

營業利益：預測 + 修正 + g

價量g、預測對去年同季預測、相對舊單季預測的修正，各有係數共同學習，共14個參數。

訓練與驗證均不排除極端值。953日驗證；Sharpe未年化、未扣成本；Rank IC有效952日。

模型	Sharpe	Rank IC
純價量g	+0.007679	-0.000734
g + 預測對去年預測	+0.012657	-0.000383
g + 預期修正	+0.007730	-0.000561
g + 預測 + 修正	+0.011516	-0.000194

組合Sharpe高於純g，但低於單獨加入預測年比，這次沒有成為最高。Rank IC是四組中最高，但仍略為負值。

分期Sharpe	純g	g + 預測	組合
2018	-0.01151	-0.01515	-0.01592
2019	+0.05007	+0.05004	+0.05114
2020	+0.05086	+0.05025	+0.05045
2021	-0.08760	-0.05698	-0.06300

相對兩個主要對照

- 對純g：Δ Sharpe +0.003837。
- 對g + 預測年比：Δ Sharpe -0.001141。
- 兩項差值的95%區間都跨0，尚無可靠勝出證據。

全部1199次更新與2,326,022筆歷史預測、排名及驗證指標已核對。正式基準維持v7。

加入修正，不等於覆蓋舊訊號

你提出的理由是：預測變更後，模型應及時使用更新的資訊。這次修正資訊確實有加入，但實作方式需要區分。

本輪模型

預測報酬 = $g + b_Y \times \text{預測年比訊號} + b_R \times \text{修正訊號}$ 。兩個係數獨立估計，兩欄事件各自按 $\exp(-a/9)$ 累加衰減。

資料內部的最新Forecast會更新；舊年比事件仍繼續衰減，修正事件另行加入，沒有把舊年比直接換成新的年比。

為何兩者不完全相同？

預測年比的分母是「去年同季預測絕對值」；修正的分母是「本季舊預測」。不同基期的兩個比率相加，不一定剛好等於更新後的年比。

這次測到的是兩項訊息的組合效果；尚未測試「每次修正後重算最新預測年比並覆蓋舊值」的另一種模型。

Sharpe差值的不確定性

比較	95%差值區間
組合減純g	[-0.00447, +0.01317]
組合減g + 預測	[-0.00587, +0.00257]
組合減g + 修正	[-0.00257, +0.01021]

20日區塊、4,000次同日期配對重抽樣，未校正多重比較與過去模型選擇。未達顯著差異不等於證明修正資訊無效。