
A01 开发 | 被试03 / 记录00 / 事件0

motor_imagery / RMI；EEG/Hb起点=25.000/77.960秒。本页独立纵轴；单位为各色团训练SD。参考期0–5秒；计分5.0–29.8秒。



原 PC1：隐藏NMSE 0.481；联合 0.100。均值6：隐藏NMSE 0.673；联合 0.109。均值12：隐藏NMSE 0.678；联合 0.110。Hb-only NMSE 0.095。


上行：仅EEG预测，整段双Hb隐藏，水平零线为无EEG预测。中行：EEG＋Hb联合与Hb-only参照。下行：相应目标减预测残差。×符号标记未收敛任务，仅供诊断；方法线型保持不变，没有因失败删除该目标。

HbO目标在5.0秒达到最高-0.14 SD，在11.8秒达到最低-1.74 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.24/0.07，相关为0.85/-0.07。HbR目标在29.8秒达到最高0.40 SD，在23.4秒达到最低-0.52 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.62/0.18，相关为0.14/0.24。

证据：eeg_fnirs_single_trial|subject_03|session_00|event=0|prefrontal__eee78d70376440fd；tasks/*.json,npz

A02 开发 | 被试03 / 记录01 / 事件0

mental_arithmetic / BL；EEG/Hb起点=25.000/82.200秒。本页独立纵轴；单位为各色团训练SD。参考期0–5秒；计分5.0–29.8秒。



原 PC1：隐藏NMSE 0.334；联合 0.034。均值6：隐藏NMSE 0.305；联合 0.036。均值12：隐藏NMSE 0.304；联合 0.035。Hb-only NMSE 0.024。


上行：仅EEG预测，整段双Hb隐藏，水平零线为无EEG预测。中行：EEG＋Hb联合与Hb-only参照。下行：相应目标减预测残差。×符号标记未收敛任务，仅供诊断；方法线型保持不变，没有因失败删除该目标。

HbO目标在10.2秒达到最高0.27 SD，在22.3秒达到最低-0.85 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.71/0.23，相关为0.67/-0.37。HbR目标在27.2秒达到最高-0.03 SD，在15.1秒达到最低-0.95 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.35/0.11，相关为0.34/0.15。

证据：eeg_fnirs_single_trial|subject_03|session_01|event=0|prefrontal__eee78d70376440fd；tasks/*.json,npz

A03 开发 | 被试04 / 记录00 / 事件0

motor_imagery / LMI；EEG/Hb起点=25.000/79.480秒。本页独立纵轴；单位为各色团训练SD。参考期0–5秒；计分5.0–29.8秒。



原 PC1：隐藏NMSE 1.323；联合 0.101。均值6：隐藏NMSE 0.543；联合 0.099。均值12：隐藏NMSE 0.613；联合 0.101。Hb-only NMSE 0.067。


上行：仅EEG预测，整段双Hb隐藏，水平零线为无EEG预测。中行：EEG＋Hb联合与Hb-only参照。下行：相应目标减预测残差。×符号标记未收敛任务，仅供诊断；方法线型保持不变，没有因失败删除该目标。

HbO目标在6.1秒达到最高0.53 SD，在14.3秒达到最低-1.91 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.70/0.10，相关为0.33/0.41。HbR目标在11.1秒达到最高1.01 SD，在6.1秒达到最低-0.38 SD；PC1/均值6的预测RMS比为1.32/0.18，相关为0.27/0.50。

证据：eeg_fnirs_single_trial|subject_04|session_00|event=0|prefrontal__eee78d70376440fd；tasks/*.json,npz

A04 开发 | 被试04 / 记录01 / 事件0

mental_arithmetic / MA；EEG/Hb起点=25.000/77.240秒。本页独立纵轴；单位为各色团训练SD。参考期0–5秒；计分5.0–29.8秒。



原 PC1：隐藏NMSE 1.916；联合 0.211。均值6：隐藏NMSE 1.774；联合 0.179。均值12：隐藏NMSE 1.831；联合 0.179。Hb-only NMSE 0.091。


上行：仅EEG预测，整段双Hb隐藏，水平零线为无EEG预测。中行：EEG＋Hb联合与Hb-only参照。下行：相应目标减预测残差。×符号标记未收敛任务，仅供诊断；方法线型保持不变，没有因失败删除该目标。

HbO目标在5.0秒达到最高1.22 SD，在11.9秒达到最低-3.12 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.26/0.03，相关为-0.35/0.31。HbR目标在12.2秒达到最高1.44 SD，在6.7秒达到最低-1.34 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.41/0.05，相关为0.12/0.36。

证据：eeg_fnirs_single_trial|subject_04|session_01|event=0|prefrontal__eee78d70376440fd；tasks/*.json,npz

A05 开发 | 被试09 / 记录00 / 事件0

motor_imagery / RMI；EEG/Hb起点=25.000/78.920秒。本页独立纵轴；单位为各色团训练SD。参考期0–5秒；计分5.0–29.8秒。



原 PC1：隐藏NMSE 5.544；联合 0.412。均值6：隐藏NMSE 5.836；联合 0.414。均值12：隐藏NMSE 5.804；联合 0.412。Hb-only NMSE 0.341。


上行：仅EEG预测，整段双Hb隐藏，水平零线为无EEG预测。中行：EEG＋Hb联合与Hb-only参照。下行：相应目标减预测残差。×符号标记未收敛任务，仅供诊断；方法线型保持不变，没有因失败删除该目标。

HbO目标在5.0秒达到最高-1.94 SD，在7.5秒达到最低-3.90 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.11/0.02，相关为-0.20/-0.21。HbR目标在29.4秒达到最高-0.01 SD，在14.5秒达到最低-1.98 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.19/0.04，相关为0.46/0.41。

证据：eeg_fnirs_single_trial|subject_09|session_00|event=0|prefrontal__eee78d70376440fd；tasks/*.json,npz

A06 开发 | 被试09 / 记录01 / 事件0

mental_arithmetic / MA；EEG/Hb起点=25.000/77.400秒。本页独立纵轴；单位为各色团训练SD。参考期0–5秒；计分5.0–29.8秒。



原 PC1：隐藏NMSE 5.754；联合 0.550。均值6：隐藏NMSE 5.471；联合 0.539。均值12：隐藏NMSE 5.510；联合 0.541。Hb-only NMSE 0.258。


上行：仅EEG预测，整段双Hb隐藏，水平零线为无EEG预测。中行：EEG＋Hb联合与Hb-only参照。下行：相应目标减预测残差。×符号标记未收敛任务，仅供诊断；方法线型保持不变，没有因失败删除该目标。

HbO目标在9.3秒达到最高-1.05 SD，在29.6秒达到最低-6.00 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.12/0.03，相关为-0.10/0.62。HbR目标在5.0秒达到最高-0.95 SD，在15.8秒达到最低-2.43 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.14/0.04，相关为0.76/0.82。

证据：eeg_fnirs_single_trial|subject_09|session_01|event=0|prefrontal__eee78d70376440fd；tasks/*.json,npz

A07 开发 | 被试13 / 记录00 / 事件0

motor_imagery / LMI；EEG/Hb起点=25.000/77.160秒。本页独立纵轴；单位为各色团训练SD。参考期0–5秒；计分5.0–29.8秒。



原 PC1：隐藏NMSE 1.133；联合 0.220。均值6：隐藏NMSE 0.384；联合 0.115。均值12：隐藏NMSE 0.414；联合 0.113。Hb-only NMSE 0.075。


上行：仅EEG预测，整段双Hb隐藏，水平零线为无EEG预测。中行：EEG＋Hb联合与Hb-only参照。下行：相应目标减预测残差。×符号标记未收敛任务，仅供诊断；方法线型保持不变，没有因失败删除该目标。

HbO目标在6.2秒达到最高0.76 SD，在28.4秒达到最低-1.56 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.82/0.15，相关为-0.66/0.22。HbR目标在29.8秒达到最高0.96 SD，在22.9秒达到最低-0.07 SD；PC1/均值6的预测RMS比为1.45/0.25，相关为-0.42/-0.42。

证据：eeg_fnirs_single_trial|subject_13|session_00|event=0|prefrontal__eee78d70376440fd；tasks/*.json,npz

A08 开发 | 被试13 / 记录01 / 事件0

mental_arithmetic / MA；EEG/Hb起点=25.000/76.600秒。本页独立纵轴；单位为各色团训练SD。参考期0–5秒；计分5.0–29.8秒。



原 PC1：隐藏NMSE 0.455；联合 0.086。均值6：隐藏NMSE 0.337；联合 0.087。均值12：隐藏NMSE 0.334；联合 0.081。Hb-only NMSE 0.067。


上行：仅EEG预测，整段双Hb隐藏，水平零线为无EEG预测。中行：EEG＋Hb联合与Hb-only参照。下行：相应目标减预测残差。×符号标记未收敛任务，仅供诊断；方法线型保持不变，没有因失败删除该目标。

HbO目标在27.4秒达到最高0.28 SD，在23.1秒达到最低-1.31 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.29/0.14，相关为0.11/-0.46。HbR目标在26.6秒达到最高0.87 SD，在5.7秒达到最低-0.47 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.33/0.16，相关为-0.44/-0.05。

证据：eeg_fnirs_single_trial|subject_13|session_01|event=0|prefrontal__eee78d70376440fd；tasks/*.json,npz

A09 开发 | 被试16 / 记录00 / 事件0

motor_imagery / RMI；EEG/Hb起点=25.000/75.560秒。本页独立纵轴；单位为各色团训练SD。参考期0–5秒；计分5.0–29.8秒。



原 PC1：隐藏NMSE 0.787；联合 0.063。均值6：隐藏NMSE 0.320；联合 0.060。均值12：隐藏NMSE 0.316；联合 0.058。Hb-only NMSE 0.046。


上行：仅EEG预测，整段双Hb隐藏，水平零线为无EEG预测。中行：EEG＋Hb联合与Hb-only参照。下行：相应目标减预测残差。×符号标记未收敛任务，仅供诊断；方法线型保持不变，没有因失败删除该目标。

HbO目标在27.1秒达到最高1.37 SD，在14.8秒达到最低0.24 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.71/0.10，相关为0.59/0.23。HbR目标在5.7秒达到最高0.35 SD，在22.3秒达到最低-0.47 SD；PC1/均值6的预测RMS比为1.90/0.27，相关为-0.32/-0.28。

证据：eeg_fnirs_single_trial|subject_16|session_00|event=0|prefrontal__eee78d70376440fd；tasks/*.json,npz

A10 开发 | 被试16 / 记录01 / 事件0

mental_arithmetic / BL；EEG/Hb起点=25.000/75.080秒。本页独立纵轴；单位为各色团训练SD。参考期0–5秒；计分5.0–29.8秒。



原 PC1：隐藏NMSE 2.233；联合 0.461。均值6：隐藏NMSE 0.674；联合 0.302。均值12：隐藏NMSE 0.702；联合 0.306。Hb-only NMSE 0.252。


上行：仅EEG预测，整段双Hb隐藏，水平零线为无EEG预测。中行：EEG＋Hb联合与Hb-only参照。下行：相应目标减预测残差。×符号标记未收敛任务，仅供诊断；方法线型保持不变，没有因失败删除该目标。

HbO目标在23.6秒达到最高1.96 SD，在15.6秒达到最低-1.25 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.89/0.21，相关为-0.75/0.68。HbR目标在10.0秒达到最高0.56 SD，在28.7秒达到最低-1.08 SD；PC1/均值6的预测RMS比为1.25/0.29，相关为-0.29/-0.01。

证据：eeg_fnirs_single_trial|subject_16|session_01|event=0|prefrontal__eee78d70376440fd；tasks/*.json,npz

A11 开发 | 被试29 / 记录00 / 事件0

motor_imagery / LMI；EEG/Hb起点=25.000/80.680秒。本页独立纵轴；单位为各色团训练SD。参考期0–5秒；计分5.0–29.8秒。



原 PC1：隐藏NMSE 0.629；联合 0.136。均值6：隐藏NMSE 0.773；联合 0.144。均值12：隐藏NMSE 0.727；联合 0.140。Hb-only NMSE 0.110。


上行：仅EEG预测，整段双Hb隐藏，水平零线为无EEG预测。中行：EEG＋Hb联合与Hb-only参照。下行：相应目标减预测残差。×符号标记未收敛任务，仅供诊断；方法线型保持不变，没有因失败删除该目标。

HbO目标在15.8秒达到最高0.25 SD，在21.6秒达到最低-1.27 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.56/0.12，相关为0.16/-0.76。HbR目标在29.8秒达到最高0.13 SD，在15.2秒达到最低-2.22 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.25/0.06，相关为0.65/-0.72。

证据：eeg_fnirs_single_trial|subject_29|session_00|event=0|prefrontal__eee78d70376440fd；tasks/*.json,npz

A12 开发 | 被试29 / 记录01 / 事件0

mental_arithmetic / MA；EEG/Hb起点=25.000/75.560秒。本页独立纵轴；单位为各色团训练SD。参考期0–5秒；计分5.0–29.8秒。



原 PC1：隐藏NMSE 4.266；联合 0.514。均值6：隐藏NMSE 4.227；联合 0.507。均值12：隐藏NMSE 4.239；联合 0.505。Hb-only NMSE 0.408。


上行：仅EEG预测，整段双Hb隐藏，水平零线为无EEG预测。中行：EEG＋Hb联合与Hb-only参照。下行：相应目标减预测残差。×符号标记未收敛任务，仅供诊断；方法线型保持不变，没有因失败删除该目标。

HbO目标在5.0秒达到最高0.49 SD，在29.4秒达到最低-4.25 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.15/0.03，相关为-0.03/0.03。HbR目标在19.2秒达到最高-1.05 SD，在11.9秒达到最低-2.51 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.15/0.03，相关为-0.18/-0.58。

证据：eeg_fnirs_single_trial|subject_29|session_01|event=0|prefrontal__eee78d70376440fd；tasks/*.json,npz

A13 评价 | 被试05 / 记录00 / 事件0

motor_imagery / RMI；EEG/Hb起点=25.000/77.720秒。本页独立纵轴；单位为各色团训练SD。参考期0–5秒；计分5.0–29.8秒。



原 PC1：隐藏NMSE 2.554；联合 1.316。均值6：隐藏NMSE 2.069；联合 1.182。Hb-only NMSE 1.086。


上行：仅EEG预测，整段双Hb隐藏，水平零线为无EEG预测。中行：EEG＋Hb联合与Hb-only参照。下行：相应目标减预测残差。×符号标记未收敛任务，仅供诊断；方法线型保持不变，没有因失败删除该目标。

HbO目标在25.1秒达到最高1.64 SD，在9.1秒达到最低-3.15 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.48/0.07，相关为0.04/-0.10。HbR目标在5.0秒达到最高0.25 SD，在10.0秒达到最低-1.99 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.63/0.08，相关为0.02/0.10。

证据：eeg_fnirs_single_trial|subject_05|session_00|event=0|prefrontal__eee78d70376440fd；tasks/*.json,npz

A14 评价 | 被试05 / 记录00 / 事件2

motor_imagery / RMI；EEG/Hb起点=81.993/134.680秒。本页独立纵轴；单位为各色团训练SD。参考期0–5秒；计分5.0–29.8秒。



原 PC1：隐藏NMSE 2.731；联合 0.922。均值6：隐藏NMSE 3.821；联合 0.988。Hb-only NMSE 0.867。


上行：仅EEG预测，整段双Hb隐藏，水平零线为无EEG预测。中行：EEG＋Hb联合与Hb-only参照。下行：相应目标减预测残差。×符号标记未收敛任务，仅供诊断；方法线型保持不变，没有因失败删除该目标。

HbO目标在9.3秒达到最高5.18 SD，在5.0秒达到最低0.32 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.30/0.03，相关为0.82/-0.18。HbR目标在8.4秒达到最高1.40 SD，在14.1秒达到最低-1.16 SD；PC1/均值6的预测RMS比为1.00/0.10，相关为-0.25/-0.06。

证据：eeg_fnirs_single_trial|subject_05|session_00|event=2|prefrontal__eee78d70376440fd；tasks/*.json,npz

A15 评价 | 被试05 / 记录00 / 事件4

motor_imagery / RMI；EEG/Hb起点=136.988/189.640秒。本页独立纵轴；单位为各色团训练SD。参考期0–5秒；计分5.0–29.8秒。



原 PC1：隐藏NMSE 8.941；联合 0.881。均值6：隐藏NMSE 10.112；联合 0.992。Hb-only NMSE 0.389。


上行：仅EEG预测，整段双Hb隐藏，水平零线为无EEG预测。中行：EEG＋Hb联合与Hb-only参照。下行：相应目标减预测残差。×符号标记未收敛任务，仅供诊断；方法线型保持不变，没有因失败删除该目标。

HbO目标在20.1秒达到最高7.52 SD，在5.0秒达到最低-0.75 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.17/0.04，相关为0.70/0.52。HbR目标在18.5秒达到最高2.34 SD，在29.8秒达到最低0.30 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.40/0.10，相关为-0.29/0.31。

证据：eeg_fnirs_single_trial|subject_05|session_00|event=4|prefrontal__eee78d70376440fd；tasks/*.json,npz

A16 评价 | 被试05 / 记录01 / 事件0

mental_arithmetic / BL；EEG/Hb起点=25.000/76.280秒。本页独立纵轴；单位为各色团训练SD。参考期0–5秒；计分5.0–29.8秒。



原 PC1：隐藏NMSE 2.135；联合 0.414。均值6：隐藏NMSE 1.690；联合 0.363。Hb-only NMSE 0.290。


上行：仅EEG预测，整段双Hb隐藏，水平零线为无EEG预测。中行：EEG＋Hb联合与Hb-only参照。下行：相应目标减预测残差。×符号标记未收敛任务，仅供诊断；方法线型保持不变，没有因失败删除该目标。

HbO目标在29.8秒达到最高2.25 SD，在6.4秒达到最低-2.34 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.48/0.12，相关为-0.60/0.34。HbR目标在9.9秒达到最高-0.40 SD，在20.3秒达到最低-2.32 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.23/0.07，相关为0.17/-0.39。

证据：eeg_fnirs_single_trial|subject_05|session_01|event=0|prefrontal__eee78d70376440fd；tasks/*.json,npz

A17 评价 | 被试05 / 记录01 / 事件2

mental_arithmetic / BL；EEG/Hb起点=80.996/132.280秒。本页独立纵轴；单位为各色团训练SD。参考期0–5秒；计分5.0–29.8秒。



原 PC1：隐藏NMSE 3.828；联合 1.160。均值6：隐藏NMSE 3.878；联合 1.197。Hb-only NMSE 0.989。


上行：仅EEG预测，整段双Hb隐藏，水平零线为无EEG预测。中行：EEG＋Hb联合与Hb-only参照。下行：相应目标减预测残差。×符号标记未收敛任务，仅供诊断；方法线型保持不变，没有因失败删除该目标。

HbO目标在25.8秒达到最高4.63 SD，在29.8秒达到最低-0.35 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.15/0.04，相关为0.24/-0.32。HbR目标在16.0秒达到最高1.21 SD，在29.8秒达到最低-2.34 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.32/0.08，相关为0.30/-0.06。

证据：eeg_fnirs_single_trial|subject_05|session_01|event=2|prefrontal__eee78d70376440fd；tasks/*.json,npz

A18 评价 | 被试05 / 记录01 / 事件4

mental_arithmetic / BL；EEG/Hb起点=136.954/188.280秒。本页独立纵轴；单位为各色团训练SD。参考期0–5秒；计分5.0–29.8秒。



原 PC1：隐藏NMSE 17.041；联合 0.834（未收敛，仅诊断）。均值6：隐藏NMSE 16.278；联合 0.830（未收敛，仅诊断）。Hb-only NMSE 0.302（未收敛，仅诊断）。


上行：仅EEG预测，整段双Hb隐藏，水平零线为无EEG预测。中行：EEG＋Hb联合与Hb-only参照。下行：相应目标减预测残差。×符号标记未收敛任务，仅供诊断；方法线型保持不变，没有因失败删除该目标。

HbO目标在5.0秒达到最高0.28 SD，在17.8秒达到最低-5.99 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.07/0.01，相关为0.03/-0.72。HbR目标在5.0秒达到最高0.20 SD，在14.1秒达到最低-2.85 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.12/0.02，相关为0.23/0.55。

证据：eeg_fnirs_single_trial|subject_05|session_01|event=4|prefrontal__eee78d70376440fd；tasks/*.json,npz

A19 评价 | 被试06 / 记录00 / 事件0

motor_imagery / RMI；EEG/Hb起点=25.000/75.960秒。本页独立纵轴；单位为各色团训练SD。参考期0–5秒；计分5.0–29.8秒。



原 PC1：隐藏NMSE 0.311；联合 0.129。均值6：隐藏NMSE 0.271；联合 0.119。Hb-only NMSE 0.109。


上行：仅EEG预测，整段双Hb隐藏，水平零线为无EEG预测。中行：EEG＋Hb联合与Hb-only参照。下行：相应目标减预测残差。×符号标记未收敛任务，仅供诊断；方法线型保持不变，没有因失败删除该目标。

HbO目标在20.0秒达到最高0.75 SD，在28.9秒达到最低-1.04 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.44/0.13，相关为0.20/0.27。HbR目标在19.5秒达到最高0.04 SD，在27.8秒达到最低-0.47 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.82/0.24，相关为0.11/0.23。

证据：eeg_fnirs_single_trial|subject_06|session_00|event=0|prefrontal__eee78d70376440fd；tasks/*.json,npz

A20 评价 | 被试06 / 记录00 / 事件2

motor_imagery / LMI；EEG/Hb起点=81.979/132.920秒。本页独立纵轴；单位为各色团训练SD。参考期0–5秒；计分5.0–29.8秒。



原 PC1：隐藏NMSE 0.559；联合 0.211。均值6：隐藏NMSE 0.528；联合 0.218。Hb-only NMSE 0.198。


上行：仅EEG预测，整段双Hb隐藏，水平零线为无EEG预测。中行：EEG＋Hb联合与Hb-only参照。下行：相应目标减预测残差。×符号标记未收敛任务，仅供诊断；方法线型保持不变，没有因失败删除该目标。

HbO目标在7.9秒达到最高0.72 SD，在26.7秒达到最低-1.35 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.49/0.18，相关为0.12/-0.10。HbR目标在16.8秒达到最高1.13 SD，在25.5秒达到最低0.14 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.35/0.13，相关为0.43/-0.30。

证据：eeg_fnirs_single_trial|subject_06|session_00|event=2|prefrontal__eee78d70376440fd；tasks/*.json,npz

A21 评价 | 被试06 / 记录00 / 事件4

motor_imagery / LMI；EEG/Hb起点=139.949/190.840秒。本页独立纵轴；单位为各色团训练SD。参考期0–5秒；计分5.0–29.8秒。



原 PC1：隐藏NMSE 11.719；联合 7.460。均值6：隐藏NMSE 12.857；联合 6.798（未收敛，仅诊断）。Hb-only NMSE 5.274。


上行：仅EEG预测，整段双Hb隐藏，水平零线为无EEG预测。中行：EEG＋Hb联合与Hb-only参照。下行：相应目标减预测残差。×符号标记未收敛任务，仅供诊断；方法线型保持不变，没有因失败删除该目标。

HbO目标在21.1秒达到最高9.78 SD，在17.3秒达到最低-1.92 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.16/0.03，相关为0.84/-0.61。HbR目标在21.1秒达到最高5.69 SD，在6.4秒达到最低-0.60 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.25/0.05，相关为-0.80/0.81。

证据：eeg_fnirs_single_trial|subject_06|session_00|event=4|prefrontal__eee78d70376440fd；tasks/*.json,npz

A22 评价 | 被试06 / 记录01 / 事件0

mental_arithmetic / MA；EEG/Hb起点=25.000/75.480秒。本页独立纵轴；单位为各色团训练SD。参考期0–5秒；计分5.0–29.8秒。



原 PC1：隐藏NMSE 1.932；联合 0.356。均值6：隐藏NMSE 1.856；联合 0.365。Hb-only NMSE 0.315。


上行：仅EEG预测，整段双Hb隐藏，水平零线为无EEG预测。中行：EEG＋Hb联合与Hb-only参照。下行：相应目标减预测残差。×符号标记未收敛任务，仅供诊断；方法线型保持不变，没有因失败删除该目标。

HbO目标在20.7秒达到最高0.93 SD，在15.6秒达到最低-2.20 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.51/0.12，相关为0.73/-0.10。HbR目标在29.6秒达到最高-0.41 SD，在23.7秒达到最低-2.00 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.34/0.08，相关为-0.53/-0.48。

证据：eeg_fnirs_single_trial|subject_06|session_01|event=0|prefrontal__eee78d70376440fd；tasks/*.json,npz

A23 评价 | 被试06 / 记录01 / 事件2

mental_arithmetic / BL；EEG/Hb起点=82.080/132.520秒。本页独立纵轴；单位为各色团训练SD。参考期0–5秒；计分5.0–29.8秒。



原 PC1：隐藏NMSE 0.516；联合 0.090。均值6：隐藏NMSE 0.292；联合 0.059。Hb-only NMSE 0.051。


上行：仅EEG预测，整段双Hb隐藏，水平零线为无EEG预测。中行：EEG＋Hb联合与Hb-only参照。下行：相应目标减预测残差。×符号标记未收敛任务，仅供诊断；方法线型保持不变，没有因失败删除该目标。

HbO目标在22.3秒达到最高1.28 SD，在27.2秒达到最低0.16 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.45/0.13，相关为0.13/0.12。HbR目标在5.0秒达到最高0.31 SD，在26.4秒达到最低-0.79 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.87/0.25，相关为-0.52/0.52。

证据：eeg_fnirs_single_trial|subject_06|session_01|event=2|prefrontal__eee78d70376440fd；tasks/*.json,npz

A24 评价 | 被试06 / 记录01 / 事件4

mental_arithmetic / MA；EEG/Hb起点=139.052/189.480秒。本页独立纵轴；单位为各色团训练SD。参考期0–5秒；计分5.0–29.8秒。



原 PC1：隐藏NMSE 1.162；联合 0.388。均值6：隐藏NMSE 0.577；联合 0.321。Hb-only NMSE 0.296。


上行：仅EEG预测，整段双Hb隐藏，水平零线为无EEG预测。中行：EEG＋Hb联合与Hb-only参照。下行：相应目标减预测残差。×符号标记未收敛任务，仅供诊断；方法线型保持不变，没有因失败删除该目标。

HbO目标在20.2秒达到最高1.52 SD，在27.3秒达到最低-1.30 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.82/0.08，相关为-0.21/0.50。HbR目标在20.4秒达到最高1.51 SD，在5.7秒达到最低-0.59 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.75/0.07，相关为-0.43/-0.58。

证据：eeg_fnirs_single_trial|subject_06|session_01|event=4|prefrontal__eee78d70376440fd；tasks/*.json,npz

A25 评价 | 被试07 / 记录00 / 事件0

motor_imagery / RMI；EEG/Hb起点=25.000/75.880秒。本页独立纵轴；单位为各色团训练SD。参考期0–5秒；计分5.0–29.8秒。



原 PC1：隐藏NMSE 0.645；联合 0.088。均值6：隐藏NMSE 0.704；联合 0.074。Hb-only NMSE 0.066。


上行：仅EEG预测，整段双Hb隐藏，水平零线为无EEG预测。中行：EEG＋Hb联合与Hb-only参照。下行：相应目标减预测残差。×符号标记未收敛任务，仅供诊断；方法线型保持不变，没有因失败删除该目标。

HbO目标在17.9秒达到最高-0.12 SD，在29.8秒达到最低-1.59 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.34/0.07，相关为-0.26/-0.61。HbR目标在15.3秒达到最高1.24 SD，在5.0秒达到最低0.15 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.30/0.07，相关为0.56/0.63。

证据：eeg_fnirs_single_trial|subject_07|session_00|event=0|prefrontal__eee78d70376440fd；tasks/*.json,npz

A26 评价 | 被试07 / 记录00 / 事件2

motor_imagery / RMI；EEG/Hb起点=81.997/132.920秒。本页独立纵轴；单位为各色团训练SD。参考期0–5秒；计分5.0–29.8秒。



原 PC1：隐藏NMSE 0.854；联合 0.512。均值6：隐藏NMSE 0.772；联合 0.484。Hb-only NMSE 0.432。


上行：仅EEG预测，整段双Hb隐藏，水平零线为无EEG预测。中行：EEG＋Hb联合与Hb-only参照。下行：相应目标减预测残差。×符号标记未收敛任务，仅供诊断；方法线型保持不变，没有因失败删除该目标。

HbO目标在13.5秒达到最高1.14 SD，在29.6秒达到最低-2.10 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.30/0.06，相关为0.19/-0.31。HbR目标在13.1秒达到最高0.48 SD，在20.6秒达到最低-1.33 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.54/0.11，相关为-0.69/-0.25。

证据：eeg_fnirs_single_trial|subject_07|session_00|event=2|prefrontal__eee78d70376440fd；tasks/*.json,npz

A27 评价 | 被试07 / 记录00 / 事件4

motor_imagery / RMI；EEG/Hb起点=139.954/190.840秒。本页独立纵轴；单位为各色团训练SD。参考期0–5秒；计分5.0–29.8秒。



原 PC1：隐藏NMSE 1.527；联合 0.498。均值6：隐藏NMSE 0.858；联合 0.465。Hb-only NMSE 0.416。


上行：仅EEG预测，整段双Hb隐藏，水平零线为无EEG预测。中行：EEG＋Hb联合与Hb-only参照。下行：相应目标减预测残差。×符号标记未收敛任务，仅供诊断；方法线型保持不变，没有因失败删除该目标。

HbO目标在23.8秒达到最高1.41 SD，在29.8秒达到最低-1.64 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.62/0.08，相关为-0.39/0.27。HbR目标在23.8秒达到最高3.10 SD，在20.3秒达到最低-0.13 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.40/0.06，相关为-0.43/-0.18。

证据：eeg_fnirs_single_trial|subject_07|session_00|event=4|prefrontal__eee78d70376440fd；tasks/*.json,npz

A28 评价 | 被试07 / 记录01 / 事件0

mental_arithmetic / BL；EEG/Hb起点=25.000/77.000秒。本页独立纵轴；单位为各色团训练SD。参考期0–5秒；计分5.0–29.8秒。



原 PC1：隐藏NMSE 2.963；联合 0.585。均值6：隐藏NMSE 2.743；联合 0.591。Hb-only NMSE 0.336。


上行：仅EEG预测，整段双Hb隐藏，水平零线为无EEG预测。中行：EEG＋Hb联合与Hb-only参照。下行：相应目标减预测残差。×符号标记未收敛任务，仅供诊断；方法线型保持不变，没有因失败删除该目标。

HbO目标在16.7秒达到最高2.88 SD，在5.0秒达到最低-0.39 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.16/0.02，相关为-0.45/-0.72。HbR目标在15.9秒达到最高2.03 SD，在5.0秒达到最低0.21 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.17/0.03，相关为0.76/0.43。

证据：eeg_fnirs_single_trial|subject_07|session_01|event=0|prefrontal__eee78d70376440fd；tasks/*.json,npz

A29 评价 | 被试07 / 记录01 / 事件2

mental_arithmetic / MA；EEG/Hb起点=82.970/135.000秒。本页独立纵轴；单位为各色团训练SD。参考期0–5秒；计分5.0–29.8秒。



原 PC1：隐藏NMSE 1.342；联合 0.144。均值6：隐藏NMSE 0.871；联合 0.117。Hb-only NMSE 0.097。


上行：仅EEG预测，整段双Hb隐藏，水平零线为无EEG预测。中行：EEG＋Hb联合与Hb-only参照。下行：相应目标减预测残差。×符号标记未收敛任务，仅供诊断；方法线型保持不变，没有因失败删除该目标。

HbO目标在28.5秒达到最高0.57 SD，在9.3秒达到最低-1.20 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.38/0.10，相关为-0.85/0.31。HbR目标在19.0秒达到最高1.49 SD，在7.1秒达到最低-0.09 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.28/0.07，相关为0.04/-0.43。

证据：eeg_fnirs_single_trial|subject_07|session_01|event=2|prefrontal__eee78d70376440fd；tasks/*.json,npz

A30 评价 | 被试07 / 记录01 / 事件4

mental_arithmetic / BL；EEG/Hb起点=139.989/191.960秒。本页独立纵轴；单位为各色团训练SD。参考期0–5秒；计分5.0–29.8秒。



原 PC1：隐藏NMSE 2.348；联合 0.509。均值6：隐藏NMSE 2.232；联合 0.493。Hb-only NMSE 0.472。


上行：仅EEG预测，整段双Hb隐藏，水平零线为无EEG预测。中行：EEG＋Hb联合与Hb-only参照。下行：相应目标减预测残差。×符号标记未收敛任务，仅供诊断；方法线型保持不变，没有因失败删除该目标。

HbO目标在8.6秒达到最高3.14 SD，在26.6秒达到最低0.33 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.17/0.07，相关为0.34/0.88。HbR目标在6.0秒达到最高0.53 SD，在22.2秒达到最低-1.24 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.40/0.17，相关为-0.26/-0.70。

证据：eeg_fnirs_single_trial|subject_07|session_01|event=4|prefrontal__eee78d70376440fd；tasks/*.json,npz

A31 评价 | 被试08 / 记录00 / 事件0

motor_imagery / LMI；EEG/Hb起点=25.000/82.120秒。本页独立纵轴；单位为各色团训练SD。参考期0–5秒；计分5.0–29.8秒。



原 PC1：隐藏NMSE 2.419；联合 0.471。均值6：隐藏NMSE 2.634；联合 0.450。Hb-only NMSE 0.392。


上行：仅EEG预测，整段双Hb隐藏，水平零线为无EEG预测。中行：EEG＋Hb联合与Hb-only参照。下行：相应目标减预测残差。×符号标记未收敛任务，仅供诊断；方法线型保持不变，没有因失败删除该目标。

HbO目标在29.8秒达到最高-0.13 SD，在8.2秒达到最低-3.36 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.22/0.03，相关为0.33/0.21。HbR目标在28.0秒达到最高0.03 SD，在17.2秒达到最低-1.27 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.50/0.07，相关为-0.52/0.63。

证据：eeg_fnirs_single_trial|subject_08|session_00|event=0|prefrontal__eee78d70376440fd；tasks/*.json,npz

A32 评价 | 被试08 / 记录00 / 事件2

motor_imagery / LMI；EEG/Hb起点=80.998/138.120秒。本页独立纵轴；单位为各色团训练SD。参考期0–5秒；计分5.0–29.8秒。



原 PC1：隐藏NMSE 0.247；联合 0.122。均值6：隐藏NMSE 0.189；联合 0.101。Hb-only NMSE 0.086。


上行：仅EEG预测，整段双Hb隐藏，水平零线为无EEG预测。中行：EEG＋Hb联合与Hb-only参照。下行：相应目标减预测残差。×符号标记未收敛任务，仅供诊断；方法线型保持不变，没有因失败删除该目标。

HbO目标在5.0秒达到最高0.53 SD，在24.0秒达到最低-1.03 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.77/0.20，相关为0.04/0.50。HbR目标在15.2秒达到最高0.25 SD，在23.1秒达到最低-0.61 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.93/0.24，相关为0.26/-0.24。

证据：eeg_fnirs_single_trial|subject_08|session_00|event=2|prefrontal__eee78d70376440fd；tasks/*.json,npz

A33 评价 | 被试08 / 记录00 / 事件4

motor_imagery / RMI；EEG/Hb起点=136.022/193.160秒。本页独立纵轴；单位为各色团训练SD。参考期0–5秒；计分5.0–29.8秒。



原 PC1：隐藏NMSE 1.010；联合 0.200。均值6：隐藏NMSE 0.903；联合 0.166。Hb-only NMSE 0.122。


上行：仅EEG预测，整段双Hb隐藏，水平零线为无EEG预测。中行：EEG＋Hb联合与Hb-only参照。下行：相应目标减预测残差。×符号标记未收敛任务，仅供诊断；方法线型保持不变，没有因失败删除该目标。

HbO目标在5.2秒达到最高0.57 SD，在21.2秒达到最低-2.50 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.31/0.07，相关为0.14/0.32。HbR目标在25.4秒达到最高0.23 SD，在7.9秒达到最低-0.91 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.71/0.17，相关为-0.70/0.69。

证据：eeg_fnirs_single_trial|subject_08|session_00|event=4|prefrontal__eee78d70376440fd；tasks/*.json,npz

A34 评价 | 被试08 / 记录01 / 事件0

mental_arithmetic / BL；EEG/Hb起点=25.000/78.600秒。本页独立纵轴；单位为各色团训练SD。参考期0–5秒；计分5.0–29.8秒。



原 PC1：隐藏NMSE 1.523；联合 0.182。均值6：隐藏NMSE 1.270；联合 0.174。Hb-only NMSE 0.138。


上行：仅EEG预测，整段双Hb隐藏，水平零线为无EEG预测。中行：EEG＋Hb联合与Hb-only参照。下行：相应目标减预测残差。×符号标记未收敛任务，仅供诊断；方法线型保持不变，没有因失败删除该目标。

HbO目标在15.7秒达到最高0.11 SD，在10.1秒达到最低-2.66 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.18/0.05，相关为0.12/0.84。HbR目标在24.7秒达到最高-0.01 SD，在18.6秒达到最低-1.02 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.44/0.10，相关为0.28/0.20。

证据：eeg_fnirs_single_trial|subject_08|session_01|event=0|prefrontal__eee78d70376440fd；tasks/*.json,npz

A35 评价 | 被试08 / 记录01 / 事件2

mental_arithmetic / BL；EEG/Hb起点=82.009/135.560秒。本页独立纵轴；单位为各色团训练SD。参考期0–5秒；计分5.0–29.8秒。



原 PC1：隐藏NMSE 0.467；联合 0.150。均值6：隐藏NMSE 0.442；联合 0.158。Hb-only NMSE 0.086。


上行：仅EEG预测，整段双Hb隐藏，水平零线为无EEG预测。中行：EEG＋Hb联合与Hb-only参照。下行：相应目标减预测残差。×符号标记未收敛任务，仅供诊断；方法线型保持不变，没有因失败删除该目标。

HbO目标在20.2秒达到最高1.54 SD，在25.2秒达到最低-1.16 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.33/0.07，相关为0.22/-0.23。HbR目标在27.7秒达到最高1.22 SD，在6.9秒达到最低-0.22 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.38/0.09，相关为-0.20/0.43。

证据：eeg_fnirs_single_trial|subject_08|session_01|event=2|prefrontal__eee78d70376440fd；tasks/*.json,npz

A36 评价 | 被试08 / 记录01 / 事件4

mental_arithmetic / BL；EEG/Hb起点=136.998/190.520秒。本页独立纵轴；单位为各色团训练SD。参考期0–5秒；计分5.0–29.8秒。



原 PC1：隐藏NMSE 0.707；联合 0.269。均值6：隐藏NMSE 0.939；联合 0.304。Hb-only NMSE 0.195。


上行：仅EEG预测，整段双Hb隐藏，水平零线为无EEG预测。中行：EEG＋Hb联合与Hb-only参照。下行：相应目标减预测残差。×符号标记未收敛任务，仅供诊断；方法线型保持不变，没有因失败删除该目标。

HbO目标在18.4秒达到最高2.04 SD，在25.2秒达到最低-2.39 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.19/0.06，相关为0.71/0.01。HbR目标在29.8秒达到最高1.13 SD，在10.8秒达到最低0.03 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.30/0.08，相关为0.76/-0.17。

证据：eeg_fnirs_single_trial|subject_08|session_01|event=4|prefrontal__eee78d70376440fd；tasks/*.json,npz

A37 评价 | 被试21 / 记录00 / 事件0

motor_imagery / RMI；EEG/Hb起点=25.000/75.080秒。本页独立纵轴；单位为各色团训练SD。参考期0–5秒；计分5.0–29.8秒。



原 PC1：隐藏NMSE 2.209；联合 0.345。均值6：隐藏NMSE 1.887；联合 0.262。Hb-only NMSE 0.239。


上行：仅EEG预测，整段双Hb隐藏，水平零线为无EEG预测。中行：EEG＋Hb联合与Hb-only参照。下行：相应目标减预测残差。×符号标记未收敛任务，仅供诊断；方法线型保持不变，没有因失败删除该目标。

HbO目标在14.2秒达到最高1.07 SD，在24.6秒达到最低-0.36 SD；PC1/均值6的预测RMS比为1.04/0.16，相关为-0.70/-0.66。HbR目标在5.0秒达到最高-0.24 SD，在28.6秒达到最低-2.89 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.21/0.03，相关为-0.36/0.30。

证据：eeg_fnirs_single_trial|subject_21|session_00|event=0|prefrontal__eee78d70376440fd；tasks/*.json,npz

A38 评价 | 被试21 / 记录00 / 事件2

motor_imagery / LMI；EEG/Hb起点=82.962/133.080秒。本页独立纵轴；单位为各色团训练SD。参考期0–5秒；计分5.0–29.8秒。



原 PC1：隐藏NMSE 0.661；联合 0.228。均值6：隐藏NMSE 0.293；联合 0.186。Hb-only NMSE 0.174。


上行：仅EEG预测，整段双Hb隐藏，水平零线为无EEG预测。中行：EEG＋Hb联合与Hb-only参照。下行：相应目标减预测残差。×符号标记未收敛任务，仅供诊断；方法线型保持不变，没有因失败删除该目标。

HbO目标在12.1秒达到最高0.90 SD，在28.3秒达到最低-0.92 SD；PC1/均值6的预测RMS比为1.26/0.19，相关为0.07/-0.50。HbR目标在15.2秒达到最高0.64 SD，在29.8秒达到最低-0.47 SD；PC1/均值6的预测RMS比为1.40/0.23，相关为0.28/0.61。

证据：eeg_fnirs_single_trial|subject_21|session_00|event=2|prefrontal__eee78d70376440fd；tasks/*.json,npz

A39 评价 | 被试21 / 记录00 / 事件4

motor_imagery / LMI；EEG/Hb起点=139.953/190.040秒。本页独立纵轴；单位为各色团训练SD。参考期0–5秒；计分5.0–29.8秒。



原 PC1：隐藏NMSE 1.236；联合 0.260。均值6：隐藏NMSE 0.651；联合 0.162。Hb-only NMSE 0.131。


上行：仅EEG预测，整段双Hb隐藏，水平零线为无EEG预测。中行：EEG＋Hb联合与Hb-only参照。下行：相应目标减预测残差。×符号标记未收敛任务，仅供诊断；方法线型保持不变，没有因失败删除该目标。

HbO目标在13.2秒达到最高1.66 SD，在6.5秒达到最低-0.86 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.81/0.18，相关为-0.48/-0.47。HbR目标在8.2秒达到最高1.08 SD，在29.8秒达到最低0.16 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.73/0.17，相关为-0.40/0.12。

证据：eeg_fnirs_single_trial|subject_21|session_00|event=4|prefrontal__eee78d70376440fd；tasks/*.json,npz

A40 评价 | 被试21 / 记录01 / 事件0

mental_arithmetic / BL；EEG/Hb起点=25.000/78.280秒。本页独立纵轴；单位为各色团训练SD。参考期0–5秒；计分5.0–29.8秒。



原 PC1：隐藏NMSE 1.011；联合 0.144。均值6：隐藏NMSE 0.566；联合 0.108。Hb-only NMSE 0.046。


上行：仅EEG预测，整段双Hb隐藏，水平零线为无EEG预测。中行：EEG＋Hb联合与Hb-only参照。下行：相应目标减预测残差。×符号标记未收敛任务，仅供诊断；方法线型保持不变，没有因失败删除该目标。

HbO目标在13.9秒达到最高0.47 SD，在19.5秒达到最低-2.19 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.42/0.07，相关为-0.58/-0.60。HbR目标在20.6秒达到最高0.79 SD，在9.3秒达到最低-0.37 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.92/0.14，相关为-0.62/-0.50。

证据：eeg_fnirs_single_trial|subject_21|session_01|event=0|prefrontal__eee78d70376440fd；tasks/*.json,npz

A41 评价 | 被试21 / 记录01 / 事件2

mental_arithmetic / BL；EEG/Hb起点=80.963/134.280秒。本页独立纵轴；单位为各色团训练SD。参考期0–5秒；计分5.0–29.8秒。



原 PC1：隐藏NMSE 0.972；联合 0.141。均值6：隐藏NMSE 0.938；联合 0.137。Hb-only NMSE 0.133。


上行：仅EEG预测，整段双Hb隐藏，水平零线为无EEG预测。中行：EEG＋Hb联合与Hb-only参照。下行：相应目标减预测残差。×符号标记未收敛任务，仅供诊断；方法线型保持不变，没有因失败删除该目标。

HbO目标在23.6秒达到最高0.62 SD，在15.4秒达到最低-0.57 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.34/0.17，相关为-0.85/-0.73。HbR目标在24.6秒达到最高1.84 SD，在5.0秒达到最低0.59 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.09/0.05，相关为0.67/0.62。

证据：eeg_fnirs_single_trial|subject_21|session_01|event=2|prefrontal__eee78d70376440fd；tasks/*.json,npz

A42 评价 | 被试21 / 记录01 / 事件4

mental_arithmetic / MA；EEG/Hb起点=137.950/191.240秒。本页独立纵轴；单位为各色团训练SD。参考期0–5秒；计分5.0–29.8秒。



原 PC1：隐藏NMSE 2.305；联合 0.370。均值6：隐藏NMSE 1.946；联合 0.311。Hb-only NMSE 0.281。


上行：仅EEG预测，整段双Hb隐藏，水平零线为无EEG预测。中行：EEG＋Hb联合与Hb-only参照。下行：相应目标减预测残差。×符号标记未收敛任务，仅供诊断；方法线型保持不变，没有因失败删除该目标。

HbO目标在14.1秒达到最高2.60 SD，在7.2秒达到最低0.25 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.37/0.04，相关为0.39/-0.19。HbR目标在16.6秒达到最高1.47 SD，在27.2秒达到最低0.15 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.55/0.07，相关为-0.78/0.08。

证据：eeg_fnirs_single_trial|subject_21|session_01|event=4|prefrontal__eee78d70376440fd；tasks/*.json,npz

A43 评价 | 被试25 / 记录00 / 事件0

motor_imagery / LMI；EEG/Hb起点=25.000/75.240秒。本页独立纵轴；单位为各色团训练SD。参考期0–5秒；计分5.0–29.8秒。



原 PC1：隐藏NMSE 0.450；联合 0.052。均值6：隐藏NMSE 0.149；联合 0.024。Hb-only NMSE 0.012。


上行：仅EEG预测，整段双Hb隐藏，水平零线为无EEG预测。中行：EEG＋Hb联合与Hb-only参照。下行：相应目标减预测残差。×符号标记未收敛任务，仅供诊断；方法线型保持不变，没有因失败删除该目标。

HbO目标在28.2秒达到最高0.56 SD，在6.2秒达到最低-0.44 SD；PC1/均值6的预测RMS比为2.18/0.26，相关为0.49/0.09。HbR目标在14.7秒达到最高-0.10 SD，在27.0秒达到最低-0.68 SD；PC1/均值6的预测RMS比为1.29/0.14，相关为0.53/-0.28。

证据：eeg_fnirs_single_trial|subject_25|session_00|event=0|prefrontal__eee78d70376440fd；tasks/*.json,npz

A44 评价 | 被试25 / 记录00 / 事件2

motor_imagery / LMI；EEG/Hb起点=81.999/132.280秒。本页独立纵轴；单位为各色团训练SD。参考期0–5秒；计分5.0–29.8秒。



原 PC1：隐藏NMSE 0.383；联合 0.103。均值6：隐藏NMSE 0.332；联合 0.093。Hb-only NMSE 0.080。


上行：仅EEG预测，整段双Hb隐藏，水平零线为无EEG预测。中行：EEG＋Hb联合与Hb-only参照。下行：相应目标减预测残差。×符号标记未收敛任务，仅供诊断；方法线型保持不变，没有因失败删除该目标。

HbO目标在15.1秒达到最高1.13 SD，在29.8秒达到最低0.04 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.37/0.07，相关为-0.52/-0.19。HbR目标在12.1秒达到最高0.26 SD，在28.2秒达到最低-1.09 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.43/0.07，相关为0.64/0.71。

证据：eeg_fnirs_single_trial|subject_25|session_00|event=2|prefrontal__eee78d70376440fd；tasks/*.json,npz

A45 评价 | 被试25 / 记录00 / 事件4

motor_imagery / RMI；EEG/Hb起点=136.959/187.240秒。本页独立纵轴；单位为各色团训练SD。参考期0–5秒；计分5.0–29.8秒。



原 PC1：隐藏NMSE 1.302；联合 0.234。均值6：隐藏NMSE 0.792；联合 0.168。Hb-only NMSE 0.150。


上行：仅EEG预测，整段双Hb隐藏，水平零线为无EEG预测。中行：EEG＋Hb联合与Hb-only参照。下行：相应目标减预测残差。×符号标记未收敛任务，仅供诊断；方法线型保持不变，没有因失败删除该目标。

HbO目标在5.0秒达到最高-0.04 SD，在28.5秒达到最低-1.93 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.62/0.08，相关为-0.69/0.30。HbR目标在7.9秒达到最高0.31 SD，在24.7秒达到最低-0.70 SD；PC1/均值6的预测RMS比为1.72/0.20，相关为0.46/-0.46。

证据：eeg_fnirs_single_trial|subject_25|session_00|event=4|prefrontal__eee78d70376440fd；tasks/*.json,npz

A46 评价 | 被试25 / 记录01 / 事件0

mental_arithmetic / BL；EEG/Hb起点=25.000/77.720秒。本页独立纵轴；单位为各色团训练SD。参考期0–5秒；计分5.0–29.8秒。



原 PC1：隐藏NMSE 0.214；联合 0.043。均值6：隐藏NMSE 0.282；联合 0.059。Hb-only NMSE 0.025。


上行：仅EEG预测，整段双Hb隐藏，水平零线为无EEG预测。中行：EEG＋Hb联合与Hb-only参照。下行：相应目标减预测残差。×符号标记未收敛任务，仅供诊断；方法线型保持不变，没有因失败删除该目标。

HbO目标在29.8秒达到最高1.48 SD，在5.0秒达到最低-0.32 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.29/0.07，相关为0.47/-0.44。HbR目标在5.7秒达到最高0.54 SD，在20.7秒达到最低-0.61 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.44/0.11，相关为0.54/-0.42。

证据：eeg_fnirs_single_trial|subject_25|session_01|event=0|prefrontal__eee78d70376440fd；tasks/*.json,npz

A47 评价 | 被试25 / 记录01 / 事件2

mental_arithmetic / BL；EEG/Hb起点=81.011/133.720秒。本页独立纵轴；单位为各色团训练SD。参考期0–5秒；计分5.0–29.8秒。



原 PC1：隐藏NMSE 2.138；联合 0.139。均值6：隐藏NMSE 1.841；联合 0.102。Hb-only NMSE 0.075。


上行：仅EEG预测，整段双Hb隐藏，水平零线为无EEG预测。中行：EEG＋Hb联合与Hb-only参照。下行：相应目标减预测残差。×符号标记未收敛任务，仅供诊断；方法线型保持不变，没有因失败删除该目标。

HbO目标在5.0秒达到最高-0.38 SD，在29.6秒达到最低-2.18 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.25/0.07，相关为-0.23/0.26。HbR目标在28.8秒达到最高2.11 SD，在5.0秒达到最低0.27 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.23/0.06，相关为-0.24/-0.32。

证据：eeg_fnirs_single_trial|subject_25|session_01|event=2|prefrontal__eee78d70376440fd；tasks/*.json,npz

A48 评价 | 被试25 / 记录01 / 事件4

mental_arithmetic / BL；EEG/Hb起点=136.016/188.760秒。本页独立纵轴；单位为各色团训练SD。参考期0–5秒；计分5.0–29.8秒。



原 PC1：隐藏NMSE 0.372；联合 0.043。均值6：隐藏NMSE 0.505；联合 0.041。Hb-only NMSE 0.017。

上行：仅EEG预测，整段双Hb隐藏，水平零线为无EEG预测。中行：EEG＋Hb联合与Hb-only参照。下行：相应目标减预测残差。×符号标记未收敛任务，仅供诊断；方法线型保持不变，没有因失败删除该目标。

HbO目标在12.2秒达到最高0.39 SD，在6.7秒达到最低-1.13 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.50/0.18，相关为0.23/0.48。HbR目标在17.8秒达到最高1.30 SD，在12.5秒达到最低-0.03 SD；PC1/均值6的预测RMS比为0.28/0.11，相关为0.30/0.61。

证据：eeg_fnirs_single_trial|subject_25|session_01|event=4|prefrontal__eee78d70376440fd；tasks/*.json,npz