

TRABAJO FINAL

KEVIN STEVEN GARCÍA^a, JOSE ALEJANDRO VARGAS^b

1. Problema 1

1.

a.

El propósito es evaluar el efecto de diferentes dosis de fertilizante nitrogenado y ver el efecto que tiene en variables biofísicas del cultivo y otras fotoquímicas, además de otras propiedades que tienen que ver con técnicas de espectroscopia óptica para evaluar qué respuesta tiene el cultivo a las diferentes dosis.

Para establecer el experimento primero se hizo un muestreo inicial del suelo para conocer que le esta proporcionando el suelo a la planta de forma natural. Se hizo un muestreo de suelos en 0.1 hectáreas, así se logra conocer la variabilidad espacial de diferentes características del suelo, como el contenido de: nitrógeno, fósforo, potasio, etc. El contenido de materia orgánica (uno de los más importante ya que es la que se mineraliza y se convierte en nitrógeno). No es tan importante la cantidad de nitrógeno en el suelo ya que es muy variable esto es que la dinámica depende de la actividad microbiana, se toma la materia orgánica porque es mas estable y aporta nitrógeno a través del tiempo.

Luego de realizar el análisis del suelo se identificó una variabilidad espacial, particularmente en cuanto al contenido de materia orgánica, en cuanto a esto se establecieron las unidades experimentales, estas unidades experimentales son: factor fertilización (fertilización nitrogenada) con cuatro niveles (tratamientos) los cuales son: 0 nitrógeno, 80 unidades de nitrógeno / Hectárea, 160 U/Hectárea y 240 U/Hectárea. ¿Cómo se definen esos niveles? Se parte de la dosis comercial en el valle del cauca la cual es alrededor de 160 unidades de nitrógeno por hectárea, se escogió un valor por encima y uno por debajo, otro es 0 para así tener un rango de evaluación y poder apreciar el efecto. Por cada dosis se tienen 5 unidades experimentales (replicas), como son 4 niveles y se tienen 5 replicas en total tenemos 20 parcelas distribuidas en las 0.1 hectáreas las cuales se distribuyeron según la variabilidad espacial y la cantidad de materia orgánica.

Como variables de respuesta se tienen tres grupos.

BIOFÍSICAS: altura de tallos, numero de tallos, hojas verdes expandidas, área foliar. Estas son medidas in situ (en campo).

FOTOQUÍMICAS: se toman muestras de una hoja determinado, se conoce de ante mano que hojas manifiestas deficiencias, estas son las que se van a analizar midiendo, nitrógeno foliar, clorofila A y B y clorofila total midiendo en campo con un clorofilometro. Para evaluar si un cultivo tiene estrés nutricional por nitrógeno.

ESPECTROSCOPIA OPTICA: son datos espectrales o huellas espectrales, esta información es tomada con sensores en satélites. Esta información se obtiene tanto a nivel de hojas como de dosel (ramas, hojas, etc.). La hipótesis es que con esta información se pueda identificar rápidamente si el cultivo tiene exceso de nitrógeno, lo cual puede llegar a ahorrar tiempo y dinero.

El tiempo de monitoreo es alrededor de 7 meses (duración del experimento) se evalúa la fase del ciclo vegetativo de la caña, el cual es el ciclo de rápido crecimiento, en este tiempo la planta

^aCódigo: 1533173. E-mail: kevin.chica@correounivalle.edu.co

^bCódigo: 1525953. E-mail: jose.alejandro.vargas@correounivalle.edu.co

tiene mayor consumo de nitrógeno el cual es mas o menos del mes 2 al mes 6, se realizan campañas de monitoreo cada 30 días, es decir cada 30 días se toman todas las variables anteriores en cada una de las unidades experimentales. Se definieron números de muestras para cada unidad experimental ya que es complicado medir todas las réplicas, algunas tienen mayor número de muestras. Se definieron cada 30 días por tema de costos y se basaron en la curva de absorción de nitrógeno la cual mes a mes arroja la cantidad de nitrógeno necesaria por cada parcela.

El experimento fue a nivel de soca.

Las unidades experimentales son parcelas definidas a partir de estacas con distintos colores, estas se componen de 4 surcos y cada surco es de 5 metros de longitud espaciados a 1,65 metros. Los colores en las estacas sirven para saber que parcelas pertenece a que nivel (las verdes son las de 0 nitrógeno). Para definir como montar el experimento, se definió de acuerdo al área total que se tenía el tamaño de las unidades experimentales o de las parécelas, el cual fue de 4 surcos especificados anteriormente, se ubica el centroide de cada parcela y de ese centroide se tomaban muestras en los 4 puntos cardinales de ese centroide y así para todas las parcelas, de esta manera se conoció la cantidad de materia orgánica en cada parcela.

b.

Se tuvo que realizar un trabajo de adecuación del terreno para así llegar a cada parcela con la dosis de nitrógeno que se requería, usualmente las practicas utilizadas son las de fertilización y riego las cuales pueden hacerse al tiempo, es decir cuando se riega la planta se hace la fertilización, esto es posible debido a una sistema de riego llamado “sistema de riego localizado de alta frecuencia”, realizaron las mezclas de nitrógeno con agua (entre otros nutrientes) y por medio de unas bombas y mangueras se “inyectan” o aplican a cada parcela o unidad experimental de acuerdo a la cantidad que requieran, es decir cuando se van a regar por ejemplo las parcelas correspondientes a 80 unidades de nitrógeno, solo se riegan esas. Solo varia la cantidad de nitrógeno, el resto de nutrientes como potasio, fósforo, entre otros, se aplican por igual a todo el cultivo.

Para asegurar la independencia se dejaron unos surcos de borde entre parcelas el cual es más delgado que el resto, con el fin de que los tratamientos en una parcela no vayan a afectar la parcela vecina.

La interpretación de la cantidad de materia orgánica se hace en función del piso térmico en el cual se encuentra. La materia orgánica se da en términos de porcentaje, se encontraron valores entre 2.9 y 3.3, estos valores encontrados, aunque no fueron tan altos se tuvieron en cuenta para la distribución de las parcelas, de acuerdo con esa variación encontrada cambia la interpretación en cuanto a la fertilidad del suelo.

Las plantas de borde no están incluidas en los muestreos, son simplemente para ejercer el control local.

En el valle del cauca existen 2 periodos secos y 2 periodos de lluvia, en los periodos secos los riegos aumentan, la solución de fertilizante con agua es lo que se le da a la planta, ósea que si no se riega la planta no recibe nutrientes.

Los tratamientos se asignaron de forma aleatoria y también la variabilidad espacial.

Para que a cada planta le llegue el riego sin que se rompan las mangueras se utilizan válvulas de presión y un filtro que limpia las impurezas del agua, el sistema se puede automatizar por tiempo de riego donde se paga al termino de un cierto tiempo y si el nivel de humedad no es suficiente se enciende de nuevo.

Hay riegos control, el cual es agua sin fertilizante, en estos casos se riega por igual todo el

cultivo, cuando se va a regar con el fertilizante se tiene que hacer dependiendo del tratamiento a aplicar, esto es posible con unas válvulas las cuales se cierran cuando se va a aplicar el fertilizante de cierta parcela, ejemplo si vamos a regar la parcela de 80 unidades de nitrógeno se cierran el resto y esta se deja abierta.

c.

Hay un área efectiva para tomar las mediciones, esto quiere decir que las plantas por fuera de esta área no se tienen en cuenta, el área efectiva fue marcada con estacas con anterioridad. Para las variables biofísicas por surco se seleccionaron 5 plantas y a estas mismas cada mes se le miden las variables número de tallos, altura de tallos, área foliar y hojas verdes completamente expandidas. Para las variables fotoquímicas se seleccionó 1 planta por surco aleatoriamente y esa misma es llevada al laboratorio y medida cada mes, como una planta esta compuesta por muchos tallos, así pues, para cada tallo dentro de cada planta se miden todas estas variables biofísicas. Para las variables bioquímicas se toma la hoja indicadora de la deficiencia de la caña, esta hoja es la que de arriba hacia abajo tenga la lígula completamente visible y se analiza solamente el tercio medio de la hoja. Para el análisis espectral se hace en la misma hoja igualmente en el tercio medio y los sensores miden sobre la hoja, también a nivel de dosel se mide sobre el cultivo con los mismos sensores.

2.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

2. Problema 2

Un ingeniero de alimentos evalúa el rendimiento del almidón agrio de yuca (en kg), el cual ha sido sometido a tres métodos de secado: 1) al sol, 2) con aire caliente, 3) 50 % al sol y 50 % aire caliente. El experimento se lleva a cabo en dos rallanderías diferentes, utilizando el mismo lote de almidón agrio (obtenido en Julio de 2008) y por cada rallandería tres trabajadores llevan a cabo la experimentación. Los resultados se muestran a continuación:

| Método de Secado | Rallandería I | | | Rallandería II | | |
|------------------|---------------|------|------|----------------|------|------|
| | Trabajador | | | Trabajador | | |
| | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 34.5 | 48.0 | 40.8 | 33.6 | 44.0 | 36.5 |
| | 40.7 | 45.2 | 43.0 | 35.2 | 44.4 | 40.4 |
| | 42.0 | 49.6 | 41.7 | 36.8 | 43.9 | 38.8 |
| 2 | 41.4 | 52.2 | 39.4 | 41.9 | 47.0 | 40.8 |
| | 43.8 | 51.5 | 45.3 | 42.6 | 46.5 | 40.9 |
| | 42.6 | 51.7 | 48.6 | 43.7 | 47.5 | 44.8 |
| 3 | 58.0 | 62.1 | 51.4 | 52.3 | 58.8 | 44.9 |
| | 54.8 | 62.5 | 49.9 | 48.5 | 62.0 | 45.9 |
| | 56.7 | 60.3 | 48.5 | 55.8 | 63.8 | 49.0 |

a. El objetivo del estudio es evaluar el rendimiento del almidón agrio de yuca (en Kg) con respecto a tres métodos de secado diferentes, dos rallanderías y tres trabajadores dentro de cada rallandería, el objetivo final sería obtener una conclusión acerca de qué método de secado, qué rallandería y cuáles trabajadores están generando un mayor rendimiento del almidón, lo cual es lo que interesa finalmente.

b.

- Factores:

- ◊ Factor 1: Método de secado.
- ◊ Factor 2: Rallandería.
- ◊ Factor anidado: Trabajador.

- Niveles:

- ◊ Factor 1: Sol(S), aire caliente(A) y 50 % al sol y 50 % aire caliente(SA).
- ◊ Factor 2: Rallandería 1(R1) y Rallandería 2(R2).
- ◊ Factor anidado: Trabajador 1(T1), trabajador 2(T2) y trabajador 3(T3).

- Tratamientos: Son 18 tratamientos en total. S-R1-T1, S-R1-T2, S-R1-T3, S-R2-T1, S-R2-T2, S-R2-T3, A-R1-T1, A-R1-T2, A-R1-T3, A-R2-T1, A-R2-T2, A-R2-T3, SA-R1-T1, SA-R1-T2, SA-R1-T3, SA-R2-T1, SA-R2-T2, SA-R2-T3.

c. La unidad experimental es el almidón agrio de yuca.

d. Dado que el almidón agrio utilizado para todo el experimento fue del mismo lote, simplemente se debe asignar al azar una parte de este a cada método de secado, a cada lavandería y a cada trabajador, es decir, se debe dividir el lote de almidón agrio de yuca en 18 partes, enumerar cada uno y seleccionar de forma aleatoria un número entre 1 y 18, asignándole a cada tratamiento el lote de almidón que le corresponda.

e. Para el análisis exploratorio de datos, dado que nos interesa encontrar diferencias entre método de secado, entre rallanderías y entre trabajadores dentro de las rallanderías, se obtendrán descriptivas para los factores principales y para el factor anidado, además, también se quiere evaluar si existen diferencias entre el efecto de la interacción método de secado y rallandería y de la interacción método de secado y trabajador dentro de cada rallandería, por ello también se sacaran estadísticas descriptivas para estos cruces.

Método de secado:

| Método de secado | \bar{X} | S | $CV(\%)$ | Min | Max |
|---------------------|-----------|----------|----------|-------|-------|
| Sol | 41.06 | 4.530049 | 11.03 | 33.6 | 49.6 |
| Aire caliente | 45.12 | 3.965521 | 8.78 | 39.4 | 52.2 |
| Sol y Aire caliente | 54.73 | 6.128525 | 11.19 | 44.9 | 63.8 |

En esta tabla se puede ver que en general, el método de secado 50 % al sol y 50 % aire caliente presenta el mayor promedio de rendimiento en Kg del almidón agrio de yuca, seguido del método aire caliente y el que menor promedio presenta es el método de secado al sol. En cuanto a la variabilidad, se tuvieron coeficientes de variación relativamente bajos y bastante parecidos, el menor fue el del método de secado al aire caliente.

Rallanderia:

| Rallanderia | \bar{X} | S | $CV(\%)$ | Min | Max |
|---------------|-----------|----------|----------|-------|-------|
| Rallanderia 1 | 48.38 | 7.358581 | 15.21 | 34.5 | 62.5 |
| Rallanderia 2 | 45.57 | 7.633227 | 16.75 | 33.6 | 63.8 |

Con respecto a esta tabla, se pudo notar que la rallanderia 1 está produciendo un rendimiento mayor (2.81 kg más que la rallanderia 2) del almidón agrio de yuca y en cuanto a la variabilidad, ambas rallanderias presentan desviaciones estándar y coeficientes de variación relativamente bajos y bastante parecidos.

Trabajador:

| Trabajador | \bar{X} | S | $CV(\%)$ | Min | Max |
|----------------------|-----------|----------|----------|-------|-------|
| Rallanderia 1 | | | | | |
| Trabajador 1 | 46.06 | 8.290071 | 18 | 34.5 | 58 |
| Trabajador 2 | 53.68 | 6.365881 | 11.86 | 45.2 | 62.5 |
| Trabajador 3 | 45.4 | 4.36921 | 9.62 | 39.4 | 51.4 |
| Rallanderia 2 | | | | | |
| Trabajador 1 | 43.38 | 7.655027 | 17.64 | 33.6 | 55.8 |
| Trabajador 2 | 50.88 | 8.193103 | 16.10 | 43.9 | 63.8 |
| Trabajador 3 | 42.44 | 3.943067 | 9.29 | 36.5 | 49 |

En esta tabla se puede notar que en ambas rallanderias, teniendo en cuenta que son trabajadores distintos, el trabajador 2 de cada una de ellas, fue el que produjo mayor rendimiento del almidón agrio de yuca, en ambas rallanderias el trabajador 2 presentó una diferencia de cerca de 7 kg con respecto a los otros dos trabajadores, los cuales presentaron casi el mismo rendimiento. Con respecto a la variabilidad, en ambas rallanderias se tuvo que los trabajadores 1 y 2 presentaron una desviación estándar y un coeficiente de variación mayor a la de los trabajadores 3.

Interacción método de secado - rallanderia:

| Método de secado - rallanderia | \bar{X} | S | $CV(\%)$ | Min | Max |
|--------------------------------|-----------|----------|----------|-------|-------|
| Sol | | | | | |
| Rallanderia 1 | 42.83 | 4.44719 | 10.38 | 34.5 | 49.6 |
| Rallanderia 2 | 39.29 | 4.094339 | 10.42 | 33.6 | 44.4 |
| Aire caliente | | | | | |
| Rallanderia 1 | 46.28 | 4.858698 | 10.5 | 39.4 | 52.2 |
| Rallanderia 2 | 43.97 | 2.608639 | 5.93 | 40.8 | 47.5 |
| Sol y Aire caliente | | | | | |
| Rallanderia 1 | 56.02 | 5.226083 | 9.32 | 48.5 | 62.5 |
| Rallanderia 2 | 53.44 | 6.983035 | 13.06 | 44.9 | 63.8 |


De esta tabla se puede decir que en general, teniendo en cuenta los 3 métodos de secado, se tuvo que la diferencia entre el rendimiento producido por las dos rallanderias no es muy grande, cerca de 3 kgs en los tres métodos. La desviación estándar y los coeficientes de variación son considerablemente bajos, teniendo en cuenta el contexto del problema. Dado que las diferencias en el rendimiento del almidón agrio de yuca de las rallanderias no son muy grandes para ninguno de los 3 métodos de secado, se pensaría que la interacción método de secado - rallanderia pueda no ser significativa, esto se corroborará posteriormente en la tabla de análisis de varianza.

Interacción método de secado - trabajador(rallanderia):


| Método de secado - trabajador(rallanderia) | \bar{X} | S | $CV(\%)$ | Min | Max |
|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|
| Sol | | | | | |
| Rallanderia 1 | | | | | |
| Trabajador 1 | 39.07 | 4 | 10.24 | 34.5 | 42 |
| Trabajador 2 | 47.6 | 2.227106 | 4.68 | 45.2 | 49.6 |
| Trabajador 3 | 41.83 | 1.106044 | 2.64 | 40.8 | 43 |
| Rallanderia 2 | | | | | |
| Trabajador 1 | 35.2 | 1.6 | 4.54 | 33.6 | 36.8 |
| Trabajador 2 | 44.1 | 0.2645751 | 0.6 | 43.9 | 44.4 |
| Trabajador 3 | 38.57 | 1.960442 | 5.1 | 36.5 | 40.4 |
| Aire caliente | | | | | |
| Rallanderia 1 | | | | | |
| Trabajador 1 | 42.6 | 1.2 | 2.81 | 41.4 | 43.8 |
| Trabajador 2 | 51.8 | 0.3605551 | 0.7 | 51.5 | 52.2 |
| Trabajador 3 | 44.43 | 4.66083 | 10.5 | 39.4 | 48.6 |
| Rallanderia 2 | | | | | |
| Trabajador 1 | 42.73 | 0.907377 | 2.12 | 41.9 | 43.7 |
| Trabajador 2 | 47 | 0.5 | 1.06 | 46.5 | 47.5 |
| Trabajador 3 | 42.17 | 2.281082 | 5.41 | 40.8 | 44.8 |
| Sol y Aire caliente | | | | | |
| Rallanderia 1 | | | | | |
| Trabajador 1 | 56.5 | 1.609348 | 2.84 | 54.8 | 58 |
| Trabajador 2 | 61.63 | 1.171893 | 1.9 | 60.3 | 62.5 |
| Trabajador 3 | 49.93 | 1.450287 | 2.9 | 48.5 | 51.4 |
| Rallanderia 2 | | | | | |
| Trabajador 1 | 52.2 | 3.651027 | 7 | 48.5 | 55.8 |
| Trabajador 2 | 61.53 | 2.532456 | 4.11 | 58.8 | 63.8 |
| Trabajador 3 | 46.6 | 2.137756 | 4.58 | 44.9 | 49 |

Para dar una interpretación general de esta tabla, lo más relevante es que el trabajador 2 en ambas rallanderias y con todos los métodos de secado, es el que en promedio mayor rendimiento del almidón agrio de yuca genera, los coeficientes de variación en general son inferiores del 11 % por lo que se podría decir que se tuvo una variabilidad relativamente baja teniendo en cuenta el contexto del problema.

Para ver de forma gráfica posibles diferencias entre los niveles de los factores principales(método de secado y rallanderia) y entre los niveles del factor anidado(trabajador), se realizaron los siguientes gráficos de cajas. No se hizo el de la interacción triple, porque se perdía claridad en la interpretación, para esta interacción se tiene un gráfico de líneas posterior.



En estos diagramas de cajas se puede evidenciar de forma gráfica lo que se mencionaba en las tablas de estadísticas descriptivas anteriores, en la primera se puede ver que el método de secado que mayores rendimiento del almidón agrio de yuca generan es el de 50 % al sol y 50 % aire caliente. En la segunda gráfica se logra apreciar que la rallandería 1 genera un rendimiento un poco mayor que la rallandería 2. En la tercera se observa que en ambas rallanderías se presenta el mismo comportamiento con respecto a los rendimientos por método de secado, el método de secado 50 % al sol y 50 % aire caliente genera mayores rendimientos. En la última gráfica se logra apreciar que los trabajadores 2 en ambas rallanderías generan un mejor rendimiento del almidón agrio de yuca y que los trabajadores 1 y 3 generan rendimientos semejantes.



Este gráfico es muy interesante, ya que muestra el comportamiento en general de los tres métodos de secado, en cada rallandería y bajo cada trabajador. Se logra apreciar que el método de secado 50 % al sol y 50 % aire caliente es el que mayor rendimiento del almidón agrio de yuca genera sin importar la rallandería ni el trabajador. A este método le sigue el de aire caliente y finalmente el de sol. También se aprecia que los picos altos corresponden al trabajador 2 en cada rallandería, confirmando esto lo dicho anteriormente.

f.

El modelo estadístico es:

$$y_{ijkl} = \mu + \tau_i + \alpha_j + \gamma_{k(j)} + (\tau\alpha)_{ij} + (\tau\gamma)_{ik(j)} + \varepsilon_{(ijk)l}$$

$$i = 1, 2, 3 \quad j = 1, 2 \quad k = 1, 2, 3 \quad l = 1, 2, 3$$

Supuestos:

$$\begin{aligned} \varepsilon_{ijkl} &\simeq N(0, \sigma^2) \\ E[\varepsilon_{ijkl}] &= 0 \quad \forall_{ijkl} \\ V[\varepsilon_{ijkl}] &= \sigma^2 \quad \forall_{ijkl} \\ Cov[\varepsilon_{ijkl}, \varepsilon_{i'j'k'l'}] &= 0 \quad \forall_{i \neq i' \wedge j \neq j' \wedge k \neq k' \wedge l \neq l'} \end{aligned}$$

Donde:

y_{ijkl} es el rendimiento del almidón agrio de yuca en Kg bajo el método de secado i, en la rallandería j y bajo el trabajador k en la l-ésima réplica.

μ es la media general del rendimiento del almidón agrio de yuca en Kg sin tener en cuenta el método de secado, la rallandería ni el trabajador.

τ_i es el efecto del i-ésimo método de secado sobre el rendimiento del almidón agrio de yuca en Kg.

α_j es el efecto de la j-ésima rallandería sobre el rendimiento del almidón agrio de yuca en Kg.

$\gamma_{k(j)}$ es el efecto del k-ésimo trabajador anidado a la j-ésima rallandería sobre el rendimiento del almidón agrio de yuca en Kg.

$(\tau\alpha)_{ij}$ es el efecto de la interacción entre el método de secado i-ésimo y la rallandería j-ésima sobre el rendimiento del almidón agrio de yuca en Kg.

$(\tau\gamma)_{ik(j)}$ es el efecto de la interacción entre el método de secado i-ésimo y el trabajador k-ésimo anidado a la j-ésima rallandería sobre el rendimiento del almidón agrio de yuca en Kg.

$\varepsilon_{(ijk)l}$ es el error aleatorio debido al i-ésimo método de secado, a la j-ésima rallandería, al k-ésimo trabajador anidado a la j-ésima rallandería y a la l-ésima réplica.

g. Las hipótesis a evaluar son:

1).

$$H_0 : \tau_1 = \tau_2 = \tau_3 = \tau$$

H_a : Al menos una de estas igualdades no se cumple

2).

$$H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha$$

H_a : Al menos una de estas igualdades no se cumple

3).

$$H_0 : \gamma_{1(1)} = \gamma_{2(1)} = \gamma_{3(1)} = \gamma_1 \quad \wedge \quad \gamma_{1(2)} = \gamma_{2(2)} = \gamma_{3(2)} = \gamma_2$$

H_a : Al menos una de estas igualdades no se cumple

4).

$$H_0 : (\tau\alpha)_{ij} = 0$$

$$H_a : (\tau\alpha)_{ij} \neq 0$$

5).

$$H_0 : (\tau\gamma)_{ik(j)} = 0$$

$$H_a : (\tau\gamma)_{ik(j)} \neq 0$$

h.


| Fuente de Variación | Grados de Libertad | Suma de Cuadrados | Cuadrados Medios | F | Pr>F | ECM |
|---------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------|-----------|---|
| τ | 2 | 1774.8 | 887.4 | 180.140 | 0 | $\sigma^2 + 9 \sum_{i=1}^3 \tau_i^2 + 3\sigma_{\tau\gamma}^2$ |
| α | 1 | 106.7 | 106.7 | 21.656 | 0.0000431 | $\sigma^2 + 27 \sum_{j=1}^2 \alpha_j^2 + 9\sigma_{\tau\gamma}^2$ |
| $\tau\alpha$ | 2 | 3.8 | 1.9 | 0.385 | 0.683429 | $\sigma^2 + \frac{9}{2} \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^2 (\tau\alpha)_{ij} + 3\sigma_{\tau\gamma}^2$ |
| $\gamma_{(j)}$ | 4 | 765.9 | 191.5 | 38.868 | 0 | $\sigma^2 + 9\sigma_{\tau\gamma}^2$ |
| $\tau\gamma_{(j)}$ | 8 | 201 | 25.1 | 5.101 | 0.000274 | $\sigma^2 + 3\sigma_{\tau\gamma}^2$ |
| Error | 36 | 177.3 | 4.9 | | | σ^2 |
| Total | 53 | 3029.5 | | | | |

A un nivel de significancia $\alpha = 0.05$ se rechaza H_0 en las hipótesis (1),(2),(3) y (5) del literal anterior. Las interpretaciones contextuales se darán en el literal j.

i.

Normalidad:

Para verificar el supuesto de normalidad en los errores, se hicieron pruebas gráficas(histograma y Q-Q plot) y se realizó la prueba de normalidad Anderson-Darling por ser más potente, ya que se tiene una cantidad de datos superior a 30.



En las gráficas no se observa un posible incumplimiento de la normalidad, se puede ver que las barras del histograma se ajustan muy bien a la curva teórica de la normal, y en el QQ-plot se observa que la gran mayoría de los puntos están sobre la recta de los cuantiles teóricos, cabe aclarar que la prueba gráfica no es muy confiable porque depende de la experiencia del investigador, por ello nos vamos a centrar en los resultados de la prueba estadística, ya que estas son más objetivas.

Los resultados para la prueba estadística realizada fueron:

H_0 : Los residuales provienen de una distribución normal

H_0 : Los residuales no provienen de una distribución normal

$$A = 0.43888, p - value = 0.2832$$

Como el p -valor=0.2832 es superior a nuestro nivel de significancia $\alpha = 0.05$, no se rechaza la hipótesis nula, y concluimos que no hay evidencia suficiente para decir que los residuales no provienen de una distribución normal. Lo cual nos indica que este supuesto de normalidad en los errores parece cumplirse.

Homocedasticidad:

Para analizar este supuesto se realizó el test de Bartlett, ya que bajo el cumplimiento de la normalidad este es más potente.

Los resultados la prueba realizada fueron:

H_0 : La varianza de los grupos no son diferentes (iguales)

H_a : La varianza de los grupos son diferentes

Bartlett's $K - squared = 25.586, df = 17, p - value = 0.08234$

Como el p valor=0.08234 es superior a nuestro nivel de significancia establecido $\alpha = 0.05$ no se rechaza la hipótesis nula, y concluimos que no hay evidencia suficiente para decir que la varianza de los grupos (18 grupos en este caso) son diferentes, por lo tanto, el supuesto de homocedasticidad en los errores parece cumplirse.

Independencia:

Para analizar el supuesto de independencia se realizó el test de Rachas, ya que este no se puede evaluar con un test Durbin- Watson o un correlograma porque estos requieren conocer el orden en el cuál fueron obtenidos los datos y esa información no se tiene.

Los resultados la prueba realizada fueron:

H_0 : La muestra es aleatoria (los residuales son independientes)

H_a : La muestra no es aleatoria (los residuales no son independientes)

Standard Normal = 1.8326, $p - value = 0.06685$

Como el p valor=0.06685 es mayor que nuestro nivel de significancia $\alpha = 0.05$, no rechazamos la hipótesis nula y concluimos que no hay evidencia suficiente para decir que los residuales no están distribuidos de manera aleatoria, en otras palabras, no podemos decir que no son independientes. Teniendo en cuenta esto, se puede concluir que este supuesto de independencia en los errores parece cumplirse.

j. El primer aspecto importante a mencionar es que ningún supuesto sobre el error se incumplió, por lo que se puede confiar en los resultados arrojados en el análisis de varianza, de lo contrario, los resultados obtenidos en la anova del literal h no serían validos y no tendría sentido realizar la interpretación de ello. Dicho lo anterior, en la anova se pudo ver que el efecto de la interacción entre el método de secado i-ésimo y la rallandería j-ésima sobre el rendimiento del almidón agrio de yuca en Kg no es significativa, es decir, el efecto del método de secado no cambia a través de la rallandería, por lo que se puede analizar los factores individualmente. Se observó que en cuando al método de secado, hay diferencias significativas entre los efectos de los diferentes métodos sobre el rendimiento del almidón agrio de yuca, aparentemente el método de secado 50 % sol y 50 % aire caliente es el que mejor rendimiento produce, esto se corroborará en los contrastes posteriormente. En cuanto a la rallandería, también hay diferencias significativas entre los efectos de las dos rallanderías. Finalmente, se observó que la interacción método de secado - trabajador también resultó ser significativa, es decir, el efecto que tienen los diferentes trabajadores sobre el rendimiento del almidón agrio de yuca cambia dependiendo del método de secado que se utilice, por ejemplo, se vio en las descriptivas y en las gráficas que cuando se aplicaba el método de secado 50 % al sol y 50 % al aire caliente los trabajadores generaban un mayor rendimiento en general que cuando se usaba alguno de los otros dos métodos de secado. En cuanto a los trabajadores también se vio en la anova que hubo diferencias significativas en los efectos de estos sobre el rendimiento del almidón, se observó que el trabajador 2 de cada rallandería aparentemente estaba generando un mayor rendimiento.

k. Para evaluar el control local del experimento nos centramos en la varianza estimada y en el coeficiente de variación

$$\sigma^2 = 4.9 \quad \bar{y}_{....} = 46.97222 \quad \rightarrow CV = \frac{\sqrt{\sigma^2}}{\bar{y}_{....}} = 0.047125 \cdot 100 \% \simeq 4.7125 \%$$

Dado que la desviación estándar $\sigma = 2.2136$ es pequeña teniendo en cuenta el contexto del problema, y el coeficiente de variación también lo es, concluimos que hubo un buen control local en el experimento.

l.

Dado que en la anova se obtuvo que la interacción método de secado-rallandería no es significativa, se puede proceder a evaluar los factores individualmente, es decir, realizaremos contrastes para ver cuál o cuáles niveles del factor método de secado difieren en su efecto en el rendimiento del almidón agrio de yuca, también sería interesante saber qué trabajador difiere en cuanto a su efecto en el rendimiento del almidón. No se realizarán contrastes para el factor rallandería, ya que solo tiene dos niveles, y dado que en la anova ya se obtuvo que existen diferencias, resultaría redundante realizar contrastes para este factor.

Método de secado: En las estadísticas descriptivas y en el gráfico de cajas se vio que aparentemente, el método de secado Sol y aire caliente son parecidos, pero estos a su vez difieren del método 50 % sol y 50 % aire caliente. Esto se verificará teóricamente con los siguientes contrastes.

$$H_0 : \tau_1 - \tau_2 = 0$$

Bajo la hipótesis nula, tenemos que el estadístico de prueba es:

$$F = \frac{(\sum_{i=1}^t a_i \bar{y}_i)^2}{\hat{\sigma}^2 \sum_{i=1}^t \frac{a_i^2}{r_i}}$$

$$\rightarrow F = \frac{(-4.06)^2}{4.9 \cdot \frac{1}{9}} = 30.276$$

Como $F_{0.95(1,51)} = 4.030393 < F_{cal} = 30.276$, se rechaza H_0 y concluimos que hay evidencia estadística para decir que existen diferencias entre el efecto del método de secado al sol y el método de secado a aire caliente sobre el rendimiento (en Kg) del almidón agrio de yuca.

Ahora se verificará si el método de secado 50 % sol y 50 % aire caliente difiere de los otros dos métodos de secado (sol y aire caliente).

$$H_0 : \tau_1 + \tau_2 - \tau_3 = 0$$

$$\rightarrow F = \frac{(-23.28)^2}{4.9 \cdot \frac{1}{3}} = 331.81$$

Como $F_{0.95(1,51)} = 4.030393 < F_{cal} = 331.81$, se rechaza H_0 y concluimos que si hay diferencias significativas entre los efectos de los métodos de secado sol y aire caliente con el método de secado 50 % sol y 50 % aire caliente sobre el rendimiento del almidón agrio de yuca.

Con los resultados de las dos hipótesis anteriores, se puede concluir que los efectos de los 3 métodos de secado son distintos, complementando esto con las estadísticas descriptivas obtenidas, se podría decir que en general, el método de secado que mayor rendimiento(en Kg) produce sobre el almidón agrio de yuca es el de 50 % sol y 50 % aire caliente seguido por el método de secado aire caliente y finalmente, el método que aparentemente menor rendimiento produce es el de secado al sol.

Trabajador: Con respecto a la **rallandería 1**, se vio en las estadísticas descriptivas y en el gráfico de cajas que los trabajadores 1 y 3 parecen generar el mismo rendimiento del almidón agrio de yuca, y estos dos a su vez difieren del rendimiento del trabajador 2. Esto se verificará con los siguientes contrastes.

$$H_0 : \gamma_{1(1)} - \gamma_{3(1)} = 0$$

$$\rightarrow F = \frac{(0.66)^2}{4.9 \cdot \frac{2}{9}} = 0.4$$

Como $F_{0.95(1,51)} = 4.030393 > F_{cal} = 0.4$, no se rechaza H_0 y concluimos que no hay diferencias significativas entre los efectos del trabajador 1 y el trabajador 3 de la rallandería 1 sobre el rendimiento del almidón agrio de yuca.

$$H_0 : \gamma_{1(1)} + \gamma_{3(1)} - 2\gamma_{2(1)} = 0$$

$$\rightarrow F = \frac{(-15.9)^2}{4.9 \cdot \frac{2}{3}} = 77.39$$

Como $F_{0.95(1,51)} = 4.030393 < F_{cal} = 77.39$, se rechaza H_0 y concluimos que hay diferencias significativas entre los efectos del trabajador 1 y 3 y el trabajador 2 de la rallandería 1 sobre el rendimiento del almidón agrio de yuca.

Con estos resultados se puede concluir que el trabajador 2 genera mayor rendimiento del almidón de yuca en la rallandería 1 sin importar el método de secado.

Con respecto a la **rallandería 2**, en las estadísticas descriptivas y en el gráfico de cajas se observó lo mismo que en la rallandería 1, que los trabajadores 1 y 3 parecen generar el mismo rendimiento del almidón agrio de yuca, y estos dos a su vez difieren del rendimiento del trabajador 2. Esto se verificará con los siguientes contrastes.

$$H_0 : \gamma_{1(2)} - \gamma_{3(2)} = 0$$

$$\rightarrow F = \frac{(0.94)^2}{4.9 \cdot \frac{2}{9}} = 0.8114$$

Como $F_{0.95(1,51)} = 4.030393 > F_{cal} = 0.8114$, no se rechaza H_0 y concluimos que no hay diferencias significativas entre los efectos del trabajador 1 y el trabajador 3 de la rallandería 2 sobre el rendimiento del almidón agrio de yuca.

$$H_0 : \gamma_{1(2)} + \gamma_{3(2)} - 2\gamma_{2(2)} = 0$$

$$\rightarrow F = \frac{(-15.94)^2}{4.9 \cdot \frac{2}{3}} = 77.78$$

Como $F_{0.95(1,51)} = 4.030393 < F_{cal} = 77.78$, se rechaza H_0 y concluimos que hay diferencias significativas entre los efectos del trabajador 1 y 3 y el trabajador 2 de la rallandería 2 sobre el rendimiento del almidón agrio de yuca.

Con estos resultados se puede concluir que el trabajador 2 genera mayor rendimiento del almidón de yuca en la rallandería 2 sin importar el método de secado.

Para la interacción método de secado - trabajador, no se exponen los contrastes realizados, ya que se presentó la misma situación, los mejores rendimiento fueron los generados por el método de secado 50 % al sol y 50 % aire caliente y por el trabajador 2 de cada una de las rallanderías.

m.

Para la primera hipótesis del literal g:

Las diferencias en valor absoluto entre los promedios de rendimiento(en Kg) del almidón de yuca de los 3 métodos de secado son:

$$\tau_1 - \tau_2 = 41.06 - 45.12 = 4.06$$

$$\tau_1 - \tau_3 = 41.06 - 54.73 = 13.67$$

$$\tau_2 - \tau_3 = 45.12 - 54.73 = 9.61$$

Observando las diferencias y teniendo en cuenta los contrastes, donde nos decían que los efectos sobre el rendimiento del almidón de yuca de los 3 métodos de secado eran diferentes, nos parece razonable asumir una diferencia mínima de 4 kg para decir que existen diferencias entre los tratamientos, entonces, se tienen dos formulas esenciales para calcular la potencia del experimento:

$$\hat{\lambda} = \frac{\sum_{i=1}^t (\tau_i - \bar{\tau})^2 r}{2\sigma^2} \quad , \quad \hat{\Phi} = \sqrt{\frac{2\hat{\lambda}}{t}}$$

$$\begin{aligned}\rightarrow \hat{\lambda} &= \frac{\sum_{i=1}^3 (4)^{218}}{2 \cdot 4.9} = \frac{3 \cdot 16 \cdot 18}{2(4.9)} = 88.1632 \\ \rightarrow \hat{\phi} &= \sqrt{\frac{2(88.1632)}{3}} = \sqrt{58.7754} = 7.66\end{aligned}$$

Utilizando la tabla de la beta no central con $f_1 = 2$ grados de libertad en el numerador y $f_2 = 51$ grados de libertad en el denominador, se obtiene:

$$P(\text{Error II}) = 0 \quad \rightarrow \quad \beta = \text{Potencia} = 1 - P(\text{Error II}) = 1$$

Para la segunda hipótesis del literal g:

Las diferencias en valor absoluto entre los promedios de rendimiento(en Kg) del almidón de yuca de las 2 rallanderías son:

$$\alpha_1 - \alpha_2 = 48.38 - 45.57 = 2.81$$

Observando las diferencias y teniendo en cuenta los contrastes, donde nos decían que no había diferencias en los efectos de las dos rallanderías sobre el rendimiento del almidón de yuca, nos parece razonable asumir una diferencia mínima de 3 kg para decir que existen diferencias entre los tratamientos, entonces:

$$\begin{aligned}\rightarrow \hat{\lambda} &= \frac{\sum_{i=1}^2 (3)^{227}}{2 \cdot 4.9} = \frac{2 \cdot 9 \cdot 27}{2(4.9)} = 49.5918 \\ \rightarrow \hat{\phi} &= \sqrt{\frac{2(49.5918)}{2}} = \sqrt{49.5918} = 7.04\end{aligned}$$

Utilizando la tabla de la beta no central con $f_1 = 1$ grados de libertad en el numerador y $f_2 = 52$ grados de libertad en el denominador, se obtiene:

$$P(\text{Error II}) = 0 \quad \rightarrow \quad \beta = \text{Potencia} = 1 - P(\text{Error II}) = 1$$

Para la tercera hipótesis del literal g:

Las diferencias en valor absoluto entre los promedios de rendimiento(en Kg) del almidón agrio de yuca de los 3 trabajadores dentro de cada una de las 2 rallanderías son:

$$\gamma_{1(1)} - \gamma_{2(1)} = 46.06 - 53.68 = 7.62 \quad \gamma_{1(2)} - \gamma_{2(2)} = 43.38 - 50.88 = 7.5$$

$$\gamma_{1(1)} - \gamma_{3(1)} = 46.06 - 45.4 = 0.66 \quad \gamma_{1(2)} - \gamma_{3(2)} = 43.38 - 42.44 = 0.94$$

$$\gamma_{2(1)} - \gamma_{3(1)} = 53.68 - 45.4 = 8.28 \quad \gamma_{2(2)} - \gamma_{3(2)} = 50.88 - 42.44 = 8.44$$

Observando las diferencias y teniendo en cuenta los contrastes, donde nos decían que no había diferencias en los efectos de los trabajadores 1 y 3 en cada rallandería sobre el rendimiento del almidón de yuca, nos parece razonable asumir una diferencia mínima de 7 kg para decir que existen diferencias entre los efectos de los trabajadores, entonces, para los trabajadores de la **rallandería 1**, se tiene:

$$\begin{aligned}\rightarrow \hat{\lambda} &= \frac{\sum_{i=1}^3 (7)^{29}}{2 \cdot 4.9} = \frac{3 \cdot 49 \cdot 9}{2(4.9)} = 135 \\ \rightarrow \hat{\phi} &= \sqrt{\frac{2(135)}{3}} = \sqrt{90} = 9.48\end{aligned}$$

Utilizando la tabla de la beta no central con $f_1 = 2$ grados de libertad en el numerador y $f_2 = 51$ grados de libertad en el denominador, se obtiene:

$$P(\text{Error II}) = 0 \quad \rightarrow \quad \beta = \text{Potencia} = 1 - P(\text{Error II}) = 1$$

Para los trabajadores de la **rallandería 2**, como se asume la misma diferencia mínima de 7 kg, se obtienen los mismos resultados:

$$P(\text{Error II}) = 0 \quad \rightarrow \quad \beta = \text{Potencia} = 1 - P(\text{Error II}) = 1$$

Por lo tanto, como la potencia de las hipótesis para los trabajadores en las dos rallanderías es 1, podemos concluir que la **potencia global para la hipótesis 3 del literal g es de 1**.

Para la cuarta hipótesis del literal g:

En este caso no se mostrarán las diferencias entre los promedios de rendimiento(en Kg) del almidón agrio de yuca de la interacción entre método de secado y rallandería, ya que se tienen un total de $\binom{6}{2} = 15$ combinaciones entre pares de tratamientos, lo cual hace bastante extenso poner todas las diferencias.

Realizando todas las diferencias y teniendo en cuenta los resultados de la anova, donde se obtuvo que el efecto de la interacción método de secado-rallandería no era significativo sobre el rendimiento del almidón de yuca, nos parece razonable asumir una diferencia mínima de 4 kg para decir que existen diferencias entre los efectos de las interacciones, entonces:

$$\begin{aligned} \rightarrow \hat{\lambda} &= \frac{\sum_{i=1}^6 (4)^2 9}{2 \cdot 4.9} = \frac{6 \cdot 16 \cdot 9}{2(4.9)} = 88.1632 \\ \rightarrow \hat{\phi} &= \sqrt{\frac{2(88.1632)}{6}} = \sqrt{29.38} = 5.4210 \end{aligned}$$

Utilizando la tabla de la beta no central con $f_1 = 5$ grados de libertad en el numerador y $f_2 = 49$ grados de libertad en el denominador, se obtiene:

$$P(\text{Error II}) = 0 \quad \rightarrow \quad \beta = \text{Potencia} = 1 - P(\text{Error II}) = 1$$

Para la quinta hipótesis del literal g:

En este caso al igual que en el anterior, no se mostrarán las diferencias entre los promedios de rendimiento(en Kg) del almidón agrio de yuca de la interacción entre método de secado y el trabajador dentro de cada rallandería, ya que se tienen muchas combinaciones entre pares de tratamientos, lo cual hace bastante extenso poner todas las diferencias.

Realizando todas las diferencias y teniendo en cuenta los resultados de la anova, donde se obtuvo que el efecto de la interacción método de secado-trabajador era significativo sobre el rendimiento del almidón de yuca, nos parece razonable asumir una diferencia mínima de 6 kg para decir que existen diferencias entre los efectos de las interacciones, entonces:

$$\begin{aligned} \rightarrow \hat{\lambda} &= \frac{\sum_{i=1}^9 (6)^2 9}{2 \cdot 4.9} = \frac{9 \cdot 36 \cdot 9}{2(4.9)} = 297.5510 \\ \rightarrow \hat{\phi} &= \sqrt{\frac{2(297.5510)}{9}} = \sqrt{66.12} = 8.1315 \end{aligned}$$

Utilizando la tabla de la beta no central con $f_1 = 8$ grados de libertad en el numerador y $f_2 = 45$ grados de libertad en el denominador, se obtiene:

$$P(\text{Error II}) = 0 \quad \rightarrow \quad \beta = \text{Potencia} = 1 - P(\text{Error II}) = 1$$

n. CONCLUIR DE FORMA GENERAL!!!