

# 日本腦炎疫苗衛教單

## 什麼是日本腦炎？

- 日本腦炎是日本腦炎病毒引起的急性傳染病，病毒經由蚊子叮咬而傳播給人。臺灣傳播日本腦炎的病媒蚊以三斑家蚊為主，流行季節在每年的 5 ~ 10 月，病媒蚊叮咬人的高峰期一般在黎明和黃昏的時候。
- 日本腦炎大部分是沒有症狀的，少部分的病童會有頭痛、發燒、無菌性腦膜炎或腦炎等症狀；嚴重者會出現頭痛、高燒、痙攣、抽搐或昏迷，可能導致神經、精神性後遺症或死亡。
- 接種日本腦炎疫苗是最有效的防治方法。

## 認識日本腦炎疫苗

- 國內長期使用不活化日本腦炎，接種效益及防治成效顯見，為順應疫苗產製技術轉變趨勢，自 106 年 5 月 22 日起改採用細胞培養之活性減毒日本腦炎疫苗。

## 接種對象及時程

- 幼兒常規接種時程：應接種 2 劑。

- 出生滿 15 個月接種第 1 劑，間隔 12 個月接種第 2 劑。
- 已接種不活化日本腦炎疫苗，依下列原則接續接種活性減毒疫苗。
  - 已接種 1 劑：與前一劑間隔 14 天以上接種第 1 劑，間隔 12 個月接種第 2 劑。
  - 已接種 2 劑：與最後一劑間隔至少 12 個月後接種 1 劑，其後不必再追加。
  - 已接種 3 劑：滿 5 歲 ~ 入學前接種 1 劑，與最後一劑間隔至少 12 個月。

### 下列情形宜暫緩或不適合接種

- 對本疫苗之任何成分曾有嚴重過敏反應者。
- 先天或後天免疫不全者，含接受化學治療、使用  $\geq 14$  天高劑量全身性皮質類固醇。
- 感染人類免疫缺乏病毒，不論有無症狀，其免疫功能有缺損者。
- 發燒或正患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種。

- 最近 1 個月曾注射過卡介苗、水痘、麻疹德國麻疹腮腺炎疫苗。
- 最近 3 個月曾肌肉注射免疫球蛋白。
- 最近 6 個月曾輸過血。
- 最近 11 個月曾靜脈注射高劑量免疫球蛋白。

### 接種後可能發生的不良反應及因應方式

- 一般為注射部位疼痛、紅、腫，可於紅腫處冰敷；2 天後熱敷，請注意避免凍傷或燙傷。
- 少數於接種後 3 ~ 7 天可能出現輕微或中度全身無力、肌肉痛、易怒、食慾不振、發燒、頭痛等症狀，可多給予水分補充，以上症狀會在數天內恢復。
- 至於嚴重過敏、昏睡或痙攣等症狀則極為罕見。

★ 如上述症狀持續未獲改善，應儘速就醫處理 ★