

Where each estimator is more accurate
A
RMSE - GCTA / REML
causal SNPs
20 0.069 0.089 0.097 0.106 0.091 0.070
10 0.088 0.072 0.102 0.114 0.093 0.077
5 0.075 0.082 0.109 0.116 0.114 0.106
3 0.076 0.105 0.117 0.133 0.119 0.106
1 0.085 0.097 0.117 0.155 0.188 0.125
0.05 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8
true h^2
B
RMSE - SuSiE fine-mapping
causal SNPs
20 0.036 0.070 0.121 0.189 0.214 0.237
10 0.038 0.065 0.098 0.134 0.131 0.153
5 0.034 0.059 0.074 0.080 0.083 0.107
3 0.036 0.054 0.058 0.068 0.092 0.081
1 0.038 0.039 0.040 0.049 0.074 0.071
0.05 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8
true h^2
C
RMSE - HEELS
causal SNPs
20 0.058 0.085 0.093 0.105 0.090 0.089
10 0.075 0.070 0.101 0.112 0.093 0.101
5 0.062 0.076 0.110 0.114 0.117 0.129
3 0.068 0.096 0.113 0.133 0.118 0.140
1 0.075 0.089 0.115 0.155 0.188 0.149
0.05 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8
true h^2
RMSE
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
D
Which estimator wins
causal SNPs
20 44% 40% 40% 50% 49% 57%
10 53% 35% 44% 40% 36% 44%
5 45% 41% 55% 57% 56% 46%
3 42% 64% 73% 76% 58% 56%
1 42% 67% 77% 83% 78% 72%
0.05 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8
true h^2
GCTA
SuSiE
HEELS