

Where each estimator is more accurate
A
RMSE - GCTA / REML
causal SNPs
20 0.049 0.082 0.104 0.099 0.105 0.073
10 0.076 0.079 0.121 0.127 0.109 0.091
5 0.086 0.081 0.120 0.148 0.111 0.101
3 0.083 0.087 0.104 0.137 0.148 0.155
1 0.066 0.091 0.114 0.169 0.222 0.111
0.05 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8
true h^2
B
RMSE - SuSiE fine-mapping
causal SNPs
20 0.036 0.067 0.113 0.181 0.228 0.257
10 0.035 0.065 0.106 0.117 0.136 0.169
5 0.036 0.054 0.079 0.096 0.093 0.162
3 0.038 0.051 0.071 0.070 0.125 0.059
1 0.029 0.051 0.044 0.071 0.142 0.066
0.05 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8
true h^2
C
RMSE - HEELS
causal SNPs
20 0.046 0.082 0.105 0.100 0.105 0.090
10 0.072 0.075 0.120 0.127 0.108 0.110
5 0.073 0.081 0.115 0.146 0.104 0.139
3 0.074 0.080 0.099 0.135 0.140 0.174
1 0.063 0.088 0.109 0.167 0.223 0.123
0.05 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8
true h^2
RMSE
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
D
Which estimator wins
causal SNPs
20 47% 44% 38% 48% 46% 48%
10 46% 38% 40% 42% 46% 40%
5 51% 60% 63% 62% 38% 42%
3 49% 62% 59% 70% 60% 66%
1 54% 67% 70% 60% 84% 62%
0.05 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8
true h^2
GCTA
SuSiE
HEELS