

טענה:

בשאלה 7 התשובה : הווקטור $(1,1,1)$ הינו support vector חיובי . גם תשובה נכונה

תשובה:

לא נכון.

$$1X^2+1X-2+1X^3-0=3$$

אם זה היה SV חיובי, היה צריך לצאת 1

טענה:

בשאלה 9 התשובה MEANS-K. : מתאים לסוג כזה של בעיה ומובטח לנו שיתכנס גם נכונה כי לא

הגדירו שאין outliers

תשובה:

לא מקבל.

זו בדיוק הקלסיקה של kmeans לטפל בבעיה שזה הקלט שלה (ברור שלא תמיד נגיע לפתרון אופטימלי)

טענה:

שאלה 1. מה מהבאים הינו הסביר ביותר?

אני ומספר סטודנטים לא הבנו נכון את השאלה "הסביר ביותר" וזה יכול להיות גם האינטרופיה כלומר רמת וודאות סבירה ביותר ולכן בחרנו את האינטרופיה הנמוכה מביניהן. ולכן השאלה לא מנוסחת מספיק לדעתי ולא מובן ממש מה מבקשים.

תשובה:

לא מקבל.

אני חושב שניסוח השאלה ברור. מורכבת עם משפט משני חלקים אליו מתייחס הביטוי "סביר"

טענה:

שאלה 3 (בתשובות שהעלית): סימנתי את תשובה 5

עבור בעיית רגרסיה, עם שימוש ב KNN נבחר את ערך התוצאה לפי ערך התוצאה בווקטור הקרוב ביותר. לא צוין כי התשובה היא עבור KNN כאשר $K=1$, כאשר K גדול מ2 לאו דווקא נבחר את הווקטור הגדול ביותר לכן כאשר ראיתי את תשובה זאתי סימנתי אותה כלא נכונה.

תשובה:

מקבל.

נכתב כי כאשר בוחרים k בגודל קבוצת האימון, ניקח את רוב העולם, אך יש כאן התעלמות מוחלטת מציון שקלול המרחקים. במידה וכן היה שקלול מרחקים לא היינו בוחרים את כל העולם.

תשובה:

מקבל.

שאלה 3 יתקבלו כתשובות נכונות:

3,4,5