

מבחן למידה חישובית סמסטר ב' 2024 מועד א

1.

עבור קבוצת הוקטורים הבאה התקבלו ה clusters הבאים לאחר ריצת KMeans:

Cluster 1: (2,4,6), (4,6,8), (6,8,10)

Cluster 2: (10,20,30), (20,30,40), (30,40,50)

חשב את ה Distortion.

ערך ה Distortion שחישבתי נמצא:

א. בין 600 ל 700

ב. בין 900 ל 1000

ג. בין 700 ל 800

ד. בין 200 ל 600

1. Centroids:


- Centroid of Cluster 1: $(4, 6, 8)$
- Centroid of Cluster 2: $(20, 30, 40)$

2. Distortion Calculations:

- Squared distances to centroid for Cluster 1:
 - $(2, 4, 6) \rightarrow (4, 6, 8): (2 - 4)^2 + (4 - 6)^2 + (6 - 8)^2 = 4 + 4 + 4 = 12$
 - $(4, 6, 8) \rightarrow (4, 6, 8): 0$ (point is the centroid)
 - $(6, 8, 10) \rightarrow (4, 6, 8): (6 - 4)^2 + (8 - 6)^2 + (10 - 8)^2 = 4 + 4 + 4 = 12$
- Distortion for Cluster 1: $12 + 0 + 12 = 24$
- Squared distances to centroid for Cluster 2:
 - $(10, 20, 30) \rightarrow (20, 30, 40): (10 - 20)^2 + (20 - 30)^2 + (30 - 40)^2 = 100 + 100 + 100 = 300$
 - $(20, 30, 40) \rightarrow (20, 30, 40): 0$ (point is the centroid)
 - $(30, 40, 50) \rightarrow (20, 30, 40): (30 - 20)^2 + (40 - 30)^2 + (50 - 40)^2 = 100 + 100 + 100 = 300$
- Distortion for Cluster 2: $300 + 0 + 300 = 600$

3. Total Distortion: $24 + 600 = 624$

2. נתונים הוקטורים הבאים:



הרצנו אלגוריתם אישכול KMEANS עבור $K=3$.

התחלנו עם המרכזים ההתחלתיים הבאים:

$(-1,2)$ $(2,2)$ $(5,2)$

כאשר תסתיים ריצת האלגוריתם נקבל:

א.

שני קלאסטרים יכילו 7 ווקטורים כל אחד וקלאסטר נוסף יכיל 12 ווקטורים

ב.

קלאסטר אחד יכיל 13 ווקטורים, קלאסטר שני יכיל 6 ווקטורים וקלאסטר שלישי יכיל 7 ווקטורים

ג.


שני קלאסטרים יכילו 6 ווקטורים כל אחד וקלאסטר נוסף יכיל 14 ווקטורים

ד.


שני קלאסטרים יכילו 5 ווקטורים כל אחד וקלאסטר נוסף יכיל 16 ווקטורים

פתרון:

מרכזים התחלתיים:



קל לראות מי הווקטורים הקרובים לכל אשכול



ולכן הפתרון

(כמובן שלצורך השאלה לא היה צורך לחשב במדויק): ולכן הפתרון

מרכז:


$$(4+5+5+5+5+5)/8 = 4.8\ldots, (0+1+2+3+4+5+5)/8 = 2.8\ldots,$$

מרכז:

$$(1 \times 6 + 3 \times 6)/12 = 2, 2 \cdot (0+1+2+3+4+5)/12 = 2.5$$


מרכז:

$$(0-1-1-1-1-1)/8 = -0.75\ldots, (0+1+2+3+4+5+5)/8 = 2.8,$$



לא יהיה שינוי נוסף בקליסטור ולכן קיבלנו 2קלסטרים בעלי 7ווקטורים וקלסטר אחד בעל 12ווקטורים

3. נתון גרף ה ROC הבא:



- א. ה AUC וה EER שווים
- ב. ה AUC גדול מה EER
- ג. ה EER גדול מה AUC
- ד. ה AUC חיובי וה EER שלילי

שווים שניהם לחצי

4. לגבי בעיית מולטי-קלאס - בהינתן שאנו יודעים לפתור בעיה בינארית, למדנו שתי גישות:

One vs. One

One vs. All

קיבלנו בעיה בה 15 מחלקות/קלאסים.

ה. בגישת one vs one נקבל כמות מודלי למידה הגדולה פי 7 מכמות מודלי הלמידה שנקבל

בגישת one vs all

ו. בגישת one vs one נקבל כמות מודלי למידה הגדולה פי 15 מכמות מודלי הלמידה שנקבל

בגישת one vs all

ז. בגישת one vs one נקבל כמות מודלי למידה הגדולה פי 5 מכמות מודלי הלמידה שנקבל

בגישת one vs all

ח. בגישת one vs all נקבל כמות מודלי למידה הגדולה פי 15 מכמות מודלי הלמידה שנקבל

בגישת one vs one

פתרון:

15 עבור. אנו מייצרים אלגוריתם סיווג בינארי המפריד בין כל מחלקה לכל שאר המחלקות יחד One vs. all בגישת מכונות למידה 15 מחלקות ייווצרו

ששווה ל 15 מתוך 2 זה למעשה שקול לבחירת. אנו מייצרים מפרידים לכל הזוגות האפשריים one vs. one בגישת 15*7 כלומר ל $15 \times 14/2$

7. לכן היחס בין שתי הגישות יהיה פי

5. נתונה בעיית קלסיפיקציה בעלת train set המכיל 100 נקודות דו מימדיות בעלות סיווג נתון (חיובי או שלילי).

הפעלנו את אלגוריתם SVM לינארי (Hard Margin) על ה train set ויצא שיש לנו רק 3 וקטורי Support Vectors המפורטים בטבלה הבאה:

#	f1	f2	class
1	0	6	P
2	5	4	P
3	2	0	N

מה תהיה משוואת הישר המפריד (על פי הנוסחה $w_1 \cdot f_1 + w_2 \cdot f_2 + b = 0$) שנוצר על ידי ה SVM שהרצנו:

א. w_1 יהיה קטן מ w_2 ו b יהיה שלילי

ב. w_1 יהיה גדול מ w_2 ו b יהיה חיובי

ג. w_1 יהיה קטן מ w_2 ו b יהיה חיובי

ד. w_1 יהיה גדול מ w_2 ו b יהיה שלילי

$$w_1 f_1 + w_2 f_2 + b = 0$$

$$(1): (f_1 = 0, f_2 = 6) \rightarrow w_1 \times 0 + w_2 \times 6 + b = 1 \rightarrow w_2 \times 6 + b = 1$$

$$(2): (f_1 = 5, f_2 = 4) \rightarrow w_1 \times 5 + w_2 \times 4 + b = 1$$

$$(3): (f_1 = 2, f_2 = 0) \rightarrow w_1 \times 2 + w_2 \times 0 + b = -1 \rightarrow w_1 \times 2 + b = -1$$

$$4: (3) - (1) \rightarrow 2 \times w_1 - 6 \times w_2 = -2$$

$$5: (2) - (1) \rightarrow 5 \times w_1 - 2 \times w_2 = 0 \rightarrow 2w_2 = 5w_1 \rightarrow w_2 = 2\frac{1}{2}w_1$$

$$4: 2 \times w_1 - 6 \times w_2 = -2 \rightarrow 2 \times w_1 - 6 \times 2\frac{1}{2}w_1 = -2 \rightarrow -13w_1 = -2 \rightarrow w_1 = \frac{2}{13}$$

$$4: 2 \times \frac{2}{13} - 6 \times w_2 = -2 \rightarrow 6w_2 = \frac{4}{13} + 2 \rightarrow 6w_2 = \frac{30}{13} \rightarrow w_2 = \frac{5}{13}$$

$$1: w_2 \times 6 + b = 1 \rightarrow \frac{5}{13} \times 6 + b = 1 \rightarrow b = 1 - \frac{30}{13} = \frac{13-30}{13} = \frac{-17}{13}$$

פתרון:

המשוואה המתקבלת: $(2/13)f_1 + (5/13)f_2 - (17/13)$

6. נתונה הטבלה הבאה:

Day	Outlook	Temperature	Humidity	Wind	PlayTennis
D1	Sunny	Hot	High	Weak	No
D2	Sunny	Hot	High	Strong	No
D3	Overcast	Hot	High	Weak	Yes
D4	Rain	Mild	High	Weak	Yes
D5	Rain	Cool	Normal	Weak	Yes
D6	Rain	Cool	Normal	Strong	No
D7	Overcast	Cool	Normal	Strong	Yes
D8	Sunny	Mild	High	Weak	No
D9	Sunny	Cool	Normal	Weak	Yes
D10	Rain	Mild	Normal	Weak	Yes
D11	Sunny	Mild	Normal	Strong	Yes
D12	Overcast	Mild	High	Strong	Yes
D13	Overcast	Hot	Normal	Weak	Yes
D14	Rain	Mild	High	Strong	No

בהינתן התכונות Outlook, Temperature, Humidity, Wind רוצים לחזות את העמודה PlayTennis באמצעות עץ החלטה עם האלגוריתם שלמדנו בכיתה (על בסיס אנטרופיה). כפי שקורה בשלב הראשון של האלגוריתם, נחשב את ה Information Gain של כל אחת מ 4 התכונות.

בחר תשובה אחת נכונה:

א. ה information gain של Humidity יהיה גבוה מזה של Wind וגבוה מזה של

Temperature

ב. ה information gain של Humidity יהיה גבוה מזה של Wind ונמוך מזה של

Temperature

ג. ה information gain של Humidity יהיה נמוך מזה של Wind וגבוה מזה של

Temperature

ד. ה information gain של Humidity יהיה נמוך מזה של Wind ונמוך מזה של

Temperature

פתרון

האנטרופיה הראשונית של הבעיה

$$E(S) = E([9+, 5-]) = (-9/14 \log_2 9/14) + (-5/14 \log_2 5/14) = 0.94$$

של כל אחת מהתכונות infogain נחשב את ה

$$\begin{aligned} G(S, \text{Outlook}) &= E(S) - [5/14 * E(\text{Outlook}=\text{sunny}) + 4/14 * \\ &E(\text{Outlook} = \text{overcast}) + 5/14 * E(\text{Outlook}=\text{rain})] \\ &= E([9+, 5-]) - [5/14 * E(2+, 3-) + 4/14 * E([4+, 0-]) + 5/14 * E([3+, 2-])] \\ &= 0.94 - [5/14 * 0.971 + 4/14 * 0.0 + 5/14 * 0.971] \\ &= \mathbf{0.246} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} G(S, \text{Temperature}) &= 0.94 - [4/14 * E(\text{Temperature}=\text{hot}) + \\ &6/14 * E(\text{Temperature}=\text{mild}) + \\ &4/14 * E(\text{Temperature}=\text{cool})] \\ G(S, \text{Temperature}) &= 0.94 - [4/14 * E([2+, 2-]) + \\ &6/14 * E([4+, 2-]) + 4/14 * E([3+, 1-])] \\ &= 0.94 - [4/14 + 6/14 * 0.918 + 4/14 * 0.811] \\ &= \mathbf{0.029} \end{aligned}$$


The information gain for Humidity is:

$$\begin{aligned} G(S, \text{Humidity}) &= 0.94 - [7/14 * E(\text{Humidity}=\text{high}) + \\ &7/14 * E(\text{Humidity}=\text{normal})] \\ &= 0.94 - [7/14 * E([3+, 4-]) + 7/14 * E([6+, 1-])] \\ &= 0.94 - [7/14 * 0.985 + 7/14 * 0.592] \\ &= \mathbf{0.1515} \end{aligned}$$

The information gain for Wind is:

$$\begin{aligned} G(S, \text{Wind}) &= 0.94 - [8/14 * 0.811 + 6/14 * 1.00] \\ &= \mathbf{0.048} \end{aligned}$$

7. נתונים הוקטורים הדו-מימדיים הבאים כקבוצת אימון:



מהאפשרויות הבאות, בחרו את זאת שמציינת רק אלגוריתמים שיצליחו לייצר מפריד מושלם (עם אפס שגיאות על קבוצת האימון)?

א. האלגוריתמים: עץ החלטה, רשת נוירונים (עם מספר שכבות ונוירונים ככל שידרש)

ב. אלגוריתם הפרספטון

ג. אלגוריתם ה AdaBoost

ד. אלגוריתם ה SVM-Hard

בשאלה זו נקבל גם את אפשרות ג' כיוון ש `adaboost`

יכול לרוץ גם מעל עץ החלטה

8. משוואת המעגל בדרום מימד היא:

$$(x_1 - a)^2 + (x_2 - b)^2 - r^2 = 0$$

נתונים 4 מיפויים שנרצה לבחון עבור שימוש בהם (כל אחד בנפרד) להפרדה לינארית באמצעות SVM עם קרנל:

$$(x_1, x_2) \rightarrow (x_1, x_2, x_1^2 + x_2^2)$$

$$(x_1, x_2) \rightarrow (x_1, x_2, x_1^2)$$

$$(x_1, x_2) \rightarrow (x_1, x_2, x_1^2 * x_2^2)$$

$$(x_1, x_2) \rightarrow (x_1, x_2, x_1^2 + x_2^2 + x_1^4 + x_2^4)$$

בחר תשובה אחת נכונה:

א. 2 מיפויים מתוך ה-4 יתאימו להפרדה לינארית

ב. 3 מיפויים מתוך ה-4 יתאימו להפרדה לינארית

ג. רק מיפוי אחד מתוך ה-4 יתאים להפרדה לינארית

ד. כל 4 המיפויים יתאימו להפרדה לינארית

התשובה הראשונה לא נכונה אבל בגלל שפורסמה בחינה שהיתה בה טעות נקבל אותה


בשאלה הזו יש רק מיפוי אחד מתאים.

המיפוי האחרון אומנם נראה דומה למיפוי הראשון אבל הוא מכריח אותנו שהביטויים עם החזקה הרביעית יכולו את אותם משקלים כמו הביטויים עם החזקה של -2 אם הם היו מופרדים היה אפשר להניח שהם יקבלו משקל של 0 אבל כאן הם מופיעים יחד מה שאומר שהמקדמים/משקלים שלהם זהים בין החזקה של 2 לחזקה של 4

$$\bullet (x_1 - a)^2 + (x_2 - b)^2 - r^2 = 0$$

$$\bullet x_1^2 - 2ax_1 + a^2 + x_2^2 - 2bx_2 + b^2 - r^2 = 0$$

$$\bullet -2ax_1 - 2bx_2 + 1x_1^2 + 1x_2^2 + (a^2 + b^2 - r^2) = 0$$



$$(x_1, x_2) \rightarrow (x_1, x_2, x_1^2 + x_2^2) \quad \text{מיפוי למימד 3}$$

$$\bullet (x_1 - a)^2 + (x_2 - b)^2 - r^2 = 0$$

$$\bullet x_1^2 - 2ax_1 + a^2 + x_2^2 - 2bx_2 + b^2 - r^2 = 0$$

$$\bullet -2ax_1 - 2bx_2 + 1(x_1^2 + x_2^2) + (a^2 + b^2 - r^2) = 0$$

