



المبحث : علوم الارض و البيئة
الصف : الثاني الثانوي العلمي
اليوم :
التاريخ :

امتحان مقترح
معلم المادة : خالد مقدادي

الاسم:

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك، علماً أن عدد الفقرات (76)، وعدد الصفحات (13):

(1) أي العبارات الآتية صحيحة في ما يتعلق بقطاعات إنتاج غازات الدفيئة:

(أ) يمثل قطاع الطاقة النسبة الأكبر من إنتاج غازات الدفيئة بنسبة تصل إلى 73.2%.

(ب) يسهم قطاع الصناعة في إنتاج غاز الميثان بصورة رئيسة عن طريق صناعة الاسمنت.


(ج) يمثل قطاع الزراعة أقل نسبة من غازات الدفيئة بنسبة 5%.

(د) لا يسهم قطاع النفط في إنتاج غاز الميثان.

(2) يصنع أحد مصانع الأسمدة (20 ton) يومياً من السماء، فإذا علمت أن كل (1 kg) من السماد ينتج

(0.1 kg) من أكسيد النيتروز، فما كمية أكسيد النيتروز الناتج يومياً من المصنع:

(أ) 20 kg (ب) 200 kg (ج) 2000 kg (د) 200000 kg



(3) يمثل الشكل الآتي تغير متوسط درجة

الحرارة، وتركيز غاز ثاني أكسيد الكربون

مع الزمن، أي من العبارات الآتية

صحيحة فيما يتعلق بتغير متوسط درجة

الحرارة في الفترة الزمنية من عام 1880م

إلى 2020م

(أ) يوجد تغير موجب في متوسط درجة الحرارة في عام 1965م.

(ب) تمثل القيم السالبة في الشكل مقدار الزيادة في درجة الحرارة عن متوسط درجة الحرارة العالمي في تلك الفترة.

(ج) تمثل القيم الموجبة في الشكل مقدار النقصان في درجة الحرارة عن متوسط درجة الحرارة العالمي في تلك الفترة.

(د) توجد علاقة طردية بين ارتفاع تركيز ثاني أكسيد الكربون والزيادة في درجة الحرارة عن متوسط درجة الحرارة العالمية بعد عام 1980م.

- 4) أي العبارات الآتية صحيحة فيما يتعلق بغاز الأوزون في طبقة الستراتوسفير؟
 أ) يُعد غاز الأوزون في طبقة الستراتوسفير ملوثاً خطيراً.
 ب) يتكوّن غاز الأوزون في طبقة الستراتوسفير بسبب وجود مركبات CFCs.
 ج) يمنع غاز الأوزون وصول الأشعة فوق البنفسجية الضارة بالكائنات الحية إلى سطح الأرض.
 د) يتكوّن غاز الأوزون بسبب زيادة تراكيز غازات أكاسيد النيتروجين.
- 5) من معيقات استخدام الطاقة الشمسية في توليد الطاقة الكهربائية:
 أ) لا يمكن استخدامها في أي مكان.
 ب) يصعب صيانة محطاتها.
 ج) تتأثر بالأحوال الجوية، وقد تنخفض كميات الطاقة المنتجة أحياناً.
 د) تصدر ضجيجاً أثناء عملية توليد الكهرباء.
- 6) يجب أن تكون درجة حرارة المياه الجوفية لاستخدامها في توليد الطاقة الكهربائية تتراوح ما بين:
 أ) $20 - 50^{\circ}\text{C}$ ب) $50 - 70^{\circ}\text{C}$ ج) $70 - 100^{\circ}\text{C}$ د) $150 - 370^{\circ}\text{C}$
- 7) أي مصادر الطاقة المتجددة الآتية تحوّل عند استخدامها الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربائية:
 أ) الكهرومائية ب) الشمسية ج) المد والجزر د) الرياح
- 8) يوضح الشكل المجاور الإجهاد والمطاوعة في الصخور الهشة واللينة، أي الرموز الظاهرة في الشكل (س، ص، ع، ل) يمثل نقطة الكسر في الصخور اللينة؟

 أ) س ب) ص ج) ع د) ل
- 9) أي المثالين الآتين يُمثّلان صخوراً هشة وأخرى لدنة على الترتيب؟
 أ) البازلت والغضار ب) الطينية والغضار
 ج) البازلت والصوّان د) الطينية والصوّان
- 10) صُنّف الإجهاد إلى ثلاثة أنواع اعتماداً على:
 أ) نوع الصخر ب) اتجاه القوة المؤثرة على الصخر
 ج) تشوّه الصخر د) التراكيب الجيولوجية الناتجة من مُطاوعة الصخر



11) معتمداً على الشكل المجاور والذي يوضح أثر الإجهاد في كل من الكتلتين الصخريتين (س، ص) فإن نوع الإجهاد الذي أثر في كل منهما على الترتيب هو:

أ) قص، شدّ ب) ضغط، قصّ ج) قصّ، قصّ د) قص، ضغط

12) صدوع الحركة النسبية الأفقية هي الصدوع:

أ) العادية ب) العكسية ج) الجانبية د) الدرجية

13) يتحرك الجدار المُعلق إلى الأعلى نسبة إلى الجدار القدم في الصدوع:

أ) العادية ب) العكسية ج) الجانبية د) الدرجية

14) تتشكل الكتل الاندفاعية عندما تتعرض صخور القشرة الأرضية لقوى:

أ) شد تؤدي إلى إحداث صدعين عاديين متقابلين.

ب) قص تؤدي إلى إحداث صدعين عاديين متوازيين.

ج) ضغط تؤدي إلى إحداث صدعين عاديين متوازيين.

د) قص تؤدي إلى إحداث صدعين عاديين متقابلين.

15) يُمثل الشكل المجاور أحد أنواع الطيات، اعتماداً على زاوية

ميل المستوى المحوري، فإن نوع الطيّة هو:

أ) متماثلة ب) غير متماثلة

ج) مقلوبة د) مضطجعة



16) لاحظ العالم فغنر أن بعض القارات مثل قارتي أوروبا وأمريكا الشمالية يكون التوافق بين حوافها

أقل من التوافق بين حواف القارات الأخرى، وسبب ذلك هو:

أ) حركة تيارات الحمل داخل الستار.

ب) عمليات الحثّ والتعرية التي تعرضت لها حواف القارات.

ج) حركة الصفائح الأرضية ما أدى إلى تغير حواف القارات.

د) توسّع قاع المحيط ما أدى إلى تغير حواف القارات.

17) حسب فرضية توسع قاع المحيط، يحدث توسع لقاع المحيط في كلا الجانبين بشكل:

أ) دائم ومتماثل ب) دائم وغير متماثل


ج) غير دائم ومتماثل د) غير دائم وغير متماثل

(18) يوجد في وسط ظهر المحيط وادٍ عميق ضيق يُسمى:

(أ) قوس الجزر (ب) القوس البركاني (ج) الأخدود البحري (د) الوادي المتصدع

(19) تتكون اللابة الوسائية التي توجد على امتداد ظهر المحيط من صخور:

(أ) الأنديزيت (ب) الغرانيت (ج) البازلت (د) البيريديوتيت



(20) يُمثل الشكل المجاور أحد قيعان المحيطات، ماذا يحدث لأعمار الصخور وسمك الطبقات الرسوبية عند الانتقال من النقطة A إلى النقطة B.

(أ) يزداد عُمر الصخور، ويقل سمك الطبقات الرسوبية.

(ب) يزداد عُمر الصخور، ويزداد سمك الطبقات الرسوبية.

(ج) يقل عمر الصخور، ويقل سمك الطبقات الرسوبية.

(د) يقل عمر الصخور، ويزداد سمك الطبقات الرسوبية.

(21) يفصل نطاق غوتنبيرغ ما بين:

(أ) الستار العلوي والستار السفلي (ب) القشرة الأرضية والستار

(ج) اللب الداخلي واللب الخارجي (د) الستار واللب

(22) إذا علمت أن جزيرة بركانية تشكلت في منطقة ظهر المحيط، وانقسمت بفعل توسع قاع المحيط إلى جزأين، حيث يتحرك كل جزء جانبياً بعيداً عن ظهر المحيط بمعدل (3 cm/y)، فإن المسافة بين الجزأين بعد مرور (1 m.y) هي:

(أ) 10 km (ب) 30 km (ج) 60 km (د) 100 km

(23) تشكلت جبال الهيمالايا نتيجة:

(أ) تصادم صفيحة أوراسيا مع صفيحة الهند.

(ب) غطس صفيحة المحيط الهادي أسفل صفيحة الفلبين.

(ج) غطس صفيحة نازكا أسفل صفيحة أمريكا الجنوبية.

(د) تحرك الصدع التحويلي سان أندرياس.

(24) توجد معظم صدوع التحويل بشكل متوازٍ على جانبي:

(أ) الأخاديد البحرية (ب) ظهر المحيط

(ج) الأقواس البركانية (د) أقواس الجزر البركانية


(25) من حدود الصفائح التي لا يصاحبها تكوّن براكين:

- (أ) المتقاربة (محيطية - محيطية)
 (ب) المتقاربة (محيطية - قارية)
 (ج) المتباعدة
 (د) التحويلية


(26) أي الأشكال الآتية يظهر التمثيل الصحيح لخطوط الكنتور والفترة الكنتورية في الخرائط الكنتورية؟




(ب)



(أ)



(د)



(ج)


إلى:




(27) يشير الرمز الآتي

- (أ) طية محدبة
 (ب) المضرب والميل واتجاه الميل في الطبقات الأفقية
 (ج) طية مقعرة
 (د) المضرب والميل واتجاه الميل في الطبقات الرأسية

(28) يمثل الشكل الآتي مضرب إحدى الطبقات وميلها واتجاه ميلها، أي العبارات الآتية صحيحة فيما يتعلق بالشكل:



- (أ) ميل الطبقة 60 وامتدادها جنوب غرب، ومضرب الطبقة الصغرى 315.
 (ب) ميل الطبقة 60، ومضرب الطبقة الصغرى 135، واتجاه الميل جنوب غرب.
 (ج) ميل الطبقة 60، ومضرب الطبقة الكبرى 315، واتجاه الميل للطبقة شمال غرب.
 (د) ميل الطبقة 225، وامتداد الطبقة جنوب شرق، ومضرب الطبقة الصغرى 135.



1:20000

دليل الخريطة:

	صخر الصوان		الصخر الرملي
	صخر الكونغلوميريت		صخر الغضار

▪ معتمداً على الشكل المجاور والذي يمثل إحدى الخرائط الجيولوجية، أجب عن الفقرات (31, 30, 29)

(29) توصف طبقات الصوان في الشكل بأنها طبقات:

- (أ) أفقية (ب) مائلة
(ج) عمودية (د) مقلوبة

(30) نوع مقياس الرسم المستخدم في الخريطة هو:

- (أ) الكتابي (ب) الكسري
(ج) النسبي (د) الخطي

(31) اتجاه ميل الطبقات الصخرية الرملية هو:

- (أ) جنوب غرب (ب) شمال شرق
(ج) شمال غرب (د) جنوب شرق

(32) يُعد التنقيب عملية مباشرة وغير مباشرة تحدد عن طريقها الأماكن المحتملة لتوزع الخامات المعدنية إحدى العمليات الآتية لا تُعد من ضمن هذه المرحلة، وهي:

- (أ) استخدام الصور الجوية والخرائط الجيولوجية.
(ب) جمع عينات من الصخور والتربة من سطح الأرض.
(ج) دراسة الخصائص الفيزيائية والكيميائية للصخور والتربة.
(د) احتمالية توافر المياه الجوفية في المنطقة.

(33) يُعتمد على خاصية الكثافة في الكشف عن الصخور والخامات المعدنية في المسح:

- (أ) الجاذبي (ب) الزلزالي (ج) الإشعاعي (د) الكهرومغناطيسي


(34) تجمعات معدنية توجد بأشكال وحجوم متعددة في صخور القشرة الأرضية بتركيز تسمح باستثمارها اقتصادياً، تسمى:

- (أ) العتبة (ب) الاستكشاف (ج) هالات التنشت (د) الخامات المعدنية

(35) يبين الجدول المجاور النسبة المئوية لتركيز النحاس في المواقع (أ، ب، ج، د، هـ) أثناء المسح الجيوكيميائي لمنطقة ما، إذا علمت أن قيمة العتبة لخام النحاس (0.5%) فإن المواقع التي يوجد فيها النحاس بتراكيز اقتصادية، هي:

الموقع	أ	ب	ج	د	هـ
النسبة المئوية %	0.10	0.62	0.20	0.05	0.78

(أ) أ، ج، د (ب) أ، د (ج) أ، ب، ج (د) ب، هـ



(36) بالاعتماد على الشكل المجاور الذي يمثل نظرية الكون المستقر، تشير فيه النقاط البيضاء إلى توزع مادة الكون، أي العبارات الآتية تصف ما يحدث للكون عبر الزمن؟

(أ) تزداد كتلة الكون بنسبة ثابتة مع حجمه مع بقاء متوسط كثافة ثابتاً.

(ب) تزداد كتلة الكون ويزداد حجمه ما يسبب زيادة في كثافته.

(ج) يزداد حجم الكون مع بقاء كل من كتلته ومتوسط كثافته ثابتان.

(د) يزداد حجم الكون بنسبة ثابتة مع كتلته ما يسبب زيادة في كثافته.

(37) من المؤشرات على وجود الكوازارات:

(أ) الانزياح نحو اللون الأحمر.

(ب) ارتفاع مستوى انبعاث الأشعة السينية.

(ج) إشعاع الخلفية الكونية.

(د) وجود نوى الهيدروجين والهيليوم بنسب عالية في الفضاء.

(38) حسب مفهوم نظرية الانفجار العظيم، فإن المرحلة الغامضة التي لم يفسرها أي قانون فيزيائي لغاية الآن، هي:

(أ) اللحظات الأولى من الانفجار في زمن مقداره (10^{-43} s).

(ب) تكوّن الذرات بعد مضي (380,000 years) من الانفجار.

(ج) تكوّن أنوية العناصر الخفيفة مثل الهيدروجين والهيليوم.

(د) آلية نشأة المجرات الأولى والنظام الشمسي.

(39) أي العبارات الآتية صحيحة فيما يتعلق بنظرية الانفجار العظيم:

- (أ) متوسط الكثافة ثابت (ب) الكون دائماً يبدو كما هو
(ج) حجم الكون ثابت (د) تمتاز الذرة البدائية بالحرارة العالية جداً
(40) أشارت البيانات والمشاهدات التي جمعت بوساطة مقراب هابل الفضائي عند رصد النجوم فوق المستعمرة إلى أن:

- (أ) الكون يتوسع في الوقت الحالي بوتيرة أبطأ مما كان عليه قبل مليارات السنين.
(ب) الكون يتوسع في الوقت الحالي بوتيرة أسرع مما كان عليه قبل مليارات السنين.
(ج) الكون يتوسع بنسب متغيرة فأحياناً يتباطأ وأحياناً أخرى يتسارع.
(د) الكون يبقى ثابتاً لا يتوسع.
(41) معتمداً على الشكل المجاور والذي يوضح نموذجاً للكون، فإن العبارة الصحيحة حول تأثير المادة المظلمة والطاقة المظلمة في الكون هي:




- (أ) يكون تأثير الطاقة المظلمة أكبر ما يمكن في النقطة (و).
(ب) يكون تأثير المادة المظلمة أكبر ما يمكن في النقطة (س).
(ج) يكون تأثير الطاقة المظلمة في النقطة (ل) أكبر منها في النقطة (ص).
(د) يكون تأثير المادة المظلمة في النقطة (و) أكبر منها في النقطة (ع).
(42) عُمر الكون بوحدة (years) على افتراض أن ثابت هابل (80 km/s/Mpc) إذا علمت أن
(1 year = 3.1×10^7 s)، وأن ($\text{Mpc} = 3.1 \times 10^{19} \text{ km}$) هو:

(أ) 14.285×10^{12} (ب) 12.5×10^{12} (ج) 14.285×10^9 (د) 12.5×10^9

- (43) من الأمثلة على المجرات الإهليلجية:

- (أ) مجرة ماجلان الكبرى (ب) مجرة ماجلان الصغرى
(ج) مجرة مسيية 59 (د) مجرة المرأة المسلسلة



44) يتموضع النظام الشمسي في مجرة درب التبانة على الذراع:

- أ) 1
- ب) 2
- ج) 3
- د) 4



45) معتمداً على الشكل المجاور والذي يمثل مخروط الرياح، فإن الجهة التي تهب منها الرياح في المنطقة التي أخذت فيها الصورة هي:

- أ) شمال
- ب) جنوب
- ج) شرق
- د) غرب

46) العامل الذي يحدد نوع الهطل الساقط على سطح الأرض، هو:

- أ) اتجاه الرياح
- ب) سرعة الرياح
- ج) درجة الحرارة على سطح الأرض
- د) الضغط الجوي

47) توصف الرياح حسب مقياس بيفورت للرياح بأنها نسيم خفيف إلى نسيم منعش إذا كانت قوتها:

- أ) (1 - 0)
- ب) (2 - 5)
- ج) (6 - 11)
- د) (12)

48) الأساس المعتمد في تصنيف أشكال هطول المطر، هو:

- أ) مدة الهطول
- ب) قوة الهطول
- ج) معدل الهطول
- د) كمية الهطول

49) تنشأ الأعاصير المدارية فوق المحيطات الاستوائية في فصل:

- أ) الشتاء
- ب) الصيف
- ج) الربيع
- د) الخريف

50) تدور الرياح في نصف الكرة الأرضية الشمالي بعكس اتجاه عقارب الساعة، بينما تدور في نصف

الكرة الأرضية الجنوبي مع اتجاه عقارب الساعة، وذلك بسبب:

- أ) الضغط الجوي
- ب) اتجاه هبوب الرياح
- ج) قوة كوريوليس
- د) درجة الحرارة

المنطقة	الشدة وفق مقياس فوجينا
أ	F1
ب	F5
ج	F3


51) معتمداً على الجدول المجاور الذي يوضح المناطق (أ، ب، ج) التي حدثت فيها أعاصير قمعية مختلفة الشدة، فإن ترتيب المناطق تنازلياً حسب سرعة الرياح فيها، هو:

- (أ) (ب، ج، أ) (ب) (أ، ب، ج) (ج) (ب، أ، ج) (د) (أ، ج، ب)

52) توصف الأضرار الناتجة عن إعصار من الفئة الثالثة حسب مقياس سفير - سمبسون للأعاصير أنها:


- (أ) خفيفة (ب) متوسطة (ج) شديدة (د) كارثية
- 53) المبدأ الذي ينص على أن: "الصخور الرسوبية تمتد جانبياً في جميع الاتجاهات على امتداد حوض الترسيب، ويقل سمكها تدريجياً عند أطراف الحوض، وأن للطبقة الواحدة عمراً جيولوجياً واحداً في أي مكان توجد فيه ضمن الحوض الترسيبي"، هو مبدأ:

- (أ) القاطع والمقطوع (ب) التعاقب الطبقي (ج) الاستمرارية الجانبية (د) الاحتواء



54) بالرجوع إلى الشكل المجاور الذي يمثل احتواء الصخر الرسوبي (ص) قطعاً من الصخر الناري (س)، فإن الرمز (و) يشير إلى سطح:

- (أ) توافق (ب) لا توافق (ج) عدم توافق حثي (د) عدم توافق زاوي



■ يمثل الشكل مقطعين لطبقات رسوبية أجريت بينهما مضاهاة صخرية، أدرسه ثم أجب عن الفقرات (55, 56, 55)

55) عدد أسطح عدم التوافق في الشكل هو:


- (أ) 2 (ب) 1 (ج) 3 (د) 4

56) الطبقة الرسوبية الأقدم عمراً في الشكل هي:

- (أ) 3 (ب) هـ (ج) 1 (د) ج

(57) عدد الطبقات الرسوبية الكلي في المنطقة هو:

- أ) 8 ب) 6 ج) 7 د) 5



- معتمداً على الشكل الآتي الذي يمثل تعاقبات من
صخور رسوبية (أ، ب، ج، د، هـ)، واندفاعات
نارية (س، ي)، وصخر متحول (ص)، وصدعين
(ل، ع)، أدرس الشكل ثم أجب عن الفقرات
(58، 59، 60)

(58) ترتيب الأحداث الجيولوجية (ل، ع، ب، س) من الأقدم إلى الأحدث هو:


- أ) (ل، ع، ب، س) ب) (ب، ل، س، ع)
ج) (ب، س، ع، ل) د) (ب، س، ل، ع)

(59) عدد التعاقبات الرسوبية في الشكل هو:

- أ) 2 ب) 3 ج) 4 د) 5

(60) نوع السطح بين (د، هـ) هو:

- أ) توافق ب) عدم التوافق الحثي ج) عدم التوافق الزاوي د) اللاتوافق
- يوضح الشكل تحليل ذرات النظيرة الأم المشعة الأصلية إلى نظيرة وليدة في بلورات أحد المعادن في
الصخور النارية، أدرسه ثم أجب عن الفقرات (61، 62، 63)




(ب)



(أ)



(د)



(ج)

- (61) المرحلة التي تمثل النظام الإشعاعي المفتوح هي:
- (أ) ب (ب) أ (ج) د (د) ج
- (62) المرحلة التي تمثل عمر الصخر الناري لحظة تشكّل المعادن المكونة له هي:
- (أ) ب (ب) أ (ج) د (د) ج
- (63) إذا علمت أن عمر النصف للنظيرة الأم المشعة يساوي (20 my) فإن عمر الصخر الناري حالياً يساوي:
- (أ) 20 my (ب) 40 my (ج) 60 my (د) 80 my
- (64) ترتيب كل من وحدات سُلّم الزمن الجيولوجي من الوحدة الكبرى إلى الوحدة الصغرى هو:
- (أ) الدهر، الحقبة، العصر (ب) العصر، الحقبة، الدهر
- (ج) الحقبة، الدهر، العصر (د) الدهر، العصر، الحقبة
- (65) العصر الجيولوجي الذي تكوّنت فيه قارة بانغيا هو:
- (أ) الكامبري (ب) البيرمي (ج) السيلوري (د) الديفوني
- (66) من طرائق الاضمحلال الإشعاعي التي استخدمت في تحديد الأعمار المطلقة لكل من صخور القمر والنيازك هي:
- (أ) كربون - نيتروجين (ب) اليورانيوم - الرصاص
- (ج) الروبيديوم - السترونشيوم (د) اليود - الزينون
- (67) الصخور الرسوبية الفتاتية التي تكوّنت في حقبة ما قبل الكامبري بسبب تعرض الأردن لنشاط تكتوني وماغماتي هي:
- (أ) الغضار (ب) الصخور الرملية الملونة
- (ج) كونغلوميريت السرموج (د) الصخر الجيري
- (68) أقدم الصخور التي عُثِرَ عليها في وادي أبو برقة في الأردن هي صخور:
- (أ) الغرانيت (ب) البازلت (ج) الكونغلوميريت (د) الشيست والنايس
- (69) العمر الجيولوجي لمعدن الفلسبار المستخرج من صخور الغرانيت التابعة لحقبة ما قبل الكامبري في الأردن هو:
- (أ) (600 – 540) my (ب) (800 – 600) my
- (ج) (800 – 540) my (د) (540 – 225) my
- (70) العمر الجيولوجي لأقدم سطح لا توافق عُثِرَ عليه في الأردن هو:
- (أ) 600 my (ب) 540 my (ج) 800 my (د) 540 my

- (71) من أشهر صخور حقبة الحياة القديمة تكوين الديسي والذي يستخرج منه خام:
 أ) الزركون ب) رمل السليكا ج) النحاس د) الكاؤولين
- (72) العصر الجيولوجي الذي لا توجد فيه تكشفات صخرية تابعة له في الأردن هو:
 أ) الكريتاسي ب) الثلاثي ج) الكربوني د) الكامبري
- (73) أكثر صخور حقبة الحياة القديمة انتشاراً في الأردن:
 أ) الغضار ب) الصخور الرملية ج) الصخور الجيرية والدولوميتية د) الصخور النارية
- (74) الحقب الجيولوجية التي تكوّنت فيها الصخور النارية في الأردن هي:
 أ) الحديثة - القديمة ب) القديمة - المتوسطة ج) ما قبل الكامبري - القديمة د) قبل الكامبري - الحديثة
- (75) العصر الذي امتاز بطغيان محيط التيثس في معظم مناطق الأردن ما عدا بعض أجزاء أقصى الجنوب هو:
 أ) الكريتاسي السفلي ب) الكريتاسي العلوي ج) الكامبري العلوي د) الكامبري السفلي
- (76) أحد الآتية من المناطق الجيولوجية التي يمكن ترويجها سياحياً ما عدا:
 أ) مغارة برقش ب) حرة الشام شمال شرق الأردن ج) خليج العقبة د) منطقة رم

انتهت الأسئلة

أمنيات التوفيق للجميع

المبحث : علوم الارض و البيئة
 الصف : الثاني الثانوي العلمي
 اليوم :
 التاريخ :

الاسم:

معلم المادة : خالد مقدادي
 اجابة نموذجية - امتحان مقترح
 نموذج (2)

رمز الإجابة	رقم السؤال	رمز الإجابة	رقم السؤال	رمز الإجابة	رقم السؤال	رمز الإجابة	رقم السؤال
ج	(4	د	(3	ج	(2	أ	(1
د	(8	ب	(7	د	(6	ج	(5
ج	(12	د	(11	ب	(10	ج	(9
ب	(16	ب	(15	أ	(14	ب	(13
ج	(20	ج	(19	د	(18	أ	(17
ب	(24	أ	(23	ج	(22	د	(21
ب	(28	ج	(27	أ	(26	د	(25
د	(32	أ	(31	ج	(30	ب	(29
أ	(36	د	(35	د	(34	أ	(33
ب	(40	د	(39	أ	(38	ب	(37
ج	(44	ج	(43	د	(42	د	(41
ج	(48	ب	(47	ج	(46	د	(45
ج	(52	أ	(51	ج	(50	ب	(49
ج	(56	أ	(55	ب	(54	ج	(53
ب	(60	ب	(59	ب	(58	أ	(57
أ	(64	ب	(63	ج	(62	ج	(61
د	(68	ج	(67	ب	(66	ب	(65
ج	(72	ب	(71	أ	(70	أ	(69
ج	(76	ب	(75	ج	(74	ب	(73