

I. KHOẢNG ƯỚC LƯỢNG TRUNG BÌNH μ CỦA TỔNG THỂ VỚI DẤU HIỆU X CÓ PHÂN PHỐI $N(\mu, \sigma^2)$ VỚI ĐỘ TIN CẬY $\gamma\%$, ($\gamma = 1 - \alpha$)

TH	TRƯỜNG HỢP	ĐỐI XỨNG	CHẶN TRÊN	CHẶN DƯỚI
σ^2 đã biết		$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$\left(-\infty, \bar{x} + z_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$	$\left(\bar{x} - z_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \infty\right)$
σ^2 chưa biết	Cỡ mẫu lớn $n \geq 30$	$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{s_x}{\sqrt{n}}$	$\left(-\infty, \bar{x} + z_{\alpha} \frac{s_x}{\sqrt{n}}\right)$	$\left(\bar{x} - z_{\alpha} \frac{s_x}{\sqrt{n}}, \infty\right)$
	Cỡ mẫu nhỏ $n < 30$	$\bar{x} \pm t_{\alpha/2, n-1} \frac{s_x}{\sqrt{n}}$	$\left(-\infty, \bar{x} + t_{\alpha, n-1} \frac{s_x}{\sqrt{n}}\right)$	$\left(\bar{x} - t_{\alpha} \frac{s_x}{\sqrt{n}}, \infty\right)$

II. KHOẢNG ƯỚC LƯỢNG TỶ LỆ P CỦA TỔNG THỂ VỚI ĐỘ TIN CẬY $\gamma\%$ ($\gamma = 1 - \alpha$)

TH	ĐỐI XỨNG	CHẶN TRÊN	CHẶN DƯỚI
Tỷ lệ p	$f_n \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{f_n(1-f_n)}{n}}$	$\left(-\infty, f_n + z_{\alpha} \sqrt{\frac{f_n(1-f_n)}{n}}\right)$	$\left(f_n - z_{\alpha} \sqrt{\frac{f_n(1-f_n)}{n}}, +\infty\right)$

III. KHOẢNG ƯỚC LƯỢNG PHƯƠNG SAI σ^2 CỦA TỔNG THỂ VỚI DẤU HIỆU X CÓ PHÂN PHỐI $N(\mu, \sigma^2)$ VỚI ĐỘ TIN CẬY $\gamma\%$ ($\gamma = 1 - \alpha$)

TH	TRƯỜNG HỢP	ĐỐI XỨNG	CHẶN TRÊN	CHẶN DƯỚI
Phương sai σ^2	Với σ^2 chưa biết	$\left(\frac{(n-1)s_x^2}{\chi_{(\alpha/2, n-1)}^2}; \frac{(n-1)s_x^2}{\chi_{(1-\alpha/2, n-1)}^2}\right)$	$\left(0; \frac{(n-1)s_x^2}{\chi_{(1-\alpha, n-1)}^2}\right)$	$\left(\frac{(n-1)s_x^2}{\chi_{(\alpha, n-1)}^2}; \infty\right)$

