

ĐƠN THUỐC

Chẩn đoán: K25 - Viêm loét dạ dày tá tràng HP (+)

Chẩn đoán kèm theo: D50 - Thiếu máu thiếu sắt

Thuốc điều trị:

Tên thuốc	Đơn vị	SL	Chỉ định
Nexium mups 40mg (Esomeprazole)	Viên	28	Uống ngày 2 lần (sáng 1 viên - tối 1 viên) trước ăn 30 phút
Amoxicillin 500mg	Viên	56	Uống ngày 2 lần (mỗi lần 2 viên: sáng - tối) ngay sau ăn
Clarithromycin 500mg	Viên	28	Uống ngày 2 lần (mỗi lần 1 viên: sáng - tối) ngay sau ăn
Tardyferon B9 (Sắt & Acid Folic)	Viên	20	Uống ngày 1 viên vào buổi trưa trước ăn 1 tiếng hoặc sau ăn 2 tiếng

Lời dặn: Tuân thủ uống thuốc kháng sinh đúng giờ, đủ liều, không tự ý ngưng thuốc. Ăn chín uống sôi, hạn chế đồ chua cay, thức ăn nhiều dầu mỡ, đồ uống có gas và rượu bia. Tránh căng thẳng stress. Tái khám sau khi hết thuốc 2 tuần (để test lại HP bằng hơi thở).