


# BÀI TẬP BUỔI 1

## B. PHẦN ĐÁP ÁN

### I. Tìm tập xác định và miền giá trị:

1.  $f(x, y) = \sqrt{x^2 + 2x - 4y^2 + 4y}$

Điều kiện:  $x^2 + 2x - 4y^2 + 4y \geq 0$   
 $\Leftrightarrow (x+1)^2 - (2y-1)^2 \geq 0$   
 $\Leftrightarrow (x+2y)(x-2y+2) \geq 0$   
 $\Leftrightarrow \begin{cases} x+2y \geq 0 \\ x-2y+2 \geq 0 \end{cases} \quad (1)$   
 $\Leftrightarrow \begin{cases} x+2y \leq 0 \\ x-2y+2 \leq 0 \end{cases} \quad (2)$



Miền giá trị: Để nhận thấy  $f(x, y) \geq 0$ , bên cạnh đó ta còn nhận thấy  $x^2 + 2x - 4y^2 + 4y \rightarrow +\infty$  khi  $x \rightarrow +\infty, y \rightarrow a \in \mathbb{R}$  nên miền giá trị của hàm sẽ là  $[0; +\infty)$

2.  $g(x, y) = \ln(2x - x^2 - y^2)$

Điều kiện xác định:  $2x - x^2 - y^2 > 0$  là hình tròn tâm  $I(1; 0)$ ,  $R=1$  không kể biên (tức là tập mở)  
 $\Leftrightarrow (x-1)^2 + y^2 < 1$

Miền giá trị: Ta có  $0 < 2x - x^2 - y^2 = 1 - (x-1)^2 - y^2 \leq 1$  nên miền giá trị của  $g(x, y)$  là  $(-\infty; 0]$

3.  $h(x, y) = \frac{x+y+1}{1-x^2-y^2}$

Điều kiện xác định:  $1 - x^2 - y^2 \neq 0$  là phần mp Oxy bỏ đi đường tròn  $(O; 1)$   
 $\Leftrightarrow x^2 + y^2 \neq 1$

Miền giá trị: giả sử  $y = 0$  thì  $h(x; 0) = \frac{1}{1-x}$  có miền giá trị là  $(-\infty; +\infty)$  nên miền giá trị của hàm là  $(-\infty; +\infty)$

4.  $m(x, y) = \ln(\arctan \frac{x}{y})$

$$\begin{cases} \arctan \frac{x}{y} > 0 \\ y \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x}{y} > 0 \\ y \neq 0 \end{cases}$$


Điều kiện xác định:  $\begin{cases} x > 0 \\ y > 0 \end{cases}$   
 $\Leftrightarrow \begin{cases} x < 0 \\ y < 0 \end{cases}$

Miền giá trị:  $0 < \arctan \frac{x}{y} < \frac{\pi}{2}$  nên miền giá trị là  $(-\infty; \ln \frac{\pi}{2})$

$$5. u(x, y) = \frac{1}{\log_2(x^2 + y + 1)}$$

Điều kiện:

$$\begin{cases} \log_2(x^2 + y + 1) \neq 0 \\ x^2 + y + 1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y \neq -1 \\ x^2 + y + 1 > 0 \end{cases}$$



(là miền nằm trên đường đỏ và bỏ đi đường xanh)

Miền giá trị:  $\log_2(x^2 + y + 1)$  có miền giá trị là  $(-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$  nên miền giá trị của hàm là  $(-\infty; +\infty)$

$$6. v(x, y) = \sqrt{\frac{x + 2y - 1}{3x - y + 2}}$$

Điều kiện:

$$\begin{cases} \frac{x + 2y - 1}{3x - y + 2} \geq 0 \\ 3x - y + 2 \neq 0 \end{cases}$$

(tương tự câu 1 các bạn có thể vẽ đồ thị để dễ hình dung miền xác định của hàm)

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \begin{cases} x + 2y - 1 \geq 0 \\ 3x - y + 2 > 0 \end{cases} \\ \text{hoặc} \\ \begin{cases} x + 2y - 1 \leq 0 \\ 3x - y + 2 < 0 \end{cases} \end{cases}$$

Miền giá trị: dễ thấy  $v \geq 0$ , mặt khác  $\frac{x + 2y - 1}{3x - y + 2} \rightarrow +\infty$  khi  $x \rightarrow 0, y \rightarrow 2^-$  nên miền giá trị của hàm là  $[0; +\infty)$

## II. Đạo hàm riêng:

$$1. f(x, y) = \sqrt{2x^2 + 4y^2 + 3xy}$$

$$f'_x = \frac{(2x^2 + 4y^2 + 3xy)'_x}{\sqrt{2x^2 + 4y^2 + 3xy}} = \frac{4x + 3y}{\sqrt{2x^2 + 4y^2 + 3xy}}$$

$$f'_y = \frac{(2x^2 + 4y^2 + 3xy)'_y}{\sqrt{2x^2 + 4y^2 + 3xy}} = \frac{8y + 3x}{\sqrt{2x^2 + 4y^2 + 3xy}}$$

$$2. g(x, y) = \arctan(x + y) + x^3 + y^2$$

$$g'_x = \frac{(x + y)'_x}{1 + (x + y)^2} + 3x^2 = \frac{1}{1 + (x + y)^2} + 3x^2$$

$$g'_y = \frac{(x + y)'_y}{1 + (x + y)^2} + 2y = \frac{1}{1 + (x + y)^2} + 2y$$

$$3. h(x, y) = \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2})$$

$$h'_x = \frac{(x + \sqrt{x^2 + y^2})'_x}{x + \sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}}{x + \sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$h'_y = \frac{(x + \sqrt{x^2 + y^2})'_y}{x + \sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}}{x + \sqrt{x^2 + y^2}}$$

4. Cho hàm số  $z = z(x, y)$  thỏa  $x^2 + 2yz^2 - 4y^2 + 3xy = 8$ . Tính  $z'_x(2, 1)$  biết  $z(2, 1) = 1$

Đạo hàm 2 vế đẳng thức theo x ta được  $2x + 2y.2z.z'_x + 3y = 0$

$$\Leftrightarrow 2.2 + 2.1.2.1.z'_x + 3.1 = 0$$

$$\Leftrightarrow z'_x = -\frac{7}{4}$$

5. Cho hàm số  $z(x, y) = x^2 f(x + e^y)$ , trong đó  $f$  là hàm khả vi tại mọi điểm. Biết  $f(2) = 1, f'(2) = -3$ . Tính  $z'_x(1, 0)$

Đạo hàm 2 vế theo x ta có:

$$z'_x = 2xf(x + e^y) + x^2 f'_x(x + e^y)$$

$$\Leftrightarrow z'_x = 2.1.f(2) + 1^2 f'(2) = -1$$

6. Cho hàm số  $z = f(x, y), x = \ln \frac{u}{v}, y = e^{uv}$ . Biết  $f'_x|_{(x,y)=(0,e)} = 2, f'_y|_{(x,y)=(0,e)} = 3$ . Tính

$$z'_u|_{(u,v)=(1,1)}$$

Coi v là hằng số khi đạo hàm theo u ta có:

$$z = f(x(u), y(u))$$

$$\Rightarrow z'_u = z'_x \cdot x'_u + z'_y \cdot y'_u$$

Mà  $x'_u = \frac{1}{u}, y'_u = ve^{uv}$  thay vào đẳng thức trên:  $z'_u = 2 \cdot \frac{1}{1} + 3 \cdot 1 \cdot e = 2 + 3e$

### III. Đạo hàm cấp cao:

1.  $f(x, y) = x^3 y^2 + 2x^2 y + 4xy + 2x + 1$ . Tính  $f''_{x^2}, f''_{xy}, f''_{y^2}$

Đáp án:

$$f''_{x^2} = 6xy^2 + 4y$$

$$f''_{xy} = 6x^2 y + 4x$$

$$f''_{y^2} = 2x^3$$

2.  $g(x, y) = e^{x^2 + xy + 5y}$ . Tính  $f''_{x^2}, f''_{xy}, f''_{y^2}$

Đáp án:

$$f''_{x^2} = 2e^{x^2 + xy + 5y} + (2x + y)^2 e^{x^2 + xy + 5y}$$

$$f''_{xy} = e^{x^2 + xy + 5y} + (2x + y)(x + 5)e^{x^2 + xy + 5y}$$

$$f''_{y^2} = (x + 5)^2 e^{x^2 + xy + 5y}$$

3.  $m(x, y) = \sin(x + y^2) + 3\cos(xy)$ . Tính  $f''_{x^2}, f''_{xy}, f''_{y^2}$

$$f''_{x^2} = -\sin(x+y^2) - 3y^2 \cos(xy)$$

Đáp án:  $f''_{xy} = -2y \sin(x+y^2) - 3 \sin(xy) + 3xy \cos(xy)$

$$f''_{y^2} = 2 \cos(x+y^2) - 4y^2 \sin(x+y^2) - 3x^2 \cos(xy)$$

4. Cho  $f(x, y) = \arctan \frac{x}{y}$ . Tính  $A = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(1,1) + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(1,1)$

$$A = f''_{xy}(1,1) + 2f''_{y^2}(1,1) \quad \text{mà} \quad f''_{xy} = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, f''_{y^2} = \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$\Rightarrow A = 1$$

5. Cho  $f(x, y) = y \ln|2y - e^x|$ . Tính  $A = f''_{x^2} - 2f''_{xy} + 3f''_{y^2}$  tại  $M(0,1)$

$$f''_{x^2} = \frac{-2y^2 e^x}{(2y - e^x)^2}$$

Ta có:  $f''_{xy} = \frac{e^{2x}}{(2y - e^x)^2}$  nên  $A = 1$

$$f''_{y^2} = \frac{2}{2y - e^x} - \frac{2e^x}{(2y - e^x)^2}$$