

ÔN TẬP CUỐI KỲ  
NĂM HỌC: 2015-2016

TÀI LIỆU SƯU TẬP  
BỞI HCMUT-CNCP

GV: PHÙNG TRỌNG THỰC

## Bài 1

Cho phương trình  $x^3 - 3x + \sin(x) + 1 = 0$  trên khoảng cách ly nghiệm  $[1, 1.5]$ . Dùng phương pháp Newton, với  $x_0$  theo điều kiện Fourier, tìm nghiệm gần đúng  $x_2$  và cho biết sai số  $\Delta x_2$ .

## Bài 1

Cho phương trình  $x^3 - 3x + \sin(x) + 1 = 0$  trên khoảng cách ly nghiệm  $[1, 1.5]$ . Dùng phương pháp Newton, với  $x_0$  theo điều kiện Fourier, tìm nghiệm gần đúng  $x_2$  và cho biết sai số  $\Delta x_2$ .

## Giải

$$f'(x) = 3x^2 - 3 + \cos(x) > 0 \quad \text{trên } [1, 1.5]$$

$$f''(x) = 6x - \sin(x) > 0 \quad \text{trên } [1, 1.5]$$

Theo điều kiện Fourier  $x_0 = 1.5$ . Dùng công thức sai số

$$|x_2 - p| \leq \frac{f(x_2)}{m}.$$

Ta có  $m = \min\{|f'(1)|, |f'(1.5)|\} = \cos(1) \mapsto \text{STO } M$

## Bài 1

Cho phương trình  $x^3 - 3x + \sin(x) + 1 = 0$  trên khoảng cách ly nghiệm  $[1, 1.5]$ . Dùng phương pháp Newton, với  $x_0$  theo điều kiện Fourier, tìm nghiệm gần đúng  $x_2$  và cho biết sai số  $\Delta x_2$ .

## Giải

$$F = F+1 : X = X - \frac{X^3 - 3X + \sin(X) + 1}{3X^2 - 3 + \cos(X)} : \frac{X^3 - 3X + \sin(X) + 1}{M}$$

$$x_2 \approx 1.1798, \Delta x_2 \approx 0.0507$$

## Bài 2

Cho hệ phương trình

$$\begin{cases} 4.51x_1 - 1.12x_2 + 0.75x_3 = 8.79 \\ 1.23x_1 + 6.75x_2 - 2.31x_3 = 9.32 \\ 1.43x_1 - 4.23x_2 + 7.89x_3 = 10.32 \end{cases}$$

Dùng phương pháp Jacobi, với  $x^{(0)} = (0.3, 1.3, 1.1)^T$ . Tìm vector lặp  $x^{(3)}$ .

## Bài 2

Cho hệ phương trình

$$\begin{cases} 4.51x_1 - 1.12x_2 + 0.75x_3 = 8.79 \\ 1.23x_1 + 6.75x_2 - 2.31x_3 = 9.32 \\ 1.43x_1 - 4.23x_2 + 7.89x_3 = 10.32 \end{cases}$$

Dùng phương pháp Jacobi, với  $x^{(0)} = (0.3, 1.3, 1.1)^T$ . Tìm vector lặp  $x^{(3)}$ .

Giải

$$T = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1.12}{4.51} & -\frac{0.75}{4.51} \\ -\frac{1.23}{6.75} & 0 & \frac{2.31}{6.75} \\ -\frac{1.43}{7.89} & \frac{4.23}{7.89} & 0 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} \frac{8.79}{4.51} \\ \frac{9.32}{6.75} \\ \frac{10.32}{7.89} \end{bmatrix}, X_0 = (0.3, 1.3, 1.1).$$

$$X_k = TX_{k-1} + C$$



## Bài 2

Cho hệ phương trình

$$\begin{cases} 4.51x_1 - 1.12x_2 + 0.75x_3 = 8.79 \\ 1.23x_1 + 6.75x_2 - 2.31x_3 = 9.32 \\ 1.43x_1 - 4.23x_2 + 7.89x_3 = 10.32 \end{cases}$$

Dùng phương pháp Jacobi, với  $x^{(0)} = (0.3, 1.3, 1.1)^T$ . Tìm vector lặp  $x^{(3)}$ .

Giải

$$T = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1.12}{4.51} & -\frac{0.75}{4.51} \\ -\frac{1.23}{6.75} & 0 & \frac{2.31}{6.75} \\ -\frac{1.43}{7.89} & \frac{4.23}{7.89} & 0 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} \frac{8.79}{4.51} \\ \frac{9.32}{6.75} \\ \frac{10.32}{7.89} \end{bmatrix}, X_0 = (0.3, 1.3, 1.1).$$

$$x^{(3)} \approx (2.0568, 1.6381, 1.8310)$$



### Bài 3

Cho  $A = \begin{bmatrix} 1.32 & 2.31 & 1.76 & 3.67 \\ 6.57 & 4.67 & 3.67 & 0.76 \\ 4.78 & 9.67 & 9.08 & 1.67 \\ 9.78 & 5.78 & 5.98 & 3.56 \end{bmatrix}$ . Sử dụng phân tích  $A = LU$  theo Doolittle xấp xỉ  $l_{42}, u_{33}$ .



### Bài 3

Cho  $A = \begin{bmatrix} 1.32 & 2.31 & 1.76 & 3.67 \\ 6.57 & 4.67 & 3.67 & 0.76 \\ 4.78 & 9.67 & 9.08 & 1.67 \\ 9.78 & 5.78 & 5.98 & 3.56 \end{bmatrix}$ . Sử dụng phân tích  $A = LU$  theo Doolittle xấp xỉ  $l_{42}, u_{33}$ .

### Giải

$$4.67 \longrightarrow 2.31 \times \left( -\frac{6.57}{1.32} \right) + 4.67 \longrightarrow \text{STO } A$$

$$5.78 \longrightarrow 2.31 \times \left( -\frac{9.78}{1.32} \right) + 5.78 \longrightarrow \text{STO } B$$

$$l_{42} = \frac{B}{A} \approx 1.6602$$

### Bài 3

Cho  $A = \begin{bmatrix} 1.32 & 2.31 & 1.76 & 3.67 \\ 6.57 & 4.67 & 3.67 & 0.76 \\ 4.78 & 9.67 & 9.08 & 1.67 \\ 9.78 & 5.78 & 5.98 & 3.56 \end{bmatrix}$ . Sử dụng phân tích  $A = LU$  theo Doolittle xấp xỉ  $l_{42}, u_{33}$ .

### Giải

$$u_{33} = \frac{\Delta_3}{\Delta_2} \approx 1.7338$$

## Bài 4

Cho bảng số

$x$	1.2	1.7	2.3
$y$	2.1	4.2	5.3

. Sử dụng Spline bậc ba  $g(x)$  thoả điều kiện  $g'(1.2) = 0.5$  và  $g'(2.3) = 0.9$  nội suy bảng số trên để xấp xỉ giá trị của hàm tại  $x = 1.5$  và  $x = 2.0$ .

## Bài 4

Cho bảng số 

$x$	1.2	1.7	2.3
$y$	2.1	4.2	5.3

. Sử dụng Spline bậc ba  $g(x)$  thoả điều kiện  $g'(1.2) = 0.5$  và  $g'(2.3) = 0.9$  nội suy bảng số trên để xấp xỉ giá trị của hàm tại  $x = 1.5$  và  $x = 2.0$ .

## Đáp số

$$g(1.5) \approx 3.1719, g(2.0) \approx 5.0084$$

## Bài 5

Cho bảng số

$x$	1.3	1.5	1.9	2.2	2.4
$y$	2.3	4.2	0.4	9.2	2.4

Sử dụng phương pháp bình phương bé nhất tìm hàm

$$f(x) = A\sqrt{x^2 + 1.3} + B \sin(x)$$

xấp xỉ tốt nhất bảng số trên.

### Bài 5

Cho bảng số 

$x$	1.3	1.5	1.9	2.2	2.4
$y$	2.3	4.2	0.4	9.2	2.4

. Sử dụng phương pháp bình phương bé nhất tìm hàm

$$f(x) = A\sqrt{x^2 + 1.3} + B \sin(x)$$

xấp xỉ tốt nhất bảng số trên.

### Đáp số

$$A \approx 1.9744, B \approx -0.7116$$

## Bài 6

Cho bảng số

$x$	1.2	2.1	2.3	3.1
$y$	2.32	2.3	$\alpha$	3.4

. Sử dụng đa thức nội suy Lagrange tìm  $\alpha$  để đa thức nội suy có giá trị xấp xỉ của đạo hàm  $y'(2.2) \approx 3.2$ .

## Bài 6

Cho bảng số

$x$	1.2	2.1	2.3	3.1
$y$	2.32	2.3	$\alpha$	3.4

. Sử dụng đa thức nội suy Lagrange tìm  $\alpha$  để đa thức nội suy có giá trị xấp xỉ của đạo hàm  $y'(2.2) \approx 3.2$ .

## Đáp số

$$\alpha \approx 2.9342$$



## Bài 7

Cho bảng số

$x$	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2
$f(x)$	1.3	3.2	2.1	5.6	4.2	5.4	2.1

Sử dụng công thức Simpson mở rộng tính xấp xỉ tích phân

$$I = \int_{1.0}^{2.2} [2.1x^2 f(x) + 0.5x^2] dx.$$

## Bài 7

Cho bảng số

$x$	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2
$f(x)$	1.3	3.2	2.1	5.6	4.2	5.4	2.1

Sử dụng công thức Simpson mở rộng tính xấp xỉ tích phân

$$I = \int_{1.0}^{2.2} [2.1x^2 f(x) + 0.5x^2] dx.$$

## Đáp số

$$I \approx 30.8803$$

## Bài 8

Cho bài toán Cauchy

$$\begin{cases} y' &= 1.2x + 1.3x^2 \sin(0.23x + 1.5y), x \geq 0.5 \\ y(0.5) &= 0.36 \end{cases}$$

Dùng phương pháp Runge-Kutta bậc 4 xấp xỉ  $y(0.7)$  với bước nhảy  $h = 0.2$ .

## Bài 8

Cho bài toán Cauchy

$$\begin{cases} y' &= 1.2x + 1.3x^2 \sin(0.23x + 1.5y), x \geq 0.5 \\ y(0.5) &= 0.36 \end{cases}$$

Dùng phương pháp Runge-Kutta bậc 4 xấp xỉ  $y(0.7)$  với bước nhảy  $h = 0.2$ .

Đáp số

$$y(0.7) \approx 0.5742$$

## Bài 9

Cho bài toán Cauchy

$$\begin{cases} y'''(x) = 1.3y'' + 0.32xy' + xy + 1.23, 1 \leq x \leq 2 \\ y(1) = 0.23, y'(1) = 0.12, y''(1) = 1.23 \end{cases}$$

Đưa phương trình về hệ phương trình vi phân cấp 1. Sử dụng công thức Euler với  $h = 0.1$  tính gần đúng  $y(1.3)$  và  $y(1.8)$ .

## Bài 9

Cho bài toán Cauchy

$$\begin{cases} y'''(x) &= 1.3y'' + 0.32xy' + xy + 1.23, 1 \leq x \leq 2 \\ y(1) &= 0.23, y'(1) = 0.12, y''(1) = 1.23 \end{cases}$$

Đưa phương trình về hệ phương trình vi phân cấp 1. Sử dụng công thức Euler với  $h = 0.1$  tính gần đúng  $y(1.3)$  và  $y(1.8)$ .

## Đáp số

Đặt  $z(x) := y'(x)$ ,  $w(x) := y''(x)$ , phương trình trở thành

$$\begin{cases} w' &= 1.3w + 0.32xz + xy + 1.23 \\ z' &= w \\ y' &= z \\ w(1) &= 1.23, z(1) = 0.12, y(1) = 0.23 \end{cases} \quad \boxed{y(1.3) \approx 0.3060, y(1.8) \approx 0.8843}$$



**Bài 10**

Cho bài toán biên tuyến tính cấp hai

$$\begin{cases} (x + 0.23) y''(x) + x^2 y' - 1.23y = 0.29x(x + 2), 1 \leq x \leq 1.8 \\ y(1) = 0.27, y(1.8) = 1.67 \end{cases}$$

Dùng phương pháp sai phân hữu hạn với bước nhảy  $h = 0.2$  xấp xỉ giá trị của  $y(1.2), y(1.4), y(1.6)$ .

Cho bài toán biên tuyến tính cấp hai

$$\begin{cases} (x + 0.23)y''(x) + x^2y' - 1.23y = 0.29x(x + 2), 1 \leq x \leq 1.8 \\ y(1) = 0.27, y(1.8) = 1.67 \end{cases}$$

Dùng phương pháp sai phân hữu hạn với bước nhảy  $h = 0.2$  xấp xỉ giá trị của  $y(1.2), y(1.4), y(1.6)$ .

**Giải**

$$p(x) = x + 0.23, q(x) = x^2, r(x) = -1.23, f(x) = 0.29x(x + 2), \\ \alpha = 0.27, \beta = 1.67, h = 0.2,$$

$$x_0 = 1, [x_1 = 1.2, x_2 = 1.4, x_3 = 1.6], x_4 = 1.8.$$

$$p_k := p(x_k), q_k := q(x_k), r_k := r(x_k), f_k := f(x_k).$$

Giải hệ sau để tìm  $y_1, y_2, y_3$ .

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} r_1 - \frac{2p_1}{h^2} & \frac{p_1}{h^2} + \frac{q_1}{2h} & 0 & f_1 - \alpha \left( \frac{p_1}{h^2} - \frac{q_1}{2h} \right) \\ \frac{p_2}{h^2} - \frac{q_2}{2h} & r_2 - \frac{2p_2}{h^2} & \frac{p_2}{h^2} + \frac{q_2}{2h} & f_2 \\ 0 & \frac{p_3}{h^2} - \frac{q_3}{2h} & r_3 - \frac{2p_3}{h^2} & f_3 - \beta \left( \frac{p_3}{h^2} + \frac{q_3}{2h} \right) \end{array} \right]$$



Cho bài toán biên tuyến tính cấp hai

$$\begin{cases} (x + 0.23) y''(x) + x^2 y' - 1.23y = 0.29x(x + 2), 1 \leq x \leq 1.8 \\ y(1) = 0.27, y(1.8) = 1.67 \end{cases}$$

Dùng phương pháp sai phân hữu hạn với bước nhảy  $h = 0.2$  xấp xỉ giá trị của  $y(1.2), y(1.4), y(1.6)$ .

**Giải**

$$p(x) = x + 0.23, q(x) = x^2, r(x) = -1.23, f(x) = 0.29x(x + 2), \alpha = 0.27, \beta = 1.67, h = 0.2,$$

$$x_0 = 1, \boxed{x_1 = 1.2, x_2 = 1.4, x_3 = 1.6}, x_4 = 1.8.$$

$$p_k := p(x_k), q_k := q(x_k), r_k := r(x_k), f_k := f(x_k).$$

$$\boxed{y(1.2) \approx 0.6504, y(1.4) \approx 1.0100, y(1.6) \approx 1.3498}$$

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} r_1 - \frac{2p_1}{h^2} & \frac{p_1}{h^2} + \frac{q_1}{2h} & 0 & f_1 - \alpha \left( \frac{p_1}{h^2} - \frac{q_1}{2h} \right) \\ \frac{p_2}{h^2} - \frac{q_2}{2h} & r_2 - \frac{2p_2}{h^2} & \frac{p_2}{h^2} + \frac{q_2}{2h} & f_2 \\ 0 & \frac{p_3}{h^2} - \frac{q_3}{2h} & r_3 - \frac{2p_3}{h^2} & f_3 - \beta \left( \frac{p_3}{h^2} + \frac{q_3}{2h} \right) \end{array} \right]$$

