Giảng viên ra đề:	Ngày	Người phê duyệt:			Ngày			
	19/05/202	22			19/05/20	122 —		
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - VNUHCM Khoa Khoa Học Ứng Dụng	Kiểm tra	a cuối kỳ	cuối kỳ Năm học 2021-202 Ngày thi 21/05/20					
	Môn học	Xác suất thống kê						
	Mã môn học	MT2013						
	Thời gian	100 phút Mã đề			2124			

- Sinh viên được sử dụng máy tính bỏ túi, bảng tra và tài liệu giấy là 2 tờ A4 được in hoặc photo (ghi rõ ho tên sinh viên)
- Sinh viên không làm tròn kết quả trung gian, làm tròn đáp án cuối cùng đến 4 chữ số thập phân.
- Sinh viên phải điền tên và MSSV vào đề thi. Đề thi gồm 17 câu hỏi trên 4 trang A4.
- Với các câu hỏi trắc nghiệm, sinh viên phải điền thông tin và tô phiếu trả lời trắc nghiệm theo đúng hướng dẫn, nếu không có thể bị mất điểm. Sinh viên phải nộp lại phiếu trả lời trắc nghiệm sau 60 phút tính từ lúc bắt đầu làm bài.
- Với các câu hỏi tư luân, sinh viên phải trình bày đầy đủ các bước, nếu không có thể bi trừ điểm.

• • /		
Họ và tên sinh viên:		
MSSV:	Giám thị 1:	
Nhóm:	Giám thị 2:	

Phần I: Trắc nghiệm (6 điểm, 60 phút)

Từ câu 1 đến câu 5, sử dụng dữ kiện sau:

Biết rằng tuổi thọ của một loại máy in (Đơn vị: năm) do một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử làm ra tuân theo phân phối mũ với tuổi thọ trung bình là 6 năm. Những máy in có tuổi thọ dưới 2 năm được phân loại là máy kém chất lượng.

1	/D/ 1 + ^	1 . 1	.1 .4	. 1	1 2.	11	/ ~ \	?	1	/	•	
Ι.	Tính độ	tech	cnuan	cno	L1101	tho	(nam)	i ciia.	ıoaı	may	ın	nav.
			CIICICIII	0110	00.01	0229	(1100111)	Corce				

- \bigcirc A) 6 \bigcirc B) Các câu còn lại đều sai. \bigcirc C) 2.4495 \bigcirc D) 2.4082 \bigcirc E) 0.4082
- 2. Tính tỷ lệ máy in kém chất lượng do nhà máy sản xuất ra.
 - \bigcirc \bigcirc 0.3935 \bigcirc \bigcirc 0.2485 \bigcirc 0.2835 \bigcirc 0.7165 \bigcirc Các câu còn lại đều sai.
- 3. Chọn ngẫu nhiên 10 máy in từ một dây chuyền sản xuất có rất nhiều máy in của nhà máy. Xác suất để chọn được ít nhất 3 máy in kém chất lượng là
 - (A) 0.5622 (B) 0.1181 (C) Các câu còn lại đều sai. (D) 0.2979 (E) 0.817
- 4. Hỏi sau bao nhiêu tháng thì có khoảng 28% số máy in do nhà máy sản xuất ra bị hỏng (làm tròn đáp án đến số nguyên)?
 - (A) 19 (B) 21 (C) 24 (D) 27 (E) Các câu còn lại đều sai.
- 5. Biết giá bán một máy in là 325 (USD). Theo điều kiện bảo hành, khách hàng sẽ được hoàn lại một khoản tiền là $325 \times e^{-t}$ nếu máy bị hỏng tại thời điểm t
 năm (tính từ thời điểm mua). Số tiền bảo hành trung bình (USD) mà nhà sản xuất phải trả theo gói bảo hành trên là?
 A 50 B 162.5 C 43.3333 D Các câu còn lại đều sai. E 46.4286

Từ câu 6 đến câu 10, sử dung dữ kiên sau:

Một công ty sản xuất sữa đậu nành đã chọn ngẫu nhiên 8 hộp sữa do công ty này sản xuất để kiểm định hàm lượng protein (%) của chúng. Kết quả được ghi nhận như sau:

79.1, 79.8, 80.2, 79.3, 79.9, 79.9, 78.3, 78.7

Với mức ý nghĩa 0.05, dữ liệu trên có đủ cơ sở để kết luận rằng hàm lượng protein trung bình của các hộp sữa đậu nành do công ty sản xuất nhỏ hơn 80%? Giả sử rằng hàm lượng protein của các hộp sữa tuân theo phân phối chuẩn.

6. Chọn giả thuyết đối H_1 phù hợp cho bài toán kiểm định trên.

(A) $\mu < 80$ (B) $\mu \neq 80$ (C) $\mu > 80$ (D) $\mu \ge 80$ (E) $\mu \le 80$

7. Giá trị kiểm định thống kê là:

(A) Các câu còn lại đều sai. (B) -1.5501 (C) -3.0501 (D) -0.5501 (E) -2.5501

8. Miền bác bỏ là:

9. Chọn kết luận phù hợp với bài toán kiểm định trên

A Giả thuyết H_1 là sai. B Các câu còn lại đều sai. C Chưa đủ cơ sở để bác bỏ giả thuyết H_0 . D Đủ cơ sở để bác bỏ giả thuyết H_0 . E Đủ cở sở để bác bỏ giả thuyết H_1 .

10. Khoảng tin cậy với độ tin cậy 90% cho trung bình hàm lượng protein trong các hộp sữa đậu nành do công ty này sản xuất là:

A [32.046, 48.654] B Các câu còn lại đều sai. C [73.926, 84.064] D [78.8436, 79.9564] E [78.9388, 79.8612]

Từ câu 11 đến câu 15, sử dụng dữ kiện sau:

Trong một thí nghiệm, người ta chọn ngẫu nhiên 8 quả bóng gôn nhãn hiệu thứ nhất và 15 quả bóng gôn nhãn hiệu thứ hai và sử dụng cùng một phương pháp để phát bóng và đo khoảng cách phát bóng của chúng. Dữ liệu thu được cho thấy khoảng cách phát bóng trung bình cho hai nhãn hiệu lần lượt là 267 thước Anh và 268 thước Anh. Người ta cũng tính được độ lệch chuẩn mẫu lần lượt là 4 thước Anh và 5 thước Anh. Với giả thiết các khoảng cách này tuân theo phân phối chuẩn và độ tin cậy $\alpha=0.05$, ta có thể kết luận khoảng cách phát bóng trung bình cho các quả bóng loại thứ nhất nhỏ hơn loại thứ hai không?

11. Chọn giả thuyết đối ${\cal H}_1$:

12. Chọn kiểm định phù hợp

(A) t-test (dùng phân phối Student) với bậc tự do 22 (B) Các câu còn lại đều sai. (C) z-test (dùng phân phối chuẩn tắc) (D) t-test (dùng phân phối Student) với bậc tự do 21 (E) F-test (dùng phân phối Fisher) với bậc tự do 2 và 14

13. Giá trị kiểm định thống kê

A -0.487 B 0.513 C 1.013 D -0.987 E Các câu còn lại đều sai.

14. Xác đinh miền bác bỏ

15. Chọn kết luận phù hợp với bài toán kiểm định trên

(A) Đủ cơ sở để bác bỏ giả thuyết H_0 . (B) Chưa đủ cơ sở để bác bỏ giả thuyết H_0 . (C) Các câu còn lại đều sai. (D) Đủ cơ sở để bác bỏ giả thuyết H_1 . (E) Giả thuyết H_1 là sai.

Họ tên sinh viên: MSSV: Trang 2 / 4

Phần II: Tự luận (4 điểm)

16. Để so sánh chất lượng sinh viên giữa 4 ngành học tại một trường đại học kinh tế, người ta đã thực hiện khảo sát điểm trung bình học kỳ (thang điểm 10) cho 20 sinh viên được chọn ngẫu nhiên từ mõi ngành và kết quả khảo sát được ghi nhận như bên dưới.

Ngành học	Điểm trung bình						
Kế toán	7.1	6.7	6.6	6.6	7.36		
Tài chính	6.7	6.8	7.0	5.6	6.2		
Nhân sự	7.5	7.5	8.4	7.6	9.8		
Tiếp thị	4.5	6.0	5.1	4.5	5.8		

Giả sử rằng dữ liệu trên thỏa các giả định của phương pháp Anova.

- (a) Hãy dùng phương pháp Anova để so sánh điểm trung bình học kỳ giữa 4 ngành học trên và kết luận với mức ý nghĩa 5%.
- (b) Thực hiện so sánh bội bằng phương pháp LSD của Fisher và nhận xét kết quả với mức ý nghĩa 5%.

Họ tên sinh viên: MSSV: Trang 3/4

17. Khi đo chỉ số chất lượng không khí AQI trong 5 ngày ở Hà nội, người ta ghi nhận được số liệu dưới đây.

Chỉ số AQI của khí NO_2					
Chỉ số AQI của Ozone	36	31	41	30	26

Giả sử rằng dữ liệu trên thỏa các giả định của mô hình hồi quy tuyến tính đơn với chỉ số AQI của Ozone là biến phụ thuộc và chỉ số AQI của khí NO_2 là biến độc lập.

- (a) Tính hệ số tương quan mẫu và đưa ra nhận xét cho hệ số tương quan mẫu này.
- (b) Viết phương trình hồi quy tuyến tính của chỉ số AQI của Ozone theo chỉ số AQI của khí NO_2 .
- (c) Tìm khoảng tin cậy 95% cho hệ số góc của đường thẳng hồi quy tuyến tính trên.

Họ tên sinh viên: MSSV: Trang 4/4

Đáp án phần trắc nghiệm.

an phan trae nghiệm.		
Question	Key	
1	A	
2	С	
3	X	C
4	C	
5	\mathbf{E}	
6	A	
7	E	
8	E	
9	D	
10	D	
11	\mathbf{E}	
12	D	
13	A	
14	В	
15	В	
(L.O.1.1, L.O.1.2, L.O.1.3, L.O.2.1, L.O.2.3)	??	
(L.O.1.1, L.O.1.2, L.O.1.3, L.O.2.1, L.O.2.3)	??	

Họ tên sinh viên: MSSV: Trang 5 / 4