



ĐÁP ÁN BẢNG B

Lời giải bài B.1

6 điểm

Ý	Cách	Bước	Nội dung	Điểm B.1
a			Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho $u_n > 3/2$	2,00
		1	Khẳng định (u_n) đơn điệu tăng	1,00
			Từ định nghĩa $u_{n+1} = \frac{1}{1!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \frac{1}{(n+1)!} > \frac{1}{1!} + \cdots + \frac{1}{n!} = u_n$ với mọi $n \geq 1$. Vậy ta suy ra $u_{n+1} > u_n$ với mọi $n \geq 1$.	1,00
		2	Khẳng định $u_n > 3/2$ khi và chỉ khi $n \geq 3$	1,00
			Do $u_2 = 1 + \frac{1}{2} = 3/2$ nên từ tính đơn điệu của (u_n) ta suy ra $u_n > 3/2$ khi và chỉ khi $n \geq 3$.	1,00
b			Chứng minh rằng dãy số $(u_n)_{n=1}^{\infty}$ hội tụ	4,00
		1	Khẳng định (u_n) bị chặn trên	2,00
			Sử dụng đánh giá $n! \geq n(n-1)$ để thấy $u_n = \frac{1}{1!} + \cdots + \frac{1}{n!} \leq 1 + \frac{1}{1 \times 2} + \cdots + \frac{1}{(n-1) \times n} < 2$ với mọi $n \geq 2$.	2,00
		2	Khẳng định (u_n) hội tụ	2,00
			Dãy (u_n) đơn điệu tăng và bị chặn trên nên hội tụ.	2,00



ĐÁP ÁN BẢNG B

Lời giải bài B.2

6 điểm

Ý	Cách	Bước	Nội dung	Điểm B.2
a			Chứng minh f liên tục tại 0	2,00
		1	Tính giới hạn của f tại 0	1,00
			Với mọi x ta luôn có $0 \leq f(x) = \sin^2 x \leq x^2.$ Do đó theo nguyên lý kẹp thì $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$.	1,00
		2	Khẳng định tính liên tục của f tại 0	1,00
			Ở bước trên ta đã có $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$. Nhưng $0 \in \mathbb{Q}$ nên $f(0) = \sin^2 0 = 0$. Vậy f liên tục tại 0.	1,00
b			Hàm f có khả vi tại 0 không?	2,00
		1	Chuyển về khảo sát giới hạn của $f(x)/x$	1,00
			Ta khảo sát giới hạn $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(0+x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}.$	1,00
		2	Tính giới hạn của $f(x)/x$	1,00
			Rõ ràng với $x \neq 0$ thì $0 \leq f(x)/x \leq x$. Vậy $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0.$ Từ đó hàm f khả vi tại 0.	1,00
c			Tìm tất cả các điểm mà ở đó hàm f khả vi	2,00
		1	Khẳng định f không khả vi tại $x \neq k\pi$ với $k \in \mathbb{Z}$	1,00
			Nhận xét: nếu $x \neq k\pi$ với $k \in \mathbb{Z}$ thì $\sin x \neq 0$. Có 2 trường hợp xảy ra: Nếu $x \in \mathbb{Q}$. Trong trường hợp này $f(x) = \sin^2 x$. Lấy 1 dãy các điểm $x_n \notin \mathbb{Q}$ sao cho $x_n \rightarrow x$. Từ tính liên tục của hàm \sin ta thấy $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (-\sin^2 x_n) = -\sin^2 x \neq \sin^2 x = f(x).$ Nếu $x \notin \mathbb{Q}$. Trong trường hợp này $f(x) = -\sin^2 x$. Lấy 1 dãy các điểm $x_n \in \mathbb{Q}$ sao cho $x_n \rightarrow x$. Từ tính liên tục của hàm \sin ta thấy $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2 x_n = \sin^2 x \neq -\sin^2 x = f(x).$	1,00
		2	Khẳng định f khả vi tại $k\pi$ với $k \in \mathbb{Z}$	1,00
			Cuối cùng chú ý rằng $f(k\pi) = 0$ với mọi $k \in \mathbb{Z}$. Do $\left \frac{f(k\pi + x) - f(k\pi)}{x} \right = \left \frac{f(x)}{x} \right ,$ lý luận như ý (b) ta thấy tại các điểm $k\pi$ với $k \in \mathbb{Z}$ thì f khả vi với $f'(k\pi) = 0$.	1,00



ĐÁP ÁN BẢNG B

Lời giải bài B.3

6 điểm


Ý	Cách	Bước	Nội dung	Điểm B.3
a			Chứng minh rằng tồn tại dãy số $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ dẫn ra $+\infty$ sao cho $f'(x_n) \rightarrow 0$	2,00
		1	Sử dụng công thức giá trị trung bình	1,00
			Sử dụng công thức giá trị trung bình trên các đoạn $[n, n+1]$ ta thu được $f'(x_n) = f(n+1) - f(n)$ với $x_n \in (n, n+1)$ nào đó.	
		2	Chỉ ra sự tồn tại một dãy $(x_n)_n$ cần tìm	1,00
			Hiển nhiên dãy $(x_n)_n$ xác định như ở bước trên tiến ra $+\infty$. Hơn nữa do $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ nên $\lim_{n \rightarrow +\infty} f'(x_n) = 0.$	1,00
b			Chứng minh rằng nếu f'' bị chặn trên \mathbb{R} thì $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$	4,00
		1	Đánh giá f' thông qua khai triển Taylor	2,00
			Từ công thức Khai triển Taylor ta có $f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{f''(x+\theta h)}{2}h^2$ với $x, h > 0$ và $\theta \in (0, 1)$ phụ thuộc vào x và h . Do f'' bị chặn nên tồn tại $M > 0$ sao cho $ f''(x) < M$ với mọi $x > 0$. Khi đó từ công thức khai triển trên $ f'(x) \leq \frac{ f(x+h) - f(x) }{h} + \frac{Mh}{2}.$	2,00
		2	Kết luận giới hạn của f'	2,00
			Do $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ nên với mỗi $\varepsilon > 0$ tùy ý tồn tại $x_0 > 0$ sao cho $ f(x) < \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall x \geq x_0.$ Do đó $ f'(x) \leq \frac{\varepsilon}{h} + \frac{Mh}{2} \quad \forall x \geq x_0.$ Đến đây ta lấy $h = \sqrt{\frac{2\varepsilon}{M}}$ để thu được $ f'(x) \leq \sqrt{2\varepsilon M} \quad \forall x \geq x_0.$ Do $\varepsilon > 0$ tùy ý nên $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.	2,00



ĐÁP ÁN BẢNG B

Lời giải bài B.4

6 điểm



Ý	Cách	Bước	Nội dung	Điểm B.4
			Xác định chiều dài ngắn nhất có thể có của thang AB	6,00
		1	<p>Đặt bài toán</p> <p>Đặt $BD = x$ mét với $x \geq p/2$. Khi đó</p> $BM = \sqrt{x^2 + h^2}.$ <p>Vì $\triangle BDM \sim \triangle BCA$ ta suy ra</p> $MA = \frac{DC}{DB} \times MB = \frac{p/2 + q}{x} \sqrt{x^2 + h^2}.$ <p>Vậy</p> $AB = MA + MB = \sqrt{x^2 + h^2} \frac{x + p/2 + q}{x} =: f(x).$	2,00
		2	<p>Khảo sát hàm f trên $[p/2, \infty)$</p> <p>Tính toán để thu được</p> $f'(x) = \frac{2x^3 - (p + 2q)h^2}{2x^2 \sqrt{x^2 + h^2}}$ <p>Rõ ràng $f'(x) = 0$ tại duy nhất</p> $x = \left(\left(\frac{p}{2} + q \right) h^2 \right)^{1/3} =: x_0.$	2,00
		3	<p>Kết luận độ dài ngắn nhất của thang AB</p> <p>Có 2 trường hợp xảy ra:</p> <p>Trường hợp $4(p + 2q)h^2 \leq p^3$: Khi đó hàm f đồng biến trên $[p/2, \infty)$ và vị trí thang AB cần tìm là khi $B \equiv N$, tức là khi thang tựa trên giá đỡ. Lúc này chiều dài của thang AB là</p> $(p + q) \sqrt{1 + \left(\frac{2h}{p} \right)^2}.$ <p>Trường hợp $4(p + 2q)h^2 > p^3$: Khi đó hàm f nghịch biến trên $[p/2, x_0]$ và đồng biến trên $[x_0, \infty)$ và vị trí thang AB cần tìm là khi $BN = x_0 - p/2$. Lúc này chiều dài của thang AB là</p> $\left(x_0 + \frac{p}{2} + q \right) \sqrt{1 + \left(\frac{h}{x_0} \right)^2}.$	2,00



ĐÁP ÁN BẢNG B

Lời giải bài B.5

6 điểm

Ý	Cách	Bước	Nội dung	Điểm B.5
a		1	Chứng minh rằng nếu $f \in \mathcal{F}$ thì f liên tục	2,00
			<p>Lấy $x \in [-1, 1]$ và $\varepsilon > 0$ bất kỳ. Ta chứng minh tồn tại $\delta > 0$ (có thể phụ thuộc vào x và ε) sao cho $f(x) - f(y) < \varepsilon$ với mọi $y \in [-1, 1]$ thỏa mãn $x - y < \delta$. Thật vậy ta lấy</p> $\delta = \frac{\varepsilon}{2022}.$ <p>Khi đó với $y \in [-1, 1]$ bất kỳ thỏa mãn $x - y < \delta$ ta sẽ có</p> $ f(x) - f(y) \leq 2022 x - y < 2022\delta = \varepsilon.$	2,00
b			Chứng minh rằng nếu $f \in \mathcal{F}$ thì $\int_{-1}^1 f(x)dx \geq \frac{1}{2022}$	4,00
		1	Chứng minh $f(x) \geq \max(1 + 2022(x - 1), 0)$ với mọi $x \in [-1, 1]$.	2,00
			<p>Rõ ràng</p> $\max(1 + 2022(x - 1), 0) = 0 \quad \forall x \in \left[-\frac{2021}{2022}, \frac{2021}{2022}\right].$ <p>Với $-1 \leq x < -\frac{2021}{2022}$ ta có</p> $f(x) \geq f(-1) - f(x) - f(-1) \geq 1 - 2022 x + 1 = 1 + 2022(x - 1).$ <p>Với $\frac{2021}{2022} < x \leq 1$ ta có</p> $f(x) \geq f(1) - f(x) - f(1) \geq 1 - 2022 x - 1 = 1 + 2022(x - 1).$	2,00
		2	Tính tích phân $\int_{-1}^1 f(x)dx$	2,00
			<p>Do $f \geq 0$ trên $[-1, 1]$ nên</p> $\begin{aligned} \int_{-1}^1 f(x)dx &\geq \int_{-1}^{-\frac{2021}{2022}} (1 - 2022(x + 1))dx + \int_{\frac{2021}{2022}}^1 (1 + 2022(x - 1))dx \\ &= \frac{1}{2022}. \end{aligned}$	2,00