

## Задачи к лекции 6

В этом листке используется обозначение  $R = K[x_1, \dots, x_n]$ , где  $K$  — некоторое поле. При сравнении одночленов от нескольких переменных всегда используется лексикографический порядок.

1. Пусть  $M_0 \subset R$  — множество всех одночленов с коэффициентом 1. Найдите все одночлены  $m \in M_0$ , для которых существует лишь конечное число одночленов  $m' \in M_0$  с условием  $m' \prec m$ .
2. Пусть  $f, g \in R$  — два ненулевых многочлена и  $L(f)$ ,  $L(g)$  — их старшие члены. Докажите, что  $L(f \cdot g) = L(f) \cdot L(g)$ .
3. Многочлен  $f(x_1, \dots, x_n) \in R$  называется *симметрическим*, если

$$f(x_{\sigma(1)}, x_{\sigma(2)}, \dots, x_{\sigma(n)}) = f(x_1, \dots, x_n)$$

для всякой подстановки  $\sigma \in S_n$ . Докажите, что если  $ax_1^{k_1}x_2^{k_2}\dots x_n^{k_n}$  — старший член некоторого симметрического многочлена, то  $k_1 \geq k_2 \geq \dots \geq k_n$ .

4. Проверьте, что операция редукции заданного монома относительно заданного многочлена является линейным оператором на векторном пространстве  $R$ .
5. Пусть  $F = \{x_1 + x_2, x_3 + x_4\}$  и  $g = x_2x_3^2x_4 - x_1x_3x_4^2$ . Найдите (какой-нибудь один) остаток многочлена  $g$  относительно системы  $F$ .
6. Покажите, что остаток многочлена  $g$  относительно системы  $F$  определён неоднозначно, если
  - (а)  $F = \{xy + 1, y^2 - 1\}$  и  $g = xy^2 - x$ ;
  - (б)  $F = \{xy - 1, y^2 - 1\}$  и  $g = x^2y + xy^2 + y^2$ .
7. Докажите, что если для некоторых многочленов  $g_1, g_2 \in K[x_1, \dots, x_n]$  их разность  $g_1 - g_2$  редуцируется к нулю относительно системы  $F \subset R \setminus \{0\}$ , то многочлены  $g_1$  и  $g_2$  можно редуцировать к одному и тому же многочлену.
8. Пусть  $F$  — произвольное непустое множество. Докажите, что все многочлены, обладающие единственным остатком относительно  $F$ , образуют подпространство в  $K[x_1, \dots, x_n]$  и что операция взятия остатка линейна на данном подпространстве.
9. Пусть  $F \subset R \setminus \{0\}$  — некоторая система многочленов и  $S(F)$  — множество всех  $S$ -многочленов системы  $F$ . Для каждого  $f \in S(F)$  найдём какой-нибудь один остаток многочлена  $f$  относительно  $F$ . Докажите, что
  - (1) если все найденные остатки равны 0, то  $F$  является системой Грёбнера;
  - (2) если хотя бы один из остатков отличен от нуля, то  $F$  не является системой Грёбнера.
10. Выясните, какие из следующих множеств многочленов являются системами Грёбнера:
  - (а) система  $F$  из задачи 5;
  - (б)  $\{x^2y - y^2, x^2z - z^2\}$ ;
  - (в)  $\{x^2y - y^2, x^2z - z^2, y^2z - yz^2\}$ .

## Домашнее задание

1. Какие значения может принимать длина убывающей (в лексикографическом порядке) цепочки одночленов от переменных  $x_1, x_2, x_3$ , начинающейся с одночлена  $x_1^2x_2^3x_3$ ?
2. Найдите остаток многочлена  $g$  относительно системы  $\{f\}$ , где
 
$$g = x_2^4x_3^6 + 2x_1x_2^4x_3 + x_1^2x_2^2, \quad f = x_2^4x_3 - x_1x_2x_3^2 + x_1x_2^2.$$
3. Выясните, является ли множество  $\{f_1, f_2, f_3\}$  системой Грёбнера, где
 
$$f_1 = 2x_1x_2 + 4x_1x_3 + x_2x_3^2, \quad f_2 = 4x_1x_3^2 + x_2x_3^3 + 4, \quad f_3 = x_2^2x_3^3 + 4x_2 + 8x_3.$$
4. Пусть  $f_1, f_2 \in K[x_1, \dots, x_n]$  — два ненулевых многочлена, у которых старшие члены взаимно просты. Докажите, что старший член многочлена  $S(f_1, f_2)$  делится либо на  $L(f_1)$ , либо на  $L(f_2)$ .