

CPE 342 - Assignment 1: OLS Regression

Name

Student ID

Kiatisak Markmeeshap 67070501005

X = advertising budget (thousand \$) | Y = sales (thousand units)

```
In [1]: import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

pd.set_option("display.precision", 4)

df = pd.DataFrame({
    "month": [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10],
    "budget_kusd": [3.0, 5.0, 2.0, 7.0, 8.0, 1.0, 4.0, 6.0, 9.0, 10.0],
    "sales_kunits": [6.0, 9.0, 4.0, 10.0, 12.0, 3.0, 7.0, 8.0, 13.0, 15.0],
}).set_index("month")

x = df["budget_kusd"].to_numpy(dtype=float)
y = df["sales_kunits"].to_numpy(dtype=float)
n = len(x)
df.T
```

```
Out[1]:
```

	month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
budget_kusd		3.0	5.0	2.0	7.0	8.0	1.0	4.0	6.0	9.0	10.0
sales_kunits		6.0	9.0	4.0	10.0	12.0	3.0	7.0	8.0	13.0	15.0

1a. OLS fit

Model:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$$

OLS chooses β_0, β_1 that minimise:

$$\text{SSE} = \sum_{i=1}^n (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2$$

Setting both partial derivatives to zero gives the **normal equations**:

$$\begin{cases} n\beta_0 + (\sum x_i)\beta_1 = \sum y_i \\ (\sum x_i)\beta_0 + (\sum x_i^2)\beta_1 = \sum x_i y_i \end{cases}$$

Five sums are needed: $n, \sum x_i, \sum y_i, \sum x_i y_i, \sum x_i^2$.

```
In [2]: sum_x, sum_y = x.sum(), y.sum()
sum_xy, sum_xx = (x * y).sum(), (x ** 2).sum()
x_bar, y_bar = x.mean(), y.mean()

print(f"n = {n}, sum x = {sum_x:g}, sum y = {sum_y:g}, "
      f"sum xy = {sum_xy:g}, sum x^2 = {sum_xx:g}")
print(f"x_bar = {x_bar:g}, y_bar = {y_bar:g}")

pd.DataFrame({"x": x, "y": y, "x*y": x * y, "x^2": x ** 2}, index=df.index).T
```

```
n = 10, sum x = 55, sum y = 87, sum xy = 583, sum x^2 = 385
x_bar = 5.5, y_bar = 8.7
```

```
Out[2]:
```

month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	3.0	5.0	2.0	7.0	8.0	1.0	4.0	6.0	9.0	10.0
y	6.0	9.0	4.0	10.0	12.0	3.0	7.0	8.0	13.0	15.0
x*y	18.0	45.0	8.0	70.0	96.0	3.0	28.0	48.0	117.0	150.0
x^2	9.0	25.0	4.0	49.0	64.0	1.0	16.0	36.0	81.0	100.0

1b. Coefficients - three methods

Method 1: closed form

Solve the two normal equations by hand:

$$\beta_1 = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}, \quad \beta_0 = \bar{y} - \beta_1 \bar{x}$$

```
In [3]: beta1_scalar = (n * sum_xy - sum_x * sum_y) / (n * sum_xx - sum_x ** 2)
beta0_scalar = y_bar - beta1_scalar * x_bar

print(f"beta_1 = ({n}*{sum_xy:g} - {sum_x:g}*{sum_y:g}) / "
      f"({n}*{sum_xx:g} - {sum_x:g}^2) = {beta1_scalar:.6f}")
print(f"beta_0 = {y_bar:g} - {beta1_scalar:.6f}*{x_bar:g} = "
      f"{beta0_scalar:.6f}")
```

```
beta_1 = (10*583 - 55*87) / (10*385 - 55^2) = 1.266667
beta_0 = 8.7 - 1.266667*5.5 = 1.733333
```

Method 2: matrix normal equations

Put the data in the design matrix $\mathbf{X} = [\mathbf{1} \ \mathbf{x}]$:

$$\mathbf{X}^\top \mathbf{X} \boldsymbol{\beta} = \mathbf{X}^\top \mathbf{y} \implies \boldsymbol{\beta} = (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{y}$$

$$\mathbf{X}^\top \mathbf{X} = \begin{bmatrix} n & \sum x_i \\ \sum x_i & \sum x_i^2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{X}^\top \mathbf{y} = \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \end{bmatrix}$$

Row by row this is the same pair of normal equations - but it still works with any number of predictors, which method 1 does not.

```
In [4]: X = np.column_stack([np.ones(n), x])
beta0, beta1 = np.linalg.solve(X.T @ X, X.T @ y)  # solve is preferred over inv()

print("X'X =\n", X.T @ X)
print("X'y =", X.T @ y)
print(f"\nbeta_0 = {beta0:.6f}, beta_1 = {beta1:.6f}")
```

```
X'X =
[[ 10.  55.]
 [ 55. 385.]]
X'y = [ 87. 583.]
```

```
beta_0 = 1.733333, beta_1 = 1.266667
```

Method 3: statsmodels (verification)

An independent implementation, used only to confirm methods 1 and 2.

```
In [5]: import statsmodels.api as sm

model = sm.OLS(endog=y, exog=X).fit()  # X already has the constant column

pd.DataFrame({
    "beta_0 (intercept)": [beta0_scalar, beta0, model.params[0]],
    "beta_1 (slope)":     [beta1_scalar, beta1, model.params[1]],
}, index=["1. closed form", "2. matrix", "3. statsmodels"])
```

```
Out[5]:
```

	beta_0 (intercept)	beta_1 (slope)
1. closed form	1.7333	1.2667
2. matrix	1.7333	1.2667
3. statsmodels	1.7333	1.2667

1c. Fitted line

$$\hat{y} = 1.7333 + 1.2667 x$$

x in thousand dollars, $\hat{y}$ in thousand units.

2a. Meaning of the slope and intercept

$$\beta_1 = 1.2667 \frac{\text{k units}}{\text{k\$}}, \quad \beta_0 = 1.7333 \text{ k units at } x = 0$$

```
In [6]: print(f"beta_1 = {beta1:.4f} k units per k$ = {beta1 * 1000:,.0f} units per  
extra $1,000")  
print(f"beta_0 = {beta0:.4f} k units = {beta0 * 1000:,.0f} units at  
zero advertising")  
print(f"observed x range: {x.min():g} to {x.max():g} k$ (x = 0 is outside  
it)")
```

```
beta_1 = 1.2667 k units per k$ = 1,267 units per extra $1,000  
beta_0 = 1.7333 k units = 1,733 units at zero advertising  
observed x range: 1 to 10 k$ (x = 0 is outside it)
```

Explanation

Slope บอกว่าถ้าหากเราเพิ่มค่า x ซึ่งก็คือ Advertising Budget ขึ้น 1k Dollar ยอดขายจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1.2667k Unit

ตัวอย่างเช่น ถ้าเราลงงบอยู่ที่ 5k Dollar โมเดลจะทำนายยอดขายได้ 8.07k Unit พอเพิ่มงบเป็น 6k Dollar ยอดขายก็จะขึ้นเป็น 9.33k Unit

Intercept คือจุดที่เส้นตรงตัดแกน Y หรือก็คือยอดขายที่โมเดลทำนายไว้ตอนที่งบโฆษณา เท่ากับ 0k Dollar ซึ่งได้ประมาณ 1.7333k Unit หรือราว ๆ 1,733 Unit ในบริบทของโจทย์นี้ ดีความได้ว่า เป็นยอดขายพื้นฐานที่เกิดจากปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่การโฆษณา เช่น ลูกค้าประจำหรือการบอกต่อ

แต่ต้องระวังไว้ว่างบต่ำสุดที่มีในข้อมูลจริงคือ 1k Dollar ไม่เคยมีเดือนไหนที่ไม่ลงโฆษณาเลยสักครั้ง ค่า Intercept นี่จึงเป็นแค่ค่าที่ได้จากการลากเส้นออกไปนอกช่วงข้อมูล ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ยืนยันได้ จากข้อมูลชุดนี้

2b. Prediction at a budget of \$12,000

A budget of 12,000 dollars means $x = 12$, since X is measured in thousand dollars:

$$\hat{y}(12) = 1.7333 + 1.2667 \times 12 = 16.9333 \text{ k units}$$

Observed range is $x \in [1, 10]$, so this is an **extrapolation**.

```
In [7]: x_new = 12_000 / 1_000
y_pred = beta0 + beta1 * x_new

print(f"y_hat({x_new:g}) = {y_pred:.4f} k units = about {y_pred * 1000:,.0f} units")
print(f"inside observed range 1-10? {bool(x.min() <= x_new <= x.max())} -> extrapolation")
```

```
y_hat(12) = 16.9333 k units = about 16,933 units
inside observed range 1-10? False -> extrapolation
```

Explanation

Prediction ถ้าพบโฆษณาอยู่ที่ 12,000 Dollar เราต้องแทนค่าเป็น $x = 12$ ไม่ใช่ 12000 เพราะ X มีหน่วยเป็น k Dollar อยู่แล้ว

แทนลงในสมการจะได้ $\hat{y} = 1.7333 + 1.2667 \times 12 = 16.9333$ ก็คือโมเดลทำนายว่า จะขายได้ประมาณ 16.9333k Unit หรือราว ๆ 16,933 Unit

ข้อควรระวัง งบที่มีในข้อมูลจริงอยู่แค่ช่วง 1k ถึง 10k Dollar การทำนายที่ 12k Dollar จึงเป็นการ extrapolate ออกไปนอกช่วงข้อมูล ตัวเลขที่ได้ถูกต้องตามสมการ แต่ไม่มีอะไรรับประกันว่ายอดขายจริงจะยังเพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรงแบบนี้

3a. R-squared

$$SSE = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2, \quad SST = \sum (y_i - \bar{y})^2, \quad R^2 = 1 - \frac{SSE}{SST}$$

```
In [8]: y_hat = beta0 + beta1 * x
residuals = y - y_hat

sse = (residuals ** 2).sum()
sst = ((y - y_bar) ** 2).sum()
r_squared = 1 - sse / sst

print(f"SSE = {sse:.4f}, SST = {sst:.4f}")
print(f"R^2 = 1 - {sse:.4f}/{sst:.4f} = {r_squared:.4f} ({r_squared * 100:.2f}%)")
print(f"check: statsmodels R^2 = {model.rsquared:.4f}, sum of residuals = {residuals.sum():.2e}")

pd.DataFrame({
    "x": x, "y": y, "y_hat": y_hat,
    "residual": residuals, "residual^2": residuals ** 2,
}, index=df.index).T
```

```
SSE = 3.7333, SST = 136.1000
R^2 = 1 - 3.7333/136.1000 = 0.9726 (97.26%)
check: statsmodels R^2 = 0.9726, sum of residuals = -5.33e-15
```

Out[8]:

	month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
x	3.0000	5.0000	2.0000	7.00	8.0000	1.0000e+00	4.00	6.0000	9.0000	1	
y	6.0000	9.0000	4.0000	10.00	12.0000	3.0000e+00	7.00	8.0000	13.0000	1	
y_hat	5.5333	8.0667	4.2667	10.60	11.8667	3.0000e+00	6.80	9.3333	13.1333	1	
residual	0.4667	0.9333	-0.2667	-0.60	0.1333	-8.8818e-16	0.20	-1.3333	-0.1333		
residual^2	0.2178	0.8711	0.0711	0.36	0.0178	7.8886e-31	0.04	1.7778	0.0178		

In [9]:

```

from pathlib import Path

fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 4.5))


line_x = np.linspace(x.min(), x.max(), 100)
extrap_x = np.linspace(x.max(), x_new, 50)

ax1.axvspan(x.max(), x_new + 0.4, color="#f77f00", alpha=0.10)
ax1.scatter(x, y, color="#c1121f", s=50, zorder=3, label="data")
ax1.plot(line_x, beta0 + beta1 * line_x, color="#003049", lw=2,
         label=f"y_hat = {beta0:.4f} + {beta1:.4f}x")
ax1.plot(extrap_x, beta0 + beta1 * extrap_x, color="#003049", lw=2, ls=":",
         label="extrapolated")
ax1.scatter([x_new], [y_pred], marker="*", s=300, color="#f77f00",
           edgecolor="#003049", zorder=4, label=f"x=12: {y_pred:.2f}k units")
ax1.set_xlabel("X: budget (k$)")
ax1.set_ylabel("Y: sales (k units)")
ax1.set_title(f"OLS fit (R-squared = {r_squared:.4f})")
ax1.legend(fontsize=8, loc="upper left")
ax1.grid(alpha=0.25)

ax2.axhline(0, color="#003049", lw=1.5)
ax2.vlines(x, 0, residuals, color="#c1121f", alpha=0.45, lw=1.5)
ax2.scatter(x, residuals, color="#c1121f", s=50, zorder=3)
ax2.set_xlabel("X: budget (k$)")
ax2.set_ylabel("residual (k units)")
ax2.set_title(f"Residuals (SSE = {sse:.4f})")
ax2.grid(alpha=0.25)

fig.tight_layout()
Path("figures").mkdir(exist_ok=True)
fig.savefig("figures/fit_and_residuals.png", dpi=150, bbox_inches="tight")
plt.show()

```



3b. Interpretation of R-squared

$$R^2 = 0.9726$$

```
In [10]: rmse = np.sqrt(sse / n)
print(f"R^2 = {r_squared:.4f} -> {r_squared * 100:.2f}% of the variance in
sales explained, "
      f"{(1 - r_squared) * 100:.2f}% unexplained")
print(f"typical miss = {rmse:.4f} k units (about {rmse * 1000:,.0f} units, "
      f"{rmse / y_bar * 100:.1f}% of mean sales)")
```

R^2 = 0.9726 -> 97.26% of the variance in sales explained, 2.74% unexplained
typical miss = 0.6110 k units (about 611 units, 7.0% of mean sales)

Explanation

ค่า R^2 ที่เกิดขึ้นคือ 0.9726 แปลว่าความแปรผัน (Variance) ของยอดขาย 97.26% สามารถอธิบายได้ด้วย Advertising Budget ส่วนอีก 2.74% เป็นสิ่งที่โมเดลไม่สามารถอธิบายได้ อาจจะเป็นปัจจัยอื่น ๆ เช่น ฤดูกาล คู่แข่ง ราคา หรือความต้องการของตลาด

Summary

```
In [11]: pd.DataFrame([
    ["1b", "beta_0", f"{beta0:.4f}", "k units"],
    ["1b", "beta_1", f"{beta1:.4f}", "k units / k$"],
    ["1c", "fitted line", f"y_hat = {beta0:.4f} + {beta1:.4f} x", ""],
    ["2b", "y_hat(12)", f"{y_pred:.4f}", f"k units (~{y_pred * 1000:,.0f} units), extrapolation"],
    ["3a", "SSE / SST", f"{sse:.4f} / {sst:.4f}", ""],
    ["3a", "R^2", f"{r_squared:.4f}", f"{r_squared * 100:.2f}%"],
], columns=["Task", "Quantity", "Value", "Note"])
```

Out[11]:

	Task	Quantity	Value	Note
0	1b	beta_0	1.7333	k units
1	1b	beta_1	1.2667	k units / k\$
2	1c	fitted line	y_hat = 1.7333 + 1.2667 x	
3	2b	y_hat(12)	16.9333	k units (~16,933 units), extrapolation
4	3a	SSE / SST	3.7333 / 136.1000	
5	3a	R^2	0.9726	97.26%