

ASSOCIAZIONE DI ARGENTO MICRONIZZATO, ZINGO AGETATO E AGIDO LAURIGO



La ricerca italiana per il benessere della cute

PERCHE IL P. ACNES È AL CENTRO DEL PROBLEMA'...





Fattori chemiotattici + Complemento

Aumentata espressione e attivazione di Toll-like receptors (citochine)

IL 1, IL-8, TNFα-like factors >> ICAM >> Cellule infiammatorie


Super-antigeni



Porfirine + O₂ (ROS + Squalene perossidazione)

Lipasi FFA Enzimi(MMP): rottura della parete follicolare







*L'argento micronizzato ha dimostrato la sua azione antibatterica non associata a sviluppo di resistenze.



L'esclusiva associazione dei 3 attivi si è dimostrata efficace nei confronti del P.Acnes, compresi i ceppi resistenti a Clindamicina, Eritromicina e Tetraciclina²



EFFICACIA DIMOSTRATA

IN VITRO²

"All P.Acnes isolates irrespective of antibiotic genotype/phenotype or geographical origin were equally susceptible to Diakon Krem2"

P.Acnes isolate	Phenotype	Mutation/Gene	Source	MIC (% v/v)
EVO-2	Sensitive	None	United states	0,156
EVO-58	Resistant C	Unknown	Sweden	0,156
EVO-59	Resistant E	2057	England	0,156
EVO-33	Resistant C+E	erm (X)	Spain	0,156
EVO-44	Resistant C+E+T	1058/2059	United States	0,156

C=Clindamycin E=Erythromycin T=Tetracycline

IN CLINICA

S.Zauli, A.Virgili, V.Bettoli, In vitro report and in vivo investigation of adjuvant topical treatment for acneic skin based on micronized silver, zinc acetate and lauric acid. Eur J Acne and Rel Dis Vol 4/2 Suppl.1, 2013.³

- 25 Pazienti con acne lieve-moderata
- Applicazione Diakon Krem 2 volte/die
- Durata dello studio 8 settimane

Miglioramenti clinici significativi

score	psicologico
medio	medio
-70%	-33%

3 Attivi Sinergici per l'Acne

La Sezione di Dermatologia Clinica dell'Università Federico II di Napoli, ha studiato l'efficacia nel trattamento dell'acne lieve-moderata di una terapia topica a base di **argento micronizzato**, **acido laurico** e **zinco acetato** attraverso una valutazione sia oggettiva, mediante GAGS e Sebutape[®], che soggettiva, mediante l'ausilio di un nuovo strumento di valutazione della componente psicologica del paziente acneico: l'**Acne Radar**.⁴


- 20 pazienti di età compresa tra 16 e 28 anni con acne lieve-moderata
- Applicazione di Diakon Krem 2 volte/die per 2 mesi

MIGLIORAMENTI CLINICI SIGNIFICATIVI


GAGS EVALUATION

Valutazione delle lesioni

Il miglioramento clinico è stato determinato mediante il calcolo del valore del GAGS con una riduzione percentuale del 45%



SEBUTAPE



Valutazione del sebo

La misurazione ottenuta con Sebutape ha evidenziato una significativa riduzione della secrezione sebacea pari al 62%

4. G. Fabbrocini, S. Cacciapuoti, M. Donnarumma, C. Marasca, G. Monfrecola. Valutazione dell'efficacia di un coadiuvante topico a base di Argento Micronizzato, Zinco Acetato e Acido Laurico nel trattamento dell'acne lieve-moderata, Vol 16/3:137-141, Settembre 2014



DOPO 2 MESI DI TRATTAMENTO

RIDUZIONE LESIONI ACNEICHE

Riduzione del GAGS del 45%

AZIONE SEBOSTATICA

Riduzione SEBUTAPE del 62%

QUALITÀ DELLA VITA

L'Acne Radar rivela un netto miglioramento:

Senso di vergogna

Percezione degli inestetismi

• Relazioni sociali e intime


• Senso di bruciore

Inestetismi8 \Rightarrow 450%Bruciore7 \Rightarrow 2,565%Relazioni sociali8,2 \Rightarrow 4,350%Relazioni intime6,8 \Rightarrow 270,6%Vergogna8 \Rightarrow 275%





Acne Radar: il nuovo approccio per la valutazione psicosociale del paziente acneico



- Acne lieve/intermedia a prevalente componente infiammatoria
- Può essere associato a trattamenti farmacologici antiacne topici e sistemici, come ad esempio i retinoidi topici

TUBO AIRLESS CON EROGATORE PREDOSATO

- Non dà secchezza o irritazioni alla cute
- Non Comedogenico
- Non Fotosensibilizzante



Modo d'uso: 1-2 volte al giorno,

secondo necessità



Trattamento coadiuvante per la cute acneica

- Acne lieve/intermedia a prevalente componente infiammatoria
- Può essere associato a trattamenti farmacologici antiacne topici e sistemici, come ad esempio i retinoidi topici



30 ml Coadiuvante Dermocosmetico Modo d'uso: 1-2 volte al giorno, secondo necessità



Diakon Tau

Detergente medicato a base di Acil-taurati e Argento Citrato

200 ml Modo d'uso: 2 volte al giorno

