

G3-22





吕群 23

有机化学整理

No.

DATE / /




一、诱导效应 (极性/电负性)



二、共轭效应

形成大π键使体系的能量降低, 分子更稳定


例:




三、反应类型

1. 取代反应


(1) 自由基取代




* 扩展: 烯烃、炔烃、酮、羧酸等分子中烷基部分也可发生自由基取代, 其中与官能团直接相连的碳原子(α-C)上最易发生反应




(2) 离子型 (极性) 取代



例 2:



例 3:

















来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器




扫描快速下载到智能设备









酯基位于双键的原因: C=O 吸电子




双键位于酯基的原因: $\text{C}=\text{O}^-$ 会被还原



NaHCO_3 作用: 提供碱性环境; 吸收生成的 HBr, 增大产率















1,2-加成

1,4-加成

竞争反应, 取决于反应条件











(羰基/邻二醇的保护)







No.

DATE / /

酸性过强会出现 CH_3NH_3^+ , 不易反应

3. 消去反应



来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器




扫描快速下载识别设备

G3-22








吕滕 23

No.


DATE / /





4. 氧化反应



(选择性氧化)



5. 还原反应 (催化加氢反应也是还原反应!!!)



来自 扫描全能王免费版



手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载识别设备

No.

DATE / /



来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载智能设备