

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតយភូមិ
សម័យប្រឡង: ២០ សីហា ២០១៨
វិទ្យាសា : គណិតវិទ្យា(ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
រយៈពេល : ១៥០ នាទី ពិន្ទុ : ១២៥
ប្រធាន

- I. ក្នុងចងមួយមានឃ្លីពណ៌សចំនួន ២ ឃ្លីពណ៌ក្រហមចំនួន ៤ និងឃ្លីពណ៌ខៀវចំនួន ៤ ។ គេចាប់យកឃ្លី ៣ ព្រមគ្នាដោយចៃដន្យ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ ៖
- A : “ឃ្លីទាំង ៣ មានពណ៌ក្រហម ”
- B : “ យ៉ាងតិចមានឃ្លី ២ មានពណ៌ខៀវ ”
- C : “ ឃ្លីទាំង ៣ មានពណ៌ខុសៗគ្នា ” ។

II. គណនាលីមីត

ក. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2(x-2) + x^2 + x - 1}{1-x}$

ខ. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2x}{\sin 3x}$

គ. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sin x - \sqrt{3} \cos x}{2(\pi - 3x)}$ ។

III. គេមានចំនួនកុំផ្លិច $Z_1 = 3 + 3i\sqrt{3}$ និង

$Z_2 = \sqrt{3} + i$ ។

ក. គណនា $Z_1 \times Z_2$ និង $\frac{Z_1}{Z_2}$

ខ. សរសេរ $Z_1 \times Z_2$ និង $\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)^2$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

គ. សរសេរ $\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)^3$ ជាទម្រង់ពិជគណិត។

IV. គណនាអាំងតេក្រាល

$I = \int_1^2 (2-x+x^2)dx$

$J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left[\cos 2x - \frac{1}{2} \cos 4x \right] dx$

$K = \int_2^3 \left(3x - 2 + \frac{1}{x-1} \right) dx$ ។

- V. ក. ក្នុងលំហប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេមានចំណុច $A(1, 2, 3)$, $B(3, 0, 1)$, $C(-1, 0, 1)$ និង $D(2, 1, 2)$ ។
- ខ. រកវ៉ិចទ័រ $\vec{AB}$, $\vec{AC}$, $\vec{AD}$, $\vec{BC}$
២. បង្ហាញថាចំណុច A , B និង C មិននៅលើបន្ទាត់តែមួយ។
៣. បង្ហាញថាវ៉ិចទ័រ $\vec{h}(0, 1, -1)$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ទៅនឹងប្លង់ ABC ។
- ខ. គេមានសមីការ $(2x+3y)^2 = 12(xy+3)$ ។ បង្ហាញថាសមីការនេះជាសមីការអេលីប៊ីប។ រកប្រវែងអ័ក្សតូច អ័ក្សធំ កូអរដោនេនៃកំពូលទាំងពីរ និងសង់អេលីប៊ីបនេះ។

VI. ក. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល

(E) : $y'' + 4y' = 5y$

- ខ. រកចម្លើយពិសេសមួយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E) បើគេដឹងថាក្រាប C នៃអនុគមន៍ចម្លើយនេះកាត់តាមចំណុច $(0, 3)$ ហើយបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងក្រាប C ត្រង់ចំណុចនេះមានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើ -3 ។

VII. គេមានអនុគមន៍ f កំណត់លើ $(1, +\infty)$ ដោយ

$f(x) = -x + 4 \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$ ។ គេតាងដោយ C

ក្រាបរបស់វានៅក្នុងប្លង់ប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O, \vec{i}, \vec{j})$ ។

ក. គណនាលីមីតនៃ f ត្រង់ ១ និងត្រង់ $+\infty$ ។

- ខ. ស្រាយបំភ្លឺថានៅលើ $(1, +\infty)$ គេបានដេរីវេនៃអនុគមន៍ f គឺ $f'(x) = \frac{-(x^2+1)}{(x+1)(x-1)}$ ។ សិក្សាអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f និងសង់តារាងអថេរនៃ f លើ $(1, +\infty)$ ។

គ. ១. បង្ហាញថាបន្ទាត់ d_1 ដែលមានសមីការ
 $y = -x + 4$ អាស៊ីមតូតទៅនឹងក្រាប C ត្រង់
 $+\infty$ ។

២. បង្ហាញថាចំពោះគ្រប់ x លើ $(1, +\infty)$;
 $\frac{x+1}{x-1} > 1$ និងទាញយកការប្រៀបធៀបទីតាំងនៃ C
 ធៀបនឹង d_1 ។

ឃ. កំណត់កូអរដោនេនៃចំណុចនៅលើ C ដែល
 បន្ទាត់ប៉ះ d_2 ទៅនឹងក្រាប C ត្រង់ចំណុចនេះមាន
 មេគុណប្រាប់ទិសស្មើ $-\frac{5}{3}$ និងសរសេរសមីការនៃ
 បន្ទាត់ប៉ះ d_2 នេះ។

ង. សង់ក្រាប C អាស៊ីមតូត d_1 និងបន្ទាត់ប៉ះ d_2 ។
 ប្រើតម្លៃប្រហែល $\ln 3 = 1.1$ និងក្រាប C កាត់អ័ក្ស
 អាបស៊ីសត្រង់ចំណុច $(4.5, 0)$ ។

កំណត់ត្រា

I. រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍

• A : “ឃ្លីទាំង 3 មានពណ៌ក្រហម”

- ចំនួនករណីអាច៖

$$\begin{aligned} n(S) &= C(10, 3) = \frac{10!}{7!3!} \\ &= \frac{7!8 \cdot 9 \cdot 10}{7!1 \cdot 2 \cdot 3} = 4 \times 3 \times 10 = 120 \end{aligned}$$

- ចំនួនករណីស្រប៖

$$n(A) = C(4, 3) = \frac{4!}{1!3!} = 4$$

- ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ A ៖

$$\text{គេបាន } P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{4}{4 \cdot 3 \cdot 10} = \frac{1}{30}$$

$$\text{ដូច្នេះ } P(A) = \frac{1}{30} \text{ ។}$$

• B : “យ៉ាងតិចមានឃ្លី 2 មានពណ៌ខៀវ”

- ចំនួនករណីស្រប៖

$$\begin{aligned} n(B) &= C(4, 2) \times C(6, 1) + C(4, 3) \\ &= \frac{4!}{2!2!} \times 6 + \frac{4!}{1!3!} \\ &= \frac{2!3 \cdot 4}{2!1 \cdot 2} \times 6 + 4 = 40 \end{aligned}$$

- ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ B ៖

$$\text{គេបាន } P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{40}{120} = \frac{1}{3}$$

$$\text{ដូច្នេះ } P(B) = \frac{1}{3} \text{ ។}$$

• C : “ឃ្លីទាំង 3 មានពណ៌ខុសៗគ្នា”

- ចំនួនករណីស្រប៖

$$\begin{aligned} n(C) &= C(2, 1) \times C(4, 1) \times C(4, 1) \\ &= 2 \times 4 \times 4 = 32 \end{aligned}$$

- ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ C ៖

$$\text{គេបាន } P(C) = \frac{n(C)}{n(S)} = \frac{2 \times 4 \times 4}{4 \times 3 \times 10} = \frac{4}{15}$$

$$\text{ដូច្នេះ } P(C) = \frac{4}{15} \text{ ។}$$

II. គណនាលីមីត

$$\text{ក. } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2(x-2) + x^2 + x - 1}{1-x} \text{ រាង } \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - x^2 + x - 1}{1-x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x^2 + 1)}{-(x-1)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 1}{-1} = 2$$

$$\text{ដូច្នេះ } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2(x-2) + x^2 + x - 1}{1-x} = 2 \text{ ។}$$

$$\text{ខ. } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2x}{\sin 3x} \text{ រាងមិនកំណត់ } \frac{0}{0}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2x}{\frac{\sin 3x}{3x} \times 3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2}{\frac{\sin 3x}{3x} \times 3}$$

$$= \frac{-2}{1 \times 3} = -\frac{2}{3}$$

$$\text{ដូច្នេះ } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2x}{\sin 3x} = -\frac{2}{3} \text{ ។}$$

$$\text{គ. } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sin x - \sqrt{3} \cos x}{2(\pi - 3x)} \text{ រាងមិនកំណត់ } \frac{0}{0}$$

របៀបទី១

$$(\text{តាង } u = \frac{\pi}{3} - x \Rightarrow x = \frac{\pi}{3} - u; \text{ ដែល}$$

$$x \rightarrow \frac{\pi}{3} \Rightarrow u \rightarrow 0)$$

$$= \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin\left(\frac{\pi}{3} - u\right) - \sqrt{3} \cos\left(\frac{\pi}{3} - u\right)}{6u}$$

$$= \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{\pi}{3} \cos u - \sin u \cos \frac{\pi}{3} - \sqrt{3} \left(\cos \frac{\pi}{3} \cos u + \sin \frac{\pi}{3} \sin u \right)}{6u}$$

$$= \lim_{u \rightarrow 0} \frac{-2 \sin u}{6u} = -\frac{1}{3} \quad \gamma$$

របៀបទី២

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sin x - \sqrt{3} \cos x}{2(\pi - 3x)} \quad \text{រាង} \quad \frac{0}{0}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{-2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos x - \frac{1}{2} \sin x \right)}{2 \times 3 \left(\frac{\pi}{3} - x \right)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{-\sin \left(\frac{\pi}{3} - x \right)}{3 \left(\frac{\pi}{3} - x \right)} = -\frac{1}{3}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-\sin t}{3t}$$

$$\text{តាង } t = \frac{\pi}{3} - x, x \rightarrow \frac{\pi}{3} \Rightarrow t \rightarrow 0$$

$$= -\frac{1}{3} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = -\frac{1}{3} \times 1 = -\frac{1}{3}$$

$$\text{ដូច្នេះ: } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sin x - \sqrt{3} \cos x}{2(\pi - 3x)} = -\frac{1}{3}$$

III. គេមាន $Z_1 = 3 + 3i\sqrt{3}$; $Z_2 = \sqrt{3} + i$ ក. គណនា $Z_1 \times Z_2$ និង $\frac{Z_1}{Z_2}$

$$Z_1 \times Z_2 = (3 + 3i\sqrt{3})(\sqrt{3} + i)$$

$$= 3\sqrt{3} + 3i + 9i + 3\sqrt{3}i^2 = 12i$$

$$\text{ដូច្នេះ: } Z_1 \times Z_2 = 12i \quad \gamma$$

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{3 + 3i\sqrt{3}}{\sqrt{3} + i} = \frac{(3 + 3\sqrt{3}i)(\sqrt{3} - i)}{\sqrt{3}^2 - i^2}$$

$$\text{ដូច្នេះ: } \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i \quad \gamma$$

ខ. សរសេរ $Z_1 \times Z_2$ និង $\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)^2$ ជាទម្រង់ត្រីកោណ

$$Z_1 \times Z_2 = 12i = 12(0 + i)$$

$$\text{ដូច្នេះ: } Z_1 \times Z_2 = 12 \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right) \quad \gamma$$

$$\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)^2 = \left[3 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \right) \right]^2$$

$$= \left[3 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) \right]^2$$

$$\text{ដូច្នេះ: } \left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)^2 = 9 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) \quad \gamma$$

គ. សរសេរ $\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)^3$ ជាទម្រង់ត្រីកោណ

$$\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)^3 = \left[3 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) \right]^3$$

$$= 27 \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right) = 27(0 + i)$$

$$\text{ដូច្នេះ: } \left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)^3 = 0 + 27i \quad \gamma$$

IV. គណនាអាំងតេក្រាល

$$I = \int_1^2 (2 - x + x^2) dx = \left[2x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} \right]_1^2$$

$$= \left(4 - 2 + \frac{8}{3} \right) - \left(2 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) = \frac{17}{6}$$

$$\text{ដូច្នេះ: } I = \frac{17}{6} \quad \gamma$$

$$J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\cos 2x - \frac{1}{2} \cos 4x \right) dx$$

$$= \left[\frac{1}{2} \sin 2x - \frac{1}{8} \sin 4x \right]_0^{\frac{\pi}{4}}$$

$$= \left(\frac{1}{2} \sin \frac{\pi}{2} - \frac{1}{8} \sin \pi \right) - \left(\frac{1}{2} \sin 0 - \frac{1}{8} \sin 0 \right)$$

$$\text{ដូច្នេះ: } J = \frac{1}{2} \quad \gamma$$

$$K = \int_2^3 \left(3x - 2 + \frac{1}{x-1} \right) dx$$

$$= \left[3\frac{x^2}{2} - 2x + \ln|x-1| \right]_2^3$$

$$= \left(\frac{27}{2} - 6 + \ln 2 \right) - (6 - 4 + \ln 1)$$

$$\text{ដូច្នេះ: } K = \left(\frac{11}{2} + \ln 2 \right) \quad \gamma$$

V. ក. $A(1, 2, 3)$, $B(3, 0, 1)$, $C(-1, 0, 1)$

$D(2, 1, 2)$

១. រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{BC}$

$$\overrightarrow{AB} = (3-1, 0-2, 1-3)$$

$$\text{ដូច្នេះ } \overrightarrow{AB} = (2, -2, -2)$$

$$\overrightarrow{AC} = (-1-1, 0-2, 1-3)$$

$$\text{ដូច្នេះ } \overrightarrow{AC} = (-2, -2, -2)$$

$$\overrightarrow{AD} = (2-1, 1-2, 2-3)$$

$$\text{ដូច្នេះ } \overrightarrow{AD} = (1, -1, -1)$$

$$\overrightarrow{BC} = (-1-3, 0-0, 1-1)$$

$$\text{ដូច្នេះ } \overrightarrow{BC} = (-4, 0, 0) \text{ ។}$$

២. បង្ហាញថាចំណុច A, B, C មិននៅលើបន្ទាត់តែ

មួយ លុះត្រាតែ $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} \neq \vec{0}$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & -2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} -2 & -2 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} \vec{k} \\ &= (4-4)\vec{i} - (-4-4)\vec{j} + (-4-4)\vec{k} \\ &= 0\vec{i} + 8\vec{j} - 8\vec{k} \neq \vec{0} \end{aligned}$$

ដូច្នេះចំណុច A, B, C មិននៅលើបន្ទាត់តែមួយ។

៣. បង្ហាញថាវ៉ិចទ័រ $\vec{n} = (0, 1, -1)$ ជាវ៉ិចទ័រ

ណរម៉ាល់នៃប្លង់ ABC

របៀបទី១ ៖ ប្លង់ ABC មានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (0, 8, -8) = 8(0, 1, -1)$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = 8 \cdot \vec{n}$$

$$\Rightarrow \text{វ៉ិចទ័រ } \vec{n} \text{ និង } (\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}) \text{ កូលីនេអ៊ែគ្នា}$$

ដូច្នេះវ៉ិចទ័រ $\vec{n}$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ ABC ។

របៀបទី២ ៖

$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = (0)(2) + (1)(-2) + (-1)(-2) = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{AC} = (0)(-2) + (1)(-2) + (-1)(-2) = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \vec{n} \perp \overrightarrow{AB} \\ \vec{n} \perp \overrightarrow{AC} \end{cases} \Rightarrow \vec{n} \perp ABC$$

ដូច្នេះ $\vec{n}$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ ABC ។

ខ. សមីការ $(2x+3y)^2 = 12(xy+3)$

បង្ហាញថាសមីការនេះជាសមីការអេលីប

$$(2x+3y)^2 = 12(xy+3)$$

$$4x^2 + 12xy + 9y^2 = 12xy + 36$$

$$4x^2 + 9y^2 = 36 \Rightarrow \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$$

ជាសមីការអេលីបដែលមានអ័ក្សធំ ជាអ័ក្សដេក

និងផ្ចិតចំគល់តម្រុយ O ។

រកប្រវែងអ័ក្សតូច អ័ក្សធំ កូអរដោនេ កំពូលទាំង


ពីរ និងសង់អេលីប ៖

$$\text{អេលីប ៖ } \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1 \text{ មានរាង}$$

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$

$$\Rightarrow h = 0, k = 0, a = 3, b = 2$$

- អ័ក្សតូច $2b = 2 \times 2 = 4$ ឯកតាប្រវែង
- អ័ក្សធំ $2a = 2 \times 3 = 6$ ឯកតាប្រវែង
- កំពូល $V(h \pm a, k) \Rightarrow V_1(-3, 0), V_2(3, 0)$



VI. ក. ដោះស្រាយ $(E) : y'' + 4y' = 5y$

$$(E) : y'' + 4y' - 5y = 0$$

$$\text{សមីការសម្គាល់ } \lambda^2 + 4\lambda - 5 = 0$$

$$\text{មាន } a+b+c = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 1$$

$$\lambda_2 = \frac{C}{a} = -5$$

គេបានចម្លើយទូទៅ $y = Ae^{\lambda_1 x} + Be^{\lambda_2 x}$

ដូច្នេះ $y = Ae^x + Be^{-5x}$; $A, B \in \mathbb{R}$ ។

ខ. រកចម្លើយពិសេសមួយនៃ (E)

មាន $y = Ae^x + Be^{-5x}$

$$y' = Ae^x - 5Be^{-5x}$$

$$\text{តាមសម្មតិកម្ម} \begin{cases} y(0) = 3 \\ y'(0) = -3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A+B = 3 \\ A-5B = -3 \end{cases} \Rightarrow A = 2 ; B = 1$$

ដូច្នេះចម្លើយពិសេស $y = 2e^x + e^{-5x}$ ។

VII. $C : y = f(x) = -x + 4 + \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$; $x > 1$

ក. គណនាលីមីត f ត្រង់ $x = 1$ និង $+\infty$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \left[-x + 4 + \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1^+} (-x + 4) + \ln\left(\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x+1}{x-1}\right)$$

តែបើ $x \rightarrow 1^+$ នោះ $\left(\frac{x+1}{x-1}\right) \rightarrow +\infty$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[-x + 4 + \ln\left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{x-1}\right) \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} (-x + 4) + \ln\left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{1}{x}}{1 - \frac{1}{x}}\right) = -\infty$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

ខ. ស្រាយបំភ្លឺថា $f'(x) = \frac{-(x^2+1)}{(x+1)(x-1)}$ នៅលើ $(1, +\infty)$ សិក្សាអថេរភាពនៃ f និងសង់តារាង

អថេរភាពនៃ f លើ $(1, +\infty)$

$$f'(x) = [-x + 4 + \ln(x+1) - \ln(x-1)]'$$

$$= -1 + \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x-1}$$

$$= \frac{-(x^2-1) + (x-1) - (x+1)}{(x+1)(x-1)}$$

$$f'(x) = \frac{-(x^2+1)}{(x+1)(x-1)} \text{ គ្រប់ } x \in (1, +\infty)$$

គេបាន $f'(x) < 0$ ដូច្នេះ $f(x)$ ជាអនុគមន៍ចុះដាច់ខាតលើ $(1, +\infty)$ ។

តារាងអថេរភាពនៃ $f(x)$

x	1	$+\infty$
$f'(x)$		-
$f(x)$	$+\infty$	$-\infty$

គ. ១. បង្ហាញថា d_1 ; $y = -x + 4$ ជាអាស៊ីមតូតទៅនឹងក្រាប C ត្រង់ $+\infty$: $y_C - y_{d_1} = \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$

$$\text{គេបាន } \lim_{x \rightarrow +\infty} (y_C - y_{d_1}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left[\frac{x\left(1 + \frac{1}{x}\right)}{x\left(1 - \frac{1}{x}\right)} \right] = \ln \left[\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{x}\right)}{\left(1 - \frac{1}{x}\right)} \right]$$

$$= \ln 1 = 0$$

(ព្រោះបើ $x \rightarrow +\infty$ នោះ $\frac{1}{x} \rightarrow 0$) ។

ដូច្នេះបន្ទាត់ $d_1 : y = -x + 4$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ

C ខាង $+\infty$ ។

២. បង្ហាញថាគ្រប់ $x \in (1, +\infty)$; $\frac{x+1}{x-1} > 1$

និងទាញយកការប្រៀបធៀបទីតាំងនៃ C ធៀប

នឹង d_1

$$\frac{x+1}{x-1} - 1 = \frac{x+1-x-1}{x-1} = \frac{2}{x-1} > 0$$

$$\Rightarrow \frac{x+1}{x-1} > 1 \text{ គ្រប់ } x \in (1 ; +\infty)$$

$$\text{មាន } \frac{x+1}{x-1} > 1 \Rightarrow \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) > \ln 1$$

$$\Rightarrow y_C - y_{d_1} > 0 \Rightarrow y_C > y_{d_1}$$

ដូច្នេះ C នៅពីខាងលើ d_1 គ្រប់ $x \in (1, +\infty)$ ។

ឃ. កំណត់កូអរដោនេនៃចំណុចនៅលើ C ដែល

បន្ទាត់ប៉ះ d_2 ប៉ះក្រាប C ត្រង់ចំណុចនេះមានមេគុណ

ប្រាប់ទិសស្មើ $-\frac{5}{3}$ និងសរសេរសមីការបន្ទាត់ d_2

នេះ

- យកចំណុច (x_0, y_0) ជាចំណុចប៉ះនេះ

$$f'(x_0) = -\frac{5}{3} \Rightarrow \frac{-(x_0^2 + 1)}{(x_0 + 1)(x_0 - 1)} = -\frac{5}{3}$$

$$\Rightarrow 3x_0^2 + 3 = 5x_0^2 - 5$$

$$\Rightarrow 2x_0^2 = 8 \Rightarrow x_0^2 = 4 \Rightarrow x_0 = \pm 2$$

$$\text{តែ } x \in (1, +\infty) \Rightarrow x_0 = 2$$

$$\text{រក } y_0 \text{ ចំពោះ } x_0 = 2$$

$$\text{បើ } x_0 = 2 \Rightarrow y_0 = -2 + 4 + \ln 3 = 2 + \ln 3$$

ដូច្នេះចំណុចប៉ះគឺ $(2, 2 + \ln 3)$ ។

- បន្ទាត់ប៉ះ $d_2: y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$

$$\Rightarrow y - (2 + \ln 3) = -\frac{5}{3}(x - 2)$$

$$\Rightarrow y = -\frac{5}{3}x + \frac{10}{3} + 2 + \ln 3$$

$$\text{ដូច្នេះ } d_2: y = -\frac{5}{3}x + \frac{16}{3} + \ln 3$$

ង. សង់ C, d_1, d_2 ដោយប្រើ $\ln 3 = 1.1$ និង C

កាត់អ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រង់ $(4.5, 0)$

- ដោយ $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$ នោះបន្ទាត់ $x = 1$ ជាអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប C ។

- តារាងតម្លៃលេខជំនួយ

x	2	4
$d_1: y$	2	0
x	2	3
$d_2: y$	3.1	1.43
x	2	4.5
$(C): y$	3.1	0

