

## ៨. ក្បួនដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់២ ទម្រង់ $ay'' + by' + cy = 0$

ដើម្បីដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលដែលមានទម្រង់  $ay'' + by' + cy = 0$  (E) យើងត្រូវ៖

➤ សរសេរសមីការសម្គាល់  $a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$  រួចដោះស្រាយតាម  $\Delta = b^2 - 4ac$

- ករណី  $\Delta > 0$  សមីការមានឫស២ផ្សេងគ្នាជាចំនួនពិត  $\lambda_1, \lambda_2$   
ចម្លើយទូទៅនៃ (E) គឺ  $y = Ae^{\lambda_1 x} + Be^{\lambda_2 x}$  ដែល  $A, B$  ថេរ។
- ករណី  $\Delta = 0$  សមីការមានឫសឌុប  $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_0$   
ចម្លើយទូទៅនៃ (E) គឺ  $y = (Ax + B)e^{\lambda_0 x}$  ដែល  $A, B$  ថេរ។
- ករណី  $\Delta < 0$  សមីការមានឫសជាចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់គ្នា  $\lambda = \alpha \pm \beta i$   
ចម្លើយទូទៅនៃ (E) គឺ  $y = (A \cos \beta x + B \sin \beta x)e^{\alpha x}$  ដែល  $A, B$  ថេរ។

## ៩. ក្បួនដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់២ ទម្រង់ $ay'' + by' + cy = p(x)$

ដើម្បីដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលដែលមានទម្រង់ (E) :  $ay'' + by' + cy = p(x)$  ដែល  $p(x) \neq 0$  យើងត្រូវ៖

- ☞ រកចម្លើយទូទៅ តាងដោយ  $y_c$  នៃសមីការ  $ay'' + by' + cy = 0$
- ☞ រកចម្លើយពិសេស តាងដោយ  $y_p$  នៃសមីការ  $ay'' + by' + cy = p(x)$
- ☞ គេបានចម្លើយទូទៅនៃ សមីការ(E) គឺ៖  $y = y_c + y_p$

## ១០. របៀបតាងមួយចំនួនដើម្បីរកចម្លើយពិសេស $y_p$

| $P(x)$          | ឫសនៃសមីការសម្គាល់               | $y_p$               |
|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| $ke^{\alpha x}$ | $\lambda \neq \alpha$           | $Ae^{\alpha x}$     |
|                 | $\lambda = \alpha$              | $Axe^{\alpha x}$    |
|                 | $\lambda = \alpha (\Delta = 0)$ | $Ax^2 e^{\alpha x}$ |
| ពហុធានីក្រេទី១  |                                 | $ax + b$            |
| ពហុធានីក្រេទី២  |                                 | $ax^2 + bx + c$     |



|                                                                |                                  |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| $k \cos \beta x$<br>, $k \sin \beta x$                         | $\lambda \neq i\beta$            | $A \cos \beta x + B \sin \beta x$                                    |
|                                                                | $\lambda = i\beta$               | $x(A \cos \beta x + B \sin \beta x)$                                 |
| $ke^{\alpha x} \cos \beta x$<br>, $ke^{\alpha x} \sin \beta x$ | $\lambda \neq \alpha \pm i\beta$ | $e^{\alpha x}(A \cos \beta x + B \sin \beta x)$                      |
|                                                                | $\lambda = \alpha \pm i\beta$    | $xe^{\alpha x}(A \cos \beta x + B \sin \beta x)$                     |
| $kx^n e^{\alpha x}$                                            | $\lambda \neq \alpha$            | $e^{\lambda x}(A_n x^n + A_{n-1} x^{n-1} + \dots + A_1 x + A_0)$     |
|                                                                | $\lambda = \alpha$               | $xe^{\lambda x}(A_n x^n + A_{n-1} x^{n-1} + \dots + A_1 x + A_0)$    |
|                                                                | $\lambda = \alpha (\Delta = 0)$  | $x^2 e^{\lambda x}(A_n x^n + A_{n-1} x^{n-1} + \dots + A_1 x + A_0)$ |



## ១. លក្ខណៈរបស់កូអរដោនេ

បើ  $A(x_A, y_A, z_A)$  និង  $B(x_B, y_B, z_B)$  ជាពីរចំណុចក្នុងលំហ គេបាន

- $A = B \Leftrightarrow x_A = x_B, y_A = y_B, z_A = z_B$
- $A \neq B \Leftrightarrow x_A \neq x_B, y_A \neq y_B, z_A \neq z_B$
- $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A)$
- កូអរដោនេចំណុចកណ្តាល  $I_{AB} \left( \frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}, \frac{z_A + z_B}{2} \right)$

បើ  $\vec{u} = (x, y, z)$  និង  $\vec{v} = (x', y', z')$  ជាពីរវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ គេបាន

- $\vec{u} = \vec{v} \Leftrightarrow x = x', y = y', z = z'$
- $\vec{u} + \vec{v} = (x + x', y + y', z + z')$
- $\vec{u} - \vec{v} = (x - x', y - y', z - z')$
- $\forall k \in \mathbb{R}, k\vec{u} = (kx, ky, kz)$

## ២. ណាមនៃវ៉ិចទ័រ

គេមាន  $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A)$

ណាមនៃវ៉ិចទ័រ  $\overrightarrow{AB}$  កំណត់ដោយ

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$

ករណី  $\vec{u} = (x, y, z)$  នោះ  $|\vec{u}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

## ៣. ផលគុណស្កាលែនៃពីរវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ

គេមាន  $\vec{u}$  និង  $\vec{v}$  ជាពីរវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ នោះ  $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cos \theta$

ដែល  $\theta$  ជាមុំធ្លាក់ឡើងដោយ  $\vec{u}$  និង  $\vec{v}$  ។



#### ៤. ផលគុណស្កាលែនៃពីរវ៉ិចទ័រក្នុងគោលអរតូណរម៉ាល់

គេមាន  $\vec{u} = (x, y, z)$  និង  $\vec{v} = (x', y', z')$  នោះ

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$$

វ៉ិចទ័រពីរស្របគ្នា  $\vec{u} \parallel \vec{v} \Leftrightarrow \frac{x}{x'} = \frac{y}{y'} = \frac{z}{z'} \quad (\text{កូលីនេអ៊ែរ})$

វ៉ិចទ័រពីរកែងគ្នា  $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow xx' + yy' + zz' = 0 \quad (\text{អរតូកូណាល់})$

#### ៥. ផលគុណខ្វែងនៃ២វ៉ិចទ័រ


ផលគុណខ្វែងនៃពីរវ៉ិចទ័រ  $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$  និង  $\vec{v} = x'\vec{i} + y'\vec{j} + z'\vec{k}$  កំណត់ដោយរូបមន្ត

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x & y & z \\ x' & y' & z' \end{vmatrix} = (yz' - zy')\vec{i} - (xz' - zx')\vec{j} + (xy' - yx')\vec{k}$$

ផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាម  
ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ

$$S = \|\vec{u} \times \vec{v}\|$$

$$S = \frac{1}{2} \|\vec{u} \times \vec{v}\|$$



#### ៦. ផលគុណចម្រុះនៃ៣វ៉ិចទ័រ

គេមាន  $\vec{u} = (x_1, y_1, z_1)$ ,  $\vec{v} = (x_2, y_2, z_2)$  និង  $\vec{w} = (x_3, y_3, z_3)$

ផលគុណចម្រុះកំណត់ដោយ  $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$

$$\Rightarrow \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \begin{vmatrix} x_1 & y_2 & z_2 \\ y_3 & z_3 & x_3 \end{vmatrix} - y_1 \begin{vmatrix} x_2 & z_2 \\ x_3 & z_3 \end{vmatrix} + z_1 \begin{vmatrix} x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \end{vmatrix}$$



### ៧. រូបមន្តមាឌសំខាន់ៗ

មាឌប្រលេពីប៉ែត  $V = |\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})|$

មាឌពីរ៉ាមីតដែលមានបាតជាប្រលេឡូក្រាម  $V = \frac{1}{3} |\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})|$

មាឌចតុមុខ  $V = \frac{1}{6} |\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})|$  (តេត្រាអែត ពីរ៉ាមីតនិយ័ត ចតុមុខ)

### ៨. សមីការប៉ារ៉ាម៉ែតនៃបន្ទាត់

គេមានបន្ទាត់( $L$ ) កាត់តាមចំណុច  $P(x_0, y_0, z_0)$  និងមានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស  $\vec{u} = (a, b, c)$  នោះសមីការប៉ារ៉ាម៉ែតនៃបន្ទាត់( $L$ ) កំណត់ដោយ

$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases} ; (t \in \mathbb{R})$$

### ៩. សមីការឆ្លុះ

បើ  $a$ ,  $b$  និង  $c$  ខុសពីសូន្យនោះសមីការឆ្លុះនៃបន្ទាត់កំណត់ដោយ

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$$

### ១០. សមីការស្តង់ដារនៃប្លង់

សមីការប្លង់ដែលកាត់តាមចំណុច  $P(x_0, y_0, z_0)$  និងមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់  $\vec{n} = (a, b, c)$  កំណត់ដោយរូបមន្ត៖

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

### ១១. សមីការទូទៅនៃប្លង់

សមីការទូទៅនៃប្លង់បានមកពីការពន្លាតនៃទម្រង់ស្តង់ដារនៃប្លង់ កំណត់ដោយ

រូបមន្ត៖  $ax + by + cz + d = 0$



១២. មុំរវាងប្លង់ពីរ  $(\alpha_1)$  និង  $(\alpha_2)$  កំណត់ដោយរូបមន្ត៖

$$\cos \theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|}$$

ដែល  $\vec{n}_1$  ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់របស់ប្លង់  $\alpha_1$  និង  $\vec{n}_2$  ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់របស់ប្លង់  $(\alpha_2)$

១៣. ចម្ងាយរវាងពីចំណុចក្នុងលំហ

ចម្ងាយរវាងពីចំណុច  $A(x_A, y_A, z_A)$  និង  $B(x_B, y_B, z_B)$  កំណត់ដោយរូបមន្ត៖

$$d = AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$

១៤. សមីការស្វ័យនៃស្វី

ស្វីដែលមានផ្ចិត  $I(x_o, y_o, z_o)$  និងកាំ  $r$  កំណត់ដោយរូបមន្ត៖

$$(S): (x - x_o)^2 + (y - y_o)^2 + (z - z_o)^2 = r^2$$

១៥. សមីការទូទៅនៃស្វី

បានមកពីការពន្លាតសមីការស្វ័យជាកំណត់ដោយ៖

$$(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2xx_o - 2yy_o - 2zz_o + k = 0$$

(ដែល  $k = x_o^2 + y_o^2 + z_o^2 - r^2$ ) ។

១៦. ចម្ងាយពីចំណុចមួយ ទៅប្លង់មួយ

ចម្ងាយពីចំណុច  $A(x_o, y_o, z_o)$  ទៅប្លង់  $(P): ax + by + cz + d = 0$  កំណត់រូបមន្ត៖


$$D[A, (P)] = \frac{|ax_o + by_o + cz_o + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

១៧. ចម្ងាយរវាងប្លង់ស្របគ្នា

ដើម្បីរកចម្ងាយរវាងប្លង់ពីរស្របគ្នា មុនដំបូងគេត្រូវជ្រើសរើសចំណុច  $(x_o, y_o, z_o)$  នៅក្នុងប្លង់ទី១ដោយឲ្យ  $y = 0, z = 0$  បន្ទាប់មកយើងត្រូវកំណត់មេគុណ  $a, b, c, d$  នៅក្នុងប្លង់ទី២ បន្ទាប់មកប្រើរូបមន្តខាងលើដដែល។




# ១៨. ក្បួនបង្ហាញប្រភេទរូបធរណីមាត្រក្នុងមេរៀនទីបីក្នុងលំហ




$ABCD$  ជាប្រលេឡូក្រាម

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \text{ ឬ } \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$$




$ABCD$  ជាចតុកោណកែង

$$\begin{cases} \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \\ \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 0 \end{cases}$$




$ABCD$  ជាការ៉េ

$$\begin{cases} \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 0 \\ |\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{BC}| = |\overrightarrow{DC}| = |\overrightarrow{AD}| \end{cases}$$




$ABCD$  ជាចតុកោណស្មើ

$$\begin{cases} \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} \neq 0 \\ |\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{BC}| = |\overrightarrow{DC}| = |\overrightarrow{AD}| \end{cases}$$




ត្រីកោណសាមញ្ញ

$$|\overrightarrow{AB}| \neq |\overrightarrow{AC}| \neq |\overrightarrow{BC}|$$




ត្រីកោណកែង

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$$




ត្រីកោណសម័ង្ស

$$|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AC}| = |\overrightarrow{BC}|$$



ត្រីកោណសមបាត

$$|\overrightarrow{AC}| = |\overrightarrow{BC}|$$



ត្រីកោណកែងសមបាត

$$\begin{cases} |\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AC}| \\ \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \end{cases}$$



## I. ប៉ារ៉ាបូល

### ១. និយមន័យ ប៉ារ៉ាបូល៖

ប៉ារ៉ាបូល ជាសំណុំចំណុចក្នុងប្លង់ដែលមានចម្ងាយស្មើគ្នាពីចំណុចនឹង  $F$  មួយនិងបន្ទាត់នឹង  $\Delta$  មួយនៅក្នុងប្លង់នោះ។ ចំណុចនឹង  $F$  ហៅថាកំណុំ និងបន្ទាត់នឹង  $\Delta$  ហៅថាបន្ទាត់ប្រាប់ទិស ។

### ២. លក្ខណៈនៃប៉ារ៉ាបូល៖

- បន្ទាត់ដែលកាត់តាមកំណុំ  $F$  ហើយកែងនឹងបន្ទាត់ប្រាប់ទិស  $\Delta$  ហៅថា អ័ក្សឆ្លុះ
- ចំណុច  $V$  ដែលស្ថិតនៅលើអ័ក្សឆ្លុះ និងជាចំណុចកណ្តាលដែលភ្ជាប់ពីកំណុំ  $F$  ទៅបន្ទាត់ប្រាប់ទិស  $\Delta$  ហៅថាកំពូល ។

### ៣. សមីការស្តង់ដារនៃប៉ារ៉ាបូលដែលមានកំពូលជាគល់តម្រុយ

| កំពូល   | កំណុំ   | បន្ទាត់ប្រាប់ទិស | សមីការស្តង់ដារ | ពណ៌នា                                                                                                                                                                                                               |
|---------|---------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $(0,0)$ | $(p,0)$ | $x = -p$         | $y^2 = 4px$    | <ul style="list-style-type: none"> <li>អ័ក្សឆ្លុះជាអ័ក្សអាប់ស៊ីស</li> <li><math>P &gt; 0</math> បែរភាពផតទៅរកទិស <math>x &gt; 0</math></li> <li><math>P &lt; 0</math> បែរភាពផតទៅទិស <math>x &lt; 0</math></li> </ul> |
| $(0,0)$ | $(0,p)$ | $y = -p$         | $x^2 = 4py$    | <ul style="list-style-type: none"> <li>អ័ក្សឆ្លុះជាអ័ក្សអរដោនេ</li> <li><math>P &gt; 0</math> បែរភាពផតទៅរកទិស <math>y &gt; 0</math></li> <li><math>P &lt; 0</math> បែរភាពផតទៅទិស <math>y &lt; 0</math></li> </ul>   |

### ៤. សមីការស្តង់ដារនៃប៉ារ៉ាបូលដែលមានកំពូលខុសពីគល់តម្រុយ

| កំពូល   | កំណុំ     | បន្ទាត់ប្រាប់ទិស | សមីការស្តង់ដារ      | ពណ៌នា                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-----------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $(h,k)$ | $(h+p,k)$ | $x = h-p$        | $(y-k)^2 = 4p(x-h)$ | <ul style="list-style-type: none"> <li>អ័ក្សឆ្លុះជាអ័ក្សអាប់ស៊ីស</li> <li><math>p &gt; 0</math> បែរភាពផតទៅទិស <math>x &gt; 0</math></li> <li><math>P &lt; 0</math> បែរភាពផតទៅទិស <math>x &lt; 0</math></li> </ul> |
| $(h,k)$ | $(h,k+p)$ | $y = k-p$        | $(x-h)^2 = 4p(y-k)$ | <ul style="list-style-type: none"> <li>អ័ក្សឆ្លុះជាអ័ក្សអរដោនេ</li> <li><math>P &gt; 0</math> បែរភាពផតទៅទិស <math>y &gt; 0</math></li> <li><math>P &lt; 0</math> បែរភាពផតទៅទិស <math>y &lt; 0</math></li> </ul>   |

**ចាន់ ដារ៉ាវ៉ូ**



## ៥. សមីការទូទៅនៃប៉ារ៉ាបូល

- សមីការទូទៅនៃប៉ារ៉ាបូលដែលមាន អ័ក្សឆ្លុះឈរ  $Ax^2 + Cx + Dy + E = 0$  ,  $A \neq 0$
- សមីការទូទៅនៃប៉ារ៉ាបូលដែលមាន អ័ក្សឆ្លុះដេក  $By^2 + Cx + Dy + E = 0$  ,  $B \neq 0$


## II. អេលីប

### ១. និយមន័យ អេលីប៖

អេលីប ជាសំណុំចំណុចក្នុងប្លង់ដែលមានផលបូកចម្ងាយពីចំណុចនោះ ទៅចំណុចនឹងពីរជាចំនួនថេរ ។

### ២. លក្ខណៈនៃអេលីប៖

- ចំណុច  $V_1$  និង  $V_2$  ហៅថាកំពូល
- ចំណុច  $F_1$  និង  $F_2$  ហៅថាកំណុំ
- អង្កត់  $V_1V_2$  ហៅថា អ័ក្សធំនៃអេលីប
- អង្កត់  $B_1B_2$  ហៅថា អ័ក្សតូចនៃអេលីប
- ចំណុច  $O$  ហៅថា ផ្ចិតនៃអេលីប
- អ័ក្សតូច និងអ័ក្សធំ ហៅថាអ័ក្សឆ្លុះនៃអេលីប
- គេតាង  $V_1V_2 = 2a$  ,  $B_1B_2 = 2b$  ដែល  $a > b > 0$
- ចម្ងាយពីផ្ចិត ទៅកំណុំ កំណត់ដោយ  $c$
- តាមនិយមន័យរបស់អេលីបយើងបានទំនាក់ទំនង  $a^2 = b^2 + c^2$





### ៣. សមីការស្តង់ដារនៃអេលីបដែលមានផ្ចិតជាគល់តម្រុយ

| ផ្ចិត | អ័ក្សធំ    | កំពូល         | កំណុំ         | សមីការស្តង់ដារ                                                   | រាងរបស់អេលីប                                                                        |
|-------|------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| (0,0) | ជាអ័ក្សដេក | $V(\pm a, 0)$ | $F(\pm c, 0)$ | $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$<br>ដែល $a^2 = b^2 + c^2$ |  |
| (0,0) | ជាអ័ក្សឈរ  | $V(0, \pm a)$ | $F(0, \pm c)$ | $\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$<br>ដែល $a^2 = b^2 + c^2$ |  |

### ៤. សមីការស្តង់ដារនៃអេលីបដែលមានផ្ចិតខុសពីគល់តម្រុយ

| ផ្ចិត | អ័ក្សធំ    | កំពូល           | កំណុំ           | សមីការស្តង់ដារ                                                           | រាងរបស់អេលីប                                                                          |
|-------|------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| (h,k) | ជាអ័ក្សដេក | $V(h \pm a, k)$ | $F(h \pm c, k)$ | $\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$<br>ដែល $a^2 = b^2 + c^2$ |  |
| (h,k) | ជាអ័ក្សឈរ  | $V(h, k \pm a)$ | $F(h, k \pm c)$ | $\frac{(x-h)^2}{b^2} + \frac{(y-k)^2}{a^2} = 1$<br>ដែល $a^2 = b^2 + c^2$ |  |

### ៥. សមីការទូទៅនៃអេលីប

- ☛ សមីការទូទៅ នៃសមីការអេលីប បានមកការពន្លាតទម្រង់ស្តង់ដារ  
សមីការដឺក្រេទី២ មានរាង  $Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0$  ដែល  $A \neq B$  ។
- ☛ ប្រសិនបើ  $A = B$  នោះអេលីប នឹងក្លាយជារង្វង់ មានន័យថាកំណុំទាំងពីរ ត្រួតស៊ីគ្នា។

### ៦. អិចសង់ទ្រីស៊ីតេ

គឺជាផលធៀបរវាង  $c$  (ចម្ងាយពីផ្ចិតទៅកំណុំ) និង  $a$  (ចម្ងាយពីផ្ចិតទៅកំពូល)  
កំណត់ដោយ  $e = \frac{c}{a}$  ដែល  $0 < e < 1$  ។




### III. អ៊ីពែបូល

#### ១. និយមន័យ អ៊ីពែបូល

អ៊ីពែបូល ជាសំណុំចំណុច  $P$  ក្នុងប្លង់ដែលមានផលដករវាង ចម្ងាយពីចំណុច  $P$  នោះ ទៅចំណុចនឹងពីរ  $F_1$  និង  $F_2$  ជាចំនួនថេរ ។

#### ២. លក្ខណៈនៃអ៊ីពែបូល៖

- ចំណុច  $V_1$  និង  $V_2$  ហៅថាកំពូល
- ចំណុច  $F_1$  និង  $F_2$  ហៅថាកំណុំ
- អង្កត់  $F_1F_2$  ហៅថា អ័ក្សទទឹង
- ចំណុច  $O$  កណ្តាលអង្កត់  $F_1F_2$  ហៅថាផ្ចិត នៃអ៊ីពែបូល
- មេដ្យាទ័រនៃអង្កត់  $F_1F_2$  ហៅថាអ័ក្សឆ្លាស់
- គេតាង  $V_1V_2 = 2a$  ដែល  $a > b > 0$
- អ័ក្សទទឹង និងអ័ក្សឆ្លាស់ ហៅថាអ័ក្សឆ្លុះនៃអ៊ីពែបូល
- ទំនាក់ទំនង  $c^2 = a^2 + b^2$  ដែល  $a > 0, b > 0$





### ៣. សមីការស្តង់ដារនៃអ៊ីពែបូលដែលមានផ្ចិតជាគល់តម្រុយ

| ផ្ចិត   | អ័ក្សទទឹង  | កំពូល         | កំណុំ         | សមីការស្តង់ដារ                                                   | អាស៊ីមតូត              |
|---------|------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| $(0,0)$ | ជាអ័ក្សដេក | $V(\pm a, 0)$ | $F(\pm c, 0)$ | $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$<br>ដែល $c^2 = a^2 + b^2$ | $y = \pm \frac{b}{a}x$ |
| $(0,0)$ | ជាអ័ក្សឈរ  | $V(0, \pm a)$ | $F(0, \pm c)$ | $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$<br>ដែល $c^2 = a^2 + b^2$ | $y = \pm \frac{a}{b}x$ |

### ៤. សមីការស្តង់ដារនៃអ៊ីពែបូល ដែលមានផ្ចិតខុសពីគល់តម្រុយ

| ផ្ចិត   | អ័ក្សទទឹង  | កំពូល           | កំណុំ           | សមីការស្តង់ដារ                                                           | អាស៊ីមតូត                    |
|---------|------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| $(h,k)$ | ជាអ័ក្សដេក | $V(h \pm a, k)$ | $F(h \pm c, k)$ | $\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$<br>ដែល $c^2 = a^2 + b^2$ | $y = k \pm \frac{b}{a}(x-h)$ |
| $(h,k)$ | ជាអ័ក្សឈរ  | $V(h, k \pm a)$ | $F(h, k \pm c)$ | $\frac{(y-k)^2}{a^2} - \frac{(x-h)^2}{b^2} = 1$<br>ដែល $c^2 = a^2 + b^2$ | $y = k \pm \frac{a}{b}(x-h)$ |

### ៥. សមីការទូទៅនៃអ៊ីពែបូល

សមីការដឺក្រេទី២មានរាង  $Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0$  ដែល  $A.B < 0$

ជាសមីការទូទៅនៃអ៊ីពែបូល ។

### ៦. អ៊ិចសង់ទ្រីស៊ីតេ $e$

គឺជាផលធៀបរវាង  $c$  (ចម្ងាយពីផ្ចិតទៅកំណុំ) និង  $a$  (ចម្ងាយពីផ្ចិតទៅកំពូល)

នៃអ៊ីពែបូល  $e = \frac{c}{a}$  ។

ចាន់ ដារ៉ុន