PRJNA662018: subtype / parent
Coefficients: natural logit; continuous effects per 1 original MP10 score unit

	Tumor - Normal	T2 - T1	high - low	MP10 continuous	Stage-complete unadjusted	Stage-complete adjusted
GC B	1.5 q=0.39	NE	NE	NE	NE	NE
IFN-stimulated B	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Memory B	-0.032 q=0.99	NE	NE	NE	NE	NE
Naive B	-0.47 q=0.58	NE	NE	NE	NE	NE
Arterial EC	-0.34 q=0.48	NE	NE	NE	NE	NE
Capillary EC	1.8 q=0.12	NE	NE	NE	NE	NE
Cycling EC	2 q=0.12	NE	NE	NE	NE	NE
Lymphatic EC	-0.21 q=0.91	NE	NE	NE	NE	NE
Tip EC	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Venous EC	-2.2 q=0.12	NE	NE	NE	NE	NE
Cycling stromal	2.3 q=0.12	NE	NE	NE	NE	NE
Matrix_CAF	1.4 q=0.29	NE	NE	NE	NE	NE
Pericyte	1.6 q=0.19	NE	NE	NE	NE	NE
SMC	-1.9 q=0.29	NE	NE	NE	NE	NE
dataset_bias_fibro	NE	NE	NE	NE	NE	NE
iCAF	-0.65 q=0.58	NE	NE	NE	NE	NE
iCAF-like	-1.7 q=0.21	NE	NE	NE	NE	NE
rCAF	-0.37 q=0.81	NE	NE	NE	NE	NE
unresolved_fibro	0.62 q=0.39	NE	NE	NE	NE	NE
vCAF	1.1 q=0.32	NE	NE	NE	NE	NE
Mast	NE	NE	NE	NE	NE	NE
C1QC TAM	0.29 q=0.63	NE	NE	NE	NE	NE
Classical Mono	-0.89 q=0.48	NE	NE	NE	NE	NE
Cycling TAM/macrophage	2.1 q=0.047	NE	NE	NE	NE	NE
FOLR2 TAM	0.15 q=0.88	NE	NE	NE	NE	NE
LAMP3 DC	1.7 q=0.12	NE	NE	NE	NE	NE
Neutrophil	-1.8 q=0.23	NE	NE	NE	NE	NE
SPP1 TAM	0.69 q=0.32	NE	NE	NE	NE	NE
cDC1	-0.019 q=0.99	NE	NE	NE	NE	NE
cDC2	0.11 q=0.91	NE	NE	NE	NE	NE
dataset_bias_myeloid	NE	NE	NE	NE	NE	NE
excluded_myeloid	1.7 q=0.22	NE	NE	NE	NE	NE
pDC	-0.98 q=0.32	NE	NE	NE	NE	NE
Plasma	NE	NE	NE	NE	NE	NE
CD4 Helper/Conventional	-0.54 q=0.58	NE	NE	NE	NE	NE
CD4 Naive/Memory-like	-1.1 q=0.29	NE	NE	NE	NE	NE
CD8 Exhausted	0.55 q=0.58	NE	NE	NE	NE	NE
CD8 GZMK/Effector-memory-like	-0.99 q=0.32	NE	NE	NE	NE	NE
CD8 T-like / unresolved	0.7 q=0.53	NE	NE	NE	NE	NE
NK	-0.34 q=0.8	NE	NE	NE	NE	NE
NK / gamma-delta-boundary	0.21 q=0.91	NE	NE	NE	NE	NE
T-cell unresolved	-1.1 q=0.33	NE	NE	NE	NE	NE
Tfh/CXCL13-like	-0.0022 q=1	NE	NE	NE	NE	NE
Treg	0.16 q=0.91	NE	NE	NE	NE	NE
dataset_bias_TNK	1.6 q=0.32	NE	NE	NE	NE	NE

Direction × -log10(q), clipped at ±3
3
2
1
0
−1
−2
−3