Регулярные выражения

1. С помощью методов регулярного выражения заменить все повторяющиеся пробелы в строке на один пробел.

Пример работы:

'Hello World Javascript' → 'Hello World Javascript'

2. Сформировать строку из 5 целых случайных чисел от **1** до **9**, разделенных пробелами. С помощью методов регулярного выражения заменить эти 5 случайных чисел на их квадраты.

Пример работы:

 $57123' \rightarrow 2549149'$

3. Сформировать строку вида 'a+b=x+y=i+j=', в которой a, b, x, y, i, j- произвольные числа. С помощью методов регулярного выражения вставить в строку после знака равенства результаты сложений.

Пример работы:

- **4.** С помощью метода регулярного выражения **test** определить, является ли строка временем в формате '11.59 am', '00.01 pm'.
- **5.** С помощью метода регулярного выражения **test** определить, лежит ли число в диапазоне [1500, 1800].
- **6.** Пусть дана строка, состоящая из нескольких слов. С помощью методов регулярного выражения найти в этой строке только те слова, которые начинаются и заканчиваются на одну и ту же букву.

Пример работы:

'push pop avada kedavra' // нашли pop avada

7. Дана строка, в которой осуществляется вызов функций с произвольными названиями. С помощью методов регулярного выражения найти *названия* этих функций

Пример работы:

'sayHi() checkAge() showMessage()' // нашли sayHi checkAge showMessage

8. С использованием регулярного выражения создать функцию, которая принимает число (оно должно быть >= 1000) и возвращает то же число, у которого разряд тысяч отделен от разряда сотен символом «,».

Пример работы функции: **func(1234)** // 1,234 **func(12345.67)** // 12,345.67 **func(123456)** // 123,456