

一类通过生成函数求线性递推式的方法

sjzez czy

2019.1.22

摘要

在一类低阶卷积递推中，常用方法是多项式开根来优化递推，但在某些特殊情况下，可以实现线性递推来求解，使得时间复杂度变为线性

关键字：卷积、形式幂级数、生成函数、多项式开根

目录

1	定义	3
1.1	卷积	3
1.2	卷积递推	3
1.3	形式幂级数	3
1.3.1	相等	3
1.3.2	加法	3
1.3.3	乘法	3
2	引理	4
2.1	形式幂级数的导数	4
2.2	形式幂级数的二次卷积	4
3	实例	5
3.1	求 $G(x)$	5
3.1.1	初值	5
3.1.2	当 $n = 0$ 时	6
3.1.3	当 $n = 1$ 时	6
3.1.4	当 $n \geq 2$ 时	6
3.2	求 $H(x)$	6
3.2.1	初值	6
3.2.2	当 $n \geq 1$ 时	7
3.3	求 $F(x)$	7
3.3.1	初值	7
3.3.2	当 $n \geq 2$ 时	7
4	其它例子	7
4.1	默慈金数	7
4.2	卡特兰数	7

1 定义

1.1 卷积

对于一个矩阵 $\{a_{n,m}\}$, 定义其 n 阶卷积 $\{c_k\}$ 为:

$$c_k = \sum_{\sum_{j=1}^n p_j = k} \prod_{i=1}^n a_{i,p_i}$$

1.2 卷积递推

定义一个序列 $\{f_k\}$ 是关于 $g_k, h_k, \{a_{u,v}\}$ 的 u 阶卷积递推, 意味着:

$$f_k = g_k + h_k \sum_{\sum_{j=1}^u p_j = k} \prod_{i=1}^u a_{i,p_i}$$

1.3 形式幂级数

对于一个序列 $\{a_n\}$, 定义它的形式幂级数 $A(x)$ 为:

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

在这里, 并不关注 x 的取值, 只是用它的一个形式, 但如果将其转化为封闭形式后, 需要保证 $a_0 = A(0)$ 成立

在本文中, 不加区分形式幂级数与生成函数的区别, 形式幂级数拥有一些常见的算术运算方式

1.3.1 相等

定义 $A(x) = B(x)$, 意味着:

$$\forall n \geq 0, a_n = b_n$$

1.3.2 加法

定义 $C(x) = A(x) + B(x)$, 意味着:

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) x^n$$

1.3.3 乘法

定义 $C(x) = A(x) \times B(x)$, 意味着:

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \sum_{i+j=n} a_i \times b_j$$

2 引理

2.1 形式幂级数的导数

由于 x^n 的导数为 nx^{n-1} ，由此可得对于形式幂级数 $A(x)$ 来说，它的导数为：

$$A'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+1}(n+1)x^n$$

于是可以推出如下结论：

$$\begin{aligned} F(x) &= A(x)^p \\ \Rightarrow F'(x) &= pA(x)^{p-1}A'(x) \\ \Rightarrow A(x)F'(x) &= pA(x)^pA'(x) \\ \Rightarrow A(x)F'(x) &= pF(x)A'(x) \end{aligned}$$

同时可以得知，如果已知 $F(0)$ 和 $F'(x)$ ，可以还原出 $F(x)$

2.2 形式幂级数的二次卷积

考虑形如如下的一类递推：

$$f_k = g_k + h_k \sum_{i+j=k} f_i f_j$$

在进行一些整理后，它们的形式幂级数可以写作：

$$A(x)F^2(x) + B(x)F(x) + C(x) = 0$$

若其为二次方程，则通过二次方程求根公式，可以得到：

$$F(x) = \frac{-B(x) \pm \sqrt{B^2(x) - 4A(x)C(x)}}{2A(x)}$$

在确定完正负号后，可以化作：

$$2A(x)F(x) = -B(x) \pm \sqrt{B^2(x) - 4A(x)C(x)}$$

因此只需要考虑一类形如 $\sqrt{A(x)}$ 的生成函数即可

当 $A(x), B(x), C(x)$ 均为低阶多项式时，可以进行一些化简后，得到 $\{f_n\}$ 的线性递推式
设 $F(x) = \sqrt{A(x)}$ ，则有：

$$\begin{cases} F'(x) = \frac{A'(x)}{2\sqrt{A(x)}} = \frac{A'(x)}{2}G(x) \\ G'(x) = \left(\frac{1}{\sqrt{A(x)}}\right)' = -\frac{A'(x)}{2A(x)}G(x) \end{cases}$$

即：

$$\begin{cases} A'(x)G(x) = -2G'(x)A(x) \\ 2F'(x) = A'(x)G(x) \end{cases}$$

展开后可以得到：

$$\begin{cases} A'(x) \sum_{n=0}^{\infty} g_n x^n = -2A(x) \sum_{n=0}^{\infty} g_{n+1}(n+1)x^n \\ \sum_{n=0}^{\infty} 2f_{n+1}(n+1)x^n = A'(x) \sum_{n=0}^{\infty} g_n x^n \end{cases}$$

在依次进行线性递推后，可以得到 $\{f_n\}$

3 实例

已知某序列的形式幂级数为 $F(x) = \frac{1-x-\sqrt{1-6x+x^2}}{2x}$ ，求其线性递推式

考虑到 $1-x$ 和 $2x$ 只是移动了系数，所以相当于求 $H(x) = \sqrt{1-6x+x^2}$ 的形式幂级数
为了方便求解，设 $G(x) = \frac{1}{H(x)}$

3.1 求 $G(x)$

因为：

$$\begin{aligned} (x-3)G(x) &= -(1-6x+x^2)G'(x) \\ \Rightarrow (x-3) \sum_{n=0}^{\infty} g_n x^n &= (-1+6x-x^2) \sum_{n=0}^{\infty} g_{n+1}(n+1)x^n \\ \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} g_{n-1}x^n - \sum_{n=0}^{\infty} 3g_n x^n &= - \sum_{n=0}^{\infty} g_{n+1}(n+1)x^n + \sum_{n=1}^{\infty} 6g_n n x^n - \sum_{n=2}^{\infty} g_{n-1}(n-1)x^n \end{aligned}$$

那么有：

3.1.1 初值

$$g_0 = G(0) = 1$$

3.1.2 当 $n = 0$ 时

$$\begin{aligned} -3g_0 &= -g_{0+1}(0+1) \\ \Rightarrow -3g_0 &= -g_1 \\ \Rightarrow g_1 &= 3 \end{aligned}$$

3.1.3 当 $n = 1$ 时

$$\begin{aligned} g_{1-1}x - 3g_1x &= -g_{1+1}(1+1)x + 6g_1x - g_{1-1}(1-1)x \\ \Rightarrow g_0 - 3g_1 &= -2g_2 + 6g_1 \\ \Rightarrow 1 - 9 &= -2g_2 + 18 \\ \Rightarrow g_2 &= 13 \end{aligned}$$

3.1.4 当 $n \geq 2$ 时

$$\begin{aligned} (g_{n-1} - 3g_n)x^n &= (-g_{n+1}(n+1) + 6g_nn - g_{n-1}(n-1))x^n & (n \geq 2) \\ \Rightarrow g_{n-1} - 3g_n &= -g_{n+1}(n+1) + 6g_nn - g_{n-1}(n-1) & (n \geq 2) \\ \Rightarrow g_{n-1}n - (3+6n)g_nn + g_{n+1}(n+1) &= 0 & (n \geq 2) \\ \Rightarrow g_{n+1}(n+1) &= (3+6n)g_n - g_{n-1}n & (n \geq 2) \\ \Rightarrow g_n &= \frac{(3+6(n-1))g_{n-1} - g_{n-2}(n-1)}{n} & (n \geq 3) \end{aligned}$$

3.2 求 $H(x)$

因为:

$$\begin{cases} h_0 = H(0) = 1 \\ \sum_{n=0}^{\infty} 2h_{n+1}(n+1)x^n = (2x-6) \sum_{n=0}^{\infty} g_nx^n = \sum_{n=1}^{\infty} 2g_{n-1}x^n - \sum_{n=0}^{\infty} 6g_nx^n \end{cases}$$

那么有:

3.2.1 初值

$$\begin{cases} h_0 = 1 \\ 2h_{0+1}(0+1) = -6g_0 \Rightarrow 2h_1 = -6 \Rightarrow h_1 = -3 \end{cases}$$

3.2.2 当 $n \geq 1$ 时

$$\begin{aligned} 2h_{n+1}(n+1) &= 2g_{n-1} - 6g_n \quad (n \geq 1) \\ \Rightarrow h_n &= \frac{g_{n-2} - 3g_{n-1}}{n} \quad (n \geq 2) \end{aligned}$$

3.3 求 $F(x)$

因为:

$$\begin{aligned} 2xF(x) &= 1 - x - H(x) \\ \Rightarrow 2x \sum_{n=0}^{\infty} f_n x^n &= 1 - x - \sum_{n=0}^{\infty} h_n x^n \\ \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} 2f_{n-1} x^n &= (1 - h_0) - (h_1 + 1)x - \sum_{n=2}^{\infty} h_n x^n \end{aligned}$$

那么有:

3.3.1 初值

$$\begin{aligned} 2f_0 x &= -(h_1 + 1)x \\ \Rightarrow f_0 &= 1 \end{aligned}$$

3.3.2 当 $n \geq 2$ 时

$$\begin{aligned} 2f_{n-1} x^n &= -h_n x^n \quad (n \geq 2) \\ \Rightarrow 2f_{n-1} &= -h_n \quad (n \geq 2) \\ \Rightarrow f_n &= -\frac{h_{n+1}}{2} \quad (n \geq 1) \end{aligned}$$

4 其它例子

4.1 默慈金数

$$F(x) = \frac{1 - x - \sqrt{1 - 2x - 3x^2}}{2x^2}$$

4.2 卡特兰数

$$F(x) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x}}{2}$$

参考文献

- [1] [生成函数及应用](#), ACdreamer
- [2] [迷思：寻找母函数运算的组合意义（一）](#), EntropyIncreaser