

AI 中的数学

第三、四讲

方聪，概率统计部分参考章复熹和张原老师课件

2024 年秋季

- ① 随机变量
- ② 离散随机变量
- ③ 连续随机变量
- ④ 随机变量严格定义

① 随机变量

② 离散随机变量

③ 连续随机变量

④ 随机变量严格定义

例 1.2. 盒中有 5 个球, 其中有 2 个白球, 3 个黑球.

从中任取 3 个球, 将其中所含的白球的数记为 X .

- 建模: 将球编号, $1 \sim 3$ 表示黑球, $4, 5$ 表示白球.
- $\omega = (i, j, k)$, 其中 $1 \leq i < j < k \leq 5$. $\Omega = C_5^3 = 10$.
- 事件是 Ω 的集合, 如果只关注第一次结果, 所有事件对应的每个集合中可以包括 2, 3 次的所有情况

例 1.2. 盒中有 5 个球, 其中有 2 个白球, 3 个黑球.
从中任取 3 个球, 将其中所含的白球的数记为 X .

- 建模: 将球编号, $1 \sim 3$ 表示黑球, $4, 5$ 表示白球.
- $\omega = (i, j, k)$, 其中 $1 \leq i < j < k \leq 5$. $\Omega = C_5^3 = 10$.
- 事件是 Ω 的集合, 如果只关注第一次结果, 所有事件对应的每个集合中可以包括 2, 3 次的所有情况
- 满足 $X = 0$ 的 ω 有 $C_2^0 C_3^3 = 1$ 个;
满足 $X = 1$ 的 ω 有 $C_2^1 C_3^2 = 6$ 个;
满足 $X = 2$ 的 ω 有 $C_2^2 C_3^1 = 3$ 个.
- 事件: $\{X = 1\} = \{\omega : X(\omega) = 1\}$,
 $\{X \leq 1\} = \{\omega : X(\omega) \leq 1\}$.
- 将 $P(\{X = 1\})$ 简记为 $P(X = 1)$. 例如,

$$P(X = 1) = \frac{6}{10}, P(X \leq 1) = \frac{7}{10}.$$

例 1.6. 某公共汽车站每隔 10 min 会有一两某路公交车到达. 某乘客随机在任意时刻到达车站.

- 候车时间 X (单位: min) 为随机变量.
- $0 \leq X \leq 10$.
- 几何概型 (参阅 1.8): 例,

$$P(X \leq 3) = \frac{3}{10}, \quad P(2 \leq X \leq 6) = \frac{4}{10}.$$

- 直观描述: 某变量 X 随机取值, 则 X 是随机变量
- 严格描述: 对于样本空间 $\Omega = \{\omega\}$, $X = X(\omega)$ 是在 Ω 上有定义的实值函数, 而且对任何实数 c , 事件“ $\{\omega : X(\omega) \leq c\}$ ”是有概率的 (属于事件域), 将 X 称为随机变量

① 随机变量

② 离散随机变量

③ 连续随机变量

④ 随机变量严格定义

- 定义 2.1. X 是离散型随机变量指: X 取有限个值 x_1, \dots, x_n , 或可列个值 x_1, x_2, \dots . X 的概率分布 (列) 指:

$$p_k = P(X = x_k), \quad k = 1, \dots, n \text{ 或 } k = 1, 2, \dots.$$

- 概率分布表:

| | | | | | |
|-----|-------|-------|---------|-------|---------|
| X | x_1 | x_2 | \dots | x_k | \dots |
| p | p_1 | p_2 | \dots | p_k | \dots |

- 非负: $p_k \geq 0, \forall k$; 规范: $\sum_{k=1}^n p_k = 1$ 或 $\sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$.
- $p_k, k = 1, 2, 3, \dots$, 是 X 的概率分布, 也称为概率函数或者概率分布律.

1. 两点分布 (伯努利分布), $X \sim B(1, p)$ (参数 $0 \leq p \leq 1$):

$$P(X = 1) = p, \quad P(X = 0) = 1 - p.$$

- 模型: 投币,

投到 H 则 $X = 1$; 投到 T 则 $X = 0$.

- 示性函数 1_A : 事件 A 发生则取 1; A 不发生则取 0.
- 例 2.1. 100 件产品中有 3 件次品. 从中任取一件.

$A =$ “取到合格品”, $X = 1_A, p = 0.97$.

2. 二项分布, $X \sim B(n, p)$ (参数 $n \geq 1, 0 \leq p \leq 1$):

$$P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}, k = 0, 1, \dots, n$$

- 模型: 独立投币 n 次, 正面的总次数.
- 定理 2.1. 分布列的最大值点 k_0 如下:

若 $(n+1)p \notin \mathbb{Z}$, 则 $k_0 = [(n+1)p]$;

若 $(n+1)p \in \mathbb{Z}$, 则 $k_0 = (n+1)p$ 或 $(n+1)p - 1$.

有组合数公式：

$$\frac{p_n(k+1)}{p_n(k)} = \frac{n-k}{k+1} \cdot \frac{p}{1-p}$$

由于 $\frac{n-k}{k+1} \cdot \frac{p}{1-p} > 1$ 等价于 $k < (n+1)p - 1$ ，于是有：

- (a) 当 $k < (n+1)p - 1$ 时， $p_n(k+1) > p_n(k)$
- (b) 当 $k > (n+1)p - 1$ 时， $p_n(k+1) < p_n(k)$
- (c) 当 $k = (n+1)p - 1$ 时， $p_n(k+1) = p_n(k)$

3. 泊松分布, $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$ (参数: $\lambda > 0$):

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

- 模型: 例 2.3. 研究放射性物质在 8 分钟内放射出的粒子数 X .



X 近似服从 $B(n, p)$, 故

$$\begin{aligned} P(X = k) &= C_n^k p^k (1 - p)^{n-k} \approx \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k (1 - p)^n \\ &\approx \frac{(np)^k}{k!} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \end{aligned}$$

- 上式即为 §1.7 第一近似公式.
- 泊松分布的分布列最大值点 $k_0 = [\lambda]$.

泊松分布的分布列最大值点 $k_0 = [\lambda]$.

证明：注意到 $p_{k+1} = \frac{\lambda}{k+1} p_k$ ，故由分布函数知

若 $k+1 \leq \lambda$ ，则 $p_{k+1} \geq p_k$

若 $k+1 \geq \lambda$ ，则 $p_{k+1} \leq p_k$

因此当 $k_0 = [\lambda]$ 时，分布列取最大值。

已知某商场一天来的顾客服从参数为 λ 的泊松分布，而每个来商场的顾客购物概率为 p ，证明此商场一天内购物的顾客数服从参数为 λp 的泊松分布

已知某商场一天来的顾客服从参数为 λ 的泊松分布，而每个来商场的顾客购物概率为 p ，证明此商场一天内购物的顾客数服从参数为 λp 的泊松分布

解：用 Y 表示商场内一天购物的顾客数，则由全概率公式知，对任意正整数 k 有

$$\begin{aligned} P(Y = k) &= \sum_{i=k}^{\infty} P(X = i)P(Y = k | X = i) = \sum_{i=k}^{\infty} \frac{\lambda^i e^{-\lambda}}{i!} C_i^k p^k (1-p)^{i-k} \\ &= \frac{(\lambda p)^k}{k!} e^{-\lambda} \sum_{i=k}^{\infty} \frac{[\lambda(1-p)]^{i-k}}{(i-k)!} = \frac{(\lambda p)^k}{k!} e^{-\lambda} e^{\lambda(1-p)} = \frac{(\lambda p)^k}{k!} e^{-\lambda p} \end{aligned}$$

4. 超几何分布, $X \sim H(N, D, n)$ (参数 N, D, n) :

$$P(X = k) = \frac{C_D^k C_{N-D}^{n-k}}{C_N^n}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

- 模型: N 个产品, D 个次品, 任取 n 个, 抽到的次品数为 X .
- 放回抽样 vs 不放回抽样: 二项分布 vs 超几何分布.
- 定理 2.3. 给定 n . 当 $N \rightarrow \infty, \frac{D}{N} \rightarrow p$ 时,

$$\frac{C_D^k C_{N-D}^{n-k}}{C_N^n} \rightarrow C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \quad k \geq 0$$

- 该定理的直观解释是, 如果一批产品的总量 N 很大, 其中次品占比为 p , 则从整批产品随机抽取 n 个, 抽到次品的个数 k 近似服从参数为 p, n 的二项分布

证明：由于 $0 < p < 1$ ，当 N 充分大时， $n < D < N$ ，且 n 是固定的，易知

$$\begin{aligned}
 \frac{C_D^k C_{N-D}^{n-k}}{C_N^n} &= \frac{D!}{k!(D-k)!} \cdot \frac{(N-D)!}{(n-k)!(N-D-n+k)!} \cdot \frac{n!(N-n)!}{N!} \\
 &= \frac{n!}{k!(n-k)!} \cdot \frac{D(D-1)\cdots(D-k+1)}{N^k} \\
 &\quad \cdot \frac{(N-D)(N-D-1)\cdots(N-D-n+k+1)}{N^{n-k}} \\
 &\quad \cdot \frac{N^n}{N(N-1)\cdots(N-n+1)} \\
 &= C_n^k \left(\prod_{i=1}^k \frac{D-i+1}{N} \right) \left(\prod_{i=1}^{n-k} \frac{N-D-i+1}{N} \right) \left(\prod_{i=1}^n \frac{N}{N-i+1} \right) \\
 &\rightarrow C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \quad (N \rightarrow \infty)
 \end{aligned}$$

5. 几何分布, $X \sim G(p)$, 参数 $0 < p < 1$:

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1} p, \quad k = 1, 2, \dots$$

- 模型: 独立重复投币中, 第一次投到 H 时的投币次数.
- $P(X > n) = (1 - p)^n, \forall n \geq 0$.
- 无记忆性: $P(X - n = k \mid X > n) = P(X = k)$.

设 X 是只取自然数的离散随机变量，若 X 的分布具有无记忆性，证明 X 的分布一定为几何分布。

证明：由无记忆性知

$$P(X > n + m | X > m) = \frac{P(X > n + m)}{P(X > m)} = P(X > n),$$

将 n 换为 $n - 1$ 仍有

$$P(X > n + m - 1) = P(X > n - 1)P(X > m).$$

两式相减有

$$P(X = n + m) = P(X = n)P(X > m).$$

设 $P(X = 1) = p$ ，若取 $n = m = 1$ 有

$$P(X = 2) = p(1 - p).$$

若取 $n = 2$, $m = 1$ 则有

$$P(X = 3) = P(X = 2)P(X > 1) = p(1 - p)^2.$$

若令 $P(X = k) = p(1 - p)^{k-1}$, 则用数学归纳法得

$$P(X = k + 1) = P(X = k)P(X > 1) = p(1 - p)^k, \quad k = 0, 1, \dots.$$

这表明 X 的分布为几何分布。

- 6. 离散均匀分布,

$$P(X = k) = \frac{1}{N}, \quad k = 1, \dots, N.$$

- 模型: 古典概型

① 随机变量

② 离散随机变量

③ 连续随机变量

④ 随机变量严格定义

- 定义 3.1. 连续型随机变量指: 存在 $p(x)$ 使得

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b p(x) dx, \quad \forall a < b.$$

称 $p(\cdot)$ 为 X 的概率密度 (函数), 也记为 $p_X(\cdot)$.

- 非负: $p(x) \geq 0$; 规范: $\int_{-\infty}^{\infty} p(x) dx = 1$.
- $P(X = x) = 0$ 在任意一点选中的概率都为 0.
- $p(\cdot)$ 在 x 连续, 则 $P(X \in [x, x + \Delta x]) = p(x)\Delta x + o(\Delta x)$,
- 单独谈论一个点 x 对应的 $p(x)$ 没有意义.

1. 均匀分布, $X \sim U(a, b)$ (参数 $a < b$) :

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}; & \text{若 } a \leq x \leq b; \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$$


- $a \leq b \leq x$ 可改为 $a < x < b, a < x \leq b, a \leq x < b$.
- $p(x) = \frac{1}{b-a} 1_{\{a \leq x \leq b\}}$.
- $p(x) = \frac{1}{b-a}$, 其中 $a \leq x \leq b$. 某公共汽车站每隔 10 分钟会

有一班公交车到达, 一位搭乘该车的乘客在任意时刻到达车站是等可能的, 则他的候车时间 X 是一个随机变量, 且满足 $[0, 10]$ 上的均匀分布

2. 指数分布, $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ (参数 $\lambda > 0$):

$$p(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x > 0.$$

- 模型: 例 2.3. $X =$ 第一个粒子的放射时刻. 等待时间、寿命.
- 第一个粒子在第 Y 个微观时间放出, 则



2. 指数分布, $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ (参数 $\lambda > 0$):

$$p(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x > 0.$$

- 定理 3.1. (无记忆性):

$$P(X - s > t \mid X > s) = e^{-\lambda t}, \quad \forall t, s \geq 0.$$

若 X 服从参数为 λ 的指数分布，则对任何 $0 \leq a < b$ 有：

$$P(a < X < b) = \lambda \int_a^b e^{-\lambda x} dx = e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b}$$

$$P(X > a) = e^{-\lambda a}$$

$$P(X - s > t \mid X > s) = \frac{P(X-s>t)}{P(X>s)} = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda t}} = e^{-\lambda t} = P(X > t)$$

设 X 是非负的随机变量, $P(X - s > t \mid X > s) = e^{-\lambda t}$ 对
 $\forall t, s \geq 0$ 恒成立的充分必要条件是 X 服从指数分布

设 X 是非负的随机变量, $P(X - s > t \mid X > s) = e^{-\lambda t}$ 对 $\forall t, s \geq 0$ 恒成立的充分必要条件是 X 服从指数分布

必要性: 设 X 是非负随机变量满足条件, 则

$$P(X > s) > 0, \quad P(X > s + t) = P(X > s)P(X > t)$$

令 $f(u) = P(X > u)$, 则 $f(s + t) = f(s)f(t)$

于是 $f(1) = f(\frac{1}{n} \times n) = (f(\frac{1}{n}))^n$

从而 $f(\frac{m}{n}) = f(\frac{1}{n} \times m) = (f(\frac{1}{n}))^m = (f(1))^{\frac{m}{n}}$

故对任意正有理数 r , 有 $f(r) = (f(1))^r$ 。由于 $0 < f(1) < 1$ 且 $f(u)$ 是关于 u 的减函数, 因此对任意 $u \geq 0$, 有 $f(u) = (f(1))^u$ 。

令 $\lambda = -\ln f(1)$, 则 $f(u) = e^{-\lambda u}$, 即

$$P(X > u) = e^{-\lambda u} = \int_{+\infty}^u e^{-\lambda x} dx$$


3. 正态分布, $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ (参数 $\mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0$) :

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp \left\{ -\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2} \right\}$$

- 标准正态分布 $N(0, 1)$:

$$-\frac{x^2}{2}$$

高尔顿钉板试验



- $\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$, 将积分的平方写为二重积分:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \times \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy = \frac{1}{2\pi} \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} dx dy.$$

- $\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$, 将积分的平方写为二重积分:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \times \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy = \frac{1}{2\pi} \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} dx dy.$$

- 做极坐标变换:

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta \Rightarrow \left| \begin{array}{cc} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial r} \\ \frac{\partial x}{\partial \theta} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{array} \right| = r.$$

- 因此,

$$\star\star = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left(\int_0^{\infty} e^{-\frac{r^2}{2}} r dr \right) d\theta = \int_0^{\infty} e^{-R} dR = 1$$

- $p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$: 令 $y = \frac{x-\mu}{\sigma}$, 则

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy = 1.$$

- 函数 Φ :

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \phi(x) dx.$$

- $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$.
- 定理 3.2. 令 $x^* = \frac{x-\mu}{\sigma}$, 则

$$P(a < X < b) = \int_a^b \frac{1}{\sigma} \phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) dx = \Phi(b^*) - \Phi(a^*).$$

- 推论 3.1. 查表得 $\Phi(3) = 0.9987$, 因此

$$P(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma) = \Phi(3) - \Phi(-3) = 0.9974$$

4. 伽玛分布, $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$ (参数 $\alpha, \beta > 0$):

$$p(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}, \quad x > 0.$$

- $\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty y^{\alpha-1} e^{-y} dy.$
- $\Gamma(\alpha + 1) = \alpha \Gamma(\alpha)$

$$\int_0^\infty y^\alpha e^{-y} dy = -y^\alpha e^{-y} \Big|_0^\infty + \int_0^\infty \alpha y^{\alpha-1} e^{-y} dy.$$

- $\Gamma(1) = 1; \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$


$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{y}} e^{-y} dy = \sqrt{2} \int_0^\infty e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \sqrt{\pi}.$$

- $\alpha = 1$ 时就是指数分布 $\text{Exp}(\beta)$.

- ① 随机变量
- ② 离散随机变量
- ③ 连续随机变量
- ④ 随机变量严格定义

- 定义 4.1. 假设 (Ω, \mathcal{F}, P) 是概率空间, $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 满足:
对任意 $x \in \mathbb{R}$ 都有 $\{X \leq x\} \in \mathcal{F}$,
则称 X 是一个随机变量.
- 定义 4.2. 令 $F(x) = P(X \leq x), x \in \mathbb{R}$. 称 F 为随机变量 X 的分布函数, 也记为 F_X .
- 定理 4.2. $F = F_X$ 的三条性质:
 - (1) 单调性: 若 $x \leq y$, 则 $F(x) \leq F(y)$.
 - (2) 规范性: $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0; \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$.
 - (3) 右连续性: $\lim_{y \rightarrow x+} F(y) = F(x)$.

- 离散型: $P(X = x_i) = p_i$. x_i 为 F_X 的跳点, p_i 为跳跃幅度.



- 连续型: $F_X(x) = \int_{-\infty}^x p(z) dz$, 且
 $p(x) = F'_X(x)$.

反过来, 若 F_X “几乎” 连续可导, 则为连续型 (定理 4.3, 4.4).

- 尾分布函数: $G(x) = P(X > x) = 1 - F(x)$.
连续型: $p(x) = -G'(x)$.
- 例. $X \sim \text{Exp}(\lambda)$.

$$G(x) = e^{-\lambda x}, \quad \forall x > 0,$$

$$\Rightarrow G'(x) = -\lambda G(x). \quad \lambda: \text{速率}.$$

- 由 $F_X(x)$ 可求出 $P(X \in B), \forall B$.
- 若 $F_X = F_Y$, 则称 X 与 Y 同分布, 记为 $X \stackrel{d}{=} Y$.
- $X = Y$, 即 $P(X = Y) = 1$, 则 $F_X = F_Y$. 反之不然.