$\chi^2_{\text{Pearson}}(21) = 18.42$, $p = 0.62$, $\widehat{V}_{\text{Cramer}} = 0.00$, $\text{CI}_{95\%}$ [0.00, 1.00], $n_{\text{obs}} = 109$

$p = 0.57$ $p = 0.01$ $p = 0.32$ $p = 1.37\text{e}{-}03$ $p = 0.14$ $p = 0.31$ $p = 0.06$ $p = 0.30$

initial_seizure_type
- infantile
- focal
- bilateral_tc
- absence

num_stable_meds

$\log_e(\text{BF}_{01}) = 6.55$, $\widehat{V}^{\text{posterior}}_{\text{Cramer}} = 0.07$, $\text{CI}^{\text{ETI}}_{95\%}$ [0.00, 0.23], $a_{\text{Gunel-Dickey}} = 1.00$

$\chi^2_{Pearson}(35) = 37.77$, $p = 0.34$, $\widehat{V}_{Cramer} = 0.08$, $CI_{95\%}$ [0.00, 1.00], $n_{obs} = 70$

$p = 0.22$ $p = 0.03$ $p = 0.22$ $p = 0.03$ $p = 0.85$ $p = 0.64$ $p = 0.05$ $p = 0.55$

unique_types: 5, 4, 3, 2, 1, 0

(n = 3), (n = 17), (n = 12), (n = 17), (n = 10), (n = 5), (n = 4), (n = 2)

num_stable_meds: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

$\log_e(BF_{01}) = 1.60$, $\widehat{V}_{Cramer}^{posterior} = 0.00$, $CI_{95\%}^{ETI}$ [0.00, 0.16], $a_{Gunel-Dickey} = 1.00$

$\chi^2_{\text{Pearson}}(7) = 9.02$, $p = 0.25$, $\widehat{V}_{\text{Cramer}} = 0.17$, $\text{CI}_{95\%}$ [0.00, 1.00], $n_{\text{obs}} = 71$

$p = 0.05$ $p = 2.70\text{e}{-}03$ $p = 0.05$ $p = 2.21\text{e}{-}05$ $p = 2.70\text{e}{-}03$ $p = 0.03$ $p = 0.05$ $p = 0.16$

$\log_e(\text{BF}_{01}) = 0.25$, $\widehat{V}_{\text{Cramer}}^{\text{posterior}} = 0.08$, $\text{CI}_{95\%}^{\text{ETI}}$ [0.00, 0.40], $a_{\text{Gunel-Dickey}} = 1.00$

$\chi^2_{\text{Pearson}}(28) = 40.72$, $p = 0.06$, $\widehat{V}_{\text{Cramer}} = 0.20$, $\text{CI}_{95\%}$ [0.00, 1.00], $n_{\text{obs}} = 79$

$\log_e(\text{BF}_{01}) = 2.93$, $\widehat{V}^{\text{posterior}}_{\text{Cramer}} = 0.07$, $\text{CI}^{\text{ETI}}_{95\%}$ [0.00, 0.25], $a_{\text{Gunel-Dickey}} = 1.00$