

# Лабораторная работа 1.

## Критерий согласия Пирсона

### Теоретические сведения

Теория вероятностей и математическая статистика занимаются анализом закономерностей случайных массовых явлений. Предметом математической статистики является изучение случайных величин (или случайных событий, процессов) по результатам наблюдений.

Множество значений результатов наблюдений над одной и той же СВ  $\xi$  при одних и тех же условиях называется **выборкой**. Элементы выборки называются **выборочными значениями**. Количество проведенных наблюдений называется **объемом выборки**. Разность  $W$  между максимальным и минимальным элементами называется **размахом выборки**:  $W = x_{\max} - x_{\min}$ .

Пусть имеется выборка объема  $n$ :  $x_1; x_2; \dots; x_n$ . Если в выборке объема  $n$  элемент  $x_i$  встречается  $n_i$  раз, число  $n_i$  называется **частотой** выборочного значения  $x_i$ , а  $\frac{n_i}{n}$  —

**относительной частотой**. Очевидно, что  $\sum_{i=1}^k n_i = n$ , где  $k$  — число различных элементов выборки.

Последовательность пар  $(x_i^*; n_i)$ , где  $x_1^*, x_2^*, \dots, x_k^*$  — различные выборочные значения, а  $n_1, n_2, \dots, n_k$  — соответствующие им частоты, называется **статистическим рядом**. Обычно статистический ряд записывают в виде таблицы, первая строка которой содержит различные выборочные значения  $x_i^*$ , а вторая — их частоты  $n_i$  (или относительные частоты  $\frac{n_i}{n}$ , иногда и те, и другие).

В случае, когда число значений признака (СВ  $\xi$ ) велико или признак является непрерывным (т. е. когда СВ  $\xi$  может принимать любое значение в некотором интервале), составляют **интервальный статистический ряд**. Для этого весь диапазон выборочных значений от  $x_{\min}$  до  $x_{\max}$  разбивают на  $k$  интервалов (обычно от 5 до 20; для определения количества интервалов можно использовать полуэмпирическую формулу Стерджесса  $k \approx 1 + \log_2 n$ ) одинаковой длины  $h = \frac{W}{k}$  и определяют частоты  $n_i$  — количество элементов выборки, попавших в  $i$ -й интервал (элемент, совпадающий с верхней границей интервала, относится к последующему интервалу). Полученные данные сводят в таблицу:

| $[x_i; x_{i-1})$                  | $[x_0; x_1)$    | $[x_1; x_2)$    | ... | $[x_{k-1}; x_k]$ |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----|------------------|
| $x_i^* = \frac{x_{i-1} + x_i}{2}$ | $x_1^*$         | $x_2^*$         | ... | $x_k^*$          |
| $n_i$                             | $n_1$           | $n_2$           | ... | $n_k$            |
| $\frac{n_i}{n}$                   | $\frac{n_1}{n}$ | $\frac{n_2}{n}$ | ... | $\frac{n_k}{n}$  |

Пусть выборка объема  $n$  представлена в виде интервального статистического ряда. Оценками для математического ожидания и дисперсии наблюдаемой случайной величины являются **выборочное среднее**

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k x_i^* n_i$$

и **выборочная дисперсия**

$$D_B = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k (x_i^* - \bar{x})^2 n_i, \text{ или } D_B = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k (x_i^*)^2 n_i - (\bar{x})^2.$$

При этом выборочная дисперсия дает всегда немного заниженную оценку для дисперсии, поэтому вместо нее используют несмещенную оценку дисперсии

$$s^2 = \frac{n}{n-1} D_B.$$

**Эмпирической функцией распределения** называется функция  $F_n^*(x)$ , определяющая для каждого значения  $x$  относительную частоту наблюдения значений, меньших  $x$ :

$$F_n^*(x) = \sum_{x_i^* < x} \frac{n_i}{n}.$$

**Гистограммой относительных частот** называют ступенчатую фигуру, состоящую из прямоугольников, основаниями которых служат частичные интервалы длины  $h$ , а высоты равны  $\frac{n_i}{nh}$ . Площадь гистограммы относительных частот равна 1.

При достаточно большом объеме выборки  $n$  и достаточно малых интервалах группировки  $h$  гистограмма относительных частот является хорошим приближением графика плотности распределения наблюдаемой случайной величины. Поэтому по виду гистограммы можно выдвинуть предположение (гипотезу) о распределении изучаемой случайной величины.

Процедура сопоставления высказанного предположения (гипотезы) с выборочными данными называется **проверкой гипотез**.

Под **статистической гипотезой** понимают всякое высказывание (предположение) о виде (**непараметрическая гипотеза**) или параметрах (**параметрическая гипотеза**) неизвестного распределения. Статистическая гипотеза называется **простой**, если она полностью определяет функцию распределения. В противном случае гипотеза называется **сложной**.

Одну из гипотез выделяют в качестве **основной** (или **нулевой**)  $H_0$ , а другую, являющуюся логическим отрицанием  $H_0$ , – в качестве **конкурирующей** (или **альтернативной**) гипотезы  $\bar{H}$ .

Правило, по которому принимается решение принять или отклонить проверяемую гипотезу, называется **критерием проверки статистической гипотезы** (**статистическим критерием**). При этом заранее выбирают допустимое значение ошибки вывода, которое называется **уровнем значимости** статистического критерия и обозначается  $\alpha$  (это вероятность отвергнуть нулевую гипотезу, когда она верна).

Статистические критерии, с помощью которых проверяются гипотезы о виде распределения, называются **критериями согласия** или **непараметрическими критериями**.

**Критерий согласия  $\chi^2$  Пирсона.** Пусть имеется выборка объема  $n$  и сгруппированный статистический ряд, в котором  $k$  групп. Например, в случае непрерывной СВ это будут  $k$  интервалов  $[x_{i-1}; x_i]$ .

Группы должны выбираться так, чтобы охватывать весь диапазон значений предполагаемой СВ. Если диапазон значений СВ не ограничен (к примеру, нормальная СВ принимает любые значения из  $(-\infty; +\infty)$ ), то крайние интервалы должны быть расширены до  $-\infty$  и  $+\infty$  соответственно.

Кроме того, интервалы (группы) должны быть не очень маленькими, чтобы в каждый из них входило не менее 5 наблюдений. Группы с малым количеством наблюдений объединяют с соседними.

Проверяемая гипотеза представляет собой предположение о распределении наблюдаемой СВ и является простой (конкретно указывает предполагаемое распределение):

$H_0$  : функция распределения наблюдаемой СВ совпадает с  $F(x)$ ;

$\bar{H}$  : функция распределения наблюдаемой СВ не совпадает с  $F(x)$ .

Критерий согласия  $\chi^2$  Пирсона основан на сравнении эмпирических и теоретических частот попадания СВ в рассматриваемые группы (интервалы):

$n_i$  – эмпирическая частота наблюдения значений из интервала  $[x_{i-1}; x_i]$ ;

$np_i = n P(\xi \in [x_{i-1}; x_i]) = n(F(x_i) - F(x_{i-1}))$  – теоретическое значение соответствующей частоты.

Рассмотрим статистику

$$\chi_{\text{расч}}^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}.$$

Для вычисления статистики  $\chi_{\text{расч}}^2$  нужно знать сгруппированный статистический ряд и теоретическую функцию распределения  $F(x)$  для расчета вероятностей  $p_i$ . При этом теоретическое распределение  $F(x)$  может зависеть от одного или нескольких параметров. В этом случае вместо значений параметров используются их оценки, рассчитанные по сгруппированному статистическому ряду до объединения групп.

*Замечание.* Контроль вычислений можно осуществить по формуле

$$\chi_{\text{расч}}^2 = \sum_{i=1}^k \frac{n_i^2}{np_i} - n.$$

Пусть  $r$  – число неизвестных параметров теоретического распределения, оцененных по выборке. **Критерий согласия  $\chi^2$  Пирсона** заключается в следующем: если  $\chi_{\text{расч}}^2 < \chi_{\alpha; k-r-1}^2$ , где  $\chi_{\alpha; k-r-1}^2$  определяется по таблице квантилей распределения  $\chi^2$ , то гипотеза  $H_0$  принимается (признается непротиворечащей экспериментальным данным; нет оснований отвергнуть гипотезу  $H_0$ ) на уровне значимости  $\alpha$ , а если  $\chi_{\text{расч}}^2 \geq \chi_{\alpha; k-r-1}^2$ , то гипотеза  $H_0$  отвергается (не согласуется с данными эксперимента).

Основное достоинство критерия согласия  $\chi^2$  Пирсона – его универсальность, т. е. применимость для любого закона распределения, в том числе с неизвестными параметрами. Основной недостаток – необходимость большого объема выборки (не менее 60–100 наблюдений) и произвольность группировки, влияющая на величину  $\chi_{\text{расч}}^2$ .

## *Контрольные вопросы*

1. Что называется выборкой? Что называется объемом выборки?
2. Что называется частотой выборочного значения? Что называется относительной частотой?
3. Как оценить по выборке математическое ожидание и дисперсию наблюдаемой СВ?
4. Как рассчитать несмещенную оценку дисперсии?
5. Как оценить по выборке функцию распределения и плотность распределения наблюдаемой СВ?
6. Что называется эмпирической функцией распределения?
7. Что называется гистограммой относительных частот?
8. Чему равна площадь гистограммы относительных частот?
9. Что называется статистической гипотезой?
10. В каком случае статистическая гипотеза называется простой? сложной?
11. В чем разница между нулевой и альтернативной гипотезами?
12. Что называется уровнем значимости статистического критерия?
13. Что называется критерием согласия?
14. В чем суть критерия согласия  $\chi^2$  Пирсона?
15. Какие достоинства и недостатки имеет критерий согласия  $\chi^2$  Пирсона?

### *Пример и методические указания по выполнению лабораторной работы в Excel*

1. Составить интервальный статистический ряд.  
Величину интервалов округлить с точностью до 0,1 в большую сторону.
2. Найти эмпирическую функцию распределения и построить ее график.
3. Построить гистограмму относительных частот.  
Можно ли предположить, что данная выборка взята из нормального распределения?
4. Определить выборочное среднее и несмещенную оценку дисперсии по сгруппированному статистическому ряду.
5. Записать предполагаемую плотность закона распределения.
6. Проверить по критерию  $\chi^2$  Пирсона гипотезу о законе распределения.  
Уровень значимости принять равным  $\alpha = 0,05$ .

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 37 | 34 | 42 | 38 | 31 | 41 | 40 | 35 | 32 | 34 |
| 37 | 37 | 26 | 39 | 45 | 37 | 40 | 40 | 45 | 31 |
| 39 | 42 | 47 | 37 | 42 | 40 | 29 | 35 | 40 | 36 |
| 34 | 33 | 31 | 28 | 37 | 40 | 41 | 41 | 49 | 41 |
| 37 | 29 | 43 | 43 | 39 | 35 | 42 | 42 | 39 | 50 |
| 31 | 33 | 38 | 42 | 38 | 35 | 32 | 37 | 45 | 42 |
| 44 | 34 | 34 | 34 | 38 | 38 | 38 | 30 | 39 | 35 |
| 42 | 33 | 35 | 31 | 35 | 53 | 48 | 39 | 47 | 41 |
| 37 | 48 | 41 | 43 | 42 | 29 | 33 | 48 | 39 | 42 |
| 41 | 41 | 36 | 43 | 37 | 33 | 38 | 43 | 37 | 34 |

1. Объем выборки  $n = 100$ . Построим интервальный статистический ряд. Количество интервалов определим по формуле Стерджесса  $k \approx 1 + \log_2 n = 1 + \log_2 100 = 7,644$ . Принимаем  $k = 8$ . Размах выборки  $W = x_{\max} - x_{\min} = 53 - 26 = 27$ . Длина каждого интервала будет  $h \approx \frac{W}{k} = \frac{27}{8} = 3,375$ . Округлив с точностью до 0,1 в большую сторону, принимаем  $h = 3,4$ . Находим количество элементов выборки в каждом интервале.


| $[x_i; x_{i-1})$ | $x_i^*$ | $n_i$ | $\frac{n_i}{n}$ | $\frac{n_i}{nh}$ |
|------------------|---------|-------|-----------------|------------------|
| [26; 29,4)       | 27,7    | 5     | 0,05            | 0,015            |
| [29,4; 32,8)     | 31,1    | 8     | 0,08            | 0,024            |
| [32,8; 36,2)     | 34,5    | 21    | 0,21            | 0,062            |
| [36,2; 39,6)     | 37,9    | 25    | 0,25            | 0,074            |
| [39,6; 43)       | 41,3    | 24    | 0,24            | 0,071            |
| [43; 46,4)       | 44,7    | 9     | 0,09            | 0,026            |
| [46,4; 49,8)     | 48,1    | 6     | 0,06            | 0,018            |
| [49,8; 53,2]     | 51,5    | 2     | 0,02            | 0,006            |

2. Для построения эмпирической функции распределения и гистограммы относительных частот дополним интервальный статистический ряд столбцами  $\frac{n_i}{n}$  (относительные частоты нужны для построения эмпирической функции распределения) и  $\frac{n_i}{nh}$  (высоты прямоугольников гистограммы).


Запишем эмпирическую функцию распределения, накапливая относительные частоты  $\frac{n_i}{n}$  (отметим, что при построении эмпирической функции распределения по интервальному статистическому ряду изменения ее значений (скачки) происходят в точках, соответствующих серединам интервалов группировки):

$$F_n^*(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \leq 27,7, \\ 0,05 & \text{при } 27,7 < x \leq 31,1, \\ 0,13 & \text{при } 31,1 < x \leq 34,5, \\ 0,34 & \text{при } 34,5 < x \leq 37,9, \\ 0,59 & \text{при } 37,9 < x \leq 41,3, \\ 0,83 & \text{при } 41,3 < x \leq 44,7, \\ 0,92 & \text{при } 44,7 < x \leq 48,1, \\ 0,98 & \text{при } 48,1 < x \leq 51,5, \\ 1 & \text{при } x > 51,5. \end{cases}$$

Построим график  $F_n^*(x)$ .




3. Построим гистограмму относительных частот, состоящую из прямоугольников шириной  $h = 3,4$  и высотой  $\frac{n_i}{nh}$ ,



По виду гистограммы можно выдвинуть гипотезу о том, что выборка взята из нормального распределения. Для проверки этой гипотезы по критерию согласия  $\chi^2$  Пирсона нужно рассчитать оценки параметров распределения по сгруппированному статистическому ряду.

Ниже приведен фрагмент рабочего листа и даны рекомендации по выполнению пунктов 1, 3 в Excel.



1. 1) В ячейке A1: "Исходные данные", в ячейки A2:J11 введите или скопируйте выборку.

2) В ячейке A12: "Кол-во интервалов"; в ячейке D12: "k="; в ячейке E12 вычислите количество интервалов по формуле Стерджесса и округлите до целого: =ОКРУГЛ(1+LOG(100;2);0) (в Excel каждая формула начинается со знака =; в формулах недопустимы пробелы). Получается  $k = 8$ .

В ячейке A13: "min="; в ячейке B13 =МИН(A2:J11); в ячейке C13: "max="; в ячейке D13 =МАКС(A2:J11); в ячейке E13: "W="; в ячейке F13 =D13-B13. В ячейке A14: "длина интервалов"; в ячейке D14 =F13/E12; в ячейке E14: "округляем"; в ячейке G14: "h="; в ячейке H14 =ОКРВВЕРХ(D14;0,1).

3) В ячейке A15: "Интервальный статистический ряд". В ячейке A16: "[xi;"; в ячейке B16 "xi+1)"; в ячейке C16: "xi\*"; в ячейке E16: "ni"; в ячейке F16: "ni/n"; в ячейке G16: "ni/n/h".

4) Для нахождения концов интервалов в ячейку A17 запишите минимальное выборочное значение (используйте формулу или ссылку на вычисленное значение), а в ячейки A18 и B17 — формулу =A17+\$H\$14, затем скопируйте (протяните) эту формулу в ячейки соответствующих столбцов до строки 24 включительно (т. к. должно быть 8 интервалов).

При копировании формула в Excel перенастраивается на новые адреса (относительные ссылки). Чтобы адрес какой-либо ячейки был абсолютным (т. е. не перенастраивался), нужно после его указания в процессе формирования формулы нажать клавишу F4 или записать адрес в виде \$A\$1. Клавиша F4 действует в этом случае как переключатель, преобразуя адрес последовательно в \$A\$1, A\$1, \$A1, A1. Знаком \$ обозначается та часть адреса, которая должна оставаться абсолютной. При перемещении формулы в новое место таблицы ссылки в формуле не изменяются.

5) В столбце С вычислите середины интервалов.

6) Для вычисления частот выделите массив D17:D25, вызовите функцию =ЧАСТОТА(A2:J11;B17:B24) и нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Shift+Enter** (три клавиши вместе!). В ячейке D25 отображена частота наблюдения значений, которые больше или равны значения B24 (т. е. значение в ячейке D25 будет больше 0, если значение в ячейке B24 равно наибольшему выборочному значению, в этом случае нужно добавить это значение к последней частоте). Вычислите с учетом этого замечания частоты в ячейках E17:E24. Для контроля вычислений рассчитайте в ячейке E25 сумму частот.

7) Вычислите относительные частоты и высоты прямоугольников гистограммы в столбцах F и G.

3. Построим гистограмму относительных частот, используя вкладку Вставка → Диаграмма.

1) Выделите данные, которые будут отображаться по оси  $Ox$ , т. е. ячейки C17:C24 (обозначим интервалы их серединами) и, нажав клавишу **Ctrl**, выберите данные, которые будут включены в гистограмму по оси  $Oy$ , т. е. ячейки G17:G24.

2) Выберите вкладку Вставка → Диаграмма, выберите вариант Гистограмма.

3) Щелкнув по прямоугольникам гистограммы правой кнопкой мыши, выбираем Формат ряда данных и во вкладке Параметры устанавливаем Боковой зазор 5%.

4) Далее можно изменить название гистограммы и подписи осей.

4. Рассчитаем оценки параметров предполагаемого нормального закона распределения по сгруппированному статистическому ряду. Данный закон содержит два параметра  $a$  и  $\sigma$ , которые имеют смысл математического ожидания и среднего квадратического отклонения СВ  $\xi$ :  $M\xi = a$ ,  $D\xi = \sigma^2$ .

В качестве оценок для математического ожидания  $a$  и дисперсии  $\sigma^2$  наблюдаемой случайной величины рассчитаем соответственно выборочное среднее  $\bar{x}$  и несмещенную оценку дисперсии  $s^2$ , для вычисления  $s^2$  предварительно найдем выборочную дисперсию  $D_b$ :

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k x_i^* n_i;$$
$$D_b = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k (x_i^*)^2 n_i - (\bar{x})^2;$$
$$s^2 = \frac{n}{n-1} D_b.$$

Используя интервальный статистический ряд, получим:

$$\bar{x} = \frac{1}{100} \cdot (27,7 \cdot 5 + 31,1 \cdot 8 + 34,5 \cdot 21 + 37,9 \cdot 25 + 41,3 \cdot 24 + 44,7 \cdot 9 + 48,1 \cdot 6 + 51,5 \cdot 2) \approx 38,44;$$
$$D_b = \frac{1}{100} \cdot (27,7^2 \cdot 5 + 31,1^2 \cdot 8 + 34,5^2 \cdot 21 + 37,9^2 \cdot 25 + 41,3^2 \cdot 24 +$$



$$+44,7^2 \cdot 9 + 48,1^2 \cdot 6 + 51,5^2 \cdot 2) - 38,44^2 \approx 27,91;$$

$$s^2 = \frac{100}{99} \cdot 27,91 \approx 28,19.$$

Тогда оценкой для среднего квадратического отклонения  $\sigma$  будет  $s = \sqrt{28,19} \approx 5,31$ .

5. Функция плотности нормального закона распределения имеет вид

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}.$$

Следовательно, выдвигаем гипотезу о том, что выборка взята из нормального распределения с плотностью

$$f(x) = \frac{1}{5,31\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-38,44)^2}{56,38}}.$$

- Е** 4. 1) В ячейке Н16: "Выборочное среднее"; в ячейке Н17: "х-ср="; в ячейке  
**Х** I17 вычислите выборочное среднее по формуле  
**С** =СУММПРОИЗВ(С17:С24;Е17:Е24)/100.  
 2) В ячейке Н18: "Выборочная дисперсия"; в ячейке Н19: "Дв="; в ячейке I19  
 вычислите выборочную дисперсию по формуле  
**Е** =СУММПРОИЗВ(С17:С24;С17:С24;Е17:Е24)/100-I17\*I17.  
**Л** 3) В ячейке Н20: "s2="; в ячейке I20 вычислите несмещенную оценку  
 дисперсии: =I19\*100/99.  
 4) В ячейке Н21: "s="; в ячейке I21 вычислите оценку среднего  
 квадратического отклонения: =КОРЕНЬ(I20).

6. Проверим с помощью критерия согласия  $\chi^2$  Пирсона гипотезу

$H_0$ : наблюдаемая СВ имеет нормальное распределение с параметрами  
 $a = 38,44, \sigma = 5,31$

при альтернативе

$\bar{H}$ : наблюдаемая СВ имеет другое распределение.

Для расчета статистики критерия Пирсона

$$\chi^2_{\text{расч}} = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$$

составим новую таблицу, содержащую следующие столбцы:

интервалы  $[x_{i-1}; x_i)$  (при этом крайние интервалы должны быть расширены до  $-\infty$  и  $+\infty$  соответственно; а интервалы с количеством наблюдений меньше 5 объединяются с соседними);

$n_i$  – эмпирическая частота наблюдения значений из интервала  $[x_{i-1}; x_i)$ ;

$p_i = P(\xi \in [x_{i-1}; x_i))$  – теоретическая вероятность попадания СВ в интервал  $[x_{i-1}; x_i)$ , в случае нормального распределения с параметрами  $a = 38,44, \sigma = 5,31$  эта вероятность рассчитывается как разность значений функции Лапласа:

$$p_i = \Phi\left(\frac{x_i - 38,44}{5,31}\right) - \Phi\left(\frac{x_{i-1} - 38,44}{5,31}\right);$$

$np_i$  – теоретическое значение соответствующей частоты,  
а также столбцы со значениями  $n_i - np_i$ ,  $(n_i - np_i)^2$ ,  $\frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$ ,  $\frac{n_i^2}{np_i}$ .

Последний столбец используется для контроля вычислений по формуле

$$\chi_{\text{расч}}^2 = \sum_{i=1}^k \frac{n_i^2}{np_i} - n.$$

Все вычисления заносим в таблицу.

| Интервалы         | $n_i$ | $p_i$  | $np_i$ | $n_i - np_i$ | $(n_i - np_i)^2$ | $\frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$   | $\frac{n_i^2}{np_i}$ |
|-------------------|-------|--------|--------|--------------|------------------|---------------------------------|----------------------|
| $[-\infty; 29,4)$ | 5     | 0,0443 | 4,425  | 0,575        | 0,33             | 0,075                           | 5,649                |
| $[29,4; 32,8)$    | 8     | 0,0996 | 9,964  | -1,96        | 3,858            | 0,387                           | 6,423                |
| $[32,8; 36,2)$    | 21    | 0,1924 | 19,24  | 1,761        | 3,103            | 0,161                           | 22,92                |
| $[36,2; 39,6)$    | 25    | 0,2499 | 24,99  | 0,011        | 0,0001           | 0,000                           | 25,01                |
| $[39,6; 43)$      | 24    | 0,2184 | 21,84  | 2,16         | 4,668            | 0,214                           | 26,37                |
| $[43; 46,4)$      | 9     | 0,1284 | 12,84  | -3,84        | 14,76            | 1,149                           | 6,308                |
| $[46,4; +\infty)$ | 8     | 0,067  | 6,701  | 1,299        | 1,686            | 0,252                           | 9,55                 |
| Суммы             | 100   | 1      | 100    |              |                  | $\chi_{\text{расч}}^2 = 2,2376$ | 102,24               |

Суммирования значения в предпоследнем столбце, вычисляем выборочное значение статистики критерия  $\chi^2$  Пирсона:  $\chi_{\text{расч}}^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i} \approx 2,24$ . Сумма


элементов последнего столбца равна  $\sum_{i=1}^k \frac{n_i^2}{np_i} \approx 102,24$ . Это позволяет провести

контроль вычислений:  $\chi_{\text{расч}}^2 = \sum_{i=1}^k \frac{n_i^2}{np_i} - n = 102,24 - 100 = 2,24$ .

Определим критическое значение  $\chi_{\text{крит}}^2 = \chi_{\alpha; k-r-1}^2$ , где  $\alpha = 0,05$  – заданный уровень значимости;  $k = 7$  – число интервалов после объединения малочисленных групп с соседними;  $r = 2$ , поскольку при расчете теоретических вероятностей  $p_i$  использовались две полученные по выборке оценки  $\bar{x}$  и  $s$  параметров нормального распределения. По таблице квантилей распределения  $\chi^2$  получаем  $\chi_{\text{крит}}^2 = \chi_{0,05; 4}^2 = 9,4877$ .

Таким образом,  $\chi_{\text{расч}}^2 = 2,24 < \chi_{\text{крит}}^2 = 9,4877$ , поэтому на уровне значимости  $\alpha = 0,05$  нет оснований отвергнуть гипотезу  $H_0$ , согласно которой выборка взята из нормального распределения с параметрами  $a = 38,44$ ,  $\sigma = 5,31$ .

Ниже приведен фрагмент рабочего листа и даны рекомендации по выполнению пункта 6 в Excel.



Е 6. 1) В ячейке A26: "Проверка гипотезы о законе распределения по критерию Пирсона". В ячейках A27:G36 будет расположена таблица,

Х помогающая рассчитать значение критерия  $\chi^2_{\text{расч}} = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$ .

С 2) Подпишите столбцы таблицы в строке 27: в ячейке A27: "[xi;"; в ячейке B27 "xi+1)"; в ячейке C27: "ni"; в ячейке D27: "pi"; в ячейке E27: "n\*pi"; в ячейке F27: "ni-npi "; в ячейке G27: "(ni-npi)^2"; в ячейке H27: "(ni-npi)^2/ni"; в ячейке I27: "ni^2/ni".

Е 3) Запишите в ячейки A28:B35 интервалы группировки, задав в ячейке A28 формулу =A17 и протянув ее на остальные ячейки. Аналогично скопируйте в массив C28:C35 частоты из массива E17:E24.

Л 4) **Помните**, что при использовании критерия  $\chi^2$  Пирсона интервалы числом наблюдений  $n_i < 5$  объединяют с соседними. Исправьте интервальный статистический ряд в соответствии с этим замечанием. Учтите, что первый интервал нужно продлить до  $-\infty$ , а последний — до  $+\infty$ . В ячейке C36 введите формулу =СУММ(C28:C35) и проконтролируйте: сумма частот должна быть равна объему выборки. Скопируйте эту формулу на ячейки D36, E36, H36, I36.

Х 5) В столбце D вычислите вероятности попадания нормальной случайной величины в соответствующие интервалы. Для этого в ячейке D29 задайте формулу

С =НОРМ.РАСП(B29;\$I\$17;\$I\$21;ИСТИНА)-  
НОРМ.РАСП(A29;\$I\$17;\$I\$21;ИСТИНА) и протяните ее на ячейки D30:D34.

Е Функция  
НОРМ.РАСП(х;среднее;стандартное откл;интегральная)  
вычисляет значение функции нормального распределения

**L**  $F(x) = 0,5 + \Phi\left(\frac{x-a}{\sigma}\right)$ . Здесь  $x$  — значение, для которого вычисляется значение функции, среднее — математическое ожидание  $a$  (задаем выборочное среднее  $\bar{x}$ ), стандартное откл — среднеквадратическое отклонение  $\sigma$  (задаем  $s$ ), интегральная — логическое значение, определяющее форму функции. Для того чтобы получить нужное значение интегральной функции распределения, задаем Интегральная: ИСТИНА. Если задать значение ЛОЖЬ, то получится значение плотности нормального распределения.

**E** Для первого интервала вероятность вычисляется в ячейке D28 как =НОРМ.РАСП(B28;\$I\$17;\$I\$21;ИСТИНА), для последнего — в ячейке D34 как =1-НОРМ.РАСП(A34;\$I\$17;\$I\$21;ИСТИНА). В ячейке D36 проконтролируйте, что сумма вероятностей равна 1.

**C** 6) В столбцах E, F, G, H, I вычислите для каждого интервала значения  $np_i$ ,

**L**  $n_i - np_i, (n_i - np_i)^2, \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}, \frac{n_i^2}{np_i}$  и посчитайте соответствующие суммы:

$$\sum_{i=1}^k np_i = n; \quad \chi_{\text{расч}}^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}; \quad \sum_{i=1}^k \frac{n_i^2}{np_i} = \chi_{\text{расч}}^2 + n.$$

**E** 7) Вычислите критическое значение  $\chi_{\text{крит}}^2 = \chi_{\alpha; k-r-1}^2$ , где  $k$  — число интервалов группировки после объединения малочисленных с соседними,  $r = 2$ , поскольку при расчете теоретических вероятностей использовались две полученные по выборке оценки  $\bar{x}$  и  $s$  параметров нормального распределения. Для этого в ячейке E37 запишите значение  $k - r - 1$  с учетом объединения интервалов, а в ячейке H37 найдите  $\chi_{\text{крит}}^2$  по формуле =ХИ2.ОБР.ПХ(0,05;E37).

**C** 8) Сделайте вывод о соответствии или несоответствии проверяемой гипотезы экспериментальным данным при заданном уровне значимости.