



厦门大学《微积分 II-1》课程期末答案

试卷类型：(理工类 A 卷) 考试日期 2018. 1. 17

得 分	
评阅人	

一、求下列不定积分 (每小题 8 分, 共 24 分) .

1. $\int \frac{\sin(\ln x)}{x} dx$

2. $\int x \cos 2x dx$

3. $\int \frac{1}{x\sqrt{1-x^2}} dx$

解: 1. $\int \frac{\sin(\ln x)}{x} dx = \int \sin(\ln x) d(\ln x) = -\cos(\ln x) + C$ --- 第一步 6 分, 第二步 2 分

2. $\int x \cos 2x dx = \frac{1}{2} \int x d \sin(2x) = \frac{1}{2} x \sin 2x - \frac{1}{2} \int \sin 2x dx$
 (每一步 2 分, 共 8 分)
 $= \frac{1}{2} x \sin 2x - \frac{1}{4} \int \sin 2x d(2x) = \frac{1}{2} x \sin 2x + \frac{1}{4} \cos 2x + C$

3. 作代换 $x = \sin t$ $t \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 则 $dx = \cos t dt$, 于是

$$\int \frac{1}{x\sqrt{1-x^2}} dx = \int \frac{1}{\sin t \cos t} \cos t dt = \int \csc t dt$$

(每一步 2 分, 共 8 分)

$$= \ln |\csc t - \cot t| + c = \ln \left| \frac{1}{x} - \frac{\sqrt{1-x^2}}{x} \right| + c = \ln \left| \frac{1-\sqrt{1-x^2}}{x} \right| + c$$

二、求下列定积分 (每小题 8 分, 共 16 分) .

得 分	
评阅人	

1. $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \cos x (1 + \sin 2x) dx$

2. $\int_0^1 e^{\sqrt{1-x}} dx$

解: 1. $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \cos x (1 + \sin 2x) dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos x dx = 2 \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \sqrt{2}$

---把积分开写成两个积分的形式, 给 2 分; 只算对余弦函数求积分部分给 5 分, 全算对给 8 分

2. 令 $t = \sqrt{1-x}$, 则 $x = 1-t^2$, $dx = -2t dt$, 于是 当 $x=0$ 时, $t=1$, 当 $x=1$ 时, $t=0$, 所以

$$\int_0^1 e^{\sqrt{1-x}} dx = -\int_1^0 2te^t dt = 2 \int_0^1 te^t dt = 2(te^t \Big|_0^1 - \int_0^1 e^t dt) = 2(e - e^t \Big|_0^1) = 2$$

---2 分, 若是积分上下限没直接写, 下面运算中写了也给 2 分

----第一个等式与前面“换元论述”总共给 2 分；第二到第四个等式分别给 2 分，共 8 分

得 分	
评阅人	

三、求下列函数极限（每题 8 分，共 24 分）.

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\arctan \frac{1}{n} + \arctan \frac{2}{n} + \cdots + \arctan \frac{n}{n} \right)$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \arcsin t dt}{\sin^4 x}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{x^3}$$

解：1. 原式 = $\int_0^1 \arctan x dx = x \arctan x \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{x}{x^2+1} dx = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{d(x^2+1)}{x^2+1}$
 $= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln(x^2+1) \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln 2$ 第一步 4 分，以后每步 1 分

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \arcsin t dt}{\sin^4 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \arcsin t dt}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin(x^2) 2x}{4x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin(x^2)}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2}$$

第一步 2 分，第二步 4 分，以后每步 1 分

$$3. Q e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + o(x^3) \quad \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + o(x^3)\right) \left(x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)\right) - x(1+x)}{x^3}$$

第一步 6 分，其中每

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + x^2 + \frac{x^3}{2!} - \frac{x^3}{3!} + o(x^3) - x(1+x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^3}{3} + o(x^3)}{x^3} = \frac{1}{3}$$

个展开 3 分，以后每步 1 分。

注：也可用洛必达法则计算

得 分	
评阅人	

四、(8 分) 设方程 $x - \int_1^{y+x} e^{-u^2} du = 0$ 确定了 y 是 x 的函数，求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}$ 。

解：对方程 $x - \int_1^{y+x} e^{-u^2} du = 0$ 两边对 x 求导得：

$$1 - e^{-(y+x)^2} (y' + 1) = 0 \text{ -----4 分}$$

将 $x = 0$ 代入原方程，得到： $\int_1^{y(0)} e^{-u^2} du = 0$ ，从而 $y(0) = 1$ -----7 分

$$\text{则 } 1 - e^{-1} (1 + y'(0)) = 0; \text{ 所以 } y'(0) = e - 1 \text{ ----8 分}$$

第一步 4 分

得 分	
评阅人	

五、(8 分) 求函数 $f(x) = 3x^4 - 4x^3 + 1$ 的单调区间以及极值.

解: $y' = 12x^3 - 12x^2 = 12x^2(x - 1)$, -----1 分 令 $y' = 0$, 解得

$x = 0, x = 1$ 。-----2 分 列表:

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 1)$	1	$(1, +\infty)$
$f'(x)$	-	0	-	0	+
$f(x)$	单调减	不是极值点	单调减	极小值 0	单调增

-----7 分

所以, $f(x)$ 的单调增加区间为 $(1, +\infty)$; 单调增加区间为 $(-\infty, 0)$, $(0, 1)$ (或合并区间成 $(-\infty, 1)$). 在

$x = 1$ 处取得极小值 $f(1) = 0$ 。-----8 分

得 分	
评阅人	

六、(8 分) 求抛物线方程 $y^2 = 2ax$ 的曲率。(8 分)

解: 对抛物线方程 $y^2 = 2ax$ 两边关于 x 求导

$$2yy' = 2a \Rightarrow y' = \frac{a}{y}, \text{-----2 分}$$

$$y'' = -\frac{ay'}{y^2} = -\frac{a^2}{y^3}$$

-----5 分

$$\text{则 } k = \left| \frac{y''}{(1 + y'^2)^{3/2}} \right| = \frac{a^2}{(a^2 + y^2)^{3/2}} = \frac{a^2}{(a^2 + 2ax)^{3/2}} \text{-----8 分}$$

注: 把 y 看作自变量也能得到相同的答案 $(\frac{a^2}{(a^2 + y^2)^{3/2}})$. 把 x 看作自变量将原方程分成两个函数分别求导

也能得到相同答案 $(\frac{a^2}{(a^2 + 2ax)^{3/2}})$

得 分	
评阅人	

七、(6 分) 计算 $\frac{d^2}{dx^2} \int_0^x tf(x-t)dt$, 其中 $f(x)$ 是连续函数。

解: 令 $x-t=u$, 则 $t=x-u$ -----1 分

当 $t=0$ 时, $u=x$; 当 $t=x$ 时, $u=0$

所以 $\int_0^x tf(x-t)dt = -\int_x^0 (x-u)f(u)du = x\int_0^x f(u)du - \int_0^x uf(u)du$ ---2 分

故 $\frac{d}{dx}\int_0^x tf(x-t)dt = \frac{d}{dx}[x\int_0^x f(u)du - \int_0^x uf(u)du] = \int_0^x f(u)du + xf(x) - xf(x) = \int_0^x f(u)du$ ---2 分

$\frac{d^2}{dx^2}\int_0^x tf(x-t)dt = \frac{d}{dx}\int_0^x f(u)du = f(x)$ ---1 分

得 分	
评阅人	

八、（6 分）设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，且单调增加，证明：

$$(a+x)\int_a^x f(t)dt < 2\int_a^x tf(t)dt, \quad x > a.$$

证明：作辅助函数 $F(x) = (a+x)\int_a^x f(t)dt - 2\int_a^x tf(t)dt$ ， ---2 分

因为 $F'(x) = \int_a^x f(t)dt + (a+x)f(x) - 2xf(x)$

$$= \int_a^x f(t)dt - (x-a)f(x)$$

$$= \int_a^x [f(t) - f(x)]dt$$

$$< 0$$

---5 分

故 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调减少，

所以当 $x > a$ 时， $F(x) = (a+x)\int_a^x f(t)dt - 2\int_a^x tf(t)dt < F(a) = 0$ ---6 分