

1.

$$x^2 - 2\pi x + \ln 3 = 0$$

$$\Delta(\pi^*) = 0.5 \cdot 10^{-2}, \quad \Delta(\ln 3^*) = 0.5 \cdot 10^{-2}$$

$$D = (2\pi)^2 - 4\ln 3 > 0$$

$$x_{1,2} = \frac{2\pi \pm \sqrt{(2\pi)^2 - 4\ln 3}}{2} = \pi \pm \sqrt{\pi^2 - \ln 3}$$

НЕХАЙ $\ln 3 = a$:

$$f(\pi, a) = \pi + \sqrt{\pi^2 - a} \quad - \text{бі́льший корінь}$$

$$\frac{\partial f}{\partial \pi} = 1 + \frac{\pi}{\sqrt{\pi^2 - a}}$$

$$\frac{\partial f}{\partial a} = -\frac{1}{2\sqrt{\pi^2 - a}}$$

ПОРАХУЄМО ПОХІДНІ

$$\left| \frac{\partial f}{\partial \pi} \right| = \left| 1 + \frac{3.1416}{2.962} \right| \approx 2.061, \quad \left| \frac{\partial f}{\partial a} \right| = \left| -\frac{1}{2 \cdot 2.962} \right| = 0.1687$$

$$\Delta(x) = \left| \frac{\partial f}{\partial \pi} \right| \Delta(\pi) + \left| \frac{\partial f}{\partial a} \right| \Delta(a) =$$

$$\approx 2.061 \cdot 0.005 + 0.1687 \cdot 0.005 \approx 0.010305 + 0.0008435 \approx 0.0111$$

НАБЛИЖЕНЕ ЗНАЧЕННЯ КОРЕННЯ: $x = 3.1416 + 2.962 = 6.1036$

ВІДНОСНА ПОХИБКА $\delta(x) = \frac{\Delta(x)}{|x|} \cdot 100\% = \frac{0.0111}{6.1036} \cdot 100\% \approx 0.182\%$

ВІДВ.: $\Delta(x) \approx 0.011$, $\delta(x) \approx 0.18\%$

2.

$$x_1 = -5.1621$$

$$x^4 + 4x^3 - 160$$

Рівняння має 2 корені:

$$x_2 = 2.8545$$

$$\varepsilon = 0.004$$

$$f(-6) = (-6)^4 + 4(-6)^3 - 160 = 212 > 0$$

$$f(-5) = (-5)^4 + 4(-5)^3 - 160 = -35, \text{ отже } x^* \in [-6, -5]$$

Знайдемо m_1 і M_1

$$f'(x) = 4x^3 + 12x^2, \quad m_1 = \min_{x \in [-6, -5]} |f'(x)| = |f'(-5)| = 200$$

$$M_1 = \max_{x \in [-6, -5]} |f'(x)| = |f'(-6)| = 432$$

$$\text{Оптимальний параметр: } \gamma_0 = \frac{2}{M_1 + m_1} = \frac{2}{432 + 200} \approx 0.00316$$

$$\text{Оскільки } f'(x) < 0, \text{ то } x_{n+1} = x_n + \gamma_0 f(x_n)$$

$$\text{Беремо правий кінець відрізка } x_0 = -5$$

Ітерація 1:

$$x_1 = x_0 + \gamma_0 f(x_0) = -5 + \frac{1}{316} \cdot (-35) \approx -5.1108$$

$$|x_1 - x_0| = |-5.1108 - (-5)| = 0.1108 > \varepsilon - \text{НЕ виконується}$$

Ітерація 2

$$x_2 = x_1 + \gamma_0 f(x_1) = -5.1108 + \frac{1}{316} \cdot (-11.72) \approx -5.1429$$

$$|x_2 - x_1| = |-5.1429 - (-5.1108)| = 0.0321 > \varepsilon - \text{НЕ виконується}$$

Умова збіжності:

$$\frac{2}{M_1} \approx 0.00463, \quad 0 < \gamma_0 < \frac{1}{316} \approx 0.00316 < 0.00463 = \frac{2}{M_1}$$

Умова збіжності виконується

$$3. A = \begin{pmatrix} -1 & a & 0 \\ a & -b & a \\ 0 & a & -1 \end{pmatrix}$$

За критерієм збіжності:

$$\begin{vmatrix} -\lambda & a & 0 \\ a & -b\lambda & a \\ 0 & a & -\lambda \end{vmatrix} = 0, \det = 2a^2\lambda^2 - b\lambda^3 = 0$$

$$2a^2\lambda^2 - b\lambda^3 = 0$$

$$\lambda^2(2a^2 - b\lambda) = 0$$

$$\lambda^2 = 0 - \text{ігноруємо}$$

$$2a^2 - b\lambda = 0$$

$$2a^2 = b\lambda$$

$$\lambda = \frac{2a^2}{b}$$

Для збіжності потрібно $|\lambda| < 1$, отже

$$\left| \frac{2a^2}{b} \right| < 1 \Rightarrow \text{область збіжності}$$

4. $f(x) = e^{1+x}$, $x \in [1, 4]$, $\varepsilon = 10^{-3}$

$$|f(x) - L_n(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{(b-a)^{n+1}}{2^{n+1}}$$

Знайдемо $n+1$ похідну: M_{n+1} :

$$f'(x) = e^{1+x}, \quad f''(x) = e^{1+x}, \quad \dots, \quad f^{(k)}(x) = e^{1+x} \quad \forall k$$

Тому $f^{(n+1)}(x) = e^{1+x}$, $M_{n+1} = \max_{x \in [1, 4]} |e^{1+x}| = e^5$

Оцінка похибки

$$|f(x) - L_n(x)| \leq \frac{e^5}{(n+1)!} \cdot \frac{5^{n+1}}{2^{n+1}} \leq 10^{-3}$$

Потрібно підібрати найменше n , для якого похибка виконується:

при $n=8$ похибка $\approx 6 \cdot 10^{-3} > 10^{-3}$ - не підходить

при $n=9$ $\approx 7.6 \cdot 10^{-4} < 10^{-3}$ - підходить,

отже мінімальне $n=9$.

Тоді число Чебишовських вузів $n+1 = 10$

5. $x_0 = -4$, $x_1 = -1$, $x_2 = 1$, пром. мох $[-4, 1]$

$$p(x) = x$$

$$\int_{-4}^1 x f(x) dx \approx C_0 f(-4) + C_1 f(-1) + C_2 f(1)$$

$$\text{Обчислимо } w(x) = (x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) = (x + 4)(x + 1)(x - 1)$$

$$~~w(x) = x^3 - 3x^2 - 4x - 4~~$$

$$w'(x_0) = w'(-4) = (-4 + 1)(-4 - 1) = 15$$

$$w'(x_1) = w'(-1) = (-1 + 4)(-1 - 1) = -6$$

$$w'(x_2) = w'(1) = (1 + 4)(1 + 1) = 10$$

Знайдемо коефіцієнти C_0, C_1, C_2 :

$$C_0 = \int_{-4}^1 x \cdot \frac{(x+1)(x-1)(x+4)}{(x+4) \cdot 15} dx = \frac{1}{15} \int_{-4}^1 (x^3 - x) dx =$$

$$= \frac{1}{15} \cdot \left(\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_{-4}^1 = 3.75$$

$$C_1 = \int_{-4}^1 x \cdot \frac{(x+4)(x-1)}{-6} dx = -\frac{1}{6} \int_{-4}^1 (x^3 + 3x^2 - 4x) dx$$

$$= -\frac{1}{6} \left(\frac{x^4}{4} + \frac{3x^3}{3} - 4x \right) \Big|_{-4}^1 = -5 \frac{5}{24} \approx -5.21$$

$$C_2 = \int_{-4}^1 x \cdot \frac{(x+4)(x+1)}{10} dx = \frac{1}{10} \int_{-4}^1 (x^3 + 5x^2 + 4x) dx =$$

$$= \frac{1}{10} \left(\frac{x^4}{4} + \frac{5x^3}{3} + 2x^2 \right) \Big|_{-4}^1 \approx 2.43$$

В-дб: Квадратурна формула: $\int_{-4}^1 x f(x) dx \approx$
 $\approx 3.75 f(-4) - 5.21 f(-1) + 2.43 f(1)$