

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

Лабораторна робота №5
Чисельні методи в інформатиці
“Сплайн”
Варіант №4

Виконав студент групи ІПС-31
Міцкевич Костянтин Олександрович

Київ — 2025

Постановка задачі

1. Побудувати кубічний сплайн для функції $x^6 + 2x^5 + 3x^4 - 3$ на проміжку $[3..7]$ за точками $x = 3, 5, 7$. Спробувати доповнити систему рівнянь значенням справжньої похідної (другої для кубічного сплайну) функції на краях замість нуля.
2. Побудувати кусково-лінійну та кусково-квадратичну інтерполяцію для цієї ж функції за тими ж точками.

Теоретичні відомості та обґрунтування

Кусково-лінійна інтерполяція:

Якщо побудувати поліном першого степеня $L_1^i(x)$ на кожному проміжку $[x_{i-1}; x_i]$, $i = \overline{1, n}$, то отримаємо кусково-лінійну інтерполяцію на $[x_0; x_n]$. Розглянемо поліном першого степеня за вузлами x_{i-1} та x_i :

$$L_1^i(x) = \frac{f(x_{i-1})(x_i - x) + f(x_i)(x - x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}}$$

Оцінимо похибку інтерполяції, врахуємо, що:

$$h_i = x_i - x_{i-1}, \quad i = \overline{1, n}, \quad M_2^i = \max_{x \in [x_{i-1}, x_i]} |f''(x)|$$

$$\begin{array}{c} h_i \\ \text{-----} \\ x_{i-1} \quad th_i \quad x \quad x_i \end{array} \quad t \in [0; 1]$$

$$x - x_{i-1} = t * h_i;$$

$$x - x_i = x - (x_{i-1} + h_i) = x - x_{i-1} - h_i = t * h_i - h_i = h_i(t - 1);$$

$$|f(x) - L_1^i(x)| \leq \frac{M_2^i}{2!} |(x - x_{i-1})(x - x_i)| \leq \frac{M_2^i}{2} |t * h_i * h_i * (t - 1)| = \frac{M_2^i}{2} |h_i^2 * t(t - 1)| = \frac{M_2^i}{2} |h_i^2 * g(t)|$$

Для оцінки зверху знайдемо екстремуми $g(t) = t(t - 1)$:

$$g'(t) = 2t - 1, \quad t = \frac{1}{2}, \quad g(0) = 0, \quad g(1) = 0, \quad g\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{4}$$

Врахуємо, що $h = \max_{i \leq n} h_i$, $M_2 = \max_{x \in [x_0; x_n]} |f''(x)|$, тоді похибка кусково лінійної інтерполяції:

$$|f(x) - L_1^i(x)| \leq \frac{M_2^i}{2} |h_i^2 * g(t)| \leq \frac{M_2}{2!} \left| h^2 \left(-\frac{1}{4}\right) \right| \leq \frac{M_2 h^2}{8}$$

Отже, для оцінки похибки при наближенні функції за допомогою кусково лінійної інтерполяції використовують формулу:

$$|f(x) - L_1(x)| \leq \frac{M_2 h^2}{8}$$

Введемо систему функцій:

$$\begin{aligned} & 0, \quad x \leq x_{i-1} \\ \phi_i(x) &= \frac{x - x_{i-1}}{x_i - x_{i-1}}, \quad x_{i-1} \leq x \leq x_i \\ & \frac{x_{i+1} - x}{x_{i+1} - x_i}, \quad x_i \leq x \leq x_{i+1} \\ & 0, \quad x \geq x_{i+1} \\ \phi_0(x) &= \frac{x_1 - x}{x_1 - x_0}, \quad x_0 \leq x \leq x_1 \\ & 0, \quad x \geq x_1 \\ \phi_n(x) &= \frac{x - x_{n-1}}{x_n - x_{n-1}}, \quad x_{n-1} \leq x \leq x_n \\ & 0, \quad x \leq x_{n-1} \end{aligned} \quad i = \overline{1, n-1}$$

Тоді для кусково-лінійної інтерполяції зручно використовувати формулу:

$$\phi_1(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) \phi_i(x)$$


Теорема. Для $f(x) \in C^2[a, b]$, що задана своїми значеннями $f(x_i), i=\overline{0, n}$ має місце оцінка:
$$\|f^{(k)}(x) - \phi_1^{(k)}(x)\|_{C[a,b]} \leq 2 M_2 * |h|^{2-k}, \quad k=0, 1, \quad \text{де}$$
$$|h| = \max_{i=\overline{1, n}} h_i, \quad h_i = x_i - x_{i-1}$$

Кусково-квадратична інтерполяція:

Покладемо сталий крок $h = x_i - x_{i-1}$, $\forall i: i = \overline{1, n}$. Якщо побудувати поліном 2-го степеня за вузлами x_{i-1} , x_i , x_{i+1} , то отримаємо кусково-квадратичну інтерполяцію на $[x_0; x_n]$:

$$L_2^i(x) = f(x_{i-1}) \frac{(x-x_i)(x-x_{i+1})}{2h^2} - f(x_i) \frac{(x-x_{i-1})(x-x_{i+1})}{h^2} + f(x_{i+1}) \frac{(x-x_{i-1})(x-x_i)}{2h^2}$$

Оцінимо похибку інтерполяції, врахуємо, що:



$$x - x_i = t * h; \quad x - x_{i-1} = x - (x_i - h) = th + h = h(t + 1);$$

$$x - x_{i+1} = x - (x_i + h) = th - h = h(t - 1);$$

$$M_3^i = \max_{x \in [x_{i-1}, x_{i+1}]} |f'''(x)|; \quad M_3 = \max_{x \in [x_0, x_n]} |f'''(x)|;$$

$$|f(x) - L_2^i(x)| \leq \frac{M_3^i}{3!} |(x - x_{i-1})(x - x_i)(x - x_{x+1})| \leq \frac{M_3^i}{6} |h(t+1)thh(t-1)| = \frac{M_3^i}{6} |h^3(t^3 - t)| = \frac{M_3^i}{6} |h^3 g(t)|$$

Для оцінки зверху знайдемо екстремуми функції $g(t)$:

$$g(t)=t^3-t; \quad g'(t)=3t^2-1=0; \quad t_1=\frac{-1}{\sqrt{3}} \notin [0,1]; \quad t_2=\frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$g(0)=0; \quad g(1)=0; \quad g\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)=\frac{-2}{3\sqrt{3}}$$

Похибка кусково-квадратичної інтерполяції:

$$|f(x) - L_2^i(x)| \leq \frac{M_3}{6} |h^3 g(t)| \leq \frac{M_3}{6} \left| h^3 \left(\frac{-2}{3\sqrt{3}} \right) \right| \leq \frac{M_3}{9\sqrt{3}} h^3$$

$$|f(x) - L_2(x)| \leq \frac{M_3}{9\sqrt{3}} h^3$$

Інтерполяційний природний кубічний сплайн:

Інтерполяційним природним кубічним сплайном називається поліном, для якого виконуються умови:

1) $s(x)$ – поліном степеня 3 для $x \in [x_{i-1}, x_i]$, $i = \overline{1, n}$;

2) $s(x) \in C_{[a, b]}^2$

3) $s(x_i) = f(x_i)$, $i = \overline{1, n}$;

4) $s''(a) = s''(b) = 0$ – умова природності.

Зауваження. Для побудови інтерполяційного кубічного сплайну можна замість умови 4) використовувати інші умови, але тоді сплайн не буде природним: $s''(a) = A$; $s''(b) = B$ або $s'(a) = A$; $s'(b) = B$ бо умови періодичності: $s(a) = s(b)$, $s'(a) = s'(b)$, $s''(a) = s''(b)$.

Розглянемо формули для побудови інтерполяційного природного кубічного сплайну s_i на проміжку $[x_{i-1}, x_i]$:

$$s_i = a_i + b_i(x - x_i) + \frac{c_i}{2}(x - x_i)^2 + \frac{d_i}{6}(x - x_i)^3, \quad c_0 = c_n = 0$$

де c_i знаходяться з тридіагональної системи лінійних алгебраїчних рівнянь:

$$h_i c_{i-1} + 2c_i(h_i + h_{i+1}) + h_{i+1} c_{i+1} = 6 \left(\frac{f_{i+1} - f_i}{h_{i+1}} - \frac{f_i - f_{i-1}}{h_i} \right)$$

решта коефіцієнтів знаходяться за формулами:

$$a_i = f_i; \quad b_i = \frac{h_i}{2} c_i - \frac{h_i^2}{6} d_i + \frac{f_i - f_{i-1}}{h_i}; \quad d_i = \frac{c_i - c_{i-1}}{h_i}$$

Хід роботи

Побудову кубічного природнього сплайну розпочнемо з пошуку значень функції в точках x_i , а також обрахуємо h_i :

```
• Вхідні дані
і Функція:  $f(x) = x^6 + 2x^5 + 3x^4 - 3$ 
  Вузлові точки  $x$ : [3.000000, 5.000000, 7.000000]
  Значення функції  $y$ : [1455.000000, 23747.000000, 158463.000000]
|
f(x[0]) = f(3.00): 1455.000000
f(x[1]) = f(5.00): 23747.000000
f(x[2]) = f(7.00): 158463.000000
```

ЕТАП 1: Обчислення кроків h_i

```
і Обчислюємо відстані між сусідніми вузлами
   $h[1] = x[1] - x[0] = 5.0 - 3.0 = 2.000000$ 
   $h[2] = x[2] - x[1] = 7.0 - 5.0 = 2.000000$ 
✓ Обчислено 2 значень  $h_i$ 
```

Наступним кроком побудуємо систему для знаходження усіх c_i . Оскільки в нас 3 точки і $c_1 = c_3 = 0$, то у нас буде лише одне рівняння для знаходження c_2 :

ЕТАП 2: Формування системи рівнянь для c_i

```
і Будуємо тридіагональну систему  $Ac = B$ 

• Рівняння 0:
   $2.0000 \cdot c[0] + 8.0000 \cdot c[1] + 2.0000 \cdot c[2]$ 
   $6 \cdot ((158463.00 - 23747.00) / 2.00 - (23747.00 - 1455.00) / 2.00) = 337272.000000$ 

• Розв'язання системи методом Гауса
✓ Систему успішно розв'язано
```

ЕТАП 3: Знайдені коефіцієнти c_i

```
c[0]: 0.00000000
c[1]: 42159.00000000
c[2]: 0.00000000
```

Далі знайдемо коефіцієнти a_i , b_i , d_i за допомогою

$$a_i = f_i; \quad b_i = \frac{h_i}{2} c_i - \frac{h_i^2}{6} d_i + \frac{f_i - f_{i-1}}{h_i}; \quad d_i = \frac{c_i - c_{i-1}}{h_i} :$$

ЕТАП 4: Обчислення решти коефіцієнтів (a , b , d)

• Інтервал [3.00, 5.00]

$a[1] = y[1] = 23747.000000$

$d[1] = (c[1] - c[0]) / h[1] = (42159.000000 - 0.000000) / 2.000000 = 21079.500000$

$b[1] = h[1]/2 \cdot c[1] - h[1]^2/6 \cdot d[1] + (y[1] - y[0])/h[1] = 39252.000000$

• Інтервал [5.00, 7.00]

$a[2] = y[2] = 158463.000000$

$d[2] = (c[2] - c[1]) / h[2] = (0.000000 - 42159.000000) / 2.000000 = -21079.500000$

$b[2] = h[2]/2 \cdot c[2] - h[2]^2/6 \cdot d[2] + (y[2] - y[1])/h[2] = 81411.000000$

✓ Всі коефіцієнти обчислено

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ КОЕФІЦІЄНТІВ

i		x _i		y _i		a _i		b _i		c _i		d _i
0		3.00		1455.00		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000
1		5.00		23747.00		23747.0000		39252.0000		42159.0000		21079.5000
2		7.00		158463.00		158463.0000		81411.0000		0.0000		-21079.5000

Маючи усі потрібні коефієнти можемо побудувати кубічний природний сплайн:

КУБІЧНІ МНОГОЧЛЕНИ СПЛАЙНА

i Представлення у формі: $s_i(x) = p_3 \cdot x^3 + p_2 \cdot x^2 + p_1 \cdot x + p_0$

Інтервал [3.00, 5.00]:

$s_1(x) = 3513.250000 \cdot x^3 - 31619.250000 \cdot x^2 + 91950.750000 \cdot x - 84681.750000$

Інтервал [5.00, 7.00]:

$s_2(x) = -3513.250000 \cdot x^3 + 73778.250000 \cdot x^2 - 435036.750000 \cdot x + 793630.750000$

✓ Природний сплайн успішно побудовано!

Тепер спробуємо побудувати кубічний сплайн замінивши $c_1 = c_3 = 0$ на значення других похідних на границях:

```
i Друга похідна функції:  $f''(x) = 30x^4 + 40x^3 + 36x^2$ 

• Обчислення граничних умов
 $f''(x[0]) = f''(3.00) = 30 \cdot 3.00^4 + 40 \cdot 3.00^3 + 36 \cdot 3.00^2 = 3834.000000$ 
 $f''(x[n]) = f''(7.00) = 30 \cdot 7.00^4 + 40 \cdot 7.00^3 + 36 \cdot 7.00^2 = 87514.000000$ 

• Вхідні дані
i Функція:  $f(x) = x^6 + 2x^5 + 3x^4 - 3$ 
Вузлові точки x: [3.000000, 5.000000, 7.000000]
Значення функції y: [1455.000000, 23747.000000, 158463.000000]

 $f(x[0]) = f(3.00): 1455.000000$ 
 $f(x[1]) = f(5.00): 23747.000000$ 
 $f(x[2]) = f(7.00): 158463.000000$ 
```

За попереднім прикладом шукаємо h_i та будуємо систему для знаходження c_2 :

ЕТАП 1: Обчислення кроків h_i

```
i Обчислюємо відстані між сусідніми вузлами
 $h[1] = x[1] - x[0] = 5.0 - 3.0 = 2.000000$ 
 $h[2] = x[2] - x[1] = 7.0 - 5.0 = 2.000000$ 
✓ Обчислено 2 значень  $h_i$ 
```

ЕТАП 2: Формування системи рівнянь для c_i

```
i Будуємо тридіагональну систему  $Ac = B$ 

• Рівняння 0:
 $2.0000 \cdot c[0] + 8.0000 \cdot c[1] + 2.0000 \cdot c[2]$ 
 $6 \cdot ((158463.00 - 23747.00) / 2.00 - (23747.00 - 1455.00) / 2.00) = 337272.000000$ 
i Застосовано граничну умову на початку:  $s''(x[0]) = 3834.000000$ 
 $B[0] = B[0] - h[1] \cdot d2\_start = 329604.000000$ 
i Застосовано граничну умову в кінці:  $s''(x[n]) = 87514.000000$ 
 $B[n-1] = B[n-1] - h[n] \cdot d2\_end = 154576.000000$ 

• Розв'язання системи методом Гауса
✓ Систему успішно розв'язано
```

ЕТАП 3: Знайдені коефіцієнти c_i

```
 $c[0]: 3834.00000000$ 
 $c[1]: 19322.00000000$ 
 $c[2]: 87514.00000000$ 
```

Далі знайдемо коефіцієнти a_i , b_i , d_i :

ЕТАП 4: Обчислення решти коефіцієнтів (a , b , d)

• Інтервал [3.00, 5.00]

$$a[1] = y[1] = 23747.000000$$

$$d[1] = (c[1] - c[0]) / h[1] = (19322.000000 - 3834.000000) / 2.000000 = 7744.000000$$

$$b[1] = h[1]/2 \cdot c[1] - h[1]^2/6 \cdot d[1] + (y[1]-y[0])/h[1] = 25305.333333$$

• Інтервал [5.00, 7.00]

$$a[2] = y[2] = 158463.000000$$

$$d[2] = (c[2] - c[1]) / h[2] = (87514.000000 - 19322.000000) / 2.000000 = 34096.000000$$

$$b[2] = h[2]/2 \cdot c[2] - h[2]^2/6 \cdot d[2] + (y[2]-y[1])/h[2] = 132141.333333$$

✓ Всі коефіцієнти обчислено

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ КОЕФІЦІЄНТІВ

i	x_i	y_i	a_i	b_i	c_i	d_i
0	3.00	1455.00	0.0000	0.0000	3834.0000	0.0000
1	5.00	23747.00	23747.0000	25305.3333	19322.0000	7744.0000
2	7.00	158463.00	158463.0000	132141.3333	87514.0000	34096.0000

Знову ж таки маючі усі потрібні коефієнти можемо побудувати кубічний сплайн:

КУБІЧНІ МНОГОЧЛЕНИ СПЛАЙНА

i Представлення у формі: $s_i(x) = p_3 \cdot x^3 + p_2 \cdot x^2 + p_1 \cdot x + p_0$

Інтервал [3.00, 5.00]:

$$s_1(x) = 1290.666667 \cdot x^3 - 9699.000000 \cdot x^2 + 25495.333333 \cdot x - 22588.000000$$

Інтервал [5.00, 7.00]:

$$s_2(x) = 5682.666667 \cdot x^3 - 75579.000000 \cdot x^2 + 354895.333333 \cdot x - 571588.000000$$

✓ Сплайн з граничними умовами успішно побудовано!

Тепер можемо перейти до побудови кусково-лінійної та кусково-квадратичної інтерполяції. Формули для їх знаходження:

$$L_1^i(x) = \frac{f(x_{i-1})(x_i - x) + f(x_i)(x - x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}}$$

$$L_2^i(x) = f(x_{i-1}) \frac{(x - x_i)(x - x_{i+1})}{2h^2} - f(x_i) \frac{(x - x_{i-1})(x - x_{i+1})}{h^2} + f(x_{i+1}) \frac{(x - x_{i-1})(x - x_i)}{2h^2}$$

Починаємо пошук кусково-лінійної інтерполяції:

КУСКОВО-ЛІНІЙНА ІНТЕРПОЛЯЦІЯ

i Формула: $L1^i(x) = (f_{\{i-1\}} \cdot (x_i - x) + f_i \cdot (x - x_{\{i-1\}})) / (x_i - x_{\{i-1\}})$

i Спрощена форма: $L1^i(x) = a \cdot x + b$

• Інтервал [3.00, 5.00]

[Крок 1/2] Обчислення коефіцієнта а (кутовий коефіцієнт)

$$a = (f_1 - f_0) / (x_1 - x_0) = (23747.000000 - 1455.000000) / (5.00 - 3.00) = 11146.000000$$

[Крок 2/2] Обчислення коефіцієнта b (вільний член)

$$b = (f_0 \cdot x_1 - f_1 \cdot x_0) / (x_1 - x_0) = -31983.000000$$

$$b = (1455.000000 \cdot 5.00 - 23747.000000 \cdot 3.00) / 2.00 = -31983.000000$$

$$\text{Результат: } L1^1(x) = 11146.000000 \cdot x - 31983.000000$$

• Інтервал [5.00, 7.00]

[Крок 1/2] Обчислення коефіцієнта а (кутовий коефіцієнт)

$$a = (f_2 - f_1) / (x_2 - x_1) = (158463.000000 - 23747.000000) / (7.00 - 5.00) = 67358.000000$$

[Крок 2/2] Обчислення коефіцієнта b (вільний член)

$$b = (f_1 \cdot x_2 - f_2 \cdot x_1) / (x_2 - x_1) = -313043.000000$$

$$b = (23747.000000 \cdot 7.00 - 158463.000000 \cdot 5.00) / 2.00 = -313043.000000$$

$$\text{Результат: } L1^2(x) = 67358.000000 \cdot x - 313043.000000$$

✓ Кусково-лінійну інтерполяцію виконано!

І нарешті знайдемо кусково-квадратичну інтерполяцію:

КУСКОВО-КВАДРАТИЧНА ІНТЕРПОЛЯЦІЯ

```
i Крок інтерполяції: h = 2.00
i Формула Лагранжа для трьох точок:
i  $L_2^i(x) = f_{i-1} \cdot (x-x_i) \cdot (x-x_{i+1}) / (2h^2) - f_i \cdot (x-x_{i-1}) \cdot (x-x_{i+1}) / h^2 + f_{i+1} \cdot (x-x_{i-1}) \cdot (x-x_i) / (2h^2)$ 

• Інтервал [3.00, 7.00] (охоплює 3 вузли)
[Крок 1/4] Розкриття першого терма
    term1 =  $f_0 \cdot (x-5.00) \cdot (x-7.00) / (2h^2) = 181.87500000 \cdot [(x-5.00) \cdot (x-7.00)]$ 
[Крок 2/4] Розкриття другого терма
    term2 =  $-f_1 \cdot (x-3.00) \cdot (x-7.00) / h^2 = -5936.75000000 \cdot [(x-3.00) \cdot (x-7.00)]$ 
[Крок 3/4] Розкриття третього терма
    term3 =  $f_2 \cdot (x-3.00) \cdot (x-5.00) / (2h^2) = 19807.87500000 \cdot [(x-3.00) \cdot (x-5.00)]$ 
[Крок 4/4] Сумування та спрощення
    Спрощений поліном:  $L_2^1(x) = 14053.000000 \cdot x^2 - 101278.000000 \cdot x + 178812.000000$ 
i Розподіл коефіцієнтів:
    a2 (при x2) = 14053.00000000
    a1 (при x1) = -101278.00000000
    a0 (вільний) = 178812.00000000
✓ Кусково-квадратичну інтерполяцію виконано!
```