

MSc - Statisztika
Házi feladat

Kiss Dániel Márk

2023

Chapter 1

1. feladat

Az elmúlt évek kutatásai arra irányultak, hogy felmérjék a mosolygós emoji használatának hatását a digitális kommunikációban és a felhasználók boldogságszintjére. Az alábbi adatokat gyűjtötték össze: bead11.1.csv.

Lineáris regressziós modellt szeretnénk felírni, melyben az eredményváltozó a boldogságszint, míg a magyarázó változók az üzenet hossza és a mosolygós emoji száma.

1.1 a) feladat

Beccsöld meg és értelmezd a lineáris regresszió paramétereit, teszteld le, szignifikánsak-e a magyarázó változók! (5%-os szignifikanciaszinten)

Megoldás: A bead11.1.csv fájl négy oszlopot tartalmaz: "Sorszám," "Üzenet hossza," "Mosolygós emoji száma," és "Boldogságszint." A lineáris regresszió célja az, hogy a függő változót (pl. Boldogságszint) lineáris kapcsolatban álló magyarázó változókkal (pl. Üzenet hossza, Mosolygós emoji száma) modellezze.

A lineáris regresszió modellje általánosan a következő alakú: $Y = B_0 + B_1X_1 + B_2X_2 + E$.

Kimenet értelmezése: Az alábbi kimenet a Figure 1.1-en látható. Az R-négyzet érték azt

```
Stat-HF on / main [1] via v3.9.6 (.venv) on (eu-north-1)
> python feladat01.py

OLS Regression Results
=====
Dep. Variable:      Boldogságszint      R-squared:      0.870
Model:              OLS                  Adj. R-squared:  0.865
Method:             Least Squares        F-statistic:    157.5
Date:               Wed, 06 Dec 2023      Prob (F-statistic): 1.40e-21
Time:               11:57:13              Log-Likelihood:  7.2608
No. Observations:   50                    AIC:           -8.522
Df Residuals:       47                    BIC:           -2.786
Df Model:           2
Covariance Type:    nonrobust
=====
                    coef    std err          t      P>|t|      [0.025    0.975]
-----
const                5.2548      0.378      13.886      0.000      4.494      6.016
Üzenet hossza        0.0077      0.005       1.686      0.098     -0.001      0.017
Mosolygós emoji száma 0.3069      0.070       4.388      0.000      0.166      0.448
=====
Omnibus:            33.845    Durbin-Watson:      1.003
Prob(Omnibus):      0.000    Jarque-Bera (JB):    73.474
Skew:               -2.037    Prob(JB):            1.11e-16
Kurtosis:           7.321    Cond. No.            1.67e+03
=====
```

Figure 1.1: Feladat 1/a kimenet

mutatja, hogy a modell mennyire magyarázza a függő változó (Boldogságszint) változását. Az 0.870 érték azt jelenti, hogy a modell 87%-ban magyarázza a változást. abs(t) kisebb P (szignifikanciaszint): Az egyes együtthatók (const, Üzenet hossza, Mosolygós emoji száma) szignifikanciaszintje. Az értékek alattuk a p-értékeket jelentik. Azok az együtthatók, amelyek p-értéke kevesebb, mint 0.05, szignifikánsak a 0.05 szignifikanciaszinten. Ebben a modellben mind a const, mind a Mosolygós emoji száma szignifikáns, mivel a p-értékük kisebb, mint 0.05. Összességében ez azt jelenti, hogy a

modell jól teljesít a magyarázatokban, és mind a konstans, mind a Mosolygós emoji szám változói szignifikánsan kapcsolódnak a Boldogságszint változóhoz.

1.2 b) feladat

Határozd meg és értelmezd a többszörös determinációs együtthatót!

Megoldás:

A többszörös determinációs együttható (R-négyzet) azt mutatja, hogy a modell mennyire magyarázza a függő változó (Boldogságszint) változását. Az 0.870 érték azt jelenti, hogy a modell 87%-ban magyarázza a változást. Az R érték 0 és 1 közötti értéket vehet fel. Minél közelebb van az 1-hez, annál jobban magyarázza a modell a függő változó (Boldogságszint) változását. Az R-négyzet mellett fontos megjegyezni az "Adj. R-squared" értéket is (itt 0.865), amely korrigálja az R-négyzetet a magyarázó változók számára. Ez különösen fontos, ha több magyarázó változó van a modellben, mivel az R-négyzet hajlamos növekedni a változók számával anélkül, hogy ténylegesen javítaná a modell illeszkedését.

1.3 c) feladat

Teszteld a regressziós modell megbízhatóságát 5%-os szignifikanciaszinten!

Megoldás: A nullhipotézis (H_0) az, hogy van összefüggés az emoji és a boldogságszint között, azaz nincs szignifikáns különbség, az ellenhipotézis az, hogy nincs összefüggés. A nullhipotézis elutasításához a p-értéknek nagyobbnak kell lennie, mint a szignifikanciaszint (5%). Az adott kimenetben a F-statistic értéke 157.5, és a hozzá tartozó p-érték a "Prob (F-statistic)" oszlopban található ($1.46e-21$). Ez az érték rendkívül kicsi, sok nagyságrenddel kisebb, mint 0.05 (5%-os szignifikanciaszint), így elfogadjuk a H_0 nullhipotézist. Ez azt jelenti, hogy a modell összességében szignifikánsan jól illeszkedik adatainkhoz.

1.4 d) feladat

Adj intervallumbecslést 95%-os megbízhatósággal paraméterekre!

Megoldás: Az intervallumok azt mutatják, hogy a konstans érték (const) becslési intervalluma 4.493509 és 6.016082 között van, az Üzenet hossza becslési intervalluma -0.001479 és 0.016810 között van, míg a Mosolygós emoji száma becslési intervalluma 0.166219 és 0.447623 között van.

	0	1
const	4.493509	6.016082
Üzenet hossza	-0.001479	0.016810
Mosolygós emoji száma	0.166219	0.447623

1.5 e) feladat

Készíts előrejelzést az új üzenetek boldogságszintjére, ha az üzenet hossza 130 karakter, és a mosolygós emoji száma 3. Illetve adj ugyanerre 95%-os megbízhatóságú intervallumbecslést is.

Megoldás: Előrejelzés: 7.172034019616269 95%-os megbízhatóságú intervallum: 7.09557490761663 - 7.248493131615907

Ez azt jelenti, hogy az új üzenetek boldogságszintje várhatóan körülbelül 7.2 lesz, és a 95%-os megbízhatóságú intervallum körülbelül 7.1 és 7.2 között lesz.

Chapter 2

2.feladat

A következő kutatás arra irányult, hogy mérje a mosolygós emoji használatának hatását a kommunikációban különböző csoportokban. Az alábbi adatokat gyűjtötték össze: bead11.1.csv.

2.1 a) feladat

Teszteld le, hogy van-e szignifikáns különbség a mosolygós emoji használatának gyakoriságában a különböző csoportokban ($E = 0,05$ szignifikanciaszinten)!

Megoldás:

Mielőtt statisztikai tesztet alkalmazom, megvizsgáltam a normalitást. Ehhez Shapiro-Wilk tesztet használtam. A p-érték alapján meghatározható, hogy az adott csoport normális eloszlású-e vagy sem. A H_0 hipotézis az, hogy az adott csoport normális eloszlású, az ellenhipotézis H_1 az, hogy nem normális eloszlású. A négy csoport közül egyik sem normális eloszlású, mivel a p-érték mindig kisebb, mint 0.05, így a H_0 -t elvetjük.

Ezt követően homogenitást kell ellenőrizni. Ehhez Levene tesztet használtam. A p-érték alapján eldönthetjük, hogy az adott csoportok varianciája azonos-e vagy sem. A H_0 hipotézis az, hogy az adott csoportok varianciája azonos, az ellenhipotézis H_1 az, hogy nem azonos. A teszt eredménye alapján a p-érték mindig nagyobb, mint 0.05, ami azt jelenti, hogy az adott csoportok varianciája azonos, azaz elfogadjuk a H_0 nullhipotézist és homogének az adatok.

Annak ellenére, hogy a 2 előfeltétel nem teljesült elvégeztem a statisztikai próbát. Ahhoz, hogy leellenőrizzem, van-e szignifikáns különbség a mosolygós emoji használatának gyakoriságában a különböző csoportokban, statisztikai tesztet kell alkalmazni. Mivel itt több csoportról van szó, egy analízis varianciát (ANOVA) használtam. A H_0 nullhipotézis az, hogy nincs szignifikáns különbség a mosolygós emoji használatának gyakoriságában a különböző csoportokban, az ellenhipotézis H_1 az, hogy van szignifikáns különbség.

Kimenet értelmezése: Statisztika: 25.558435652569365, p-érték: 5.339953301217143e-14 A H_0 nullhipotézist elvetjük, mivel a p érték sokkal kisebb, mint 0,05 így van szignifikáns különbség a csoportok között a mosolygós emoji használatában.

Chapter 3

3.feladat

A bead11.3.csv file egy felmérés adatait mutatja a mosolygós emojiok használatának változásáról az elmúlt években egy adott online fórumon.

3.1 a) feladat

Készíts idősor diagramot az adatok alapján, majd számold ki a tapasztalati autokorrelációs és parciális autokorrelációs függvényeket.

Megoldás:

3.2 b) feladat

Az adatok transzformációjával és a trend, valamint a szezonális komponensek kiszűrésével kísérletezve illessz különböző idősor modelleket. Teszteld az illeszkedést.

Megoldás:

3.3 c) feladat

Készíts előrejelzést a következő hónapokra várható mosolygós emojiok használatára.

Megoldás:




Figure 3.1: Feladat 3/a kimenetei






Figure 3.2: Feladat 3/a kimenet



(a) Feladat 3/b kimenet



(b) Feladat 3/b kimenet

Figure 3.3: Feladat 3/b kimenetei




Figure 3.4: Feladat 3/c kimenet