#### BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Đinh nghĩa

Phân Ioai

Phân phối xá

Bảng phân phối xá

Hàm phân phôi xác suất

Hàm mật độ xác sư

# BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

BỘ MÔN THỐNG KÊ TOÁN HỌC KHOA TOÁN - TIN HỌC ĐAI HỌC KHOA HỌC TƯ NHIÊN TP.HCM

Tháng 2 năm 2016

# Outline

#### BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Vă Thìn

#### Định nghĩa

Phân phối xác

Bảng phân phối xá suất

suất Hàm mật độ xác suấ

Các tham số đặc trưng

- 1 Dịnh nghĩa
- 2 Phân loại
- 3 Phân phối xác suất
  - Bảng phân phối xác suất
  - Hàm phân phối xác suất
  - Hàm mật độ xác suất
- 4 Các tham số đặc trưng

# Outline

#### BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

. ~

Phân loại

suất Bảng phân phối xác suất Hàm phân phối xác suất

- 1 Dinh nghĩa
- 2 Phân loai
- 3 Phân phối xác suất
  - Bảng phân phối xác suất
  - Hàm phân phối xác suất
  - Hàm mật độ xác suất
- 4 Các tham số đặc trưng

# Biến ngẫu nhiên: Định nghĩa

#### BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văi Thìn

### Định nghĩa

Phan phoi xac suất Bảng phân phối xác suất Hàm phân phối xác suất Hàm mật độ xác suấ

# Định nghĩa 1

Biến ngẫu nhiên X là một ánh xạ từ không gian các biến cố sơ cấp  $\Omega$  vào  $\mathbb{R}$ ,

$$X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$$
 $\omega \longmapsto X = X(\omega)$ 

Người ta thường dùng các chữ cái in hoa  $X, Y, Z, \ldots$  để ký hiệu các biến ngẫu nhiên và các chữ in thường  $x, y, z, \ldots$  để chỉ các giá trị của biến ngẫu nhiên.

# Biến ngẫu nhiên: Ví dụ

#### BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văr Thìn

#### Định nghĩa

Phân Ioại

Phân phối xã uất Bảng phân phối x

Bảng phân phối xác suất Hàm phân phối xác suất Hàm mật độ xác suấ:

#### Ví du 2

Xét phép thử tung hai đồng xu. Không gian mẫu của phép thử này là  $\,$ 

$$\Omega = \{SS, SN, NS, NN\}$$

Gọi X là số mặt ngửa xuất hiện. Khi đó, X là một ánh xạ từ không gian mẫu  $\Omega$  vào  $\mathbb R$  như sau:

$\omega$	SS	NS	SN	NN
$X(\omega)$	0	1	1	2

# Biến ngẫu nhiên: Phân loại

#### BIẾN NGẪU NHIÊN

Iguyễn Vă Thìn

Định nghĩa Phân loại

Phân phối xá suất <sup>Bảng phân phối xá suất</sup>

Hàm phân phối xá suất Hàm mật độ xác s Các tham số Dựa vào miền giá trị của biến ngẫu nhiên mà người ta phân thành 2 loại chính như sau

### Biến ngẫu nhiên rời rạc

Biến ngẫu nhiên được gọi là rời rạc nếu tập hợp các giá trị mà nó có thể nhận là một tập hữu hạn hoặc vô hạn đếm được.

# Biến ngẫu nhiên liên tục

Biến ngẫu nhiên được gọi là liên tục nếu tập hợp các giá trị mà nó nhận được là một khoảng dạng (a,b) hoặc toàn bộ  $\mathbb R$ 

# Outline

#### BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Vă Thìn

Dinh nghĩa

Phân Ioại

Phân phối xác suất Bảng phân phối xác suất Hàm phân phối xác suất 1 Dinh nghĩa

2 Phân loai

3 Phân phối xác suất

- Bảng phân phối xác suất
- Hàm phân phối xác suất
- Hàm mật đô xác suất
- 4 Các tham số đặc trưng

# Biến ngẫu nhiên: Phân loại

#### BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văi Thìn

Định nghĩa Phân loại

> suất Bảng phân phối xác suất Hàm phân phối xác suất Hàm mật độ xác suấ

Các tham

# Ví dụ 3

Tung 1 con xúc sắc cân đối. Gọi X là số chấm xuất hiện thì X là một biến ngẫu nhiên rời rạc vì tập các giá trị mà nó có thể nhận là  $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ .

## Ví dụ 4

Các biến ngẫu nhiên X sau là biến ngẫu nhiên liên tục:

- (a) Chọn ngẫu nhiên một thời điểm trong ngày và đo nhiệt độ không khí (X).
- (b) Chọn ngẫu nhiên một bóng đèn điện tử và đo thời gian hoạt động bình thường của nó (X).
- (c) Chọn ngẫu nhiên một hợp chất hóa học và đo độ pH của nó (X).

# Outline

#### BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văi Thìn

Định nghĩa

#### Phân loại Phân phối xác

Bảng phân phối xác suất Hàm phân phối xác suất

Các tham s đặc trưng

- 1 Dinh nghĩa
- 2 Phân loại
- 3 Phân phối xác suất
  - Bảng phân phối xác suất
  - Hàm phân phối xác suất
  - Hàm mật độ xác suất
- 4 Các tham số đặc trưng

# Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên

Bảng phân phối xác suất

#### BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Và Thìn

Định nghĩa Phân loại

Phân phối xá suất Bảng phân phối xá

Hàm phân phối xá suất Hàm mật độ xác s

Các tham s đặc trưng Để mô tả biến ngẫu nhiên rời rạc X nhận giá trị nào đó với xác suất tương ứng là bao nhiều thì người ta dùng bảng phân phối xác suất. Bảng này có hai dòng như sau

- Dòng thứ nhất là các giá trị mà biến ngẫu nhiên X nhận được.
- Dòng thứ hai là xác suất biến ngẫu nhiên X nhận các giá trị tương ứng.

# Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên

#### BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văr Thìn

Định nghĩa

Phận phối xác

Bảng phân phối xác suất Hàm phân phối xác suất

### Kí hiêu

Cho  $A \subset \mathbb{R}$ . Ta kí hiệu

$$(X \in A) = \{\omega \in \Omega \colon X(\omega) \in A\}$$

Chẳng hạn, ta viết

$$(X = a) = \{\omega \in \Omega \colon X(\omega) = a\}$$

$$(X \le a) = \{\omega \in \Omega \colon X(\omega) \le a\}$$

# Hàm phân phối xác suất: Định nghĩa và tính chất

#### BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văi Thìn

Dịnh nghĩa

Phân phối xác suất

Bảng phân phối xá suất **Hàm phân phối xá**o

Các tham

# Định nghĩa 5

Cho biến ngẫu nhiên X, hàm thực

$$\begin{array}{ccc} F_X: \mathbb{R} & \longrightarrow & [0,1] \\ x & \longmapsto & P(X \leq x) \end{array}$$

được gọi là hàm phân phối xác suất của X.

### Mênh đề 6

Hàm phân phối xác suất  $F(x) \equiv F_X(x)$  có các tính chất sau:

- (i) không giảm:  $x \le y \Rightarrow F(x) \le F(y)$ ,
- (ii) liên tục phải:  $\lim_{x \to x_0^+} F(x) = F(x_0)$  với mọi số thực  $x_0$ ,
- (iii)  $F(-\infty) = \lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$ ,  $F(+\infty) = \lim_{x \to +\infty} F(x) = 1$ ,
- (iv)  $\mathbb{P}(a < X \le b) = F(b) F(a) \ v \acute{o}i \ a \le b \ b \acute{a}t \ ki$ .

# Hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc

#### BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văi Thìn

Định nghĩa

Phân Ioại

Phân phối : suất

Bảng phân phối xác suất Hàm phân phối xác suất

Các tham s đặc trưng Giả sử biến ngẫu nhiên X có bảng phân phối xác suất

• Nếu  $x < x_1$  thì  $(X \le x) = \emptyset$  và ta có

$$F(x) = P(X \le x) = P(\emptyset) = 0$$

Nếu  $x_k \le x < x_{k+1}$  thì,

$$(X \le x) = (X \in \{x_1, x_2, \dots, x_k\}) = (X = x_1) \cup (X = x_2) \cup \dots \cup (X = x_k)$$

Mặt khác, do các biến cố  $(X = x_i)$  xung khắc nhau từng đôi một nên

$$F(x) = P(X \le x) = P(X = x_1) + P(X = x_2) + ... + P(X = x_k)$$

# Hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên rời rac

#### BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văr Thìn

)inh nghĩa

Phân phối xác suất Bảng phân phối xác suất Hàm phân phối xác

Hàm mật độ xác Các tham số đặc trưng

$$F(x) = P(X \le x) = P(X = x_1) + P(X = x_2) + \ldots + P(X = x_k)$$
  
=  $p_1 + p_2 + \ldots + p_k$ 

Vậy hàm phân phối xác suất của X là

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{n\'eu } x < x_1 \\ p_1 & \text{n\'eu } x_1 \le x < x_2 \\ p_1 + p_2 & \text{n\'eu } x_2 \le x < x_3 \\ \dots & \dots & \dots \\ p_1 + p_2 + \dots + p_k & \text{n\'eu } x_k \le x < x_{k+1} \\ \dots & \dots & \dots \end{cases}$$

#### BIẾN NGẪU NHIÊN

Vguyễn Vă Thìn

Phân loại Phân phối xáo suất Bảng phân phối xáo suất

suất Hàm mật độ xáo Các tham so đặc trưng

### Ví dụ 7

Tung một đồng xu cân đối đồng chất. Gọi X là số mặt sấp xuất hiện. Hãy lập bảng phân phối xác suất của X và xác định hàm phân phối của nó.

### Gợi ý 8

Bảng phân phối xác suất của X là

$$\begin{array}{c|ccc} X & 0 & 1 \\ \hline \mathbb{P} & 0.5 & 0.5 \end{array}$$

Hàm phân phối xác suất của X là

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{n\'eu } x < 0 \\ 0.5 & \text{n\'eu } 0 \le x < 1 \\ 1 & \text{n\'eu } x \ge 1 \end{cases}$$

#### BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văi Thìn

Dịnh nghĩa Phân loại

SUAT Bảng phân phối xác suất Hàm phân phối xác

Các tham

#### Ví du 9

Gọi X là số nút xuất hiện khi tung một con xúc sắc. Hãy lập bảng phân phối và xác định hàm phân phối xác suất của X.

### Ví du 10

Tung đồng thời hai đồng xu cân đối đồng chất. Gọi Y là số mặt sấp xuất hiện khi thực hiện phép thử, hãy lập bảng phân phối xác suất và xác định hàm phân phối xác suất của Y.

### Ví dụ 11

Một người đi thi bằng lái xe, xác suất đậu của anh ta ở mỗi lần thi là 0.3. Anh ta sẽ thi đến khi đạt được bằng lái xe thì thôi. Gọi Z là số lần người đó dự thi. Lập bảng phân phối xác suất của Z.

# Hàm mật đô xác suất: Đinh nghĩa

# BIẾN NGẪU NHIÊN

# Đinh nghĩa 12

Cho biến ngẫu nhiên liên tục X. Hàm số f(x) không âm, xác định trên  $\mathbb R$  và thỏa các tính chất

$$\mathbb{P}(X \in I) = \int_{I} f(x) dx, \quad \forall I \subset \mathbb{R}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$

được gọi là hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên X.

# BIẾN NGẪU NHIÊN

### Ví dụ 14

Cho hàm

$$f(x) = \begin{cases} 2x & \text{n\'eu } x \in [0, 1] \\ 0 & \text{n\'eu } x \notin [0, 1] \end{cases}$$

- a) Chứng tỏ rằng f(x) là hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên X nào đó.
- b) Tìm hàm phân phối xác suất F(x) của X.
- c) Tính xác suất  $\mathbb{P}(0 < X \leq \frac{1}{2})$ .

# Hàm mật độ xác suất: Tính chất

# BIẾN NGẪU NHIÊN

### Nhận xét 13

- 1) Mọi hàm f(x) không âm và thỏa điều kiện  $\int\limits_{-\infty}^{\infty}f(x)dx=1$ đều là hàm mật đô xác suất của 1 biến ngẫu nhiên X nào
- 2) Từ định nghĩa về hàm mật độ ta có hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ f(x) là

$$F(x) = \mathbb{P}(X \le x) = \int_{-\infty}^{x} f(u)du$$

3)

$$F'(x) = \frac{dF}{dx}(x) = f(x)$$

4) Trong trường hợp liên tục,  $P(X = a) = \int_a^a f(x) dx = 0$ .

#### BIẾN NGẪU NHIÊN

### Ví du 15

Tuổi thọ Y của một thiết bị (đơn vị: giờ) có hàm mật độ xác suất có dang

$$f(x) = \begin{cases} \frac{a}{x^2} & \text{n\'eu } x \ge 100\\ 0 & \text{n\'eu } x < 100 \end{cases}$$

với  $a \in \mathbb{R}$ .

- a) Hãy xác định hàm phân phối của Y.
- b) Thiết bi được gọi là loại A nếu tuổi tho của nó kéo dài ít nhất 400 giờ. Tính tỉ lê loại A.

# Outline

#### BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văr Thìn

Định nghĩa

Phân Ioại

Phân phối xá suất Bảng phân phối xá

Hàm phân phối xác suất Hàm mật độ xác suấ **Các tham số** 

đặc trưng

- 1 Dinh nghĩa
- 2 Phân loại
- 3 Phân phối xác suất
  - Bảng phân phối xác suất
  - Hàm phân phối xác suất
  - Hàm mật độ xác suất
- 4 Các tham số đặc trưng

# Kỳ vọng của biến ngẫu nhiên rời rạc

#### BIẾN NGẪU NHIÊN

Vguyễn Và Thìn

Dịnh nghĩa

Phân phối x suất

Bảng phân phối xác suất Hàm phân phối xác suất

Các tham số đặc trưng

### Ví dụ 17

Một hộp chứa 10 viên bi, trong đó có 3 viên bi nặng 10g, 5 viên nặng 50g, 2 viên nặng 20g. Chọn ngẫu nhiên ra 1 viên bi và gọi X là khối lượng của viên bi đó. Tính  $\mathbb{E}(X)$ .

### Ví du 18

Một chùm chìa khóa có 6 chìa, trong đó có 2 chìa mở được cửa. Thử từng chìa (thử xong bỏ ra ngoài) cho đến khi mở được cửa. Tìm số lần thử trung bình để mở được cửa.

# Đặc trưng của biến ngẫu nhiên: Kỳ vọng

#### BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Định nghĩa

Phân loại

Phân phối xác suất Bảng phân phối xác suất Hàm phân phối xác suất

Các tham số đặc trưng

### Định nghĩa 16

Kỳ vọng của X, ký hiệu  $\mathbb{E}(X)$ , là một số được định nghĩa

$$\mathbb{E}(X) = \begin{cases} \sum_{x}^{+\infty} x \mathbb{P}(X = x) & \text{n\'eu } X \text{ là BNN rời rạc} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx & \text{n\'eu } X \text{ là BNN liên tục} \end{cases}$$

# Ý nghĩa của kỳ vọng

- Là giá trị trung bình theo xác suất của tất cả các giá trị có thể có của biến ngẫu nhiên.
- Kỳ vọng phản ánh giá trị trung tâm của phân phối xác suất.

# Kỳ vọng của biến ngẫu nhiên liên tục

#### BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văi Thìn

Dịnh nghĩa

hân phối xác uất

Suat

Bảng phân phối xác
suất

Hàm phân phối xác
suất

Các tham số đặc trưng

# Ví dụ 19

Cho X là một biến ngẫu nhiên có hàm mật độ

$$f(x) = \begin{cases} 2x & \text{n\'eu } x \in [0,1] \\ 0 & \text{n\'eu } x \notin [0,1] \end{cases}$$

Tìm kỳ vọng của X.

### Ví dụ 20

Cho biến ngẫu nhiên Y có hàm mật độ xác suất

$$g(y) = \begin{cases} \frac{2}{y^2} & \text{n\'eu } y \in [1, 2] \\ 0 & \text{n\'eu } y \notin [1, 2] \end{cases}$$

Tìm  $\mathbb{E}(Y)$ .

#### BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văr Thìn

Dịnh nghĩa

Phân Ioai

Phân phối x

Bảng phân phối xá suất

suat Hàm phân phối xác suất

Các tham số đặc trưng

### Tính chất của kỳ vọng

Cho X, Y là hai biến ngẫu nhiên bất kỳ và  $C \in \mathbb{R}$  thì kỳ vọng của biến ngẫu nhiên có các tính chất sau

- i)  $\mathbb{E}(C) = C$ .
- ii)  $\mathbb{E}(CX) = C\mathbb{E}(X)$ .
- iii)  $\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y)$ .
- iv) Nếu hai biến ngẫu nhiên X và Y độc lập thì  $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$ .

#### BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Vă: Thìn

Định nghĩa

Phân phối xá suất Bảng phân phối xi

Bảng phân phối xác suất Hàm phân phối xác suất

Các tham số đặc trưng

# Định nghĩa 22 (Độ lệch chuẩn)

Độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên X, ký hiệu  $\sigma(X)$ , là căn bậc hai của  $\mathbb{V}ar(X)$ .

$$\sigma(X) = \sqrt{\mathbb{V}ar(X)}$$

# Tính chất phương sai

Cho hai biến ngẫu nhiên X, Y và hằng số thực  $C \in \mathbb{R}$ , phương sai có các tính chất sau

- i) Var(C) = 0.
- ii)  $\mathbb{V}ar(CX) = C^2 \mathbb{V}ar(X)$ .
- iii) Nếu X và Y độc lập thì  $\mathbb{V}ar(X+Y)=\mathbb{V}ar(X)+\mathbb{V}ar(Y).$

# Đặc trưng của biến ngẫu nhiên: Phương sai

#### BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văr Thìn

Định nghĩa

Phân phối xác suất Bảng phân phối xác suất Hàm phân phối xác

Các tham số đặc trưng

### Định nghĩa 21

Nếu biến ngẫu nhiên X có kỳ vọng  $\mathbb{E}(X)$  thì phương sai, ký hiệu  $\mathbb{V}ar(X)$ , được định nghĩa

$$Var(X) = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}(X))^{2}$$
 (1)

### Lưu ý

- Trong tính toán, để tính phương sai của biến ngẫu nhiên X ta thường sử dụng công thức  $\mathbb{V}ar(X) = \mathbb{E}(X^2) (\mathbb{E}(X))^2$ .
- Đôi khi người ta còn kí hiệu D(X) để chỉ phương sai của X trong một số giáo trình.

#### BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văr Thìn

Dịnh nghĩa

Phân phối xác suất Bảng phân phối xác suất Hàm phân phối xác suất Hàm mặt độ xác suất

Các tham số đặc trưng

### Ví du 23

Một hộp chứa 10 viên bi, trong đó có 3 viên bi nặng 10g, 5 viên nặng 50g, 2 viên nặng 20g. Chọn ngẫu nhiên ra 1 viên bi và gọi X là khối lượng của viên bi đó. Tính  $\mathbb{E}(X)$ ,  $\mathbb{V}ar(X)$ .

### Ví dụ 24

Cho biến ngẫu nhiên Y có hàm mật độ xác suất

$$g(y) = \begin{cases} \frac{2}{y^2} & \text{n\'eu } y \in [1, 2] \\ 0 & \text{n\'eu } y \notin [1, 2] \end{cases}$$

Tim  $\mathbb{E}(Y)$ ,  $\mathbb{V}ar(Y)$ .

# Ý nghĩa của Phương sai

#### BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Vă

Định nghĩa

Phân Ioại

Suất Bảng phân phối xác suất Hàm phân phối xác

Các tham số đặc trưng

- Phương sai là kỳ vọng của bình phương các sai lệch giữa X và  $\mathbb{E}(X)$ , nói cách khác phương sai là trung bình bình phương sai lệch, nó phản ánh mức độ phân tán các giá trị của biến ngẫu nhiên xung quanh giá trị trung bình.
- Trong công nghiệp phương sai biểu thị độ chính xác trong sản xuất. Trong canh tác, phương sai biểu thị mức độ ổn định của năng suất...

## Mod

#### BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Và Thìn

Dịnh nghĩa

Phân phối xác suất Bảng phân phối xác suất Hàm phân phối xác

Các tham số

# Ví dụ 26 (Trường hợp rời rạc)

Tìm Mod của biến ngẫu nhiên X có phân phối rời rạc với bảng phân phối xác suất

### Ví dụ 27 (Trường hợp liên tục)

Tìm Mod của biến ngẫu nhiên X có hàm mật đô xác suất sau

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{4}x(2-x) & \text{khi } 0 \le x \le 2\\ 0 & \text{noi khác} \end{cases}$$

# Đặc trưng của biến ngẫu nhiên: Mod

#### BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văi Thìn

Định nghĩa

Phân Ioại

suất Bảng phân phối xác suất Hàm phân phối xác suất

Các tham số đặc trưng

### Dinh nghĩa 25 (Mod)

Mod của biến ngẫu nhiên X, ký hiệu Mod(X), là giá trị mà biến ngẫu nhiên X nhận được với xác suất lớn nhất.

Từ định nghĩa, nếu biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân phối xác suất

thì

$$Mod(X) = x_i \Leftrightarrow p_i = \mathbb{P}(X = x_i) = \max\{p_1, p_2 \ldots\}$$

còn nếu X có phân phối liên tục với hàm mật độ xác suất f(x) thì

$$Mod(X) = x_0 \Leftrightarrow f(x_0) = \max_{x \in \mathbb{R}} f(x)$$

# Đặc trưng của biến ngẫu nhiên: Trung vị

#### BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văi Thìn

Dịnh nghĩa

Phân phối xác suất

suất Hàm phân phối xác suất Hàm mật độ xác su

Các tham số đặc trưng

# Định nghĩa 28 (Trung vị)

Cho biến ngẫu nhiên X bất kỳ, trung vị của X, ký hiệu Med(X), là giá trị m của biến ngẫu nhiên X sao cho

$$\begin{cases} \mathbb{P}(X \leq m) \geq \frac{1}{2} \\ \mathbb{P}(X \geq m) \geq \frac{1}{2} \end{cases}$$

ta viết Med(X) = m.

# Đặc trưng của biến ngẫu nhiên: Trung vị

#### BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Vă Thìn

Dịnh nghĩa

Phân Ioại

suất

Bảng phân phối xác
suất

Hàm phân phối xác

Các tham số đặc trưng

### Nhận xét 29

Khi X là biến ngẫu nhiên liên tục thì trung vị của X chính là điểm chia phân phối xác suất thành hai phần bằng nhau. Nghĩa là

$$\mathbb{P}\left(X\geq m\right)=\mathbb{P}\left(X\leq m\right)=1/2$$

tương đương với  $\mathbb{P}(X \geq m) = 1/2$  hoặc  $\mathbb{P}(X \leq m) = 1/2$ .

### Chứng minh

Thật vậy, từ điều kiện  $P(X \ge m) \ge 1/2$  suy ra  $P(X \le m) = P(X < m) \le 1/2$ . Kết hợp với điều kiện  $P(X \le m) \ge 1/2$  ta phải có  $P(X \le m) = 1/2$ .

# Đặc trưng của biến ngẫu nhiên: Trung vị

#### BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Vă Thìn

Dịnh nghĩa

Phân phối xã

Suat Bảng phân phối xác suất Hàm phân phối xác suất

Các tham số đặc trưng

## Ví dụ 32 (Trung vị phân phối liên tục)

Giả sử biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất cho bởi

$$f(x) = \begin{cases} 4x^3 & \text{khi } 0 < x < 1 \\ 0 & \text{noi khác} \end{cases}$$

Tim Med(X).

# Ví dụ 33 (Trung vị phân phối liên tục cho trường hợp không duy nhất)

Giả sử biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất cho bởi  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 

 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{khi } 0 \le x \le 1\\ 1 & \text{khi } 2.5 \le x \le 3\\ 0 & \text{noi khác} \end{cases}$ 

Tim Med(X).

# Đặc trưng của biến ngẫu nhiên: Trung vị

#### BIẾN NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

Dịnh nghĩa

Phân Ioại Phân phối xáo suất

suất
Hàm phân phối xác
suất
Hàm mật độ xác suất
Các tham số

đặc trưng

# Ví dụ 30 (Trung vị phân phối rời rạc)

Giả sử biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân phối xác suất như sau

 X
 1
 2
 3
 4

 P
 0.1
 0.2
 0.3
 0.4

Tìm Med(X).

# Ví dụ 31 (Trung vị phân phối rời rạc cho trường hợp không duy nhất)

Giả sử biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân phối xác suất như sau

 X
 1
 2
 3
 4

 P
 0.1
 0.4
 0.3
 0.2

Tim Med(X).