


1. 水平な地面に立つ高さ $h = 125[\text{m}]$ のビルの屋上から、質量 m のボールを、速さ $v_0 = 3.0[\text{m/s}]$ で水平かつ真東に打ち出した。このボールの運動を予測したい。下図のように地面に原点をとった 2 次元デカルト座標系を設定し、打ち出してから時間を $t[\text{s}]$ として、ボールの位置ベクトルをこの座標系で $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t))[\text{m}]$ と書くことにする。以下の問に答えなさい。ただし、ボールに対する空気の影響は無視できる。問 (1) と問 (2) の答えには、なるべく数値を使わずに文字を使いなさい。問 (3) と問 (4) の数値の答えには、重力加速度の大きさ $g = 10 [\text{m/s}^2]$ を使いなさい。



- (1) 問題文で用意された座標系と函数を使って、打ち出されてから地面に着くまでの間のボールの**運動方程式**とボールの**初期条件**を書きなさい。

地面に着くまでにボールにはたらく力は重力のみである。従って、地面に着くまでの間のボールの運動方程式は以下である。

$$m(\ddot{x}(t), \ddot{y}(t)) = (0, -mg) \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} m\ddot{x}(t) = 0 \\ m\ddot{y}(t) = -mg \end{cases}$$

時刻 $t = 0$ には、ボールは位置 $(0, h)$ におり、かつ、速度が $(v_0, 0)$ だったので、初期条件は以下である。

$$x(0) = 0, y(0) = h \quad \Leftrightarrow \quad \dot{x}(0) = v_0, \dot{y}(0) = 0$$

- (2) 問 1 の方程式と条件を解いて、空中に飛んでいるボールの**運動**、つまり、函数 $x(t)$ と $y(t)$ を答えなさい。

(1) の運動方程式より、 $A \sim D$ を任意の定数として、函数 $x(t)$ と $y(t)$ が以下の様に、一旦、無数に求まる。

$$\begin{cases} m\ddot{x}(t) = 0 \\ m\ddot{y}(t) = -g \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x(t) = At + B \\ y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + Ct + D \end{cases}$$

ここで、(1) の初期条件より $A \sim D$ は決定され、 $A = v_0$, $B = 0$, $C = 0$, $D = h$ である。問題のボールの運動に対応する関数は以下である。

$$\begin{cases} x(t) = v_0 t \\ y(t) = \frac{1}{2} g t^2 + h \end{cases}$$

(3) 打ち出してから 2.0[s] 後のボールの**位置と速度**を答えなさい。

(2) で得た式に $t = 2.0[\text{s}]$ を代入する。

$$\begin{cases} x(2) = 3.0 \times 2.0 = 6.0 [\text{m}] \\ y(2) = -\frac{1}{2} \cdot 10 \times 2.0^2 + 125 = 105 [\text{m}] \end{cases}$$

位置は与えられた座標系で (6.0, 105) [m]


(2) の式を 1 回微分した式に $t = 2.0[\text{s}]$ を代入する。

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = v_0 \\ \dot{y}(t) = -gt \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x}(2) = 3.0 [\text{m/s}] \\ \dot{y}(2) = -10 \times 2.0 = -20 [\text{m/s}] \end{cases}$$

速度は与えられた座標系の成分表示で (3.0, -20) [m/s]

(4) 問題のボールが地面に衝突する**時刻と位置**を答えなさい。

2. 水平から角度 23° のなめらかな斜面に、質量 $m = 5.0[\text{kg}]$ の小物体が糸が引かれて静止している。糸と斜面は平行である。糸が小物体を引く力 \boldsymbol{T} の大きさ T と小物体にはたらく垂直抗力 \boldsymbol{N} の大きさ N を、適切な単位で答えなさい。途中の説明には図の書き込みを併用してよい。必要があれば、 $\sin(23^\circ) = 0.39$, $\cos(23^\circ) = 0.92$ を使ってよい。重力加速度の大きさは $g = 10[\text{m/s}^2]$ とする。



3. 質量不明の小物体を地面から $v_0 = 15[\text{m/s}]$ である角度に打ち出すと、最高点の地面からの高さは $H = 10[\text{m}]$ であった。物質の最高点での**速さ v** を答えなさい。重力加速度の大きさは $g = 10[\text{m/s}^2]$ とする。空気の影響は無視できる。

4. 次の文章のカッコに適当な単語を埋めなさい。

- (1) 電車に乗っていると、減速中に上半身を進行方向に押し付けられるように感じる。この力は（ ）と呼ばれるが、本物の力ではない。実際、この現象を地面を基準に考えると、身体は等速度を続けようとする（慣性の法則）に、電車の床に着いている足だけが電車と共に減速するから、上半身が前のめりになるだけなのである。このような見かけの力であっても、（ ）座標系を採用して運動を調べる場合に役に立つ。
- (2) 物体の軸の回りの回転運動を考えると、力よりも（ ）と呼ばれるベクトルの方が便利である。
- (3) このベクトルの大きさは、力の大きさの他に、軸から力の作用点までの（ ）にも比例する。

5. 授業や試験の感想，要望，文句，その他，何でもよいので書きなさい。