คำแนะนำการอัพโหลดเอกสารหลักฐาน (ให้จัดทำเอกสารทุกชิ้นเป็น pdf ไฟล์)

- 1. **ยบ.8 คำขออนุญาตผลิต/นำเข้า** ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ยบ.8) ที่ได้รับการอนุญาตแล้ว
- 2. รูปถ่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร : ภาพแสดงลักษณะสีของผงยา และภาพแสดงแคปซูล โดยแสดงไว้ในแผ่นเดียวกัน
- 3. ฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ คำแนะนำ :
 - 1. **ใช้เทมเพลทฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ที่จัดทำให้เท่านั้น** (เนื่องจากเป็นการดำเนินการที่ใช้เวลาสั้น จึงไม่มีการพิจารณาฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่น ในทุกกรณี) ทั้งนี้ให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ตามคำแนะนำ ข้างล่างนี้ ให้ครบถ้วนแล้ว upload ไฟล์

กรณีเป็นการผลิตในประเทศ

ผลิตโดย..(ระบุชื่อผู้ผลิตและที่ตั้งของสถานที่ผู้ผลิต ที่สอดล้องตามใบอนุญาต หรือ ระบุ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ เป็นอย่างน้อย)

กรณีนำเข้า มีสถานที่ผลิตในต่างประเทศ

นำเข้าโดย..(ระบุชื่อผู้นำเข้าและที่ตั้งของสถานที่นำเข้า ที่สอดล้องตามใบอนุญาต หรือ ระบุ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ เป็นอย่างน้อย) **ผู้ผลิตโดย**(ชื่อสถานที่ผลิต และ ชื่อเมือง ประเทศที่ตั้ง)

กรณีผู้ยื่นคำขอไม่ได้ผลิต/นำเข้า แต่จ้างผู้รับอนุญาตอื่นผลิตหรือนำเข้า

(หากผู้ผลิต/นำเข้าเป็นผู้ยื่นคำขอเองไม่ต้องกรอกช่องนี้)

ผู้รับใบจดแจ้ง......(ระบุชื่อและที่อยู่ผู้ยื่นค้ำขอ)........

4. **หนังสือรับรอง**ต่างๆ ได้แก่

- 4.1 คำรับรองสำหรับผู้รับอนุญาตที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณสำหรับการรายงานอาการไม่พึง ประสงค์จากยาชนิดร้ายแรง
- 4.2 คำรับรองเงื่อนไขรายการเรียกเก็บยาคืนของผู้รับอนุญาตผลิตและนำหรือสั่งยาแผนโบราณฯ เข้ามาใน ราชอาณาจักร
- 4.3 คำรับรองอื่นๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด

5. เอกสารด้านคุณภาพ

- 5.1 รายงานผลวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค เป็นไปตามที่ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา กำหนด
- 5.2 เอกสารหลักฐานด้านการควบคุมคุณภาพ ตามที่รายการผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นๆกำหนดไว้ในประกาศฯ จด แจ้ง และ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด

โดยรายการผลการตรวจวิเคราะห์มาจาก

- 1. หน่วยงานบริการวิเคราะห์ ในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
- 2. ห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ทางด้านสมุนไพร ยา หรือ อาหาร ค้นหาได้ที่

http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=LDMEM (เป็นรายชื่อห้องปฏิบัติการที่ได้การรับรอง ISO 17025 ในด้านต่างๆ ซึ่งท่านต้อง สอบถามหรือดูรายละเอียดว่า ห้องปฏิบัติการนั้นๆ ได้ ISO-17025 ทางยา หรือ อาหาร หรือไม่เพิ่มเติมด้วย)



3. ห้องปฏิบัติการของสถานที่ผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้มาตรฐาน PIC/s GMP

4. สำเนาใบอนุญาตผลิต/นำเข้า ตามแต่กรณีที่ขออนุญาต

ใน 162 กรัม มีส่วนประกอบสำคัญ ดังนี้

ไพล 81 กรัม กระเทียม 8 กรัม เกลือสินเธาว์ 8 กรัม ขมิ้นอ้อย 8 กรัม ขิง 8 กรัม ดีปลี 8 กรัม เทียนดำ 8 กรัม พริกไทยล่อน 8 กรัม มะกรูด 8 กรัม ว่านน้ำ 8 กรัม หอม 8 กรัม และการบูร 1 กรัม

สรรพคุณ: บรรเทาอาการปวดประจำเดือน, แก้ประจำเดือนมาไม่ สม่ำเสมอหรือมาน้อยกว่าปกติ, ขับน้ำคาวปลาในหญิงหลังคลอดบุตร, แก้ จุกเสียด

ขนาดและวิธีใช้ :

- กรณีอาการปวดประจำเดือน

รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า กลางวัน และ เย็น (กรณีที่มีอาการปวดประจำเดือนเป็นประจำ ให้รับประทานยาก่อนมี ประจำเดือน 2-3 วัน ไปจนถึงวันแรกและวันที่สองที่มีประจำเดือน)

- กรณีประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอหรือมาน้อยกว่าปกติ

รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า กลางวัน และ เย็น เป็นเวลา 3-5 วัน เมื่อประจำเดือนมาให้หยุดรับประทาน

- กรณีขับน้ำคาวปลาในหญิงหลังคลอดบุตร

รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า กลางวัน และ เย็น ให้รับประทานจนกว่าน้ำคาวปลาจะหมดแต่ไม่เกิน 15 วัน

- <u>กรณีแก้จุกเสียด</u>

รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า กลางวัน และ เย็น

คำเตือน •

- กรณีประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอหรือมาน้อยกว่าปกติ ไม่ควรใช้ติดต่อกัน นานเกิน 1 เดือน
- กรณีขับน้ำคาวปลาในหญิงหลังคลอดบุตร ไม่ควรใช้ติดต่อกันนานเกิน 15 วัน

สภาวะการเก็บรักษา: เก็บในที่แห้ง

ยาประสะไพล ชนิดแคปซูล

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป

ยาแผนไทย เลขจดแจ้งที่

วันเดือนปีที่ผลิต	
ครั้งที่ผลิต	
สิ้นอายุ	
ขนาดบรรจุแคปซูล	
(บรรจุผงยา 500 มก.,/แคปซูล)	

9 5

ผลตเดย	

จัดจำหน่ายโดย

ผู้รับใบรับจดแจ้ง	

เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์

ขนาดและวิธีใช้ :

กรณีอาการปวดประจำเดือน

รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า กลางวัน และเย็น (กรณีที่มีอาการปวดประจำเดือนเป็นประจำ ให้รับประทาน ยาก่อนมีประจำเดือน 2-3 วัน ไปจนถึงวันแรกและวันที่สองที่มี ประจำเดือน)

- กรณีประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอหรือมาน้อยกว่าปกติ

รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า กลางวัน และเย็น เป็นเวลา 3-5 วัน เมื่อประจำเดือนมาให้หยุดรับประทาน

- กรณีขับน้ำคาวปลาในหญิงหลังคลอดบุตร

รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า กลางวัน และเย็น ให้รับประทานจนกว่าน้ำคาวปลาจะหมดแต่ไม่เกิน 15 วัน

- <u>กรณีแก้จุกเสียด</u>

รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า กลางวัน และเย็น

ข้อห้ามใช้ :

- ห้ามใช้ในผู้ที่มีใช้ หญิงตั้งครรภ์ หญิงผ่าคลอด และหญิงที่มีเลือดออก มากผิดปกติหลังคลอด
- ห้ามใช้ในหญิงที่มีประจำเดือนมากกว่าปกติ เพราะจะทำให้มีการขับ ประจำเดือนออกมามากขึ้น

ข้อควรระวัง: ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับและไตเนื่องจากอาจเกิดการสะสมของ การบูรและเกิดพิษได้

สภาวะการเก็บรักษา : เก็บในที่แห้ง

ขอรับรองว่าข้อความและรูปบนฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแสดงชื่อของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในการขึ้นทะเบียนตำรับ แจ้งรายละเอียด หรือจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการ แสดงฉลาก และเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

พื้นสี	 	
ตัวอักษรสี	 	

หมายเหตุ 1. ผู้รับใบจดแจ้ง... (ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ โดยระบุจังหวัดและเบอร์โทร เป็นอย่างน้อย) (เฉพาะกรณีผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ว่าจ้างผู้อื่นผลิต)หากผู้ยื่นคำขอฯ เป็นผู้เดียวกับ ผู้ผลิต /นำเข้า ให้ขีดฆ่าคำนื้ออก ตัวอย่าง ผู้รับใบจดแจ้ง

		ยาประสะไพล ชนิดแคปซูล
		เลขจดแจ้งที่
		เลขจดแจงทครั้งที่ผลิต
ด้านห	น้ำ	ด้านหลัง
ขอรับรองว่าข้อความและรูปบนฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแสดงชื่อของผลิตภัณ		
หลกเกณฑ วิธการ และเงอนเซเกยวกบการแสดงขอของผลตรเน ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการแสดงฉลาก และเอกสารกำกับผลิตภั		บ แงงรายสะเอยต หรองตแงง ตัวอักษรสี

เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์

ยาประสะไพล ชนิดแคปซูล

ใน 162 กรัม มีส่วนประกอบสำคัญ ดังนี้

ไพล 81 กรัม กระเทียม 8 กรัม เกลื้อสินเธาว์ 8 กรัม ขมิ้นอ้อย 8 กรัม ซิง 8 กรัม ดีปลี 8 กรัม เทียนดำ 8 กรัม พริกไทยล่อน 8 กรัม มะกรูด 8 กรัม ว่านน้ำ 8 กรัม หอม 8 กรัม และการบูร 1 กรัม สรรพคุณ : บรรเทาอาการปวดประจำเดือน, แก้ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอหรือมาน้อยกว่าปกติ, ขับน้ำคาวปลาในหญิงหลังคลอดบุตร, แก้จุกเสียด ขนาดและวิธีใช้ :

- กรณีอาการปวดประจำเดือน

รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า กลางวัน และเย็น (กรณีที่มีอาการปวดประจำเดือนเป็นประจำ ให้รับประทานยาก่อนมีประจำเดือน 2-3 วัน ไปจนถึงวันแรกและวันที่สองที่มีประจำเดือน)

- กรณีประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอหรือมาน้อยกว่าปกติ

รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า กลางวัน และเย็น เป็นเวลา 3-5 วัน เมื่อประจำเดือนมาให้หยุดรับประทาน

- กรณีขับน้ำคาวปลาในหญิงหลังคลอดบุตร

รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า กลางวัน และเย็น ให้รับประทานจนกว่าน้ำคาวปลาจะหมดแต่ไม่เกิน 15 วัน

- <u>กรณีแก้จุกเสียด</u>

้ รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า กลางวัน และเย็น

คำเตือน :

- กรณีประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอหรือมาน้อยกว่าปกติ ไม่ควรใช้ติดต่อกันนานเกิน 1 เดือน
- กรณีขับน้ำคาวปลาในหญิงหลังคลอดบุตร ไม่ควรใช้ติดต่อกันนานเกิน 15 วัน

ข้อห้ามใช้ :

- ห้ามใช้ในผู้ที่มีใช้ หญิงตั้งครรภ์ หญิงผ่าคลอด และหญิงที่มีเลือดออกมากผิดปกติหลังคลอด
- ห้ามใช้ในหญิงที่มีประจำเดือนมากกว่าปกติ เพราะจะทำให้มีการขับประจำเดือนออกมามากขึ้น

ข้อควรระวัง : ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับและไตเนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้

สภาวะการเก็บรักษา: เก็บในที่แห้ง

ขอรับรองว่าข้อความและรูปบนฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่อง ก์	ำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแสดงชื่อของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในการขึ้นทะเบียนตำรับ แจ้งรายละเอียด หรือจดแ	,จ้ง
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการแสดงฉลาก และเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๔	

พื้นสี	
ตัวอักษรสี	

ใน 99 กรัม มีส่วนประกอบสำคัญ ดังนี้

กระดอม 12 กรัม โกฐเขมา 12 กรัม โกฐจุฬาลัมพา 12 กรัม โกฐสอ 12 กรัม จันทน์ขาว 12 กรัม บอระเพ็ด 12 กรัม ปลาไหลเผือก 12 กรัม และตัวยาอื่นๆ

สรรพคุณ: บรรเทาอาการไข้ตัวร้อน ไข้เปลี่ยนฤดู

ขนาดและวิธีใช้ :

ขนาดบรรจุซองละ 1 กรัม

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1- 2 ซอง ละลายน้ำต้มสุก (ควรใช้ ขณะยังอุ่นอยู่) ทุก 3 - 4 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ

ขนาดบรรจุซองละ 500 มิลลิกรัม

เด็ก อายุ 6 - 12 ปี รับประทานครั้งละ 1 - 2 ซอง ละลายน้ำต้ม สุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่) ทุก 3 - 4 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ

คำเตือน: ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก

สภาวะการเก็บรักษา : เก็บในที่แห้ง

ยาจันทลีลา ชนิดผง

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป

ยาแผนไทย

เลขจดแจ้งที่

วันเดือนปีที่ผลิตครั้งที่ผลิต ครั้งที่ผลิต สิ้นอายุ

ขนาดบรรจุ ซอง

ผลิตโดย

จัดจำหน่ายโดย......

ผู้รับใบรับจดแจ้ง

เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์

ขนาดและวิธีใช้ :

ขนาดบรรจุซองละ 1 กรัม

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1- 2 ซอง ละลายน้ำต้มสุก (ควรใช้ ขณะยังอุ่นอยู่) ทุก 3 - 4 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ

ขนาดบรรจุซองละ 500 มิลลิกรัม

เด็ก อายุ 6 - 12 ปี รับประทานครั้งละ 1 - 2 ซอง ละลายน้ำ ต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่) ทุก 3 - 4 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ

ข้อควรระวัง :

หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์

สภาวะการเก็บรักษา : เก็บในที่แห้ง

ขอรับรองว่าข้อความและรูปบนฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแสดงชื่อของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในการขึ้นทะเบียนตำรับ แจ้งรายละเอียด หรือจดแจ้ง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการแสดงฉลาก และเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

พื้นสี	
ตัวอักษรสี	

หมายเหตุ 1. ผู้รับใบจดแจ้ง... (ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ โดยระบุจังหวัดและเบอร์โทร เป็นอย่างน้อย) (เฉพาะกรณีผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ว่าจ้างผู้อื่นผลิต)หากผู้ยื่นคำขอฯ เป็นผู้เดียวกับ ผู้ผลิต /นำเข้า ให้ขีดฆ่าคำนี้ออก ตัวอย่าง ผู้รับใบจดแจ้ง
2. จัดจำหน่ายโดย หากไม่มี ให้ขีดฆ่าคำนี้ออก ตัวอย่าง จัดจำหน่ายโดย

ใน 99 กรัม มีส่วนประกอบสำคัญ ดังนี้

กระดอม 12 กรัม โกฐเขมา 12 กรัม โกฐจุฬาลัมพา 12 กรัม โกฐสอ 12 กรัม จันทน์ขาว 12 กรัม บอระเพ็ด 12 กรัม ปลาไหลเผือก 12 กรัม และตัวยาอื่นๆ

สรรพคุณ: บรรเทาอาการไข้ตัวร้อน ไข้เปลี่ยนฤดู

ขนาดและวิธีใช้ :

เด็ก อายุ 6 - 12 ปี

รับประทานครั้งละ 1 - 2 แคปซูล ทุก 3 - 4 ชั่วโมง เมื่อมี อาการ

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 2 – 4 แคปซูล ทุก 3 - 4 ชั่วโมง เมื่อ มีอาการ

คำเตือน: ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก

สภาวะการเก็บรักษา: เก็บในที่แห้ง

ยาจันทลีลา ชนิดแคปซูล

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป

เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์

ขนาดและวิธีใช้ :

เด็ก อายุ 6 - 12 ปี

รับประทานครั้งละ 1 - 2 แคปซูล ทุก 3 - 4 ชั่วโมง เมื่อ มีอาการ

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 2 – 4 แคปซูล ทุก 3 - 4 ชั่วโมง เมื่อมีคาการ

ข้อควรระวัง: หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วัน แล้ว อาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์

สภาวะการเก็บรักษา: เก็บในที่แห้ง

ขอรับรองว่าข้อความและรูปบนฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการแสดงชื่อของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในการขึ้นทะเบียนตำรับ แจ้งรายละเอียด หรือจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการแสดงฉลาก และเอกสาร กำกับผลิตภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

พื้นสี	
ตัวอักษรสี	

หมายเหตุ 1. ผู้รับใบจดแจ้ง... (ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ โดยระบุจังหวัดและเบอร์โทร เป็นอย่างน้อย) (เฉพาะกรณีผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ว่าจ้างผู้อื่นผลิต)หากผู้ยื่นคำขอฯ เป็นผู้เดียวกับ ผู้ผลิต /นำเข้า ให้ขีดฆ่าคำนี้ออก ตัวอย่าง ผู้รับใบจดแจ้ง

	ยาจันทลีลา ชนิดแคปซูล
	เลขจดแจ้งที่
	เสซจตแจงทครั้งที่ผลิต
ด้านหน้า	ด้านหลัง
ขอรับรองว่าข้อความและรูปบนฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์เป็นไปตามประกาศคณะกรรม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแสดงชื่อของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในการขึ้นทะเบียนตํ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการแสดงฉลาก และเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๔	

เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์

ยาจันทลีลา ชนิดแคปซูล

ใน 99 กรัม มีส่วนประกอบสำคัญ ดังนี้

กระดอม 12 กรัม โกฐเขมา 12 กรัม โกฐจุฬาลัมพา 12 กรัม โกฐสอ 12 กรัม จันทน์ขาว 12 กรัม บอระเพ็ด 12 กรัม ปลาไหลเผือก 12 กรัม และตัวยาอื่นๆ

สรรพคุณ: บรรเทาอาการไข้ตัวร้อน ไข้เปลี่ยนฤดู

ขนาดและวิธีใช้ :

เด็ก อายุ 6 - 12 ปี รับประทานครั้งละ 1 - 2 แคปซูล ทุก 3 - 4 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ **ผู้ใหญ่** รับประทานครั้งละ 2 – 4 แคปซูล ทุก 3 - 4 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ

คำเตือน : ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก

ข้อควรระวัง

หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์

สภาวะการเก็บรักษา : เก็บในที่แห้ง

พื้นสี
ตัวอักษรสี

ใน 80 กรัม มีส่วนประกอบสำคัญ ดังนี้

เปราะหอม 40 กรัม กระวาน 2 กรัม กานพลู 2 กรัม โกฐเขมา 2 กรัม โกฐจุฬาลัมพา 2 กรัม โกฐเชียง 2 กรัม โกฐสอ 2 กรัม โกฐหัวบัว 2 กรัม จันทน์เทศ 2 กรัม ดอกจันทน์ 2 กรัม เทียนขาว 2 กรัม เทียนข้าวเปลือก 2 กรัม เทียนดำ 2 กรัม เทียนแดง 2 กรัม เทียนตาตั๊กแตน 2 กรัม บัวหลวง 2 กรัม บุนนาค 2 กรัม และ ตัวยาอื่นๆ

สรรพคุณ: ถอนพิษตานซางสำหรับเด็ก ซึ่งมีอาการปวดท้อง ท้องอืดท้องเฟ้อ ถ่ายเหลวกะปริบกะปรอย เบื่ออาหาร

ขนาดและวิธีใช้ :

เด็ก อายุ 1-5 ขวบ รับประทานครั้งละ 1 - 2 ซอง ละลายน้ำกระสายยา 3 เวลา ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน เย็น

กระสายยาที่ใช้

น้ำดอกไม้เทศ (rose water) หรือน้ำต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่)

คำเตือน: ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจาก อาจบดบังอาการของไข้เลือดออก

สภาวะการเก็บรักษา: เก็บในที่แห้ง

ยาประสะเปราะใหญ่ ชนิดผง

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป

ยาแผนไทย
เลขจดแจ้งที่
วันเดือนปีที่ผลิต ครั้งที่ผลิต สิ้นอายุของ
ผลิตโดย
จัดจำหน่ายโดย
800 O 00
ผู้รับใบรับจดแจ้ง

เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์

ขนาดและวิสีใช้ :

เด็ก อายุ 1-5 ขวบ รับประทานครั้งละ 1 - 2 ซอง ละลายน้ำกระสายยา 3 เวลา ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน เย็น

กระสายยาที่ใช้

น้ำดอกไม้เทศ (rose water) หรือน้ำต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่น อยู่)

ข้อห้ามใช้ : ห้ามใช้ในเด็กที่มีใข้สูง ที่มีใข้ 38.0 องศาเซลเซียส จึ๊นไง

ข้อควรระวัง :

- ควรระวังการกินร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelet)
- ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้
- หากใช้ยาเป็นเวลาน^านเกิน 3 วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น ควร ปรึกษาแพทย์

สภาวะการเก็บรักษา : เก็บในที่แห้ง

ขอรับรองว่าข้อความและรูปบนฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแสดงชื่อของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในการขึ้นทะเบียนตำรับ แจ้งรายละเอียด หรือจดแจ้ง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการแสดงฉลาก และเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

พื้นสี	
ตัวอักษรสี	

หมายเหตุ 1. ผู้รับใบจดแจ้ง... (ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ โดยระบุจังหวัดและเบอร์โทร เป็นอย่างน้อย) (เฉพาะกรณีผู้อื่นคำขอเป็นผู้ว่าจ้างผู้อื่นผลิต)หากผู้อื่นคำขอฯ เป็นผู้เดียวกับ ผู้ผลิต /นำเข้า ให้ขีดฆ่าคำนื้ออก ตัวอย่าง ผู้รับใบจดแจ้ง

ใน 80 กรัม มีส่วนประกอบสำคัญ ดังนี้

เปราะหอม 40 กรัม กระวาน 2 กรัม กานพลู 2 กรัม
โกฐเขมา 2 กรัม โกฐจุฬาลัมพา 2 กรัม โกฐเชียง 2 กรัม
โกฐสอ 2 กรัม โกฐหัวบัว 2 กรัม จันทน์เทศ 2 กรัม
ดอกจันทน์ 2 กรัม เทียนขาว 2 กรัม เทียนข้าวเปลือก 2 กรัม
เทียนดำ 2 กรัม เทียนแดง 2 กรัม เทียนตาตั๊กแตน 2 กรัม
บัวหลวง 2 กรัม บุนนาค 2 กรัม และ ตัวยาอื่นๆ

สรรพคุณ: ถอนพิษตานซางสำหรับเด็ก ซึ่งมีอาการปวดท้อง ท้องอืดท้องเฟ้อ ถ่ายเหลวกะปริบกะปรอย เบื่ออาหาร

ขนาดและวิธีใช้ :

เด็ก อายุ 1-5 ขวบ รับประทานครั้งละ 1 - 2 ซอง ละลายน้ำกระสายยา 3 เวลา ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน เย็น

กระสายยาที่ให้

น้ำดอกไม้เทศ (rose water) หรือน้ำต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่)

คำเตือน: ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจาก อาจบดบังอาการของไข้เลือดออก

สภาวะการเก็บรักษา: เก็บในที่แห้ง

ยาประสะเปราะใหญ่ ชนิดแคปซูล

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป

ยาแผนไทย เลขจดแจ้งที่

ผลิตโดย	

จัดจำหน่ายโดย.....

ผู้รับใบรับจดแจ้ง

เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์

ขนาดและวิธีใช้ :

เด็ก อายุ 1-5 ขวบ รับประทานครั้งละ 1 - 2 ซอง ละลายน้ำกระสายยา 3 เวลา ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน เย็น กระสายยาที่ใช้

น้ำดอกไม้เทศ (rose water) หรือน้ำต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่)

ข้อห้ามใช้ : ห้ามใช้ในเด็กที่มีใข้สูง ที่มีใข้ 38.0 องศาเซลเซียส ขึ้นไป

ข้อควรระวัง:

- ควรระวังการกินร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelet)
- ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้
- หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษา แพทย์

สภาวะการเก็บรักษา: เก็บในที่แห้ง

ขอรับรองว่าข้อความและรูปบนฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแสดงชื่อของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในการขึ้นทะเบียนตำรับ แจ้งรายละเอียด หรือจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการ แสดงฉลาก และเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

พื้นสี
ตัวอักษรสี

หมายเหตุ 1. ผู้รับใบจดแจ้ง... (ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ โดยระบุจังหวัดและเบอร์โทร เป็นอย่างน้อย) (เฉพาะกรณีผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ว่าจ้างผู้อื่นผลิต)หากผู้ยื่นคำขอฯ เป็นผู้เดียวกับ ผู้ผลิต /นำเข้า ให้ขีดฆ่าคำนี้ออก ตัวอย่าง ผู้รับใบจดแจ้ง

	ยาประสะเปราะใหญ่ ชนิดแคปซูล
	เลขจดแจ้งที่ครั้งที่ผลิต
ด้านหน้า งว่าข้อความและรงไทบอลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์เป็นไปตามประกาศคณ	ด้านหลัง

เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์

ยาประสะเปราะใหญ่ ชนิดแคปซูล

ใน 80 กรัม มีส่วนประกอบสำคัญ ดังนี้

เปราะหอม 40 กรัม กระวาน 2 กรัม กานพลู 2 กรัม โกฐเขมา 2 กรัม โกฐจุฬาลัมพา 2 กรัม โกฐเชียง 2 กรัม โกฐสอ 2 กรัม โกฐหัวบัว 2 กรัม จันทน์เทศ 2 กรัม ดอกจันทน์ 2 กรัม เทียนขาว 2 กรัม เทียนข้าวเปลือก 2 กรัม เทียนดำ 2 กรัม เทียนแดง 2 กรัม เทียนตาตั๊กแตน 2 กรัม บัวหลวง 2 กรัม บุนนาค 2 กรัม และตัวยาอื่นๆ

สรรพคุณ : ถอนพิษตานซางสำหรับเด็ก ซึ่งมีอาการปวดท้อง ท้องอืดท้องเฟ้อ ถ่ายเหลวกะปริบกะปรอย เบื่ออาหาร

ขนาดและวิธีใช้ : เด็ก อายุ 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล 3 เวลา ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน เย็น

คำเตือน: ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก

ข้อควรระวัง:

- ควรระวังการกินร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelet)
- ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้
- หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์

สภาวะการเก็บรักษา: เก็บในที่แห้ง

พื้นสี		 	 	
ตัวอักแร	3			

ใน 98 กรัม มีส่วนประกอบสำคัญ ดังนี้

กระดอม 2 กรัม กระดังงา 2 กรัม กระลำพัก 2 กรัม กระวาน 2 กรัม กฤษณา 2 กรัม กานพลู 2 กรัม กำยาน 2 กรัม คำไทย 2 กรัม และตัวยาอื่นๆ

สรรพคุณ: แก้ลมบาดทะจิต แก้คลื่นเหียนอาเจียน แก้ลมจุกเสียด

ขนาดและวิธีใช้ :

รับประทานครั้งละ 1 - 2 ซอง ละลายน้ำกระสายยา ทุก 3 - 4 ชั่วโมง ไม่ควรเกินวันละ 3 ครั้ง

กระสายยาที่ใช้

- แก้ลมบาดทะจิต ใช้น้ำดอกมะลิ
- แก้คลื่นเหียนอาเจียน ใช้น้ำลูกผักชีลา เทียนดำตัม ถ้าไม่มีใช้น้ำ ต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่)
- แก้ลมจุกเสียด ใช้น้ำขิ่งต้ม

สภาวะการเก็บรักษา: เก็บในที่แห้ง

ยาหอมอินทจักร์ ชนิดผง

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป

ยาแผนไทย

เลขจดแจ้งที่

ขนาดบรรจุ ซอง

ผลิตโดย

จัดจำหน่ายโดย......

ผู้รับใบรับจดแจ้ง

เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์

ขนาดและวิธีใช้ :

รับประทานครั้งละ 1 - 2 ซอง ละลายน้ำกระสายยา ทุก 3 - 4 ชั่วโมง ไม่ควรเกินวันละ 3 ครั้ง

กระสายยาที่ใช้

- แก้ลมบาดทะจิต ใช้น้ำดอกมะลิ
- แก้คลื่นเหียนอาเจียน ใช้น้ำลูกผักชีลา เทียนคำต้ม ถ้าไม่มีใช้น้ำต้ม สุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่)
- แก้ลมจุกเสียด ใช้น้ำขิงต้ม

ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์

ข้อควรระวัง

- 1. ควรระวังการกินร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelet)
- 2. ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้

สภาวะการเก็บรักษา: เก็บในที่แห้ง

ขอรับรองว่าข้อความและรูปบนฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแสดงชื่อของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในการขึ้นทะเบียนตำรับ แจ้งรายละเอียด หรือจดแจ้ง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการแสดงฉลาก และเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

พื้น	เสี		
200	o o 15 g		
ตัว	คัก ษรสี		

หมายเหตุ 1. ผู้รับใบจดแจ้ง... (ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ โดยระบุจังหวัดและเบอร์โทร เป็นอย่างน้อย) (เฉพาะกรณีผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ว่าจ้างผู้อื่นผลิต)หากผู้ยื่นคำขอฯ เป็นผู้เดียวกับ ผู้ผลิต /นำเข้า ให้ขีดฆ่าคำนื้ออก ตัวอย่าง ผู้รับใบจดแจ้ง

ใน 71 กรัม มีส่วนประกอบสำคัญ ดังนี้

การบูร 6 กรัม เจตมูลเพลิงแดง 6 กรัม มะกรูด 6 กรัม สารส้มสะตุ 6 กรัม แสมทะเล 6 กรัม กะทือ 5 กรัม ขมิ้นอ้อย 5 กรัม ข่า 5 กรัม ไพล 5 กรัม มะรุม 5 กรัม กระเทียม 4 กรัม ขิง 4 กรัม ดีปลี 4 กรัม และพริกไทยล่อน 4 กรัม

สรรพคุณ : ขับน้ำคาวปลาในเรือนไฟ ช่วยให้มดลูกเข้าอู่

ขนาดและวิธีใช้ :

รับประทานครั้งละ 1 ชอง ละลายน้ำต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่) วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน และเย็น ให้รับประทานจนกว่าน้ำคาวปลาจะหมด แต่ไม่ควรเกิน 15 วัน

สภาวะการเก็บรักษา: เก็บในที่แห้ง

ยาไฟประลัยกัลป์ ชนิดผง

ขายเฉพาะสถานที่มีใบอนุญาต

ครั้งที่ผลิต สิ้นอายุ

ขนาดบรรจุ ซอง

ผลิตโดย	

จัดจำหน่ายโดย.....

ผู้รับใบรับจดแจ้ง	

เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์

ขนาดและวิธีใช้ :

รับประทานครั้งละ 1 ซอง ละลายน้ำต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่) วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน และเย็น ให้รับประทานจนกว่าน้ำคาวปลาจะหมด แต่ไม่ควรเกิน 15 วัน

ข้อห้ามใช้ :

- ห้ามใช้ในผู้ที่มีใช้ หญิงผ่าคลอด และหญิงที่มีเลือดออกมาก ผิดปกติหลังคลอด
- ห้ามใช้ในหญิงที่ผ่าคลอด เนื่องจากทำให้แผลหายช้า

ข้อควรระวัง: ควรระวังการใช้ยาต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับและไต เนื่องจากอาจเกิดการ สะสมของการบูรและเกิดพิษได้

สภาวะการเก็บรักษา: เก็บในที่แห้ง

ขอรับรองว่าข้อความและรูปบนฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแสดงชื่อของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในการขึ้นทะเบียนตำรับ แจ้งรายละเอียด หรือจดแจ้ง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการแสดงฉลาก และเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ทันสี	
ว์อักษรสี	

หมายเหตุ 1. ผู้รับใบจดแจ้ง... (ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ โดยระบุจังหวัดและเบอร์โทร เป็นอย่างน้อย) (เฉพาะกรณีผู้อื่นคำขอเป็นผู้ว่าจ้างผู้อื่นผลิต)หากผู้อื่นคำขอฯ เป็นผู้เดียวกับ ผู้ผลิต /นำเข้า ให้ขีดฆ่าคำนื้ออก ตัวอย่าง ผู้รับใบจดแจ้ง

ใน 71 กรัม มีส่วนประกอบสำคัญ ดังนี้

การบูร 6 กรัม เจตมูลเพลิงแดง 6 กรัม มะกรูด 6 กรัม สารส้มสะตุ 6 กรัม แสมทะเล 6 กรัม กะทือ 5 กรัม ขมิ้นอ้อย 5 กรัม ข่า 5 กรัม ไพล 5 กรัม มะรุม 5 กรัม กระเทียม 4 กรัม ขิง 4 กรัม ดีปลี 4 กรัม และพริกไทยล่อน 4 กรัม

สรรพคุณ : ขับน้ำคาวปลาในเรือนไฟ ช่วยให้มดลูกเข้าอู่

ขนาดและวิธีใช้ :

รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน และเย็น ให้รับประทานจนกว่าน้ำคาวปลาจะหมด แต่ไม่ควรเกิน 15 วัน

สภาวะการเก็บรักษา: เก็บในที่แห้ง

ยาไฟประลัยกัลป์ ชนิดแคปซูล

ขายเฉพาะสถานที่มีใบอนุญาต

เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์

ขนาดและวิธีใช้ :

รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน และ เย็น ให้รับประทานจนกว่าน้ำคาวปลาจะหมด แต่ไม่ควรเกิน 15 วัน

ข้อห้ามใช้ :

- ห้ามใช้ในผู้ที่มีใช้ หญิงผ่าคลอด และหญิงที่มีเลือดออกมากผิดปกติหลัง คลอด
- ห้ามใช้ในหญิงที่ผ่าคลอด เนื่องจากทำให้แผลหายช้า

ข้อควรระวัง: ควรระวังการใช้ยาต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มี ความผิดปกติของตับและไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิด พิษได้

สภาวะการเก็บรักษา: เก็บในที่แห้ง

ขอรับรองว่าข้อความและรูปบนฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแสดงชื่อของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในการขึ้นทะเบียนตำรับ แจ้งรายละเอียด หรือจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการ แสดงฉลาก และเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

พื้นสี	
ตัวอักษรสี	

หมายเหตุ 1. ผู้รับใบจดแจ้ง... (ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ โดยระบุจังหวัดและเบอร์โทร เป็นอย่างน้อย) (เฉพาะกรณีผู้อื่นคำขอเป็นผู้ว่าจ้างผู้อื่นผลิต)หากผู้อื่นคำขอฯ เป็นผู้เดียวกับ ผู้ผลิต /นำเข้า ให้ขีดฆ่าคำนี้ออก ตัวอย่าง ผู้รับใบจดแจ้ง

	ยาไ	ฟประลัยกัลป์ ชนิดแคปซูล
		v
	ครั้ง	จดแจ้งที่ที่ผลิต ที่ผลิต
ด้านหน้า		ด้านหลัง
ขอรับรองว่าข้อความและรูปบนฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์เป็นไปตามประก หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแสดงชื่อของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในการ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการแสดงฉลาก และเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๔	ขึ้นทะเบียนตำรับ แจ้งรายละเอียด หรือจดแจ้ง	พื้นสี

เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์

ยาไฟประลัยกัลป์ ชนิดแคปซูล

ใน 71 กรัม มีส่วนประกอบสำคัญ ดังนี้

การบูร 6 กรัม เจตมูลเพลิงแดง 6 กรัม มะกรูด 6 กรัม สารส้มสะตุ 6 กรัม แสมทะเล 6 กรัม กะทือ 5 กรัม ขมิ้นอ้อย 5 กรัม ข่า 5 กรัม ไพล 5 กรัม มะรุม 5 กรัม กระเทียม 4 กรัม ขิง 4 กรัม ดีปลี 4 กรัม และพริกไทยล่อน 4 กรัม

สรรพคุณ : ขับน้ำคาวปลาในเรือนไฟ ช่วยให้มดลูกเข้าอู่

ขนาดและวิธีใช้ : รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน และเย็น ให้รับประทานจนกว่าน้ำคาวปลาจะหมด แต่ไม่ควรเกิน 15 วัน ข้อห้ามใช้ :

- ห้ามใช้ในผู้ที่มีใช้ หญิงผ่าคลอด และหญิงที่มีเลือดออกมากผิดปกติหลังคลอด
- ห้ามใช้ในหญิงที่ผ่าคลอด เนื่องจากทำให้แผลหายช้า

ข้อควรระวัง : ควรระวังการใช้ยาต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับและไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้

สภาวะการเก็บรักษา: เก็บในที่แห้ง

ฟื	้ นสี	 	 	
ଜା	วอักษรสี			

ใน 90 กรัม มีส่วนประกอบสำคัญ ดังนี้

ขมิ้นชัน 30 กรัม กระเทียม 5 กรัม กล้วยตีบ 5 กรัม ขมิ้นอ้อย 5 กรัม ครั่ง 5 กรัม ชันย้อย 5 กรัม ดีปลี 5 กรัม ทับทิม 5 กรัม เทียนกิ่ง 5 กรัม เพกา 5 กรัม สีเสียดเทศ 5 กรัม สีเสียด ไทย 5 กรัม และแห้วหมู 5 กรัม

สรรพคุณ :

- บรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ
- บรรเทาอาการท้องเสียที่อุจจาระไม่เป็นมูกหรือมีเลือดปน
- ท้องเสียชนิดที่ไม่มีใช้

ขนาดและวิธีการใช้

บรรจุซองละ 100 มิลลิกรัม

เด็กอายุ 3 - 5 เดือน รับประทานครั้งละ 2 ซอง ละลายน้ำกระสายยา รับประทานทุก 3 – 5 ชั่วโมงเมื่อมีอาการ

เด็กอายุ 6 - 12 เดือน รับประทานครั้งละ 3 - 4 ซอง

ละลายน้ำกระสายยา รับประทานทุก 3 – 5 ชั่วโมงเมื่อมีอาการ

เด็กอายุ 1 - 5 ปี รับประทานครั้งละ 5 - 7 ซอง

ละลายน้ำกระสายยา รับประทานทุก 3 – 5 ชั่วโมงเมื่อมีอาการ

บรรจุซองละ 200 มิลลิกรัม

เด็กอายุ 6 - 12 ปี รับประทานครั้งละ 4 - 5 ซอง ละลายน้ำกระสายยา รับประทานทุก 3 – 5 ซั่วโมงเมื่อมีอาการ ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 5 ซอง ละลายน้ำกระสายยา

รับประทานทุก 3 – 5 ชั่วโมงเมื่อมีอาการ

กระสายยาที่ใช้

ใช้น้ำเปลือกผลทับทิมหรือเปลือกแคต้ม หรือกับน้ำปูนใสเป็นน้ำกระสาย ยา สำหรับเด็กเล็กให้บดผสมกับน้ำกระสายยา ใช้กินหรือกวาดก็ได้ ถ้าหา น้ำกระสายยาไม่ได้ให้ใช้น้ำต้มสุกแทน (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่)

สภาวะการเก็บรักษา: เก็บในที่แห้ง

ยาเหลืองปิดสมุทร ชนิดผง

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป

ยาแผนไทย

เลขจดแจ้งที่

ผลิตโดย	

จัดจำหน่ายโดย	

ผู้รับใบรับจดแจ้ง	

เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์

ขนาดและวิธีการใช้

บรรจุซองละ 100 มิลลิกรัม

เด็กอายุ 3 - 5 เดือน รับประทานครั้งละ 2 ซอง
ละลายน้ำกระสายยา รับประทานทุก 3 - 5 ชั่วโมงเมื่อมีอาการ
เด็กอายุ 6 - 12 เดือน รับประทานครั้งละ 3 - 4 ซอง
ละลายน้ำกระสายยา รับประทานทุก 3 - 5 ชั่วโมงเมื่อมีอาการ
เด็กอายุ 1 - 5 ปี รับประทานครั้งละ 5 - 7 ซอง
ละลายน้ำกระสายยา รับประทานทุก 3 - 5 ชั่วโมงเมื่อมีอาการ

ละลายน้ำกระสายยา รับประทานทุก 3 – 5 ชั่วโมงเมื่อมีอาการ บรรจซองละ 200 มิลลิกรัม

เด็กอายุ 6 - 12 ปี รับประทานครั้งละ 4 - 5 ซอง
ละลายน้ำกระสายยา รับประทานทุก 3 – 5 ชั่วโมงเมื่อมีอาการ
ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 5 ซอง ละลายน้ำกระสายยา
รับประทานทุก 3 – 5 ชั่วโมงเมื่อมีอาการ

กระสายยาที่ใช้

ใช้น้ำเปลือกผลทับทิมหรือเปลือกแคต้ม หรือกับน้ำปูนใสเป็นน้ำ กระสายยา สำหรับเด็กเล็กให้บดผสมกับน้ำกระสายยา ใช้กินหรือ กวาดก็ได้ ถ้าหาน้ำกระสายยาไม่ได้ให้ใช้น้ำต้มสุกแทน (ควรใช้ขณะ ยังอุ่นอยู่)

ข้อควรระวัง

ใช้ได้ไม่เกิน 1 วัน หากอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์

สภาวะการเก็บรักษา : เก็บในที่แห้ง

พื้นสี		 	 	 	
ตัวอัก	าษรสี	 	 	 	

ใน 90 กรัม มีส่วนประกอบสำคัญ ดังนี้

ขมิ้นชัน 30 กรัม กระเทียม 5 กรัม กล้วยตีบ 5 กรัม ขมิ้นอ้อย 5 กรัม ครั่ง 5 กรัม ชันย้อย 5 กรัม ดีปลี 5 กรัม ทับทิม 5 กรัม เทียนกิ่ง 5 กรัม เพกา 5 กรัม สีเสียดเทศ 5 กรัม สีเสียดไทย 5 กรัม และแห้วหมู 5 กรัม

สรรพคุณ :

- บรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ
- บรรเทาอาการท้องเสียที่อุจจาระไม่เป็นมูกหรือมีเลือดปน
- ท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้

ขนาดและวิธีการใช้

เด็กอายุ 6 - 12 ปี

รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล เมื่อมีอาการ

สภาวะการเก็บรักษา: เก็บในที่แห้ง

ยาเหลืองปิดสมุทร ชนิดแคปซูล

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป

ยาแผนไทย

เลขจดแจ้งที่

วันเดือนปีที่ผลิตครั้งที่ผลิต

สิ้นอายุขนาดบรรจแคปซล

น้ำหนักผงยา 400 มิลลิกรัม/แคปซูล

ผลิตโดย

จัดจำหน่ายโดย.....

ผู้รับใบรับจดแจ้ง

เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์

ขนาดและวิธีการใช้

เด็กอายุ 6 - 12 ปี

รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล เมื่อมีอาการ

ข้อควรระวัง

ใช้ได้ไม่เกิน 1 วัน หากอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์

สภาวะการเก็บรักษา: เก็บในที่แห้ง

ขอรับรองว่าข้อความและรูปบนฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแสดงชื่อของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในการขึ้นทะเบียนตำรับ แจ้งรายละเอียด หรือจดแจ้ง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการแสดงฉลาก และเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

พื้นสี
ตัวอักษรสี

หมายเหตุ 1. ผู้รับใบจดแจ้ง... (ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ โดยระบุจังหวัดและเบอร์โทร เป็นอย่างน้อย) (เฉพาะกรณีผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ว่าจ้างผู้อื่นผลิต)หากผู้ยื่นคำขอฯ เป็นผู้เดียวกับ ผู้ผลิต /นำเข้า ให้ขีดฆ่าคำนื้ออก ตัวอย่าง ผู้รับใบจดแจ้ง

	ยาเหลืองปิดสมุทร ชนิดแคปซูล เลขจดแจ้งที่
ด้านหน้า	ด้านหลัง
ขอรับรองว่าข้อความและรูปบนฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์เป็นไปตามประกาศคณ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแสดงชื่อของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในการขึ้นทะ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการแสดงฉลาก และเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๔	

เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์

ยาเหลืองปิดสมุทร ชนิดแคปซูล

ใน 90 กรัม มีส่วนประกอบสำคัญ ดังนี้

ขมิ้นชั้น 30 กรัม กระเทียม 5 กรัม กล้วยตีบ 5 กรัม ขมิ้นอ้อย 5 กรัม ครั่ง 5 กรัม ชั้นย้อย 5 กรัม ดีปลี 5 กรัม ทับทิม 5 กรัม เทียนกิ่ง 5 กรัม เพกา 5 กรัม สีเสียดเทศ 5 กรัม สีเสียดไทย 5 กรัม และแห้วหมู 5 กรัม

สรรพคุณ :

- บรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ
- บรรเทาอาการท้องเสียที่อุจจาระไม่เป็นมูกหรือมีเลือดปน
- ท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้

ขนาดและวิธีการใช้

เด็กอายุ 6 - 12 ปี รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล เมื่อมีอาการ

ข้อควรระวัง

ใช้ได้ไม่เกิน 1 วัน หากอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์

สภาวะการเก็บรักษา: เก็บในที่แห้ง

พื้นสี
ตัวลักษรสี

ใน 90 กรัม มีส่วนประกอบสำคัญ ดังนี้

ขมิ้นชัน 30 กรัม กระเทียม 5 กรัม กล้วยตีบ 5 กรัม ขมิ้นอ้อย 5 กรัม ครั่ง 5 กรัม ชันย้อย 5 กรัม ดีปลี 5 กรัม ทับทิม 5 กรัม เทียนกิ่ง 5 กรัม เพกา 5 กรัม สีเสียดเทศ 5 กรัม สีเสียดไทย 5 กรัม และแห้วหมู 5 กรัม

สรรพคุณ :

- บรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ
- บรรเทาอาการท้องเสียที่อุจจาระไม่เป็นมูกหรือมีเลือดปน
- ท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้

ขนาดและวิธีการใช้

เด็กอายุ 6 - 12 ปี

รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล เมื่อมีอาการ

ผู้ใหญ่

ง รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล ทุก 3 - 5 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ

สภาวะการเก็บรักษา: เก็บในที่แห้ง

ยาเหลืองปิดสมุทร ชนิดแคปซูล

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป

ยาแผนไทย

เลขจดแจ้งที่

วันเดือนปีที่ผลิตครั้งที่ผลิต

สิ้นอายุขนาดบรรจุแคปซูล

น้ำหนักผงยา 500 มิลลิกรัม/แคปซูล

ผลิตโดย

จัดจำหน่ายโดย.....

ผู้รับใบรับจดแจ้ง

เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์

ขนาดและวิธีการใช้

เด็กอายุ 6 - 12 ปี

รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล เมื่อมีอาการ

ผู้ใหญ่

รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล ทุก 3 - 5 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ

ข้อควรระวัง

ใช้ได้ไม่เกิน 1 วัน หากอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์

สภาวะการเก็บรักษา: เก็บในที่แห้ง

ขอรับรองว่าข้อความและรูปบนฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแสดงชื่อของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในการขึ้นทะเบียนตำรับ แจ้งรายละเอียด หรือจดแจ้ง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการแสดงฉลาก และเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

พื้น	สี	 	 	 	
ตัวส่	ลัก ษรสี				

หมายเหตุ 1. ผู้รับใบจดแจ้ง... (ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ โดยระบุจังหวัดและเบอร์โทร เป็นอย่างน้อย) (เฉพาะกรณีผู้อื่นคำขอเป็นผู้ว่าจ้างผู้อื่นผลิต)หากผู้ยื่นคำขอฯ เป็นผู้เดียวกับ ผู้ผลิต /นำเข้า ให้ขีดฆ่าคำนื้ออก ตัวอย่าง ผู้รับใบจดแจ้ง
2. จัดจำหน่ายโดย หากไม่มี ให้ขีดฆ่าคำนื้ออก ตัวอย่าง จัดจำหน่ายโดย

	ยาเหลืองปิดสมุทร ชนิดแคปซูล เลขจดแจ้งที่
ด้านหน้า ขอรับรองว่าข้อความและรูปบนฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภ์ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแสดงชื่อของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในการขึ้นทะเบียนตำรับ แจ้งร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการแสดงฉลาก และเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๔	

เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์

ยาเหลืองปิดสมุทร ชนิดแคปซูล

ใน 90 กรัม มีส่วนประกอบสำคัญ ดังนี้

ขมิ้นชั้น 30 กรัม กระเทียม 5 กรัม กล้วยตีบ 5 กรัม ขมิ้นอ้อย 5 กรัม ครั่ง 5 กรัม ชั้นย้อย 5 กรัม ดีปลี 5 กรัม ทับทิม 5 กรัม เทียนกิ่ง 5 กรัม เพกา 5 กรัม สีเสียดเทศ 5 กรัม สีเสียดไทย 5 กรัม และแห้วหมู 5 กรัม

สรรพคุณ :

- . - บรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ
- บรรเทาอาการท้องเสียที่อุจจาระไม่เป็นมูกหรือมีเลือดปน
- ท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้

ขนาดและวิธีการใช้

เด็กอายุ 6 - 12 ปี รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล เมื่อมีอาการ ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล ทุก 3 - 5 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ ข้อควรระวัง

ใช้ได้ไม่เกิน 1 วัน หากอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์

สภาวะการเก็บรักษา: เก็บในที่แห้ง

พื้นสี		 	 	
ตัวอักษ	ษรสี	 	 	