ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Факультет информационных технологий и анализа больших данных Департамент анализа данных и машинного обучения


Дисциплина: «Теория вероятностей и математическая статистика» Направление подготовки: 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» Профиль: «Анализ данных и принятие решений в экономике и финансах» Форма обучения очная, учебный 2020/2021 год, 4 семестр

Билет 103

1. Сформулируйте определение случайной выборки из конечной генеральной совокупности. Какие виды выборок вам известны? Перечислите (с указанием формул) основные характеристики выборочной и генеральной совокупностей

Здесь очень много исчерпывающей информации о выборках из генеральной совокупности и про различные виды выборок

- 2. Случайные величины X и Y независимы и имеют равномерное распределение на отрезках [0;1] и [0;10] соответственно. Для случайной величины $Z=\frac{Y}{X}$ найдите: 1) функцию распределения $F_Z(x)$; 2) плотность распределения $f_Z(x)$ и постройте график плотности; 3) вероятность $\P(2,96\leqslant Z\leqslant 17,91)$.
 - 1) Функция распределения $F_Z(x)$ имеет вид: $F_Z(x) = \begin{cases} 0, x \leqslant 0; \\ \frac{x}{20}, 0 \leqslant x \leqslant 10 \approx 10,0; \\ 1 \frac{5}{x}, x \geqslant 10; \end{cases}$ Плотность распределения $f_Z(x)$ имеет вид: $f_Z(x) = \begin{cases} 0, x < 0; \\ 1 \frac{5}{x}, x \geqslant 10; \\ \frac{1}{20}, 0 \leqslant x \leqslant 10 \approx 10,0; \\ \frac{5}{x^2}, x \geqslant 10; \end{cases}$



3) вероятность равна: $\P(2,96 \leqslant Z \leqslant 17,91) = 0,57283$.

3. (10) Известно, что доля возвратов по кредитам в банке имеет распределение $F(x)=x^{\beta}, 0\leqslant x\leqslant 1$. Наблюдения показали, что в среднем она составляет 91,6667%. Методом моментов оцените параметр β и вероятность того, что она опуститься ниже 59%

Найдём плотность рапределения как интеграл от ΦP , а дальше всё и вовсе простою Ответ: 30155888444737842659

- 4. (10) В группе Ω учатся студенты: $\omega_1...\omega_{25}$. Пусть X и Y 100-балльные экзаменационные оценки по математическому анализу и теории вероятностей. Оценки ω_i студента обозначаются: $x_i = X(\omega_i)$ и $y_i = Y(\omega_i)$, i = 1...25. Все оценки известны $x_0 = 73, y_0 = 44, x_1 = 44, y_1 = 83, x_2 = 49, y_2 = 41, x_3 = 36, y_3 = 32, x_4 = 48, y_4 = 60, x_5 = 53, y_5 = 37, x_6 = 70, y_6 = 86, x_7 = 61, y_7 = 82, x_8 = 42, y_8 = 57, x_9 = 94, y_9 = 40, x_{10} = 44, y_{10} = 78, x_{11} = 85, y_{11} = 78, x_{12} = 48, y_{12} = 66, x_{13} = 88, y_{13} = 82, x_{14} = 31, y_{14} = 39, x_{15} = 84, y_{15} = 68, x_{16} = 49, y_{16} = 51, x_{17} = 84, y_{17} = 55, x_{18} = 65, y_{18} = 67, x_{19} = 37, y_{19} = 99, x_{20} = 46, y_{20} = 31, x_{21} = 84, y_{21} = 46, x_{22} = 40, y_{22} = 67, x_{23} = 86, y_{23} = 54, x_{24} = 89, y_{24} = 32$ Требуется найти следующие условные эмпирические характеристики: 1) ковариацию X и Y при условии, что одновременно $X \geqslant 50$ и $Y \geqslant 50$; 2) коэффициент корреляции X и Y при том же условии.
 - 1) Ковариация = -345.5 2) Коэффициент корреляции = -2.9554
- 5. Распределение результатов экзамена в некоторой стране с 10-балльной системой оценивания задано следующим образом: $\{1:6,\ 2:16,\ 3:9,\ 4:16,\ 5:14,\ 6:4,\ 7:25,$ Работы будут перепроверять 10 преподавателей, которые разделили все имеющиеся работы между собой случайным образом. Пусть \overline{X} средний балл (по перепроверки) работ, попавших к одному преподавателю.

Требуется найти матожидание и стандартное отклонение среднего балла работ, попавших к одному преподавателю, до перепроверки.

$$k = len(marks) // k$$
 $ex = np.sum([marks[m] * m for m in marks]) / n$ $varx = np.var([m for m in marks for temp in range(marks[m])]) / k * (n - k) / (n - 1)$ $sigmax = varx**(0.5)$ Ответы: $6.14667, 0.65542$.

6. Известно, что доля возвратов по кредитам в банке имеет распределение $F(x) = x^{\beta}, 0 \le x \le 1$. Наблюдения показали, что в среднем она составила 60.0%. Методом моментов оцените параметр β и вероятность того, что она опуститься ниже 52.0%.

$$f(x) = F'(x) = \beta \cdot x^{\beta - 1}$$

$$\mu_1 = E(X) = \int_{-\inf}^{\inf} x \cdot f(x) = \int_{-\inf}^{\inf} \beta \cdot x^{\beta} = \beta \cdot \frac{x^{\beta + 1}}{\beta + 1} \Big|_{0}^{1} = \frac{\beta}{\beta + 1}$$

$$\beta = (\beta + 1) \cdot 60.0$$

$$\beta = \frac{60.0}{1 - 60.0}$$

$$P(x \le 52.0) = F(52.0) = 52.0^{1.5}$$

Ответ: 1.5, 0.37

Подготовил

Рябов П.Е. Рябов

Утверждаю:

Первый заместитель

руководителя департамента

Дата 01.06.2021

Режии Феклин В.Г.