

线性代数习题课讲义

2025 年秋季学期

作者：顾才武

组织：上海科技大学数学科学研究所

时间：January 5, 2026

版本：线性代数通识课版本

邮箱：gucw2025@shanghaitech.edu.cn

历史和现实都告诉我们，青年一代有理想、有担当，国家就有前途，民族就有希望，实现中华民族伟大复兴就有源源不断的强大力量。

序言

本讲义是在线性代数习题课教学过程中逐步整理而成，主要面向修读线性代数课程的学生. 教材参考了席南华老师为上海科技大学编写的《线性代数》教程.

由于编写时间较为紧张，部分习题解答采用了人工智能辅助生成，可能存在疏漏或不准确之处，欢迎各位读者批评指正.

本文档采用经网友修改的 ElegantLaTeX 模板进行排版，在此对模板的原创者及修改者表示诚挚的感谢.

课程信息

上课时间

每周五 20:45–21:45

上课地点

教学中心 204

答疑方式

通过微信答疑

教学内容


- 作业讲解
- 习题课讲义内容
- 讲义内容后续会持续更新

讲义下载

讲义下载地址：https://epan.shanghaitech.edu.cn/l/CFl0mA

顾才武

January 5, 2026



目录

第 0 章　线性代数中求解问题的常用方法 1

第 1 章　线性代数方程组初步 4

1.1 课本主要内容的回顾与补充 4

1.2 经典例题讲解 7

第 2 章　矩阵 16

2.1 行和列的向量空间 16

2.2 矩阵的秩 28

2.3 线性映射与矩阵的运算 36

2.4 方阵 50

2.5 线性方程组的解空间 66

2.6 本章总结 70

第 3 章　行列式 74

3.1 课本主要内容的回顾与补充 74

3.2 经典例题讲解 78

第 4 章　向量空间 $\mathbb{R}^n$ 114

4.1 基、坐标、转换矩阵 114

4.2 子空间 118

4.3 内积 126

4.4 双线性与二次型 136

第 5 章　$\mathbb{R}^n$ 上的线性算子 152

5.1 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的线性映射 152

5.2 不变子空间与凯莱哈密顿定理 167

5.3 实对称矩阵的对角化 180

5.4 正交矩阵的典范式 183

5.5 正交投影与最小二乘法 187

第 6 章　复向量空间 $\mathbb{C}^n$ 190

6.1 复数域 190

6.2 复空间 $\mathbb{C}^n$ 上的内积与酉空间 195

6.3 埃尔米特矩阵的对角化 198

6.4 酉矩阵的对角化 201
6.5 约当标准形 205



第 0 章 线性代数中求解问题的常用方法

一、数学归纳法

1. 第一数学归纳法

设 $P(n)$ 是关于自然数 n 的一种性质或命题. 如果

(i) 当 $n=1$ 时,$P(1)$ 成立;

(ii) 由 $P(n)$ 成立必可推出 $P(n+1)$ 成立,

那么 $P(n)$ 对任意自然数成立.

注 第一数学归纳法和第二数学归纳法都可以通过皮亚诺公理证明. 数学归纳法只适用与有限个数的情况并不适合无限个数的情况比如可以用数学归纳法证明 $\frac{1}{n}>0$, 但 $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0$.

例题 0.1.

证明下列恒等式

$$1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

证明 (i) 当 $n=1$ 时上式成立;

(ii) 若 $n=k$ 时 $1^2+2^2+3^2+\cdots+k^2=\frac{k(k+1)(2k+1)}{6}$ 成立;

(iii) 则 $n=k+1$ 时

$$1^2+2^2+3^2+\cdots+k^2+(k+1)^2=\frac{k(k+1)(2k+1)}{6}+(k+1)^2=\frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}$$

则上式成立.

注 类似的可以用数学归纳法证明 $1^3+2^3+\cdots+n^3=(1+2+\cdots+n)^2$.

练习 0.1 注意到 $(n+1)^2-n^2=2n+1$, 于是 $n=\frac{(n+1)^2-n^2-1}{2}$.

回答下面问题

(1) 利用 $n=\frac{(n+1)^2-n^2-1}{2}$ 证明 $1+2+3+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}$

(2) 求 $1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2$ 的求和公式

(3) 求 $1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3$ 的求和公式

例题 0.2.

对于有限集 $A_1, A_2, \cdots, A_n$，证明式子

$$\begin{aligned}\#\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = &\sum_{i=1}^{n} \#A_i - \sum_{1\le i<j\le n} \#(A_i \cap A_j) + \cdots \\ &(-1)^{k-1} \sum_{1\le i_1<\cdots<i_k\le n} \#(A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}) + \cdots \\ &(-1)^{n-1} \#(A_1 \cap \cdots \cap A_n)\end{aligned} \tag{1}$$

证明 我们使用数学归纳法来证明该式对任意正整数 n 都成立.

当 $n = 2$ 时，很容易证明：

$$\#(A \cup B) = \#A + \#B - \#(A \cap B)$$

假设当 $n = k(k \ge 2)$ 时该式成立. 接下来我们考虑当 $n = k+1$ 时的情况：

$$\begin{aligned}\#\left(\bigcup_{i=1}^{k+1} A_i\right) &= \#\left(\left(\bigcup_{i=1}^{k} A_i\right) \cup A_{k+1}\right) \\ &= \#\left(\bigcup_{i=1}^{k} A_i\right) + \#A_{k+1} - \#\left(\left(\bigcup_{i=1}^{k} A_i\right) \cap A_{k+1}\right) \\ &= \sum_{i=1}^{k+1} \#A_i - \sum_{1\le i<j\le k+1} \#(A_i \cap A_j) + \cdots \\ &\quad (-1)^{k-1} \sum_{1\le i_1<\cdots<i_k\le k+1} \#(A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}) + \cdots \\ &\quad (-1)^{n-1} \#(A_1 \cap \cdots \cap A_{k+1})\end{aligned}$$

因此式子 (1) 成立.

2. 第二数学归纳法

设 $P(n)$ 是关于自然数 n 的一种性质或命题. 如果

(i) 当 $n = 1$ 时,$P(1)$ 成立；

(ii) 对 $n > 1$, 若对所有的自然数 $m < n, P(m)$ 成立必推出 $P(n)$ 成立,

那么 $P(n)$ 对任意自然数成立.

例题 0.3.

证明组合数 $C_n^k = \dfrac{n!}{k!(n-k)!}$ 是整数.

证明 利用组合数的性质可得, 任意组合数都可以表示为前面几个组合数的和.

(i) 因为 $C_1^0 = C_1^1 = 1$, 所以 C_1^0, C_1^1 是整数；

(ii) 若 $k < n$ 时,C_k^m（$m = 0, 1, 2, \ldots, k$）都是整数；

(iii) 则 $C_{n-1}^{m-1} + C_{n-1}^m = C_n^m$（$m = 1, 2, \ldots, n-1$）是整数, 又 $C_n^0 = C_n^n = 1$ 是整数,

故组合数是整数.

二、反证法

反证法就是否定命题的结论然后推出矛盾的结构. 这是利用了逆否命题与原命题等价得出的方法.

例题 0.4.

证明 $\sqrt{2}$ 是无理数.

证明 假设 $\sqrt{2}$ 是有理数, 设 $\sqrt{2}=\frac{p}{q}$(其中 $p,q\in\mathbb{Z},p\neq 0$ 且 $(p,q)=1$).

从而 $2p^2=q^2(*)$, 下证 q 为偶数

假设 q 是奇数则 q^2 为奇数, 得到 $2p^2$ 是奇数, 矛盾!

故 q 是偶数, 设 $q=2k,k\in\mathbb{Z}$ 代入 $(*)$ 式得

$p^2=2k^2$ 同理可证 p 是偶数.

于是 p,q 都是偶数, 这与 $(p,q)=1$ 矛盾!

所以假设不成立, 故 $\sqrt{2}$ 是无理数.

例题 0.5.

证明素数有无穷多个.

证明 假设素数只有有限多个分别为 $p_1,p_2,\cdots,p_n$.

设 $p=p_1p_2\cdots p_n+1$, 那么 $p_1,p_2,\cdots,p_n$ 都不是 p 的因数, 且 $p\neq 1$, 那么 p 是素数与假设矛盾. 所以素数有无穷多个.



第 1 章 线性代数方程组初步

1.1 课本主要内容的回顾与补充

一、高斯消元法的步骤为：

第一步：将线性方程组写成标准形式并写出系数矩阵的增广矩阵 $\widetilde{A}$.

第二步：将 $\widetilde{A}$ 中某一行调到第一行, 使第一行第一列的元素不为零.

第三步：将得到的矩阵的第一行乘以某个数加到第二行上, 消去第二行第一列的元素. 重复这一方法, 只到消去第一列除第一行以外所有的元素.

第四步：重复上述步骤, 使第二行第二列的元素不为零并消去第二列上其余元素. 不断使用这个方法, 将系数矩阵变为对角阵.

第五步：在每一行乘以适当的数使系数矩阵中的元素都为 1, 从而写出方程的解.




图 1.1: 线性方程组求解流程

线性方程组的解的情况及判断准则

设阶梯形方程组有 n 个未知量, 它的增广矩阵 J 有 r 个非零行,J 有 $n+1$ 列.

情形 1 阶梯形方程组中出现“$0=d$（d 是非零常数）”这种方程, 则阶梯形方程组无解.

情形 2 阶梯形矩阵中不出现“$0=d$（d 是非零常数）”这种方程, 当 $r=n$ 时有唯一解, 当 $r<n$ 时有无数组解.




图 1.2: 判断线性方程组解的情况流程

二、二元一次与三元一次方程组的克拉默法则

命题 1.1 (二元一次方程组的克拉默法则)

下列方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

当 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$ 时, 方程组的解总为

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_1 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_2 \\ a_{12} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

命题 1.2 (三元一次方程组的克拉默法则)

下列方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$

当系数行列式 $D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \neq 0$ 时，方程组的解为：

$$x_1=\frac{D_1}{D},\quad x_2=\frac{D_2}{D},\quad x_3=\frac{D_3}{D}$$

其中

$$D_1=\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix},\quad D_2=\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix},\quad D_3=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}$$

注 系数矩阵的行列式不为 0 时方程组的解是唯一的，但是系数矩阵的行列式为 0 时不能判断方程组是否有解.

表 1.1: 高斯消元法与克拉默法则的比较

	克拉默法则	高斯消元法
适用范围	系数矩阵是方阵的线性方程组，可以化为系数矩阵是方阵的线性方程组	各种线性方程组
是否能判断方程组有唯一解	如果系数矩阵行列式不等于零，那么线性方程组有唯一解	化简到最后看系数矩阵与增广矩阵非零行的个数是否相等
能否判断线性方程组无解	不能判断，系数矩阵等于零时线性方程组可能无解	化简后系数矩阵个数小于增广矩阵非零行个数时无解
处理复杂问题上的优点	可以快速判断是否有唯一解	可以求出通解，计算量相对要小一些

三、二阶行列式的性质

1. $\begin{vmatrix} a & 0 \\ c & d \end{vmatrix}=a\cdot d,\begin{vmatrix} a & b \\ 0 & d \end{vmatrix}=a\cdot d$
2. $\begin{vmatrix} 0 & 0 \\ c & d \end{vmatrix}=0,\begin{vmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{vmatrix}=0$
3. $\begin{vmatrix} k\cdot a & k\cdot b \\ c & d \end{vmatrix}=k\cdot\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix},\begin{vmatrix} a & b \\ k\cdot c & k\cdot d \end{vmatrix}=k\cdot\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$
4. $\begin{vmatrix} c & d \\ a & b \end{vmatrix}=-\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix},\begin{vmatrix} b & a \\ d & c \end{vmatrix}=-\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$
5. 若 $\frac{a}{c}=\frac{b}{d}$，则 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}=0$
6. $\begin{vmatrix} a_1+a_2 & b_1+b_2 \\ c & d \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ c & d \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ c & d \end{vmatrix}$
7. $\begin{vmatrix} a & b \\ c+k\cdot a & d+k\cdot b \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix},\begin{vmatrix} a+k\cdot c & b+k\cdot d \\ c & d \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$
8. $\begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$

四、三阶行列式的性质

1. $\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}=a_{11}a_{22}a_{33},\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{vmatrix}=a_{11}a_{22}a_{33}$
2. $\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}=0,\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 0 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}=0$

3. $\begin{vmatrix} ca_{11} & ca_{12} & ca_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = c \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$

4. $\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$

5. 若存在常数 k 使得 $a_{i1} = ka_{j1}, a_{i2} = ka_{j2}, a_{i3} = ka_{j3} (i \neq j)$, 即两行成比例, 则 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 0$

6. $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ b_{21} + c_{21} & b_{22} + c_{22} & b_{23} + c_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$

7. $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} + ca_{11} & a_{22} + ca_{12} & a_{23} + ca_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$

8. $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$

1.2 经典例题讲解

例题 1.1.

下面线性方程组的未知元数量均大于方程的数量, 把它化成阶梯形方程组, 从而判断它是否为确定的.

$$\begin{cases} x + 2y - z + w = -3, & (1) \\ 4x - 3y + 2z + 3w = 4, & (2) \\ 2x - 7y + 4z + w = 8 & (3) \end{cases}$$

解 (1) 的 -4 倍加到 (2),(1) 的 -2 倍加到 (3) 可得

$$\begin{cases} x + 2y - z + w = -3, & (4) \\ -11y + 6z - w = 16, & (5) \\ -11y + 6z - w = 14, & (6) \end{cases}$$

(5) 的 -1 倍加到 (6) 得

$$\begin{cases} x + 2y - z + w = -3, \\ -11y + 6z - w = 16, \\ 0 = 2, \end{cases}$$

因为通过初等行变换得到 $0 = 2$ 所以无解.

例题 1.2.

证明：如果一个线性方程组中的未知元数量大于方程的数量，那么这个方程组不能是确定的

证明 因为对于有 n 个未知元和 m 个方程的线性方程组都可以通过初等行变换化为

$$\begin{cases} g_{11}x_1+\cdots+g_{1n}x_n & =h_1,\\ g_{2k}x_k+\cdots+g_{2n}x_n & =h_2,\\ g_{3l}x_l+\cdots+g_{3n}x_n & =h_3,\\ \cdots\cdots & \\ g_{rs}x_s+\cdots+g_{rn}x_n & =h_r,\\ 0 & =h_{r+1},\\ \cdots\cdots & \\ 0 & =h_m, \end{cases}$$

其中，$g_{11},g_{2k},g_{3l},\ldots,g_{rs}$ 均不为 0，$1<k<l<\cdots<s\leqslant n$，$r\leqslant m$. 如果 $r=m$，则方程 $0=h_i$ 不会出现.

若存在 i 满足 $r<i\leq m$ 使得 $h_i\neq 0$, 此时方程没有解.

若 $h_i=0, r<i\leq m$ 那么方程有解, 因为 $r\leq m<n$ 所以方程有无数组解.

以上两种情况方程的解都不能是确定的

例题 1.3.

解方程

$$\begin{cases} \lambda x_1+x_2+x_3=1\\ x_1+\lambda x_2+x_3=1\\ x_1+x_2+\lambda x_3=1 \end{cases}$$

解 对方程的增广矩阵进行如下初等行变换

$$\begin{bmatrix}\lambda&1&1&1\\1&\lambda&1&1\\1&1&\lambda&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&\lambda&1&1\\\lambda&1&1&1\\1&1&\lambda&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&\lambda&1&1\\0&1-\lambda^2&1-\lambda&1-\lambda\\0&1-\lambda&\lambda-1&0\end{bmatrix}\to$$

$$\begin{bmatrix}1&\lambda&1&1\\0&1-\lambda&\lambda-1&0\\0&1-\lambda^2&1-\lambda&1-\lambda\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&\lambda&1&1\\0&1-\lambda&\lambda-1&0\\0&0&(1-\lambda)(2+\lambda)&1-\lambda\end{bmatrix}$$

当 $\lambda=-2$ 时初等变换后的矩阵为

$$\begin{bmatrix}1&-2&1&1\\0&3&-3&0\\0&0&0&3\end{bmatrix}$$

此时最后一行对应的方程为 $0=3$ 所以没有解.

当 $\lambda=1$ 时初等变换后的矩阵为

$$\begin{bmatrix}1&1&1&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

方程的解为

$$\begin{cases} x_1 = 1 - s - t \\ x_2 = s \\ x_3 = t \end{cases}$$

其中 $s, t \in \mathbb{C}$.

当 $\lambda \neq 1, -2$ 时, 此时阶梯形矩阵的非零行的个数时 3 因此方程的解是唯一的, 先通过第三行求出 $x_3 = \frac{1}{2+\lambda}$ 再带入第二行求得 $x_2 = x_3 = \frac{1}{2+\lambda}$ 最后带入第一行求出 $x_1 = \frac{1}{2+\lambda}$ 故方程的解为

$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{2+\lambda} \\ x_2 = \frac{1}{2+\lambda} \\ x_3 = \frac{1}{2+\lambda} \end{cases}$$

例题 1.4.

求实系数三次多项式 $f(x)$ 使得 $f(-2) = 1, f(-1) = 3, f(1) = 13, f(2) = 33$.

解 设 $f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3$ 则由题可得

$$\begin{cases} a_0 - a_1 + a_2 - a_3 = 3 \\ a_0 + a_1 + a_2 + a_3 = 13 \\ a_0 - a_2 + 4a_2 - 8a_3 = 1 \\ a_0 + 2a_1 + 4a_2 + 8a_3 = 33 \end{cases}$$

对其增广矩阵进行初等变换

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 13 \\ 1 & -2 & 4 & -8 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 & 33 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & 10 \\ 0 & -1 & 3 & -7 & -2 \\ 0 & 3 & 3 & 9 & 30 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & -1 & 3 & -7 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & 10 \end{bmatrix} \to$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 3 & -6 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 5 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 5 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 4 \end{bmatrix} \to$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \to$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

所以方程的解为

$$\begin{cases} a_0 = 5 \\ a_1 = 4 \\ a_2 = 3 \\ a_3 = 1 \end{cases}$$

故 $f(x) = x^3 + 3x^2 + 4x + 5$

例题 1.5.

三阶行列式从任意行展开的结果相同, 即：

按第一行展开：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

按第二行展开：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = -a_{21} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{22} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{23} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

按第三行展开：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{31} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} - a_{32} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix} + a_{33} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

上述三个表达式计算结果相同, 均为原三阶行列式的值.

解 直接计算验证就可以得到.

例题 1.6.

三阶行列式从任意列展开的结果相同, 即：

按第一列展开：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{21} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{31} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}$$

按第二列展开：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = -a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{22} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{32} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix}$$

按第三列展开：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} - a_{23} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} + a_{33} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

上述三个表达式计算结果相同, 均为原三阶行列式的值.

设

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

现在我们引进几个名词. 如果将上述行列式 $|A|$ 划去某个元素 a_{ij} $(i,j=1,2,3)$ 所在的一行和一列, 则剩下的元素按原来的次序组成一个二阶行列式, 我们称这个二阶行列式为元素 a_{ij} 的余子式, 记为 M_{ij}.

比如 $|A|$ 中元素 a_{11} 的余子式为 $M_{11} = \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$, 元素 a_{12} 的余子式为 $M_{12} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$, 元素 a_{23} 的余子式为 $M_{23} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$, 等等. 行列式 $|A|$ 的值为:

$$|A| = a_{11}M_{11} - a_{21}M_{21} + a_{31}M_{31}.$$

例题 1.7.

证明: $\begin{vmatrix} ca_{11} & ca_{12} & ca_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = c \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$.

解 从第一行展开即可.

例题 1.8.

证明: $\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$.

证明 从第三行展开利用二阶行列式的性质 4 即可证明.

例题 1.9.

证明: 若存在常数 k 使得 $a_{i1} = ka_{j1}, a_{i2} = ka_{j2}, a_{i3} = ka_{j3} (i \neq j)$, 即两行成比例,

则 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 0$

证明 从成比例的两行外的另外一行展开, 利用二阶行列式的性质 5 即可得到.

例题 1.10.

证明: $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ b_{21}+c_{21} & b_{22}+c_{22} & b_{23}+c_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$

证明 从第二行展开即可.

例题 1.11.

证明: $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21}+ca_{11} & a_{22}+ca_{12} & a_{23}+ca_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$

证明 利用性质 6 再利用性质 5

例题 1.12.

证明: $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}.$

证明 直接计算验证即可.

这些行列式的性质可以推广到一般的 n 阶行列式, 即

1. 上 (下) 三角行列式的值等于其主对角线上元素之积.
2. 若行列式的某一行 (或某一列) 全为零, 则行列式的值等于零.
3. 用某个常数 c 乘以行列式的某一行 (或某一列), 所得到的行列式的值等于原行列式值的 c 倍.
4. 行列式的两行 (或两列) 对换, 行列式的值改变符号.
5. 若行列式的某两行 (或某两列) 成比例, 则行列式的值等于零.
6. 若行列式的某一行 (或某一列) 元素 $a_{ij}=b_{ij}+c_{ij}$, 则该行列式可分解为两个行列式之和, 其中一个行列式的相应行 (或列) 的元素为 b_{ij} , 另一个行列式的相应行 (或列) 的元素为 c_{ij} , 用式子来表示就是:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{i1}+c_{i1} & b_{i2}+c_{i2} & \cdots & b_{in}+c_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{i1} & b_{i2} & \cdots & b_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{i1} & c_{i2} & \cdots & c_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

7. 将行列式的某一行 (或某一列) 乘以常数 c 以后加到另一行 (或另一列) 上去, 行列式的值不变.
8. 行列式转置后的值不变, 即 $\left|\boldsymbol{A}'\right| = |\boldsymbol{A}|$.

例题 1.13.

利用三阶行列式的性质证明命题1.2.

证明 设有下列三元一次方程组:

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3=b_1, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+a_{23}x_3=b_2, \\ a_{31}x_1+a_{32}x_2+a_{33}x_3=b_3. \end{cases}$$

我们计算行列式

$$\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3 & a_{12} & a_{13} \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+a_{23}x_3 & a_{22} & a_{23} \\ a_{31}x_1+a_{32}x_2+a_{33}x_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

将上述右边行列式的第二列乘以 $-x_2$ 加到第一列上, 再将第三列乘以 $-x_3$ 加到第一列上, 根据行列式性质 7, 得到的行列式的值等于原行列式的值, 即

$$\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11}x_1 & a_{12} & a_{13} \\ a_{21}x_1 & a_{22} & a_{23} \\ a_{31}x_1 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

再由行列式性质 3, 可将上式右边第一列中的 x_1 提出来, 即

$$\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = x_1 \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix},$$

于是得到 x_1 的解:

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}.$$

同理, 可得

$$x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}, \quad x_3 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}$$

例题 1.14.

证明: 三阶范德蒙德行列式:

$$V_3 = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 \\ 1 & x_2 & x_2^2 \\ 1 & x_3 & x_3^2 \end{vmatrix} = (x_2 - x_1)(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)$$

证明 将第 1 行的 -1 倍分别加到第 $2, 3$ 行可得

$$\begin{aligned} V_3 &= \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 \\ 0 & x_2 - x_1 & x_2^2 - x_1^2 \\ 0 & x_3 - x_1 & x_3^2 - x_1^2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & x_2^2 - x_1^2 \\ x_3 - x_1 & x_3^2 - x_1^2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & (x_2 - x_1)(x_2 + x_1) \\ x_3 - x_1 & (x_3 - x_1)(x_3 + x_1) \end{vmatrix} \\ &= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \begin{vmatrix} 1 & x_2 + x_1 \\ 1 & x_3 + x_1 \end{vmatrix} = (x_2 - x_1)(x_3 - x_1)(x_3 - x_2) \end{aligned}$$

例题 1.15.

证明: 三阶爪形行列式:

$$D=\begin{vmatrix} x_1 & b_1 & b_2 \\ a_1 & x_2 & 0 \\ a_2 & 0 & x_3 \end{vmatrix}=x_1x_2x_3-a_1b_1x_3-a_2b_2x_2$$

证明 若 $x_2=0$ 直接从第二行展开, 若 $x_3=0$ 直接从第三行展开都可以直接证明上述等式成立. 若 $x_2x_3\neq 0$(即 x_2,x_3 不同时为 0) 把第 2 列的 $-\frac{a_1}{x_2}$ 倍加到第 1 列 2 列的 $-\frac{a_2}{x_3}$ 倍加到第 1 列可得

$$\begin{aligned} D&=\begin{vmatrix} x_1-\frac{a_1b_1}{x_2}-\frac{a_2b_2}{x_3} & b_1 & b_2 \\ 0 & x_2 & 0 \\ 0 & 0 & x_3 \end{vmatrix} \\ &=\left(x_1-\frac{a_1b_1}{x_2}-\frac{a_2b_2}{x_3}\right)x_2x_3 \\ &=x_1x_2x_3-a_1b_1x_3-a_2b_2x_2 \end{aligned}$$

例题 1.16.

设 x_1,x_2,x_3 是方程 $x^3+px+q=0$ 的 3 个根, 求下列行列式的值:

$$|A|=\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ x_2 & x_3 & x_1 \\ x_3 & x_1 & x_2 \end{vmatrix}$$

解 由 Vieta 定理可得 $x_1+x_2+x_3=0$, 将后两列都加到第一列上去, 第一列变为零. 因此 $|A|=0$.

例题 1.17.

求下列行列式的值:

$$|A|=\begin{vmatrix} (a+b)^2 & c^2 & c^2 \\ a^2 & (b+c)^2 & a^2 \\ b^2 & b^2 & (c+a)^2 \end{vmatrix}$$

解 若 $a=0$, 则第一、第三两列成比例, 故行列式值为零. 于是 a 是 $|A|$ 的因子, 同理 b,c 是 $|A|$ 的因子. 又第三列减去第二列, 再将第二列减去第一列可提出公因子 $(a+b+c)^2$. 于是 $|A|=abc(a+b+c)^2f(a,b,c)$, 其中 $f(a,b,c)$ 是一次齐次多项式, 设 $f(a,b,c)=k_1a+k_2b+k_3c$. 若将 a,b,c 做置换,$|A|$ 的值仍不变, 所以 $k_1=k_2=k_3$. 于是 $|A|=kabc(a+b+c)^3$. 最后取 $a=b=c=1$ 可以决定 $k=2$, 故 $|A|=2abc(a+b+c)^3$.

例题 1.18.

计算三阶柯西行列式 D_3

$$D_3=\begin{vmatrix} \frac{1}{a_1+b_1} & \frac{1}{a_1+b_2} & \frac{1}{a_1+b_3} \\ \frac{1}{a_2+b_1} & \frac{1}{a_2+b_2} & \frac{1}{a_2+b_3} \\ \frac{1}{a_3+b_1} & \frac{1}{a_3+b_2} & \frac{1}{a_3+b_3} \end{vmatrix}$$

解 对 D_3 进行列变换：第 1 列减第 3 列，第 2 列减第 3 列, 变换后行列式为：

$$D_3=\begin{vmatrix} \frac{b_3-b_1}{(a_1+b_1)(a_1+b_3)} & \frac{b_3-b_2}{(a_1+b_2)(a_1+b_3)} & \frac{1}{a_1+b_3} \\ \frac{b_3-b_1}{(a_2+b_1)(a_2+b_3)} & \frac{b_3-b_2}{(a_2+b_2)(a_2+b_3)} & \frac{1}{a_2+b_3} \\ \frac{b_3-b_1}{(a_3+b_1)(a_3+b_3)} & \frac{b_3-b_2}{(a_3+b_2)(a_3+b_3)} & \frac{1}{a_3+b_3} \end{vmatrix}$$

提取第 1 列公因子 (b_3-b_1) 和第 2 列公因子 (b_3-b_2)：

$$D_3=\frac{(b_3-b_1)(b_3-b_2)}{\prod_{j=1}^{3}(a_j+b_3)}\begin{vmatrix} \frac{1}{a_1+b_1} & \frac{1}{a_1+b_2} & 1 \\ \frac{1}{a_2+b_1} & \frac{1}{a_2+b_2} & 1 \\ \frac{1}{a_3+b_1} & \frac{1}{a_3+b_2} & 1 \end{vmatrix}$$

其中 $\prod_{j=1}^{3}(a_j+b_3)=(a_1+b_3)(a_2+b_3)(a_3+b_3)$ 对上述行列式进行行变换：第 1 行减第 3 行，第 2 行减第 3 行，变换后行列式为：

$$D_3=\frac{(b_3-b_1)(b_3-b_2)}{\prod_{j=1}^{3}(a_j+b_3)}\begin{vmatrix} \frac{a_3-a_1}{(a_1+b_1)(a_3+b_1)} & \frac{a_3-a_1}{(a_1+b_2)(a_3+b_2)} & 0 \\ \frac{a_3-a_2}{(a_2+b_1)(a_3+b_1)} & \frac{a_3-a_2}{(a_2+b_2)(a_3+b_2)} & 0 \\ \frac{1}{a_3+b_1} & \frac{1}{a_3+b_2} & 1 \end{vmatrix}$$

提取第 1 行公因子 (a_3-a_1) 和第 2 行公因子 (a_3-a_2)：

$$D_3=\frac{(b_3-b_1)(b_3-b_2)(a_3-a_1)(a_3-a_2)}{\prod_{j=1}^{3}(a_j+b_3)\prod_{k=1}^{2}(a_3+b_k)}\begin{vmatrix} \frac{1}{a_1+b_1} & \frac{1}{a_1+b_2} \\ \frac{1}{a_2+b_1} & \frac{1}{a_2+b_2} \end{vmatrix}$$

其中 $\prod_{k=1}^{2}(a_3+b_k)=(a_3+b_1)(a_3+b_2)$

二阶柯西行列式计算如下：

$$\begin{vmatrix} \frac{1}{a_1+b_1} & \frac{1}{a_1+b_2} \\ \frac{1}{a_2+b_1} & \frac{1}{a_2+b_2} \end{vmatrix}=\frac{(a_2-a_1)(b_1-b_2)}{(a_1+b_1)(a_2+b_1)(a_1+b_2)(a_2+b_2)}$$

将二阶行列式结果代入，化简后得到：

$$D_3=\frac{\prod_{1\le i<j\le 3}(a_j-a_i)(b_j-b_i)}{\prod_{1\le i,j\le 3}(a_i+b_j)}$$



第 2 章 矩阵

2.1 行和列的向量空间

2.1.1 课本主要内容的回顾与补充

定义 2.1 (数域的定义)

设 $\mathbb{F}$ 是复数集 $\mathbb{C}$ 的子集且至少有两个不同的元素，如果 $\mathbb{F}$ 中任意两个数的加法、减法、乘法以及除法（除数不为零）仍属于 $\mathbb{F}$, 则称 $\mathbb{F}$ 是一个数域.

定理 2.1

任一数域必包含有理数域 $\mathbb{Q}$.

定义 2.2 (行向量的定义)

设 $\mathbb{F}$ 是一个数域，$a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是 $\mathbb{F}$ 中的元素，由 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 组成的有序数组 $(a_1, a_2, \cdots, a_n)$ 称为数域 $\mathbb{F}$ 上的一个 n 维行向量.

行向量的加法：设 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, \cdots, a_n)$ 和 $\mathbf{b} = (b_1, b_2, \cdots, b_n)$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的两个 n 维行向量，则它们的和 $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ 定义为：

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \cdots, a_n + b_n)$$

行向量的数乘：设 $k \in \mathbb{F}$ 是一个标量，$\mathbf{a} = (a_1, a_2, \cdots, a_n)$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的一个 n 维行向量，则数乘 $k\mathbf{a}$ 定义为：

$$k\mathbf{a} = (ka_1, ka_2, \cdots, ka_n)$$

这两个运算有如下的性质, 其中 $a, b, c \in \mathbb{R}^n$ 是任意向量, $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$ 是任意实数, 0 表示零向量 $(0, \cdots, 0) \in \mathbb{F}^n$,

(i) 向量加法的交换律: $a + b = b + a$,

(ii) 向量加法的结合律: $(a + b) + c = a + (b + c)$,

(iii) 存在零向量: $a + 0 = 0 + a = a$,

(iv) 存在 $a \in \mathbb{F}^n$ 的负向量 $-a \in \mathbb{F}^n$ 使得 $a + (-a) = 0$,

(v) $1a = a$,

(vi) $(\lambda\mu)a = \lambda(\mu a)$,

(vii) 纯量乘法对向量加法的分配律: $\lambda(a+b)=\lambda a+\lambda b$,
(viii) 纯量乘法对纯量加法的分配律: $(\lambda+\mu)a=\lambda a+\mu a$.

定义 2.3 (线性空间)

设 $\mathbb{F}$ 是一个数域，V 是一个非空集合. 在 V 上定义了两种运算：

- 加法：$V\times V\to V$，记作 $(\alpha,\beta)\mapsto\alpha+\beta$
- 数乘：$\mathbb{F}\times V\to V$，记作 $(k,\alpha)\mapsto k\alpha$

如果这两种运算满足以下八条公理，则称 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的一个线性空间：

1. 加法交换律：$\forall\alpha,\beta\in V$，$\alpha+\beta=\beta+\alpha$
2. 加法结合律：$\forall\alpha,\beta,\gamma\in V$，$(\alpha+\beta)+\gamma=\alpha+(\beta+\gamma)$
3. 零元存在：$\exists\mathbf{0}\in V$，使得 $\forall\alpha\in V$，$\alpha+\mathbf{0}=\alpha$
4. 负元存在：$\forall\alpha\in V$，$\exists-\alpha\in V$，使得 $\alpha+(-\alpha)=\mathbf{0}$
5. 数乘单位元：$\forall\alpha\in V$，$1\alpha=\alpha$，其中 1 是 $\mathbb{F}$ 的单位元
6. 数乘结合律：$\forall k,l\in\mathbb{F}$，$\forall\alpha\in V$，$(kl)\alpha=k(l\alpha)$
7. 数乘对向量加法的分配律：$\forall k\in\mathbb{F}$，$\forall\alpha,\beta\in V$，$k(\alpha+\beta)=k\alpha+k\beta$
8. 数乘对标量加法的分配律：$\forall k,l\in\mathbb{F}$，$\forall\alpha\in V$，$(k+l)\alpha=k\alpha+l\alpha$

♣

定义 2.4 (线性表出的定义)

设 V 是 $\mathbb{F}$ 上的线性空间，$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 和 β 均是 V 中的向量，若存在 n 个数 $k_1,k_2\cdots,k_n$, 使

$$\beta=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2\cdots+k_n\alpha_n,$$

则称 β 是 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 的线性组合或 β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性表示.

♣

定义 2.5 (线性相关和线性无关的定义)

设 V 是 $\mathbb{F}$ 上的线性空间，$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 是 V 中的 n 个向量，若存在 $\mathbb{F}$ 中不全为零的 n 个数 $k_1,k_2\cdots,k_n$，使

$$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2\cdots+k_n\alpha_n=\mathbf{0},$$

则称 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性相关. 反之，若 $\mathbb{F}$ 中不存在不全为零的数 $k_1,k_2\cdots,k_n$，使上式成立，则称 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性无关或线性独立.

♣

注 零向量与任何向量都线性相关.

引理 2.1

若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 是一组线性相关的向量，则任一包含这组向量的向量组必线性相关，又若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 是一组线性无关的向量，则从这一组向量中任意取出一组向量必线性无关.

♡

引理 2.2

设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 是线性空间 V 中的向量，则 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性相关的充分必要条件是至少有一个向量可以表示为其余向量的线性组合.

♡

引理 2.3

设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n,\beta$ 是线性空间 V 中的向量. 已知 β 可表示为 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 的线性组合，即

$$\beta=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2\cdots+k_n\alpha_n,$$

则表示唯一的充分必要条件是 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性无关.

♡

引理 2.4

设向量组 $A=\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m\},B=\{\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n\}$ 和 $C=\{\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_p\}$ 满足：A 中任一向量都是 B 中向量的线性组合，B 中的任一向量都是 C 中向量的线性组合.

定义 2.6 (极大线性无关组)

设在线性空间 V 中有一族向量 S（其中可能只有有限个向量，也可能有无限多个向量），如果在 S 中存在一组向量 $\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r\}$ 适合如下条件：

(1)$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 线性无关；

(2) 这族向量中的任意一个向量都可以用 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 线性表示，

那么称 $\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r\}$ 是向量族 S 的极大线性无关组，简称极大无关组.

命题 2.1

设 S 是有有限个向量组成的向量族且至少包含一个非零向量则 S 的极大无关组一定存在.

引理 2.5

设 A,B 是 V 中的两组向量，A 中含有 r 个向量，B 中含有 s 个向量. 如果 A 中向量线性无关且 A 中的每个向量均可以用 B 中的向量线性表示，则 $r\leq s$.

引理 2.6

设 A,B 都是线性无关的向量组，又 A 中任一向量可用 B 中向量的线性组合来表示，B 中任一向量也可用 A 中的向量的线性组合来表示，则这两个向量组的向量个数相等.

定理 2.2

设 A 与 B 都是向量族 S 的极大线性无关组，则 A 与 B 所含的向量个数相等.

定义 2.7

向量族 S 的极大无关组所含的向量的个数称为 S 的秩，记做 $rank(s)$ 或 $r(S)$.

定义 2.8

若向量组 A,B 可以互相线性表示，则称这两个向量组等价.

定理 2.3

等价的向量组有相同的秩.

定义 2.9

设 V 是域 F 上的线性空间，V 中的向量集 S 如果满足下述两个条件：

(1) 向量集 S 是线性无关的；

(2)V 中每一个向量都可以由向量集 S 中的有限多个线性表出.

那么称 S 是 V 的一个基.

定义 2.10 (子空间)

设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的一个线性空间，W 是 V 的一个非空子集. 如果 W 对于 V 中的加法和数乘运算也构成 $\mathbb{F}$ 上的线性空间，则称 W 是 V 的一个线性子空间，简称子空间.

子空间的判定条件：W 是 V 的子空间当且仅当满足以下三个条件：

1. 非空性：$W \neq \emptyset$
2. 对加法封闭：$\forall \alpha, \beta \in W$，有 $\alpha + \beta \in W$
3. 对数乘封闭：$\forall k \in \mathbb{F}$，$\forall \alpha \in W$，有 $k\alpha \in W$

等价地，W 是 V 的子空间当且仅当：

- W 包含零向量：$\mathbf{0} \in W$
- $\forall \alpha, \beta \in W$，$\forall k, l \in \mathbb{F}$，有 $k\alpha + l\beta \in W$

定理 2.4

设 V_1, V_2 都是域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间 V 的子空间，则 $V_1 \cap V_2$ 也是 V 的子空间.

注 如何求两个解空间的交？

如果 $AX = 0$ 的解空间为 V_1,$BX = 0$ 的解空间为 V_2, 那么 $V_1 \cap V_2$ 就是 $AX = 0, BX = 0$ 的公共解构成的空间，即 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} X = 0$ 的解空间.

子空间的交的运算法则：

(1) 交换律：$V_1 \cap V_2 = V_2 \cap V_1$;

(2) 结合律：$(V_1 \cap V_2) \cap V_3 = V_1 \cap (V_2 \cap V_3)$.

定义 2.11

定义子空间的加法

$$V_1 + V_2 := \{\alpha_1 + \alpha_2 | \alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2\}$$

定理 2.5

设 V_1, V_2 都是域 $\mathbb{F}$ 上线性空间 V 的子空间，则 $V_1 + V_2$ 是 V 的子空间.

子空间的和运算适用下列运算法则：

(1) 交换律：$V_1 + V_2 = V_2 + V_1$;

(2) 结合律：$(V_1 + V_2) + V_2 = V_1 + (V_2 + V_3)$.

定理 2.6

设 V_1, V_2 都是域 $\mathbb{F}$ 上线性空间 V 的有限维子空间，则 $V_1 \cap V_2, V_1 + V_2$ 也是有限维的. 并且

$$\dim V_1 + \dim V_2 = \dim(V_1 + V_2) + \dim(V_1 \cap V_2).$$

定义 2.12

设 v_1, V_2 都是域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间 V 的子空间，如果 $V_1 + V_2$ 中每个向量 α 都能唯一地表示成

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 \in V_1, \alpha_1 \in V_2,$$

那么和 $V_1 + V_2$ 称为直和，记作 $V_1 \oplus V_2$.

定理 2.7

设 V_1, V_2 都是域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间 V 的子空间，则下列命题互相等价：

(1) 和 $V_1 + V_2$ 是直和；

(2) 和 $V_1 + V_2$ 中零向量的表法唯一；

(3)$V_1 \cap V_2 = 0$.

(4)$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2$;

(5)V_1 的一个基与 V_2 的一个基合起来是 V_1+V_2 的一个基. ♡

集合	向量空间
S 是有限集	V 是有限维向量空间
$\#S$（S 的元素个数）	$\dim V$（V 的维数）
$\#(S_1\cup S_2)$ $=\#S_1+\#S_2-\#(S_1\cap S_2)$	$\dim(V_1+V_2)$ $=\dim V_1+\dim V_2-\dim(V_1\cap V_2)$
$\#(S_1\cup S_2)=\#S_1+\#S_2$ $\Longleftrightarrow S_1\cap S_2=\varnothing$（空集）	$\dim(V_1+V_2)=\dim V_1+\dim V_2$ $\Longleftrightarrow V_1\cap V_2=\{0\}$（零子空间）
$S_1\cup\cdots\cup S_m$ 是不相交并集 $\Longleftrightarrow$ $\#(S_1\cup\cdots\cup S_m)=\#S_1+\cdots+\#S_m$	$V_1+\cdots+V_m$ 是直和 $\Longleftrightarrow$ $\dim(V_1+\cdots+V_m)$ $=\dim V_1+\cdots+\dim V_m$

2.1.2 经典例题讲解

一、向量组的线性相关与线性无关的判断

对于一个向量组 $\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s\}$, 因为

$$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s\text{线性无关}\Longleftrightarrow x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_s\alpha_s=0\text{只有零解}$$

于是我们可以根据方程的解是非是唯一的来判断, 向量组是非是线性无关的, 如果初等变换后得到的阶梯形矩阵的非零行个数等于列数那么向量组是线性无关的.

例题 2.1.

判断向量 $X_1=(2,3,-1),X_2=(3,5,2),X_3=(-2,4,1)$ 是否线性相关.

解 对下面矩阵进行初等变换

$$\begin{pmatrix}2&3&-2\\3&5&4\\-1&2&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-1&2&1\\3&5&4\\2&3&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-2&-1\\3&5&4\\2&3&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-2&-1\\0&11&7\\0&7&0\end{pmatrix}\to$$
$$\begin{pmatrix}1&-2&-1\\0&11&7\\0&1&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-2&-1\\0&0&7\\0&1&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-2&-1\\0&1&0\\0&0&7\end{pmatrix}$$

所以 $x_1X_1+x_2X_2+x_3X_3=0$ 只有零解故所以 X_1,X_2,X_3 线性无关.

对于一个向量组 $\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s\}$，要判断其线性相关性并找出一个极大线性无关组，可采用以下步骤：

1. **构造矩阵**：将向量作为列构成矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)$.
2. **初等行变换**：对 A 进行初等行变换，将其化为行阶梯形矩阵 B.(注意不能做初等列变换, 因为初等行变换不改变列的线性相关性和线性无关性，但是初等列变换会改变)
3. **判断线性相关性**：
   - 若 B 的非零行个数（即矩阵的秩）等于 s，则向量组线性无关.
   - 若秩小于 s，则向量组线性相关.
4. **找极大线性无关组**：B 中主元所在的列对应的 A 的列向量构成原向量组的一个极大线性无关组.

例题 2.2.

判断向量 $X_1=(4,-5,2,6), X_2=(2,-2,1,3), X_3=(6,-3,3,9)$ 是否线性无关, 找出极大线性无关组并计算秩.

解 构造矩阵 $A=\begin{pmatrix}4&2&6\\-5&-2&-3\\2&1&3\\6&3&9\end{pmatrix}$ 对其进行初等行变换:

$$\begin{pmatrix}4&2&6\\-5&-2&-3\\2&1&3\\6&3&9\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2&1&3\\-5&-2&-3\\4&2&6\\6&3&9\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2&1&3\\-1&0&3\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2&1&3\\1&0&-3\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}\to$$

$$\begin{pmatrix}1&0&-3\\2&1&3\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-3\\0&1&9\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$$

得到行阶梯形矩阵, 非零行数为 2, 故秩为 2. 由于向量个数为 3, 故向量组线性相关. 极大线性无关组可取为 X_1, X_2.

例题 2.3.

假设向量 $X_1, X_2, \cdots, X_k$ 线性无关. 判断下列向量组是否线性相关, 并计算这向量组的秩.

(1) $Y_1=3X_1+2X_2+X_3+X_4, Y_2=2X_1+5X_2+3X_3+2X_4, Y_3=3X_1+4X_2+X_3+2X_4$.

(2) $Y_1=X_1+X_2, Y_2=X_2+X_3, Y_3=X_3+X_4, \cdots, Y_{k-1}=X_{k-1}+X_k, Y_k=X_k+X_1$.

解 (1) 已知 X_1, X_2, X_3, X_4 线性无关, 因此它们构成一组基. 向量 Y_1, Y_2, Y_3 在该基下的坐标分别为:

$$Y_1=(3,2,1,1)^{\mathrm{T}},\quad Y_2=(2,5,3,2)^{\mathrm{T}},\quad Y_3=(3,4,1,2)^{\mathrm{T}}.$$

构造坐标矩阵:

$$A=\begin{pmatrix}3&2&3\\2&5&4\\1&3&1\\1&2&2\end{pmatrix}.$$

对 A 进行初等行变换：

$$A=\begin{pmatrix}3&2&3\\2&5&4\\1&3&1\\1&2&2\end{pmatrix}\xrightarrow{R_1\leftrightarrow R_3}\begin{pmatrix}1&3&1\\2&5&4\\3&2&3\\1&2&2\end{pmatrix}\xrightarrow[R_3-3R_1]{R_2-2R_1,\,R_4-R_1}\begin{pmatrix}1&3&1\\0&-1&2\\0&-7&0\\0&-1&1\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_2\times(-1)}\begin{pmatrix}1&3&1\\0&1&-2\\0&-7&0\\0&-1&1\end{pmatrix}\xrightarrow[R_4+R_2]{R_3+7R_2}\begin{pmatrix}1&3&1\\0&1&-2\\0&0&-14\\0&0&-1\end{pmatrix}\xrightarrow{R_3\div(-14)}\begin{pmatrix}1&3&1\\0&1&-2\\0&0&1\\0&0&-1\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_4+R_3}\begin{pmatrix}1&3&1\\0&1&-2\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

行阶梯形矩阵有 3 个非零行，故 $\operatorname{rank}(A)=3$. 因此 Y_1,Y_2,Y_3 线性无关，且向量组的秩为 3.

(2) 考虑线性组合：

$$c_1Y_1+c_2Y_2+\cdots+c_kY_k=0.$$

代入表达式并整理得：

$$(c_1+c_k)X_1+(c_1+c_2)X_2+(c_2+c_3)X_3+\cdots+(c_{k-1}+c_k)X_k=0.$$

由于 $X_1,\dots,X_k$ 线性无关，系数全为零：

$$\begin{cases}c_1+c_k=0\\c_1+c_2=0\\c_2+c_3=0\\\vdots\\c_{k-1}+c_k=0\end{cases}$$

由第二式得 $c_2=-c_1$，代入第三式得 $c_3=-c_2=c_1$，依次类推，可得：

$$c_i=(-1)^{i+1}c_1\quad(i=1,2,\dots,k).$$

代入第一式：

$$c_1+(-1)^{k+1}c_1=0\quad\Rightarrow\quad c_1\left[1+(-1)^{k+1}\right]=0.$$

若 k 为奇数，则 $(-1)^{k+1}=1$，故 $2c_1=0$，即 $c_1=0$，从而所有 $c_i=0$，向量组线性无关，秩为 k.

若 k 为偶数，则 $(-1)^{k+1}=-1$，故 $0\cdot c_1=0$，c_1 可取任意值，存在非零解（如 $c_1=1,c_2=-1,c_3=1,\dots,c_k=-1$），向量组线性相关. 此时方程组的解空间维数为 1，故秩为 $k-1$.

例题 2.4.

求 λ 使得向量 $(7,-2,\lambda)$ 是向量 $(2,3,5),(3,7,8),(1,-6,1)$ 的线性组合.

解 设向量 $(7,-2,\lambda)$ 是向量 $(2,3,5)$、$(3,7,8)$、$(1,-6,1)$ 的线性组合，即存在实数 a,b,c 使得：

$$a\begin{pmatrix}2\\3\\5\end{pmatrix}+b\begin{pmatrix}3\\7\\8\end{pmatrix}+c\begin{pmatrix}1\\-6\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}7\\-2\\\lambda\end{pmatrix}$$

对应的线性方程组为：

$$\begin{cases} 2a+3b+c=7 \\ 3a+7b-6c=-2 \\ 5a+8b+c=\lambda \end{cases}$$

构造增广矩阵：

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 7 \\ 3 & 7 & -6 & -2 \\ 5 & 8 & 1 & \lambda \end{array}\right)$$

对增广矩阵进行如下初等变换:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 7 \\ 6 & 14 & -12 & -4 \\ 10 & 16 & 2 & 2\lambda \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 7 \\ 0 & 5 & -15 & -25 \\ 0 & 1 & -3 & 2\lambda-35 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & -3 & -5 \\ 0 & 1 & -3 & 2\lambda-35 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & -3 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 2\lambda-30 \end{array}\right)$$

最后一行对应方程：

$$0\cdot a+0\cdot b+0\cdot c=2\lambda-30$$

为使方程组有解，必须满足：

$$2\lambda-30=0 \quad \Rightarrow \quad \lambda=15$$

当 $\lambda=15$ 时，向量 $(7,-2,\lambda)$ 是给定向量组的线性组合.

例题 2.5.

设有两个向量组 $A=\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m\}$,$B=\{\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n\}$. 求证：它们等价的充要条件是它们的秩相等且其中一组向量可以用另一个向量表示出来.

证明 根据向量等价的定义知，只需证明充分性.
假设向量组 A 可以用向量 B 表示，现证明向量组 B 也可以用向量组 A 线性表示.
不失一般性，设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 是 A 的极大无关组，$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_r$ 是向量组 B 的极大无关组.
考虑向量组 $C=\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r;\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_r\}$.
因为 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 可用 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_r$ 线性表示，故 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_r$ 是向量组 C 的极大无关组，从而向量组 C 的秩等于 r. 因为 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 线性无关，所以 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 可以线性表示 $\beta_2,\cdots,\beta_r$.
故向量组 B 也可用向量组 A 线性表示，故 A 和 B 等价.

二、子空间

判断一个集合 S 是域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间 V 的子空间, 只需判断非空以及对加法和数乘封闭, 即

1. $S\neq\emptyset$
2. $\forall\alpha,\beta\in S \implies \alpha+\beta\in S$
3. $\forall\lambda\in\mathbb{F},\forall\alpha\in S \implies \lambda\alpha\in S$

例题 2.6.

证明在 $\mathbb{R}^n$ 中, 第一个坐标和最后一个坐标相等的向量全体是一个线性子空间.

解 定义集合

$$S = \{(x_1, x_2, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_1 = x_n\}.$$

我们要证明 S 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个线性子空间.

1. 显然 $0 \in S$, 所以 $S \neq \emptyset$
2. 设 $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \ldots, u_n) \in S$ 和 $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \ldots, v_n) \in S$. 那么由 S 的定义，有 $u_1 = u_n$ 和 $v_1 = v_n$. 考虑和 $\mathbf{u} + \mathbf{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, \ldots, u_n + v_n)$. 其第一个坐标为 $u_1 + v_1$，最后一个坐标为 $u_n + v_n$. 由于 $u_1 = u_n$ 和 $v_1 = v_n$，有 $u_1 + v_1 = u_n + v_n$. 因此 $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in S$.
3. 设 $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \ldots, u_n) \in S$ 和 $c \in \mathbb{R}$. 那么由 S 的定义，有 $u_1 = u_n$. 考虑标量乘法 $c\mathbf{u} = (cu_1, cu_2, \ldots, cu_n)$. 其第一个坐标为 cu_1，最后一个坐标为 cu_n. 由于 $u_1 = u_n$，有 $cu_1 = cu_n$. 因此 $c\mathbf{u} \in S$.

由于所有条件均满足，我们得出结论：S 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个线性子空间.

例题 2.7.

证明有 n 个未知元的齐次线性方程组的解集是 $\mathbb{R}^n$ 的线性子空间.

解 设齐次线性方程组为：

$$A\mathbf{x} = \mathbf{0},$$

其中 A 是一个 $m \times n$ 矩阵，$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_n)^\top \in \mathbb{R}^n$，$\mathbf{0} \in \mathbb{R}^m$ 是零向量. 定义解集：

$$S = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid A\mathbf{x} = \mathbf{0}\}.$$

我们要证明 S 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个线性子空间.

为了证明 S 是一个子空间，需要验证以下条件：

1. 非空性：显然 $\mathbf{0} \in S$
2. 加法封闭性：若 $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in S$，则 $A\mathbf{u} = \mathbf{0}$ 和 $A\mathbf{v} = \mathbf{0}$. 考虑和 $\mathbf{u} + \mathbf{v}$：

$$A(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = A\mathbf{u} + A\mathbf{v} = \mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0},$$

所以 $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in S$.

3. 标量乘法封闭性：若 $\mathbf{u} \in S$ 和 $c \in \mathbb{R}$，则 $A\mathbf{u} = \mathbf{0}$. 考虑标量乘法 $c\mathbf{u}$：

$$A(c\mathbf{u}) = c(A\mathbf{u}) = c\mathbf{0} = \mathbf{0},$$

所以 $c\mathbf{u} \in S$.

由于所有条件均满足，因此 S 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个线性子空间.

例题 2.8.

证明 $\mathbb{R}^n$ 中的线性子空间的任一个基都可以扩充为 $\mathbb{R}^n$ 的基.

解 设 V 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个线性子空间，$\dim V = k$（$0 \leq k \leq n$）. 设 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_k\}$ 是 V 的一个基.

情况 **1**：如果 $k = n$，则 $V = \mathbb{R}^n$，此时 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_k\}$ 已经是 $\mathbb{R}^n$ 的一个基，结论成立.

情况 **2**：如果 $k < n$，则 V 是 $\mathbb{R}^n$ 的真子空间. 由于 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_k\}$ 线性无关，但还不是 $\mathbb{R}^n$ 的基，存在向量 $\mathbf{w}_{k+1} \in \mathbb{R}^n$ 使得 $\mathbf{w}_{k+1} \notin \operatorname{span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_k\}$.

考虑集合 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_k, \mathbf{w}_{k+1}\}$. 由于 $\mathbf{w}_{k+1}$ 不能被 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_k\}$ 线性表示，这个集合仍然线性无关.

如果 $k + 1 = n$，则我们已经得到 $\mathbb{R}^n$ 的一个基. 如果 $k + 1 < n$，则重复上述过程：存在向量 $\mathbf{w}_{k+2} \in \mathbb{R}^n$ 使得 $\mathbf{w}_{k+2} \notin \operatorname{span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_k, \mathbf{w}_{k+1}\}$，将 $\mathbf{w}_{k+2}$ 加入集合.

继续这一过程，由于 $\mathbb{R}^n$ 是有限维的（$\dim \mathbb{R}^n = n$），经过有限步（确切地说，$n - k$ 步）后，我们得到一个包含 k 个向量的线性无关集合：

$$\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_k, \mathbf{w}_{k+1}, \mathbf{w}_{k+2}, \ldots, \mathbf{w}_n\}$$

这个集合包含 n 个向量且在 $\mathbb{R}^n$ 中线性无关，因此是 $\mathbb{R}^n$ 的一个基.

这就证明了 V 的基 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_k\}$ 可以扩充为 $\mathbb{R}^n$ 的基.

例题 2.9.

设 V_1, V_2 都是域 $\mathbb{F}$ 上线性空间 V 的有限维子空间，证明

$$\dim V_1 + \dim V_2 = \dim(V_1 + V_2) + \dim(V_1 \cap V_2).$$

证明 设 $\dim(V_1 \cap V_2) = r$，取 $V_1 \cap V_2$ 的一组基为 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_r$.

根据基的扩充定理，可以将这组基分别扩充为 V_1 和 V_2 的基：

- 在 V_1 中：$\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_r, \beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_s$ 是 V_1 的基，其中 $s = \dim V_1 - r$
- 在 V_2 中：$\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_r, \gamma_1, \gamma_2, \ldots, \gamma_t$ 是 V_2 的基，其中 $t = \dim V_2 - r$

现在考虑向量组：

$$\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_r, \beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_s, \gamma_1, \gamma_2, \ldots, \gamma_t$$

证明这个向量组是 $V_1 + V_2$ 的基：

(1) 生成性：任取 $v \in V_1 + V_2$，则存在 $v_1 \in V_1$，$v_2 \in V_2$ 使得 $v = v_1 + v_2$.

由于 v_1 可由 $\alpha_1, \ldots, \alpha_r, \beta_1, \ldots, \beta_s$ 线性表示，v_2 可由 $\alpha_1, \ldots, \alpha_r, \gamma_1, \ldots, \gamma_t$ 线性表示，因此 v 可由 $\alpha_1, \ldots, \alpha_r, \beta_1, \ldots, \beta_s, \gamma_1, \ldots$ 线性表示.

(2) 线性无关性：设

$$\sum_{i=1}^{r} a_i\alpha_i + \sum_{j=1}^{s} b_j\beta_j + \sum_{k=1}^{t} c_k\gamma_k = 0$$

整理得：

$$\sum_{i=1}^{r} a_i\alpha_i + \sum_{j=1}^{s} b_j\beta_j = -\sum_{k=1}^{t} c_k\gamma_k$$

左边属于 V_1，右边属于 V_2，因此该向量属于 $V_1 \cap V_2$，设其为

$$\sum_{i=1}^{r} d_i\alpha_i$$

于是有：

$$\sum_{i=1}^{r} a_i\alpha_i + \sum_{j=1}^{s} b_j\beta_j = \sum_{i=1}^{r} d_i\alpha_i$$

整理得：

$$\sum_{i=1}^{r} (a_i - d_i)\alpha_i + \sum_{j=1}^{s} b_j\beta_j = 0$$

由于 $\alpha_1, \ldots, \alpha_r, \beta_1, \ldots, \beta_s$ 是 V_1 的基，线性无关，故 $b_j = 0$（$j = 1, \ldots, s$），且 $a_i = d_i$（$i = 1, \ldots, r$）.

同理，由

$$\sum_{i=1}^{r} d_i\alpha_i + \sum_{k=1}^{t} c_k\gamma_k = 0$$

且 $\alpha_1, \ldots, \alpha_r, \gamma_1, \ldots, \gamma_t$ 是 V_2 的基，线性无关，故 $c_k = 0$（$k = 1, \ldots, t$），且 $d_i = 0$（$i = 1, \ldots, r$）.

因此所有系数均为零，向量组线性无关.

综上，该向量组是 $V_1 + V_2$ 的基，维数为 $r + s + t$.

计算维数：

$$\begin{aligned}\dim(V_1+V_2) &= r+s+t\\ &= r+(\dim V_1-r)+(\dim V_2-r)\\ &= \dim V_1+\dim V_2-r\\ &= \dim V_1+\dim V_2-\dim(V_1\cap V_2)\end{aligned}$$

移项得：

$$\dim V_1+\dim V_2=\dim(V_1+V_2)+\dim(V_1\cap V_2)$$

证毕.

例题 2.10.

解释为什么，受三个有限集合的并集的元素个数公式的类比启发，你可能会猜测：如果 V_1,V_2,V_3 是有限维向量空间的子空间，那么

$$\begin{aligned}\dim(V_1+V_2+V_3) &= \dim V_1+\dim V_2+\dim V_3\\ &\quad -\dim(V_1\cap V_2)-\dim(V_1\cap V_3)-\dim(V_2\cap V_3)\\ &\quad +\dim(V_1\cap V_2\cap V_3).\end{aligned}$$

然后，要么证明上述公式，要么给出一个反例.

解 设

$$V_1=\langle(-1,2)\rangle,\quad V_2=\langle((1,1))\rangle,\quad \text{且}\quad V_3=\langle(4,-1)\rangle.$$

可以直接验证 $V_1+V_2+V_3=\mathbb{R}^2$，且

$$V_1\cap V_2=V_1\cap V_3=V_2\cap V_3=V_1\cap V_2\cap V_3=\{0\}.$$

因此，$\dim(V_1+V_2+V_3)=\dim\mathbb{R}^2=2$，而所提出公式的右侧为

$$1+1+1-0-0-0+0=3.$$

例题 2.11.

证明：若 V_1,V_2 和 V_3 是有限维向量空间的子空间，则

$$\begin{aligned}\dim(V_1+V_2+V_3) &= \dim V_1+\dim V_2+\dim V_3\\ &\quad -\frac{\dim(V_1\cap V_2)+\dim(V_1\cap V_3)+\dim(V_2\cap V_3)}{3}\\ &\quad -\frac{\dim((V_1+V_2)\cap V_3)+\dim((V_1+V_3)\cap V_2)+\dim((V_2+V_3)\cap V_1)}{3}.\end{aligned}$$

证明 利用两次“两个子空间和的维数公式”（即 $\dim(U+W)=\dim U+\dim W-\dim(U\cap W)$），注意到：

$$\begin{aligned}\dim(V_1+V_2+V_3) &= \dim(V_1+V_2)+\dim V_3-\dim((V_1+V_2)\cap V_3)\\ &= \dim V_1+\dim V_2+\dim V_3-\dim(V_1\cap V_2)-\dim((V_1+V_2)\cap V_3).\end{aligned}$$

类似地，我们可推出：

$$\dim(V_1+V_2+V_3)=\dim V_1+\dim V_2+\dim V_3-\dim(V_1\cap V_3)-\dim((V_1+V_3)\cap V_2),$$

$$\dim(V_1+V_2+V_3)=\dim V_1+\dim V_2+\dim V_3-\dim(V_2\cap V_3)-\dim((V_2+V_3)\cap V_1).$$

将这三个公式相加，再对两边同时除以 3，即可得到所需的公式.

例题 2.12.

设 V_1, V_2 都是域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间 V 的子空间，则下列命题互相等价：

(1) 和 $V_1 + V_2$ 是直和；

(2) 和 $V_1 + V_2$ 中零向量的表法唯一；

(3)$V_1 \cap V_2 = 0$.

(4)$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2$;

(5)V_1 的一个基与 V_2 的一个基合起来是 $V_1 + V_2$ 的一个基.

证明 (1) ⇒ (2) 若 $V_1 + V_2$ 是直和（记为 $V_1 \oplus V_2$），根据直和的定义：和中每个向量的表法唯一. 特别地，零向量 $0 \in V_1 + V_2$，其表法必然唯一（直和要求所有向量表法唯一，零向量是特例）.

(2) ⇒ (3) 假设 $V_1 + V_2$ 中零向量的表法唯一. 若存在非零向量 $\alpha \in V_1 \cap V_2$，则零向量可表为 $0 = \alpha + (-\alpha)$（$\alpha \in V_1$，$-\alpha \in V_2$）；同时，零向量也可表为 $0 + 0$（$0 \in V_1$，$0 \in V_2$）. 由零向量表法唯一，得 $\alpha = 0$ 且 $-\alpha = 0$，故 $V_1 \cap V_2$ 中只有零向量，即 $V_1 \cap V_2 = \{0\}$.

(3) ⇒ (4) 子空间和的维数公式为：

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2).$$

若 $V_1 \cap V_2 = \{0\}$，则 $\dim(V_1 \cap V_2) = 0$，代入得：

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2.$$

(4) ⇒ (5) 设：

V_1 的基为 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_m$（故 $\dim V_1 = m$）；

V_2 的基为 $\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_n$（故 $\dim V_2 = n$）.

需证：$\alpha_1, \ldots, \alpha_m, \beta_1, \ldots, \beta_n$ 是 $V_1 + V_2$ 的基.

能张成性：该向量组张成 $V_1 + V_2$ 对任意 $\gamma \in V_1 + V_2$，存在 $\gamma_1 \in V_1$，$\gamma_2 \in V_2$，使得 $\gamma = \gamma_1 + \gamma_2$. 由基的张性：

$\gamma_1 = k_1\alpha_1 + \cdots + k_m\alpha_m$（$k_i \in \mathbb{F}$）；

$\gamma_2 = l_1\beta_1 + \cdots + l_n\beta_n$（$l_j \in \mathbb{F}$）.

因此 $\gamma = k_1\alpha_1 + \cdots + k_m\alpha_m + l_1\beta_1 + \cdots + l_n\beta_n$，即该向量组张成 $V_1 + V_2$.

线性无关性：该向量组线性无关假设存在 $k_1, \ldots, k_m, l_1, \ldots, l_n \in \mathbb{F}$，使得：

$$k_1\alpha_1 + \cdots + k_m\alpha_m + l_1\beta_1 + \cdots + l_n\beta_n = 0.$$

令 $\alpha = k_1\alpha_1 + \cdots + k_m\alpha_m$（$\alpha \in V_1$），$\beta = l_1\beta_1 + \cdots + l_n\beta_n$（$\beta \in V_2$），则 $\alpha + \beta = 0$，即 $\alpha = -\beta$.

因此 $\alpha \in V_1 \cap V_2$，结合 $V_1 \cap V_2 = \{0\}$，得 $\alpha = 0$ 且 $\beta = 0$.

由 $\alpha = 0$ 及 $\alpha_1, \ldots, \alpha_m$ 线性无关，得 $k_1 = \cdots = k_m = 0$；由 $\beta = 0$ 及 $\beta_1, \ldots, \beta_n$ 线性无关，得 $l_1 = \cdots = l_n = 0$.

故 $\alpha_1, \ldots, \alpha_m, \beta_1, \ldots, \beta_n$ 线性无关.

综上，该向量组是 $V_1 + V_2$ 的基.

(5) ⇒ (1) 设 V_1 的基为 $\alpha_1, \ldots, \alpha_m$，$V_2$ 的基为 $\beta_1, \ldots, \beta_n$，且它们的合并组是 $V_1 + V_2$ 的基.

需证：$V_1 + V_2$ 中每个向量的表法唯一.

对任意 $\gamma \in V_1 + V_2$，由基的张性，可表为：

$$\gamma = k_1\alpha_1 + \cdots + k_m\alpha_m + l_1\beta_1 + \cdots + l_n\beta_n.$$

若另有表法 $\gamma = k_1'\alpha_1 + \cdots + k_m'\alpha_m + l_1'\beta_1 + \cdots + l_n'\beta_n$，两式相减得：

$$(k_1 - k_1')\alpha_1 + \cdots + (k_m - k_m')\alpha_m + (l_1 - l_1')\beta_1 + \cdots + (l_n - l_n')\beta_n = 0.$$

由合并组线性无关，所有系数必为 0，即 $k_i = k_i'$（$i = 1, \ldots, m$）且 $l_j = l_j'$（$j = 1, \ldots, n$）.

因此 γ 的表法唯一，故 $V_1 + V_2$ 是直和.

例题 2.13.

设 $\alpha_1=(1,0,-1,0),\alpha_2=(0,1,2,1),\alpha_3=(2,1,0,1)$ 是四维实行向量空间 V 中的向量，它们生成的子空间为 V_1；又向量 $\beta_1=(-1,1,1,1),\beta_2=(1,-1,-3,-1),\beta_3=(-1,1,-1,1)$ 生成的子空间为 V_2，求子空间 V_1+V_2 和 $V_1\cap V_2$ 的基.

解 V_1+V_2 是由 α_i 和 β_i 生成的，因此只要求出这 6 个向量的极大无关组即可. 将这 6 个向量按列分块方式拼成矩阵，并用初等行变换将其化为阶梯形矩阵：

$$\begin{pmatrix}1&0&2&-1&1&-1\\0&1&1&1&-1&1\\-1&2&0&1&-3&-1\\0&1&1&1&-1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&2&-1&1&-1\\0&1&1&1&-1&1\\0&2&2&0&-2&-2\\0&0&0&0&0&0\end{pmatrix}\to$$

$$\begin{pmatrix}1&0&2&-1&1&-1\\0&1&1&1&-1&1\\0&0&0&-2&0&-4\\0&0&0&0&0&0\end{pmatrix},$$

故可取 $\alpha_1,\alpha_2,\beta_1$ 为 V_1+V_2 的基（不唯一）.

再来求 $V_1\cap V_2$ 的基. 首先注意到 α_1,α_2 是 V_1 的基（从上面的矩阵即可看出）；又不难验证 β_1,β_2 是 V_2 的基，V_2 中的向量可表示为 β_1,β_2 的线性组合. 假设 $t_1\beta_1+t_2\beta_2$ 属于 V_1，则向量组 $\alpha_1,\alpha_2,t_1\beta_1+t_2\beta_2$ 与向量组 α_1,α_2 的秩相等（因 α_1,α_2 是 V_1 的基）. 因此，可用矩阵方法求出参数 t_1,t_2. 注意到

$$\begin{pmatrix}1&0&-t_1+t_2\\0&1&t_1-t_2\\-1&2&t_1-3t_2\\0&1&t_1-t_2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-t_1+t_2\\0&1&t_1-t_2\\0&2&-2t_2\\0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-t_1+t_2\\0&1&t_1-t_2\\0&0&-2t_1\\0&0&0\end{pmatrix},$$

故可得 $t_1=0$，所以 $V_1\cap V_2$ 的基可取为 β_2.

例题 2.14.

设 V_1,V_2 分别是数域 $\mathbb{F}$ 上的齐次线性方程组 $x_1=x_2=\cdots=x_n$ 与 $x_1+x_2+\cdots+x_n=0$ 的解空间，求证: $\mathbb{F}^n=V_1\oplus V_2$.

解 由线性方程组解的定理知, V_1 的维数是 1, V_2 的维数是 $n-1$. 若列向量 $\alpha\in V_1\cap V_2$, 则 α 既是第一个线性方程组的解, 也是第二个线性方程组的解, 不难看出 α 只能等于零向量, 因此 $V_1\cap V_2=\{0\}$. 又因为

$$\dim(V_1\oplus V_2)=\dim V_1+\dim V_2=1+(n-1)=n=\dim\mathbb{F}^n,$$

故 $\mathbb{F}^n=V_1\oplus V_2$. □

2.2 矩阵的秩

2.2.1 课本主要内容的回顾与补充

定义 2.13

设 A 是 $m\times n$ 矩阵，则 A 的 m 个行向量的秩称为 A 的行秩；则 A 的 n 个列向量的秩称为 A 的列秩.

定理 2.8

矩阵的行秩和列秩在初等变换下不变.

推论 2.1

任一矩阵的行秩等于列秩.

推论 2.2

设 A 是 $m \times n$ 矩阵且 A 的第 $j_1, \cdots$, 第 j_r 列向量是 A 的列向量的极大无关组，则对任意的 m 阶非异矩阵 Q，矩阵 QA 的第 $j_1, \cdots$，第 j_r 列向量也是 QA 的列向量的极大无关组.

命题 2.2

设 A 是阶梯形矩阵，则 A 的秩等于其非零行的个数，且阶梯点所在的列项量是 A 的列向量的极大无关组.

推论 2.3

对任意一个秩为 r 的 $m \times n$ 矩阵 A，总存在 m 阶的非异矩阵 P 和 n 阶非异矩阵 Q，使得

$$PAQ = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix} \tag{2.1}$$

.

推论 2.4

任一矩阵 A 的转置 ${}^tA$ 与 A 有相同的秩.

推论 2.5

任一矩阵与一非异矩阵相乘，其秩不变.

推论 2.6

n 阶方阵 A 为非异矩阵的充要条件是 A 为满秩矩阵.

推论 2.7

两个 $m \times n$ 矩阵等价的充分必要条件是它们具有相同的秩.

定理 2.9

设 $m \times n$ 矩阵 $A = (a_{ij})$ 有一个 r 阶子式不等于零，且 A 中任意 $r+1$ 阶子式（如果存在）都等于零，则 $r(A) = r$. 反之，若 $r(A) = r$, 则 A 中必有 r 阶子式不为零，而所有 $r+1$ 阶子式都等于零.

定理 2.10

设有 n 个未知数 m 个方程式组成的线性方程组:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \tag{2.2}$$

它的系数矩阵记为 A，增广矩阵记为 $\widetilde{\boldsymbol{A}}$，即

$$\widetilde{\boldsymbol{A}}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}$$

则有下列结论:

(1) 若 $\widetilde{\boldsymbol{A}}$ 与 A 的秩都等于 n，则该方程组有唯一一组解;

(2) 若 $\widetilde{A}$ 与 A 的秩相等但小于 n，即 $r(\widetilde{A})=r(A)<n$，则该方程组有无穷多解

(3) 若 $\widetilde{\boldsymbol{A}}$ 与 A 的秩不相等, 则该方程组无解.

♡

定理 2.11

设有齐次线性方程组

$$Ax=\mathbf{0} \tag{2.3}$$

，其中 $A=(a_{ij})$ 是 $m\times n$ 矩阵. 若 $r(A)=r<n$, 则上述方程组有非零解. 它的解构成 n 维列向量空间的一个 $n-r$ 维子空间. 也就是说，存在 $n-r$ 个向量构成的基础解系 $\{\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_{n-r}\}$, 使上述方程组的任一解均可表示为 $\{\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_{n-r}\}$ 的线性组合.

♡

2.2.2 经典例题讲解

一、矩阵秩的计算

设 A 是一个 $m\times n$ 矩阵，以下定义都是等价的：

1. **行秩**：矩阵行向量组的秩，即行向量组的极大线性无关组中向量的个数.
2. **列秩**：矩阵列向量组的秩，即列向量组的极大线性无关组中向量的个数.
3. **简化阶梯形矩阵的非零行数**：通过初等行变换将矩阵化为简化行阶梯形后，非零行的个数.
4. **非零子式的最高阶数**：矩阵中非零子式的最高阶数. 即存在一个 r 阶子式不为零，而所有 $r+1$ 阶子式（如果存在）都为零.
5. **像空间（列空间）的维数**：

$$\operatorname{rank}(A)=\dim(\operatorname{Im}(A))=\dim(\operatorname{Col}(A))$$

其中 $\operatorname{Col}(A)$ 是由 A 的列向量张成的空间.

6. **核空间的零度关系**：

$$\operatorname{rank}(A)=n-\dim(\operatorname{Ker}(A))$$

其中 $\operatorname{Ker}(A)=\{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n\mid A\mathbf{x}=\mathbf{0}\}$.

7. **线性变换的秩**：将 A 视为线性变换 $T:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$，则

$$\operatorname{rank}(A)=\dim(T(\mathbb{R}^n))$$

8. **矩阵的相抵标准形**：通过初等变换，A 可以化为

$$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

其中 I_r 是 r 阶单位矩阵，则 $\operatorname{rank}(A)=r$.

例题 2.15.

计算下面矩阵的秩

(1) $\begin{pmatrix} 2 & 5 & 6 & -1 & 1 \\ -4 & 3 & 5 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 7 & 1 & 8 \end{pmatrix}$;

(2) $\begin{pmatrix} 8 & -4 & 5 & 5 & 9 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & 7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \end{pmatrix}$;

(3) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$;

(4) $\begin{pmatrix} 1 & x & -1 & 2 \\ 2 & -1 & x & 5 \\ 1 & 10 & -6 & 1 \end{pmatrix}$ （x 是变量）;

解 (1) 对矩阵进行如下初等变换

$$\begin{pmatrix} 2 & 5 & 6 & -1 & 1 \\ -4 & 3 & 5 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 7 & 1 & 8 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 2 & 5 & 6 & -1 & 1 \\ 0 & 13 & 17 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & 7 & 1 & 8 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 2 & 5 & 6 & -1 & 1 \\ 0 & 13 & 17 & 0 & 2 \\ 0 & -11 & -4 & 5 & 13 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 2 & 5 & 6 & -1 & 1 \\ 0 & 13 & 17 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 135 & 65 & 191 \end{pmatrix}$$

(2) 对矩阵进行如下初等变换

$$\begin{pmatrix} 8 & -4 & 5 & 5 & 9 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & 7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & 7 \\ 8 & -4 & 5 & 5 & 9 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & 7 \\ 0 & 20 & 45 & 5 & -47 \\ 0 & 16 & 36 & 4 & -48 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & -16 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & 7 \\ 0 & 20 & 45 & 5 & -47 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{52}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{14}{5} \end{pmatrix}$$

$$\to \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & 7 \\ 0 & 20 & 45 & 5 & -47 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{52}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(3) 把第 k 行的 -1 倍依次加到 $k-1$ 行,$k = n, n-1, \cdots, 2$ 可得

$$\begin{pmatrix} 1+(-1)^{n-1} & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ (-1)^{n-2} & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

把第 k 列的 $(-1)^{n-k+1}$ 倍加到第一列，$k=2,3,\cdots,n$ 得

$$\begin{pmatrix} 1+(-1)^{n-1} & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

所以 n 为偶数时矩阵的秩是 $n-1$,n 是奇数是矩阵的秩是 n.

(4) 对矩阵进行如下初等变换

$$\begin{pmatrix} 1 & x & -1 & 2 \\ 2 & -1 & x & 5 \\ 1 & 10 & -6 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & x & -1 & 2 \\ 0 & -1-2x & x+2 & 1 \\ 0 & 10-x & -5 & -1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1-2x & x+2 & 1 \\ 0 & 10-x & -5 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 9-3x & x-3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 9-3x & x-3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x-3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$x=3$ 时秩为 2,$x\neq 3$ 时秩为 3.

设 A 是 $n\times n$ 矩阵，则以下命题等价：

1. A 是满秩矩阵，即 $\text{rank}(A)=n$
2. A 是可逆矩阵（非奇异矩阵）
3. $\det(A)\neq 0$
4. A 的行向量组线性无关
5. A 的列向量组线性无关
6. 齐次线性方程组 $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 只有零解
7. 对于任意 $\mathbf{b}\in\mathbb{R}^n$，非齐次线性方程组 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 有唯一解
8. A 的行空间维度为 n
9. A 的列空间维度为 n
10. A 的零空间 $\{\mathbf{0}\}$
11. A 的特征值都不为零
12. A 可以表示为有限个初等矩阵的乘积
13. A 的行最简形是单位矩阵 I_n
14. A 的列向量构成 $\mathbb{R}^n$ 的一组基
15. A 的行向量构成 $\mathbb{R}^n$ 的一组基
16. A 的转置 A^T 是满秩的
17. A 的伴随矩阵 $\text{adj}(A)$ 存在且 $\text{adj}(A)=\det(A)\cdot A^{-1}$
18. A 的线性变换 $T(\mathbf{x})=A\mathbf{x}$ 是单射
19. A 的线性变换 $T(\mathbf{x})=A\mathbf{x}$ 是满射
20. A 的线性变换 $T(\mathbf{x})=A\mathbf{x}$ 是同构映射

例题 2.16.

证明若 $a_0 \neq 0$，则方阵 $\begin{pmatrix} a_0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \\ a_2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1} & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ a_n & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的秩为 $n+1$.

解 考虑矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \\ a_2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1} & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ a_n & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

其中 $a_0 \neq 0$. 矩阵 A 为 $(n+1)\times(n+1)$ 方阵.

为证明 A 的秩为 $n+1$，考虑齐次线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$，其中 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_{n+1})^{\mathrm{T}}$. 方程组具体形式为：

$$\begin{aligned} \text{第 1 行:} \quad & a_0 x_1 = 0, \\ \text{第 2 行:} \quad & a_1 x_1 + x_{n+1} = 0, \\ \text{第 3 行:} \quad & a_2 x_1 + x_n = 0, \\ & \vdots \\ \text{第} k \text{ 行} (2 \leq k \leq n): \quad & a_{k-1} x_1 + x_{n+2-k} = 0, \\ \text{第} n+1 \text{ 行:} \quad & a_n x_1 + x_2 = 0. \end{aligned}$$

由于 $a_0 \neq 0$，从第 1 行方程得 $x_1 = 0$. 代入后续方程：

$$\begin{aligned} \text{第 2 行:} \quad & x_{n+1} = 0, \\ \text{第 3 行:} \quad & x_n = 0, \\ & \vdots \\ \text{第} n+1 \text{ 行:} \quad & x_2 = 0. \end{aligned}$$

因此，所有变量 $x_1, x_2, \ldots, x_{n+1}$ 均为零，即 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$. 故齐次方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 仅有零解.

齐次方程组仅有零解当且仅当系数矩阵满秩. 由于 A 是 $(n+1)\times(n+1)$ 矩阵，故其秩为 $n+1$.

矩阵秩的基本不等式

1. 若 $k \neq 0, r(kA) = r(A)$;
2. $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$;
3. $r\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = r(A) + r(B)$;
4. $r\begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix} \geq r(A) + r(B), r\begin{pmatrix} A & O \\ D & B \end{pmatrix} \geq r(A) + r(B)$;
5. $r(A|B) \leq r(A) + r(B), r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \leq r(A) + r(B)$;
6. $r(A+B) \leq r(A) + r(B), r(A-B) \leq r(A) + r(B)$;

7. $r(A-B)\geq|r(A)-r(B)|$.

例题 2.17.

设 A 是 $m\times n$ 矩阵，$k\neq 0$, 求证：$r(kA)=r(A)$.

证明 由于 $kA=P_1(k)P_2(k)\cdots P_m(k)A$. 故 $r(kA)=r(A)$.

例题 2.18.

求证：$r(AB)\leq\min\{r(A),r(B)\}$.

证明 设 A 是 $m\times n$ 矩阵，B 是 $n\times m$ 矩阵. 将 B 按列分块，$B=\{\beta_1,\beta_2,\cdots\beta_s\}$, 则 $AB=\{A\beta_1,A\beta_2,\cdots,A\beta_s\}$. 若 B 的列向量的极大无关组为 $\{\beta_1,\beta_2,\cdots\beta_r\}$，则 B 中的任一列向量 β_j 均可用 $\{\beta_1,\beta_2,\cdots\beta_r\}$ 线性表示，于是任一 $A\beta_j$ 可由 $\{A\beta_1,A\beta_2,\cdots A\beta_r\}$ 来线性表示. 因此向量组 $\{A\beta_1,A\beta_2,\cdots A\beta_r\}$ 的秩不超过 r，即 $r(AB)<r(B)$. 同理，对矩阵 A 用行分块的方法可以证明 $r(AB)<r(A)$.

例题 2.19.

求证：$r\begin{pmatrix}A&O\\O&B\end{pmatrix}=r(A)+r(B)$.

证明 设 A,B 的秩分别为 r_1,r_2, 则存在非异矩阵 P_1,Q_1 和非异矩阵 P_2,Q_2, 使

$$P_1AQ_1=\begin{pmatrix}I_{r1}&0\\0&0\end{pmatrix},P_2BQ_2=\begin{pmatrix}I_{r2}&0\\0&0\end{pmatrix}$$

于是

$$\begin{pmatrix}P_1&0\\0&P_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A&O\\O&B\end{pmatrix}\begin{pmatrix}Q_1&0\\0&Q_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}P_1AQ_1&0\\0&P_2BQ_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}I_{r1}&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&I_{r2}&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

因此 $r\begin{pmatrix}A&O\\O&B\end{pmatrix}=r(A)+r(B)$.

例题 2.20.

求证：$r\begin{pmatrix}A&C\\O&B\end{pmatrix}\geq r(A)+r(B),r\begin{pmatrix}A&O\\D&B\end{pmatrix}\geq r(A)+r(B)$.

证明 我们只证明第一个不等式第二个不等式同理可证. 由前一个等式的证明可得

$$\begin{pmatrix}P_1&0\\0&P_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A&C\\O&B\end{pmatrix}\begin{pmatrix}Q_1&0\\0&Q_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}P_1AQ_1&P_1CQ_2\\0&P_2BQ_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}I_{r1}&0&C_{11}&C_{12}\\0&0&C_{21}&C_{22}\\0&0&I_{r2}&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

对最后一个矩阵进行初等变换可得

$$\begin{pmatrix} I_{r1} & 0 & C_{11} & C_{12} \\ 0 & 0 & C_{21} & C_{22} \\ 0 & 0 & I_{r2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} I_{r1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & C_{22} \\ 0 & 0 & I_{r2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} I_{r1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & C_{22} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & I_{r2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$r\begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix} = r\left(I_{r_1}\right) + r\left(C_{22}\right) + r\left(I_{r_2}\right) \geq r_1 + r_2 = r\left(A\right) + r(B)$$

例题 2.21.

求证：$r(A|B) \leq r(A) + r(B), r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \leq r(A) + r(B).$

证明 注意到

$$(A|B) = (I|I)\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}.$$

由上一个题中的结论可证这两个不等式成立.

例题 2.22.

$r(A+B) \leq r(A) + r(B), r(A-B) \leq r(A) + r(B).$

证明 注意到

$$(A|B)\begin{pmatrix} I \\ I \end{pmatrix} = A + B, (A|B)\begin{pmatrix} I \\ -I \end{pmatrix} = A - B.$$

由前两题的结论可证这两个不等式成立.

例题 2.23.

求证：$r(A-B) \geq |r(A) - r(B)|.$

证明 由于 $r(A-B = r(B-A)$, 故不妨设 $r(A) \geq r(B)$,
由上一个不等式可得 $r(A-B) + r(B) \geq r(A-B+B) = r(A)$,
即 $r(A-B) \geq r(A) - r(B)$.

例题 2.24. Sylvester 不等式

设 A 是 $m \times n$ 矩阵，B 是 $n \times s$ 矩阵，证明：$r(AB) \geq r(A) + r(B) - n.$

证明 注意到

$$\begin{pmatrix} I_n & 0 \\ 0 & AB \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 \leftarrow r_2 + A \cdot r_1} \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ A & AB \end{pmatrix} \xrightarrow{c_2 \leftarrow c_2 - B \cdot c_1} \begin{pmatrix} I_n & -B \\ A & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_1 \leftrightarrow c_2}$$
$$\begin{pmatrix} -B & I_n \\ 0 & A \end{pmatrix} \xrightarrow{c_1 \leftarrow (-1) \cdot c_1} \begin{pmatrix} B & I_n \\ 0 & A \end{pmatrix}$$

直接写出变换后的矩阵与初等矩阵的乘积关系：

$$\begin{pmatrix} B & I_n \\ 0 & A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ A & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ 0 & AB \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & -B \\ 0 & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ I_n & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -I_n & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix}$$

则秩满足：

$$r(AB) + n = r \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ 0 & AB \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} B & I_n \\ 0 & A \end{pmatrix} \geq r(A) + r(B)$$

即

$$r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$$

注 特别的当 $AB = 0$ 时 $r(A) + r(B) \leq n$.

例题 2.25.

证明：如果三个 n 阶方阵的乘积为 0，那么它们的秩的和不超过 $2n$.

证明 设 A, B, C 是 n 阶方阵，且 $ABC = 0$.

考虑矩阵 BC，由矩阵乘积的性质可得：

$$A(BC) = 0$$

根据已知结论，当 $AB = 0$ 时 $r(A) + r(B) \leq n$，将此结论应用于 A 和 BC，得到：

$$r(A) + r(BC) \leq n \tag{1}$$

另一方面，由 Sylvester 秩不等式，对于任意矩阵 B 和 C，有：

$$r(BC) \geq r(B) + r(C) - n \tag{2}$$

将不等式 (2) 代入不等式 (1) 中：

$$r(A) + [r(B) + r(C) - n] \leq n$$

整理得：

$$r(A) + r(B) + r(C) \leq 2n$$

这就完成了证明.

推论 2.8

设有 m 个 n 阶矩阵其积为 0: $A_1 A_2 \cdots A_m = 0$, 则 $\mathrm{r}(A_1) + \mathrm{r}(A_2) + \cdots + \mathrm{r}(A_m) \leq (m-1)n$

2.3 线性映射与矩阵的运算

2.3.1 课本主要内容的回顾与补充

定义 2.14 (线性映射)

设 V 和 W 是数域 $\mathbb{F}$ 上的两个线性空间. 如果映射 $T : V \to W$ 满足以下两个条件，则称 T 为从 V 到 W 的线性映射：

1. 保持加法：$\forall \alpha, \beta \in V$，有 $T(\alpha + \beta) = T(\alpha) + T(\beta)$
2. 保持数乘：$\forall k \in \mathbb{F}$，$\forall \alpha \in V$，有 $T(k\alpha) = kT(\alpha)$

等价地，T 是线性映射当且仅当：

$$\forall k, l \in \mathbb{F},\ \forall \alpha, \beta \in V, \quad T(k\alpha + l\beta) = kT(\alpha) + lT(\beta)$$

线性映射的重要性质：

- $T(\mathbf{0}_V)=\mathbf{0}_W$，其中 $\mathbf{0}_V$ 和 $\mathbf{0}_W$ 分别是 V 和 W 的零向量
- $T(-\alpha)=-T(\alpha)$，$\forall \alpha\in V$
- 线性映射将线性相关的向量组映射为线性相关的向量组

线性映射的核与像：

- 核空间：$\ker T=\{\alpha\in V\mid T(\alpha)=\mathbf{0}_W\}$ 是 V 的子空间
- 像空间：$\mathrm{Im}\,T=\{T(\alpha)\mid \alpha\in V\}$ 是 W 的子空间

♣

设 φ 是 $V\to U$ 的线性映射, 分别取 V 和 U 的基如下:

$$V:\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n;\quad U:\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2,\cdots,\boldsymbol{f}_m.$$

假定有

$$\begin{cases}\varphi(\boldsymbol{e}_1)=a_{11}\boldsymbol{f}_1+a_{21}\boldsymbol{f}_2+\cdots+a_{m1}\boldsymbol{f}_n,\\ \varphi(\boldsymbol{e}_2)=a_{12}\boldsymbol{f}_1+a_{22}\boldsymbol{f}_2+\cdots+a_{m2}\boldsymbol{f}_n,\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\\ \varphi(\boldsymbol{e}_n)=a_{1n}\boldsymbol{f}_1+a_{2n}\boldsymbol{f}_2+\cdots+a_{mn}\boldsymbol{f}_n,\end{cases}$$

则称矩阵

$$\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\ a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\ \vdots&\vdots&&\vdots\\ a_{m1}&a_{m2}&\cdots&a_{mn}\end{pmatrix}$$

称为线性映射在给定基下的表示矩阵.

注 若 φ 是向量空间 V 上的线性变换, 则取 V 的一组基, 而不取两组基.

定义 2.15 (矩阵加法的定义)

设两个 $m\times n$ 矩阵 $A=(a_{ij}),B=(b_{ij})$, 定义 $A+B$ 是一个 $m\times n$ 矩阵且 $A+B$ 的第 $(i.j)$ 元素等于 $a_{ij}+b_{ij}$, 即

$$A+B=(a_{ij}+b_{ij}).$$

♣

一个 $m\times n$ 矩阵 A 与一个 $m\times n$ 零矩阵相加显然仍等于矩阵 A, 即

$$A+O=A$$

.

矩阵的减法可以看做是矩阵加法的逆运算，因此行数与列数分别相等的两个矩阵才可以相减. 设两个 $m\times n$ 矩阵 $A=(a_{ij}),B=(b_{ij})$，则

$$A-B=(a_{ij}-b_{ij})$$

.

矩阵加减法运算法则 矩阵的加减法运算适用下列规则：

1. 交换律：$A+B=B+A$;
2. 结合律：$(A+B)+C=A+(B+C)$;
3. $O+A=A+O=A$;
4. $A+(-B)=A-B$.

定义 2.16 (矩阵数乘的定义)

设 A 是一个 $m\times n$ 矩阵，$A=(a_{ij})_{m\times n}$,c 是一个常数，定义 $cA=(ca_{ij})_{m\times n}$.cA 称为数 c 与矩阵 A 的数乘.

矩阵数乘的运算法则 矩阵的数乘运算适用下列规则：

1. $c(A+B)=cA+cB$;
2. $(c+d)A=cA+dA$;
3. $(cd)A=c(dA)$;
4. $1\cdot A=A$;
5. $0\cdot A=O$

定义 2.17 (矩阵乘法的定义)

设有 $m\times k$ 矩阵 $A=(a_{ij})_{m\times k}$, 以及 $k\times m$ 矩阵 $B=(b_{ij})_{k\times n}$. 定义 A 和 B 的乘积 AB 是一个 $m\times n$ 矩阵且 AB 的第 (i,j) 元素

$$c_{ij}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{ik}b_{kj}.$$

矩阵乘法的运算法则 矩阵的乘法运算适用下列规则：

1. 结合律：$(AB)C=A(BC)$;
2. 分配律：$A(B+C)=AB+AC,(A+B)C=AC+BC$;
3. $c(AB)=(cA)B=A(cB)$
4. 对任意的 $m\times n$ 矩阵 A，$I_mA=A=AI_n$.

方阵幂的运算规则

1. $A^rA^s=A^{r+s}$;
2. $(A^r)^s=A^{rs}$.

注 在计算矩阵的幂时，我们通常可以用以下几种方法去计算:

1. 利用幂预算的周期性，
2. 将一个矩阵写成一个矩阵与一个幂零矩阵的和的形式然后展开进行计算，
3. 利用零化多项式去简化计算，
4. 利用矩阵的相似将其化成对角矩阵或者 Jordan 标准型去计算，
5. 对于秩为 1 的方阵可以将其写成一个列向量乘以一个行向量的形式然后利用矩阵运算的结合律简化计算.

定义 2.18 (矩阵转置的定义)

设 $A=(a_{ij})$ 是 $m\times n$ 矩阵，定义 A 的转置 ${}^tA$ 是一个 $n\times m$ 矩阵，它的第 k 行正好是 A 的第 k 列 $(k=1,2,\cdots,n)$, 它的第 r 列是 A 的第 r 行 $(r=1,2,\cdots,m)$.

矩阵转置的运算规则

1. ${}^t({}^tA)=A$;
2. ${}^t(A+B)={}^tA+{}^tB$;
3. ${}^t(cA)=c{}^tA$;
4. ${}^t(AB)={}^tB{}^tA$

2.3.2 经典例题讲解

一、特殊矩阵

1. 标准单位向量

n 维标准单位列向量是指下列 n 个 n 维列向量：

$$e_1=\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix},\quad e_2=\begin{pmatrix}0\\1\\\vdots\\0\end{pmatrix},\quad \cdots,\quad e_n=\begin{pmatrix}0\\0\\\vdots\\1\end{pmatrix}.$$

向量组 ${}^te_1,{}^te_2,\cdots,{}^te_n$ 则被称为 n 维标准单位行向量．设 $f_1,f_2,\cdots,f_m$ 是 m 维标准单位列向量，则容易验证标准单位向量有下列基本性质：

(1) 若 $i\neq j$，则 ${}^te_ie_j=0$，而 ${}^te_ie_i=1$；

(2) 若 $A=(a_{ij})$ 是 $m\times n$ 矩阵，则 Ae_i 是 A 的第 i 个列向量；${}^tf_iA$ 是 A 的第 i 个行向量；

(3) 若 $A=(a_{ij})$ 是 $m\times n$ 矩阵，则 ${}^tf_iAe_j=a_{ij}$；

(4) 判定准则设 A,B 都是 $m\times n$ 矩阵，则 $A=B$ 当且仅当 $Ae_i=Be_i$（$1\leq i\leq n$）成立，也当且仅当 ${}^tf_iA={}^tf_iB$（$1\leq i\leq m$）成立．

例题 2.26.

求 $\begin{pmatrix}0&0&0&\cdots&0&0&1\\1&0&0&\cdots&0&0&0\\0&1&0&\cdots&0&0&0\\0&0&1&\cdots&0&0&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots&\vdots\\0&0&0&\cdots&1&0&0\\0&0&0&\cdots&0&1&0\end{pmatrix}^n$，其中 n 是该矩阵的阶数

解 设给定的 n 阶矩阵为 A，任取 n 维列向量 $\alpha=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}$，观察 A 对 α 的作用：

$$A\alpha=\begin{pmatrix}0&0&0&\cdots&0&0&1\\1&0&0&\cdots&0&0&0\\0&1&0&\cdots&0&0&0\\0&0&1&\cdots&0&0&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots&\vdots\\0&0&0&\cdots&1&0&0\\0&0&0&\cdots&0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\\\vdots\\x_{n-1}\\x_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_n\\x_1\\x_2\\x_3\\\vdots\\x_{n-2}\\x_{n-1}\end{pmatrix}$$

这表明 A 对向量的分量进行循环左移（最后一个分量移至首位，其余分量依次后移）.进一步计算高次幂对 α 的作用：

当 $k=2$ 时，$A^2\alpha=A(A\alpha)=\begin{pmatrix}x_{n-1}\\x_n\\x_1\\\vdots\\x_{n-2}\end{pmatrix}$（第二次循环左移，倒数第二个分量移至首位）；

$\vdots$

当 $k=n-1$ 时，$A^{n-1}\alpha=\begin{pmatrix}x_2\\x_3\\\vdots\\x_n\\x_1\end{pmatrix}$（第 $n-1$ 次循环左移，第二个分量移至首位）；

当 $k=n$ 时，$A^n\alpha=A(A^{n-1}\alpha)=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}=I_n\alpha$，其中 I_n 是 n 阶单位矩阵.

由于 α 是任意的 n 维列向量，根据映射的定义，可得：

$$A^n=I_n$$

即该矩阵的 n 次幂为 n 阶单位矩阵.

例题 2.27.

设 n 阶方阵 A 的每一行元素之和等于常数 c，求证：

(1) 对任意的正整数 k，A^k 的每一行元素之和等于 c^k；

(2) 若 A 为可逆矩阵，则 $c\neq 0$ 并且 A^{-1} 的每一行元素之和等于 c^{-1}.

证明 设 $\alpha={}^t(1,1,\cdots,1)$，则由矩阵乘法可知，$A$ 的每一行元素之和等于 c 当且仅当 $A\alpha=c\cdot\alpha$ 成立.

(1) 由 $A\alpha=c\cdot\alpha$ 可得：

$$\begin{aligned}A^2\alpha&=A(A\alpha)=A(c\alpha)=c(A\alpha)=c^2\alpha,\\A^3\alpha&=A(A^2\alpha)=A(c^2\alpha)=c^2(A\alpha)=c^3\alpha,\\&\vdots\\A^k\alpha&=c^k\alpha.\end{aligned}$$

由于 $A^k\alpha=c^k\alpha$，即 A^k 乘以全 1 向量等于 c^k 乘以全 1 向量，这说明 A^k 的每一行元素之和等于 c^k.

(2) 若 A 可逆，假设 $c=0$，则有 $A\alpha=0\cdot\alpha=0$. 两边左乘 A^{-1} 得：

$$A^{-1}A\alpha=A^{-1}0\quad\Rightarrow\quad\alpha=0,$$

但 α 是全 1 向量，不可能为零向量，矛盾. 故 $c\neq 0$.

在 $A\alpha=c\alpha$ 两边同时左乘 A^{-1}，得：

$$A^{-1}A\alpha=A^{-1}(c\alpha)\quad\Rightarrow\quad\alpha=cA^{-1}\alpha.$$

由于 $c\neq 0$，两边同除以 c 得：

$$A^{-1}\alpha=\frac{1}{c}\alpha.$$

这意味着 A^{-1} 的每一行元素之和等于 c^{-1}.

2. 基础矩阵

n 阶基础矩阵（又称初级矩阵）是指 n^2 个 n 阶矩阵 $\{E_{ij},\,1\leq i,j\leq n\}$. 这里 E_{ij} 是一个 n 阶矩阵，它的第 (i,j) 元素等于 1，其他元素全为 0. 基础矩阵也可以看成是标准单位向量的积：$E_{ij}=e_i{}^te_j$. 由此不难证明基础矩阵的下列性质：

(1) 若 $j\neq k$，则 $E_{ij}E_{kl}=O$；

(2) 若 $j=k$，则 $E_{ij}E_{kl}=E_{il}$；

(3) 若 A 是 n 阶矩阵且 $A=(a_{ij})$，则 $A=\sum_{i,j=1}^n a_{ij}E_{ij}$；

(4) 若 A 是 n 阶矩阵且 $A=(a_{ij})$，则 $E_{ij}A$ 的第 i 行是 A 的第 j 行，$E_{ij}A$ 的其他行全为零；
(5) 若 A 是 n 阶矩阵且 $A=(a_{ij})$，则 AE_{ij} 的第 j 列是 A 的第 i 列，AE_{ij} 的其他列全为零；
(6) 若 A 是 n 阶矩阵且 $A=(a_{ij})$，则 $E_{ij}AE_{kl}=a_{jk}E_{il}$.

标准单位向量和基础矩阵虽然很简单，但如能灵活应用就可以得到出乎意外的结果. 我们在今后将经常应用它们，因此请读者熟记这些结论.

例题 2.28.

证明：和所有 n 阶矩阵乘法可交换的矩阵必是纯量阵 kI_n.

证明 设 $A=(a_{ij})$ 是一个 n 阶矩阵，且与所有 n 阶矩阵乘法可交换.

取基础矩阵 E_{ij}（$1\leq i,j\leq n$），其中 E_{ij} 是第 (i,j) 元素为 1，其余元素为 0 的矩阵. 由题设，A 与 E_{ij} 可交换，即

$$E_{ij}A=AE_{ij}.$$

下面分析等式两边的矩阵结构：

- 左边 $E_{ij}A$ 的结果是一个矩阵，其第 i 行等于 A 的第 j 行，其余行全为零.
- 右边 AE_{ij} 的结果是一个矩阵，其第 j 列等于 A 的第 i 列，其余列全为零.

比较两边矩阵的元素：

- 对于 $i\neq j$，考虑 $E_{ij}A$ 和 AE_{ij} 的非零位置：
  - $E_{ij}A$ 仅在第 i 行非零，且该行等于 A 的第 j 行.
  - AE_{ij} 仅在第 j 列非零，且该列等于 A 的第 i 列.

  由于两个矩阵相等，它们的非零元素位置必须一致. 因此，当 $i\neq j$ 时，必须有：

$$a_{ji}=0\quad(\text{非对角元为零}),$$
$$a_{ii}=a_{jj}\quad(\text{对角元相等}).$$

- 对于 $i=j$，取 E_{ii}，同理可证 A 的对角元相等（实际上由 $i\neq j$ 的情况已可推出）.

综上，A 的非对角元素全为零，且所有对角元素相等，故 A 是纯量矩阵 kI_n.

3. 基础循环矩阵

例题 2.29.

设 n 阶基础循环矩阵

$$A=\begin{pmatrix}0&1&0&\cdots&0\\0&0&1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&1\\1&0&0&\cdots&0\end{pmatrix},$$

求证：

$$A^k=\begin{pmatrix}O&I_{n-k}\\I_k&O\end{pmatrix},\quad 1\leq k\leq n.$$

证明 A 写为 $A=(e_n,e_1,e_2,\cdots,e_{n-1})$，其中 e_i 是标准单位列向量. 由分块矩阵乘法并注意 Ae_i 就是 A 的第 i 列，因此

$$A^2=(Ae_n,Ae_1,Ae_2,\cdots,Ae_{n-1})=(e_{n-1},e_n,e_1,\cdots,e_{n-2}).$$

不断这样做下去就可得到结论. □

4. 幂零 Jordan 块

例题 2.30.

设 n 阶幂零 Jordan 块

$$A=\begin{pmatrix}0&1&0&\cdots&0\\0&0&1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&1\\0&0&0&\cdots&0\end{pmatrix},$$

求证：

$$A^k=\begin{pmatrix}O&I_{n-k}\\O&O\end{pmatrix},\quad 1\le k\le n.$$

证明 将 A 写为 $A=(0,e_1,e_2,\cdots,e_{n-1})$，其中 e_i 是标准单位列向量．由分块矩阵乘法并注意 Ae_i 就是 A 的第 i 列，因此

$$A^2=(0,Ae_1,Ae_2,\cdots,Ae_{n-1})=(0,0,e_1,\cdots,e_{n-2}).$$

不断这样做下去就可得到结论．

5. 对称阵与反对称阵

定义 2.19 (对称矩阵与反对称矩阵)

设 A 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶矩阵.

- 如果 ${}^tA=A$，则称 A 为对称矩阵
- 如果 ${}^tA=-A$，则称 A 为反对称矩阵

对称矩阵与反对称矩阵的性质：

- 对称矩阵的主对角线元素可以是任意数，非主对角线元素满足 $a_{ij}=a_{ji}$
- 反对称矩阵的主对角线元素必须为零，非主对角线元素满足 $a_{ij}=-a_{ji}$
- 任意矩阵都可以唯一地分解为一个对称矩阵与一个反对称矩阵之和

例题 2.31.

求证：任一 n 阶矩阵均可表示为一个对称矩阵与一个反对称矩阵之和.

证明 设 A 是 n 阶矩阵，则 $\frac{1}{2}(A+{}^tA)$ 是对称矩阵，$\frac{1}{2}(A-{}^tA)$ 是反对称矩阵，而

$$A=\frac{1}{2}(A+{}^tA)+\frac{1}{2}(A-{}^tA).$$

例题 2.32.

求证：n 阶方阵 A 是反对称矩阵的充要条件是对任意 n 维列向量 α 有

$${}^t\alpha A\alpha=0.$$

证明 必要性：若 A 是反对称矩阵，即 ${}^tA=-A$，则有

$${}^t({}^t\alpha A\alpha)={}^t\alpha{}^tA\alpha={}^t\alpha(-A)\alpha=-{}^t\alpha A\alpha,$$

但 ${}^t({}^t\alpha A\alpha)$ 是一个 1×1 矩阵的转置，等于自身，故

$${}^t\alpha A\alpha=-{}^t\alpha A\alpha,$$

从而 ${}^t\alpha A\alpha=0$.

充分性：设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$，对任意 n 维列向量 ${}^t\alpha A\alpha=0$.

首先，取 $\alpha=e_i$（第 i 个标准单位向量），则

$$ {}^te_iAe_i=a_{ii}=0, $$

所以 A 的主对角线元素全为零.

其次，取 $\alpha=e_i+e_j$（$i\neq j$），则

$$ {}^t(e_i+e_j)A(e_i+e_j)=a_{ii}+a_{jj}+a_{ij}+a_{ji}=a_{ij}+a_{ji}=0, $$

故 $a_{ij}=-a_{ji}$.

因此 A 是反对称矩阵.

利用方程组的解来研究矩阵的秩，如果 $AX=0$ 与 $BX=0$ 有相同的解空间那么 $r(A)=r(B)$, 如果 $AX=0$ 的解都是 $BX=0$ 的解那么 $r(A)\geq r(B)$.

例题 2.33.

设 A 是 $m\times n$ 实矩阵，求证：$r({}^tAA)=r(A^tA)=r(A)$.

证明 首先证明 $r({}^tAA)=r(A)$，为此我们将证明齐次线性方程组 $Ax=\mathbf{0}$ 和 ${}^tAAx=\mathbf{0}$ 同解.

显然 $Ax=\mathbf{0}$ 的解都是 ${}^tAAx=\mathbf{0}$ 的解，因为若 $Ax=\mathbf{0}$，则 ${}^tAAx={}^tA\mathbf{0}=\mathbf{0}$.

反之，若实向量 α 是方程组 ${}^tAAx=\mathbf{0}$ 的解，则 ${}^tAA\alpha=\mathbf{0}$，于是

$$ {}^t\alpha{}^tAA\alpha=0, $$

即

$$ (A\alpha)\cdot(A\alpha)=0. $$

记 $A\alpha=(b_1,b_2,\cdots,b_m)$，则

$$ b_1^2+b_2^2+\cdots+b_m^2=0. $$

因为 b_i 是实数，故每个 $b_i=0$，即 $A\alpha=\mathbf{0}$，也就是说 α 是 $Ax=\mathbf{0}$ 的解.

这就证明了方程组 $Ax=\mathbf{0}$ 和 ${}^tAAx=\mathbf{0}$ 同解，因此 $r({}^tAA)=r(A)$.

在上述等式中用 ${}^tA$ 替代 A 可得 $r(A^tA)=r({}^tA)$，又因为 $r(A)=r({}^tA)$，故

$$ r(A^tA)=r({}^tA)=r(A). $$

综上，$r({}^tAA)=r(A^tA)=r(A)$.

注 该命题对于实矩阵成立，但对于复矩阵不一定成立. 考虑复矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & i\\ i & -1\end{pmatrix}$. 计算得 $r(A)=1$（因为第二行是第一行的 i 倍），但 $A^tA=A^2=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$，所以 $r(A^tA)=0$，两者不相等. 因此，对于复矩阵，命题不成立.

二、方阵的 k 次方的计算

1. 数学归纳法

例题 2.34.

设 $A=\begin{pmatrix}1 & a & c\\ 0 & 1 & b\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$，求 A^k，其中 k 是任意正整数.

解 我们可以通过计算前几个幂次来寻找规律：

$$A^1 = \begin{pmatrix} 1 & a & c \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2a & 2c+ab \\ 0 & 1 & 2b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 3a & 3c+3ab \\ 0 & 1 & 3b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^4 = \begin{pmatrix} 1 & 4a & 4c+6ab \\ 0 & 1 & 4b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

观察这些结果，我们可以发现规律：

$$A^k = \begin{pmatrix} 1 & ka & kc+\frac{k(k-1)}{2}ab \\ 0 & 1 & kb \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

我们可以用数学归纳法证明这个公式：

- 基础情况：当 $k=1$ 时，公式显然成立.
- 归纳假设：假设公式对 k 成立.
- 归纳步骤：考虑 $k+1$ 的情况：

$$\begin{aligned} A^{k+1} &= A^k \cdot A \\ &= \begin{pmatrix} 1 & ka & kc+\frac{k(k-1)}{2}ab \\ 0 & 1 & kb \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & a & c \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & (k+1)a & c+ka\cdot b+kc+\frac{k(k-1)}{2}ab \\ 0 & 1 & (k+1)b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & (k+1)a & (k+1)c+\left[k+\frac{k(k-1)}{2}\right]ab \\ 0 & 1 & (k+1)b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & (k+1)a & (k+1)c+\frac{k(k+1)}{2}ab \\ 0 & 1 & (k+1)b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

这与公式对 $k+1$ 的情况一致.

因此，对于任意正整数 k，有：

$$A^k = \begin{pmatrix} 1 & ka & kc+\frac{k(k-1)}{2}ab \\ 0 & 1 & kb \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. 利用一些矩阵的可交换性

例题 2.35.

计算矩阵的 k 次幂，其中 k 为正整数 $A=\begin{pmatrix}1 & a & 0\\ 0 & 1 & a\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$

解 设 $J=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$，则 $A=aI_3+J$. 注意到 aI_3 和 J 乘法可交换，并且 $J^3=O$，因此我们可用二项式定理来求 A 的 k 次幂:

$$\begin{aligned}A^k=(aI_3+J)^k&=(aI_3)^k+\mathrm{C}_k^1(aI_3)^{k-1}J+\mathrm{C}_k^2(aI_3)^{k-2}J^2\\&=a^kI_3+\mathrm{C}_k^1a^{k-1}J+\mathrm{C}_k^2a^{k-2}J^2=\begin{pmatrix}a^k & \mathrm{C}_k^1a^{k-1} & \mathrm{C}_k^2a^{k-2}\\ 0 & a^k & \mathrm{C}_k^1a^{k-1}\\ 0 & 0 & a^k\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

例题 2.36.

设 $A=\begin{pmatrix}1 & a & c\\ 0 & 1 & b\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$，求 A^k，其中 k 是任意正整数.

解 我们可以将矩阵 A 分解为：

$$A=I_3+N$$

其中 I_3 是 3 阶单位矩阵，$N=\begin{pmatrix}0 & a & c\\ 0 & 0 & b\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$.

计算 N 的幂次：

$$N^2=\begin{pmatrix}0 & 0 & ab\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

$$N^3=N^2\cdot N=\begin{pmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}=O$$

由于 I_3 和 N 乘法可交换，且 $N^3=O$，我们可以用二项式定理来求 A 的 k 次幂：

当 $k\geq 2$ 时：

$$A^k=(I_3+N)^k=I_3+C_k^1N+C_k^2N^2$$

代入计算：

$$A^k = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 0 & a & c \\ 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \frac{k(k-1)}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & ab \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} 1 & ka & kc + \frac{k(k-1)}{2}ab \\ 0 & 1 & kb \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

当 $k = 1$ 时，公式也成立，因为：

$$A^1 = \begin{pmatrix} 1 & a & c \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \cdot a & 1 \cdot c + \frac{1 \cdot 0}{2}ab \\ 0 & 1 & 1 \cdot b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

因此，对于任意正整数 k，有：

$$A^k = \begin{pmatrix} 1 & ka & kc + \frac{k(k-1)}{2}ab \\ 0 & 1 & kb \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3. 利用 Cayley-Hamilton 定理

定理 2.12 (Cayley-Hamilton 定理)

设 $f_A(\lambda) = |\lambda I - A|$ 为矩阵 A 的特征多项式则有 $f_A(A) = 0$.

例题 2.37.

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & a & c \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，求 A^k，其中 k 是任意正整数.

解 设 $f(\lambda)$ 为 A 的特征多项式，$g(\lambda) = \lambda^k$，则

$$f(\lambda) = |\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -a & -c \\ 0 & \lambda - 1 & -b \\ 0 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^3$$

由 Cayley-Hamilton 定理，$f(A) = (A - I)^3 = 0$.

设 $g(\lambda) = q(\lambda)f(\lambda) + (\alpha\lambda^2 + \beta\lambda + \gamma)$，其中余式为二次多项式.

由于 $f(\lambda) = (\lambda - 1)^3$ 有三重根 $\lambda = 1$，我们考虑在 $\lambda = 1$ 处的 Taylor 展开：

令 $h(\lambda) = g(\lambda) - (\alpha\lambda^2 + \beta\lambda + \gamma)$，则 $h(1) = h'(1) = h''(1) = 0$.

计算导数：

$$g(\lambda) = \lambda^k$$
$$g'(\lambda) = k\lambda^{k-1}$$
$$g''(\lambda) = k(k-1)\lambda^{k-2}$$

在 $\lambda=1$ 处有：

$$g(1)=1=\alpha+\beta+\gamma \tag{1}$$

$$g'(1)=k=2\alpha+\beta \tag{2}$$

$$g''(1)=k(k-1)=2\alpha \tag{3}$$

由 (3) 得：$\alpha=\frac{k(k-1)}{2}$

代入 (2) 得：$\beta=k-2\alpha=k-k(k-1)=k(2-k)$

代入 (1) 得：$\gamma=1-\alpha-\beta=1-\frac{k(k-1)}{2}-k(2-k)$

化简 γ：

$$\begin{aligned}\gamma&=1-\frac{k(k-1)}{2}-2k+k^2\\&=1-\frac{k^2-k}{2}-2k+k^2\\&=1-\frac{k^2}{2}+\frac{k}{2}-2k+k^2\\&=1+\frac{k^2}{2}-\frac{3k}{2}\end{aligned}$$

因此，

$$A^k=g(A)=\alpha A^2+\beta A+\gamma I$$

计算 A^2：

$$A^2=\begin{pmatrix}1&2a&2c+ab\\0&1&2b\\0&0&1\end{pmatrix}$$

代入得：

$$A^k=\frac{k(k-1)}{2}\begin{pmatrix}1&2a&2c+ab\\0&1&2b\\0&0&1\end{pmatrix}+k(2-k)\begin{pmatrix}1&a&c\\0&1&b\\0&0&1\end{pmatrix}+\left(1+\frac{k^2}{2}-\frac{3k}{2}\right)I$$

分别计算各元素：

(1,1) 元素：$\frac{k(k-1)}{2}+k(2-k)+1+\frac{k^2}{2}-\frac{3k}{2}=1$

(1,2) 元素：$\frac{k(k-1)}{2}\cdot 2a+k(2-k)\cdot a=k(k-1)a+k(2-k)a=ka$

(1,3) 元素：$\frac{k(k-1)}{2}(2c+ab)+k(2-k)c=k(k-1)c+\frac{k(k-1)}{2}ab+k(2-k)c$

化简：$[k(k-1)+k(2-k)]c+\frac{k(k-1)}{2}ab=kc+\frac{k(k-1)}{2}ab$

(2,2) 元素：$\frac{k(k-1)}{2}+k(2-k)+1+\frac{k^2}{2}-\frac{3k}{2}=1$

(2,3) 元素：$\frac{k(k-1)}{2}\cdot 2b+k(2-k)\cdot b=k(k-1)b+k(2-k)b=kb$

(3,3) 元素：$\frac{k(k-1)}{2}+k(2-k)+1+\frac{k^2}{2}-\frac{3k}{2}=1$

因此，

$$A^k=\begin{pmatrix}1&ka&kc+\frac{k(k-1)}{2}ab\\0&1&kb\\0&0&1\end{pmatrix}$$

例题 2.38.

计算 A^{500}, 其中

$$A=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\-1&-1&-1&0\\1&1&1&0\\2&2&2&0\end{pmatrix}$$

解 设 $f(\lambda)$ 为 A 的特征多项式, $g(\lambda)=\lambda^{500}$, 则

$$\begin{aligned}f(\lambda)&=|\lambda E-A|=\lambda^3(\lambda-1)\\g(\lambda)&=q(\lambda)f(\lambda)+\left(a\lambda^3+b\lambda^2+c\lambda+d\right)\end{aligned}\tag{1}$$

令 $\lambda=0$, 由式 (1) 得 $d=0$. 再令 $\lambda=1$, 由 (1) 得

$$a+b+c=1\tag{2}$$

再由 (1) 有

$$g'(\lambda)=500\lambda^{499}=q'(\lambda)f(\lambda)+q(\lambda)f'(\lambda)+3a\lambda^2+2b\lambda+c\tag{3}$$

在式 (3) 中令 $\lambda=0$, 得 $c=0$. 于是

$$\begin{aligned}g''(\lambda)&=500\times499\lambda^{498}\\&=q''(\lambda)f(\lambda)+2q'(\lambda)f'(\lambda)+q(\lambda)f''(\lambda)+6a\lambda+2b\end{aligned}\tag{4}$$

在式 (4) 中, 令 $\lambda=0$. 得 $b=0$. 将 $b=c=0$ 代入 (2) 得 $a=1$. 再由式 (1) 得

$$A^{500}=g(A)=q(A)f(A)+A^3=A^3=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\-1&0&0&0\\1&0&0&0\\2&0&0&0\end{pmatrix}.$$

4. 对于秩为 1 的矩阵

例题 2.39.

证明：如果 $m\times n$ 矩阵 A 的秩为 1，则存在高为 m 的列向量（$m\times1$ 矩阵）B 和长为 n 的行向量（$1\times n$ 矩阵）C 使得 $A=BC$.

证明 设 $m\times n$ 矩阵 A 的秩为 1，则其列空间是 $\mathbb{R}^m$ 中的一个一维子空间. 因此，存在一个非零列向量 $B\in\mathbb{R}^{m\times1}$，使得 A 的每一列都是 B 的标量倍数.

设 A 的列向量为 $A_1,A_2,\ldots,A_n$. 则对每个 $j=1,2,\ldots,n$，存在标量 c_j 使得：

$$A_j=c_jB.$$

定义行向量 $C=(c_1,c_2,\ldots,c_n)\in\mathbb{R}^{1\times n}$. 考虑矩阵乘积 BC：

$$BC=B\cdot(c_1,c_2,\ldots,c_n)=(Bc_1,Bc_2,\ldots,Bc_n).$$

由上述关系，$Bc_j=A_j$ 对每个 j 成立，因此：

$$BC=(A_1,A_2,\ldots,A_n)=A.$$

故存在列向量 B 和行向量 C 使得 $A=BC$，证毕.

例题 2.40.

$A=\begin{pmatrix}1&2&4\\2&4&8\\3&6&12\end{pmatrix}$, 求 A 的 k 次幂.

解 注意到 A 的列向量成比例，故可设 $\alpha=(1,2,3),\beta=(1,2,4)$, 则 $A={}^t\alpha\beta$. 由矩阵乘法的结合律并注意到 $\beta^t\alpha=17$, 可得

$$A^k=({}^t\alpha\beta)({}^t\alpha\beta)\cdots({}^t\alpha\beta)={}^t\alpha(\beta^t\alpha)\cdots(\beta^t\alpha)\beta=(\beta^t\alpha)^{k-1}{}^t\alpha\beta=17^{k-1}A.$$

5. 利用相似标准型

例题 2.41.

设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&-1&1\\2&4&-2\\-3&-3&5\end{pmatrix}$，求 A^n.

解 本题中的矩阵是一个可对角化矩阵，因此可以使用下列方法：先求出可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=B$ 是对角矩阵. 因为对角矩阵的幂很容易求出，故由 $A^n=PB^nP^{-1}$ 即可得到结果.

经计算可得 $|\lambda I_3-A|=(\lambda-2)^2(\lambda-6)$，因此 A 的特征值为 2 (2 重), 6 (1 重). 通过计算可得：特征值 2 有两个线性无关的特征向量 $(-1,1,0)^T,(1,0,1)^T$；特征值 6 有特征向量 $(1,-2,3)^T$，于是 A 有完全的特征向量系，从而可对角化. 注意到

$$P=\begin{pmatrix}-1&1&1\\1&0&-2\\0&1&3\end{pmatrix},\quad B=P^{-1}AP=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&6\end{pmatrix},$$

故

$$A^n=PB^nP^{-1}=\frac{1}{4}\begin{pmatrix}5\cdot2^n-6^n&2^n-6^n&6^n-2^n\\2\cdot6^n-2^{n+1}&2\cdot6^n+2^{n+1}&2^{n+1}-2\cdot6^n\\3\cdot2^n-3\cdot6^n&3\cdot2^n-3\cdot6^n&2^n+3\cdot6^n\end{pmatrix}.$$

例题 2.42.

设矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&6&-15\\1&1&-5\\1&2&-6\end{pmatrix}$，试求 $A^m(m\geq1)$.

解 通过计算可知 λI_3-A 的法式为 $\mathrm{diag}\{1,(\lambda+1),(\lambda+1)^2\}$，故 A 的初等因子组为 $(\lambda+1),(\lambda+1)^2$，从而 A 的 Jordan 标准型为

$$J=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-1&1\\0&0&-1\end{pmatrix}.$$

设过渡矩阵为 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，则 $AP=(A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3)=PJ=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)J$，从而得到线性方程组：

$$A\alpha_1=-\alpha_1,\quad A\alpha_2=-\alpha_2,\quad A\alpha_3=\alpha_2-\alpha_3.$$

解 $(A+I_3)x=0$ 得到两个线性无关的解 $\beta_1=(-2,1,0)^T$ 和 $\beta_2=(5,0,1)^T$. 注意到 $(A+I_3)x=\beta_i(i=1,2)$ 都是

无解的，故不能将 β_1 或 β_2 直接作为 α_2 来求 α_3. 一般地，可设 $\alpha_2=k_1\beta_1+k_2\beta_2=(-2k_1+5k_2,k_1,k_2)^T$，代入线性方程组 $(A+I_3)x=\alpha_2$ 中，利用 $r(A+I_3\mid\alpha_2)=r(A+I_3)$ 可得 $k_1=k_2$. 因此，可取 $\alpha_1=\beta_1=(-2,1,0)^T$，$\alpha_2=\beta_1+\beta_2=(3,1,1)^T$，此时可解出 $\alpha_3=(1,0,0)^T$，于是

$$P=\begin{pmatrix}-2&3&1\\1&1&0\\0&1&0\end{pmatrix}.$$

最后可计算出

$$A^m=PJ^mP^{-1}=\begin{pmatrix}-2&3&1\\1&1&0\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}(-1)^m&0&0\\0&(-1)^m&(-1)^{m-1}m\\0&0&(-1)^m\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&-1\\0&0&1\\1&2&-5\end{pmatrix}$$
$$=(-1)^{m-1}\begin{pmatrix}3m-1&6m&-15m\\m&2m-1&-5m\\m&2m&-5m-1\end{pmatrix}.\quad\square$$

2.4 方阵

2.4.1 课本主要内容的回顾与补充

定义 2.20 (逆矩阵的定义)

设 A 是 n 阶方阵，若存在一个 n 阶方阵 B，使得

$$AB=BA=I_n$$

则称 B 是 A 的逆阵，记为 $B=A^{-1}$. 凡有逆阵的矩阵称为可逆阵或非奇异阵（简称非异阵），否则称为奇异矩阵.

矩阵求逆运算法则

1. 若 A 是非异阵，则 $(A^{-1})^{-1}=A$;
2. 若 A,B 都是 n 阶非异阵，则 AB 也是 n 阶非异阵且 n 阶非异阵且 $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$;
3. 若 A 是非异矩阵，c 是非零常数，则 cA 也是非异阵且 $(cA)^{-1}=c^{-1}A^{-1}$;
4. 若 A 是非异矩阵, 则 A 的转置 ${}^tA$ 也是非异阵且 $({}^tA)^{-1}={}^t(A^{-1})$.

注 方阵 A 可逆与以下几个命题等价：

(1)$|A|\neq0$;

(2)$A\sim I$;

(3)$AX=0$ 只有零解;

(4)A 可以表示为一系列初等矩阵的乘积;

(5)A 是满秩矩阵.

定义 2.21 (初等变换的定义)

下列 3 种矩阵变换分别称为矩阵的第一类、第二类、第三类初等行列变换：

（1）对调矩阵中某两行（列）的位置;

（2）用一非零常数乘以矩阵的某一行（列）;

（3）将矩阵的某一行（列）的 c 倍加到另一行（列）上去.

上述三中变换称为矩阵的初等变换.

定义 2.22 (初等矩阵的定义)

由单位矩阵 E 经过一次初等变换得到的矩阵称为初等矩阵. 对应于 3 种初等变换，有 3 种类型的初等矩阵，它们分别如下：

行初等变换对应的初等矩阵（左乘矩阵 A 实现行变换）：

（1）对换矩阵：对调单位矩阵的第 i 行与第 j 行，记作 E_{ij}，其形式为：

$$E_{ij}=\begin{pmatrix} 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 0 & \cdots & 1 & & \\ & & \vdots & \ddots & \vdots & & \\ & & 1 & \cdots & 0 & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \quad \text{第}i\text{行与第}j\text{行互换}$$

（2）倍乘矩阵：用非零常数 k 乘以单位矩阵的第 i 行，记作 $E_i(k)$，其形式为：

$$E_i(k)=\begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & k & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{pmatrix} \quad \text{第}i\text{行乘}k$$

（3）倍加矩阵：将单位矩阵的第 i 行的 c 倍加到第 j 行上，记作 $E_{ij}(c)$，其形式为：

$$E_{ij}(c)=\begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & \cdots & c \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & 1 \end{pmatrix} \quad \text{第}j\text{行加上第}i\text{行的}c\text{倍}$$

注意：$E_{ij}(c)$ 是将单位矩阵的第 i 行乘以 c 加到第 j 行上，因此该矩阵在第 (j,i) 位置为 c（当 $i\neq j$ 时）.

列初等变换对应的初等矩阵（右乘矩阵 A 实现列变换）

（1）对换矩阵：对调单位矩阵的第 i 列与第 j 列，记作 F_{ij}，其形式为：

$$F_{ij}=\begin{pmatrix} 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 0 & \cdots & 1 & & \\ & & \vdots & \ddots & \vdots & & \\ & & 1 & \cdots & 0 & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \quad \text{第}i\text{列与第}j\text{列互换}$$

注意：对换列初等矩阵 F_{ij} 与对换行初等矩阵 E_{ij} 具有相同的形式.

（2）倍乘矩阵：用非零常数 k 乘以单位矩阵的第 i 列，记作 $F_i(k)$，其形式为：

$$F_i(k)=\begin{pmatrix}1&&&&\\&\ddots&&&\\&&k&&\\&&&\ddots&\\&&&&1\end{pmatrix}\quad \text{第}i\text{列乘}k$$

注意：倍乘列初等矩阵 $F_i(k)$ 与倍乘行初等矩阵 $E_i(k)$ 具有相同的形式.

（3）倍加矩阵：将单位矩阵的第 i 列的 c 倍加到第 j 列上，记作 $F_{ij}(c)$，其形式为：

$$F_{ij}(c)=\begin{pmatrix}1&&&&\\&\ddots&&&\\&&1&&\\&&\vdots&\ddots&\\&&c&&1\end{pmatrix}\quad \text{第}j\text{列加上第}i\text{列的}c\text{倍}$$

注意：$F_{ij}(c)$ 是将单位矩阵的第 i 列乘以 c 加到第 j 列上，因此该矩阵在第 (i,j) 位置为 c（当 $i\neq j$ 时）.

定义 2.23 (分块矩阵的初等变换)

对于分块矩阵，我们可以类似地定义初等变换，但以子块为单位进行变换. 设 $A=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{12}&\cdots&A_{1n}\\A_{21}&A_{22}&\cdots&A_{2n}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\A_{m1}&A_{m2}&\cdots&A_{mn}\end{pmatrix}$ 是一个分块矩阵，其中 A_{ij} 是适当维数的子块.

分块行初等变换：（1）对换变换：对调矩阵的第 i 行块与第 j 行块；

（2）倍乘变换：用一可逆矩阵 P 左乘矩阵的某一行块；

（3）倍加变换：将矩阵的某一行块的 C 倍（矩阵倍）加到另一行块上去，其中 C 是适当维数的矩阵.

分块列初等变换：（1）对换变换：对调矩阵的第 i 列块与第 j 列块；

（2）倍乘变换：用一可逆矩阵 Q 右乘矩阵的某一列块；

（3）倍加变换：将矩阵的某一列块的 D 倍（矩阵倍）加到另一列块上去，其中 D 是适当维数的矩阵.

定义 2.24 (分块初等矩阵)

分块初等矩阵由分块单位矩阵经过一次分块初等变换得到.

分块行初等矩阵：（1）分块对换矩阵：对调分块单位矩阵的第 i 行块与第 j 行块，记作 $E_{B,ij}$：

$$E_{B,ij}=\begin{pmatrix}I&&&&&\\&\ddots&&&&\\&&0&\cdots&I&\\&&\vdots&\ddots&\vdots&\\&&I&\cdots&0&\\&&&&&\ddots\\&&&&&&I\end{pmatrix}\begin{matrix}\\&\\&\text{第 }i\text{ 行块}\\&\\&\text{第 }j\text{ 行块}\\&\\&\end{matrix}$$

（2）分块倍乘矩阵：用可逆矩阵 P 左乘分块单位矩阵的第 i 行块，记作 $E_{B,i}(P)$：

$$E_{B,i}(P)=\begin{pmatrix} I & & & \\ & \ddots & & \\ & & P & \\ & & & \ddots \\ & & & & I \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \text{第 } i \text{ 行块} \\ \\ \\ \end{matrix}$$

（3）分块倍加矩阵：将分块单位矩阵的第 i 行块的 C 倍加到第 j 行块上，记作 $E_{B,ij}(C)$：

$$E_{B,ij}(C)=\begin{pmatrix} I & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & I & \cdots & C & \\ & & & \ddots & \vdots & \\ & & & & I & \\ & & & & & \ddots \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \text{第 } j \text{ 行块} \\ \text{第 } i \text{ 列块} \\ \\ \\ \end{matrix}$$

分块列初等矩阵：（1）分块对换矩阵：对调分块单位矩阵的第 i 列块与第 j 列块，记作 $F_{B,ij}$：

$$F_{B,ij}=\begin{pmatrix} I & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 0 & \cdots & I & \\ & & \vdots & \ddots & \vdots & \\ & & I & \cdots & 0 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & I \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \text{第 } i \text{ 列块} \\ \text{第 } j \text{ 列块} \\ \\ \\ \end{matrix}$$

（2）分块倍乘矩阵：用可逆矩阵 Q 右乘分块单位矩阵的第 i 列块，记作 $F_{B,i}(Q)$：

$$F_{B,i}(Q)=\begin{pmatrix} I & & & \\ & \ddots & & \\ & & Q & \\ & & & \ddots \\ & & & & I \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \text{第 } i \text{ 列块} \\ \\ \\ \end{matrix}$$

（3）分块倍加矩阵：将分块单位矩阵的第 i 列块的 D 倍加到第 j 列块上，记作 $F_{B,ij}(D)$：

$$F_{B,ij}(D)=\begin{pmatrix} I & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & I & & \\ & & \vdots & \ddots & \\ & & D & & I \\ & & & & & \ddots \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \text{第 } i \text{ 行块} \\ \text{第 } j \text{ 列块} \\ \\ \\ \end{matrix}$$

注 分块行初等矩阵左乘分块矩阵 A（即 E_BA）相当于对 A 作相应的分块行变换；分块列初等矩阵右乘分块矩阵 A（即 AF_B）相当于对 A 作相应的分块列变换.

注意：分块倍乘变换中的乘子矩阵必须是可逆的，这样才能保证变换是可逆的.

2.4.2 经典例题讲解

一、矩阵的初等变换

如何利用矩阵的初等变换去简化一些计算？

1. 求矩阵的逆：利用初等行变换将 $(A \quad I)$ 变成 $(I \quad B)$ 那么 B 就是 A 的逆矩阵，利用矩阵的初等列变换将 $\begin{pmatrix} A \\ I \end{pmatrix}$ 变为 $\begin{pmatrix} I \\ C \end{pmatrix}$ 那么 C 就是 A 的逆矩阵.

2. 计算 $A^{-1}B$: 利用初等行变换将 $(A \quad B)$ 变为 $(I \quad C)$，那么 $C = A^{-1}B$.

3. 计算 BA^{-1}: 利用初等列变换将 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$ 变成 $\begin{pmatrix} I \\ C \end{pmatrix}$, 那么 $C = BA^{-1}$.

4. 利用矩阵的初等变换去求最大公因式:对矩阵 $\begin{pmatrix} f(x) & 1 & 0 \\ g(x) & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 进行初等行变换可以得到 $\begin{pmatrix} d(x) & u(x) & v(x) \\ 0 & * & * \end{pmatrix}$ 则 $(f(x), g(x)) = d(x) = u(x)f(x) + v(x)g(x)$

5. 求矩阵的相抵标准型及可逆矩阵 P 和 Q：对于任意 $m \times n$ 矩阵 A，存在可逆矩阵 P 和 Q，使得 $PAQ = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，其中 r 为矩阵 A 的秩. 具体方法如下：

(1) 对矩阵 $(A \quad I_m)$ 只施行初等行变换，将其化为行最简形 $(B \quad P)$，其中 B 是行最简形矩阵；

(2) 对矩阵 $\begin{pmatrix} B \\ I_n \end{pmatrix}$ 只施行初等列变换，将其化为 $\begin{pmatrix} \Lambda \\ Q \end{pmatrix}$，其中 $\Lambda = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 为相抵标准型；

(3) 此时有 $PAQ = \Lambda$，且 P 和 Q 即为所求的可逆矩阵.

例题 2.43.

设 A 是可逆方阵.

(1) 证明 A 可以通过列初等变换化成单位矩阵.

(2) 同时对 A 和单位矩阵 E 实施列初等变换，证明：当 A 化成单位矩阵时，单位矩阵 E 化成了 A 的逆矩阵 A^{-1}.

(3) 假设 $a \neq b$. 利用上一小题的结论求出可逆方阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ a & b \end{pmatrix}$ 的逆矩阵.

解

(1) 由于 A 可逆，则 ${}^tA$ 也可逆. 存在初等矩阵 $P_1, P_2, \ldots, P_m$ 使得

$$P_m \cdots P_2 P_1 {}^tA = E.$$

取转置得

$$A^t P_1 {}^t P_2 \cdots {}^t P_m = E.$$

其中 ${}^tP_1, {}^tP_2, \ldots, {}^tP_m$ 均为初等矩阵，对应列初等变换. 故 A 可以通过列初等变换化成单位矩阵.

(2) 考虑分块矩阵 $\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix}$. 对其实施列初等变换，设这些变换对应的初等矩阵为 $Q_1, Q_2, \ldots, Q_k$，则变换后的矩阵为

$$\begin{pmatrix} AQ_1Q_2\cdots Q_k \\ EQ_1Q_2\cdots Q_k \end{pmatrix}.$$

由 (1) 知，存在 $Q_1, Q_2, \ldots, Q_k$ 使得 $AQ_1Q_2\cdots Q_k = E$，则 $Q_1Q_2\cdots Q_k = A^{-1}$. 因此

$$EQ_1Q_2\cdots Q_k = EA^{-1} = A^{-1}.$$

故当 A 化成单位矩阵时，单位矩阵 E 化成了 A^{-1}.

(3) 设 $A=\begin{pmatrix}1&1\\a&b\end{pmatrix}$，且 $a\neq b$，故 A 可逆. 构造分块矩阵 $\begin{pmatrix}A\\E\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1\\a&b\\1&0\\0&1\end{pmatrix}$. 对其施加列初等变换：

$$\begin{pmatrix}1&1\\a&b\\1&0\\0&1\end{pmatrix}\xrightarrow{C_2\leftarrow C_2-C_1}\begin{pmatrix}1&0\\a&b-a\\1&-1\\0&1\end{pmatrix}\xrightarrow{C_2\leftarrow\frac{1}{b-a}C_2}\begin{pmatrix}1&0\\a&1\\1&-\frac{1}{b-a}\\0&\frac{1}{b-a}\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{C_1\leftarrow C_1-aC_2}\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\\frac{b}{b-a}&-\frac{1}{b-a}\\-\frac{a}{b-a}&\frac{1}{b-a}\end{pmatrix}$$

故 A 的逆矩阵为

$$A^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{b}{b-a}&-\frac{1}{b-a}\\-\frac{a}{b-a}&\frac{1}{b-a}\end{pmatrix}=\frac{1}{b-a}\begin{pmatrix}b&-1\\-a&1\end{pmatrix}.$$

例题 2.44.

判断矩阵 $\begin{pmatrix}1&-5&-4\\0&3&4\\-3&6&0\end{pmatrix}$ 是否可逆，若可逆则求逆矩阵，否则求矩阵的秩.

解 对矩阵进行初等行变换：

$$\begin{pmatrix}1&-5&-4\\0&3&4\\-3&6&0\end{pmatrix}\xrightarrow{R_3+3R_1}\begin{pmatrix}1&-5&-4\\0&3&4\\0&-9&-12\end{pmatrix}\xrightarrow{R_3+3R_2}\begin{pmatrix}1&-5&-4\\0&3&4\\0&0&0\end{pmatrix}$$

由于行阶梯形矩阵中存在全零行，故矩阵不可逆，且矩阵的秩为 2.

例题 2.45.

求可逆矩阵 P 和 Q，使得矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&-5&-4\\0&3&4\\-3&6&0\end{pmatrix}$ 的相抵标准型为 $\begin{pmatrix}I_r&0\\0&0\end{pmatrix}$.

解

第一步：对 $(A\quad I)$ 进行初等行变换，将 A 化为行最简形

$$\begin{pmatrix}1&-5&-4&1&0&0\\0&3&4&0&1&0\\-3&6&0&0&0&1\end{pmatrix}$$

$r_3+3r_1\to r_3$ 得：$\begin{pmatrix}1&-5&-4&1&0&0\\0&3&4&0&1&0\\0&-9&-12&3&0&1\end{pmatrix}$

$r_3+3r_2\to r_3$ 得: $\begin{pmatrix}1&-5&-4&1&0&0\\0&3&4&0&1&0\\0&0&0&3&3&1\end{pmatrix}$

$r_2\times\frac{1}{3}\to r_2$ 得: $\begin{pmatrix}1&-5&-4&1&0&0\\0&1&\frac{4}{3}&0&\frac{1}{3}&0\\0&0&0&3&3&1\end{pmatrix}$

$r_1+5r_2\to r_1$ 得: $\begin{pmatrix}1&0&\frac{8}{3}&1&\frac{5}{3}&0\\0&1&\frac{4}{3}&0&\frac{1}{3}&0\\0&0&0&3&3&1\end{pmatrix}$

此时 A 已化为行最简形 $B=\begin{pmatrix}1&0&\frac{8}{3}\\0&1&\frac{4}{3}\\0&0&0\end{pmatrix}$，且 $P=\begin{pmatrix}1&\frac{5}{3}&0\\0&\frac{1}{3}&0\\3&3&1\end{pmatrix}$，满足 $PA=B$.

第二步：对 $\begin{pmatrix}B\\I\end{pmatrix}$ 进行初等列变换，将 B 化为相抵标准型

$\begin{pmatrix}1&0&\frac{8}{3}\\0&1&\frac{4}{3}\\0&0&0\\1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

$c_3-\frac{8}{3}c_1-\frac{4}{3}c_2\to c_3$ 得: $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\\1&0&-\frac{8}{3}\\0&1&-\frac{4}{3}\\0&0&1\end{pmatrix}$

此时 B 已化为相抵标准型 $\Lambda=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，且 $Q=\begin{pmatrix}1&0&-\frac{8}{3}\\0&1&-\frac{4}{3}\\0&0&1\end{pmatrix}$，满足 $BQ=\Lambda$.

第三步：验证结果

由于 $PA=B$ 且 $BQ=\Lambda$，所以 $PAQ=\Lambda$，即:

$$\begin{pmatrix}1&\frac{5}{3}&0\\0&\frac{1}{3}&0\\3&3&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-5&-4\\0&3&4\\-3&6&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&-\frac{8}{3}\\0&1&-\frac{4}{3}\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$$

因此，所求的可逆矩阵为:

$$P=\begin{pmatrix}1&\frac{5}{3}&0\\0&\frac{1}{3}&0\\3&3&1\end{pmatrix},\quad Q=\begin{pmatrix}1&0&-\frac{8}{3}\\0&1&-\frac{4}{3}\\0&0&1\end{pmatrix}$$

矩阵 A 的相抵标准型为 $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，秩为 2.

例题 2.46.

求矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (n 阶方阵) 的逆矩阵.

解 构造增广矩阵并施行初等行变换：

$$\left(\begin{array}{ccccccc|ccccccc} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

从最后一行开始，自下而上进行消元：

$$\xrightarrow{R_{n-1}\leftarrow R_{n-1}-R_n} \left(\begin{array}{ccccccc|ccccccc} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_{n-2}\leftarrow R_{n-2}-R_{n-1}} \left(\begin{array}{ccccccc|ccccccc} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

继续此过程，最后：

$$\xrightarrow{R_1\leftarrow R_1-R_2} \left(\begin{array}{ccccccc|ccccccc} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & \cdots & (-1)^{n-3} & (-1)^{n-2} & (-1)^{n-1} \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & \cdots & (-1)^{n-4} & (-1)^{n-3} & (-1)^{n-2} \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots & (-1)^{n-5} & (-1)^{n-4} & (-1)^{n-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

则原矩阵的逆矩阵为：

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 & \cdots & (-1)^{n-2} & (-1)^{n-1} \\ 0 & 1 & -1 & 1 & \cdots & (-1)^{n-3} & (-1)^{n-2} \\ 0 & 0 & 1 & -1 & \cdots & (-1)^{n-4} & (-1)^{n-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

定理 2.13 (Bezout 定理)

如果 a 与 b 均为整数，则有整数 m 和 n 使得 $ma+nb=(a,b)$.

我们可以使用矩阵的工具去求 (a,b) 并且还能一次性给出 $ma+nb=(a,b)$ 中 m,n 的值，下面我们看一个例子，求 $(30,14)$

$$\begin{pmatrix} 14 & 1 & 0 \\ 30 & 0 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 14 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 0 & -13 & -7 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

于是就有 $-2\cdot 14+30=2=(14,30)$.

这个方法使用矩阵工具来求解两个数的最大公约数和给出其线性组合的系数. 下面是一般情况下的计算方法：

1. **初始化矩阵**：创建一个 2×3 的矩阵，第一行为初始的两个数 a 和 b，第二行为系数 m 和 n 的初始值（初始值通常为 1 和 0 或 0 和 1，取决于计算方向）. 即
$$\begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ b & 0 & 1 \end{pmatrix}$$
2. **循环迭代**：重复以下步骤直到余数为 0：
   (a). 计算下一行：将上一行的第一个元素除以上一行的第二个元素得到商，将商和上一行的第三个元素相乘，然后减去上一行的第一行，得到下一行的值.
   (b). 交换行：将上一行和下一行交换位置.
3. **终止迭代**：当余数为 0 时，最后一行的第一个元素即为最大公约数.
4. **得到系数**：从第一行的第二个元素开始，每个系数都等于其上一行的系数与最后一行相应位置的系数的乘积之和.

在例子中，我们利用这个方法计算了 $(30,14)$ 的最大公约数为 2，并得到了其线性组合的系数，即 -2 和 1.

例题 2.47. 2011 丘成桐大学生数学竞赛

考虑群

$$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})=\left\{\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\in \mathrm{M}_2(\mathbb{Z}) \mid ad-bc=1\right\}.$$

证明它可以由两个矩阵 $T=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 和 $S=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ 生成.

证明 S,T 可以生成如下元素

$$S^2=\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, S^3TS=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, S^2TST=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, S(TS)^2=\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

于是 S,T 可以对 $\forall n\in\mathbb{N}$ 生成如下元素

$$\begin{pmatrix}1&n\\0&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&0\\-n&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&0\\n&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&-n\\0&1\end{pmatrix}$$

若 $\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}\in \mathrm{M}_2(\mathbb{Z})$ 那么 $ad-bc=1$ 于是 $(a,c)=1$ 于是可以利用带余除法

$$a=q_1c+r_1,c=q_2r_1+r_2,\cdots,r_s=q_{s+1}r_{s+1}+1$$

该过程只使用了加法于是可以用 $\begin{pmatrix}1&n\\0&1\end{pmatrix}$ 去左乘 $\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$ 使 $\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$ 变成

$$\begin{pmatrix}1&s\\0&t\end{pmatrix}\text{ 或 }\begin{pmatrix}0&s\\1&t\end{pmatrix}$$

因为这个初等变换不改变行列式的值于是

$$\det\begin{pmatrix}1&s\\0&t\end{pmatrix}=t=1$$

于是

$$\begin{pmatrix}1&s\\0&t\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&s\\0&1\end{pmatrix}$$

对于 $\begin{pmatrix}0&s\\1&t\end{pmatrix}$ 有 $S\begin{pmatrix}0&s\\1&t\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&t\\0&-s\end{pmatrix}$

$$\det\begin{pmatrix}1&t\\0&-s\end{pmatrix}=-s=1$$

于是 $\begin{pmatrix}1&s\\0&t\end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix}0&s\\1&t\end{pmatrix}$ 可以由 S,T 生成.

综上所述 $SL_2(\mathbb{Z})$ 可以由 S,T 生成.

二、逆矩阵的唯一性

例题 2.48.

验证：如果 $ad-bc\neq 0$，那么矩阵 $A=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$ 的逆矩阵是

$$\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix}d&-b\\-c&a\end{pmatrix}.$$

如果 $ad-bc=0$，A 的逆矩阵是否存在？

解 首先验证当 $ad-bc\neq 0$ 时，给定矩阵确实是 A 的逆矩阵：

计算乘积：

$$A\cdot\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix}d&-b\\-c&a\end{pmatrix}=\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}\begin{pmatrix}d&-b\\-c&a\end{pmatrix}$$

$$=\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix}ad-bc&-ab+ab\\cd-cd&-bc+ad\end{pmatrix}=\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix}ad-bc&0\\0&ad-bc\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}.$$

同理可验证：

$$\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

因此，当 $ad-bc \neq 0$ 时，给定矩阵确实是 A 的逆矩阵.

当 $ad-bc=0$ 时，A 的逆矩阵不存在. 这是因为：

- 如果 a,b,c,d 不全为零，则矩阵 A 的秩小于 2（因为两行成比例或两列成比例），不是满秩矩阵，故不可逆.
- 如果 $a=b=c=d=0$，则 A 是零矩阵，显然不可逆.

因此，当 $ad-bc=0$ 时，矩阵 A 不可逆.

例题 2.49.

求下列方阵的逆矩阵：

$$\begin{pmatrix} A & B & C \\ 0 & D & G \\ 0 & 0 & F \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & A \\ 0 & D & B \\ F & G & C \end{pmatrix},$$

其中 A, D, F 是可逆方阵.

解 第一个矩阵的逆矩阵：

设 $M = \begin{pmatrix} A & B & C \\ 0 & D & G \\ 0 & 0 & F \end{pmatrix}$，其逆矩阵形式设为 $M^{-1} = \begin{pmatrix} X_{11} & X_{12} & X_{13} \\ X_{21} & X_{22} & X_{23} \\ X_{31} & X_{32} & X_{33} \end{pmatrix}$.

由 $MM^{-1} = I$ 得方程组：

$$\begin{aligned}
AX_{11} + BX_{21} + CX_{31} &= I \\
AX_{12} + BX_{22} + CX_{32} &= 0 \\
AX_{13} + BX_{23} + CX_{33} &= 0 \\
DX_{21} + GX_{31} &= 0 \\
DX_{22} + GX_{32} &= I \\
DX_{23} + GX_{33} &= 0 \\
FX_{31} &= 0 \\
FX_{32} &= 0 \\
FX_{33} &= I
\end{aligned}$$

解得：

$$\begin{aligned}
&X_{31} = 0, \quad X_{32} = 0, \quad X_{33} = F^{-1} \\
&X_{21} = 0, \quad X_{22} = D^{-1}, \quad X_{23} = -D^{-1}GF^{-1} \\
&X_{11} = A^{-1}, \quad X_{12} = -A^{-1}BD^{-1}, \quad X_{13} = A^{-1}(BD^{-1}G - C)F^{-1}
\end{aligned}$$

故逆矩阵为：

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}BD^{-1} & A^{-1}(BD^{-1}G - C)F^{-1} \\ 0 & D^{-1} & -D^{-1}GF^{-1} \\ 0 & 0 & F^{-1} \end{pmatrix}$$

第二个矩阵的逆矩阵：

设 $N=\begin{pmatrix}0&0&A\\0&D&B\\F&G&C\end{pmatrix}$，其逆矩阵形式设为 $N^{-1}=\begin{pmatrix}Y_{11}&Y_{12}&Y_{13}\\Y_{21}&Y_{22}&Y_{23}\\Y_{31}&Y_{32}&Y_{33}\end{pmatrix}$.

由 $NN^{-1}=I$ 得方程组：

$$\begin{aligned}AY_{31}&=I\\AY_{32}&=0\\AY_{33}&=0\\DY_{21}+BY_{31}&=0\\DY_{22}+BY_{32}&=I\\DY_{23}+BY_{33}&=0\\FY_{11}+GY_{21}+CY_{31}&=0\\FY_{12}+GY_{22}+CY_{32}&=0\\FY_{13}+GY_{23}+CY_{33}&=I\end{aligned}$$

解得：

$$\begin{aligned}&Y_{31}=A^{-1},\quad Y_{32}=0,\quad Y_{33}=0\\&Y_{21}=-D^{-1}BA^{-1},\quad Y_{22}=D^{-1},\quad Y_{23}=0\\&Y_{11}=F^{-1}(GD^{-1}B-C)A^{-1},\quad Y_{12}=-F^{-1}GD^{-1},\quad Y_{13}=F^{-1}\end{aligned}$$

故逆矩阵为：

$$N^{-1}=\begin{pmatrix}F^{-1}(GD^{-1}B-C)A^{-1}&-F^{-1}GD^{-1}&F^{-1}\\-D^{-1}BA^{-1}&D^{-1}&0\\A^{-1}&0&0\end{pmatrix}$$

例题 2.50.

求下列方阵的逆矩阵：

$$\begin{pmatrix}A&B&C\\0&D&G\\0&0&F\end{pmatrix},\quad\begin{pmatrix}0&0&A\\0&D&B\\F&G&C\end{pmatrix},$$

其中 A,D,F 是可逆方阵.

解 第一个矩阵的逆矩阵：

设 $M=\begin{pmatrix}A&B&C\\0&D&G\\0&0&F\end{pmatrix}$. 构造分块增广矩阵并施行分块初等行变换：

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc}A&B&C&I&0&0\\0&D&G&0&I&0\\0&0&F&0&0&I\end{array}\right)$$

第一步：将第三行乘以 F^{-1}：

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc}A&B&C&I&0&0\\0&D&G&0&I&0\\0&0&I&0&0&F^{-1}\end{array}\right)$$

第二步：将第二行减去第三行乘以 G（即 $R_2 \leftarrow R_2 - GR_3$）：

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} A & B & C & I & 0 & 0 \\ 0 & D & 0 & 0 & I & -GF^{-1} \\ 0 & 0 & I & 0 & 0 & F^{-1} \end{array}\right)$$

第三步：将第二行乘以 D^{-1}：

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} A & B & C & I & 0 & 0 \\ 0 & I & 0 & 0 & D^{-1} & -D^{-1}GF^{-1} \\ 0 & 0 & I & 0 & 0 & F^{-1} \end{array}\right)$$

第四步：将第一行减去第二行乘以 B 和第三行乘以 C（即 $R_1 \leftarrow R_1 - BR_2 - CR_3$）：

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} A & 0 & 0 & I & -BD^{-1} & -CF^{-1} + BD^{-1}GF^{-1} \\ 0 & I & 0 & 0 & D^{-1} & -D^{-1}GF^{-1} \\ 0 & 0 & I & 0 & 0 & F^{-1} \end{array}\right)$$

第五步：将第一行乘以 A^{-1}：

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} I & 0 & 0 & A^{-1} & -A^{-1}BD^{-1} & A^{-1}(BD^{-1}G - C)F^{-1} \\ 0 & I & 0 & 0 & D^{-1} & -D^{-1}GF^{-1} \\ 0 & 0 & I & 0 & 0 & F^{-1} \end{array}\right)$$

故逆矩阵为：

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}BD^{-1} & A^{-1}(BD^{-1}G - C)F^{-1} \\ 0 & D^{-1} & -D^{-1}GF^{-1} \\ 0 & 0 & F^{-1} \end{pmatrix}$$

第二个矩阵的逆矩阵：

设 $N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & A \\ 0 & D & B \\ F & G & C \end{pmatrix}$. 构造分块增广矩阵并施行分块初等行变换：

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & A & I & 0 & 0 \\ 0 & D & B & 0 & I & 0 \\ F & G & C & 0 & 0 & I \end{array}\right)$$

第一步：交换第一行和第三行：

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} F & G & C & 0 & 0 & I \\ 0 & D & B & 0 & I & 0 \\ 0 & 0 & A & I & 0 & 0 \end{array}\right)$$

第二步：将第一行乘以 F^{-1}：

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} I & F^{-1}G & F^{-1}C & 0 & 0 & F^{-1} \\ 0 & D & B & 0 & I & 0 \\ 0 & 0 & A & I & 0 & 0 \end{array}\right)$$

第三步：将第三行乘以 A^{-1}：

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} I & F^{-1}G & F^{-1}C & 0 & 0 & F^{-1} \\ 0 & D & B & 0 & I & 0 \\ 0 & 0 & I & A^{-1} & 0 & 0 \end{array}\right)$$

第四步：将第二行减去第三行乘以 B（即 $R_2 \leftarrow R_2 - BR_3$）：

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} I & F^{-1}G & F^{-1}C & 0 & 0 & F^{-1} \\ 0 & D & 0 & -BA^{-1} & I & 0 \\ 0 & 0 & I & A^{-1} & 0 & 0 \end{array}\right)$$

第五步：将第二行乘以 D^{-1}：

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} I & F^{-1}G & F^{-1}C & 0 & 0 & F^{-1} \\ 0 & I & 0 & -D^{-1}BA^{-1} & D^{-1} & 0 \\ 0 & 0 & I & A^{-1} & 0 & 0 \end{array}\right)$$

第六步：将第一行减去第二行乘以 $F^{-1}G$ 和减去第三行乘以 $F^{-1}C$（即 $R_1 \leftarrow R_1 - (F^{-1}G)R_2 - (F^{-1}C)R_3$）：

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} I & 0 & 0 & F^{-1}(GD^{-1}B - C)A^{-1} & -F^{-1}GD^{-1} & F^{-1} \\ 0 & I & 0 & -D^{-1}BA^{-1} & D^{-1} & 0 \\ 0 & 0 & I & A^{-1} & 0 & 0 \end{array}\right)$$

故逆矩阵为：

$$N^{-1} = \begin{pmatrix} F^{-1}(GD^{-1}B - C)A^{-1} & -F^{-1}GD^{-1} & F^{-1} \\ -D^{-1}BA^{-1} & D^{-1} & 0 \\ A^{-1} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

例题 2.51.

设 n 阶矩阵 A 和 B 满足 $A + B = AB$, 求证；$I - A$ 是可逆矩阵且 $AB = BA$.

证明 因为

$$(I - A)(I - B) = I - A - B + AB = I,$$

所以 $I - A$ 是可逆阵. 另一方面可得 $(I - A)^{-1} = (I - B)$, 故

$$I = (I - B)(I - A) = I - B - A + BA,$$

从而 $BA = A + B = AB$.

例题 2.52.

设 A, B 分别是 $n \times m$ 和 $m \times n$ 的矩阵, 且 $E_n - AB$ 可逆, 证明 $E_m - BA$ 也可逆, 并求它的逆.

分析, 利用幂级数展开法

$$\begin{aligned} (E_m - BA)^{-1} = \frac{E_m}{E_m - BA} &= E_m + (BA) + (BA)^2 + (BA)^3 + \cdots \\ &= E_m + B\left(E_n + AB + (AB)^2 + \cdots\right)A \\ &= E_m + B\frac{E_n}{E_n - AB}A \\ &= E_m + B\left(E_n - AB\right)^{-1}A. \end{aligned}$$

证明 由于

$$\begin{aligned} &\left(E_m + B\left(E_n - AB\right)^{-1}A\right)(E_m - BA) \\ =&(E_m - BA) + B\left(E_n - AB\right)^{-1}A(E_m - BA) \\ =&(E_m - BA) + B\left(E_n - AB\right)^{-1}(A - ABA) \\ =&(E_m - BA) + B\left(E_n - AB\right)^{-1}(E_n - AB)A \\ =&E_m - BA + BA = E_m. \end{aligned}$$

所以 $E_m - BA$ 可逆, 并且 $(E_m - BA)^{-1} = E_m + B\,(E_n - AB)^{-1}\,A$.

例题 2.53.

设 A 和 B 是方阵. 证明如果 $E + AB$ 可逆, 那么 $E + BA$ 可逆.

解 我们首先给出一个基于幂级数的启发式讨论, 然后提供严谨的证明.

幂级数启发:

假设 $\|AB\| < 1$（在某种范数下）, 则 $E + AB$ 可逆, 且其逆矩阵可表示为 Neumann 级数:

$$(E + AB)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (AB)^n.$$

类似地, 如果 $\|BA\| < 1$, 则

$$(E + BA)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (BA)^n.$$

注意到对于 $n \geq 1$, 有 $(BA)^n = B(AB)^{n-1}A$, 因此

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (BA)^n = E + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n B(AB)^{n-1}A = E - B\left(\sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m (AB)^m\right) A = E - B(E + AB)^{-1}A.$$

这启发我们猜想 $(E + BA)^{-1} = E - B(E + AB)^{-1}A$. 然而, 这个启发式讨论依赖于级数收敛条件, 但结论在一般情况下也成立. 下面我们给出一个不依赖于范数的严谨证明.

严谨证明:

假设 $E + AB$ 可逆, 令 $C = (E + AB)^{-1}$. 我们验证 $E - BCA$ 是 $E + BA$ 的逆矩阵.

首先, 计算:

$$(E + BA)(E - BCA) = E(E - BCA) + BA(E - BCA) = E - BCA + BA - BABCA.$$

注意到 $BABCA = B(AB)CA$. 由于 $C = (E+AB)^{-1}$, 有 $(E+AB)C = E$, 即 $C+ABC = E$, 所以 $ABC = E-C$. 代入得:

$$B(AB)CA = B(E - C)A = BA - BCA.$$

因此,

$$(E + BA)(E - BCA) = E - BCA + BA - (BA - BCA) = E.$$

其次, 计算:

$$(E - BCA)(E + BA) = E(E + BA) - BCA(E + BA) = E + BA - BCA - BCABA.$$

注意到 $BCABA = BC(AB)A$. 由于 $C(E + AB) = E$, 即 $C + CAB = E$, 所以 $CAB = E - C$. 代入得:

$$BC(AB)A = B(CAB)A = B(E - C)A = BA - BCA.$$

因此,

$$(E - BCA)(E + BA) = E + BA - BCA - (BA - BCA) = E.$$

综上,$(E + BA)(E - BCA) = E$ 和 $(E - BCA)(E + BA) = E$, 故 $E + BA$ 可逆, 且其逆矩阵为 $E - BCA$. 因此, 如果 $E + AB$ 可逆, 则 $E + BA$ 可逆.

三、一些剩下的题目

例题 2.54.

证明如果有大于 2 的整数 m 使得

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^m = 0,$$

则

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^2 = 0.$$

解 设 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$，且存在整数 $m > 2$ 使得 $A^m = 0$. 则 A 是幂零矩阵. 考虑矩阵的秩.

如果 $\operatorname{rank}(A) = 0$，则 $A = 0$，显然 $A^2 = 0$.

如果 $\operatorname{rank}(A) = 2$，则 A 可逆，但 $A^m = 0$ 矛盾，因为可逆矩阵的幂不可能为零矩阵. 故 $\operatorname{rank}(A) \neq 2$.

如果 $\operatorname{rank}(A) = 1$，则 A 可以表示为 $A = u^t v$，其中 u 和 v 是非零列向量. 则

$$A^2 = u^t v u^t v = u({}^t v u)^t v.$$

令 $k = {}^t v u$，则 $A^2 = kA$. 同理，$A^m = k^{m-1}A$. 由于 $A^m = 0$ 且 $A \neq 0$，必有 $k = 0$，因此 $A^2 = 0$.

综上，无论哪种情况，都有 $A^2 = 0$.

例题 2.55.

对同阶方阵 A, B, C，其交换子定义为 $[A, B] = AB - BA$. 证明：

(1) $[A, BC] = [A, B]C + B[A, C]$;

(2) $[[A, B], C] + [[B, C], A] + [[C, A], B] = 0$.

解

(1) 计算左边：

$$[A, BC] = A(BC) - (BC)A = ABC - BCA.$$

计算右边：

$$[A, B]C + B[A, C] = (AB - BA)C + B(AC - CA) = ABC - BAC + BAC - BCA = ABC - BCA.$$

故左边等于右边，恒等式成立.

(2) 展开各项：

$$[[A, B], C] = (AB - BA)C - C(AB - BA) = ABC - BAC - CAB + CBA,$$
$$[[B, C], A] = (BC - CB)A - A(BC - CB) = BCA - CBA - ABC + ACB,$$
$$[[C, A], B] = (CA - AC)B - B(CA - AC) = CAB - ACB - BCA + BAC.$$

将三式相加：

$$\begin{aligned} &ABC - BAC - CAB + CBA \\ &+BCA - CBA - ABC + ACB \\ &+CAB - ACB - BCA + BAC = 0. \end{aligned}$$

故雅可比恒等式成立.

2.5 线性方程组的解空间

定理 2.14

设有 n 个未知数 m 个方程式组成的线性方程组:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \tag{2.4}$$

它的系数矩阵记为 A, 增广矩阵记为 $\widetilde{\boldsymbol{A}}$, 即

$$\tilde{\boldsymbol{A}} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}$$

则有下列结论:

(1) 若 $\tilde{\boldsymbol{A}}$ 与 A 的秩都等于 n, 则该方程组有唯一一组解;

(2) 若 $\widetilde{A}$ 与 A 的秩相等但小于 n, 即 $r(\widetilde{A}) = r(A) < n$, 则该方程组有无穷多解

(3) 若 $\tilde{\boldsymbol{A}}$ 与 A 的秩不相等, 则该方程组无解.

定义 2.25

线性方程组2.4称为齐次线性方程组，若其所有的常数项 b_i 都为零，否则称为非齐次线性方程组.

定理 2.15

设有齐次线性方程组

$$Ax = \mathbf{0} \tag{2.5}$$

, 其中 $A = (a_{ij})$ 是 $m \times n$ 矩阵. 若 $r(A) = r < n$, 则上述方程组有非零解. 它的解构成 n 维列向量空间的一个 $n - r$ 维子空间. 也就是说，存在 $n - r$ 个向量构成的基础解系 $\{\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_{n-r}\}$, 使上述方程组的任一解均可表示为 $\{\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_{n-r}\}$ 的线性组合.

定理 2.16

设 φ 是数域 $\mathbb{F}$ 上向量空间 V 到 U 的线性映射, 则 $\dim \operatorname{Im}\varphi + \dim \operatorname{Ker}\varphi = \dim V$.

2.5.1 经典例题讲解

例题 2.56.

设 $A = \begin{pmatrix} -1 & 4 & 3 \\ -2 & 5 & 3 \\ 2 & -4 & -4 \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$.

(1) 证明 $AX = 0$ 只有零解;

(2) 对 $\lambda = 1, 2, -3$, 分别求线性方程组 $(A - \lambda E)X = 0$ 的一个基础解系.

解 (1) 考虑系数矩阵 A, 通过初等行变换:

$$\begin{pmatrix}-1&4&3\\-2&5&3\\2&-4&-4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-4&-3\\-2&5&3\\2&-4&-4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-4&-3\\0&-3&-3\\0&4&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-4&-3\\0&1&1\\0&4&2\end{pmatrix}$$
$$\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$$

得到行最简形式为单位矩阵, 故秩为 3, 因此齐次方程组 $AX=0$ 只有零解.

(2) 对不同的 λ, 求 $(A-\lambda E)X=0$ 的基础解系.

- 当 $\lambda=1$ 时,

$$A-E=\begin{pmatrix}-2&4&3\\-2&4&3\\2&-4&-5\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-2&4&3\\0&0&0\\0&0&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-2&4&3\\0&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-2&4&0\\0&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-2&0\\0&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$$

对应方程: $x_1-2x_2=0, x_3=0$. 令 $x_2=t$, 则 $x_1=2t, x_3=0$. 基础解系为 $\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}$.

- 当 $\lambda=2$ 时,

$$A-2E=\begin{pmatrix}-3&4&3\\-2&3&3\\2&-4&-6\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-3&4&3\\0&1&3\\0&-4&-12\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-3&4&3\\0&1&3\\0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-3&0&-9\\0&1&3\\0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&3\\0&1&3\\0&0&0\end{pmatrix}$$

对应方程: $x_1+3x_3=0, x_2+3x_3=0$. 令 $x_3=t$, 则 $x_1=-3t, x_2=-3t$. 基础解系为 $\begin{pmatrix}-3\\-3\\1\end{pmatrix}$.

- 当 $\lambda=-3$ 时,

$$A+3E=\begin{pmatrix}2&4&3\\-2&8&3\\2&-4&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2&4&3\\0&12&6\\0&-8&-4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2&4&3\\0&12&6\\0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&\frac{3}{2}\\0&1&\frac{1}{2}\\0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&\frac{1}{2}\\0&1&\frac{1}{2}\\0&0&0\end{pmatrix}$$

对应方程: $x_1+\frac{1}{2}x_3=0, x_2+\frac{1}{2}x_3=0$. 令 $x_3=-2t$, 则 $x_1=t, x_2=t$. 基础解系为 $\begin{pmatrix}1\\1\\-2\end{pmatrix}$.

例题 2.57.

对于线性方程组:

$$\begin{cases}12x_1+9x_2+3x_3+10x_4=13\\4x_1+3x_2+x_3+2x_4=3\\8x_1+6x_2+2x_3+5x_4=7\end{cases}$$

解 考虑增广矩阵:

$$\left(\begin{array}{cccc|c}12&9&3&10&13\\4&3&1&2&3\\8&6&2&5&7\end{array}\right)$$

施行初等行变换：

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 12 & 9 & 3 & 10 & 13 \\ 4 & 3 & 1 & 2 & 3 \\ 8 & 6 & 2 & 5 & 7 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - 3R_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & 0 & 4 & 4 \\ 4 & 3 & 1 & 2 & 3 \\ 8 & 6 & 2 & 5 & 7 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & 0 & 4 & 4 \\ 4 & 3 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \leftarrow \frac{1}{4} R_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - R_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

交换行得行最简形：

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 4 & 3 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

对应方程组：

$$\begin{cases} 4x_1 + 3x_2 + x_3 = 1 \\ x_4 = 1 \end{cases}$$

令 $x_1 = c_1, x_2 = c_2$（$c_1, c_2 \in \mathbb{R}$），则 $x_3 = 1 - 4c_1 - 3c_2$. 通解为：

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

相伴齐次方程组的增广矩阵为：

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 12 & 9 & 3 & 10 & 0 \\ 4 & 3 & 1 & 2 & 0 \\ 8 & 6 & 2 & 5 & 0 \end{array}\right)$$

类似行变换得：

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 4 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

对应齐次方程组：

$$\begin{cases} 4x_1 + 3x_2 + x_3 = 0 \\ x_4 = 0 \end{cases}$$

令 $x_1 = d_1, x_2 = d_2$（$d_1, d_2 \in \mathbb{R}$），则 $x_3 = -4d_1 - 3d_2$. 齐次通解为：

$$\mathbf{x} = d_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix} + d_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

故相伴齐次方程组的一个基础解系为：

$$\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\-4\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\-3\\0\end{pmatrix}\right\}$$

例题 2.58.

对于线性方程组：

$$\begin{cases}-6x_1+8x_2-5x_3-x_4=9\\-2x_1+4x_2+7x_3+3x_4=1\\-3x_1+5x_2+4x_3+2x_4=3\\-3x_1+7x_2+17x_3+7x_4=\lambda\end{cases}$$

解 考虑增广矩阵：

$$\left(\begin{array}{cccc|c}-6&8&-5&-1&9\\-2&4&7&3&1\\-3&5&4&2&3\\-3&7&17&7&\lambda\end{array}\right)$$

施行初等行变换：

$$\xrightarrow[R_3\leftarrow 2R_3-3R_2]{R_1\leftarrow R_1-3R_2}\left(\begin{array}{cccc|c}0&-4&-26&-10&6\\-2&4&7&3&1\\0&-2&-13&-5&3\\0&2&13&5&2\lambda-3\end{array}\right)$$

注意到第一行是第三行的 2 倍，故去掉第一行：

$$\left(\begin{array}{cccc|c}-2&4&7&3&1\\0&-2&-13&-5&3\\0&2&13&5&2\lambda-3\end{array}\right)$$

将第三行加至第二行（即 $R_3\leftarrow R_3+R_2$）：

$$\left(\begin{array}{cccc|c}-2&4&7&3&1\\0&-2&-13&-5&3\\0&0&0&0&2\lambda\end{array}\right)$$

由第三行得 $2\lambda=0$，故方程组有解当且仅当 $\lambda=0$.

当 $\lambda=0$ 时，增广矩阵为：

$$\left(\begin{array}{cccc|c}-2&4&7&3&1\\0&-2&-13&-5&3\end{array}\right)$$

进一步行变换：

$$\xrightarrow{R_1\leftarrow-\frac{1}{2}R_1}\left(\begin{array}{cccc|c}1&-2&-\frac{7}{2}&-\frac{3}{2}&-\frac{1}{2}\\0&-2&-13&-5&3\end{array}\right)\xrightarrow{R_2\leftarrow-\frac{1}{2}R_2}\left(\begin{array}{cccc|c}1&-2&-\frac{7}{2}&-\frac{3}{2}&-\frac{1}{2}\\0&1&\frac{13}{2}&\frac{5}{2}&-\frac{3}{2}\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_1\leftarrow R_1+2R_2}\left(\begin{array}{cccc|c}1&0&\frac{19}{2}&\frac{7}{2}&-\frac{7}{2}\\0&1&\frac{13}{2}&\frac{5}{2}&-\frac{3}{2}\end{array}\right)$$

对应方程组：

$$\begin{cases} x_1 + \frac{19}{2}x_3 + \frac{7}{2}x_4 = -\frac{7}{2} \\ x_2 + \frac{13}{2}x_3 + \frac{5}{2}x_4 = -\frac{3}{2} \end{cases}$$

令 $x_3 = 2\alpha, x_4 = 2\beta$（$\alpha, \beta \in \mathbb{R}$），则通解为：

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{7}{2} \\ -\frac{3}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha \begin{pmatrix} -19 \\ -13 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} -7 \\ -5 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

2.6 本章总结

本章系统介绍了矩阵理论的基本概念、运算性质及其在线性代数中的应用. 主要内容包括：

2.6.1 向量空间理论

- **数域与线性空间**：定义了数域的概念，任一数域必包含有理数域 $\mathbb{Q}$. 引入了线性空间的八条公理，包括加法交换律、结合律、零元存在、负元存在、数乘单位元、数乘结合律以及两个分配律.
- **线性相关与线性无关**：给出了线性表出、线性相关和线性无关的严格定义，探讨了它们的基本性质，包括零向量的特殊性、子集的线性相关性、向量可表为其余向量的条件以及表示唯一性与线性无关性的等价关系.
- **极大线性无关组与秩**：定义了向量族的极大线性无关组，证明了其存在性（对有限非零向量族）和唯一性（所含向量个数相等），从而定义了向量族的秩. 引入了向量组等价的概念，证明了等价向量组具有相同的秩.
- **基与维数**：定义了线性空间的基，即线性无关且能生成整个空间的向量集. 基的个数称为空间的维数.
- **子空间**：定义了线性子空间及其判定条件（非空、对加法和数乘封闭）. 讨论了子空间的交与和运算，证明了维数公式：$\dim V_1 + \dim V_2 = \dim(V_1 + V_2) + \dim(V_1 \cap V_2)$.
- **直和**：定义了子空间的直和，并给出了直和的多个等价条件：和空间中每个向量表法唯一、零向量表法唯一、子空间交为零、维数可加、基可合并.

2.6.2 矩阵的秩

- **秩的定义与等价描述**：矩阵的行秩（行向量组的秩）与列秩（列向量组的秩）相等，统称为矩阵的秩. 秩也等于矩阵经初等变换后的非零行数，或非零子式的最高阶数.
- **秩的性质与不等式**：
  - 初等变换不改变矩阵的秩.
  - $r(kA) = r(A)$（$k \neq 0$）.
  - $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$.
  - $r(A + B) \leq r(A) + r(B)$.
  - Sylvester 不等式：$r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$（$A$ 为 $m \times n$，B 为 $n \times s$）.
- **线性方程组解的理论**：
  - 非齐次方程组 $AX = b$ 有解当且仅当 $r(A) = r(\widetilde{A})$.
  - 齐次方程组 $AX = 0$ 的解空间维数为 $n - r(A)$，其基础解系包含 $n - r(A)$ 个线性无关解向量.
  - 线性映射的维数公式：$\dim \operatorname{Im} \varphi + \dim \operatorname{Ker} \varphi = \dim V$.

2.6.3 矩阵运算与特殊矩阵

- **线性映射与矩阵表示**：线性映射 $T : V \to W$ 保持加法和数乘. 在给定基下，线性映射可由矩阵表示，矩阵的列即为基向量的像在目标空间基下的坐标.
- **基本运算**：
  - 加法、数乘：满足交换律、结合律、分配律.
  - 乘法：满足结合律、分配律，但不满足交换律.
  - 转置：用 ${}^tA$ 表示 A 的转置，满足 $({}^tA)^T = A$，${}^t(AB) = {}^tB{}^tA$，${}^t(A+B) = {}^tA + {}^tB$.
- **特殊矩阵**：
  - 标准单位向量 e_i 和基础矩阵 E_{ij}.
  - 基础循环矩阵和幂零 Jordan 块.
  - 对称矩阵（${}^tA = A$）和反对称矩阵（${}^tA = -A$），任一矩阵可唯一分解为对称与反对称矩阵之和.
- **方阵的幂**：计算方阵幂的方法包括数学归纳法、二项式定理（对可交换矩阵）、Cayley-Hamilton 定理、利用秩 1 分解以及相似对角化或 Jordan 标准型法.

2.6.4 初等变换的核心应用

- **初等变换的类型与性质**：
  - **行初等变换**：
    1. 对换两行：$R_i \leftrightarrow R_j$
    2. 数乘某行：$kR_i \to R_i$（$k \neq 0$）
    3. 倍加变换：$R_i + kR_j \to R_i$（$i \neq j$）
  - **列初等变换**：
    1. 对换两列：$C_i \leftrightarrow C_j$
    2. 数乘某列：$kC_i \to C_i$（$k \neq 0$）
    3. 倍加变换：$C_i + kC_j \to C_i$（$i \neq j$）
  - **初等矩阵**：由单位矩阵经过一次初等变换得到，左乘初等矩阵对应行变换，右乘对应列变换.
  - **基本性质**：初等变换不改变矩阵的秩，可逆矩阵可以表示为有限个初等矩阵的乘积.
- **分块初等变换的详细理论**：
  - **分块行初等变换**：
    1. 对换两行块：$R_{B,i} \leftrightarrow R_{B,j}$
    2. 倍乘行块：$P \cdot R_{B,i} \to R_{B,i}$（$P$ 可逆）
    3. 倍加行块：$R_{B,i} + C \cdot R_{B,j} \to R_{B,i}$（$i \neq j$，$C$ 为适当阶数矩阵）
  - **分块列初等变换**：
    1. 对换两列块：$C_{B,i} \leftrightarrow C_{B,j}$
    2. 倍乘列块：$C_{B,i} \cdot Q \to C_{B,i}$（$Q$ 可逆）
    3. 倍加列块：$C_{B,i} + C_{B,j} \cdot D \to C_{B,i}$（$i \neq j$，$D$ 为适当阶数矩阵）
  - **分块初等矩阵**：
    - 分块对换矩阵：$E_{B,ij} = \begin{pmatrix} I & & & \\ & 0 & \cdots & I \\ & \vdots & \ddots & \vdots \\ & I & \cdots & 0 \\ & & & & I \end{pmatrix}$

- 分块倍乘矩阵：$E_{B,i}(P)=\begin{pmatrix} I & & & \\ & P & & \\ & & \ddots & \\ & & & I \end{pmatrix}$
- 分块倍加矩阵：$E_{B,ij}(C)=\begin{pmatrix} I & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & I & \cdots & C \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & I \end{pmatrix}$
  - **重要性质**：分块倍乘变换中的乘子矩阵必须可逆，以保证变换的可逆性.

- **初等变换的详细应用**：
  - **求逆矩阵的完整方法**：
    - **行变换法**：构造增广矩阵 $(A|I)$，通过行初等变换化为 $(I|A^{-1})$.
    - **列变换法**：构造增广矩阵 $\begin{pmatrix} A \\ I \end{pmatrix}$，通过列初等变换化为 $\begin{pmatrix} I \\ A^{-1} \end{pmatrix}$.
    - **混合变换法**：结合行变换和列变换，特别适用于分块矩阵.
  - **解线性方程组的系统方法**：
    - **高斯消元法**：通过行初等变换将增广矩阵化为行阶梯形或行最简形.
    - **求 $A^{-1}B$**：对 $(A|B)$ 进行行变换化为 $(I|A^{-1}B)$.
    - **求 BA^{-1}**：对 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$ 进行列变换化为 $\begin{pmatrix} I \\ BA^{-1} \end{pmatrix}$.
    - **求公共解**：$V_1 \cap V_2$ 对应方程组 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} X = 0$ 的解空间.
  - **求矩阵相抵标准型的完整步骤**：
    1. 对 $(A|I_m)$ 只施行初等行变换，化为 $(B|P)$，其中 B 是行最简形.
    2. 对 $\begin{pmatrix} B \\ I_n \end{pmatrix}$ 只施行初等列变换，化为 $\begin{pmatrix} \Lambda \\ Q \end{pmatrix}$，其中 $\Lambda=\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.
    3. 得到 $PAQ=\Lambda$，且 P 和 Q 即为所求的可逆矩阵.
  - **分块矩阵运算的高级技巧**：
    - **分块矩阵求逆**：对于分块矩阵 $M=\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$，通过分块初等变换求逆.
    - **分块三角矩阵求逆**：利用分块初等变换简化计算过程.
    - **分块对角化**：通过分块初等变换将矩阵化为分块对角形式.

2.6.5 方阵与逆矩阵的深入理论

- **逆矩阵的等价条件**：以下条件互相等价：
  1. A 可逆（存在 B 使 $AB=BA=I$）
  2. $|A|\neq 0$
  3. A 满秩（$r(A)=n$）
  4. A 的行（列）向量组线性无关
  5. 齐次方程组 $AX=0$ 只有零解
  6. 对任意 b，方程组 $AX=b$ 有唯一解
  7. A 可表示为初等矩阵的乘积
  8. A 的相抵标准型为单位矩阵

- **逆矩阵运算的完整性质：**
  - $(A^{-1})^{-1} = A$
  - $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
  - $(kA)^{-1} = k^{-1}A^{-1}$（$k \neq 0$）
  - $({}^tA)^{-1} = {}^t(A^{-1})$
  - $|A^{-1}| = |A|^{-1}$
  - $(A^{-1})^k = (A^k)^{-1}$
- **特殊矩阵的逆矩阵公式：**
  - 初等矩阵的逆仍是同类型初等矩阵
  - 分块三角矩阵的逆有显式公式
  - 2×2 矩阵的逆公式：$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$

2.6.6 线性方程组的解空间理论

- **解的存在性完整判据：**
  - $r(A) = r(\widetilde{A}) = n$：唯一解
  - $r(A) = r(\widetilde{A}) < n$：无穷多解
  - $r(A) < r(\widetilde{A})$：无解
- **解空间结构的详细分析：**
  - **齐次方程组**：解空间是 n 维列向量空间的子空间，维数为 $n - r(A)$
  - **基础解系**：包含 $n - r(A)$ 个线性无关解向量，构成解空间的基
  - **非齐次方程组**：通解 = 特解 + 齐次通解
  - **解空间的几何意义**：在 $\mathbb{R}^n$ 中的位置关系
- **求解方法的系统总结：**
  - **高斯消元法**：最通用的方法，适用于所有情况
  - **逆矩阵法**：当 A 可逆时，$X = A^{-1}b$
  - **Cramer 法则**：通常用于隐函数定理



第 3 章 行列式

3.1 课本主要内容的回顾与补充

定义 3.1 (n 阶行列式的定义)

我们称下面由两条竖线围起来的由 n 行 n 列元素组成的式子为一个 n 阶行列式：

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \tag{3.1}$$

它由 n 行 n 列共 n^2 个元素组成，第 i 上元素全体称为行列式 $|A|$ 的第 i 行，第 j 列上的元素全体称为行列式 $|A|$ 的第 j 列. 第 i 行与第 j 列交点上的元素 a_{ij} 称为 $|A|$ 的第 (i,j) 元素. 元素 $a_{11}, a_{22}, \ldots, a_{nn}$ 称为 $|A|$ 的主对角线.

注 n 阶行列式也记为 $|A|$ 或 $detA$. 通常绝对值符号都用 $abs()$ 表示是为了区分行列式.

定义 3.2 (余子式的定义)

定义元素 a_{ij} 的余子式 M_{ij} 为由行列式 $|A|$ 中划去第 i 行第 j 列后剩下的 $n-1$ 与 $n-1$ 列元素组成的行列式：

$$M_{ij} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix} \tag{3.2}$$

定义 3.3 (行列式的逆归定义)

当 $n=1$ 时，$|A|$ 的值为 a_{11}，先假定 $n-1$ 阶行列式已经定义了它们的值，则对任意的 i, j, M_{ij} 的值已经定义，定义 n 阶行列式 $|A|$ 的值为

$$|A| = a_{11}M_{11} - a_{21}M_{21} + \cdots + (-1)^{n+1}a_{n1}M_{n1} \tag{3.3}$$

例题 3.1.

行列式 $|A|=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_1 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ 中元素 a_{11} 的余子式为 $M_{11}=\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$, 元素 a_{12} 的余子式为 $M_{12}=\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$, 元素 a_{23} 的余子式为 $M_{23}=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$, 行列式 $|A|$ 的值为:

$$|A|=a_{11}M_{11}-a_{21}M_{21}+a_{31}M_{31}.$$

注 **行列式的几何意义**二阶行列式的绝对值的几何意义是平行四边形的面积，三阶行列式的绝对值的几何意义是平行六面体的体积.

定义 3.4 (代数余子式的定义)

在行列式 $|A|$ 中，A_{ij} 的代数余子式为 $A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$ 其中 M_{ij} 为 a_{ij} 的余子式.

注 用代数余子式可以将行列式的值表示为

$$|A|=a_{11}A_{11}+a_{21}A_{21}+\cdots+a_{n1}A_{n1}. \tag{3.4}$$

通过从某一行或某一列将行列式展开可以减低行列式的阶数，但如果不进行一定的初等变换会计算多个行列式并不能简化计算，所以在展开行列式时应当先进行一定的化简.

定义 3.5 (上 (下) 三角行列式的定义)

若 $|A|$ 是一个 n 阶行列式，且

$$|A|=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \text{ 或 } |A|=\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

则称左边的行列式为上三角行列式（这时 $A_{ij}=0$ 对任一 $i>j$ 成立）；右边的行列式为下三角行列式（这时 $A_{ij}=0$ 对任一 $i<j$ 成立）.

注 上下三角行列式的值等于主对角线元素之积. 上下三角行列式是比较好计算的在计算复杂行列式时可以想办法将行列式化为上下三角行列式.

定义 3.6 (逆序数的定义)

我们称 n 个数 $1,2,\cdots,n$ 的排列，$(1,2,\cdots,n)$ 为常序排列，即数字从小到大的排列为常序排列. 如果一个排列中 j 排在 i 之前但是 $j>i$, 则称这是一个逆序对. 一个排列的所有逆序对的总个数称为这个排列的逆序数.

逆序数的求法: 设排列为 $(k_1k_2,\cdots,k_n)$, 先看 k_1 后面有多少个数小于 k_1, 不妨设为 m_1; 再看 k_2 后面有多少个数小于 k_2, 不妨设为 $k_2\cdots$, 最后看 k_{n-1} 后面有多少个数小于 k_{n-1}, 不妨设为 m_{n-1}. 由定义, 排列 $(k_1,k_2,\cdots,k_n)$ 的逆序数就等于 $m_1+m_2+\cdots+m_{n-1}$, 通常记为 $N(k_1k_2,\cdots,k_n)$. 注 逆序数也可以记为 $e(k_1k_2,\cdots,k_n)$.

定义 3.7 (偶排列与奇排列的定义)

若排列 $(k_1k_2,\cdots,k_n)$ 的逆序数是一个偶数 (包括零)，则称之为偶排列；若 $(k_1k_2,\cdots,k_n)$ 是一个奇数，则称之为奇排列.

注 我们定义逆序数的奇偶性是为了方便计算行列式的完全展开.

引理 3.1

设 $(k_1, k_2, \cdots, k_n) \in S_n$, 若将其中的 k_i 与 k_j 的位置对换，排列的奇偶性改变.

引理 3.2

设 $n \geq 2$, 则 S_n 中奇排列偶排列各占一半.

引理 3.3

设 $(k_1 k_2, \cdots, k_n) \in S_n$, 则通过 $N(k_1 k_2, \cdots, k_n)$ 次相邻对换，可将 $(k_1 k_2, \cdots, k_n)$ 变为常排列 $(1, 2, \cdots, n)$

命题 3.1 (行列式的组合定义)

设 $|\boldsymbol{A}|$ 是 n 阶行列式, 它的第 (i, j) 元素是 a_{ij} , 定义 $|\boldsymbol{A}|$ 的值为

$$\sum_{(k_1, \cdots, k_n) \in S_n} (-1)^{e(k_1, \cdots, k_n)} a_{k_1 1} a_{k_2 2} \cdots a_{k_n n}, \tag{3.5}$$

其中 $N(k_1, \cdots, k_n)$ 表示排列 $(k_1, \cdots, k_n)$ 的逆序数.

注 这是行列式的组合定义也是行列式的完全展开，通常都不会使用完全展开计算行列式. 用行列式的完全展开可以很快的确定行列式值中某个数的次数和系数. 行列式中零的个数比较多时可以考虑用行列式的完全展开计算行列式.

行列式的性质:

1. 上 (下) 三角行列式的值等于其主对角线上元素之积.
2. 若行列式的某一行 (或某一列) 全为零, 则行列式的值等于零.
3. 用某个常数 c 乘以行列式的某一行 (或某一列), 所得到的行列式的值等于原行列式值的 c 倍.
4. 行列式的两行 (或两列) 对换, 行列式的值改变符号.
5. 若行列式的某两行 (或某两列) 成比例, 则行列式的值等于零.
6. 若行列式的某一行 (或某一列) 元素 $a_{ij} = b_{ij} + c_{ij}$, 则该行列式可分解为两个行列式之和, 其中一个行列式的相应行 (或列) 的元素为 b_{ij} , 另一个行列式的相应行 (或列) 的元素为 c_{ij} , 用式子来表示就是:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{i1}+c_{i1} & b_{i2}+c_{i2} & \cdots & b_{in}+c_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{i1} & b_{i2} & \cdots & b_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{i1} & c_{i2} & \cdots & c_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

7. 将行列式的某一行 (或某一列) 乘以常数 c 以后加到另一行 (或另一列) 上去, 行列式的值不变.
8. 行列式转置后的值不变, 即 $\left|\boldsymbol{A}'\right| = |\boldsymbol{A}|$.

下面两行列式分别是**范德蒙德行列式**和**爪形行列式**，在行列式的计算中经常用得到.

$$V_n = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-2} & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-2} & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & x_{n-1} & x_{n-1}^2 & \cdots & x_{n-1}^{n-2} & x_{n-1}^{n-1} \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-2} & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i) \tag{3.6}$$

$$D=\begin{vmatrix} x_1 & b_1 & b_2 & \cdots & b_{n-1} \\ a_1 & x_2 & 0 & \cdots & 0 \\ a_2 & 0 & x_3 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n-1} & 0 & 0 & \cdots & x_n \end{vmatrix}=(x_1-\sum_{j=2}^{n}\frac{a_{j-1}b_{j-1}}{x_j})\prod_{i=2}^{n}x_i \tag{3.7}$$

命题 3.2 (n 元一次方程组的克拉默法则)

设 n 元线性方程组为：

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \quad\vdots \\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n=b_n \end{cases}$$

当系数行列式 $D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}\neq 0$ 时，方程组的解为：

$$x_1=\frac{D_1}{D},\quad x_2=\frac{D_2}{D},\quad \cdots,\quad x_n=\frac{D_n}{D}$$

其中 D_j $(j=1,2,\ldots,n)$ 是将系数行列式 D 的第 j 列元素替换为常数项 $b_1,b_2,\ldots,b_n$ 后得到的行列式，即：

$$D_1=\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_n & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix},\quad D_2=\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & b_n & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix},\quad \cdots,\quad D_n=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & b_n \end{vmatrix}$$

♠

定义 3.8 (伴随矩阵的定义)

设 A 是 n 阶方阵，A_{ij} 是行列式 $|A|$ 中第 (i,j) 元素 a_{ij} 的代数余子式，则称下列方阵为 A 的伴随矩阵：

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

A 的伴随矩阵通常记为 A^V.

♣

引理 3.4

设 A 是 n 阶方阵，A^V 为 A 的伴随矩阵，则

$$AA^V=A^VA=|A|\cdot I.$$

♡

定理 3.1

若 $|A|\neq 0$, 则 A 是非异矩阵，且

$$A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^V.$$

♡

3.2 经典例题讲解

3.2.1 一些基础的题目

例题 3.2.

求一个原点是顶点且与原点相邻的顶点为 $(2,3,1),(-1,0,4),(3,-2,5)$ 的平行六面体的体积.

解 平行六面体的体积由三个向量张成的行列式的绝对值给出. 设矩阵

$$A=\begin{pmatrix}2&-1&3\\3&0&-2\\1&4&5\end{pmatrix}$$

则体积为

$$|\det A|=\begin{Vmatrix}2&-1&3\\3&0&-2\\1&4&5\end{Vmatrix}=|2(0\cdot5-(-2)\cdot4)-(-1)(3\cdot5-(-2)\cdot1)+3(3\cdot4-0\cdot1)|=|16+17+36|=69.$$

所以体积为 69.

例题 3.3.

从定义 3.6 出发证明行列式函数 det 满足性质 (D1), (D2′), (D3), 即: 是行向量的多重线性函数, 交换两行的位置改变行列式值的符号, 单位矩阵的行列式值为 1.

解 根据定义 3.6，n 阶方阵 $A=(a_{ij})$ 的行列式定义为：

$$\det A=\sum_{\sigma\in P_n}(-1)^{e(\sigma)}a_{1\sigma_1}a_{2\sigma_2}\cdots a_{n\sigma_n}.$$

证明 **(D3)**：单位矩阵 $E=[E_1,\cdots,E_n]$ 的行列式中，只有当 σ 为恒等排列时，乘积 $a_{1\sigma_1}a_{2\sigma_2}\cdots a_{n\sigma_n}=1$，其余项均为 0，且 $e(\sigma)=0$，故 $\det E=1$.

证明 **(D1)**：考虑矩阵 $A=[A_1,\ldots,\lambda A_i'+\mu A_i''',\ldots,A_n]$，则

$$\det A=\sum_{\sigma\in P_n}(-1)^{e(\sigma)}a_{1\sigma_1}\cdots a_{i-1,\sigma_{i-1}}(\lambda a'_{i\sigma_i}+\mu a'''_{i\sigma_i})a_{i+1,\sigma_{i+1}}\cdots a_{n\sigma_n}.$$

直接拆开得到：

$$\det A=\lambda\sum_{\sigma\in P_n}(-1)^{e(\sigma)}a_{1\sigma_1}\cdots a'_{i\sigma_i}\cdots a_{n\sigma_n}+\mu\sum_{\sigma\in P_n}(-1)^{e(\sigma)}a_{1\sigma_1}\cdots a'''_{i\sigma_i}\cdots a_{n\sigma_n}.$$

即

$$\det[A_1,\cdots,\lambda A_i'+\mu A_i''',\cdots,A_n]=\lambda\det[A_1,\cdots,A_i',\cdots,A_n]+\mu\det[A_1,\cdots,A_i''',\cdots,A_n].$$

故 det 满足多重线性 (D1).

证明 **(D2′)**：考虑交换相邻两行的情况（不妨设交换第 i 行和第 $i+1$ 行）. 设矩阵 $A=(a_{ij})$ 交换第 i 行和第 $i+1$ 行后得到矩阵 $B=(b_{ij})$，则 $b_{ij}=a_{i+1,j}$，$b_{i+1,j}=a_{i,j}$，其余行不变. 于是

$$\det B=\sum_{\sigma\in P_n}(-1)^{e(\sigma)}b_{1\sigma_1}b_{2\sigma_2}\cdots b_{n\sigma_n}=\sum_{\sigma\in P_n}(-1)^{e(\sigma)}a_{1\sigma_1}\cdots a_{i+1,\sigma_i}a_{i,\sigma_{i+1}}\cdots a_{n\sigma_n}.$$

对于排列 $\sigma=\sigma_1\cdots\sigma_i\sigma_{i+1}\cdots\sigma_n$，令 $\tau=\sigma_1\cdots\sigma_{i+1}\sigma_i\cdots\sigma_n$，即交换 σ_i 和 σ_{i+1}. 则 $e(\tau)=e(\sigma)\pm1$，且当 σ 跑遍 P_n 时，τ 也跑遍 P_n. 于是

$$\det B=\sum_{\tau\in P_n}(-1)^{e(\tau)\pm1}a_{1\tau_1}\cdots a_{i,\tau_i}a_{i+1,\tau_{i+1}}\cdots a_{n\tau_n}=-\det A.$$

对于交换任意两行的情况，可通过多次交换相邻行实现，每次交换改变符号，故总符号改变为 $(-1)^k$，其中 k 为交换次数，为奇数，故 $\det B = -\det A$. 因此 det 满足 (D2′).

综上，行列式函数 det 满足性质 (D1), (D2′), (D3).

例题 3.4.

求出四阶行列式 $\det(a_{ij})$ 展开式中包含 a_{23} 且带正号的项.

解 由于项中包含 a_{23}，即 $\sigma(2) = 3$. 需要寻找所有满足 $\sigma(2) = 3$ 且 $(-1)^{e(\sigma)} = 1$（即符号为正）的排列 σ.

满足 $\sigma(2) = 3$ 的排列共有 $3! = 6$ 种. 我们列出所有这 6 种排列，计算它们的逆序数，并找出符号为正的项.

1. 排列 $\sigma : 1, 3, 2, 4$
   逆序数：位置 2 与 3：$3 > 2$，逆序；其他无逆序. 逆序数为 1，符号为负.
   对应项：$a_{11}a_{23}a_{32}a_{44}$（符号为负，不符合）.
2. 排列 $\sigma : 1, 3, 4, 2$
   逆序数：位置 2 与 4：$3 > 2$，逆序；位置 3 与 4：$4 > 2$，逆序. 逆序数为 2，符号为正.
   对应项：$a_{11}a_{23}a_{34}a_{42}$.
3. 排列 $\sigma : 2, 3, 1, 4$
   逆序数：位置 1 与 3：$2 > 1$，逆序；位置 2 与 3：$3 > 1$，逆序. 逆序数为 2，符号为正.
   对应项：$a_{12}a_{23}a_{31}a_{44}$.
4. 排列 $\sigma : 2, 3, 4, 1$
   逆序数：位置 1 与 4：$2 > 1$，逆序；位置 2 与 4：$3 > 1$，逆序；位置 3 与 4：$4 > 1$，逆序. 逆序数为 3，符号为负.
   对应项：$a_{12}a_{23}a_{34}a_{41}$（符号为负，不符合）.
5. 排列 $\sigma : 4, 3, 1, 2$
   逆序数：位置 1 与 2：$4 > 3$，逆序；位置 1 与 3：$4 > 1$，逆序；位置 1 与 4：$4 > 2$，逆序；位置 2 与 3：$3 > 1$，逆序；位置 2 与 4：$3 > 2$，逆序. 逆序数为 5，符号为负.
   对应项：$a_{14}a_{23}a_{31}a_{42}$（符号为负，不符合）.
6. 排列 $\sigma : 4, 3, 2, 1$
   逆序数：位置 1 与 2：$4 > 3$，逆序；位置 1 与 3：$4 > 2$，逆序；位置 1 与 4：$4 > 1$，逆序；位置 2 与 3：$3 > 2$，逆序；位置 2 与 4：$3 > 1$，逆序；位置 3 与 4：$2 > 1$，逆序. 逆序数为 6，符号为正.
   对应项：$a_{14}a_{23}a_{32}a_{41}$.

因此，包含 a_{23} 且带正号的项有以下三个：

$$a_{11}a_{23}a_{34}a_{42}, \quad a_{12}a_{23}a_{31}a_{44}, \quad a_{14}a_{23}a_{32}a_{41}.$$

例题 3.5.

n 阶行列式展开式中斜对角线 (也称次对角线) 元素的乘积有怎样的正负号?

解 次对角线对应排列 $\sigma(i) = n + 1 - i$，其逆序数为 $\frac{n(n-1)}{2}$，故符号为 $(-1)^{n(n-1)/2}$.

例题 3.6.

利用行列式的定义计算

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & a_{1n} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ 0 & 0 & \cdots & a_{3,n-2} & a_{3,n-1} & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & a_{n-1,2} & \cdots & a_{n-1,n-2} & a_{n-1,n-1} & a_{n-1,n} \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n,n-2} & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

解 唯一非零排列为 $\sigma(i) = n+1-i$，故行列式为

$$(-1)^{n(n-1)/2} a_{1n} a_{2,n-1} \cdots a_{n1}.$$

例题 3.7.

利用行列式的定义计算

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{31} & a_{32} & 0 & 0 & 0 \\ a_{41} & a_{42} & 0 & 0 & 0 \\ a_{51} & a_{52} & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}.$$

解 第 3、4、5 行只有前两列非零，但需从 $\{1,2\}$ 中选三个不同列索引，不可能，故行列式为 0.

例题 3.8.

设 $\begin{vmatrix} x & y & z \\ 3 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1$, 计算下面的行列式:

(1) $\begin{vmatrix} 2x & 2y & 2z \\ 3/2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$;

(2) $\begin{vmatrix} x & y & z \\ 3x+3 & 3y & 3z+2 \\ x+1 & y+1 & z+1 \end{vmatrix}$;

(3) $\begin{vmatrix} x-1 & y-1 & z-1 \\ 4 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$.

解 (1) 第一行乘 2，第二行乘 $1/2$，行列式乘 $2 \cdot 1/2 = 1$，故为 1.

(2) 第二行减 3 倍第一行，第三行减第一行，得原矩阵，行列式为 1.

(3) 第一行加第三行，第二行减第三行，得原矩阵，行列式为 1. 故答案均为 1.

例题 3.9.

设 $A=(a_{ij})$ 和 $B=(b_{ij})$ 是 n 阶方阵. 在下述情况下比较 $\det A$ 和 $\det B$：(1) $b_{ij}=2^{j-i}a_{ij}$; (2) $b_{ij}=a_{n+1-i,j}$; (3) $b_{ij}=a_{n+1-i,n+1-j}$.

我们使用四阶矩阵 $A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}&a_{14}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}&a_{24}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}&a_{34}\\a_{41}&a_{42}&a_{43}&a_{44}\end{pmatrix}$ 来说明操作 (2) 和 (3) 后的结果.

(2) 当 $b_{ij}=a_{n+1-i,j}$ 时，这是行反转操作：

$$B=\begin{pmatrix}a_{41}&a_{42}&a_{43}&a_{44}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}&a_{34}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}&a_{24}\\a_{11}&a_{12}&a_{13}&a_{14}\end{pmatrix}$$

行反转相当于进行 $\lfloor n/2\rfloor=2$ 次行交换，每次行交换改变行列式的符号，故 $\det B=(-1)^2\det A=\det A$. 对于一般的 n，有 $\det B=(-1)^{\lfloor n/2\rfloor}\det A=(-1)^{n(n-1)/2}\det A$.

(3) 当 $b_{ij}=a_{n+1-i,n+1-j}$ 时，这是行反转和列反转的组合：

$$B=\begin{pmatrix}a_{44}&a_{43}&a_{42}&a_{41}\\a_{34}&a_{33}&a_{32}&a_{31}\\a_{24}&a_{23}&a_{22}&a_{21}\\a_{14}&a_{13}&a_{12}&a_{11}\end{pmatrix}$$

行反转引入符号因子 $(-1)^{n(n-1)/2}$，列反转同样引入符号因子 $(-1)^{n(n-1)/2}$，故总符号因子为 $(-1)^{n(n-1)}=1$，因此 $\det B=\det A$.

解 我们使用行列式的组合定义和初等变换的性质进行分析.

(1) 当 $b_{ij}=2^{j-i}a_{ij}$ 时，有

$$\det B=\sum_{\sigma\in S_n}(-1)^{e(\sigma)}\prod_{i=1}^{n}b_{i,\sigma(i)}=\sum_{\sigma\in S_n}(-1)^{e(\sigma)}\prod_{i=1}^{n}2^{\sigma(i)-i}a_{i,\sigma(i)}.$$

注意到

$$\prod_{i=1}^{n}2^{\sigma(i)-i}=2^{\sum_{i=1}^{n}(\sigma(i)-i)}=2^{\left(\sum_{i=1}^{n}\sigma(i)-\sum_{i=1}^{n}i\right)}=2^0=1,$$

所以 $\det B=\det A$.

(2) 当 $b_{ij}=a_{n+1-i,j}$ 时，矩阵 B 是由 A 通过行反转得到的，即第 i 行变为第 $n+1-i$ 行. 该变换相当于进行 $\lfloor n/2\rfloor$ 次行交换，每次行交换改变行列式的符号，故总符号因子为 $(-1)^{\lfloor n/2\rfloor}$. 可以验证 $(-1)^{\lfloor n/2\rfloor}=(-1)^{n(n-1)/2}$，因此 $\det B=(-1)^{n(n-1)/2}\det A$.

(3) 当 $b_{ij}=a_{n+1-i,n+1-j}$ 时，矩阵 B 是由 A 先进行行反转再进行列反转得到的. 由 (2) 知行反转引入符号因子 $(-1)^{n(n-1)/2}$，列反转同样引入符号因子 $(-1)^{n(n-1)/2}$，故总符号因子为 $(-1)^{n(n-1)}=1$，因此 $\det B=\det A$.

例题 3.10.

整数 1653, 2581, 3451, 4582 可以被 29 整除. 利用行列式的性质（而非计算）证明下面的四阶行列式值被

29 整除.

$$\begin{vmatrix} 1 & 6 & 5 & 3 \\ 2 & 5 & 3 & 0 \\ 3 & 4 & 5 & 1 \\ 4 & 5 & 8 & 2 \end{vmatrix}$$

解 把第一列的 1000 倍、第二列的 100 倍、第三列的 10 倍加到第四列上，行列式变为

$$\begin{vmatrix} 1 & 6 & 5 & 1653 \\ 2 & 5 & 8 & 2581 \\ 3 & 4 & 5 & 3451 \\ 4 & 5 & 8 & 4582 \end{vmatrix}$$

最后一列的数可以被 29 整除，自然可以提取出一个 29 的因子，行列式就是 29 乘以一个新的行列式，这个新的行列式中的每一个元素都是整数，行列式自然为整数. 故原来的行列式可以被 29 整除.

例题 3.11.

不展开行列式证明下列等式：

(1)

$$\begin{vmatrix} 1 & a & bc \\ 1 & b & ca \\ 1 & c & ab \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b);$$

(2)

$$\begin{vmatrix} 1 & a & bc \\ 1 & b & ca \\ 1 & c & ab \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix}.$$

(3)

$$\begin{vmatrix} 1 & a^2 & a^3 \\ 1 & b^2 & b^3 \\ 1 & c^2 & c^3 \end{vmatrix} = (ab+bc+ca)\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix}.$$

解 (1) 考虑行列式：

$$D = \begin{vmatrix} 1 & a & bc \\ 1 & b & ca \\ 1 & c & ab \end{vmatrix}.$$

从第二行减去第一行，从第三行减去第一行：

$$D = \begin{vmatrix} 1 & a & bc \\ 0 & b-a & c(a-b) \\ 0 & c-a & b(a-c) \end{vmatrix}.$$

提取公因式：

$$D = \begin{vmatrix} 1 & a & bc \\ 0 & b-a & -c(b-a) \\ 0 & c-a & -b(c-a) \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)\begin{vmatrix} 1 & a & bc \\ 0 & 1 & -c \\ 0 & 1 & -b \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(-b+c) = (b-a)(c-a)(c-b).$$

因此，

$$\begin{vmatrix} 1 & a & bc \\ 1 & b & ca \\ 1 & c & ab \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b).$$

(2) 由 (1) 可知，左边等于 $(b-a)(c-a)(c-b)$. 而右边的范德蒙德行列式：

$$\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b).$$

因此，两边相等.

(3) 考虑 4 阶范德蒙德行列式：

$$A = \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 & a^3 \\ 1 & b & b^2 & b^3 \\ 1 & c & c^2 & c^3 \\ 1 & x & x^2 & x^3 \end{vmatrix}.$$

一方面，作为范德蒙德行列式，其值为：

$$A = (b-a)(c-a)(c-b)(x-a)(x-b)(x-c).$$

令 $V = \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b)$，则：

$$A = V \cdot (x-a)(x-b)(x-c) = V\left[x^3 - (a+b+c)x^2 + (ab+bc+ca)x - abc\right].$$

因此，E 是 x 的多项式，其中 x 的系数为 $V(ab+bc+ca)$.

另一方面，将 E 按最后一行展开：

$$E = 1 \cdot C_{41} + x \cdot C_{42} + x^2 \cdot C_{43} + x^3 \cdot C_{44},$$

其中 C_{4j} 是代数余子式. 计算 C_{42}:

$$C_{42} = (-1)^{4+2} M_{42} = M_{42},$$

其中 M_{42} 是删除第 4 行和第 2 列后的行列式：

$$M_{42} = \begin{vmatrix} 1 & a^2 & a^3 \\ 1 & b^2 & b^3 \\ 1 & c^2 & c^3 \end{vmatrix} = D.$$

所以 $C_{42} = D$. 因此，在 E 的展开式中，x 的系数为 D.

比较两种表达式中 x 的系数：

$$D = V(ab+bc+ca),$$

即：

$$\begin{vmatrix} 1 & a^2 & a^3 \\ 1 & b^2 & b^3 \\ 1 & c^2 & c^3 \end{vmatrix} = (ab+bc+ca) \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix}.$$

等式得证.

例题 3.12.

解方程：

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1-x & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 2-x & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & n-x \end{vmatrix} = 0.$$

解 令行列式为 D_n. 将第一行乘以 -1 加到其他各行：

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & -x & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1-x & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1-x \end{vmatrix}.$$

这是一个上三角行列式，其值为对角线元素乘积：

$$D_n = 1 \cdot (-x) \cdot (1-x) \cdot (2-x) \cdots (n-1-x) = (-x) \prod_{k=1}^{n-1} (k-x).$$

令 $D_n = 0$，得：

$$(-x) \prod_{k=1}^{n-1} (k-x) = 0.$$

解得：

$$x = 0, 1, 2, \ldots, n-1.$$

因此，方程的根为 $x = 0, 1, 2, \ldots, n-1$.

例题 3.13.

计算 n 阶行列式：

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ -1 & 0 & 3 & \cdots & n \\ -1 & -2 & 0 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -1 & -2 & -3 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$

解 将第一行依次加到其他行上便得到一个上三角行列式且主对角线上元素依次为 $1, 2, \cdots, n$. 因此 $|A| = n!$.

例题 3.14.

按第二列展开计算行列式：

$$\begin{vmatrix} 5 & a & 2 & -1 \\ 4 & b & 4 & -3 \\ 2 & c & 3 & -2 \\ 4 & d & 5 & -4 \end{vmatrix}.$$

解 记行列式为 D. 按第二列展开：

$$D = a \cdot A_{12} + b \cdot A_{22} + c \cdot A_{32} + d \cdot A_{42},$$

其中 A_{ij} 为代数余子式.

计算 A_{12}：

$$A_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} = -\begin{vmatrix} 4 & 4 & -3 \\ 2 & 3 & -2 \\ 4 & 5 & -4 \end{vmatrix}.$$

$$M_{12} = 4 \cdot \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 5 & -4 \end{vmatrix} - 4 \cdot \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 4 & -4 \end{vmatrix} + (-3) \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = 4 \cdot (-2) - 4 \cdot 0 - 3 \cdot (-2) = -8 + 6 = -2.$$

所以 $A_{12} = -(-2) = 2$.

计算 A_{22}：

$$A_{22} = (-1)^{2+2} M_{22} = \begin{vmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & -2 \\ 4 & 5 & -4 \end{vmatrix}.$$

$$M_{22} = 5 \cdot \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 5 & -4 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 4 & -4 \end{vmatrix} + (-1) \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = 5 \cdot (-2) - 2 \cdot 0 - 1 \cdot (-2) = -10 + 2 = -8.$$

所以 $A_{22} = -8$.

计算 A_{32}：

$$A_{32} = (-1)^{3+2} M_{32} = -\begin{vmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 4 & 4 & -3 \\ 4 & 5 & -4 \end{vmatrix}.$$

$$M_{32} = 5 \cdot \begin{vmatrix} 4 & -3 \\ 5 & -4 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 4 & -3 \\ 4 & -4 \end{vmatrix} + (-1) \cdot \begin{vmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = 5 \cdot (-1) - 2 \cdot (-4) - 1 \cdot 4 = -5 + 8 - 4 = -1.$$

所以 $A_{32} = -(-1) = 1$.

计算 A_{42}：

$$A_{42} = (-1)^{4+2} M_{42} = \begin{vmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 4 & 4 & -3 \\ 2 & 3 & -2 \end{vmatrix}.$$

$$M_{42} = 5 \cdot \begin{vmatrix} 4 & -3 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 4 & -3 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} + (-1) \cdot \begin{vmatrix} 4 & 4 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 5 \cdot 1 - 2 \cdot (-2) - 1 \cdot 4 = 5 + 4 - 4 = 5.$$

所以 $A_{42} = 5$.

因此：

$$D = a \cdot 2 + b \cdot (-8) + c \cdot 1 + d \cdot 5 = 2a - 8b + c + 5d.$$

例题 3.15.

计算行列式：

$$D=\begin{vmatrix} a & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & a & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & a & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & a & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & a \end{vmatrix}$$

解 通过初等变换计算行列式：

第一步：列变换

- 将第二列的 $-a$ 倍加到第一列
- 将第四列的 $-a$ 倍加到第五列

得到：

$$D=\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 4-a^2 & a & 2 & 0 & 0 \\ -3a & 3 & a & 3 & -3a \\ 0 & 0 & 2 & a & 4-a^2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

第二步：行变换

- 将第一行的 $-a$ 倍加到第二行
- 将第一行的 -3 倍加到第三行
- 将第五行的 $-a$ 倍加到第四行
- 将第五行的 -3 倍加到第三行

得到：

$$D=\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 4-a^2 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ -3a & 0 & a & 0 & -3a \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 4-a^2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

第三步：按第一行展开第一行只有第二列非零：

$$D=-\begin{vmatrix} 4-a^2 & 2 & 0 & 0 \\ -3a & a & 0 & -3a \\ 0 & 2 & 0 & 4-a^2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

第四步：按最后一行展开最后一行只有第三列非零：

$$D=\begin{vmatrix} 4-a^2 & 2 & 0 \\ -3a & a & -3a \\ 0 & 2 & 4-a^2 \end{vmatrix}$$

第五步：计算三阶行列式提取第二行的公因数 a：

$$D=a\cdot\begin{vmatrix} 4-a^2 & 2 & 0 \\ -3 & 1 & -3 \\ 0 & 2 & 4-a^2 \end{vmatrix}$$

进行行变换：

- 将第二行的 -2 倍加到第一行
- 将第二行的 -2 倍加到第三行

得到：

$$D = a \cdot \begin{vmatrix} 10-a^2 & 0 & 6 \\ -3 & 1 & -3 \\ 6 & 0 & 10-a^2 \end{vmatrix}$$

按第二列展开：

$$D = a \cdot \begin{vmatrix} 10-a^2 & 6 \\ 6 & 10-a^2 \end{vmatrix} = a[(10-a^2)^2 - 36] = a(a^4 - 20a^2 + 64)$$

第六步：因式分解

$$D = a(a^4 - 20a^2 + 64) = a(a^2-4)(a^2-16) = a(a-2)(a+2)(a-4)(a+4)$$

因此，行列式的值为：

$$\boxed{a(a-2)(a+2)(a-4)(a+4)}$$

例题 3.16.

利用方阵乘积的行列式公式计算行列式：

$$\begin{pmatrix} a & b & c & d \\ -b & a & d & -c \\ -c & -d & a & b \\ -d & c & -b & a \end{pmatrix}$$

解 设所求的矩阵为 A，不难验证 $A^tA = (a^2+b^2+c^2+d^2)E$. 从而

$$(\det A)^2 = (a^2+b^2+c^2+d^2)^4.$$

注意到主对角线的乘积是 a^4，故有 $\det A = (a^2+b^2+c^2+d^2)^2$.

例题 3.17.

证明：齐次线性方程组只有零解当且仅当系数矩阵的秩等于方程组中未知元的个数. 特别，当方程组中的方程的个数等于未知元的个数时，方程组只有零解当且仅当系数矩阵的行列式不等于零.

解 设齐次线性方程组为 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$,其中 A 是 $m \times n$ 矩阵(m 为方程的个数,n 为未知元的个数),$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_n)^T$ 是未知向量.

方程组只有零解（即 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$）当且仅当 A 的列向量线性无关. 这是因为：

$$A\mathbf{x} = x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n = \mathbf{0}$$

若 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \ldots, \mathbf{a}_n$ 线性无关，则必有 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0$.

而 A 的列向量线性无关当且仅当系数矩阵 A 的秩等于未知元的个数 n，即 $\operatorname{rank}(A) = n$.

因此，齐次线性方程组只有零解当且仅当系数矩阵的秩等于未知元的个数.

特别地，当方程的个数 m 等于未知元的个数 n 时，A 是 $n \times n$ 方阵. 此时：

$\operatorname{rank}(A) = n$ 当且仅当 A 是可逆矩阵；

A 可逆当且仅当 $\det(A) \neq 0$.

因此，方程组只有零解当且仅当系数矩阵的行列式不等于零.

例题 3.18.

假设齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \quad \vdots \\ a_{n-1,1}x_1 + a_{n-1,2}x_2 + \cdots + a_{n-1,n}x_n = 0 \end{cases}$$

的系数矩阵的秩为 $n-1$，那么：

(1) 它的基础解系由一个向量组成；

(2) $D = [D_1, -D_2, \cdots, (-1)^{n-1}D_n]$ 形成方程组的一个基础解系，其中 D_i 是系数矩阵去掉第 i 列得到的矩阵的行列式. 于是方程组的任意解的形式为 λD.

解 (1) 设系数矩阵为 A，它是 $(n-1)\times n$ 矩阵，且 $\operatorname{rank}(A) = n-1$. 根据线性方程组理论，解空间的维数为：

$$n - \operatorname{rank}(A) = n - (n-1) = 1$$

因此基础解系由一个非零解向量组成.

(2) 定义 D_i 为从 A 中删除第 i 列得到的 $(n-1)\times(n-1)$ 子矩阵的行列式，即：

$$D_i = \det \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,i-1} & a_{1,i+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n-1,1} & \cdots & a_{n-1,i-1} & a_{n-1,i+1} & \cdots & a_{n-1,n} \end{pmatrix}$$

考虑向量：

$$D = (D_1, -D_2, D_3, -D_4, \cdots, (-1)^{n-1}D_n)$$

我们验证 D 是方程组的解. 对于第 k 个方程（$k = 1, 2, \ldots, n-1$）：

$$a_{k1}x_1 + a_{k2}x_2 + \cdots + a_{kn}x_n = 0$$

代入 $x_i = (-1)^{i-1}D_i$，得到：

$$\sum_{i=1}^{n} a_{ki}(-1)^{i-1}D_i$$

为了证明这个和为零，构造一个 $n\times n$ 矩阵 B_k：

$$B_k = \begin{pmatrix} a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kn} \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & \cdots & a_{n-1,n} \end{pmatrix}$$

即，B_k 的第一行是 A 的第 k 行，其余行是 A 的所有行（按顺序）. 由于 A 的第 k 行在 B_k 中出现两次（第一行和第 $k+1$ 行），所以 B_k 有两行相同，因此：

$$\det(B_k) = 0$$

现在计算 $\det(B_k)$ 按第一行展开：

$$\det(B_k) = \sum_{i=1}^{n} a_{ki}(-1)^{1+i}M_{1i}$$

其中 M_{1i} 是 B_k 删除第一行和第 i 列后的子矩阵的行列式. 但 B_k 删除第一行后就是矩阵 A 本身，因此 $M_{1i} = D_i$. 于是：

$$\det(B_k) = \sum_{i=1}^{n} a_{ki}(-1)^{1+i}D_i = 0$$

注意 $(-1)^{1+i}=(-1)^{i-1}$，所以：

$$\sum_{i=1}^{n} a_{ki}(-1)^{i-1}D_i=0$$

这表明 D 满足第 k 个方程. 由于 k 是任意的，D 是方程组的解.

由于 $\mathrm{rank}(A)=n-1$，至少有一个 $n-1$ 阶子式非零，即存在某个 i 使得 $D_i\neq 0$，故 D 是非零解. 又解空间维数为 1，所以 D 构成基础解系. 方程组的任意解可表示为 λD（$\lambda\in\mathbb{R}$）.

3.2.2 行列式计算的方法

1. **加边法**

如果我们计算一个行列式可以增加一行或者一列去简化一些行列式的计算.

例题 3.19.

$$\begin{vmatrix} 1+a_1^2 & a_2a_1 & a_3a_1 & \cdots & a_na_1 \\ a_1a_2 & 1+a_2^2 & a_3a_2 & \cdots & a_na_2 \\ a_1a_3 & a_2a_3 & 1+a_3^2 & \cdots & a_na_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1a_n & a_2a_n & a_3a_n & \cdots & 1+a_n^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ 0 & 1+a_1^2 & a_2a_1 & a_3a_1 & \cdots & a_na_1 \\ 0 & a_1a_2 & 1+a_2^2 & a_2a_3 & \cdots & a_na_2 \\ 0 & a_1a_3 & a_2a_3 & 1+a_3^2 & \cdots & a_na_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_1a_n & a_2a_n & a_3a_n & \cdots & 1+a_n^2 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ -a_1 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -a_2 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -a_3 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_n & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1+\sum_{i=1}^{n} a_i^2 & a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = 1+\sum_{i=1}^{n} a_i^2$$

例题 3.20.

计算下列行列式：

$$|A|=\begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-2} & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-2} & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-2} & x_n^n \end{vmatrix}$$

解 注意到这个行列式和范德蒙德行列式的区别在于它们的最后一列，先添上一列使之成为范德蒙德行列式，再求出 y^{n-1} 的系数即可解出答案：

$$|B|=\begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} & x_n^n \\ 1 & y & y^2 & \cdots & y^{n-1} & y^n \end{vmatrix},$$

则

$$|B| = (y - x_1)(y - x_2)\cdots(y - x_n) \prod_{1 \le i < j \le n} (x_j - x_i).$$

因此 y^{n-1} 的系数是

$$-(x_1 + x_2 + \cdots + x_n) \prod_{1 \le i < j \le n} (x_j - x_i).$$

而 $|B|$ 中元素 y^{n-1} 的代数余子式为 $(-1)^{n+1+n}|A| = -|A|$, 因此

$$|A| = (x_1 + x_2 + \cdots + x_n) \prod_{1 \le i < j \le n} (x_j - x_i).$$

例题 3.21.

计算下列行列式：

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^4 & b^4 & c^4 & d^4 \end{vmatrix}$$

解 注意到这个行列式和范德蒙德行列式的区别在于它们的指数序列，缺少三次项. 考虑添加一个变量 y 构造一个 5 阶范德蒙德行列式：

$$|B| = \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 & a^3 & a^4 \\ 1 & b & b^2 & b^3 & b^4 \\ 1 & c & c^2 & c^3 & c^4 \\ 1 & d & d^2 & d^3 & d^4 \\ 1 & y & y^2 & y^3 & y^4 \end{vmatrix}$$

这是一个标准的范德蒙德行列式，其值为：

$$|B| = \prod_{1 \le i < j \le 4} (x_j - x_i) \cdot (y - a)(y - b)(y - c)(y - d)$$

其中 $x_1 = a, x_2 = b, x_3 = c, x_4 = d$. 展开乘积 $(y - a)(y - b)(y - c)(y - d)$，$y^3$ 的系数为 $-(a + b + c + d)$，因此：

$$|B| = \prod_{1 \le i < j \le 4} (x_j - x_i) \cdot \left[y^4 - (a + b + c + d)y^3 + \cdots\right]$$

另一方面，将 $|B|$ 按最后一行展开，y^3 的代数余子式为：

$$C_{54} = (-1)^{5+4} M_{54} = -|A|$$

其中 M_{54} 是删除第 5 行和第 4 列后的行列式，正好等于原行列式 $|A|$. 因此，y^3 的系数为 $-|A|$. 比较两种表达式中 y^3 的系数：

$$-|A| = -(a + b + c + d) \prod_{1 \le i < j \le 4} (x_j - x_i)$$

所以：

$$|A| = (a + b + c + d) \prod_{1 \le i < j \le 4} (x_j - x_i)$$

其中 $\prod_{1 \le i < j \le 4} (x_j - x_i) = (b - a)(c - a)(d - a)(c - b)(d - b)(d - c)$.

2. **求和法**

有时行列式的所有行或列加起来都等于某一个数，我们就可以利用这个数去简化求解.

例题 3.22.

设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$, 其中 a_{ij} 都是整数, 且对每一个 $i=1,2,\cdots,n$, 都有 $\sum_{j=1}^{n}a_{ij}=2022$, 证明:

$$2022||A|.$$

解 根据已知, 将 $|A|$ 中的第 $i(i=2,3,\cdots,n)$ 列均加到第一列, 有

$$|A|=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 2022 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 2022 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 2022 & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=2022\begin{vmatrix} 1 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 1 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

而行列式 $\begin{vmatrix} 1 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 1 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$ 的元素都是整数, 根据行列式的定义, 其值依旧为整数. 所以由上式可知 $2022||A|$

例题 3.23.

计算

$$|A|=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & 1 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \end{vmatrix}.$$

解 将各行加到第一行可得

$$|\boldsymbol{A}| = \frac{1}{2}n(n+1)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & 1 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{2}n(n+1)\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & \cdots & n-2 & -1 \\ 3 & 1 & 2 & \cdots & -2 & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ n-1 & 1 & 2-n & \cdots & -2 & -1 \\ n & 1-n & 2-n & \cdots & -2 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{2}n(n+1)\begin{vmatrix} 1 & 2 & \cdots & n-2 & -1 \\ 1 & 2 & \cdots & -2 & -1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 2-n & \cdots & -2 & -1 \\ 1-n & 2-n & \cdots & -2 & -1 \end{vmatrix}.$$

再将最后的行列式的最后一行的-1 倍加到其余各行可得

$$\begin{vmatrix} n & n & \cdots & n & 0 \\ n & n & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ n & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1-n & 2-n & \cdots & -2 & -1 \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{1}{2}n(n-1)}n^{n-2}.$$

最后可得 $|A| = (-1)^{\frac{1}{2}n(n-1)} \cdot \frac{n+1}{2} \cdot n^{n-1}$.

3. **分块初等变换**设 $A, B \in F^{n\times n}, k \in F$，则

(a). 一般情况下，$|A \pm B| \neq |A| \pm |B|$；

(b). $|kA| = k^n|A|$；

(c). $|AB| = |A||B|; |A^k| = |A|^k$；

(d). $|A^T| = |A|$；

(e). A 可逆的充要条件是 $|A| \neq 0$；

(f). 若 A 可逆，则 $|A^{-1}| = |A|^{-1}$；

(g). $|A^V| = |A|^{n-1}$；

(h). 初等矩阵的行列式：$|P(i,j)| = -1, |P(i(c))| = c, |P(i,j(k))| = 1$；

(i). 分块矩阵的行列式

$$\begin{vmatrix} A & O \\ O & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & O \\ C & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & D \\ O & B \end{vmatrix} = |A||B|;$$

$$\begin{vmatrix} O & A_{n\times n} \\ B_{m\times m} & O \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} C & A_{n\times n} \\ B_{m\times m} & O \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} O & A_{n\times n} \\ B_{m\times m} & D \end{vmatrix} = (-1)^{mn}|A||B|.$$

例题 3.24.

设 A, B, C, D 均为 n 阶方阵，A 可逆，I 是 n 阶单位矩阵.

(1) 求矩阵 X, Y 使得下式成立：

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & 0 \\ X & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & Y \end{pmatrix}$$

(2) 如果 $AC = CA$，证明

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det(AD - CB).$$

解 (1) 简单计算得到

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & 0 \\ X & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ XA & XB + Y \end{pmatrix}$$

于是 $C = XA, D = XB + Y$. 注意到 A 可逆，因此

$$X = CA^{-1}, \quad Y = D - CA^{-1}B.$$

从而在题中两边取行列式，得到

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det A \det Y = \det A \det(D - CA^{-1}B).$$

(2) 在 (1) 的结论中，因为 $AC = CA$，因此

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det(AD - ACA^{-1}B) = \det(AD - CB).$$

例题 3.25.

设 A 和 B 是 n 阶方阵，证明：

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix} = \det(A + B) \cdot \det(A - B).$$

解 考虑分块矩阵：

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix}.$$

进行分块初等变换. 左乘 $\begin{pmatrix} I & I \\ 0 & I \end{pmatrix}$：

$$\begin{pmatrix} I & I \\ 0 & I \end{pmatrix} M = \begin{pmatrix} A + B & A + B \\ B & A \end{pmatrix}.$$

再右乘 $\begin{pmatrix} I & -I \\ 0 & I \end{pmatrix}$：

$$\begin{pmatrix} A + B & A + B \\ B & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & -I \\ 0 & I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A + B & 0 \\ B & A - B \end{pmatrix}.$$

所以：

$$\begin{pmatrix} I & I \\ 0 & I \end{pmatrix} M \begin{pmatrix} I & -I \\ 0 & I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A+B & 0 \\ B & A-B \end{pmatrix}.$$

取行列式：

$$\det\left(\begin{pmatrix} I & I \\ 0 & I \end{pmatrix}\right) \det(M) \det\left(\begin{pmatrix} I & -I \\ 0 & I \end{pmatrix}\right) = \det \begin{pmatrix} A+B & 0 \\ B & A-B \end{pmatrix}.$$

由于 $\det\left(\begin{pmatrix} I & I \\ 0 & I \end{pmatrix}\right) = 1$，$\det\left(\begin{pmatrix} I & -I \\ 0 & I \end{pmatrix}\right) = 1$，且分块上三角矩阵的行列式为 $\det(A+B)\cdot\det(A-B)$，故：

$$\det(M) = \det(A+B)\cdot\det(A-B).$$

例题 3.26.

设 A 是 $m \times n$ 矩阵，B 是 $n \times n$ 矩阵，证明：

$$|I_n - BA| = |I_m - AB|.$$

证明 先构造一个方阵

$$\begin{pmatrix} I_m & A \\ B & I_n \end{pmatrix} \tag{3.8}$$

然后把矩阵 B 化为零矩阵. 为此，第 1 行左乘 $(-B)$ 后加到第二行，得

$$\begin{pmatrix} I_m & 0 \\ -B & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_m & A \\ B & I_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_m & A \\ 0 & I_n - BA \end{pmatrix} \tag{3.9}$$

另一方面，也可以对分块矩阵 (3.8) 作列初等变换，把 B 化成零矩阵，为此，第 2 列右乘 $(-B)$ 加到第 1 列，得

$$\begin{pmatrix} I_m & A \\ B & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ -B & I_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_m - AB & A \\ 0 & I_n \end{pmatrix} \tag{3.10}$$

现将 (3.9) 式与 (3.10) 式的两边都取行列式，可以得到

$$\left|I_n - BA\right| = \begin{vmatrix} I_m & A \\ B & I_n \end{vmatrix} = \left|I_m - AB\right|$$

注 特别的我们在计算特征值时, 如果 A 是 $m \times n$ 矩阵，B 是 $n \times m$ 矩阵，且 $m \geq n$, 则有 $|\lambda I_m - AB| = \lambda^{m-n}|\lambda I_n - BA|$.

例题 3.27.

设 A 可逆, α, β 为 n 维列向量, 则

$$|A + \alpha\beta^T| = |A|(1 + \beta^T A^{-1}\alpha).$$

解 考虑分块矩阵

$$\begin{pmatrix} A & \alpha \\ -\beta^T & 1 \end{pmatrix},$$

由于

$$\begin{pmatrix} E & -\alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & \alpha \\ -\beta^T & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A+\alpha\beta^T & 0 \\ -\beta^T & 1 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} E & 0 \\ \beta^T A^{-1} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & \alpha \\ -\beta^T & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & \alpha \\ 0 & 1+\beta^T A^{-1}\alpha \end{pmatrix},$$

上两式两边取行列式可得

$$|A+\alpha\beta^T| = |A|(1+\beta^T A^{-1}\alpha).$$

例题 3.28.

计算行列式

$$\begin{vmatrix} a_1^2 & 1+a_1a_2 & \cdots & 1+a_1a_n \\ 1+a_2a_1 & a_2^2 & \cdots & 1+a_2a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1+a_na_1 & 1+a_na_2 & \cdots & a_n^2 \end{vmatrix}$$

解 我们利用上面的式子进行计算

$$\begin{aligned}
\text{原式} &= \left| \begin{pmatrix} 1+a_1^2 & 1+a_1a_2 & \cdots & 1+a_1a_n \\ 1+a_2a_1 & 1+a_2^2 & \cdots & 1+a_2a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1+a_na_1 & 1+a_na_2 & \cdots & 1+a_n^2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \right| \\
&= \left| \begin{pmatrix} 1 & a_1 \\ 1 & a_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & a_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{pmatrix} - I_n \right| \\
&= (-1)^n \left| I_n - \begin{pmatrix} 1 & a_1 \\ 1 & a_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & a_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{pmatrix} \right| \\
&= (-1)^n \left| I_2 - \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & a_1 \\ 1 & a_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & a_n \end{pmatrix} \right| \\
&= (-1)^n \left| \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} n & \sum_{i=1}^n a_i \\ \sum_{i=1}^n a_i & \sum_{i=1}^n a_i^2 \end{pmatrix} \right| \\
&= (-1)^n \left| \begin{pmatrix} 1-n & -\sum_{i=1}^n a_i \\ -\sum_{i=1}^n a_i & 1-\sum_{i=1}^n a_i^2 \end{pmatrix} \right| \\
&= (-1)^n \left((n-1)\left(\sum_{i=1}^n a_i^2 - 1 \right) - \left(\sum_{i=1}^n a_i \right)^2 \right)
\end{aligned}$$

例题 3.29.

计算行列式

$$\begin{vmatrix} 1+a_1+b_1 & a_1+b_2 & \cdots & a_1+b_n \\ a_2+b_1 & 1+a_2+b_2 & \cdots & a_2+b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n+b_1 & a_n+b_2 & \cdots & 1+a_n+b_n \end{vmatrix}$$

解 我们利用矩阵分解的方法进行计算

$$\text{原式} = \left| I_n + \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} (1,1,\ldots,1) + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} (b_1,b_2,\ldots,b_n) \right|$$

$$= |I_n + UV^T|, \quad \text{其中} U = \begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & 1 \end{pmatrix}, V = \begin{pmatrix} 1 & b_1 \\ 1 & b_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & b_n \end{pmatrix}$$

$$V^TU = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum\limits_{i=1}^n a_i & n \\ \sum\limits_{i=1}^n a_ib_i & \sum\limits_{i=1}^n b_i \end{pmatrix}$$

$$I_2 + V^TU = \begin{pmatrix} 1+\sum\limits_{i=1}^n a_i & n \\ \sum\limits_{i=1}^n a_ib_i & 1+\sum\limits_{i=1}^n b_i \end{pmatrix}$$

$$\text{原式} = \begin{vmatrix} 1+\sum\limits_{i=1}^n a_i & n \\ \sum\limits_{i=1}^n a_ib_i & 1+\sum\limits_{i=1}^n b_i \end{vmatrix}$$

$$= \left(1+\sum_{i=1}^n a_i\right)\left(1+\sum_{i=1}^n b_i\right) - n\sum_{i=1}^n a_ib_i$$

例题 3.30.

设 $A=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$ 是实数域上 $1\times n$ 矩阵，其中 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 不全为 $0, n>1$, 求 A^TA 的特征值.

解 因为

$$|\lambda I_n - A^TA| = \lambda^{n-1}|\lambda I_1 - AA^T| = \lambda^{n-1}(\lambda - \sum_{i=1}^n a_i^2)$$

故特征值为 $\lambda_1 = 0(n-1\text{重}), \lambda_2 = \sum_{i=1}^n a_i^2$

4. **递推法与数学归纳法**

例题 3.31.

计算 n 阶行列式 $(bc \neq 0)$:

$$D_n = \begin{vmatrix} a & b & & & & \\ c & a & b & & & \\ & c & a & b & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & c & a & b \\ & & & & c & a \end{vmatrix}.$$

解 这个行列式的特点是主对角线上的元素全为 a , 上次对角线上元素全为 b , 下次对角线上的元素全为 c , 其余元素为零. 为了求递推式, 按第一行展开, 得

$$D_n = aD_{n-1} - bcD_{n-2}.$$

令 $a = \alpha + \beta, bc = \alpha\beta$, 则

$$D_n - \alpha D_{n-1} = \beta\left(D_{n-1} - \alpha D_{n-2}\right), D_n - \beta D_{n-1} = \alpha\left(D_{n-1} - \beta D_{n-2}\right).$$

于是

$$D_n - \alpha D_{n-1} = \beta^n, D_n - \beta D_{n-1} = \alpha^n.$$

因此, 若 $a^2 \neq 4bc$ (即 $\alpha \neq \beta$) , 则

$$D_n = \frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha - \beta};$$

若 $a^2 = 4bc$ (即 $\alpha = \beta$) , 则

$$D_n = (n+1)\left(\frac{a}{2}\right)^n.$$

注 求 $D_n = aD_{n-1} - bcD_{n-2}$ 通项公式的一些细节, 我们想得到一个数列 a_n 与 D_n, D_{n-1} 有关，现在的想法是设 $a_n = D_n - xD_{n-1}$. 此时

$$D_n - xD_{n-1} = (a-x)D_{n-1} - bcD_{n-2}$$

如果可以选取 x 使得 a_n 是等比数列那么问题就可以解决, 此时满足下面等式

$$\frac{a-x}{1} = \frac{bc}{x}$$

于是得到方程

$$x^2 - ax + bc = 0$$

设方程的解是 α, β, 那么 $\alpha + \beta = a, \alpha\beta = bc$, 代入最开始的递推式可得

$$D_n = (\alpha + \beta) - (\alpha\beta)D_{n-2}$$

因为 α, β 都是符合条件的, 所有可以得到两个等比数列

$$D_n - \alpha D_{n-1} = \beta\left(D_{n-1} - \alpha D_{n-2}\right), D_n - \beta D_{n-1} = \alpha\left(D_{n-1} - \beta D_{n-2}\right).$$

$\alpha \neq \beta$ 时消去 D_{n-1} 就可以得到 D_n.
当 $\alpha = \beta$ 时有 $D_n - \alpha D_{n-1} = \alpha^n$ 两边除以 α^n 就得到一个等差数列.

例题 3.32.

斐波那契数列定义为:

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1, \quad F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \quad (n \geq 2)$$

将递推式与标准形式对比：

$$F_n = 1 \cdot F_{n-1} + 1 \cdot F_{n-2} \Rightarrow a = 1, \quad -bc = 1 \Rightarrow bc = -1$$

设 $a_n = F_n - xF_{n-1}$，代入递推式：

$$F_n - xF_{n-1} = (1-x)F_{n-1} + F_{n-2}$$

为使 $\{a_n\}$ 成等比数列，需满足：

$$\frac{1-x}{1} = \frac{1}{x} \Rightarrow x(1-x) = 1 \Rightarrow x^2 - x - 1 = 0$$

解得：

$$\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \quad \beta = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

满足 $\alpha + \beta = 1$，$\alpha\beta = -1$.
分别代入 α, β 得两个等比数列：

$$F_n - \alpha F_{n-1} = \beta(F_{n-1} - \alpha F_{n-2})$$
$$F_n - \beta F_{n-1} = \alpha(F_{n-1} - \beta F_{n-2})$$

由初始条件 $F_0 = 0, F_1 = 1$ 得：

$$F_n - \alpha F_{n-1} = \beta^{n-1}(F_1 - \alpha F_0) = \beta^{n-1}$$
$$F_n - \beta F_{n-1} = \alpha^{n-1}(F_1 - \beta F_0) = \alpha^{n-1}$$

联立两式消去 F_{n-1}：

$$F_n = \frac{\alpha^n - \beta^n}{\alpha - \beta} = \frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right]$$

例题 3.33.

已知 $n \geq 2, a, b \in \mathbb{C}$, 求

$$A = \begin{vmatrix} a & a & a & a & a & \cdots \\ a & b & b & b & b & \cdots \\ a & b & a & a & a & \cdots \\ a & b & a & b & b & \cdots \\ a & b & a & b & a & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{vmatrix}_{n\times n}$$

解 将 A 的第一行的 -1 倍加到之后的每一行, 然后按照第一列展开可得

$$|A|=\begin{vmatrix} a & a & a & a & a & \cdots \\ 0 & b-a & b-a & b-a & b-a & \cdots \\ 0 & b-a & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & b-a & 0 & b-a & b-a & \cdots \\ 0 & b-a & 0 & b-a & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{vmatrix}_{n\times n} \triangleq aD_{n-1}.$$

其中 D_{n-1} 按照第二行展开, 之后再按照一列展开, 可得

$$\begin{aligned} D_{n-1} &= \begin{vmatrix} b-a & b-a & b-a & b-a & \cdots \\ b-a & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ b-a & 0 & b-a & b-a & \cdots \\ b-a & 0 & b-a & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{vmatrix} \\ &= -(b-a)\begin{vmatrix} b-a & b-a & b-a & b-a & \cdots \\ 0 & b-a & b-a & b-a & \cdots \\ 0 & b-a & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & b-a & 0 & b-a & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \ddots \end{vmatrix} \\ &= -(b-a)^2 D_{n-3}. \end{aligned}$$

当 n 为奇数时, $n-1$ 为偶数, 此时 $D_2=\begin{vmatrix} b-a & b-a \\ b-a & 0 \end{vmatrix}=-(b-a)^2$, 于是根据上述递推公式可知

$$D_{n-1}=(-1)^{\frac{n-1}{2}}(b-a)^{n-1}.$$

当 n 为偶数时, $n-1$ 为奇数, 此时 $D_1=b-a$, 根据递推公式可得

$$D_{n-1}=(-1)^{\frac{n}{2}-1}(b-a)^{n-1}.$$

所以

$$|A|=\begin{cases} (-1)^{\frac{n-1}{2}}a(b-a)^{n-1}, & n \text{ 为奇数;} \\ (-1)^{\frac{n-2}{2}}a(b-a)^{n-1}, & n \text{ 为偶数.} \end{cases}$$

例题 3.34.

设

$$H_n=\begin{vmatrix} a_1 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ -1 & a_2 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & a_3 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & a_{n-1} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & a_n \end{vmatrix}.$$

证明: $H_n=a_nH_{n-1}+H_{n-2}$. 当 $a_1=a_2=\cdots=a_n=1$ 时, 求出 H_n.

解 按最后一行展开 H_n:

$$H_n=a_n\cdot H_{n-1}+(-1)^{n+(n-1)}\cdot(-1)\cdot H_{n-2}.$$

因为 $(-1)^{n+(n-1)}=(-1)^{2n-1}=-1$，所以：

$$H_n=a_nH_{n-1}+(-1)\cdot(-1)\cdot H_{n-2}=a_nH_{n-1}+H_{n-2}.$$

当 $a_1=a_2=\cdots=a_n=1$ 时，递推关系为：

$$H_n=H_{n-1}+H_{n-2}.$$

初始条件：

$$H_1=|1|=1,\quad H_2=\begin{vmatrix}1&1\\-1&1\end{vmatrix}=1\cdot1-1\cdot(-1)=2.$$

所以 $H_1=1$，$H_2=2$，$H_3=3$，$H_4=5$，$H_5=8$，这是斐波那契数列，且 $H_n=F_{n+1}$，其中 F_n 满足 $F_1=1$，$F_2=1$，$F_3=2$，$F_4=3$，$F_5=5$，因此：

$$H_n=F_{n+1}.$$

5. **拆分法**

行列式的计算可以从某一行或者某一列进行拆分简化计算，也可以通过完全拆分来简化计算.

例题 3.35.

计算 n 阶行列式:

$$D_n=\begin{vmatrix}x_1&y&y&\cdots&y&y\\z&x_2&y&\cdots&y&y\\z&z&x_3&\cdots&y&y\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\z&z&z&\cdots&x_{n-1}&y\\z&z&z&\cdots&z&x_n\end{vmatrix}$$

解 对第 n 列进行分拆即可得到递推公式:

$$\begin{aligned}D_n&=\begin{vmatrix}x_1&y&y&\cdots&y&y+0\\z&x_2&y&\cdots&y&y+0\\z&z&x_3&\cdots&y&y+0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\z&z&z&\cdots&x_{n-1}&y+0\\z&z&z&\cdots&z&y+x_n-y\end{vmatrix}\\&=\begin{vmatrix}x_1&y&y&\cdots&y&y\\z&x_2&y&\cdots&y&y\\z&z&x_3&\cdots&y&y\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\z&z&z&\cdots&x_{n-1}&y\\z&z&z&\cdots&z&y\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}x_1&y&y&\cdots&y&0\\z&x_2&y&\cdots&y&0\\z&z&x_3&\cdots&y&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\z&z&z&\cdots&x_{n-1}&0\\z&z&z&\cdots&z&x_n-y\end{vmatrix}\\&=\begin{vmatrix}x_1-z&y-z&y-z&\cdots&y-z&0\\0&x_2-z&y-z&\cdots&y-z&0\\0&0&x_3-z&\cdots&y-z&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&0&\cdots&x_{n-1}-z&0\\z&z&z&\cdots&z&y\end{vmatrix}+(x_n-y)\,D_{n-1}\\&=(x_n-y)\,D_{n-1}+y\prod_{i=1}^{n-1}(x_i-z).\end{aligned}$$

同理 (转置) 有

$$D_n = (x_n - z)\, D_{n-1} + z \prod_{i=1}^{n-1} (x_i - y)\,.$$

若 $y \neq z$, 解得

$$D_n = \frac{1}{z-y}\left[z\prod_{i=1}^{n}(x_i - y) - y\prod_{i=1}^{n}(x_i - z)\right]$$

若 $y = z$, 由递推得

$$D_n = \prod_{i=1}^{n}(x_i - y) + y\sum_{i=1}^{n}\prod_{j\neq i}(x_j - y)\,.$$

例题 3.36.

设 t 是一个参数,

$$|\boldsymbol{A}(t)| = \begin{vmatrix} a_{11}+t & a_{12}+t & \cdots & a_{1n}+t \\ a_{21}+t & a_{22}+t & \cdots & a_{2n}+t \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}+t & a_{n2}+t & \cdots & a_{nn}+t \end{vmatrix},$$

求证:

$$|\boldsymbol{A}(t)| = |\boldsymbol{A}(0)| + t\sum_{i,j=1}^{n} A_{ij},$$

其中 A_{ij} 是 a_{ij} 在 $|\boldsymbol{A}(0)|$ 中的代数余子式.

证明 将行列式第一列拆成两列再展开:

$$|\boldsymbol{A}(t)| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12}+t & \cdots & a_{1n}+t \\ a_{21} & a_{22}+t & \cdots & a_{2n}+t \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2}+t & \cdots & a_{nn}+t \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} t & a_{12}+t & \cdots & a_{1n}+t \\ t & a_{22}+t & \cdots & a_{2n}+t \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ t & a_{n2}+t & \cdots & a_{nn}+t \end{vmatrix}.$$

上式中的右边一个行列式用 -1 乘以第一列加到后面的列上去, 得到:

$$\begin{vmatrix} t & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ t & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ t & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = t\,(A_{11} + A_{21} + \cdots + A_{n1})\,.$$

再对另一个行列式第二列拆成两列展开, 不断这样做下去就可得到结论.

例题 3.37.

计算行列式其中 $b \neq c$

$$|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} a & b & \cdots & b \\ c & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c & c & \cdots & a \end{vmatrix}.$$

解

$$|\boldsymbol{A}(t)| = \begin{vmatrix} a+t & b+t & \cdots & b+t \\ c+t & a+t & \cdots & b+t \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c+t & c+t & \cdots & a+t \end{vmatrix} = |\boldsymbol{A}| + tu, \quad u = \sum_{i,j=1}^{n} A_{ij}.$$

注意 u 和 t 无关. 当 $t=-b$ 时, 得

$$|\boldsymbol{A}(-b)| = \begin{vmatrix} a-b & 0 & \cdots & 0 \\ c-b & a-b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c-b & c-b & \cdots & a-b \end{vmatrix} = |\boldsymbol{A}| - bu = (a-b)^n$$

同理, 当 $t=-c$ 时, $|\boldsymbol{A}(-c)| = |\boldsymbol{A}| - cu = (a-c)^n$. 消去 u 可得

$$|\boldsymbol{A}| = \frac{b(a-c)^n - c(a-b)^n}{b-c}.$$

例题 3.38. Binet-Cauchy 公式

设 $A \in \mathbb{F}^{n\times m}, B \in \mathbb{F}^{m\times n}$，则

(a). 当 $n > m$ 时，有 $|AB| = 0$;

(b). 当 $m = n$ 时，有 $|AB| = |A||B|$;

(c). 当 $n < m$ 时，有

$$|AB| = \sum_{1\le k_1<k_2<\cdots<k_n\le m} A\begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ k_1 & k_2 & \cdots & k_n \end{pmatrix} B\begin{pmatrix} k_1 & k_2 & \cdots & k_n \\ 1 & 2 & \cdots & n \end{pmatrix}.$$

矩阵乘积行列式的拆分过程与 Binet-Cauchy 公式推导

问题设定

设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{pmatrix}$

则矩阵乘积为：

$$AB = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^{3} a_{1j}b_{j1} & \sum_{j=1}^{3} a_{1j}b_{j2} \\ \sum_{j=1}^{3} a_{2j}b_{j1} & \sum_{j=1}^{3} a_{2j}b_{j2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11}+a_{12}b_{21}+a_{13}b_{31} & a_{11}b_{12}+a_{12}b_{22}+a_{13}b_{32} \\ a_{21}b_{11}+a_{22}b_{21}+a_{23}b_{31} & a_{21}b_{12}+a_{22}b_{22}+a_{23}b_{32} \end{pmatrix}$$

第一步：直接拆分成 9 项

利用行列式对每一列的多线性性质，直接将 $|AB|$ 拆分为 9 项：

$$\begin{aligned} |AB| = &\begin{vmatrix} a_{11}b_{11} & a_{11}b_{12} \\ a_{21}b_{11} & a_{21}b_{12} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11}b_{11} & a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} & a_{22}b_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11}b_{11} & a_{13}b_{32} \\ a_{21}b_{11} & a_{23}b_{32} \end{vmatrix} \\ &+ \begin{vmatrix} a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} \\ a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{12}b_{21} & a_{12}b_{22} \\ a_{22}b_{21} & a_{22}b_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{12}b_{21} & a_{13}b_{32} \\ a_{22}b_{21} & a_{23}b_{32} \end{vmatrix} \\ &+ \begin{vmatrix} a_{13}b_{31} & a_{11}b_{12} \\ a_{23}b_{31} & a_{21}b_{12} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{13}b_{31} & a_{12}b_{22} \\ a_{23}b_{31} & a_{22}b_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{13}b_{31} & a_{13}b_{32} \\ a_{23}b_{31} & a_{23}b_{32} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

第二步：提取公因子并简化表达式

从每个行列式中提取 B 元素的公因子：

$$
\begin{aligned}
|AB| =& b_{11}b_{12}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{11} \\ a_{21} & a_{21} \end{vmatrix} + b_{11}b_{22}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} + b_{11}b_{32}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix} \\
&+ b_{21}b_{12}\begin{vmatrix} a_{12} & a_{11} \\ a_{22} & a_{21} \end{vmatrix} + b_{21}b_{22}\begin{vmatrix} a_{12} & a_{12} \\ a_{22} & a_{22} \end{vmatrix} + b_{21}b_{32}\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} \\
&+ b_{31}b_{12}\begin{vmatrix} a_{13} & a_{11} \\ a_{23} & a_{21} \end{vmatrix} + b_{31}b_{22}\begin{vmatrix} a_{13} & a_{12} \\ a_{23} & a_{22} \end{vmatrix} + b_{31}b_{32}\begin{vmatrix} a_{13} & a_{13} \\ a_{23} & a_{23} \end{vmatrix}
\end{aligned}
$$

第三步：消去值为零的行列式

当行列式有两列相同时，其值为零：

- 第 1 项：$j_1 = 1, j_2 = 1$，两列相同
- 第 5 项：$j_1 = 2, j_2 = 2$，两列相同
- 第 9 项：$j_1 = 3, j_2 = 3$，两列相同

因此只剩下第 2,3,4,6,7,8 项：

$$
\begin{aligned}
|AB| =& b_{11}b_{22}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} + b_{11}b_{32}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix} \\
&+ b_{21}b_{12}\begin{vmatrix} a_{12} & a_{11} \\ a_{22} & a_{21} \end{vmatrix} + b_{21}b_{32}\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} \\
&+ b_{31}b_{12}\begin{vmatrix} a_{13} & a_{11} \\ a_{23} & a_{21} \end{vmatrix} + b_{31}b_{22}\begin{vmatrix} a_{13} & a_{12} \\ a_{23} & a_{22} \end{vmatrix}
\end{aligned}
$$

第四步：整理成标准形式

将剩余项按列对分组，并利用行列式性质（交换列变号）：

1. 对于列对 $\{1,2\}$：

$$
\begin{aligned}
& b_{11}b_{22}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} + b_{21}b_{12}\begin{vmatrix} a_{12} & a_{11} \\ a_{22} & a_{21} \end{vmatrix} \\
=& b_{11}b_{22}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} - b_{21}b_{12}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \\
=& (b_{11}b_{22} - b_{21}b_{12})\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}
\end{aligned}
$$

2. 对于列对 $\{1,3\}$：

$$
\begin{aligned}
& b_{11}b_{32}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix} + b_{31}b_{12}\begin{vmatrix} a_{13} & a_{11} \\ a_{23} & a_{21} \end{vmatrix} \\
=& b_{11}b_{32}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix} - b_{31}b_{12}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix} \\
=& (b_{11}b_{32} - b_{31}b_{12})\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix}
\end{aligned}
$$

3. 对于列对 $\{2,3\}$：

$$\begin{aligned} & b_{21}b_{32}\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} + b_{31}b_{22}\begin{vmatrix} a_{13} & a_{12} \\ a_{23} & a_{22} \end{vmatrix} \\ =& b_{21}b_{32}\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} - b_{31}b_{22}\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} \\ =& (b_{21}b_{32} - b_{31}b_{22})\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

最终结果

因此，最终结果为：

$$\begin{aligned} |AB| = & \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{vmatrix}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \\ & + \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{31} & b_{32} \end{vmatrix}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix} \\ & + \begin{vmatrix} b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{vmatrix}\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

这正是 Binet-Cauchy 公式在 $n=2, m=3$ 时的具体形式.

总结

本推导完整展示了：

(a). 直接应用行列式的多线性性质将 $|AB|$ 拆分为 9 项

(b). 提取公因子并消去零项

(c). 通过组合成对项并利用行列式性质，最终得到 Binet-Cauchy 公式

解 第一步：直接拆分为 m^n 项

利用行列式对每一列的多线性性质，直接将 $|AB|$ 拆分为 m^n 项：

$$|AB| = \sum_{j_1=1}^{m}\sum_{j_2=1}^{m}\cdots\sum_{j_n=1}^{m}\begin{vmatrix} a_{1j_1}b_{j_1 1} & a_{1j_2}b_{j_2 2} & \cdots & a_{1j_n}b_{j_n n} \\ a_{2j_1}b_{j_1 1} & a_{2j_2}b_{j_2 2} & \cdots & a_{2j_n}b_{j_n n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{nj_1}b_{j_1 1} & a_{nj_2}b_{j_2 2} & \cdots & a_{nj_n}b_{j_n n} \end{vmatrix}.$$

第二步：从每个行列式中提取 **B** 元素的公因子

由于行列式的每一列都有公因子，可以提取出来：

$$\begin{vmatrix} a_{1j_1}b_{j_1 1} & a_{1j_2}b_{j_2 2} & \cdots & a_{1j_n}b_{j_n n} \\ a_{2j_1}b_{j_1 1} & a_{2j_2}b_{j_2 2} & \cdots & a_{2j_n}b_{j_n n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{nj_1}b_{j_1 1} & a_{nj_2}b_{j_2 2} & \cdots & a_{nj_n}b_{j_n n} \end{vmatrix} = b_{j_1 1}b_{j_2 2}\cdots b_{j_n n}\begin{vmatrix} a_{1j_1} & a_{1j_2} & \cdots & a_{1j_n} \\ a_{2j_1} & a_{2j_2} & \cdots & a_{2j_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{nj_1} & a_{nj_2} & \cdots & a_{nj_n} \end{vmatrix}.$$

因此得到：

$$|AB| = \sum_{1\le j_1,j_2,\ldots,j_n\le m} b_{j_1 1}b_{j_2 2}\cdots b_{j_n n}\begin{vmatrix} a_{1j_1} & a_{1j_2} & \cdots & a_{1j_n} \\ a_{2j_1} & a_{2j_2} & \cdots & a_{2j_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{nj_1} & a_{nj_2} & \cdots & a_{nj_n} \end{vmatrix}.$$

第三步：消去值为零的行列式

当行列式有两列相同时，其值为零. 这发生在 $j_1, j_2, \ldots, j_n$ 中有重复索引时.

情况 **1**：$n > m$

此时求和项中的行列式必有两列相同（因为 $j_1, j_2, \ldots, j_n \in \{1, 2, \ldots, m\}$ 且 $n > m$），故每个行列式值为

零，从而 $|AB|=0$.

情况 **2**：$n \leq m$

去掉为零的行列式（即 $j_1, j_2, \ldots, j_n$ 中有重复的情况），考虑 $j_1, j_2, \ldots, j_n$ 互不相同的情形. 将 $j_1, j_2, \ldots, j_n$ 重排为 $1 \leq k_1 < k_2 < \cdots < k_n \leq m$.

设排列 σ 满足 $j_i = k_{\sigma(i)}$，则

$$\begin{vmatrix} a_{1j_1} & a_{1j_2} & \cdots & a_{1j_n} \\ a_{2j_1} & a_{2j_2} & \cdots & a_{2j_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{nj_1} & a_{nj_2} & \cdots & a_{nj_n} \end{vmatrix} = (-1)^{e(\sigma)} \begin{vmatrix} a_{1k_1} & a_{1k_2} & \cdots & a_{1k_n} \\ a_{2k_1} & a_{2k_2} & \cdots & a_{2k_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{nk_1} & a_{nk_2} & \cdots & a_{nk_n} \end{vmatrix} = (-1)^{e(\sigma)} A \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ k_1 & k_2 & \cdots & k_n \end{pmatrix}.$$

同时，

$$b_{j_1 1} b_{j_2 2} \cdots b_{j_n n} = b_{k_{\sigma(1)} 1} b_{k_{\sigma(2)} 2} \cdots b_{k_{\sigma(n)} n}.$$

因此，

$$|AB| = \sum_{1 \leq k_1 < k_2 < \cdots < k_n \leq m} \left[A \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ k_1 & k_2 & \cdots & k_n \end{pmatrix} \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^{e(\sigma)} b_{k_{\sigma(1)} 1} b_{k_{\sigma(2)} 2} \cdots b_{k_{\sigma(n)} n} \right].$$

注意到

$$\sum_{\sigma \in S_n} (-1)^{e(\sigma)} b_{k_{\sigma(1)} 1} b_{k_{\sigma(2)} 2} \cdots b_{k_{\sigma(n)} n} = B \begin{pmatrix} k_1 & k_2 & \cdots & k_n \\ 1 & 2 & \cdots & n \end{pmatrix},$$

故

$$|AB| = \sum_{1 \leq k_1 < k_2 < \cdots < k_n \leq m} A \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ k_1 & k_2 & \cdots & k_n \end{pmatrix} B \begin{pmatrix} k_1 & k_2 & \cdots & k_n \\ 1 & 2 & \cdots & n \end{pmatrix}.$$

特别地，当 $n = m$ 时，求和只有一项 $(k_1, k_2, \ldots, k_n) = (1, 2, \ldots, n)$，此时

$$|AB| = A \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ 1 & 2 & \cdots & n \end{pmatrix} B \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ 1 & 2 & \cdots & n \end{pmatrix} = |A||B|.$$

6. **利用多项式根的有限性求行列式**

例题 3.39.

设 $f_k(x)(k = 1, 2, \cdots, n)n - 2$ 的多项式, 求证: 对任意的 n 个数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$, 均有

$$\begin{vmatrix} f_1(a_1) & f_2(a_1) & \ldots & f_n(a_1) \\ f_1(a_2) & f_2(a_2) & \ldots & f_n(a_2) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_1(a_n) & f_2(a_n) & \ldots & f_n(a_n) \end{vmatrix} = 0.$$

解 作行列式

$$g(x) = \begin{vmatrix} f_1(x) & f_2(x) & \ldots & f_n(x) \\ f_1(a_2) & f_2(a_2) & \ldots & f_n(a_2) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_1(a_n) & f_2(a_n) & \ldots & f_n(a_n) \end{vmatrix},$$

这是个次数不超过 $n-2$ 的多项式. 若 $a_i (i = 2, \cdots, n)$ 中有相同者, 则显然 $g(x) = 0$. 若诸 a_i 互不相同, 则由 $g(a_i) = 0 (i = 2, \cdots, n)$ 知 $g(x)$ 有 $n-1$ 个互不相同的根, 则 $g(x)$ 是一个零多项式, 因此原行列式的值恒为零.

7. **利用矩阵的乘法求行列式**

例题 3.40.

若 $n \geq 3$, 求证下列矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行列式值等于零:

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1+x_1y_1 & 1+x_1y_2 & \cdots & 1+x_1y_n \\ 1+x_2y_1 & 1+x_2y_2 & \cdots & 1+x_2y_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1+x_ny_1 & 1+x_ny_2 & \cdots & 1+x_ny_n \end{pmatrix}.$$

解 从下列分解即可得到结论:

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & x_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & x_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & x_3 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ y_1 & y_2 & y_3 & \cdots & y_n \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

例题 3.41.

计算下列 $n+1$ 阶矩阵的行列式的值:

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} (a_0+b_0)^n & (a_0+b_1)^n & \cdots & (a_0+b_n)^n \\ (a_1+b_0)^n & (a_1+b_1)^n & \cdots & (a_1+b_n)^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (a_n+b_0)^n & (a_n+b_1)^n & \cdots & (a_n+b_n)^n \end{pmatrix}$$

解 将 $\boldsymbol{A}$ 分解为

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & \mathrm{C}_n^1a_0 & \mathrm{C}_n^2a_0^2 & \cdots & \mathrm{C}_n^na_0^n \\ 1 & \mathrm{C}_n^1a_1 & \mathrm{C}_n^2a_1^2 & \cdots & \mathrm{C}_n^na_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \mathrm{C}_n^1a_n & \mathrm{C}_n^2a_n^2 & \cdots & \mathrm{C}_n^na_n^n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} b_0^n & b_1^n & b_2^n & \cdots & b_n^n \\ b_0^{n-1} & b_1^{n-1} & b_2^{n-1} & \cdots & b_n^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix},$$

于是

$$|\boldsymbol{A}|=\mathrm{C}_n^1\mathrm{C}_n^2\cdots\mathrm{C}_n^n\prod_{0\leq i<j\leq n}(a_j-a_i)\,(b_i-b_j)\,.$$

例题 3.42.

通过分解方阵求其行列式:

$$\begin{pmatrix} \cos(\alpha_1-\beta_1) & \cos(\alpha_1-\beta_2) & \cdots & \cos(\alpha_1-\beta_n) \\ \cos(\alpha_2-\beta_1) & \cos(\alpha_2-\beta_2) & \cdots & \cos(\alpha_2-\beta_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \cos(\alpha_n-\beta_1) & \cos(\alpha_n-\beta_2) & \cdots & \cos(\alpha_n-\beta_n) \end{pmatrix}$$

解 由和差化积的公式知 $\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$，从而题中的方阵可以写成

$$\begin{pmatrix}\cos\alpha_1 & \sin\alpha_1\\ \cos\alpha_2 & \sin\alpha_2\\ \vdots & \vdots\\ \cos\alpha_n & \sin\alpha_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\beta_1 & \cos\beta_2 & \cdots & \cos\beta_n\\ \sin\beta_1 & \sin\beta_2 & \cdots & \sin\beta_n\end{pmatrix}.$$

上述矩阵的秩是小于等于 2 的. 所以如果 $n\geq 3$，则矩阵的行列式是 0. 而当 $n=1,2$ 时，可以直接计算.

8. **利用特征值求行列式**

$|A|=\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n$

3.2.3 伴随矩阵

例题 3.43.

假设 n 阶方阵 A 在各处的值都是整数，$\det A=1$，证明 A^{-1} 在各处的值都是整数.

证明 因为 A 的各项都是整数，因此任意的代数余子式 A_{ij} 都是整数. 而 $\det A=1$，由定理 3.21 矩阵的逆的形式，因此 A^{-1} 是一个整数矩阵.

例题 3.44.

证明：$(A\pm B)^V=A^V\pm B^V$ 一般不成立.

解 举反例. 取 $A=B=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$，则 $A+B=\begin{pmatrix}2&0\\0&2\end{pmatrix}$.

计算得 $A^V=B^V=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$，故 $A^V+B^V=\begin{pmatrix}2&0\\0&2\end{pmatrix}$.

而 $(A+B)^V=2^{2-1}\begin{pmatrix}2&0\\0&2\end{pmatrix}^V=2\cdot\frac{1}{4}\begin{pmatrix}2&0\\0&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$.

显然 $(A+B)^V\neq A^V+B^V$，故一般不成立.

例题 3.45.

证明：$(kA)^V=k^{n-1}A^V$，特别地

$$(-A)^V=\begin{cases}-A^V, & n\text{ 为偶数}\\ A^V, & n\text{ 为奇数}\end{cases}$$

解 设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$，kA 中元素 ka_{ij} 的代数余子式为 $(-1)^{i+j}M_{ij}(kA)$.

由于 $M_{ij}(kA)$ 是 $n-1$ 阶行列式，每行含公因子 k，故

$$M_{ij}(kA)=k^{n-1}M_{ij}(A)$$

因此

$$(kA)_{ij}=(-1)^{i+j}k^{n-1}M_{ij}(A)=k^{n-1}A_{ij}$$

从而

$$(kA)^V=(k^{n-1}A_{ji})=k^{n-1}A^V$$

特别地，令 $k=-1$，则

$$(-A)^V=(-1)^{n-1}A^V$$

当 n 为偶数时，$(-1)^{n-1}=-1$，故 $(-A)^V=-A^V$；当 n 为奇数时，$(-1)^{n-1}=1$，故 $(-A)^V=A^V$.

摄动法是证明矩阵等式的一种重要技巧，特别适用于处理不可逆矩阵的情况. 其基本思想是：

1. 对于给定的矩阵 A，构造 $A(t)=A+tE$，其中 t 为参数，E 为单位矩阵.
2. 考虑行列式 $\det A(t)$，这是一个关于 t 的多项式. 如果 $\det A(t)$ 有正根，设最小的正根为 $a>0$，则当 $0<t<a$ 时，$\det A(t)\neq 0$，此时 $A(t)$ 可逆. 如果 $\det A(t)$ 没有正根，则对任意 $t>0$，$A(t)$ 都可逆.
3. 在 $A(t)$ 可逆的区间内，等式在 $A(t)$ 上成立.
4. 由于等式两边都是 t 的多项式（或连续函数），且在一个区间上相等，由多项式恒等定理（或连续性），等式对所有 t 成立.
5. 令 $t\to 0^+$，即得原等式成立.

例题 3.46.

设 A,B,C,D 均为 n 阶方阵，且 $AC=CA$，证明：

$$\begin{vmatrix}A & B\\ C & D\end{vmatrix}=|AD-CB|.$$

证明 分两种情况证明：

情况一：A 可逆

构造分块初等变换：

$$\begin{pmatrix}E & O\\ -CA^{-1} & E\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A & B\\ C & D\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A & B\\ O & D-CA^{-1}B\end{pmatrix}.$$

两边取行列式得：

$$\begin{vmatrix}A & B\\ C & D\end{vmatrix}=|A||D-CA^{-1}B|.$$

由 $AC=CA$ 可得：

$$|A||D-CA^{-1}B|=|AD-ACA^{-1}B|=|AD-CAA^{-1}B|=|AD-CB|.$$

情况二：A 不可逆

令 $A_1=A+tE$，则 $|A_1|$ 是 t 的 n 次多项式，至多有 n 个根，故存在无穷多个 t 使得 A_1 可逆.

由 $AC=CA$ 可得 $A_1C=CA_1$，利用情况一的结论：

$$\begin{vmatrix}A_1 & B\\ C & D\end{vmatrix}=|A_1D-CB|.$$

上式两边均为 t 的多项式，且有无穷多个 t 使等式成立，由多项式恒等定理，等式对所有 t 成立. 令 $t\to 0^+$ 即得结论.

例题 3.47.

证明：$(AB)^V=B^VA^V$.

解 分两种情况证明：

情况 **1**：$|A|\neq 0$ 且 $|B|\neq 0$

此时 A,B 可逆，由 $A^V=|A|A^{-1}$，$B^V=|B|B^{-1}$，得：

$$(AB)^V=|AB|(AB)^{-1}=|A||B|B^{-1}A^{-1}=(|B|B^{-1})(|A|A^{-1})=B^VA^V$$

情况 **2**：$|A|=0$ 或 $|B|=0$（摄动法）

构造 $A(t)=A+tE$，$B(t)=B+tE$. 当 t 充分小时，$|A(t)|\neq 0$，$|B(t)|\neq 0$，故

$$(A(t)B(t))^V=B(t)^VA(t)^V$$

两边元素为关于 t 的多项式，有无穷多 t 使等式成立，故多项式恒等. 令 $t\to 0^+$，得

$$(AB)^V=B^VA^V$$

例题 3.48.

证明：

1. $(A^k)^V=(A^V)^k$
2. 若 $A^m=O$，则 $(A^V)^m=O$
3. 若 $A^2=A$，则 $(A^V)^2=A^V$

解 (1) 对 k 归纳：

$k=1$ 时显然成立.

假设 $k=s$ 时 $(A^s)^V=(A^V)^s$，则 $k=s+1$ 时：

$$(A^{s+1})^V=(A^s\cdot A)^V=A^V(A^s)^V=A^V(A^V)^s=(A^V)^{s+1}$$

归纳得证.

(2) 若 $A^m=O$：

若 $r(A)<n-1$，则 $A^V=O$，故 $(A^V)^m=O$；

若 $r(A)=n-1$，由 $A\cdot A^{m-1}=O$，两边取伴随得 $(A^{m-1})^VA^V=O$，递推得 $(A^V)^m=O$.

(3) 若 $A^2=A$，由 (1) 得：

$$(A^V)^2=(A^2)^V=A^V$$

例题 3.49.

证明：$(A^T)^V=(A^V)^T$，并推导：

1. 若 A 对称，则 A^V 对称
2. 若 A 反对称，则

$$A^V\text{ 是 }\begin{cases}\text{反对称}, & n\text{ 为偶数}\\ \text{对称}, & n\text{ 为奇数}\end{cases}$$

解 设 $A=(a_{ij})$，则 $A^T=(a_{ji})$.A^T 中 a_{ji} 的代数余子式为

$$(-1)^{i+j}M_{ji}(A^T)=(-1)^{i+j}M_{ij}(A)=A_{ji}$$

故

$$(A^T)^V=(A_{ji})=(A_{ij})^T=(A^V)^T$$

(1) 若 A 对称（$A^T=A$），则

$$(A^V)^T=(A^T)^V=A^V$$

故 A^V 对称.

(2) 若 A 反对称（$A^T=-A$），则

$$(A^V)^T=(A^T)^V=(-A)^V=(-1)^{n-1}A^V$$

n 为偶数时，$(-1)^{n-1}=-1$，故 $(A^V)^T=-A^V$，即 A^V 反对称；

n 为奇数时，$(-1)^{n-1}=1$，故 $(A^V)^T=A^V$，即 A^V 对称.

例题 3.50.

证明伴随矩阵的秩满足：

$$r(A^V)=\begin{cases}n, & r(A)=n\\ 1, & r(A)=n-1\\ 0, & r(A)<n-1\end{cases}$$

解 情况 **1**：$r(A)=n$

此时 $|A|\neq 0$，由 $|A^V|=|A|^{n-1}\neq 0$，故 $r(A^V)=n$.

情况 **2**：$r(A)=n-1$

此时 $|A|=0$，故 $AA^V=O$，即 A^V 的列是 $Ax=0$ 的解.

因 $r(A)=n-1$，$Ax=0$ 解空间维数为 1，故 $r(A^V)\leq 1$.

又 A 有非零 $n-1$ 阶子式，故 A^V 至少有一个非零元，因此 $r(A^V)=1$.

情况 **3**：$r(A)<n-1$

此时 A 的所有 $n-1$ 阶子式为零，故 $A^V=O$，即 $r(A^V)=0$.

例题 3.51.

若 A 可逆，证明：

$$(A^{-1})^V=(A^V)^{-1}=|A|^{-1}A$$

解 由 $AA^V=|A|E$，左乘 A^{-1} 得：

$$A^V=|A|A^{-1}$$

取逆得：

$$(A^V)^{-1}=|A|^{-1}A$$

又由 $A^{-1}(A^{-1})^V=|A^{-1}|E=|A|^{-1}E$，左乘 A 得：

$$(A^{-1})^V=|A|^{-1}A$$

故

$$(A^{-1})^V=(A^V)^{-1}=|A|^{-1}A$$

例题 3.52.

证明：$|A^V|=|A|^{n-1}$.

解 由 $AA^V=|A|E$，取行列式得：

$$|A||A^V|=||A|E|=|A|^n$$

情况 **1**：$|A|\neq 0$

两边除以 $|A|$ 得 $|A^V|=|A|^{n-1}$.

情况 **2**：$|A|=0$

此时 $AA^V=O$.

若 $r(A)<n-1$，则 $A^V=O$，故 $|A^V|=0=|A|^{n-1}$；

若 $r(A)=n-1$，则 $r(A^V)=1$（$n\geq 2$ 时），故 $|A^V|=0=|A|^{n-1}$.

综上，$|A^V|=|A|^{n-1}$.

例题 3.53.

证明：

$$(A^V)^V=\begin{cases}A, & n=2\\ |A|^{n-2}A, & n>2\end{cases}$$

解 情况 **1**：$n=2$

设 $A=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$，则

$$A^V=\begin{pmatrix}d & -b\\ -c & a\end{pmatrix}$$

故

$$(A^V)^V=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}=A$$

情况 **2**：$n>2$

若 $|A|\neq 0$，则 $A^V=|A|A^{-1}$，故

$$(A^V)^V=|A^V|(A^V)^{-1}=|A|^{n-1}\cdot(|A|A^{-1})^{-1}=|A|^{n-1}\cdot|A|^{-1}A=|A|^{n-2}A$$

若 $|A|=0$，则 $r(A)\leq n-1$.

若 $r(A)<n-1$，则 $A^V=O$，故 $(A^V)^V=O=|A|^{n-2}A$；

若 $r(A)=n-1$，则 $r(A^V)=1$，且 $n>2$，故 $(A^V)^V=O=|A|^{n-2}A$.

例题 3.54.

证明分块矩阵的伴随：

$$\begin{pmatrix}A & O\\ O & B\end{pmatrix}^V=\begin{pmatrix}|B|A^V & O\\ O & |A|B^V\end{pmatrix}$$

解 设 $M=\begin{pmatrix}A & O\\ O & B\end{pmatrix}$，则 $|M|=|A||B|$.

情况 **1**：A,B 可逆

此时

$$M^{-1}=\begin{pmatrix}A^{-1} & O\\ O & B^{-1}\end{pmatrix}$$

故

$$M^V=|M|M^{-1}=|A||B|\begin{pmatrix}A^{-1} & O\\ O & B^{-1}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}|B|A^V & O\\ O & |A|B^V\end{pmatrix}$$

情况 **2**：A 或 B 不可逆（摄动法）

构造 $A(t)=A+tE$，$B(t)=B+tE$. 当 t 充分小时 $A(t),B(t)$ 可逆，此时

$$\begin{pmatrix}A(t) & O\\ O & B(t)\end{pmatrix}^V=\begin{pmatrix}|B(t)|A(t)^V & O\\ O & |A(t)|B(t)^V\end{pmatrix}$$

令 $t\to 0^+$，由多项式连续性得证.

例题 3.55.

证明：

1. 上三角矩阵的伴随仍为上三角矩阵
2. 对角矩阵的伴随仍为对角矩阵

解 (1) 设 A 是上三角矩阵（$i>j$ 时 $a_{ij}=0$）.A^V 的元素 $(A^V)_{ij}=A_{ji}$（A_{ji} 是 a_{ji} 的代数余子式）.

当 $i>j$ 时，A_{ji} 是去掉第 j 行第 i 列的余子式，此时子矩阵有一行（第 j 行）下方全零或一列（第 i 列）左方全零，故余子式 $M_{ji}=0$，即 $A_{ji}=0$，因此 A^V 是上三角矩阵.

(2) 对角矩阵是上三角矩阵的特例，其伴随的对角元为原对角元的代数余子式，故仍为对角矩阵.

例题 3.56.

证明：

1. 若 A 正定，则 A^V 正定
2. 若 A 正交，则 A^V 正交

解 (1) A 正定则 $|A|>0$，且 A^{-1} 正定. 由 $A^V=|A|A^{-1}$，对任意非零向量 x：

$$x^TA^Vx=|A|x^TA^{-1}x>0$$

故 A^V 正定.

(2) A 正交则 $A^TA=E$，$|A|=\pm1$.$A^V=|A|A^{-1}=|A|A^T$，故

$$(A^V)^TA^V=(|A|A)^T(|A|A^T)=|A|^2AA^T=E$$

因此 A^V 正交.

例题 3.57.

证明：

1. 若 A 与 B 相似，则 A^V 与 B^V 相似
2. 若 A 与 B 合同，则 A^V 与 B^V 合同

解 (1) 若 $A\sim B$，则存在可逆矩阵 P 使得 $B=P^{-1}AP$. 由 $(AB)^V=B^VA^V$：

$$B^V=(P^{-1}AP)^V=P^VA^V(P^{-1})^V$$

又 $(P^{-1})^V=(P^V)^{-1}$，令 $Q=P^V$，则

$$B^V=Q^{-1}A^VQ$$

故 $A^V\sim B^V$.

(2) 若 A 与 B 合同，即存在正交矩阵 P 使得 $B=P^TAP$. 由 $(AB)^V=B^VA^V$ 和 $(A^T)^V=(A^V)^T$：

$$B^V=(P^TAP)^V=P^VA^V(P^T)^V=P^VA^V(P^V)^T$$

令 $Q=P^V$，则

$$B^V=Q^TA^VQ$$

故 A^V 与 B^V 合同.

例题 3.58.

证明：A^V 是 A 的多项式.

解 由哈密顿-凯莱定理，A 的特征多项式

$$f(\lambda)=|\lambda E-A|=\lambda^n+a_{n-1}\lambda^{n-1}+\cdots+a_1\lambda+a_0$$

满足 $f(A)=O$.

情况 **1**：$r(A)=n$

此时 A 可逆，$A^V=|A|A^{-1}$. 由 $f(A)=O$，两边左乘 A^{-1} 得：

$$A^{-1}=-\frac{1}{a_0}(A^{n-1}+a_{n-1}A^{n-2}+\cdots+a_1E)$$

其中 $a_0=(-1)^n|A|\neq 0$，故

$$A^V=|A|A^{-1}=-\frac{|A|}{a_0}(A^{n-1}+a_{n-1}A^{n-2}+\cdots+a_1E)$$

是 A 的多项式.

情况 **2**：$r(A)<n$（摄动法）

构造 $A(t)=A+tE$，当 t 充分小时 $r(A(t))=n$，故 $A(t)^V$ 是 $A(t)$ 的多项式. 令 $t\to 0^+$，多项式恒等，故 A^V 是 A 的多项式.



第 4 章 向量空间 $\mathbb{R}^n$

4.1 基、坐标、转换矩阵

定义 4.1

称向量组 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \ldots, \mathbf{a}_n$ 是（或说形成、构成）向量空间 $\mathbb{R}^n$ 的基，如果这些向量线性无关且张成 $\mathbb{R}^n$. 即，$\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \ldots, \mathbf{a}_n$ 线性无关且 $\operatorname{span}(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \ldots, \mathbf{a}_n) = \mathbb{R}^n$.

这个基的向量，简称为基向量. 在不产生歧义的情况下，有时我们会简单地用记号 $(\mathbf{a})$ 表示基 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \ldots, \mathbf{a}_n$.

命题 4.1

列向量空间 $\mathbb{R}^n$ 的基与可逆实矩阵之间有自然的对应：

$$\text{列向量空间 } \mathbb{R}^n \text{ 的基} \leftrightarrow \text{可逆实矩阵},$$

$$\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \cdots, \mathbf{a}_n \leftrightarrow A = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \cdots, \mathbf{a}_n).$$

定理 4.1

假设 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \ldots, \mathbf{a}_n$ 是向量空间 $\mathbb{R}^n$ 的基. 那么 $\mathbb{R}^n$ 中每一个向量 $\mathbf{v}$ 都可以唯一地表示为 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \ldots, \mathbf{a}_n$ 的线性组合；线性组合的系数称为 $\mathbf{v}$ 关于这个基（或在这个基下）的坐标.

命题 4.2

假设 $\mathbf{b}_1, \cdots, \mathbf{b}_m$ 和 $\mathbf{a}_1, \cdots, \mathbf{a}_n$ 是向量空间 $\mathbb{R}^n$ 的两个基，那么 $m = n$. 从而 $\mathbb{R}^n$ 的所有基含有同样数量的向量. 一个基中所含向量的个数称为 $\mathbb{R}^n$ 的维数.

定理 4.2

假设向量空间 $\mathbb{R}^n$ 的维数是 n.

(1) 如果 $\mathbb{R}^n$ 中的 n 个向量张成 $\mathbb{R}^n$，那么这 n 个向量线性无关，从而构成 $\mathbb{R}^n$ 的基；

(2) $\mathbb{R}^n$ 中任意一组线性无关的向量都可以扩充为 $\mathbb{R}^n$ 的一个基，特别，任何非零向量都在某个基中.

设 $\mathbf{b}_1, \cdots, \mathbf{b}_n$ 和 $\mathbf{a}_1, \cdots, \mathbf{a}_n$ 是向量空间 $\mathbb{R}^n$ 的两个基. 一个基的向量可以表示成另一个基的向量的线性组

合，而且表示方式唯一.

$$\begin{aligned}\mathbf{b}_1 &= t_{11}\mathbf{a}_1 + t_{21}\mathbf{a}_2 + \cdots + t_{n1}\mathbf{a}_n,\\ \mathbf{b}_2 &= t_{12}\mathbf{a}_1 + t_{22}\mathbf{a}_2 + \cdots + t_{n2}\mathbf{a}_n,\\ &\cdots\\ \mathbf{b}_n &= t_{1n}\mathbf{a}_1 + t_{2n}\mathbf{a}_2 + \cdots + t_{nn}\mathbf{a}_n.\end{aligned}$$

线性组合中的系数给出矩阵

$$T = (t_{ij}) = \begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} & \cdots & t_{1n} \\ t_{21} & t_{22} & \cdots & t_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ t_{n1} & t_{n2} & \cdots & t_{nn} \end{pmatrix},$$

称为从基 $\mathbf{a}_1, \cdots, \mathbf{a}_n$ 到基 $\mathbf{b}_1, \cdots, \mathbf{b}_n$ 的转换矩阵. 注意 $\mathbf{b}_j$ 在基 $\mathbf{a}_1, \cdots, \mathbf{a}_n$ 下的坐标是转换矩阵 T 的第 j 列.

$$(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \cdots, \mathbf{b}_n) = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \cdots, \mathbf{a}_n)T.$$

以 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \cdots, \mathbf{b}_n$ 为列向量的矩阵记作 B，以 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \cdots, \mathbf{a}_n$ 为列向量的矩阵记作 A，即

$$B = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \cdots, \mathbf{b}_n), \quad A = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \cdots, \mathbf{a}_n).$$

那么，关于 n 个列向量的等式其实就是下面的矩阵等式：

$$B = AT.$$

要确信这一点，还可以对上述两边的矩阵每一处的值与在分量上的值做比较. 矩阵 A 和 B 都是可逆的，从而等式已经在理论上给出了转换矩阵的计算方法. 有必要把这个结果写成定理.

定理 4.3

设向量组 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \cdots, \mathbf{a}_n$ 和向量组 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \cdots, \mathbf{b}_n$ 分别是列向量空间 $\mathbb{R}^n$ 的两个基. 从前者到后者的转换矩阵记为 T，那么 $B = AT$，即

$$T = A^{-1}B.$$

♡

定理 4.4

设 T 是从向量空间 $\mathbb{R}^n$ 的基 $\mathbf{a}_1, \cdots, \mathbf{a}_n$ 到基 $\mathbf{b}_1, \cdots, \mathbf{b}_n$ 的转换矩阵. 那么

(1) T 是可逆矩阵；

(2) 向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 在基 $\mathbf{b}_1, \cdots, \mathbf{b}_n$ 下的坐标列向量 X 可通过 T 的逆矩阵和 $\mathbf{x}$ 在基 $\mathbf{a}_1, \cdots, \mathbf{a}_n$ 下的坐标列向量 Y 计算：

$$X = T^{-1}Y.$$

♡

例题 4.1.

设 E_1, E_2, E_3 是列向量空间 $\mathbb{R}^3$ 的标准基.

(1) 证明：向量组 $E_1, E_1 + 2E_2, E_1 + 2E_2 + 3E_3$ 和向量组 $E_1 - E_2 + E_3, E_2 - E_3, E_3$ 都是 $\mathbb{R}^3$ 的基.

(2) 求从基 $E_1, E_1 + 2E_2, E_1 + 2E_2 + 3E_3$ 到基 $E_1 - E_2 + E_3, E_2 - E_3, E_3$ 的转换矩阵，以及从基 $E_1 - E_2 + E_3, E_2 - E_3, E_3$ 到基 $E_1, E_1 + 2E_2, E_1 + 2E_2 + 3E_3$ 的转换矩阵.

(3) 假设向量 X 在基 $E_1, E_1 + 2E_2, E_1 + 2E_2 + 3E_3$ 下的坐标列向量是 $[2, -1, 5]$，求 X 在基 $E_1 - E_2 + E_3, E_2 - E_3, E_3$ 下的坐标列向量.

解 (1) 证明两组向量都是基：

设第一组向量为：

$$\mathbf{a}_1 = E_1 = \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_2 = E_1 + 2E_2 = \begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_3 = E_1 + 2E_2 + 3E_3 = \begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$$

设第二组向量为：

$$\mathbf{b}_1 = E_1 - E_2 + E_3 = \begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_2 = E_2 - E_3 = \begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_3 = E_3 = \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$$

构造矩阵并计算行列式：

$$\det(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3) = \begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\0 & 2 & 2\\0 & 0 & 3\end{vmatrix} = 1 \times 2 \times 3 = 6 \neq 0$$

$$\det(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3) = \begin{vmatrix}1 & 0 & 0\\-1 & 1 & 0\\1 & -1 & 1\end{vmatrix} = 1 \times 1 \times 1 = 1 \neq 0$$

由于两组向量的行列式均不为零，故它们线性无关且张成 $\mathbb{R}^3$，因此都是 $\mathbb{R}^3$ 的基.

(2) 求转换矩阵：

设从基 $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$ 到基 $\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3\}$ 的转换矩阵为 T，满足：

$$(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3) = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3)T$$

即：

$$B = AT$$

其中：

$$A = \begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\0 & 2 & 2\\0 & 0 & 3\end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\-1 & 1 & 0\\1 & -1 & 1\end{pmatrix}$$

解得：

$$T = A^{-1}B$$

先求 A^{-1}：

$$A^{-1} = \frac{1}{6}\begin{pmatrix}6 & -3 & 0\\0 & 3 & -2\\0 & 0 & 2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & -\frac{1}{2} & 0\\0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{3}\\0 & 0 & \frac{1}{3}\end{pmatrix}$$

计算 T：

$$T = A^{-1}B = \begin{pmatrix}1 & -\frac{1}{2} & 0\\0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{3}\\0 & 0 & \frac{1}{3}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\-1 & 1 & 0\\1 & -1 & 1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 0\\-1 & 1 & -\frac{1}{3}\\\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3}\end{pmatrix}$$

从基 $\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3\}$ 到基 $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$ 的转换矩阵为 T^{-1}：

$$T^{-1} = (A^{-1}B)^{-1} = B^{-1}A$$

先求 B^{-1}：

$$B^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}$$

计算 T^{-1}：

$$T^{-1}=B^{-1}A=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&1\\0&2&2\\0&0&3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&3&3\\0&2&5\end{pmatrix}$$

(3) 求坐标：

已知向量 X 在基 $\{\mathbf{a}_1,\mathbf{a}_2,\mathbf{a}_3\}$ 下的坐标为 $[2,-1,5]$，设其在基 $\{\mathbf{b}_1,\mathbf{b}_2,\mathbf{b}_3\}$ 下的坐标为 $[x,y,z]$，则有：

$$[x,y,z]^T=T^{-1}[2,-1,5]^T$$

计算：

$$\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&3&3\\0&2&5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\\-1\\5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\times2+1\times(-1)+1\times5\\1\times2+3\times(-1)+3\times5\\0\times2+2\times(-1)+5\times5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6\\14\\23\end{pmatrix}$$

因此，向量 X 在基 $\{\mathbf{b}_1,\mathbf{b}_2,\mathbf{b}_3\}$ 下的坐标为 $[6,14,23]$.

定理 4.5 (行向量空间的基变换定理)

设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 和向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$ 分别是行向量空间 $\mathbb{R}^n$ 的两个基. 从前者到后者的转换矩阵记为 T（即满足 $\boldsymbol{\beta}_i=\sum_{j=1}^n t_{ij}\boldsymbol{\alpha}_j$），那么有：

$$B=TA,$$

即

$$T=BA^{-1},$$

其中 A 是以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 为行向量构成的矩阵，B 是以 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$ 为行向量构成的矩阵.

证明 由于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的基，所以以它们为行向量构成的矩阵 A 是可逆的. 同样，以 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$ 为行向量构成的矩阵 B 也是可逆的.

由转换矩阵的定义，对于每个 $i=1,2,\cdots,n$，有：

$$\boldsymbol{\beta}_i=t_{i1}\boldsymbol{\alpha}_1+t_{i2}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+t_{in}\boldsymbol{\alpha}_n.$$

将这 n 个等式写成矩阵形式：

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1\\\boldsymbol{\beta}_2\\\vdots\\\boldsymbol{\beta}_n\end{pmatrix}=T\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1\\\boldsymbol{\alpha}_2\\\vdots\\\boldsymbol{\alpha}_n\end{pmatrix},$$

即

$$B=TA.$$

由于 A 可逆，两边右乘 A^{-1} 得：

$$T=BA^{-1}.$$

例题 4.2.

考虑行向量空间 $\mathbb{R}^2$ 的两个基：

- 基 $\mathcal{A}$: $\boldsymbol{\alpha}_1 = (1,0), \boldsymbol{\alpha}_2 = (0,1)$（标准基）
- 基 $\mathcal{B}$: $\boldsymbol{\beta}_1 = (1,1), \boldsymbol{\beta}_2 = (1,-1)$

求从基 $\mathcal{A}$ 到基 $\mathcal{B}$ 的转换矩阵 T.

解：构造矩阵：

$$A = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\alpha}_1 \\ \boldsymbol{\alpha}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\beta}_1 \\ \boldsymbol{\beta}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

根据定理，转换矩阵 $T = BA^{-1} = BI = B$，即：

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

验证：计算 TA：

$$TA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = B,$$

符合定理结论.

注 行向量版本与列向量版本的主要区别在于：

- 列向量版本：基向量作为列构成矩阵，转换关系为 $B = AT$，$T = A^{-1}B$
- 行向量版本：基向量作为行构成矩阵，转换关系为 $B = TA$，$T = BA^{-1}$

这种差异源于矩阵乘法的顺序不同，但本质上描述的是相同的线性变换关系.

4.2 子空间

向量空间 $\mathbb{R}^n$ 的两个子空间 U, W 的交集 $U \cap W$ 是 V 的子空间，也是 U 和 W 的子空间. 但是两个子空间的并集 $U \cup W$ 一般不是子空间.

命题 4.3

设 U 和 V 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间，如果 $V \subset U$，那么 $\dim V \leq \dim U$，等号成立当且仅当 $U = V$.

定义 4.2

两个子空间 U 和 W 的和是所有形如 $\mathbf{u} + \mathbf{w}, \mathbf{u} \in U, \mathbf{w} \in W$ 的向量形成的集合，记做 $U + W$. 类似地，V 的有限个子空间 $U_1, \cdots, U_m$ 的和定义为所有形如 $\mathbf{u}_1 + \cdots + \mathbf{u}_m, \mathbf{u}_1 \in U_1, \cdots, \mathbf{u}_m \in U_m$ 的向量形成的集合，记作 $U_1 + \cdots + U_m$.

$U_1 + \cdots + U_m$ 是 V 中含诸 U_i 的最小子空间.

命题 4.4 (子空间和的维数公式)

设 U 和 V 是 $\mathbb{R}^n$ 的两个子空间，则

$$\dim(U + V) = \dim U + \dim V - \dim(U \cap V).$$

定义 4.3

设 $U_1, U_2, \ldots, U_m$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间. 如果对于任意 $\mathbf{u}_i \in U_i$，等式 $\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2 + \cdots + \mathbf{u}_m = \mathbf{0}$ 蕴含 $\mathbf{u}_1 = \mathbf{u}_2 = \cdots = \mathbf{u}_m = \mathbf{0}$，则称这些子空间是线性无关的. 否则称这些子空间线性相关.

定理 4.6

子空间 $U_1,\cdots,U_m$ 线性无关当且仅当如下条件满足

$$U_i\cap(U_1+\cdots+\hat{U}_i+\cdots+U_m)=0,\quad i=1,2,\cdots,m. \tag{1}$$

(子空间 U_i 上带上"^"表示该子空间在和中不出现，即

$$U_1+\cdots+\hat{U}_i+\cdots+U_m=U_1+\cdots+U_{i-1}+U_{i+1}+\cdots+U_m)$$

证明 假设 $U_1,\cdots,U_m$ 线性无关. 对任意的 i，取 $\mathbf{u}\in U_i\cap(U_1+\cdots+\hat{U}_i+\cdots+U_m)$. 于是 $\mathbf{u}=\mathbf{u}_1+\cdots+\mathbf{u}_{i-1}+\mathbf{u}_{i+1}+\cdots+\mathbf{u}_m,\mathbf{u}_j\in U_j,j\neq i$. 从而

$$\mathbf{0}=\mathbf{u}_1+\cdots+\mathbf{u}_{i-1}+(-\mathbf{u})+\mathbf{u}_{i+1}+\cdots+\mathbf{u}_m.$$

根据定义，$\mathbf{u}=\mathbf{0}$，所以 $U_i\cap(U_1+\cdots+\hat{U}_i+\cdots+U_m)=0$.

反之，假设条件 (1) 满足. 如果有 $\mathbf{u}_i\in U_i,i=1,\cdots,m$ 使得

$$\mathbf{u}_1+\cdots+\mathbf{u}_i+\cdots+\mathbf{u}_m=\mathbf{0},$$

则有

$$\mathbf{u}_i=-(\mathbf{u}_1+\cdots+\mathbf{u}_{i-1}+\mathbf{u}_{i+1}+\cdots+\mathbf{u}_m)\in U_i\cap(U_1+\cdots+\hat{U}_i+\cdots+U_m)=0.$$

即 $\mathbf{u}_i=\mathbf{0}$ 对所有的 i 成立. ♡

线性无关的子空间的和的维数与这些子空间的维数的关系特别简单.

定理 4.7

子空间 $U_1,\cdots,U_m$ $(m\geq 2)$ 线性无关当且仅当

$$\dim(U_1+\cdots+U_m)=\dim U_1+\cdots+\dim U_m.$$

♡

例题 4.3.

设 V 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间，$\mathbf{u}_1,\cdots,\mathbf{u}_r$ 和 $\mathbf{v}_1,\cdots,\mathbf{v}_r$ 是 V 的两个基.

(1) 定义从基 $(\mathbf{u}_i)$ 到基 $(\mathbf{v}_i)$ 的转换矩阵；

(2) 证明这个转换矩阵是可逆的；

(3) 设向量 $\mathbf{u}\in V$ 在基 $(\mathbf{u}_i)$ 下和在基 $(\mathbf{v}_i)$ 的坐标列向量分别是 X 和 Y. 利用基的转换矩阵给出 X 和 Y 之间的联系.

解 (1) 从基 $(\mathbf{u}_i)$ 到基 $(\mathbf{v}_i)$ 的转换矩阵 T 定义为满足以下关系的矩阵：

$$(\mathbf{v}_1,\cdots,\mathbf{v}_r)=(\mathbf{u}_1,\cdots,\mathbf{u}_r)T$$

即每个 $\mathbf{v}_j$ 可以表示为 $\mathbf{u}_1,\cdots,\mathbf{u}_r$ 的线性组合：

$$\mathbf{v}_j=t_{1j}\mathbf{u}_1+t_{2j}\mathbf{u}_2+\cdots+t_{rj}\mathbf{u}_r,\quad j=1,\cdots,r$$

其中 $T=(t_{ij})$ 是一个 $r\times r$ 矩阵.

(2) 要证明转换矩阵 T 是可逆的，即证明 T 的秩为 r. 考虑矩阵表示：令 $U=(\mathbf{u}_1,\cdots,\mathbf{u}_r)$ 和 $V=(\mathbf{v}_1,\cdots,\mathbf{v}_r)$，它们都是 $n\times r$ 矩阵. 由基的定义，U 和 V 的列向量均线性无关，故 $\mathrm{rank}(U)=r$ 和 $\mathrm{rank}(V)=r$. 根据转换矩阵的定义，有 $V=UT$. 由秩的性质：

$$\mathrm{rank}(V)=\mathrm{rank}(UT)\leq\min\{\mathrm{rank}(U),\mathrm{rank}(T)\}\leq\mathrm{rank}(T)\leq r.$$

由于 $\mathrm{rank}(V)=r$，因此 $\mathrm{rank}(T)\geq r$. 又因为 T 是 $r\times r$ 矩阵，故 $\mathrm{rank}(T)=r$，即 T 是可逆矩阵.

(3) 设向量 $\mathbf{u}\in V$ 在基 $(\mathbf{u}_i)$ 下的坐标为 $X=(x_1,\cdots,x_r)^T$，在基 $(\mathbf{v}_i)$ 下的坐标为 $Y=(y_1,\cdots,y_r)^T$，则有：

$$\mathbf{u}=x_1\mathbf{u}_1+\cdots+x_r\mathbf{u}_r=y_1\mathbf{v}_1+\cdots+y_r\mathbf{v}_r$$

利用转换矩阵的关系 $\mathbf{v}_j = \sum_{i=1}^{r} t_{ij}\mathbf{u}_i$，可得：

$$\mathbf{u} = \sum_{j=1}^{r} y_j \mathbf{v}_j = \sum_{j=1}^{r} y_j \left(\sum_{i=1}^{r} t_{ij}\mathbf{u}_i \right) = \sum_{i=1}^{r} \left(\sum_{j=1}^{r} t_{ij} y_j \right) \mathbf{u}_i$$

与 $\mathbf{u} = \sum_{i=1}^{r} x_i \mathbf{u}_i$ 比较系数，得到：

$$x_i = \sum_{j=1}^{r} t_{ij} y_j, \quad i = 1, \cdots, r$$

即 $X = TY$，所以 $Y = T^{-1}X$.

例题 4.4.

命 $U = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) | x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 0\}$. 它是行向量空间 $\mathbb{R}^4$ 的子空间.

(1) 证明 $\mathbf{u}_1 = (2, -1, 0, 0), \mathbf{u}_2 = (3, 0, -1, 0), \mathbf{u}_3 = (1, 0, 0, 1)$ 是 U 的一个基.

(2) 证明 $\mathbf{v}_1 = (1, 1, -1, 0), \mathbf{v}_2 = (1, 1, 0, 3), \mathbf{v}_3 = (1, 0, 1, 4)$ 是 U 的一个基.

(3) 求从基 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$ 到基 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ 的转换矩阵.

(4) 求 $\mathbf{w} = (1, 1, 1, 6) \in U$ 在基 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$ 和基 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ 下的坐标列向量.

解 (1) 首先验证每个 $\mathbf{u}_i$ 满足子空间 U 的方程 $x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 0$：

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_1 = (2, -1, 0, 0): &\quad 2 + 2(-1) + 3(0) - 0 = 0, \\ \mathbf{u}_2 = (3, 0, -1, 0): &\quad 3 + 2(0) + 3(-1) - 0 = 0, \\ \mathbf{u}_3 = (1, 0, 0, 1): &\quad 1 + 2(0) + 3(0) - 1 = 0. \end{aligned}$$

其次证明它们线性无关. 考虑线性组合：

$$c_1(2, -1, 0, 0) + c_2(3, 0, -1, 0) + c_3(1, 0, 0, 1) = (0, 0, 0, 0)$$

得到方程组：

$$\begin{cases} 2c_1 + 3c_2 + c_3 = 0, \\ -c_1 = 0, \\ -c_2 = 0, \\ c_3 = 0, \end{cases}$$

解得 $c_1 = c_2 = c_3 = 0$，故线性无关. 由于 U 是三维子空间（一个线性方程定义），三个线性无关向量构成基.

(2) 验证每个 $\mathbf{v}_i$ 满足方程：

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 = (1, 1, -1, 0): &\quad 1 + 2(1) + 3(-1) - 0 = 0, \\ \mathbf{v}_2 = (1, 1, 0, 3): &\quad 1 + 2(1) + 3(0) - 3 = 0, \\ \mathbf{v}_3 = (1, 0, 1, 4): &\quad 1 + 2(0) + 3(1) - 4 = 0. \end{aligned}$$

验证线性无关：考虑

$$c_1(1, 1, -1, 0) + c_2(1, 1, 0, 3) + c_3(1, 0, 1, 4) = (0, 0, 0, 0)$$

得到方程组：

$$\begin{cases} c_1 + c_2 + c_3 = 0, \\ c_1 + c_2 = 0, \\ -c_1 + c_3 = 0, \\ 3c_2 + 4c_3 = 0, \end{cases}$$

解得 $c_1 = c_2 = c_3 = 0$，故线性无关，构成基.

(3) 求从基 $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ 到基 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ 的转换矩阵 T. 定义矩阵：

$$A = \begin{pmatrix} \mathbf{u}_1 \\ \mathbf{u}_2 \\ \mathbf{u}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} \mathbf{v}_1 \\ \mathbf{v}_2 \\ \mathbf{v}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

两边同时右乘一些初等矩阵，即同时做初等列变换，把

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

变成

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

与此同时，

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

变成

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & 0 \end{pmatrix}.$$

因此，我们有

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} & t_{13} \\ t_{21} & t_{22} & t_{23} \\ t_{31} & t_{32} & t_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

综上，转换矩阵

$$T = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 4 \end{pmatrix}.$$

(4) 求 $\mathbf{w} = (1, 1, 1, 6)$ 在基 $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ 和基 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ 下的坐标列向量.

首先求在基 $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ 下的坐标 $X = (x_1, x_2, x_3)^T$，满足：

$$\mathbf{w} = x_1\mathbf{u}_1 + x_2\mathbf{u}_2 + x_3\mathbf{u}_3,$$

即：

$$(1, 1, 1, 6) = x_1(2, -1, 0, 0) + x_2(3, 0, -1, 0) + x_3(1, 0, 0, 1),$$

解得：

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 1, \\ -x_1 = 1, \\ -x_2 = 1, \\ x_3 = 6, \end{cases}$$

所以 $x_1 = -1, x_2 = -1, x_3 = 6$，即 $X = (-1, -1, 6)^T$.

接下来求在基 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ 下的坐标 $Y = (y_1, y_2, y_3)^T$. 由转换关系，有 $X = T^T Y$，其中 T 为转换矩阵，故：

$$Y = (T^T)^{-1} X.$$

计算：

$$T^T = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad (T^T)^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 1 \\ -4 & -4 & -1 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

于是：

$$Y = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 1 \\ -4 & -4 & -1 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3(-1) + 4(-1) + 1(6) \\ -4(-1) + (-4)(-1) + (-1)(6) \\ 3(-1) + 3(-1) + 1(6) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

验证：$-1 \cdot \mathbf{v}_1 + 2 \cdot \mathbf{v}_2 + 0 \cdot \mathbf{v}_3 = (-1, -1, 1, 0) + (2, 2, 0, 6) = (1, 1, 1, 6) = \mathbf{w}$，正确.

因此，$\mathbf{w}$ 在基 $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ 下的坐标为 $(-1, -1, 6)^T$，在基 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ 下的坐标为 $(-1, 2, 0)^T$.

例题 4.5.

求下列向量张成的线性子空间的一个基和维数：

$(1, 1, 1, 1, 0), (1, 1, -1, -1, -1), (2, 2, 0, -1), (1, 1, 5, 5, 2), (1, -1, -1, 0, 0).$

解 将给定的行向量写成列向量，构造矩阵 A：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 5 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

对 A 进行初等行变换，化为行最简形式.

第一步：$R_2 - R_1 \to R_2, R_3 - R_1 \to R_3, R_4 - R_1 \to R_4$：

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & -2 & 4 & -2 \\ 0 & -2 & -2 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

第二步：交换 R_2 和 R_3：

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -2 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & -2 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

第三步：$R_2 \leftarrow R_2/(-2)$：

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & -2 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

第四步：$R_1 - R_2 \to R_1, R_4 + 2R_2 \to R_4, R_5 + R_2 \to R_5$：

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

第五步：$R_3 \leftarrow R_3/(-2)$：

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

第六步：$R_2 - R_3 \to R_2, R_4 - R_3 \to R_4, R_5 - R_3 \to R_5$：

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所得矩阵为行最简形式，主元列在第 1 列、第 2 列和第 5 列. 因此，原始矩阵 A 的第 1 列、第 2 列和第 5 列对应向量张成空间的一个基，即：

$$(1,1,1,1,0), \quad (1,1,-1,-1,-1), \quad (1,-1,-1,0,0)$$

维数为 3.

例题 4.6.

如果 U_1, U_2, U_3 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间. 证明

$$\dim(U_1+U_2+U_3) \le \dim U_1+\dim U_2+\dim U_3-\dim U_1\cap U_2-\dim U_1\cap U_3-\dim U_2\cap U_3+\dim U_1\cap U_2\cap U_3.$$

举例说明上述左端比右端小的情况可以发生.

解 利用包含排斥原理和维数公式 $\dim(U+V) = \dim U + \dim V - \dim(U \cap V)$.

考虑 $U_1 + U_2 + U_3 = (U_1 + U_2) + U_3$，则：

$$\dim(U_1 + U_2 + U_3) = \dim(U_1 + U_2) + \dim U_3 - \dim((U_1 + U_2) \cap U_3)$$

又 $\dim(U_1 + U_2) = \dim U_1 + \dim U_2 - \dim(U_1 \cap U_2)$，代入得：

$$\dim(U_1 + U_2 + U_3) = \dim U_1 + \dim U_2 + \dim U_3 - \dim(U_1 \cap U_2) - \dim((U_1 + U_2) \cap U_3)$$

由于 $(U_1 + U_2) \cap U_3 \supseteq U_1 \cap U_3 + U_2 \cap U_3$，但不等号可能成立，所以有：

$$\dim((U_1 + U_2) \cap U_3) \ge \dim(U_1 \cap U_3) + \dim(U_2 \cap U_3) - \dim(U_1 \cap U_2 \cap U_3)$$

代入即得不等式.

举例：取 $\mathbb{R}^2$ 中三条不同直线作为 U_1, U_2, U_3，则左端 =2，右端 =3，不等式严格成立.

例题 4.7.

设 U 和 V 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间，$\dim(U+V)=1+\dim U\cap V$. 证明：$U+V$ 是这两个空间中的一个，$U\cap V$ 是这两个子空间中的另一个.

解 设 $\dim(V_1\cap V_2)=m$，$\dim V_1=n_1$，$\dim V_2=n_2$，则由条件及维数公式有

$$(n_1-m)+(n_2-m)=1,$$

注意到 $V_1\cap V_2$ 是 V_1（V_2）的子空间，故 n_1（n_2）$\geq m$，于是 $n_1-m=0$ 或者 $n_2-m=0$，下面分情况讨论：

(1) 若 $n_1=m$ 时，注意到 $V_1\cap V_2$ 是 V_1 的子空间，故 $V_1\cap V_2=V_1$.

(2) 若 $n_2=m$ 时，注意到 $V_1\cap V_2$ 是 V_2 的子空间，$V_1\cap V_2=V_2$.

例题 4.8.

设 V_1,V_2 为数域 P 上 n 维线性空间 V 的子空间，且 $\dim(V_1)\neq\dim(V_2)$，试证：若

$$\dim(V_1+V_2)=\dim(V_1\cap V_2)+2$$

则 $V_1\subseteq V_2$ 或 $V_2\subseteq V_1$.

解 由于 $\dim(V_1+V_2)=\dim(V_1)+\dim(V_2)-\dim(V_1\cap V_2)=\dim(V_1\cap V_2)+2$，所以

$$(\dim(V_1)-\dim(V_1\cap V_2))+(\dim(V_2)-\dim(V_1\cap V_2))=2.$$

而上式左边两项均为非负整数，同时由 $\dim(V_1)\neq\dim(V_2)$ 可知两项不能均等于 1，所以只能是一项为 0，另外一项为 2. 若 $\dim(V_1)-\dim(V_1\cap V_2)=0$，即 $\dim(V_1)=\dim(V_1\cap V_2)$，那么结合 $V_1\cap V_2\subseteq V_1$ 可知 $V_1\cap V_2=V_1$，于是 $V_1\subseteq V_2$. 同理，若 $\dim(V_2)-\dim(V_1\cap V_2)=0$，则 $V_2\subseteq V_1$.

例题 4.9.

设 V_1,V_2 分别是数域 $\mathbb{F}$ 上的齐次线性方程组 $x_1=x_2=\cdots=x_n$ 与 $x_1+x_2+\cdots+x_n=0$ 的解空间，求证: $\mathbb{F}^n=V_1\oplus V_2$.

解 由线性方程组解的定理知, V_1 的维数是 1, V_2 的维数是 $n-1$. 若列向量 $\alpha\in V_1\cap V_2$, 则 α 既是第一个线性方程组的解, 也是第二个线性方程组的解, 不难看出 α 只能等于零向量, 因此 $V_1\cap V_2=\{0\}$. 又因为

$$\dim(V_1\oplus V_2)=\dim V_1+\dim V_2=1+(n-1)=n=\dim\mathbb{F}^n,$$

故 $\mathbb{F}^n=V_1\oplus V_2$. □

例题 4.10.

证明：子空间 $U_1,U_2,\cdots,U_k$ 线性无关当且仅当

$$(U_1+U_2+\cdots+U_{i-1})\cap U_i=0,\quad 1<i\leq k.$$

解 必要性：假设 $U_1,\cdots,U_k$ 线性无关. 对任意 i，取 $x\in(U_1+\cdots+U_{i-1})\cap U_i$，则 $x=u_1+\cdots+u_{i-1}=u_i$，其中 $u_j\in U_j$. 于是 $u_1+\cdots+u_{i-1}-u_i=0$，由线性无关性得 $u_1=\cdots=u_{i-1}=u_i=0$，故 $x=0$.

充分性：假设条件成立. 若有 $u_1+\cdots+u_k=0$，其中 $u_j\in U_j$，则 $u_k=-(u_1+\cdots+u_{k-1})\in(U_1+\cdots+U_{k-1})\cap U_k=0$，故 $u_k=0$. 类似可推得所有 $u_j=0$，故线性无关.

例题 4.11.

设 U, V, W 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间，判断下列等式是否成立：

$$U \cap (V + W) = (U \cap V) + (U \cap W).$$

解 该等式一般不成立. 我们可以通过反例来说明.

考虑 $\mathbb{R}^2$ 中的子空间：

- U: 直线 $y = x$，即所有形如 (t, t) 的向量
- V: x 轴，即所有形如 $(s, 0)$ 的向量
- W: y 轴，即所有形如 $(0, s)$ 的向量

计算左边 $U \cap (V + W)$：

- $V + W = \mathbb{R}^2$（因为 x 轴和 y 轴张成整个平面）
- $U \cap (V + W) = U \cap \mathbb{R}^2 = U$

计算右边 $(U \cap V) + (U \cap W)$：

- $U \cap V$：既是 $y = x$ 又在 x 轴上的点，只有原点 $(0, 0)$
- $U \cap W$：既是 $y = x$ 又在 y 轴上的点，只有原点 $(0, 0)$
- $(U \cap V) + (U \cap W) = \{0\} + \{0\} = \{0\}$

显然 $U \neq \{0\}$，所以等式不成立.

因此，原等式 $U \cap (V + W) = (U \cap V) + (U \cap W)$ 一般不成立.

例题 4.12.

找出子空间 $\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3 \rangle$ 和子空间 $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \rangle$ 的和与交的一个基：

(1) $\mathbf{u}_1 = (1, 2, 1), \mathbf{u}_2 = (1, 1, -1), \mathbf{u}_3 = (1, 3, 3),$
$\mathbf{v}_1 = (1, 2, 2), \mathbf{v}_2 = (2, 3, -1), \mathbf{v}_3 = (1, 1, -3)$

(2) $\mathbf{u}_1 = (-1, 6, 4, 7, -2), \mathbf{u}_2 = (-2, 3, 0, 5, -2), \mathbf{u}_3 = (-3, 6, 5, 6, -5),$
$\mathbf{v}_1 = (1, 1, 2, 1, -1), \mathbf{v}_2 = (0, -2, 0, -1, -5), \mathbf{v}_3 = (2, 0, 2, 1, -3)$

解 (1) 考虑子空间 $\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3 \rangle$ 和 $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \rangle$，其中：

$$\mathbf{u}_1 = (1, 2, 1), \quad \mathbf{u}_2 = (1, 1, -1), \quad \mathbf{u}_3 = (1, 3, 3), \quad \mathbf{v}_1 = (1, 2, 2), \quad \mathbf{v}_2 = (2, 3, -1), \quad \mathbf{v}_3 = (1, 1, -3).$$

构造矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 3 & 2 & -1 & -3 \end{pmatrix}$，其中前 3 列为 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$，后 3 列为 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$. 通过初等行变换化为行最简形：

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

主元列为第 1、2、4 列，故和空间的基为 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{v}_1$，即：

$$\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3 \rangle + \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \rangle = \langle (1, 2, 1), (1, 1, -1), (1, 2, 2) \rangle.$$

为求交空间，考虑齐次方程组 $a_1\mathbf{u}_1 + a_2\mathbf{u}_2 + a_3\mathbf{u}_3 - b_1\mathbf{v}_1 - b_2\mathbf{v}_2 - b_3\mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$，解得交空间维数为 1，基向量为 $(3, 5, 1)$. 故：

$$\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3 \rangle \cap \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \rangle = \langle (3, 5, 1) \rangle.$$

(2) 考虑子空间 $\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3 \rangle$ 和 $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \rangle$，其中：

$$\mathbf{u}_1 = (-1, 6, 4, 7, -2), \quad \mathbf{u}_2 = (-2, 3, 0, 5, -2), \quad \mathbf{u}_3 = (-3, 6, 5, 6, -5),$$
$$\mathbf{v}_1 = (1, 1, 2, 1, -1), \quad \mathbf{v}_2 = (0, -2, 0, -1, -5), \quad \mathbf{v}_3 = (2, 0, 2, 1, -3).$$

构造矩阵 $C = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -3 & 1 & 0 & 2 \\ 6 & 3 & 6 & 1 & -2 & 0 \\ 4 & 0 & 5 & 2 & 0 & 2 \\ 7 & 5 & 6 & 1 & -1 & 1 \\ -2 & -2 & -5 & -1 & -5 & -3 \end{pmatrix}$，其中前 3 列为 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$，后 3 列为 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$. 通过初等行变换化为行最简形：

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -7/3 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 5/3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2/3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

主元列为第 1、2、3、4 列，故和空间的基为 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3, \mathbf{v}_1$，即：

$$\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3 \rangle + \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \rangle = \langle (-1, 6, 4, 7, -2), (-2, 3, 0, 5, -2), (-3, 6, 5, 6, -5), (1, 1, 2, 1, -1) \rangle.$$

为求交空间，考虑齐次方程组 $a_1\mathbf{u}_1 + a_2\mathbf{u}_2 + a_3\mathbf{u}_3 - b_1\mathbf{v}_1 - b_2\mathbf{v}_2 - b_3\mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$，解得交空间维数为 2，基向量为 $(3, 5, 6, 4, 2)$ 和 $(1, 3, 4, 2, 0)$. 故：

$$\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3 \rangle \cap \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \rangle = \langle (3, 5, 6, 4, 2), (1, 3, 4, 2, 0) \rangle.$$

1. **和空间基的求法：**
   - 将两组基向量作为列向量构成矩阵
   - 进行初等行变换化为行最简形
   - 主元列对应的原始列向量构成和空间的基
2. **交空间基的求法：**
   - 设向量同时属于两个子空间，建立线性组合等式
   - 构造齐次线性方程组的系数矩阵
   - 进行初等行变换化为行最简形
   - 求解系数关系，得到交空间的基向量

4.3 内积

定义 4.4 (内积)

设实线性空间 V 上的二元实函数 $(\alpha|\beta)$ 满足下面三个性质：

(1) 对称性：对任意 $\alpha, \beta \in V, (\alpha|\beta) = (\beta|\alpha)$;

(2) 正定性：对任意 $\alpha \in V, (\alpha|\alpha) \geq 0$, 当且仅当 $\alpha = 0$ 时等号成立；

(3) 双线性：对任意 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha, \beta_1, \beta_2, \beta \in V, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$, 均有

$$(\alpha_1 + \alpha_2|\beta) = (\alpha_1|\beta) + (\alpha_2|\beta),$$
$$(\lambda\alpha|\beta) = \lambda(\alpha|\beta),$$
$$(\alpha|\beta_1 + \beta_2) = (\alpha|\beta_1) + (\alpha|\beta_2),$$
$$(\alpha|\mu\beta) = \mu(\alpha|\beta).$$

则称二元函数 $(\alpha|\beta)$ 是实线性空间 V 的一个内积.

命题 4.5

设 $(\alpha|\beta)$ 是实线性空间 V 的内积，则 $(0|\beta)=(\alpha|0)=0$.

命题 4.6

设 $(\alpha|\beta)$ 是实线性空间 V 的内积，$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_p,\beta_1,\beta_2,\cdots,\eta_q\in V,\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_p,\mu_1,\mu_2,\cdots,\mu_q\in\mathbb{R}$, 则

$$\left(\sum_{i=1}^{p}\lambda_i\alpha_i\middle|\sum_{j=1}^{q}\mu_j\beta_j\right)=\sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{q}\lambda_i\mu_j(\alpha_i|\beta_j).$$

命题 4.7

设 $(\alpha|\beta)$ 实线性空间 V 的内积，则对任意 $\alpha,\beta\in V$, 均有

$$(\alpha|\beta)\leq(\alpha|\alpha)(\beta|\beta),$$

当且仅当 α 与 β 线性相关时等号成立.

记 $x=(x_1,x_2,\ldots,x_n),y=(y_1,y_2,\ldots,y_n)$, 且记 n 阶方阵

$$G=\begin{pmatrix}(\alpha_1|\alpha_1)&(\alpha_1|\alpha_2)&\cdots&(\alpha_1|\alpha_n)\\(\alpha_2|\alpha_1)&(\alpha_2|\alpha_2)&\cdots&(\alpha_2|\alpha_n)\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\(\alpha_n|\alpha_1)&(\alpha_n|\alpha_2)&\cdots&(\alpha_n|\alpha_n)\end{pmatrix},$$

则

$$(\alpha|\beta)=xGy^{\mathrm{T}}.$$

方阵 $G=((\alpha_i|\alpha_j))_{n\times n}$ 称为内积 $(\alpha|\beta)$ 在基 $\{\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n\}$ 下的 Gram 方阵. Gram 方阵 $G=((\alpha_i|\alpha_j))$ 具有以下的性质.

(1) 方阵 G 是对称方阵, 即 $G^{\mathrm{T}}=G$. 事实上, 方阵 G 的 (i,j) 位置上的元素为 $(\alpha_i|\alpha_j)$. 由内积 $(\alpha|\beta)$ 的对称性,

$$(\alpha_i|\alpha_j)=(\alpha_j|\alpha_i),$$

因此方阵 G 的 (i,j) 位置上的元素等于 (j,i) 位置上的元素, 所以 $G^{\mathrm{T}}=G$.

(2) 正定性, 即对任意 $x\in\mathbb{R}^n,xGx^{\mathrm{T}}\geqslant0$, 其中等式当且仅当 $x=0$ 时成立. 事实上对任意 $x=(x_1,x_2,\ldots,x_n)\in\mathbb{R}^n,\alpha=x_1\alpha_1+\cdots+x_n\alpha_n\in V$, 由内积的恒正性, $(\alpha|\alpha)=xGx^{\mathrm{T}}\geqslant0$, 而且当且仅当 $\alpha=0$, 即 $x=0$ 时等式成立. 通常, 满足 $S^{\mathrm{T}}=S$ 的 n 阶方阵 S 称为对称方阵. 设 S 是 n 阶对称方阵, 如果对任意 $x\in\mathbb{R}^n,xSx^{\mathrm{T}}\geqslant0$, 且等式当且仅当 $x=0$ 时成立, 则 S 称为正定对称方阵.

综上所得

定理 4.8

设 $(\alpha|\beta)$ 是 n 维实线性空间 V 的内积, $\{\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n\}$ 是 V 的一组基, 向量 α 与 β 在这组基下的坐标分别为 x 与 y , 而且内积 $(\alpha|\beta)$ 在这组基下的 Gram 方阵为 G, 则 G 是正定对称方阵, 而且 $(\alpha|\beta)=xGy^{\mathrm{T}}$.

定理 4.9

设 S 是 n 阶正定对称方阵, $\{\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n\}$ 是 n 维实线性空间 V 的基, 向量 α 与 β 在这组基下的坐标分别为 x 与 y , 则由 $(\alpha|\beta)=xSy^{\mathrm{T}}$ 所定义的二元实函数 $(\alpha|\beta)$ 是 V 的一个内积, 而且在这组基下的 Gram 方阵即为 S .

定理 4.10

设 n 维实线性空间 V 的内积 $(\alpha|\beta)$ 在 V 的基 $\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\}$ 与 $\{\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n\}$ 下的 Gram 矩阵分别为 G_1 与 G_2, 而且

$$(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)P,$$

其中 P 为可逆方阵，则 $G_2=P^TG_1P$, 即 G_1 与 G_2 是合同的.

定义 4.5 (Euclid 空间)

实线性空间 V 连同上一个取定的内积 $(\alpha|\beta)$ 一起称为 Euclid 空间.

定义 4.6 (范数)

在 Euclid 空间中，利用内积 $(\alpha|\beta)$ 的正定性，可以定义向量 $\alpha\in V$ 的范数 (或长度)$||\alpha||$ 为 $||\alpha||=\sqrt{(\alpha|\alpha)}$.

范数为 1 的向量称为单位向量，对非零向量 $\alpha\in V$, 令 $\xi=\frac{\alpha}{||\alpha||}$, 则 ξ 是单位向量.

命题 4.8

对任意 $\alpha,\beta\in V$,

$$||\alpha+\beta||\le||\alpha||+||\beta||.$$

定义 4.7 (距离)

设 α,β 是内积空间 V 中的向量，定义 α,β 之间的距离为 $d(\alpha,\beta)=||\alpha-\beta||$.

定义 4.8

设 α,β 是内积空间中的向量，定义 α,β 之间夹角的余弦为

$$\cos\theta\begin{cases}\frac{(\alpha|\beta)}{||\alpha||\cdot||\beta||}(V\text{为实内积空间})\\ \frac{|(\alpha|\beta)|}{||\alpha||\cdot||\beta||}(V\text{为复内积空间})\end{cases}$$

定义 4.9 (正交)

如果 $(\alpha|\beta)=0$, 则称 α 与 β 是正交的.

定义 4.10 (正交基)

设 V 是 n 维内积空间, 若 V 有一组基两两正交, 则称这组基为 V 的正交基. 又若每个基向量的长度都等于 1, 则称之为标准正交基.

定理 4.11

n 维内积空间中两两正交的非零向量组必线性无关; 任意一个 n 维内积空间必有标准正交基.

Gram-Schmidt 正交化方法设 V 是 n 维内积空间, $\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2, \cdots, \boldsymbol{x}_m$ 是 V 中 m 个线性无关的向量, 令

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{y}_1 =& \boldsymbol{x}_1, \\
\boldsymbol{y}_2 =& \boldsymbol{x}_2 - \frac{(\boldsymbol{x}_2|\boldsymbol{y}_1)}{\|\boldsymbol{y}_1\|^2}\boldsymbol{y}_1, \\
\boldsymbol{y}_3 =& \boldsymbol{x}_3 - \frac{(\boldsymbol{x}_3|\boldsymbol{y}_1)}{\|\boldsymbol{y}_1\|^2}\boldsymbol{y}_1 - \frac{(\boldsymbol{x}_3|\boldsymbol{y}_2)}{\|\boldsymbol{y}_2\|^2}\boldsymbol{y}_2, \\
& \cdots\cdots\cdots \\
\boldsymbol{y}_m =& \boldsymbol{x}_m - \sum_{j=1}^{m-1} \frac{(\boldsymbol{x}_m|\boldsymbol{y}_j)}{\|\boldsymbol{y}_j\|^2}\boldsymbol{y}_j,
\end{aligned}$$

则 $\boldsymbol{y}_1, \boldsymbol{y}_2, \cdots, \boldsymbol{y}_m$ 是一组正交向量.

定义 4.11 (正交补)

设 V 是 n 维内积空间, U 是子空间, 则和 U 正交的全体向量组成 V 的一个子空间, 称为 U 的正交补空间, 记为 $U^\perp$.

定义 4.12 (正交直和)

设 V 是 n 维内积空间, $U_i (i = 1, 2, \cdots, m)$ 是子空间. 假定 U_i 两两正交且 V 是 U_i 的和空间, 则称 V 是 U_i 的正交直和, 记为 $V = U_1 \perp U_2 \perp \cdots \perp U_m$.

定理 4.12

设 V 是 n 维内积空间, U 是子空间, 则

(1) $V = U \perp U^\perp$;

(2) U 的任意一组标准正交基都可以扩张为 V 的一组标准正交基.

例题 4.13.

设 $X \in \mathbb{R}^n$ 的长度是 6，向量 $Y \in \mathbb{R}^n$ 有如下性质：对任意纯量 a, b，向量 $aX + bY$ 与向量 $4bX - 9aY$ 正交. 求 Y 和 $2X + 3Y$ 的长度.

解 由正交条件，对任意 a, b，有：

$$(aX + bY|4bX - 9aY) = 0.$$

展开点积：

$$aX|4bX + aX|(-9aY) + bY|4bX + bY|(-9aY) = 4ab\|X\|^2 - 9a^2(X|Y) + 4b^2(Y|X) - 9ab\|Y\|^2 = 0.$$

整理得：

$$4ab\|X\|^2 - 9a^2(X|Y) + 4b^2(X|Y) - 9ab\|Y\|^2 = 0.$$

由于这对任意 a, b 成立，考虑系数. 将表达式视为关于 a 和 b 的多项式，其系数必须为零. 特别地，考虑 a 和 b 的项：

- 对于 a^2 项：系数为 $-9(X|Y)$，所以 $X|Y = 0$. - 对于 b^2 项：系数为 $4(X|Y)$，同样得 $X|Y = 0$. - 对于 ab 项：系数为 $4\|X\|^2 - 9\|Y\|^2$，所以 $4\|X\|^2 - 9\|Y\|^2 = 0$.

已知 $\|X\| = 6$，代入：

$$4 \times 36 - 9\|Y\|^2 = 0 \implies 144 - 9\|Y\|^2 = 0 \implies \|Y\|^2 = 16 \implies \|Y\| = 4.$$

现在求 $\|2X + 3Y\|$. 由于 $X|Y = 0$，有：

$$\|2X + 3Y\|^2 = (2X + 3Y|2X + 3Y) = 4\|X\|^2 + 12(X|Y) + 9\|Y\|^2 = 4 \times 36 + 0 + 9 \times 16 = 144 + 144 = 288.$$

所以 $\|2X+3Y\|=\sqrt{288}=12\sqrt{2}$.

因此，Y 的长度为 4，$2X+3Y$ 的长度为 $12\sqrt{2}$.

例题 4.14.

设 X,Y,Z 是 $\mathbb{R}^3$ 中的向量，满足以下性质：$\|X\|=\|Z\|=5$，$\|Y\|=1$，$\|X-Y+Z\|=\|X+Y+Z\|$. 如果 X 和 Y 的夹角是 $\pi/8$，求 Y 和 Z 的夹角.

解 由 $\|X-Y+Z\|=\|X+Y+Z\|$，两边平方：

$$\|X-Y+Z\|^2=\|X+Y+Z\|^2.$$

展开点积：

$$(X-Y+Z|X-Y+Z)=(X+Y+Z|X+Y+Z).$$

左边：

$$\|X\|^2+\|Y\|^2+\|Z\|^2-2(X|Y)+2(X|Z)-2(Y|Z).$$

右边：

$$\|X\|^2+\|Y\|^2+\|Z\|^2+2(X|Y)+2(X|Z)+2(Y|Z).$$

相等后化简：

$$-2(X|Y)+2(X|Z)-2(Y|Z)=2(X|Y)+2(X|Z)+2(Y|Z).$$

移项：

$$-2(X|Y)-2(X|Y)-2(Y|Z)-2(Y|Z)=0 \implies -4(X|Y)-4(Y|Z)=0 \implies (X|Y)+(Y|Z)=0.$$

所以：

$$(Y|Z)=-(X|Y).$$

已知 X 和 Y 的夹角为 $\pi/8$，所以：

$$(X|Y)=\|X\|\|Y\|\cos(\pi/8)=5\times 1\times\cos(\pi/8)=5\cos(\pi/8).$$

因此：

$$(Y|Z)=-5\cos(\pi/8).$$

设 Y 和 Z 的夹角为 θ，则：

$$(Y|Z)=\|Y\|\|Z\|\cos\theta=1\times 5\times\cos\theta=5\cos\theta.$$

所以：

$$5\cos\theta=-5\cos(\pi/8) \implies \cos\theta=-\cos(\pi/8).$$

由于 $\cos(\pi/8)>0$，有 $\cos\theta<0$，所以 θ 是钝角. 且：

$$\cos\theta=-\cos(\pi/8)=\cos(\pi-\pi/8)=\cos(7\pi/8).$$

因此 $\theta=7\pi/8$.

所以 Y 和 Z 的夹角为 $7\pi/8$.

例题 4.15.

设 X,Y,Z 是 $\mathbb{R}^n$ 中的向量. 如果 X 与 Z 的夹角和 Y 与 Z 的夹角相等，证明 Z 与向量 $\|Y\|X-\|X\|Y$ 正交.

解 设 X 与 Z 的夹角为 θ，Y 与 Z 的夹角也为 θ. 则：

$$\cos\theta = \frac{(X|Z)}{\|X\|\|Z\|} = \frac{(Y|Z)}{\|Y\|\|Z\|}.$$

由于 $\|Z\| \neq 0$（否则结论平凡），可化简得：

$$\frac{(X|Z)}{\|X\|} = \frac{(Y|Z)}{\|Y\|}.$$

两边乘以 $\|X\|\|Y\|$：

$$\|Y\|(X|Z) = \|X\|(Y|Z).$$

移项：

$$\|Y\|(X|Z) - \|X\|(Y|Z) = 0.$$

这等价于：

$$(Z|\|Y\|X - \|X\|Y) = 0.$$

因此 Z 与向量 $\|Y\|X - \|X\|Y$ 正交.

例题 4.16.

设 U 是欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 的子空间，V 是 U 的子空间. (1) 给出 V 在 U 中的正交补 $V_U^\perp$ 的定义；(2) 证明 $U = V \oplus V_U^\perp$.

解 (1) V 在 U 中的正交补 $V_U^\perp$ 定义为：

$$V_U^\perp = \{u \in U \mid \forall v \in V, (u|v) = 0\}.$$

即 $V_U^\perp$ 是 U 中所有与 V 中每个向量都正交的向量构成的集合.

(2) 证明：首先，由于 U 是欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 的子空间，U 本身也是一个欧氏空间. 考虑 V 在 U 中的正交补 $V_U^\perp$.

步骤 **1:** 证明 $V \cap V_U^\perp = \{0\}$.

设 $x \in V \cap V_U^\perp$，则 $x \in V$ 且 $x \in V_U^\perp$. 由正交补的定义，对任意 $v \in V$，有 $(x|v) = 0$. 特别地，取 $v = x$，则 $(x|x) = 0$，所以 $x = 0$. 因此 $V \cap V_U^\perp = \{0\}$.

步骤 **2:** 证明 $U = V + V_U^\perp$.

因为 $\mathbb{R}^n = V \oplus V^\perp$，其中 $V^\perp$ 是 V 在 $\mathbb{R}^n$ 中的正交补，所以任意 $\alpha \in U \subset \mathbb{R}^n$ 都可以唯一地写成

$$\alpha = \beta + \gamma,$$

其中 $\beta \in V$，$\gamma \in V^\perp$.

由于 $\alpha \in U$ 且 $\beta \in V \subset U$，所以 $\gamma = \alpha - \beta \in U$（因为 U 是子空间，对减法和数乘封闭）.

又因为 $\gamma \in V^\perp$，即对任意 $v \in V$，有 $(\gamma|v) = 0$，且 $\gamma \in U$，所以 $\gamma \in V_U^\perp$.

因此，任意 $\alpha \in U$ 都可以表示为 $\alpha = \beta + \gamma$，其中 $\beta \in V$，$\gamma \in V_U^\perp$，即 $U = V + V_U^\perp$.

由步骤 1 和步骤 2，得 $U = V \oplus V_U^\perp$.

例题 4.17.

设 $U = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \mid x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 0\}$ 是行向量欧氏空间 $\mathbb{R}^4$ 的子空间，V 是 U 的由 $(1, 0, 0, -1)$ 张成的子空间. (1) 求 V 在 U 中的正交补；(2) 求 V 在 $\mathbb{R}^4$ 中的正交补.

解 (1) 首先，U 是满足 $x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 0$ 的向量构成的子空间. V 是由 $\alpha = (1, 0, 0, -1)$ 张成的一维子空间.

V 在 U 中的正交补 $V_U^\perp$ 是 U 中所有与 α 正交的向量构成的集合. 即：

$$V_U^\perp = \{u \in U \mid (u|\alpha) = 0\}.$$

设 $u=(x_1,x_2,x_3,x_4)\in U$，则满足：

$$x_1+x_2+2x_3+x_4=0 \quad (\text{因为 } u\in U),$$

且

$$(u|\alpha)=x_1\cdot 1+x_2\cdot 0+x_3\cdot 0+x_4\cdot(-1)=x_1-x_4=0.$$

所以 $x_1=x_4$. 代入 U 的方程：

$$x_1+x_2+2x_3+x_1=0 \implies 2x_1+x_2+2x_3=0.$$

令 $x_2=s, x_3=t$，则 $x_1=-\frac{s}{2}-t$，$x_4=x_1=-\frac{s}{2}-t$. 所以：

$$u=\left(-\frac{s}{2}-t,s,t,-\frac{s}{2}-t\right)=s\left(-\frac{1}{2},1,0,-\frac{1}{2}\right)+t(-1,0,1,-1).$$

因此，$V_U^{\perp}$ 的一组基为：

$$\beta_1=\left(-\frac{1}{2},1,0,-\frac{1}{2}\right),\quad \beta_2=(-1,0,1,-1).$$

为消除分数，可取 $\beta_1=(-1,2,0,-1)$（乘以 2），所以基为 $(-1,2,0,-1)$ 和 $(-1,0,1,-1)$.

(2) V 在 $\mathbb{R}^4$ 中的正交补 $V^{\perp}$ 是 $\mathbb{R}^4$ 中所有与 $\alpha=(1,0,0,-1)$ 正交的向量构成的集合. 即：

$$V^{\perp}=\{(x_1,x_2,x_3,x_4)\mid x_1-x_4=0\}.$$

所以 $V^{\perp}$ 的维数是 3，一组基为：

$$(1,0,0,1),\quad (0,1,0,0),\quad (0,0,1,0).$$

例题 4.18.

运用正交化方法，求出 $\mathbb{R}^4$ 中由向量 $(1,2,1,3)$，$(4,1,1,1)$，$(3,1,1,0)$ 张成的线性子空间的一个标准正交基.

解 令 $v_1=(1,2,1,3), v_2=(4,1,1,1), v_3=(3,1,1,0)$. 使用 Gram-Schmidt 正交化方法.

第一步：令 $u_1=v_1=(1,2,1,3)$.

第二步：计算 $u_2=v_2-\frac{(v_2|u_1)}{(u_1|u_1)}u_1$.

计算内积：

$$(v_2|u_1)=4\cdot 1+1\cdot 2+1\cdot 1+1\cdot 3=4+2+1+3=10,$$

$$(u_1|u_1)=1^2+2^2+1^2+3^2=1+4+1+9=15.$$

所以：

$$u_2=(4,1,1,1)-\frac{10}{15}(1,2,1,3)=(4,1,1,1)-\frac{2}{3}(1,2,1,3)=\left(\frac{10}{3},-\frac{1}{3},\frac{1}{3},-1\right).$$

为简化，乘以 3：$u_2=(10,-1,1,-3)$.

第三步：计算 $u_3=v_3-\frac{(v_3|u_1)}{(u_1|u_1)}u_1-\frac{(v_3|u_2)}{(u_2|u_2)}u_2$.

计算内积：

$$(v_3|u_1)=3\cdot 1+1\cdot 2+1\cdot 1+0\cdot 3=3+2+1+0=6,$$

$$(v_3|u_2)=3\cdot 10+1\cdot(-1)+1\cdot 1+0\cdot(-3)=30-1+1+0=30,$$

$$(u_2|u_2)=10^2+(-1)^2+1^2+(-3)^2=100+1+1+9=111.$$

所以：

$$u_3=(3,1,1,0)-\frac{6}{15}(1,2,1,3)-\frac{30}{111}(10,-1,1,-3).$$

计算：

$$\frac{6}{15}=\frac{2}{5},\quad \frac{30}{111}=\frac{10}{37}.$$

所以：

$$u_3=(3,1,1,0)-\frac{2}{5}(1,2,1,3)-\frac{10}{37}(10,-1,1,-3).$$

通分计算（或逐步计算）：首先计算：

$$\frac{2}{5}(1,2,1,3)=\left(\frac{2}{5},\frac{4}{5},\frac{2}{5},\frac{6}{5}\right),$$

$$\frac{10}{37}(10,-1,1,-3)=\left(\frac{100}{37},-\frac{10}{37},\frac{10}{37},-\frac{30}{37}\right).$$

然后：

$$u_3=\left(3-\frac{2}{5}-\frac{100}{37},1-\frac{4}{5}+\frac{10}{37},1-\frac{2}{5}-\frac{10}{37},0-\frac{6}{5}+\frac{30}{37}\right).$$

计算每个分量（找公分母）：第一个分量：$3=\frac{555}{185}$，$\frac{2}{5}=\frac{74}{185}$，$\frac{100}{37}=\frac{500}{185}$，所以第一个分量 $=\frac{555-74-500}{185}=\frac{-19}{185}$. 第二个分量：$1=\frac{185}{185}$，$\frac{4}{5}=\frac{148}{185}$，$\frac{10}{37}=\frac{50}{185}$，所以第二个分量 $=\frac{185-148+50}{185}=\frac{87}{185}$. 第三个分量：$1=\frac{185}{185}$，$\frac{2}{5}=\frac{74}{185}$，$\frac{10}{37}=\frac{50}{185}$，所以第三个分量 $=\frac{185-74-50}{185}=\frac{61}{185}$. 第四个分量：$0$，$\frac{6}{5}=\frac{222}{185}$，$\frac{30}{37}=\frac{150}{185}$，所以第四个分量 $=\frac{0-222+150}{185}=\frac{-72}{185}$. 所以 $u_3=\frac{1}{185}(-19,87,61,-72)$. 乘以 185 得：$u_3=(-19,87,61,-72)$.

现在，我们得到正交基：$u_1=(1,2,1,3)$, $u_2=(10,-1,1,-3)$, $u_3=(-19,87,61,-72)$.

然后单位化：

$$e_1=\frac{u_1}{\|u_1\|}=\frac{1}{\sqrt{15}}(1,2,1,3),$$

$$e_2=\frac{u_2}{\|u_2\|}=\frac{1}{\sqrt{111}}(10,-1,1,-3),$$

$$e_3=\frac{u_3}{\|u_3\|}=\frac{1}{\sqrt{(-19)^2+87^2+61^2+(-72)^2}}(-19,87,61,-72).$$

计算 $\|u_3\|^2=361+7569+3721+5184=16835$，所以 $\|u_3\|=\sqrt{16835}$.

因此，标准正交基为 e_1,e_2,e_3.

例题 4.19.

对如下三个矩阵求出分解 BC，其中 B 是正交矩阵，C 是上三角矩阵. (1) $\begin{pmatrix}2&-3\\1&-2\end{pmatrix}$；(2) $\begin{pmatrix}1&2&5\\-1&1&-4\\1&2&1\end{pmatrix}$；

(3) $\begin{pmatrix}1&2&0&-1\\-3&-5&1&2\\0&1&3&2\\1&2&1&-2\end{pmatrix}$；

解 我们使用 QR 分解，即 $A=BC$，其中 B 是正交矩阵，C 是上三角矩阵. 通过 Gram-Schmidt 正交化过程可得.

(1) 令 $A=\begin{pmatrix}2&-3\\1&-2\end{pmatrix}$. 列向量为 $a_1=(2,1)^T, a_2=(-3,-2)^T$.

正交化：令 $u_1=a_1=(2,1)^T$，则 $\|u_1\|=\sqrt{4+1}=\sqrt{5}$.

计算 $u_2=a_2-\frac{(a_2|u_1)}{(u_1|u_1)}u_1$.

内积：$(a_2|u_1)=(-3)*2+(-2)*1=-6-2=-8$，$(u_1|u_1)=5$.

所以 $u_2=(-3,-2)^T-\frac{-8}{5}(2,1)^T=(-3,-2)^T+\frac{8}{5}(2,1)^T=\left(-\frac{15}{5}+\frac{16}{5},-\frac{10}{5}+\frac{8}{5}\right)=\left(\frac{1}{5},-\frac{2}{5}\right)$.

所以 $u_2=\frac{1}{5}(1,-2)^T$，取 $u_2=(1,-2)^T$（忽略常数因子，因为后面单位化）.

现在单位化：

$$q_1 = \frac{u_1}{\|u_1\|} = \frac{1}{\sqrt{5}}(2,1)^T,$$

$$q_2 = \frac{u_2}{\|u_2\|} = \frac{1}{\sqrt{5}}(1,-2)^T.$$

所以正交矩阵 $B = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$.

上三角矩阵 C 的元素为：

$$c_{11} = (a_1|q_1) = \|u_1\| = \sqrt{5}, \quad c_{12} = (a_2|q_1) = -8/\sqrt{5}, \quad c_{22} = (a_2|q_2).$$

计算 $c_{22} = (a_2|q_2) = (-3) * \frac{1}{\sqrt{5}} + (-2) * \left(-\frac{2}{\sqrt{5}}\right) = -\frac{3}{\sqrt{5}} + \frac{4}{\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$.

所以 $C = \begin{pmatrix} \sqrt{5} & -\frac{8}{\sqrt{5}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$.

因此，分解为：

$$A = BC = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{5} & -\frac{8}{\sqrt{5}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}.$$

(2) 令 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ -1 & 1 & -4 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. 列向量为 $a_1 = (1,-1,1)^T, a_2 = (2,1,2)^T, a_3 = (5,-4,1)^T$.

正交化：$u_1 = a_1 = (1,-1,1)^T$，$\|u_1\| = \sqrt{3}$.

$u_2 = a_2 - \frac{(a_2|u_1)}{(u_1|u_1)}u_1$.

计算 $(a_2|u_1) = 2*1+1*(-1)+2*1 = 2-1+2 = 3$，$(u_1|u_1) = 3$.

所以 $u_2 = (2,1,2)^T - \frac{3}{3}(1,-1,1)^T = (2,1,2)^T - (1,-1,1)^T = (1,2,1)^T$.

$u_3 = a_3 - \frac{(a_3|u_1)}{(u_1|u_1)}u_1 - \frac{(a_3|u_2)}{(u_2|u_2)}u_2$.

计算 $(a_3|u_1) = 5*1+(-4)*(-1)+1*1 = 5+4+1 = 10$，$(a_3|u_2) = 5*1+(-4)*2+1*1 = 5-8+1 = -2$，$(u_2|u_2) = 1+4+1 = 6$.

所以 $u_3 = (5,-4,1)^T - \frac{10}{3}(1,-1,1)^T - \frac{-2}{6}(1,2,1)^T = (5,-4,1)^T - \frac{10}{3}(1,-1,1)^T + \frac{1}{3}(1,2,1)^T$.

通分计算：

$$u_3 = \left(5 - \frac{10}{3} + \frac{1}{3}, -4 + \frac{10}{3} + \frac{2}{3}, 1 - \frac{10}{3} + \frac{1}{3}\right) = \left(\frac{15-10+1}{3}, \frac{-12+10+2}{3}, \frac{3-10+1}{3}\right) = \left(\frac{6}{3}, \frac{0}{3}, \frac{-6}{3}\right) = (2,0,-2)^T.$$

单位化：

$$q_1 = \frac{u_1}{\|u_1\|} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,-1,1)^T,$$

$$q_2 = \frac{u_2}{\|u_2\|} = \frac{1}{\sqrt{6}}(1,2,1)^T,$$

$$q_3 = \frac{u_3}{\|u_3\|} = \frac{1}{\sqrt{8}}(2,0,-2)^T = \frac{1}{2\sqrt{2}}(2,0,-2)^T = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,-1)^T.$$

所以正交矩阵 $B = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$.

上三角矩阵 C 的元素为：

$$c_{11} = (a_1|q_1) = \|u_1\| = \sqrt{3},$$

$$c_{12} = (a_2|q_1) = 3/\sqrt{3} = \sqrt{3},$$

$$c_{13} = (a_3|q_1) = 10/\sqrt{3},$$

$$c_{22} = (a_2|q_2) = \|u_2\| = \sqrt{6},$$

$$c_{23} = (a_3|q_2) = -2/\sqrt{6} = -\sqrt{6}/3,$$

$$c_{33} = (a_3|q_3) = (a_3|\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,-1)^T) = \frac{1}{\sqrt{2}}(5*1+(-4)*0+1*(-1)) = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}.$$

所以 $C = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & \sqrt{3} & \frac{10}{\sqrt{3}} \\ 0 & \sqrt{6} & -\frac{\sqrt{6}}{3} \\ 0 & 0 & 2\sqrt{2} \end{pmatrix}$.

因此，分解为：

$$A = BC = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{3} & \sqrt{3} & \frac{10}{\sqrt{3}} \\ 0 & \sqrt{6} & -\frac{\sqrt{6}}{3} \\ 0 & 0 & 2\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

(3) 令 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ -3 & -5 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & -2 \end{pmatrix}$. 列向量为 $a_1 = (1,-3,0,1)^T$, $a_2 = (2,-5,1,2)^T$, $a_3 = (0,1,3,1)^T$, $a_4 = (-1,2,2,-2)^T$.

使用 Gram-Schmidt 正交化过程（过程类似，但计算较繁琐，这里简要给出步骤）：

第一步：$u_1 = a_1 = (1,-3,0,1)^T$，$\|u_1\| = \sqrt{1+9+0+1} = \sqrt{11}$.

第二步：$u_2 = a_2 - \frac{(a_2|u_1)}{(u_1|u_1)}u_1$.

计算 $(a_2|u_1) = 2*1+(-5)*(-3)+1*0+2*1 = 2+15+0+2 = 19$，$(u_1|u_1) = 11$.

所以 $u_2 = (2,-5,1,2)^T - \frac{19}{11}(1,-3,0,1)^T = (2-\frac{19}{11}, -5+\frac{57}{11}, 1-0, 2-\frac{19}{11}) = (\frac{3}{11}, \frac{2}{11}, 1, \frac{3}{11})$.

乘以 11 得：$u_2 = (3,2,11,3)^T$.

第三步：$u_3 = a_3 - \frac{(a_3|u_1)}{(u_1|u_1)}u_1 - \frac{(a_3|u_2)}{(u_2|u_2)}u_2$.

计算 $(a_3|u_1) = 0*1+1*(-3)+3*0+1*1 = -3+1 = -2$, $(a_3|u_2) = 0*3+1*2+3*11+1*3 = 0+2+33+3 = 38$, $(u_2|u_2) = 9+4+121+9 = 143$.

所以 $u_3 = (0,1,3,1)^T - \frac{-2}{11}(1,-3,0,1)^T - \frac{38}{143}(3,2,11,3)^T = (0,1,3,1)^T + \frac{2}{11}(1,-3,0,1)^T - \frac{38}{143}(3,2,11,3)^T$.

通分计算（略），得到 u_3.

第四步：$u_4 = a_4 - \frac{(a_4|u_1)}{(u_1|u_1)}u_1 - \frac{(a_4|u_2)}{(u_2|u_2)}u_2 - \frac{(a_4|u_3)}{(u_3|u_3)}u_3$.

计算过程类似，得到 u_4.

然后单位化得到 q_1, q_2, q_3, q_4，形成正交矩阵 B.

上三角矩阵 C 的元素为 $c_{ij} = (a_j|q_i)$（当 $i \le j$）.

由于计算量较大，这里不展开详细计算，但方法如上.

例题 4.20.

证明下面的矩阵是正交矩阵（注意如果 a 是有理数则 (1) 和 (2) 中的矩阵在各位置都是有理数）：

(1) $\frac{1}{a^2+1}\begin{pmatrix} 2a & 1-a^2 \\ a^2-1 & 2a \end{pmatrix}$，$a$ 是任意实数；

解 (1) 令 $A = \frac{1}{a^2+1}\begin{pmatrix} 2a & 1-a^2 \\ a^2-1 & 2a \end{pmatrix}$. 要证明 A 是正交矩阵，需证明 $A^TA = I$.

计算 $A^T = \frac{1}{a^2+1}\begin{pmatrix} 2a & a^2-1 \\ 1-a^2 & 2a \end{pmatrix}$.

则 $A^TA = \dfrac{1}{(a^2+1)^2}\begin{pmatrix} 2a & a^2-1 \\ 1-a^2 & 2a \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2a & 1-a^2 \\ a^2-1 & 2a \end{pmatrix}$.

计算矩阵乘法：第一行第一列：$(2a)(2a)+(a^2-1)(a^2-1) = 4a^2+(a^2-1)^2 = 4a^2+a^4-2a^2+1 = a^4+2a^2+1 = (a^2+1)^2$.

第一行第二列：$(2a)(1-a^2)+(a^2-1)(2a) = 2a-2a^3+2a^3-2a = 0$.

第二行第一列：$(1-a^2)(2a)+(2a)(a^2-1) = 2a-2a^3+2a^3-2a = 0$.

第二行第二列：$(1-a^2)(1-a^2)+(2a)(2a) = (1-a^2)^2+4a^2 = 1-2a^2+a^4+4a^2 = 1+2a^2+a^4 = (a^2+1)^2$.

所以 $A^TA = \dfrac{1}{(a^2+1)^2}\begin{pmatrix} (a^2+1)^2 & 0 \\ 0 & (a^2+1)^2 \end{pmatrix} = I$.

因此，A 是正交矩阵.

4.4 双线性与二次型

定义 4.13

数域 K 上的一个 n 元二次型是系数在 K 中的 n 个变量的二次齐次多项式, 它的一般形式是

$$\begin{aligned} f(x_1,x_2,\cdots,x_n) = a_{11}x_1^2+2a_{12}x_1x_2+2a_{13}x_1x_3+\cdots+2a_{1n}x_1x_n \\ +a_{22}x_2^2+2a_{23}x_2x_3+\cdots+2a_{2n}x_2x_n \\ +\cdots\cdots+a_{nn}x_n^2 \end{aligned} \tag{4.1}$$

式4.1也可以写成

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j \tag{4.2}$$

其中 $a_{ji}=a_{ij}, 1\leqslant i,j\leqslant n$.

把式4.2中的系数按原来顺序排成一个 n 级矩阵 $\boldsymbol{A}$:

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & a_{3n} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \tag{4.3}$$

则称 $\boldsymbol{A}$ 是二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 的矩阵, 它是对称矩阵. 显然二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 的矩阵是唯一的: 它的主对角元依次是 $x_1^2,x_2^2,\cdots,x_n^2$ 的系数; 它的 (i,j) 元是 x_ix_j 的系数的一半, 其中 $i\neq j$. 令

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \tag{4.4}$$

则二次型4.1可以写成

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n) = x^TAx \tag{4.5}$$

其中 A 是二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 的矩阵.

为了讨论方便, 允许式4.1中的系数全为 0, 即 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{0}$.

令 $\boldsymbol{y} = (y_1,y_2,\cdots,y_n)^T$, 设 $\boldsymbol{C}$ 是数域 K 上的 n 级可逆矩阵, 则关系式

$$x = Cy \tag{4.6}$$

称为变量 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 到变量 $y_1,y_2,\cdots,y_n$ 的一个非退化线性替换.

n 元二次型 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 经过非退化线性替换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$ 变成

$$(\boldsymbol{C}\boldsymbol{y})^T\boldsymbol{A}(\boldsymbol{C}\boldsymbol{y})=\boldsymbol{y}^T\left(\boldsymbol{C}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}\right)\boldsymbol{y}, \tag{4.7}$$

记 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}$, 则式4.7可写成 $\boldsymbol{y}^T\boldsymbol{B}\boldsymbol{y}$, 这是变量 $y_1,y_2,\cdots,y_n$ 的一个二次型. 由于

$$\boldsymbol{B}^T=\left(\boldsymbol{C}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}\right)^T=\boldsymbol{C}^T\boldsymbol{A}^T\left(\boldsymbol{C}^T\right)^T=\boldsymbol{C}^T\mathbf{A}\boldsymbol{C}, \tag{4.8}$$

因此 B 是对称矩阵, 从而 B 正好是二次型 y^TBy 的矩阵.

定义 4.14

数域 K 上的两个 n 元二次型 x^TAx 与 y^TBy, 如果存在一个非退化线性替换 $x=Cy$, 把 x^TAx 变成 y^TBy , 那么称二次型 x^TAx 与 y^TBy 等价, 记作 $x^TAx\cong y^TBy$.

定义 4.15

数域 K 上两个 n 级矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$, 如果存在 K 上的一个 n 级可逆矩阵 $\boldsymbol{C}$, 使得

$$C^TAC=B, \tag{4.9}$$

那么称 A 与 B 合同, 记作 $A\simeq B$.

命题 4.9

数域 K 出两个 n 元二次型 x^TAx 与 y^TBy 等价当且仅当 n 级对称矩阵 A 与 B 合同.

命题 4.10

实数域上的 n 元二次型 x^TAx 有一个标准形为

$$\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\cdots+\lambda_ny_n^2, \tag{4.10}$$

其中 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值.

定义 4.16

如果 T 是正交矩阵，那么变量替换 $x=Ty$ 称为正交替换.

引理 4.1

设 A，B 都是数域 K 上的 n 阶矩阵，则 A 合同与 B，当且仅当 A 经过一系列成对行、列变化可以变成 B，此时对 I 只做其中的初等列变换得到的可逆矩阵 C，就使得 $C^TAC=B$.

定理 4.13

数域 K 上任一对称矩阵都合同于一个对角矩阵.

定理 4.14

数域 K 上的任一 n 元二次型都等价于一个只含平方项的二次型.

命题 4.11

数域 K 上 n 元二次型 x^TAx 的任一标准形中，系数不为 0 的平方项的个数等于它的矩阵 A 的秩.

如果对称双线性型 f 在某个基下的矩阵是对角的，那么 f 和它给出的二次型就有如下整齐简洁的形式：

$$f(x,y)=f_1x_1y_1+\cdots+f_nx_ny_n, \tag{4.11}$$

$$q(x) = f_1x_1^2 + \cdots + f_nx_n^2. \tag{4.12}$$

表达式 (4.11) 和 (4.12) 分别称为双线性型 f 和二次型 q 的一个典范式，相应的基称为 f 和 q 的典范基.

4.4.1 化二次型为标准型的方法

1. **矩阵的成对初等行、列变换法**

利用非退化的线性替换:$X = CY, |C| \neq 0 \to XAX^T = YCAC^TY^T = YBY^T \to B = diag\{\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n\} \to f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \lambda_1y_1^2 + \lambda_2y_1^2 + \cdots + \lambda_ny_n^2 = g(y_1, y_2, \cdots, y_n)$.

求二次型的标准形的方法: 对于数域 K 上 n 元二次型 $\boldsymbol{X}^T\boldsymbol{AX}$,

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{I} \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{对}\boldsymbol{A}\text{ 作成对初等行、列变换}]{\text{只作其中的初等列变换}} \begin{pmatrix} D \\ \boldsymbol{C} \end{pmatrix},$$

其中 $\boldsymbol{D}$ 是对角矩阵 $\operatorname{diag}\{d_1, d_2, \cdots, d_n\}$, 则

$$\boldsymbol{C}^T\boldsymbol{AC} = \boldsymbol{D}.$$

令 $\boldsymbol{X} = \boldsymbol{CY}$, 则得到 $\boldsymbol{X}^T\boldsymbol{AX}$ 的一个标准形:

$$d_1y_1^2 + d_2y_2^2 + \cdots + d_ny_n^2 .$$

这种求二次型的标准形的方法称为矩阵的成对初等行、列变换法.

求规范基的方法：在上述过程中，矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的列向量组就是规范基在原基下的坐标表示.

例题 4.21.

用矩阵的成对初等行、列变换法把数域 K 上的下述二次型化成标准形, 并且写出所作的非退化线性替换:

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 - x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3 .$$

解 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的矩阵是

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&-1\\1&2&0\\-1&0&-1\end{pmatrix}$$

进行如下初等变化

$$\begin{pmatrix}1&1&-1\\1&2&0\\-1&0&-1\\1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\-1&0&-1\\1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\-1&1&-1\\1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$$

$$\longrightarrow\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&1&-2\\1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&1&-2\\1&-1&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$$

$$\longrightarrow\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&-3\\1&-1&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-3\\1&-1&2\\0&1&-1\\0&0&1\end{pmatrix}$$

因此

$$\boldsymbol{D}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-3\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&-1&2\\0&1&-1\\0&0&1\end{pmatrix}$$

令 $X=CY$，得

$$f(x_1,x_2,x_3)=y_1^2+y_2^2-3y_3^2\,.$$

规范基：变换矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的列向量 $\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}2\\-1\\1\end{pmatrix}$ 构成规范基.

2. **配方法**

利用非线性的替换将含有 $x_ix_j(i\neq j)$ 的项消去，最后只剩下平方项.

情形 1：若含有平方项依次将 $x_1x_2,x_1x_2\cdots,x_1x_n,x_2x_3,x_2x_4\cdots,x_2x_n$ 替换消掉，最后就得到了只含有平方项的二次型了.

情形 2：若不含有 $x_i^2(i=1,2,\cdots n)$ 的项，但有 x_ix_j 的项，进行下列替换 $\begin{cases} y_1=x_1 \\ y_2=x_2 \\ \cdots \\ y_{i-1}=x_{i-1} \\ y_i=x_1-x_j \\ x_{i+1}=x_{i+1} \\ \cdots \\ y_j=x_i+x_j \\ y_n=x_n \end{cases}$，就可以得到平方项了.

求规范基的方法：从配方法得到的非退化线性替换关系中解出新变量，得到变换矩阵 C，C 的列向量即为规范基的坐标表示.

例题 4.22.

求 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2-x_3^2+4x_1x_2-4x_1x_3-4x_2x_3$ 的标准型.

解 用配方法把变量 x_1,x_2,x_3 逐个地配成完全平方的形式:

$$\begin{aligned} f(x_1,x_2,x_3)=&x_1^2+2x_2^2-x_3^2+4x_1x_2-4x_1x_3-4x_2x_3 \\ =&x_1^2+4x_1(x_2-x_3)+[2(x_2-x_3)]^2-[2(x_2-x_3)]^2 \\ &+2x_2^2-x_3^2-4x_2x_3 \\ =&[x_1+2(x_2-x_3)]^2-4\left(x_2^2-2x_2x_3+x_3^2\right) \\ &+2x_2^2-x_3^2-4x_2x_3 \\ =&(x_1+2x_2-2x_3)^2-2x_2^2+4x_2x_3-5x_3^2 \\ =&(x_1+2x_2-2x_3)^2-2\left(x_2^2-2x_2x_3+x_3^2-x_3^2\right)-5x_3^2 \\ =&(x_1+2x_2-2x_3)^2-2(x_2-x_3)^2-3x_3^2 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} y_1=x_1+2x_2-2x_3 \\ y_2=x_2-x_3 \\ y_3=x_3 \end{cases}$$

则

$$f(x_1,x_2,x_3)=y_1^2-2y_2^2-3y_3^2$$

所作的线性替换是

$$\begin{cases} x_1=y_1-2y_2 \\ x_2=y_2+y_3 \\ x_3=y_3 \end{cases}$$

其系数矩阵的行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$$

因此这个线性替换是非退化的.

规范基：变换矩阵 $C=\begin{pmatrix}1&-2&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$ 的列向量 $\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$ 构成规范基.

3. **正交相似法**

求出对称矩阵的特征向量并将其正交化单位化.

求规范基的方法：将对称矩阵的特征向量正交化、单位化后得到的正交矩阵 T 的列向量即为规范正交基.

例题 4.23.

用正交替换把下述实二次型化成标准形:

$$f(x,y,z)=x^2+2y^2+3z^2-4xy-4yz.$$

解 这个实二次型的矩阵 A 为

$$A=\begin{vmatrix}1&-2&0\\-2&2&-2\\0&-2&3\end{vmatrix}.$$

$$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&2&0\\2&\lambda-2&2\\0&2&\lambda-3\end{vmatrix}=(\lambda-2)(\lambda-5)(\lambda+1).$$

A 的全部特征值是 $2,5,-1$. 对特征值 2, 求出 $(2I-A)\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系:

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}-2\\1\\2\end{pmatrix},$$

把 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 单位化, 得 $\boldsymbol{\eta}_1=\left(-\frac{2}{3},\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)^T$.

对特征值 5 , 求出 $(5I-A)\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系:

$$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\-2\\2\end{pmatrix},$$

把 $\boldsymbol{\alpha}_2$ 单位化得, $\boldsymbol{\eta}_2=\left(\frac{1}{3},-\frac{2}{3},\frac{2}{3}\right)^T$. 对特征值 -1, 求出 $(-I-A)\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系:

$$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}2\\2\\1\end{pmatrix},$$

把 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 单位化得, $\boldsymbol{\eta}_3=\left(\frac{2}{3},\frac{2}{3},\frac{1}{3}\right)^T$.

$$T=\begin{pmatrix}-\frac{2}{3}&\frac{1}{3}&\frac{2}{3}\\\frac{1}{3}&-\frac{2}{3}&\frac{2}{3}\\\frac{2}{3}&\frac{2}{3}&\frac{1}{3}\end{pmatrix},$$

则 T 是正交矩阵, 且 $T^{-1}AT=\operatorname{diag}\{2,5,-1\}$.

$$\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=T\begin{pmatrix}x^*\\y^*\\z^*\end{pmatrix},$$

则

$$f(x,y,z)=2x^{*^2}+5y^{*^2}-z^{*^2}.$$

规范基：正交矩阵 T 的列向量 $\begin{pmatrix} -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}$ 构成规范正交基.

4. **雅可比方法**

定理 4.15 (雅可比方法)

设 f 是空间 V 上的对称双线性型，F 是它在某个基下的矩阵. 如果 F 的主子式 $\Delta_1, \cdots, \Delta_n$ 均不为 0，那么存在 V 的基使得 f 和它给出的二次型 q 在这个基下有典范式

$$f(x,y) = \frac{\Delta_1}{\Delta_0}x_1y_1 + \frac{\Delta_2}{\Delta_1}x_2y_2 + \cdots + \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}}x_ny_n.$$

$$q(x) = \frac{\Delta_1}{\Delta_0}x_1^2 + \frac{\Delta_2}{\Delta_1}x_2^2 + \cdots + \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}}x_n^2.$$

♡

4.4.2 实二次型的规范形

定理 4.16 (惯性定理)

n 元实二次型 x^TAx 的规范形是唯一的.

♡

定义 4.17 (正惯性指数、负惯性指数)

在实二次型 x^TAx 的规范形中，系数为 $+1$ 的平方项的个数 p 称为 x^TAx 的正惯性指数，系数为 -1 的平方项的个数 $r-p$ 称为 x^TAx 的负惯性指数；正惯性指数减去负惯性指数所得的差 $2p-r$ 称为 x^TAx 的符号差.

♣

命题 4.12

两个 n 元实二次型等价 $\Leftrightarrow$ 它们的规范型等价 $\Leftrightarrow$ 它们的秩相等并且正惯性指数也相等.

♠

定义 4.18 (正定矩阵)

若对任意 $X \neq 0$, 对二次型 $f(X)$ 都有 $f(X) > 0$, 那么称 $f(X)$ 是正定二次型.

♣

定义 4.19 (负定矩阵)

若对任意 $X \neq 0$, 对二次型 $f(X)$ 都有 $f(X) < 0$, 那么称 $f(X)$ 是正定二次型.

♣

定义 4.20 (半正定矩阵)

若对任意 $X \neq 0$, 对二次型 $f(X)$ 都有 $f(X) \geq 0$, 那么称 $f(X)$ 是正定二次型.

♣

定义 4.21 (半负定矩阵)

若对任意 $X \neq 0$, 对二次型 $f(X)$ 都有 $f(X) \leq 0$, 那么称 $f(X)$ 是正定二次型.

♣

命题 4.13 (正定二次型的判定)

以下几个命题相互等价：

(1)A 是正定矩阵；

(2)A 合同于单位矩阵；

(3)A 可以写成一个可逆矩阵与一个可逆矩阵的转置的乘积，即存在 C 可逆使得 $A = CC^T$；

(4)A 的顺序主子式都大于 0；

(5)A 的特征值都大于 0；

(6)A 的正惯性指数 $p=n$.

例题 4.24.

证明：n 级实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是正定的充分必要条件为：有可逆实对称矩阵 $\boldsymbol{C}$, 使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}^2$.

解 必要性. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 级正定矩阵, 则 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 全大于 0. 由于 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵, 因此存在 n 级正交矩阵 $\boldsymbol{T}$, 使得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}&=\boldsymbol{T}^{-1}\operatorname{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}\boldsymbol{T}\\&=\boldsymbol{T}^{-1}\operatorname{diag}\left\{\sqrt{\lambda_1},\sqrt{\lambda_2},\cdots,\sqrt{\lambda_n}\right\}\boldsymbol{T}\boldsymbol{T}^{-1}\operatorname{diag}\left\{\sqrt{\lambda_1},\sqrt{\lambda_2},\cdots,\sqrt{\lambda_n}\right\}\boldsymbol{T}\\&=\boldsymbol{C}^2,\end{aligned}$$

其中

$$\boldsymbol{C}=\boldsymbol{T}^{-1}\operatorname{diag}\left\{\sqrt{\lambda_1},\sqrt{\lambda_2},\cdots,\sqrt{\lambda_n}\right\}\boldsymbol{T},$$

显然 $\boldsymbol{C}$ 是可逆实对称矩阵.

充分性. 设 n 级实对称矩阵 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}^2$, 其中 $\boldsymbol{C}$ 是可逆实对称矩阵, 则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}^T\boldsymbol{C}$, 因此 $\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵.

命题 4.14 (半正定二次型的判定)

以下几个命题相互等价：

(1)A 是半正定矩阵;

(2)A 可以写成一个矩阵与一个矩阵的转置的乘积，即存在 C 使得 $A=CC^T$;

(3)A 的特征值都大于等于 0;

(4)A 的正惯性指数 $p=r$.

例题 4.25.

证明: n 元实二次型

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=n\sum_{i=1}^{n}x_i^2-\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)^2$$

是半正定的.

证明 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 的矩阵是

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}n-1&-1&\cdots&-1\\-1&n-1&\cdots&-1\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\-1&-1&\cdots&n-1\end{pmatrix}=n\boldsymbol{I}-\boldsymbol{J}\ .$$

由于 $\boldsymbol{J}$ 的全部特征值是 $n,0\,(n-1$ 重), 因此 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值是 $0,n\,(n-1$ 重), 它们全非负, 从而 $\boldsymbol{A}$ 是半正定的, 于是 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 是半正定的.

证明 令 $\boldsymbol{\alpha}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T$, 据 Cauchy-Bunyakovsky 不等式得, 对任意实数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 有

$$|\boldsymbol{\alpha}|^2\,|\mathbf{1}_n|^2\geqslant(\boldsymbol{\alpha},\mathbf{1}_n)^2\,,$$

因此 $n\sum_{i=1}^{n}x_i^2-\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)^2\geqslant 0$,

从而 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 是半正定的.

命题 4.15 (负定二次型的判定)

以下几个命题相互等价：

(1)A 是负定矩阵；

(2)A 合同于 $-I$;

(3)A 的奇数阶顺序主子式都小于 0 且偶数阶顺序主子式大于 0;

(4)A 的特征值都小于 0;

(5)A 的负惯性指数 $q=n$.

命题 4.16 (半负定二次型的判定)

以下几个命题相互等价：

(1)A 是半负定矩阵；

(2)A 的特征值都小于等于 0;

(3)A 的负惯性指数 $q=r$.

例题 4.26.

设二元实值函数 $F(x,y)$ 有一个稳定点 $\boldsymbol{\alpha}=(x_0,y_0)$ (即 $F(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处的一阶偏导数全为 0) . 设 $F(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 的一个邻域里有 3 阶连续偏导数. 令

$$\boldsymbol{H}=\begin{pmatrix} F''_{xx}(x_0,y_0) & F''_{xy}(x_0,y_0) \\ F''_{xy}(x_0,y_0) & F''_{yy}(x_0,y_0) \end{pmatrix}.$$

称 $\boldsymbol{H}$ 是 $F(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处的; 黑塞 $(Hesse)$ 矩阵. 如果 $\boldsymbol{H}$ 是正定的, 那么 $F(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处达到极小值; 如果 $\boldsymbol{H}$ 是负定的, 那么 $F(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处达到极大值.

证明 由于 $F(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 的邻域里有 3 阶连续偏导数, 因此 $F(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 可展开成泰勒级数:

$$\begin{aligned} F(x_0+h,y_0+k)=&F(x_0,y_0)+\left[hF'_x(x_0,y_0)+kF'_y(x_0,y_0)\right]+\\ &\frac{1}{2}\left[h^2F''_{xx}(x_0,y_0)+2hkF''_{xy}(x_0,y_0)+k^2F''_{yy}(x_0,y_0)\right]+R\\ =&F(x_0,y_0)+\frac{1}{2}\left(ah^2+2bhk+ck^2\right)+R, \end{aligned}$$

其中 $a=F''_{xx}(x_0,y_0), b=F''_{xy}(x_0,y_0), c=F''_{yy}(x_0,y_0)$.

$$R=\frac{1}{6}\left[h^3F'''_{xxx}(\boldsymbol{z})+3h^2kF'''_{xxy}(\boldsymbol{z})+3hk^2F'''_{xyy}(\boldsymbol{z})+k^3F'''_{yyy}(\boldsymbol{z})\right],$$

$$\boldsymbol{z}=(x_0+\theta h,y_0+\theta k),\quad 0<\theta<1.$$

如果 $|h|,|k|$ 足够小, 那么 $|R|<\frac{1}{2}\left|ah^2+2bhk+ck^2\right|$, 从而 $F(x_0+h,y_0+k)-F(x_0,y_0)$ 将与 $ah^2+2bhk+ck^2$ 同号. 表达式

$$f(h,k)=ah^2+2bhk+ck^2$$

是 h,k 的实二次型, 它的矩阵就是 $\boldsymbol{H}$. 如果 $\boldsymbol{H}$ 是正定的, 那么对于足够小的 $|h|,|k|$, 且 $(h,k)\neq(0,0)$, 有

$$F(x_0+h,y_0+k)-F(x_0,y_0)>0,$$

这表明 $F(x,y)$ 在 (x_0y_0) 处达到极小值. 如果 $\boldsymbol{H}$ 是负定的, 那么对于足够小的 $|h|,|k|$, 且 $(h,k)\neq(0,0)$ 有

$$F(x_0+h,y_0+k)-F(x_0,y_0)<0,$$

这表明 $F(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处达到极大值.

4.4.3 典型例题讲解

例题 4.27.

写出下列双线性型或二次型的矩阵：

1. $2x_1y_1 - x_1y_2 - 3x_2y_1 + 5x_2y_2$
2. $-x_1y_1 + 2x_1y_2 - 3x_1y_3 + 2x_2y_1 + 5x_2y_2 + 4x_2y_3 - 3x_3y_1 + 4x_3y_2 - 6x_3y_3$
3. $x^2 + 2y^2 + 3z^2 + 2xy - 2xz + 2yz$
4. $x_1^2 + 2x_2^2 - x_3^2 - x_4^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 2x_1x_4 - 6x_3x_4$

解

1. 双线性型的矩阵为：
$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$$
2. 双线性型的矩阵为：
$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & -3 \\ 2 & 5 & 4 \\ -3 & 4 & -6 \end{pmatrix}$$
3. 二次型的矩阵为：
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$
4. 二次型的矩阵为：
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & -3 \\ 1 & 0 & -3 & -1 \end{pmatrix}$$

例题 4.28.

求双线性型的典范基：

1. 对向量空间 $\mathbb{R}^2$ 上的双线性型 $f(x,y) = {}^tx \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} y$
2. 对向量空间 $\mathbb{R}^3$ 上的双线性型 $f(x,y) = {}^tx \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} y$

解

1. 对于矩阵 $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$，考虑如下的对合变换：
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} \end{pmatrix}$$
因此典范基就是 $(1,0), (-\frac{1}{2}, 1)$。

2. 首先，考虑如下的对合变换：

$$\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&-1\\1&2&1\\-1&1&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&2\\0&2&1\end{pmatrix}$$

再考虑：

$$\begin{pmatrix}1&0\\-2&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2\\2&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-2\\0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\0&5\end{pmatrix}$$

于是，我们令：

$$A=\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&-2\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-1&3\\0&1&-2\\0&0&1\end{pmatrix}$$

因此，A 的列向量就是典范基：$\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}3\\-2\\1\end{pmatrix}$。

例题 4.29.

用雅可比方法化双线性型为典范式：

$$f(x,y)=x_1y_1-x_1y_2+x_1y_3-x_2y_1+x_2y_2+2x_2y_3+x_3y_1+2x_3y_2+x_3y_3$$

解 该双线性型的矩阵为：

$$F=\begin{pmatrix}1&-1&1\\-1&1&2\\1&2&1\end{pmatrix}$$

直接用雅可比方法不行，因此考虑 $F_{1,3}FF_{1,3}$，得到：

$$F_{1,3}FF_{1,3}=\begin{pmatrix}1&2&1\\2&1&-1\\1&-1&1\end{pmatrix}$$

计算主子式：

$$\Delta_1=1$$

$$\Delta_2=\begin{vmatrix}1&2\\2&1\end{vmatrix}=-3$$

$$\Delta_3=\det(F_{1,3}FF_{1,3})=-9$$

因此双线性型的典范式是：

$$f(x,y)=x_1y_1-3x_2y_2+3x_3y_3$$

另一种方法：通过配方法得到典范式 $x_1y_1+6x_2y_2-\frac{3}{2}x_3y_3$。

例题 4.30.

用雅可比方法判断下列矩阵是否合同：

$$A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&0&-1\\3&-1&3\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}1&3&0\\3&1&1\\0&1&5\end{pmatrix}$$

解 计算矩阵 A 的主子式：

$$\Delta_1(A)=1$$
$$\Delta_2(A)=\begin{vmatrix}1&2\\2&0\end{vmatrix}=-4$$
$$\Delta_3(A)=\det(A)=-28$$

计算矩阵 B 的主子式：

$$\Delta_1(B)=1$$
$$\Delta_2(B)=\begin{vmatrix}1&3\\3&1\end{vmatrix}=-8$$
$$\Delta_3(B)=\det(B)=-39$$

由于两个矩阵的主子式符号模式相同（均为正、负、负），且惯性指数相同，因此它们合同。

例题 4.31.

设 $A_1,A_2,\dots,A_k$ 是方阵，且

$$A=\begin{pmatrix}A_1&&\mathbf{0}\\&A_2&\\\mathbf{0}&&A_k\end{pmatrix}$$

证明：A 是（斜）对称的当且仅当 $A_1,A_2,\dots,A_k$ 都是（斜）对称的。

解

证明 必要性：若 A 对称，则 $A^T=A$。由于

$$A^T=\begin{pmatrix}A_1^T&&\mathbf{0}\\&A_2^T&\\\mathbf{0}&&A_k^T\end{pmatrix}$$

比较块对角元素得 $A_i^T=A_i$，即每个 A_i 对称。

充分性：若每个 A_i 对称，则 $A_i^T=A_i$，于是

$$A^T=\begin{pmatrix}A_1^T&&\mathbf{0}\\&A_2^T&\\\mathbf{0}&&A_k^T\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A_1&&\mathbf{0}\\&A_2&\\\mathbf{0}&&A_k\end{pmatrix}=A$$

故 A 对称。

对于斜对称的情形证明类似。

例题 4.32.

举例说明：

1. 正定矩阵 (a_{ij}) 可以在某些 (i,j) 处的元素 a_{ij} 为负
2. 实对称矩阵 $A=(a_{ij})$ 的所有元素都是正的，但 A 不是正定矩阵

解

1. 考虑矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&-1\\-1&2\end{pmatrix}$，其特征值为 1 和 3，均大于 0，故正定，但非对角元为负。
2. 考虑矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2\\2&1\end{pmatrix}$，所有元素为正，但特征值为 3 和-1，不全是正数，故不是正定矩阵。

例题 4.33.

证明：实二次型 $q(x)=\sum_{i,j=1}^n a_{ij}x_ix_j$ $(a_{ij}=a_{ji})$ 是半正定的当且仅当对任意指标 $1\le i_1<i_2<\cdots<i_k\le n$，$k$ 阶行列式 $\det(a_{i_si_t})$ 是非负的。

证明 必要性：设 $q(x)$ 是半正定的，即对任意 $x\in\mathbb{R}^n$，有 $q(x)\ge 0$。

由半正定二次型的标准形定理，存在可逆矩阵 P，使得

$$A=P^T\begin{pmatrix}I_r&0\\0&0\end{pmatrix}P$$

其中 $r=\operatorname{rank}(A)$。因此 $\det A\ge 0$。

对于任意指标集 $\{i_1,i_2,\dots,i_k\}\subset\{1,2,\dots,n\}$，考虑由这些指标对应的标准基向量张成的子空间 $V=\langle e_{i_1},\dots,e_{i_k}\rangle$。

在子空间 V 上，二次型 $q(x)$ 的限制为 $q'=q|_V$，对应的矩阵为 $(a_{i_si_t})_{k\times k}$。

由于 $q(x)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上半正定，故在子空间 V 上也半正定，从而其矩阵 $(a_{i_si_t})$ 是半正定的，因此 $\det(a_{i_si_t})\ge 0$。

充分性：设对任意指标集 $\{i_1,i_2,\dots,i_k\}\subset\{1,2,\dots,n\}$，都有 $\det(a_{i_si_t})\ge 0$。

首先，取 $k=1$，则对所有 i，有 $a_{ii}\ge 0$。

情形 **1**：所有 $a_{ii}=0$。

对任意 $i\ne j$，考虑二阶主子式：

$$\det\begin{pmatrix}a_{ii}&a_{ij}\\a_{ji}&a_{jj}\end{pmatrix}=\det\begin{pmatrix}0&a_{ij}\\a_{ij}&0\end{pmatrix}=-a_{ij}^2\ge 0$$

故 $a_{ij}=0$ 对所有 i,j 成立，此时 $q(x)\equiv 0$，显然是半正定的。

情形 **2**：存在某个 $a_{kk}>0$。

不妨设 $a_{11}>0$。构造矩阵：

$$P=\begin{pmatrix}1&-\frac{a_{21}}{a_{11}}&-\frac{a_{31}}{a_{11}}&\cdots&-\frac{a_{n1}}{a_{11}}\\0&1&0&\cdots&0\\0&0&1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&0&\cdots&1\end{pmatrix}$$

考虑合同变换：

$$P^TAP=Q=\begin{pmatrix}a_{11}&0\\0&F\end{pmatrix}$$

其中 $F=(f_{ij})$ 是 $n-1$ 阶对称矩阵，且

$$f_{ij}=a_{ij}-\frac{a_{i1}a_{1j}}{a_{11}},\quad i,j=2,\dots,n$$

对任意指标集 $\{i_1, i_2, \ldots, i_k\} \subset \{2, 3, \ldots, n\}$，考虑 P, A, Q 中对应行和列构成的子矩阵 P', A', Q'，满足：

$$P'^T A' P' = Q'$$

计算行列式：

$$\det Q' = (\det P')^2 \det A' \geq 0$$

又因为 $\det Q' = a_{11} \det F'$，其中 F' 是 F 的相应主子矩阵，故

$$\det F' = \frac{\det Q'}{a_{11}} \geq 0$$

由归纳假设（对 $n-1$ 阶矩阵 F），F 是半正定的，从而 A 是半正定的，即 $q(x)$ 是半正定的。

综上，充分性得证。

例题 4.34.

已知实二次型 $f(x) = ax_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 - 2x_1x_2$ 的秩为 2：

1. 写出二次型对应的矩阵 A，并求参数 a
2. 将二次型化为标准形

解

1. 二次型矩阵为：

$$A = \begin{pmatrix} a & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

秩为 2，故 $\det(A) = 0$。计算得：

$$\det(A) = a \cdot 1 \cdot 3 + (-1) \cdot 0 \cdot 0 + 0 \cdot (-1) \cdot 0 - 0 \cdot 1 \cdot 0 - 0 \cdot 0 \cdot a - 3 \cdot (-1) \cdot (-1) = 3a - 3 = 0$$

解得 $a = 1$。

2. 代入 $a = 1$，矩阵为：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

通过配方法或特征值计算得标准形为：

$$f(x) = y_1^2 + 3y_3^2$$

例题 4.35.

实二次型 $\lambda x_1^2 - 2x_2^2 - 3x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 2x_2x_3$ 在 λ 取何值时是负定的？

解 该二次型的矩阵为：

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & -3 \end{pmatrix}$$

负定要求所有顺序主子式负正交替（奇数阶负，偶数阶正）：

$$\Delta_1 = \lambda < 0$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} \lambda & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -2\lambda - 1 > 0$$

$$\Delta_3 = \det(A) = 5\lambda + 3 < 0$$

解不等式组得：$\lambda < -\frac{3}{5}$。

例题 4.36.

证明下列对称矩阵是正定的，并将其分解为 ${}^tP \cdot P$（P 为方阵）：

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 2 \\ -2 & 10 & 2 \\ 2 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

解

1. 对于 A，顺序主子式：$2 > 0$，$\det(A) = 3 > 0$，故正定。使用 Cholesky 分解：

$$A = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \sqrt{\frac{3}{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \sqrt{\frac{3}{2}} \end{pmatrix}$$

2. 对于 B，顺序主子式：$4 > 0$，$\begin{vmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 10 \end{vmatrix} = 36 > 0$，$\det(B) = 108 > 0$，故正定。使用 Cholesky 分解：

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & \sqrt{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \end{pmatrix}$$

例题 4.37.

证明：正定矩阵的对角线上的元素都是正的。

解 设 A 为正定矩阵，则对任意非零向量 x，有 $x^TAx > 0$。取 $x = e_i$（第 i 个标准基向量），则 $e_i^TAe_i = a_{ii} > 0$。故对角线元素均为正数。

例题 4.38.

设 A 是 n 阶斜对称实方阵，E 是 n 阶单位矩阵，λ 是复数。若 $\det(\lambda E - A) = 0$，则 λ 的实部为 0。

解 由于 A 斜对称，即 $A^T = -A$。设 λ 是特征值，对应特征向量 $x \neq 0$，则 $Ax = \lambda x$。考虑共轭转置：$x^HA^H = \bar{\lambda}x^H$。但 A 为实矩阵，故 $A^H = A^T = -A$。于是有 $-x^HA = \bar{\lambda}x^H$，右乘 x 得：$-x^HAx = \bar{\lambda}x^Hx$。代入 $Ax = \lambda x$ 得：$-\lambda x^Hx = \bar{\lambda}x^Hx$。由于 $x^Hx > 0$，故 $-\lambda = \bar{\lambda}$，即 $\lambda + \bar{\lambda} = 0$，所以实部为 0。

例题 4.39.

设 A 是实对称矩阵，E 是同阶单位矩阵，ε 是充分小的实数。证明：方阵 $E + \varepsilon A$ 是正定的。

解

考虑矩阵 $E + \varepsilon A$ 的 k 阶主子式 $\Delta_k(\varepsilon)$。首先注意到 $\Delta_k(\varepsilon)$ 是关于 ε 的多项式，且 $\Delta_k(0) = 1$。因此当 ε 充分小时，可以保证 $\Delta_k(\varepsilon) > 0$，$\forall k = 1, 2, \cdots, n$。因此 $E + \varepsilon A$ 是正定矩阵。

例题 4.40.

设方阵 $A_1, A_2, \ldots, A_k$ 分别与 $B_1, B_2, \ldots, B_k$ 合同，且

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & \mathbf{0} \\ & A_2 & \\ \mathbf{0} & & A_k \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} B_1 & & \mathbf{0} \\ & B_2 & \\ \mathbf{0} & & B_k \end{pmatrix}$$

证明：A 与 B 合同。

解

证明 由条件，存在可逆矩阵 P_i 使得 $B_i = P_i^T A_i P_i$。令 $P = \begin{pmatrix} P_1 & & \mathbf{0} \\ & P_2 & \\ \mathbf{0} & & P_k \end{pmatrix}$，则 P 可逆，且

$$P^T A P = \begin{pmatrix} P_1^T A_1 P_1 & & \mathbf{0} \\ & P_2^T A_2 P_2 & \\ \mathbf{0} & & P_k^T A_k P_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_1 & & \mathbf{0} \\ & B_2 & \\ \mathbf{0} & & B_k \end{pmatrix} = B$$

故 A 与 B 合同。



第 5 章 $\mathbb{R}^n$ 上的线性算子

5.1 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的线性映射

设 $\varphi: V \to U$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的线性映射，$\dim V = n$，$\dim U = m$. 取 V 的一组基 $\{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$ 和 U 的一组基 $\{f_1, f_2, \ldots, f_m\}$. 由于 $\varphi(e_j) \in U$，它可由 U 的基线性表示为：

$$\varphi(e_j) = a_{1j}f_1 + a_{2j}f_2 + \cdots + a_{mj}f_m, \quad j = 1, 2, \ldots, n.$$

将这些等式写成矩阵形式：

$$\varphi(e_1, e_2, \ldots, e_n) = (\varphi(e_1), \varphi(e_2), \ldots, \varphi(e_n)) = (f_1, f_2, \ldots, f_m)A,$$

其中 A 是 $m \times n$ 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

称 A 为线性映射 φ 在 V 的基 $\{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$ 与 U 的基 $\{f_1, f_2, \ldots, f_m\}$ 下的表示矩阵，并记

$$\varphi(e_1, e_2, \ldots, e_n) = (f_1, f_2, \ldots, f_m)A.$$

若 φ 是向量空间 V 到自身的线性变换（即 $U = V$），则通常取 V 的一组基 $\{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$，此时表示矩阵为 n 阶方阵.

取定基后，数域 $\mathbb{F}$ 上 n 维向量空间 V 到 m 维向量空间 U 的线性映射集合 $\mathrm{Hom}(V, U)$ 与数域 $\mathbb{F}$ 上 $m \times n$ 矩阵集合 $M_{m\times n}(\mathbb{F})$ 之间存在一一对应 $\varphi \mapsto A$，该对应还是线性同构. 特别地，当 φ 是 V 上的线性变换时，该对应保持乘法，即若 φ, ψ 是 V 上的线性变换，对应的表示矩阵分别为 A, B，则 $\varphi \circ \psi$ 对应的表示矩阵为 AB.

定义 5.1 (相似矩阵)

设 A, B 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶矩阵，若存在数域 $\mathbb{F}$ 上的可逆矩阵 P，使得 $B = P^{-1}AP$，则称 A 与 B 相似，记作 $A \sim B$.

定理 5.1 (不同基下表示矩阵的相似性)

设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维向量空间，φ 是 V 上的线性变换，$\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 和 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 是 V 的两组基，且从基 $\{e_i\}$ 到基 $\{f_i\}$ 的过渡矩阵为 P，即

$$(f_1, f_2, \dots, f_n) = (e_1, e_2, \dots, e_n)P.$$

若 φ 在基 $\{e_i\}$ 下的表示矩阵为 A，在基 $\{f_i\}$ 下的表示矩阵为 B，则

$$B = P^{-1}AP.$$

即同一个线性变换在不同基下的表示矩阵相似.

推导：由表示矩阵的定义，

$$\varphi(e_1, e_2, \dots, e_n) = (e_1, e_2, \dots, e_n)A,$$

$$\varphi(f_1, f_2, \dots, f_n) = (f_1, f_2, \dots, f_n)B.$$

利用过渡矩阵 P，有

$$\begin{aligned}\varphi(f_1, f_2, \dots, f_n) &= \varphi\big((e_1, e_2, \dots, e_n)P\big)\\ &= \varphi(e_1, e_2, \dots, e_n)P\\ &= (e_1, e_2, \dots, e_n)AP.\end{aligned}$$

另一方面，

$$\varphi(f_1, f_2, \dots, f_n) = (f_1, f_2, \dots, f_n)B = (e_1, e_2, \dots, e_n)PB.$$

由于 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 线性无关，比较得 $AP = PB$，故 $B = P^{-1}AP$.

定理 5.2 (线性映射的秩等于其表示矩阵的秩)

设 $\varphi : V \to U$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的线性映射，A 是 φ 在任意给定基下的表示矩阵，则 $\operatorname{rank}\varphi = \operatorname{rank} A$.

推论 5.1 (线性变换可逆的矩阵条件)

n 维向量空间 V 上的线性变换 φ 是可逆变换的充分必要条件是，它在 V 的任意一组基下的表示矩阵是可逆矩阵.

定理 5.3 (维数公式)

设 $\varphi : V \to U$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的线性映射，则

$$\dim \operatorname{Im}\varphi + \dim \operatorname{Ker}\varphi = \dim V.$$

推论 5.2 (线性变换可逆的映射条件)

n 维向量空间 V 上的线性变换 φ 是可逆变换的充分必要条件为，它是单映射（或满映射）.

相似关系是数域 K 上所有 n 阶矩阵组成的集合 $M_n(K)$ 上的一个等价关系. 它满足：

- **反身性：** $A \sim A$.
- **对称性：**若 $A \sim B$，则 $B \sim A$.
- **传递性：**若 $A \sim B$ 且 $B \sim C$，则 $A \sim C$.

在相似关系下，A 的等价类称为 A 的相似类.

相似矩阵具有以下性质：

1. 若 $B_1 = P^{-1}A_1P$，$B_2 = P^{-1}A_2P$，则

$$B_1 + B_2 = P^{-1}(A_1 + A_2)P, \quad B_1B_2 = P^{-1}(A_1A_2)P, \quad B_1^m = P^{-1}A_1^mP \quad (m \in \mathbb{N}^*).$$

2. 相似矩阵的行列式相等：若 $A \sim B$，则 $\det A = \det B$.
3. 相似矩阵同时可逆或同时不可逆；当可逆时，它们的逆矩阵也相似.
4. 相似矩阵的秩相等.
5. 相似矩阵的迹相等.
6. 相似矩阵具有相同的特征多项式.
7. 相似矩阵具有相同的特征值（包括重数）.

上述性质表明：行列式、秩、迹、特征多项式、特征值等都是相似关系下的不变量，称为相似不变量.

定义 5.2 (可对角化)

如果 n 阶矩阵 A 相似于一个对角矩阵，则称 A 可对角化.

定理 5.4 (矩阵可对角化的充要条件)

数域 K 上 n 阶矩阵 A 可对角化的充分必要条件是，K^n 中存在 n 个线性无关的列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$，以及 K 中的 n 个数 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$（允许重复），使得

$$A\alpha_i = \lambda_i \alpha_i, \quad i = 1, 2, \ldots, n.$$

此时，令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n)$，则

$$P^{-1}AP = \operatorname{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n).$$

定理 5.5

设 λ_1, λ_2 是数域 K 上 n 阶矩阵 A 的一个特征值，则 A 的不同特征值，$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 和 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r$ 分别是 A 的属于 λ_1, λ_2 的线性无关的特征向量，则 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$，$\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r$ 线性无关.

定理 5.6

设 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_m$ 是数域 K 上 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的不同的特征值，$\boldsymbol{\alpha}_{j1}, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_{jr_j}$ 是 A 的属于 λ_j 的线性无关的特征向量，$j = 1, 2, \cdots, m$，则向量组

$$\boldsymbol{\alpha}_{11}, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_{1r_1}, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_{m1}, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_{mr_m}$$

线性无关.

推论 5.3

n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的属于不同特征值的特征向量是线性无关的.

定理 5.7

数域 K 上 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可对角化的充分必要条件是：$\boldsymbol{A}$ 的属于不同特征值的特征子空间的维数之和等于 n .

推论 5.4

数域 K 上 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 如果有 n 个不同的特征值，那么 $\boldsymbol{A}$ 可对角化.

定理 5.8

数域 K 上 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可对角化的充分必要条件是：$\boldsymbol{A}$ 的特征多项式的全部复根都属于 K，并且 $\boldsymbol{A}$ 的每个特征值的几何重数等于它的代数重数.

矩阵是否可对角化，通常有以下方法：

1. A 可对角化的充要条件是 A 有 n 个线性无关的特征向量；
2. 若 A 有 n 个不同的特征值，则 A 可对角化；

3. A 可对角化的充要条件是 $\mathbb{C}^n$ 是 A 的特征子空间的直和；
4. A 可对角化的充要条件是对 A 的任意特征值其集合重数等于代数重数；
5. A 可对角化的充要条件是 A 的最小多项式无重根；
6. A 可对角化的充要条件是 A 的 Jordan 块都是一阶的.

5.1.1 典型例题讲解

5.1.1.1 线性性的判定与矩阵表示

例题 5.1. 判断线性变换并求矩阵

下面关于 $T(x,y)$ 的公式定义了映射 $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$. 判断各小题的映射是否为线性变换. 如果是，确定变换的矩阵.

(1) $T[x,y]=[y,x]$;　(2) $T(x,y)=[x,-y]$;　(3) $T[x,y]=[0,x]$;　(4) $T(x,y)=[x,x]$;
(5) $T[x,y]=[x^2,y^3]$;　(6) $T(x,y)=[2^x,2^y]$;　(7) $T[x,y]=[1,x]$;　(8) $T(x,y)=[x+1,y+1]$;
(9) $T[x,y]=[x-y,x+y]$;　(10) $T(x,y)=[3x+2y,5x-6y]$.

解 验证线性性需检验加性和齐性. 若 T 是线性的，则其在标准基下的矩阵为 $A=[T(\mathbf{e}_1)\ T(\mathbf{e}_2)]$，其中 $\mathbf{e}_1=(1,0),\mathbf{e}_2=(0,1)$.

(1) 线性.$T(\mathbf{e}_1)=(0,1),T(\mathbf{e}_2)=(1,0)$，故矩阵为 $\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$.

(2) 线性. 矩阵为 $\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}$.

(3) 线性. 矩阵为 $\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}$.

(4) 线性. 矩阵为 $\begin{pmatrix}1&0\\1&0\end{pmatrix}$.

(5) 非线性，因为 $T(\lambda x,\lambda y)=(\lambda^2x^2,\lambda^3y^3)\neq\lambda T(x,y)$（除非 $\lambda=0,1$）.

(6) 非线性，指数函数不具有齐性.

(7) 非线性，因为 $T(0,0)=(1,0)\neq(0,0)$，线性变换必须将零向量映为零向量.

(8) 非线性，同样 $T(0,0)=(1,1)\neq(0,0)$.

(9) 线性. 矩阵为 $\begin{pmatrix}1&-1\\1&1\end{pmatrix}$.

(10) 线性. 矩阵为 $\begin{pmatrix}3&2\\5&-6\end{pmatrix}$.

例题 5.2. 构造齐次但非线性的映射

给出一个非线性映射 $\varphi:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ 使得对任意的 $\lambda\in\mathbb{R}$ 和 $X\in\mathbb{R}^2$ 有 $\varphi(\lambda X)=\lambda\varphi(X)$.

解 这样的映射称为齐次映射，但可能不满足可加性. 构造时需破坏加性. 例如，令

$$\varphi(x,y)=\begin{cases}(0,0), & xy=0,\\ (x+y,x+y), & xy\neq 0.\end{cases}$$

验证：齐性成立，但取 $X=(1,0),Y=(0,1)$，则 $\varphi(X+Y)=\varphi(1,1)=(2,2)$，而 $\varphi(X)+\varphi(Y)=(0,0)+(0,0)=(0,0)$，不相等.

5.1.1.2 几何变换的复合与矩阵

例题 5.3. 几何变换的复合与矩阵

考虑 $\mathbb{R}^2$ 上的线性变换 T：

(1) T 先绕原点旋转角度 $3\pi/4$，再做关于 y 轴的反射；

(2) T 先做关于 y 轴的反射，再做关于 x 轴的反射；

(3) T 先做关于 x 轴的反射，再做以直线 $x=y$ 为轴的反射；

(4) T 先做关于 x 轴的反射，再绕原点旋转角度 $\pi/4$.

求各变换的矩阵（在标准基下）.

解 旋转角度 θ 的矩阵：$\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}$. 关于 y 轴的反射矩阵：$\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$. 关于 x 轴的反射矩阵：$\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$. 关于直线 $x=y$ 的反射矩阵：$\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$.

注意变换的复合对应矩阵的乘法（从右向左）.

(1) 旋转矩阵 $R_{3\pi/4}=\begin{pmatrix}-\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2}\\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2}\end{pmatrix}$，关于 y 轴反射矩阵 $S_y=\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$，则 T 的矩阵为 $S_yR_{3\pi/4}$.

(2) 关于 y 轴反射：矩阵 $A=\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$；关于 x 轴反射：矩阵 $B=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$. 复合 $BA=\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$，这是绕原点旋转 π 的矩阵.

(3) 关于 x 轴反射：矩阵 B；关于直线 $x=y$ 反射：矩阵 $C=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$. 复合 $CB=\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$，这是绕原点旋转 $\pi/2$ 的矩阵.

(4) 关于 x 轴反射：矩阵 B；旋转 $\pi/4$ 的矩阵 $R_{\pi/4}=\begin{pmatrix}\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2}\\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2}\end{pmatrix}$. 复合 $R_{\pi/4}B=\begin{pmatrix}\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2}\\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2}\end{pmatrix}$.

5.1.1.3 核、像与可逆性

例题 5.4. 求核、像、判断可逆

考虑线性映射 $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$，定义为 $T(x,y,z)=[x-y,y-z,z-x]$.

(i) 求核 $\operatorname{Ker}T$，

(ii) 求像 $\operatorname{Im}T$，

(iii) 判断 T 是否可逆.

解 写出矩阵 $T=\begin{pmatrix}1 & -1 & 0\\ 0 & 1 & -1\\ -1 & 0 & 1\end{pmatrix}$.

(i) 解 $T\mathbf{x}=0$，即方程组：

$$\begin{cases}x-y=0,\\ y-z=0,\\ z-x=0.\end{cases}$$

解得 $x=y=z$，故核空间为 $\operatorname{Ker}T=\operatorname{span}\{(1,1,1)\}$.

(ii) 像空间为矩阵的列空间，列向量为 $(1,0,-1),(-1,1,0),(0,-1,1)$. 由于秩为 2，像空间为 $\operatorname{span}\{(1,0,-1),(-1,1,0)\}$（或等价地，由任意两个线性无关的列张成）.

(iii) 因为核非零（存在非零解），所以 T 不是单射，故不可逆.

5.1.1.4 矩阵相似性的证明与应用

例题 5.5. 利用相似定理证明矩阵相似

设 $A=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}1&a\\0&1\end{pmatrix}, C=\begin{pmatrix}1&0\\a&1\end{pmatrix}$，其中 a 是非零实数.

(1) 通过直接计算证明 A,B,C 都是相似的；

(2) 利用定理 5.12（同一线性变换在不同基下的矩阵相似）证明 A,B,C 都是相似的.

解 (1) 直接找可逆矩阵 P 使得 $B=P^{-1}AP$. 例如，取 $P=\begin{pmatrix}1&0\\0&a\end{pmatrix}$，则 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&a\\0&1\end{pmatrix}=B$. 对于 C，可取 $P=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$，则 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&0\\a&1\end{pmatrix}=C$.

(2) 考虑线性算子 $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$，使得在标准基下的矩阵为 A. 选取适当的基，使得 T 在新基下的矩阵为 B 或 C. 例如，取基 $u_1=\mathbf{e}_1, u_2=\frac{1}{a}\mathbf{e}_2$，则 $T(u_1)=u_1$，$T(u_2)=\frac{1}{a}T(\mathbf{e}_2)=\frac{1}{a}(\mathbf{e}_1+\mathbf{e}_2)=\frac{1}{a}\mathbf{e}_1+\mathbf{e}_2=au_1+u_2$，故在基 $\{u_1,u_2\}$ 下的矩阵为 $\begin{pmatrix}1&a\\0&1\end{pmatrix}=B$. 类似地，取基 $v_1=\mathbf{e}_2, v_2=\frac{1}{a}\mathbf{e}_1$，则 $T(v_1)=T(\mathbf{e}_2)=\mathbf{e}_1+\mathbf{e}_2=av_2+v_1$，$T(v_2)=\frac{1}{a}T(\mathbf{e}_1)=\frac{1}{a}\mathbf{e}_1=v_2$，故在基 $\{v_1,v_2\}$ 下的矩阵为 $\begin{pmatrix}1&0\\a&1\end{pmatrix}=C$. 从而 A,B,C 相似.

例题 5.6. 相似矩阵的性质

证明：如果方阵 A 与 B 相似，E 是同阶的单位矩阵，那么 $E+A$ 与 $E+B$ 相似.

解 由 $A\sim B$，存在可逆矩阵 P 使得 $B=P^{-1}AP$. 则

$$E+B=E+P^{-1}AP=P^{-1}EP+P^{-1}AP=P^{-1}(E+A)P,$$

故 $E+A\sim E+B$.

例题 5.7. AB 与 BA 的相似性

设 A 和 B 是同阶方阵且 A 可逆. 证明：AB 和 BA 相似.

解 因为 A 可逆，取 $P=A$，则

$$A^{-1}(AB)A=BA,$$

所以 $AB\sim BA$.

例题 5.8. 线性算子在不同基下的矩阵

设 $A:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ 是线性算子，定义为 $A(x,y)=(-x,y)$.

(1) 求 A 在标准基下的矩阵 A.

(2) 求 A 在基 $u_1=(1,1), u_2=(-1,1)$ 下的矩阵 B.

(3) 求从基 u_1,u_2 到基 $v_1=(2,1), v_2=(1,0)$ 的转换矩阵 S，再通过计算 $S^{-1}BS$ 求出 A 在基 v_1,v_2 下的矩阵.

(4) 求从标准基到基 v_1,v_2 的转换矩阵 T，再通过计算 $T^{-1}AT$ 求出 A 在基 v_1,v_2 下的矩阵. 比较 (3) 和 (4) 的计算繁简.

解 (1) 标准基下：$A(\mathbf{e}_1)=(-1,0), A(\mathbf{e}_2)=(0,1)$，故矩阵 $A=\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$.

(2) 先求 $A(u_1)$ 和 $A(u_2)$ 在基 $\{u_1,u_2\}$ 下的坐标. $A(u_1)=A(1,1)=(-1,1)$. 设 $(-1,1)=\alpha u_1+\beta u_2$，解得 $\alpha=0,\beta=1$. $A(u_2)=A(-1,1)=(1,1)=1\cdot u_1+0\cdot u_2$. 故矩阵 $B=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$.

(3) 过渡矩阵 S 满足 $(v_1,v_2)=(u_1,u_2)S$，即 S 的列是 v_1,v_2 在基 $\{u_1,u_2\}$ 下的坐标. 设 $v_1=au_1+bu_2$，即 $(2,1)=a(1,1)+b(-1,1)$，解得 $a=1.5,b=-0.5$. 类似 $v_2=(1,0)=0.5u_1-0.5u_2$. 故 $S=\begin{pmatrix}1.5 & 0.5\\ -0.5 & -0.5\end{pmatrix}$. 计算 $S^{-1}=\begin{pmatrix}1 & 1\\ -1 & -3\end{pmatrix}$，则 $S^{-1}BS=\begin{pmatrix}1 & 1\\ -1 & -3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1.5 & 0.5\\ -0.5 & -0.5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$. 故 A 在基 $\{v_1,v_2\}$ 下的矩阵为 $\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$.

(4) 从标准基到 $\{v_1,v_2\}$ 的过渡矩阵 T 以 v_1,v_2 为列：$T=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$. 计算 $T^{-1}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & -2\end{pmatrix}$，则 $T^{-1}AT=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & -2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$. 比较发现，方法 (4) 更直接，因为直接从标准基转换，避免了中间基的坐标计算.

例题 5.9. Jordan 块及其变形的相似性

证明以下矩阵相似：

1. Jordan 块 $J_n(\lambda)$ 与其转置，其中

$$J_n(\lambda)=\begin{pmatrix}\lambda & 1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \lambda & 1 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & \lambda & 1\\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda\end{pmatrix}.$$

2. Jordan 块 $J_n(\lambda)$ 与其次对角线元素为 a（$a\neq 0$）的矩阵，即

$$\begin{pmatrix}\lambda & a & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \lambda & a & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & \lambda & a\\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda\end{pmatrix}.$$

解

1. 考虑线性变换 $T:V\to V$，其中 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维向量空间。取 V 的一组基 $\{e_1,e_2,\ldots,e_n\}$，使得 T 在该基下的矩阵为 $J_n(\lambda)$，即

$$T(e_1)=\lambda e_1,\quad T(e_2)=e_1+\lambda e_2,\quad \ldots,\quad T(e_n)=e_{n-1}+\lambda e_n.$$

现在取另一组基 $\{f_1,f_2,\ldots,f_n\}$，其中 $f_1=e_n,f_2=e_{n-1},\ldots,f_n=e_1$（即逆序基）。计算 T 在新基下的

作用：

$$\begin{aligned}
T(f_1) = T(e_n) &= e_{n-1} + \lambda e_n = f_2 + \lambda f_1,\\
T(f_2) = T(e_{n-1}) &= e_{n-2} + \lambda e_{n-1} = f_3 + \lambda f_2,\\
&\vdots\\
T(f_{n-1}) = T(e_2) &= e_1 + \lambda e_2 = f_n + \lambda f_{n-1},\\
T(f_n) = T(e_1) &= \lambda e_1 = \lambda f_n.
\end{aligned}$$

因此，T 在基 $\{f_1, f_2, \ldots, f_n\}$ 下的矩阵为

$$\begin{pmatrix}
\lambda & 0 & \cdots & 0 & 0\\
1 & \lambda & \cdots & 0 & 0\\
\vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots\\
0 & 0 & \cdots & \lambda & 0\\
0 & 0 & \cdots & 1 & \lambda
\end{pmatrix},$$

这正是 $J_n(\lambda)$ 的转置。由定理 5.12，同一个线性变换在不同基下的矩阵相似，故 $J_n(\lambda)$ 与其转置相似。

2. 仍考虑上述线性变换 T 及基 $\{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$，使得 T 在该基下的矩阵为 $J_n(\lambda)$。取另一组基 $\{g_1, g_2, \ldots, g_n\}$，其中 $g_k = a^{k-1}e_k$（$k = 1, 2, \ldots, n$），这里 $a \neq 0$。计算 T 在新基下的作用：

$$\begin{aligned}
T(g_1) &= T(e_1) = \lambda e_1 = \lambda g_1,\\
T(g_2) &= T(ae_2) = aT(e_2) = a(e_1 + \lambda e_2) = ae_1 + a\lambda e_2 = ag_1 + \lambda(ae_2) = ag_1 + \lambda g_2,\\
T(g_3) &= T(a^2e_3) = a^2T(e_3) = a^2(e_2 + \lambda e_3) = a^2e_2 + a^2\lambda e_3 = a(ae_2) + \lambda(a^2e_3) = ag_2 + \lambda g_3,\\
&\vdots\\
T(g_n) &= T(a^{n-1}e_n) = a^{n-1}T(e_n) = a^{n-1}(e_{n-1} + \lambda e_n) = a^{n-1}e_{n-1} + a^{n-1}\lambda e_n = a(a^{n-2}e_{n-1}) + \lambda(a^{n-1}e_n) = ag_{n-1} + \cdots
\end{aligned}$$

因此，T 在基 $\{g_1, g_2, \ldots, g_n\}$ 下的矩阵为

$$\begin{pmatrix}
\lambda & a & 0 & \cdots & 0\\
0 & \lambda & a & \cdots & 0\\
\vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots\\
0 & 0 & \cdots & \lambda & a\\
0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda
\end{pmatrix}.$$

由定理 5.12，该矩阵与 $J_n(\lambda)$ 相似。

例题 5.10. Jordan 块及其变形的相似性

证明以下矩阵相似：

1. Jordan 块 $J_n(\lambda)$ 与其转置 $J_n(\lambda)^T$。
2. Jordan 块 $J_n(\lambda)$ 与将其次对角线元素 1 替换为非零常数 a 的矩阵 $J_n(\lambda; a)$，其中

$$J_n(\lambda) = \begin{pmatrix}
\lambda & 1 & 0 & \cdots & 0\\
0 & \lambda & 1 & \cdots & 0\\
\vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots\\
0 & 0 & \cdots & \lambda & 1\\
0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda
\end{pmatrix}, \quad J_n(\lambda; a) = \begin{pmatrix}
\lambda & a & 0 & \cdots & 0\\
0 & \lambda & a & \cdots & 0\\
\vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots\\
0 & 0 & \cdots & \lambda & a\\
0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda
\end{pmatrix}.$$

解

1. 构造可逆矩阵 P 如下：令 P 为反对角线上全为 1，其余为 0 的 n 阶方阵，即

$$P=\begin{pmatrix}0&0&\cdots&0&1\\0&0&\cdots&1&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots\\0&1&\cdots&0&0\\1&0&\cdots&0&0\end{pmatrix}.$$

易见 $P^{-1}=P$（因为 P 是对合矩阵：$P^2=I$）。直接计算 $P^{-1}J_n(\lambda)P$：
考虑 P 的第 i 列 $Pe_i=e_{n+1-i}$，其中 e_i 表示第 i 个标准单位列向量。则

$$P^{-1}J_n(\lambda)Pe_i=P^{-1}J_n(\lambda)e_{n+1-i}.$$

分两种情况：

- 若 $n+1-i=1$，即 $i=n$，则 $J_n(\lambda)e_1=\lambda e_1$，于是
$$P^{-1}J_n(\lambda)Pe_n=P^{-1}(\lambda e_1)=\lambda e_n.$$
- 若 $n+1-i>1$，即 $i<n$，则 $J_n(\lambda)e_{n+1-i}=\lambda e_{n+1-i}+e_{n-i}$，于是
$$P^{-1}J_n(\lambda)Pe_i=P^{-1}(\lambda e_{n+1-i}+e_{n-i})=\lambda e_i+e_{i+1}.$$

因此，$P^{-1}J_n(\lambda)P$ 的第 i 列为 λe_i+e_{i+1}（当 $i<n$）或 λe_n（当 $i=n$），这正是 $J_n(\lambda)^T$ 的列向量。故 $P^{-1}J_n(\lambda)P=J_n(\lambda)^T$，即 $J_n(\lambda)$ 与 $J_n(\lambda)^T$ 相似。

2. 构造可逆对角矩阵 $P=\operatorname{diag}(1,a,a^2,\dots,a^{n-1})$，即

$$P=\begin{pmatrix}1&0&0&\cdots&0\\0&a&0&\cdots&0\\0&0&a^2&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&0&\cdots&a^{n-1}\end{pmatrix}.$$

其逆矩阵为 $P^{-1}=\operatorname{diag}(1,a^{-1},a^{-2},\dots,a^{-(n-1)})$。直接计算 $P^{-1}J_n(\lambda)P$ 的元素：由于 P 为对角矩阵，有

$$(P^{-1}J_n(\lambda)P)_{ij}=p_i^{-1}\cdot(J_n(\lambda))_{ij}\cdot p_j,$$

其中 $p_i=a^{i-1}$ 是 P 的第 i 个对角元。代入 $J_n(\lambda)$ 的元素：

- 当 $i=j$ 时，$(J_n(\lambda))_{ii}=\lambda$，故 $(P^{-1}J_n(\lambda)P)_{ii}=a^{-(i-1)}\cdot\lambda\cdot a^{i-1}=\lambda$。
- 当 $j=i+1$ 时，$(J_n(\lambda))_{i,i+1}=1$，故 $(P^{-1}J_n(\lambda)P)_{i,i+1}=a^{-(i-1)}\cdot 1\cdot a^i=a$。
- 其他情况，$(J_n(\lambda))_{ij}=0$，故 $(P^{-1}J_n(\lambda)P)_{ij}=0$。

因此，$P^{-1}J_n(\lambda)P=J_n(\lambda;a)$，即 $J_n(\lambda)$ 与 $J_n(\lambda;a)$ 相似。

例题 5.11.

设 $i_1,i_2,\cdots,i_n$ 是 $1,2,\cdots,n$ 的一个排列。证明：对角矩阵 $\operatorname{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)$ 和对角矩阵 $\operatorname{diag}(\lambda_{i_1},\lambda_{i_2},\cdots,\lambda_{i_n})$ 相似。

解 令 $D=\operatorname{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)$，$D'=\operatorname{diag}(\lambda_{i_1},\lambda_{i_2},\cdots,\lambda_{i_n})$。设排列 $i_1,i_2,\cdots,i_n$ 对应的置换矩阵为 P，即 P 是从单位矩阵经过相应行置换得到的矩阵。则 P 可逆，且满足 $P^{-1}DP=D'$。这是因为左乘 P 对 D 进行行置换，右乘 P^{-1} 进行列置换，最终将对角线元素重新排列。具体地，P 的第 k 行是单位矩阵的第 i_k 行，因此 PD 的第 k 行为 λ_{i_k} 乘对应行，再右乘 $P^{-1}=P^{\top}$ 将列置换回去，得到对角矩阵 D'。故 D 与 D' 相似。

例题 5.12.

求 a,b,c,d,e,f 使得列向量 $[1,1,1],[1,0,-1],[1,-1,0]$ 为矩阵

$$A=\begin{pmatrix}1&1&1\\a&b&c\\d&e&f\end{pmatrix}$$

的特征向量。

解 设三个列向量依次为 $\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_3$，对应的特征值分别为 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$。由特征值定义，有

$$A\mathbf{v}_1=\lambda_1\mathbf{v}_1,\quad A\mathbf{v}_2=\lambda_2\mathbf{v}_2,\quad A\mathbf{v}_3=\lambda_3\mathbf{v}_3.$$

计算 $A\mathbf{v}_1$：

$$A\mathbf{v}_1=\begin{pmatrix}1&1&1\\a&b&c\\d&e&f\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\a+b+c\\d+e+f\end{pmatrix}=\lambda_1\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda_1\\\lambda_1\\\lambda_1\end{pmatrix}.$$

所以有 $\lambda_1=3$，且 $a+b+c=3$，$d+e+f=3$。

对 $\mathbf{v}_2=[1,0,-1]^\top$：

$$A\mathbf{v}_2=\begin{pmatrix}1&1&1\\a&b&c\\d&e&f\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\a-c\\d-f\end{pmatrix}=\lambda_2\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda_2\\0\\-\lambda_2\end{pmatrix}.$$

所以 $\lambda_2=0$，且 $a-c=0$，$d-f=\lambda_2=0$，即 $a=c$，$d=f$。

对 $\mathbf{v}_3=[1,-1,0]^\top$：

$$A\mathbf{v}_3=\begin{pmatrix}1&1&1\\a&b&c\\d&e&f\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\a-b\\d-e\end{pmatrix}=\lambda_3\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda_3\\-\lambda_3\\0\end{pmatrix}.$$

所以 $\lambda_3=0$，且 $a-b=-\lambda_3=0$，$d-e=0$，即 $a=b$，$d=e$。

综合以上：

$a=b=c$，由 $a+b+c=3$ 得 $3a=3$，故 $a=b=c=1$。

$d=e=f$，由 $d+e+f=3$ 得 $3d=3$，故 $d=e=f=1$。

因此，矩阵为

$$A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix},$$

且三个特征值分别为 $\lambda_1=3,\lambda_2=0,\lambda_3=0$。

例题 5.13.

求矩阵

$$A=\begin{pmatrix}1&0&0\\-5&1&0\\3&-6&1\end{pmatrix}$$

的特征值和相应的特征子空间以及该子空间的一个基。

解 矩阵 A 是下三角矩阵，特征值即对角线元素：$\lambda=1$（三重）。

解方程 $(A-I)\mathbf{x}=\mathbf{0}$：

$$A-I=\begin{pmatrix}0&0&0\\-5&0&0\\3&-6&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-5&0&0\\0&-6&0\\0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

得 $x_1=0,x_2=0,x_3$ 自由。所以特征子空间为 $\operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\right\}$，基为 $\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$。

因此，特征值 $\lambda=1$ 的几何重数为 1，代数重数为 3。

例题 5.14.

求矩阵

$$A=\begin{pmatrix}2&1&3\\1&2&3\\3&3&20\end{pmatrix}$$

的特征值和相应的特征子空间以及该子空间的一个基。

解 先求特征多项式：

$$\det(A-\lambda I)=\begin{vmatrix}2-\lambda&1&3\\1&2-\lambda&3\\3&3&20-\lambda\end{vmatrix}.$$

计算得（具体过程略）：

$$\det(A-\lambda I)=-\lambda^3+24\lambda^2-65\lambda+42=-(\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda-21).$$

特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=2,\lambda_3=21$。

对于 $\lambda_1=1$，解 $(A-I)\mathbf{x}=\mathbf{0}$，得特征向量 $\mathbf{p}_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$，特征子空间基为 $\mathbf{p}_1$。

对于 $\lambda_2=2$，解 $(A-2I)\mathbf{x}=\mathbf{0}$，得特征向量 $\mathbf{p}_2=\begin{pmatrix}-3\\-3\\1\end{pmatrix}$，基为 $\mathbf{p}_2$。

对于 $\lambda_3=21$，解 $(A-21I)\mathbf{x}=\mathbf{0}$，得特征向量 $\mathbf{p}_3=\begin{pmatrix}1\\1\\6\end{pmatrix}$，基为 $\mathbf{p}_3$。

三个特征子空间均为一维。

例题 5.15.

求矩阵

$$A=\begin{pmatrix}5&-6&-6\\-1&4&2\\3&-6&-4\end{pmatrix}$$

的特征值和相应的特征子空间以及该子空间的一个基。

解 特征多项式为：

$$\det(A-\lambda I)=\begin{vmatrix}5-\lambda & -6 & -6\\ -1 & 4-\lambda & 2\\ 3 & -6 & -4-\lambda\end{vmatrix}.$$

计算得（具体过程略）：

$$\det(A-\lambda I)=-\lambda^3+5\lambda^2-8\lambda+4=-(\lambda-1)(\lambda-2)^2.$$

特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=\lambda_3=2$（二重）。

对于 $\lambda_1=1$，解 $(A-I)\mathbf{x}=\mathbf{0}$，得特征向量 $\mathbf{p}_1=\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}$，基为 $\mathbf{p}_1$。

对于 $\lambda=2$，解 $(A-2I)\mathbf{x}=\mathbf{0}$：

$$A-2I=\begin{pmatrix}3 & -6 & -6\\ -1 & 2 & 2\\ 3 & -6 & -6\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & -2 & -2\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}.$$

得 $x_1=2x_2+2x_3$，自由变量 x_2,x_3。基础解系为：

$$\mathbf{p}_2=\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix},\quad \mathbf{p}_3=\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix}.$$

特征子空间为 $\operatorname{span}\{\mathbf{p}_2,\mathbf{p}_3\}$，基为 $\mathbf{p}_2,\mathbf{p}_3$。

例题 5.16.

求矩阵

$$A=\begin{pmatrix}2 & 7\\ 0 & -1\end{pmatrix}$$

的对角形和对角化变换矩阵。

解 首先，求矩阵 A 的特征值。特征多项式为：

$$\det(A-\lambda I)=\begin{vmatrix}2-\lambda & 7\\ 0 & -1-\lambda\end{vmatrix}=(2-\lambda)(-1-\lambda).$$

令其为零，解得特征值：

$$\lambda_1=2,\quad \lambda_2=-1.$$

对于 $\lambda_1=2$，解方程 $(A-2I)\mathbf{x}=\mathbf{0}$：

$$A-2I=\begin{pmatrix}0 & 7\\ 0 & -3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}.$$

得基础解系：$\mathbf{p}_1=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$。

对于 $\lambda_2=-1$，解方程 $(A+I)\mathbf{x}=\mathbf{0}$：

$$A+I=\begin{pmatrix}3 & 7\\ 0 & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}3 & 7\\ 0 & 0\end{pmatrix}.$$

得 $3x_1+7x_2=0$，取 $x_2=3$，则 $x_1=-7$，故基础解系：$\mathbf{p}_2=\begin{pmatrix}-7\\3\end{pmatrix}$。

因此，对角化变换矩阵为：

$$P = (\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2) = \begin{pmatrix} 1 & -7 \\ 0 & 3 \end{pmatrix},$$

且对角矩阵为：

$$D = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

可验证 $P^{-1}AP = D$，其中

$$P^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{7}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

计算得 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$。

例题 5.17.

求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 6 \\ -3 & 2 & 3 \\ -3 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

的对角形和对角化变换矩阵。

解 首先，求矩阵 A 的特征值。特征多项式为：

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -4-\lambda & 0 & 6 \\ -3 & 2-\lambda & 3 \\ -3 & 0 & 5-\lambda \end{vmatrix}.$$

按第二列展开：

$$= (2-\lambda)\begin{vmatrix} -4-\lambda & 6 \\ -3 & 5-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)[(-4-\lambda)(5-\lambda) - 6\cdot(-3)].$$

计算：

$$(-4-\lambda)(5-\lambda) + 18 = (-20 - \lambda + \lambda^2) + 18 = \lambda^2 - \lambda - 2 = (\lambda - 2)(\lambda + 1).$$

所以，

$$\det(A - \lambda I) = (2-\lambda)(\lambda-2)(\lambda+1) = -(\lambda-2)^2(\lambda+1).$$

特征值为：

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 2 \quad (\text{二重}), \quad \lambda_3 = -1.$$

对于二重特征值 $\lambda = 2$，解方程 $(A - 2I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$：

$$A - 2I = \begin{pmatrix} -6 & 0 & 6 \\ -3 & 0 & 3 \\ -3 & 0 & 3 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

得 $x_1 = x_3$，x_2 自由。基础解系：

$$\mathbf{p}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{p}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

对于特征值 $\lambda=-1$，解方程 $(A+I)\mathbf{x}=\mathbf{0}$：

$$A+I=\begin{pmatrix}-3&0&6\\-3&3&3\\-3&0&6\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-2\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

得 $x_1=2x_3$，$x_2=x_3$。取 $x_3=1$，得基础解系：

$$\mathbf{p}_3=\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}.$$

由于特征值 2 有两个线性无关的特征向量，矩阵可对角化。令变换矩阵：

$$P=(\mathbf{p}_1,\mathbf{p}_2,\mathbf{p}_3)=\begin{pmatrix}1&0&2\\0&1&1\\1&0&1\end{pmatrix},$$

对角矩阵为：

$$D=P^{-1}AP=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&-1\end{pmatrix}.$$

可验证：计算 P^{-1}（过程略）后，有 $P^{-1}AP=D$。

例题 5.18.

求矩阵

$$A=\begin{pmatrix}0&-1&0\\0&0&1\\-1&-3&3\end{pmatrix}$$

的特征值和特征子空间，并利用定理 5.17 确定该矩阵是否能对角化。

解 特征多项式为：

$$\det(A-\lambda I)=\begin{vmatrix}-\lambda&-1&0\\0&-\lambda&1\\-1&-3&3-\lambda\end{vmatrix}=-\lambda\begin{vmatrix}-\lambda&1\\-3&3-\lambda\end{vmatrix}+1\cdot\begin{vmatrix}0&1\\-1&3-\lambda\end{vmatrix}.$$

计算：

$$=-\lambda[(-\lambda)(3-\lambda)+3]+1\cdot[0\cdot(3-\lambda)-(-1)\cdot1]=-\lambda(-\lambda(3-\lambda)+3)+1.$$

化简得：

$$=-\lambda(-\lambda(3-\lambda)+3)+1=\lambda^2(3-\lambda)-3\lambda+1=-\lambda^3+3\lambda^2-3\lambda+1=-(\lambda-1)^3.$$

特征值为 $\lambda=1$（三重）。

解方程 $(A-I)\mathbf{x}=\mathbf{0}$：

$$A-I=\begin{pmatrix}-1&-1&0\\0&-1&1\\-1&-3&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&-1\\0&-2&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

得 $x_1=-x_3, x_2=x_3$，自由变量 x_3。基础解系为 $\mathbf{p}=\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}$，特征子空间维数为 1。

定理 5.17（可能指：矩阵可对角化的充要条件是每个特征值的几何重数等于代数重数）。此处代数重数为 3，几何重数为 1，不相等，故矩阵不能对角化。

例题 5.19.

设 λ 是方阵 A 的特征值。证明：

(1) λ^2 是方阵 A^2 的特征值；

(2) 更一般地，对任意正整数 k，λ^k 是 A^k 的特征值。

解 因为 λ 是 A 的特征值，故存在非零向量 $\mathbf{x}$ 使得 $A\mathbf{x}=\lambda\mathbf{x}$。

(1) 考虑 $A^2\mathbf{x}=A(A\mathbf{x})=A(\lambda\mathbf{x})=\lambda A\mathbf{x}=\lambda\cdot\lambda\mathbf{x}=\lambda^2\mathbf{x}$，所以 λ^2 是 A^2 的特征值，对应特征向量 $\mathbf{x}$。

(2) 对正整数 k 用数学归纳法：当 $k=1$ 时成立。假设 $A^k\mathbf{x}=\lambda^k\mathbf{x}$，则

$$A^{k+1}\mathbf{x}=A(A^k\mathbf{x})=A(\lambda^k\mathbf{x})=\lambda^kA\mathbf{x}=\lambda^k\cdot\lambda\mathbf{x}=\lambda^{k+1}\mathbf{x}.$$

所以对任意正整数 k，λ^k 是 A^k 的特征值。

例题 5.20.

设 A 是可逆方阵。证明：如果 λ 是 A 的特征值，那么 $\lambda\neq0$ 且 λ^{-1} 是 A 的逆矩阵 A^{-1} 的特征值。

解 设 $\mathbf{x}$ 是对应于 λ 的特征向量，即 $A\mathbf{x}=\lambda\mathbf{x}$。因为 A 可逆，故 $\mathbf{x}\neq\mathbf{0}$，且 A^{-1} 存在。

首先证明 $\lambda\neq0$：若 $\lambda=0$，则 $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$，即 A 有零特征值，则 A 不可逆（因为特征值 0 意味着 $\det A=0$），矛盾。所以 $\lambda\neq0$。

在等式 $A\mathbf{x}=\lambda\mathbf{x}$ 两边左乘 A^{-1}，得

$$A^{-1}A\mathbf{x}=A^{-1}(\lambda\mathbf{x})\Rightarrow\mathbf{x}=\lambda A^{-1}\mathbf{x}.$$

因为 $\lambda\neq0$，两边除以 λ 得

$$A^{-1}\mathbf{x}=\lambda^{-1}\mathbf{x}.$$

所以 λ^{-1} 是 A^{-1} 的特征值，对应特征向量 $\mathbf{x}$。

例题 5.21.

证明：如果 λ^2 是线性算子 A^2 的特征值，那么 λ 和 $-\lambda$ 中有一个是 A 的特征值。

解 提示：利用等式 $A^2-\lambda^2E=(A+\lambda E)(A-\lambda E)$。

设 λ^2 是 A^2 的特征值，则存在非零向量 $\mathbf{x}$ 使得 $A^2\mathbf{x}=\lambda^2\mathbf{x}$，即 $(A^2-\lambda^2I)\mathbf{x}=\mathbf{0}$。于是

$$(A+\lambda I)(A-\lambda I)\mathbf{x}=\mathbf{0}.$$

记 $\mathbf{y}=(A-\lambda I)\mathbf{x}$，则上式变为 $(A+\lambda I)\mathbf{y}=\mathbf{0}$。

若 $\mathbf{y}\neq\mathbf{0}$，则 $A\mathbf{y}=-\lambda\mathbf{y}$，即 $-\lambda$ 是 A 的特征值。

若 $\mathbf{y}=\mathbf{0}$，则 $A\mathbf{x}=\lambda\mathbf{x}$，即 λ 是 A 的特征值。

因此，λ 和 $-\lambda$ 中至少有一个是 A 的特征值。

5.2 不变子空间与凯莱哈密顿定理

定义 5.3 (不变子空间)

设 φ 是数域 $\mathbb{F}$ 上向量空间 V 上的线性变换, W 是 V 的子空间, 若 W 适合条件 $\varphi(W) \subseteq W$, 则称 W 是 φ 的不变子空间.

定理 5.9

设 φ 是数域 F 上向量空间 V 上的线性变换, W 是 φ 的不变子空间, 若取 W 的一组基 $\{e_1, \cdots, e_r\}$, 再扩张为 V 的一组基 $\{e_1, \cdots, e_r, e_{r+1}, \cdots, e_n\}$, 则在 V 的这组基下 φ 的表示矩阵具有下列分块形状:

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ O & A_{22} \end{pmatrix},$$

其中 $\boldsymbol{A}_{11}$ 是一个 r 阶矩阵.

推论 5.5

设 φ 是数域 F 上向量空间 V 上的线性变换, $V_1, V_2, \cdots, V_m$ 是 φ 的不变子空间且 $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_m$, 若取 V_i 的基拼成 V 的一组基 $\{\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \cdots, \boldsymbol{e}_n\}$, 则在 V 的这组基下 φ 的表示矩阵具有下列分块对角矩阵的形状:

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{A}_{11} & & & \\ & \boldsymbol{A}_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \boldsymbol{A}_{mm} \end{pmatrix}$$

定理 5.10 (Cayley-Hamilton 定理)

设 $f_A(\lambda) = |\lambda I - A|$ 为矩阵 A 的特征多项式则有 $f_A(A) = 0$.

5.2.1 典型例题讲解

例题 5.22.

设 A 和 B 是向量空间 $\mathbb{R}^n$ 上的线性算子, C 是方阵, λ 是实数。证明如下关于算子迹的结论: (1) $\operatorname{tr}(A+B) = \operatorname{tr} A + \operatorname{tr} B$; (2) $\operatorname{tr}(\lambda A) = \lambda \operatorname{tr} A$; (3) $\operatorname{tr} C^{\top} = \operatorname{tr} C$。

解 (1) 设 A, B 在某一组基下的矩阵表示分别为 (a_{ij}) 和 (b_{ij}), 则 $A+B$ 的矩阵为 $(a_{ij}+b_{ij})$。迹是对角线元素之和:

$$\operatorname{tr}(A+B) = \sum_{i=1}^{n}(a_{ii}+b_{ii}) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii} + \sum_{i=1}^{n} b_{ii} = \operatorname{tr} A + \operatorname{tr} B.$$

(2) 算子 λA 的矩阵为 (λa_{ij}), 所以

$$\operatorname{tr}(\lambda A) = \sum_{i=1}^{n} \lambda a_{ii} = \lambda \sum_{i=1}^{n} a_{ii} = \lambda \operatorname{tr} A.$$

(3): 设 $C = (c_{ij})$, 则 $C^{\top} = (c_{ji})$, 于是

$$\operatorname{tr} C = \sum_{i=1}^{n} c_{ii}, \quad \operatorname{tr} C^{\top} = \sum_{i=1}^{n} (C^{\top})_{ii} = \sum_{i=1}^{n} c_{ii} = \operatorname{tr} C.$$

所以成立。

例题 5.23.

设 A 和 B 是 n 阶方阵。假设 $\det A = \det B$，$\operatorname{tr} A = \operatorname{tr} B$。证明：在 $n = 2$ 时，A 和 B 的特征多项式相等。但当 $n > 2$ 时这个结论不成立。

解 对于 $n = 2$，设特征多项式为 $p(\lambda) = \lambda^2 - (\operatorname{tr} A)\lambda + \det A$。由条件 $\det A = \det B$，$\operatorname{tr} A = \operatorname{tr} B$，所以 A 和 B 的特征多项式相同。

一个经典反例是：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1.5 & 1.5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

迹均为 3，行列式均为 0。但 A 的特征多项式为 $\lambda(\lambda-1)(\lambda-2)$，$B$ 的特征多项式为 $\lambda(\lambda-1.4)^2$，显然不同。所以当 $n > 2$ 时结论不成立。

例题 5.24.

设 A 是向量空间 $\mathbb{R}^n$ 上的线性算子。证明：如果 $V_1, \cdots, V_m$ 是 A 的不变子空间，那么这些子空间的交也是 A 的不变子空间。

解 设 $V = V_1 \cap \cdots \cap V_m$。任取 $\mathbf{v} \in V$，则对每个 i，有 $\mathbf{v} \in V_i$。由于 V_i 是 A 的不变子空间，所以 $A\mathbf{v} \in V_i$。因此 $A\mathbf{v} \in \bigcap_{i=1}^m V_i = V$。故 V 也是 A 的不变子空间。

例题 5.25.

设 A, B 是向量空间 $\mathbb{R}^n$ 上的线性算子。证明：如果 $AB = BA$，那么对任意的 $\lambda \in \mathbb{R}$，$\ker(\lambda I - A)$ 是 B 的不变子空间。

解 记 $V_\lambda = \ker(\lambda I - A)$，即 A 的属于特征值 λ 的特征子空间。任取 $\mathbf{v} \in V_\lambda$，则有 $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$。需要证明 $B\mathbf{v} \in V_\lambda$，即 $A(B\mathbf{v}) = \lambda(B\mathbf{v})$。由于 $AB = BA$，所以

$$A(B\mathbf{v}) = (AB)\mathbf{v} = (BA)\mathbf{v} = B(A\mathbf{v}) = B(\lambda\mathbf{v}) = \lambda(B\mathbf{v}).$$

因此 $B\mathbf{v} \in V_\lambda$，故 V_λ 是 B 的不变子空间。

例题 5.26.

证明：如果 A 是可逆线性算子，那么 A 的不变子空间也是 A^{-1} 的不变子空间。特别地，A 的特征向量也是 A^{-1} 的特征向量。

解 设 W 是 A 的不变子空间，即对任意 $\mathbf{w} \in W$，有 $A\mathbf{w} \in W$。由于 A 可逆，限制映射 $A|_W : W \to W$ 是单射（因为 A 整体可逆），且由于 W 是有限维（因为 $\mathbb{R}^n$ 有限维），$A|_W$ 也是满射，所以是双射。因此对任意 $\mathbf{w} \in W$，存在唯一的 $\mathbf{w}' \in W$ 使得 $A\mathbf{w}' = \mathbf{w}$，即 $\mathbf{w}' = A^{-1}\mathbf{w}$。这说明 $A^{-1}\mathbf{w} \in W$，所以 W 也是 A^{-1} 的不变子空间。

特别地，如果 $\mathbf{v}$ 是 A 的特征向量，即 $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$，则 $\operatorname{span}\{\mathbf{v}\}$ 是 A 的一维不变子空间，从而也是 A^{-1} 的不变子空间，因此存在标量 μ 使得 $A^{-1}\mathbf{v} = \mu\mathbf{v}$。实际上，由 $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ 可得 $A^{-1}\mathbf{v} = \lambda^{-1}\mathbf{v}$，所以 $\mathbf{v}$ 也是 A^{-1} 的特征向量。

例题 5.27.

设 A 是向量空间 $\mathbb{R}^n$ 上的线性算子，其平方是恒等算子。证明：

(1) 对任意的向量 $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$，向量 $\mathbf{v} - A\mathbf{v}$ 是零向量或以 -1 为特征值的特征向量；

(2) $\mathbb{R}^n$ 是特征空间 $\mathbb{R}^n_1$ 和 $\mathbb{R}^n_{-1}$ 的直和。

解 由条件 $A^2=I$，即 $(A-I)(A+I)=0$。

(1) 对任意 $\mathbf{v}\in\mathbb{R}^n$，令 $\mathbf{u}=\mathbf{v}-A\mathbf{v}$。计算

$$A\mathbf{u}=A(\mathbf{v}-A\mathbf{v})=A\mathbf{v}-A^2\mathbf{v}=A\mathbf{v}-\mathbf{v}=-(\mathbf{v}-A\mathbf{v})=-\mathbf{u}.$$

所以，如果 $\mathbf{u}\neq\mathbf{0}$，则 $\mathbf{u}$ 是 A 的属于特征值 -1 的特征向量。

(2) 对任意 $\mathbf{v}\in\mathbb{R}^n$，定义

$$\mathbf{v}_1=\frac{1}{2}(\mathbf{v}+A\mathbf{v}),\quad \mathbf{v}_2=\frac{1}{2}(\mathbf{v}-A\mathbf{v}).$$

则 $\mathbf{v}=\mathbf{v}_1+\mathbf{v}_2$。计算

$$A\mathbf{v}_1=\frac{1}{2}(A\mathbf{v}+A^2\mathbf{v})=\frac{1}{2}(A\mathbf{v}+\mathbf{v})=\mathbf{v}_1,$$

所以 $\mathbf{v}_1$ 属于特征值 1 的特征空间（记为 V_1）。类似地，

$$A\mathbf{v}_2=\frac{1}{2}(A\mathbf{v}-A^2\mathbf{v})=\frac{1}{2}(A\mathbf{v}-\mathbf{v})=-\mathbf{v}_2,$$

所以 $\mathbf{v}_2$ 属于特征值-1 的特征空间（记为 V_{-1}）。因此任意向量可分解为属于 V_1 和 V_{-1} 的向量之和。又若 $\mathbf{v}\in V_1\cap V_{-1}$，则 $A\mathbf{v}=\mathbf{v}$ 且 $A\mathbf{v}=-\mathbf{v}$，所以 $\mathbf{v}=\mathbf{0}$，故直和成立。即 $\mathbb{R}^n=V_1\oplus V_{-1}$。

例题 5.28.

设 A 是向量空间 $\mathbb{R}^n$ 上的幂等线性算子（即 $A^2=A$）。证明：

(1) $B=I-A$ 也是幂等线性算子，而且 $AB=BA$，$I=A+B$；

(2) $\operatorname{im}A$ 是 A 的以 1 为特征值的特征空间，$\ker A$ 是 A 的以 0 为特征值的特征空间；

(3) $\ker A=\operatorname{im}B$；

(4) $\mathbb{R}^n=\operatorname{im}A\oplus\ker A=\operatorname{im}A\oplus\operatorname{im}(I-A)$。

解 (1) 计算 $B^2=(I-A)^2=I-2A+A^2=I-2A+A=I-A=B$，所以 B 幂等。又 $AB=A(I-A)=A-A^2=A-A=0$，同理 $BA=(I-A)A=A-A^2=0$，所以 $AB=BA=0$。显然 $A+B=A+(I-A)=I$。

(2) 先证 $\operatorname{im}A$ 中的向量都是特征值 1 的特征向量：任取 $\mathbf{y}\in\operatorname{im}A$，存在 $\mathbf{x}$ 使 $\mathbf{y}=A\mathbf{x}$，则 $A\mathbf{y}=A(A\mathbf{x})=A^2\mathbf{x}=A\mathbf{x}=\mathbf{y}$，所以 $\mathbf{y}$ 是特征值 1 的特征向量。反之，若 $\mathbf{y}$ 是特征值 1 的特征向量，则 $A\mathbf{y}=\mathbf{y}$，所以 $\mathbf{y}\in\operatorname{im}A$。故 $\operatorname{im}A=V_1$。

对于 $\ker A$: 若 $\mathbf{x}\in\ker A$，则 $A\mathbf{x}=0=0\cdot\mathbf{x}$，所以 $\mathbf{x}$ 是特征值 0 的特征向量。反之，若 $\mathbf{x}$ 是特征值 0 的特征向量，则 $A\mathbf{x}=0$，所以 $\mathbf{x}\in\ker A$。故 $\ker A=V_0$。

(3) 证明 $\ker A=\operatorname{im}B$。任取 $\mathbf{x}\in\operatorname{im}B$，则存在 $\mathbf{u}$ 使 $\mathbf{x}=B\mathbf{u}=(I-A)\mathbf{u}$，于是 $A\mathbf{x}=A(I-A)\mathbf{u}=(A-A^2)\mathbf{u}=0$，所以 $\mathbf{x}\in\ker A$。反之，任取 $\mathbf{x}\in\ker A$，则 $A\mathbf{x}=0$。令 $\mathbf{u}=\mathbf{x}$，则 $B\mathbf{u}=(I-A)\mathbf{x}=\mathbf{x}-A\mathbf{x}=\mathbf{x}$，所以 $\mathbf{x}\in\operatorname{im}B$。故 $\ker A=\operatorname{im}B$。

(4) 由 (2) 和 (3)，有 $\mathbb{R}^n=\operatorname{im}A\oplus\ker A$（因为对于任意 $\mathbf{v}\in\mathbb{R}^n$，可分解为 $\mathbf{v}=A\mathbf{v}+(\mathbf{v}-A\mathbf{v})$，其中 $A\mathbf{v}\in\operatorname{im}A$，且 $\mathbf{v}-A\mathbf{v}\in\ker A$，因为 $A(\mathbf{v}-A\mathbf{v})=A\mathbf{v}-A^2\mathbf{v}=0$；并且若 $\mathbf{v}\in\operatorname{im}A\cap\ker A$，则 $\mathbf{v}=A\mathbf{u}$ 且 $A\mathbf{v}=0$，于是 $0=A\mathbf{v}=A^2\mathbf{u}=A\mathbf{u}=\mathbf{v}$，所以直和成立）。又由 (3) $\ker A=\operatorname{im}B=\operatorname{im}(I-A)$，所以第二个等式成立。

例题 5.29.

更一般地，设 $A_1,\cdots,A_{m-1}$ 是向量空间 $\mathbb{R}^n$ 上的幂等线性算子，且相互正交（即 $A_iA_j=A_jA_i=O$ 如果 $i\neq j$）。证明：

(1) $A=A_1+\cdots+A_{m-1}$ 是幂等线性算子，且 $AA_i=A_iA=A_i$，$1\leq i\leq m-1$；

(2) 置 $A_m=I-A$，则有 $A_mA_i=A_iA_m=O$，$1\leq i\leq m-1$；

(3) $\mathbb{R}^n = \operatorname{im} A_1 \oplus \operatorname{im} A_2 \oplus \cdots \oplus \operatorname{im} A_m$。

解 (1) 计算 $A^2 = (A_1 + \cdots + A_{m-1})^2 = \sum_{i=1}^{m-1} A_i^2 + \sum_{i \neq j} A_i A_j$。由于每个 A_i 幂等，$A_i^2 = A_i$；又当 $i \neq j$ 时 $A_i A_j = O$，所以 $A^2 = \sum_{i=1}^{m-1} A_i = A$，故 A 幂等。

对任意 i，$AA_i = (A_1 + \cdots + A_{m-1})A_i = A_i^2 + \sum_{j \neq i} A_j A_i = A_i + O = A_i$，同理 $A_i A = A_i$。

(2) 令 $A_m = I - A$。首先，A_m 幂等：$A_m^2 = (I - A)^2 = I - 2A + A^2 = I - 2A + A = I - A = A_m$。然后，对任意 i，$A_m A_i = (I - A)A_i = A_i - AA_i = A_i - A_i = O$，同理 $A_i A_m = O$。

(3) 先证明 $\mathbb{R}^n = \operatorname{im} A_1 + \cdots + \operatorname{im} A_m$ 是直和。对任意 $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$，有

$$\mathbf{v} = I\mathbf{v} = (A + A_m)\mathbf{v} = A_1\mathbf{v} + \cdots + A_{m-1}\mathbf{v} + A_m\mathbf{v}.$$

显然 $A_i\mathbf{v} \in \operatorname{im} A_i$，所以 $\mathbf{v}$ 可表示为各像空间中的向量之和。

再证直和：假设存在 $\mathbf{v}_i \in \operatorname{im} A_i$ 使得 $\mathbf{v}_1 + \cdots + \mathbf{v}_m = \mathbf{0}$。由于 $\mathbf{v}_i \in \operatorname{im} A_i$，存在 $\mathbf{u}_i$ 使得 $\mathbf{v}_i = A_i\mathbf{u}_i$。用 A_j 作用上式：当 $j \neq m$ 时，$A_j(\sum_{i=1}^m \mathbf{v}_i) = \sum_{i=1}^m A_j A_i \mathbf{u}_i$。注意当 $i \neq j$ 时 $A_j A_i = O$，所以仅剩 $A_j A_j \mathbf{u}_j = A_j \mathbf{u}_j = \mathbf{v}_j$。因此 $A_j(\sum_{i=1}^m \mathbf{v}_i) = \mathbf{v}_j = \mathbf{0}$。对 $j = m$ 类似，A_m 作用得 $\mathbf{v}_m = \mathbf{0}$。所以所有 $\mathbf{v}_i = \mathbf{0}$，直和成立。

最后，还需证明 $\operatorname{im} A_i$ 互不相交：若 $\mathbf{v} \in \operatorname{im} A_i \cap \operatorname{im} A_j$（$i \neq j$），则存在 $\mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j$ 使 $\mathbf{v} = A_i\mathbf{u}_i = A_j\mathbf{u}_j$。用 A_i 作用：$A_i\mathbf{v} = A_i^2\mathbf{u}_i = A_i\mathbf{u}_i = \mathbf{v}$，同时 $A_i\mathbf{v} = A_i A_j \mathbf{u}_j = O$，所以 $\mathbf{v} = \mathbf{0}$。因此直和分解成立。

例题 5.30.

设 A 是 $\mathbb{R}^n$ 上的线性算子。证明：存在正整数 k 使得

$$\mathbb{R}^n = \ker A^k \oplus \operatorname{im} A^k,$$

并且该直和分解中的两个子空间都是 A 的不变子空间。

证明 首先考虑核与像的升链与降链：

$$\ker A \subseteq \ker A^2 \subseteq \cdots \subseteq \ker A^i \subseteq \ker A^{i+1} \subseteq \cdots,$$

$$\operatorname{im} A \supseteq \operatorname{im} A^2 \supseteq \cdots \supseteq \operatorname{im} A^i \supseteq \operatorname{im} A^{i+1} \supseteq \cdots.$$

由于每个 $\ker A^i$ 和 $\operatorname{im} A^i$ 都是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间，且维数满足

$$\dim \ker A^i + \dim \operatorname{im} A^i = n,$$

因此两个链最终都会稳定。即存在正整数 k 使得

$$\operatorname{im} A^k = \operatorname{im} A^{k+1}.$$

此时由维数公式可得

$$\dim \ker A^k = \dim \ker A^{k+1},$$

结合包含关系即有

$$\ker A^k = \ker A^{k+1}.$$

进一步，对任意 $m \geq 1$，有

$$\operatorname{im} A^k = \operatorname{im} A^{k+m}, \quad \ker A^k = \ker A^{k+m}.$$

接下来证明 $\ker A^k \cap \operatorname{im} A^k = 0$。任取 $z \in \ker A^k \cap \operatorname{im} A^k$，则存在 $x \in \mathbb{R}^n$ 使得 $z = A^k x$，且 $A^k z = 0$。于是

$$A^{2k}x = A^k(A^k x) = A^k z = 0,$$

故 $x \in \ker A^{2k} = \ker A^k$，从而

$$z = A^k x = 0.$$

因此 $\ker A^k \cap \operatorname{im} A^k = 0$。再由维数关系

$$\dim \ker A^k + \dim \operatorname{im} A^k = n,$$

即得

$$\mathbb{R}^n = \ker A^k \oplus \operatorname{im} A^k.$$

显然 $\ker A^k$ 和 $\operatorname{im} A^k$ 都是 A 的不变子空间：若 $x \in \ker A^k$，则 $A^k(Ax) = A^{k+1}x = 0$，故 $Ax \in \ker A^k$；若 $y \in \operatorname{im} A^k$，则存在 u 使得 $y = A^k u$，于是 $Ay = A^{k+1}u \in \operatorname{im} A^{k+1} = \operatorname{im} A^k$。

例题 5.31.

设 A, B 是 n 阶实矩阵，且满足 $AB = BA$。若 B 是幂零矩阵，证明：

$$\det\big(tI - (A+B)\big) = \det(tI - A).$$

证明 对矩阵的阶数 n 进行归纳。当 $n = 1$ 时，B 幂零意味着 $B = 0$，结论显然成立。

假设结论对阶数小于 n 的矩阵成立。考虑 n 阶情形。将 A, B 视为线性算子 $\mathcal{A}, \mathcal{B} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$，即 $\mathcal{A}X = AX$，$\mathcal{B}X = BX$。由 $AB = BA$ 知 $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$。因为 B 幂零，所以 $\mathcal{B}$ 的特征值全为零。记 $V = \ker \mathcal{B}$（即属于特征值 0 的特征子空间）。对任意 $v \in V$，有

$$\mathcal{B}(\mathcal{A}v) = \mathcal{A}(\mathcal{B}v) = \mathcal{A}(0) = 0,$$

故 $\mathcal{A}v \in V$，即 V 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间。

取 V 的一组基 $v_1, v_2, \ldots, v_p$，并将其扩充为 $\mathbb{R}^n$ 的一组基 $v_1, \ldots, v_p, v_{p+1}, \ldots, v_n$。在这组基下，算子 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 的矩阵分别具有如下分块形式：

$$A' = \begin{pmatrix} A_1 & A_0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}, \quad B' = \begin{pmatrix} 0 & B_0 \\ 0 & B_2 \end{pmatrix},$$

其中 A_1 是 p 阶方阵，A_2 是 $n-p$ 阶方阵，B_2 是 $n-p$ 阶方阵。由于 $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$，矩阵 A' 与 B' 可交换，从而可得 $A_2B_2 = B_2A_2$。又因为 B 幂零，故 B' 幂零，进而 B_2 也是幂零矩阵。

计算特征多项式：

$$\det\big(tI - (A+B)\big) = \det\left(tI - \begin{pmatrix} A_1 & A_0 + B_0 \\ 0 & A_2 + B_2 \end{pmatrix}\right) = \det(tI_p - A_1) \cdot \det\big(tI_{n-p} - (A_2 + B_2)\big).$$

类似地，

$$\det(tI - A) = \det(tI_p - A_1) \cdot \det(tI_{n-p} - A_2).$$

由归纳假设，在阶数为 $n-p$（注意 $p \geq 1$，因为 $V \neq \{0\}$；若 $p = n$，则 $B = 0$，结论平凡）的情形下，由于 A_2 与 B_2 可交换且 B_2 幂零，有

$$\det\big(tI_{n-p} - (A_2 + B_2)\big) = \det(tI_{n-p} - A_2).$$

代入前式即得

$$\det\big(tI - (A+B)\big) = \det(tI - A).$$

归纳完成，命题得证。

例题 5.32.

证明：幂等实方阵 A（即 $A^2=A$）相似于分块对角矩阵 $\operatorname{diag}(I_r,0)$，其中 $r=\operatorname{rank}A$，I_r 是 r 阶单位矩阵。利用这一结果证明：对幂等实矩阵 A 有 $\operatorname{rank}A=\operatorname{tr}A$。

解 由第 7 题知，$\mathbb{R}^n=\operatorname{im}A\oplus\ker A$，且 A 在 $\operatorname{im}A$ 上的限制是恒等映射，在 $\ker A$ 上是零映射。取 $\operatorname{im}A$ 的一组基和 $\ker A$ 的一组基，合并成 $\mathbb{R}^n$ 的一组基。在这组基下，算子 A 的矩阵表示为 $\begin{pmatrix}I_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$，其中 $r=\dim(\operatorname{im}A)=\operatorname{rank}A$。所以 A 相似于 $\operatorname{diag}(I_r,0)$。

由于相似矩阵有相同的迹，而 $\operatorname{diag}(I_r,0)$ 的迹为 r，所以 $\operatorname{tr}A=r=\operatorname{rank}A$。

例题 5.33.

方阵 A 和 $A^\top$ 是否有相同的特征向量？是否有相同的特征值？

解 方阵 A 和 $A^\top$ 有相同的特征值，因为特征多项式满足 $\det(\lambda I-A)=\det(\lambda I-A)^\top=\det(\lambda I-A^\top)$，所以特征多项式相同，从而特征值（包括重数）相同。

但特征向量不一定相同。例如，设 $A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}$，特征值为 1 和 0。对于特征值 1，$A$ 的特征向量满足 $\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}$，得 $x+y=x\Rightarrow y=0$，所以特征向量为 $\begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix}$。而 $A^\top=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix}$ 对于特征值 1 的特征向量满足 $\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}$，得 $x=x,x=y$，所以特征向量为 $\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}$。两者不同。

例题 5.34.

对三阶方阵 $A=(a_{ij})$，证明其特征多项式中一次项的系数为 2 阶对称子式之和：

$$\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}a_{11} & a_{13}\\ a_{31} & a_{33}\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}a_{22} & a_{23}\\ a_{32} & a_{33}\end{vmatrix}.$$

解 三阶方阵的特征多项式为

$$f(\lambda)=\det(\lambda I-A)=\begin{vmatrix}\lambda-a_{11} & -a_{12} & -a_{13}\\ -a_{21} & \lambda-a_{22} & -a_{23}\\ -a_{31} & -a_{32} & \lambda-a_{33}\end{vmatrix}.$$

展开后，$f(\lambda)=\lambda^3-(a_{11}+a_{22}+a_{33})\lambda^2+c\lambda-\det A$，其中 c 是 λ 的一次项系数。要证明 c 等于所述三个二阶子式之和。

由行列式展开理论，c 等于所有主子式之和（带符号?）。对于三阶矩阵，一次项系数等于所有二阶主子式的和。具体地，考虑展开式中 λ 的一次项来源：必须从三个对角线元素中恰好选取一个 λ，另外两个位置取常数项，并且这些常数项构成一个二阶子式（要求行指标和列指标相同）。所以三个二阶主子式分别为：

$$\Delta_1=\begin{vmatrix}a_{22} & a_{23}\\ a_{32} & a_{33}\end{vmatrix},\quad \Delta_2=\begin{vmatrix}a_{11} & a_{13}\\ a_{31} & a_{33}\end{vmatrix},\quad \Delta_3=\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{vmatrix}.$$

注意符号：在特征多项式中，λ 的一次项系数应为这些主子式之和。验证：展开行列式，取 λ 的一次项。例如，取第一行的 $\lambda-a_{11}$ 中的 λ，则剩余部分为去掉第一行第一列的子式：

$$\begin{vmatrix}\lambda-a_{22} & -a_{23}\\ -a_{32} & \lambda-a_{33}\end{vmatrix}$$

中取常数项（即不含 λ 的项）为 $\begin{vmatrix} -a_{22} & -a_{23} \\ -a_{32} & -a_{33} \end{vmatrix} = (-1)^2 \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \Delta_1$。但注意整体符号：由于我们在第一行选了 λ，其代数余子式带符号 $(-1)^{1+1} = 1$，所以贡献为 $\lambda \cdot \Delta_1$。类似地，从第二行选 λ 贡献 $\lambda \cdot \Delta_2$，从第三行选 λ 贡献 $\lambda \cdot \Delta_3$。所以一次项系数为 $\Delta_1 + \Delta_2 + \Delta_3$，即所述三个二阶主子式之和。

例题 5.35.

假设向量空间 $\mathbb{R}^3$ 上的线性算子在标准基下的矩阵是

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 2 \\ 2 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

求该线性算子的所有不变子空间。

解 首先计算矩阵 A 的特征值和特征向量。

1. 特征多项式：

$$\begin{aligned} \chi_A(t) &= \det(tI - A) \\ &= \begin{vmatrix} t-4 & 2 & -2 \\ -2 & t & -2 \\ 1 & -1 & t-1 \end{vmatrix} \\ &= (t-1)(t-2)^2. \end{aligned}$$

特征值为 $\lambda_1 = 1$（代数重数 1）和 $\lambda_2 = 2$（代数重数 2）。

2. 特征子空间：

- 对于 $\lambda_1 = 1$，解方程组 $(A - I)\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$：

$$A - I = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \to \boldsymbol{x} = k \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

记 $\boldsymbol{v}_1 = (2, 2, -1)^{\mathsf{T}}$，则特征子空间为

$$U_1 = \operatorname{span}\{\boldsymbol{v}_1\}.$$

- 对于 $\lambda_2 = 2$，解方程组 $(A - 2I)\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$：

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 2 \\ 2 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \to \boldsymbol{x} = s \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

记 $\boldsymbol{v}_2 = (1, 1, 0)^{\mathsf{T}}$，$\boldsymbol{v}_3 = (0, 1, 1)^{\mathsf{T}}$，则特征子空间为

$$U_2 = \operatorname{span}\{\boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_3\}.$$

由于特征值 λ_2 的几何重数等于代数重数（均为 2），故 A 可对角化。

3. 不变子空间的分类：由于 A 可对角化，任何不变子空间都是特征子空间的直和。以下列出所有不变子空间（包括平凡子空间）。

1. 零维子空间：$\{\boldsymbol{0}\}$。
2. 一维不变子空间：
   - 特征子空间 U_1（由属于特征值 1 的特征向量张成）。
   - 特征子空间 U_2 中的任意一维子空间。即对任意不全为零的实数 α, β，由向量 $\alpha\boldsymbol{v}_2 + \beta\boldsymbol{v}_3$ 张成的子空间。

3. 二维不变子空间：
   - 整个特征子空间 U_2。
   - 直和 $U_1 \oplus L$，其中 L 是 U_2 的任意一维子空间。即对任意不全为零的实数 α, β，由 $\boldsymbol{v}_1$ 和 $\alpha\boldsymbol{v}_2 + \beta\boldsymbol{v}_3$ 张成的子空间。
4. 三维不变子空间：整个空间 $\mathbb{R}^3$。

注意：一维和二维不变子空间均有无穷多个，它们由参数 $(\alpha : \beta)$（齐次坐标）参数化。

例题 5.36.

设 λ 是算子 A 的特征值，v 是相应的一个特征向量。证明：
(1) 对任意的非负整数 k 有 $A^k v = \lambda^k v$。
(2) 对任意的多项式 $f(t)$ 有 $f(A)v = f(\lambda)v$。
(3) 对 A 的极小多项式 $\mu_A(t)$ 有 $\mu_A(\lambda) = 0$。这意味着 A 的特征值一定是 A 的极小多项式的根。
(4) 上面 3 个结论对方阵也成立。

解 (1) 用数学归纳法。当 $k = 0$ 时，$A^0 = I$，所以 $Iv = v = \lambda^0 v$，成立。假设 $A^k v = \lambda^k v$，则

$$A^{k+1}v = A(A^k v) = A(\lambda^k v) = \lambda^k Av = \lambda^k \cdot \lambda v = \lambda^{k+1} v.$$

所以对任意非负整数 k 成立。

(2) 设多项式 $f(t) = a_m t^m + a_{m-1}t^{m-1} + \cdots + a_1 t + a_0$，则

$$f(A) = a_m A^m + a_{m-1}A^{m-1} + \cdots + a_1 A + a_0 I.$$

作用于 v：

$$f(A)v = a_m A^m v + a_{m-1}A^{m-1}v + \cdots + a_1 Av + a_0 Iv.$$

由 (1)，$A^i v = \lambda^i v$，所以

$$f(A)v = (a_m\lambda^m + a_{m-1}\lambda^{m-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0)v = f(\lambda)v.$$

(3) 由极小多项式的定义，$\mu_A(A) = 0$。在 (2) 中取 $f = \mu_A$，则 $\mu_A(A)v = \mu_A(\lambda)v$。但 $\mu_A(A) = 0$，所以 $0 = \mu_A(A)v = \mu_A(\lambda)v$。由于 $v \neq 0$，故 $\mu_A(\lambda) = 0$。因此 λ 是 $\mu_A(t)$ 的根。

(4) 对方阵而言，算子就是矩阵乘法，特征值和特征向量的定义类似。以上证明完全适用于方阵，只需将算子 A 视为方阵，v 视为列向量即可。所以结论同样成立。

例题 5.37.

求如下矩阵的特征多项式和极小多项式：

$$(1)\quad A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad (2)\quad B = \begin{pmatrix} 4 & -2 & -2 \\ -5 & 7 & -5 \\ -6 & 6 & -4 \end{pmatrix}.$$

解 (1) 对于矩阵 A，先求特征多项式。计算：

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda - 2 & 0 \\ -1 & -1 & \lambda - 1 \end{vmatrix}.$$

按第二行展开：

$$= (\lambda-2)\begin{vmatrix} \lambda - 3 & 1 \\ -1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda-2)[(\lambda-3)(\lambda-1)+1] = (\lambda-2)(\lambda^2-4\lambda+3+1) = (\lambda-2)(\lambda^2-4\lambda+4) = (\lambda-2)(\lambda-2)^2 = (\lambda-2)^3.$$

所以特征多项式为 $p_A(\lambda) = (\lambda-2)^3$。

下面求极小多项式。由于特征值 2 是三重的，极小多项式可能是 $(\lambda-2), (\lambda-2)^2, (\lambda-2)^3$。检验 $A-2I$：

$$A-2I = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

计算 $(A-2I)^2$：

$$(A-2I)^2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1*1+(-1)*0+(-1)*1 & 1*(-1)+(-1)*0+(-1)*1 & 1*(-1)+(-1) \\ 0 & 0 & \\ 1*1+1*0+(-1)*1 & 1*(-1)+1*0+(-1)*1 & 1*(-1)+1* \end{pmatrix}$$

不为零矩阵。再计算 $(A-2I)^3 = (A-2I)(A-2I)^2$，容易验证为零矩阵（因为 $(A-2I)^3$ 是零矩阵，由于特征多项式满足 Cayley-Hamilton 定理）。实际上，由于特征多项式是 $(\lambda-2)^3$，所以 $(A-2I)^3 = 0$。因此极小多项式是 $(\lambda-2)^d$，其中 d 是使得 $(A-2I)^d = 0$ 的最小正整数。由上面计算，$(A-2I)^2 \neq 0$，而 $(A-2I)^3 = 0$，所以极小多项式为 $\mu_A(\lambda) = (\lambda-2)^3$。

(2) 对于矩阵 B，求特征多项式：

$$\det(\lambda I - B) = \begin{vmatrix} \lambda-4 & 2 & 2 \\ 5 & \lambda-7 & 5 \\ 6 & -6 & \lambda+4 \end{vmatrix}.$$

计算行列式。按第一行展开：

$$\begin{aligned} &= (\lambda-4)\begin{vmatrix} \lambda-7 & 5 \\ -6 & \lambda+4 \end{vmatrix} - 2\begin{vmatrix} 5 & 5 \\ 6 & \lambda+4 \end{vmatrix} + 2\begin{vmatrix} 5 & \lambda-7 \\ 6 & -6 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-4)[(\lambda-7)(\lambda+4)+30] - 2[5(\lambda+4)-30] + 2[-30-6(\lambda-7)] \\ &= (\lambda-4)(\lambda^2-3\lambda-28+30) - 2(5\lambda+20-30) + 2(-30-6\lambda+42) \\ &= (\lambda-4)(\lambda^2-3\lambda+2) - 2(5\lambda-10) + 2(12-6\lambda) \\ &= (\lambda-4)(\lambda-1)(\lambda-2) - 10\lambda + 20 + 24 - 12\lambda \\ &= (\lambda-4)(\lambda-1)(\lambda-2) - 22\lambda + 44. \end{aligned}$$

展开前一项：

$$(\lambda-4)(\lambda-1)(\lambda-2) = (\lambda-4)(\lambda^2-3\lambda+2) = \lambda^3-3\lambda^2+2\lambda-4\lambda^2+12\lambda-8 = \lambda^3-7\lambda^2+14\lambda-8.$$

所以整体为：

$$\lambda^3-7\lambda^2+14\lambda-8-22\lambda+44 = \lambda^3-7\lambda^2-8\lambda+36.$$

因此特征多项式为 $p_B(\lambda) = \lambda^3-7\lambda^2-8\lambda+36$。可以因式分解吗？尝试整数根。检查 $\lambda=2$：8-28-16+36=0，所以 $\lambda=2$ 是一个根。多项式除以 $(\lambda-2)$：

$$(\lambda^3-7\lambda^2-8\lambda+36) \div (\lambda-2) = \lambda^2-5\lambda-18.$$

再求根：$\lambda = \frac{5\pm\sqrt{25+72}}{2} = \frac{5\pm\sqrt{97}}{2}$，不是有理数。所以特征多项式为 $p_B(\lambda) = (\lambda-2)(\lambda^2-5\lambda-18)$。

现在求极小多项式。由于特征值有 3 个：$2, \frac{5+\sqrt{97}}{2}, \frac{5-\sqrt{97}}{2}$，且它们互异，所以极小多项式等于特征多项式：$\mu_B(\lambda) = (\lambda-2)(\lambda^2-5\lambda-18)$。

例题 5.38.

假设 $\mathbb{R}^3$ 上的线性算子 A 在标准基下的矩阵是

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

利用定理 5.37 把 $\mathbb{R}^3$ 分解成两个非平凡不变子空间的直和。

解 定理 5.37 可能是关于极小多项式分解与不变子空间分解的定理。通常，如果极小多项式可以分解为互素因子的乘积，则空间可以分解为对应算子的不变子空间的直和。

先求矩阵的特征多项式和极小多项式。设

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

计算特征多项式：

$$\det(\lambda I - M) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & 0 \\ -1 & \lambda - 2 & -1 \\ 1 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix}.$$

按第一行展开：

$$= (\lambda - 1)\begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 \\ 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 1) = (\lambda - 1)^2(\lambda - 2).$$

所以特征多项式为 $p(\lambda) = (\lambda - 1)^2(\lambda - 2)$。

现在求极小多项式。可能为 $(\lambda - 1)(\lambda - 2)$ 或 $(\lambda - 1)^2(\lambda - 2)$。检验 $M - I$：

$$M - I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

计算 $(M - I)(M - 2I)$：

$$M - 2I = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

乘积：

$$(M - I)(M - 2I) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1+1-1 & 0 & 0+1-1 \\ 1+0+0 & 0 & 0+0+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq 0.$$

再计算 $(M - I)^2(M - 2I)$：先算 $(M - I)^2$：

$$(M - I)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0+1-1 & 0+1+0 & 0+1+0 \\ 0+0+0 & 0+0+0 & 0+0+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

然后 $(M-I)^2(M-2I)$：

$$\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1&0&0\\1&0&1\\-1&0&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0&0\\0+1-1&0&0+1-1\\0&0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

所以 $(M-I)^2(M-2I)=0$。因此极小多项式为 $\mu(\lambda)=(\lambda-1)^2(\lambda-2)$。

设 $p_1(\lambda)=(\lambda-1)^2$，$p_2(\lambda)=\lambda-2$，则存在多项式 $u(\lambda),v(\lambda)$ 使得 $u(\lambda)p_1(\lambda)+v(\lambda)p_2(\lambda)=1$。那么 $\mathbb{R}^3=\ker p_1(M)\oplus\ker p_2(M)$，其中 $\ker p_1(M)=\ker(M-I)^2$，$\ker p_2(M)=\ker(M-2I)$。

计算 $\ker(M-2I)$，即特征值 2 的特征子空间：解 $(M-2I)\mathbf{x}=0$：

$$\begin{pmatrix}-1&0&0\\1&0&1\\-1&0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\mathbf{0}.$$

得 $-x_1=0$，$x_1+x_3=0$，$-x_1-x_3=0$，所以 $x_1=0,x_3=0$，x_2 自由。所以特征向量为 $\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$，子空间 $V_2=\operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}\right\}$。

再计算 $\ker(M-I)^2$：由上面计算，$(M-I)^2=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，解 $(M-I)^2\mathbf{x}=0$：

$$\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\x_2+x_3\\0\end{pmatrix}=\mathbf{0},$$

所以 $x_2+x_3=0$，即 $x_3=-x_2$，而 x_1 自由。所以解空间维数为 2，基为 $\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$。因此 $\ker(M-I)^2=\operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}\right\}$。

验证直和：这两个子空间的和是整个空间，且交为零（因为维数之和为 3）。所以 $\mathbb{R}^3=\ker(M-I)^2\oplus\ker(M-2I)$，这就是两个非平凡不变子空间的直和。

例题 5.39.

利用凯莱-哈密顿定理求如下矩阵的逆矩阵：

$$(1)\ \begin{pmatrix}3&5\\4&8\end{pmatrix},\qquad(2)\ \begin{pmatrix}2&-1&0\\-1&2&-1\\0&-1&2\end{pmatrix},\qquad(3)\ \begin{pmatrix}1&-1&0\\-1&2&-1\\0&-1&2\end{pmatrix}.$$

解 凯莱-哈密顿定理指出：矩阵满足其特征多项式。即若 $p(\lambda)=\det(\lambda I-A)=\lambda^n+c_{n-1}\lambda^{n-1}+\cdots+c_1\lambda+c_0$，则 $p(A)=A^n+c_{n-1}A^{n-1}+\cdots+c_1A+c_0I=0$。由此可得 $A\cdot(-\frac{1}{c_0}(A^{n-1}+c_{n-1}A^{n-2}+\cdots+c_1I))=I$，当 $c_0\neq0$ 时，逆矩阵为 $A^{-1}=-\frac{1}{c_0}(A^{n-1}+c_{n-1}A^{n-2}+\cdots+c_1I)$。

(1) 设 $A=\begin{pmatrix}3 & 5\\ 4 & 8\end{pmatrix}$。特征多项式：

$$p(\lambda)=\det(\lambda I-A)=\begin{vmatrix}\lambda-3 & -5\\ -4 & \lambda-8\end{vmatrix}=(\lambda-3)(\lambda-8)-20=\lambda^2-11\lambda+24-20=\lambda^2-11\lambda+4.$$

所以 $c_1=-11, c_0=4$。由 Cayley-Hamilton，$A^2-11A+4I=0$，即 $A^2-11A=-4I$，两边乘以 $-\frac{1}{4}$ 得 $-\frac{1}{4}(A^2-11A)=I$，整理得 $A\cdot\frac{1}{4}(11I-A)=I$，所以

$$A^{-1}=\frac{1}{4}(11I-A)=\frac{1}{4}\left(\begin{pmatrix}11 & 0\\ 0 & 11\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}3 & 5\\ 4 & 8\end{pmatrix}\right)=\frac{1}{4}\begin{pmatrix}8 & -5\\ -4 & 3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2 & -5/4\\ -1 & 3/4\end{pmatrix}.$$

(2) 设 $B=\begin{pmatrix}2 & -1 & 0\\ -1 & 2 & -1\\ 0 & -1 & 2\end{pmatrix}$。特征多项式：

$$p(\lambda)=\det(\lambda I-B)=\begin{vmatrix}\lambda-2 & 1 & 0\\ 1 & \lambda-2 & 1\\ 0 & 1 & \lambda-2\end{vmatrix}.$$

按第一行展开：

$$\begin{aligned}&=(\lambda-2)\begin{vmatrix}\lambda-2 & 1\\ 1 & \lambda-2\end{vmatrix}-1\cdot\begin{vmatrix}1 & 1\\ 0 & \lambda-2\end{vmatrix}\\ &=(\lambda-2)[(\lambda-2)^2-1]-[1\cdot(\lambda-2)-0]\\ &=(\lambda-2)(\lambda^2-4\lambda+4-1)-(\lambda-2)\\ &=(\lambda-2)(\lambda^2-4\lambda+3)-(\lambda-2)\\ &=(\lambda-2)(\lambda^2-4\lambda+2).\end{aligned}$$

所以 $p(\lambda)=(\lambda-2)(\lambda^2-4\lambda+2)=\lambda^3-6\lambda^2+10\lambda-4$。因此 $c_2=-6, c_1=10, c_0=-4$。由 Cayley-Hamilton，$B^3-6B^2+10B-4I=0$，即 $B^3-6B^2+10B=4I$，两边除以 4 得 $\frac{1}{4}(B^3-6B^2+10B)=I$，但这不是 B 乘以一个矩阵的形式。我们需要表达为 $B\cdot X=I$，所以从 $B^3-6B^2+10B-4I=0$ 得 $B(B^2-6B+10I)=4I$，因此

$$B^{-1}=\frac{1}{4}(B^2-6B+10I).$$

计算 B^2：

$$B^2=\begin{pmatrix}2 & -1 & 0\\ -1 & 2 & -1\\ 0 & -1 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2 & -1 & 0\\ -1 & 2 & -1\\ 0 & -1 & 2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4+1+0 & -2-2+0 & 0+1+0\\ -2-2+0 & 1+4+1 & 0-2-2\\ 0+1+0 & 0-2-2 & 0+1+4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5 & -4 & 1\\ -4 & 6 & -4\\ 1 & -4 & 5\end{pmatrix}.$$

然后 $B^2-6B+10I=\begin{pmatrix}5 & -4 & 1\\ -4 & 6 & -4\\ 1 & -4 & 5\end{pmatrix}-6\begin{pmatrix}2 & -1 & 0\\ -1 & 2 & -1\\ 0 & -1 & 2\end{pmatrix}+10\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$。分别计算：

$$-6B=\begin{pmatrix}-12 & 6 & 0\\ 6 & -12 & 6\\ 0 & 6 & -12\end{pmatrix},\quad 10I=\begin{pmatrix}10 & 0 & 0\\ 0 & 10 & 0\\ 0 & 0 & 10\end{pmatrix}.$$

求和：

$$B^2-6B+10I=\begin{pmatrix}5-12+10 & -4+6+0 & 1+0+0\\ -4+6+0 & 6-12+10 & -4+6+0\\ 1+0+0 & -4+6+0 & 5-12+10\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3 & 2 & 1\\ 2 & 4 & 2\\ 1 & 2 & 3\end{pmatrix}.$$

所以逆矩阵为：

$$B^{-1}=\frac{1}{4}\begin{pmatrix}3&2&1\\2&4&2\\1&2&3\end{pmatrix}.$$

(3) 设 $C=\begin{pmatrix}1&-1&0\\-1&2&-1\\0&-1&2\end{pmatrix}$。特征多项式：

$$p(\lambda)=\det(\lambda I-C)=\begin{vmatrix}\lambda-1&1&0\\1&\lambda-2&1\\0&1&\lambda-2\end{vmatrix}.$$

按第一行展开：

$$\begin{aligned}
&=(\lambda-1)\begin{vmatrix}\lambda-2&1\\1&\lambda-2\end{vmatrix}-1\cdot\begin{vmatrix}1&1\\0&\lambda-2\end{vmatrix}\\
&=(\lambda-1)[(\lambda-2)^2-1]-[1\cdot(\lambda-2)-0]\\
&=(\lambda-1)(\lambda^2-4\lambda+4-1)-(\lambda-2)\\
&=(\lambda-1)(\lambda^2-4\lambda+3)-(\lambda-2)\\
&=(\lambda-1)(\lambda-1)(\lambda-3)-(\lambda-2)\quad(\text{因为}\lambda^2-4\lambda+3=(\lambda-1)(\lambda-3))\\
&=(\lambda-1)^2(\lambda-3)-(\lambda-2)\\
&=\lambda^3-5\lambda^2+7\lambda-3-\lambda+2=\lambda^3-5\lambda^2+6\lambda-1.
\end{aligned}$$

所以 $p(\lambda)=\lambda^3-5\lambda^2+6\lambda-1$，即 $c_2=-5,c_1=6,c_0=-1$。由 Cayley-Hamilton，$C^3-5C^2+6C-I=0$，移项得 $C^3-5C^2+6C=I$，即 $C(C^2-5C+6I)=I$，所以

$$C^{-1}=C^2-5C+6I.$$

计算 C^2：

$$C^2=\begin{pmatrix}1&-1&0\\-1&2&-1\\0&-1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1&0\\-1&2&-1\\0&-1&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1+1+0&-1-2+0&0+1+0\\-1-2+0&1+4+1&0-2-2\\0+1+0&0-2-2&0+1+4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&-3&1\\-3&6&-4\\1&-4&5\end{pmatrix}.$$

然后 $C^2-5C+6I=\begin{pmatrix}2&-3&1\\-3&6&-4\\1&-4&5\end{pmatrix}-5\begin{pmatrix}1&-1&0\\-1&2&-1\\0&-1&2\end{pmatrix}+6\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$。计算：

$$-5C=\begin{pmatrix}-5&5&0\\5&-10&5\\0&5&-10\end{pmatrix},\quad 6I=\begin{pmatrix}6&0&0\\0&6&0\\0&0&6\end{pmatrix}.$$

求和：

$$C^2-5C+6I=\begin{pmatrix}2-5+6&-3+5+0&1+0+0\\-3+5+0&6-10+6&-4+5+0\\1+0+0&-4+5+0&5-10+6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&2&1\\2&2&1\\1&1&1\end{pmatrix}.$$

所以逆矩阵为：

$$C^{-1}=\begin{pmatrix}3&2&1\\2&2&1\\1&1&1\end{pmatrix}.$$

5.3 实对称矩阵的对角化

定理 5.11

实对称矩阵的特征多项式的每一个复数根都是实数，从而它们都是特征值。

定理 5.12

实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的属于不同特征值的特征向量正交。

定理 5.13

实对称矩阵一定正交相似于对角矩阵。

对于 n 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$，求一个正交矩阵 $\boldsymbol{T}$，使得 $\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}$ 为对角矩阵的步骤如下：

第 1 步计算特征多项式 $|\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}|$，求出它的全部不同的根 $\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_m$，它们是 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值。

第 2 步对于每一个特征值 λ_j，求齐次线性方程组 $(\lambda_j\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系 $\boldsymbol{\alpha}_{j1},\boldsymbol{\alpha}_{j2},\ldots,\boldsymbol{\alpha}_{jr_j}$，将它们施密特正交化并单位化，得到一组标准正交向量 $\boldsymbol{\eta}_{j1},\boldsymbol{\eta}_{j2},\ldots,\boldsymbol{\eta}_{jr_j}$。

第 3 步令

$$\boldsymbol{T}=(\boldsymbol{\eta}_{11},\ldots,\boldsymbol{\eta}_{1r_1},\ldots,\boldsymbol{\eta}_{m1},\ldots,\boldsymbol{\eta}_{mr_m}),$$

则 $\boldsymbol{T}$ 是 n 阶正交矩阵，且

$$\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}=\operatorname{diag}\left(\underbrace{\lambda_1,\ldots,\lambda_1}_{r_1},\ldots,\underbrace{\lambda_m,\ldots,\lambda_m}_{r_m}\right).$$

命题 5.1

如果 n 阶实矩阵 $\boldsymbol{A}$ 正交相似于一个对角矩阵 $\boldsymbol{D}$，那么 $\boldsymbol{A}$ 一定是对称矩阵。

命题 5.2

两个 n 阶实对称矩阵正交相似的充分必要条件是它们相似。

例题 5.40.

将矩阵

$$A=\begin{pmatrix}11 & 2 & -8\\ 2 & 2 & 10\\ -8 & 10 & 5\end{pmatrix}$$

正交相似对角化。

解 矩阵 A 是实对称矩阵，故必可正交对角化。步骤如下：

求特征多项式

$$\begin{aligned}\det(\lambda I-A)&=\begin{vmatrix}\lambda-11 & -2 & 8\\ -2 & \lambda-2 & -10\\ 8 & -10 & \lambda-5\end{vmatrix}\\ &=\lambda^3-18\lambda^2-81\lambda+1458\\ &=(\lambda-9)(\lambda^2-9\lambda-162)\\ &=(\lambda-9)(\lambda-18)(\lambda+9).\end{aligned}$$

故特征值为 $\lambda_1=9$，$\lambda_2=18$，$\lambda_3=-9$。

- 对 $\lambda_1=9$，解 $(9I-A)\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$：

$$9I-A=\begin{pmatrix}-2&-2&8\\-2&7&-10\\8&-10&4\end{pmatrix}\to \boldsymbol{x}_1=k_1\begin{pmatrix}2\\2\\1\end{pmatrix}.$$

- 对 $\lambda_2=18$，解 $(18I-A)\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$：

$$18I-A=\begin{pmatrix}7&-2&8\\-2&16&-10\\8&-10&13\end{pmatrix}\to \boldsymbol{x}_2=k_2\begin{pmatrix}-2\\1\\2\end{pmatrix}.$$

- 对 $\lambda_3=-9$，解 $(-9I-A)\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$，等价于 $(9I+A)\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$：

$$9I+A=\begin{pmatrix}20&2&-8\\2&11&10\\-8&10&14\end{pmatrix}\to \boldsymbol{x}_3=k_3\begin{pmatrix}1\\-2\\2\end{pmatrix}.$$

取 $k_1=k_2=k_3=1$，得特征向量

$$\boldsymbol{v}_1=\begin{pmatrix}2\\2\\1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{v}_2=\begin{pmatrix}-2\\1\\2\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{v}_3=\begin{pmatrix}1\\-2\\2\end{pmatrix}.$$

由于 A 实对称且特征值互异，它们两两正交。

$$\boldsymbol{\eta}_1=\frac{\boldsymbol{v}_1}{\|\boldsymbol{v}_1\|}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2\\2\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2/3\\2/3\\1/3\end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{\eta}_2=\frac{\boldsymbol{v}_2}{\|\boldsymbol{v}_2\|}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}-2\\1\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2/3\\1/3\\2/3\end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{\eta}_3=\frac{\boldsymbol{v}_3}{\|\boldsymbol{v}_3\|}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1\\-2\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1/3\\-2/3\\2/3\end{pmatrix}.$$

令正交矩阵

$$T=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\eta}_1&\boldsymbol{\eta}_2&\boldsymbol{\eta}_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2/3&-2/3&1/3\\2/3&1/3&-2/3\\1/3&2/3&2/3\end{pmatrix},$$

则有

$$T^{-1}AT=T^{\mathsf{T}}AT=\operatorname{diag}(9,18,-9).$$

例题 5.41.

将矩阵

$$A=\begin{pmatrix}5&-1&-1\\-1&5&-1\\-1&-1&5\end{pmatrix}$$

正交相似对角化。

解 矩阵 A 是实对称矩阵，故必可正交对角化。步骤如下：

特征多项式为

$$\begin{aligned}\det(\lambda I - A) &= \begin{vmatrix} \lambda-5 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda-5 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda-5 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-5)^3 + 1 + 1 - \big((\lambda-5)+(\lambda-5)+(\lambda-5)\big) \\ &= (\lambda-5)^3 + 2 - 3(\lambda-5) \\ &= \lambda^3 - 15\lambda^2 + 72\lambda - 108 \\ &= (\lambda-3)(\lambda-6)^2.\end{aligned}$$

故特征值为 $\lambda_1 = 3$（单重），$\lambda_2 = 6$（二重）。

- 对 $\lambda_1 = 3$，解 $(3I - A)\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$：

$$3I - A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \to \boldsymbol{v}_1 = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- 对 $\lambda_2 = 6$，解 $(6I - A)\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$：

$$6I - A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \to \boldsymbol{x} = k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

取两个线性无关的特征向量

$$\boldsymbol{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

- 对于 $\lambda_1 = 3$，单位化 $\boldsymbol{v}_1$：

$$\boldsymbol{\eta}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- 对于 $\lambda_2 = 6$，特征子空间为 $\{\boldsymbol{x} \mid x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$。将 $\boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_3$ 正交化（施密特过程）：

$$\boldsymbol{u}_2 = \boldsymbol{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{u}_3 = \boldsymbol{v}_3 - \frac{\boldsymbol{v}_3 \cdot \boldsymbol{u}_2}{\boldsymbol{u}_2 \cdot \boldsymbol{u}_2} \boldsymbol{u}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

为简化，取 $\boldsymbol{u}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$（乘以 2）。此时 $\boldsymbol{u}_2$ 与 $\boldsymbol{u}_3$ 正交。单位化：

$$\boldsymbol{\eta}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{\eta}_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{6} \\ -2/\sqrt{6} \end{pmatrix}.$$

令正交矩阵

$$T = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\eta}_1 & \boldsymbol{\eta}_2 & \boldsymbol{\eta}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & 0 & -2/\sqrt{6} \end{pmatrix},$$

则有

$$T^{-1}AT = T^{\mathsf{T}}AT = \operatorname{diag}(3, 6, 6).$$

5.4 正交矩阵的典范式

定理 5.14

设 A 是 n 阶正交矩阵。定义线性算子 $\mathcal{A} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$，$X \mapsto AX$。则对 $\mathbb{R}^n$ 中任意的两个向量 X 和 Y，有

$$(AX|AY) = (X|Y).$$

即算子 $\mathcal{A}$ 保持点积，从而也保持长度和距离。

定理 5.15

设线性算子 $\mathcal{A} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 保持点积，即对任意的 $X, Y \in \mathbb{R}^n$ 有 $(AX|AY) = (X|Y)$。那么 $\mathcal{A}$ 在 $\mathbb{R}^n$ 的标准基下的矩阵 A 是正交矩阵。

引理 5.1

设 A 是正交矩阵。

1. 如果 λ 是 A 的特征值，那么 $\lambda = 1$ 或 -1。
2. 如果 X 和 Y 分别是属于特征值 1 和 -1 的特征向量，那么 X 和 Y 正交，即 $(X|Y) = 0$。

引理 5.2

假设 A 是 n 阶正交矩阵，定义线性算子 $\mathcal{A} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$，$X \mapsto AX$。那么 $\mathcal{A}$ 的不变子空间的正交补也是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间。

引理 5.3

假设 A 是二阶正交矩阵，$\mathcal{A} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$，$X \mapsto AX$ 是相应的线性算子。

1. 如果 $\det A = 1$，那么存在角 θ 使得

$$A = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

此时 $\mathcal{A}$ 是绕原点的旋转，旋转角度为 θ。

2. 如果 $\det A=-1$，那么存在角 θ 使得

$$A=\begin{pmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ \sin\theta & -\cos\theta\end{pmatrix},$$

并且存在正交矩阵 B 使得

$$B^{-1}AB=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}.$$

此时 $\mathcal{A}$ 是关于一条直线的反射，该直线与 x 轴的夹角为 $\theta/2$。

定理 5.16

设 A 是 n 阶正交矩阵，那么存在 n 阶正交矩阵 B 使得

$$B^{-1}AB=\operatorname{diag}\left(\begin{pmatrix}\cos\theta_1 & -\sin\theta_1\\ \sin\theta_1 & \cos\theta_1\end{pmatrix},\cdots,\begin{pmatrix}\cos\theta_r & -\sin\theta_r\\ \sin\theta_r & \cos\theta_r\end{pmatrix},I_k,-I_l\right),$$

其中 $2r+k+l=n$，$\theta_1,\theta_2,\ldots,\theta_r$ 均不是 π 的整数倍，I_k 和 I_l 分别是 k 阶和 l 阶单位矩阵。

例题 5.42.

设 u 和 v 是欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中的两个向量，且 $\|u\|=\|v\|$。证明：存在一个保距线性算子 $\mathcal{A}:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$，使得 $\mathcal{A}(u)=v$。

证明 将 u 扩充为 $\mathbb{R}^n$ 的一个标准正交基 $u=u_1,u_2,\ldots,u_n$。同时将 v 扩充为 $\mathbb{R}^n$ 的一个标准正交基 $v=v_1,v_2,\ldots,v_n$。定义线性算子 $\mathcal{A}:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$，使得 $\mathcal{A}(u_i)=v_i$ 对 $i=1,2,\ldots,n$ 成立。由于 $\{u_i\}$ 和 $\{v_i\}$ 都是标准正交基，故对任意 $x,y\in\mathbb{R}^n$，设 $x=\sum_{i=1}^n a_iu_i$，$y=\sum_{i=1}^n b_iu_i$，则有

$$(\mathcal{A}x|\mathcal{A}y)=\left(\sum_{i=1}^n a_iv_i\middle|\sum_{j=1}^n b_jv_j\right)=\sum_{i,j}a_ib_j(v_i|v_j)=\sum_{i=1}^n a_ib_i=(x|y).$$

因此 $\mathcal{A}$ 是保距算子，且满足 $\mathcal{A}(u)=v$。

例题 5.43.

设 $u_1,u_2,\ldots,u_k$ 和 $v_1,v_2,\ldots,v_k$ 是欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中的两组向量。证明：存在一个保距线性算子 $\mathcal{A}:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$，使得 $\mathcal{A}(u_i)=v_i$（$i=1,2,\ldots,k$）当且仅当 $(u_i|u_j)=(v_i|v_j)$ 对所有 $1\leqslant i,j\leqslant k$ 成立。

证明 必要性：若存在保距线性算子 $\mathcal{A}$ 使得 $\mathcal{A}(u_i)=v_i$，则

$$(v_i|v_j)=(\mathcal{A}u_i|\mathcal{A}u_j)=(u_i|u_j).$$

充分性：假设 $(v_i|v_j)=(u_i|u_j)$ 对所有 i,j 成立。首先证明以下性质：对任意标量 $\lambda_1,\ldots,\lambda_k$，

$$\sum_{i=1}^k\lambda_iu_i=0\quad\text{当且仅当}\quad\sum_{i=1}^k\lambda_iv_i=0.$$

事实上，若 $\sum_{i=1}^k\lambda_iu_i=0$，则对任意 j 有 $(\sum_{i=1}^k\lambda_iu_i|u_j)=0$，即 $\sum_{i=1}^k\lambda_i(u_i|u_j)=0$。由条件得 $\sum_{i=1}^k\lambda_i(v_i|v_j)=0$，从而 $(\sum_{i=1}^k\lambda_iv_i|v_j)=0$。由于 $v_1,\ldots,v_k$ 张成的子空间中，内积非退化，可得 $\sum_{i=1}^k\lambda_iv_i=0$。反之同理。

记 $U=\langle u_1,\ldots,u_k\rangle$，$V=\langle v_1,\ldots,v_k\rangle$。定义映射 $\mathcal{A}_0:U\to V$ 为

$$\mathcal{A}_0\left(\sum_{i=1}^k a_iu_i\right)=\sum_{i=1}^k a_iv_i.$$

由上述性质知 $\mathcal{A}_0$ 是良定义的线性映射，且保持内积（因为 $(u_i|u_j)=(v_i|v_j)$）。将 $\mathcal{A}_0$ 扩展为整个 $\mathbb{R}^n$ 上的保距线性算子：取 $U^\perp$ 的一个标准正交基 $\alpha_1,\ldots,\alpha_l$，以及 $V^\perp$ 的一个标准正交基 $\beta_1,\ldots,\beta_l$，定义 $\mathcal{A}(\alpha_i)=\beta_i$，并与

$\mathcal{A}_0$ 结合即得所求。

例题 5.44.

设 w 是欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中的非零向量。对任意 $x \in \mathbb{R}^n$，定义

$$\mathcal{R}_w(x) = x - 2\frac{(x|w)}{(w|w)}w.$$

证明：$\mathcal{R}_w$ 是保距线性算子（即关于超平面 $w^\perp$ 的反射）。

证明 线性性可直接验证。下证保距性：对任意 $x, y \in \mathbb{R}^n$，将它们分解为

$$x = aw + u, \quad y = bw + v, \quad \text{其中} u, v \in \langle w\rangle^\perp.$$

则 $(x|w) = a(w|w)$，$(y|w) = b(w|w)$，于是

$$\mathcal{R}_w(x) = x - 2aw = -aw + u, \quad \mathcal{R}_w(y) = y - 2bw = -bw + v.$$

计算内积：

$$(\mathcal{R}_w(x)|\mathcal{R}_w(y)) = (-aw + u| - bw + v) = ab(w|w) + (u|v).$$

而

$$(x|y) = (aw + u|bw + v) = ab(w|w) + (u|v).$$

故 $(\mathcal{R}_w(x)|\mathcal{R}_w(y)) = (x|y)$，即 $\mathcal{R}_w$ 保持内积，从而是保距算子。

例题 5.45.

求正交矩阵

$$A = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

的典范式。

解 首先注意到 A 是实对称矩阵，因此它正交相似于对角矩阵，且特征值均为实数。计算特征多项式：

$$\det(\lambda I - A) = 0.$$

为简化，令 $B = 3A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$，则 A 的特征值 λ 满足 3λ 是 B 的特征值。计算 B 的特征多项式：

$$\begin{aligned}
\det(\mu I - B) &= \begin{vmatrix} \mu - 2 & -2 & 1 \\ -2 & \mu + 1 & -2 \\ 1 & -2 & \mu - 2 \end{vmatrix} \\
&= (\mu - 2)\big[(\mu + 1)(\mu - 2) - 4\big] + 2\big[-2(\mu - 2) + 2\big] + \big[4 - (\mu + 1)\big] \\
&= (\mu - 2)(\mu^2 - \mu - 6) + 2(-2\mu + 6) + (3 - \mu) \\
&= \mu^3 - 3\mu^2 - 9\mu + 27.
\end{aligned}$$

解方程 $\mu^3 - 3\mu^2 - 9\mu + 27 = 0$，得 $\mu = 3$（二重根）和 $\mu = -3$。因此 A 的特征值为 $\lambda = 1$（二重）和 $\lambda = -1$（一重）。

由于 A 是实对称正交矩阵，它正交相似于对角矩阵。根据正交矩阵的典范式定理，其典范式为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

即对应于定理中的参数 $k=2,\ l=1,\ r=0$（无旋转块）。

例题 5.46.

求正交矩阵

$$A=\frac{1}{13}\begin{pmatrix} 3 & 4 & -12 \\ 12 & 3 & 4 \\ -4 & 12 & 3 \end{pmatrix}$$

的典范式。

解 首先验证 A 是正交矩阵：计算 $A^{\mathrm{T}}A=I$（过程略）。计算行列式得 $\det(A)=-1$，故 A 是一个瑕旋转（旋转反射）。

为求典范式，先计算 A 的特征值。令 $B=13A$，则

$$B=\begin{pmatrix} 3 & 4 & -12 \\ 12 & 3 & 4 \\ -4 & 12 & 3 \end{pmatrix}.$$

计算 B 的特征多项式：

$$\det(\mu I-B)=\mu^3-9\mu^2-117\mu+2197.$$

分解得 $(\mu+13)(\mu^2-22\mu+169)=0$，解得特征值：

$$\mu_1=-13,\quad \mu_2=11+4\sqrt{3}i,\quad \mu_3=11-4\sqrt{3}i.$$

于是 A 的特征值为

$$\lambda_1=\frac{\mu_1}{13}=-1,\quad \lambda_2=\frac{11+4\sqrt{3}i}{13},\quad \lambda_3=\frac{11-4\sqrt{3}i}{13}.$$

记 $\lambda_2=e^{i\theta}$，则

$$\cos\theta=\frac{11}{13},\quad \sin\theta=\frac{4\sqrt{3}}{13}.$$

根据正交矩阵的典范式定理，存在正交矩阵 T，使得

$$T^{-1}AT=\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \frac{11}{13} & -\frac{4\sqrt{3}}{13} & 0 \\ \frac{4\sqrt{3}}{13} & \frac{11}{13} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

该矩阵即为 A 的典范式。

5.5 正交投影与最小二乘法

定义 5.4 (正交投影)

设 V 是内积空间，U 是 V 的有限维子空间。若 $\{e_1,\dots,e_n\}$ 是 U 的一组标准正交基，则映射 $P_U: V\to V$ 定义为

$$P_U(v)=\sum_{i=1}^{n}(v\mid e_i)e_i,\quad \forall v\in V,$$

称为 V 到 U 上的正交投影。

定理 5.17 (垂直线最短)

设 U 是内积空间 V 的子空间，$f\in V$。若 $f_0=P_U(f)$ 是 f 在 U 中的正交投影，则对任意 $\varphi\in U$，有

$$\|f-\varphi\|\geq\|f-f_0\|,$$

等号成立当且仅当 $\varphi=f_0$。

定义 5.5 (最小二乘解)

设 A 为 $m\times n$ 实矩阵，$B\in\mathbb{R}^m$。称 $X_0\in\mathbb{R}^n$ 为线性方程组 $AX=B$ 的最小二乘解，如果它满足

$$\|AX_0-B\|^2=\min_{X\in\mathbb{R}^n}\|AX-B\|^2,$$

其中 $\|\cdot\|$ 是 $\mathbb{R}^m$ 中的欧氏范数。满足上述条件且范数最小的解称为模最小解。

定理 5.18 (最小二乘解的刻画)

设 A 的列向量组为 $\mathbf{a}_1,\dots,\mathbf{a}_n$，记 $U=\operatorname{span}\{\mathbf{a}_1,\dots,\mathbf{a}_n\}$。则 X_0 是最小二乘解当且仅当 AX_0 是 B 在 U 上的正交投影，即

$$AX_0=P_U(B).$$

等价地，X_0 满足正规方程组

$$A^{\mathsf{T}}AX=A^{\mathsf{T}}B.$$

定理 5.19 (格拉姆行列式与线性无关)

设 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 是欧氏空间中的向量组，其格拉姆矩阵为 $G=\big((\mathbf{e}_i\mid\mathbf{e}_j)\big)_{n\times n}$，行列式 $\det G$ 称为格拉姆行列式。则 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 线性无关当且仅当 $\det G\neq 0$。

1. **正交投影计算**：若子空间 U 有一组标准正交基 $\{e_1,\dots,e_n\}$，则 f 在 U 上的正交投影为

$$P_U(f)=\sum_{i=1}^{n}(f\mid e_i)e_i.$$

若基不是标准正交的，可通过 Gram–Schmidt 正交化得到标准正交基后再计算。

2. **最小二乘解计算**：对线性方程组 $AX=B$，求解正规方程组

$$A^{\mathsf{T}}AX=A^{\mathsf{T}}B.$$

若 A 的列向量线性无关，则 $A^{\mathsf{T}}A$ 可逆，最小二乘解唯一，为

$$X=(A^{\mathsf{T}}A)^{-1}A^{\mathsf{T}}B.$$

若 A 的列向量线性相关，则正规方程组有无穷多解，其中模最小的解可通过广义逆或奇异值分解求得。

例题 5.47.

用最小二乘法求拟合下面数据的直线方程，并在坐标平面上画出数据点和所求直线。

x	-1	0	1	2
y	0	1	3	9

解 设直线方程为 $y=ax+b$，其中 a,b 为待求参数。将数据点代入方程得到方程组：

$$\begin{cases} -1\cdot a+b=0 \\ 0\cdot a+b=1 \\ 1\cdot a+b=3 \\ 2\cdot a+b=9 \end{cases}$$

写成矩阵形式 $AX=B$，其中

$$A=\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix},\quad X=\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \\ 9 \end{pmatrix}.$$

求解正规方程组 $A^{\mathsf{T}}AX=A^{\mathsf{T}}B$：

$$A^{\mathsf{T}}A=\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix},$$

$$A^{\mathsf{T}}B=\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \\ 9 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 21 \\ 13 \end{pmatrix}.$$

所以有

$$\begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 21 \\ 13 \end{pmatrix}.$$

解此方程组：

$$\begin{cases} 6a+2b=21 \\ 2a+4b=13 \end{cases}\quad\Rightarrow\quad\begin{cases} a=\frac{29}{10}=2.9 \\ b=\frac{9}{10}=0.9 \end{cases}$$

故所求直线方程为

$$y=2.9x+0.9.$$

例题 5.48.

用最小二乘法求拟合同一数据的二次函数 $y=ax^2+bx+c$，并作出概略图。

解 设二次函数为 $y = ax^2 + bx + c$，其中 a, b, c 为待求参数。将数据点代入方程得到方程组：

$$\begin{cases} (-1)^2 \cdot a + (-1) \cdot b + c = 0 \\ 0^2 \cdot a + 0 \cdot b + c = 1 \\ 1^2 \cdot a + 1 \cdot b + c = 3 \\ 2^2 \cdot a + 2 \cdot b + c = 9 \end{cases}$$

写成矩阵形式 $AX = B$，其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \\ 9 \end{pmatrix}.$$

求解正规方程组 $A^{\mathsf{T}}AX = A^{\mathsf{T}}B$：

$$A^{\mathsf{T}}A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 4 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 18 & 8 & 6 \\ 8 & 6 & 2 \\ 6 & 2 & 4 \end{pmatrix},$$

$$A^{\mathsf{T}}B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 4 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 39 \\ 21 \\ 13 \end{pmatrix}.$$

所以有

$$\begin{pmatrix} 18 & 8 & 6 \\ 8 & 6 & 2 \\ 6 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 39 \\ 21 \\ 13 \end{pmatrix}.$$

解此方程组：

$$\begin{cases} 18a + 8b + 6c = 39 \\ 8a + 6b + 2c = 21 \\ 6a + 2b + 4c = 13 \end{cases}$$

解得 $a = 1, b = 1, c = 1$。故所求二次函数为

$$y = x^2 + x + 1.$$



第 6 章 复向量空间 $\mathbb{C}^n$

6.1 复数域

1. 复数域 (中学:$\sqrt{-1}=i$, 引进复数 $a+ib$ 其中 $a,b\in\mathbb{R}$. 缺陷：回避了虚数 i 的存在问题因为我们没有定义过负数开平方)

用实数给出复数的定义: 所有有序实数对 (a,b) 构成的集合称为复数集. 对有序实数对的加法和乘法定义如下：

$$(a,b)+(c,d)=(a+c,b+d)$$

$$(a,b)\cdot(c,d)=(ac-bd,ad+bc)$$

容易验证: 这样定义的复数集满足域的所有公理, 也就是说满足加法与乘法的结合律、交换律和分配律, 对加法有零元素 $(0,0)$, 对每个元素有逆元素 $(-a,-b)$, 对乘法有单位元素 $(1,0)$, 且每个非零元素 (a,b) 都有逆元素 $(\frac{a}{a^2+b^2},\frac{-b}{a^2+b^2})$.

序数对 (a,b) 总可以表示为 $(a,b)=(a,0)+(0,1)(b,0)$.

建立映射 $a\mapsto(a,0)$, 该映射是一一对应的, 且保持加法和乘法运算, 因此可将实数域看作复域的一个子集, 记号 $(a,0)$ 与 a 不加区分. 记 $(0,1)$ 为 i, 则有序实数对 (a,b) 可表示为：

$$(a,b)=(a,0)+(0,b)=(a,0)+(b,0)\cdot(0,1)=a+bi$$

其中 i 满足：


$$i^2=(0,1)\cdot(0,1)=(-1,0)=-1$$

这上面用有序实数对定义的复数可以用我们熟知的记号表示.

数 i 的平方为 -1, 现在用 i 表示一个实数对 $(0,1)$ 这样就解决 i 的存在问题

2. 复数的表示

上节定义的有序实数对 (x,y) 为复数, 记作 z, 引入记号 $i=(0,1)$ 和恒同实数 a 与 $(a,0)$ 后,$z=(x,y)=(x,0)+(0,1)(y,0)=x+iy$.



$x = \mathrm{Re}z, y = \mathrm{Im}z, x, y \in \mathbb{R}$.

P 表示复数 $x + iy$.

$(x, y) \leftrightarrow P$, 复数与平面上的点一一对应.


与复数建立这种对应关系的平面称为复平面, 记为 $\mathbb{C}$.

复数与平面上的自由向量一一对应, 即 $z = x + iy \leftrightarrow P = (x, y) \leftrightarrow \overrightarrow{OP}$.

向量 $\overrightarrow{OP}$ 的长度 r 为复数 $x + iy$ 的模, 记 $|z|$.

显然 $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}, |x|, |y| \leq |z| \leq |x| + |y|$.

假如 P 不是原点（即 $z \neq 0$）, 则向量 $\overrightarrow{OP}$ 与 x 轴正向之间的夹角称为 z 的辐角, 记 $\mathrm{Arg}\ z$.




辐角的符号规定为：由 x 实轴依逆时针方向转到 $\overrightarrow{OP}$ 为正, 顺时针方向为负. 显然, 一个复数有无限多个辐角, 若 θ_0 为 z 的一个辐角, 那么 $\theta = \theta_0 + 2k\pi$（$k \in \mathbb{Z}$）给出复数 z 的全部辐角. 为了方便, 我们只取一个辐角与之对应, 称为辐角主值, 记作 $\arg z$, 其中 $-\pi < \arg z \leq \pi$, 故 $\mathrm{Arg}\ z = \arg z + 2k\pi$（$k \in \mathbb{Z}$）.

问：给定复数 $z = x + iy$（$z \neq 0$）, 如何求 $\arg z$?

$\tan\theta = \frac{y}{x}$, 而 $-\frac{\pi}{2} < \arctan\frac{y}{x} < \frac{\pi}{2}$.

$$\arg z = \begin{cases} \arctan\frac{y}{x} & \text{当} x > 0, y \in \mathbb{R} \\ \frac{\pi}{2} & \text{当} x = 0, y > 0 \\ \arctan\frac{y}{x} + \pi & \text{当} x < 0, y \geq 0 \\ \arctan\frac{y}{x} - \pi & \text{当} x < 0, y < 0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{当} x = 0, y < 0 \end{cases} \quad (z \neq 0)$$

上面讨论说, 给定复数的实部与虚部, 我们可以求出复数的模与辐角（$z = 0$ 时, 辐角不存在）. 反之, 我们给定复数的模 r 与辐角 θ, 我们有 $\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \end{cases}$, 所以 $z = x + iy = r(\cos\theta + i\sin\theta)$.



我们定义 $e^{i\theta}$ 为 $e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$（欧拉记号）.

容易证明,$e^{i\theta_1+i\theta_2}=e^{i\theta_1}\cdot e^{i\theta_2}$. 这样 $z=re^{i\theta}$（$z\neq 0$）.

复数 $x-iy$ 称为复数 $z=x+iy$ 的共轭复数, 记作 $\overline{z}$.

$|\overline{z}|=|z|$,$\arg\overline{z}=-\arg z$,$|z|^2=z\overline{z}$,$x=\frac{z+\overline{z}}{2}$,$y=\frac{z-\overline{z}}{2i}$.

复数的三种表示如何转换：

当 $z=x+iy\neq 0$, 记 $\arg z=\theta$（主值）, 则

$$\tan\frac{\theta}{2}=\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta}=\frac{r\sin\theta}{r+r\cos\theta}=\frac{y}{x+\sqrt{x^2+y^2}}$$

所以 $\arg z=\theta=2\arctan\frac{y}{x+\sqrt{x^2+y^2}}$.


3. 复数的运算

(1) $z_1=x_1+iy_1,z_2=x_2+iy_2,z_1=z_2\Leftrightarrow x_1=x_2,y_1=y_2$.

$z_1=r_1e^{i\theta_1},z_2=r_2e^{i\theta_2},z_1=z_2\Leftrightarrow r_1=r_2,\theta_1=\theta_2+2k\pi$.

(2) $z_1+z_2=(x_1+x_2)+i(y_1+y_2)$

$z_1-z_2=z_1+(-z_2)=(x_1-x_2)+i(y_1-y_2)$



复数的加减法与向量的加减法保持一致.

(3) 讨论复数的乘法与除法：

$z_1=x_1+iy_1,z_2=x_2+iy_2,z_1z_2=(x_1+iy_1)(x_2+iy_2)=(x_1x_2-y_1y_2)+i(x_1y_2+x_2y_1)$

除法定义为乘法的逆运算：


$zz_2=z_1\Rightarrow z=\frac{z_1}{z_2}$, 即 $(x+iy)(x_2+iy_2)=x_1+iy_1$

$$\frac{z_1}{z_2}=\frac{z_1\overline{z_2}}{z_2\overline{z_2}}=\frac{x_1x_2+y_1y_2}{x_2^2+y_2^2}+i\frac{y_1x_2-x_1y_2}{x_2^2+y_2^2}\quad(z_2\neq 0)$$

用指数形式讨论乘法与除法：

$z_1=r_1e^{i\theta_1},z_2=r_2e^{i\theta_2},z_1z_2=r_1r_2e^{i(\theta_1+\theta_2)}$

$$\begin{cases}|z_1z_2|=r_1r_2\\ \operatorname{Arg}(z_1z_2)=\operatorname{Arg}z_1+\operatorname{Arg}z_2\end{cases}$$



$z_1 z_2$ 所对应的向量是把 z_1 所对应向量的长度伸缩 $r_2 = |z_2|$ 倍, 然后再旋转一个角度 $\theta = \arg z_2$.

当 $|z| = 1$, 只旋转一个角度. 用单位复数乘以任何数, 几何上相应的向量旋转一个角度.

4. 复数的乘幂与方根

乘幂：$z = re^{i\theta}, z^n = (re^{i\theta})^n$（$n$ 为正整数）

$(\cos\theta + i\sin\theta)^n = e^{in\theta} = \cos n\theta + i\sin n\theta.$

方根：$w^n = z$（$n \geq 2, n \in \mathbb{N}$）, $w = ?$

用 $\sqrt[n]{z}$ 表示 z 的所有 n 次方根, 根据代数学基本定理, 有 n 个.

设 $z = re^{i\theta}, w = \rho e^{i\varphi}$,

$$\rho^n e^{in\varphi} = re^{i\theta}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \rho^n = r \\ n\varphi = \theta + 2k\pi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \rho = \sqrt[n]{r} \\ \varphi = \frac{\theta + 2k\pi}{n} \end{cases} \qquad k \in \mathbb{N}$$

$w_k = (\sqrt[n]{z})_k = \sqrt[n]{r} e^{i\frac{\theta+2k\pi}{n}} = e^{i\frac{2k\pi}{n}} \cdot \sqrt[n]{r} e^{i\frac{\theta}{n}}$, k 为某个整数.

$(\sqrt[n]{z})_k$（$k \in \mathbb{N}$）表示所有 n 次方根, $\sqrt[n]{z}$ 表示某个 n 次方根.

$w_k = (\sqrt[n]{z})_k = e^{i\frac{2k\pi}{n}} \cdot w_0$, 其中 $w_0 = \sqrt[n]{r} e^{i\frac{\theta}{n}}$.

即 $w_0, ww_0, w^2 w_0, \cdots, w^{n-1} w_0$.

可由 w_0 依次绕原点旋转 $\frac{2\pi}{n}, \frac{2\pi}{n} \cdot 2, \cdots$

但当 k 取到 n 时, 又与 w_0 重合, 故非零复数 z 的 n 次方根共有 n 个, 它们分布在以原点为圆心, 半径为 $\sqrt[n]{r}$ 的圆周上.

特别地, 单位根 $z^n = 1, z_k = e^{i\frac{2\pi k}{n}}$（$k = 0, 1, 2, \cdots, n-1$）.

单位根：$1, w = e^{i\frac{2\pi}{n}}, w^2, w^3, \cdots, w^{n-1}$.（$1 + w + w^2 + \cdots + w^{n-1} = 0$）

$w^n - 1 = 0 \Rightarrow (w-1)(1 + w + w^2 + \cdots + w^{n-1}) = 0$

$\mathrm{Arg} z_1 z_2 = \mathrm{Arg} z_1 + \mathrm{Arg} z_2$

$\mathrm{Arg} z_1 = \left\{\frac{\pi}{6} + 2n\pi\right\}_{n=0,\pm1,\cdots}$

$\mathrm{Arg} z_2 = \left\{\frac{\pi}{4} + 2m\pi\right\}_{m=0,\pm1}$

$\mathrm{Arg} z_1 z_2 = \left\{\frac{5}{12}\pi + 2k\pi\right\}_{k=0,\pm1,\cdots}$

若 $n = 0, m = 1$, $\mathrm{Arg} z_1 + \mathrm{Arg} z_2 = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{4} + 2\pi = \frac{29}{12}\pi, k = 2.$

$\arg z_1 z_2 = \arg z_1 + \arg z_2 + 2k\pi$

$\arg \frac{z_1}{z_2} = \arg z_1 - \arg z_2 + 2k\pi$

例题 6.1.

设 A, B 为 n 阶实方阵，证明：

$$\begin{vmatrix} A & B \\ -B & A \end{vmatrix} = |A+iB| \cdot |A-iB|,$$

其中 $i = \sqrt{-1}$.

解 考虑如下分块矩阵乘法：

$$\begin{pmatrix} E & iE \\ O & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ -B & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & -iE \\ O & E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A+iB & 0 \\ -B & A-iB \end{pmatrix}.$$

两边取行列式，并利用行列式乘法定理以及三角分块矩阵行列式的性质，得

$$\begin{vmatrix} E & iE \\ O & E \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} A & B \\ -B & A \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} E & -iE \\ O & E \end{vmatrix} = |A+iB| \cdot |A-iB|.$$

由于

$$\begin{vmatrix} E & iE \\ O & E \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} E & -iE \\ O & E \end{vmatrix} = 1,$$

因此

$$\begin{vmatrix} A & B \\ -B & A \end{vmatrix} = |A+iB| \cdot |A-iB|.$$

例题 6.2.

设 $C = (c_{kl})$ 是 n 阶复方阵，$Z = [z_1, \cdots, z_n]^T$ 是复未知数列向量. 那么齐次线性方程组 $CZ = 0$ 有非零解当且仅当 $\det C = 0$. 设 $c_{kl} = a_{kl} + ib_{kl}$，其中 $a_{kl}, b_{kl} \in \mathbb{R}$，且记 $z_k = x_k + iy_k$，其中 $x_k, y_k \in \mathbb{R}$. 则方程组 $CZ = 0$ 等价于一个含有 $2n$ 个实未知数 x_k, y_k 和 $2n$ 个实方程的齐次线性方程组，其系数矩阵为一个 $2n$ 阶实方阵. 有非零解的条件是该实方阵的行列式为零. 另一方面，由 $\det C = 0$ 等价于两个实方程：$\mathrm{Re}(\det C) = 0$ 和 $\mathrm{Im}(\det C) = 0$. 为什么这两个条件（一个行列式为零和两个实方程）是一致的？提示：利用本章习题 2 和习题 3 的结论.

解 记 $C = A + iB$，其中 A, B 是 n 阶实矩阵，且 $A = (a_{kl}), B = (b_{kl})$. 则方程组 $CZ = 0$ 可写为

$$(A+iB)(X+iY) = 0,$$

其中 $X = (x_1, \ldots, x_n)^T, Y = (y_1, \ldots, y_n)^T$. 分离实部和虚部，得到

$$\begin{cases} AX - BY = 0, \\ BX + AY = 0. \end{cases}$$

这等价于

$$\begin{pmatrix} A & -B \\ B & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = 0.$$

记 $M = \begin{pmatrix} A & -B \\ B & A \end{pmatrix}$，则原复方程组有非零解当且仅当上述实方程组有非零解，即 $\det M = 0$.

由习题 3 知，

$$\det M = |\det(A-iB)|^2.$$

又由习题 2 知，$\det(A+iB) = \overline{\det(A-iB)}$，故 $\det(A-iB) = \overline{\det(A+iB)}$. 因此，

$$\det M = |\det(A+iB)|^2 = |\det C|^2.$$

但 $\det C$ 是一个复数，设 $\det C = a + ib$，则 $|\det C|^2 = a^2 + b^2$. 于是 $\det M = 0$ 当且仅当 $a^2 + b^2 = 0$，即 $a = 0$ 且 $b = 0$. 这正是 $\det C = 0$ 的实部和虚部都为零.

因此，复方程组有非零解的复数条件 $\det C = 0$（即 $a = 0$ 且 $b = 0$）与相应的实方程组有非零解的条件 $\det M = 0$ 是等价的. 虽然复数条件给出两个实方程，但实方程组的行列式 $\det M$ 恰好是这两个实方程的平方和，因此 $\det M = 0$ 等价于这两个实方程同时成立. 所以两者是一回事.

例题 6.3.

证明：

$$\begin{vmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ a_{n-2} & a_{n-1} & a_0 & \cdots & a_{n-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_0 \end{vmatrix} = \prod_{k=0}^{n-1} \left(a_0 + \epsilon^k a_1 + \epsilon^{2k} a_2 + \cdots + \epsilon^{(n-1)k} a_{n-1}\right),$$

其中 ϵ 是 1 的 n 次本原根（即 $\epsilon = e^{2\pi i/n}$）.

解 记左边的行列式为 D. 考虑多项式

$$P(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_{n-1} x^{n-1}.$$

令 $\epsilon_k = \epsilon^k$（$k = 0, 1, \ldots, n-1$），则 ϵ_k 是 $x^n = 1$ 的 n 个不同的根.

对行列式 D 进行如下操作：对于每个 $k = 0, 1, \ldots, n-1$，将第 j 列（$j = 1, 2, \ldots, n$）乘以 ϵ_k^{j-1} 后加到第一列上. 由于矩阵是循环的，第 i 行第 j 列的元素为 $a_{(i-j) \bmod n}$. 经过计算，变换后第一列的第 i 行元素为 $\epsilon_k^{i-1} P(\epsilon_k^{-1})$. 因此，第一列的所有元素都含有因子 $P(\epsilon_k^{-1})$，而列变换不改变行列式的值，所以 $P(\epsilon_k^{-1})$ 整除 D. 由于 $\epsilon_k^{-1} = \epsilon^{n-k}$，它也是 n 次本原根的幂，所以 $a_0 + a_1\epsilon^k + a_2\epsilon^{2k} + \cdots + a_{n-1}\epsilon^{(n-1)k}$（适当调整 k）都是 D 的因子.

这些因子两两互质（因为对于不同的 k，它们是不同的线性形式），且次数之和为 n. 而 D 作为 $a_0, a_1, \ldots, a_{n-1}$ 的多项式，次数为 n，且 a_0^n 项的系数为 1. 比较次数和首项系数，即得

$$D = \prod_{k=0}^{n-1} P(\epsilon^k) = \prod_{k=0}^{n-1} \left(a_0 + \epsilon^k a_1 + \epsilon^{2k} a_2 + \cdots + \epsilon^{(n-1)k} a_{n-1}\right).$$

6.2 复空间 $\mathbb{C}^n$ 上的内积与酉空间

定义 6.1 (内积)

设 $(\alpha|\beta)$ 是 $\mathbb{C}^n$ 上的二元复值函数，满足以下条件：

1. **Hermite** 对称性：对任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}^n$，$(\beta|\alpha) = \overline{(\alpha|\beta)}$；
2. 恒正性：对任意非零向量 $\alpha \in \mathbb{C}^n$，$(\alpha|\alpha) > 0$；
3. 共轭双线性性：对任意 $\alpha, \alpha_1, \alpha_2, \beta, \beta_1, \beta_2 \in \mathbb{C}^n$ 和任意 $\lambda_1, \lambda_2, \mu_1, \mu_2 \in \mathbb{C}$，

$$(\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2|\beta) = \lambda_1(\alpha_1|\beta) + \lambda_2(\alpha_2|\beta),$$
$$(\alpha|\mu_1\beta_1 + \mu_2\beta_2) = \overline{\mu}_1(\alpha|\beta_1) + \overline{\mu}_2(\alpha|\beta_2).$$

则称 $(\alpha|\beta)$ 为 $\mathbb{C}^n$ 上的一个内积.

命题 6.1 (内积的基本性质)

1. 对任意 $\alpha,\beta\in\mathbb{C}^n$，$(\alpha|0)=0=(\beta|0)$.
2. 对任意 $\alpha_1,\dots,\alpha_p,\beta_1,\dots,\beta_q\in\mathbb{C}^n$ 和 $\lambda_1,\dots,\lambda_p,\mu_1,\dots,\mu_q\in\mathbb{C}$，

$$\left(\sum_{i=1}^{p}\lambda_i\alpha_i\middle|\sum_{j=1}^{q}\mu_j\beta_j\right)=\sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{q}\lambda_i\overline{\mu}_j(\alpha_i|\beta_j).$$

定理 6.1 (Cauchy-Schwarz 不等式)

对任意 $\alpha,\beta\in\mathbb{C}^n$，

$$|(\alpha|\beta)|^2\le(\alpha|\alpha)(\beta|\beta),$$

等号成立当且仅当 α 与 β 线性相关.

定义 6.2 (Gram 矩阵与正定 Hermite 矩阵)

设 $\{e_1,e_2,\dots,e_n\}$ 是 $\mathbb{C}^n$ 的一组基，内积 $(\alpha|\beta)$ 在这组基下的 **Gram** 矩阵为

$$G=\begin{pmatrix}(e_1|e_1)&(e_1|e_2)&\cdots&(e_1|e_n)\\(e_2|e_1)&(e_2|e_2)&\cdots&(e_2|e_n)\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\(e_n|e_1)&(e_n|e_2)&\cdots&(e_n|e_n)\end{pmatrix}.$$

Gram 矩阵 G 是 Hermite 矩阵（即 $G^*=G$）且正定：对任意非零行向量 $x\in\mathbb{C}^n$，$xGx^*>0$.

定义 6.3 (酉空间)

$\mathbb{C}^n$ 连同其上一个内积 $(\alpha|\beta)$ 一起称为一个 酉空间，仍记为 $\mathbb{C}^n$. 向量 α 的 范数定义为 $\|\alpha\|=\sqrt{(\alpha|\alpha)}$，范数为 1 的向量称为 单位向量.

定义 6.4 (正交)

设 $\alpha,\beta\in\mathbb{C}^n$，若 $(\alpha|\beta)=0$，则称 α 与 β 正交，记作 $\alpha\perp\beta$.

定理 6.2 (正交向量组的线性无关性)

酉空间 $\mathbb{C}^n$ 中任意 k 个两两正交的非零向量 $\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_k$ 线性无关.

定理 6.3 (Gram-Schmidt 正交化)

设 $\{\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_n\}$ 是 $\mathbb{C}^n$ 的一组基，则存在正交向量组 $\{\beta_1,\beta_2,\dots,\beta_n\}$，使得对每个 k，$\{\beta_1,\beta_2,\dots,\beta_k\}$ 是子空间 $\langle\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_k\rangle$ 的一组基. 具体构造为：

$$\begin{aligned}\beta_1&=\alpha_1,\\\beta_2&=\alpha_2-\frac{(\alpha_2|\beta_1)}{(\beta_1|\beta_1)}\beta_1,\\&\vdots\\\beta_k&=\alpha_k-\sum_{j=1}^{k-1}\frac{(\alpha_k|\beta_j)}{(\beta_j|\beta_j)}\beta_j.\end{aligned}$$

将每个 β_j 单位化 $\xi_j=\frac{\beta_j}{\|\beta_j\|}$，即得到标准正交基 $\{\xi_1,\xi_2,\dots,\xi_n\}$.

定理 6.4 (标准正交基的存在性与扩充)

1. $\mathbb{C}^n$ 中存在标准正交基.
2. $\mathbb{C}^n$ 中任意一组两两正交的单位向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_k\}$ 都可以扩充为 $\mathbb{C}^n$ 的一组标准正交基.

定理 6.5 (标准正交基与酉矩阵)

设 $\{\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n\}$ 和 $\{\eta_1, \eta_2, \ldots, \eta_n\}$ 是 $\mathbb{C}^n$ 的两组标准正交基，过渡矩阵 U 满足

$$(\eta_1, \eta_2, \ldots, \eta_n) = (\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n)U,$$

则 U 是酉矩阵，即 $UU^* = U^*U = I$. 反之，若 U 是酉矩阵，则由上式定义的 $\{\eta_1, \eta_2, \ldots, \eta_n\}$ 也是一组标准正交基.

定理 6.6 (矩阵的 UT 分解)

任意 n 阶可逆复方阵 A 均可唯一分解为 $A = UT$，其中 U 是酉矩阵，T 是对角元全为正实数的上三角矩阵.

定义 6.5 (正交补)

设 W 是 $\mathbb{C}^n$ 的子空间，向量 $\beta \in \mathbb{C}^n$ 若与 W 中所有向量正交，则称 β 与 W 正交. 所有与 W 正交的向量构成的集合称为 W 的正交补，记作 $W^\perp$，即

$$W^\perp = \{\beta \in \mathbb{C}^n \mid (\alpha|\beta) = 0,\ \forall \alpha \in W\}.$$

定理 6.7 (正交直和分解)

对于 $\mathbb{C}^n$ 的子空间 W，有

$$\mathbb{C}^n = W \oplus W^\perp.$$

定义 6.6 (酉空间的同构)

设 $\mathbb{C}^n$ 和 $\mathbb{C}^m$ 是两个酉空间，若存在线性映射 $\sigma : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^m$ 保持内积，即对任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}^n$，

$$(\sigma(\alpha)|\sigma(\beta)) = (\alpha|\beta),$$

则称 σ 为同构映射，称 $\mathbb{C}^n$ 与 $\mathbb{C}^m$ 同构.

定理 6.8 (有限维酉空间的同构)

任意 n 维酉空间均同构于具有标准内积的 $\mathbb{C}^n$. 两个有限维酉空间同构的充分必要条件是它们维数相同.

例题 6.4.

设 V 是欧氏空间或酉空间（即埃氏空间），其中的两个基 $e_1, \ldots, e_n$ 和 $v_1, \ldots, v_n$ 互称为**对偶基**，如果它们满足

$$(e_i|v_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

证明：对 V 中的任意一组基 $u_1, u_2, \ldots, u_n$，存在唯一的一组基 $v_1, v_2, \ldots, v_n$ 使得它们互为对偶基.

解 取 $V = \mathbb{C}^n$ 并赋予标准内积 $(x|y) = x_1\overline{y_1} + \cdots + x_n\overline{y_n}$. 设 $u_1, u_2, \ldots, u_n$ 是 $\mathbb{C}^n$ 的任意一组基. 令矩阵 A 是以 $u_1, u_2, \ldots, u_n$ 为列向量的矩阵，即

$$A = (u_1, u_2, \ldots, u_n).$$

则 A 可逆. 记 $e_1, e_2, \ldots, e_n$ 为 $\mathbb{C}^n$ 的标准基（即 e_i 是第 i 个分量为 1、其余为 0 的列向量）. 于是有 $u_i = Ae_i$.

现在定义向量 v_j 为

$$v_j = (A^*)^{-1}e_j, \quad j = 1, 2, \ldots, n,$$

其中 $A^* = \overline{A}^\top$ 是 A 的共轭转置. 由于 A 可逆，A^* 也可逆，故 $(A^*)^{-1}$ 存在，从而 $v_1, v_2, \ldots, v_n$ 也是 $\mathbb{C}^n$ 的一组基.

接下来验证对偶条件：

$$(u_i|v_j) = (Ae_i|(A^*)^{-1}e_j).$$

对于任意向量 $x, y \in \mathbb{C}^n$ 和矩阵 M，有内积性质 $(Mx|y) = (x|M^*y)$. 于是

$$(Ae_i|(A^*)^{-1}e_j) = (e_i|A^*(A^*)^{-1}e_j) = (e_i|e_j) = \delta_{ij}.$$

因此 $(u_i|v_j) = \delta_{ij}$，即两组基互为对偶基.

下证唯一性. 若存在另一组基 $w_1, w_2, \ldots, w_n$ 也满足 $(u_i|w_j) = \delta_{ij}$. 令矩阵 $B = (w_1, w_2, \ldots, w_n)$，则条件等价于

$$A^*B = I,$$

因为 $(Ae_i|w_j) = e_i^\top A^* w_j = (A^*w_j)_i = \delta_{ij}$ 表明 $A^*w_j = e_j$，即 $A^*B = I$. 于是 $B = (A^*)^{-1}$，从而 $w_j = (A^*)^{-1}e_j = v_j$. 故对偶基唯一.

6.3 埃尔米特矩阵的对角化

定义 6.7 (埃尔米特矩阵)

设 A 是 n 阶复方阵，若 A 的共轭转置 A^* 等于 A，即 $A^* = A$，则称 A 为埃尔米特矩阵.

记 $\mathbb{C}^n$ 为复数域上的 n 维列向量空间，其标准内积定义为

$$(x|y) = \sum_{i=1}^{n} x_i\overline{y_i} = x^\top \overline{y}, \quad x, y \in \mathbb{C}^n.$$

对任意 n 阶复方阵 A 及 $x, y \in \mathbb{C}^n$，有

$$(Ax|y) = (Ax)^\top \overline{y} = x^\top A^\top \overline{y} = x^\top \overline{A^*}\overline{y} = (x|A^*y).$$

特别地，当 A 是埃尔米特矩阵时，有 $(Ax|y) = (x|Ay)$.

引理 6.1 (埃尔米特矩阵的性质)

设 A 是埃尔米特矩阵，定义线性算子 $A : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n, x \mapsto Ax$，则：

1. 对任意 $x, y \in \mathbb{C}^n$，有 $(Ax|y) = (x|Ay)$；
2. A 的特征值都是实数；
3. A 的属于不同特征值的特征向量互相正交；
4. A 的不变子空间的正交补也是 A 的不变子空间.

定理 6.9 (埃尔米特矩阵的酉对角化)

设 A 是埃尔米特矩阵，则存在酉矩阵 U，使得 $U^{-1}AU$ 为对角矩阵.

对角化埃尔米特矩阵的步骤如下：

1. 求出埃尔米特矩阵的特征多项式，得到所有特征值；
2. 对每个特征值，求出对应的特征子空间的一组基；
3. 将每个特征子空间的基正交化、单位化，得到一组标准正交基；

4. 将这些标准正交基向量作为列向量构成一个酉矩阵 U，则 $U^{-1}AU$ 为对角矩阵，其对角线元素为对应的特征值.

定义 6.8 (半双线性型)

设 U 是 $\mathbb{C}^n$ 的子空间. 函数 $f: U\times U\to\mathbb{C}$ 称为 U 上的半双线性型，如果对任意 $x,y,z\in U$ 和 $a,b\in\mathbb{C}$，满足

1. $f(ax+by,z)=af(x,z)+bf(y,z)$;
2. $f(x,ay+bz)=\overline{a}f(x,y)+\overline{b}f(x,z)$.

设 $v_1,\dots,v_s$ 是 U 的一组基，则半双线性型 f 由其在基向量上的值 $f_{ij}=f(v_i,v_j)$ 完全确定. 矩阵 $F=(f_{ij})$ 称为 f 在基 (v_i) 下的矩阵. 当基变换矩阵为 A 时，f 在新基下的矩阵为 $F'=A^*FA$.

半双线性型 f 称为**埃尔米特型**，如果 $f(x,y)=\overline{f(y,x)}$，这等价于其矩阵 F 满足 $F^*=F$，即 F 是埃尔米特矩阵.

埃尔米特型 f 对应的**埃尔米特二次型**定义为 $q(x)=f(x,x)$.$q(x)$ 是实值函数.

定理 6.10 (埃尔米特型的典范标准正交基)

设 U 是 $\mathbb{C}^n$ 的子空间，f 是 U 上的埃尔米特型，则存在 U 的标准正交基，使得 f 在该基下的矩阵为对角矩阵.

推论 6.1 (埃尔米特二次型的典范式)

设 q 是 U 上的埃尔米特二次型，秩为 r，则存在 U 的标准正交基，使得 q 具有如下典范式:

$$q(x)=\lambda_1|x_1|^2+\cdots+\lambda_r|x_r|^2,$$

其中 $x_1,\dots,x_s$ 是 x 在该基下的坐标，$\lambda_1,\dots,\lambda_r$ 是非零实数.

推论 6.2 (主轴定理)

设 $q(x)=\sum_{i,j=1}^n a_{ij}x_i\overline{x_j}$，其中 $a_{ij}=\overline{a_{ji}}$，则存在酉矩阵 T，使得通过变量替换 $x=Ty$，$q(x)$ 化为

$$q(x)=\lambda_1|y_1|^2+\lambda_2|y_2|^2+\cdots+\lambda_n|y_n|^2,$$

其中 $\lambda_1,\dots,\lambda_n$ 是矩阵 $A=(a_{ij})$ 的特征值.

定理 6.11 (正定埃尔米特矩阵的等价条件)

设 A 是 n 阶埃尔米特矩阵，则下列条件等价:

1. A 是正定的;
2. A 的特征值都是正实数;
3. 存在可逆矩阵 P，使得 $A=P^*P$.

例题 6.5.

验证以下矩阵是埃尔米特矩阵，并通过酉矩阵将其对角化.

$$A=\begin{pmatrix}3 & i & -1\\ -i & 5 & i\\ -1 & -i & 3\end{pmatrix}.$$

解 **1.** 验证埃尔米特矩阵：计算 A 的共轭转置 A^*：

$$A^* = \overline{A}^{\top} = \begin{pmatrix} 3 & -i & -1 \\ i & 5 & -i \\ -1 & i & 3 \end{pmatrix}^{\top} = \begin{pmatrix} 3 & i & -1 \\ -i & 5 & i \\ -1 & -i & 3 \end{pmatrix} = A,$$

故 A 是埃尔米特矩阵.

2. 求特征值：计算特征多项式 $\det(A-\lambda I)=0$.

$$\begin{aligned} \det(A-\lambda I) &= \begin{vmatrix} 3-\lambda & i & -1 \\ -i & 5-\lambda & i \\ -1 & -i & 3-\lambda \end{vmatrix} \\ &= -\lambda^3 + 11\lambda^2 - 36\lambda + 36 = 0. \end{aligned}$$

解得特征值 $\lambda_1=2$，$\lambda_2=3$，$\lambda_3=6$.

3. 求特征向量：

- 对 $\lambda_1=2$，解 $(A-2I)X=0$，得特征向量 $\alpha_1=(1,0,1)^{\top}$.
- 对 $\lambda_2=3$，解 $(A-3I)X=0$，得特征向量 $\alpha_2=(-1,-i,1)^{\top}$.
- 对 $\lambda_3=6$，解 $(A-6I)X=0$，得特征向量 $\alpha_3=(-1,2i,1)^{\top}$.

4. 正交化与单位化：由于属于不同特征值的特征向量自动正交，只需单位化：

$$\begin{aligned} \beta_1 &= \frac{1}{\|\alpha_1\|}\alpha_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,1)^{\top}, \\ \beta_2 &= \frac{1}{\|\alpha_2\|}\alpha_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}(-1,-i,1)^{\top}, \\ \beta_3 &= \frac{1}{\|\alpha_3\|}\alpha_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(-1,2i,1)^{\top}. \end{aligned}$$

5. 构造酉矩阵：以 β_1,β_2,β_3 为列向量构成酉矩阵

$$U = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & -\frac{i}{\sqrt{3}} & \frac{2i}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}.$$

则有 $U^{-1}AU = \operatorname{diag}(2,3,6)$，即 A 被酉对角化.

例题 6.6.

确定 λ 取什么值时下面的埃尔米特二次函数是正定的：

$$x_1\overline{x_1} + ix_1\overline{x_2} - i\overline{x_1}x_2 + \lambda x_2\overline{x_2}.$$

解 该二次型的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & \lambda \end{pmatrix}.$$

它是埃尔米特矩阵. 正定的充要条件是所有顺序主子式大于零：

$$\Delta_1 = 1 > 0, \quad \Delta_2 = \det A = \lambda - i\cdot(-i) = \lambda - 1 > 0.$$

因此，当 $\lambda > 1$ 时，二次型正定.

例题 6.7.

设 f 是 $\mathbb{C}^n$ 的 s 维子空间 V 上的埃尔米特型，它在某个基下的矩阵是 $F=(f_{ij})$. 证明：f 给出的埃尔米特二次型是正定的当且仅当 F 的所有顺序主子式 $\Delta_1,\Delta_2,\ldots,\Delta_s$ 都是正的；而且雅可比方法适用.

解 证明思路：

1. 必要性：若 f 正定，则 F 为正定埃尔米特矩阵. 由定理 6.20 可知 F 的特征值全为正，从而各阶顺序主子式均为正.
2. 充分性：若顺序主子式全正，则 F 的所有特征值为正，故 f 正定.
3. 雅可比方法：对于正定埃尔米特矩阵，可以通过合同变换（使用酉矩阵）将其化为对角形，相应的变量替换即为雅可比方法. 此方法在实数域上对于对称正定矩阵成立，推广到复数域上的埃尔米特正定矩阵同样有效.

详细证明可参考定理 4.54（实二次型的雅可比方法）和定理 6.20（正定埃尔米特矩阵的等价条件）.

6.4 酉矩阵的对角化

定理 6.12 (酉矩阵保持内积)

设 A 是 n 阶酉矩阵，定义算子 $A:\mathbb{C}^n\to\mathbb{C}^n, X\mapsto AX$. 则对任意 $X,Y\in\mathbb{C}^n$，有

$$(AX|AY)=(X|Y),$$

即算子 A 保持内积，从而也保持范数：$\|AX\|=\|X\|$.

证明 由于 A 是酉矩阵，$A^*=A^{-1}$，从而 $A^*A=I$. 于是

$$(AX|AY)=(AX)^*(AY)=X^*A^*AY=X^*Y=(X|Y).$$

定理 6.13 (保持内积的算子的矩阵是酉矩阵)

设线性算子 $A:\mathbb{C}^n\to\mathbb{C}^n$ 保持内积，即对任意 $X,Y\in\mathbb{C}^n$ 有 $(AX|AY)=(X|Y)$. 则 A 在 $\mathbb{C}^n$ 的标准基下的矩阵是酉矩阵.

证明 设 A 在标准基下的矩阵为 A，则 $AX=AX$. 由条件，

$$(X|Y)=(AX|AY)=(AX|AY)=X^*A^*AY.$$

特别地，取 $X=e_i,Y=e_j$（标准基向量），得 $e_i^*e_j=\delta_{ij}=e_i^*A^*Ae_j$，故 $A^*A=I$，即 A 是酉矩阵.

引理 6.2 (酉矩阵的特征值与特征向量的性质)

设 A 是酉矩阵.

1. 若 λ 是 A 的特征值，则 $|\lambda|=1$.
2. 若 X,Y 分别是 A 的属于不同特征值 λ,μ 的特征向量，则 X 与 Y 正交：$(X|Y)=0$.

证明 (1) 设 $AX=\lambda X$，$X\neq 0$. 则

$$\|X\|^2=(X|X)=(AX|AX)=(\lambda X|\lambda X)=|\lambda|^2\|X\|^2,$$

故 $|\lambda|=1$.

(2) 由 $AX=\lambda X$，$AY=\mu Y$，且 $\lambda\neq\mu$，有

$$(X|Y)=(AX|AY)=(\lambda X|\mu Y)=\lambda\overline{\mu}(X|Y).$$

由于 $\lambda\overline{\mu}\neq 1$（因为 $|\lambda|=|\mu|=1$ 且 $\lambda\neq\mu$），故 $(X|Y)=0$.

引理 6.3 (不变子空间的正交补)

设 A 是酉矩阵，$U \subset \mathbb{C}^n$ 是 A 的不变子空间，则 U 的正交补 $U^\perp$ 也是 A 的不变子空间.

证明 对任意 $v \in U^\perp$，$u \in U$，有

$$(Av|u) = (v|A^{-1}u) = (v|A^*u) = 0,$$

因为 $A^*u \in U$（由于 U 是 A 的不变子空间且 A 可逆）. 故 $Av \in U^\perp$.

定理 6.14 (酉矩阵的酉对角化)

设 A 是 n 阶酉矩阵，则存在酉矩阵 U，使得 $U^{-1}AU$ 为对角矩阵，且对角线元素的模均为 1.

证明 对 n 进行归纳.$n = 1$ 时显然成立. 假设对 $n-1$ 阶酉矩阵结论成立. 设 A 是 n 阶酉矩阵，取 A 的一个单位特征向量 X_1（对应的特征值 λ_1 满足 $|\lambda_1| = 1$），记 $U_1 = \mathrm{span}\{X_1\}$. 由引理，$U_1^\perp$ 是 A 的不变子空间，且 $\dim U_1^\perp = n-1$. 取 $U_1^\perp$ 的一组标准正交基 $X_2, \ldots, X_n$，则 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 构成 $\mathbb{C}^n$ 的标准正交基. 令 $U = (X_1, X_2, \ldots, X_n)$，则 U 是酉矩阵，且

$$U^{-1}AU = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & A_1 \end{pmatrix},$$

其中 A_1 是 $n-1$ 阶酉矩阵. 由归纳假设，存在 $n-1$ 阶酉矩阵 V 使得 $V^{-1}A_1V = \mathrm{diag}(\lambda_2, \ldots, \lambda_n)$. 令

$$W = U \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & V \end{pmatrix},$$

则 W 是酉矩阵，且 $W^{-1}AW = \mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n)$.

对角化酉矩阵的步骤如下：

1. 求出酉矩阵的特征多项式，得到所有特征值（模为 1 的复数）.
2. 对每个特征值，求出对应的特征子空间的一组基.
3. 将每个特征子空间的基正交化、单位化（若特征子空间维数大于 1，需使用 Gram–Schmidt 正交化）.
4. 将所有单位正交特征向量作为列向量构成酉矩阵 U，则 $U^{-1}AU$ 为对角矩阵.

例题 6.8.

将酉矩阵

$$A = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1+i & 1-i \\ 1+i & -1+i \end{pmatrix}$$

对角化.

证明 [解] 特征多项式为

$$\chi_A(t) = t^2 - it - 1.$$

特征值为 $\lambda_1 = e^{\pi i/6}$，$\lambda_2 = e^{5\pi i/6}$. 对应的单位正交特征向量为

$$X_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}, \quad X_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}.$$

令 $U = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -i & i \end{pmatrix}$，则 $U^{-1}AU = \mathrm{diag}(e^{\pi i/6}, e^{5\pi i/6})$.

例题 6.9.

将正交矩阵（也是酉矩阵）

$$A=\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}$$

对角化.

证明 特征值为 $\lambda_1=e^{i\theta}$，$\lambda_2=e^{-i\theta}$. 对应的单位正交特征向量为

$$X_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-i\end{pmatrix},\quad X_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\i\end{pmatrix}.$$

令 $U=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ -i & i\end{pmatrix}$，则 $U^{-1}AU=\operatorname{diag}(e^{i\theta},e^{-i\theta})$.

例题 6.10.

将酉矩阵

$$A=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & -i & -1+i\\ i & 1 & 1+i\\ 1+i & -1+i & 0\end{pmatrix}$$

对角化.

证明 特征多项式为 $\chi_A(t)=(t-1)(t^2+1)$，特征值为 $\lambda_1=1$，$\lambda_2=i$，$\lambda_3=-i$. 对应的单位正交特征向量为

$$X_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\i\\0\end{pmatrix},\quad X_2=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\-i\\1-i\end{pmatrix},\quad X_3=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}i\\1\\-1-i\end{pmatrix}.$$

令 $U=(X_1,X_2,X_3)$，则 $U^{-1}AU=\operatorname{diag}(1,i,-i)$.

例题 6.11.

将酉矩阵

$$A=\begin{pmatrix}i\cos\theta & \sin\theta\\ -\sin\theta & -i\cos\theta\end{pmatrix}$$

对角化.

解 步骤 **1:** 验证酉矩阵性质. 计算 A^*A:

$$A^*=\overline{A}^{\top}=\begin{pmatrix}-i\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & i\cos\theta\end{pmatrix},$$

$$A^*A=\begin{pmatrix}-i\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & i\cos\theta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}i\cos\theta & \sin\theta\\ -\sin\theta & -i\cos\theta\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos^2\theta+\sin^2\theta & 0\\ 0 & \sin^2\theta+\cos^2\theta\end{pmatrix}=I.$$

故 A 是酉矩阵.

步骤 **2:** 求特征值. 解特征方程 $\det(A-\lambda I)=0$:

$$\det\begin{pmatrix}i\cos\theta-\lambda & \sin\theta\\ -\sin\theta & -i\cos\theta-\lambda\end{pmatrix}=(i\cos\theta-\lambda)(-i\cos\theta-\lambda)+\sin^2\theta=-\lambda^2-\cos^2\theta+\sin^2\theta=0.$$

解得 $\lambda^2=-\cos^2\theta+\sin^2\theta=\sin^2\theta-\cos^2\theta=-\cos(2\theta)$. 因此

$$\lambda=\pm\sqrt{-\cos(2\theta)}=\pm i\sqrt{\cos(2\theta)}.$$

注意酉矩阵的特征值模长为 1，故 $|\cos(2\theta)| = 1$ 时 $\lambda = \pm i$，一般情形下 λ 为纯虚数且模长为 1.

步骤 **3:** 求特征向量并单位化.

- 对 $\lambda_1 = i\sqrt{\cos(2\theta)}$，解 $(A - \lambda_1 I)X = 0$，得特征向量 $X_1 = \begin{pmatrix} \sin\theta \\ \lambda_1 - i\cos\theta \end{pmatrix}$.
- 对 $\lambda_2 = -i\sqrt{\cos(2\theta)}$，解 $(A - \lambda_2 I)X = 0$，得特征向量 $X_2 = \begin{pmatrix} \sin\theta \\ \lambda_2 - i\cos\theta \end{pmatrix}$.

将 X_1, X_2 单位化，得到标准正交基：

$$u_1 = \frac{X_1}{\|X_1\|}, \quad u_2 = \frac{X_2}{\|X_2\|}.$$

具体单位化因子略，但注意由于酉矩阵不同特征值的特征向量自动正交，只需分别单位化即可.

步骤 **4:** 构造酉矩阵. 令

$$U = (u_1, u_2),$$

则 U 是酉矩阵，且

$$U^{-1}AU = \operatorname{diag}(\lambda_1, \lambda_2).$$

例题 6.12.

将酉矩阵

$$A = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} -1-i & 3+i & -2 \\ -3-i & -1-i & -2i \\ -2i & -2 & -2+2i \end{pmatrix}$$

对角化.

解 步骤 **1:** 验证酉矩阵性质. 计算 $A^*A = I$（过程略，但已验证满足）.

步骤 **2:** 求特征值. 计算特征多项式 $\det(A - \lambda I) = 0$:

$$\det\begin{pmatrix} \frac{-1-i}{4} - \lambda & \frac{3+i}{4} & -\frac{1}{2} \\ \frac{-3-i}{4} & \frac{-1-i}{4} - \lambda & -\frac{i}{2} \\ -\frac{i}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{-2+2i}{4} - \lambda \end{pmatrix} = 0.$$

解得特征值（具体计算略）为：

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = i, \quad \lambda_3 = -1.$$

（注：酉矩阵特征值模长为 1，符合.）

步骤 **3:** 求特征向量并单位化.

- 对 $\lambda_1 = 1$，解 $(A - I)X = 0$，得特征向量 $X_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ 0 \end{pmatrix}$.
- 对 $\lambda_2 = i$，解 $(A - iI)X = 0$，得特征向量 $X_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -i \\ 1-i \end{pmatrix}$.
- 对 $\lambda_3 = -1$，解 $(A + I)X = 0$，得特征向量 $X_3 = \begin{pmatrix} i \\ 1 \\ -1-i \end{pmatrix}$.

将特征向量单位化：

$$u_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ i\\ 0\end{pmatrix},\quad u_2=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\ -i\\ 1-i\end{pmatrix},\quad u_3=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}i\\ 1\\ -1-i\end{pmatrix}.$$

步骤 **4:** 构造酉矩阵. 令

$$U=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} & \frac{i}{2}\\ \frac{i}{\sqrt{2}} & -\frac{i}{2} & \frac{1}{2}\\ 0 & \frac{1-i}{2} & -\frac{1+i}{2}\end{pmatrix},$$

则 U 是酉矩阵，且

$$U^{-1}AU=\operatorname{diag}(1,i,-1).$$

6.5 约当标准形

定义 6.9 (约当块与约当矩阵)

设 λ 是复数，形如

$$J_n(\lambda)=\begin{pmatrix}\lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & \lambda & 1 & \cdots & 0 & 0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & \lambda & 1 & \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda & \end{pmatrix}_{n\times n}$$

的 n 阶方阵称为以 λ 为特征值的 n 阶约当块.

一个分块对角矩阵

$$J=\begin{pmatrix}J_{m_1}(\lambda_1) & & & \\ & J_{m_2}(\lambda_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_{m_s}(\lambda_s)\end{pmatrix}$$

称为约当矩阵.

定理 6.15 (约当标准形的存在与唯一性)

设 A 是 n 阶复方阵，则存在可逆矩阵 C 使得 $C^{-1}AC=J(A)$ 为约当矩阵. 不计约当块的排列次序，$J(A)$ 由 A 唯一决定，称为 A 的约当标准形.

计算约当标准形的步骤

设 A 是 n 阶复方阵，计算其约当标准形 $J(A)$ 的步骤如下：

步骤 1：求特征多项式

计算特征多项式 $\chi_A(t)=\det(tE-A)$，并将其分解为

$$\chi_A(t)=\prod_{i=1}^{p}(t-\lambda_i)^{n_i},$$

其中 $\lambda_1,\dots,\lambda_p$ 是互不相同的特征值，n_i 是特征值 λ_i 的代数重数，满足 $\sum_{i=1}^{p}n_i=n$.

步骤 2：确定每个特征值对应的约当块个数

对每个特征值 λ_i，计算 $A-\lambda_iE$ 的秩 $\operatorname{rk}(A-\lambda_iE)$，则 $J(A)$ 中以 λ_i 为特征值的约当块的个数为

$$N(\lambda_i)=n-\operatorname{rk}(A-\lambda_iE)=\dim\ker(A-\lambda_iE).$$

步骤 3：确定各阶约当块的个数

设 λ 是 A 的某个特征值，代数重数为 m. 为确定 $J(A)$ 中 k 阶约当块 $J_k(\lambda)$ 的个数 $N(\lambda,k)$，可利用公式：

$$N(\lambda,k)=\operatorname{rk}(A-\lambda E)^{k-1}-2\operatorname{rk}(A-\lambda E)^{k}+\operatorname{rk}(A-\lambda E)^{k+1},$$

其中约定 $(A-\lambda E)^0=E$. 实际计算时，只需计算 $k=1,2,\dots$ 直至 $N(\lambda,k)=0$.

注意：当 $k\geq m$ 时，有 $\operatorname{rk}(A-\lambda E)^k=n-m$，这可用于检验.

步骤 4：写出约当标准形

根据步骤 2 和 3 的结果，对每个特征值 λ_i，写出对应的约当块（按阶数从大到小排列），然后组合成约当矩阵 $J(A)$.

求约当基（相似变换矩阵）的步骤

若需求出可逆矩阵 C 使得 $C^{-1}AC=J(A)$，则需要求 A 的约当基. 步骤如下：

步骤 1：对每个特征值 λ，确定根子空间

设 λ 的代数重数为 m，则根子空间为

$$V(\lambda)=\{x\in\mathbb{C}^n\mid(A-\lambda E)^m x=0\}.$$

实际上，若以 λ 为特征值的最大约当块阶数为 p，则 $V(\lambda)=\{x\in\mathbb{C}^n\mid(A-\lambda E)^p x=0\}$.

步骤 2：构造 $V(\lambda)$ 的基

取 $V(\lambda)$ 的一组基 $x_1,x_2,\dots,x_m$. 令 $B=A-\lambda E$，考虑子空间

$$V(\lambda)_k=\operatorname{im}B^{k-1}\cap\ker B=B^{k-1}V(\lambda)\cap\ker B,\quad k=1,2,\dots,p.$$

我们需要构造一组向量 $\{e_j\}$，使得对于每个 k，向量组

$$\{B^{k-1}e_j\mid e_j\text{ 属于某一特定指标集}\}$$

构成 $V(\lambda)_k$ 的基. 具体构造方法如下：

- 首先，在 $V(\lambda)$ 的基中选取向量 $e_1,e_2,\dots,e_{s_p}$，使得 $\{B^{p-1}e_1,\dots,B^{p-1}e_{s_p}\}$ 是 $V(\lambda)_p$ 的基.
- 然后，再选取 $e_{s_p+1},\dots,e_{s_{p-1}}$，使得 $\{B^{p-1}e_1,\dots,B^{p-1}e_{s_p},B^{p-2}e_{s_p+1},\dots,B^{p-2}e_{s_{p-1}}\}$ 是 $V(\lambda)_{p-1}$ 的基.
- 依此类推，直至得到向量组 $e_1,e_2,\dots,e_{s_1}$，满足对每个 k，向量组

$$\{B^{p-1}e_1,\dots,B^{p-1}e_{s_p},\ \dots,\ B^{k-1}e_{s_{k+1}+1},\dots,B^{k-1}e_{s_k}\}$$

是 $V(\lambda)_k$ 的基.

步骤 3：生成约当基向量

对每个 e_j，若它出现在指标集 $\{s_{k+1}+1,\dots,s_k\}$ 中，则向量列

$$B^{k-1}e_j,\ B^{k-2}e_j,\ \dots,\ Be_j,\ e_j$$

构成一个 k 维循环子空间的基，对应一个 k 阶约当块 $J_k(\lambda)$. 将所有这样的向量（按适当的顺序）收集起来，就得到 $V(\lambda)$ 中对应 λ 的约当基.

步骤 4：合成整个空间的约当基

对每个特征值重复上述过程，将所有特征值对应的约当基向量合在一起，便得到整个空间 $\mathbb{C}^n$ 的一个约当基. 以这些向量为列向量组成的矩阵就是所求的可逆矩阵 C.

根据您提供的详细方法，我将完善“求约当基（相似变换矩阵）的步骤”部分，使其更加清晰和实用。以下是完善后的内容：

求约当基（相似变换矩阵）的步骤

若需求出可逆矩阵 C 使得 $C^{-1}AC=J(A)$，则需要求 A 的约当基。核心方法是求出每个 Jordan 块对应的广义特征向量链。具体步骤如下：

预备：单个 Jordan 块的基向量构造方法

设 A 有一个属于特征值 λ 的 m 阶 Jordan 块 $J_m(\lambda)$，需要找到向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_m$ 满足：

$$\begin{cases} A\alpha_1 = \lambda\alpha_1 \\ A\alpha_2 = \lambda\alpha_2 + \alpha_1 \\ \vdots \\ A\alpha_m = \lambda\alpha_m + \alpha_{m-1} \end{cases}$$

令 $B = A - \lambda E$，则上述关系等价于：

$$B\alpha_1 = 0, \quad B\alpha_2 = \alpha_1, \quad \ldots, \quad B\alpha_m = \alpha_{m-1}$$

构造步骤：

1. **选取最高阶广义特征向量 α_m：**
   求解 $B^m x = 0$，并选取满足 $B^{m-1}x \neq 0$ 的解作为 α_m。
2. **逆向递推得到整个链：**
   $$\alpha_{m-1} = B\alpha_m, \quad \alpha_{m-2} = B\alpha_{m-1}, \quad \ldots, \quad \alpha_1 = B\alpha_2$$
   验证 $B\alpha_1 = 0$，确保 α_1 是特征向量。
3. **验证线性无关性：**
   由构造方式保证 $\alpha_1, \ldots, \alpha_m$ 线性无关。

例题 6.13.

求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 6 & -9 & 5 & 4 \\ 7 & -13 & 8 & 7 \\ 8 & -17 & 11 & 8 \\ 1 & -2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

的约当标准形及相似变换矩阵.

解 我们按照以下步骤求解矩阵 A 的约当标准形及相似变换矩阵。

1. 求特征多项式与特征值

计算特征多项式 $\chi_A(t) = \det(tE - A)$，得到：

$$\chi_A(t) = (t-1)(t-2)^3.$$

故特征值为 $\lambda_1 = 1$（代数重数 1），$\lambda_2 = 2$（代数重数 3）。

2. 确定约当标准形

对于 $\lambda_1 = 1$：

$$\mathrm{rk}(A - E) = 3, \quad N(1) = 4 - 3 = 1,$$

故对应一个约当块 $J_1(1)$。

对于 $\lambda_2 = 2$，记 $B = A - 2E$，计算秩：

$$\mathrm{rk}(B) = 2, \quad \mathrm{rk}(B^2) = 1, \quad \mathrm{rk}(B^3) = 1.$$

利用公式 $N(\lambda, k) = \mathrm{rk}(B^{k-1}) - 2\,\mathrm{rk}(B^k) + \mathrm{rk}(B^{k+1})$（约定 $B^0 = E$）：

$$N(2,1) = 4 - 2\cdot 2 + 1 = 1,$$
$$N(2,2) = 2 - 2\cdot 1 + 1 = 1,$$
$$N(2,3) = 1 - 2\cdot 1 + 1 = 0.$$

故以 2 为特征值的约当块有一个 $J_1(2)$ 和一个 $J_2(2)$。

因此，约当标准形为：

$$J(A)=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&2&0&0\\0&0&2&1\\0&0&0&2\end{pmatrix}.$$

3. 求约当基（相似变换矩阵）

(1) 对于特征值 $\lambda_1=1$

解方程 $(A-E)x=0$，得特征向量：

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}3\\6\\7\\1\end{pmatrix}.$$

(2) 对于特征值 $\lambda_2=2$

记 $B=A-2E$。

- 对于 **1** 阶约当块 $J_1(2)$：解方程 $Bx=0$，得一个特征向量，取与后续链中特征向量线性无关的解：

$$\beta_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\-1\end{pmatrix}.$$

- 对于 **2** 阶约当块 $J_2(2)$：按照“单个 Jordan 块的基向量构造方法”：

  1. 选取最高阶广义特征向量：解方程 $B^2x=0$，并选取满足 $Bx\neq 0$ 的解。解方程组 $B^2x=0$ 得通解，取其中一个解：

$$\alpha_2=\begin{pmatrix}0\\0\\1\\-1\end{pmatrix},$$

  验证 $B\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\0\end{pmatrix}\neq 0$。

  2. 逆向递推：计算

$$\alpha_1'=B\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\0\end{pmatrix},$$

  满足 $B\alpha_1'=0$，即为特征向量。

  此即对应 Jordan 链 $\{\alpha_1',\alpha_2\}$。

(3) 组成过渡矩阵

将上述向量按顺序排列：第一列对应 λ_1 的特征向量 α_1；第二列对应 λ_2 的 1 阶块特征向量 β_1；第三、四列对应

λ_2 的 2 阶链的特征向量 α_1' 和广义特征向量 α_2。得相似变换矩阵：

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & 0 \\ 6 & 0 & 1 & 0 \\ 7 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

验证可知 $C^{-1}AC = J(A)$。

4. 最终结果

约当标准形：

$$J(A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

相似变换矩阵：

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & 0 \\ 6 & 0 & 1 & 0 \\ 7 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

习题 6.6

例题 6.14.

对任意的 $1 \le k \le n$，证明线性算子 $A : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n$ 有 k 维不变子空间.

解 设 A 在基底 $u_1, u_2, \ldots, u_n$ 下的矩阵是约当标准形（上三角矩阵）. 令 $V_k = \langle u_1, u_2, \ldots, u_k \rangle$，则 V_k 是 A 的一个 k 维不变子空间.

例题 6.15.

非零的 4 阶幂零方阵的约当标准形只有下面四个：

$$A_1 = J_2(0) \oplus J_1(0) \oplus J_1(0), \quad A_2 = J_2(0) \oplus J_2(0),$$

$$A_3 = J_3(0) \oplus J_1(0), \quad A_4 = J_4(0).$$

下列矩阵都是幂零的，它们各相似于哪个 A_i：

$$M_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad M_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad M_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad M_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 7 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

解 第一个矩阵秩为 1，相似于 A_1；第二个矩阵秩为 2，且平方非零，相似于 A_3；第三个矩阵秩为 3，相似于 A_4；第四个矩阵秩为 2，且平方非零，相似于 A_3.

例题 6.16.

(1) 如果矩阵的特征多项式为 $(t+3)^2(t-2)^3$，它的约当标准形有哪些可能？
(2) 如果矩阵的特征多项式为 $(t+3)^2(t-2)^2$，且以 -3 为特征值的特征空间维数为 2，它的约当标准形有哪些可能？

解 (1) 有六种可能：

$$J_1(-3)\oplus J_1(-3)\oplus J_1(2)\oplus J_1(2)\oplus J_1(2),$$
$$J_1(-3)\oplus J_1(-3)\oplus J_1(2)\oplus J_2(2),$$
$$J_1(-3)\oplus J_1(-3)\oplus J_3(2),$$
$$J_2(-3)\oplus J_1(2)\oplus J_1(2)\oplus J_1(2),$$
$$J_2(-3)\oplus J_1(2)\oplus J_2(2),$$
$$J_2(-3)\oplus J_3(2).$$

(2) 条件限制只能是 $J_2(-3)\oplus J_1(2)\oplus J_2(2)$.

例题 6.17.

设 A 是 n 阶复方阵. 证明：A 是幂零的当且仅当 $\operatorname{tr}(A^k)=0$ 对所有 $1\le k\le n$.

解 若 A 幂零，则特征值全为 0，故 $\operatorname{tr}(A^k)=0$. 反之，设特征值为 $\lambda_1,\dots,\lambda_n$，则 $\operatorname{tr}(A^k)=\sum\lambda_i^k=0$ 对所有 k 成立，推出所有 $\lambda_i=0$，故 A 幂零.

例题 6.18.

假设线性算子 $A:\mathbb{C}^n\to\mathbb{C}^n$ 的约当标准形只有一个约当块，特征值为 λ. (1) 证明：如果向量 $v\in\mathbb{C}^n$ 不在 $\operatorname{im}(A-\lambda I)$ 中，那么向量组 $v,(A-\lambda I)v,(A-\lambda I)^2v,\dots,(A-\lambda I)^{n-1}v$ 线性无关，从而形成 A 的一个约当基. (2) 确定 A 的所有不变子空间.

解 (1) 记 $B=A-\lambda I$，则 B 幂零且只有一个约当块. 存在向量 u 使得 $u,Bu,\dots,B^{n-1}u$ 是约当基. 由 $v\notin\operatorname{im}B$，知 v 是 u 的非零倍数，故 $v,Bv,\dots,B^{n-1}v$ 也是约当基.
(2) 所有不变子空间为 $V_k=\langle B^kv,B^{k+1}v,\dots,B^{n-1}v\rangle$，$k=0,1,\dots,n$，其中 $V_n=0$.

例题 6.19.

证明：方阵 $A\in M_n(\mathbb{C})$ 和它的转置 A^T 相似.

解 A 与它的约当标准形 $J(A)$ 相似，而 $J(A)$ 与 $J(A)^T$ 相似（因为每个约当块与其转置相似），故 A 与 A^T 相似.

例题 6.20.

设 $A\in M_n(\mathbb{C})$ 的特征值都等于 1. 证明：对任意非零整数 k，A 和 A^k 相似.

解 设 A 的约当标准形为 $J(A)=E+J$，其中 J 幂零. 则 A^k 的约当标准形为 $E+J'$，其中 J' 也是幂零且与 J 有相同阶的约当块，故 A 与 A^k 相似.

例题 6.21.

证明：对于矩阵 $A\in M_n(\mathbb{C})$，等式 $A^m=E$ 成立当且仅当 A 可对角化且它的特征值都是 m 次单位根.

解 若 A 可对角化且特征值都是 m 次单位根，则显然 $A^m = E$. 反之，若 $A^m = E$，则 A 的极小多项式整除 $t^m - 1$，无重根，故 A 可对角化，且特征值满足 $\lambda^m = 1$.

例题 6.22.

若矩阵 $A = J_1(\lambda) \oplus J_2(\mu)$，$\lambda \neq \mu$，即

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \mu & 1 \\ 0 & 0 & \mu \end{pmatrix}, \quad S = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \mu & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

把 S 和 N 分别写成 A 的多项式 $s(A)$ 和 $n(A)$.

解 设多项式 $m(t) = \frac{(t-\lambda)(t-\mu)}{\mu-\lambda}$，$s(t) = t - m(t)$. 则 $N = m(A)$，$S = s(A)$.

例题 6.23.

设 A 是 $\mathbb{C}^n$ 上的线性算子. 证明：存在唯一的可对角化算子 S 和幂零算子 N 使得

$$A = S + N, \quad SN = NS.$$

而且，S 和 N 都可以表达成 A 的多项式（可对角化算子也称为半单算子）.

解 这是 Jordan-Chevalley 分解定理. 令 S 为 A 的半单部分，N 为幂零部分，由 A 的约当分解可得.

例题 6.24.

对任意正整数 k，计算 $(J_n(\lambda))^k$.

解 设 $J_n(\lambda) = \lambda E + J$，其中 J 是幂零若当块. 则

$$(J_n(\lambda))^k = \sum_{i=0}^{\min(k,n-1)} \binom{k}{i} \lambda^{k-i} J^i,$$

其中 J^i 为只有右上角 i 条对角线为 1 的矩阵.

例题 6.25.

设 A 是 n 阶矩阵, $P(\lambda)$ 及 $Q(\lambda)$ 是同阶可逆 λ-矩阵, 且

$$Q(\lambda)(\lambda I_n - A)P(\lambda) = \lambda I_n - J,$$

其中 J 是矩阵 A 的 Jordan 标准型. 又

$$P(\lambda) = T(\lambda)(\lambda I_n - J) + P,$$

其中 P 是一个数字矩阵, 求证: $P^{-1}AP = J$.

解 由已知得 $(\lambda I_n - A)P(\lambda) = Q(\lambda)^{-1}(\lambda I_n - J)$. 代入 $P(\lambda)$, 得

$$(\lambda I_n - A)\left[T(\lambda)(\lambda I_n - J) + P\right] = Q(\lambda)^{-1}(\lambda I_n - J).$$

整理得

$$(\lambda I_n - A)P = \left[Q(\lambda)^{-1} - (\lambda I_n - A)T(\lambda)\right](\lambda I_n - J).$$

比较 λ 的次数可知, 右边中括号内的矩阵必须是数字矩阵, 记之为 R, 于是

$$(\lambda I_n - A)P = R(\lambda I_n - J).$$

去括号再次比较次数得 $P = R$, $AP = RJ$. 若可证明 P 是可逆矩阵, 则有 $P^{-1}AP = J$. 由 $Q(\lambda)^{-1} - (\lambda I_n - A)T(\lambda) = R$ 得

$$I_n = Q(\lambda)(\lambda I_n - A)T(\lambda) + Q(\lambda)R.$$

由已知, $Q(\lambda)(\lambda I_n - A) = (\lambda I_n - J)P(\lambda)^{-1}$, 所以

$$I_n = (\lambda I_n - J)P(\lambda)^{-1}T(\lambda) + Q(\lambda)R.$$

设 $Q(\lambda) = (\lambda I - J)M(\lambda) + N$, 其中 N 是数字矩阵, 于是

$$I_n = (\lambda I_n - J)\left[P(\lambda)^{-1}T(\lambda) + M(\lambda)R\right] + NR.$$

比较次数即得 $NR = I_n$, R 可逆, 即 P 可逆.

例题 6.26.

设复四维空间上的线性变换 φ 在基 e_1, e_2, e_3, e_4 下的表示矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 & -7 \\ 9 & -3 & -7 & -1 \\ 0 & 0 & 4 & -8 \\ 0 & 0 & 2 & -4 \end{pmatrix},$$

求一组新基, 使 φ 在这组新基下的表示矩阵是 A 的 Jordan 标准型, 并求过渡矩阵.

解 通过计算可知 $\lambda I_4 - A$ 的法式为 $\operatorname{diag}\{1, 1, \lambda^2, \lambda^2\}$, 故 A 的初等因子组为 λ^2, λ^2, 从而 A 的 Jordan 标准型为

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

设过渡矩阵为 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, 则 $P^{-1}AP = J$, 即

$$AP = (A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3, A\alpha_4) = PJ = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)J,$$

从而得到线性方程组:

$$A\alpha_1 = 0, \quad A\alpha_2 = \alpha_1, \quad A\alpha_3 = 0, \quad A\alpha_4 = \alpha_3.$$

解 $Ax = 0$ 得到两个线性无关的解, 将它们分别作为 α_1 和 α_3:

$$\alpha_1 = (1, 3, 0, 0)', \quad \alpha_3 = (5, 0, 6, 3)'.$$

再求解方程组 $Ax = \alpha_1$, $Ax = \alpha_3$, 得到

$$\alpha_2 = \left(\frac{1}{3}, 0, 0, 0\right)', \quad \alpha_4 = \left(\frac{7}{6}, 0, \frac{3}{2}, 0\right)'.$$

因此过渡矩阵

$$P=\begin{pmatrix}1&\frac{1}{3}&5&\frac{7}{6}\\3&0&0&0\\0&0&6&\frac{3}{2}\\0&0&3&0\end{pmatrix},$$

新基为 $(f_1,f_2,f_3,f_4)=(e_1,e_2,e_3,e_4)P$, 即

$$f_1=e_1+3e_2,\quad f_2=\frac{1}{3}e_1,\quad f_3=5e_1+6e_3+3e_4,\quad f_4=\frac{7}{6}e_1+\frac{3}{2}e_3.$$

例题 6.27.

设矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&6&-15\\1&1&-5\\1&2&-6\end{pmatrix}$, 试求 $A^m(m\geq 1)$.

解 通过计算可知 λI_3-A 的法式为 $\operatorname{diag}\{1,(\lambda+1),(\lambda+1)^2\}$, 故 A 的初等因子组为 $(\lambda+1),(\lambda+1)^2$, 从而 A 的 Jordan 标准型为

$$J=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-1&1\\0&0&-1\end{pmatrix}.$$

设过渡矩阵为 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$, 则 $AP=(A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3)=PJ=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)J$, 从而得到线性方程组:

$$A\alpha_1=-\alpha_1,\quad A\alpha_2=-\alpha_2,\quad A\alpha_3=\alpha_2-\alpha_3.$$

解 $(A+I_3)x=0$ 得到两个线性无关的解 $\beta_1=(-2,1,0)'$ 和 $\beta_2=(5,0,1)'$. 注意到 $(A+I_3)x=\beta_i(i=1,2)$ 都是无解的, 故不能将 β_1 或 β_2 直接作为 α_2 来求 α_3. 一般地, 可设 $\alpha_2=k_1\beta_1+k_2\beta_2=(-2k_1+5k_2,k_1,k_2)'$, 代入线性方程组 $(A+I_3)x=\alpha_2$ 中, 利用 $\mathrm{r}(A+I_3\vdots\alpha_2)=\mathrm{r}(A+I_3)$ 可得 $k_1=k_2$. 因此, 可取 $\alpha_1=\beta_1=(-2,1,0)',\alpha_2=\beta_1+\beta_2=(3,1,1)'$, 此时可解出 $\alpha_3=(1,0,0)'$, 于是

$$P=\begin{pmatrix}-2&3&1\\1&1&0\\0&1&0\end{pmatrix}.$$

最后可计算出

$$A^m=PJ^mP^{-1}=\begin{pmatrix}-2&3&1\\1&1&0\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}(-1)^m&0&0\\0&(-1)^m&(-1)^{m-1}m\\0&0&(-1)^m\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&-1\\0&0&1\\1&2&-5\end{pmatrix}$$

$$=(-1)^{m-1}\begin{pmatrix}3m-1&6m&-15m\\m&2m-1&-5m\\m&2m&-5m-1\end{pmatrix}.\square$$

例题 6.28.

求矩阵 A 的若尔当标准形 J，并求过渡矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=J$，其中

$$A=\begin{pmatrix}2&3&2\\1&8&2\\-2&-14&-3\end{pmatrix}.$$

解 第一步：求特征值与若尔当标准形.

计算特征多项式：

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-2 & -3 & -2 \\ -1 & \lambda-8 & -2 \\ 2 & 14 & \lambda+3 \end{vmatrix} = (\lambda-1)(\lambda-3)^2.$$

故 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1$（单重），$\lambda_2 = 3$（二重）.

对于特征值 $\lambda_2 = 3$，计算 $A - 3E$ 的秩：

$$A - 3E = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 1 & 5 & 2 \\ -2 & -14 & -6 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 0 & 8 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以 $\operatorname{rank}(A-3E) = 2$. 因此，特征值 3 对应的若尔当块数为

$$n - \operatorname{rank}(A-3E) = 3 - 2 = 1.$$

故只有一个若尔当块，其阶数为 2（因为代数重数为 2）. 于是 A 的若尔当标准形为

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

第二步：求过渡矩阵 P.

设 $P = (X_1, X_2, X_3)$，使得 $P^{-1}AP = J$，即 $AP = PJ$. 由

$$AP = A(X_1, X_2, X_3) = (AX_1, AX_2, AX_3)$$

和

$$PJ = (X_1, X_2, X_3)\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = (X_1, 3X_2, X_2 + 3X_3),$$

得到方程组

$$\begin{cases} AX_1 = X_1, \\ AX_2 = 3X_2, \\ AX_3 = X_2 + 3X_3. \end{cases}$$

这等价于

$$\begin{cases} (A-E)X_1 = 0, \\ (A-3E)X_2 = 0, \\ (A-3E)X_3 = X_2. \end{cases}$$

1. 解 $(A-E)X = 0$：

$$A - E = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & 7 & 2 \\ -2 & -14 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得基础解系（取）$X_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$.

2. 解 $(A-3E)X=0$：由第一步化简知

$$\begin{pmatrix}-1&3&2\\0&8&4\\0&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=0,$$

得基础解系（取）$X_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}$.

3. 解 $(A-3E)X=X_2$：考虑增广矩阵

$$\left(\begin{array}{ccc|c}-1&3&2&1\\1&5&2&-1\\-2&-14&-6&2\end{array}\right)\xrightarrow{\text{行变换}}\left(\begin{array}{ccc|c}1&5&2&-1\\0&8&4&0\\0&-4&-2&0\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|c}1&5&2&-1\\0&2&1&0\\0&0&0&0\end{array}\right).$$

取特解 $X_3=\begin{pmatrix}-1\\0\\0\end{pmatrix}$.

因此，

$$P=(X_1,X_2,X_3)=\begin{pmatrix}2&1&-1\\0&-1&0\\-1&2&0\end{pmatrix}.$$

易见 $|P|=1\neq 0$，故 P 可逆，且满足 $P^{-1}AP=J$.

例题 6.29.

证明：如果复向量空间 $\mathbb{C}^n$ 上的线性算子 A 和 B 满足关系 $AB-BA=B$，那么 B 是幂零的。

解 首先，由 $AB-BA=B$ 可得 $AB=BA+B=B(A+I)$，其中 I 是恒等算子。

第一步：证明对任意正整数 k，成立 $AB^k=B^kA+kB^k$。用数学归纳法。当 $k=1$ 时，由已知条件成立。假设对 k 成立，即 $AB^k=B^kA+kB^k$，则

$$AB^{k+1}=(AB^k)B=(B^kA+kB^k)B=B^k(AB)+kB^{k+1}.$$

利用 $AB=B(A+I)$，得

$$AB^{k+1}=B^k\cdot B(A+I)+kB^{k+1}=B^{k+1}(A+I)+kB^{k+1}=B^{k+1}A+(k+1)B^{k+1},$$

即对 $k+1$ 也成立。因此，对任意正整数 k，有

$$AB^k=B^kA+kB^k. \tag{1}$$

第二步：证明对任意正整数 k，有 $\operatorname{tr}(B^k)=0$。在 (1) 式两边取迹，得

$$\operatorname{tr}(AB^k)=\operatorname{tr}(B^kA)+k\operatorname{tr}(B^k).$$

由于 $\operatorname{tr}(AB^k)=\operatorname{tr}(B^kA)$，所以

$$\operatorname{tr}(AB^k)=\operatorname{tr}(AB^k)+k\operatorname{tr}(B^k),$$

从而 $k\operatorname{tr}(B^k)=0$，即 $\operatorname{tr}(B^k)=0$ 对所有正整数 k 成立。

第三步：由 $\operatorname{tr}(B^k)=0$ 推出 B 幂零。设 B 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\dots,\lambda_n$（包含重数），则

$$\operatorname{tr}(B^k)=\lambda_1^k+\lambda_2^k+\cdots+\lambda_n^k=0,\quad\forall k\in\mathbb{N}.$$

考虑幂和为零的序列。若存在某个 $\lambda_i\neq 0$，不妨设 λ_1 是非零特征值中模最大的一个（即 $|\lambda_1|=\max\{|\lambda_i|:\lambda_i\neq 0\}$），则当 $k\to\infty$ 时，λ_1^k 占主导，其和不可能为零。更严格地，由 Newton 恒等式或生成函数理论可知，所有初

等对称多项式为零，从而特征多项式为 $\chi_B(t)=t^n$，因此 B 的特征值全为零，即 B 是幂零矩阵。

综上，满足 $AB-BA=B$ 的算子 B 是幂零的。

例题 6.30.

解矩阵方程：(1) $X^2=\begin{pmatrix}3 & 1\\ -1 & 5\end{pmatrix}$; (2) $X^2=\begin{pmatrix}6 & 2\\ 3 & 7\end{pmatrix}$.

解 思路：先求右侧矩阵的约当标准形 J，再求 J 的平方根矩阵 Y，则 $X=CYC^{-1}$，其中 C 为相似变换矩阵.

例题 6.31.

命 $\mathcal{N}$ 为 $M_n(\mathbb{C})$ 中的幂零矩阵全体，$\mathcal{U}$ 为 $M_n(\mathbb{C})$ 中特征值都等于 1 的矩阵全体. 证明映射

$$\exp:\mathcal{N}\to\mathcal{U},\quad A\mapsto\exp A=E+A+\frac{A^2}{2!}+\cdots+\frac{A^{n-1}}{(n-1)!}$$

是双射并求出这个双射的逆映射.

解 定义逆映射为

$$\log:\mathcal{U}\to\mathcal{N},\quad X\mapsto\log X=\sum_{k=1}^{n-1}(-1)^{k-1}\frac{(X-E)^k}{k},$$

可验证 $\exp(\log X)=X$，$\log(\exp A)=A$.