



بسم الله الرحمن الرحيم

حساب دیفرانسیل توابع یک متغیره

معادلات دیفرانسیل

(بخش ۲: معادلات مرتبه دوم و مراتب بالاتر)

محمد حسین مسلمی کوپایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

۶ فروردین ۱۴۰۰

عنوان مطالب:

۱. معادلات دیفرانسیل خطی و مرتبه دوم و مراتب بالاتر (معادله خطی همگن با ضرایب ثابت، معادله کُوشی-اوایلر، معادلات غیر همگن، روش ضرایب نامعین و ضرایب ثابت، روش تغییر

پارامتر)؛

۲. مسایل نمونه



ارائه دهنده:

محمد حسین
مسلمی کویایی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

مسایل نمونه

۱ بخش اول

معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم و مراتب بالاتر

یک معادله دیفرانسیل مرتبه دوم به صورت زیر است:

$$F(x, y, y', y'') = 0$$

جواب عمومی این معادلات به شکل $g(x, y, c_1, c_2) = 0$ است. ساده ترین نوع این معادلات به شکل $y'' = f(x)$ است که با دو بار انتگرال گیری از آن، جواب عمومی به دست می آید.

مثال: جواب عمومی معادله دیفرانسیل $y'' = x + \cos x$ را بیابید.

حل:

$$y'' = x + \cos x \rightsquigarrow \int y' dx' = \int (x + \cos x) dx \rightsquigarrow y' = \frac{x^2}{2} + \sin x + c_1$$

$$\rightsquigarrow \int y' dx = \int \left(\frac{x^2}{2} + \sin x + c_1 \right) dx \rightsquigarrow y = \frac{1}{6} x^3 - \cos x + c_1 x + c_2$$



ارائه دهنده:

محمد حسین
مسلمی کوپایی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

مسائل نمونه



ارائه دهنده:

محمد حسین
مسلمی کویایی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

مسایل نمونه

روش کلی برای حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم غیر خطی وجود ندارد. چند حالت خاص برای حل آنها وجود دارد که بعضی از موارد آن در انتهای بخش اول شرح داده شد. اما در این بخش به حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم خطی و مراتب بالاتر خطی می پردازیم.

تعریف

معادلات دیفرانسیل خطی

شکل کلی معادلات خطی مرتبه دوم و بالاتر به صورت زیر است:

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = r(x)$$

$$a_n(x)y^{(n)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y = f(x)$$

هرگاه در معادلات فوق $r(x) = 0$ و $f(x) = 0$ باشند، معادلات فوق را همگن می نامیم.

تعریف

عملگر خطی

یک تابع مانند L از مجموعه F به F را یک عملگر خطی روی F می نامیم هرگاه

$$L : F \rightarrow F$$

$$(\forall) L(a+b) = L(a) + L(b) \quad , \quad (\forall) L(ma) = m L(a) \quad a, b \in F \quad , \quad m \in \mathbf{R}$$

مهم ترین عملگرها، عملگر مشتق گیری (D) و عملگر انتگرال گیری (I) روی مجموعه توابع است.

$$D : F \rightarrow F \quad D(f) = \frac{df}{dx} = f'(x)$$

$$I : F \rightarrow F \quad I(f) = \int f \, dx$$

عملگر دیفرانسیل گیری n ام (D^n)

عملگر دیفرانسیل مرتبه n ام به صورت زیر تعریف می شود:

$$D^n(f) = f^{(n)}(x)$$



ارائه دهنده:

محمد حسین
مسلمی کوپایی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

مسایل نمونه

اکنون معادله دیفرانسیل خطی مرتبه n ام را در نظر می گیریم.

$$a_n(x) y^{(n)} + \dots + a_1(x) y' + a_0(x) y = f(x)$$

بنابر تعریف D^n ، $D^n(y) = y^{(n)}$ ؛ با جایگزینی در معادله خطی مرتبه n ، داریم:

$$a_n(x) D^n(y) + \dots + a_1(x) D'(y) + a_0(x) y = f(x)$$

بنا به قرار داد $D^0 y = y$ می باشد، پس

$$(a_n(x) D^n + \dots + a_1(x) D' + a_0(x)) y = f(x)$$

اکنون عملگر L را ب صورت زیر تعریف می کنیم:

$$L = a_n(x) D^n + \dots + a_1(x) D' + a_0(x)$$

بنابراین معادله دیفرانسیل به صورت $L y = f(x)$ در می آید.

مثال : عملگر L برای معادله یفرانسیل $x^2 y'' - 5x y' + \sin x y = e^x$ برابر است با:

$$L = x^2 D^2 - 5x D + \sin x D^0$$



ارائه دهنده:

محمد حسین
مسلمی کوپایی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

مسایل نمونه

لذا

$$L y = f(x) \rightsquigarrow L y = (x^2 D^2 - 5x D + \sin x D')(y) = e^x$$

تعریف

ترکیب خطی

یک ترکیب خطی از توابع f_1, f_2, \dots, f_n و تعداد حقیقی c_1, c_2, \dots, c_n را به صورت زیر نوشته می شود.

$$f = c_1 f_1 + c_2 f_2 + \dots + c_n f_n$$

استقلال خطی

توابع f_1, f_2, \dots, f_n استقلال خطی دارند یا مستقل خطی هستند هرگاه برای هر c_1, c_2, \dots, c_n از اعداد حقیقی که در تساوی زیر صدق می کند یعنی

$$c_1 f_1 + c_2 f_2 + \dots + c_n f_n = 0$$

نتیجه بگیریم تمام ضرایب ترکیب خطی صفرند به عبارت دیگر

$$c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$$



ارائه دهنده:

محمد حسین
مسلمی کوپایی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

مسایل نمونه

ملاحظه

آزمونی برای استقلال خطی

توابع f_1, f_2, \dots, f_n را که در نقطه x ، $n-1$ بار مشتق پذیر می باشند را در نظر می گیریم. عبارت $W(x, f_1, f_2, \dots, f_n)$ را به صورت زیر تعریف می کنیم.

$$W(x, f_1, f_2, \dots, f_n) = \begin{vmatrix} f_1(x) & f_2(x) & \dots & f_n(x) \\ f_1'(x) & f_2'(x) & \dots & f_n'(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1^{(n-1)}(x) & f_2^{(n-1)}(x) & \dots & f_n^{(n-1)}(x) \end{vmatrix}$$

ثابت می شود هرگاه مقدار دترمینان فوق مخالف صفر شود یعنی $W(x, f_1, f_2, \dots, f_n) \neq 0$ ؛ آنگاه توابع f_1 تا f_n مستقل خطی هستند.

مثال: هرگاه $a \neq b$ ثابت کنید توابع $f_1(x) = e^{ax}$ و $f_2(x) = e^{bx}$ مستقل خطی هستند.

حل:



ارائه دهنده:

محمد حسین
مسلمی کویایی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

مسایل نمونه

ابتدا مقدار $W(x, f_1, f_2)$ را محاسبه می کنیم.

$$W(x, f_1, f_2) = \begin{vmatrix} e^{ax} & e^{bx} \\ \underbrace{ae^{ax}}_{f_1'} & \underbrace{be^{bx}}_{f_2'} \end{vmatrix} = e^{ax} (be^{bx}) - e^{bx} (ae^{ax}) = b e^{ax+bx} - a e^{ax+bx} = (b-a) e^{(a+b)x}$$

چون $a \neq b$ ، پس $b-a \neq 0$ ، لذا

$$(b-a) e^{(a+b)x} \neq 0 \quad \leadsto \quad W(x, f_1, f_2) \neq 0$$

در نتیجه توابع e^{ax} و e^{bx} مستقل خطی هستند.

تذکر

اگر اعداد حقیقی r_1, r_2, \dots, r_n دو بدو متمایز باشند، آنگاه توابع $e^{r_1 x}, e^{r_2 x}, \dots, e^{r_n x}$ مستقل خطی هستند.



ارائه دهنده:

محمد حسین
مسلمی کوپایی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

مسایل نمونه

ملاحظه

قضیه اساسی ۱

اگر f_1, f_2, \dots, f_n جواب های مستقل خطی معادله همگن زیر باشد،

$$a_n(x) y^{(n)} + a_{n-1}(x) y^{(n-1)} + \dots + a_1(x) y' + a_0(x) y = 0$$

آنگاه جواب عمومی معادله فوق به صورت زیر است:

$$y = c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \dots + c_n f_n(x)$$



ارائه دهنده:

محمد حسین
مسلمی کویایی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

مسایل نمونه



ارائه دهنده:

محمد حسین
مسلمی کوپایی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

مسایل نمونه

ملاحظه

قضیه اساسی ۲

معادله دیفرانسیل خطی مرتبه دوم زیر را در نظر می گیریم.

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = r(x)$$

جواب عمومی معادله فوق به صورت $y = y_h + y_p$ می باشد، که در آن y_p جواب خصوصی معادله فوق و y_h جواب معادله همگن زیر است:

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

تذکر

هرگاه f_1 و f_2 دو جواب مستقل خطی معادله همگن زیر باشد

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

آنگاه بنا به قضیه اساسی ۱ جواب عمومی معادله همگن به صورت زیر است:

$$y = c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x)$$

یافتن جواب عمومی معادله دیفرانسیل خطی مرتبه دوم همگن با معلوم یک جواب آن:

فرض کنیم $f_1(x)$ یک جواب غیر صفر معادله همگن زیر باشد

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

در این صورت تابع $g(x)$ را به صورت زیر محاسبه می کنیم:

$$g(x) = \int \frac{1}{f_1^2(x)} e^{-\int p(x) dx} dx$$



ارائه دهنده:

محمد حسین
مسلمی کوپایی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

مسائل نمونه

ثابت می شود که جواب دیگر معادله همگن برابر است:

$$f_2(x) = g(x) \cdot f_1(x)$$

از طرفی چون $W(x, f_1, f_2) \neq 0$ ، پس دو جواب f_1, f_2 مستقل خطی هستند. بنابراین بنا به قضیه اساسی ۱ ، جواب عمومی معادله همگن فوق برابر است با:

$$y = c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x)$$

مثال

جواب عمومی معادله همگن $y'' + y = 0$ را وقتی $f_1(x) = \sin x$ یک جواب آن است، بیابید.
حل:

ابتدا $g(x)$ را می یابیم.

$$g(x) = \int \frac{1}{f_1^2(x)} e^{-\int p(x) dx} dx = \int \frac{1}{\sin^2 x} e^{-\int \frac{1}{\sin x} dx} dx = \int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x$$



ارائه دهنده:

محمد حسین
مسلمی کوپایی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

مسایل نمونه

مثال

جواب دیگر یعنی $f_2(x)$ برابر است با:

$$f_2(x) = g(x) \cdot f_1(x) = -\cot x \cdot \sin x = -\frac{\cos x}{\sin x} \cdot \sin x = -\cos x$$

بنابراین جواب عمومی معادله همگن به صورت زیر نوشته می شود.

$$y = c_1 \sin x + c_2 \cos x$$

مثال: جواب عمومی معادله همگن $y'' - y = 0$ را وقتی $f_1(x) = e^x$ یک جواب آن است، بیابید.
حل:

ابتدا $g(x)$ را می یابیم.

$$g(x) = \int \frac{1}{f_1'(x)} e^{-\int p(x) dx} dx = \int \frac{1}{e^{2x}} e^{-\int 2x dx} dx = \int \frac{1}{e^{2x}} dx = \int e^{-2x} dx = -\frac{1}{2} e^{-2x}$$



ارائه دهنده:

محمد حسین
مسلمی کوپایی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

مسایل نمونه

مثال

جواب دیگر یعنی $f_2(x)$ برابر است با:

$$f_2(x) = g(x) \cdot f_1(x) = -\frac{1}{4}e^{-2x} \cdot e^x = -\frac{1}{4}e^{-2x+x} = -\frac{1}{4}e^{-x}$$

بنابراین جواب عمومی معادله همگن به صورت زیر نوشته می شود.

$$y = c_1 e^x - \frac{1}{4} c_2 e^{-2x}$$

معادله خطی همگن با ضرایب ثابت :

این معادله به شکل زیر است:

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y = 0$$



ارائه دهنده:

محمد حسین
مسلمی کوپایی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

مسائل نمونه

که در آن اعداد حقیقی هستند. مانند:

$$(۱) \quad 4y'' - 6y' + 2y = 0$$

$$(۲) \quad 3y^{(۴)} - 2y^{(۳)} + 4y'' - y = 0$$

برای حل این گونه معادلات چنین عمل می کنیم.
عملگر دیفرانسیل D ، این معادلات دارای چند جمله ای عملگر دیفرانسیل گیری به شکل $P(D)$ است که به صورت زیر نوشته می شود.

$$P(D) = a_n D^n + a_{n-1} D^{n-1} + \cdots + a_1 D + a_0 = 0$$

لازم به ذکر است که معادله $P(D)y = 0$ همان معادله دیفرانسیل خطی همگن با ضرایب ثابت است.
چند جمله ای کمکی وابسته به $P(D) = 0$ را با $P(r)$ نمایش می دهیم و به صورت زیر به تعریف می گردد.

$$P(r) = a_n r^n + a_{n-1} r^{n-1} + \cdots + a_1 r + a_0$$

مثال: چند جمله ای کمکی وابسته به $P(D)$ برای معادله دیفرانسیل زیر را بنویسید.

$$2y'' - 5y' + 2y = 0$$



ارائه دهنده:

محمد حسین
مسلمی کویایی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

مسائل نمونه

حل:

$$P(D) = 2D^2 - 5D + 2D' \rightsquigarrow P(r) = 2r^2 - 5r + 2$$

ملاحظه

روش حل معادله خطی همگن با ضرایب ثابت :

برای حل معادلات خطی همگن با ضرایب ثابت، ابتدا معادله $P(r)$ را می یابیم، سپس معادله $P(r) = 0$ را حل می کنیم. برای ریشه های این معادله سه حالت زیر رُخ می دهد:

(۱) اگر معادله $P(r) = 0$ دارای n ریشه حقیقی متمایز مانند r_1, r_2, \dots, r_n باشد، آنگاه ثابت می شود معادله خطی همگن با ضرایب ثابت ، دارای جواب های مستقل خطی زیر است:

$$f_1(x) = e^{r_1 x}, \quad f_2(x) = e^{r_2 x}, \quad \dots \quad f_n(x) = e^{r_n x}$$

بنابراین جواب عمومی معادله برابر است با:

$$y = c_1 e^{r_1 x} + c_2 e^{r_2 x} + \dots + c_n e^{r_n x}$$



ارائه دهنده:

محمد حسین
مسلمی کوپایی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

مسایل نمونه

مثال

جواب عمومی معادلات دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابت زیر را به دست آورید.

$$(۱) \ y'' - ۳y' + ۲y = ۰ \qquad (۲) \ (D - ۱)(D + ۱)(D + ۲) y = ۰$$

حل :

(۱) چندجمله ای $P(r)$ وابسته به عملگر دیفرانسیل ای معادله به صورت زیر است:

$$P(r) = r^۲ - ۳r + ۲$$

اکنون قرار می دهیم $P(r) = ۰$ ، پس

$$r^۲ - ۳r + ۲ = ۰ \quad \rightsquigarrow \quad (r - ۱)(r - ۲) = ۰ \quad \rightsquigarrow \quad r_۱ = ۱ \quad , \quad r_۲ = ۲$$



ارائه دهنده:

محمد حسین
مسلمی کوپایی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

مسایل نمونه

لذا جواب های مستقل خطی معادله برابر است با:

$$f_1(x) = e^{-x}, \quad f_2(x) = e^{2x}$$

بنابراین جواب عمومی معادله برابر است با:

$$y = c_1 e^{-x} + c_2 e^{2x}$$

(۲) چند جمله ای $P(D)$ به صورت زیر است.

$$P(D) = (D - 1)(D + 1)(D + 2)$$

چند جمله ای $P(r)$ وابسته به عملگر دیفرانسیل ای معادله به صورت زیر است:

$$P(r) = (r - 1)(r + 1)(r + 2)$$

اکنون قرار می دهیم $P(r) = 0$ ، پس

$$(r - 1)(r + 1)(r + 2) = 0 \quad \rightsquigarrow \quad r_1 = 1, \quad r_2 = -1, \quad r_3 = -2$$



ارائه دهنده:

محمد حسین
مسلمی کویایی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

مسایل نمونه

لذا جواب های مستقل خطی معادله برابر است با:

$$f_1(x) = e^x, \quad f_2(x) = e^{-x}, \quad f_3(x) = e^{-2x}$$

بنابراین جواب عمومی معادله برابر است با:

$$y = c_1 e^x + c_2 e^{-x} + c_3 e^{-2x}$$



ارائه دهنده:

محمد حسین
مسلمی کوپایی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

مسایل نمونه

ملاحظه

روش حل معادله خطی همگن با ضرایب ثابت :

(۲) اگر معادله $P(r) = 0$ دارای جواب مختلطی به صورت $z = a + bi$ باشد، آنگاه ثابت می شود معادله خطی همگن با ضرایب ثابت ، دارای دو جواب مستقل خطی زیر است:

$$f_1(x) = e^{ax} \cos bx, \quad f_2(x) = e^{ax} \sin bx$$

بنابراین جواب عمومی معادله برابر است با:

$$y = c_1 e^{ax} \cos bx + c_2 e^{ax} \sin bx$$

مثال

جواب عمومی معادلات دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابت زیر را بیابید.

$$(۱) \quad y'' + y = 0$$

$$(۲) \quad y'' - ۲y' + ۴y = 0$$



ارائه دهنده:

محمد حسین
مسلمی کوپایی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

مسایل نمونه

حل:

(۱) چندجمله ای $P(r)$ وابسته به عملگر دیفرانسیل ای معادله به صورت زیر است:

$$P(r) = r^2 + 1$$

اکنون قرار می دهیم $P(r) = 0$ ، پس

$$r^2 + 1 = 0 \rightsquigarrow r^2 = -1 \rightsquigarrow r = \pm \underbrace{\sqrt{-1}}_i = \pm i$$

پس

$$r = 0 \pm 1i \rightsquigarrow a = 0, \quad b = 1$$

لذا جواب های مستقل خطی معادله برابر است با:

$$f_1(x) = e^{0 \cdot x} \cos 1x = \cos x, \quad f_2(x) = e^{0 \cdot x} \sin 1x = \sin x$$



ارائه دهنده:

محمد حسین
مسلمی کوپایی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

مسایل نمونه

بنابراین جواب عمومی معادله برابر است با:

$$y = c_1 \cos \sqrt{x} + c_2 \sin \sqrt{x}$$

(۲) چندجمله ای $P(r)$ وابسته به عملگر دیفرانسیل ای معادله به صورت زیر است:

$$P(r) = r^2 - 2r + 4$$

اکنون قرار می دهیم $P(r) = 0$ ، پس

$$r^2 - 2r + 4 = 0 \quad \rightsquigarrow \quad r = \frac{-(-2) \pm \sqrt{4 - 16}}{2(1)} = \frac{2 \pm \sqrt{-12}}{2}$$

لذا جواب های مستقل خطی معادله برابر است با:

$$f_1(x) = e^{\sqrt{3}x} \cos \sqrt{3}x, \quad f_2(x) = e^{\sqrt{3}x} \sin \sqrt{3}x$$



ارائه دهنده:

محمد حسین
مسلمی کوپایی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

مسایل نمونه

بنابراین جواب عمومی معادله برابر است با:

$$y = c_1 e^{-x} \cos \sqrt{3}x + c_2 e^{-x} \sin \sqrt{3}x$$



ارائه دهنده:

محمد حسین
مسلمی کوپایی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

مسایل نمونه

ملاحظه

روش حل معادله خطی همگن با ضرایب ثابت :

(۳) اگر در حل معادله $P(r) = 0$ ریشه های تکراری به دست آید، حالت های زیر را در نظر می گیریم:

(الف) فرض کنیم ریشه حقیقی مانند c ، مرتبه تکرار شده باشد، در این صورت برای این ریشه تکراری جواب های مستقل خطی عبارتند از:

$$f_1(x) = e^{c x} , \quad f_2(x) = x e^{c x} , \quad \dots , \quad f_{m-1}(x) = x^{m-1} e^{c x}$$

(ب) فرض کنیم ریشه مختلط $r = a + bi$ که از حل معادله $P(r) = 0$ به دست آمده، مرتبه m تکرار شده باشد، آنگاه نظیر این ریشه مختلط m جواب مستقل خطی به صورت زیر به دست می آید.

$$f_1(x) = e^{a x} \cos b x , \quad f_2(x) = x e^{a x} \cos b x , \dots , \quad f_{m-1}(x) = x^{m-1} e^{a x} \cos b x$$

$$f_m(x) = e^{a x} \sin b x , \quad f_{m+1}(x) = x e^{a x} \sin b x , \dots , \quad f_{2m}(x) = x^{m-1} e^{a x} \sin b x$$



ارائه دهنده:

محمد حسین
مسلمی کوپایی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

مسایل نمونه

مثال

جواب عمومی معادلات دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابت زیر را بیابید.

$$(۱) (D^2 - ۱)(D + ۱)y = ۰, \quad (۲) y^{(۴)} + ۲y'' + y = ۰, \quad (۳) y^{(۵)} + ۴y''' = ۰$$

حل:

(۱) چندجمله ایهای $P(D)$ و $P(r)$ به صورت زیر می باشد.

$$P(D) = (D^2 - ۱)(D + ۱) \rightsquigarrow P(r) = (r^2 - ۱)(r + ۱)$$

از حل معادله $P(r) = ۰$ داریم:

$$P(r) = ۰ \rightsquigarrow (r^2 - ۱)(r + ۱) = ۰ \rightsquigarrow r^2 = ۱ \rightsquigarrow r = \pm ۱, \quad r = -۱$$

بنابراین ریشه حقیقی $r = -۱$ دو بار تکرار و ریشه $r = ۱$ یک بار تکرار شده است، پس جواب های



ارائه دهنده:

محمد حسین
مسلمی کوپایی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

مسایل نمونه

مستقل خطی معادله برابر است با:

$$f_1(x) = e^x, \quad f_2(x) = e^{-x}, \quad f_3(x) = x e^{-x}$$

لذا جواب عمومی به صورت زیر است.

$$y = c_1 e^x + c_2 e^{-x} + c_3 x e^{-x}$$

(۲) چندجمله ای $P(r)$ به صورت زیر می باشد.

$$P(r) = r^4 + 2r^2 + 1$$

از حل معادله $P(r) = 0$ داریم:

$$P(r) = 0 \rightsquigarrow r^4 + 2r^2 + 1 = 0 \rightsquigarrow (r^2 + 1)^2 = 0$$

$$\rightsquigarrow r^2 + 1 = 0, \quad r^2 + 1 = 0 \rightsquigarrow r = \pm\sqrt{-1} = \pm i, \quad r = \pm\sqrt{-1} = \pm i$$

لذا ریشه $r = 0 \pm 1i$ دو بار تکرار شده است که در آن $a = 0$ و $b = 1$ می باشد، در نتیجه جواب های



ارائه دهنده:

محمد حسین
مسلمی کوپایی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

مسایل نمونه

مستقل خطی برابر است با :

$$f_1(x) = e^x \cos x = \cos x , \quad f_2(x) = x e^x \cos x = x \cos x$$

$$f_3(x) = e^x \sin x = \sin x , \quad f_4(x) = x e^x \sin x = x \sin x$$

در نتیجه جواب عمومی معادله برابر است با:

$$y = c_1 \cos x + c_2 x \cos x + c_3 \sin x + c_4 x \sin x$$

(۳) چند جمله ای $P(r)$ به صورت زیر می باشد.

$$P(r) = r^5 + 4r^3$$

از حل معادله $P(r) = 0$ ، داریم:

$$P(r) = 0 \quad \rightsquigarrow \quad r^5 + 4r^3 = 0 \quad \rightsquigarrow \quad r^3(r^2 + 4) = 0$$



ارائه دهنده:

محمد حسین
مسلمی کوپایی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

مسایل نمونه

لذا $r^3 = 0$ ، در نتیجه $r = 0$ (سه بار تکرار شده است)؛ از حل معادله $r^2 + 4 = 0$ داریم:

$$r^2 = -4 \rightsquigarrow r = \pm\sqrt{-4} = \pm\sqrt{4}\underbrace{\sqrt{-1}}_i = \pm 2i$$

بنابراین ریشه حقیقی $r = 0$ سه بار تکرار شده است، جواب های مستقل خطی وابسته به آن به صورت زیر است:

$$f_1(x) = e^{0x} = 1, \quad f_2(x) = x e^{0x} = x, \quad f_3(x) = x^2 e^{0x} = x^2$$

از طرفی برای ریشه مختلط $r = 0 \pm 2i$ که در آن $a = 0$ و $b = 2$ می باشد، جواب های مستقل خطی وابسته به آن برابر است با:

$$f_4(x) = e^{0x} \cos 2x = \cos 2x, \quad f_5(x) = e^{0x} \sin 2x = \sin 2x$$

در نتیجه جواب عمومی معادله برابر است با:

$$y = c_1 1 + c_2 x + c_3 x^2 + c_4 \cos 2x + c_5 \sin 2x$$



ارائه دهنده:

محمد حسین
مسلمی کوپایی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

مسایل نمونه

ملاحظه

معادله کوشی - اویلر :

شکل این معادله در حالت مرتبه دوم به صورت زیر است:

$$ax^2 y'' + bx y' + c y = 0$$

با فرض $x > 0$ ، تغییر متغیر $x = e^t$ یا $t = \ln x$ را در نظر می گیریم. با این تغییر متغیر معادله خطی همگن با ضرایب ثابت به دست می آید. در این صورت چند جمله ای $P(D)$ به صورت زیر تعیین می گردد.

$$P(D) = a D(D - 1) + b D + c$$

اکنون برای حل معادله کافی است معادله $P(r)$ را که به صورت زیر است، حل شود.

$$P(r) = a r(r - 1) + b r + c = 0$$



ارائه دهنده:

محمد حسین
مسلمی کوپایی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

مسایل نمونه

مثال

معادلات کوشی - اوایلر زیر را حل کنید.

$$(۱) x^2 y'' - 2y = 0$$

$$(۲) x^2 y'' - 5x y' + ۱۳y = 0$$

حل:

(۱) با انتخاب $x = e^t$ یا $t = \ln x$ داریم:

$$P(D) = D(D - ۱) - 2 \rightsquigarrow P(r) = r(r - ۱) - 2 = 0$$

$$\rightsquigarrow r^2 - r - 2 = 0 \rightsquigarrow (r + ۱)(r - ۲) = 0 \rightsquigarrow r_1 = -۱, r_2 = ۲$$

بنابراین جواب های مستقل خطی برابر است با:

$$f(t) = e^{r_1 t} = e^{-۱ t}, \quad f_2(t) = e^{r_2 t} = e^{۲ t}$$



ارائه دهنده:

محمد حسین
مسلمی کوپایی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

مسایل نمونه

در نتیجه جواب عمومی معادله برابر است با:

$$y = c_1 e^{-t} + c_2 e^{\sqrt{2}t} = c_1 \underbrace{(e^t)^{-1}}_x + c_2 \underbrace{(e^t)^{\sqrt{2}}}_x = c_1 x^{-1} + c_2 x^{\sqrt{2}}$$

(۲) با انتخاب $x = e^t$ یا $t = \ln x$ داریم:

$$P(D) = D(D - 1) - 5D + 13 \rightsquigarrow P(r) = r(r - 1) - 5r + 13 = 0$$

$$\rightsquigarrow r^2 - r - 5r + 13 = 0 \rightsquigarrow r^2 - 6r + 13 = 0 \rightsquigarrow r = \frac{-(-6) \pm \sqrt{36 - 4(13)}}{2(1)}$$

$$\rightsquigarrow = \frac{6 \pm \sqrt{-16}}{2} = \frac{6 \pm \sqrt{16}\sqrt{-1}}{2} = 3 \pm 2i \rightsquigarrow a = 3, \quad b = 2$$

لذا جواب های مستقل خطی معادله برابر است با:

$$f_1(t) = e^{\sqrt{2}t} \cos \sqrt{2}t, \quad f_2(t) = e^{\sqrt{2}t} \sin \sqrt{2}t$$

بنابراین جواب عمومی معادله برابر است با:

$$y = c_1 e^{\sqrt{2}t} \cos \sqrt{2}t + c_2 e^{\sqrt{2}t} \sin \sqrt{2}t = c_1 \underbrace{(e^t)^{\sqrt{2}}}_x \cos \sqrt{2} \underbrace{\left(\frac{t}{\ln x}\right)}_{\ln x} + c_2 \underbrace{(e^t)^{\sqrt{2}}}_x \sin \sqrt{2} \underbrace{\left(\frac{t}{\ln x}\right)}_{\ln x}$$



ارائه دهنده:

محمد حسین
مسلمی کوپایی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

مسائل نمونه

در نتیجه جواب عمومی معادله فوق بر حسب x به صورت زیر به دست می آید.

$$= c_1 x^{\frac{1}{2}} \cos(\frac{1}{2} \ln x) + c_2 x^{\frac{1}{2}} \sin(\frac{1}{2} \ln x)$$

معادلات دیفرانسیل غیر همگن

می دانیم یک معادله خطی غیر همگن به صورت زیر است:

$$a_n(x) y^{(n)} + a_{n-1}(x) y^{(n-1)} + \dots + a_1(x) y' + a_0(x) y = f(x)$$

برای حل آن دو روش ضرایب نامعین و تغییر پارامتر ارائه می شود.



ارائه دهنده:

محمد حسین
مسلمی کوپایی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

مسایل نمونه

تذکر

اگر f_1, f_2, \dots, f_n جواب های مستقل خطی معادله دیفرانسیل خطی همگن زیر باشد،

$$a_n(x) y^{(n)} + a_{n-1}(x) y^{(n-1)} + \dots + a_1(x) y' + a_0(x) y = 0$$

و علاوه بر این y_p یک جواب خصوصی معادله غیر همگن

$$a_n(x) y^{(n)} + a_{n-1}(x) y^{(n-1)} + \dots + a_1(x) y' + a_0(x) y = f(x)$$

باشد، آنگاه جواب عمومی معادله غیر همگن فوق به صورت زیر است.

$$y = c_1 f_1 + c_2 f_2 + \dots + c_n f_n + y_p$$

مثال: اگر $y_p = 2e^{-x}$ یک جواب خصوصی معادله زیر باشد، جواب عمومی معادله را به دست آورید.

$$y'' - 3y' + 2y = 22e^{-x}$$



ارائه دهنده:

محمد حسین
مسلمی کوپایی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

مسائل نمونه

حل:

ابتدا جواب های مستقل خطی معادله همگن زیر را می یابیم.

$$y'' - 3y' + 2y = 0$$

ار حل معادله $P(r) = 0$ داریم:

$$P(r) = r^2 - 3r + 2 = 0 \rightsquigarrow (r - 1)(r - 2) = 0 \rightsquigarrow r_1 = 1, \quad r_2 = 2$$

بنابراین $f_1(x) = e^x$ ، $f_2(x) = e^{2x}$ ؛ جواب های مستقل خطی معادله همگن هستند. چون $y_p = 2e^{-x}$ جواب خصوصی معادله غیر همگن است، لذا بنا به تذکر قبل، جواب عمومی معادله غیر همگن برابر است با:

$$y = c_1 e^x + c_2 e^{2x} + \underbrace{2e^{-x}}_{y_p}$$



ارائه دهنده:

محمد حسین
مسلمی کوپایی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

مسایل نمونه

روش حل ضرایب نامعین برای معادلات خطی با ضرایب ثابت

در این قسمت به حل معادلات خطی غیر همگن با ضرایب ثابت به شکل زیر می پردازیم.

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_0 y = f(x)$$

فرض کنیم $P(D)$ عملگر دیفرانسیل گیری و $P(r)$ چند جمله ای کمکی وابسته به $P(D)$ باشد؛ به عبارت دیگر

$$P(D) = a_n D^n + a_{n-1} D^{n-1} + \dots + a_0 D^0, \quad P(r) = a_n r^n + a_{n-1} r^{n-1} + \dots + a_0$$

هرگاه تابع $f(x)$ به شکل $Ax^j e^{cx}$ (c یک عدد حقیقی یا مختلط) باشد، در این صورت برای یافتن جواب خصوصی معادله غیر همگن فوق (y_p) دو حالت زیر را در نظر می گیریم.

الف : c ریشه معادله $P(r) = 0$ نباشد.

در این شرایط جواب خصوصی معادله به شکل زیر است:

$$y_p = (A_0 + A_1 x + \dots + A_j x^j) e^{cx}$$



ارائه دهنده:

محمد حسین
مسلمی کوپایی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

مسایل نمونه

که در آن A_0, A_1, \dots, A_j مجهول هستند. برای یافتن آنها، y_p را در معادله دیفرانسیل قرار داده و سمت چپ و راست متحد هم قرار می دهیم؛ از آنجا ضرایب A_j ها به دست می آیند.

ب : c ریشه معادله $P(r) = 0$ با m تکرار باشد.

در این شرایط جواب خصوصی معادله به شکل زیر است:

$$y_p = x^m (A_0 + A_1 x + \dots + A_j x^j) e^{c x}$$

و همانند قسمت الف، ضرایب مجهول را می یابیم.

مثال

جواب عمومی معادلات خطی غیر همگن با ضرایب ثابت زیر را به دست آورید.

$$(۱) \quad y'' + ۲y' - ۳y = ۵e^{۲x}$$

$$(۲) \quad y'' + ۳y' + ۲y = ۶xe^x$$

$$(۳) \quad y''' + y'' = e^{-x}$$

حل:



ارائه دهنده:

محمد حسین
مسلمی کوپایی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

مسایل نمونه

(۱) ابتدا جواب های مستقل خطی معادله همگن آن را می یابیم. به عبارت دیگر

$$y'' + 2y' - 3y = 0 \rightsquigarrow P(r) = r^2 + 2r - 3 = 0 \rightsquigarrow (r - 1)(r + 3) = 0$$

$$\rightsquigarrow r_1 = 1, \quad r_2 = -3 \rightsquigarrow f_1(x) = e^x, \quad f_2(x) = e^{-3x}$$

اکنون جواب خصوصی y_p معادله غیر همگن را تعیین می کنیم. چون $f(x) = 5e^{2x} = 5x^0 e^2x$ ، لذا $j = 0$ و $c = 2$ می باشد. $c = 2$ ریشه $P(r) = 0$ نیست. بنا به حالت (الف) ، داریم:

$$y_p = A \cdot e^{2x}, \quad A = ?$$

حال مشتق اول و دوم y_p را محاسبه نموده در معادله غیر همگن قرار می دهیم و از آنجا A را به دست می آوریم.

$$y'_p = 2A \cdot e^{2x} \rightsquigarrow y''_p = 4A \cdot e^{2x} \rightsquigarrow y''_p + 2y'_p - 3y_p = 5e^{2x}$$

$$\rightsquigarrow 4(A \cdot e^{2x}) + 2(2A \cdot e^{2x}) - 3(A \cdot e^{2x}) = 5e^{2x}$$

$$\rightsquigarrow (4A + 4A - 3A) e^{2x} = 5e^{2x}$$

$$\rightsquigarrow 5A = 5 \rightsquigarrow A = 1$$



ارائه دهنده:

محمد حسین
مسلمی کوپایی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

مسایل نمونه

در نتیجه $y_p = 1 e^{2x}$ ؛ بنابراین جواب عمومی معادله غیر همگن برابر است با:

$$y = c_1 e^x + c_2 e^{-2x} + \underbrace{e^{2x}}_{y_p}$$

(۲) ابتدا جواب های مستقل خطی معادله همگن آن را می یابیم. به عبارت دیگر

$$y'' + 3y' + 2y = 0 \rightsquigarrow P(r) = r^2 + 3r + 2 = 0 \rightsquigarrow (r+1)(r+2) = 0$$

$$\rightsquigarrow r_1 = -1, \quad r_2 = -2 \rightsquigarrow f_1(x) = e^{-x}, \quad f_2(x) = e^{-2x}$$

اکنون جواب خصوصی y_p معادله غیر همگن را تعیین می کنیم. چون $f(x) = 6xe^x = 6x^1 e^1 x$ ، لذا $j = 1$ و $c = 1$ می باشد. $c = 1$ ریشه $P(r) = 0$ نیست. بنا به حالت (الف) ، داریم:

$$y_p = (A_1 + A_2 x) e^x, \quad A_1 = ?, \quad A_2 = ?$$

حال مشتق اول و دوم y_p را محاسبه نموده در معادله غیر همگن قرار می دهیم و از آنجا A_1 و A_2 را به دست می آوریم.

$$y_p = A_1 e^x + A_2 x e^x \rightsquigarrow y'_p = A_1 e^x + A_2 e^x + A_2 x e^x$$



ارائه دهنده:

محمد حسین
مسلمی کوپایی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

مسایل نمونه

$$\leadsto y_p'' = A_1 e^x + A_2 e^x + A_3 e^x + A_4 x e^x, \quad y_p'' + 3y_p' + 2y_p = 6xe^x$$

$$\leadsto \underbrace{A_1 e^x + A_2 e^x + A_3 e^x + A_4 x e^x}_{y_p''} + 3 \underbrace{(A_1 e^x + A_2 e^x + A_4 x e^x)}_{y_p'} + 2 \underbrace{(A_1 e^x + A_4 x e^x)}_{y_p} = 6x e^x$$

$$\leadsto (A_1 + A_2 + A_3 + A_4 x + 3A_1 + 3A_2 + 3A_4 x + 2A_1 + 2A_4 x) e^x = 6x e^x$$

$$\leadsto (6A_1 + 5A_2) + 6A_4 x = 6x = 0 + 6x$$

$$\leadsto 6A_1 + 5A_2 = 0, \quad 6A_4 = 6 \leadsto A_4 = 1, \quad 6A_1 + 5(1) = 0 \leadsto A_1 = -\frac{5}{6}$$

در نتیجه $y_p = (-\frac{5}{6} + x) e^x$ ؛ لذا جواب عمومی معادله غیرهمگن برابر است با:

$$y = c_1 e^{-x} + c_2 e^{-2x} + (-\frac{5}{6} + x) e^x$$

(۳) ابتدا جواب های مستقل خطی معادله همگن آن را می یابیم. به عبارت دیگر

$$y''' + y'' = 0 \leadsto P(r) = r^3 + r^2 = 0 \leadsto r^2(r + 1) = 0$$

$$\leadsto r_1 = 0 \text{ (دوبار تکرار شده است)}, \quad r_2 = -1$$

$$\leadsto f_1(x) = e^{0x} = 1, \quad f_2(x) = x^1 e^{0x} = x, \quad f_3(x) = e^{-1x}$$



ارائه دهنده:

محمد حسین
مسلمی کویایی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

مسایل نمونه

اکنون جواب خصوصی y_p معادله غیر همگن را تعیین می کنیم. چون $f(x) = e^{-x} = x^0 e^{-1 \cdot x}$ ، لذا $j = 0$ و $c = -1$ می باشد. $c = -1$ ریشه $P(r) = 0$ می باشد. بنا به حالت (ب) ، داریم:

$$y_p = A \cdot x e^{-x} , \quad A = ?$$

$$\rightsquigarrow y_p' = A \cdot e^{-x} + (-A \cdot x e^{-x}) \rightsquigarrow y_p'' = -A \cdot e^{-x} - A \cdot x e^{-x} + A \cdot x e^{-x} = -2A \cdot e^{-x} + A \cdot x e^{-x}$$

$$\rightsquigarrow y_p''' = 2A \cdot e^{-x} + A \cdot e^{-x} - A \cdot x e^{-x} = 3A \cdot e^{-x} - A \cdot x e^{-x}$$

مقادیر y_p'' و y_p''' در معادله دیفرانسیل قرار داده و از آنجا A را می یابیم.

$$y_p''' + y_p'' = e^{-x} \rightsquigarrow \underbrace{3A \cdot e^{-x} - A \cdot x e^{-x}}_{y_p'''} + \underbrace{(-2A \cdot e^{-x} + A \cdot x e^{-x})}_{y_p''} = e^{-x}$$

$$\rightsquigarrow A \cdot e^{-x} = e^{-x} \rightsquigarrow A = 1$$

بنابراین $y_p = x e^{-x}$ ؛ لذا جواب عمومی معادله غیر همگن برابر است با:

$$y = c_1(1) + c_2 x + c_3 e^{-x} + x e^{-x}$$



ارائه دهنده:

محمد حسین
مسلمی کوپایی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

مسایل نمونه

تذکر

اگر در معادله دیفرانسیل غیر همگن با ضرایب ثابت، تابع $f(x)$ به صورت $a \sin bx$ یا $a \cos bx$ باشد، آنگاه جواب خصوصی را به صورت $y_p = A_1 \cos bx + A_2 \sin bx$ قرار می دهیم و مشتقات آن را محاسبه نموده در معادله دیفرانسیل غیر همگن قرار داده، از آنجا مجهول های A_1 و A_2 را می یابیم.

مثال

جواب عمومی معادله دیفرانسیل $y'' + 4y = 3 \cos 5x$ را بیابید.

حل:

(۱) ابتدا جواب های مستقل خطی معادله همگن آن را می یابیم. به عبارت دیگر

$$y'' + 4y = 0 \rightsquigarrow P(r) = r^2 + 4 = 0 \rightsquigarrow r^2 = -4$$

$$\rightsquigarrow r = \pm \sqrt{-4} = \pm 2i = 0 \pm 2i \rightsquigarrow a = 0, b = 2$$



ارائه دهنده:

محمد حسین
مسلمی کویایی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

مسائل نمونه

لذا جواب های مستقل خطی برابر است با:

$$f_1(x) = e^{ax} \cos bx = e^{ix} \cos x = \cos x, \quad f_2(x) = e^{ax} \sin bx = e^{ix} \sin x = \sin x$$

چون $f(x) = 3 \cos 5x$ ، لذا $b = 5$ می باشد و جواب خصوصی معادله به صورت $y_p = A_1 \cos 5x + A_2 \sin 5x$ است.

$$y'_p = -5A_1 \sin 5x + 5A_2 \cos 5x \rightsquigarrow y''_p = -25A_1 \cos 5x - 25A_2 \sin 5x$$

باقرار دادن در y_p و y''_p در معادله دیفرانسیل غیر همگن، داریم:

$$y'' + 4y = 3 \cos 5x$$

$$\rightsquigarrow \underbrace{-25A_1 \cos 5x - 25A_2 \sin 5x}_{y''_p} + 4 \underbrace{(A_1 \cos 5x + A_2 \sin 5x)}_{y_p} = 3 \cos 5x$$

$$-25A_1 \cos 5x - 25A_2 \sin 5x = 3 \cos 5x + 0 \sin 5x \rightsquigarrow -25A_1 = 3, \quad -25A_2 = 0$$

بنابراین $A_1 = -\frac{3}{25}$ و $A_2 = 0$ ؛ در نتیجه

$$y_p = A_1 \cos 5x + A_2 \sin 5x = -\frac{3}{25} \cos 5x + 0 \sin 5x = -\frac{3}{25} \cos 5x$$



ارائه دهنده:

محمد حسین
مسلمی کویایی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

مسایل نمونه

بنابراین جواب عمومی معادله غیر همگن برابر است با:

$$y = c_1 \cos 5x + c_2 \sin 5x - \underbrace{\frac{1}{5} \cos 5x}_{y_p}$$

ملاحظه

روش تغییر پارامتر برای حل معادلات خطی مرتبه دوم

اگر $f_1(x)$ و $f_2(x)$ جواب های مستقل خطی برای معادله همگن خطی زیر باشد،

$$a_2(x) y'' + a_1(x) y' + a_0(x) y = 0$$

آنگاه معادله $a_2(x) y'' + a_1(x) y' + a_0(x) y = f(x)$ دارای جواب خصوصی به صورت $y_p = c_1(x) f_1(x) + c_2(x) f_2(x)$ می باشد که مجهول های $c_1(x)$ و $c_2(x)$ از حل دستگاه زیر به دست می آیند.

$$\begin{cases} c_1'(x) f_1(x) + c_2'(x) f_2(x) = 0 \\ c_1'(x) f_1'(x) + c_2'(x) f_2'(x) = \frac{f(x)}{a_2(x)} \end{cases}$$



ارائه دهنده:

محمد حسین
مسلمی کوپایی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

مسایل نمونه

مثال

جواب عمومی معادله دیفرانسیل زیر را به روش تغییر پارامتر به دست آورید.

$$y'' + y = \frac{1}{\sin x}$$

حل:

ابتدا جواب های مستقل خطی معادله همگن آن را می یابیم. به عبارت دیگر

$$y'' + y = 0 \rightsquigarrow P(r) = r^2 + 1 = 0 \rightsquigarrow r^2 = -1$$

$$\rightsquigarrow r = \pm\sqrt{-1} = \pm i = 0 \pm i \rightsquigarrow a = 0, b = 1$$

لذا جواب های مستقل خطی برابر است با:

$$f_1(x) = e^{ax} \cos bx = e^{0x} \cos 1x = \cos x, \quad f_2(x) = e^{ax} \sin bx = e^{0x} \sin 1x = \sin x$$

بنابراین جواب خصوصی معادله غیر همگن به صورت زیر به دست می آید.

$$y_p = c_1(x) f_1(x) + c_2(x) f_2(x) = c_1(x) \cos x + c_2(x) \sin x$$



ارائه دهنده:

محمد حسین
مسلمی کوپایی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

مسائل نمونه

اکنون دستگاه زیر را حل می کنیم.

$$\begin{cases} c_1'(x) \cos x + c_2'(x) \sin x = 0 & (1) \\ c_1'(x) (-\sin x) + c_2'(x) \cos x = \frac{1}{\sin x} & (2) \end{cases}$$

برای دستگاه فوق، معادله (۱) را در $\cos x$ و معادله (۲) را در $-\sin x$ ضرب کرده، با هم جمع می کنیم. داریم:

$$\begin{cases} c_1'(x) \cos^2 x + c_2'(x) \cos x \sin x = 0 \\ c_1'(x) \sin^2 x - c_2'(x) \sin x \cos x = (-\sin x) \frac{1}{\sin x} \end{cases}$$

$$\rightsquigarrow c_1'(x) (\cos^2 x + \sin^2 x) + c_2'(x) (\cos x \sin x - \sin x \cos x) = 0 - 1$$

$$c_1'(x) (\underbrace{\cos^2 x + \sin^2 x}_1) + 0 = -1 \rightsquigarrow c_1'(x) = -1 \rightsquigarrow c_1(x) = x$$

اکنون در معادله (۱)، بجای $c_1'(x)$ ، مقدار -1 را قرار می دهیم.

$$\underbrace{c_1'(x)}_{-1} \cos x + c_2'(x) \sin x = 0 \rightsquigarrow -\cos x + c_2'(x) \sin x = 0$$

$$\rightsquigarrow c_2'(x) \sin x = \cos x \rightsquigarrow c_2'(x) = \frac{\cos x}{\sin x} \rightsquigarrow \int c_2'(x) dx = \int \frac{\cos x}{\sin x} dx$$



ارائه دهنده:

محمد حسین
مسلمی کویایی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

مسائل نمونه

$$\leadsto c_2(x) = \ln |\sin x|$$

در نتیجه جواب خصوصی معادله به صورت زیر به دست آمد.

$$y_p = c_1(x) \cos x + c_2(x) \sin x = -x \cos x + \ln |\sin x| \sin x$$

بنابراین جواب عمومی معادله برابر است با:

$$y = c_1 \cos x + c_2 \sin x + \underbrace{-x \cos x + \ln |\sin x| \sin x}_{y_p}$$



ارائه دهنده:

محمد حسین
مسلمی کوپایی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

مسایل نمونه

۲ مسائل نمونه

در این بخش چند مسأله نمونه از معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم بیان می شود.



ارائه دهنده:

محمد حسین
مسلمی کوپایی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

مسائل نمونه



شکل ۱: برنهارت ریمان ریاضی دان برجسته آلمانی ، متولد: ۱۸۲۶ میلادی ، درگذشت: ۱۸۶۶ میلادی



شکل ۲: بلز پاسکال ریاضی دان برجسته فرانسوی متولد: ۱۶۲۳ میلادی ، درگذشت: ۱۶۶۲ میلادی



ارائه دهنده:

محمد حسین
مسلمی کوپایی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

مسائل نمونه



شکل ۳: گوتفريد لايبنيٲس رياضي دان برجسته آلماني ، متولد: ۱۶۴۶ ميلادي ، درگذشت: ۱۷۱۶ ميلادي



شکل ۴: فريدریش گاوس رياضي دان برجسته آلماني ، متولد: ۱۷۷۷ ميلادي ، درگذشت: ۱۸۵۵ ميلادي



ارائه دهنده:

محمد حسين
مسلمی کويایی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

مسائل نمونه



با سپاس فراوان از توجه شما

ارائه دهنده:

محمد حسین
مسلمی کوپایی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

مسائل نمونه