

Travail demandé. Vous utiliserez de préférence les langages Python ou Matlab.

1. *Paires stéréoscopiques.* L'objet considéré est un polyèdre défini par des points P_1, \dots, P_n reliés entre eux par des arêtes. Ecrire un script pour calculer les transformations T_G et T_G^{-1} de ce polyèdre et pour afficher les deux images (une pour chaque oeil) sur un même graphique. Tester votre code avec les polyèdres suivants.

(a) *Tétraèdre :*

$$\begin{aligned} P_1 &= (1.2, -0.5, 65), & P_2 &= (3, 1.5, 63), \\ P_3 &= (4, -1, 62), & P_4 &= (1.8, -1.5, 62) \end{aligned}$$

(b) *Prisme :*

$$\begin{aligned} P_1 &= (1, -1, 65), & P_2 &= (1.8, -2, 62), & P_3 &= (4.2, -1.5, 65), \\ P_4 &= (1, 2, 65), & P_5 &= (1.8, 1, 62), & P_6 &= (4.2, 1.5, 65) \end{aligned}$$

(c) *et encore un polyèdre... :*

$$\begin{aligned} P_1 &= (0, 2, z), & P_2 &= (0, 3, z), & P_3 &= (3, 3, z), & P_4 &= (3, 2, z), \\ P_5 &= (2, 2, z), & P_6 &= (2, 0, z), & P_7 &= (1, 0, z), & P_8 &= (1, 2, z), \end{aligned}$$

puis 8 autres points avec $P_{8+i} = P_i + (0, 0, 1)$, $i = 1, \dots, 8$. Prendre $z = 64$.

On prendra la distance entre les yeux $e = 7\text{cm}$ et la distance des yeux au plan de projection $f = 40\text{cm}$.

Prendre d'autres objets polyédriques plus ou moins compliqués. Vérifier que si la taille des images est plus grande que $e/2$ alors l'effet stéréoscopique disparaît ou s'estompe fortement. Faire varier aussi la distance f .

2. *Cas d'une surface : points aléatoires.* L'objet considéré est défini par une surface $z = h(x, y)$. Engendrer aléatoirement des points sur cette surface, calculer leurs projections avec (1) et afficher le nuage de points ainsi obtenu dans le plan de projection. Vous pourrez considérer le "pont parabolique" suivant :

$$z = h(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2}{4} - \frac{3x}{2} + 62 & \text{si } |y| \leq 8 \text{ et } -6 \leq x \leq 12 \\ 80 & \text{sinon.} \end{cases} \quad (8)$$

3. *Cas d'une surface : calculs des points sur les courbes (C).* La surface $z = h(x, y)$ est définie pour $(x, y) \in [a, b] \times [c, d]$. On segmente l'intervalle $[c, d]$ (pour y) en plusieurs coupes $y = y_i$ pour $i = 0, \dots, m$ avec $c = y_0 < y_1 < \dots < y_m = d$ et les y_i étant espacés régulièrement. Pour chaque courbe (C_i) définie par $z = h(x, y_i)$, $i = 0, \dots, m$, vous devez :

- engendrer aléatoirement plusieurs points P .
- pour chacun des points P , déterminer les points $I_0^P, I_1^P, \dots, I_n^P$ dont les abscisses sont dans l'intervalle $[a, b]$. On s'arrêtera quand l'abscisse de I_n^P est très proche de b . Le nombre n de points dépend de i et du point de départ P .
- afficher tous les points I_j^P ainsi déterminés pour obtenir le stéréogramme de la surface.

Le calcul des points I_j^P doit se faire en utilisant les 3 procédures différentes décrites précédemment (cf. Calcul de I_2). Tester avec la surface (8), comparer les 3 procédures entre-elles et aussi avec la procédure précédente du choix aléatoires des points.

Ensuite, à vous de jouer... pour trouver des objets et surfaces intéressants, pour ajouter de la couleur, remplacer les points par des *motifs esthétiques*¹...

Références

- [1] Dalang R., Chaabouni A., Algèbre linéaire, aide-mémoires, exercices et applications, PPUR, 2004.
- [2] Quarteroni A., Sacco R., Saleri F., Méthodes numériques pour le calcul scientifique, Springer, 2006.
- [3] Terrell M., Terrell R., *Behind the Scenes of a Random Dot Stereogram*, The American Mathematical Monthly, Oct., 1994, Vol. 101, No. 8, pp. 715-724

1. Dans la méthode présentée ici, le motif de base est le point (chaque point P donne lieu à une suite de points I_0, I_1, I_2, \dots). Il est possible de remplacer les points P par des motifs M (cercle, croix, courbe, figure géométrique, ...). Le principe reste le même avec un motif M : on calcule $J_1 = T_D(M)$ l'image du motif M par T_D puis le motif $M_1 = T_G^{-1}(J_1)$ et ainsi de suite...