

Ҳомиладорлик ва эмизиш даврида СВГВ нинг кечиши хусусиятлари

ВГВ ДНК ёки НВeAg учун текшириш имкони мавжуд бўлган шароитларда ҳомиладор аёллар орасида вирусга қарши профилактика	
В	<p>Вирусга қарши даво фонида режалаштирилмаган ҳомиладорлик кузатилганда, тенофовир қўлланилганда ҳомиладорликни сақлаб қолиш тавсия этилади, энтекавир қўлланилганда ҳомиладорликни тўхтатиш мумкин ва тенофовирга ўтказиш тавсия этилади.</p> <p>https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36891718/</p>
В	<p>ВГВ ДНКси $\geq 200\,000$ ХБ/мл ёки НВeAg-мусбат бўлган барча HBV мусбат (НВsAg мусбат) ҳомиладор аёлларга онадан болага ВГВ юкишининг олдини олиш учун тенофовир дизопроксил фумарат TDF профилактика мақсадида тавсия этилади. Ҳомиладорликнинг иккинчи триместридан бошлаб, ҳеч бўлмаганда туғиш вақтигача ёки боланинг ВГВ га қарши эмланиши тугашига қадар.</p> <p>Шарҳ: Ҳамма аралашувлар барча эмизилувчи чақалоқлар учун гепатит В га қарши эмлашнинг камида учта дозасига қўшимча равишда бўлиши керак, шу жумладан, туғилганда ўз вақтида дозани олиши инобатга олинади.</p> <p>Репродуктив ёшдаги аёллар ва барча ҳомиладорлар биринчи навбатда ВҚД билан узоқ муддатли даволаш тамойилларига текширилиши керак. Ҳомиладорликнинг тўлиқ муддатини ўтказишни режалаштираётган аёллар учун TDF профилактикаси аёлнинг хоҳишига кўра туғруқдан кейин ҳам, кейинги ҳомиладорлик даврида ҳам давом эттирилиши мумкин.</p>
С	<p>Эмизиш тенофовир терапиясига қарши кўрсатма эмас.</p> <p>https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36891718/</p>
	<p>https://www.who.int/publications/i/item/9789240090903</p>

Эмлаш	
В	<p>Барча чақалоқлар гепатит В га қарши вакцинанинг биринчи дозасини туғилгандан кейин имкон қадар тезроқ, 24 соат ичида олиши керак.</p> <p>Туғилгандан кейин 24 соат ичида гепатит В га қарши вакцинани олиш барча эмлаш дастурлари самарадорлигининг кўрсаткичи бўлиши керак ва ҳисобот ҳамда</p>

	<p>мониторинг тизимлари эса, туғилиш вақтида доза маълумотларининг сифатини яхшилаш учун кучайтирилиши керак.</p> <p>Бирламчи эмлаш сериясини якунлаш учун туғилганда олинадиган дозадан кейин икки ёки учта қўшимча дозаларни олиш керак.</p> <p>Ҳомиладор аёллар ва ўсмир қизлар ўртасида HBsAg ни текшириш. Барча ҳомиладор аёллар ОИВ, сифилис ва гепатит В юзаки антигенига (HBsAg) камида бир марта имкон қадар ҳомиладорликнинг эрта даврида текширилиши керак.</p>
	<p>https://www.who.int/publications/i/item/9789240090903</p>