


ЖИГАР ЦИРРОЗИ СКРИНИНГИ АЛГОРИТМИ



Жигар циррози билан оғриган беморларни кузатиш

Лаборатория ва инструментал текшириш усуллари	Вирус этиологияли ЖЦ
Қоннинг клиник таҳлили	Ҳар 3 ойда
Жигар функционал синамалари умумий билирубин ва унинг фракциялари, АЛТ, АСТ, ГГТП, ИФ, альбумин, ХНН, холестерин, креатинин	Ҳар 3 ойда
Альфа-фетопротеин	Ҳар 3 ойда
ПЦР усулида микдорий HBV DNA, HCV RNA	Ҳар 3 ойда
Билвосита жигар эластометрияси	Йилда 1 марта
Қорин бўшлиғи аъзолари УТТ	Ҳар 6 ойда
ЭФГДС	Қизилўнғач ва ошқозон варикоз томирларининг йўқлиги ва циррознинг компенсация босқичида ҳар 1-2 йилда; Қизилўнғач ва ошқозон варикоз томирлари мавжуд бўлганда ва (ёки) циррознинг декомпенсация босқичида ҳар 6-12 ойда

Беморларга керак бўлган ҳолларда қўшимча текширувлар (масалан, асцит бўлганда диуретик терапия учун қон электролитларини текшириш, гидроторакс учун кўкрак қафаси рентгенограммаси), ўтказилиши мумкин.

ЖЦ нинг ривожланиши ва декомпенсациясида текширувларнинг частотаси кўпроқ бўлиши мумкин (кўрсаткичларга кўра).