

СВГВ билан касалланган беморларни текшириш учун стандарт тестлар*

Лаборатор текширувлар
Қоннинг иммунофермен таҳлили – HBsAg ни аниқлаш
Реал вақт режимидаги полимераза занжирли реакция (ПЗР) - ДНК HBV ва унинг концентрациясини аниқлаш
Жигар функциясининг кўрсаткичлари (АЛТ, АСТ, билирубин, креатинин)
Қоннинг умумий таҳлили тромбоцитларни ҳисоблаган ҳолда
Инструментал текширувлар
Қорин бўшлиғи аъзоларининг УТТ
Жигарнинг билвосита эластометрияси (фибросканирлаш)

АЛТ — аланинаминотрансфераза, АСТ — аспартатаминотрансфераза,

**Зарур шароит ва моддий-техник жиҳозлар бўлмаган тақдирда, стандарт лаборатор ва инструментал текширув усуллари юқори даражадаги тиббиёт муассасасида ўтказилиши мумкин.*

СВГВ билан касалланган беморларни текшириш учун қўшимча тестлар

Ифодаланган ва оғир жигар фибрози (F3-F4) кузатилган СВГВ билан касалланган барча беморларга ГЦК ни эрта ташхислаш учун қон зардобидида **альфа-фетопроtein (АФП) даражасини** текшириш тавсия этилади (даллилар синфи/шкаласи 1 А).

Шарҳ: ЖЦ босқичида ГЦК ривожланиш хавфи йилига тахминан 1-5% ни ташкил қилади. ГЦК ташхиси қўйилгандан кейин биринчи йил ичида ўлим эҳтимоли 33% ни ташкил қилади.

Ноинвазив ташхисот маълумотлари ноаниқ бўлган СВГВ билан касалланган барча беморларга **жигарнинг пункцион биопсиясини** ўтказиш тавсия этилади (даллилар синфи/шкаласи 1 А)..

Шарҳ: Жигар биопсияси беморни даволашда ёки жигар касаллигини ва босқичларини баҳолашда ёрдам бериши мумкин бўлган ҳолларда, агар клиник белгилар ёки билвосита маълумотлар касалликнинг табиати, унинг фаоллиги ва жигар паренхимасидаги ўзгаришлар даражасини мутлақо аниқ баҳолашга имкон бермаганда тавсия этилади..

<https://www.who.int/publications/i/item/9789240090903>

ЭФГДС: эзофагогастродуоденоскопия

Ошқозон-ичак трактининг ўткир патологиясини аниқлаш учун қорин оғриғи ва "кофе қуйқалари" кўринишидаги қусиш кузатилган беморларга эзофагогастроуденоскопия (ЭФГДС) текшируви тавсия этилади.

Шарҳ: қизилўнгач, ошқозон ва ўн икки бармоқли ичак шиллиқ қаватининг шикастланиш хусусиятини аниқлаш учун амалга оширилади.

<https://diseases.medelement.com/disease/хронический-вирусный-гепатит-d-y-взрослых-кп-рф-2021/16920>

Жадвал. СВГВ билан касалланган беморларни текшириш учун қўшимча тестлар

Текширув тури	Кўрсатма (интерпретация)
Альфа-фетопротеин (АФП) миқдорини текшириш	Ифодаланган ва оғир жигар фибрози (F3-F4) кузатилган СВГВ билан касалланган барча беморлар. Қонда алфа-фетопротеин миқдорининг ошиши жигар циррози (ЖЦ) билан касалланган беморларда ГЦК ривожланиши учун хавф омилidir. Сурункали вирусли гепатитларда жигарнинг фиброз даражаси ва АФП миқдори ўртасида бевосита боғлиқлик аниқланган.
Жигарнинг пункцион биопсияси	Ноинвазив ташхисот ноаниқ маълумотлар олинганда, беморни кузатиш ва тактикани аниқлаш (ЖЦ ҳолатида) учун тери орқали жигар биопсиясини ўтказиш тавсия этилади.