

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$17+29\in C$$

$$4.56+4.56+4/5+4+5+\text{Polar}(4.56,4.56)+\pi+e+e++++\gamma+\infty$$

$$22/7\approx\pi$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

$$f(x) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{f^{(j)}(0)}{j!} x^j$$

$$x^2-9=x^2-3^2=(x-3)(x+3)$$

$$x^2-9=x^2-^2$$

$$ax^2+bx+c=0$$

$$ax^2+bx=-c$$

$$x^2+\frac{b}{a}x=\frac{-c}{a} \quad \text{Divide out leading coefficient.}$$

$$x^2+\frac{b}{a}x+\left(\frac{b}{2a}\right)^2=\frac{-c(4a)}{a(4a)}+\frac{b^2}{4a^2} \quad \text{Complete the square.}$$

$$\left(x+\frac{b}{2a}\right)\left(x+\frac{b}{2a}\right)=\frac{b^2-4ac}{4a^2} \quad \text{Discriminant revealed.}$$

$$\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2=\frac{b^2-4ac}{4a^2}$$

$$x+\frac{b}{2a}=\sqrt{\frac{b^2-4ac}{4a^2}}$$

$$x=\frac{-b}{2a}\pm\{C\}\sqrt{\frac{b^2-4ac}{4a^2}} \quad \text{There's the vertex formula.}$$

$$x=\frac{-b\pm\{C\}\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$