

### ● 第一阶段：构建“水相引爆液”（A 相 - 副锅）

1. 将 150mL 副烧杯放置在电子秤上，去皮归零，精确称取 **32.90g 纯净水**。
2. 电子秤去皮，称入 **0.10g 乙二胺四乙酸二钠 (EDTA-2Na)**。
3. 摇晃或用玻璃棒搅拌 10 秒，确认粉末完全溶解，水恢复绝对透明。将此杯放在左手边备用。

### ● 第二阶段：构建“抗氧活相床”与“免研磨秒溶”（B 相 - 主锅）

1. 将 250mL 主烧杯放置在电子秤上，去皮归零。
2. **先加垫底不挥发溶剂**：依次称入：**10.00g 二乙二醇乙醚**、**5.00g 1,2-丙二醇**、**0.40g 月桂氮卓酮**
3. **压轴加极易挥发的主溶剂**：去皮，迅速倒入 **50.00g 99% 乙醇**。
4. **硬核粉末直投（告别研磨）**：
  - 去皮，直接敲入 **0.10g 2,6-二叔丁基对甲酚 (BHT)** 颗粒/粉末。
  - 去皮，直接敲入 **0.30g 17 $\beta$ -雌二醇** 粉末。
5. **极速化解**：用干净的玻璃棒搅动。在纯粹的有机溶剂中，BHT 的坚硬颗粒会瞬间投降。

### ● 第三阶段：骨架悬浮与瞬间激发（见证奇迹的 10 秒）

1. **直接撒粉悬浮**：电子秤归零。将 **1.20g Sepimax Zen 粉末** 全部倒入这杯 250mL 的澄清药液中。
2. **物理打散**：用玻璃棒快速搅拌药液。此时 Zen 绝对不会结块，只会变成像牛奶一样的白浊悬浮液。
3. **双手协同操作**：左手端起备好的“A 相引爆液”，右手握住主烧杯里的玻璃棒。
4. **引爆体系**：右手在主烧杯里**快速画圈搅拌**，同时左手将含有 EDTA-2Na 的纯水**一次性、迅速地“唰”一下全部倒入**主烧杯的悬浊液中！
5. **流变学突变**：在纯水接触到悬浮粒子的瞬间，右手的玻璃棒会瞬间感受到巨大的阻力。整杯白浊液体会在 5-10 秒内瞬间膨胀，彻底锁死所有的水分和乙醇，化为一整块包含着双重防御装甲的、晶莹剔透的高弹凝胶！
6. **拔出玻璃棒**：成胶后立刻停止搅拌，拔出玻璃棒。

### ● 第四阶段：排泡与战略级封存

1. **静态排泡**：迅速盖上 90mm 玻璃皿（或保鲜膜）防止乙醇挥发。刚才的瞬间激发必然卷入了空气。将烧杯移至 20℃ 的避光处，**静置 2 到 4 个小时**。强大的应力会自动将内部气泡全部挤出。
2. **极限清盘**：熟化后，用医药级硅胶刮刀，贴着烧杯壁将凝胶完美转移进预先消毒的**真空按压瓶**中。
3. **排气锁定**：拧紧泵头，瓶底垫毛巾垂直在桌面上用力墩几下挤出底部空气，按压直到顺滑出胶。
4. **冷链入库**：留出一瓶近期使用的放在 25℃ 避光抽屉；将其余储备瓶直接打入 **4℃ 冰箱冷藏室**。