

F. 237,v.-239,r.

	Status praecipuarum stellarum fixarum anno 1211 a Dhū 'l-qarnayn.								
	Stellarum nomina.	Declinatio.	Plaga Caeli.	Altitudo meridiana.	Dimidium commorationis supra Terram.	Gradus cum quibus culminant.	Gradus cum quibus oriuntur.	Gradus cum quibus occidunt.	Ordines magnitudi- nis.
1	as-Simāk ar-rā- miḥ (α Bootis).	25° 39'	B	79° 39'	110° 25'	202° 48'	180° 31'	239° 7'	1
2	an-Nasr al-wāqi' (α Lyrae).	38 25	B	92 25	125 8	269 20	224 25	314 25	1
3	al-ʿAnz sive al-ʿAy- yūq (α Aurigae).	43 10	B	97 10	132 58	61 34	25 45	84 28	1
4	ad-Dabarān (α Tau- ri).	13 19	B	67 19	99 54	55 25	61 4	51 32	1
5	Qalb al-asad (α Leonis).	16 47	B	70 47	102 50	134 20	134 5	134 43	1
6	Dhanab al-asad (β Leonis).	19 36	B	73 36	105 1	160 52	153 5	175 48	1
7	Postrema cursus a- quae (α Piscis au- stralis).	33 45	A	20 15	63 50	325 25	350 15	312 6	1

1. Cum P (1) consentiunt δ et h . — A potius pro anno 1216 valeret; tamen pro anno 1211 error nonnisi + 4' est. Datis P et A bene dati B et C deducuntur.
2. In h cod. ضو 96° pro ضب = ضب 92°; in B cod. فكه = فكه 124° pro فكه 224°. — P differt - 3' ab eo qui cum δ et h conveniret. Optime A , cum qua et cum P conveniunt B et C .
3. In h cod. صر 67° pro صر 97°; in C cod. قز 107° pro قد 84°. — P , δ , h inter se convenientes. A differt + 2' vel + 3' a vera quantitate pro 1211.
4. In A cod. ل 35° pro نه 55°; in B ي 10' pro د 4'; in C ر 251° pro نا 51°.
5. Ex δ et h proveniret P 102° 40' loco codicis 102° 50'; sed hoc numero auctor usus est ad B et C supputandos. Tam δ quam A concordant cum catalogo ad annum 1211 reducto, quod sane perraro in his tabulis evenit.
6. P , δ , h satis inter se convenientes; A quantitate 3' nimis parva.
7. Plaga cod. borealis. — Magnus error in δ et h . In P cod. سج 303° pro سج 63°; in B cod. سزم 307° 40' pro سن يه 350° 15'. Quibus correctis, data A (quae - 2° differt ab anno 1211) bene B et C deducuntur.

(1) Adnotationes omnes ad hanc tabulam nituntur longissimis taediosissimisque supputationibus quibus Schiaparelli multos codicis errores, quantum fieri poterat, emendare conatus est. Multa incerta semper esse patet quoque ex animadversionibus generalibus sub fine huius tomi impressis. — Littera δ declinationem, h altitudinem, P arcum semidiurnum (dimidium commorationis supra Terram), A culminationem, B ortum, C occasum indico. — De magnitudinibus, praeter animadversiones generales, cfr. p. 183, adn. 1.

	Stellarum nomina.	Declinatio.	Plaga Caeli.	Altitudo meridiana.	Dimidium commorationis supra Terram.	Gradus cum quibus culminant.	Gradus cum quibus orientur.	Gradus cum quibus occidunt.	Ordines magnitudi- nis.
8	as-Simāk al-a'zal (α Virginis).	4° 49'	A	49° 11'	86° 31'	186° 43'	188° 0'	184° 20'	1
9	Initium caudae Sa- gittarii (ω Sagitta- rii).	30 0	A	24 0	65 12	274 30	280 40	268 43	1
10	Mankib al-ġawzā' (α Orionis).	5 30	B	59 30	94 0	76 25	89 45	64 50	1
11	Riġl al-ġawzā' (β Orionis).	10 20	A	43 40	82 21	69 56	94 0	49 40	1
12	Postrema stellarum Fluvii (θ Eridani).	43 45	A	10 15	45 48	39 3	98 20	353 43	1
13	ash-Shi'rā 'l-ya- māniyyah (α Ca- nis maioris).	15 51	A	38 9	78 5	89 22	115 33	63 18	1
14	ash-Shi'rā 'sh- -sha'miyyah (α Canis minoris).	6 25	B	60 25	94 41	99 25	110 53	86 46	1
15	Suhayl al-yamānī (Canopus).	51 25	A	2 35	24 26	89 30	159 20	19 44	1
16	Riġl Qintāwuros « Pes Centauri » (β Columbae).	37 3	A	16 57	56 44	78 50	123 36	36 39	2

8. Plaga cod. borealis. In *h* cod. ما 41' pro لا = يا 11'; in *P* cod. 106° pro 86°; in *B* cod. قعج 173° pro قعج = قعج 188°; in *C* cod. قعد 174° pro قعد = قعد 184°. — *P* et δ bene inter se convenientes; a *P* et *A* optime *B* et *C* proveniunt.
9. Plaga cod. borealis. E catalogo suo fixarum al-Battānī long. 274° 0', lat. 6° 30' sumpsit (cfr. p. 163, nr. 16), cum quibus omnia optime congruunt.
10. In *B* cod. قط 109° pro فط 89°. *P*, *h*, δ optime inter se conveniunt; item reliqua.
11. Plaga cod. borealis. In *P* cod. قب 102° pro فب 82°; in *C* cod. مد 44° 0' pro مط 49° 40'. — *P* satis convenit cum δ et *h*, sed hae et *A* discrepant a catalogo ad annum 1211 reducto. Tamen numeris datis exacte *B* et *C* deducuntur.
12. De hac stella cfr. p. 170, nr. 2. — Plaga cod. borealis. A catalogo fixarum deducerentur δ 43° 32', *P* 46° 21', *A* 38° 57'. Sed a codicis *P* et *A* exacte deducuntur *B* et *C*. Cum *P* cod. conveniret δ 43° 49' pro 43° 45'; error in scriptura maghrebina facillimus.
13. Plaga cod. borealis. In *P* cod. ن 50' pro ه 5'; in *A* قط 109° pro فط 89°; in *C* سنج 353° pro صج 63° (in archetypo, iuxta scripturam orientalem, سج 63°). Reliqua optime.
14. In *C* cod. 106° pro 86°.
15. In *A* cod. قط 109° pro فط 89°; in *B* cod. قيط 119° pro قنط 159°; in *C* نط 59° pro يط 19°. Quibus correctis, *A*, *B*, *C* inter se conveniunt. Cum *P* et cum anno 1211 satis bene consentiunt δ et *h*.
16. Stellae nomen falsum; non enim est α Centauri, sed β Columbae (nr. 9 constellationis Canis maioris in catalogo Albateniano, p. 172). Vero suo nomine rursus indicatur infra nr. 60; elementa autem ad

	Stellarum nomina.	Declinatio.	Plaga Caeli.	Altitudo meridiana.	Dimidium commorationis supra Terram.	Gradus cum quibus culminant.	Gradus cum quibus oriuntur.	Gradus cum quibus occidunt.	Ordines magnitudi- nis.
17	Latus Ursae minoris (β Ursae minoris).	91° 17'	B	145° 17'	Hae octo stellae supra Terram semper apparent; nec ortum nec occasum habent, et in suis revolutio-	130° 0'	nibus lineam medii Caeli bis attingunt, altera vice su- pra polum cum gradibus in hac tabula descriptis, al- tera vice sub polo.		2
18	Eius latus etiam (γ Ursae minoris).	91 15	B	145 15		142 24			2
19	Dorsus Ursae maio- ris (α Ursae maio- ris).	66 20	B	120 20		142 0			2
20	Tenuior pars ventris eius (β Ursae ma- ioris).	60 30	B	114 30		143 10			2
21	Eius femur (γ Ur- sae maioris).	57 45	B	111 45		178 35			2
22	Eius cauda (ϵ Ursae maioris).	60 27	B	114 26		168 10			2
23	Eius cauda etiam (ζ Ursae maioris).	59 40	B	113 40		187 20			2
24	Eius cauda etiam (η Ursae maioris).	54 15	B	108 15		196 0			2
25	Lucida Coronae bo- realis (α Coronae bor.).	31 46	B	85 46	134° 18'	224 11	192° 32'	267° 6'	2
26	Cauda Cygni (α Cy- gni).	42 21	B	96 21	131 27	298 54	245 7	345 31	2
27	Rostrum Cygni (β Cy- gni).	26 19	B	80 19	111 2	279 4	244 24	311 4	3

α Centauri pertinentes nescio quo modo translata sint infra, sub nr. 70. — In *C* pro $\text{ط} 19'$ cod. legendum $\text{ط} 39'$; magnitudo cod. 1, quae cum falso nomine Pede Centauri convenit. *P*, δ et *h* inter se congruunt; *A* cum catalogo ad annum 1211 reducto; *B* et *C* cum *A*.

17-24. Quoniam his circumpolaribus stellis *P*, *B*, *C* desunt, impossibile fit numeros ex ipsorum inter se collatione emendare. Si cum catalogo fixarum comparantur, apparent hic illic gravissimae mendae, quarum naturam causamque investigare non possumus. Reliqui numeri, rudi quodam modo, inter se congruunt; nisi minuta essent corrupta, interdum *A* anno 1211 conveniret. Itaque codicis numeros intactos servavi, inclinatis seu Italicis notis imprimens qui gravioribus scateant mendis. In nr. 22 minuta δ et *h* aequalia esse deberent; discrepantia ab amanuense provenit ($\text{ك} 27$, $\text{كو} 26$).

25. Multum δ et *h* differunt ab eo quod praeberet *P*, qui manifeste falsus est, et 116° 44' circiter complecti debebat. Nam, hac quantitate, et data *A* (cod. $\text{ط} 51'$ pro $\text{ط} 11'$) deducuntur numeri satis cum *B* et *C* congruentes; parvae tantum differentiae exstant quas non possumus explicare. In *h* cod. $\text{ق} 105^\circ$ pro $\text{ق} 85^\circ$.

26. In *C* cod. $\text{سمد} 344^\circ$ pro $\text{سمد} 345^\circ$. Cum *P* congruunt δ et *h*; *A* est 10' minor quam quae a catalogo fixarum deducitur pro 1211, sed numero Albateniano exacte reperiuntur *B* et *C*.

27. Magnitudo in cod. $\text{ب} 2$ pro $\text{ج} 3$. *A* cum catalogo ad annum 1211 reducto convenit; tunc proxime deducuntur *B* (cuius vera quantitas 244° 29') et *C* (ubi 4' error pro 35').

	Stellarum nomina.	Declinatio.	Plaga Caeli.	Altitudo meridiana.	Dimidium commorationis supra Terram.	Gradus cum quibus culminant.	Gradus cum quibus oriuntur.	Gradus cum quibus occidunt.	Ordines magnitudinis.
28	Latus Persei (α Persei).	44° 9'	B	98° 9'	134° 52'	34° 30'	340° 0'	63° 0'	2
29	Caput daemonis (Medusae) in manu Persei (β Persei).	36 2	B	90 2	121 55	32 12	356 53	50 43	2
30	Capulus ensis (χ Persei).	50 39	B	104 39	152 26	17 40	295 30	64 20	neb.
31	Humerus Aurigae (β Aurigae).	42 17	B	96 17	131 20	69 46	40 28	90 53	2
32	an-Nasr at-tā'ir « aquila volans » (α Aquilae).	6 22	B	60 22	94 44	282 18	261 12	301 10	2
33	Caput Andromedae (o Andromedae).	37 14	B	91 14	122 27	331 22	281 54	4 52	3
34	Ala Pegasi (α Pegasi).	10 16	B	64 16	97 35	330 45	309 0	343 48	2
35	Humerus Pegasi (β Pegasi).	22 31	B	76 31	107 32	330 24	296 46	351 44	2
36	Dorsus Pegasi (γ Pegasi).	9 7	B	63 7	96 42	348 18	332 48	356 43	2
37	Initium colli Serpentis (β Serpentis).	20 5	B	74 5	105 24	225 27	202 42	257 20	3

28. In *C* amanuensis maghrebinus in exemplari scriptura orientali seu nashī exarato invenerat شج 303° pro سج 63°; posuit igitur, scriptura maghrebina, سج 303° loco سج 63°. Cum *P* congruunt δ et *h*; *A* convenit potius anno 1223 quam 1211, sed ab ea deducuntur bene *B* et *C*.
29. In *B* cod. سنح 353° 3' pro سنح 356° 53'. *P*, δ , *h* bene inter se congruentes. *A* (ubi minuta 12' pro 6') anno 1216 conveniret; sed ei *B* et *C* bene respondent.
30. In *P* cod. قيب 112° pro قنب 152°; in *B* رصه 265° pro رصه 295°; in magnitudine 2 pro « nebula ». Proxime δ et *h* cum *P* congruunt; *A* (17° 40' pro 17° 17') conveniret anno 1237, sed ei *B* et *C* bene respondent.
31. *P*, *h*, δ bene congruentes; *A* excedit 1° 38' quantitatem ad annum 1211 pertinentem, sed exacte gignit *B* et *C* (ubi 53' pro 51' apparent).
32. δ et *h* differunt + 6' ab iis quas *P* reposcit, et – 4' ab iis quae catalogo fixarum deducuntur pro 1211. *A* e contra cum 1211 et *B*, *C*, optime congruit.
33. Nomen falsum, de quo cfr. p. 154, nr. 3. Magnitudo in cod. ب 2 pro ج 3. In *h* cod. ضد 94° pro ضا 91°. Cum *P* conveniret δ 36° 26'. Optime *A* pro anno 1211, et *B*, *C*.
34. In *B* cod. صط 69° pro سط 309°; in *C* cod. م 40' pro مح 48'. *A* *P* differt δ 5' minutis. *A* veritatem 24' excedit, et anno 1240 respondet; sed a *P* et *A* codicis proxime *B* et *C* deducuntur.
35. In *C* cod. سند 354° 4' pro سنا 351° 44'. Reliqua optime.
36. In *A* cod. لح 38' pro مح = سج 18'. *A* *P* discrepat δ 3'. *A* convenit anno 1218, sed cum *B* et *C* congruit.
37. In *P* cod. مو 46' pro كد 24', quae *h* et δ reposcunt. Magnitudo cod. ب 2 pro ج 3. *A* congruit cum anno 1211; *B* et *C* cum *A* et *P* correcto.

	Stellarum nomina.	Declinatio.	Plaga Caeli.	Altitudo meridiana.	Dimidium commorationis supra Terram.	Gradius cum quibus culminant.	Gradius cum quibus oriuntur.	Gradius cum quibus occidunt.	Ordines magnitudinis.
38	Caput Afollon («'A- πόλλων» i. e. Ge- mini anterioris, α Gemin.).	32° 49'	B	106° 49'	117° 57'	95° 10'	86° 28'	104° 32'	2
39	Caput Īraqīās («'H- ρακλής» i. e. Ge- mini posterioris, β Gemin.).	29 32	B	103 32	114 18	98 33	93 12	104 35	2
40	Medium Pleiadum, nebulosa (η Tauri).	19 18	B	73 18	104 45	43 13	39 22	44 17	4
41	Pectus Cancrī, ne- bulosa (Praesepe).	22 10	B	76 10	107 15	111 54	111 36	112 16	neb.
42	Dorsus Leonis (δ Leo- nis).	25 2	B	79 2	109 51	151 0	141 34	168 44	2
43	Caput Orionis (α Andromedae).	19 38	B	73 38	105 2	347 15	319 30	2 44	3
44	Mulier (Cassiopea) quae vocatur al- -kaff al-khaḍīb « manus tincta » (α Ophiuchi).	14 18	B	68 18	100 38	251 56	228 58	278 34	3

38. Nomen *Afollon* in catalogo fixarum non memoratur. In *P* cod. یر 17' pro یر 57'; in *B* cod. 106° pro 86°. Omnia optime; *A* anno 1211 convenit.

39. Nomen *Īraqīās* in catalogo non memoratur. In *C* cod. ل 30' pro ل 35'. Omnia optime pro anno 1211.

40. In δ et *h* cod. ح 38' pro ح = ح 18'; in *B* cod. ط 59' pro ط 39'; in *C* cod. قد 144° 30' pro مد 44° 17'; magnitudo cod. 3 ج 3 pro د 4. Pro anno 1211 debebant esse δ 20° 18',8, *P* 105° 36', *A* 42° 10',7; sed e datis numeris bene *B* et *C* proveniunt.

41. In *P* cod. ه 45' pro ه = ه 15'; in magnitudine cod. 3 pro « nebulosa ». Omnia optime inter se congruentia; *A* pro anno 1211. Sed iuxta catalogum fixarum δ 22° 27',8 esse debebat.

42. In *A* cod. قبا 111° pro قبا 151'; in *B* cod. 30' pro 34'; in *C* cod. 40' pro 44'. Omnia optime; *A* pro anno 1211. Sed iuxta catalogum δ 25° 50',7 debebat esse.

43. Nomen falsum; caput Orionis infra, nr. 54, occurrit. Stella cui elementa hic exposita satis bene conveniunt est Caput Andromedae, prima stellarum Pegasi in catalogo p. 153, et falso supra (nr. 33) indicata. Calculis, iuxta catalogi elementa, pro anno 1211 ductis, pauca tantum minuta differentiae in *A*, sed 3° 35' in δ colliguntur. At δ codicis confirmatur arcu semidiurno *P*; a quo et ab *A* codicis optime *B* et *C* proveniunt. Elementa igitur, inter se congruentia, pertinent ad locum Caeli circiter 3° $\frac{1}{2}$ ab austro α *Andromedae*, in quo nulla stella priorum magnitudinum conspicitur. In *C* cod. رب 202° pro ب 2°.

44. Nomen falsum, nam est prima stellarum Ophiuchi p. 154. Quantitate + 3' discrepant δ et *h* a dato *P* a quo et ab *A* (anno 1211 convenienti) bene *B* et *C* proveniunt. In *B* cod. 50' pro 58'.

	Stellarum nomina.	Declinatio.	Plaga Caeli.	Altitudo meridiana.	Dimidium commorationis supra Terram.	Gradus cum quibus culminant.	Gradus cum quibus orientur.	Gradus cum quibus occidunt.	Ordines magnitudi- nis.
45	Lanx australis Li- brae (α Librae).	8° 42'	A	45° 18'	83° 38'	210° 14'	208° 25'	213° 27'	2
46	Lanx borealis Librae (β Librae).	3 43	A	50 17	87 18	216 35	210 32	227 0	2
47	Cor Scorpionis (α Scorpii).	22 10	A	31 50	72 40	229 15	232 27	224 5	2
48	Malleolus Sagittarii (β Sagittarii).	46 34	A	7 26	39 52	268 28	300 52	235 18	3
49	Quae sequitur acu- leum Scorpionis, nebulosa.	35 23	A	18 37	58 56	250 40	262 27	235 0	neb.
50	Oculus Sagittarii, ne- bulosa (v^2 Sagitta- rii).	22 46	A	31 14	72 16	266 39	266 0	267 20	3
51	Cuspis sagittae Sagit- tarii (γ Sagittarii).	29 8	A	24 52	66 8	255 17	260 31	248 52	3
52	Coma Leonis, crines plexi (Prima in Co- ma Berenices).	36 10	B	90 10	121 58	170 43	146 40	215 50	obsc.

45. 45 (1). Omnia optime; A pro 1211. In *P* cod. $\frac{1}{2}$ 103° pro $\frac{1}{2}$ 83°; in *B* $\frac{1}{2}$ 35' pro $\frac{1}{2}$ 25'.

46. In δ cod. $\frac{1}{2}$ 8° 47' pro $\frac{1}{2}$ 3° 43'; in *h* $\frac{1}{2}$ 37' pro $\frac{1}{2}$ 17'; in *P* $\frac{1}{2}$ 107° pro $\frac{1}{2}$ 87°. Omnia satis bene; A pro 1211.

47. In elementis huius stellae supputandis, ut in nr. 43, auctor situ falso usus est, longitudine perperam 230° 0' pro 233° 50' sumpta. Quantitate – 7',8 discrepat δ ab eo quod *P* praeberet; a *P* et *A* (anno 1211 satis convenienti) optime *B* et *C* deducuntur. In *A* cod. $\frac{1}{2}$ 55' pro $\frac{1}{2}$ 15'; in *C* $\frac{1}{2}$ 15' pro $\frac{1}{2}$ 5'.

48. Una e paucis stellis in quibus omnia, etiam δ et *h*, ad amussim inter se et cum catalogo ad 1211 reducto congruunt.

49. In *P* cod. $\frac{1}{2}$ 18° pro $\frac{1}{2}$ 58°; in *h* $\frac{1}{2}$ 13° pro $\frac{1}{2}$ 18°. Omnia optime; A pro 1211.

50. In *h* cod. $\frac{1}{2}$ 54' pro $\frac{1}{2}$ 14'; in *B* cod. $\frac{1}{2}$ 267° pro $\frac{1}{2}$ 266°. Omnia optime; A pro 1211.

51. In δ cod. $\frac{1}{2}$ 0' pro $\frac{1}{2}$ 8'; in *h* $\frac{1}{2}$ 25° 0' pro $\frac{1}{2}$ 24° 52'; in *A* $\frac{1}{2}$ 47' pro $\frac{1}{2}$ 17'. Omnia optime, etiam δ et *h*, non solum inter se sed etiam cum catalogo pro 1211 reducto.

52. In *P* cod. $\frac{1}{2}$ 18' pro $\frac{1}{2}$ 58'; in *B* et *C* minuta rotunda (40' et 50' pro 41' et 53'); in *C* cod. $\frac{1}{2}$ 255° pro $\frac{1}{2}$ 215°. Ab eo quod arcui semidiurno conveniret discrepant δ et *h* 7'; A est 8' minor quam quae anno 1211 responderet. Datis *A* et *P* bene *B* et *C* deducuntur.

53. Fortasse vox العقرب « Scorpio » corrupta ex الضفيرة « Crines plexi » i. e. Coma Berenices. In δ minuta sunt rotunda facta, 40' nempe pro 44'; unde *h* quoque 40' pro 44'. In *A* cod. $\frac{1}{2}$ 54' pro $\frac{1}{2}$ 14'; quibus correctis, optime respondet *B*, *C* et anno 1211.

(1) Huius stellae, a qua fol. 238,v. codicis incipit, et sequentium non indicatur in codice magnitudo; omnesque, iuxta titulum folii, tertiae magnitudinis dicuntur. Veras quantitates restitui ad fidem catalogi pro anno 1191.

	Stellarum nomina.	Declinatio.	Plaga Caeli.	Altitudo meridiana.	Dimidium commorationis supra Terram.	Gradus cum quibus culminant.	Gradus cum quibus oriuntur.	Gradus cum quibus occidunt.	Ordines magnitudi- nis.
53	Una duarum obscurarum quae sunt in <i>Scorpione</i> (Secunda Comae Berenices).	31° 40'	B	85° 40'	116° 41'	167° 14'	148° 22'	203° 29'	obsc.
54	Caput Orionis (λ Orionis).	5 16	B	59 16	93 46	71 0	84 30	59 45	neb.
55	Humerus sinister Orionis (γ Orionis).	3 47	B	57 47	92 44	68 22	82 50	56 42	2
56	Prima ex iis quae sunt in eius zona (δ Orionis).	2 32	A	51 28	88 11	70 33	89 18	54 54	2
57	Media earum (ϵ Orionis).	2 54	A	51 6	87 55	72 20	91 40	55 53	2
58	Tertia earum (ζ Orionis).	3 35	A	50 25	87 24	73 10	92 33	56 33	2
59	Lucida quae sequitur Canem (α Columbae).	35 25	A	18 35	58 55	76 38	120 0	36 34	2
60	Secunda ab ea (β Columbae).	37 3	A	16 57	56 44	78 50	123 36	36 39	2
61	[In] rotunditate Navis (ϵ Navis).	38 30	A	15 30	54 58	124 55	165 23	75 43	2
62	[In] sectione eius tabulatus (? Navis).	36 19	A	17 41	57 40	128 30	166 10	81 10	2

54. Quantitate + 6' discrepant δ et h ab iis quae cum P convenirent; in h cod. ن 56' pro يو 16'. Iuxta catalogum fixarum deberet A esse 70° 53',6; auctor rotunde 71° posuit, a quibus B bene, C proxime deducitur. In B cod. ه 85° pro د 84°; in C vera quantitas 59° 51'.

55. P , δ , h bene inter se congruentia; optime A cum anno 1211, B et C.

56. In P cod. ل 51' pro ي 11'. — P , δ , h inter se convenientes; A praecise anno 1211, B et C respondens.

57. In P cod. ق 107° pro ف 87°; P , δ , h congruentes. At in reliquis supputationibus auctor P 87° 30' posuit, nam hac quantitate et data A (optime anno 1211 convenienti) praecise B et C deducuntur.

58. In P cod. ق 107° pro ف 87°; in C aliquis minuta rotunda fecit, qua re cod. 30' pro 33'. P cum δ et h optime; item A cum anno 1211, B et C.

59. Cod. in δ ك 20' pro ك 25'; in h ح 58° pro ح 18°. Bene δ et h cum P . A praecise pro anno 1211: sed miro modo auctor B et C deduxit A 76° 45' sumendo, quod pro anno 1223 valeret.

60. Repetitio nr. 16, ubi nomen falsum. In h cod. ن 56° pro يو 16°.

61. In h cod. و 55° pro ه 15°. Deest in catalogo ob folium deperditum quo stellae Navis continebantur; apud Ptolemaeum est 31^a Navis: ὁ ὑποκάτω τῶν γ τῆς ἐπομένης ἀσπιδίσκης « quae est sub tribus « sequentis scutuli ». Iuxta Bailly ϵ Navis seu Argûs (Lacaille 830), iuxta Schjellerup λ Navis. — A P debebant δ 38° 18',8, h 15° 41',2 deduci; datis P et A exacte B et C respondent.

62. In h cod. ز 57° pro ز 17°. Apud Ptolemaeum 32^a Navis: ὁ ἐπὶ τῆς ἀποτομῆς τοῦ καταστρώματος; iuxta Bailly Lacaille 864, iuxta Schjellerup ψ Navis. — A P debebant exactius δ 36° 21',5, h 17° 38',5 deduci; vel, datis δ et h , P 57° 43',4. Inter se P , A, B, C optime congruunt.

	Stellarum nomina.	Declinatio.	Plaga Caeli.	Altitudo meridiana.	Dimidium commorationis supra Terram.		Gradius cum quibus culminant.	Gradius cum quibus orientur.	Gradius cum quibus occident.	Ordines magnitudi- nis.
63	Quae est sub tabu- latu (ζ Navis).	37° 45'	A	59° 55'	52°	14'	118° 20'	162° 0'	67° 40'	2
64	Quae est sub eius pectore (? Navis).	50 42	A	3 18	27	25	112 30	177 24	42 27	2
65	Praecedens e tribus eius (? Navis).	52 8	A	1 52	20	56	122 43	191 40	45 53	2
66	Lucida Hydrae (α Hy- drae).	2 55	A	51 5	87	53	125 58	139 20	107 20	2
67	Venter equi Centau- ri (? Centauri).	48 45	A	5 15	35	10	192 30	239 0	118 10	2
68	Medium poplitis equi (ν Centauri).	53 3	A	0 57	30	0	169 52	221 35	92 0	2
69	Ungula huius equi (ζ Centauri).	56 37	A	Haec linea est semper occulta sub horizonte australi, sine ortu, qua re			165 7	neque commoratio- nem habet supra Terram neque cul- minationem.		2
70	Pes huius equi (α Cen- tauri).	44 38	A	9 22	44	10	177 30	215 46	113 20	1
71	Genu huius equi (γ Centauri).	53 57	A	0 3	2	0	191 53	261 30	85 3	2

63. In *P* cod. 54' pro 14'; in *C* 307° pro 67°. Apud Ptolemaeum 35^a Navis: ὑπὸ τὸ κατάστρομα λαμπρός « lucida sub tabulatu »; Bailly ζ Navis (Lac. 737), Schjellerup γ Navis. — *P*, *A*, *B*, *C* optime congruunt; sed δ et *h* falsae, nam ex *P* oriuntur δ 40° 8', *h* 13° 52'.
64. In δ cod. 52' pro 42'; in *h* 8' pro 18'; in *P* 0' pro 25'. His correctis, omnia bene congruunt. — Apud Ptol. 36^a Navis: ἐπὶ τῆς κάτω τρόπεως λαμπρός « lucida infra, in carina »; Bailly η Navis (Lac. 721), Schjellerup χ Navis.
65. In δ cod. 2' pro 8'; in *A* 132° pro 122°; quibus correctis omnia optime congruunt. — Apud Ptol. 37^a Navis: τῶν ἐπομένων τούτῳ γ ὁ προηγούμενος « anterior trium hanc sequentium »; Bailly q Navis (Lac. 786), Schjellerup δ Navis.
66. In *P* cod. 13' pro 53'. Omnia optime. In catalogo, ob folium deperditum, deest ut nr. 61-65.
67. Nullo modo elementa huius stellae Schiaparelli emendare potuit. Fortasse δ et *A* potius 23^a stellarum Centauri in catalogo (p. 174) indicarent; sed reliqui numeri non concordant.
68. In Catalogo est 20^a stella Centauri: « in poplite dextero prope pedem » (p. 174). In δ cod. 13° pro 53°. Optime congruunt inter se *h* et δ ; item optime inter se *P*, *A*, *B*, *C*; sed inter δ (et *h*) et *P* magna habetur discrepantia. Error ex eo provenit quod auctor, in *B* et *C* supputandis, arcum diurnum pro arcu semidiurno sumpsit; i. e. posuit *P* 30° 0' (ut cod. habet) loco 15° 0'. *A* anno 1211 non convenit. — Iuxta Bailly ν Centauri (Lac. 1070); Schjellerup γ Crucis.
69. In δ cod. 16° pro 56° (iuxta catalogum 57° 17' pro 1211). *A* est 4' maior quam quae anno 1211 conveniret. Iuxta Bailly ζ Centauri (Lac. 1082); Schjellerup α Crucis. In urbe ar-Raqqah non aspicitur. Magnitudo ut *S.* et *Pts.*; *Almagesta* graeca 4.
70. In *P* cod. 53' pro 10'; error ab auctore provenit, qui, in 90° — *m* = *P* scribendo, legit *m* 45° 7' loco 45° 50' (ζ pro ν). Sed omnia optime congruunt cum *P* 44° 10', quem recepi. *A* est 6',6 maior quam quae anno 1211 conveniret.
71. In *B* cod. 0' pro 30'; in *C* 125° pro 85°. Quantitate — 2' discrepat δ ab ea quam *P* praeberet. Datis *P* et *A* (quae tamen + 1° 20' ab epocha 1211 differt) deducuntur satis bene *B* et *C* (ve-

	Stellarum nomina.	Declinatio.	Plaga Caeli.	Altitudo meridiana.	Dimidium commorationis supra Terram.	Gradus cum quibus culminant.	Gradus cum quibus oriuntur.	Gradus cum quibus occidunt.	Ordines magnitudi- nis.
72	Lucida e stellis Co- ronae australis (θ Cor. Austr.).	40° 44'	A	13° 16'	51° 14'	268° 27'	288° 10'	248° 11'	4
73	Initium cursus a- quae ab ansa am- phorae (? Aquarii).	16 21	A	37 39	77 39	323 0	325 45	321 30	
74	Medium cursus a- quae ab ansa (? A- quarii).	10 7	A	43 53	82 33	325 46	322 45	327 30	4
75	Finis cursus aquae ab ansa (χ Aqua- rii).	12 25	A	41 35	80 48	332 26	333 0	330 33	4

rae quantitates 261° 26', 6, 84° 58', 1). — Iuxta Bailly γ Centauri (Lac. 1185); Schjellerup β Centauri.

72. In *h* cod. لو 36' pro يو = يو 16'; in *P* يا ند 11° 54' pro تا يد 51° 14'; in *C* د 4' pro يا 11'. Quibus correctis, omnia optime congruunt; sed *A* discrepat + 13', 1 ab epocha 1211, qua re potius ad 1223 pertinet.

73. Omnia satis bene inter se congruentia: sed ad locum constellationis Aquarii pertinent (long. 322° 12' pro 1211, vel 321° 54' pro anno 1191 catalogi; lat. austr. 2° 17'), in quo nullum sidus catalogus Albatenianus indicat.

74. In *P* cod. قيا فج 111° 53' pro فج ل 82° 33'; in *C* سلز 337° pro سكر 327°. Optime δ et *h* cum *P*; exacte *A* pro anno 1211; satis proxime *B* et *C*. — Est tertiadecima stella Aquarii in catalogo, p. 165.

75. In *P* cod. قب 102° pro ف 80°; in *B* سلب ك 332° 20' pro لا سلب 333° 0'. Omnia optime; *A* praecise pro anno 1211. — Est septimadecima stellarum Aquarii, p. 165.