

Fol. 226,v.-237,r. = Textus, t. III, p. 245-274.

**Situs et magnitudines stellarum fixarum
anno 1191 a Dhū 'l-qarnayn.**

I.

Constellationes quae sunt a septentrionibus zodiaci.

	Stellarum descriptio.	Longitudo.		Latitudo.		Plaga Caeli.	Magnitudo.	
	Ursa minor (<i>ad-dubb al-aṣghar</i>).							
1	Stella quae est in extremitate caudae Ursae minoris.	71°	20′	66°	0′	bor.	3	α
2	Stella quae est in radice caudae huius Ursae.	87	10	74	20	b	4	ε
3	Australior in sequenti latere quadranguli.	118	20	72	50	b	2	β
4	Borealior in hoc sequenti latere quadranguli.	127	20	74	50	b	2	γ
	Ursa maior (<i>ad-dubb al-akbar</i>).							
1	Stella quae est in anteriore parte rictus Ursae maioris.	96	30	39	50	b	4	ο
2	Quae est in sinistro huius Ursae genu.	111	50	35	0	b	3	θ
3	Septentrionalis quae est in extremitate pedis anterioris sinistri.	106	40	29	20	b	3	ι
4	Australis in hoc pede.	107	30	28	20	b	3	κ
5	Stella quae est in dorso Ursae in quadrangulo.	118	50	49	0	b	2	α

Ursa minor (1):

1. Cod. « in extremitate genus » (ذنب pro ركة).
2. Long. cod. 101° 20' pro 87° 10' (ut Pt., S.) vel 81° 40' (ut codex quidam Ptolemaei).
3. Cod. « in secundo » الثاني pro « in sequenti » التالي; Pt. ἐν τῇ ἐπομένῃ πλευρᾷ, ut S. — Long. cod. 153° pro 118°; minuta congruunt cum L. et S. (sed H. et B. 30'). — Minuta lat. cod. 10' pro 50'.
4. Cod. « in secundo » ut nr. 3. — Long. cod. 157° pro 127°.

Ursa maior:

1. Long. cod. 176° pro 96°. — Minuta lat. cod. 22' pro 50'.

(1) Conferantur animadversiones generales post finem tabularum omnium.

	Stellarum descriptio.	Longitudo.		Latitudo.		Plaga Caeli.	Magnitudo.	
6	Quae est in tenuiore parte ventris.	123°	20'	44°	30'	b	2	β
7	Quae est in radice caudae.	134	20	51	0	b	3	δ
8	Quae est in radice poplitis sinistri posterioris.	134	10	46	30	b	2	γ
9	Anterior quae est in extremitate pedis sinistri posterioris.	123	50	29	20	b	3	λ
10	Quae eam sequitur.	125	20	28	15	b	3	μ
11	Borealis ex iis quae sunt in extremitate pedis dexteri posterioris.	141	0	25	50	b	3	ν
12	Australis ex iis.	141	30	25	0	b	3	ξ
13	Anterior e tribus quae sunt in cauda.	143	20	53	30	b	2	ε
14	Media e tribus his.	149	10	55	40	b	2	ζ
15	Tertia quae est in extremitate caudae.	161	0	54	0	b	2	η
Et ex eius [stellis] quae in figura Ursae non sunt:								
16	Quae est sub cauda a parte australi.	159	0	39	45	b	3	12 Canum
17	Quae est inter pedem anteriorem Ursae et caput Leonis.	116	10	17	15	b	4	40 Lync.
18	Obscura quae reliquas tres obscuras sequitur.	117	20	20	0	b	obscura	10 Leo. M.
19	Obscura hanc praecedens.	113	20	22	50	b	obscura	
20	Obscura ante hanc.	112	20	20	20	b	obscura	
21	Quae est ante hanc, inter eam et Geminos.	101	10	22	15	b	obscura	31 Lync.

6. Gradus long. cod. قلیج 133° pro فکیج 123°; minuta ut L. et S. (sed B. et H. 40'). — Minuta lat. cod. ی 10' pro ل 30'.

7. Min. long. cod. ۰ 0'; L. et S. 20'; B. et H. 40'.

8. Long. cod. ل قلیج 133° 30' pro ی قلد 134° 10'.

9. Long. cod. ل 30' pro ن 50'. — Lat. cod. مط 49° pro كط 29°.

10. Lat. cod. نه 55' pro یه 15'.

11. Cod. « australis »! — Lat. cod. مه 45° pro كه 25°.

12. Lat. cod. ع 28° pro كه 25°.

13. Long. cod. قعیج 173° pro قعیج 143°.

16. Lat. cod. نط 59° pro لط 39°.

17. Lat. cod. ز 57° pro یز 17°.

19. Lat. cod. كه 24° pro كب 22°; minuta ut B. et H., sed L. et S. 45'. — Bailly: « I cannot find any « star that corresponds with the position given by Ptolemy ».

20. Lat. discrepans a B., H., S. (qui 23° 0' habent) et a L. (23° 15'). Error fortasse iam in Graeco aliquo exemplari (κγ' 20° $\frac{1}{3}$ pro κγ 23°). — Bailly: « I cannot find any star that corresponds with the « position given by Ptolemy ».

Stellarum descriptio.	Longitudo.		Latitudo.		Plaga Caeli.	Magnitudo.	
Draco (<i>tinnīn</i>).							
Stella quae est in extremitate linguae Draconis.	217°	50′	76°	30′	b	4	μ
Stella quae est supra caput.	250	50	75	30	b	3	γ
Stella quae est supra oculum Draconis.	234	20	75	40	b	3	β
Stella ex triangulo quae est a parte occidentali.	169	30	84	50	b	3	ζ
Borealis e duabus quae versus occidentem sequuntur.	171	10	78	0	b	3	η
E duabus illis quae sequitur praecedentem longinquam.	142	20	65	30	b	3	α
Quae hanc stellam sequitur.	120	20	61	15	b	3	κ
Stella quae est in extremitate caudae Draconis.	114	20	56	15	b	3	λ
Cephaeus (<i>Qifāwus</i> , sive <i>al-multahib</i> « exardescens »).							
Tangens in humero dextero.	357	50	69	0	b	3	α
Tangens in cubito dextero.	350	30	72	0	b	4	η
Stella quae est in brachio sinistro.	18	40	62	30	b	4 magna	ι
Australis e tribus quae sunt in tiara.	357	30	60	15	b	5	ε

Draco:

- Long. cod. ل 30' pro ن 50'.
- Long. cod. رتا 251° 10' pro رن 250° 50'. — Lat. cod. ى 10' pro ل 30'.
- Lat. cod. عد 74° pro عه 75°.
- Lat. cod. فه 85° pro فد 84°.
- Lat. cod. مه 45' pro هه = يه 15'; B., H. et S. 15'; L. 35' (له).
- Long. cod. م 40' pro ل 20'.

Cephaeus:

- Lat. cod. به 15' pro 0'. — Magnitudo cod. « 4 magna »; sed procul dubio « magna » pertinet ad stellam sequentem, ut Pts., L., S. et Arg. habent.
- Long. cod. صح 68° 13' pro م 18° 40'. — Magnitudo cod. 4, sed cfr. adn. praecedentem.
- Cod. « media » المتوسط; si hoc verum esset, long. 358° 30', lat. 61° 15' haberi deberent. Cfr. nr. 10 Bootis. — Long. cod. ح 13' pro ل 30'; magnitudo cod. د 4 (quod cum « media » conveniret) pro ه 5.

	Stellarum descriptio.	Longitudo.	Latitudo.	Plaga Caeli.	Magnitudo.	
Bootes (<i>al-ghūl</i> « daemon », sive <i>hāris ash-shamāl</i> « custos septentrionis », sive <i>al-baqqār</i> « bubulcus »).						
1	Quae est in humero sinistro.	180° 50'	49° 0'	b	3	γ
2	Stella quae est in capite.	187 50	53 50	b	4 magna	β
3	Stella quae est in humero dextero.	196 50	48 40	b	4 magna	δ
4	Stella quae est sub humero sinistro.	198 50	46 30	b	4 magna	
5	Quae est in poplite dextero, in cingulo et vinculo.	191 10	40 15	b	3	ε
6	Praecedens e duabus quae sunt in cingulo.	186 10	42 10	b	4 magna	ρ
7	Stella quae est in talo dextero.	196 30	28 0	b	3	ζ
8	Borealis ex tribus quae sunt in crure sinistro.	182 30	28 0	b	3	η
9	Media e tribus his.	181 40	26 30	b	4	τ
10	Stella australis e tribus his.	182 30	25 0	b	4	υ
11	<i>as-Simāk ar-rāmiḥ</i> « praeeminens hastam gerens », quae est inter duo femora daemonis, extra figuram.	188 10	31 30	b	1	α
Corona borealis (<i>al-fakkah</i>).						
1	Lucida e stellis Coronae.	205 50	44 30	b	2 magna	α
2	Praecedens e stellis Coronae.	202 50	46 30	b	4 magna	β

Bootes:

- Perperam lat. H. 57° 50'.
- Magnitudo cod. ut Pts. et S.; L. 4; Arg. 3.
- Pt. et S: « borealior e duabus quae sunt sub humero, in baculo ». — Lat. cod. ut H.; sed probabiliter pro 30' restituendum 10' ut B., L. et S. — Magnitudo ut B., H, L. et Pts.; S. « 5 magna ». — Bailly: « I am uncertain whether to designate this star as Flamsteed's 1 or 2 *Coronae Borealis* »; Schjellerup p. 65, adn. 1, proponit η Coronae, sed non sine haesitatione.
- Fortasse pro *والرباط* « et vinculo » legendum *وهي الرباط* « sive vinculo »; Pt. ὁ ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ μηροῦ ἐν τῷ περιζώματι.
- Lat. cod. 30' pro 10'; magnitudo ut Pts. et S. (L. sine « magna »).
- Long. cod. 166° *قصور* pro 196° *قصور*.
- Long. cod. 172° 10' *قعب* pro 182° 30' *قعب*.
- Cod. « media »; error ut in nr. 4 Cephei. — Long. cod. 10' pro 30'; magnitudo cod. 3 *ج* pro 4.

Corona australis:

- Magnitudo ut L.; sed Pts., S. et Arg. sine « magna ».
- Magnitudo ut L. et Arg.; Pts. et S. sine « magna ».

	Stellarum descriptio.	Longitudo.		Latitudo.		Plaga Caeli.	Magnitudo.	
Hercules (<i>al-ġāthī</i> « incumbens genibus »).								
1	Quae est in capite Herculis.	238°	50′	37°	30′	b	3	α
2	Quae est in humero dextero prope axillam.	224	50	43	0	b	3	β
3	Quae est in brachio dextero.	222	50	40	10	b	3	γ
4	Quae est in humero sinistro.	237	50	48	0	b	3	δ
5	Quae est in brachio sinistro.	243	10	49	30	b	4 magna	λ
6	Quae est in cubito sinistro.	248	50	52	0	b	4 magna	μ
7	Australis ex tribus quae sunt in carpo si- nistro.	252	40	53	0	b	3	ξ
8	Stella quae est in latere dextero.	224	50	50	40	b	3 magna	ζ
9	Quae est in radice poplitis sinistri.	232	20	58	30	b	3	c
10	Quae eam sequitur ex tribus in poplite sinistro.	237	30	61	15	b	4 magna	ρ
11	Quae est in radice poplitis dexteri.	221	50	64	0	b	4 magna	η
12	Quae est in genu dextero.	206	50	65	30	b	4 magna	τ
Lyra (<i>an-nasr al-wāqī</i> ^c « aquila ruens »).								
1	Lucida quae est in tiara tenentis lyram (<i>lūrah</i>); ipsaque est <i>an-nasr</i> « aquila ».	268	30	62	0	b	1	α
2	Borealis e duabus ei propinquis.	271	30	62	40	b	4 magna	ε
3	Australis e duabus iis.	271	30	61	0	b	4 magna	ζ
4	Australis e duabus quae sunt in anteriore [parte] praecedentis lancis librae.	272	0	55	0	b	4 parva	v ¹

Hercules:

5. Magnitudo ut L. et Pts.; S. et Arg. 5; B. et H. 4.

6. Magnitudo ut L. et Pts.; S. 4; Arg. 3 parva.

7. Magnitudo L., Pts. et Arg. 4 magna; B. et H. 4; S. 4.

8. Long. cod. 𐤒𐤓 227° pro 𐤒𐤓 224°. — Lat. cod. ut H.; B. 53° 0'; L. 56° 10'; S. 53° 10'. — Magnitudo ut L. et Arg.; Pts. et S. 3; B. et H. 4.

9. Long. cod. 𐤒𐤓 235° pro 𐤒𐤓 232°.

10. Magnitudo ut L. et Pts.; S. et Arg. 4.

11. Long. cod. 𐤒𐤓 223° 10' pro 𐤒𐤓 221° 50'. — Lat. ut H. (ξδ); sed rectius L., B. et S. 60° 15' (ξ ιε'). Magnitudo ut L. et Pts.; B., H. et S. 4; Arg. 3.

Lyra:

1. Mira stellae descriptio; Pt. ὁ λαμπρὸς ἐπὶ τοῦ ὀστράκου καλούμενος λύρα « lucida in testa (testudinis); **Lyra** « vocata ».

2. Magnitudo ut Pts. et S.; L. et Arg. 4.

3. Magnitudo ut Pts. et S.; L. et Arg. 4.

4. Mira descriptio; Pt. ὁ νοτιώτερος αὐτῶν (i. e. τῶν ἐν τῷ ζυγώματι προηγούμενων β) « australior earum (i. « e. duarum praecedentium in zygomate lyrae) ».

	Stellarum descriptio.	Longitudo.		Latitudo.		Plaga Caeli.	Magnitudo.	
5	Australis e duabus quae sunt in anteriore [parte] posterioris lancis librae.	272°	10'	54°	45'	b	4 parva	λ
6	Borealis prior e duabus quae sunt in posteriore lance librae.	272	10	56	10	b	3	β
7	Borealis posterior e duabus quae sunt in posteriore lance librae.	276	20	55	20	b	3	γ
Cygnus (<i>ad-dagāḡah</i> « gallina »).								
1	Quae est in rostro.	284	50	49	20	b	3	β
2	Quae est in medio colli.	297	30	54	30	b	4	η
3	Quae est in pectore.	309	40	57	20	b	3	γ
4	Stella lucida quae est in cauda.	320	20	60	0	b	2	α
5	Stella quae est in cubito alae dexteræ.	300	30	64	40	b	3	δ
6	Media e tribus quae sunt in ala sinistra.	302	20	71	30	b	4 magna	ι ²
7	Stella a septentrionibus eius, in extremitate alae.	297	50	74	0	b	4 magna	κ
8	Quae est in cubito alae sinistrae.	312	0	49	30	b	3	ε
9	Quae est in pede sinistro.	321	10	55	10	b	4 magna	ν
10	Quae est in genu sinistro.	325	40	57	0	b	4 magna	ξ
Cassiopea (<i>dhāt al-kursī</i> « [mulier] throno praedita »).								
1	Quae est in capite.	19	0	45	20	b	3	ζ
2	Quae est in pectore.	22	0	46	45	b	3	α

5. Pt.: ὁ νοτιώτερος αὐτῶν (i. e. τῶν ἐν τῷ ζυγώματι ἐπομένων β) « australior earum (i. e. duarum sequentium « in zygomate lyrae) ». — Long. cod. ut H.; sed rectius B., L. et S. 275° 10'; qua re fortasse رعب 272° error pro رعب 275°. — Magnitudo ut L. et Pts. (H. et B. 4); S. et Arg. 5 parva.

6. Pt.: τῶν ἐν τῷ ζυγώματι προηγούμενων β ὁ βορειότερος « borealior duarum praecedentium in zygomate lyrae ». — Lat. cod. 40' pro 10'.

7. Pt.: τῶν ἐν τῷ ζυγώματι ἐπομένων β ὁ βορειότερος « borealior duarum sequentium in zygomate lyrae ».

Cygnus:

1. Long. cod. رفز 287° 20' pro رفد 284° 50', quae reposcit nr. 27 tabulae statuum fixarum ad annum 1211 (fol. 238,r.); Pt. et S. 285° 40'. — Lat. ut L. et S.; B. et H. 49° 0'.

2. Magnitudo cod. ج 3 pro د 4; B. et H. 4; L. et Pts. 4 magna; S. 5; Arg. 4 parva.

6. Lat. cod. عد 74° 10' pro عال 71° 30'. — Magnitudo ut Pts. et L.; S. et Arg. 4.

8. Cod. طرف « extremitate » pro مرفق « cubito » (ὁ ἐπὶ τοῦ ἀγκῶνος τῆς ἀριστερᾶς πτέρυγος).

9. Magnitudo ut Pts. et L.; S. et Arg. 4.

10. Long. cod. سكو 326° 20' pro سكه 325° 40'. — Magnitudo ut Pts.; L., S. et Arg. 4.

Cassiopea:

1. Magnitudo B., H. et Arg. 4; Pts., L. et S. 4 magna.

2. Long. cod. نب 52° pro كب 22°.

	Stellarum descriptio.	Longitudo.		Latitudo.		Plaga Caeli.	Magnitudo.	
3	Quae est a septentrionibus eius, in zona.	24°	10'	47°	50'	b	4 magna	η
4	Stella quae est in genu.	31	50	45	30	b	3	δ
5	Stella quae est in medio throni.	19	0	51	40	b	3	β
6	Quae est supra pedem throni.	26	10	52	40	b	4 parva	κ
Perseus (<i>Firsāwus; al-fāris al-mumsik li-ra's al-ghūl</i> « eques caput daemonis gestans »)								
1	Quae est in extremitate manus dexteræ . equitis.	37	50	40	30	b	nebulosa	χ
2	Lucida quae est in latere dextero.	46	0	30	0	b	2	α
3	Quae est in humero dextero.	43	50	34	30	b	3	γ
4	Posterior ex tribus quae sunt in latere dextero.	48	50	27	20	b	4 magna	δ
5	Quae est in femore sinistro.	48	0	21	50	b	4	ν
6	Lucida ex iis quae sunt in capite daemonis.	40	50	23	0	b	2	β
7	Stella quae est in talo sinistro.	45	20	12	0	b	3 parva	ο
8	Quae eam sequitur, in pede sinistro.	47	30	11	0	b	3	ζ
Auriga (<i>dhū 'l-a'innah</i> « habenas tenens », idemque est <i>al-'annāz al-ġanūbī</i> « caprarius australis »).								
1	Stella quae est in capite aurigae.	73	40	30	0	b	4	δ
2	Quae est in humero sinistro, et appellatur <i>al-'anz</i> « capra ».	66	10	22	30	b	1	α

3. Long. cod. 23° 50' pro 24° 10'. — Magnitudo ut Arg.; Pts., L et S. 4.

5. Magnitudo cod. 4 parva; sed hoc manifeste pertinet ad stellam sequentem. Correxī iuxta Pt., S. et Arg.

6. De magnitudine cfr. nr. 5; cod. « nebulosa » quod ad sequentem stellam pertinet. Correxī iuxta Pts., S. et Arg.; L. 4.

Perseus:

1. In magnitudine cod. 4 parva, quod pertinet ad praecedentem stellam.

2 et 3. Numeri magnitudinum in codice inter se permutati.

4. Magnitudo Pt., S. et Arg. 3; sed emendare non audeo.

5. Magnitudo cod. 2 pro 4, ut habent B., S. et Arg.; L. 4 magna; H. 5.

7. Long. cod. 0' pro 20'.

8. Long. ut B., L. et S.; H. 40'. — Magnitudo ut Arg.; Pts. et S. 3 parva; L. 3 magna.

Auriga:

1. Magnitudo cod. 3 pro 4.

2. Male in textu *العير* *al-'ayyūq* (nomen Arabicum sideris illius) pro *العير* cod. emendare proposui. Le-

	Stellarum descriptio.	Longitudo.		Latitudo.		Plaga Caeli.	Magnitudo.	
3	Quae est in humero dextero.	74°	0'	20°	0'	b	2	β
4	Stella quae est in malleolo sinistro.	61	0	10	10	b	3 parva	ι
5	Quae est in malleolo dextero.	66	50	5	0	b	3 magna	γ
Ophiuchus (<i>al-ḥawwā' alladhī yamsik al-ḥayyah</i> « psyllus qui serpentem tenet »).								
1	Stella quae est in capite psylli.	246	0	36	0	b	3 magna	α
2	Praecedens e duabus quae sunt in humero dextero.	249	10	27	15	b	4	β
3	Prima e duabus quae sunt in extremitate manus sinistrae.	226	10	17	0	b	3	δ
4	Quae eam sequitur in extremitate manus.	227	10	16	30	b	3	ε
5	Stella quae est in genu dextero.	242	20	7	30	b	3	η
6	Stella quae est in crure dextero.	244	50	2	15	b	3 magna	40 Ophi
7	Secunda e quatuor quae sunt in pede.	245	30	1	30	b	4 magna	
8	Borealis quae est in linea trium borealium.	233	20	11	50	b	3 magna	ζ
Serpens (<i>al-ḥayyah allatī yamsik-hā al-ḥawwā'</i> « serpens quem psyllus tenet »).								
1	Quae est in tempore serpentis quem psyllus tenet.	215	30	36	0	b	3	γ
2	Contigua naribus serpentis.	212	50	40	0	b	4	ρ

gendum erat العنز *al-anz*, quae est versio nominis Ptolemaici αἴξ, ut cod. ipse praebet in nr. 3 tabulae statuum fixarum ad annum 1211. Cfr. Šūfī, p. 93.

5. Long. cod. صر 67° 10' pro صر 66° 50'. — Magnitudo ut L. et Pts.; S. et Arg. 2.

Ophiuchus:

1. Lat. cod. ut B., L. et S.; H. 36° 30'. — Magnitudo L., Pts. et S. 3; sed Arg. 2.

2. Magnitudo ut Pts; L. 4 magna; S. 3 parva; Arg. 3.

4. Magnitudo ut L.; Pts., S et Arg. 3 parva.

5. Long. cod. م 40' pro ل 20'.

6. Long. cod. ut L. et S.; minus bene B. et H. 247° 50'. — Magnitudo cod. ut L., sed vix recte; B. et H. 4; Pts. 4 magna; S. 4 parva vel 5 magna; Arg. 5.

7. Lat. cod. ل 35' pro ل 30'; male H 4° 30'. — Plaga cod. ut L., codex quidam Graecus, et vetus translatio Arabica (apud Šūfī, p. 102, adn. 2); sed melius B., H. et S. australis (tunc, iuxta Bailly, 42 Ophiuchi; iuxta Schjellerup, 9 Ophiuchi).

8. Long. cod. فج 253° pro فج 233°. — Magnitudo ut Arg.; L. Pts. et S. 3.

Serpens:

1. Long. ut B, L. et S.; male H. 212° 30'.

	Stellarum descriptio.	Longitudo.		Latitudo.		Plaga Caeli.	Magnitudo.	
3	Quae est prope initium colli.	213°	10'	34°	15'	b	3	β
4	Quae est post vertebram anteriorem colli.	212	50	29	15	b	3	δ
5	Media e tribus quae sunt post illam vertebram.	215	30	25	20	b	3	α
6	Stella australis ex iis.	217	30	24	0	b	3 magna	ε
7	Stella australis quae est post femur psylli.	244	50	10	30	b	4 magna	ν
8	Quae sequitur primam e tribus in cauda serpentis positis.	259	50	21	15	b	4 magna	η
9	Quae est in extremitate caudae serpentis.	269	30	27	0	b	4	θ
Sagitta (<i>uwīstos</i> « ὀϊστός » id est <i>an-naṣl</i> « cuspis sagittae »).								
1	Stella solitaria in sagitta.	291	20	39	20	b	4	γ
2	Stella quae est in extremitate sagittae.	284	30	38	40	b	5	β
Aquila (<i>an-naṣr aṭ-ṭā'ir</i> « aquila volans »).								
1	Praecedens e duabus quae sunt in humero sinistro.	284	20	31	30	b	3	γ
2	Quae sequitur stellam in medio capitis, et est in collo.	286	0	27	10	b	3	β
3	<i>an-naṣr aṭ-ṭā'ir</i> « aquila volans », quae est lucida inter humeros.	285	0	29	10	b	2 magna	α
4	Stella borealis propinqua <i>an-naṣr aṭ-ṭā'ir</i> .	285	50	30	0	b	3 parva	ο
5	Quae est sub <i>an-naṣr</i> , ab hac longe dis-sita, in latere Viae lacteae.	273	20	36	20	b	3	ζ

3. Lat. cod. ى 10' pro ١٥ = 15'.

4. Lat. cod. ٥٩° pro ٢٩°.

6. Magnitudo L. et Pts. 3; S. et Arg. 3 parva.

7. Long. cod. ى 10' pro ٥٠; lat. cod. ١٧° pro ١٠°. — Magnitudo L, Pts. et S. 4; Arg. 4 parva.

8. Minuta lat. ut S.; Pt. 10'.

Sagitta:

1. Long. ut B., L. et S.; male H. 297° 10'.

2. Lat. ut S.; L. 38° 45'; B. et H. 37° 40'. Magnitudo cod. ٤ 4 pro ٥ 5.

Aquila:

1. Long. cod. ٢٩٤° pro ٢٨٤°.

2. Long. cod. ٢٨٤° ٢٠' pro ٢٨٦° ٠'.

3. Magnitudo cod. ٣ 3 pro ٢ 2.

4. Long. cod. ٢٨٦° ١٠' pro ٢٨٥° ٥٠'.

Stellarum descriptio.		Longitudo.		Latitudo.		Plaga Caeli.	Magnitudo.	
Delphinus (ad-dulfin, sive aṣ-ṣalīb « crux »).								
1	Praecedens e tribus quae sunt in cauda.	298	50	29	10	b	3 parva	ε
2	Australis praecedens in primo latere.	299	40	32	0	b	3 parva	β
3	Contigua australis quae est in linea fulci- menti rostri.	302	30	32	0	b	3 parva	δ
4	Borealis in latere posteriore.	304	40	33	10	b	3 parva	γ
5	Borealis in primo latere.	301	20	33	50	b	3 parva	α
Equuleus (buruṭūmis « [ἵππου] προτομή », sive al-faras « equus »).								
1	Prima anterior e duabus quae sunt in ca- pite buruṭūmis, qui est equus.	307	30	20	30	b	obscura	α
2	Secunda, quae est e duabus his posterior.	309	10	20	40	b	obscura	β
3	Praecedens e duabus quae sunt in ore.	307	30	25	30	b	obscura	γ
4	Posterior ex iis.	308	50	25	0	b	obscura	δ
[Pegasus].								
1	Media ex iis quae sunt in capite Androme- dae, quae est mulier maritum non ha- bens.	358	30	26	0	b	2 parva	α Andr.
2	Quae est in dorso equi et in apice eius humeri.	353	20	12	30	b	2 parva	γ

Delphinus:

3. Pt., S. et Ulugh Beg: « australis [duarum] in sequenti latere rhombi » (τῆς ἐπομένης τοῦ ῥόμβου πλευρᾶς ὁ νότιος). — Long. cod. ۱۰' pro ۱۰' 30'; lat. cod. ۱۰' 33° pro ۱۰' 32°.
4. Minuta long. ut L. et S.; B. et H. 20'.
5. Minuta lat. ut B. et L.; H. 20'; S. 15'.

Equuleus:

1. Male long. H. 307° 50'.
2. Lat. cod. ۲۵° pro ۲۰°.
4. Long. cod. ۳۰' pro ۵۰'. — Lat. cod. ۱۰' 30' pro ۳۰' 0'.

Pegasus:

1. Long. cod. non amanuensium corruptela pro 359° 0', quae Pt. et S. praebent, sed Albatenii correctio, [cuius numeri veritati sunt propinquiores quam Ptolemaici. — SCHIAPARELLI].
2. Pt., S. et Ulugh Beg: « quae est in lumbo et in margine alae » (ὁ ἐπὶ τῆς ὀσφύος καὶ ἄκρου τοῦ πτεροῦ); versio Arabica Almagesti, quam al-Battānī prae oculis habuit, voci ἄκρον alterum sensum apicis (*ra's*) seu cacuminis tribuerat. Cfr. nr. 3 Andromedae.

	Stellarum descriptio.	Longitudo.		Latitudo.		Plaga Caeli.	Magnitudo.	
3	<i>Mankib al-faras</i> « humerus equi », quae est in humero dextero ubi oritur pes.	343°	20'	31°	0'	b	2 parva	β
4	Quae est inter duos humeros in humero alae.	337	50	19	40	b	2 parva	α
5	Borealis e duabus quae sunt in genu dextero.	340	10	35	0	b	3	η
6	Praecedens e duabus quae sunt in collo.	330	0	18	0	b	3	ζ
7	Borealis e duabus quae sunt in capite.	320	20	16	50	b	3	θ
8	Stella quae est in faucibus.	316	30	22	30	b	3 magna	ε
9	Quae est in malleolo dextero.	334	50	41	10	b	4 magna	π ²
10	Quae est in genu sinistro.	328	50	34	15	b	4 magna	ι
11	Quae est in malleolo sinistro.	323	30	36	50	b	4 magna	κ
Andromeda (<i>Andrūmīdhis</i> , sive mulier quae maritum non vidit).								
1	Quae est inter duos humeros Andromedae.	6	30	24	30	b	3	δ
2	Australis e tribus quae sunt supra eius zonam.	15	0	26	20	b	3	β
3	Praecedens extra tres quae sunt in manu dextera.	352	50	44	0	b	3	ο
4	Stella quae est supra pedem sinistrum.	28	0	28	0	b	3	γ
Triangulum (<i>trighānus</i> « τριγώνος » sive <i>al-muthallath</i> « triangulum »).								
1	Stella quae est in summitate trianguli.	22	10	16	30	b	3	α
2	Praecedens e tribus quae sunt in base.	27	10	20	40	b	3	β
3	Postrema harum trium.	28	0	19	0	b	3	γ

7. Lat. cod. 56° pro 16°.

8. Long. cod. 346° 33' pro 316° 30' = سيول = سول — Magnitudo ut L.; Arg. 2 parva; Pts. et S. 3.

9. Lat. cod. 21° pro 41° = ما 21° — Magnitudo ut L. et Pts.; S. et Arg. 4.

10. Long. cod. 30' pro 50'. — Magnitudo ut L. et Pts.; S. et Arg. 4.

11. Magnitudo ut Pts.; L., S. et Arg. 4.

Andromeda:

2. Lat. ut L. et S.; B. et H. 25° 20'.

3. Cod. « quae sunt in eius capite »; fortasse restituendum « quae sunt in apice [eius manus dexterae] »; nam Arabice *ra's* tam « caput » quam « apicem » significat. Graece ἐν τῷ δεξιῷ ἀκροχειρίῳ « in an- « teriore parte brachii dexteri »; ἄκρον = *ra's* ut in nr. 2 Pegasi. — Long. cod. 335' pro 352°.

Triangulum:

1. Long. cod. 82° pro 22°.

2. Long. cod. 23° pro 27°.

II.

Constellationes zodiaci.

	Stellarum descriptio.	Longitudo.		Latitudo.		Plaga Caeli.	Magnitudo.	
	Aries (<i>al-hamal</i>).							
1	Praecedens e duabus quae sunt in cornu.	17°	50′	7°	20′	b	3 parva	γ
2	Posterior e duabus iis.	18	50	8	20	b	3	β
3	Borealis e duabus quae sunt in ore.	22	10	7	40	b	5	η
4	Australis e duabus iis.	22	40	6	0	b	5	θ
5	Stella quae est in collo Arietis.	17	40	5	30	b	5	ι
6	Quae est in dorso.	28	40	6	0	b	6	ν
7	Quae est ubi oritur cauda.	32	30	4	50	b	5	ε
8	Praecedens e tribus quae sunt in cauda.	35	0	1	40	b	4	δ
9	Media ex iis.	36	30	2	30	b	4	ζ
10	Postrema ex his tribus.	38	10	1	50	b	4	τ ²
11	Quae est post femur.	30	50	1	10	b	5	ρ ¹
12	Quae est supra medium femoris.	29	10	1	30	austr.	5	σ
13	Quae est in dorso pedis posterioris.	28	10	5	15	a	4 magna	
	Et ex iis quae non sunt in figura:							
14	Quae est supra caput.	21	30	10	0	b	3	α
	Taurus (<i>ath-thawr</i>).							
1	Borealis e quatuor quae sunt in sectione Tauri.	37	30	6	0	a	4	f

Aries:

- Long. cod. ١٤° 40' pro ١٧° 50'.
- Long. cod. ٤٠' pro ٥٠'.
- Long. cod. ٢٠' pro ٤٠'.
- Long. cod. ut L., sed fortasse pro ٤٠' sunt ٥٠' restituenda, ut B., H. et S. habent.
- Lat. cod. ٤٠' pro ٥٠'.
- Lat. cod. ٥٠' pro ٤٠'.
- Long. cod. ٣٠' pro ٥٠'. — Minuta lat. ut L. et S.; B. et H. 30'.
- Lat. cod. ١٠' pro ٣٠'.
- Magnitudo ut L.; sed Pts. et S. 4, Arg. 5. Probabile est « magnam » pertinere ad stellam sequentem (Pts. et S. 3 magna; Arg. 2). — Iuxta Bailly est 87 Ceti; iuxta Delambre et Schjellerup μ Ceti.
- Long. ut H; sed probabiliter pro ٣٠' restituenda ٥٠' ut B., L. et S. habent. — Lat. ut L. et S; B. et H. 10° 30'. — De magnitudine cfr. nr. 13.

Taurus:

- Long. cod. ٣٦° pro ٣٧°.

	Stellarum descriptio.	Longitudo.		Latitudo.		Plaga Caeli.	Magnitudo.	
2	Secunda ex iis quatuor, quae sequitur.	37°	10'	7°	15'	a	4	s
3	Australis ex quatuor iis, quae sunt in sectione.	35	30	9	15	a	4	o
4	Stella quae est in pectore Tauri.	44	50	8	0	a	3	λ
5	Quae est in humero dextero.	40	50	9	30	a	5	e
6	Quae est in vultu in naso, et est e stellis <i>ad-dabarān</i> appellatis.	50	10	5	45	a	3 parva	γ
7	Quae est inter hanc stellam et oculum borealem.	51	30	4	15	a	3 parva	δ ¹
8	Aldebaran (<i>ad-dabarān</i> « sequens »), quae est in oculo et sub cornu australi.	53	50	5	10	a	1	α
9	Quae est inter primam stellarum <i>ad-dabarān</i> et oculum australem.	52	0	5	50	a	3 parva	θ ¹
10	Sequens hanc, in oculo boreali.	53	0	3	0	a	3	ε
11	Quae est in initio cornus, prope aurem australem.	58	40	4	0	a	5	i
12	Quae est in medio cornu, ex duabus quae sunt in cornu australi.	61	30	5	0	a	5	m
13	Quae est in initio cornus borealis.	56	50	4	0	a	4	τ
14	Quae est in extremitate cornus australis.	68	50	2	30	a	3	ζ
15	Quae est in extremitate cornus borealis et in pede Aurigae.	66	50	5	0	b	3	β

2. Long. cod. 36° 50' pro 37° 10'.

4. Long. cod. 46° 30' pro 44° 50'.

5. Long. et lat. cod. 30' pro 50'. — Magnitudo 4 pro 5.

6. Long. cod. 0' pro 10'.

7. Lat. cod. 1° pro 4°.

8. Pt.: ὁ λαμπρὸς τῶν ὑάδων ἐπὶ τοῦ νοτίου ὀφθαλμοῦ ὑπόκιρρος « lucida Hyadum in oculo australi; subrufa ». Quae al-Battānī habet « et sub cornu » falsa sunt; fortasse versio Arabica Almagesti, qua ille usus est, pro ὑπόκιρρος « subrufa » in textu ὑπὸ κέρατος « sub cornu » legerat. Cfr. quae Šūfī p. 37 de Albatēnio narrat, et quae in adn. d ad cap. LI dixi.

9. Cod. « et alterum oculum australem ».

10. Long. B., H. et S. 54°; sed L. 53° ut al-Battānī [quod veritatem magis appropinquat. SCHIAPARELLI]. — Magnitudo cod. 4 pro 3; L. 3; Pts. et S. 3 parva; Arg. 4 magna.

11. Long. cod. 57° pro 58°. — Male H. lat. 0° 15'. — Magnitudo ut S.; Pt. 4.

13. Latitudo falsa, sed e Graeco exemplari proveniens (δ 4° pro δ' $\frac{1}{4}$ °), nam etiam apud L. et S.; S. autem addit: « latitudo, iuxta quod in Caelo conspicitur, debet esse 0° 0' ». Vera Ptolemaei lectio 0° 15', ut B. et H. praebent. De plaga Bailly dicit: « All the copies have the latitude *south*, except L., where « it is described as *north*, and which appears to be the most correct ».

14. Lat. cod. 50' pro 30'.

15. Lat. cod. ut B., L. et S.; nam eadem est quae nr. 5 Aurigae; H. 6°. — Perperam magnitudo cod. « 3 « nebula ».

	Stellarum descriptio.	Longitudo.	Latitudo.	Plaga Caeli.	Magnitudo.	
16	Borealis e Pleiadibus (<i>ath-thurayyā</i>), quae est in linea anteriore.	43° 20'	4° 30'	b	5	
17	Australis e Pleiadibus, quae est in extremitate lateris anterioris.	43 30	3 40	b	4	
18	Parva posterior quae est in posteriore latere Pleiadum.	44 50	3 20	b	5	
19	Parva exterior in parte boreali Pleiadum.	44 50	5 0	b	4	
Gemini (<i>at-taw'amāni</i>).						
1	Quae est in capite Gemini anterioris.	94 30	9 30	b	2	α
2	Quae est in capite Gemini posterioris.	97 50	6 15	b	2	β
3	Quae est ante pedem Gemini anterioris.	77 40	1 30	a	4 magna	η
4	Quae est in extremitate pedis Gemini anterioris.	81 20	3 30	a	4 magna	ν
5	Quae est in extremitate pedis sinistri Gemini posterioris.	83 10	7 30	a	3	γ
6	Quae est in extremitate pedis dexteri Gemini posterioris.	85 50	10 30	a	4	ξ
7	Quae est in sinistro genu Gemini posterioris.	89 40	2 30	a	3	ζ
8	Quae est in media flexura dextera huius Gemini.	92 50	6 0	a	3	λ
9	Quae est in latere sinistro huius Gemini.	92 50	0 30	a	3	δ
10	Quae est in genu sinistro Gemini anterioris.	84 10	1 30	a	4 magna	ε

16. Lat. cod. 5° pro 4°. — Magnitudo cod. 3 nebulosa.

17. Long. ut B.; H., L. et S. 40'. — Magnitudo cod. 4 nebulosa.

18. Lat. ut S. et nonnulli codices Graeci; L. 5° 20'; B. et H. 3° 40'. — Magnitudo cod. 3 nebulosa.

19. Magnitudo cod. 4 nebulosa.

Gemini:

1. Lat. cod. 20' pro 30'; B., H. et S. 9° 30'; L. 9° 40'.

4. Long. cod. 101° pro 81°. — Magnitudo ut Pts.; L. 4; S. 3 parva.

5. Long. cod. 103° pro 83°.

6. Long. cod. 105° pro 85°; male H. 82°.

7. Long. cod. 109° pro 89°; minuta incerta sunt, nam B. et H. 25', S. 10', L. 20'.

8. Long. cod. ut trium codicum Graecorum; B., H., L. et S. 92° 30'. — Lat. ut L. et S.; B. et H. 6° 10'.

9. Long. ut S.; sed pro 50' fortasse 30' restituenda, quae B., H. et L. praebent.

10. Long. cod. 104° pro 84°. — Lat. cod. 10' pro 30'. — Magnitudo L. 3; Pts. et S. 3 parva; Arg. 4 magna.

	Stellarum descriptio.	Longitudo.	Latitudo.	Plaga Caeli.	Magnitudo.	
Cancer (<i>as-saraṭān</i>).						
1	Medium praeseptis, nebula quae est in pectore.	111° 30'	0° 40'	b	nebula	ε
2	Borealis e duabus quae sunt prope quadrilaterum nebulosum in tenebris.	108 50	1 15	b	4 parva	η
3	Australis e duabus iis, et appellantur quadrilaterum.	109 10	1 10	a	4 parva	θ
4	Quae est in chela boreal Cancrī.	109 30	11 50	b	4 magna	ι
5	Quae est in chela australi.	117 40	5 30	a	4	α
6	Quae est in extremitate pedis posterioris australis.	108 20	7 30	a	4	β
7	Quae est in extremitate pedis posterioris borealis.	103 50	1 0	b	5	μ ²
8	<i>Australis e duabus quas memoravimus.</i>	108 20	7 30	a	4 magna	β
9	Borealis e duabus quae sunt prope nebulosam, et appellantur « duo asini » (<i>al-ḥimārāni</i>).	111 30	2 40	b	4 magna	γ
10	Australis e duabus iis.	112 30	0 10	a	4	δ
Leo (<i>al-asad</i>).						
1	Stella quae est in extremitate narium.	119 30	10 0	b	4	κ
2	Borealis e duabus quae sunt in capite.	125 30	12 0	b	3	μ
3	Media e tribus quae sunt in collo.	133 20	8 30	b	2	γ
4	Praecedens, eaque borealis, e tribus quae sunt in collo.	131 20	11 0	b	3	ζ

Cancer:

1. Lat. ut L.; sed fortasse 40' error cod pro 20' quae B., H. et S. praebent.
2. Rectius Pt. et S.: τοῦ περὶ τὸ νεφέλιον τετραπλεύρου τῶν προηγουμένων β ὁ βορειότατος « borealior duarum » praecedentium quadrilateri [quod est] circa nebulosam ». — Long. cod. قيا 111° pro 108°.
3. Long. cod. قيب 112° pro قط 109°.
4. Magnitudo L., Pts., S. et Arg. 4, sine « magna ».
5. Long. cod. قيا 111° pro قيز 117°.
6. Plaga cod. « borealis »; sed cfr. nr. 8. — Magnitudo cod. 5 pro 4; L. et Arg. 4 magna; Pts. et S. 4 (cfr. nr. 8).
7. Magnitudo cod. 4 pro 5; ergo permutatio cum praecedenti.
8. Est eadem stella quae sub nr. 6.
9. Long. ut B., L. et S.; male H. 114° 10'. — Magnitudo ut L. et Pts.; S. 4; Arg. 4 parva.

Leo:

2. Long. cod. 0' pro 30'.
4. Long. cod. قله 135° pro قلا 131°. Magnitudo 4 pro 3.

	Stellarum descriptio.	Longitudo.	Latitudo.	Plaga Caeli.	Magnitudo.	
5	Australis ex his tribus quae sunt in collo.	131° 50'	4° 30'	b	3	η
6	<i>Qalb al-asad</i> « cor Leonis », et vocatur etiam <i>al-malakī</i> (?) « regia ».	134 0	0 10	b	1	α
7	Praecedens e duabus quae sunt in dorso.	142 30	12 15	b	5	b
8	Stella quae hanc sequitur.	145 20	13 40	b	2 parva	δ
9	Quae est in femore posteriore.	151 30	5 50	b	3	ι
10	Secunda quae etiam est in femore posteriore.	152 50	1 15	b	4	σ
11	Quae etiam est in medio femoris posterioris.	158 40	3 0	a	5	υ
12	<i>aş-Şarfah</i> « conversio », stella quae est in extremitate caudae.	155 40	11 50	b	1	β
13	Borealis e duabus quae sunt in postica parte Leonis.	145 30	11 30	b	5	71 Leo.
14	Australis e duabus iis.	147 30	9 40	b	3	θ
15	Stella quae est in dextero genu.	128 30	0 0	0	5	ψ
Stellae Comae, quae non sunt in figura Leonis:						
16	Prima earum <i>Bulūqāmos</i> « πλόκαμος (coma) », quae est stella inter caudam Leonis et <i>as-Simāk ar-rāmiḥ</i> (α Bootis).	156 0	30 15	b	conspicua	
17	Praecedens magna quae est in crinibus plexis et vocatur <i>urf al-asad</i> « iuba Leonis ».	155 30	25 0	b	obscura	4 Comae
18	Stella quae eam sequitur in crinibus plexis.	159 40	25 30	b	obscura	21 Comae
Hae tres appellantur <i>adh-dhawā'ib</i> « comae ».						

6. Cod. الماكين *al-mākin* « potestatem habens »; sed nomen mihi aliunde ignotum, qua re puto ab amanuensibus esse corruptum e notissimo الملكى *al-malakī* « [stella] regia » i. e. βασιλ'σκος, Regulus. — Long. cod. est quam ipse al-Battānī observaverat (cfr. t. I, p. 124, cap. LI); Pt. et S 133° 40'.

7. Magnitudo ut L. et Pts.; S. 5 magna; Arg. 4 parva; B. et H. 6.

8. Long. cod. قد 144° pro قه 145°. — Magnitudo cod. د 4 pro ب = ب 2; Arg. 2 parva, ut cod.; L., Pts. et S. 2.

9. Long. cod. قنب 152° pro فنا 151°. — Lat. cod. د 4° pro ه 5°.

11. Lat. ut L. et S.; H. 3° 10'; B. 3° 12'.

12. Long. cod. قنه 155° pro قند 154°. — Lat. cod. ل 30' pro ن 50'.

13. Lat. cod. ut L.; B. et H. 10'; S. 20'. — Schjellerup 72 Leonis, aliam stellam considerans.

15. Long. cod. ل 20' pro ل 30'.

16. Magnitudo in cod. definitur مشهور « conspicua, nota, celebris, vulgata »; L. « luminosa »; versio Trapezuntii (1), e Graeco exemplari facta, « splendida »; e contra B et H. άμυρός « obscura ». Ş ū f i, qui eam quintae magnitudinis existimat, p. 154 ait eandem Ptolemaeum ex « obscuris » fecisse. — Lat. cod. paulo differt a Pt. et S. (30° 0'). — Bailly: « I cannot identify this star. The lati- tude accords with 31 Comae Berenices; but the longitude differs as much as 8° ». Iuxta Schjellerup est Fl. 15 Comae.

(1) Claudii Ptolemaei Pheludiensis Alexandrini *Almagestum, seu magnae constructionis mathematicae opus plane divinum, Latina donatum lingua ab Georgio Trapezuntio*, Venetiis 1528.

	Stellarum descriptio.	Longitudo.		Latitudo.		Plaga Caeli.	Magnitudo.	
Virgo (<i>al-‘adhrā’</i> « virgo » sive <i>as-sunbulah</i> « spica »).								
1	Australis e duabus quae sunt in capite Vir- ginis.	157°	30′	4°	15′	b	5	v
2	Borealis e duabus iis.	158	10	5	40	b	5	ξ
3	Quae est in dorso prope alam sinistram.	160	10	0	10	b	3	β
4	Praecedens e quatuor quae sunt in ala si- nistra.	169	25	1	10	b	3	η
5	Stella quae hanc sequitur.	174	20	2	50	b	3	γ
6	Quae est in latere dextero sub mammis.	175	30	8	30	b	3	δ
7	Postrema ex his quatuor memoratis.	182	10	1	40	b	4	θ
8	Quae est in extremitate pedis sinistri.	201	10	0	30	b	4	λ
9	Quae est in extremitate pedis dexteri bo- realis.	203	50	9	50	b	4	μ
10	Quae est in cursu caudae vestis.	197	50	7	30	b	4	ι
11	Quae est e tribus in ala boreali, [appel- lata] <i>al-mutaqaddim li-’l-qaṭāf</i> « pro- « cedens ad vindemiandum ».	173	20	15	10	b	3	ε
12	Lucida quae est in extremitate manus sini- strae, et appellatur <i>as-sunbulah</i> « spica » sive <i>as-simāk al-aʿzal</i> « praeeminens « inermis ».	187	50	2	0	a	1	α
13	Quae est in zona et nate dextera.	186	0	8	40	b	3	ζ

Virgo:

- Long. ut L. et S.; minus bene B. et H. 156° 30’. — Male H. lat. 1° 15’.
- Lat. cod. ى 10’ pro م 40’.
- In cod. lat. 1° 10’ ex permutatione cum lat. stellae sequentis.
- Long. cod. قضا 161° pro قسط 169°. — Lat. cod. 0° 10’; cfr. nr. 3. — Magnitudo cod. د 4 pro ح = ج 3.
- Long. cod. قعب 172° pro قعد 174°.
- Long. cod. قعب 172° pro قعه 175°.
- Long. cod. قعب 172° pro قعب 182°.
- Cod.: « Borealis quae est in extremitate pedis dexteri ». — Male H. long. 203° 30’, et lat. 0° 50’. — Magnitudo ut L. et Arg.; Pts. et S. 4 magna; B. et H. 3.
- Long. ut L. et S.; B. et H. 197° 30’.
- Long. cod. رج 203° pro رعب 173°. — Lat. cod. ل 30’ pro ى 10’, ut L. et S.; B. et H. 16° 0’. — Magnitudo ut L. et S.; Pts. 3 parva; Arg. 3 magna; male B. et H. 5.
- Long. cod. رزل 207° 30’ pro ن قز 187° 50’. — Plaga cod.: borealis (e litterarum permutatione cum stella sequenti).
- Long. cod. رو 206° pro قفو 186°. — Plaga cod.: australis (e permutatione cum plaga praecedentis stellae).

	Stellarum descriptio.	Longitudo.		Latitudo.		Plaga Caeli.	Magnitudo.	
	Libra (<i>al-mīzān</i>).							
1	Stella lucida e stellis lancis australis.	209°	10′	2°	0′	b	2	α
2	Obscura a septentrionibus huius stellae.	208	10	2	30	b	5	μ
3	Lucida ex iis quae sunt in extremitate lan- cis borealis.	213	20	8	20	b	2	β
4	Media ex iis quae sunt in lance australi.	215	10	1	40	a	4	ι ¹
5	Stella hanc praecedens.	212	30	1	15	b	4	ν ¹
6	Stella media in lance boreali.	219	0	4	45	b	4	γ
	Scorpius (<i>al-‘aqrab</i>).							
1	Borealis e tribus quae sunt inter oculos.	227	40	1	20	b	3	β
2	Media ex his tribus.	226	50	1	40	a	3	δ
3	Australis ex his tribus.	226	50	5	0	a	3	π
4	Praecedens e tribus lucidis quae sunt in pectore.	231	30	3	45	a	3	σ
5	<i>Qalb al-‘aqrab</i> « cor Scorpii », earum me- dia, rubra.	233	50	4	0	a	2	α
6	Posterior ex his tribus.	235	40	5	30	a	3	τ
7	Quae hanc sequitur in prima vertebra.	239	40	11	0	a	3	ε
8	Quae est in secunda vertebra.	240	0	15	0	a	3	μ
9	Borealis duplae quae est in tertia vertebra.	241	10	18	40	a	4	ζ ¹
10	Quae eam sequitur in quarta vertebra.	244	20	19	30	a	3	η
11	Eas sequens in quinta vertebra.	249	20	18	50	a	3	θ

Libra:

1. Lat. cod. inserviit quoque ad supputanda elementa nr. 45 tabulae statuum fixarum ad annum 1211; Pt. et S. 0° 40'.
3. Long. cod. 5' pro 20'. — Lat. cod. confirmatur elementis nr. 46 tabulae statuum fixarum ad annum 1211; B., H. et S. 8° 50'; L. 8° 30'.
4. Plaga cod.: borealis.
5. Cod.: « sequens ».

Scorpius:

1. Minuta long. cod. incerta; t. I, p. 124, cap. LI, ait se eam in 227° 45' (Plato 20') observavisse, quod comparatione cum Menelai longitudine confirmatur (cfr. I, 124, adn. 6). At Pt. et S. 227° 30'.
2. Long. cod. 30' pro 50'. — Lat. cod. 20' pro 40'.
3. Long. cod. 30' pro 50'.
- 5 Long. cod. 30' pro 50'.
6. Long. cod. 30' pro 40'.
9. Cod.: « dupla borealis »; Pt.: τοῦ ἐν τῇ τρίτῃ σπονδύλῳ διπλοῦ ὁ βόρειος.
10. Long. cod. 245° pro 244°. — Magnitudo cod. 4 pro 3.

	Stellarum descriptio.	Longitudo.	Latitudo.	Plaga Caeli.	Magnitudo.	
12	Quae eas sequitur in sexta vertebra.	251° 40'	16° 40'	a	3	ι
13	Quae est in septima vertebra prope aculeum.	250 10	15 10	a	3	κ
14	Posterior e duabus quae sunt in aculeo.	248 40	13 20	a	3	λ
15	Praecedens e duabus iis.	248 10	13 30	a	4	υ
	Et ex iis quae non sunt in figura:					
16	Borealis nebula quae aculeum sequitur.	252 20	13 15	a	nebula	
	Sagittarius (<i>ar-rāmī</i> « iaculator » sive <i>al-qaws</i> « arcus » et <i>as-sahm</i> « sagitta » simul).					
1	Stella quae est in cuspide sagittae.	255 40	6 20	a	3	γ
2	Quae est in initio manus sinistrae.	258 50	6 30	a	3	δ
3	Quae est in parte australi arcus.	259 10	10 50	a	3	ε
4	Australis e duabus quae sunt in parte boreali arcus.	260 10	1 30	a	3	λ
5	Borealis e duabus iis, in extremitate arcus.	257 50	2 50	b	3	μ
6	Quae est in humero Sagittarii.	266 30	3 10	a	3	σ
7	Quae est ante hanc in sagitta.	264 10	3 45	a	4 <i>parva</i>	φ
8	Dupla nebula quae est in oculo Sagittarii.	266 20	0 45	b	nebula	ν ²
9	Quae est in malleolo anteriore sinistro.	268 50	23 0	a	3	β

15. Magnitudo cod. 3 pro 4; Pt. et Arg. 4; S. 3 parva.

16. Long. cod. 0' pro 20'. — Lat. cod. 20' pro 15'.

Sagittarius:

1. Male H. long. 260° 40'. — Magnitudo cod.: « 3 nebula ».

2. Long. cod. 30' pro 50'.

3. Lat. ut B., L. et S.; male H. 20° 20'. — Magnitudo cod. 4 pro 3 = 3.

6. Cod. plagam et magnitudinem cum nr. 8 permutavit (*b*; nebula).

7. Minuta lat. discrepant a B. et H. (30'), atque a L. et S. (50'). — Plaga cod. borealis. — Magnitudo « 4 parva » error videtur; L. 4; Pts., S. et Arg. 4 magna.

8. Magnitudo cod. 3, e confusione cum nr. 6.

9. Minuta long. in cod. 30' pro 50'; correxi secundum Pt. et S., sed nescio an recte. Nam etiam in catalogi Albateniani exemplari quod Şūfī prae oculis habuit minuta 30' erant; qua re Şūfī, p. 30, maligne et procul dubio iniuria dicit: « Il [i. e. al-Battānī] dit ensuite qu'il a observé les étoiles du « Sagittaire (1), et qu'il a trouvé l'étoile située sur le jarret de la jambe gauche de devant, dans « 28° 30' du Sagittaire. Il apporte aussi dans son livre qu'il a trouvé, au temps de son observation, « que l'addition à faire à chaque étoile rapportée dans l'*al-madjistī*, était de 11° 10'. Or, d'après ce « qu'il a dit sur l'addition à faire à chaque étoile, cette étoile devait être dans 28° 50' du Sagittaire; « puisque son lieu rapporté dans l'*al-madjistī* est dans 17° 40', d'où il suit qu'il en a retranché 20

(1) Falsum est; id nullo loco al-Battānī narrat.

	Stellarum descriptio.	Longitudo.		Latitudo.		Plaga Caeli.	Magnitudo.	
10	Media, in humero, e tribus quae sunt in dorso.	268°	50′	4°	30′	a	4	τ
11	Sequens quae est sub axilla et est proxima mediae ex iis quae sunt in dorso.	267	30	6	45	a	3	ζ
12	Quae est in genu sinistro.	268	10	18	0	a	3	α
13	Quae est in malleolo pedis anterioris.	257	50	13	0	a	3	η
14	Quae est in femore sinistro.	278	30	13	30	a	3	θ
15	Quae est in crure dextero posteriore.	277	30	20	10	a	3	ι
16	Borealis e quatuor quae sunt in initio caudae; et dicitur <i>‘urqūb ar-rāmī</i> « malleolus Sagittarii » [sic!].	274	0	6	30	a	1	ω
17	Quae eam sequitur in latere boreali.	280	0	4	50	a	5	A
Capricornus (<i>al-ġady</i> « haedus »).								
1	Praecedens e tribus quae sunt in cornu posteriore.	288	30	7	20	b	3	α ¹

« pour faire croire qu’il a observé cette étoile (1). La preuve qu’il ne l’a ni observée ni connue, « et qu’elle n’a pas été plus connue des autres astronomes, depuis que l’on a composé des tables, « fait des sphères et dessiné dessus les étoiles, c’est qu’ils ont marqué dans leurs livres et sur leurs « sphères cette étoile comme de la deuxième grandeur, tandis qu’elle est des moindres de la qua- « trième ». Sed magnitudo cod. 3, quod verum est; B., H., L. et Pts. 2; fortasse Albatenii emendatio, ut in nr. 12.

10. Long. cod. $\downarrow$ 30′ pro $\downarrow$ 50′. — Magnitudo cod. 3 fortasse Albatenii emendatio; L., Pts., S. et Arg. 4 magna.

12. Magnitudo 3 videtur ab al-Battānī ipso provenire; Š ū f ī p. 30: « Il a aussi trouvé dans l’*al-madjistī* « que l’étoile au genou de la même jambe de devant était des petites de la deuxième grandeur, et « néanmoins il l’a marquée de la troisième. C’est l’étoile qui se trouve très-près de la 6^e étoile de « la Couronne, parce qu’elles ont la même longitude; l’étoile du genou est seulement plus méridio- « nale de 50′. Elles sont toutes les deux de la quatrième grandeur. Peut-être les traducteurs ou les « copistes ont-ils marqué la grandeur de ces deux étoiles par un $\mathfrak{d}$ *dāl*, qu’un copiste a pris pour « un $\mathfrak{b}$ *bā*, et ainsi les a marqué de la deuxième grandeur ». Tamen non amanuenses, sed Ptolemaeus ipse erraverat et stellam duxerat secundae magnitudinis; L. 2 parva.

13. Long. cod. $\downarrow$ 30′ pro $\downarrow$ 50′.

15. Long. cod. incerta; B. et H. 274° 0′; L. 277° 50′; S. 278° 0′.

16. *‘Urqūb ar-rāmī* « malleolus Sagittarii » apud reliquos Arabes est β Sagittarii, scilicet nr. 9 Albatenii. — Long. cod. est quae, iuxta B. et H., ad nr. 15 pertineret; lat. et magnitudo quoque valde a Ptolemaicis differunt. Exspectandum erat: long. 278° 30′ (L. 279° 50′, S. 278° 50′), lat. 4° 50′, magnitudo 5. Sed numeris falsis codicis al-Battānī supputavit elementa nr. 48 tabulae statuum fixarum ad annum 1211.

17. Long. cod. $\downarrow$ 20′ pro $\mathfrak{b}$ 0′.

Capricornus:

1. Cod. « praecedens », sed rectius « borealis ».

(1) Sed cfr. quae dixi in adn. e ad LI caput.

	Stellarum descriptio.	Longitudo.	Latitudo.	Plaga Caeli.	Magnitudo.	
2	Media e tribus his.	288° 50'	6° 40'	b	6	v
3	Australis ex his tribus memoratis.	288 30	5 0	b	3	β
4	Australis e tribus quae sunt in ore.	290 10	0 45	b	6	o
5	Praecedens duarum reliquarum ex tribus quae sunt in ore.	289 50	1 45	b	6	π
6	Tertia stella quae eas duas sequitur in ore.	290 0	1 30	b	6	ρ
7	Quae est sub genu dextero.	292 0	6 30	a	4	ψ
8	Quae est in genu sinistro.	292 50	8 40	a	4	ω
9	Praecedens ex duabus sibi invicem proximis quae sunt in ventre.	301 20	6 50	a	4	ζ
10	Stella hanc sequens in ventre.	301 30	6 0	a	5	
11	Praecedens e duabus quae sunt prope caudam.	305 0	2 10	a	3	γ
12	Stella quae eam sequitur.	307 30	2 0	a	3	δ
13	Australis e tribus his reliquis.	309 50	0 0	o	5	μ
14	Media e tribus iis.	308 50	2 50	b	5	λ
15	Borealis ex iis quae sunt in extremitate caudae.	309 50	4 20	b	5	c ¹
16	Praecedens e duabus quae sunt in spina dorsi.	304 30	4 45	a	4	ε
17	Praecedens e duabus quae sunt in dorso.	297 50	0 0	a	4	θ
18	Australis e quatuor quae sunt in parte bo- reali caudae.	303 0	0 0	a	5	μ
Aquarius (as-sāqī « aquator » sive ad-dalw « situla »).						
1	Stella quae est in capitē Aquarii.	311 30	15 45	b	5	d
2	Lucida e duabus quae sunt in humero dextero.	317 30	11 0	b	3	α

2. Long. cod. ل 30' pro ن 50'.

4. Lat. cod. 45° 45' pro 0° 45'.

7. Male lat. H. 6° 20'. — Plaga cod. borealis.

10. Iuxta Delambre et Schjellerup *b* Capricorni; iuxta Bailly Fl. 35 Capricorni.

11. Long. cod. 309°, quod in scriptura Arabico-maghrebina facile oritur ex 305°. Hunc numerum igitur recepi, qui etiam cum observationibus hodiernis, Schiaparelli teste, melius quam alii congruit. B., L. et S. 306°; H. 303°. — Lat. cod. ل 30' pro 10'.

12-14. Numeri cod. sine erroribus, sed nomina stellarum inter se commutata. Nam duodecima stella in cod. est: « Praecedens e quatuor quae sunt in parte boreali caudae », quod est sidus in hoc catalogo Albateniano omissum; item cod. nomen stellae 14 loco 13, 15 loco 14, 12 loco 15 ponit, et 13 omittit. — In long. nr. 13 male H. 301° 50'.

18. Est mera repetitio nr. 13, mutata long. iuxta falsam lectionem quam etiam H. praebet. — Lat. cod. ج 3° pro 0°. — Magnitudo cod. 4 pro 5.

Aquarius:

1. Lat. cod. 5° pro 15°.

	Stellarum descriptio.	Longitudo.		Latitudo.		Plaga Caeli.	Magnitudo.	
3	Obscura quae est sub ea.	316°	20'	9°	40'	b	5	ο
4	Quae est in humero sinistro.	307	40	8	50	b	3	β
5	Stella sequens e tribus quae sunt in manu sinistra.	298	50	5	30	b	3	ν
6	Media e tribus his.	297	20	8	0	b	4	μ
7	Praecedens ex his tribus.	295	50	8	40	b	3	ε
8	Quae est in brachio dextero.	320	40	8	45	b	3	γ
9	Borealis e tribus quae sunt in extremitate manus.	322	50	10	45	b	3	π
10	Praecedens e duabus australibus reliquis.	323	10	9	0	b	3	ζ
11	Stella hanc sequens.	324	30	8	30	b	3	η
12	Australis e duabus quae sunt in crure dextero.	322	50	7	30	a	3	δ
13	Praecedens e quinque quae sunt in loco exitus aquae.	326	10	2	0	b	4	
14	Quae eam sequitur ad austrum.	326	0	0	10	b	4	λ
15	Quae hanc sequitur post ansam.	328	50	1	10	a	4	h ¹
16	Quae eam etiam sequitur.	331	10	0	30	a	4	φ
17	Australis ex iis quae sunt in ansa.	331	40	1	40	a	4	χ
18	Postrema earum quae sunt in loco finis aquae, et appellatur <i>fam al-ḥūt al-ġa-nūbī</i> « os piscis australis ».	318	10	20	20	a	1	α Piscis Austr.
19	Borealis e duabus quae sunt ab austro stellarum ansae.	330	10	3	30	a	4	ψ ¹
20	Praecedens e duabus sibi invicem proximis quae sunt in crure [dextero].	322	50	7	30	b	3	θ
21	Quae est in nate dextera Aquarii.	319	50	0	50	a	5	σ

3. Lat. cod. 50' pro 40'.

4. Long. cod. 20' pro 40'.

5. Cod. « sequens tres », ommissa scilicet particula من « ex ».

7. Lat. cod. 20' pro 40'.

8. Cod. نخذ « femore » pro عضد « brachio ». — Lat. cod. 7' pro 45'.

9. Cod. ذنبه « caudae » pro يده « manus ».

12. Plaga cod. borealis.

13. Bailly: « This star is probably [Flamsteed] 67 Aquarii; but the longitude should be increased nearly « 2° ». Item Schjellerup: Fl. 67.

15. Lat. ut B. et H.; L. et S. 1° 0'.

16. Long. cod. 40' pro 10'. — Lat. cod. 3° 0' pro 0° 30'.

18. Lat. cod. ut B.; male H., L. et S. 23° 0' (κγ pro κγ').

20. Plaga excepta, numeri omnes falsi; ad nr. 12 pertinent. Veri erant: 317° 20', 3° 0', b, 4.

21. Intra nr. 20 et 21 cod. perperam denuo stellam 19 inserit. — Lat. cod. 3° 20', e confusione cum lat. stellae 19 falso in cod. repetitae. — Magnitudo cod. ut L.; Pts. 4; S. 4 parva; Arg. 5 magna.

	Stellarum descriptio.	Longitudo.		Latitudo.		Plaga Caeli.	Magnitudo.	
22	Media e tribus quae sunt in prima curvatura ansae.	333°	20'	14°	45'	a	5	A ²
23	Prima e tribus quae sunt in secunda curvatura ansae.	323	0	14	45	a	4	c ¹
24	Australis e duabus quae sunt in nate sinistra.	312	50	1	40	a	4	ι
25	Media e tribus aliis quae sunt in prima curvatura ansae.	328	40	15	0	a	4	b ²
26	Borealis e duabus quae sunt in crure sinistro sub genu.	319	0	9	0	a	5	g ¹
Et ex iis quae non sunt in figura:								
27	Praecedens e tribus quae sequuntur ansam amphorae.	337	50	15	30	a	4 magna	2 Ceti.
28	Borealis e duabus reliquis.	340	50	14	40	a	4 magna	6 Ceti.
29	Stella eas sequens post ansam amphorae.	340	10	18	15	a	4 magna	7 Ceti.
Pisces (as-samakātāni « duo pisces »).								
1	Quae est in ore Piscis anterioris sive australis.	332	50	9	15	b	4 magna	β
2	Australis e duabus quae sunt in capite huius Piscis.	335	20	7	30	b	4	γ
3	Borealis e duabus his quae sunt in capite.	337	10	9	20	b	4	b
4	Praecedens e duabus quae sunt in dorso.	339	20	9	30	b	4	θ
5	Secunda e duabus quae sunt in dorso.	341	50	7	30	b	4	ι
6	Praecedens e duabus quae sunt in ventre Piscis australis.	337	10	4	30	b	4	κ
7	Posterior e duabus iis.	340	50	3	30	b	4	λ
8	Quae est in cauda huius Piscis.	347	10	6	20	b	4	ω

22. Long. cod. 0' pro 20' (B., H. et S.); L. 50'. — Plaga cod. borealis. — Magnitudo cod. 4 pro 5.

23. Gradus long. cod. 328° pro 323° سكيح; minuta long. ut B., H. et S.; L. 5'. — Lat. ut B. et H.; L. et S. 14° 50'.

24. Long. cod. 317° pro 312° سير. — Lat. cod. 11° pro 1° يا.

26. Plaga cod. borealis ut L.

27. Long. cod. 30' pro 50'. — Magnitudo cod. 2 pro 4; L. 4; Pts. et S. 4 magna; Arg. 4 parva.

28 et 29. Magnitudo ut Pts. et S.; L. 4; Arg. 5 magna.

Pisces:

1. Magnitudo ut Pts. et L.; S. 4; Arg. 5 magna.

2. Long. cod. 334° pro 335° سله. — Magnitudo cod. 3 pro 4. ج.

5. Lat. cod. 20° pro 7° ر.

6. Long. cod. 340° pro 337° سمر; fortasse e confusione cum sequenti stella. — Lat. cod. 3° pro 4° ج.

7. Long. cod. 342° vel 347° pro 340° سم.

	Stellarum descriptio.	Longitudo.		Latitudo.		Plaga Caeli.	Magnitudo.	
9	Praecedens ex iis quae sunt in cauda in filo lini.	352°	10'	5°	45'	b	6	<i>d</i>
10	Quae hanc sequitur.	354	10	3	45	b	6	Fl. 51.
11	Praecedens e tribus lucidis quae sunt post eas quarum praecessit mentio.	358	20	2	15	b	4	δ
12	Media ex iis.	1	40	1	10	b	4	ε
13	Quae hanc sequitur, e tribus.	4	10	6	0	a	4	ζ
14	Borealis e duabus proximis quae sunt in <i>ansa</i> .	3	30	2	0	a	6	<i>e</i>
15	Australis e duabus iis.	4	30	5	0	a	6	<i>f</i>
16	Media e tribus quae sunt post <i>ansam</i> .	9	30	4	40	a	4	ν
17	Quae est in nodo duorum filorum lini.	13	40	8	30	a	3	α
18	Praecedens a septentrionibus nodi.	11	40	1	20	b	4	$\omicron$
19	Media e tribus quae sunt in nodo.	11	50	5	20	b	3	η
20	Borealis e duabus quae sunt in ore Piscis borealis.	13	10	21	45	b	5	<i>g</i>
21	Borealis e tribus quae sunt in extremitate caudae.	11	40	9	0	b	4	ρ
22	Praecedens e tribus quae sunt in spina dorsi huius Piscis.	6	50	14	20	b	4	ψ^1
23	Media ex iis.	7	50	13	0	b	4	ψ^2
24	Postrema ex his tribus.	8	50	12	0	b	4	ψ^3
25	Borealis e duabus quae sunt in ventre.	13	20	17	0	b	4	υ
26	Australis e duabus iis.	11	0	15	20	b	4	φ
27	Quae est in spina posteriore prope caudam.	11	10	11	45	b	4	χ
28	Et ex iis quae sunt fere sub quadrilatero.	342	20	2	40	a	4	Fl. 27.

9. Pt.: « Prima ex iis quae sunt in filo lini, [incipiendo] a cauda » (τῶν κατὰ τὸν λίνον αὐτοῦ ὁ πρῶτος ἀπὸ τῆς οὐρᾶς). Sed etiam L.: « prima stellarum quae sunt in cauda »; pro ἀπὸ legerunt ἐπί.

10. Long. cod. سنه 355° pro سنه 354°. — Magnitudo cod. 5 pro 6.

12. Long. ut L.; B., H. et S. 1° 20'.

13. Lat. ut H. et S.; L. 1° 20'; sed rectius B. 0° 10' ($\zeta' \frac{1}{6}$ pro $\zeta 6^\circ$). — Plaga cod. borealis.

14. « Ansa » error, ut in nr. 16, pro « voluta (seu curvatura) lini » καμπή. — Plaga cod. borealis.

15. Plaga cod. borealis.

16. Plaga cod. borealis.

18. Lat. ut S.; L. 5° 20'; B. et H. 1° 40'. — Plaga ut L. et S; B. et H. australis.

23. Lat. ut L. et S.; B. et H. 13° 15' — Magnitudo cod. 3 pro 4.

25. Male long. H. 12° 50'. — Magnitudo cod. 6 pro 4.

28. Long. cod. سنه 352° 46' pro سمب 342° 20'.

III.

Constellationes ab austro zodiaci.

	Stellarum descriptio.	Longitudo.		Latitudo.		Plaga Caeli.	Magnitudo.	
Cetus (<i>qīṭos</i> « κῆτος » sive <i>sabu' al-baḥr</i> « bellua marina »).								
1	Quae est in extremitate nasi.	28°	50'	7°	45'	a	4	λ
2	Postrema e tribus quae sunt in gutture in extremitate maxillae.	28	50	12	20	a	3	α
3	Media ex iis, in medio oris.	23	50	11	30	a	3	γ
4	Praecedens e tribus quae sunt in barba.	21	40	14	0	a	3	δ
5	Quae est in fronte supra oculum.	21	20	8	10	a	4	ν
6	Australis lateris posterioris.	18	10	27	30	a	3	π
7	Media e tribus quae sunt in corpore.	3	10	25	20	a	3	τ
8	Borealis ex his tribus.	6	10	20	0	a	3	ζ
9	Posterior e duabus quae sunt in cauda.	0	50	15	20	a	3	θ
10	Anterior e duabus iis.	356	10	15	40	a	3	η
11	Borealis quae est in latere anteriore.	350	30	13	0	a	5 magna	
12	Borealis prope duas quae sunt in extremitate caudae.	345	50	9	40	a	3 parva	ι
13	Australis quae est in extremitate caudae.	346	50	20	20	a	3 magna	β
Orion (<i>al-ġabbār</i> « gigas »).								
1	Nebulosa quae est in capite.	68	10	16	30	a	nebulosa	λ
2	Lucida quae est supra humerum dexterum, et appellatur <i>mankib al-ġawzā'</i> « hu- « merus <i>al-ġawzā'</i> ».	73	10	17	0	a	1 parva	α

Cetus:

1. Magnitudo cod. ج 3 pro د 4.

4. Male lat. H. 14° 15'.

5. Long. B. 21° 30'; H. 22° 20' (quod, Schiaparelli teste, verius est); L. 21° 50'; S. 20° 30'. — Lat. cod. م 45' pro ی 10'.

9. Lat. ut L. et S.; B. et H. 15° 40'.

10. Long. cod. سمو 346° pro سنو 356°. — Lat. cod. ل 30' pro م 40'.

11. Magnitudo ut Pts.; L. 5; S. 5 parva vel 6 magna; Arg. 6. — Bailly: « I cannot identify this star of « the quadrilateral figure, alluded to by Ptolemy: in fact, the figure itself is not easily recognised, « so as to correspond with the description ».

12. Magnitudo cod. 3 magna, perperam enim in sequenti stella « parvam » pro « magna » scripsit. Pts., S. et Arg 3 parva; L. 3.

13. Long. cod. سمه 345° pro سمو 346°. — Lat. cod. م 40' pro ل 20'. — Magnitudo cod. 4 parva (cfr. nr. 12); Pts., L. et S. 3 magna; Arg.

2.

	Stellarum descriptio.	Longitudo.		Latitudo.		Plaga Caeli.	Magnitudo.	
3	Quae est in humero sinistro.	65°	10'	17°	30'	a	2 parva	γ
4	Stella sub hac quae est in humero sinistro.	66	10	18	0	a	4 parva	A
5	Quae est in cubito dextero.	75	30	14	30	a	4	μ
6	Borealis ex novem quae sunt in pelle manu sinistra gestata.	61	40	8	0	a	4	Fl. 15.
7	Sexta earum, in parte boreali.	56	0	15	50	a	3	π ¹
8	Septima, quae est post hanc in parte boreali.	56	0	17	10	a	3	π ³
9	Octava, quae est post eam in parte boreali.	56	30	20	20	a	3	π ⁵
10	Nona ex iis quae sunt in pelle, ipsaque est in parte australi et vocatur <i>al-miġlad</i> « flagellum ».	57	30	21	30	a	3	π ⁶
11	Praecedens e tribus quae sunt in zona.	66	30	24	10	a	2	δ
12	Media ex iis.	68	30	24	50	a	2	ε
13	Postrema e tribus quae sunt in zona.	69	20	25	40	a	2	ζ
14	Quae est prope capulum ensis.	65	0	25	50	a	3	η
15	Borealis ex tribus collectis quae sunt prope cuspidem ensis.	67	40	28	40	a	4	c
16	Media ex his tribus.	67	50	29	10	a	3 parva	θ ²
17	Praecedens et australis ex his tribus.	67	50	29	50	a	3	ι
18	Lucida quae est in extremitate pedis sinistri et appellatur <i>riġl al-ġawzā'</i> « pes <i>al-ġawzā'</i> ».	61	0	31	30	a	1	β
19	Stella a septentrionibus huius, supra maleolum.	62	10	30	15	a	4	τ
20	Externa sub talo sinistro.	64	30	31	10	a	4	e
21	Quae est sub genu dextero posteriore.	71	20	33	30	a	3 magna	κ

Orion:

4. Long. cod. J 20' pro 10'. — Lat. cod ح 8° pro 18°.

5. Male H. lat. 14° 20'.

9. Lat. cod. ك 21° pro 20°.

10. Nomen *al-miġlad* mihi aliunde ignotum et ex coniectura restitutum cod. الخلة. — Lat. cod. كط 29° pro 21°. — Magnitudo ut B., L et Pts.; H. 2; S. 4; Arg. 5 magna.

12. Lat. cod. J 30' pro 50'.

13. Magnitudo ut B., Pts., S. et Arg.; H. et L. 3.

15. Long. cod. 50' pro 40'. — Gradus lat. cod. J 20° pro 28°; minuta lat. ut L. et S; B. et H. 20'.

16. Long. ut B., L. et S.; male H. 64° 30'. — Minuta lat. ut B. et S.; H. 0'; L. 40'.

17. Long. ut S.; Pt. 68° 10'.

18. Long. ut B. et S.; male H. 62° 0', L. 60° 20'.

19. Magnitudo L., Pts. et S. 4 magna; Arg. 4.

21. Magnitudo ut Arg.; L. 3; Pts. et S. 3 parva.

	Stellarum descriptio.	Longitudo.		Latitudo.		Plaga Caeli.	Magnitudo.	
Eridanus (<i>an-nahr</i> « fluvius »).								
1	Quae est in extremitate pedis Orionis et in initio fluvii.	59°	30′	31°	50′	a	4 magna	λ
2	Lucida magna, quae est ultima stellarum fluvii.	11	20	53	30	a	1	θ
3	Sequens ex quatuor quae sunt in intervallo [ulteriore].	38	10	32	50	a	3	γ
4	Tertia ante mediam.	35	20	28	50	a	3	δ
5	Anterior ex quatuor.	33	10	28	0	a	3	ε
6	Postrema ex quatuor.	28	20	25	30	a	3	ζ
7	Tertia quae est ante hanc quartam.	23	20	23	30	a	3	η
8	Quae est in curvatura fluvii et in fine pectoris Ceti.	16	20	32	10	a	4	τ ¹
9	Borealis quae est in latere anteriore ex quatuor quae sunt in trapezio (?).	32	30	41	20	a	4	τ ⁶
10	Postrema ex his quatuor.	35	50	43	20	a	4	τ ⁹
11	Posterior e duabus quae sunt post curvaturam et appellatur التربة.	39	20	53	50	a	4	υ ⁵
12	Postrema e tribus quae sunt post has duas.	29	0	53	0	a	4	υ ³
13	Borealis e duabus inter se oppositis.	45	20	53	20	a	4	υ ⁶
14	Australis e duabus iis.	46	10	51	45	a	4	υ

Eridanus:

1. Long. cod. 69° pro 59°. — Lat. cod. 30° pro 31°. — Magnitudo L., Pts, S. et Arg. 4 (sine « magna »).
2. Long. ut B., L. et S.; H. incertus utrum 18° 50' an 358° 40'. — Lat. cod. 33° pro 53°. — Baily, cui Schiaparelli assentit, iure dicit: « Most of the commentators on Ptolemy's catalogue have « supposed this star to be *Achernar* (1): but neither the longitude nor latitude of any of the copies « will agree with the position of that star; and moreover *Achernar* was not visible at Alexandria. « The magnitude has probably changed since Ptolemy's time ». Est θ Eridani, 225 Lacaille.
3. Cod. « sequens quatuor », omitta particula من « ex ». — Lat. ut B., L. et S; H. 33° 10'.
6. Long. cod. 30' pro 20'.
7. Lat. ut quidam codices Graeci; L. et S 23° 50'; B. et H. 24° 30'.
9. Cod. الجوزا في quod non intelligo; fortasse الجواز في « in vado »? Pt. ἐν τραπεζίῳ.
11. Nomen cod. *at-turbah* significat « tumulum, sepulchrum »; sed lectio procul dubio falsa. L. « beemum ».
12. Minuta lat. ut B., L. et S; H. 10'.
13. Gradus lat. cod. 63° pro 53°, quos H. et S. habent; sed vera lectio est 50° 20' ut apud B. et L., atque ut e descriptione Ptolemaica patet.
14. Lat. cod. 50' pro 45'.

(1) I. e. α Eridani. Ita etiam Schjellerup.

	Stellarum descriptio.	Longitudo.		Latitudo.		Plaga Caeli.	Magnitudo.	
Lepus (<i>al-arnab</i>).								
1	Borealis in latere anteriore ex quatuor quae sunt in <i>dorso</i> .	60°	30′	35°	0′	a	5	ι
2	Borealis in latere posteriore ex iis.	62	30	35	40	a	5	ν
3	[Australis ex iis in latere anteriore].	61	0	36	30	a	5	κ
4	Quae est in mento.	60	20	39	15	a	4 magna	μ
5	Quae est ante extremitatem pedis anterioris sinistri.	57	20	45	15	a	4 magna	ε
6	Quae est in medio corporis.	67	0	41	30	a	3	α
7	Quae est sub ventre.	65	30	44	20	a	3	β
8	Borealis e duabus quae sunt in pedibus posterioribus.	72	10	44	0	a	4 magna	δ
9	Australis e duabus iis.	70	10	45	50	a	4 magna	γ
10	Quae est in dorso.	71	10	38	20	a	4 magna	ζ
11	Quae est in extremitate caudae.	73	50	38	10	a	4 magna	η
Canis maior (<i>al-kalb</i>).								
1	Stella quae est in auribus.	90	50	35	0	a	4	θ
2	Quae est in capite.	92	30	36	30	a	5	μ
3	Lucida quae est in ore Canis et vocatur <i>ash-shiʿrā al-yamāniyyah</i> .	88	50	39	10	a	1	α
4	Quae est in extremitate pedis anterioris.	82	10	41	20	a	3	β

Lepus:

- « In dorso » falsum est; Pt. ceterique « in auribus ». — Minuta long. cod. fortasse falsa; L. et S. 50'; B. et H. 10'.
- In columna nominum siderum scribe hanc stellam praetergressus est, sed eius numeros in columnis reliquis servavit. Unde factum est ut numeri reliquarum stellarum Leporis et priorum quinque Canis maioris non stellis suis sed stellis sequentibus convenirent. Ut veram congruentiam demum restitueret, insulsus scribe in columna nominum, inter quintam et sextam stellam Canis maioris falso inseruit: « Quae est in initio femoris dexteri ». Lacuna ita impleta, numeri et stellae sequentes inter se conveniunt. Textum Arabicum ut in cod. est edidi; in versione formam genuinam restitui.
- Long. cod. 61° pro 67°.
- Long. ut S.; B., H. et L. 66° 0'. — Lat. cod. 50' pro 20'; male H. 41° 20'.
- Lat. cod. 45' pro 50'.
- Lat. cod. 40' pro 20'.

Canis maior:

- Long. cod. 30' pro 50'. — De quinque prioribus stellis cfr. quae dixi ad nr. 3 Leporis.
- Long. cod. 108° pro 88°. — Lat. cod. 59° pro 39°.
- Long. cod. 102° pro 82°.

	Stellarum descriptio.	Longitudo.		Latitudo.		Plaga Caeli.	Magnitudo.	
5	Quae est in initio femoris sinistri.	97°	50'	48°	45'	a	3 parva	δ
6	Quae est sub ventre inter duo femora.	94	50	51	30	a	3	ε
7	Quae est in pede dextero.	80	50	53	45	a	3	ζ
8	Quae est in cauda.	103	20	50	40	a	3 parva	η
Et ex iis quae non sunt ei in figura:								
9	Posterior e duabus lucidis.	70	10	59	40	a	2	β Columbae.
10	Praecedens e duabus iis.	67	10	57	40	a	2	α Columbae.
Canis minor (<i>muqaddam al-kalb</i> « ante Canem positus, προκύων »).								
1	Quae est in collo.	96	10	14	0	a	4	β
2	Lucida quae est post eam, et appellatur <i>ash-shi'rā ash-sha'miyyah</i> .	100	20	16	10	a	1	α
[Desideratur in codice folium, quo continebantur stellae Navis atque Hydrae, et primae stellae Crateris].								
Reliquae stellae Crateris (<i>agrāfīros</i> « κρατήρ », sive <i>al-ka's</i> « poculum »).								
1	Quae est in labro boreali oris.	160	30	13	40	a	4	ε
2	Quae est in ansa australi.	170	20	16	10	a	4	η
3	Quae est in ansa boreali.	162	50	11	50	a	4	θ
Corvus (<i>al-ghurāb</i>).								
1	Quae est in rostro Corvi, prope Hydram (<i>ash-shuḡā</i>).	176	30	21	40	a	3	α

5. Male H lat. 48° 50'. — Magnitudo ut L.; Pts. et S. 3; Arg. 2.

7. Long. cod. ق 100° pro ف 80°.

8. Lat. cod. ل 30° pro ن 50°. — Magnitudo cod. « nebulosa parva »; L. et Pts. 3; S. 3 parva; Arg. 3 magna.

Canis minor:

1. Lat. cod. د 54° pro د 14°.

2. Minuta long. ut L. et S.; B. et H. 40'. — Lat. cod. ن 56° pro ي 16°.

Crater:

2. Long. cod. قعا 171° pro قع 170°. — Magnitudo ut L.; Pts. et S. 4 parva; Arg. 5.

3. Long. ut S.; B. 162° 30'; H. male 174° 20'; L. ...° 50'. — Lat. cod. ل 30' pro ن 50°. — Magnitudo cod. ه 5 pro د 4.

Corvus:

1. Long. cod. قفو 186° pro قعو 176°.

	Stellarum descriptio.	Longitudo.		Latitudo.		Plaga Caeli.	Magnitudo.	
2	Quae est in collo prope caput.	175°	30'	19°	40'	a	3	ε
3	Quae est in ala anteriore dextera.	174	40	14	50	a	3	γ
4	Praecedens e duabus quae sunt in ala posteriore.	177	50	12	30	a	3	δ
5	Posterior e duabus iis.	178	10	11	45	a	4	η
6	Quae est in extremitate pedis prope Hydram.	181	40	18	10	a	3	β
Centaurus (<i>Qinṭāwuros</i> sive imago hominis equique, et appellatur etiam <i>az-zulmān</i> « struthiocameli mares »).								
1	Australis e quatuor quae sunt in capite.	201	40	21	40	a	5 magna	g
2	Borealis ex iis.	201	10	18	50	a	5 magna	h
3	Praecedens e duabus mediis reliquis.	200	20	20	30	a	4 magna	i
4	Posterior ex his duabus, et est reliqua ex quatuor.	201	10	20	0	a	5 magna	k
5	Quae est in humero anteriore sinistro.	197	20	25	40	a	3	ι
6	Quae est in humero posteriore dextero.	206	50	22	30	a	3	θ
7	E duabus reliquis quae est in summo surculo.	213	10	18	15	a	4 magna	π
8	Praecedens e tribus quae sunt in latere dextero.	204	30	28	20	a	4 magna	τ
9	Media ex iis.	205	10	29	20	a	4 magna	υ
10	Posterior ex his tribus.	206	20	28	0	a	4 magna	φ
11	Quae est in brachio dextero.	207	30	26	30	a	4 magna	m
12	Quae est in parte anteriore brachii dexteri.	214	0	25	15	a	3	κ
13	Lucida quae est in initio lateris sinistri.	209	10	33	30	a	3	λ
14	Posterior ex obscuris a septentrionibus eius.	208	50	31	0	a	5	n
15	Praecedens ex obscuris a septentrionibus eius.	208	0	30	20	a	5	χ

2. Long. cod. قفح 188° pro قعه 175°.

4. Long. cod. ل 30' pro ن 50'.

5. Lat. cod. ن 50' pro ح 10'. — Magnitudo د 4 pro ح = ج 3.

Centaurus:

1. Long. cod. ل 20' pro م 40'.

1-4. Magnitudines ut Pts.; L. et S. « magnam » omittunt.

4. Cod. « et est secunda ex quatuor »; scilicet الباقي الثاني pro الباقي.

6. Long. cod. ل 30' pro ن 50'.

7. Magnitudo L., Pts. et S. 4, sine « magna ».

10. Magnitudo ut L. et Pts.; S. 4, sine « magna ».

13. Magnitudo ut S; L. et Pts. 3 magna.

14. Magnitudo cod. د 4 pro ه 5.

15. Male H. lat. 33° 0'

	Stellarum descriptio.	Longitudo.		Latitudo.		Plaga Caeli.	Magnitudo.	
16	Postrema e tribus quae sunt in dorso a dextera.	197°	0'	40°	0'	a	3	μ
17	Praecedens e duabus sibi invicem vicinis in femore dextero equi.	193	50	46	10	a	3	β
18	Praecedens e duabus quae sunt sub ventre equi.	207	30	43	0	a	2	
19	Posterior e duabus iis.	208	50	43	45	a	3	
20	Quae est in poplite dextero prope pedem.	201	10	51	10	a	2	v
21	Quae est in ungula pedis sinistri.	202	20	55	20	a	2	ζ
22	Lucida quae est in extremitate pedis dexteri anterioris et vocatur <i>riġl al-faras</i> « pes equi ».	199	30	41	10	a	1	α
23	Quae est in genu sinistro a parte pedis.	215	20	45	20	a	2	γ
24	Quae est in malleolo dextero.	206	30	51	40	a	2	ξ
25	Sexta ex iis quae sunt in pede posteriore dextero.	205	50	49	10	a	4	ε
26	Quae est sub medio poplitis sinistri.	197	30	55	10	a	4	f
Lupus (<i>as-sabu</i> ^c « bellua »).								
1	Quae est in extremitate pedis posterioris.	219	10	24	50	a	3	o

16. Long. cod. قَضَح 193° pro قَضَر 197°.

17. Long. cod. ل 30' pro ن 50'.

18. Long. cod. ل 20' pro ل 30'. — Baily, in adnotationibus ad Catalogum Ulugh Beg: « I cannot « identify this star ». Schjellerup e Centauri, quam Baily e contra putat nr. 25 Catalogi Albateniani respondere.

19. Šūfī p. 244 et 249 ait nullam hoc Caeli loco stellam exsistere. Baily, in adnotationibus ad Catalogum Ulugh Beg: « There is no star of any considerable magnitude near the spot indicated by Pto- « lemy, and unobserved by him [i. e. Ulugh Beg], except 1088 in Lacaille's catalogue; but neither « the longitude nor latitude will agree with Ptolemy's description or position ».

20. Reliqui Arabes eam *riġl qintāwuros* « pedem Centauri » vocant. — Long. ut L., sed ex errore in signo zodiacali provenit; legerunt enim 9° 30' Librae pro 9° 30' Scorpī (= 229° 30') ut B et S. habent. H. 4° 10' Scorpī (= 224° 10'). Errorem Albatenii et plurium codicum Almagesti memorat Šūfī p. 32, qui testatur in eundem illapsos esse auctores *Tabulae probatae*. — Male H. lat. 42° 20'.

23. Long. cod. ريو 216° 0' pro ريه 215° 20'.

24. Long. cod. رو 207° pro رو 206°.

25. Pt. ὁ ἔκτος ὑπὸ τὸν δεξιὸν ὀπισθιόποδα « quae extra [est], sub dextero pede posteriore »; sed versio qua al-Battānī usus est legerat in Graeco ἔκτος i. e. « sexta » (cfr. ad nr. 1 Coronae australis). Idem error H., qui vertit « la sixième ». — Magnitudo cod. و 6 pro د 4; B., H., Pts. et S. 4; L. 3. — Perperam Schjellerup θ Centauri, quae est nr. 6.

26. Magnitudo ut L. et Pts.; B. et H. 2; S. 3 parva; hodie 3. Situs Ptolemaicus magno errore affectus. Schjellerup stellam putat esse δ Crucis.

Lupus:

1. Nomen ut H. et S.; rectius B. non ὀπισθίου « posterioris » sed ἐμπροσθίου « anterioris ».

	Stellarum descriptio.	Longitudo.	Latitudo.	Plaga Caeli.	Magnitudo.	
2	Quae est in medio poplitis posterioris.	217° 0'	29° 10'	a	3	α
3	Borealis e tribus quae sunt in extremitate caudae.	214 10	29 20	a	4 magna	κ
4	Australis e duabus quae sunt in pede anteriore.	218 20	11 30	a	4 magna	ε
5	Borealis e duabus quae sunt in collo.	230 30	15 20	a	4 magna	μ
6	Borealis e duabus quae sunt in pede anteriore.	217 40	10 0	a	4 magna	δ
<i>Ara (al-miǧmarah « thuribulum » sive al-muriḥ « odores spargens »).</i>						
1	Borealis e duabus quae sunt in base thuribuli.	248 50	22 40	a	5	γ
2	Quae est in medio partis superioris i. e. in loco ignis.	247 20	26 30	a	4 magna	α
3	Australis e duabus sibi invicem proximis quae sunt in flamma.	246 20	34 10	a	4 magna	ζ
4	Quae est in extremitate flammae.	242 0	34 0	a	4	
5	[Australis e duabus quae sunt in base thuribuli.]	254 10	25 45	a	4	
<i>Corona australis (al-iklīl al-ǧanūbī).</i>						
1	Praecedens e sex quae sunt in curvatura australi.	260 20	21 30	a	4	α

2. Long. cod. روم 216° 40' pro رير 217° 0'.

4. Lat. ut L. et S.; B. et H. 11° 50'. — Magnitudo ut L.; Pts. 4; S. 6 parva.

6. Male H. long. 218° 40'. — Magnitudo ut L. et Pts.; S. 5 parva.

Ara (1):

2. Long. ut L. et S.; B. 247° 30'; H. 249° 30'.

4. Lat. ut L. et S.; B. et H. 34° 15'.

5. Scriptor cod. nomen stellae e neglegentia omisit. — Long. ut H.; B. 254° 20'; S. 251° 30' false; L 221° 30' (i. e. 11° 30' Scorpii loco Sagittarii). — Lat. cod. ك 21° pro ك 25°.

Corona australis:

1. Pt.: τῆς νοτίου περιφερείας ὁ προηγούμενος ἔκτος « peripheriae australis sexta praecedens ». Versiones Almagesti quibus S. et Ulugh Beg usi sunt, in Graeco ἐκτός « extra » pro ἔκτος legerant (cfr. ad nr. 25 Centauri): « praecedens extra peripheriam australem ».

(1) Litterae Bayer ad hanc constellationem pertinentes, teste Bailly in tabula erratorum (et p. 176, ad Catalogum Halleyanum stellarum australium), fere omnes « are prob bly erroneous and it is very difficult » to apply them correctly ». Schjellerup eas hoc modo indicat: σ, α, γ, ζ, θ. Numeri in Catalogo Lacaille (*Caelum australe stelliferum*, Parisiis 1763), iuxta Bailly, sunt: 1443, 1436, 1422, 1386, 1480 Lac.

	Stellarum descriptio.	Longitudo.		Latitudo.		Plaga Caeli.	Magnitudo.	
2	Quarta ex his sex.	266°	0'	20°	0'	a	4	β
3	Quae eam sequitur ante genu Sagittarii.	267	20	18	30	a	5	η
4	Lucida quae hanc sequitur a septentrionibus.	268	10	17	10	a	2	θ
5	Stella a septentrionibus huius lucidae.	268	0	16	0	a	4	γ
6	Praecedens e duabus obscuris.	265	50	14	50	a	6	ν
7	Reliqua e duabus obscuris.	263	0	14	40	a	5	ι
8	Stella quae hanc ipsam praecedit.	260	50	15	50	a	5	κ
9	Reliqua ab austro huius.	260	20	18	30	a	5	λ
Piscis australis (<i>al-hūt al-ġanūbī</i>).								
1	Quae est in ore Piscis in extremitate aquae.	...	..	..	..	..		α
2	[Praecedens e tribus in curvatura australi capitis.]	311	50	20	20	a	4	β
3	Quae hanc sequitur.	315	20	22	15	a	4	γ
4	Tertia postrema e tribus his praecedentibus.	316	30	22	30	a	4	δ
5	Quae est in gutture Piscis.	315	30	16	15	a	4 magna	ε
6	Australis quae est in spina dorsi australi.	306	20	19	30	a	5	μ
7	Posterior e duabus quae sunt in ventre.	312	20	15	10	a	5	ζ
8	Praecedens e duabus iis.	310	0	14	40	a	4	λ
9	Postrema e tribus quae sunt in spina dorsi boreali.	306	20	15	0	a	4	η
10	Media ex his tribus.	303	0	16	30	a	4	θ
11	Praecedens ex his tribus.	302	10	18	10	a	4	ι
12	Quae est in extremitate caudae.	301	20	22	15	a	4	κ

4. Magnitudo Pt. 4, S. 5; sed cfr. nr. 72 tabulae statuum fixarum ad annum 1211.

5. Long. cod. رعب 272° pro ربح 268° quae L. et S. habent; B. et H. 267° 30'.

7. Lat. ut H., L. et S.; B. 15° 50'.

8. Long. cod. ل 30' pro ن 50'.

9. Lat. cod. ن 50' pro ل 30'; B., H. et L. 18° 30'; S. 8° 0'.

Piscis australis:

1. Est α Piscis austr., quae iam in constellatione Aquarii, nr. 18, a Pt. et Albatenio descripta est. Itaque al-Battānī eius numeros hic omisit, ut quoque L. fecit. Scriptor cod., causam lacunae ignorans, numeros secundae stellae tribuit primae, et nomen secundae stultissime omisit, ne vacuum aliquid appareret.

3. Lat. cod. ی 10' pro ل 30'.

5. Lat. cod. ی 10' pro یه 15'. — Magnitudo L., Pts., S. et Arg. 4, sine « magna ».

6. Lat. cod. ط 9° pro ط = یط 19°.

7. Male H. long. 313° 20'. — Magnitudo cod. د 4 pro ه 5 (S. 6 parva).

8. Magnitudo cod. ج 3 pro د 4 (S. 5 parva).

9. Lat. cod. یب 12° pro یه 15°.

	Stellarum descriptio.	Longitudo.	Latitudo.	Plaga Caeli.	Magnitudo.
	Et ex iis quae non sunt ei in figura:				
13	Praecedens e tribus lucidis.	289° 10′	22° 20′	a	3 parva
14	Media ex his tribus.	292 20	22 10	a	3 parva
15	Postrema ex his tribus.	295 10	21 0	a	3 parva
16	Obscura quae est ante eam.	293 10	20 50	a	5

- 13-16. Quatuor hae stellae, quae re vera ad quintam magnitudinem pertinent, a S. et Ulugh Beg aspectae non sunt, et in catalogis omissae. — Nr. 13 est fortasse 1694 Lacaille; nr. 14 fortasse 1717 Lac. nr. 16 fortasse 1704 Lac. — Long. nr. 14 in cod. رصَب ى 262° 10' pro رَضَب ى 292° 20'. — Lat. nr. 15 ut L.; B. et H. 21° 10'. Magnitudo cod. 4 pro 3 = 3. — Magnitudo nr. 16 in cod. 4 pro 5.