

Topologi Aljabar — Roberts 30/30 dan Fomberg 1.1–1.13

Komponen Roberts lengkap; jembatan Fomberg melalui homologi seluler; checkpoint komposit parsial

David Michael Roberts (materi sumber Roberts)
Yeheli Fomberg (catatan sumber Fomberg; berdasarkan kuliah Nir Lazarovich)
Edisi Bahasa Indonesia dengan pendamping penguasaan

26 Agustus 2026

Daftar Isi

Status pembaca komposit	10
Tentang unit ini	10
1 Kuliah 1	10
1.1 Apa yang dipelajari oleh topologi aljabar?	10
1.2 Ruang topologis	11
Pendamping penguasaan terpecahkan	13
1.3 Solusi Latihan 1.1	13
1.4 Solusi Latihan 1.2	13
1.5 Pemeriksaan Lema 1.1	14
1.6 Contoh terpecahkan: penciutan radial	14
Tentang unit ini	14
2 Kuliah 2	15
2.1 Kelanjutan topologi awal	15
2.2 Topologi akhir dan ruang hasil bagi	15
2.3 Gabungan saling lepas dan sifat universalnya	16
2.4 Sampul dan lema perekatan	17
2.5 Homotopi dan kontraktibilitas	18
Pendamping penguasaan terpecahkan	20
2.6 Solusi Latihan 2.1	20
2.7 Bukti lengkap Lema 2.1	21
2.8 Solusi Latihan 2.2	21
2.9 Solusi Latihan 2.3	21
2.10 Solusi Latihan 2.4	22
2.11 Solusi Latihan 2.5	22
2.12 Bukti Lema 2.3	22
2.13 Solusi Latihan 2.6	22
2.14 Solusi Latihan 2.7	23
2.15 Jawaban Pertanyaan 2.1	23
Tentang unit ini	24

3 Kuliah 3	24
3.1 Komponen terhubung dan himpunan π_0	24
3.2 Homotopi dan ekuivalensi homotopi	25
3.3 Kategori dan functor	27
3.4 Kategori homotopi	30
Pendamping penguasaan: solusi lengkap	30
3.5 Solusi Latihan 3.1	30
3.6 Solusi Latihan 3.2	31
3.7 Pemeriksaan Contoh 3.2	31
3.8 Solusi Latihan 3.3	31
3.9 Bukti Proposisi 3.2	31
3.10 Solusi Latihan 3.4	32
3.11 Solusi Latihan 3.5	32
Tentang unit ini	33
4 Kuliah 4	33
4.1 Functor pada kategori homotopi	33
4.2 Ruang terhubung lintasan semilokal	36
4.3 Ruang dan homotopi bertitik	37
4.4 Ruang penutup	38
Pendamping penguasaan: solusi lengkap	39
4.5 Solusi Latihan 4.1	39
4.6 Bukti Lema 4.1	40
4.7 Solusi Latihan 4.2	40
4.8 Solusi Latihan 4.3	41
4.9 Jawaban Pertanyaan 4.1	41
4.10 Solusi Latihan 4.4	41
Tentang unit ini	42
5 Kuliah 5	43
5.1 Serat ruang penutup di sepanjang lintasan	43
5.2 Tarik balik ruang penutup	44
5.3 Ruang penutup dari interval	45
5.4 Pengangkatan lintasan dan transpor serat	47
Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap	49
5.5 Solusi Pemeriksaan 5.1	49
5.6 Solusi Pemeriksaan 5.2	49
5.7 Bukti Lema 5.1	50
5.8 Solusi Pemeriksaan 5.3	51
5.9 Solusi Pemeriksaan 5.4	51
Tentang unit ini	52
6 Kuliah 6	52
6.1 Loop dan aksi pada serat	52
6.2 Topologi kompak-terbuka pada ruang lintasan	54
6.3 Kekontinuan operator pengangkatan	55
6.4 Ruang terhubung sederhana semilokal	58
Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap	59

6.5 Solusi Pemeriksaan 6.1	60
6.6 Solusi Pemeriksaan 6.2	60
6.7 Solusi Pemeriksaan 6.3	62
6.8 Solusi Pemeriksaan 6.4	62
Bukti mandiri Teorema 6.2 untuk kasus yang digunakan	63
Tentang unit ini	64
7 Kuliah 7	64
7.1 Konkatensi dan transpor serat	64
7.2 Hukum grup hingga homotopi	65
7.3 Grup fundamental dan serat ruang penutup	69
7.4 Fungtorialitas ruang loop dan grup fundamental	70
Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap	70
7.5 Solusi Pemeriksaan 7.1	70
7.6 Solusi Pemeriksaan 7.2	71
7.7 Solusi Pemeriksaan 7.3	71
7.8 Solusi Pemeriksaan 7.4	72
Tentang unit ini	74
8 Kuliah 8	74
8.1 Dari transpor lintasan menuju grupoid	74
8.2 Grupoid fundamental	76
8.3 Ruang terhubung sederhana	78
Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap	80
8.4 Solusi Latihan Sumber 8.1	80
8.5 Solusi Pemeriksaan 8.2	81
8.6 Solusi Pemeriksaan 8.3	82
8.7 Solusi Pemeriksaan 8.4	83
8.8 Solusi Pemeriksaan 8.5	84
Tentang unit ini	85
9 Kuliah 9	85
9.1 Ruang penutup menginduksi fungtor setia	85
9.2 Trivialitas penutup di sepanjang interval	86
9.3 Sifat pengangkatan homotopi	89
9.4 Serat sebagai ruang koset	91
Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap	91
9.5 Solusi Latihan Sumber 9.1	91
9.6 Solusi Pemeriksaan 9.2	92
9.7 Solusi Pemeriksaan 9.3	92
9.8 Solusi Pemeriksaan 9.4	93
9.9 Solusi Pemeriksaan 9.5	94
Tentang unit ini	95
10 Kuliah 10	96
10.1 Menuntaskan deskripsi serat sebagai ruang koset	96
10.2 Baji ruang bertitik	99
10.3 Penutup tiga lembaran yang mendeteksi nonkomutativitas	100

Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap	102
10.4 Solusi Pemeriksaan 10.1	102
10.5 Solusi Pemeriksaan 10.2	103
10.6 Solusi Pemeriksaan 10.3	104
10.7 Solusi Pemeriksaan 10.4	105
10.8 Solusi Pemeriksaan 10.5	106
Tentang unit ini	106
11 Kuliah 11	107
11.1 Grup bebas dan produk bebas	107
11.2 Pushout dalam suatu kategori	108
11.3 Teorema Seifert–van Kampen dalam bentuk grupoid	111
11.4 Konstruksi functor universal: bagian pertama bukti	111
11.4.1 Fungsi pada objek	112
11.4.2 Fungsi pada lintasan yang berada dalam satu anggota sampel	112
11.4.3 Lintasan umum dan subdivisi	113
11.4.4 Pemanasan: dua lintasan batas sebuah persegi	114
Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap	115
11.5 Solusi Pemeriksaan 11.1	115
11.6 Solusi Pemeriksaan 11.2	116
11.7 Solusi Pemeriksaan 11.3	117
Tentang unit ini	117
12 Kuliah 12	118
12.1 Menuntaskan bukti Seifert–van Kampen	118
12.1.1 Penurunan ke kelas homotopi	119
12.1.2 Pembatasan dan keunikan	120
12.2 Persegi komutatif dan retrak	121
12.3 Dari pushout grupoid ke pushout grup	123
12.4 Contoh: grup fundamental sfera	125
Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap	126
12.5 Solusi Pemeriksaan 12.1	126
12.6 Solusi Pemeriksaan 12.2	127
12.7 Solusi Pemeriksaan 12.3	128
12.8 Solusi Pemeriksaan 12.4	128
Tentang unit ini	129
13 Kuliah 13	130
13.1 Produk bebas dengan amalgamasi	130
13.2 Pushout grupoid sebagai kata panah	132
13.3 Contoh lingkaran	134
13.4 Grup fundamental baji	136
13.5 Kompleks presentasi	137
13.6 Mengklasifikasikan ruang pelapis	140
Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap	140
13.7 Solusi Pemeriksaan 13.1	140
13.8 Solusi Pemeriksaan 13.2	141
13.9 Solusi Pemeriksaan 13.3	141
13.10 Solusi Pemeriksaan 13.4	142

13.11Solusi Pemeriksaan 13.5	143
13.12Solusi Pemeriksaan 13.6	143
Tentang unit ini	144
14 Kuliah 14	144
14.1 Pemetaan ruang penutup dan transformasi natural	145
14.2 Dua ruang penutup lingkaran	146
14.3 Mereduksi pertanyaan klasifikasi	147
14.4 Memilih satu titik pada setiap komponen	148
14.5 Memisahkan komponen dan aksi grup	149
14.6 Hipotesis untuk langkah berikutnya	151
Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap	151
14.7 Solusi Pemeriksaan 14.1	151
14.8 Solusi Pemeriksaan 14.2	152
14.9 Solusi Pemeriksaan 14.3	152
14.10Solusi Pemeriksaan 14.4	153
14.11Solusi Pemeriksaan 14.5	153
14.12Solusi Pemeriksaan 14.6	154
Tentang unit ini	154
15 Kuliah 15	155
15.1 Memisahkan ruang penutup menurut komponen basis	155
15.2 Komponen terhubung dan contoh lingkaran	157
15.3 Orbit serat dan koset kanan	158
15.4 Reduksi ke ruang penutup terhubung dan aksi transitif	159
15.5 Pertanyaan realisasi subgrup	160
Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap	161
15.6 Solusi Pemeriksaan 15.1	161
15.7 Solusi Pemeriksaan 15.2	161
15.8 Solusi Pemeriksaan 15.3	162
15.9 Solusi Pemeriksaan 15.4	162
15.10Solusi Pemeriksaan 15.5	163
15.11Solusi Pemeriksaan 15.6	163
15.12Solusi Pemeriksaan 15.7	164
Tentang unit ini	164
16 Kuliah 16	165
16.1 Aksi serat demi serat dan hasil bagi ruang penutup	165
16.2 Aksi kiri hasil bagi dan monodromi kanan	166
16.3 Konstruksi himpunan kelas lintasan dan topologi basis	167
16.4 Realisasi subgrup dan semua representasi	170
Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap	172
16.5 Solusi Pemeriksaan 16.1	172
16.6 Solusi Pemeriksaan 16.2	173
16.7 Solusi Pemeriksaan 16.3	173
16.8 Solusi Pemeriksaan 16.4	174
16.9 Solusi Pemeriksaan 16.5	174
16.10Solusi Pemeriksaan 16.6	175

Tentang unit ini	175
17 Kuliah 17	176
17.1 Keunikan pemetaan ke ruang penutup	176
17.2 Kepenuhan dan teorema klasifikasi	177
17.3 Grup homotopi lebih tinggi	179
17.4 Model sfera, kubus, dan cakram	179
17.5 Adjungsi loop dan struktur grup	180
17.6 Argumen Eckmann–Hilton yang bertipe tepat	181
17.7 Grup topologis dan loop teriterasi	182
Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap	183
17.8 Solusi Pemeriksaan 17.1	183
17.9 Solusi Pemeriksaan 17.2	184
17.10 Solusi Pemeriksaan 17.3	184
17.11 Solusi Pemeriksaan 17.4	185
17.12 Solusi Pemeriksaan 17.5	186
17.13 Solusi Pemeriksaan 17.6	186
Tentang unit ini	187
18 Kuliah 18	187
18.1 Fungtorialitas dan contoh awal	187
18.2 Transpor grup homotopi sepanjang lintasan	188
18.3 Hasil kali dan invariansi homotopi	190
18.4 Bundel serat dan bundel Hopf kompleks	193
18.5 Barisan eksak	194
18.6 Barisan eksak panjang bundel serat	195
18.7 Penerapan pada ruang penutup	196
18.8 Penerapan pada bundel Hopf kompleks	197
Pendamping penguasaan: pemeriksaan, petunjuk, dan solusi lengkap	199
Tentang unit ini	205
19 Kuliah 19	205
19.1 Bundel hasil bagi grup Lie	205
19.2 Ekuivalensi homotopi lemah	208
19.3 Penggantian SLPC	209
19.4 Kompleks dan motivasi karakteristik Euler	211
19.5 Morfisma kompleks	213
19.6 Keeksakan kalkulus vektor dan informasi topologis	215
19.7 Graf berarah dan kompleksnya	216
Pendamping penguasaan: pemeriksaan, petunjuk, dan solusi lengkap	218
Tentang unit ini	225
20 Kuliah 20	226
20.1 Contoh konkret kompleks graf	226
20.2 Permukaan kombinatorik dan kompleks dua dimensi	230
20.3 Dari ruang ke kompleks: gagasan besar dan batas unit	236
Pendamping penguasaan: pemeriksaan, petunjuk, dan solusi lengkap	236

Tentang unit ini	241
21 Kuliah 21	242
21.1 Kohomologi permukaan kombinatorik	242
21.2 Dua upaya merealisasikan graf	243
21.3 Simpleks standar dan pemetaan inklusi	244
21.4 Realisasi geometrik dan triangulasi	245
Pendamping penguasaan: pemeriksaan, petunjuk, dan solusi lengkap	246
Tentang unit ini	250
22 Kuliah 22	250
22.1 Pemetaan permukaan kombinatorik	250
22.2 Himpunan-Delta dan kerangka	254
22.3 Realisasi dan triangulasi dalam semua dimensi	255
22.4 Triangulasi prisma	257
22.5 Kompleks korantai dan perubahan koefisien	258
Pendamping penguasaan: pemeriksaan, petunjuk, dan solusi lengkap	261
Tentang unit ini	264
23 Kuliah 23	265
23.1 Pemetaan nama dan evaluasi korantai	265
23.2 Gabungan saling lepas dan produk	267
23.3 Perekatan dua sub-himpunan- Δ	269
23.4 Fungsi tereduksi pada sebuah hasil bagi	271
Pendamping penguasaan: pemeriksaan, petunjuk, dan solusi lengkap	273
Tentang unit ini	277
24 Kuliah 24	277
24.1 Kelanjutan contoh pasangan dan hasil bagi	277
24.2 Kernel morfisma kompleks dan korantai relatif	278
24.3 Prinsip aljabar homologis	279
24.4 Lema Ular	280
24.5 Diagram persiapan	283
24.6 Bukti teorema dan penyambungan	284
24.7 Kealamian	285
Pendamping penguasaan: pemeriksaan, petunjuk, dan solusi lengkap	286
Tentang unit ini	289
25 Kuliah 25	290
25.1 Kohomologi relatif dan kerangka atas	290
25.2 Barisan eksak panjang kohomologi relatif	291
25.3 Lema Lima	294
25.4 Karakteristik Euler dari modul kohomologi	296
25.5 Pemeriksaan penguasaan	298
Tentang unit ini	302
26 Kuliah 26	302

26.1 Dari realisasi geometrik menuju simpleks singular	302
26.2 Kompleks korantai singular	303
26.3 Kohomologi relatif dan tereduksi	305
26.4 Koproduk ruang	307
26.5 Invariansi homotopi	308
26.6 Pemeriksaan penguasaan	311
Tentang unit ini	314
27 Kuliah 27	315
27.1 Derajat nol tanpa memilih titik dasar	315
27.2 Korantai kecil untuk suatu sampel terbuka	318
27.3 Barisan eksak panjang Mayer–Vietoris	321
27.4 Kohomologi sfera	323
27.5 Pemeriksaan penguasaan lanjutan	324
Tentang unit ini	327
28 Kuliah 28	328
28.1 Menyelesaikan perhitungan kohomologi sfera	328
28.2 Invariansi dimensi ruang Euklides	329
28.3 Eksisi dan kohomologi hasil bagi	329
28.4 Hasil bagi kerangka dan baji sfera	331
28.5 Peta pembanding singular–simpleksial	333
28.6 Pemeriksaan penguasaan	333
Tentang unit ini	336
29 Kuliah 29	337
29.1 Kealamian peta pembanding	337
29.2 Perbandingan relatif pada kerangka	337
29.3 Teorema perbandingan	338
29.4 Kompleks CW	339
29.5 Pasangan CW dan kategori homotopi	341
29.6 Karakterisasi Eilenberg–Steenrod	341
29.7 Pemeriksaan penguasaan	342
Tentang unit ini	345
30 Kuliah 30	345
30.1 Tiga penerapan klasik	345
30.2 Teorema titik tetap Brouwer	345
30.3 Teorema dasar aljabar	347
30.4 Derajat dan teorema sfera berbulu	348
30.5 Pemeriksaan penguasaan	351
Komponen Fomberg O012-FOM-001	353
Tentang komponen ini	353
31 Homologi	353
31.1 Kompleks- Δ	353
31.2 Homologi simpleksial	357
Lapisan penguasaan edisi	361

Komponen Fomberg O012-FOM-002	363
Tentang komponen ini	364
32 Homologi singular dan invariansi homotopi	364
32.1 Homologi singular	364
32.2 Invariansi homotopi	369
Lapisan penguasaan edisi	374
Komponen Fomberg O012-FOM-003	377
Tentang komponen ini	378
33 Barisan eksak dan homologi relatif	378
33.1 Barisan eksak	378
Audit koreksi sumber	384
33.2 Homologi relatif	385
33.3 Pemeriksaan penguasaan	395
Komponen Fomberg O012-FOM-004	399
Tentang komponen ini	399
34 Eksisi, Mayer–Vietoris, Kealamian, dan Pembandingan Homologi	399
34.1 Eksisi	399
34.2 Mayer–Vietoris	412
34.3 Kealamian	415
34.4 Homologi simpleksial versus homologi singular	417
34.5 Pemeriksaan penguasaan	421
Komponen Fomberg O012-FOM-005	425
Tentang komponen ini	425
35 Derajat Pemetaan dan Derajat Lokal	426
35.1 Derajat pemetaan	426
35.2 Teorema sfera berbulu	429
35.3 Derajat lokal	430
35.4 Pemeriksaan penguasaan	435
Komponen Fomberg O012-FOM-006	438
Tentang komponen ini	439
36 Kompleks Seluler	439
36.1 Kerangka, sel, dan dua jenis peta	439
36.2 Kompleks CW berdimensi rendah dan tak berhingga	441
36.3 Contoh dan noncontoh	442
36.4 Pemeriksaan penguasaan	447
Komponen Fomberg O012-FOM-007	452
Tentang komponen ini	452
37 Homologi Seluler	452
37.1 Perbaikan FOM-PR-13: stabilisasi untuk kompleks CW sebarang	453

37.2 Perbaikan FOM-PR-14: teorema homologi seluler	455
37.3 Perbaikan FOM-PR-15: rumus bilangan insidensi	458
37.4 Pemeriksaan penguasaan	466
37.5 Extras before cohomology	472

Status pembaca komposit

Checkpoint ini memuat komponen Roberts lengkap 30/30 serta jembatan Fomberg Bagian 1.1–1.13 dalam urutan sumber, sampai baris sumber 4185. Fomberg O012-FOM-007 menerjemahkan Bagian 1.13 (homologi seluler), baris 3518–4185, dan dipetakan ke D60-R12. Komponen Fomberg bukan kuliah Roberts tambahan dan tidak mengubah penomoran tiga puluh kuliah Roberts. Jalur komposit masih parsial karena lapisan penguasaan lintas-rute, laboratorium, dan capstone belum selesai; kursor sumber berikutnya tepat pada baris 4186.

Pembaca terpadu ini tersedia di bawah CC BY-SA 4.0. Materi Roberts tetap diidentifikasi sebagai CC BY 4.0 dan materi Fomberg sebagai CC BY-SA 4.0, dengan atribusi, catatan perubahan, dan pernyataan non-pengesahan masing-masing. Edisi ini independen. HTML mandiri dengan MathML asli adalah permukaan akses utama yang reflow; PDF A4 adalah permukaan cetak sekunder dan belum ditag secara struktural.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi Bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya `Notes.tex` baris 134–348 pada commit `b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53`. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#). Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, pemindahan satu latihan dari catatan pinggir ke blok latihan, penjelasan kasus keluarga kosong pada topologi awal, dan koreksi identitas invers sumber dari $g \circ f = \text{id}_X$ dan $g \circ f = \text{id}_Y$ menjadi $g \circ f = \text{id}_X$ dan $f \circ g = \text{id}_Y$. Materi pendamping penguasaan setelah teks inti ditulis khusus untuk edisi ini dan juga tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

1 Kuliah 1

1.1 Apa yang dipelajari oleh topologi aljabar?

Topologi aljabar mempelajari pemetaan

$$\{\text{Ruang}\} \longrightarrow \{\text{Objek aljabar}\},$$

atau, lebih tepatnya, pemetaan semacam itu yang “berperilaku baik”. Pemetaan tersebut juga harus mengirim fungsi kontinu antarruang ke pemetaan aljabar dengan tetap menghormati komposisi (jadi, pemetaan itu berupa *functor*). Selain itu, ruang yang dibangun dari ruang-ruang yang lebih sederhana semestinya dikirim ke objek aljabar yang dibangun secara serasi dari komponen-komponen yang lebih sederhana.

Di sini, “ruang” secara kasar berarti ruang topologis hingga deformasi—biasanya hingga homotopi, meskipun tidak selalu demikian. Kelas-kelas ekuivalensi semacam ini disebut *tipe homotopi*. “Objek aljabar” dapat berarti grup (abelian), gelanggang, modul, atau bahkan kompleks rantai dari objek-objek tersebut.

Catatan. Kompleks rantai adalah suatu jenis barisan pemetaan tertentu, $\cdots \rightarrow V_0 \rightarrow V_1 \rightarrow V_2 \rightarrow \cdots$.

Contoh 1.1. Bagaimana kita dapat menentukan apakah permukaan bola S^2 dan torus $S^1 \times S^1$ dapat dideformasikan satu sama lain? Bagaimana kita membuktikan bahwa deformasi semacam itu tidak mungkin?

Contoh 1.2. Sebagai contoh positif, kita *dapat* menciutkan $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\} \rightarrow S^2 \hookrightarrow \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ dengan mengirim $x \mapsto \frac{x}{|x|}$. Pemetaan komposit ini dapat dideformasikan secara kontinu menjadi pemetaan identitas. Jadi, dimensi tidak selalu dipertahankan.

Contoh 1.3. Mungkinkah $S^1 \sim S^2$?

Pertama-tama kita perlu memahami bagaimana ruang dibangun.

1.2 Ruang topologis

Ingat kembali definisi berikut.

Prasyarat sumber. Topologi dan Analisis III.

Definisi 1.1 (topologi). Suatu *topologi* pada himpunan X adalah koleksi $\mathcal{T}$ yang terdiri atas subset-subset X dan memenuhi:

1. $\emptyset, X \in \mathcal{T}$;
2. jika $U, V \in \mathcal{T}$, maka $U \cap V \in \mathcal{T}$;
3. jika $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ adalah sembarang keluarga himpunan dalam $\mathcal{T}$, maka $\bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha \in \mathcal{T}$.

Di sini I adalah himpunan indeks. Jika $U \in \mathcal{T}$, kita mengatakan bahwa U *terbuka*. Suatu *ruang topologis* adalah himpunan X yang dilengkapi dengan topologi $\mathcal{T}$.

Contoh 1.4. Pada himpunan bilangan real, *topologi Euklides* (atau topologi “biasa”) didefinisikan dengan menyatakan bahwa suatu himpunan terbuka jika dan hanya jika himpunan itu merupakan gabungan selang-selang terbuka (a, b) . Gabungan kosong juga diperbolehkan dan menghasilkan $\emptyset$.

Topologi diskret pada himpunan X diperoleh dengan mengambil $\mathcal{T}$ sebagai koleksi semua subset X . *Topologi indiskret* diperoleh dengan mengambil $\mathcal{T} = \{\emptyset, X\}$.

Definisi tersebut ringkas, tetapi bukan selalu cara terbaik untuk mendefinisikan topologi. Kita juga akan menggunakan *lingkungan*.

Definisi 1.2 (lingkungan). Dalam topologi $\mathcal{T}$ pada X , suatu himpunan $N \subseteq X$ disebut *lingkungan* dari titik $x \in X$ jika terdapat himpunan terbuka $U \subseteq N$ dengan $x \in U$.

Contoh 1.5. Ambil $\mathbb{R}$ dengan topologi Euklides. Himpunan $(-1, 1)$, $[-1, 1]$, dan $[-1, 1)$ semuanya merupakan lingkungan dari setiap $-1 < x < 1$, tetapi $[0, 1)$ bukan lingkungan dari 0. Sebagai contoh yang sedikit lebih rumit, $[0, 1] \cup \{2\} \cup [5, 6]$ merupakan lingkungan dari setiap $0 < x < 1$ dan setiap $5 < x < 6$.

Contoh 1.6. Misalkan (X, d) adalah ruang metrik. *Topologi metrik* didefinisikan dengan menyatakan bahwa subset $U \subseteq X$ terbuka jika dan hanya jika, untuk setiap $x \in U$, terdapat $\varepsilon_x > 0$ sehingga bola terbuka $B(x, \varepsilon_x) \subseteq U$. Bola terbuka yang berpusat di x merupakan lingkungan dari x ; demikian pula bola tertutup berjari-jari positif.

Pendekatan berikut lebih konkret dan memungkinkan kita mendefinisikan topologi secara ringkas.

Definisi 1.3 (basis lingkungan). Suatu *basis lingkungan* $\mathcal{N}$ pada himpunan X adalah keluarga $\{\mathcal{N}(x)\}_{x \in X}$, dengan setiap $\mathcal{N}(x)$ merupakan koleksi tak kosong yang terdiri atas subset-subset X , sehingga untuk setiap $x \in X$ berlaku:

1. untuk setiap $N \in \mathcal{N}(x)$, berlaku $x \in N$;
2. untuk setiap $N_1, N_2 \in \mathcal{N}(x)$, terdapat $N \in \mathcal{N}(x)$ dengan $N \subseteq N_1 \cap N_2$;
3. untuk setiap $N \in \mathcal{N}(x)$, terdapat subset $U \subseteq N$ sehingga $x \in U$ dan, untuk setiap $y \in U$, terdapat $V \in \mathcal{N}(y)$ dengan $V \subseteq U$.

Himpunan-himpunan dalam $\mathcal{N}(x)$ disebut *lingkungan dasar* dari x .

Sebagai contoh, jika $(X, \mathcal{T})$ adalah ruang topologis, kita memperoleh basis lingkungan dengan mendefinisikan $\mathcal{N}(x)$ sebagai koleksi semua lingkungan dari x . Kita juga memperoleh basis lingkungan dengan mendefinisikan $\mathcal{N}'(x)$ sebagai koleksi semua himpunan terbuka yang memuat x .

Jika $\mathcal{N}$ adalah basis lingkungan pada X , definisikan subset $U \subseteq X$ sebagai $\mathcal{N}$ -terbuka jika dan hanya jika, untuk setiap $x \in U$, terdapat $N \in \mathcal{N}(x)$ dengan $N \subseteq U$.

Proposisi 1.1. Himpunan-himpunan $\mathcal{N}$ -terbuka membentuk suatu topologi pada X .

Bukti. Kita memeriksa ketiga aksioma topologi.

1. Syarat bahwa $\emptyset$ bersifat $\mathcal{N}$ -terbuka benar secara vakum. Karena $\mathcal{N}(x)$ tidak kosong, di setiap titik terdapat lingkungan dasar; akibatnya X bersifat $\mathcal{N}$ -terbuka.
2. Misalkan U dan V keduanya $\mathcal{N}$ -terbuka. Ambil $x \in U \cap V$. Terdapat $N_U, N_V \in \mathcal{N}(x)$ dengan $N_U \subseteq U$ dan $N_V \subseteq V$. Selain itu, $x \in N_U \cap N_V$. Jadi terdapat $N \in \mathcal{N}(x)$ dengan $N \subseteq N_U \cap N_V \subseteq U \cap V$. Hal ini berlaku untuk setiap $x \in U \cap V$, sehingga $U \cap V$ bersifat $\mathcal{N}$ -terbuka.
3. Misalkan setiap U_α , $\alpha \in I$, bersifat $\mathcal{N}$ -terbuka, dan tetapkan $U = \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha$. Ambil $x \in U$. Ada α_0 dengan $x \in U_{\alpha_0}$. Karena U_{α_0} bersifat $\mathcal{N}$ -terbuka, terdapat lingkungan dasar N dari x dengan $N \subseteq U_{\alpha_0} \subseteq U$. Maka U bersifat $\mathcal{N}$ -terbuka. $\square$

Topologi pada proposisi ini disebut topologi yang *dibangkitkan oleh $\mathcal{N}$* . Lingkungan dalam topologi ini adalah himpunan yang memuat suatu lingkungan dasar: V merupakan lingkungan dari x jika terdapat $N \in \mathcal{N}(x)$ dengan $N \subseteq V$.

Dengan basis lingkungan $\mathcal{N}$ pada X , kita dapat mengenali *penutupan* suatu himpunan $S \subset X$ sebagai koleksi titik $x \in X$ yang memenuhi: untuk setiap $N \in \mathcal{N}(x)$, terdapat $s \in N \cap S$.

Contoh 1.7. Pada ruang metrik (X, d) , bola-bola terbuka membentuk basis lingkungan pada X , dan topologi yang dibangkitkannya adalah topologi metrik.

Dengan demikian, banyak definisi yang dikenal dari ruang metrik tetap berlaku untuk ruang topologis asalkan dapat dirumuskan menggunakan lingkungan dasar. Salah satu yang terpenting adalah kontinuitas.

Definisi 1.4 (kontinuitas). Misalkan $\mathcal{N}_X$ dan $\mathcal{N}_Y$ masing-masing merupakan basis lingkungan pada himpunan X dan Y . Fungsi $f: X \rightarrow Y$ disebut *kontinu* jika, untuk setiap $x \in X$ dan $N \in \mathcal{N}_Y(f(x))$, himpunan $f^{-1}(N)$ memuat suatu lingkungan dasar dari x .

Definisi ini merupakan perumuman besar dari definisi kontinuitas ε - δ .

Latihan 1.1. Buktikan bahwa jika $f: (X, \mathcal{N}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{N}_Y)$ kontinu menurut definisi di atas, maka f kontinu untuk topologi yang dibangkitkan oleh basis lingkungan pada X dan Y .

Ingat bahwa kontinuitas untuk topologi berarti $f^{-1}(U)$ terbuka untuk setiap himpunan terbuka U .

Sebagai pemeriksaan kewajaran, fungsi identitas id_X pada ruang X memang kontinu. Setiap fungsi *menuju* ruang indiskret juga kontinu, demikian pula setiap fungsi *dari* ruang diskret.

Definisi 1.5 (homeomorfisma). Fungsi kontinu $f: X \rightarrow Y$ disebut *homeomorfisma* jika terdapat fungsi kontinu $g: Y \rightarrow X$ dengan $g \circ f = \text{id}_X$ dan $f \circ g = \text{id}_Y$. Dalam keadaan ini, X dan Y disebut *homeomorfik*.

Sekarang kita perlu menjelaskan cara membangun ruang baru serta pemetaan kontinu yang menghubungkannya dengan ruang asal.

Definisi 1.6 (topologi awal). Misalkan X adalah himpunan; $(Y_\alpha, \mathcal{N}_\alpha)$, $\alpha \in I$, adalah keluarga himpunan yang dilengkapi basis lingkungan; dan $f_\alpha: X \rightarrow Y_\alpha$ adalah keluarga fungsi. *Topologi awal* pada X dibangkitkan oleh basis lingkungan berikut: suatu himpunan bagian $B \subseteq X$ merupakan lingkungan dasar dari x jika dan hanya jika B berbentuk

$$f_{\alpha_1}^{-1}(N_1) \cap \cdots \cap f_{\alpha_k}^{-1}(N_k),$$

untuk beberapa $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ dan $N_i \in \mathcal{N}_{\alpha_i}(f_{\alpha_i}(x))$. Untuk keluarga kosong, irisan kosong ditafsirkan sebagai X .

Latihan 1.2. Buktikan bahwa koleksi pada Definisi 1.6 benar-benar merupakan basis lingkungan.

Konstruksi ini merangkum topologi produk. Untuk $X = Y_1 \times Y_2$ dan proyeksi $f_i: X \rightarrow Y_i$, $f_i(y_1, y_2) = y_i$, topologi awal adalah topologi produk. Konstruksi yang sama juga menghasilkan topologi subruang: ambil injeksi $f: X \hookrightarrow Y$ lalu berikan X topologi awal.

Lema 1.1 (sifat universal topologi awal). Setelah X diberi topologi awal, setiap fungsi $f_\alpha: X \rightarrow Y_\alpha$ kontinu. Selain itu, fungsi $k: Z \rightarrow X$ kontinu jika dan hanya jika $f_\alpha \circ k: Z \rightarrow Y_\alpha$ kontinu untuk setiap α .

Pendamping penguasaan terpecahkan

Bagian ini merupakan materi baru untuk edisi Bahasa Indonesia. Tujuannya bukan mengganti latihan sumber, melainkan menyediakan bukti lengkap, pemeriksaan konsep, dan satu perhitungan deformasi yang menutup hasil belajar Unit 1.

1.3 Solusi Latihan 1.1

Misalkan U terbuka dalam topologi pada Y yang dibangkitkan oleh $\mathcal{N}_Y$. Kita harus membuktikan bahwa $f^{-1}(U)$ terbuka dalam topologi pada X yang dibangkitkan oleh $\mathcal{N}_X$.

Ambil $x \in f^{-1}(U)$. Karena $f(x) \in U$ dan U bersifat $\mathcal{N}_Y$ -terbuka, terdapat $N \in \mathcal{N}_Y(f(x))$ dengan $N \subseteq U$. Kontinuitas menurut Definisi 1.4 memberi lingkungan dasar $M \in \mathcal{N}_X(x)$ yang memenuhi

$$M \subseteq f^{-1}(N) \subseteq f^{-1}(U).$$

Jadi setiap titik $x \in f^{-1}(U)$ memiliki lingkungan dasar yang termuat dalam $f^{-1}(U)$. Artinya, $f^{-1}(U)$ bersifat $\mathcal{N}_X$ -terbuka. Karena hal ini berlaku untuk setiap U terbuka, f kontinu untuk topologi-topologi yang dibangkitkan tersebut.

1.4 Solusi Latihan 1.2

Tuliskan anggota calon basis di x sebagai $B = \bigcap_{i=1}^k f_{\alpha_i}^{-1}(N_i)$, dengan $N_i \in \mathcal{N}_{\alpha_i}(f_{\alpha_i}(x))$.

1. Karena $f_{\alpha_i}(x) \in N_i$ untuk setiap i , berlaku $x \in B$.
2. Jika B_1 dan B_2 adalah dua lingkungan dasar di x , irisannya kembali merupakan irisan berhingga dari prabayangan lingkungan dasar. Apabila indeks yang sama muncul dua kali, aksioma kedua basis lingkungan di Y_α memberi lingkungan dasar yang lebih kecil di dalam irisan keduanya. Jadi terdapat lingkungan dasar $B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$.
3. Untuk setiap N_i pada representasi B , aksioma ketiga basis lingkungan di Y_{α_i} memberi $U_i \subseteq N_i$ yang memuat $f_{\alpha_i}(x)$ dan mempunyai sifat penyempurnaan lokal. Tetapkan $U = \bigcap_i f_{\alpha_i}^{-1}(U_i) \subseteq B$. Jika $y \in U$, untuk setiap i pilih $V_i \in \mathcal{N}_{\alpha_i}(f_{\alpha_i}(y))$ dengan $V_i \subseteq U_i$. Maka $\bigcap_i f_{\alpha_i}^{-1}(V_i)$ adalah lingkungan dasar dari y yang termuat dalam U .

Ketiga aksioma basis lingkungan terpenuhi. Jika I kosong, satu-satunya irisan yang diperlukan adalah irisan kosong X , dan argumen yang sama tetap berlaku.

1.5 Pemeriksaan Lema 1.1

Untuk $N \in \mathcal{N}_\alpha(f_\alpha(x))$, prabayangan $f_\alpha^{-1}(N)$ adalah salah satu lingkungan dasar pembangkit di x . Jadi setiap f_α kontinu.

Jika $k: Z \rightarrow X$ kontinu, komposisi $f_\alpha \circ k$ kontinu karena komposisi fungsi kontinu bersifat kontinu. Sebaliknya, anggap setiap $f_\alpha \circ k$ kontinu. Untuk lingkungan dasar $B = \bigcap_{i=1}^m f_{\alpha_i}^{-1}(N_i)$ di sekitar $k(z)$, kita mempunyai

$$k^{-1}(B) = \bigcap_{i=1}^m (f_{\alpha_i} \circ k)^{-1}(N_i).$$

Setiap faktor di ruas kanan memuat suatu lingkungan dasar dari z . Dengan aksioma irisan berhingga untuk basis lingkungan di Z , irisannya juga memuat suatu lingkungan dasar dari z . Jadi k kontinu.

1.6 Contoh terpecahkan: penciutan radial

Definisikan $r: \mathbb{R}^3 \setminus \{0\} \rightarrow S^2$ dengan $r(x) = x/\|x\|$, dan misalkan $i: S^2 \hookrightarrow \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ adalah inklusi. Jelas $r \circ i = \text{id}_{S^2}$.

Untuk membandingkan $i \circ r$ dengan identitas pada $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$, gunakan

$$H(x, t) = \left((1-t) + \frac{t}{\|x\|} \right) x, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

Koefisien di dalam kurung selalu positif, sehingga $H(x, t) \neq 0$. Selain itu, $H(x, 0) = x$ dan $H(x, 1) = x/\|x\| = i(r(x))$. Jadi H adalah homotopi dari identitas ke $i \circ r$. Jika $x \in S^2$, maka $\|x\| = 1$ dan $H(x, t) = ((1-t) + t)x = x$ untuk setiap t . Homotopi ini menetapkan S^2 titik demi titik. Dengan demikian, S^2 memang merupakan retrak deformasi dari $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$.

Pemeriksaan konsep. Contoh ini tidak mengatakan bahwa homeomorfisma boleh mengubah dimensi. Contoh ini mengatakan bahwa *tipe homotopi* dapat sama walaupun dimensi ruang berbeda. Perbedaan antara homeomorfisma dan ekuivalensi homotopi akan menjadi pusat unit berikutnya.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi Bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya `Notes.tex` baris 349–584 pada commit `b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53`. Penanda `\lecturenum{3}` muncul di tengah baris 585, sesudah kata “This”; seluruh kalimat pada baris 585 dan seterusnya disisihkan untuk unit berikutnya agar batas kuliah tidak menghasilkan fragmen kalimat. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, pemindahan satu latihan dari catatan pinggir ke blok latihan, pelengkapan bukti yang hanya diisyaratkan oleh sumber, dan tujuh koreksi terbatas: tanda pembentuk himpunan pada definisi D^n , faktor koordinat dalam pemeriksaan kontinuitas kontraksi, argumen nilai antara untuk ruang diskret, peubah terikat yang hilang pada syarat surjektif bersama, kasus ruang kosong dalam definisi keterhubungan, serta dua syarat kontinuitas yang hilang pada klaim tentang lintasan dan pemetaan ke ruang diskret. Materi pendamping penguasaan setelah teks inti ditulis khusus untuk edisi ini dan juga tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

2 Kuliah 2

2.1 Kelanjutan topologi awal

Contoh 2.1 (topologi subruang). Misalkan keluarga fungsi hanya terdiri atas satu pemetaan *injektif*, yaitu $\iota: X \hookrightarrow Y$, dengan Y suatu ruang topologis. Topologi awal pada X adalah topologi subruang: lingkungan dasar dari x berbentuk

$$\iota^{-1}(N),$$

dengan N lingkungan dasar dari $\iota(x)$. Jika X dipandang sebagai himpunan bagian dari Y , himpunan ini pada dasarnya adalah $N \cap X$.

Contoh 2.2 (fungsi konstan). Sebaliknya, misalkan $c_{y_0}: X \rightarrow Y$ adalah fungsi konstan yang mengirim setiap $x \in X$ ke $y_0 \in Y$. Untuk setiap lingkungan N dari y_0 ,

$$c_{y_0}^{-1}(N) = X.$$

Jadi satu-satunya lingkungan dari setiap $x \in X$ dalam topologi awal tersebut adalah X sendiri. Dengan demikian, topologi awal yang dihasilkan oleh fungsi konstan adalah topologi indiskret.

Secara umum, suatu keluarga fungsi $f_\alpha: X \rightarrow Y_\alpha$ menentukan fungsi tunggal

$$(f_\alpha): X \longrightarrow \prod_{\alpha} Y_{\alpha}, \quad x \longmapsto (f_{\alpha}(x))_{\alpha}.$$

Jika $\prod_{\alpha} Y_{\alpha}$ diberi topologi produk, topologi awal pada X yang dibangkitkan oleh keluarga $\{f_{\alpha}\}$ sama dengan topologi awal yang dibangkitkan oleh fungsi tunggal (f_{α}) . Oleh karena itu, jika (f_{α}) injektif, X mewarisi topologi subruang dari ruang produk tersebut. Inilah penggunaan utama topologi awal yang akan kita jumpai.

Contoh 2.3 (submanifold). Suatu submanifold $M \subseteq \mathbb{R}^n$ memperoleh topologinya dari fungsi-fungsi koordinat

$$M \hookrightarrow \mathbb{R}^n \xrightarrow{\text{pr}_i} \mathbb{R}.$$

Suatu pemetaan menuju M kontinu jika dan hanya jika komposisinya dengan setiap fungsi koordinat kontinu.

Latihan 2.1. Diberikan suatu himpunan X , ruang topologis Y , dan fungsi $f: X \rightarrow Y$. Andaikan $x_1, x_2 \in X$ memenuhi $f(x_1) = f(x_2)$. Buktikan bahwa, dalam topologi awal pada X , subset $V \subseteq X$ merupakan lingkungan dari x_1 jika dan hanya jika V merupakan lingkungan dari x_2 .

2.2 Topologi akhir dan ruang hasil bagi

Konstruksi berikut akan lebih penting bagi kita dan mungkin belum dikenal oleh sebagian besar pembaca.

Definisi 2.1 (topologi akhir). Misalkan X adalah suatu himpunan; $(Z_{\beta}, \mathcal{N}_{\beta})$, $\beta \in J$, adalah keluarga ruang topologis, dengan ruang yang sama boleh muncul lebih dari sekali; dan $g_{\beta}: Z_{\beta} \rightarrow X$ adalah keluarga fungsi. Perhatikan bahwa arah fungsi-fungsi ini berlawanan dengan arah fungsi pada topologi awal.

Topologi akhir pada X didefinisikan sebagai berikut: subset $U \subseteq X$ terbuka jika dan hanya jika

$g_\beta^{-1}(U)$ terbuka dalam Z_β untuk setiap $\beta \in J$.

Topologi akhir lebih mudah dirumuskan dengan himpunan terbuka daripada dengan lingkungan.

Lema 2.1 (sifat universal topologi akhir). Setelah X diberi topologi akhir, semua fungsi $g_\beta: Z_\beta \rightarrow X$ kontinu. Selain itu, suatu fungsi $h: X \rightarrow W$ kontinu jika dan hanya jika $h \circ g_\beta: Z_\beta \rightarrow W$ kontinu untuk setiap $\beta \in J$.

Kita akan sering menggunakan dua kasus khusus berikut.

Contoh 2.4 (topologi hasil bagi). Misalkan Z adalah ruang topologis dan $\sim$ suatu relasi ekuivalensi pada Z . Definisikan $X = Z/\sim$ dan pemetaan hasil bagi

$$\pi: Z \rightarrow X, \quad y \mapsto [y].$$

Topologi akhir pada X terdiri atas subset-subset $U \subseteq X$ yang memenuhi

$$U \text{ terbuka dalam } X \iff \pi^{-1}(U) \text{ terbuka dalam } Z.$$

Sebagai contoh, berikan S^2 topologi awal yang dibangkitkan oleh fungsi-fungsi koordinat

$$x_i: S^2 \hookrightarrow \mathbb{R}^3 \xrightarrow{\text{pr}_i} \mathbb{R};$$

ini adalah topologi biasa pada S^2 . Bentuk relasi ekuivalensi yang dibangkitkan oleh $x \sim -x$ untuk setiap $x \in S^2$. Ruang hasil baginya adalah bidang projektif real $\mathbb{RP}^2$. Kita memberinya topologi akhir yang berasal dari $S^2 \rightarrow \mathbb{RP}^2$; topologi inilah yang dimilikinya sebagai manifold. Sebagai catatan, pemetaan ini menjadikan S^2 suatu *ruang penutup* dari $\mathbb{RP}^2$. Ruang penutup akan dipelajari pada bagian pertama mata kuliah ini.

2.3 Gabungan saling lepas dan sifat universalnya

Ingat kembali gabungan saling lepas dari himpunan-himpunan. Untuk keluarga himpunan $\{Z_\beta\}_{\beta \in J}$ terdapat injeksi

$$\text{in}_\gamma: Z_\gamma \hookrightarrow \bigsqcup_{\beta} Z_\beta,$$

dengan salinan-salinan Z_β saling lepas. Jika setiap Z_β adalah ruang topologis, kita memberikan $\bigsqcup_{\beta} Z_\beta$ topologi akhir yang dibangkitkan oleh semua pemetaan in_γ . Topologi ini disebut *topologi gabungan saling lepas* atau *topologi jumlah*, dan ruangnya kadang-kadang disebut *jumlah topologis*. Suatu titik di dalamnya dapat ditulis sebagai pasangan (β, z) dengan $z \in Z_\beta$.

Latihan 2.2 (latihan pinggir pada sumber). Buktikan bahwa pemetaan kanonik

$$\Phi: \bigsqcup_{\beta} (X \times Z_\beta) \longrightarrow X \times \bigsqcup_{\beta} Z_\beta, \quad \Phi(\beta, (x, z)) = (x, (\beta, z)),$$

adalah suatu homeomorfisma.

Latihan 2.3 (pemetaan keluar dari suatu jumlah). Diberikan fungsi-fungsi kontinu $h_\beta: Z_\beta \rightarrow W$, buktikan bahwa terdapat tepat satu fungsi kontinu

$$h = \langle h_\beta \rangle: \bigsqcup_{\beta} Z_\beta \rightarrow W$$

yang memenuhi $h_\beta = h \circ \text{in}_\beta$ untuk setiap β . Dengan kata lain, diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} Z_\gamma & \xrightarrow{\text{in}_\gamma} & \bigsqcup_{\beta} Z_\beta \\ & \searrow h_\gamma & \downarrow h \\ & & W \end{array}$$

Lema 2.2. Topologi akhir pada X yang dibangkitkan oleh $g_\beta: Z_\beta \rightarrow X$ sama dengan topologi akhir yang dibangkitkan oleh fungsi tunggal

$$g = \langle g_\beta \rangle: \bigsqcup_{\beta} Z_\beta \rightarrow X,$$

dengan domain diberi topologi jumlah.

Bukti. Untuk setiap $U \subseteq X$,

$$\begin{aligned} U \text{ terbuka} &\iff g_\beta^{-1}(U) \text{ terbuka untuk setiap } \beta \\ &\iff (g \circ \text{in}_\beta)^{-1}(U) = \text{in}_\beta^{-1}(g^{-1}(U)) \text{ terbuka untuk setiap } \beta \\ &\iff g^{-1}(U) \text{ terbuka dalam topologi jumlah.} \end{aligned}$$

Kondisi pertama mendefinisikan topologi akhir untuk keluarga $\{g_\beta\}$, sedangkan kondisi terakhir mendefinisikan topologi akhir untuk g . Jadi kedua topologi itu sama. $\square$

Jika keluarga $g_\beta: Z_\beta \rightarrow X$ *surjektif secara bersama-sama*, artinya

$$\forall x \in X \exists \beta \in J \exists z \in Z_\beta \quad g_\beta(z) = x,$$

kita dapat menafsirkan topologi akhir sebagai topologi perekatan. Berikan relasi ekuivalensi pada $\bigsqcup_{\beta} Z_\beta$ dengan

$$(\beta_1, z_1) \sim (\beta_2, z_2) \iff g_{\beta_1}(z_1) = g_{\beta_2}(z_2) \in X.$$

Sebagai himpunan, X adalah himpunan kelas ekuivalensi dari relasi ini. Jadi kita dapat memandang X sebagai hasil perekatan himpunan-himpunan yang mendasari ruang-ruang Z_β . Topologi akhir adalah topologi alami pada ruang yang diperoleh dengan merekatkan ruang-ruang tersebut.

2.4 Sampul dan lema perekatan

Latihan 2.4 (sampul terbuka). Misalkan $\{U_\alpha\}$ adalah suatu sampul terbuka dari ruang X . Buktikan bahwa topologi X adalah topologi akhir yang dibangkitkan oleh semua inklusi

$$U_\alpha \hookrightarrow X,$$

atau, secara ekuivalen, oleh pemetaan

$$\bigsqcup_{\alpha} U_\alpha \longrightarrow X.$$

Contoh 2.5 (atlas manifold). Setiap manifold M mempunyai topologi akhir yang berasal dari sembarang atlas yang dipilih untuknya.

Latihan 2.5 (sampul tertutup berhingga). Misalkan $\{V_i\}_{i=1}^n$ adalah sampul tertutup berhingga dari X . Buktikan bahwa topologi X adalah topologi akhir yang dibangkitkan oleh

$$\bigsqcup_{i=1}^n V_i \longrightarrow X.$$

Contoh 2.6 (selang yang dipecah). Setiap selang tertutup $[a, b] \subset \mathbb{R}$ dengan topologi subruang mempunyai topologi akhir yang berasal dari koleksi subselang

$$[a, t_1], [t_1, t_2], \dots, [t_k, b],$$

yang masing-masing diberi topologi subruang dari $\mathbb{R}$.

Latihan-latihan tersebut menghasilkan pernyataan yang biasanya disebut *lema perekatan* atau *lema penempelan*.

Lema 2.3 (lema perekatan). Misalkan X adalah ruang topologis dan $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ suatu sampul terbuka sembarang, atau $\{V_i\}_{i=1}^n$ suatu sampul tertutup berhingga. Misalkan pula Y adalah ruang topologis. Jika pembatasan fungsi $f: X \rightarrow Y$ ke setiap U_α kontinu—atau, dalam kasus kedua, pembatasannya ke setiap V_i kontinu—maka f kontinu pada X .

Kelak kita akan menjumpai ruang-ruang yang dibangun dengan merekatkan banyak ruang “sederhana”, misalnya cakram

$$D^n := \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| \leq 1\},$$

dengan topologi subruang dari $\mathbb{R}^n$. Dalam konteks ini, “sederhana” secara kasar berarti “dapat diciutkan menjadi satu titik”.

2.5 Homotopi dan kontraktibilitas

“Dapat diciutkan” menyatakan suatu proses kontinu yang berlangsung sepanjang waktu. Ambil $I = [0, 1]$ dan definisikan

$$\begin{aligned} H: I \times D^n &\longrightarrow D^n, \\ (t, \mathbf{x}) &\longmapsto (1-t)\mathbf{x}. \end{aligned}$$

Pemetaan ini memang bernilai di D^n , sebab $\|(1-t)\mathbf{x}\| = (1-t)\|\mathbf{x}\| \leq 1$ untuk $0 \leq t \leq 1$ dan $\mathbf{x} \in D^n$.

Untuk setiap $t \in I$, fungsi ini memberi pemetaan $H_t: D^n \rightarrow D^n$. Pada kedua ujung selang,

$$H_0 = \text{id}_{D^n}, \quad H_1(\mathbf{x}) = 0.$$

Fungsi H kontinu. Untuk melihatnya, ingat bahwa $D^n \subset \mathbb{R}^n$ dan $I \subset \mathbb{R}$ diberi topologi subruang, sedangkan $\mathbb{R}^n$ diberi topologi produk. Karena topologi pada D^n adalah topologi awal untuk fungsi-fungsi koordinat $x_i: D^n \rightarrow \mathbb{R}$, kontinuitas H dapat diperiksa koordinat demi koordinat. Komposisi koordinat ke- i adalah

$$\begin{aligned} I \times D^n &\xrightarrow{\text{id}_I \times x_i} I \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R} \xrightarrow{\mu} \mathbb{R}, \\ (t, \mathbf{x}) &\longmapsto (t, x_i) \longmapsto (1-t, x_i) \longmapsto (1-t)x_i, \end{aligned}$$

dengan $\mu(a, b) = ab$.

Latihan 2.6 (produk pemetaan). Jika $f: X \rightarrow W$ dan $g: Y \rightarrow Z$ kontinu, buktikan bahwa

$$f \times g: X \times Y \rightarrow W \times Z, \quad (x, y) \mapsto (f(x), g(y)),$$

juga kontinu. Jika X dan Y masing-masing mempunyai sekurang-kurangnya satu titik, buktikan pula implikasi sebaliknya: kontinuitas $f \times g$ mengakibatkan kontinuitas f dan g .

Jadi, untuk membuktikan H kontinu, tinggal membuktikan bahwa perkalian $\mu: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu. Topologi biasa pada $\mathbb{R}$ berasal dari metrik, sehingga kita dapat memakai kriteria barisan untuk kontinuitas. Jika $(a_n, b_n) \rightarrow (a, b)$ dalam $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, maka

$$\begin{aligned} |a_n b_n - ab| &= |a_n b_n - ab_n + ab_n - ab| \\ &\leq |a_n - a| |b_n| + |a| |b_n - b| \\ &\leq |a_n - a| \sup_n |b_n| + |a| |b_n - b| \\ &\rightarrow 0 + 0 = 0. \end{aligned}$$

Barisan (b_n) terbatas karena konvergen. Maka perkalian kontinu, sehingga setiap fungsi koordinat dari H kontinu dan akhirnya H sendiri kontinu.

Definisi 2.2 (ruang kontraktif). Ruang X disebut *kontraktif*—atau *dapat dikontraksikan ke* $x_0 \in X$ —jika terdapat titik $x_0 \in X$ dan fungsi kontinu

$$H: I \times X \rightarrow X$$

yang memenuhi, untuk setiap $x \in X$,

$$H(0, x) = x, \quad H(1, x) = x_0.$$

Fungsi H disebut suatu *kontraksi*.

Kita telah membuktikan bahwa D^n kontraktif.

Latihan 2.7. Buktikan bahwa $\mathbb{R}$ kontraktif. Buktikan pula bahwa produk sembarang dari ruang-ruang kontraktif adalah kontraktif.

Contoh 2.7 (ruang diskret yang kontraktif). Misalkan ruang diskret S kontraktif ke suatu titik $*$ $\in S$ melalui $h: I \times S \rightarrow S$. Untuk $s \in S$, batasi h pada $I \times \{s\}$ sehingga diperoleh lintasan

$$h_s: I \rightarrow S, \quad h_s(0) = s, \quad h_s(1) = *.$$

Andaikan $s \neq *$. Karena S diskret, fungsi karakteristik

$$\chi_{\{*\}}: S \rightarrow \mathbb{R}, \quad \chi_{\{*\}}(*) = 1, \quad \chi_{\{*\}}(u) = 0 \text{ untuk } u \neq *,$$

kontinu. Komposisi $\tilde{h} = \chi_{\{*\}} \circ h_s: I \rightarrow \mathbb{R}$ juga kontinu, mempunyai $\tilde{h}(0) = 0$ dan $\tilde{h}(1) = 1$, tetapi citranya termuat dalam $\{0, 1\}$. Teorema nilai antara menyatakan bahwa citranya harus memuat setiap nilai di antara 0 dan 1, suatu kontradiksi. Jadi tidak ada $s \neq *$, dan S tepat mempunyai satu anggota.

Pertanyaan 2.1. Jika X kontraktif, apakah pilihan titik $x_0 \in X$ berpengaruh? Jika X dapat dikontraksikan ke x_0 , apakah X juga dapat dikontraksikan ke setiap $x \neq x_0$?

Suatu selang hanya dapat dipetakan secara kontinu ke ruang diskret jika pemetaannya konstan; secara ekuivalen, citranya hanya terdiri atas satu titik. Sifat ini cukup penting untuk diberi nama.

Definisi 2.3 (keterhubungan). Ruang X disebut *terhubung* jika setiap pemetaan kontinu dari X ke suatu ruang diskret mempunyai citra yang memuat paling banyak satu titik.

Definisi ini ekuivalen dengan definisi keterhubungan yang biasa dan, seperti definisi biasa itu, menggo-
longkan ruang kosong sebagai ruang terhubung. Untuk ruang tak kosong, “paling banyak satu titik”
tentu berarti “tepat satu titik”.

Selang I merupakan contoh ruang terhubung. Lebih kuat lagi, jika dua titik $x, y \in X$ dihubungkan oleh suatu *lintasan*, yaitu pemetaan kontinu

$$\gamma: I \rightarrow X, \quad \gamma(0) = x, \quad \gamma(1) = y,$$

maka setiap fungsi kontinu $f: X \rightarrow S$ ke ruang diskret memenuhi $f(x) = f(y)$.

Contoh 2.8. Setiap ruang kontraktif terhubung. Memang, jika X kontraktif melalui H ke x_0 , maka untuk setiap $y \in X$ pemetaan $t \mapsto H(t, y)$ adalah lintasan dari y ke x_0 . Karena itu, untuk setiap pemetaan kontinu $f: X \rightarrow S$ ke ruang diskret,

$$f(y) = f(x_0)$$

untuk semua $y \in X$. Jadi citra f hanya mempunyai satu titik.

Ada banyak ruang yang terhubung tetapi tidak kontraktif, namun kita belum dapat membuktikannya pada tahap ini.

Pendamping penguasaan terpecahkan

Bagian ini merupakan materi baru untuk edisi Bahasa Indonesia. Setiap latihan dan pertanyaan pada Kuliah 2 dijawab lengkap; dua sifat universal yang menjadi penghubung utama argumen perekatan juga dibuktikan secara eksplisit.

2.6 Solusi Latihan 2.1

Dalam topologi awal yang dibangkitkan oleh f , lingkungan dasar dari $x \in X$ berbentuk $f^{-1}(N)$, dengan N lingkungan dari $f(x)$ dalam Y .

Andaikan V merupakan lingkungan dari x_1 . Maka terdapat lingkungan N dari $f(x_1)$ dengan

$$f^{-1}(N) \subseteq V.$$

Karena $f(x_1) = f(x_2)$, himpunan N juga merupakan lingkungan dari $f(x_2)$, sehingga $f^{-1}(N)$ adalah lingkungan dasar dari x_2 . Jadi V merupakan lingkungan dari x_2 . Argumen yang sama dengan menukar x_1 dan x_2 memberi implikasi sebaliknya.

Makna. Topologi awal tidak dapat membedakan dua titik yang mempunyai citra sama di bawah semua pemetaan pembangkit. Untuk suatu keluarga $\{f_\alpha\}$, argumen yang sama berlaku jika $f_\alpha(x_1) = f_\alpha(x_2)$ untuk setiap α .

2.7 Bukti lengkap Lema 2.1

Ambil $U \subseteq X$ terbuka dalam topologi akhir. Menurut definisi, $g_\beta^{-1}(U)$ terbuka dalam Z_β untuk setiap β . Jadi setiap g_β kontinu.

Jika $h: X \rightarrow W$ kontinu, maka setiap komposisi $h \circ g_\beta$ kontinu. Sebaliknya, andaikan semua $h \circ g_\beta$ kontinu. Untuk setiap himpunan terbuka $O \subseteq W$ dan setiap β ,

$$g_\beta^{-1}(h^{-1}(O)) = (h \circ g_\beta)^{-1}(O)$$

terbuka dalam Z_β . Definisi topologi akhir lalu menyatakan bahwa $h^{-1}(O)$ terbuka dalam X . Karena hal ini berlaku untuk setiap O , fungsi h kontinu.

2.8 Solusi Latihan 2.2

Pemetaan Φ jelas bijektif, dengan invers

$$\Psi(x, (\beta, z)) = (\beta, (x, z)).$$

Untuk setiap β , pembatasan Φ pada komponen $X \times Z_\beta$ adalah

$$X \times Z_\beta \xrightarrow{\text{id}_X \times \text{in}_\beta} X \times \bigsqcup_{\gamma} Z_\gamma,$$

yang kontinu menurut Latihan 2.6. Karena domain Φ diberi topologi jumlah, sifat universal topologi akhir menunjukkan bahwa Φ kontinu.

Untuk kontinuitas Ψ , perhatikan bahwa setiap komponen $\text{in}_\beta(Z_\beta)$ terbuka dalam $\bigsqcup_{\gamma} Z_\gamma$: praba-yangannya pada suatu komponen Z_γ adalah Z_γ jika $\gamma = \beta$ dan kosong jika tidak. Oleh karena itu,

$$X \times \text{in}_\beta(Z_\beta)$$

membentuk sampul terbuka dari $X \times \bigsqcup_{\gamma} Z_\gamma$. Pada komponen ini, pembatasan Ψ adalah komposisi invers homeomorfisma kanonik $X \times Z_\beta \rightarrow X \times \text{in}_\beta(Z_\beta)$ dengan inklusi komponen $X \times Z_\beta \hookrightarrow \bigsqcup_{\gamma} (X \times Z_\gamma)$, sehingga kontinu. Lema perekatan memberi bahwa Ψ kontinu secara global. Jadi Φ adalah homeomorfisma.

2.9 Solusi Latihan 2.3

Definisikan fungsi h pada gabungan saling lepas dengan

$$h(\beta, z) = h_\beta(z).$$

Fungsi ini unik dengan sifat $h \circ \text{in}_\beta = h_\beta$, sebab setiap titik pada gabungan saling lepas berada pada tepat satu komponen. Karena topologi jumlah adalah topologi akhir bagi pemetaan-pemetaan inklusi tersebut, Lema 2.1 memberi

$$h \text{ kontinu} \iff h \circ \text{in}_\beta = h_\beta \text{ kontinu untuk setiap } \beta.$$

Syarat di ruas kanan telah diberikan, sehingga h kontinu.

2.10 Solusi Latihan 2.4

Misalkan $A \subseteq X$ memenuhi bahwa $A \cap U_\alpha$ terbuka dalam U_α untuk setiap α . Karena U_α terbuka dalam X , setiap subset yang terbuka dalam U_α juga terbuka dalam X . Jadi semua $A \cap U_\alpha$ terbuka dalam X . Karena $\{U_\alpha\}$ menutupi X ,

$$A = A \cap X = A \cap \bigcup_{\alpha} U_\alpha = \bigcup_{\alpha} (A \cap U_\alpha),$$

yang terbuka dalam X . Sebaliknya, jika A terbuka dalam X , maka $A \cap U_\alpha$ terbuka dalam U_α . Inilah persis syarat topologi akhir untuk semua inklusi $U_\alpha \hookrightarrow X$.

2.11 Solusi Latihan 2.5

Misalkan $A \subseteq X$ dan $A \cap V_i$ terbuka dalam V_i untuk setiap i . Tetapkan $F = X \setminus A$. Maka

$$F \cap V_i = V_i \setminus (A \cap V_i)$$

tertutup dalam V_i . Karena V_i tertutup dalam X , himpunan $F \cap V_i$ juga tertutup dalam X . Sampulnya berhingga, sehingga

$$F = \bigcup_{i=1}^n (F \cap V_i)$$

adalah gabungan berhingga himpunan tertutup dan karenanya tertutup dalam X . Jadi A terbuka. Implikasi sebaliknya langsung dari definisi topologi subruang. Dengan demikian, topologi X adalah topologi akhir untuk pemetaan inklusi $V_i \hookrightarrow X$.

Syarat “berhingga” tidak boleh dihapus dari argumen ini: gabungan tak berhingga himpunan tertutup tidak harus tertutup.

2.12 Bukti Lema 2.3

Untuk sampel terbuka, Latihan 2.4 mengatakan bahwa X mempunyai topologi akhir bagi pemetaan inklusi $U_\alpha \hookrightarrow X$. Pembatasan $f|_{U_\alpha}$ adalah komposisi

$$U_\alpha \hookrightarrow X \xrightarrow{f} Y.$$

Jika semua komposisi ini kontinu, sifat universal pada Lema 2.1 menyatakan bahwa f kontinu. Untuk sampel tertutup berhingga, gunakan Latihan 2.5 dengan argumen yang sama.

2.13 Solusi Latihan 2.6

Topologi produk pada $W \times Z$ adalah topologi awal untuk proyeksi pr_W dan pr_Z . Karena

$$\text{pr}_W \circ (f \times g) = f \circ \text{pr}_X, \quad \text{pr}_Z \circ (f \times g) = g \circ \text{pr}_Y,$$

dan semua fungsi di ruas kanan kontinu, sifat universal topologi awal menunjukkan bahwa $f \times g$ kontinu.

Sekarang andaikan $f \times g$ kontinu serta pilih $y_0 \in Y$ dan $x_0 \in X$. Pemetaan

$$i_X: X \rightarrow X \times Y, \quad x \mapsto (x, y_0)$$

kontinu karena kedua fungsi koordinatnya—identitas pada X dan fungsi konstan ke y_0 —kontinu. Maka

$$f = \text{pr}_W \circ (f \times g) \circ i_X$$

kontinu. Dengan cara yang sama, pemetaan $i_Y(y) = (x_0, y)$ memberi

$$g = \text{pr}_Z \circ (f \times g) \circ i_Y,$$

sehingga g kontinu. Kebutuhan akan x_0 dan y_0 menjelaskan syarat bahwa kedua domain tidak kosong.

2.14 Solusi Latihan 2.7

Kontraksi $\mathbb{R}$ ke 0 diberikan oleh

$$H: I \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad H(t, x) = (1 - t)x.$$

Fungsi ini kontinu, $H(0, x) = x$, dan $H(1, x) = 0$.

Untuk setiap $\alpha \in A$, misalkan X_α kontraktil ke x_α^0 melalui

$$H_\alpha: I \times X_\alpha \rightarrow X_\alpha.$$

Definisikan

$$\begin{aligned} H: I \times \prod_{\alpha \in A} X_\alpha &\longrightarrow \prod_{\alpha \in A} X_\alpha, \\ H(t, (x_\alpha)_\alpha) &= (H_\alpha(t, x_\alpha))_\alpha. \end{aligned}$$

Untuk setiap proyeksi pr_α ,

$$\text{pr}_\alpha \circ H = H_\alpha \circ (\text{id}_I \times \text{pr}_\alpha),$$

yang kontinu. Sifat universal topologi produk menyatakan bahwa H kontinu. Selain itu,

$$H(0, (x_\alpha)_\alpha) = (x_\alpha)_\alpha, \quad H(1, (x_\alpha)_\alpha) = (x_\alpha^0)_\alpha.$$

Jadi produk sembarang tersebut kontraktil.

2.15 Jawaban Pertanyaan 2.1

Pilihan titik kontraksi tidak berpengaruh: jika X dapat dikontraksikan ke x_0 , maka X dapat dikontraksikan ke setiap $x_1 \in X$.

Misalkan H adalah kontraksi ke x_0 . Definisikan

$$K(t, y) = \begin{cases} H(2t, y), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ H(2 - 2t, x_1), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Pada $t = \frac{1}{2}$, kedua rumus bernilai x_0 , sebab $H(1, y) = x_0 = H(1, x_1)$. Masing-masing rumus kontinu pada subruang tertutup $[0, \frac{1}{2}] \times X$ dan $[\frac{1}{2}, 1] \times X$; Lema perekatan menunjukkan bahwa K kontinu. Akhirnya,

$$K(0, y) = H(0, y) = y, \quad K(1, y) = H(0, x_1) = x_1.$$

Jadi K adalah kontraksi X ke x_1 .

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya `Notes.tex` baris 585-877 pada commit `b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53`. Baris 878 membuka proposisi yang penandanya, `\lecturenum{4}`, baru muncul pada baris 879; karena itu baris 878 disisihkan bersama isi proposisi untuk Unit 4 agar tidak ada lingkungan LaTeX yang terpotong. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, pemindahan empat tugas dari catatan pinggir atau prosa ke blok latihan, dan sepuluh koreksi atau klarifikasi terbatas: ketak-kosongan komponen terhubung; syarat jari-jari positif pada homotopi anulus; ketak-kosongan pada klaim $\pi_0(X) = *$; titik akhir homotopi gabungan; subinterval bagi paruh kedua homotopi gabungan; nama homotopi balik; ketak-kosongan dalam definisi keterhubungan lintasan; kategori asal objek pada definisi funktor; kasus citra kosong pada bukti keterhubungan citra; dan asumsi keterhubungan lokal pada bukti kedua functorialitas π_0 . Materi pendamping penguasaan menjawab seluruh lima latihan dan melengkapi bukti bahwa keterhubungan lintasan mengakibatkan keterhubungan. Materi baru ini juga tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

3 Kuliah 3

3.1 Komponen terhubung dan himpunan π_0

Inilah contoh pertama kita tentang suatu invarian ruang: apakah sebuah ruang terhubung atau tidak. Ruang terhubung X tidak mungkin homeomorfik dengan ruang Z yang tidak terhubung. Namun, bagaimana kita membedakan dua ruang yang sama-sama tidak terhubung?

Latihan 3.1 (invariansi keterhubungan). Misalkan $h: X \xrightarrow{\cong} Z$ adalah homeomorfisma dan S ruang diskret. Tunjukkan bahwa setiap fungsi kontinu $u: X \rightarrow S$ berkorespondensi dengan tepat satu fungsi kontinu $v: Z \rightarrow S$ yang memenuhi $u = v \circ h$. Simpulkan bahwa X terhubung jika dan hanya jika Z terhubung.

Definisi 3.1 (komponen terhubung dan π_0). Untuk suatu ruang X :

1. Subset tak kosong $Y \subseteq X$ disebut *komponen terhubung* dari X jika Y terhubung dan maksimal terhadap sifat itu: apabila Y' terhubung dan $Y \subseteq Y' \subseteq X$, maka $Y = Y'$.
2. Definisikan relasi pada X dengan

$$x_1 \sim x_2 \iff x_1 \text{ dan } x_2 \text{ termuat bersama dalam suatu subset terhubung } C \subseteq X.$$

Relasi ini merupakan relasi ekuivalensi, dan kelas-kelas ekuivalensinya adalah komponen-komponen terhubung X . Himpunan kelas tersebut dinotasikan dengan

$$\pi_0(X) = X/\sim$$

dan disebut *himpunan komponen terhubung*.

Latihan 3.2. Buktikan dua pernyataan yang dipakai dalam Definisi 3.1:

1. Jika $C, D \subseteq X$ terhubung dan $C \cap D \neq \emptyset$, maka $C \cup D$ terhubung.
2. Relasi $\sim$ di atas adalah relasi ekuivalensi dan kelas-kelas ekuivalensinya tepat merupakan komponen-komponen terhubung X .

Setiap ruang terhubung tak kosong X memenuhi $\pi_0(X) = *$. Untuk ruang yang tidak terhubung, kita dapat membandingkan himpunan π_0 -nya.

Semua ruang yang akan dipertimbangkan dalam mata kuliah ini dapat ditulis sebagai

$$X = \bigsqcup_{\alpha \in \pi_0(X)} X_\alpha,$$

dengan setiap X_α terhubung, dan mempunyai fungsi kontinu $X \rightarrow \pi_0(X)$ ketika $\pi_0(X)$ diberi topologi diskret. Sifat ini berlaku, khususnya, bagi ruang yang terhubung secara lokal. Perlu diingat bahwa $\mathbb{Q}$ dengan topologi Euklides tidak terhubung secara lokal; banyak contoh menarik lainnya juga tidak. Karena itu, kita perlu memahami ruang terhubung, walaupun ruang yang tidak terhubung tetap akan digunakan.

3.2 Homotopi dan ekuivalensi homotopi

Dapatkah kita memperoleh lebih banyak dari gagasan kontraksi? Untuk homotopi $H: I \times X \rightarrow X$, pemetaan ujungnya adalah $H_0 = \text{id}_X$ dan pemetaan konstan H_1 ke x_0 . Apa yang terjadi jika H_0 dan H_1 merupakan pemetaan kontinu lain?

Contoh 3.1 (anulus). Ambil $0 < r < R$ dan anulus

$$A(r, R) = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid r \leq \|x\| \leq R\}.$$

Definisikan

$$H(t, x) = ((1-t)r + tR) \frac{x}{\|x\|}.$$

Karena $\|x\| \geq r > 0$, rumus ini terdefinisi dan kontinu. Jari-jari $H(t, x)$ adalah $(1-t)r + tR$, sehingga citranya tetap di dalam $A(r, R)$. Pada $t = 0$ ia memetakan setiap titik secara radial ke lingkaran dalam dan menetapkan lingkaran itu titik demi titik; pada $t = 1$ ia melakukan hal yang sama terhadap lingkaran luar. Jadi kedua pemetaan ujung benar-benar merupakan retraksi.

Bagaimana jika kita mempertimbangkan pemetaan kontinu umum $X \rightarrow Y$, bukan hanya pemetaan $X \rightarrow X$?

Definisi 3.2 (homotopi). Suatu *homotopi* adalah pemetaan kontinu

$$H: I \times X \longrightarrow Y.$$

Jika $f = H(0, -)$ dan $g = H(1, -)$, maka H disebut *homotopi dari f ke g* , dan f serta g disebut *homotopik*, ditulis $f \simeq g$.

Secara diagramatik, jika $i_0(x) = (0, x)$ dan $i_1(x) = (1, x)$, syarat ujungnya ialah

$$H \circ i_0 = f, \quad H \circ i_1 = g.$$

Contoh 3.1 memberikan homotopi antara dua pemetaan “retraksi” $A(r, R) \rightarrow A(r, R)$ yang masing-masing mengirim titik ke lingkaran dalam dan lingkaran luar.

Topologi aljabar hampir selalu mempertimbangkan pemetaan *hingga homotopi* dan, demikian pula, “ruang hingga homotopi”.

Definisi 3.3 (ekuivalensi homotopi). Pemetaan kontinu $f: X \rightarrow Y$ disebut *ekuivalensi homotopi* jika terdapat pemetaan kontinu $g: Y \rightarrow X$ sedemikian sehingga

$$g \circ f \simeq \text{id}_X, \quad f \circ g \simeq \text{id}_Y.$$

Dalam keadaan ini, X dan Y disebut *ekuivalen secara homotopi*.

Contoh 3.2. Setiap ruang kontraktif ekuivalen secara homotopi dengan ruang satu titik.

Ekuivalensi homotopi dapat dipandang sebagai versi isomorfisma yang lebih kasar. Pemetaan

$$\{\text{ruang}\} \longrightarrow \{\text{objek aljabar}\}$$

yang menjadi sasaran topologi aljabar seharusnya mengirim ruang-ruang yang ekuivalen secara homotopi ke objek-objek aljabar yang isomorfik. Bahasa teori kategori akan membuat gagasan ini lebih tepat.

Sifat homotopi berikut sangat penting dan akan terus digunakan.

Proposisi 3.1 (penggabungan dan pembalikan homotopi). Misalkan $H, H': I \times X \rightarrow Y$ adalah homotopi dengan $H_1 = H'_0$. Maka terdapat homotopi H'' dari H_0 ke H'_1 . Selain itu, terdapat homotopi $\tilde{H}$ dari H_1 ke H_0 .

Bukti. Definisikan

$$H''(t, x) = \begin{cases} H(2t, x), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ H'(2t - 1, x), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Kedua rumus memberikan nilai yang sama pada $t = \frac{1}{2}$, karena $H(1, x) = H'(0, x)$. Masing-masing kontinu pada subruang tertutup $[0, \frac{1}{2}] \times X$ dan $[\frac{1}{2}, 1] \times X$; lema perekatan menunjukkan bahwa H'' kontinu. Nilai ujungnya ialah

$$H''(0, x) = H(0, x), \quad H''(1, x) = H'(1, x),$$

sehingga H'' merupakan homotopi dari H_0 ke H'_1 .

Untuk pembalikan, ambil $c: I \rightarrow I$, $c(t) = 1 - t$, dan definisikan

$$\tilde{H} = H \circ (c \times \text{id}_X).$$

Maka $\tilde{H}(0, x) = H(1, x)$ dan $\tilde{H}(1, x) = H(0, x)$, sebagaimana diperlukan. $\square$

Homotopi pemetaan merupakan relasi ekuivalensi. Refleksivitas disaksikan oleh homotopi konstan $C(t, x) = f(x)$; simetri diberikan oleh pembalikan pada Proposisi 3.1; dan transitivitas diberikan oleh penggabungan pada proposisi yang sama.

Ruang kontraktif menyediakan banyak homotopi.

Lema 3.1. Jika Y kontraktif ke $y_0 \in Y$, maka setiap pemetaan kontinu $f: X \rightarrow Y$ homotopik dengan pemetaan yang citranya termuat dalam $\{y_0\}$.

Bukti. Misalkan $K: I \times Y \rightarrow Y$ menyaksikan kontraktibilitas Y . Komposisi

$$I \times X \xrightarrow{\text{id}_I \times f} I \times Y \xrightarrow{K} Y$$

merupakan homotopi dari f ke pemetaan konstan bernilai y_0 . $\square$

Sebagai akibatnya, setiap dua pemetaan menuju ruang kontraktibil saling homotopik: terapkan Lema 3.1 kepada kedua pemetaan, balik salah satu homotopi menuju pemetaan konstan yang sama, lalu gabungkan keduanya dengan Proposisi 3.1. Karena ruang kontraktibil dalam arti tertentu bersifat trivial, pemetaan menuju ruang tersebut juga trivial dalam arti yang sama.

Versi antara yang penting muncul ketika ruang asalnya diskret, atau bahkan hanya ruang satu titik.

Definisi 3.4 (terhubung lintasan). Ruang tak kosong Y disebut *terhubung lintasan* jika setiap dua pemetaan $* \rightarrow Y$ saling homotopik.

Dengan menguraikan definisi ini, untuk setiap dua titik $y_0, y_1 \in Y$ terdapat lintasan kontinu $\gamma: I \rightarrow Y$ dengan $\gamma(0) = y_0$ dan $\gamma(1) = y_1$.

Latihan 3.3. Buktikan bahwa ruang tak kosong Y terhubung lintasan jika dan hanya jika, untuk setiap ruang diskret S , setiap dua pemetaan kontinu $S \rightarrow Y$ saling homotopik.

Proposisi 3.2. Setiap ruang terhubung lintasan adalah terhubung.

Untuk ruang X dan Y , tuliskan

$$[X, Y] = \{f: X \rightarrow Y \mid f \text{ kontinu}\} / \text{homotopi}.$$

Himpunan *komponen lintasan* dari Y adalah $[\ast, Y]$. Ruang Y terhubung lintasan jika dan hanya jika $[\ast, Y] = \ast$. Perhatikan bahwa $\pi_0(Y)$ dalam catatan ini berarti himpunan **komponen terhubung**, sedangkan $[\ast, Y]$ berarti himpunan **komponen lintasan**. Keduanya tidak boleh diidentifikasi tanpa hipotesis tambahan, misalnya keterhubungan lintasan lokal yang sesuai.

3.3 Kategori dan funktor

Sejauh ini kita membahas ruang topologis dan pemetaan kontinu, tetapi kita juga secara tersirat memakai himpunan dan fungsi yang tidak harus kontinu. Pada kedua konteks tersebut, komposisi bersifat asosiatif dan tersedia pemetaan identitas. Kelak kita akan menggunakan kelas-kelas ruang topologis yang lebih terbatas agar sifat yang dibutuhkan benar-benar berlaku.

Definisi 3.5 (kategori). Suatu *kategori* $\mathcal{C}$ terdiri atas koleksi objek $W, X, Y, Z, \dots$ dan, untuk setiap pasangan objek X, Y , koleksi morfisma $\mathcal{C}(X, Y)$, bersama data berikut:

1. Untuk $f \in \mathcal{C}(X, Y)$ dan $g \in \mathcal{C}(Y, Z)$, dipilih morfisma komposit $g \circ f \in \mathcal{C}(X, Z)$.
2. Untuk setiap objek X , dipilih morfisma identitas $\text{id}_X \in \mathcal{C}(X, X)$.

Data tersebut harus memenuhi:

1. Untuk $h \in \mathcal{C}(W, X)$, $f \in \mathcal{C}(X, Y)$, dan $g \in \mathcal{C}(Y, Z)$,

$$g \circ (f \circ h) = (g \circ f) \circ h.$$

2. Untuk setiap $h \in \mathcal{C}(W, X)$ dan $f \in \mathcal{C}(X, Y)$,

$$\text{id}_X \circ h = h, \quad f \circ \text{id}_X = f.$$

Untuk $f \in \mathcal{C}(X, Y)$, objek X disebut *sumber* f dan Y disebut *sasaran* f ; ditulis $X = s(f)$, $Y = t(f)$, atau $f: X \rightarrow Y$. Jika setiap $\mathcal{C}(X, Y)$ merupakan himpunan, maka $\mathcal{C}$ disebut *kecil secara lokal* dan $\mathcal{C}(X, Y)$ disebut *himpunan morfisma* atau *himpunan-hom*.

Banyak kategori mempunyai objek berupa himpunan yang dilengkapi struktur tambahan, misalnya topologi, dan morfisma berupa fungsi yang sesuai dengan struktur tersebut, tetapi tidak semua kategori berbentuk demikian. Kita telah menjumpai **Top**, kategori ruang topologis dan pemetaan kontinu, serta **Set**, kategori himpunan dan fungsi. Ruang vektor, grup, grup abelian, manifold, dan gelanggang memberikan contoh lain.

Contoh 3.3 (himpunan bertitik). Kategori $\mathbf{Set}_*$ mempunyai objek berupa himpunan bertitik (X, x) , dengan $x \in X$ titik yang ditentukan, dan morfisma berupa pemetaan bertitik

$$f: (X, x) \longrightarrow (Y, y), \quad f(x) = y.$$

Kategori ini dapat dipandang sebagai kategori objek aljabar dengan struktur yang paling lemah. Bandingkan dengan homomorfisma, transformasi linear, dan homomorfisma gelanggang, yang semuanya mempertahankan unsur tertentu.

Kekuatan utama kategori tampak pada hubungannya satu sama lain; sebuah kategori yang terisolasi hanya dapat memberi informasi terbatas.

Definisi 3.6 (funktor). Diberikan kategori $\mathcal{C}$ dan $\mathcal{D}$, suatu *funktor* $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ terdiri atas data:

1. Untuk setiap objek X dari $\mathcal{C}$, suatu objek $F(X)$ dari $\mathcal{D}$.
2. Untuk setiap morfisma $f: X \rightarrow Y$ dalam $\mathcal{C}$, suatu morfisma $F(f): F(X) \rightarrow F(Y)$ dalam $\mathcal{D}$.

Untuk setiap objek X dari $\mathcal{C}$ dan setiap pasangan morfisma yang dapat dikomposisikan, $f: X \rightarrow Y$ dan $g: Y \rightarrow Z$, data ini memenuhi

$$F(\text{id}_X) = \text{id}_{F(X)}, \quad F(g \circ f) = F(g) \circ F(f).$$

Sifat kedua disebut *functorialitas*. Untuk kategori kecil secara lokal, aturan pada morfisma memberikan fungsi

$$\mathcal{C}(X, Y) \longrightarrow \mathcal{D}(F(X), F(Y)).$$

Selain functor identitas, kita telah melihat sedikitnya tiga contoh:

- functor pelupa, atau functor himpunan yang mendasari, $U: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$;
- functor topologi diskret $\text{disc}: \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Top}$;
- functor komponen terhubung $\pi_0: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$.

Topologi indiskret juga menghasilkan functor $\mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Top}$, tetapi tidak akan kita gunakan. Kita belum membuktikan bahwa π_0 benar-benar functor. Functor dapat dikomposisikan, sehingga misalnya diperoleh

$$\text{disc} \circ U: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Top}, \quad \text{disc} \circ \pi_0: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Top}.$$

Misalkan $\mathcal{C}$ sebuah kategori dan $\mathcal{D}$ suatu *subkategori*: sebagian objek dan sebagian morfisma $\mathcal{C}$ yang dengan sendirinya membentuk kategori. Penyertaan objek dan morfisma membentuk functor $\mathcal{D} \hookrightarrow \mathcal{C}$, yang disebut *inklusi subkategori*. Jika

$$\mathcal{D}(X, Y) = \mathcal{C}(X, Y)$$

untuk setiap objek X, Y dari $\mathcal{D}$, maka $\mathcal{D}$ disebut *subkategori penuh*. Secara lebih umum, funktor yang injektif pada objek dan morfisma dapat dipakai untuk mendeskripsikan subkategori.

Contoh 3.4. Funktor $\text{disc}: \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Top}$ mengidentifikasi $\mathbf{Set}$ dengan subkategori penuh ruang-ruang diskret di dalam $\mathbf{Top}$. Fakta ini akan dipakai tanpa komentar lebih lanjut. Kelak kita juga akan membatasi perhatian pada subkategori-subkategori penuh tertentu dari $\mathbf{Top}$.

Lema 3.2 (citra ruang terhubung). Misalkan X terhubung dan $f: X \rightarrow Y$ kontinu. Maka $\text{im}(f) \subseteq Y$ terhubung.

Bukti. Ambil ruang diskret S dan pemetaan kontinu $g: \text{im}(f) \rightarrow S$. Komposisi

$$X \xrightarrow{f} \text{im}(f) \xrightarrow{g} S$$

kontinu. Karena X terhubung, citra komposisi ini memuat paling banyak satu titik. Pemetaan $f: X \rightarrow \text{im}(f)$ surjektif, sehingga citra g juga memuat paling banyak satu titik. Jadi $\text{im}(f)$ terhubung. $\square$

Proposisi 3.3. Aturan $X \mapsto \pi_0(X)$ menentukan funktor

$$\pi_0: \mathbf{Top} \longrightarrow \mathbf{Set}.$$

Bukti. Untuk pemetaan kontinu $f: X \rightarrow Y$, kita perlu mendefinisikan fungsi

$$\pi_0(f): \pi_0(X) \longrightarrow \pi_0(Y).$$

Ambil $\alpha \in \pi_0(X)$ dan komponen terhubung terkait $X_\alpha \subseteq X$. Menurut Lema 3.2, $f(X_\alpha)$ terhubung, sehingga termuat dalam tepat satu komponen terhubung Y . Definisikan $\pi_0(f)(\alpha)$ sebagai komponen tersebut.

Jika $g: Y \rightarrow Z$ kontinu, komponen yang memuat $g(f(X_\alpha))$ sama dengan komponen yang diperoleh dengan menerapkan $\pi_0(g)$ kepada komponen yang memuat $f(X_\alpha)$. Jadi

$$\pi_0(g \circ f) = \pi_0(g) \circ \pi_0(f).$$

Selain itu, $\pi_0(\text{id}_X)$ adalah fungsi identitas pada $\pi_0(X)$. Kedua hukum funktor terpenuhi. $\square$

Bukti kedua untuk Proposisi 3.3 (kasus terhubung secara lokal). Andaikan semua objek yang dipakai dalam argumen ini terhubung secara lokal; mula-mula ambil $f: X \rightarrow Y$. Pemetaan kanonik $Y \rightarrow \pi_0(Y)$ kontinu ketika $\pi_0(Y)$ diberi topologi diskret. Karena komposisi

$$X \xrightarrow{f} Y \longrightarrow \pi_0(Y)$$

konstan pada setiap komponen X_α , ia turun melalui $X \rightarrow \pi_0(X)$ menjadi fungsi

$$\pi_0(f): \pi_0(X) \longrightarrow \pi_0(Y), \quad \pi_0(f)(\alpha) = [f(x)]$$

untuk sembarang $x \in X_\alpha$. Diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ \pi_0(X) & \xrightarrow{\pi_0(f)} & \pi_0(Y). \end{array}$$

Pada ruang yang terhubung secara lokal, topologi hasil bagi pada $\pi_0(X)$ sama dengan topologi diskret; jadi pemetaan di baris bawah kontinu, walaupun di sini kita hanya memandangnya sebagai fungsi himpunan. Untuk memeriksa komposisi di subkategori ruang terhubung lokal, ambil pula ruang terhubung lokal Z , pemetaan $g: Y \rightarrow Z$, dan titik $x \in X_\alpha$. Maka

$$\pi_0(g)(\pi_0(f)(\alpha)) = \pi_0(g)([f(x)]) = [g(f(x))] = \pi_0(g \circ f)(\alpha),$$

yang sekali lagi membuktikan functorialitas. $\square$

Latihan 3.4. Buktikan bahwa

$$[* , -]: \mathbf{Top} \longrightarrow \mathbf{Set}$$

adalah functor. Buktikan pula pernyataan yang lebih umum: untuk setiap ruang tetap A , aturan $[A, -]: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$ adalah functor.

3.4 Kategori homotopi

Contoh kategori penting lainnya adalah *kategori homotopi* **Ho**. Objeknya ialah ruang topologis, sedangkan

$$\mathbf{Ho}(X, Y) = [X, Y].$$

Terdapat functor $\mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Ho}$ yang identik pada objek dan mengirim setiap pemetaan kontinu ke kelas homotopinya. Dua objek isomorfik dalam **Ho** jika dan hanya jika keduanya ekuivalen secara homotopi.

Latihan 3.5. Buktikan bahwa komposisi kelas homotopi terdefinisi dengan baik, sehingga **Ho** benar-benar merupakan kategori. Verifikasi pula pernyataan tentang functor $\mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Ho}$ dan isomorfisma objek pada paragraf sebelumnya.

Pendamping penguasaan: solusi lengkap

Bagian ini merupakan materi baru untuk edisi bahasa Indonesia. Setiap tugas pada Kuliah 3 dijawab lengkap, dan bukti Proposisi 3.2 yang tidak dituliskan dalam sumber diberikan secara eksplisit.

3.5 Solusi Latihan 3.1

Dari $u: X \rightarrow S$, definisikan

$$v = u \circ h^{-1}: Z \rightarrow S.$$

Pemetaan v kontinu karena h^{-1} dan u kontinu, serta $v \circ h = u$. Jika $w: Z \rightarrow S$ juga memenuhi $w \circ h = u$, maka

$$w = w \circ h \circ h^{-1} = u \circ h^{-1} = v,$$

sehingga v unik. Konstruksi sebaliknya ialah $v \mapsto v \circ h$; jadi kita memperoleh korespondensi bijektif antara pemetaan kontinu $X \rightarrow S$ dan $Z \rightarrow S$.

Jika X terhubung, setiap $u: X \rightarrow S$ mempunyai citra paling banyak satu titik. Karena $\text{im}(u) = \text{im}(u \circ h^{-1})$, hal yang sama berlaku bagi setiap pemetaan kontinu $Z \rightarrow S$, sehingga Z terhubung. Argumen dengan h^{-1} memberikan implikasi sebaliknya.

3.6 Solusi Latihan 3.2

Pertama, ambil pemetaan kontinu $f: C \cup D \rightarrow S$ ke ruang diskret. Pembatasannya pada C dan D masing-masing mempunyai citra paling banyak satu titik. Pilih $x \in C \cap D$. Jika kedua citra tidak kosong, nilai bersama $f(x)$ memaksa keduanya sama. Maka $f(C \cup D)$ memuat paling banyak satu titik, sehingga $C \cup D$ terhubung.

Untuk relasi $\sim$:

- refleksivitas mengikuti karena singleton $\{x\}$ terhubung;
- simetri langsung dari definisi;
- jika $x_1 \sim x_2$ melalui C dan $x_2 \sim x_3$ melalui D , maka $x_2 \in C \cap D$, sehingga $C \cup D$ terhubung dan $x_1 \sim x_3$.

Jadi $\sim$ merupakan relasi ekuivalensi. Kelas $[x]$ adalah gabungan semua subset terhubung yang memuat x . Gabungan ini terhubung: setiap pemetaan kontinu dari gabungan tersebut ke ruang diskret konstan pada tiap anggota keluarga dan semua nilai konstannya sama karena setiap anggota memuat x . Kelas $[x]$ juga maksimal, sebab setiap subset terhubung yang memuatnya, dan khususnya memuat x , sudah termasuk dalam gabungan yang mendefinisikan $[x]$. Jadi $[x]$ adalah komponen terhubung.

Sebaliknya, jika C komponen terhubung dan $x \in C$, maka $C \subseteq [x]$. Karena $[x]$ terhubung dan C maksimal, $C = [x]$. Dengan demikian kelas ekuivalensi dan komponen terhubung tepat sama.

3.7 Pemeriksaan Contoh 3.2

Misalkan X kontraktif ke $x_0 \in X$. Ambil pemetaan tunggal $p: X \rightarrow *$ dan pemetaan $i: * \rightarrow X$ dengan $i(*) = x_0$. Maka

$$p \circ i = \text{id}_*, \quad i \circ p = c_{x_0}.$$

Kontraksi memberikan homotopi $\text{id}_X \simeq c_{x_0}$; dengan membalik homotopi tersebut, diperoleh $c_{x_0} \simeq \text{id}_X$. Jadi p dan i merupakan invers hingga homotopi, sehingga X ekuivalen secara homotopi dengan ruang satu titik.

3.8 Solusi Latihan 3.3

Andaikan dahulu Y terhubung lintasan. Ambil ruang diskret S dan dua pemetaan $a, b: S \rightarrow Y$. Untuk setiap $s \in S$, pilih lintasan $\gamma_s: I \rightarrow Y$ dari $a(s)$ ke $b(s)$. Definisikan

$$H: I \times S \longrightarrow Y, \quad H(t, s) = \gamma_s(t).$$

Karena S diskret, $I \times S$ adalah gabungan saling lepas dari subruang terbuka $I \times \{s\}$. Pembatasan H pada tiap subruang ini adalah γ_s dan kontinu; sifat universal gabungan saling lepas menunjukkan bahwa H kontinu. Nilai ujungnya adalah a dan b , sehingga $a \simeq b$.

Sebaliknya, terapkan syarat tersebut pada ruang diskret satu titik $S = *$. Setiap dua pemetaan $* \rightarrow Y$ homotopik, sehingga Y terhubung lintasan. Ketak-kosongan Y disyaratkan pada kedua rumusan.

3.9 Bukti Proposisi 3.2

Misalkan Y terhubung lintasan dan $f: Y \rightarrow S$ kontinu, dengan S diskret. Untuk sembarang $y_0, y_1 \in Y$, pilih lintasan $\gamma: I \rightarrow Y$ dari y_0 ke y_1 . Komposisi

$$I \xrightarrow{\gamma} Y \xrightarrow{f} S$$

kontinu. Interval I terhubung, sehingga citranya dalam S memuat paling banyak satu titik. Akibatnya $f(y_0) = f(y_1)$. Karena kedua titik dipilih sembarang, $f(Y)$ memuat tepat satu titik. Jadi setiap pemetaan kontinu dari Y ke ruang diskret konstan, dan Y terhubung.

3.10 Solusi Latihan 3.4

Untuk ruang tetap A , definisikan funktor $[A, -]$ pada objek dengan

$$Y \longmapsto [A, Y].$$

Untuk pemetaan kontinu $h: Y \rightarrow Z$, definisikan

$$[A, h]: [A, Y] \longrightarrow [A, Z], \quad [f] \longmapsto [h \circ f].$$

Aturan ini terdefinisi dengan baik. Jika $f_0 \simeq f_1$ melalui $H: I \times A \rightarrow Y$, maka $h \circ H$ merupakan homotopi dari $h \circ f_0$ ke $h \circ f_1$, sehingga kelas hasil tidak bergantung pada wakil.

Untuk identitas dan komposisi,

$$[A, \text{id}_Y]([f]) = [f],$$

dan jika $k: Z \rightarrow W$, maka

$$[A, k \circ h]([f]) = [k \circ h \circ f] = [A, k]([A, h]([f])).$$

Jadi $[A, -]$ adalah funktor. Kasus $A = *$ memberikan funktor $[*, -]$ yang diminta.

3.11 Solusi Latihan 3.5

Untuk kelas $[f] \in [X, Y]$ dan $[g] \in [Y, Z]$, definisikan

$$[g] \circ [f] = [g \circ f].$$

Kita harus membuktikan bahwa hasil ini tidak bergantung pada wakil. Misalkan $f_0 \simeq f_1$ melalui $H: I \times X \rightarrow Y$ dan $g_0 \simeq g_1$ melalui $K: I \times Y \rightarrow Z$. Komposisi

$$(t, x) \longmapsto g_0(H(t, x))$$

memberikan homotopi $g_0 \circ f_0 \simeq g_0 \circ f_1$, sedangkan

$$(t, x) \longmapsto K(t, f_1(x))$$

memberikan homotopi $g_0 \circ f_1 \simeq g_1 \circ f_1$. Dengan menggabungkan keduanya menggunakan Proposisi 3.1, diperoleh

$$g_0 \circ f_0 \simeq g_1 \circ f_1.$$

Jadi komposisi kelas terdefinisi dengan baik. Asosiativitas diwarisi dari komposisi pemetaan, dan $[\text{id}_X]$ bertindak sebagai identitas. Maka **Ho** adalah kategori.

Aturan $Q: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Ho}$ dengan $Q(X) = X$ dan $Q(f) = [f]$ mempertahankan identitas dan komposisi secara langsung, sehingga merupakan funktor.

Jika $[f]: X \rightarrow Y$ isomorfik dalam $\mathbf{Ho}$ dengan invers $[g]$, maka

$$[g \circ f] = [\text{id}_X], \quad [f \circ g] = [\text{id}_Y].$$

Artinya $g \circ f \simeq \text{id}_X$ dan $f \circ g \simeq \text{id}_Y$, sehingga f adalah ekuivalensi homotopi. Sebaliknya, setiap ekuivalensi homotopi dengan invers homotopi g memberikan isomorfisma $[f]$ dengan invers $[g]$ dalam $\mathbf{Ho}$.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya `Notes.tex` baris 878-1131 pada commit `b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53`. Rentang itu dimulai dengan proposisi yang memuat penanda Kuliah 4 dan berakhir tepat setelah pernyataan tentang serat ruang penutup di sepanjang lintasan. Bukti pernyataan terakhir tidak terdapat dalam rentang unit ini. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, pemindahan diagram dan tugas dari catatan pinggir ke badan teks, serta koreksi atau klarifikasi terbatas yang dicatat satu per satu dalam ledger edisi. Di antaranya: arah pemetaan pada pelestarian koproduk; rumus $\sin(1/x)$ pada kurva sinus topolog; objek kanan bawah diagram naturalitas; kodomain transformasi $U \Rightarrow \pi_0$; karakterisasi SLPC yang benar beserta bukti global Proposisi 4.2; notasi prapeta χ^{-1} ; makna basis lingkungan dalam definisi SLPC; definisi pemetaan dan homotopi bertitik; kekontinuan fungsi yang turun melalui pemetaan kuadrat; serta penggunaan homeomorfisma pada definisi ruang penutup dan istilah baji untuk $S^1 \vee S^1$. Materi pendamping penguasaan menjawab seluruh empat latihan dan satu pertanyaan sumber, serta melengkapi bukti Lema 4.1 yang tidak dituliskan dalam sumber. Materi baru ini juga tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

4 Kuliah 4

4.1 Funktor pada kategori homotopi

Proposisi 4.1. Funktor π_0 turun menjadi sebuah funktor

$$\pi_0: \mathbf{Ho} \longrightarrow \mathbf{Set}.$$

Bukti. Kita buktikan bahwa aturan pada morfisma terdefinisi dengan baik pada setiap himpunan morfisma; sifat-sifat lainnya rutin. Misalkan $f, g: X \rightarrow Y$ homotopik melalui $H: I \times X \rightarrow Y$. Kita harus menunjukkan bahwa untuk setiap $\alpha \in \pi_0(X)$,

$$\pi_0(f)(\alpha) = \pi_0(g)(\alpha).$$

Ambil x dalam komponen terhubung X_α . Komposisi

$$I \longrightarrow I \times X \xrightarrow{H} Y, \quad t \longmapsto (t, x),$$

adalah lintasan $f(x) \rightsquigarrow g(x)$. Karena X_α terhubung, masing-masing citra $f(X_\alpha)$ dan $g(X_\alpha)$ termuat dalam satu komponen terhubung Y . Lintasan di atas menunjukkan bahwa kedua komponen tersebut sama. Jadi $\pi_0(f)(\alpha) = \pi_0(g)(\alpha)$. $\square$

Akibatnya, jika $\pi_0(X) \not\cong \pi_0(Y)$, maka X dan Y tidak mungkin ekuivalen secara homotopi, apalagi homeomorfik.

Latihan 4.1. Tunjukkan bahwa funktor $[\ast, -]: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$ turun menjadi funktor $[\ast, -]: \mathbf{Ho} \rightarrow \mathbf{Set}$. Berikut sebuah fakta yang berguna tentang ruang.

Lema 4.1 (pelestarian koproduk). Untuk setiap keluarga ruang $\{X_\beta\}_{\beta \in J}$, terdapat isomorfisma

$$\bigsqcup_{\beta \in J} \pi_0(X_\beta) \xrightarrow{\cong} \pi_0\left(\bigsqcup_{\beta \in J} X_\beta\right)$$

dan

$$\bigsqcup_{\beta \in J} [\ast, X_\beta] \xrightarrow{\cong} \left[\ast, \bigsqcup_{\beta \in J} X_\beta\right].$$

Pemetaan maju diinduksi oleh keluarga inklusi $\text{in}_\beta: X_\beta \rightarrow \bigsqcup_{\gamma \in J} X_\gamma$, sedangkan pemetaan balik mengirim setiap komponen ke suku koproduk tunggal yang memuatnya. Dengan kata lain, π_0 dan $[\ast, -]$ melestarikan koproduk.

Kita telah memperoleh funktor $\pi_0: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$ dan, dengan sedikit penyalahgunaan notasi, funktor $\pi_0: \mathbf{Ho} \rightarrow \mathbf{Set}$. Keduanya membentuk segitiga komutatif

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Top} & \xrightarrow{\pi_0} & \mathbf{Set} \\ \downarrow Q & \nearrow \pi_0 & \\ \mathbf{Ho} & & \end{array}$$

dengan Q mengirim pemetaan kontinu ke kelas homotopinya.

Contoh 4.1. Jika X dan Y adalah ruang dengan $|\pi_0(X)| < |\pi_0(Y)|$, tidak ada pemetaan kontinu surjektif $X \rightarrow Y$. Memang, pemetaan kontinu surjektif akan menginduksi fungsi surjektif $\pi_0(X) \rightarrow \pi_0(Y)$, yang bertentangan dengan pertidaksamaan kardinalitas tersebut.

Berikut contoh yang instruktif.

Contoh 4.2 (kurva sinus topolog). *Kurva sinus topolog* adalah citra C dari pemetaan

$$[-1, 1] \sqcup (0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

yang didefinisikan oleh

$$\begin{cases} y \longmapsto (0, y), & y \in [-1, 1], \\ x \longmapsto (x, \sin(1/x)), & x \in (0, 1], \end{cases}$$

dan diberi **topologi subruang**. Ruang ini merupakan ruang metrik kompak dengan metrik Euklides yang diwariskan.

Faktanya, setiap fungsi kontinu $f: C \rightarrow \{0, 1\}$ bersifat konstan. Pada cabang berosilasi, nilai f konstan karena $(0, 1]$ terhubung. Tuliskan nilai itu sebagai a . Pada ruas vertikal, nilai f juga konstan; tuliskan sebagai b . Karena

$$\left(\frac{1}{n\pi}, 0\right) \longrightarrow (0, 0)$$

di C , kekontinuan memberikan

$$b = f(0, 0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{n\pi}, 0\right) = a.$$

Jadi C terhubung. Akan tetapi, tidak ada lintasan kontinu $\gamma: [0, 1] \rightarrow C$ dengan $\gamma(0) = (0, 0)$ dan $\gamma(1) = (1, \sin 1)$. Karena interval terhubung lintasan, C mempunyai tepat dua komponen lintasan, tetapi hanya satu komponen terhubung:

$$[* , C] \cong \{0, 1\}, \quad \pi_0(C) = *.$$

Latihan 4.2. Buktikan klaim pada Contoh 4.2 bahwa tidak ada lintasan dari $(0, 0)$ ke $(1, \sin 1)$ di dalam C . Petunjuk sumber menyarankan agar Anda memeriksa perilaku limit suatu lintasan saat koordinat pertamanya mendekati nol.

Jadi kita mempunyai dua invarian berbeda. Untuk setiap ruang X , terdapat pemetaan surjektif kanonik

$$[* , X] \longrightarrow \pi_0(X)$$

yang mengirim setiap komponen lintasan ke komponen terhubung yang memuatnya. Selain itu, untuk setiap pemetaan $f: X \rightarrow Y$, diagram berikut selalu komutatif:

$$\begin{array}{ccc} [* , X] & \xrightarrow{[* , f]} & [* , Y] \\ \downarrow & & \downarrow \\ \pi_0(X) & \xrightarrow{\pi_0(f)} & \pi_0(Y). \end{array}$$

Ini adalah sebuah contoh *transformasi natural*.

Definisi 4.1 (transformasi natural). Misalkan $F, G: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ adalah functor. Sebuah *transformasi natural* $\alpha: F \Rightarrow G$ terdiri atas data berikut: untuk setiap objek X dalam $\mathcal{C}$, dipilih sebuah morfisma

$$\alpha_X: F(X) \longrightarrow G(X),$$

yang disebut *komponen* α pada X . Data ini harus memenuhi syarat bahwa untuk setiap morfisma $f: X \rightarrow Y$ dalam $\mathcal{C}$, diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccccc} F(X) & \xrightarrow{F(f)} & F(Y) \\ \alpha_X \downarrow & & \downarrow \alpha_Y \\ G(X) & \xrightarrow{G(f)} & G(Y). \end{array}$$

Dengan kata lain,

$$G(f) \circ \alpha_X = \alpha_Y \circ F(f).$$

Transformasi natural disebut *isomorfisma natural* jika semua komponennya merupakan isomorfisma. Sebagai contoh, terdapat transformasi natural

$$\text{disc} \circ U \Rightarrow \text{id}_{\mathbf{Top}}: \mathbf{Top} \longrightarrow \mathbf{Top},$$

yang komponennya pada X adalah pemetaan identitas kontinu $\text{disc}(U(X)) \rightarrow X$, dan transformasi natural

$$U \Rightarrow \pi_0: \mathbf{Top} \longrightarrow \mathbf{Set},$$

yang komponennya adalah pemetaan kanonik $U(X) \rightarrow \pi_0(X)$.

4.2 Ruang terhubung lintasan semilokal

Kita mencari syarat yang menentukan suatu subkategori penuh dari $\mathbf{Top}$ sedemikian sehingga komponen

$$[* , X] \longrightarrow \pi_0(X)$$

dari transformasi natural $[\ast, -] \Rightarrow \pi_0$ menjadi isomorfisma untuk setiap ruang X dalam subkategori tersebut.

Definisi 4.2 (terhubung lintasan semilokal). Sebuah ruang X disebut *terhubung lintasan semilokal*, disingkat **SLPC**, jika X mempunyai basis lingkungan yang terdiri atas himpunan-himpunan N dengan sifat berikut: untuk setiap $x, y \in N$, terdapat suatu lintasan di X dari x ke y .

Lintasan dalam definisi ini tidak disyaratkan tetap berada di dalam N .

Sebuah ruang bersifat SLPC jika dan hanya jika setiap komponen lintasannya terbuka. Pernyataan yang tampak mirip dengan “setiap komponen terhubungnya SLPC” tidak memadai: pada $\mathbb{Q}$ dengan topologi subruang, setiap komponen terhubung adalah ruang satu titik dan karenanya SLPC, tetapi $\mathbb{Q}$ sendiri tidak SLPC. Sifat SLPC dipertahankan oleh homeomorfisma: jika $X \cong Y$ dan salah satunya SLPC, maka yang lain juga SLPC.

Proposisi 4.2. Jika X merupakan ruang SLPC, maka pemetaan kanonik

$$[* , X] \longrightarrow \pi_0(X)$$

adalah isomorfisma.

Bukti. Kasus $X = \emptyset$ langsung. Untuk setiap $x \in X$, definisikan $\chi_x: X \rightarrow \{0, 1\}$ dengan

$$\chi_x(y) = \begin{cases} 1, & \text{jika terdapat lintasan } y \rightsquigarrow x, \\ 0, & \text{jika tidak.} \end{cases}$$

Tuliskan

$$C_x := \chi_x^{-1}(1),$$

yakni komponen lintasan yang memuat x . Kita akan menunjukkan bahwa C_x terbuka dan tertutup.

Ambil $y \in C_x$ dan pilih lingkungan $V \ni y$ dari basis dalam Definisi 4.2. Untuk setiap $z \in V$, terdapat lintasan $z \rightsquigarrow y$ di X . Menggabungkannya dengan lintasan $y \rightsquigarrow x$ menunjukkan bahwa $z \in C_x$. Jadi $V \subseteq C_x$, dan C_x terbuka.

Sebaliknya, ambil $y \in \overline{C_x}$ dan lingkungan basis $V \ni y$. Karena $V \cap C_x \neq \emptyset$, pilih $z \in V \cap C_x$. Sifat V memberikan lintasan $y \rightsquigarrow z$ di X , sedangkan $z \in C_x$ memberikan lintasan $z \rightsquigarrow x$. Penggabungan keduanya menghasilkan lintasan $y \rightsquigarrow x$, sehingga $y \in C_x$. Maka $\overline{C_x} \subseteq C_x$, jadi C_x tertutup.

Sekarang biarkan K menjadi komponen terhubung dari X . Ruang K merupakan gabungan komponen-komponen lintasan yang termuat di dalamnya. Setiap komponen lintasan $C \subseteq K$ terbuka di K , dan komplementnya di K merupakan gabungan komponen lintasan lain yang juga terbuka. Jadi C terbuka sekaligus tertutup di K . Karena K terhubung dan tak kosong, hanya satu komponen lintasan yang termuat di dalam K . Dengan demikian komponen lintasan dan komponen terhubung X berimpit, sehingga pemetaan kanonik $[\cdot, X] \rightarrow \pi_0(X)$ bijektif. $\square$

Untuk sisa bagian mata kuliah ini, kita akan mempertimbangkan ruang-ruang SLPC. Ruang-ruang tersebut membentuk subkategori penuh

$$\mathbf{Top}_{\text{slpc}} \hookrightarrow \mathbf{Top}.$$

Ruang diskret bersifat SLPC, sehingga terdapat pula subkategori $\mathbf{Set} \hookrightarrow \mathbf{Top}_{\text{slpc}}$ melalui functor topologi diskret.

Contoh 4.3. Setiap ruang terhubung lintasan X bersifat SLPC. Memang, untuk lingkungan apa pun N dan setiap $x, y \in N$, sudah tersedia lintasan di X yang menghubungkan x dan y .

Latihan 4.3. Tunjukkan bahwa produk dua ruang SLPC bersifat SLPC, dan bahwa setiap ruang vektor topologis yang konveks lokal bersifat SLPC.

Contoh 4.4. Setiap manifold bersifat SLPC, sebab setiap titik berada dalam suatu peta koordinat yang homeomorfik dengan sebuah subruang terbuka dari $\mathbb{R}^n$, dan bola-bola Euklides yang cukup kecil terhubung lintasan.

Peringatan: subruang dari ruang SLPC belum tentu SLPC. Sebagai contoh, kurva sinus topolog merupakan subruang dari ruang kontraktif $\mathbb{R}^2$, tetapi kurva itu sendiri tidak SLPC.

Pertanyaan 4.1. Jika X bersifat SLPC dan $q: X \rightarrow Y$ adalah pemetaan hasil bagi, sehingga Y diberi topologi final terhadap q , apakah Y juga bersifat SLPC?

4.3 Ruang dan homotopi bertitik

Masih ada satu pokok teknis terakhir.

Definisi 4.3 (ruang bertitik). Sebuah *ruang bertitik* adalah pasangan (X, x) , dengan X ruang topologis dan $x \in X$. Pemetaan bertitik

$$f: (X, x) \longrightarrow (Y, y)$$

adalah pemetaan kontinu $f: X \rightarrow Y$ yang memenuhi $f(x) = y$. Ruang bertitik dan pemetaan bertitik membentuk kategori $\mathbf{Top}_*$.

Sebuah *homotopi bertitik* antara pemetaan bertitik $f, g: (X, x_0) \rightarrow (Y, y_0)$ adalah homotopi $H: I \times X \rightarrow Y$ dari f ke g yang juga memenuhi

$$H(t, x_0) = y_0 \quad \text{untuk setiap } t \in I.$$

Kelas homotopi bertitik dari pemetaan bertitik dinotasikan dengan

$$[(X, x_0), (Y, y_0)]_*.$$

Kategori $\mathbf{Ho}_*$ didefinisikan secara analog dengan $\mathbf{Ho}$. Kita memperoleh functor

$$\pi_0: \mathbf{Ho}_* \longrightarrow \mathbf{Set}_*,$$

dengan titik terpilih pada $\pi_0(X)$ adalah komponen yang memuat x_0 .

4.4 Ruang penutup

Kadang-kadang, ketika mempelajari suatu ruang tertentu X , kita perlu membangun ruang-ruang lain yang berkaitan dengan X untuk menelaah objek yang menarik.

Contoh 4.5 (akar kuadrat pada bidang kompleks berlubang). Ambil

$$X = \mathbb{C}^\times := \mathbb{C} \setminus \{0\}.$$

Tidak ada pilihan akar kuadrat yang kontinu pada seluruh X ; suatu cabang kontinu dapat dipilih setelah sebuah potongan cabang dibuang dari domain. Bahkan, untuk fungsi kontinu $f: \mathbb{C}^\times \rightarrow \mathbb{C}$, ekspresi $x \mapsto f(\sqrt{x})$ bergantung pada pilihan akar dan tidak serta-merta memberikan fungsi kontinu global pada X .

Namun, kita memperoleh fungsi kontinu jika domainnya diubah. Pemetaan

$$Z := \mathbb{C}^\times \longrightarrow \mathbb{C}^\times, \quad z \longmapsto z^2 = x,$$

tidak injektif dan karena itu tidak mempunyai invers global. Jika kita bersedia memakai Z sebagai domain dan memasukkan argumen z yang memenuhi $z^2 = x$ ke dalam f , kita kembali berurusan dengan fungsi kontinu. Jika $f(z) = f(-z)$ untuk setiap $z \in Z$, definisikan $g(x) = f(z)$ untuk sembarang z dengan $z^2 = x$. Fungsi g terdefinisi dengan baik dan kontinu: pemetaan $p(z) = z^2$ adalah pemetaan terbuka dan surjektif, jadi merupakan pemetaan hasil bagi, dan persamaan $f = g \circ p$ memaksa kekontinuan g .

Sifat pemetaan $z \mapsto z^2$ di luar nol, serta pemetaan lain seperti $z \mapsto z^n$, eksponensial kompleks, dan fungsi rasional di luar kutub serta titik kritisnya, mengarah pada gagasan ruang penutup bagi domain tertentu di $\mathbb{C}$. Kita memakai definisi umum untuk ruang sembarang.

Definisi 4.4 (ruang penutup). Sebuah *ruang penutup* dari X adalah ruang Z yang dilengkapi pemetaan

$$\pi: Z \longrightarrow X$$

dengan sifat berikut: untuk setiap $x \in X$, terdapat lingkungan terbuka $V_x \ni x$ dan homeomorfisma

$$\varphi_x: \pi^{-1}(V_x) \xrightarrow{\cong} V_x \times \pi^{-1}(x)$$

di atas V_x . Artinya, diagram

$$\begin{array}{ccc} \pi^{-1}(V_x) & \xrightarrow{\varphi_x} & V_x \times \pi^{-1}(x) \\ \pi \downarrow & & \downarrow \text{pr}_1 \\ V_x & = & V_x \end{array}$$

komutatif, dengan $\pi^{-1}(x)$ diberi topologi diskret. Perhatikan bahwa

$$V_x \times \pi^{-1}(x) \cong \bigsqcup_{z \in \pi^{-1}(x)} V_x.$$

Pemetaan π sendiri juga disebut *pemetaan penutup*.

Untuk ruang penutup $Z \xrightarrow{\pi} X$ dan $x \in X$, tuliskan

$$Z_x := \pi^{-1}(x)$$

untuk *serat* di atas x . Ruang X disebut *ruang dasar*.

Contoh ruang penutup mencakup

$$\exp: \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}^\times, \quad S^2 \longrightarrow \mathbb{RP}^2, \quad U(1) \xrightarrow{(-)^n} U(1) \quad (n \geq 1),$$

serta berbagai penutup ruang berbentuk angka delapan $S^1 \vee S^1$.

Latihan 4.4. Misalkan $Z \xrightarrow{\pi} Y$ dan $Y \xrightarrow{\rho} X$ adalah pemetaan penutup. Andaikan ρ mempunyai serat hingga, yakni Y_x hingga untuk setiap $x \in X$. Tunjukkan bahwa komposisi

$$Z \xrightarrow{\rho \circ \pi} X$$

juga merupakan pemetaan penutup.

Proposisi 4.3. Untuk ruang penutup $Z \xrightarrow{\pi} X$, jika terdapat lintasan $x_0 \rightsquigarrow x_1$ di X , maka terdapat bijeksi—ekuivalen dengan homeomorfisma untuk serat-serat diskret—

$$Z_{x_0} \cong Z_{x_1}.$$

Bijeksi tersebut pada umumnya bergantung pada pilihan lintasan. Buktinya dimulai dalam Kuliah 5 dan karena itu berada dalam unit berikutnya.

Pendamping penguasaan: solusi lengkap

Bagian ini merupakan materi baru untuk edisi bahasa Indonesia. Seluruh tugas dan pertanyaan dalam Kuliah 4 dijawab lengkap. Bukti Lema 4.1, yang tidak dituliskan dalam sumber, juga diberikan. Proposisi 4.3 sengaja tidak dibuktikan di sini karena pernyataannya berada tepat di batas akhir rentang sumber dan pembahasannya dilanjutkan pada unit berikutnya.

4.5 Solusi Latihan 4.1

Pada objek, tetapkan $X \mapsto [* , X]$. Untuk kelas homotopi $[f] \in \mathbf{Ho}(X, Y)$, definisikan

$$[* , [f]]: [* , X] \longrightarrow [* , Y], \quad [u] \longmapsto [f \circ u].$$

Pertama, aturan ini tidak bergantung pada wakil u . Jika $u_0 \simeq u_1$, maka komposisi suatu homotopi $H: I \times * \rightarrow X$ dengan f memberi $f \circ u_0 \simeq f \circ u_1$.

Aturan ini juga tidak bergantung pada wakil f . Jika $f_0 \simeq f_1$ melalui $K: I \times X \rightarrow Y$, maka untuk setiap $u: * \rightarrow X$, pemetaan

$$(t, *) \longmapsto K(t, u(*))$$

adalah homotopi $f_0 \circ u \simeq f_1 \circ u$. Jadi aturan tersebut terdefinisi pada morfisma $[f]$ dalam $\mathbf{Ho}$. Pelestarian identitas dan komposisi mengikuti dari

$$[\mathrm{id}_X \circ u] = [u], \quad [(g \circ f) \circ u] = [g \circ (f \circ u)].$$

Maka $[* , -]$ turun menjadi funktor $\mathbf{Ho} \rightarrow \mathbf{Set}$.

4.6 Bukti Lema 4.1

Dalam koproduk topologis

$$X = \bigsqcup_{\beta \in J} X_\beta,$$

setiap suku koproduk X_β terbuka sekaligus tertutup. Setiap subset terhubung tak kosong dari X harus termuat dalam satu suku koproduk: jika ia bertemu dua suku, fungsi kontinu ke himpunan diskret J yang mencatat indeks suku tidak akan konstan. Sebaliknya, setiap subset terhubung dalam sebuah X_β tetap terhubung setelah dimasukkan ke X . Karena itu, komponen-komponen terhubung X tepat merupakan komponen-komponen dari semua X_β , dan diperoleh bijeksi pertama.

Untuk komponen lintasan, ambil lintasan $\gamma: I \rightarrow X$. Karena I terhubung, citranya harus termuat dalam satu suku koproduk. Jadi dua titik dalam suku berbeda tidak mungkin terhubung oleh lintasan, sedangkan lintasan di suatu X_β tetap merupakan lintasan di X . Komponen lintasan X pun tepat merupakan komponen lintasan semua suku, yang memberikan bijeksi kedua. Kedua bijeksi diinduksi oleh inklusi suku koproduk dan natural terhadap keluarga pemetaan.

4.7 Solusi Latihan 4.2

Andaikan terdapat lintasan $\gamma: [0, 1] \rightarrow C$ dari $(0, 0)$ ke $(1, \sin 1)$. Tuliskan

$$\gamma(t) = (a(t), b(t)),$$

dengan a, b kontinu. Karena $a(0) = 0$ dan $a(1) = 1$, himpunan $a^{-1}(0)$ merupakan subset tertutup tak kosong dari $[0, 1]$ yang tidak memuat 1. Maka ia mempunyai unsur terbesar

$$t_0 = \max a^{-1}(0) < 1.$$

Untuk setiap $t > t_0$, kita mempunyai $a(t) > 0$, sehingga

$$b(t) = \sin\left(\frac{1}{a(t)}\right).$$

Pilih dua barisan bilangan positif yang menuju nol,

$$r_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2\pi n}, \quad s_n = \frac{1}{\frac{3\pi}{2} + 2\pi n}.$$

Untuk setiap k cukup besar, tetapkan $m_k = a(t_0 + 1/k) > 0$. Pilih indeks n_k sedemikian sehingga $r_{n_k} < m_k$ dan $s_{n_k} < m_k$. Karena $a(t_0) = 0$, teorema nilai antara memberikan titik $u_k, v_k \in (t_0, t_0 + 1/k)$ dengan

$$a(u_k) = r_{n_k}, \quad a(v_k) = s_{n_k}.$$

Jadi $u_k \rightarrow t_0$ dan $v_k \rightarrow t_0$.

Akibatnya,

$$b(u_k) = 1, \quad b(v_k) = -1.$$

Namun, kekontinuan b di t_0 menuntut kedua barisan nilai itu menuju nilai yang sama, yaitu $b(t_0)$. Kontradiksi. Jadi lintasan tersebut tidak ada.

Cabang berosilasi adalah citra kontinu dari $(0, 1]$ dan terhubung lintasan, sedangkan ruas vertikal juga terhubung lintasan. Argumen di atas, diterapkan setelah reparametrisasi ujung bila perlu, menunjukkan bahwa tidak ada lintasan yang menghubungkan kedua bagian itu. Dengan demikian keduanya tepat merupakan dua komponen lintasan C .

4.8 Solusi Latihan 4.3

Misalkan X dan Y bersifat SLPC. Untuk $(x, y) \in X \times Y$, ambil lingkungan dasar $U \times V$ dengan U dan V berasal dari basis SLPC masing-masing. Jika $(x_0, y_0), (x_1, y_1) \in U \times V$, pilih lintasan

$$\alpha: I \rightarrow X, \quad \alpha(0) = x_0, \quad \alpha(1) = x_1,$$

dan

$$\beta: I \rightarrow Y, \quad \beta(0) = y_0, \quad \beta(1) = y_1.$$

Lintasan $t \mapsto (\alpha(t), \beta(t))$ berada di $X \times Y$ dan menghubungkan kedua titik tersebut. Jadi himpunan-himpunan $U \times V$ membentuk basis SLPC bagi produk.

Sekarang misalkan E ruang vektor topologis yang konveks lokal. Setiap titik mempunyai basis lingkungan berupa translasi himpunan-himpunan konveks. Jika u dan v berada dalam satu lingkungan konveks N , lintasan garis

$$\gamma(t) = (1 - t)u + tv$$

bahkan tetap berada dalam N . Karena itu setiap lingkungan basis tersebut memenuhi syarat Definisi 4.2, sehingga E bersifat SLPC.

4.9 Jawaban Pertanyaan 4.1

Ya. Menurut Definisi 4.2, suatu ruang bersifat SLPC jika dan hanya jika setiap komponen lintasannya terbuka.

Untuk arah maju, jika P adalah komponen lintasan dan $y \in P$, pilih lingkungan basis $N \ni y$. Semua titik N dapat dihubungkan ke y oleh lintasan di ruang, sehingga $N \subseteq P$. Jadi P terbuka. Untuk arah balik, jika semua komponen lintasan terbuka, maka himpunan $P_x \cap U$, dengan P_x komponen lintasan x dan U lingkungan terbuka dari x , membentuk basis lingkungan. Dua titik di $P_x \cap U$ dapat dihubungkan oleh lintasan di X , sebagaimana diperbolehkan oleh Definisi 4.2.

Sekarang biarkan P menjadi sebuah komponen lintasan Y . Jika dua titik $x_0, x_1 \in X$ berada dalam komponen lintasan yang sama di X , citra suatu lintasan di antara keduanya adalah lintasan dari $q(x_0)$ ke $q(x_1)$ di Y . Jadi $q^{-1}(P)$ merupakan gabungan komponen-komponen lintasan X . Karena X SLPC, setiap komponen itu terbuka, sehingga $q^{-1}(P)$ terbuka. Definisi topologi hasil bagi menyatakan bahwa P terbuka di Y karena $q^{-1}(P)$ terbuka di X . Dengan demikian semua komponen lintasan Y terbuka, dan Y bersifat SLPC.

4.10 Solusi Latihan 4.4

Tetapkan $x \in X$. Karena ρ adalah pemetaan penutup, terdapat lingkungan terbuka $U \ni x$ yang tertutup rata:

$$\rho^{-1}(U) = \bigsqcup_{i \in I} U_i,$$

dengan setiap pembatasan $\rho_i := \rho|_{U_i} : U_i \rightarrow U$ suatu homeomorfisma. Himpunan indeks I berkorespondensi dengan serat Y_x , sehingga I hingga.

Untuk setiap $i \in I$, tuliskan $y_i = \rho_i^{-1}(x)$. Karena π adalah pemetaan penutup, pilih lingkungan terbuka $W_i \subseteq U_i$ dari y_i yang tertutup rata oleh π . Himpunan $\rho_i(W_i)$ adalah lingkungan terbuka dari x di U . Karena I hingga, irisan

$$V = \bigcap_{i \in I} \rho_i(W_i),$$

masih merupakan lingkungan terbuka dari x ; jika $I = \emptyset$, irisan kosong ini dipahami sebagai U . Gantikan U dengan V dan setiap U_i dengan $V_i := \rho_i^{-1}(V) \subseteq W_i$. Setiap V_i tetap tertutup rata oleh π dan dipetakan homeomorfik ke V oleh ρ .

Untuk setiap i , tuliskan dekomposisi penutup

$$\pi^{-1}(V_i) = \bigsqcup_{j \in J_i} W_{ij},$$

dengan $\pi|_{W_{ij}} : W_{ij} \rightarrow V_i$ sebuah homeomorfisma. Maka

$$(\rho \circ \pi)^{-1}(V) = \bigsqcup_{i \in I} \bigsqcup_{j \in J_i} W_{ij},$$

dan pada setiap W_{ij} , komposisi

$$W_{ij} \xrightarrow{\pi} V_i \xrightarrow{\rho} V$$

merupakan homeomorfisma. Jadi V tertutup rata oleh $\rho \circ \pi$. Karena x dipilih sembarang, komposisi itu merupakan pemetaan penutup.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya [Notes.tex](#) baris 1132–1304 pada commit [b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#). Rentang itu dimulai dengan penanda Kuliah 5 dan bukti pertama bagi Proposisi 4.3, lalu berakhir dengan invariansi transpor serat terhadap reparameterisasi lintasan. Baris 1305 memulai Kuliah 6 dan tidak termasuk dalam unit ini. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, serta pemindahan keterangan dari catatan pinggir ke badan teks. Beberapa koreksi dan klarifikasi matematis terbatas juga diterapkan: sampul pada bukti serat diganti dengan subdivisi interval yang tunduk pada sampul trivial; notasi ruang penutup bertitik diperbaiki; konvensi serat kosong dan ketergantungan identifikasi pada pilihan dijelaskan; morfisma kategori ruang penutup dinyatakan lengkap; contoh analisis kompleks dibatasi pada klaim monodromi yang memang didukung; argumen trivialisasi interval memakai rantai subinterval dan lema penempelan; trivialisasi dinormalisasi pada serat awal; kesalahan tipe pada fungsi transisi diperbaiki; serta notasi dan bukti keunikan pengangkatan diperjelas. Semua perubahan substantif tersebut merupakan bagian dari adaptasi, bukan kutipan dari sumber lain.

Sumber tidak memuat lingkungan latihan dalam rentang ini. Karena itu, bagian pendamping penguasaan di akhir unit menambahkan empat pemeriksaan penguasaan beserta solusi lengkap, juga bukti bagi lema kekompakan dan proposisi tarik balik yang tidak dibuktikan dalam sumber. Seluruh materi baru itu tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

5 Kuliah 5

5.1 Serat ruang penutup di sepanjang lintasan

Kita mulai dengan bukti pertama bagi pernyataan terakhir Unit 4.

Bukti pertama Proposisi 4.3. Ambil lintasan

$$\gamma: I \longrightarrow X, \quad \gamma(0) = x_0, \quad \gamma(1) = x_1,$$

dan suatu sampel terbuka $\{V_\alpha\}$ dari X yang memberikan trivialisasi bagi ruang penutup $Z \xrightarrow{\pi} X$. Prapeta $\{\gamma^{-1}(V_\alpha)\}$ merupakan sampel terbuka dari interval kompak I . Dengan lema bilangan Lebesgue, kita dapat memilih subdivisi

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_N = 1$$

dan anggota-anggota sampel terbuka $V_1, \dots, V_N$ yang mentrivialkan ruang penutup serta memenuhi

$$\gamma([t_{i-1}, t_i]) \subseteq V_i \quad (1 \leq i \leq N).$$

Untuk setiap i , pilih trivialisasi

$$\varphi_i: \pi^{-1}(V_i) \xrightarrow{\cong} V_i \times F_i,$$

dengan F_i diskret. Trivialisasi itu mengidentifikasi setiap serat di atas titik V_i dengan F_i . Karena titik sambung $\gamma(t_i)$ berada dalam $V_i \cap V_{i+1}$, kita memperoleh rangkaian bijeksi

$$Z_{x_0} \cong F_1 \cong Z_{\gamma(t_1)} \cong F_2 \cong \cdots \cong F_N \cong Z_{x_1}.$$

Komposisinya memberikan bijeksi $Z_{x_0} \cong Z_{x_1}$, yang sekaligus merupakan homeomorfisma karena kedua serat diskret. Argumen ini membuktikan keberadaan; pada tahap ini ia belum memberikan identifikasi yang dinyatakan bebas dari pilihan subdivisi dan trivialisasi. $\square$

Jadi, jika X bersifat SLPC, maka untuk setiap $\alpha \in \pi_0(X)$, sebuah ruang penutup $Z \xrightarrow{\pi} X$ menentukan satu kelas isomorfisma himpunan pada komponen terhubung $X_\alpha \subseteq X$. Kelas isomorfisma ini disebut *serat tipikal* di atas X_α . Karena komponen terhubung dan komponen lintasan berimpit dalam ruang SLPC, setiap dua serat pada X_α memang isomorfik, tetapi belum ada identifikasi yang lebih disukai tanpa data tambahan.

Catatan tentang serat kosong. Unit ini mengikuti konvensi sumber bahwa serat boleh kosong; dengan kata lain, pemetaan penutup tidak diwajibkan surjektif. Sebagian buku memasukkan surjektivitas ke dalam definisi pemetaan penutup. Jika X bertitik di x , sebuah ruang penutup bertitik ditulis

$$(Z, z) \longrightarrow (X, x), \quad \pi(z) = x.$$

Data titik di atas itu persis merupakan pilihan $z \in Z_x$. Jika X terhubung dan SLPC, setiap $x' \in X$ dapat dihubungkan ke x oleh suatu lintasan. Identifikasi serat di sepanjang lintasan tersebut membawa z ke suatu titik di $Z_{x'}$, sehingga setiap serat tidak kosong. Identifikasi itu bergantung pada pilihan lintasan; pengangkatan lintasan di bawah akan membuat konstruksinya eksplisit.

Terdapat kategori $\mathbf{Cov}_X$ yang objeknya adalah ruang-ruang penutup $\pi_i: Z_i \rightarrow X$. Sebuah morfisma dari π_1 ke π_2 adalah pemetaan kontinu $h: Z_1 \rightarrow Z_2$ di atas X , yaitu yang membuat segitiga

$$\begin{array}{ccc} Z_1 & \xrightarrow{h} & Z_2 \\ & \searrow \pi_1 & \downarrow \pi_2 \\ & & X \end{array}$$

komutatif, atau setara dengan $\pi_2 \circ h = \pi_1$. Demikian pula, kategori $\mathbf{Cov}_{(X,x)}$ mempunyai objek ruang penutup bertitik $(Z, z) \rightarrow (X, x)$ dan morfisma di atas X yang juga mempertahankan titik terpilih di ruang atas. Kita akan mempelajari kategori-kategori ini untuk melihat informasi apa yang dikandungnya tentang topologi X .

Contoh 5.1 (monodromi pada bidang kompleks berlubang). Untuk

$$X = \mathbb{C} \setminus \{p_1, \dots, p_n\},$$

kategori $\mathbf{Cov}_X$ mengodekan data penutup tak bercabang dan monodromi. Setiap penutup topologis dari X memperoleh struktur permukaan Riemann yang ditarik balik sehingga proyeksinya holomorfik dan merupakan biholomorfisma lokal. Untuk penutup berlembar hingga, tiap lubang dapat diisi menurut siklus-siklus monodromi lokal sehingga diperoleh pemetaan bercabang; lubang itu menjadi nilai cabang hanya jika monodromi lokalnya tidak trivial. Untuk penutup berlembar tak hingga, pengisian semacam itu memerlukan syarat tambahan pada orbit monodromi atau ujung-ujung ruang. Jadi, data penutup saja tidak membenarkan klaim bahwa semua dan hanya titik p_i pasti merupakan nilai kritis.

Jika X terhubung dan SLPC, bukti pertama di atas hanya mengatakan bahwa untuk $x_0, x_1 \in X$ terdapat suatu bijeksi $Z_{x_0} \cong Z_{x_1}$. Kita akan memperkuat pernyataan ini. Sebelum itu, kita memerlukan sebuah konstruksi untuk ruang penutup.

5.2 Tarik balik ruang penutup

Definisi 5.1 (tarik balik). Diberikan ruang penutup $Z \xrightarrow{\pi} X$ dan pemetaan $Y \xrightarrow{f} X$, tarik balik Z sepanjang f adalah subruang

$$f^*Z := Y \times_X Z = \{(y, z) \in Y \times Z \mid f(y) = \pi(z)\} \subseteq Y \times Z.$$

Ia berada dalam persegi komutatif

$$\begin{array}{ccc} f^*Z & \xrightarrow{\text{pr}_2} & Z \\ p = \text{pr}_1 \downarrow & & \downarrow \pi \\ Y & \xrightarrow{f} & X. \end{array}$$

Ruang hasil kali serat $Y \times_X Z$ sebenarnya dapat didefinisikan untuk sembarang pasangan pemetaan menuju X ; pada definisi ini, asumsi bahwa π merupakan pemetaan penutup diperlukan untuk menyimpulkan bahwa proyeksi p juga merupakan pemetaan penutup.

Proposisi 5.1. Dalam situasi Definisi 5.1, berlaku hal-hal berikut.

1. Pemetaan $p: f^*Z \rightarrow Y$ merupakan ruang penutup.

2. Tarik balik mendefinisikan functor

$$f^*: \mathbf{Cov}_X \longrightarrow \mathbf{Cov}_Y.$$

3. Jika $Y_2 \xrightarrow{g} Y_1 \xrightarrow{f} X$ dan $Z \xrightarrow{\pi} X$, terdapat isomorfisma kanonik dalam $\mathbf{Cov}_{Y_2}$,

$$(f \circ g)^* Z \cong g^*(f^* Z).$$

Hanya butir pertama yang memakai asumsi bahwa π adalah pemetaan penutup. Butir kedua dan ketiga berlaku bagi tarik balik umum dalam kategori irisan $\mathbf{Top}/X$, yang objeknya adalah pemetaan menuju X dan morfismanya adalah segitiga-segitiga komutatif.

Akibat 5.1. Untuk setiap $y \in Y$, terdapat isomorfisma kanonik

$$(f^* Z)_y \cong Z_{f(y)},$$

yang diberikan oleh $(y, z) \mapsto z$.

Sekarang, untuk suatu lintasan $\gamma: I \rightarrow X$ dan ruang penutup $Z \xrightarrow{\pi} X$, kita dapat membentuk ruang penutup tarik balik

$$\gamma^* Z \longrightarrow I.$$

Karena itu, kita perlu memahami ruang-ruang penutup dari I . Untuk setiap ruang diskret S , proyeksi $S \times I \rightarrow I$ jelas merupakan ruang penutup.

5.3 Ruang penutup dari interval

Proposisi 5.2. Setiap ruang penutup $Z \xrightarrow{\pi} I$ isomorfik dalam $\mathbf{Cov}_I$ dengan ruang penutup trivial

$$Z_0 \times I \xrightarrow{\text{pr}_2} I, \quad Z_0 := \pi^{-1}(0).$$

Isomorfisma dapat dipilih agar pada $Z_0 \times \{0\}$ merupakan identitas serat Z_0 .

Kita memerlukan lema bantu kecil berikut.

Lema 5.1. Jika X kompak dan $Z \rightarrow X$ merupakan ruang penutup, maka terdapat sampul berhingga X oleh lingkungan-lingkungan yang di atasnya ruang penutup tersebut trivial. Lingkungan-lingkungan itu dapat dipilih terbuka.

Bukti Proposisi 5.2. Terapkan Lema 5.1 pada I . Dengan memperhalus sampul berhingga menggunakan bilangan Lebesgue dan sedikit memperbesar subinterval-subinterval pembagian, kita dapat memilih rantai subinterval tertutup

$$[0, t_1], [s_2, t_2], \dots, [s_N, 1]$$

yang menutupi I , masing-masing termuat dalam suatu lingkungan trivial, dan memenuhi $s_{i+1} < t_i$ untuk setiap pasangan berturut-turut. Argumen induksi pada N mereduksi penempelan menjadi kasus dua bagian.

Jadi, andaikan $I = [0, t] \cup [s, 1]$ dengan $s < t$. Tuliskan $Z_A := \pi^{-1}(A)$. Kita mempunyai trivialisasi

$$\tau: Z_0 \times [0, t] \xrightarrow{\cong} Z_{[0, t]}$$

dan

$$\sigma: F \times [s, 1] \xrightarrow{\cong} Z_{[s,1]},$$

dengan F diskret. Trivialisasi pertama dapat dinormalisasi: jika pembatasannya pada $Z_0 \times \{0\}$ menginduksi permutasi $b: Z_0 \rightarrow Z_0$, prakomposisikan τ dengan $b^{-1} \times \text{id}$. Setelah itu,

$$\tau(z, 0) = z \quad (z \in Z_0).$$

Pada irisan $[s, t]$, pertimbangkan komposisi

$$Z_0 \times [s, t] \xrightarrow{\tau} Z_{[s,t]} \xrightarrow{\sigma^{-1}} F \times [s, t] \xrightarrow{\text{pr}_1} F.$$

Jika $z \in Z_0$ ditetapkan, komposisi itu memberi pemetaan kontinu $\{z\} \times [s, t] \rightarrow F$. Karena $[s, t]$ terhubung dan F diskret, pemetaan ini konstan. Tuliskan nilai konstannya sebagai p_z . Secara eksplisit, untuk sembarang $r \in [s, t]$,

$$p_z = \text{pr}_1(\sigma^{-1}(\tau(z, r))).$$

Pada setiap r tetap, fungsi transisi di atas serat merupakan bijeksi. Karena itu,

$$\phi: Z_0 \longrightarrow F, \quad z \longmapsto p_z,$$

merupakan bijeksi, dan juga homeomorfisma karena kedua ruang diskret.

Sekarang terdapat pemetaan

$$Z_0 \times [0, t] \xrightarrow{\tau} Z$$

dan

$$Z_0 \times [s, 1] \xrightarrow{\phi \times \text{id}} F \times [s, 1] \xrightarrow{\sigma} Z.$$

Keduanya sama pada $Z_0 \times [s, t]$ menurut konstruksi ϕ . Lema penempelan untuk sampul tertutup $[0, t] \cup [s, 1]$ menghasilkan pemetaan kontinu

$$T: Z_0 \times I \longrightarrow Z$$

di atas I . Dengan menempelkan pemetaan-pemetaan balik pada $Z_{[0,t]}$ dan $Z_{[s,1]}$, kita memperoleh pemetaan kontinu

$$S: Z \longrightarrow Z_0 \times I$$

di atas I . Evaluasi titik demi titik menunjukkan $S \circ T = \text{id}$ dan $T \circ S = \text{id}$. Jadi T merupakan isomorfisma dalam $\mathbf{Cov}_I$ dan, berkat normalisasi τ , memenuhi $T(z, 0) = z$.

Langkah dua bagian ini dapat diterapkan berulang sepanjang rantai subinterval. Maka diperoleh isomorfisma ternormalisasi $Z_0 \times I \cong Z$ untuk sampul berhingga semula. $\square$

Akibat 5.2 (penampang tunggal dengan nilai awal). Diberikan ruang penutup $Z \xrightarrow{\pi} I$ dan titik $z \in Z_0$, terdapat tepat satu lintasan

$$\eta_z: I \longrightarrow Z$$

sedemikian sehingga

$$\eta_z(0) = z, \quad \pi \circ \eta_z = \text{id}_I.$$

Dengan kata lain, terdapat tepat satu penampang π yang bernilai z pada 0.

Bukti. Pilih isomorfisma ternormalisasi

$$T: Z_0 \times I \xrightarrow{\cong} Z$$

dari Proposisi 5.2. Definisikan

$$\eta_z(t) = T(z, t).$$

Karena T berada di atas I , pemetaan ini memenuhi $\pi \circ \eta_z = \text{id}_I$, dan normalisasi memberikan $\eta_z(0) = z$.

Untuk keunikan, jika η' merupakan penampang lain dengan nilai awal z , tuliskan

$$T^{-1}(\eta'(t)) = (a(t), t).$$

Fungsi $a: I \rightarrow Z_0$ kontinu. Karena I terhubung dan Z_0 diskret, a konstan. Nilai awal memaksa $a(t) = z$ untuk semua t , sehingga $\eta'(t) = T(z, t) = \eta_z(t)$. $\square$

5.4 Pengangkatan lintasan dan transpor serat

Sekarang kita memperoleh salah satu sifat terpenting ruang penutup.

Teorema 5.1 (pengangkatan lintasan tunggal). Diberikan ruang penutup apa pun $Z \xrightarrow{\pi} X$, lintasan $\gamma: I \rightarrow X$, dan titik $z \in Z_{\gamma(0)}$, terdapat tepat satu pengangkatan

$$\tilde{\gamma}_z: I \longrightarrow Z$$

yang memenuhi

$$\tilde{\gamma}_z(0) = z, \quad \pi \circ \tilde{\gamma}_z = \gamma.$$

Tidak diperlukan asumsi bahwa X terhubung atau SLPC.

Bukti. Bentuk tarik balik

$$p: \gamma^* Z \longrightarrow I.$$

Seratnya di 0 teridentifikasi secara kanonik dengan $Z_{\gamma(0)}$, sehingga titik awal yang sesuai adalah $(0, z)$. Menurut Akibat 5.2, terdapat tepat satu penampang

$$\eta_{(0,z)}: I \longrightarrow \gamma^* Z$$

dengan

$$\eta_{(0,z)}(0) = (0, z), \quad p \circ \eta_{(0,z)} = \text{id}_I.$$

Definisikan

$$\tilde{\gamma}_z = \text{pr}_2 \circ \eta_{(0,z)}: I \longrightarrow Z.$$

Persegi tarik balik memberikan

$$\pi \circ \tilde{\gamma}_z = \pi \circ \text{pr}_2 \circ \eta_{(0,z)} = \gamma \circ p \circ \eta_{(0,z)} = \gamma,$$

dan nilai awalnya adalah z .

Sebaliknya, setiap pengangkatan lain $\lambda: I \rightarrow Z$ dengan $\lambda(0) = z$ menentukan penampang kedua dari p melalui

$$t \longmapsto (t, \lambda(t)).$$

Penampang itu mempunyai nilai awal $(0, z)$, sehingga oleh keunikan pada Akibat 5.2 ia sama dengan $\eta_{(0,z)}$. Maka $\lambda = \tilde{\gamma}_z$. $\square$

Teorema ini memberi bukti kedua yang lebih eksplisit bagi Proposisi 4.3.

Akibat 5.3 (transpor sepanjang lintasan). Setiap lintasan $\gamma: I \rightarrow X$ mendefinisikan bijeksi

$$\gamma_*: Z_{\gamma(0)} \xrightarrow{\cong} Z_{\gamma(1)}, \quad \gamma_*(z) = \tilde{\gamma}_z(1).$$

Bukti. Pertama, γ_* memang merupakan fungsi ke $Z_{\gamma(1)}$ karena

$$\pi(\tilde{\gamma}_z(1)) = \gamma(1).$$

Definisikan lintasan balik

$$\bar{\gamma}(t) = \gamma(1 - t).$$

Jika $z \in Z_{\gamma(0)}$, lintasan balik dari $\tilde{\gamma}_z$ dimulai di $\gamma_*(z)$ dan merupakan pengangkatan $\bar{\gamma}$. Oleh keunikan pengangkatan,

$$\bar{\gamma}_*(\gamma_*(z)) = z.$$

Argumen simetris, dimulai dari $w \in Z_{\gamma(1)}$, memberikan

$$\gamma_*(\bar{\gamma}_*(w)) = w.$$

Jadi $\bar{\gamma}_*$ adalah invers γ_* , sehingga γ_* bijektif. $\square$

Pengamatan pertama tentang transpor ini adalah invariansinya terhadap reparameterisasi. Jika

$$\psi: I \xrightarrow{\cong} I, \quad \psi(0) = 0, \quad \psi(1) = 1,$$

maka

$$(\gamma \circ \psi)_* = \gamma_*: Z_{\gamma(0)} \longrightarrow Z_{\gamma(1)}.$$

Memang, $\tilde{\gamma}_z \circ \psi$ adalah pengangkatan $\gamma \circ \psi$ yang berawal di z . Keunikan pengangkatan menyatakan bahwa itulah $(\gamma \circ \psi)_z$, dan kedua lintasan terangkat mempunyai titik akhir yang sama. Pernyataan ini baru membuktikan invariansi terhadap reparameterisasi, belum invariansi terhadap homotopi lintasan.

Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Bagian ini merupakan materi baru untuk edisi bahasa Indonesia dan tersedia di bawah CC BY 4.0. Tidak ada latihan eksplisit dalam rentang sumber Kuliah 5 ini. Empat pemeriksaan berikut menutup langkah-langkah pembuktian dan penerapan yang paling penting; semuanya langsung disertai solusi lengkap. Bukti Lema 5.1 yang tidak dituliskan dalam sumber juga diberikan.

Pemeriksaan penguasaan 5.1 (serat tipikal dan transpor). Jelaskan perbedaan logis antara pernyataan “semua serat di atas satu komponen lintasan mempunyai tipe isomorfisma yang sama” dan “suatu lintasan γ menentukan transpor γ_* ”. Mengapa Akibat 5.3 lebih kuat daripada bukti pertama Proposisi 4.3, tetapi belum memberikan identifikasi yang bebas dari pilihan lintasan?

5.5 Solusi Pemeriksaan 5.1

Bukti pertama hanya menghasilkan keberadaan setidaknya satu bijeksi di antara dua serat, melalui pilihan sampel, subdivisi, dan trivialisasi. Kesimpulan yang dapat dicatat tanpa mempertahankan semua pilihan itu hanyalah kelas isomorfisma serat pada setiap komponen lintasan.

Sebaliknya, setelah lintasan tertentu γ dan titik awal z diberikan, Teorema 5.1 memilih tepat satu lintasan terangkat. Karena itu rumus

$$z \longmapsto \tilde{\gamma}_z(1)$$

memberikan fungsi yang ditentukan oleh γ , bukan sekadar bukti bahwa suatu bijeksi ada. Namun, dua lintasan berbeda dari x_0 ke x_1 dapat menghasilkan permutasi serat yang berbeda. Unit ini baru membuktikan bahwa reparameterisasi berujung tetap tidak mengubah transpor; belum dibuktikan bahwa deformasi lain pada lintasan tidak mengubahnya.

Pemeriksaan penguasaan 5.2 (struktur tarik balik). Buktikan ketiga butir Proposisi 5.1 dan isomorfisma serat pada Akibat 5.1 secara eksplisit.

5.6 Solusi Pemeriksaan 5.2

Untuk butir pertama, tetapkan $y_0 \in Y$. Pilih lingkungan terbuka $V \ni f(y_0)$ yang di atasnya Z trivial, dengan

$$\pi^{-1}(V) \cong V \times F$$

di atas V . Himpunan $W = f^{-1}(V)$ merupakan lingkungan terbuka y_0 . Dengan mengambil hasil kali serat, diperoleh

$$p^{-1}(W) = W \times_V \pi^{-1}(V) \cong W \times_V (V \times F) \cong W \times F$$

di atas W . Jadi $p: f^*Z \rightarrow Y$ adalah pemetaan penutup.

Untuk butir kedua, jika $h: Z_1 \rightarrow Z_2$ merupakan morfisma di atas X , definisikan

$$f^*h: f^*Z_1 \longrightarrow f^*Z_2, \quad (y, z) \longmapsto (y, h(z)).$$

Karena $\pi_2(h(z)) = \pi_1(z) = f(y)$, pasangan di ruas kanan memang berada dalam f^*Z_2 . Rumus ini mempertahankan proyeksi ke Y , bersifat kontinu, serta memenuhi

$$f^*(\text{id}) = \text{id}, \quad f^*(h_2 \circ h_1) = f^*h_2 \circ f^*h_1.$$

Jadi f^* adalah functor.

Untuk butir ketiga, kedua ruang dapat ditulis sebagai

$$(f \circ g)^*Z = \{(y_2, z) \mid f(g(y_2)) = \pi(z)\}$$

dan

$$g^*(f^*Z) = \{(y_2, (y_1, z)) \mid g(y_2) = y_1, f(y_1) = \pi(z)\}.$$

Isomorfisma kanoniknya adalah

$$(y_2, z) \longmapsto (y_2, (g(y_2), z)),$$

dengan invers $(y_2, (y_1, z)) \mapsto (y_2, z)$. Kedua pemetaan kontinu, berada di atas Y_2 , dan tidak melibatkan pilihan apa pun.

Terakhir,

$$(f^*Z)_y = \{(y, z) \mid \pi(z) = f(y)\}.$$

Pemetaan $(y, z) \mapsto z$ merupakan bijeksi kanonik ke $Z_{f(y)}$, dan homeomorfisma karena serat-serat ruang penutup diskret. Inversnya adalah $z \mapsto (y, z)$.

5.7 Bukti Lema 5.1

Untuk setiap $x \in X$, definisi ruang penutup memberikan lingkungan terbuka $V_x \ni x$ yang di atasnya $Z \rightarrow X$ trivial. Keluarga $\{V_x\}_{x \in X}$ merupakan sampul terbuka dari X . Karena X kompak, terdapat subkeluarga berhingga

$$V_{x_1}, \dots, V_{x_m}$$

yang masih menutupi X . Setiap anggotanya tetap merupakan lingkungan terbuka tempat ruang penutup itu trivial. Inilah sampul berhingga yang diminta.

Pemeriksaan penguasaan 5.3 (mengangkat satu putaran lingkaran). Untuk $n \geq 1$, pertimbangkan pemetaan penutup

$$p_n: S^1 \longrightarrow S^1, \quad p_n(z) = z^n,$$

dan lintasan $\gamma(t) = e^{2\pi it}$. Tentukan pengangkatan yang berawal di $z_k = e^{2\pi ik/n}$, dengan $k \in \{0, \dots, n-1\}$, lalu hitung transpor $\gamma_*(z_k)$.

5.8 Solusi Pemeriksaan 5.3

Definisikan

$$\tilde{\gamma}_{z_k}(t) = e^{2\pi i(t+k)/n}.$$

Nilai awalnya adalah $e^{2\pi i k/n} = z_k$, dan

$$p_n(\tilde{\gamma}_{z_k}(t)) = \left(e^{2\pi i(t+k)/n}\right)^n = e^{2\pi i(t+k)} = e^{2\pi i t} = \gamma(t).$$

Oleh keunikan pengangkatan, inilah pengangkatan yang diminta. Titik akhirnya adalah

$$\gamma_*(z_k) = e^{2\pi i(k+1)/n} = z_{k+1 \bmod n}.$$

Jadi satu putaran positif pada ruang dasar menggerakkan serat dengan siklus $z_0 \mapsto z_1 \mapsto \cdots \mapsto z_{n-1} \mapsto z_0$.

Pemeriksaan penguasaan 5.4 (naturalitas transpor). Misalkan $h: Z_1 \rightarrow Z_2$ merupakan morfisma ruang penutup di atas X , dan γ lintasan dalam X . Buktikan bahwa diagram transpor serat

$$\begin{array}{ccc} (Z_1)_{\gamma(0)} & \xrightarrow{\gamma_*^{Z_1}} & (Z_1)_{\gamma(1)} \\ h \downarrow & & \downarrow h \\ (Z_2)_{\gamma(0)} & \xrightarrow{\gamma_*^{Z_2}} & (Z_2)_{\gamma(1)} \end{array}$$

komutatif.

5.9 Solusi Pemeriksaan 5.4

Ambil $z \in (Z_1)_{\gamma(0)}$. Karena h berada di atas X , kita mempunyai

$$\pi_2 \circ h = \pi_1.$$

Maka komposisi

$$h \circ \tilde{\gamma}_z^{Z_1} : I \longrightarrow Z_2$$

merupakan pengangkatan γ dan berawal di $h(z)$. Teorema 5.1 memberikan hanya satu pengangkatan dengan nilai awal itu, sehingga

$$h \circ \tilde{\gamma}_z^{Z_1} = \tilde{\gamma}_{h(z)}^{Z_2}.$$

Evaluasi pada $t = 1$ menghasilkan

$$h(\gamma_*^{Z_1}(z)) = h(\tilde{\gamma}_z^{Z_1}(1)) = \tilde{\gamma}_{h(z)}^{Z_2}(1) = \gamma_*^{Z_2}(h(z)).$$

Karena persamaan berlaku untuk setiap z , diagram tersebut komutatif.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya [Notes.tex baris 1305–1515 pada commit b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#). Rentang itu dimulai dengan penanda Kuliah 6 dan aksi lintasan pada serat ruang penutup, lalu berakhir setelah teorema Wada–Roberts tentang keterhubungan lintasan semilokal ruang pemetaan. Baris 1516 memulai Kuliah 7 dan tidak termasuk dalam unit ini. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, dan pemindahan semua keterangan pinggir ke urutan bacaan utama. Koreksi atau klarifikasi substantif yang diterapkan adalah sebagai berikut: contoh penutup eksponensial dibuat konsisten sebagai $p: \mathbb{R} \rightarrow S^1$, $p(t) = e^{it}$, sehingga serat dan titik akhir pengangkatan benar; hipotesis bagi pemilihan satu titik serat pada setiap komponen lintasan ruang atas dinyatakan; dua salah ketik pada pembahasan faktorisasi dan homotopi diperbaiki; bukti kekontinuan operator pengangkatan diperbaiki dengan kendali eksplisit pada irisan lembaran, menggantikan himpunan yang salah tipe, lingkungan yang tidak didefinisikan, dan klaim kesamaan yang tidak terbukti dalam sumber; contoh manifold memakai bola koordinat yang benar-benar konveks; serta indeks anting-anting Hawaii dibatasi pada $n \geq 1$. Semua perbaikan merupakan bagian dari adaptasi independen ini, bukan salinan ungkapan dari sumber lain.

Rentang sumber tidak memuat lingkungan latihan. Bagian pendamping penguasaan menambahkan empat pemeriksaan beserta solusi lengkap: aksi loop pada penutup lingkaran, basis topologi kompak-terbuka, kekontinuan dan kesurjektifan transpor, serta contoh-contoh SLSC. Bukti utama Wada–Roberts tidak diberikan dalam sumber, melainkan dirujuk ke *Handout 1*. Agar unit dapat dipelajari mandiri, pendamping menutup celah itu dengan pembuktian khusus kasus $n = 1$ yang diturunkan langsung dari definisi SLSC dan diberi label tegas sebagai materi edisi, bukan sebagai teks Roberts atau reproduksi handout. Seluruh materi pendamping tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

6 Kuliah 6

6.1 Loop dan aksi pada serat

Hasil Unit 5 dapat dirumuskan lebih kuat sebagai sebuah fungsi

$$\{\text{lintasan } x_0 \rightsquigarrow x_1 \text{ di } X\} \times Z_{x_0} \longrightarrow Z_{x_1}, \quad (\gamma, z) \longmapsto \gamma_*(z).$$

Jika $x_0 = x_1 = x$, fungsi itu menjadi

$$\{\text{loop } x \rightsquigarrow x \text{ di } X\} \times Z_x \longrightarrow Z_x.$$

Setiap loop memberikan bijeksi $Z_x \rightarrow Z_x$, sehingga informasi yang sama dapat dipandang sebagai fungsi

$$\{\text{loop } x \rightsquigarrow x \text{ di } X\} \longrightarrow \text{Aut}(Z_x), \quad \gamma \longmapsto \gamma_*.$$

Jika diinginkan, himpunan lintasan atau loop pada rumus-rumus ini dapat terlebih dahulu dibagi menurut reparameterisasi berujung tetap, karena Unit 5 menunjukkan bahwa reparameterisasi tidak mengubah γ_* .

Untuk ruang penutup bertitik

$$(Z, z) \xrightarrow{\pi} (X, x),$$

kita juga memperoleh fungsi kanonik

$$\{\text{loop } x \rightsquigarrow x \text{ di } X\} \longrightarrow Z_x, \quad \gamma \longmapsto \gamma_*(z). \quad (6.1)$$

Contoh 6.1 (penutup trivial dan penutup eksponensial). Untuk penutup trivial $Z = S \times X \rightarrow X$, transpor setiap lintasan bertindak sebagai identitas pada koordinat S :

$$\gamma_*: S \longrightarrow S, \quad \gamma_* = \text{id}_S.$$

Karena itu, setelah suatu titik (s, x) dipilih, citra fungsi (6.1) hanya terdiri atas satu titik. Setiap ruang penutup dari I bersifat trivial menurut Proposisi 5.2, sehingga fenomena yang sama berlaku di sana.

Sebaliknya, pertimbangkan pemetaan penutup

$$p: \mathbb{R} \longrightarrow S^1, \quad p(t) = e^{it},$$

dengan titik dasar $x = 1 \in S^1$ dan $z = 0 \in \mathbb{R}$. Seratnya adalah

$$p^{-1}(1) = 2\pi\mathbb{Z}.$$

Fungsi

$$\{\gamma: I \rightarrow S^1 \mid \gamma(0) = \gamma(1) = 1\} \longrightarrow 2\pi\mathbb{Z}, \quad \gamma \longmapsto \gamma_*(0),$$

surjektif. Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$, lintasan

$$\tilde{\gamma}_n(t) = 2\pi nt$$

mengangkat loop

$$\gamma_n(t) = e^{2\pi int},$$

dan memenuhi

$$\tilde{\gamma}_n(0) = 0, \quad \tilde{\gamma}_n(1) = 2\pi n.$$

Perbedaan dengan penutup trivial berserat lebih dari satu titik adalah bahwa $\mathbb{R}$ terhubung lintasan, sedangkan $X \times S$ tidak terhubung lintasan jika $|S| > 1$.

Secara umum, andaikan $(Z, z) \xrightarrow{\pi} (X, x)$ merupakan ruang penutup bertitik dan Z terhubung lintasan. Untuk setiap $z' \in Z_x$, terdapat lintasan

$$\tilde{\gamma}: I \longrightarrow Z, \quad \tilde{\gamma}(0) = z, \quad \tilde{\gamma}(1) = z'.$$

Proyeksinya $\gamma = \pi \circ \tilde{\gamma}$ adalah loop pada x , dan keunikan pengangkatan memberi $\tilde{\gamma} = \tilde{\gamma}_z$. Jadi fungsi (6.1) surjektif. Dengan demikian, lintasan membatasi ukuran serat ruang penutup terhubung, dan

ukuran serat juga membatasi kemungkinan lintasan. Himpunan loop pada X sendiri tidak bergantung pada ruang penutup yang dipilih.

Lebih umum lagi, andaikan setiap komponen lintasan Z_α dari Z bertemu serat Z_x ; kondisi ini berlaku, misalnya, jika X terhubung lintasan. Pilih satu titik $z_\alpha \in Z_\alpha \cap Z_x$ untuk setiap α . Pilihan itu adalah sebuah penampang dari pemetaan kanonik $Z \rightarrow [*, Z]$ pada tingkat himpunan. Maka fungsi

$$\{\text{loop pada } x\} \times [*, Z] \cong \{\text{loop pada } x\} \times \{z_\alpha\} \longrightarrow Z_x, \quad (\gamma, \alpha) \longmapsto \gamma_*(z_\alpha), \quad (6.2)$$

selalu surjektif. Memang, setiap $z' \in Z_x$ berada dalam satu komponen Z_α , lalu suatu lintasan dalam komponen itu dari z_α ke z' memproyeksikan ke loop yang diperlukan.

Jumlah lintasan biasanya sangat besar. Mengambil hasil bagi terhadap reparameterisasi memang mengurangi redundansi, tetapi kita dapat berbuat lebih banyak: kita dapat memberi topologi pada himpunan lintasan.

6.2 Topologi kompak-terbuka pada ruang lintasan

Serat Z_x dari ruang penutup bersifat diskret, sedangkan himpunan $\text{Top}(I, X)$ dari semua lintasan $I \rightarrow X$ dapat diberi topologi. Jika X metrik, kita dapat memakai metrik supremum

$$d_\infty(\gamma, \eta) = \sup_{t \in I} d(\gamma(t), \eta(t)).$$

Tujuan kita adalah mendefinisikan topologi yang juga berlaku ketika X bukan ruang metrik.

Lema 6.1 (basis lingkungan kompak-terbuka). Misalkan X ruang topologis dan $\gamma \in \text{Top}(I, X)$. Pilih partisi

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n < t_{n+1} = 1$$

serta himpunan-himpunan terbuka $U_0, \dots, U_n \subseteq X$ sedemikian sehingga

$$\gamma([t_i, t_{i+1}]) \subseteq U_i \quad (0 \leq i \leq n),$$

Definisikan

$$\begin{aligned} N_\gamma(t_1 < \cdots < t_n; U_0, \dots, U_n) \\ := \{\eta: I \rightarrow X \mid \eta([t_i, t_{i+1}]) \subseteq U_i \text{ untuk setiap } i\}. \end{aligned}$$

Ketika partisi dan himpunan terbuka tersebut bervariasi, himpunan-himpunan N_γ membentuk basis lingkungan pada $\text{Top}(I, X)$.

Catatan sumber merumuskan hal yang sama dengan lingkungan U_i dan interior U_i° , yang didefinisikan di catatan pinggir sebagai gabungan semua himpunan terbuka yang termuat dalam U_i . Edisi ini memilih U_i terbuka sejak awal, sehingga $U_i^\circ = U_i$ dan rumusnya ekuivalen.

Definisi 6.1 (ruang lintasan). Ruang lintasan X^I adalah himpunan $\text{Top}(I, X)$ yang dilengkapi topologi dari Lema 6.1. Topologi itu disebut *topologi kompak-terbuka*.

Jika X metrik, topologi kompak-terbuka sama dengan topologi yang dihasilkan oleh metrik supremum. Sifat penting lainnya adalah hukum eksponensial: karena I kompak Hausdorff, untuk setiap ruang Y , pemetaan kontinu

$$H: Y \times I \longrightarrow X$$

berkorespondensi dengan pemetaan kontinu

$$h: Y \longrightarrow X^I, \quad h(y)(t) = H(y, t),$$

dan sebaliknya. Secara khusus, homotopi $H: I \times I \rightarrow X$ dapat dipandang sebagai lintasan $h: I \rightarrow X^I$, dengan

$$h_s(t) = H(s, t).$$

Lema 6.2. Berlaku dua sifat berikut.

1. Pemetaan evaluasi

$$\text{ev}: X^I \times I \longrightarrow X, \quad \text{ev}(\gamma, t) = \gamma(t),$$

kontinu.

2. Untuk setiap pemetaan kontinu $f: X \rightarrow Y$, pemetaan pascakomposisi

$$f_*: X^I \longrightarrow Y^I, \quad f_*(\gamma) = f \circ \gamma,$$

kontinu.

Untuk $t \in I$, evaluasi pada waktu tetap

$$\text{ev}_t: X^I \longrightarrow X, \quad \text{ev}_t(\gamma) = \gamma(t),$$

kontinu sebagai komposisi

$$X^I \cong X^I \times \{t\} \hookrightarrow X^I \times I \xrightarrow{\text{ev}} X.$$

Kasus yang paling sering dipakai adalah $t = 0$ dan $t = 1$. Untuk $x, y \in X$, definisikan subruang-subruang

$$\begin{aligned} P_x X &:= \{\gamma \in X^I \mid \gamma(0) = x\} = \text{ev}_0^{-1}(x), \\ P_x^y X &:= \{\gamma \in X^I \mid \gamma(0) = x, \gamma(1) = y\} \\ &= \text{ev}_0^{-1}(x) \cap \text{ev}_1^{-1}(y), \\ \Omega_x X &:= P_x^x X = \{\gamma \in X^I \mid \gamma(0) = x = \gamma(1)\}. \end{aligned}$$

Dua ruang terakhir sudah muncul sebelumnya, tetapi tanpa topologinya. Lintasan di dalam $P_x^y X$ berkorespondensi dengan homotopi antarlintasan yang mempertahankan kedua titik ujung. Karena itu, komponen lintasan ruang-ruang pemetaan ini berkaitan langsung dengan kelas homotopi lintasan relatif terhadap titik ujung.

6.3 Kekontinuan operator pengangkatan

Transformasi natural

$$\text{id} \Rightarrow \text{disc } \pi_0: \mathbf{Top}_{\text{slpc}} \longrightarrow \mathbf{Top}_{\text{slpc}}$$

mempunyai sifat universal berikut. Jika S diskret, X SLPC, dan $f: X \rightarrow S$ kontinu, terdapat tepat satu fungsi $\bar{f}: \pi_0(X) \rightarrow U(S)$ yang membuat diagram

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & S \\ q \downarrow & \nearrow \text{disc}(\bar{f}) & \\ \text{disc}(\pi_0(X)) & & \end{array}$$

komutatif. Di sini q mengirim setiap titik ke komponen terhubungnya.

Sekarang ambil ruang penutup $Z \rightarrow X$. Fungsi transpor Unit 5 memberikan

$$A: P_x^y X \times Z_x \longrightarrow Z_y, \quad A(\gamma, z) = \gamma_*(z). \quad (6.3)$$

Jika A kontinu, karena Z_y diskret fungsi itu konstan pada komponen terhubung dan memfaktor sebagai

$$P_x^y X \times Z_x \longrightarrow \pi_0(P_x^y X \times Z_x) \cong \pi_0(P_x^y X) \times Z_x \longrightarrow Z_y.$$

Isomorfisma tengah ada karena Z_x diskret. Jika Z terhubung lintasan dan suatu $z \in Z_x$ ditetapkan, kita memperoleh fungsi surjektif

$$\pi_0(P_x^y X) \longrightarrow Z_y.$$

Hal ini semakin membatasi topologi ruang lintasan dan serat yang mungkin dimiliki ruang penutup. Namun, masih ada dua persoalan:

1. kita belum mengetahui bahwa fungsi pengangkatan lintasan kontinu;
2. kita belum mengetahui bahwa $P_x^y X$ bersifat SLPC, sehingga belum dapat menyamakan komponen lintasan dengan komponen terhubungnya.

Untuk menangani persoalan pertama, kita tingkatkan sifat pengangkatan lintasan tunggal menjadi sebuah fungsi kontinu. Definisikan hasil kali serat

$$X^I \times_X Z := \{(\gamma, z) \in X^I \times Z \mid \gamma(0) = \pi(z)\}$$

dan operator

$$\text{Lift}: X^I \times_X Z \longrightarrow Z^I, \quad \text{Lift}(\gamma, z) = \tilde{\gamma}_z.$$

Fungsi ini sudah terdefinisi oleh Teorema 5.1; yang harus dibuktikan sekarang adalah kekontinuannya. Setelah itu, fungsi (6.3) dapat ditulis sebagai komposisi

$$P_x^y X \times Z_x \hookrightarrow X^I \times_X Z \xrightarrow{\text{Lift}} Z^I \xrightarrow{\text{ev}_1} Z,$$

yang citranya termuat dalam Z_y .

Teorema 6.1. Fungsi

$$\text{Lift}: X^I \times_X Z \longrightarrow Z^I$$

kontinu.

Bukti. Tetapkan $(\gamma, z) \in X^I \times_X Z$, dan tuliskan

$$\tilde{\gamma} = \text{Lift}(\gamma, z).$$

Ambil lingkungan dasar

$$N_{\tilde{\gamma}} = N_{\tilde{\gamma}}(t_1 < \cdots < t_n; U_0, \dots, U_n)$$

dari $\tilde{\gamma}$ dalam Z^I . Kita akan membangun lingkungan $M(\gamma, z)$ yang dipetakan oleh Lift ke dalam $N_{\tilde{\gamma}}$. Karena π merupakan homeomorfisma lokal dan I kompak, kita dapat memperhalus partisi menjadi

$$0 = s_0 < s_1 < \cdots < s_m = 1$$

yang memuat semua titik t_j , serta memilih lembaran-lembaran terbuka $W_1, \dots, W_m \subseteq Z$ sedemikian sehingga, untuk setiap k ,

$$\tilde{\gamma}([s_{k-1}, s_k]) \subseteq W_k \subseteq U_{j(k)},$$

subinterval $[s_{k-1}, s_k]$ termuat dalam $[t_{j(k)}, t_{j(k)+1}]$, dan pembatasan

$$\pi|_{W_k} : W_k \xrightarrow{\cong} V_k := \pi(W_k)$$

merupakan homeomorfisma ke himpunan terbuka $V_k \subseteq X$.

Pada setiap titik sambung s_k , kedua lembaran W_k dan W_{k+1} memuat $\tilde{\gamma}(s_k)$. Pilih lingkungan terbuka

$$Q_k \ni \tilde{\gamma}(s_k), \quad Q_k \subseteq W_k \cap W_{k+1},$$

yang dipetakan homeomorfik oleh π ke lingkungan terbuka $R_k := \pi(Q_k)$ dari $\gamma(s_k)$.

Definisikan lingkungan terbuka B dari γ dalam X^I dengan

$$B := N_{\gamma}(s_1 < \cdots < s_{m-1}; V_1, \dots, V_m) \cap \bigcap_{k=1}^{m-1} \text{ev}_{s_k}^{-1}(R_k).$$

Lalu tetapkan

$$M(\gamma, z) := (B \times W_1) \cap (X^I \times_X Z).$$

Ini merupakan lingkungan terbuka (γ, z) dalam hasil kali serat.

Ambil $(\eta, w) \in M(\gamma, z)$ dan tuliskan $\tilde{\eta} = \text{Lift}(\eta, w)$. Pada subinterval pertama, lintasan

$$t \longmapsto (\pi|_{W_1})^{-1}(\eta(t))$$

adalah pengangkatan $\eta|_{[s_0, s_1]}$ yang berawal di w . Oleh keunikan pengangkatan, $\tilde{\eta}([s_0, s_1]) \subseteq W_1$. Karena $\eta(s_1) \in R_1$ dan prapeta R_1 pada lembaran W_1 termuat dalam $Q_1 \subseteq W_2$, titik $\tilde{\eta}(s_1)$ juga berada dalam W_2 .

Argumen yang sama dapat diulang secara induktif. Kita memperoleh

$$\tilde{\eta}([s_{k-1}, s_k]) \subseteq W_k \subseteq U_{j(k)}$$

untuk setiap k . Karena partisi s_k memperhalus partisi t_j , hal ini menunjukkan

$$\tilde{\eta} \in N_{\tilde{\gamma}}.$$

Jadi

$$M(\gamma, z) \subseteq \text{Lift}^{-1}(N_{\tilde{\gamma}}).$$

Setiap lingkungan dasar dari $\tilde{\gamma}$ mempunyai prapeta yang merupakan lingkungan (γ, z) . Maka Lift kontinu. $\square$

Catatan 6.1. Keunikan pengangkatan menunjukkan bahwa Lift sebenarnya bijektif, bahkan homeomorfisma. Inversnya adalah

$$(\pi_*, \text{ev}_0): Z^I \longrightarrow X^I \times_X Z, \quad \lambda \longmapsto (\pi \circ \lambda, \lambda(0)).$$

Pemetaan invers itu kontinu menurut Lema 6.2. Komposisi pada kedua arah adalah identitas karena setiap lintasan λ merupakan pengangkatan tunggal dari $\pi \circ \lambda$ dengan nilai awal $\lambda(0)$.

Dengan demikian fungsi transpor

$$P_x^y X \times Z_x \longrightarrow Z_y$$

kontinu dan menghasilkan fungsi

$$\pi_0(P_x^y X) \times Z_x \longrightarrow Z_y.$$

Kita masih ingin mengetahui bahwa dua titik $\gamma, \eta \in P_x^y X$ dalam komponen terhubung yang sama dapat dihubungkan oleh lintasan dalam $P_x^y X$. Lintasan seperti itu setara dengan homotopi

$$H: I \times I \longrightarrow X$$

dari γ ke η yang *mempertahankan titik ujung*, yaitu

$$H(0, t) = \gamma(t), \quad H(1, t) = \eta(t) \quad \text{untuk setiap } t \in I,$$

dan

$$H(s, 0) = x, \quad H(s, 1) = y \quad \text{untuk setiap } s \in I.$$

6.4 Ruang terhubung sederhana semilokal

Definisi 6.2 (terhubung sederhana semilokal). Dalam konvensi mata kuliah ini, sebuah ruang X disebut *terhubung sederhana semilokal*, disingkat **SLSC**, jika setiap titik mempunyai basis lingkungan terbuka N dengan kedua sifat berikut:

1. N terhubung lintasan;
2. untuk setiap $x, y \in N$ dan setiap dua lintasan $\gamma, \eta \in P_x^y N$, terdapat homotopi di X dari γ ke η yang mempertahankan titik ujung.

Lintasan-lintasan awal berada di dalam N , sedangkan homotopinya diperbolehkan bergerak di seluruh X . Ini adalah syarat teknis terakhir pada ruang yang diperlukan dalam bagian mata kuliah ini.

Peringatan istilah: konvensi ini menggabungkan dua syarat yang sering dipisahkan dalam pustaka, yakni *terhubung lintasan lokal* dan *terhubung sederhana semilokal* dalam arti standar. Dengan keterhubungan lintasan lokal, Definisi 6.2 setara dengan adanya basis lingkungan terhubung lintasan N sehingga homomorfisma yang diinduksi inklusi $\pi_1(N, u) \rightarrow \pi_1(X, u)$ trivial untuk setiap $u \in N$. Istilah SLSC tanpa syarat tambahan dalam arti standar tidak dengan sendirinya menyiratkan SLPC.

Setiap ruang SLSC bersifat SLPC, sebab basis lingkungan dalam Definisi 6.2 khususnya terdiri atas himpunan-himpunan terhubung lintasan.

Contoh 6.2. Setiap manifold bersifat SLSC. Untuk manifold tanpa batas, di dalam suatu peta koordinat kita dapat memilih lingkungan yang citranya merupakan bola Euklides kecil. Untuk manifold dengan batas, gunakan setengah bola yang konveks dalam peta koordinat batas. Dalam kedua kasus citra itu konveks, sehingga dua lintasan di dalamnya yang mempunyai titik ujung sama dapat dihubungkan oleh homotopi garis lurus yang mempertahankan titik ujung.

Contoh 6.3 (anting-anting Hawaii). *Anting-anting Hawaii* adalah subruang

$$\mathbb{H} := \bigcup_{n \geq 1} \left\{ (u, v) \in \mathbb{R}^2 \mid \left\| (u, v) - \left(\frac{1}{n}, 0 \right) \right\| = \frac{1}{n} \right\}.$$

Ruang ini tidak SLSC. Setiap lingkungan titik $(0, 0)$ memuat seluruh lingkaran penyusun untuk semua n yang cukup besar. Loop yang mengitari salah satu lingkaran itu tidak dapat dikontraksikan bahkan di dalam seluruh $\mathbb{H}$.

Teorema 6.2 (Wada 1955; diperkuat oleh Roberts 2010). Jika X terhubung sederhana semilokal, maka ruang-ruang

$$X^I, \quad P_x X, \quad P_x^y X, \quad \text{dan karenanya } \Omega_x X,$$

bersifat terhubung lintasan semilokal.

Atribusi yang dicantumkan dalam sumber: H. Wada, “Local connectivity of mapping spaces,” *Duke Mathematical Journal* **22**(3), 1955, hlm. 419–425; dan D. M. Roberts, “[Fundamental bigroupoids and 2-covering spaces](#),” [Teorema 5.12](#) (2010). Teorema 6.2 adalah kasus $n = 1$ dari hasil Roberts tersebut.

Bukti (tidak diujikan dalam catatan sumber). Sumber merujuk pembaca ke *Handout 1*. Argumen lengkap tidak terdapat dalam rentang sumber unit ini dan tidak direkonstruksi sebagai seolah-olah merupakan teks Roberts. Sebagai pengganti untuk keperluan belajar mandiri, bagian pendamping di bawah memberikan pembuktian kasus $n = 1$ yang diturunkan secara independen dari definisi-definisi unit ini dan dilabeli sebagai materi edisi. $\square$

Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Bagian ini merupakan materi baru untuk edisi bahasa Indonesia dan tersedia di bawah CC BY 4.0. Keempat pemeriksaan berikut dapat dikerjakan tanpa sumber tambahan dan semuanya disertai solusi lengkap. Bagian terakhir memberikan bukti mandiri khusus kasus Teorema 6.2 yang digunakan dalam mata kuliah ini; bukti tersebut merupakan kontribusi edisi dan bukan reproduksi *Handout 1*.

Pemeriksaan penguasaan 6.1 (aksi loop pada penutup lingkaran). Untuk $p(t) = e^{it}: \mathbb{R} \rightarrow S^1$, tentukan transpor pada serat $2\pi\mathbb{Z}$ yang dihasilkan oleh loop $\gamma_n(t) = e^{2\pi i n t}$. Tunjukkan pula bahwa penggabungan loop dengan bilangan putaran m dan n menghasilkan transpor dengan bilangan putaran $m + n$.

6.5 Solusi Pemeriksaan 6.1

Jika titik awal pada serat ditulis $2\pi k$, pengangkatan tunggal adalah

$$\tilde{\gamma}_{n,k}(t) = 2\pi k + 2\pi nt,$$

sebab

$$p(\tilde{\gamma}_{n,k}(t)) = e^{i(2\pi k + 2\pi nt)} = e^{2\pi i nt} = \gamma_n(t).$$

Karena titik akhirnya $2\pi(k+n)$, transpor bertindak sebagai translasi

$$(\gamma_n)_*: 2\pi k \mapsto 2\pi(k+n).$$

Jika loop berputaran m diikuti loop berputaran n , pengangkatan bagian kedua dimulai di $2\pi(k+m)$ dan berakhir di $2\pi(k+m+n)$. Jadi transpor gabungan adalah translasi sebesar $2\pi(m+n)$, sama dengan komposisi kedua transpor.

Pemeriksaan penguasaan 6.2 (basis dan pemetaan dasar ruang lintasan). Mulai dari definisi standar topologi kompak-terbuka dengan subbasis

$$[K, O] := \{\eta: I \rightarrow X \mid \eta(K) \subseteq O\},$$

dengan $K \subseteq I$ kompak dan $O \subseteq X$ terbuka. Buktikan Lema 6.1 dan kedua bagian Lema 6.2. Jika X metrik, buktikan pula bahwa topologi ini sama dengan topologi metrik supremum. Terakhir, buktikan hukum eksponensial

$$\text{Top}(Y \times I, X) \cong \text{Top}(Y, X^I)$$

untuk setiap ruang Y .

6.6 Solusi Pemeriksaan 6.2

Setiap lingkungan pada Lema 6.1 adalah irisan berhingga

$$N_\gamma(t_1 < \dots < t_n; U_0, \dots, U_n) = \bigcap_{i=0}^n [[t_i, t_{i+1}], U_i],$$

sehingga terbuka dalam topologi kompak-terbuka.

Sebaliknya, ambil lingkungan dasar

$$\mathcal{W} = \bigcap_{j=1}^r [K_j, O_j]$$

yang memuat γ . Semua K_j kompak, dan karena I Hausdorff, semuanya tertutup. Untuk setiap $t \in I$, pilih interval terbuka relatif $A_t \ni t$ dengan sifat berikut: jika $t \in K_j$, maka $A_t \subseteq \gamma^{-1}(O_j)$; jika $t \notin K_j$, maka $A_t \cap K_j = \emptyset$. Pilihan serentak ini mungkin karena hanya ada berhingga banyak j .

Sampul $\{A_t\}_{t \in I}$ mempunyai bilangan Lebesgue. Pilih partisi cukup halus sehingga setiap $[t_i, t_{i+1}]$ termuat dalam suatu A_{a_i} . Definisikan

$$J_i := \{j \mid [t_i, t_{i+1}] \cap K_j \neq \emptyset\}, \quad U_i := \bigcap_{j \in J_i} O_j,$$

dengan irisan kosong dipahami sebagai X . Dari sifat A_{a_i} diperoleh $\gamma([t_i, t_{i+1}]) \subseteq U_i$. Jika $\eta \in N_\gamma(t_1 < \dots < t_n; U_0, \dots, U_n)$ dan $s \in K_j$, setiap subinterval partisi yang memuat s mempunyai $j \in J_i$, sehingga $\eta(s) \in O_j$. Jadi $N_\gamma \subseteq \mathcal{W}$, dan keluarga pada Lema 6.1 memang merupakan basis lingkungan.

Untuk kekontinuan evaluasi, tetapkan (γ, t) dan lingkungan terbuka $O \ni \gamma(t)$. Prapeta $\gamma^{-1}(O)$ terbuka di I , sehingga terdapat lingkungan relatif terbuka J dari t yang penutupannya $K = \bar{J}$ kompak dan termuat dalam $\gamma^{-1}(O)$. Maka

$$[K, O] \times J$$

adalah lingkungan (γ, t) yang dipetakan evaluasi ke O .

Untuk pascakomposisi, cukup diperiksa pada subbasis. Bagi $K \subseteq I$ kompak dan $O \subseteq Y$ terbuka,

$$(f_*)^{-1}([K, O]) = [K, f^{-1}(O)],$$

yang terbuka dalam X^I . Jadi f_* kontinu.

Sekarang andaikan X metrik. Pertama, ambil lingkungan subdasar $[K, O]$ dari γ . Himpunan kompak $\gamma(K)$ termuat dalam himpunan terbuka O , sehingga terdapat $\varepsilon > 0$ dengan

$$\{x \in X \mid d(x, \gamma(K)) < \varepsilon\} \subseteq O.$$

Karena itu bola metrik supremum $B_\infty(\gamma, \varepsilon)$ termuat dalam $[K, O]$. Sebaliknya, untuk $\varepsilon > 0$, kekontinuan seragam γ pada interval kompak memberi partisi cukup halus sehingga citra setiap subinterval termuat dalam bola berjari-jari $\varepsilon/3$ terhadap suatu nilai $\gamma(a_i)$. Pilih

$$U_i = B\left(\gamma(a_i), \frac{2\varepsilon}{3}\right).$$

Lingkungan $N_\gamma(t_1 < \dots < t_n; U_0, \dots, U_n)$ lalu termuat dalam $B_\infty(\gamma, \varepsilon)$ menurut pertidaksamaan segitiga. Kedua topologi jadi sama.

Terakhir, misalkan $H: Y \times I \rightarrow X$ kontinu dan definisikan $h(y)(t) = H(y, t)$. Untuk menunjukkan h kontinu, ambil $y_0 \in h^{-1}([K, O])$. Bagi setiap $t \in K$, kekontinuan H memberi lingkungan $W_t \ni y_0$ dan $V_t \ni t$ dengan

$$H(W_t \times V_t) \subseteq O.$$

Kekompakan K memberi subkeluarga berhingga $V_{t_1}, \dots, V_{t_r}$ yang menutupi K . Irisan $W = \bigcap_j W_{t_j}$ adalah lingkungan y_0 dan memenuhi $H(W \times K) \subseteq O$, jadi $W \subseteq h^{-1}([K, O])$. Maka h kontinu. Sebaliknya, jika $h: Y \rightarrow X^I$ kontinu, maka

$$H = \text{ev} \circ (h \times \text{id}_I)$$

kontinu menurut Lema 6.2. Kedua pengubahan ini saling invers, sehingga hukum eksponensial terbukti.

Pemeriksaan penguasaan 6.3 (transpor kontinu dan surjektif). Gunakan Teorema 6.1 dan Lema 6.2 untuk membuktikan bahwa $A: P_x^y X \times Z_x \rightarrow Z_y$ kontinu. Jika Z terhubung lintasan dan $z \in Z_x$, buktikan bahwa fungsi terinduksi $\pi_0(P_x^y X) \rightarrow Z_y$ surjektif.

6.7 Solusi Pemeriksaan 6.3

Inklusi

$$P_x^y X \times Z_x \hookrightarrow X^I \times_X Z$$

kontinu. Menurut Teorema 6.1, Lift kontinu, dan menurut Lema 6.2, $\text{ev}_1: Z^I \rightarrow Z$ kontinu. Maka komposisi

$$(\gamma, w) \longmapsto \text{ev}_1(\text{Lift}(\gamma, w)) = \gamma_*(w)$$

kontinu. Citranya berada di subruang diskret Z_y , sehingga inilah kekontinuan A .

Sekarang tetapkan $z \in Z_x$ dan ambil sembarang $w \in Z_y$. Karena Z terhubung lintasan, pilih lintasan $\lambda: I \rightarrow Z$ dari z ke w . Proyeksi $\gamma = \pi \circ \lambda$ berada dalam $P_x^y X$. Lintasan λ adalah pengangkatan γ yang berawal di z , sehingga keunikan pengangkatan memberi

$$A(\gamma, z) = \gamma_*(z) = w.$$

Jadi $A(-, z)$ surjektif. Karena Z_y diskret dan $A(-, z)$ kontinu, ia konstan pada setiap komponen terhubung $P_x^y X$ dan turun menjadi fungsi surjektif $\pi_0(P_x^y X) \rightarrow Z_y$.

Pemeriksaan penguasaan 6.4 (SLSC dan dua contoh). Buktikan langsung bahwa setiap ruang SLSC bersifat SLPC. Jelaskan secara rinci mengapa manifold memenuhi Definisi 6.2 dan mengapa anting-anting Hawaii tidak memenuhinya.

6.8 Solusi Pemeriksaan 6.4

Basis pada Definisi 6.2 terdiri atas lingkungan-lingkungan N yang terhubung lintasan. Jadi, untuk setiap dua titik $u, v \in N$, terdapat lintasan di N , dan khususnya di X , dari u ke v . Ini persis memenuhi syarat basis dalam definisi SLPC Unit 4.

Untuk manifold tanpa batas, pilih peta koordinat $\varphi: N \rightarrow C$ yang citranya C merupakan bola Euklides terbuka; pada titik batas manifold dengan batas, pilih sebagai C sebuah setengah bola yang konveks. Karena C konveks, ia terhubung lintasan. Jika $\gamma, \eta: I \rightarrow N$ mempunyai titik ujung sama, tuliskan $\bar{\gamma} = \varphi \circ \gamma$ dan $\bar{\eta} = \varphi \circ \eta$, lalu definisikan dalam koordinat

$$\bar{H}(s, t) = (1 - s)\bar{\gamma}(t) + s\bar{\eta}(t), \quad H = \varphi^{-1} \circ \bar{H}.$$

Kekonveksan C menjamin $\bar{H}(s, t) \in C$, sedangkan kesamaan titik ujung menjamin $H(s, 0)$ dan $H(s, 1)$ tetap. Jadi H membuktikan syarat SLSC.

Untuk anting-anting Hawaii $\mathbb{H}$, setiap lingkungan relatif dari $(0, 0)$ memuat lingkaran penuh C_n untuk semua n yang cukup besar. Untuk satu n tetap, terdapat retraksi kontinu

$$r_n: \mathbb{H} \longrightarrow C_n$$

yang merupakan identitas pada C_n dan meruntuhkan setiap C_m dengan $m \neq n$ ke titik $(0, 0)$. Jika loop yang mengitari C_n dapat dikontraksikan dalam $\mathbb{H}$, komposisi kontraksi itu dengan r_n akan mengontraksikan loop pembangkit di lingkaran C_n , yang mustahil. Jadi setiap lingkungan $(0, 0)$

memuat loop yang tetap tidak dapat dikontraksikan di seluruh ruang. Tidak mungkin ada basis lingkungan di $(0, 0)$ yang memenuhi Definisi 6.2; maka $\mathbb{H}$ tidak SLSC.

Bukti mandiri Teorema 6.2 untuk kasus yang digunakan

Materi edisi. Kita membuktikan langsung bahwa jika X SLSC menurut Definisi 6.2, maka X^I , $P_x X$, dan $P_x^y X$ memenuhi definisi SLPC Unit 4. Kasus $\Omega_x X = P_x^x X$ lalu langsung mengikuti. Ingat bahwa definisi SLPC hanya meminta dua titik dalam satu lingkungan basis dapat dihubungkan oleh lintasan di ruang keseluruhan; lintasan penghubung tidak harus tetap berada dalam lingkungan basis itu.

Tetapkan $\gamma \in X^I$ dan suatu lingkungan dasar kompak-terbuka

$$\mathcal{U} = N_\gamma(t_1 < \cdots < t_n; U_0, \dots, U_n).$$

Karena X SLSC, kekompakan I , dan Lema 6.1, kita dapat memperhalus partisi menjadi

$$0 = s_0 < s_1 < \cdots < s_m = 1$$

yang memuat semua t_j , lalu memilih lingkungan basis SLSC terbuka $V_1, \dots, V_m$ sehingga

$$\gamma([s_{k-1}, s_k]) \subseteq V_k \subseteq U_{j(k)}$$

dan $[s_{k-1}, s_k] \subseteq [t_{j(k)}, t_{j(k)+1}]$. Kedua himpunan V_k dan V_{k+1} memuat $\gamma(s_k)$. Pilih lingkungan basis SLSC terbuka

$$L_k \ni \gamma(s_k), \quad L_k \subseteq V_k \cap V_{k+1} \quad (1 \leq k < m).$$

Pilih pula $L_0 \subseteq V_1$ dan $L_m \subseteq V_m$ dari basis yang sama pada kedua titik ujung. Definisikan

$$\mathcal{V} := N_\gamma(s_1 < \cdots < s_{m-1}; V_1, \dots, V_m) \cap \bigcap_{k=0}^m \text{ev}_{s_k}^{-1}(L_k).$$

Himpunan $\mathcal{V}$ adalah lingkungan terbuka γ dan termuat dalam $\mathcal{U}$.

Ambil sembarang $\eta, \zeta \in \mathcal{V}$. Karena setiap L_k terhubung lintasan, pilih lintasan

$$\delta_k: I \longrightarrow L_k$$

dari $\eta(s_k)$ ke $\zeta(s_k)$. Untuk subinterval ke- k , tuliskan η_k dan ζ_k bagi reparameterisasi pembatasan η dan ζ ke $[s_{k-1}, s_k]$. Kedua lintasan komposit

$$\eta_k * \delta_k \quad \text{dan} \quad \delta_{k-1} * \zeta_k$$

berada dalam V_k dan mempunyai titik awal serta titik akhir yang sama. Sifat SLSC bagi V_k memberikan homotopi di X di antara kedua lintasan itu yang mempertahankan titik ujung. Secara ekuivalen, loop batas yang dibentuk oleh η_k , δ_k , lintasan balik ζ_k , dan lintasan balik δ_{k-1} mempunyai pengisian disk di X . Setelah disk diidentifikasi dengan persegi, kita memperoleh homotopi persegi yang sisi bawahnya η_k , sisi atasnya ζ_k , dan kedua sisi tegaknya δ_{k-1} serta δ_k .

Homotopi-homotopi persegi untuk $k = 1, \dots, m$ memiliki sisi tegak yang sama pada setiap batas bersama. Lema penempelan karena itu menghasilkan homotopi kontinu

$$H: I \times I \longrightarrow X$$

dari η ke ζ . Menurut hukum eksponensial, H adalah lintasan di X^I dari η ke ζ . Jadi setiap dua titik dalam $\mathcal{V}$ dapat dihubungkan oleh lintasan dalam X^I . Karena lingkungan awal $\mathcal{U}$ sembarang, lingkungan-lingkungan seperti $\mathcal{V}$ membentuk basis SLPC bagi X^I .

Untuk $P_x X$, lakukan konstruksi yang sama di dalam subruang dan pilih δ_0 sebagai lintasan konstan di x . Homotopi hasil penempelan lalu memenuhi

$$H(s, 0) = x$$

untuk semua s , sehingga seluruh lintasan di ruang pemetaan tetap berada dalam $P_x X$. Untuk $P_x^y X$, pilih juga δ_m sebagai lintasan konstan di y ; dengan demikian

$$H(s, 0) = x, \quad H(s, 1) = y$$

untuk semua s . Irisan lingkungan-lingkungan $\mathcal{V}$ dengan subruang masing-masing membentuk basis relatif yang memenuhi syarat SLPC. Maka $P_x X$ dan $P_x^y X$ bersifat SLPC, dan mengambil $y = x$ memberi hasil untuk $\Omega_x X$. $\square$

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya [Notes.tex baris 1516–1770 pada commit b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#). Rentang itu dimulai dengan penanda Kuliah 7 dan pertanyaan tentang transpor sepanjang lintasan yang dikonkatenasi, lalu berakhir setelah funtorialitas grup fundamental. Baris 1771 memulai Kuliah 8 dan tidak termasuk dalam unit ini. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, serta pemindahan tugas dan gambar dari catatan pinggir ke urutan bacaan utama. Sepuluh grafik TikZ pinggir diganti dengan rumus eksplisit bagi keenam pemetaan parameter $\phi, \psi, \alpha, \beta, \mu, \nu$; dengan demikian semua informasi matematisnya tetap tersedia dalam bentuk yang dapat dibaca perangkat bantu. Koreksi substantif yang diterapkan adalah: notasi serat $Z_{\gamma(0)}$ diperbaiki; label dua grafik asosiativitas diselaraskan dengan rumusnya; homotopi afin yang keliru karena mengulang ϕ diperbaiki agar benar-benar menginterpolasi ϕ dan ψ ; kata “terhubung” pada contoh S^2 diperkuat menjadi “terhubung lintasan,” sesuai hipotesis yang dipakai; dan arah aksi transpor dijelaskan secara eksplisit sebagai aksi kanan—atau, setelah membalik loop, sebagai representasi kiri—agar urutan komposisi tidak tersamarkan.

Rentang sumber tidak memberikan bukti bagi lema transpor-konkatenasi, proposisi funktor ruang loop, atau akibat funtorialitas π_1 . Kekontinuan operasi konkatenasi diserahkan ke *Assignment 2*, dan identifikasi dengan kelas homotopi bertitik $S^1 \rightarrow X$ diberikan sebagai latihan pinggir. Bagian pendamping penguasaan menutup semuanya dengan empat pemeriksaan beserta solusi lengkap dan mandiri. Seluruh materi pendamping tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

7 Kuliah 7

7.1 Konkatenasi dan transpor serat

Apa yang terjadi pada isomorfisma

$$\gamma_*: Z_x \longrightarrow Z_y$$

jika lintasan $\gamma: I \rightarrow X$ dipecah menjadi dua sublintasan $x \rightsquigarrow x' \rightsquigarrow y$, lalu isomorfisma-isomorfisma yang bersesuaian dikomposisikan?

Misalkan $\gamma, \eta: I \rightarrow X$ memenuhi $\gamma(1) = \eta(0)$. *Konkatenasi* keduanya adalah lintasan $\gamma \# \eta: I \rightarrow X$ yang didefinisikan oleh

$$(\gamma \# \eta)(t) = \begin{cases} \gamma(2t), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ \eta(2t - 1), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Kekontinuan mengikuti dari lema penempelan karena kedua rumus bernilai sama pada $t = \frac{1}{2}$.

Lema 7.1 (transpor menghormati concatenasi). Jika $\gamma, \eta: I \rightarrow X$ dan $\gamma(1) = \eta(0)$, maka

$$(\gamma \# \eta)_* = \eta_* \circ \gamma_*: Z_{\gamma(0)} \longrightarrow Z_{\eta(1)}.$$

Secara khusus, jika $\gamma, \eta \in \Omega_x X$, maka $\gamma \# \eta \in \Omega_x X$. Fungsi

$$\Omega_x X \longrightarrow \text{Aut}(Z_x), \quad \gamma \longmapsto \gamma_*,$$

kompatibel dengan concatenasi dalam urutan yang dinyatakan Lema 7.1. Akan tetapi, concatenasi tidak asosiatif sebagai kesamaan literal lintasan berparameter.

Contoh 7.1 (kegagalan asosiativitas literal). Ambil $X = S^1$ dan $\gamma(t) = e^{2\pi i t}$. Maka

$$((\gamma \# \gamma) \# \gamma)(t) = \begin{cases} e^{8\pi i t}, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ e^{4\pi i t}, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1, \end{cases}$$

sedangkan

$$(\gamma \# (\gamma \# \gamma))(t) = \begin{cases} e^{4\pi i t}, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ e^{8\pi i t}, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Keduanya menempuh loop dasar tiga kali, tetapi dengan jadwal yang berbeda. Sebagai contoh, pada $t = \frac{1}{4}$, lintasan pertama bernilai 1, sedangkan lintasan kedua bernilai -1 .

7.2 Hukum grup hingga homotopi

Mari periksa kembali cara lintasan dikonkatenasi. Untuk $\gamma(1) = \eta(0)$, terdapat fungsi kontinu alami

$$\langle \gamma, \eta \rangle: [0, 2] \longrightarrow X$$

yang menempuh γ pada $[0, 1]$ dan η pada $[1, 2]$. Concatenasi $\gamma \# \eta$ diperoleh dengan melakukan prakomposisi terhadap $t \mapsto 2t: [0, 1] \rightarrow [0, 2]$.

Jika ditambahkan lintasan ketiga λ dengan $\lambda(0) = \eta(1)$, definisikan

$$\langle \gamma, \eta, \lambda \rangle: [0, 3] \longrightarrow X$$

dengan menempuh ketiga lintasan secara berurutan pada interval satuan berturut-turut. Dua cara memasang tanda kurung diperoleh melalui prakomposisi terhadap

$$\phi(t) = \begin{cases} 4t, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ 2t + 1, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1, \end{cases}$$

dan

$$\psi(t) = \begin{cases} 2t, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ 4t - 1, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Lebih tepatnya,

$$(\gamma \# \eta) \# \lambda = \langle \gamma, \eta, \lambda \rangle \circ \phi, \quad \gamma \# (\eta \# \lambda) = \langle \gamma, \eta, \lambda \rangle \circ \psi.$$

Kedua lintasan $\phi, \psi: I \rightarrow [0, 3]$ mempunyai titik ujung yang sama. Homotopi afin

$$h(s, t) = (1 - s)\phi(t) + s\psi(t)$$

mempertahankan titik ujung dan menghubungkan ϕ dengan ψ . Komposisi

$$(s, t) \mapsto \langle \gamma, \eta, \lambda \rangle(h(s, t))$$

memberikan homotopi berujung tetap dari $(\gamma \# \eta) \# \lambda$ ke $\gamma \# (\eta \# \lambda)$. Jadi konkatenasi lintasan *asosiatif hingga homotopi*.

Sekarang ambil sembarang lintasan $\gamma: I \rightarrow X$ dan definisikan lintasan balik

$$\bar{\gamma}(t) := \gamma(1 - t).$$

Konkatenasi dengan lintasan balik difaktorkan melalui dua pemetaan parameter

$$\gamma \# \bar{\gamma} = \gamma \circ \alpha, \quad \alpha(t) = \begin{cases} 2t, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ 2 - 2t, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1, \end{cases}$$

dan

$$\bar{\gamma} \# \gamma = \gamma \circ \beta, \quad \beta(t) = \begin{cases} 1 - 2t, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ 2t - 1, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Grafik α bergerak dari 0 ke 1 lalu kembali ke 0, sedangkan grafik β bergerak dari 1 ke 0 lalu kembali ke 1. Homotopi-homotopi afin

$$a(s, t) = (1 - s)\alpha(t)$$

dan

$$b(s, t) = (1 - s)\beta(t) + s$$

masing-masing menghubungkan α ke fungsi konstan 0 dan β ke fungsi konstan 1, sambil mempertahankan titik ujung. Setelah dikomposisikan dengan γ , kita memperoleh

$$\gamma \# \bar{\gamma} \simeq c_{\gamma(0)}, \quad \bar{\gamma} \# \gamma \simeq c_{\gamma(1)}$$

relatif terhadap titik ujung. Jadi lintasan balik merupakan invers hingga homotopi.

Untuk identitas hingga homotopi, gunakan lintasan konstan

$$c_x: I \longrightarrow X, \quad c_x(t) = x.$$

Kita mempunyai faktorisasi

$$\gamma \# c_{\gamma(1)} = \gamma \circ \mu, \quad \mu(t) = \begin{cases} 2t, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ 1, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1, \end{cases}$$

dan

$$c_{\gamma(0)} \# \gamma = \gamma \circ \nu, \quad \nu(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ 2t - 1, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Masing-masing μ dan ν homotopik relatif titik ujung dengan id_I , melalui

$$m(s, t) = (1 - s)\mu(t) + st, \quad n(s, t) = (1 - s)\nu(t) + st.$$

Komposisi dengan γ menghasilkan

$$\gamma \# c_{\gamma(1)} \simeq \gamma, \quad c_{\gamma(0)} \# \gamma \simeq \gamma$$

relatif terhadap titik ujung.

Jika kelima homotopi—satu asosiativitas, dua invers, dan dua identitas—dipandang sebagai lintasan dalam X^I , maka untuk loop-loop pada x semuanya merupakan lintasan dalam $\Omega_x X$. Jadi operasi biner

$$\#: \Omega_x X \times \Omega_x X \longrightarrow \Omega_x X$$

memenuhi hukum grup hingga keberadaan lintasan:

$$\begin{aligned} (\gamma \# \eta) \# \lambda &\rightsquigarrow \gamma \# (\eta \# \lambda), \\ \gamma \# \bar{\gamma} &\rightsquigarrow c_x, \\ \bar{\gamma} \# \gamma &\rightsquigarrow c_x, \\ \gamma \# c_x &\rightsquigarrow \gamma, \\ c_x \# \gamma &\rightsquigarrow \gamma. \end{aligned}$$

Lebih banyak koherensi sebenarnya tersedia: homotopi-homotopi tersebut sendiri dapat dirangkai secara koheren untuk berbagai pilihan tanda kurung. Misalnya, catatan sumber menyebut keluarga bertipe

$$I \times \Omega_x X \times \Omega_x X \times \Omega_x X \longrightarrow \Omega_x X.$$

Catatan sumber tidak membuktikan struktur tingkat lebih tinggi itu.

Proposisi 7.1. Misalkan (X, x) ruang bertitik dan X bersifat SLSC. Himpunan

$$\pi_0(\Omega_x X)$$

mempunyai struktur grup. Perkaliannya diinduksi oleh konkatenasi loop, unsur identitasnya diwakili oleh loop konstan c_x , dan invers kelas $[\gamma]$ diwakili oleh $\bar{\gamma}$.

Jika hanya bekerja dengan ruang yang tidak diketahui SLSC, gunakan himpunan komponen lintasan $[\ast, \Omega_x X]$ sebagai gantinya.

Bukti. Operasi konkatenasi

$$\# : \Omega_x X \times \Omega_x X \longrightarrow \Omega_x X$$

kontinu; inilah tugas yang dirujuk sumber sebagai *Assignment 2*, dan pembuktiannya diberikan dalam Pemeriksaan Penguasaan 7.2. Karena X SLSC, Teorema 6.2 menyatakan bahwa $\Omega_x X$ SLPC. Maka komponen terhubung dan komponen lintasannya berimpit.

Menerapkan π_0 pada $\#$ memberi

$$\pi_0(\Omega_x X \times \Omega_x X) \longrightarrow \pi_0(\Omega_x X).$$

Untuk ruang SLPC M, N , pemetaan kanonik

$$\pi_0(M \times N) \xrightarrow{\cong} \pi_0(M) \times \pi_0(N)$$

adalah bijeksi. Karena itu diperoleh perkalian

$$\pi_0(\Omega_x X) \times \pi_0(\Omega_x X) \longrightarrow \pi_0(\Omega_x X), \quad ([\gamma], [\eta]) \longmapsto [\gamma \# \eta].$$

Kelima lintasan dalam $\Omega_x X$ yang dibangun di atas menunjukkan bahwa perkalian kelas bersifat asosiatif, $[c_x]$ merupakan identitas dua sisi, dan $[\bar{\gamma}]$ merupakan invers dua sisi $[\gamma]$. Jadi aksioma grup terpenuhi. $\square$

Definisi 7.1 (grup fundamental). Untuk ruang bertitik (X, x) , *grup fundamental di x* adalah

$$\pi_1(X, x) := [\ast, \Omega_x X],$$

yakni himpunan komponen lintasan ruang loop, dengan perkalian yang diinduksi konkatenasi. Jika X SLSC, Teorema 6.2 dan Proposisi 4.2 memberikan identifikasi

$$\pi_1(X, x) \cong \pi_0(\Omega_x X).$$

Ingat bahwa funktor $[\ast, -]$ turun menjadi funktor $\mathbf{Ho} \rightarrow \mathbf{Set}$, sebagaimana dibuktikan dalam pendamping Unit 4.

7.3 Grup fundamental dan serat ruang penutup

Penalaran sebelumnya memberi aksi transpor pada serat. Menurut Teorema 6.1, pemetaan

$$\Omega_x X \times Z_x \longrightarrow Z_x, \quad (\gamma, z) \longmapsto \gamma_*(z),$$

kontinu. Homotopi loop berujung tetap adalah lintasan dalam $\Omega_x X$, sedangkan Z_x diskret. Karena itu transpor konstan sepanjang homotopi tersebut dan turun ke kelas dalam $\pi_1(X, x)$.

Dengan konvensi perkalian kronologis

$$[\gamma][\eta] := [\gamma \# \eta]$$

(menempuh γ lebih dahulu, kemudian η), rumus Lema 7.1 berarti bahwa

$$z \cdot [\gamma] := \gamma_*(z)$$

adalah **aksi kanan** $\pi_1(X, x)$ pada Z_x :

$$(z \cdot [\gamma]) \cdot [\eta] = z \cdot ([\gamma][\eta]).$$

Jika representasi kiri lebih disukai, definisikan

$$\rho: \pi_1(X, x) \longrightarrow \text{Aut}(Z_x), \quad \rho([\gamma]) = (\bar{\gamma})_*.$$

Karena $\overline{\gamma \# \eta} = \bar{\eta} \# \bar{\gamma}$, Lema 7.1 memberikan

$$\rho([\gamma][\eta]) = \rho([\gamma]) \circ \rho([\eta]),$$

sehingga ρ benar-benar homomorfisma grup. Untuk ruang SLPC yang tidak SLSC, konstruksi yang sama tetap bekerja dengan kelas homotopi berujung tetap; asumsi SLSC hanya membuat pendekatan melalui komponen terhubung ruang fungsi lebih langsung.

Jika Z terhubung lintasan dan $z \in Z_x$ dipilih, pemetaan orbit

$$\pi_1(X, x) \longrightarrow Z_x, \quad [\gamma] \longmapsto \gamma_*(z),$$

surjektif. Jadi kardinalitas serat ruang penutup terhubung lintasan dibatasi dari atas oleh banyaknya kelas homotopi loop. Sebaliknya, serat sebuah ruang penutup terhubung lintasan memberi batas bawah bagi banyaknya kelas homotopi loop yang berbeda di X .

Contoh 7.2. Proyeksi

$$S^2 \longrightarrow \mathbb{RP}^2$$

adalah ruang penutup dengan serat dua titik, dan S^2 terhubung lintasan. Karena itu terdapat sedikitnya dua kelas homotopi loop di $\mathbb{RP}^2$ pada setiap titik dasar. Salah satunya adalah kelas loop konstan, sehingga ada loop di $\mathbb{RP}^2$ yang tidak homotopik relatif titik ujung dengan loop konstan.

Contoh 7.3. Pemetaan penutup

$$\exp(2\pi i -): \mathbb{R} \longrightarrow S^1, \quad t \longmapsto e^{2\pi i t},$$

mempunyai serat $\mathbb{Z}$ di atas $1 \in S^1$. Ruang atas $\mathbb{R}$ terhubung lintasan, sehingga terdapat surjeksi $\pi_1(S^1, 1) \rightarrow \mathbb{Z}$. Akibatnya, $\pi_1(S^1, 1)$ merupakan grup tak hingga.

7.4 Functorialitas ruang loop dan grup fundamental

Proposisi 7.2. Konstruksi ruang loop merupakan functor

$$\Omega: \mathbf{Top}_* \longrightarrow \mathbf{Top}_*.$$

Pada objek, $\Omega(X, x) = (\Omega_x X, c_x)$. Pada pemetaan bertitik $f: (X, x) \rightarrow (Y, y)$, functor ini bertindak melalui pascakomposisi $\Omega f(\gamma) = f \circ \gamma$.

Akibat 7.1. Grup fundamental merupakan functor

$$\pi_1 := [* , -] \circ \Omega: \mathbf{Top}_* \longrightarrow \mathbf{Grp}.$$

Pada subkategori penuh ruang-ruang SLSC, functor ini teridentifikasi secara natural dengan $\pi_0 \circ \Omega$ setelah setiap $\pi_0(\Omega_x X)$ diberi struktur grup Proposisi 7.1. Selain itu, terdapat isomorfisma natural

$$\pi_1(X, x) \cong [(S^1, 1), (X, x)]_*,$$

yang pembuktiannya diberikan dalam Pemeriksaan Penguasaan 7.4.

Bukti lengkap Proposisi 7.2 dan bagian functorial Akibat 7.1 juga diberikan dalam Pemeriksaan Penguasaan 7.4.

Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Bagian ini merupakan materi baru untuk edisi bahasa Indonesia dan tersedia di bawah CC BY 4.0. Empat pemeriksaan berikut menutup semua bukti dan tugas yang ditinggalkan sumber pada rentang Kuliah 7.

Pemeriksaan penguasaan 7.1 (bukti Lema 7.1). Buktikan bahwa transpor serat menghormati konkatenasi lintasan.

7.5 Solusi Pemeriksaan 7.1

Ambil $z \in Z_{\gamma(0)}$ dan tuliskan

$$z' := \gamma_*(z) = \tilde{\gamma}_z(1).$$

Lintasan terangkat

$$\tilde{\gamma}_z \# \tilde{\eta}_{z'}$$

berawal di z . Proyeksinya adalah

$$\pi \circ (\tilde{\gamma}_z \# \tilde{\eta}_{z'}) = (\pi \circ \tilde{\gamma}_z) \# (\pi \circ \tilde{\eta}_{z'}) = \gamma \# \eta.$$

Jadi lintasan itu merupakan pengangkatan $\gamma \# \eta$ yang berawal di z . Keunikan pengangkatan memberikan

$$\widetilde{(\gamma \# \eta)}_z = \tilde{\gamma}_z \# \tilde{\eta}_{z'}.$$

Evaluasi pada $t = 1$ menghasilkan

$$(\gamma \# \eta)_*(z) = \eta_*(z') = \eta_*(\gamma_*(z)).$$

Karena berlaku untuk setiap z , diperoleh $(\gamma \# \eta)_* = \eta_* \circ \gamma_*$.

Pemeriksaan penguasaan 7.2 (kekontinuan konkatenasi). Buktikan bahwa

$$\# : \Omega_x X \times \Omega_x X \longrightarrow \Omega_x X$$

kontinu untuk topologi kompak-terbuka.

7.6 Solusi Pemeriksaan 7.2

Definisikan pemetaan tiga variabel (sebelum mengambil adjoinnya)

$$C : (\Omega_x X \times \Omega_x X) \times I \longrightarrow X$$

dengan

$$C(\gamma, \eta, t) = \begin{cases} \gamma(2t), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ \eta(2t - 1), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Pada dua subruang tertutup $(\Omega_x X \times \Omega_x X) \times [0, \frac{1}{2}]$ dan $(\Omega_x X \times \Omega_x X) \times [\frac{1}{2}, 1]$, masing-masing rumus kontinu karena merupakan komposisi evaluasi dengan pemetaan parameter kontinu. Pada irisan $t = \frac{1}{2}$, kedua rumus bernilai x , sebab $\gamma(1) = x = \eta(0)$. Lema penempelan menunjukkan bahwa C kontinu.

Karena I kompak Hausdorff, hukum eksponensial topologi kompak-terbuka menyatakan bahwa pemetaan teradjung

$$\widehat{C} : \Omega_x X \times \Omega_x X \longrightarrow X^I, \quad \widehat{C}(\gamma, \eta)(t) = C(\gamma, \eta, t),$$

kontinu. Citra $\widehat{C}$ berada dalam subruang $\Omega_x X$, dan pemetaan ke subruang itu tepat merupakan $\#$. Maka konkatenasi kontinu.

Pemeriksaan penguasaan 7.3 (komponen dan aksi). Lengkapi dua rincian dalam Proposisi 7.1: buktikan bahwa komponen suatu produk adalah produk komponen, dan jelaskan mengapa homotopi-homotopi pada bagian utama benar-benar memberikan aksioma grup pada kelas. Kemudian verifikasi konvensi aksi kanan pada serat.

7.7 Solusi Pemeriksaan 7.3

Misalkan C_m dan C_n adalah komponen terhubung yang memuat titik $m \in M$ dan $n \in N$. Produk $C_m \times C_n$ terhubung dan memuat (m, n) . Sebaliknya, jika $A \subseteq M \times N$ terhubung dan memuat (m, n) , kedua proyeksinya terhubung, sehingga

$$\text{pr}_M(A) \subseteq C_m, \quad \text{pr}_N(A) \subseteq C_n.$$

Jadi $A \subseteq C_m \times C_n$. Maka komponen terhubung yang memuat (m, n) tepat $C_m \times C_n$, dan diperoleh bijeksi

$$\pi_0(M \times N) \cong \pi_0(M) \times \pi_0(N).$$

Pada $\Omega_x X$, setiap homotopi berujung tetap adalah lintasan dalam ruang loop. Karena itu dua sisi setiap hukum pada bagian utama berada dalam komponen lintasan yang sama. Setelah mengambil kelas, tanda $\leadsto$ berubah menjadi kesamaan. Maka

$$([\gamma][\eta])[\lambda] = [\gamma]([\eta][\lambda]),$$

$$[\gamma][\bar{\gamma}] = [c_x] = [\bar{\gamma}][\gamma],$$

dan

$$[\gamma][c_x] = [\gamma] = [c_x][\gamma].$$

Terakhir, dengan $z \cdot [\gamma] = \gamma_*(z)$, Lema 7.1 memberikan

$$(z \cdot [\gamma]) \cdot [\eta] = \eta_*(\gamma_*(z)) = (\gamma \# \eta)_*(z) = z \cdot ([\gamma][\eta]),$$

dan loop konstan bertindak sebagai identitas. Jadi ini benar-benar aksi kanan.

Pemeriksaan penguasaan 7.4 (functorialitas dan model lingkaran). Buktikan Proposisi 7.2 dan Akibat 7.1. Kemudian bangun secara eksplisit isomorfisma natural

$$\pi_1(X, x) \cong [(S^1, 1), (X, x)]_*.$$

7.8 Solusi Pemeriksaan 7.4

Pada objek, definisikan

$$\Omega(X, x) := (\Omega_x X, c_x).$$

Untuk pemetaan bertitik $f: (X, x) \rightarrow (Y, y)$, definisikan

$$\Omega f: \Omega_x X \longrightarrow \Omega_y Y, \quad (\Omega f)(\gamma) = f \circ \gamma.$$

Pemetaan ini kontinu menurut Lema 6.2, dan bertitik karena $f \circ c_x = c_y$. Selain itu,

$$\Omega(\text{id}) = \text{id}, \quad \Omega(g \circ f) = \Omega g \circ \Omega f.$$

Jadi Ω merupakan functor $\mathbf{Top}_* \rightarrow \mathbf{Top}_*$.

Functor $[\ast, -]$ mengirim ruang bertitik ke himpunan komponen lintasannya. Pada ruang loop, konkatenasi memberi struktur grup pada himpunan ini. Pemetaan Ωf mempertahankan konkatenasi secara literal:

$$(\Omega f)(\gamma \# \eta) = (f \circ \gamma) \# (f \circ \eta),$$

serta mempertahankan loop konstan dan lintasan balik. Karena itu pemetaan terinduksi

$$\pi_1(f): \pi_1(X, x) \longrightarrow \pi_1(Y, y), \quad [\gamma] \longmapsto [f \circ \gamma],$$

adalah homomorfisma grup. Identitas dan komposisi dipertahankan karena sifat yang sama berlaku bagi Ω , sehingga π_1 merupakan funktor ke **Grp**. Jika X SLSC, Teorema 6.2 mengidentifikasi komponen lintasan dan komponen terhubung $\Omega_x X$ secara natural, yang memberi deskripsi $\pi_1 \cong \pi_0 \circ \Omega$.

Sekarang ambil pemetaan hasil bagi

$$q: I \longrightarrow I/\{0 \sim 1\} \cong S^1, \quad q(t) = e^{2\pi it}.$$

Setiap loop $\gamma: I \rightarrow X$ pada x mempunyai $\gamma(0) = \gamma(1)$, sehingga menurut sifat universal hasil bagi terdapat tepat satu pemetaan bertitik kontinu

$$\gamma^\sharp: (S^1, 1) \longrightarrow (X, x)$$

dengan $\gamma^\sharp \circ q = \gamma$. Sebaliknya, setiap pemetaan bertitik $u: (S^1, 1) \rightarrow (X, x)$ menghasilkan loop $u \circ q$. Kedua konstruksi saling invers.

Jika $H: I \times I \rightarrow X$ merupakan homotopi loop yang mempertahankan titik ujung, maka $H(s, 0) = H(s, 1) = x$ untuk setiap s . Pemetaan

$$\text{id}_I \times q: I \times I \longrightarrow I \times S^1$$

adalah pemetaan hasil bagi: ia merupakan surjeksi kontinu dari ruang kompak ke ruang Hausdorff. Karena H konstan pada setiap seratnya, sifat universal hasil bagi memberi tepat satu homotopi bertitik $H^\sharp: I \times S^1 \rightarrow X$. Sebaliknya, prakomposisi homotopi bertitik dengan $\text{id}_I \times q$ menghasilkan homotopi loop berujung tetap. Jadi bijeksi di atas turun menjadi

$$\pi_1(X, x) \xrightarrow{\cong} [(S^1, 1), (X, x)]_*.$$

Faktorisasi melalui q dan pengambilan kembali dengan prakomposisi oleh q bersifat natural. Untuk setiap pemetaan bertitik $f: (X, x) \rightarrow (Y, y)$, pembentukan kelas memenuhi

$$(f \circ \gamma)^\sharp = f \circ \gamma^\sharp.$$

Dengan demikian isomorfisma tersebut natural. Untuk memeriksa perkalian, tuliskan $\iota_1, \iota_2: S^1 \rightarrow S^1 \vee S^1$ bagi kedua inklusi dan definisikan pemetaan jepit $p: S^1 \rightarrow S^1 \vee S^1$ melalui

$$p(q(t)) = \begin{cases} \iota_1(q(2t)), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ \iota_2(q(2t-1)), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Kedua rumus bertemu di titik baji dan sama pada $t = 0, 1$, sehingga lema penempelan dan sifat hasil bagi q memberi pemetaan bertitik kontinu p . Untuk pemetaan bertitik $u, v: S^1 \rightarrow X$, pemetaan baji $u \vee v$ memenuhi

$$((u \vee v) \circ p) \circ q = (u \circ q) \# (v \circ q).$$

Jadi perkalian yang diinduksi p tepat bersesuaian dengan konkatenasi loop. Isomorfisma natural di atas merupakan isomorfisma grup.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya [Notes.tex baris 1771–1946 pada commit b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#). Rentang itu dimulai dengan penanda Kuliah 8 dan motivasi bagi grupoid, lalu berakhir setelah pembuktian bahwa ruang kontraktif terhubung sederhana. Baris 1947 memulai Kuliah 9 dan tidak termasuk dalam unit ini. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, serta pemindahan semua keterangan dan diagram pinggir ke urutan bacaan utama. Beberapa cacat sumber diperbaiki secara independen: pada lema konjugasi, arah morfisma a diubah dari $\Gamma(y, x)$ menjadi $\Gamma(x, y)$ agar semua komposit bertipe benar menurut urutan komposisi aljabar yang dinyatakan sumber; salah eja “groupids” diperbaiki; dua kemunculan Π yang kehilangan subskrip 1 pada rumus produk dan koproduk dipulihkan menjadi Π_1 ; frasa “such an cover” diperbaiki; dan dalam contoh kontraksi, $h(0, x) = x_0$ diperbaiki menjadi $h(1, x) = x_0$, sesuai $H|_{\{1\} \times X}$ yang konstan. Ada pula ketidakselarasan cakupan: definisi sumber memakai π_0 hanya untuk ruang SLSC, sedangkan proposisi berikutnya mengklaim functor pada semua pasangan ruang. Edisi ini mempertahankan rumus π_0 pada kasus SLSC dan memakai kelas homotopi berujung tetap $[\{*\}, P_x^y X]$ untuk perluasan ke semua pasangan, konsisten dengan definisi umum π_1 pada Kuliah 7. Diagram komutatif ditulis ulang sebagai susunan rumus dengan uraian tekstual agar hubungan panahnya tetap dapat diakses.

Rentang sumber memuat satu latihan, tentang daerah berbentuk bintang, tetapi tidak memberikan solusinya. Lema struktur grupoid dan proposisi functorialitas grupoid fundamental juga diberikan tanpa bukti. Bagian pendamping penguasaan mempertahankan latihan sumber tersebut dan menambahkan empat pemeriksaan edisi, semuanya dengan solusi lengkap: lema konjugasi dan aksi bebas-transitif; keabsahan komposisi, functorialitas Π_1 , serta functor monodromi dan aksi kanan; kriteria keterhubungan sederhana dan penutup; serta argumen kontraksi melalui grupoid. Seluruh materi pendamping yang ditambahkan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

8 Kuliah 8

8.1 Dari transpor lintasan menuju grupoid

Seperti telah kita lihat, ruang penutup tidak hanya memberikan aksi $\pi_1(X, x)$ pada serat Z_x . Lintasan di antara titik-titik berbeda juga bertindak: suatu lintasan dari x ke y membawa titik-titik pada Z_x ke titik-titik pada Z_y . Jika X sejak awal tidak dilengkapi titik dasar, atau jika ada beberapa pilihan alami tanpa satu pun pilihan kanonik, kita dapat membentuk invarian yang lebih kaya, yaitu sebuah *grupoid*.

Definisi 8.1 (grupoid). Grupoid adalah kategori yang setiap morfismanya memiliki invers.

Untuk mengenali jenis-jenis grupoid yang muncul, mari kita lihat beberapa contoh. Kita hanya akan mempertimbangkan grupoid *kecil*. Artinya, grupoid Γ bersifat kecil secara lokal—setiap himpunan morfisma $\Gamma(x, y)$ benar-benar merupakan himpunan—dan koleksi objeknya juga merupakan suatu himpunan Γ_0 . Dengan demikian, himpunan semua morfisma dapat dibentuk sebagai gabungan lepas

$$\Gamma_1 = \bigsqcup_{x, y \in \Gamma_0} \Gamma(x, y).$$

Terdapat peta sumber dan sasaran

$$s, t: \Gamma_1 \rightrightarrows \Gamma_0.$$

Grupoid beserta funktor di antaranya membentuk kategori **Gpd**.

Contoh 8.1 (tiga grupoid dasar).

1. Setiap himpunan S menentukan grupoid $\text{Disc}(S)$: himpunan objeknya adalah S , dan satu-satunya morfisma adalah morfisma identitas. Konstruksi ini memberikan penyertaan subkategori penuh

$$\text{Disc}: \mathbf{Set} \hookrightarrow \mathbf{Gpd}.$$

Grupoid seperti ini disebut *diskret*.

2. Setiap himpunan C juga menentukan grupoid $\text{Codisc}(C)$. Objeknya adalah unsur-unsur C , tetapi sekarang terdapat tepat satu morfisma dari setiap objek menuju setiap objek lain. Himpunan morfismanya dapat diidentifikasi dengan $C \times C$, dan setiap $c \in C$ mempunyai grup automorfisma trivial. Grupoid seperti ini disebut *kodiskret*.
3. Misalkan grup G beraksi di kanan pada himpunan Y . Ada grupoid aksi $Y//G$ dengan himpunan objek Y dan himpunan morfisma $Y \times G$. Morfisma (y, g) mempunyai sumber dan sasaran

$$s(y, g) = y, \quad t(y, g) = yg,$$

sedangkan komposisinya adalah

$$(y, g)(yg, h) = (y, gh).$$

Morfisma identitas pada y adalah (y, e) , dan inversnya adalah

$$(y, g)^{-1} = (yg, g^{-1}).$$

Rumus-rumus ini langsung memenuhi hukum identitas, invers, dan asosiativitas karena hukum grup pada G .

Jika $G = 1$, konstruksi ini kembali menjadi grupoid diskret pada Y . Jika $Y = \{*\}$, informasi grupoid tersebut pada hakikatnya sama dengan informasi grup G . Grupoid satu objek ini dilambangkan **BG**, dan

$$\mathbf{B}: \mathbf{Grp} \hookrightarrow \mathbf{Gpd}$$

merupakan penyertaan subkategori penuh.

Slogan yang kadang dipakai adalah bahwa grupoid menyerupai grup dengan “banyak identitas”. Pandangan lain yang berguna ialah bahwa grupoid memperumum aksi grup: grup-grup yang berbeda dapat bertindak pada bagian-bagian yang berbeda dari himpunan objek.

Pada lema berikut kita memakai *urutan komposisi aljabar*: jika $f: x \rightarrow y$ dan $g: y \rightarrow z$, komposit “pertama f , lalu g ” ditulis $fg: x \rightarrow z$.

Lema 8.1 (konjugasi dan aksi pada himpunan-hom). Untuk setiap grupoid Γ , objek $x, y \in \Gamma_0$, dan morfisma $a \in \Gamma(x, y)$, pemetaan

$$\begin{aligned} \text{Ad}_a: \Gamma(x, x) &\xrightarrow{\cong} \Gamma(y, y), \\ g &\longmapsto a^{-1}ga \end{aligned}$$

merupakan isomorfisma grup, dengan invers

$$(\text{Ad}_a)^{-1} = \text{Ad}_{a^{-1}}.$$

Selain itu, fungsi

$$\begin{aligned}\Gamma(x, x) \times \Gamma(x, y) &\longrightarrow \Gamma(x, y), \\ (g, a) &\longmapsto ga\end{aligned}$$

mendefinisikan aksi bebas dan transitif dari grup $\Gamma(x, x)$ pada $\Gamma(x, y)$.

Jika $\Gamma(x, y)$ tidak kosong, pernyataan terakhir mengatakan bahwa $\Gamma(x, y)$ merupakan torsor kiri bagi $\Gamma(x, x)$. Jika himpunan-hom itu kosong, kebebasan dan transitivitas dalam bentuk berkuantor di atas berlaku secara vakum, tetapi istilah *torsor* biasanya mensyaratkan himpunan tak kosong.

Sebagai pengingat, aksi $G \times S \rightarrow S$ disebut *bebas* jika $g \cdot p = p$ mengakibatkan g adalah unsur identitas. Aksi itu disebut *transitif* jika untuk setiap $p, q \in S$ terdapat $g \in G$ dengan $g \cdot p = q$. Dalam Lema 8.1, jika $a, b \in \Gamma(x, y)$, unsur $ba^{-1} \in \Gamma(x, x)$ membawa a ke b karena

$$(ba^{-1})a = b.$$

Kebebasan mengikuti dari

$$ga = a \implies g = gaa^{-1} = aa^{-1} = \text{id}_x.$$

8.2 Grupoid fundamental

Definisi 8.2 (grupoid fundamental bertumpu pada suatu himpunan). Misalkan X adalah ruang SLSC dan $A \subseteq X$ suatu subruang. *Grupoid fundamental bertumpu pada A* adalah grupoid $\Pi_1(X, A)$ yang himpunan objeknya A dan yang himpunan morfismanya dari x ke y adalah

$$\Pi_1(X, A)(x, y) := \pi_0(P_x^y X).$$

Komposisi diinduksi oleh konkatenasi lintasan:

$$\pi_0(P_x^y X) \times \pi_0(P_y^z X) \xrightarrow{\cong} \pi_0(P_x^y X \times P_y^z X) \longrightarrow \pi_0(P_x^z X),$$

dan lintasan konstan menjadi morfisma identitas.

Dalam rumus sumber, π_0 berarti komponen **terhubung**, bukan komponen lintasan. Untuk ruang SLSC, Teorema 6.2 membuat ruang-ruang lintasan di atas terhubung lintasan secara lokal. Karena itu pemetaan alami

$$[\{*\}, P_x^y X] \longrightarrow \pi_0(P_x^y X)$$

adalah bijeksi: kelas homotopi berujung tetap sama dengan komponen terhubung. Konvensi SLSC Unit 6 juga mencakup keterhubungan lintasan lokal.

Proposisi berikut berbicara tentang **semua** pasangan ruang, bukan hanya pasangan SLSC. Agar cakupannya tepat, untuk ruang topologis sebarang kita memakai perluasan standar

$$\Pi_1(X, A)(x, y) := [\{*\}, P_x^y X],$$

yaitu kelas homotopi lintasan yang mempertahankan titik ujung. Definisi ini berlaku tanpa hipotesis lokal apa pun dan, pada ruang SLSC, berimpit dengan rumus π_0 yang ditampilkan dalam Definisi 8.2.

Seperti invarian-invarian lain, grupoid fundamental bersifat funktorial. Definisikan $\mathbf{Top}^{(2)}$ sebagai kategori yang objeknya pasangan (X, A) , dengan X ruang topologis dan $A \subseteq X$ subruang. Morfisma

$$f: (X, A) \longrightarrow (Y, B)$$

adalah fungsi kontinu $f: X \rightarrow Y$ yang memenuhi $f(A) \subseteq B$. Pengiriman ruang bertitik (X, x) ke pasangan $(X, \{x\})$ memberi penyertaan subkategori penuh

$$\mathbf{Top}_* \hookrightarrow \mathbf{Top}^{(2)}.$$

Proposisi 8.1 (funktorialitas grupoid fundamental). Grupoid fundamental memberikan funktor

$$\Pi_1: \mathbf{Top}^{(2)} \longrightarrow \mathbf{Gpd}$$

sehingga diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Top}_* & \xrightarrow{\pi_1} & \mathbf{Grp} \\ \downarrow & & \downarrow \mathbf{B} \\ \mathbf{Top}^{(2)} & \xrightarrow{\Pi_1} & \mathbf{Gpd}. \end{array}$$

Panah vertikal kiri mengirim (X, x) ke $(X, \{x\})$, sedangkan panah vertikal kanan mengirim grup G ke grupoid satu objek $\mathbf{B}G$. Komutativitas berarti

$$\Pi_1(X, \{x\}) \cong \mathbf{B}\pi_1(X, x).$$

Selain itu, terdapat isomorfisma alami

$$\Pi_1(X \times Y, A \times B) \xrightarrow{\cong} \Pi_1(X, A) \times \Pi_1(Y, B)$$

dan

$$\Pi_1(X, A) \sqcup \Pi_1(Y, B) \xrightarrow{\cong} \Pi_1(X \sqcup Y, A \sqcup B).$$

Produk grupoid pada proposisi ini dibentuk dengan mengambil produk himpunan objek dan produk himpunan morfisma. Koproduct atau gabungan lepas grupoid dibentuk dengan mengambil gabungan lepas himpunan objek dan gabungan lepas himpunan morfisma.

Ruang tanpa titik dasar juga dapat dimasukkan ke dalam kategori pasangan melalui

$$X \longmapsto (X, X).$$

Ini memberikan funktor penuh dan setia $\mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Top}^{(2)}$. Jadi, meskipun X sama sekali tidak memiliki titik dasar pilihan, kita tetap dapat mendefinisikan

$$\Pi_1(X) := \Pi_1(X, X).$$

Konstruksi tersebut merupakan funktor $\mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Gpd}$.

8.3 Ruang terhubung sederhana

Kita belum menghitung grup atau grupoid fundamental dalam banyak contoh. Pertama-tama kita beri nama bagi ruang yang grupoid fundamentalnya trivial dalam arti kodiskret.

Definisi 8.3 (terhubung sederhana). Ruang X disebut *terhubung sederhana* jika funktor kanonik

$$\Pi_1(X) \longrightarrow \text{Codisc}(X)$$

merupakan isomorfisma; dengan kata lain,

$$\Pi_1(X) \cong \text{Codisc}(X)$$

secara identik pada objek.

Menurut definisi kategoris ini, ruang kosong juga memenuhi syarat secara vakum. Jika konvensi lain mendefinisikan “terhubung sederhana” hanya untuk ruang tak kosong, tambahkan syarat $X \neq \emptyset$; semua hasil berikut untuk ruang yang mempunyai titik tidak berubah.

Ruang semacam itu juga memenuhi

$$\Pi_1(X, A) \cong \text{Codisc}(A)$$

untuk setiap $A \subseteq X$.

Untuk $X \neq \emptyset$, Definisi 8.3 dapat diuraikan menjadi dua syarat. Pertama, untuk setiap $x, y \in X$ terdapat lintasan $x \rightsquigarrow y$, sehingga X terhubung lintasan. Kedua, semua lintasan di antara dua titik yang telah ditentukan homotopik dengan titik ujung tetap. Jadi terdapat tepat satu morfisma dalam grupoid fundamental di antara dua objek mana pun. Khususnya,

$$\pi_1(X, x) = \Pi_1(X)(x, x)$$

adalah grup trivial.

Contoh 8.2 (himpunan konveks). Setiap himpunan konveks $C \subseteq \mathbb{R}^n$ terhubung sederhana. Setiap dua titik $v, w \in C$ dapat dihubungkan oleh ruas garis. Jika $\gamma, \eta: v \rightsquigarrow w$ adalah dua lintasan, maka

$$H(s, t) = s\gamma(t) + (1 - s)\eta(t)$$

merupakan homotopi di dalam C dari η ke γ . Titik ujungnya tetap karena

$$H(s, 0) = v, \quad H(s, 1) = w.$$

Secara khusus, interval I terhubung sederhana. Grupoid

$$\Pi_1(I, \{0, 1\})$$

cukup penting untuk diberi nama tersendiri, yaitu **2**. Grupoid ini kadang ditulis

$$0 \xrightarrow{\cong} 1.$$

Ia mempunyai dua objek, 0 dan 1, serta tepat satu isomorfisma dalam setiap arah di antara keduanya.

Latihan sumber 8.1 (daerah berbentuk bintang). Dalam ruang vektor riil atau kompleks V , definisikan *daerah berbentuk bintang* sebagai himpunan $K \subseteq V$ yang mempunyai suatu $v_0 \in K$ sedemikian sehingga, untuk setiap $v \in K$ dan $t \in I$,

$$tv_0 + (1-t)v \in K.$$

Buktikan bahwa setiap daerah berbentuk bintang terhubung sederhana.

Sebagai contoh yang tidak konveks, ambil setengah bidang atas terbuka

$$\mathcal{H} = \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Im} z > 0\}.$$

Himpunan $\mathcal{H} \cup \mathbb{Q} \subset \mathbb{C}$ berbentuk bintang dengan pusat, misalnya, $i \in \mathcal{H}$: untuk $t > 0$, titik $ti + (1-t)v$ berada di $\mathcal{H}$, sedangkan pada $t = 0$ ia sama dengan v . Himpunan ini tidak konveks.

Ruang terhubung sederhana istimewa karena hubungannya dengan ruang penutup.

Proposisi 8.2 (penutup terhubung di atas ruang terhubung sederhana). Jika X terhubung sederhana, maka setiap ruang penutup terhubung lintasan

$$\pi: Z \longrightarrow X$$

bersifat trivial, dalam arti π merupakan homeomorfisma.

Bukti. Kita memakai konvensi lazim bahwa ruang terhubung lintasan tidak kosong. Pilih $z_0 \in Z$ dan tuliskan $x_0 = \pi(z_0)$. Karena X terhubung lintasan, untuk setiap $x \in X$ terdapat lintasan dari x_0 ke x ; pengangkatannya yang berawal di z_0 berakhir pada suatu titik $z_x \in Z_x$. Jadi setiap serat tidak kosong. Karena Z terhubung lintasan, pemetaan orbit

$$\pi_1(X, x) \longrightarrow Z_x, \quad [\gamma] \longmapsto \gamma_*(z_x),$$

surjektif. Karena X terhubung sederhana, $\pi_1(X, x)$ trivial. Jadi Z_x hanya mempunyai satu titik. Argumen yang sama berlaku bagi setiap $x \in X$, sehingga π bijektif.

Syarat trivialitas lokal suatu ruang penutup menyatakan bahwa setiap $x \in X$ mempunyai lingkungan terbuka $U \ni x$ sedemikian sehingga

$$\pi^{-1}(U) \longrightarrow U$$

adalah homeomorfisma. Ambil semua lingkungan semacam itu sebagai suatu penutup terbuka $\{U_\alpha\}$ bagi X . Invers-invers lokal $U_\alpha \rightarrow \pi^{-1}(U_\alpha)$ berimpit pada setiap irisan karena π bijektif. Lema penempelan menggabungkannya menjadi invers kontinu $X \rightarrow Z$ bagi π . Jadi π adalah homeomorfisma. $\square$

Contoh 8.3 (ruang kontraktif). Jika X kontraktif, maka X terhubung sederhana. Ambil kontraksi

$$H: I \times X \longrightarrow X$$

menuju $x_0 \in X$, dengan

$$H(0, x) = x, \quad H(1, x) = x_0.$$

Fungtor terinduksi

$$h = \Pi_1(H): \Pi_1(I \times X, \{0, 1\} \times X) \longrightarrow \Pi_1(X)$$

mempunyai domain yang, menurut Proposisi 8.1, dapat ditulis

$$\Pi_1(I, \{0, 1\}) \times \Pi_1(X) = \mathbf{2} \times \Pi_1(X).$$

Pada salinan $\{0\} \times \Pi_1(X)$, functor h adalah identitas karena $H|_{\{0\} \times X} = \text{id}_X$. Pada salinan $\{1\} \times \Pi_1(X)$, ia mengirim setiap objek ke x_0 dan setiap lintasan ke lintasan konstan di x_0 , karena $H|_{\{1\} \times X}$ konstan. Khususnya,

$$h(1, x) = x_0$$

untuk setiap $x \in X$.

Kontraksi juga menunjukkan bahwa X terhubung lintasan: lintasan $s \mapsto H(s, x)$ menghubungkan x dengan x_0 . Sekarang ambil lintasan $\gamma: x \rightsquigarrow y$. Di dalam $\mathbf{2} \times \Pi_1(X)$ terdapat persegi komutatif

$$\begin{array}{ccc} (0, x) & \xrightarrow{(\text{id}_0, [\gamma])} & (0, y) \\ \downarrow & & \uparrow \\ (1, x) & \xrightarrow{(\text{id}_1, [\gamma])} & (1, y). \end{array}$$

Panah vertikal adalah isomorfisma tunggal yang diberikan faktor $\mathbf{2}$ (dipasangkan dengan morfisma identitas pada objek yang bersesuaian). Di bawah h , persegi itu menjadi

$$\begin{array}{ccc} x & \xrightarrow{[\gamma]} & y \\ \downarrow & & \uparrow \\ x_0 & \xrightarrow{\text{id}_{x_0}} & x_0. \end{array}$$

Citra kedua panah vertikal hanya bergantung pada x , y , dan kontraksi H , bukan pada kelas $[\gamma]$. Komutativitas menunjukkan bahwa $[\gamma]$ sama dengan komposit melalui x_0 . Karena komposit tersebut tidak bergantung pada pilihan γ , semua lintasan dari x ke y homotopik dengan titik ujung tetap. Maka $\Pi_1(X) \cong \text{Codisc}(X)$, sehingga X terhubung sederhana.

Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Latihan Sumber 8.1 di atas berasal dari Roberts. Pemeriksaan 8.2–8.5 dan seluruh solusi berikut merupakan materi asli edisi ini, ditambahkan di bawah CC BY 4.0 untuk menutup langkah yang tidak dibuktikan dalam rentang sumber.

8.4 Solusi Latihan Sumber 8.1

Pilih pusat bintang $v_0 \in K$. Definisikan

$$F: I \times K \longrightarrow K, \quad F(s, v) = sv_0 + (1 - s)v.$$

Definisi daerah berbentuk bintang menjamin bahwa citra F berada di K . Pemetaan itu kontinu dan memenuhi

$$F(0, v) = v, \quad F(1, v) = v_0.$$

Jadi K kontraktif. Kita dapat langsung memperoleh dua syarat pada Definisi 8.3. Pertama, setiap $v \in K$ dihubungkan ke v_0 oleh $s \mapsto F(s, v)$, sehingga K terhubung lintasan.

Kedua, jika $\gamma, \eta: v \rightsquigarrow w$, definisikan lintasan kanonik melalui pusat bintang

$$\lambda_{v,w} = (s \mapsto F(s, v)) \# \overline{(s \mapsto F(s, w))}.$$

Homotopi kontraksi mengubah setiap lintasan γ menjadi $\lambda_{v,w}$ dengan titik ujung tetap; hal ini juga merupakan kasus khusus argumen persegi pada Contoh 8.3. Hal yang sama berlaku bagi η . Maka $\gamma \simeq \lambda_{v,w} \simeq \eta$ relatif terhadap titik ujung. Jadi terdapat tepat satu kelas lintasan dari v ke w , dan K terhubung sederhana.

Pemeriksaan penguasaan 8.2 (struktur grupoid). Buktikan seluruh Lema 8.1. Kemudian tentukan orbit dan stabilisator dalam grupoid aksi $Y//G$, serta tentukan kapan grupoid itu diskret dan kapan ia kodiskret.

8.5 Solusi Pemeriksaan 8.2

Untuk $a: x \rightarrow y$ dan $g: x \rightarrow x$, komposit $a^{-1}ga$ bertipe $y \rightarrow y$. Bagi $g, h \in \Gamma(x, x)$,

$$\text{Ad}_a(gh) = a^{-1}gha = (a^{-1}ga)(a^{-1}ha),$$

karena $aa^{-1} = \text{id}_x$ dalam urutan komposisi aljabar. Selain itu,

$$\text{Ad}_{a^{-1}}(\text{Ad}_a(g)) = a(a^{-1}ga)a^{-1} = g,$$

dan perhitungan sebaliknya sama. Jadi Ad_a adalah isomorfisma grup dengan invers $\text{Ad}_{a^{-1}}$.

Rumus $g \cdot b = gb$ memenuhi

$$\text{id}_x \cdot b = b, \quad (gh) \cdot b = g \cdot (h \cdot b),$$

sehingga merupakan aksi. Jika $g \cdot b = b$, maka

$$g = gbb^{-1} = bb^{-1} = \text{id}_x,$$

jadi aksi bebas. Jika $b, c \in \Gamma(x, y)$, ambil

$$g = cb^{-1} \in \Gamma(x, x).$$

Lalu $g \cdot b = (cb^{-1})b = c$, sehingga aksi transitif.

Dalam $Y//G$, dua objek berada pada komponen grupoid yang sama tepat jika mereka berada pada orbit G yang sama. Grup automorfisma objek y adalah stabilisator

$$G_y = \{g \in G \mid yg = y\}.$$

Grupoid aksi diskret tepat ketika satu-satunya morfisma pada setiap objek adalah identitas. Ini terjadi tepat ketika setiap orbit berupa satu titik dan setiap stabilisator trivial, yakni ketika G sendiri

trivial apabila $Y \neq \emptyset$. Untuk $Y = \emptyset$, grupoid kosong tentu diskret untuk setiap G . Grupoid aksi kodiskret tepat ketika di antara setiap dua objek terdapat tepat satu morfisma. Artinya, aksi G pada Y bebas dan transitif. Dengan kata lain, jika $Y \neq \emptyset$, maka grupoid aksi kodiskret tepat ketika Y adalah torsor kanan bagi G . Jika $Y = \emptyset$, maka $Y // G = \text{Codisc}(\emptyset)$ untuk setiap G .

Pemeriksaan penguasaan 8.3 (keabsahan dan fungtorialitas Π_1). Buktikan bahwa konkatenasi pada Definisi 8.2 terdefinisi baik pada kelas, memenuhi aksioma grupoid, dan fungtorial terhadap morfisma pasangan. Buktikan pula kedua isomorfisma pada Proposisi 8.1. Terakhir, tunjukkan bahwa setiap ruang penutup $\pi: Z \rightarrow X$ menentukan fungtor monodromi $\rho_Z: \Pi_1(X) \rightarrow \mathbf{Set}$ dan jelaskan bagaimana restriksinya pada loop menghasilkan aksi kanan Unit 7.

8.6 Solusi Pemeriksaan 8.3

Untuk ruang sebarang, ambil kelas homotopi berujung tetap

$$[\gamma] \in [\{*\}, P_x^y X], \quad [\eta] \in [\{*\}, P_y^z X].$$

Konkatenasi kontinu sebagai pemetaan ruang lintasan menurut Pemeriksaan Penguasaan 7.2. Karena itu, homotopi berujung tetap pada γ atau η menghasilkan homotopi berujung tetap pada $\gamma \# \eta$. Maka

$$[\gamma][\eta] := [\gamma \# \eta]$$

tidak bergantung pada wakil. Homotopi reparameterisasi dari Unit 7 menunjukkan asosiativitas pada kelas. Kelas lintasan konstan $[c_x]$ menjadi identitas, dan kelas lintasan balik $[\bar{\gamma}]$ menjadi invers. Jadi struktur ini benar-benar suatu grupoid.

Untuk morfisma pasangan $f: (X, A) \rightarrow (Y, B)$, definisikan

$$\Pi_1(f)(x) = f(x), \quad \Pi_1(f)([\gamma]) = [f \circ \gamma].$$

Komposisi dengan f membawa homotopi berujung tetap ke homotopi berujung tetap. Ia juga memenuhi

$$f \circ (\gamma \# \eta) = (f \circ \gamma) \# (f \circ \eta), \quad f \circ c_x = c_{f(x)}.$$

Jadi $\Pi_1(f)$ adalah fungtor grupoid. Rumus tersebut jelas mempertahankan identitas dan komposisi pemetaan pasangan, sehingga Π_1 adalah fungtor. Pada pasangan $(X, \{x\})$, hanya ada satu objek dan grup automorfismanya adalah $\pi_1(X, x)$. Ini membuktikan komutativitas diagram Proposisi 8.1.

Selanjutnya, pemetaan

$$P_{(x,y)}^{(x',y')}(X \times Y) \longrightarrow P_x^{x'} X \times P_y^{y'} Y, \quad \gamma \longmapsto (\text{pr}_X \circ \gamma, \text{pr}_Y \circ \gamma)$$

adalah homeomorfisma, dengan invers yang memasangkan kedua lintasan titik demi titik. Setelah mengambil kelas homotopi dan memakai bijeksi alami

$$[\{*\}, M \times N] \cong [\{*\}, M] \times [\{*\}, N],$$

kita memperoleh isomorfisma produk pada objek maupun morfisma. Pada ruang SLSC, ini juga dapat dibaca sebagai rumus π_0 dalam Definisi 8.2. Rumus tersebut menghormati konkatenasi koordinat demi koordinat.

Terakhir, setiap lintasan $I \rightarrow X \sqcup Y$ seluruhnya berada di X atau seluruhnya berada di Y , karena I terhubung dan kedua bagian gabungan lepas itu terbuka sekaligus tertutup. Jadi tidak ada morfisma yang melintasi kedua bagian, sedangkan semua morfisma di dalam masing-masing bagian tetap ada. Ini memberikan isomorfisma koproduk pada Proposisi 8.1.

Untuk ruang penutup $\pi: Z \rightarrow X$, definisikan functor monodromi pada objek dan morfisma dengan

$$\rho_Z(x) = Z_x, \quad \rho_Z([\gamma]) = \gamma_*: Z_x \longrightarrow Z_y$$

bagi $[\gamma]: x \rightarrow y$. Invariansi transpor terhadap homotopi berujung tetap membuat rumus ini terdefinisi baik. Lintasan konstan menginduksi identitas, sedangkan Lema 7.1 memberi

$$\rho_Z([\gamma][\eta]) = (\gamma \# \eta)_* = \eta_* \circ \gamma_* = \rho_Z([\eta]) \circ \rho_Z([\gamma]).$$

Ini tepat hukum functor untuk konvensi komposisi aljabar, yakni pertama $[\gamma]$ lalu $[\eta]$. Pada grup automorfisma objek x , tuliskan $z \cdot [\gamma] = \gamma_*(z)$. Persamaan yang sama menjadi

$$z \cdot ([\gamma][\eta]) = (z \cdot [\gamma]) \cdot [\eta],$$

yaitu aksi kanan pada serat Z_x . Jika aksi kiri lebih disukai, balik setiap loop sebagaimana dijelaskan pada Unit 7.

Pemeriksaan penguasaan 8.4 (kriteria keterhubungan sederhana dan penutup). Untuk ruang terhubung lintasan X , buktikan bahwa syarat-syarat berikut ekuivalen:

1. X terhubung sederhana;
2. $\pi_1(X, x)$ trivial untuk satu titik $x \in X$;
3. $\pi_1(X, y)$ trivial untuk setiap titik $y \in X$.

Jelaskan pula dengan contoh mengapa kata “terhubung lintasan” pada Proposisi 8.2 tidak boleh dihapus dari hipotesis ruang atas Z .

8.7 Solusi Pemeriksaan 8.4

Implikasi (1) $\Rightarrow$ (3) langsung dari Definisi 8.3, dan (3) $\Rightarrow$ (2) langsung. Untuk (2) $\Rightarrow$ (3), pilih lintasan $a: x \rightsquigarrow y$. Lema 8.1 memberi isomorfisma konjugasi

$$\pi_1(X, x) \xrightarrow{\cong} \pi_1(X, y).$$

Jadi trivialitas pada x mengakibatkan trivialitas pada y .

Untuk membuktikan (2) $\Rightarrow$ (1), ambil dua lintasan $\gamma, \eta: y \rightsquigarrow z$. Karena X terhubung lintasan, pilih $a: x \rightsquigarrow y$. Komposit

$$a \# \gamma \# \bar{\eta} \# \bar{a}$$

adalah loop pada x . Kelasnya trivial, sehingga pembatalan kelas $[a]$ dan $[\bar{a}]$ di dalam grupoid memberi $[\gamma] = [\eta]$. Maka di antara setiap dua objek terdapat tepat satu morfisma, sehingga $\Pi_1(X)$ kodiskret.

Sekarang ambil ruang terhubung sederhana X dan himpunan diskret S yang mempunyai sedikitnya dua unsur. Proyeksi penutup trivial

$$S \times X \longrightarrow X$$

bukan homeomorfisma, sebab setiap serat mempunyai $|S| > 1$ titik. Ruang atas $S \times X$ bukan terhubung lintasan: setiap $\{s\} \times X$ adalah komponen lintasannya. Jadi hipotesis keterhubungan lintasan pada Z tepat menyingkirkan penutup trivial dengan lebih dari satu lembaran.

Pemeriksaan penguasaan 8.5 (argumen kontraksi tanpa diagram). Misalkan $H(0, u) = u$ dan $H(1, u) = x_0$. Untuk setiap $u \in X$, definisikan $\rho_u(s) = H(s, u)$. Tunjukkan langsung bahwa setiap lintasan $\gamma: x \rightsquigarrow y$ homotopik dengan titik ujung tetap terhadap $\rho_x \# \bar{\rho}_y$. Deduksikan kembali bahwa X terhubung sederhana dan cocokkan perhitungan ini dengan persegi pada Contoh 8.3.

8.8 Solusi Pemeriksaan 8.5

Definisikan

$$K: I \times I \longrightarrow X, \quad K(s, t) = H(s, \gamma(t)).$$

Untuk $s = 0$, kita memperoleh

$$K(0, t) = \gamma(t).$$

Untuk $s = 1$, lintasan itu konstan:

$$K(1, t) = x_0.$$

Namun K belum merupakan homotopi berujung tetap, sebab sisi-sisinya bergerak menurut

$$K(s, 0) = \rho_x(s), \quad K(s, 1) = \rho_y(s).$$

Menelusuri batas mulai dari $(0, 0)$, pertama-tama dalam arah t meningkat, memberikan loop

$$\gamma \# \rho_y \# \bar{c}_{x_0} \# \bar{\rho}_x,$$

yang null-homotopik melalui K . Karena c_{x_0} adalah identitas pada kelas lintasan, persamaan batas di dalam grupoid fundamental adalah

$$[\gamma][\rho_y][\bar{\rho}_x] = [c_x].$$

Kalikan dengan kelas invers yang sesuai, atau baca kembali arah batas persegi, untuk mendapatkan

$$[\gamma] = [\rho_x][\bar{\rho}_y].$$

Dengan demikian

$$\gamma \simeq \rho_x \# \bar{\rho}_y \quad \text{relatif terhadap } \{0, 1\}.$$

Ruas kanan hanya bergantung pada x , y , dan kontraksi H , bukan pada γ . Jadi setiap dua lintasan $x \rightsquigarrow y$ berada dalam kelas yang sama. Karena $\rho_x \# \bar{\rho}_y$ juga memperlihatkan adanya lintasan dari x ke y , X terhubung lintasan dan grupoid fundamentalnya kodiskret.

Dalam persegi Contoh 8.3, citra panah vertikal kiri adalah $[\rho_x]$, sedangkan citra panah vertikal kanan yang diarahkan ke atas adalah $[\bar{\rho}_y]$. Panah bawah menjadi $[\text{id}_{x_0}]$. Maka “jalan memutar” dari x ke y tepat $[\rho_x][\bar{\rho}_y]$, sama dengan perhitungan langsung di atas.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya [Notes.tex baris 1947–2093 pada commit b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#). Rentang itu dimulai dengan penanda Kuliah 9 dan teorema kesetiaan functor grupoid fundamental suatu ruang penutup, lalu berakhir tepat setelah pernyataan teorema yang mengidentifikasi serat dengan ruang koset. Baris 2094 memulai Kuliah 10 dan tidak termasuk dalam unit ini. Bukti sumber bagi teorema ruang koset baru dimulai pada kuliah berikutnya. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, dan pemindahan ketiga unsur pinggir ke urutan bacaan utama: keterangan tentang functor setia, latihan kontraksi, dan diagram pengangkatan homotopi. Diagram tersebut ditulis ulang sebagai diagram linear beserta uraian semua panahnya. Beberapa cacat sumber diperbaiki secara independen: salah eja “funtor”, “trivialisable”, dan “resuls” diperbaiki; fragmen kalimat sebelum pemetaan ke ruang lintasan dilengkapi dengan hukum eksponensial yang memang dipakai; salah variabel $(t, z) := \pi(z)$ diperbaiki menjadi $(t, x) := \pi(z)$; serta “are path” dan “map in injective” diperbaiki menjadi bentuk yang bertipe dan gramatikal. Rumus bagi τ dan σ juga menampilkan titik awal lintasan secara eksplisit, sehingga produk serat yang tersirat dalam sumber dapat diperiksa.

Ada satu persoalan konvensi yang substantif. Sumber menuliskan ruang koset G/H , yang membawa aksi kiri alami. Unit 7–8 menggunakan transpor penutup sebagai aksi kanan, sebagaimana dituntut oleh urutan konkatenasi yang sudah ditetapkan. Karena itu teorema penutup unit ini menyatakan kedua bentuk yang ekuivalen: G/H untuk aksi kiri yang diperoleh dengan membalik unsur grup, dan $H \backslash G$ untuk aksi kanan monodromi. Subgrup H ditulis sebagai citra $\pi_*\pi_1(Z, z)$, bukan disamakan secara diam-diam dengan grup asalnya.

Rentang sumber memuat satu latihan pinggir tetapi tidak menyediakan solusinya. Bagian pendamping penguasaan mempertahankan latihan itu dan menambahkan empat pemeriksaan edisi dengan solusi lengkap: perbedaan antara setia dan penuh; invers eksplisit bagi trivialitas di atas $I \times X$; konstruksi pengangkatan homotopi dari sebuah penampang; serta identifikasi orbit–stabilisator dengan kedua konvensi koset. Solusi terakhir memberi bukti mandiri bagi teorema penutup tanpa menyalin ungkapan bukti pada kuliah berikutnya. Seluruh materi pendamping yang ditambahkan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

9 Kuliah 9

Dalam satu arti, kita terutama tertarik pada ruang yang terhubung lintasan. Meskipun demikian, grupoid fundamental juga berguna ketika ruang dibangun dari komponen-komponen yang saling lepas. Sekarang kita akan melihat cara lain untuk memperoleh informasi tentang grupoid fundamental sebuah ruang dari grupoid fundamental ruang lain.

9.1 Ruang penutup menginduksi functor setia

Teorema 9.1 (kesetiaan bagi ruang penutup). Misalkan $\pi: Z \rightarrow X$ suatu ruang penutup. Untuk setiap $z_1, z_2 \in Z$, pemetaan

$$\begin{aligned}\Pi_1(Z)(z_1, z_2) &\longrightarrow \Pi_1(X)(\pi(z_1), \pi(z_2)), \\ [\gamma] &\longmapsto [\pi \circ \gamma]\end{aligned}$$

bersifat injektif. Dengan kata lain, functor $\Pi_1(\pi): \Pi_1(Z) \rightarrow \Pi_1(X)$ bersifat *setia*.

Bukti teorema ini akan diberikan setelah kita membuktikan sifat pengangkatan homotopi. Untuk sekarang, kita mencatat satu akibat penting.

Akibat 9.1 (grup fundamental ruang atas sebagai subgrup). Untuk ruang penutup bertitik

$$\pi: (Z, z) \longrightarrow (X, x),$$

homomorfisma terinduksi

$$\pi_*: \pi_1(Z, z) \longrightarrow \pi_1(X, x)$$

mengidentifikasi $\pi_1(Z, z)$ secara isomorfik dengan subgrup $\pi_*(\pi_1(Z, z)) \leq \pi_1(X, x)$.

Jadi, jika grupoid fundamental ruang atas suatu penutup diketahui, ukuran grup fundamental ruang atas memberi batas bawah bagi ukuran grup fundamental ruang dasar. Secara ekuivalen,

$$|\pi_1(Z, z)| \leq |\pi_1(X, x)|.$$

Dengan demikian, jika $\pi_1(X, x)$ berhingga, maka $\pi_1(Z, z)$ juga berhingga.

9.2 Trivialitas penutup di sepanjang interval

Proposisi 9.1 (penutup di atas $I \times X$). Misalkan $\pi: Z \rightarrow I \times X$ suatu ruang penutup dan definisikan

$$Z_0 := Z_{\{0\} \times X} = \pi^{-1}(\{0\} \times X).$$

Terdapat isomorfisma ruang penutup

$$Z \xrightarrow{\cong} I \times Z_0$$

di atas $I \times X$, dengan $I \times Z_0 \rightarrow I \times X$ diberikan oleh

$$(t, z_0) \longmapsto (t, x) \quad \text{jika} \quad \pi(z_0) = (0, x).$$

Bukti. Pemetaan dari Z menuju $I \times Z_0$ akan berbentuk

$$\Phi = (\text{pr}_1 \circ \pi, \tau),$$

untuk suatu pemetaan $\tau: Z \rightarrow Z_0$ yang masih harus dibangun. Gagasannya sama dengan trivialitas ruang penutup di atas I ; kasus itu tepat merupakan kasus khusus $X = \{*\}$.

Untuk setiap $x \in X$, pembatasan

$$Z_{I \times \{x\}} \longrightarrow I \times \{x\} \cong I$$

merupakan ruang penutup yang dapat ditrivialkan. Karena itu terdapat pemetaan

$$\tau_x: Z_{I \times \{x\}} \longrightarrow I \times Z_{(0, x)} \xrightarrow{\text{pr}_2} Z_{(0, x)}.$$

Pemetaan-pemetaan τ_x menentukan sebuah fungsi himpunan $Z \rightarrow Z_0$, tetapi kekontinuannya belum langsung terlihat. Kita akan membangun versi globalnya dari pemetaan-pemetaan yang sudah diketahui kontinu.

Untuk $(t, x) \in I \times X$, definisikan lintasan

$$\eta_{(t,x)}: I \longrightarrow I \times X, \quad \eta_{(t,x)}(s) = (ts, x).$$

Lintasan ini berjalan dari $(0, x)$ menuju (t, x) dan berubah secara kontinu terhadap (t, x) . Memang, pemetaan

$$I \times I \times X \longrightarrow I \times X, \quad (s, t, x) \longmapsto (ts, x)$$

kontinu. Hukum eksponensial bagi ruang lintasan kemudian memberi pemetaan kontinu

$$E: I \times X \longrightarrow (I \times X)^I, \\ (t, x) \longmapsto \eta_{(t,x)}.$$

Tuliskan $\bar{\eta}_{(t,x)}(s) = \eta_{(t,x)}(1-s)$ bagi lintasan balik. Pemetaan $(t, x) \mapsto \bar{\eta}_{(t,x)}$ kontinu karena, menurut hukum eksponensial, ia bersesuaian dengan pemetaan kontinu

$$(s, t, x) \longmapsto ((1-s)t, x).$$

Pemetaan ke kedua produk serat di bawah ini karena itu kontinu; untuk σ , koordinat x diperoleh secara kontinu dari pembatasan $Z_0 \rightarrow \{0\} \times X$. Dengan operator pengangkatan lintasan kontinu Lift, definisikan komposit

$$\tau: Z \xrightarrow{\cong} (I \times X) \times_{I \times X} Z \\ \longrightarrow (I \times X)^I \times_{I \times X} Z \xrightarrow{\text{Lift}} Z^I \xrightarrow{\text{ev}_1} Z,$$

yang pada suatu titik diberikan oleh

$$z \longmapsto (\pi(z), z) \longmapsto (\bar{\eta}_{\pi(z)}, z) \longmapsto \tilde{\eta}_{\pi(z), z}(1).$$

Produk serat di sini memasang suatu lintasan di $I \times X$ dengan titik di Z di atas titik awal lintasan itu. Jika $\pi(z) = (t, x)$, maka $\bar{\eta}_{(t,x)}$ berjalan dari (t, x) menuju $(0, x)$. Karena itu titik akhir pengangkatannya berada di $Z_{(0,x)}$; jadi τ benar-benar memfaktor melalui Z_0 . Semua pemetaan dalam komposit tersebut kontinu, sehingga τ kontinu.

Sekarang bangun invers kontinu bagi Φ . Jika $z_0 \in Z_0$ dan $\pi(z_0) = (0, x)$, angkat lintasan $\eta_{(t,x)}$ mulai dari z_0 , lalu ambil titik akhirnya. Dengan kata lain,

$$\sigma: I \times Z_0 \longrightarrow (I \times X)^I \times_{I \times X} Z \xrightarrow{\text{Lift}} Z^I \xrightarrow{\text{ev}_1} Z, \\ (t, z_0) \longmapsto (\eta_{(t,x)}, z_0) \longmapsto \tilde{\eta}_{(t,x), z_0}(1).$$

Pemetaan ini kontinu. Untuk setiap x , pembatasannya merupakan trivialitas kanonik ruang penutup di atas $I \times \{x\}$. Mengangkat suatu lintasan lalu lintasan baliknya mengembalikan titik awal, berdasarkan keunikan pengangkatan lintasan. Akibatnya

$$\sigma \circ \Phi = \text{id}_Z, \quad \Phi \circ \sigma = \text{id}_{I \times Z_0}.$$

Jadi Φ merupakan isomorfisma di atas $I \times X$. $\square$

Akibat 9.2 (invariansi homotopi bagi tarik balik). Misalkan $f, g: X \rightarrow Y$ homotopik melalui $H: I \times X \rightarrow Y$, dengan

$$H(0, u) = f(u), \quad H(1, u) = g(u).$$

Jika $Z \rightarrow Y$ suatu ruang penutup, maka terdapat isomorfisma ruang penutup

$$f^*Z \cong g^*Z$$

di atas X .

Bukti. Bentuk tarik balik

$$H^*Z \longrightarrow I \times X.$$

Menurut Proposisi 9.1,

$$H^*Z \cong I \times f^*Z.$$

Di sisi lain, pembatasan H^*Z ke $\{1\} \times X$ isomorfik dengan g^*Z . Membatasi isomorfisma di atas ke $\{1\} \times X$ memberikan

$$g^*Z \cong (H^*Z)_{\{1\} \times X} \cong (I \times f^*Z)_{\{1\} \times X} \cong f^*Z.$$

Semua isomorfisma ini berada di atas X . $\square$

Isomorfisma $f^*Z \cong g^*Z$ yang dihasilkan umumnya bergantung pada homotopi H yang dipilih; akibat ini menyatakan keberadaan isomorfisma, bukan kanonisitas yang hanya ditentukan oleh kedua pemetaan ujung.

Kita segera memperoleh kriteria yang menjamin bahwa suatu ruang tidak memiliki ruang penutup nontrivial.

Akibat 9.3 (penutup di atas ruang kontraktil). Jika X kontraktil, maka untuk setiap $x \in X$ dan setiap ruang penutup $Z \rightarrow X$ terdapat isomorfisma

$$Z \cong X \times Z_x$$

di atas X .

Bukti. Pilih kontraksi $H: I \times X \rightarrow X$ menuju x , dan tuliskan $c_x: X \rightarrow X$ bagi pemetaan konstan bernilai x . Karena H merupakan homotopi dari id_X menuju c_x , Akibat 9.2 memberi

$$Z = \text{id}_X^* Z \cong c_x^* Z = X \times Z_x.$$

Ini adalah isomorfisma ruang penutup di atas X . $\square$

Latihan sumber 9.1 (mengubah titik tujuan kontraksi). Definisi kontraktil hanya menjamin kontraksi menuju suatu titik. Buktikan bahwa jika X kontraktil, maka untuk setiap $x \in X$ terdapat kontraksi X menuju x .

Contoh 9.1 (ruang tanpa penutup nontrivial). Setiap ruang vektor topologis yang konveks lokal tidak mempunyai ruang penutup nontrivial; hal yang sama berlaku bagi setiap daerah konveks,

bahkan setiap daerah berbentuk bintang di dalamnya. Dengan “tidak mempunyai ruang penutup nontrivial” dimaksudkan bahwa setiap penutup isomorfik dengan produk $X \times S \rightarrow X$ untuk suatu himpunan diskret S .

Sfera satuan di ruang Hilbert separabel berdimensi tak hingga juga tidak mempunyai ruang penutup nontrivial. Demikian pula halnya dengan manifold Stiefel berdimensi tak hingga. Dua pernyataan terakhir memakai fakta kontraktibilitas tingkat lanjut. Sumber tidak membuktikan fakta itu dan tidak menentukan model maupun topologi bagi manifold Stiefel berdimensi tak hingga; karena itu keduanya dicatat di sini sebagai klaim sumber, bukan sebagai akibat yang telah dibuktikan dalam unit ini.

9.3 Sifat pengangkatan homotopi

Akibat 9.4 (pengangkatan homotopi). Misalkan $\pi: Z \rightarrow Y$ suatu ruang penutup, $f, g: X \rightarrow Y$, dan

$$H: I \times X \longrightarrow Y$$

suatu homotopi dari f menuju g . Jika

$$\tilde{f}: \{0\} \times X \longrightarrow Z$$

merupakan pengangkatan f , maka terdapat tepat satu homotopi

$$\tilde{H}: I \times X \longrightarrow Z$$

yang mengangkat H , membatasi ke $\tilde{f}$ pada $\{0\} \times X$, dan pada $\{1\} \times X$ memberikan suatu pengangkatan dari g .

Diagram yang harus dipenuhi adalah

$$\begin{array}{ccc} \{0\} \times X & \xrightarrow{\tilde{f}} & Z \\ i_0 \downarrow & & \pi \downarrow \\ I \times X & \xrightarrow{H} & Y, \end{array}$$

dan panah diagonal yang dicari ialah $\tilde{H}: I \times X \rightarrow Z$, dengan $\pi \circ \tilde{H} = H$ dan $\tilde{H} \circ i_0 = \tilde{f}$.

Bukti. Pengangkatan $\tilde{f}$ bersesuaian dengan sebuah penampang

$$s_f: X \longrightarrow f^*Z.$$

Proposisi 9.1 memberi isomorfisma, yang dinormalisasi pada $\{0\} \times X$,

$$I \times f^*Z \xrightarrow{\cong} H^*Z.$$

Komposisikan penampang produk

$$I \times X \longrightarrow I \times f^*Z, \quad (t, u) \longmapsto (t, s_f(u)),$$

dengan isomorfisma tersebut, lalu dengan proyeksi $H^*Z \rightarrow Z$. Hasilnya adalah pemetaan

$$\tilde{H}: I \times X \longrightarrow Z$$

yang menutupi H dan membatasi ke $\tilde{f}$ pada waktu 0. Pada waktu 1, persamaan $\pi \circ \tilde{H} = H$ menunjukkan bahwa $\tilde{H}|_{\{1\} \times X}$ mengangkat g .

Untuk keunikan, tetapkan $u \in X$. Lintasan $H(-, u)$ di Y mempunyai titik awal $f(u)$. Setiap pengangkatan $\tilde{H}'$ yang memenuhi syarat akan memberikan lintasan $\tilde{H}'(-, u)$ yang mengangkat $H(-, u)$ dan berawal di $\tilde{f}(0, u)$. Keunikan pengangkatan lintasan memaksa

$$\tilde{H}'(-, u) = \tilde{H}(-, u).$$

Ini berlaku bagi setiap u , sehingga $\tilde{H}' = \tilde{H}$. $\square$

Sekarang kita dapat memberikan bukti Teorema 9.1 yang sebelumnya ditunda.

Bukti Teorema 9.1. Ambil lintasan $\gamma, \eta: z_1 \rightsquigarrow z_2$ di Z , dan anggap bahwa $\pi \circ \gamma$ dan $\pi \circ \eta$ mewakili morfisma yang sama di $\Pi_1(X)$. Jadi terdapat homotopi berujung tetap

$$H: I \times I \longrightarrow X$$

dari $\pi \circ \gamma$ menuju $\pi \circ \eta$. Akibat 9.4 mengangkat H menjadi homotopi $\tilde{H}$ yang pada sisi waktu awal sama dengan γ dan pada sisi waktu akhir merupakan suatu pengangkatan $\pi \circ \eta$.

Secara eksplisit, dengan s sebagai parameter homotopi dan t sebagai parameter lintasan,

$$H(0, t) = \pi(\gamma(t)), \quad H(1, t) = \pi(\eta(t)),$$

sedangkan syarat titik ujung tetap adalah

$$H(s, 0) = \pi(z_1), \quad H(s, 1) = \pi(z_2).$$

Karena H mempertahankan titik ujung, kedua pembatasan

$$H|_{I \times \{i\}}, \quad i = 0, 1,$$

merupakan lintasan konstan. Pembatasan-pembatasan $\tilde{H}|_{I \times \{i\}}$ adalah lintasan di dalam serat-serat ruang penutup, yang merupakan ruang diskret. Oleh sebab itu kedua lintasan tersebut konstan. Jadi $\tilde{H}$ juga mempertahankan titik ujung.

Lintasan $\tilde{H}(1, -)$ dan η sama-sama mengangkat $\pi \circ \eta$ dan mempunyai titik awal z_1 . Keunikan pengangkatan lintasan memberi

$$\tilde{H}(1, -) = \eta.$$

Dengan demikian γ dan η homotopik relatif terhadap titik-titik ujung. Keduanya menentukan unsur yang sama di $\Pi_1(Z)(z_1, z_2)$, sehingga pemetaan pada Teorema 9.1 injektif. $\square$

9.4 Serat sebagai ruang koset

Sejauh ini, banyak hasil kita hanya memberikan batas atau perkiraan yang menghubungkan serat suatu ruang penutup dengan grup fundamental ruang dasarnya. Jika ruang atas terhubung lintasan, kita memperoleh deskripsi yang tepat.

Teorema 9.2 (serat penutup terhubung sebagai ruang koset). Misalkan

$$\pi: (Z, z) \longrightarrow (X, x)$$

suatu ruang penutup dengan Z terhubung lintasan. Tuliskan

$$G := \pi_1(X, x), \quad H := \pi_*(\pi_1(Z, z)) \leq G.$$

Jika aksi monodromi kanan dari Unit 7–8 digunakan, terdapat isomorfisma himpunan- G kanan

$$Z_x \cong H \backslash G.$$

Jika aksi itu diubah menjadi aksi kiri melalui $g \star u := u \cdot g^{-1}$, bentuk yang sama adalah isomorfisma himpunan- G kiri

$$Z_x \cong G/H = \pi_1(X, x)/\pi_*(\pi_1(Z, z)).$$

Bentuk terakhir adalah konvensi yang ditampilkan dalam sumber.

Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Bagian ini memuat solusi latihan sumber dan empat pemeriksaan tambahan yang menutup langkah-langkah yang paling mudah terlewat ketika unit dipelajari secara mandiri.

9.5 Solusi Latihan Sumber 9.1

Karena X kontraktif, terdapat suatu $x_0 \in X$ dan homotopi

$$F: I \times X \longrightarrow X$$

dengan

$$F(0, u) = u, \quad F(1, u) = x_0.$$

Tetapkan titik sembarang $x \in X$. Definisikan

$$K(t, u) = \begin{cases} F(2t, u), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ F(2 - 2t, x), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Pada $t = \frac{1}{2}$, kedua rumus bernilai x_0 , sehingga lema penempelan menunjukkan bahwa K kontinu. Selain itu,

$$K(0, u) = u, \quad K(1, u) = x.$$

Jadi K merupakan homotopi dari id_X menuju pemetaan konstan c_x . Karena x dipilih sembarang, kontraksi dapat diarahkan menuju setiap titik di X .

Pemeriksaan penguasaan 9.2 (setia tidak berarti penuh).

1. Turunkan Akibat 9.1 langsung dari Teorema 9.1.
2. Berikan ruang penutup yang functor $\Pi_1(Z) \rightarrow \Pi_1(X)$ -nya setia tetapi tidak penuh.
3. Jelaskan dengan tepat kesimpulan keterhinggaan yang dapat ditarik dari penyertaan $\pi_1(Z, z) \hookrightarrow \pi_1(X, x)$.

9.6 Solusi Pemeriksaan 9.2

Untuk $z_1 = z_2 = z$, himpunan-hom pada Teorema 9.1 adalah grup automorfisma

$$\Pi_1(Z)(z, z) = \pi_1(Z, z), \quad \Pi_1(X)(x, x) = \pi_1(X, x).$$

Pemetaan terinduksi tepat π_* . Karena pemetaan itu injektif dan juga homomorfisma, ia mengidentifikasi domainnya dengan citranya sebagai subgrup.

Untuk melihat bahwa functor tersebut tidak harus penuh, ambil ruang tak kosong X , himpunan diskret S dengan sedikitnya dua unsur, dan penutup trivial

$$\pi: S \times X \longrightarrow X.$$

Pilih $s_1 \neq s_2$ dan $x \in X$, lalu tetapkan $z_i = (s_i, x)$. Tidak ada lintasan dari z_1 menuju z_2 , sehingga

$$\Pi_1(S \times X)(z_1, z_2) = \emptyset.$$

Namun $\Pi_1(X)(x, x)$ tidak kosong karena memuat kelas lintasan konstan. Pemetaan dari himpunan kosong menuju himpunan tak kosong memang injektif, tetapi tidak surjektif. Jadi functor itu setia tetapi tidak penuh.

Terakhir, injeksi memberi pertidaksamaan kardinal

$$|\pi_1(Z, z)| \leq |\pi_1(X, x)|.$$

Jika grup kanan berhingga, grup kiri berhingga dan ordonya membagi ordo grup kanan menurut Teorema Lagrange. Kebalikannya tidak berlaku: sebuah grup tak hingga dapat mempunyai subgrup berhingga, bahkan subgrup trivial. Karena itu keterhinggaan $\pi_1(Z, z)$ saja tidak memaksa keterhinggaan $\pi_1(X, x)$.

Pemeriksaan penguasaan 9.3 (memeriksa kedua invers trivialitas). Dengan notasi Proposisi 9.1, buktikan secara titik demi titik bahwa $\sigma \circ \Phi = \text{id}_Z$ dan $\Phi \circ \sigma = \text{id}_{I \times Z_0}$. Periksa pula bahwa kedua pemetaan berada di atas $I \times X$.

9.7 Solusi Pemeriksaan 9.3

Ambil $z \in Z$ dengan $\pi(z) = (t, x)$, dan tuliskan

$$z_0 := \tau(z) = \tilde{\eta}_{(t,x),z}(1).$$

Jadi z_0 berada di atas $(0, x)$. Pemetaan Φ memberi $\Phi(z) = (t, z_0)$. Pemetaan σ kemudian mengangkat $\eta_{(t,x)}$ mulai dari z_0 .

Lintasan $\tilde{\eta}_{(t,x),z}$ yang dibalik merupakan pengangkatan $\eta_{(t,x)}$ mulai dari z_0 dan berakhir di z . Menurut keunikan pengangkatan lintasan, itulah tepat lintasan yang dipakai oleh σ . Karena itu

$$\sigma(\Phi(z)) = z.$$

Sebaliknya, ambil $(t, z_0) \in I \times Z_0$ dengan $\pi(z_0) = (0, x)$ dan definisikan

$$z := \sigma(t, z_0) = \tilde{\eta}_{(t,x),z_0}(1).$$

Pengangkatan balik $\bar{\eta}_{(t,x)}$ mulai dari z adalah kebalikan dari pengangkatan $\eta_{(t,x)}$ tadi. Maka titik akhirnya adalah z_0 , sehingga

$$\Phi(\sigma(t, z_0)) = (t, z_0).$$

Untuk sifat di atas ruang dasar, jika $\pi(z) = (t, x)$, maka

$$(I \times Z_0 \rightarrow I \times X)(\Phi(z)) = (t, x) = \pi(z).$$

Jika $\pi(z_0) = (0, x)$, pengangkatan $\eta_{(t,x)}$ berakhir di atas (t, x) , sehingga

$$\pi(\sigma(t, z_0)) = (t, x).$$

Jadi kedua pemetaan merupakan pemetaan di atas $I \times X$, dan perhitungan sebelumnya membuktikan bahwa keduanya saling invers.

Pemeriksaan penguasaan 9.4 (dari penampang menuju pengangkatan homotopi). Tulis tarik balik H^*Z sebagai himpunan pasangan, lalu:

1. jelaskan mengapa pengangkatan $\tilde{f}$ sama dengan penampang $s_f: X \rightarrow f^*Z$;
2. bangun $\tilde{H}$ secara eksplisit melalui trivialitas Proposisi 9.1;
3. buktikan bahwa nilai $\tilde{H}(t, u)$ juga dapat dicirikan sebagai titik akhir pengangkatan lintasan $s \mapsto H(st, u)$ yang berawal di $\tilde{f}(0, u)$.

9.8 Solusi Pemeriksaan 9.4

Tarik balik dapat ditulis

$$H^*Z = \{(t, u, w) \in (I \times X) \times Z \mid H(t, u) = \pi(w)\}.$$

Serupa dengan itu,

$$f^*Z = \{(u, w) \in X \times Z \mid f(u) = \pi(w)\}.$$

Karena $\pi \circ \tilde{f}(0, -) = f$, rumus

$$s_f(u) = (u, \tilde{f}(0, u))$$

memberi penampang proyeksi $f^*Z \rightarrow X$. Sebaliknya, komponen kedua dari setiap penampang memberi pengangkatan f , sehingga kedua data tersebut ekuivalen.

Terapkan Proposisi 9.1 pada $H^*Z \rightarrow I \times X$. Trivialitas eksplisitnya memberi isomorfisma

$$\Theta: I \times f^*Z \xrightarrow{\cong} H^*Z$$

yang pada $t = 0$ adalah identitas. Definisikan

$$\tilde{H}(t, u) := \text{pr}_Z(\Theta(t, s_f(u))).$$

Karena $\Theta(t, s_f(u))$ berada dalam H^*Z , secara otomatis

$$\pi(\tilde{H}(t, u)) = H(t, u).$$

Normalisasi pada $t = 0$ memberi $\tilde{H}(0, u) = \tilde{f}(0, u)$.

Dalam konstruksi Proposition 9.1, Θ mengangkat lintasan radial dalam koordinat interval. Untuk (t, u) tetap, lintasan dasar itu adalah

$$\lambda_{t,u}(s) = H(st, u), \quad 0 \leq s \leq 1.$$

Ia berawal di $f(u)$ dan berakhir di $H(t, u)$. Karena itu $\tilde{H}(t, u)$ adalah titik akhir satu-satunya pengangkatan $\lambda_{t,u}$ yang berawal di $\tilde{f}(0, u)$. Karakterisasi ini juga menjelaskan keunikan: setiap pengangkatan homotopi lain dengan nilai awal yang sama harus memakai pengangkatan lintasan yang sama untuk setiap (t, u) .

Pemeriksaan penguasaan 9.5 (orbit, stabilisator, dan sisi koset). Dalam situasi Teorema 9.2, gunakan aksi kanan monodromi

$$u \cdot [\gamma] := \gamma_*(u)$$

untuk membuktikan bahwa:

1. aksi G pada Z_x transitif;
2. stabilisator z tepat $H = \pi_*\pi_1(Z, z)$;
3. pemetaan $H \backslash G \rightarrow Z_x$, $Hg \mapsto z \cdot g$, merupakan isomorfisma himpunan- G kanan;
4. setelah aksi kiri didefinisikan oleh $g \star u = u \cdot g^{-1}$, pemetaan $G/H \rightarrow Z_x$, $gH \mapsto z \cdot g^{-1}$, merupakan isomorfisma himpunan- G kiri.

9.9 Solusi Pemeriksaan 9.5

Ambil $u \in Z_x$. Karena Z terhubung lintasan, terdapat lintasan $\delta: z \rightsquigarrow u$ di Z . Proyeksinya $\pi \circ \delta$ adalah loop pada x , dan keunikan pengangkatan menunjukkan bahwa

$$z \cdot [\pi \circ \delta] = u.$$

Jadi orbit z adalah seluruh Z_x ; aksi tersebut transitif.

Selanjutnya, $[\gamma] \in G$ menstabilkan z jika dan hanya jika pengangkatan γ yang berawal di z juga berakhir di z . Dalam hal itu pengangkatan tersebut merupakan loop di Z , dan proyeksi kelasnya adalah $[\gamma]$. Sebaliknya, proyeksi setiap loop pada z mempunyai transpor yang mempertahankan z . Invariansi transpor terhadap homotopi berujung tetap menunjukkan bahwa pernyataan ini hanya bergantung pada kelas. Jadi

$$\text{Stab}_G(z) = \pi_*(\pi_1(Z, z)) = H.$$

Definisikan

$$\varphi: H \backslash G \longrightarrow Z_x, \quad \varphi(Hg) = z \cdot g.$$

Jika $Hg_1 = Hg_2$, maka $g_1 = hg_2$ untuk suatu $h \in H$, sehingga

$$z \cdot g_1 = (z \cdot h) \cdot g_2 = z \cdot g_2.$$

Jadi φ terdefinisi baik. Transitivitas membuktikan surjektivitas. Jika $z \cdot g_1 = z \cdot g_2$, maka

$$z \cdot (g_1 g_2^{-1}) = z,$$

sehingga $g_1 g_2^{-1} \in H$ dan $Hg_1 = Hg_2$. Jadi φ injektif. Selain itu,

$$\varphi((Hg) \cdot k) = \varphi(Hgk) = z \cdot (gk) = (z \cdot g) \cdot k,$$

sehingga φ ekuivarian untuk aksi kanan.

Untuk konvensi kiri, definisikan $g \star u = u \cdot g^{-1}$. Pemetaan inversi

$$G/H \longrightarrow H \backslash G, \quad gH \longmapsto Hg^{-1}$$

terdefinisi baik dan bijektif. Komposisinya dengan φ adalah

$$gH \longmapsto z \cdot g^{-1}.$$

Untuk $k \in G$,

$$z \cdot (kg)^{-1} = z \cdot g^{-1} k^{-1} = k \star (z \cdot g^{-1}),$$

yang membuktikan ekuivariansi kiri. Dengan demikian kedua bentuk koset pada Teorema 9.2 menyatakan klasifikasi yang sama, dengan sisi aksi yang dinyatakan secara eksplisit.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya [Notes.tex](#) baris 2094–2272 pada commit [b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#). Rentang itu dimulai dengan penanda Kuliah 10 dan lanjutan bukti teorema ruang koset dari Unit 9, lalu berakhir tepat setelah pratinjau bahwa grup fundamental bagi dua lingkaran adalah grup bebas pada dua pembangkit. Baris 2273 memulai Kuliah 11 dan tidak termasuk dalam unit ini. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, serta pemindahan keenam unsur pinggir ke urutan bacaan utama: definisi himpunan- G , arti ekuivarian, konvensi keterhubungan lintasan semilokal, sifat universal bagi, diagram penutup tiga lembaran, dan bentuk kata dalam grup bebas. Diagram penutup diganti dengan daftar simpul dan sisi berarah yang mempertahankan semua data pelabelan, proyeksi, dan pengangkatan lintasan.

Sejumlah cacat sumber diperbaiki secara independen. Huruf titik yang berubah dari p menjadi s dalam pemetaan orbit–stabilisator diseragamkan; subgrup stabilisator ditulis sebagai citra $\pi_*(\pi_1(Z, z))$,

bukan disamakan secara harfiah dengan grup asalnya; variabel x, y pada himpunan morfisma grupoid terbatas disyaratkan berada di A ; dan dekomposisi grupoid dinyatakan hanya ketika $X = X_1 \sqcup X_2$ merupakan dekomposisi ke dalam komponen lintasan. Istilah *join* yang salah diganti dengan *wedge* atau *baji*, urutan komposisi dalam sifat universal baji diperbaiki agar bertipe benar, dan salah tulis $S^\vee S^1$ dipulihkan menjadi $S^1 \vee S^1$. Salah eja “goups”, simbol **rho** yang kehilangan garis miring, serta bentuk jamak “homomorphism” juga diperbaiki. Catatan bentuk normal produk bebas dilengkapi dengan syarat eksponen tak nol, pergantian faktor, dan kata kosong agar tidak menyatakan representasi tak tereduksi sebagai bentuk normal.

Konvensi aksi memerlukan perhatian khusus. Pengangkatan lintasan pada Unit 7–9 memberi aksi kanan langsung $u \cdot (gh) = (u \cdot g) \cdot h$, sehingga ruang orbit–stabilisator alaminya adalah $H \backslash G$. Sumber memakai aksi kiri dan G/H . Unit ini mempertahankan kedua bentuk dengan menyatakan operasi inversi yang menghubungkannya. Demikian pula, operator titik akhir $R_g(u) = u \cdot g$ memenuhi $R_{gh} = R_h \circ R_g$; representasi permutasi sebagai homomorfisma biasa diperoleh dari $\lambda(g) = R_{g^{-1}}$. Perbedaan ini mencegah urutan perkalian terbalik secara diam-diam pada contoh baji dua lingkaran.

Rentang sumber tidak memuat latihan. Bagian pendamping penguasaan menambahkan lima pemeriksaan dengan solusi lengkap: aksi reguler dan kesetiaan; langkah yang memuntaskan perhitungan $\pi_1(S^1)$; sifat universal baji; pemeriksaan lokal dan monodromi penutup tiga lembaran; serta batas logis antara nonkomutativitas yang sudah dibuktikan dan struktur grup bebas yang baru akan dibuktikan. Seluruh materi pendamping yang ditambahkan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

10 Kuliah 10

10.1 Menuntaskan deskripsi serat sebagai ruang koset

Bukti Teorema 9.2 (lanjutan). Sebuah himpunan yang dilengkapi aksi grup G disebut *himpunan- G* . Mula-mula ambil sembarang himpunan- G kanan transitif S dan suatu titik $p \in S$. Pemetaan

$$G \longrightarrow S, \quad g \longmapsto p \cdot g$$

turun menjadi bijeksi yang terdefinisi baik

$$\text{Stab}(p) \backslash G \xrightarrow{\cong} S, \quad \text{Stab}(p)g \longmapsto p \cdot g,$$

dengan

$$\text{Stab}(p) := \{g \in G \mid p \cdot g = p\}.$$

Bijeksi ini *ekuivariant*: ia mempertahankan aksi kanan G . Jika aksi kiri yang bersesuaian didefinisikan oleh

$$g \star u := u \cdot g^{-1},$$

bijeksi yang sama dapat ditulis

$$G / \text{Stab}(p) \xrightarrow{\cong} S, \quad g \text{Stab}(p) \longmapsto p \cdot g^{-1}.$$

Inilah bentuk aksi kiri yang digunakan dalam sumber.

Terapkan fakta tersebut pada aksi kanan transitif $G = \pi_1(X, x)$ di serat Z_x . Aksi itu transitif karena Z terhubung lintasan. Kita memperoleh isomorfisma himpunan- G kanan

$$\text{Stab}(z) \backslash \pi_1(X, x) \xrightarrow{\cong} Z_x.$$

Tinggal mengidentifikasi stabilisatornya. Jika $[\gamma] \in \pi_1(X, x)$ memenuhi

$$z \cdot [\gamma] = \gamma_*(z) = z,$$

maka pengangkatan $\tilde{\gamma}_z$ yang berawal di z juga berakhir di z , sehingga merupakan loop di Z . Sebaliknya, proyeksi setiap loop pada z mempunyai pengangkatan berawal di z yang berakhir di z . Karena Teorema 9.1 menyatakan bahwa π_* injektif, kita boleh mengidentifikasi $\pi_1(Z, z)$ dengan citranya, tetapi sebagai subgrup dari $\pi_1(X, x)$ pernyataan yang tepat adalah

$$\text{Stab}(z) = \pi_*(\pi_1(Z, z)).$$

Jadi

$$Z_x \cong \pi_*(\pi_1(Z, z)) \backslash \pi_1(X, x)$$

sebagai himpunan- $\pi_1(X, x)$ kanan. Setelah aksi diubah melalui inversi, hasil ini menjadi bentuk kiri

$$Z_x \cong \pi_1(X, x) / \pi_*(\pi_1(Z, z))$$

yang ditampilkan dalam sumber. $\square$

Akibat 10.1 (serat penutup terhubung sederhana). Jika

$$\pi: (Z, z) \longrightarrow (X, x)$$

suatu ruang penutup dengan Z terhubung sederhana, maka pemetaan

$$\begin{aligned} \pi_1(X, x) &\longrightarrow Z_x, \\ g &\longmapsto z \cdot g \end{aligned}$$

merupakan isomorfisma himpunan- $\pi_1(X, x)$ kanan, dengan grup pada ruas kiri membawa aksi kanan reguler melalui perkalian.

Bukti. Karena Z terhubung sederhana, $\pi_1(Z, z) = 1$. Stabilisator z karena itu trivial, sehingga Teorema 9.2 memberi

$$Z_x \cong \{1\} \backslash \pi_1(X, x) \cong \pi_1(X, x)$$

secara ekuivarian untuk aksi kanan. $\square$

Contoh 10.1 (keterhitungan grup fundamental lingkaran). Kini kita dapat mengatakan bahwa $\pi_1(S^1, 1)$ bukan hanya tak hingga, seperti yang sudah dibuktikan pada Contoh 7.3, melainkan juga terhitung. Memang, ia berbijeksi dengan serat $\mathbb{Z}$ dari ruang penutup terhubung sederhana

$$\mathbb{R} \longrightarrow S^1, \quad t \longmapsto e^{2\pi i t},$$

di atas $1 \in S^1$.

Akibat 10.1 memberi lebih dari sekadar bijeksi. Untuk aksi kanan langsung, tuliskan

$$R_g: Z_x \longrightarrow Z_x, \quad R_g(u) = u \cdot g.$$

Hukum aksi memberi

$$R_{gh} = R_h \circ R_g.$$

Jadi $g \mapsto R_g$ adalah aksi permutasi kanan, atau antihomomorfisma ke grup permutasi bila komposisi fungsi dibaca dengan konvensi biasa. Dengan membalik unsur grup, kita memperoleh representasi permutasi kiri

$$\begin{aligned} \lambda: \pi_1(X, x) &\longrightarrow \text{Aut}(Z_x), \\ g &\longmapsto R_{g^{-1}}, \end{aligned}$$

yang merupakan homomorfisma. Representasi ini *setia*. Jika $g \neq h$, maka bijeksi Akibat 10.1 memberi suatu $u \in Z_x$ —bahkan titik dasar z sudah cukup—dengan

$$u \cdot g^{-1} \neq u \cdot h^{-1}.$$

Dengan demikian $\lambda(g) \neq \lambda(h)$. Grup fundamental kini direalisasikan sebagai grup permutasi, tempat perhitungan dapat dilakukan secara lebih konkret.

Akibat 10.2 (aksi bebas pada serat). Untuk ruang penutup terhubung sederhana bertitik $(Z, z) \rightarrow (X, x)$, aksi kanan $\pi_1(X, x)$ pada Z_x bersifat bebas.

Sekarang kita dapat memberi contoh pertama grup fundamental nontrivial yang dihitung secara lengkap.

Teorema 10.1 (grup fundamental lingkaran). Terdapat isomorfisma grup

$$\pi_1(S^1, 1) \cong \mathbb{Z}.$$

Bukti. Gunakan ruang penutup terhubung sederhana

$$q: \mathbb{R} \longrightarrow S^1, \quad q(t) = e^{2\pi it},$$

yang turun menjadi homeomorfisma $\mathbb{R}/\mathbb{Z} \cong S^1$ dan yang seratnya di atas $1 \in S^1$ adalah $\mathbb{Z}$. Inklusi

$$[0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}, \quad t \longmapsto t,$$

merupakan pengangkatan loop γ yang mengelilingi lingkaran satu kali dalam arah positif. Semua pengangkatan loop itu adalah translasi inklusi tersebut. Karena itu aksi kanan $[\gamma]$ pada serat $\mathbb{Z}$ adalah translasi sebesar 1:

$$n \cdot [\gamma] = n + 1.$$

Lebih umum,

$$n \cdot [\gamma]^k = n + k \quad (k, n \in \mathbb{Z}).$$

Jadi subgrup yang dibangkitkan oleh $[\gamma]$ sudah bertindak transitif pada $\mathbb{Z}$. Di sisi lain, Akibat 10.2 menyatakan bahwa aksi seluruh $\pi_1(S^1, 1)$ bebas. Untuk setiap $g \in \pi_1(S^1, 1)$, pilih $k \in \mathbb{Z}$ dengan

$$0 \cdot g = k = 0 \cdot [\gamma]^k.$$

Kebebasan aksi memaksa $g = [\gamma]^k$. Maka $[\gamma]$ membangkitkan seluruh grup. Karena translasi sebesar k hanya identitas ketika $k = 0$, pembangkit itu berordo tak hingga. Jadi grupnya siklik tak hingga dan isomorfik dengan $\mathbb{Z}$. $\square$

Akibatnya, untuk setiap $A \subseteq S^1$, grupoid fundamental terbatas $\Pi_1(S^1, A)$ mempunyai himpunan objek A . Untuk setiap $x \in A$,

$$\pi_1(S^1, x) \cong \mathbb{Z}.$$

Untuk setiap $x, y \in A$, himpunan morfisma $\Pi_1(S^1, A)(x, y)$ tidak kosong dan berbijeksi dengan $\mathbb{Z}$ sebagai himpunan. Bijeksi terakhir tidak kanonik sebelum suatu kelas lintasan dari x menuju y dipilih.

Bagaimana kita menghitung π_1 secara umum—atau, lebih baik, Π_1 ? Jika sebuah ruang merupakan gabungan saling lepas dari dua komponen lintasan,

$$X = X_1 \sqcup X_2,$$

maka tidak ada morfisma grupoid fundamental di antara kedua komponen, dan karena itu

$$\Pi_1(X, A) = \Pi_1(X_1, A \cap X_1) \sqcup \Pi_1(X_2, A \cap X_2).$$

Jika $A \cap X_i \neq \emptyset$ untuk $i = 1, 2$, maka setiap titik di X dapat dihubungkan oleh lintasan ke suatu titik di A . Dengan demikian grup fundamental kedua komponen lintasan terwakili di dalam grupoid terbatas tersebut.

Contoh 10.2 (dua lingkaran yang saling lepas). Grupoid

$$\Pi_1(S^1 \sqcup S^1, \{1\} \sqcup \{1\})$$

mempunyai dua objek. Tidak terdapat morfisma di antara kedua objek itu, dan grup automorfisma masing-masing objek isomorfik dengan $\mathbb{Z}$.

10.2 Baji ruang bertitik

Kita akan memusatkan perhatian sejenak pada perhitungan grup fundamental, atau grupoid fundamental, bagi ruang terhubung lintasan. Cara paling sederhana membuat ruang terhubung baru dari dua ruang terhubung X dan Y ialah memilih $x \in X$ serta $y \in Y$, lalu mengidentifikasi kedua titik itu. Sesuai konvensi mata kuliah, ruang yang digunakan di sini bersifat terhubung lintasan semilokal (SLPC); menurut Proposisi 4.2, dalam kelas ruang tersebut komponen dan komponen lintasan berimpit.

Definisi 10.1 (baji). Untuk dua ruang bertitik (X, x) dan (Y, y) , *baji* $X \vee Y$ adalah ruang hasil bagi

$$X \vee Y := (X \sqcup Y) / (x \sim y).$$

Titik dasarnya adalah

$$* = [x] = [y].$$

Pemetaan inklusi kanonik memberi diagram ruang bertitik

$$(X, x) \xrightarrow{\text{in}_L} (X \vee Y, *) \xleftarrow{\text{in}_R} (Y, y).$$

Sifat utama baji adalah sifat universal berikut. Jika (M, m) suatu ruang bertitik dan

$$f: (X, x) \longrightarrow (M, m), \quad g: (Y, y) \longrightarrow (M, m)$$

pemetaan bertitik, maka terdapat tepat satu pemetaan bertitik

$$\langle f, g \rangle: (X \vee Y, *) \longrightarrow (M, m)$$

yang memenuhi persamaan bertipe benar

$$\langle f, g \rangle \circ \text{in}_L = f, \quad \langle f, g \rangle \circ \text{in}_R = g.$$

Karena semua pemetaan tersebut bertitik, functorialitas π_1 memberi dua homomorfisma

$$\pi_1(X, x) \xrightarrow{\pi_1(\text{in}_L)} \pi_1(X \vee Y, *) \xleftarrow{\pi_1(\text{in}_R)} \pi_1(Y, y).$$

Jika grup fundamental X dan Y sudah diketahui, kita dapat mencoba memanfaatkan keduanya untuk memahami grup fundamental bajinya. Sebagai contoh, untuk $X = Y = S^1$ diperoleh

$$\mathbb{Z} \xrightarrow{\pi_1(\text{in}_L)} \pi_1(S^1 \vee S^1, *) \xleftarrow{\pi_1(\text{in}_R)} \mathbb{Z}.$$

Definisikan

$$a := \pi_1(\text{in}_L)(1), \quad b := \pi_1(\text{in}_R)(1).$$

Jadi a dan b adalah kelas loop yang masing-masing mengelilingi lingkaran kiri dan kanan satu kali dalam arah positif.

10.3 Penutup tiga lembaran yang mendeteksi nonkomutativitas

Definisikan ruang penutup

$$q_1: Z_1 \longrightarrow S^1 \vee S^1$$

sebagai graf berarah berlabel berikut. Sumber menamai panah penutup ini π_1 ; edisi menulisnya sebagai q_1 agar tidak bertabrakan dengan functor grup fundamental π_1 . Ruang dasar mempunyai satu simpul $*$ dan dua loop berarah a dan b . Ruang atas mempunyai tiga simpul A, B, C , semuanya dipetakan ke $*$, dan enam sisi berarah:

Diagram linear penutup q_1 . Sisi-sisi yang dipetakan ke loop a ialah

$$A \xrightarrow{a_1} A, \quad B \xrightarrow{a_2} C, \quad C \xrightarrow{a_3} B,$$

sedangkan sisi-sisi yang dipetakan ke loop b ialah

$$A \xrightarrow{b_1} B, \quad B \xrightarrow{b_2} A, \quad C \xrightarrow{b_3} C.$$

Dengan kata lain,

$$q_1(A) = q_1(B) = q_1(C) = *, \quad q_1(a_i) = a, \quad q_1(b_i) = b \quad (i = 1, 2, 3).$$

Daftar tersebut merupakan pengganti aksesibel bagi gambar sumber: dari setiap simpul terdapat tepat satu sisi keluar dan satu sisi masuk berlabel a , serta tepat satu sisi keluar dan satu sisi masuk berlabel b .

Pengangkatan loop memberi aksi kanan pada serat

$$(Z_1)_* = \{A, B, C\}.$$

Tuliskan $R_w(u) = u \cdot w$ bagi operator titik akhir pengangkatan kata loop w . Dari daftar sisi diperoleh

$$R_a = (BC), \quad R_b = (AB)$$

sebagai permutasi $\{A, B, C\}$. Karena kata ab berarti menelusuri a terlebih dahulu lalu b , hukum aksi kanan memberi

$$R_{ab} = R_b \circ R_a = (ABC).$$

Serupa dengan itu,

$$R_{ba} = R_a \circ R_b = (ACB).$$

Kedua permutasi tersebut berbeda, sehingga $ab \neq ba$ di $\pi_1(S^1 \vee S^1, *)$. Dengan kata lain, grup fundamental bagi dua lingkaran **tidak abelian**.

Jika diinginkan representasi permutasi sebagai homomorfisma dengan komposisi fungsi biasa, definisikan

$$\rho_1(g) := R_{g^{-1}}.$$

Maka

$$\rho_1: \pi_1(S^1 \vee S^1, *) \longrightarrow \text{Aut}\{A, B, C\} \cong S_3$$

merupakan homomorfisma. Karena a dan b dipetakan ke involusi, tetap berlaku

$$\rho_1(a) = (BC), \quad \rho_1(b) = (AB),$$

tetapi urutan siklus kompositnya berbalik terhadap operator kanan:

$$\rho_1(ab) = (ACB), \quad \rho_1(ba) = (ABC).$$

Perbedaan itu hanyalah akibat konvensi aksi; kedua perhitungan membuktikan kesimpulan nonkomutativitas yang sama.

Dengan memilih ruang penutup secara cermat, orang juga dapat membuktikan bahwa kedua homomorfisma

$$\mathbb{Z} \longrightarrow \pi_1(S^1 \vee S^1, *)$$

di atas injektif. Jadi a dan b masing-masing membangkitkan subgrup siklik tak hingga. Kelak akan dibuktikan bahwa

$$\pi_1(S^1 \vee S^1, *) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z} = F_2,$$

yakni grup bebas pada pembangkit a, b , dengan presentasi

$$\langle a, b \mid \rangle.$$

Setelah hasil itu tersedia, setiap unsur bukan identitas mempunyai bentuk kata tereduksi yang berganti-ganti di antara pangkat tak nol dari a dan pangkat tak nol dari b . Kata dapat dimulai atau berakhir pada salah satu faktor; identitas diwakili oleh kata kosong. Misalnya salah satu pola yang mungkin ialah

$$a^{n_1} b^{m_1} \dots a^{n_k} b^{m_k},$$

dengan setiap eksponen pada blok yang benar-benar tampil tidak nol; blok awal atau akhir dapat dihilangkan agar kata dimulai atau berakhir pada salah satu faktor. Pernyataan bentuk bebas ini masih merupakan pratinjau pada tahap sekarang, bukan akibat dari satu penutup tiga lembaran saja.

Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Bagian ini menambahkan lima pemeriksaan yang menutup langkah-langkah paling mudah terlewat ketika unit dipelajari secara mandiri.

Pemeriksaan penguasaan 10.1 (aksi reguler dari penutup terhubung sederhana). Dalam situasi Akibat 10.1:

1. buktikan langsung bahwa pemetaan $\Phi(g) = z \cdot g$ terdefinisi dengan baik dan bijektif;
2. buktikan bahwa aksi pada Z_x bebas dan transitif;
3. periksa bahwa $\lambda(g) = R_{g^{-1}}$ merupakan homomorfisma injektif ke $\text{Aut}(Z_x)$;
4. untuk penutup terhubung lintasan yang tidak harus terhubung sederhana, buktikan bagaimana stabilisator berubah ketika titik pilihan dalam serat diganti, baik dalam konvensi aksi kanan maupun aksi kiri.

10.4 Solusi Pemeriksaan 10.1

Karena Z terhubung lintasan, untuk setiap $u \in Z_x$ pilih lintasan $\delta: z \rightsquigarrow u$ di Z . Loop $\pi \circ \delta$ pada x memenuhi

$$z \cdot [\pi \circ \delta] = u,$$

sehingga Φ surjektif. Jika $\Phi(g) = \Phi(h)$, maka

$$z \cdot (gh^{-1}) = z.$$

Stabilisator z adalah $\pi_* \pi_1(Z, z) = 1$, sehingga $gh^{-1} = 1$ dan $g = h$. Jadi Φ bijektif.

Surjektivitas Φ tepat menyatakan transitivitas. Jika $u \cdot g = u$, tulis $u = z \cdot h$. Maka

$$z \cdot (hg) = z \cdot h.$$

Injektivitas Φ memberi $hg = h$, lalu $g = 1$. Jadi aksi bebas.

Terakhir, dari $R_{gh} = R_h \circ R_g$ diperoleh

$$\lambda(gh) = R_{(gh)^{-1}} = R_{h^{-1}g^{-1}} = R_{g^{-1}} \circ R_{h^{-1}} = \lambda(g) \circ \lambda(h).$$

Jika $\lambda(g) = \lambda(h)$, evaluasi pada z memberi $z \cdot g^{-1} = z \cdot h^{-1}$. Kebebasan aksi memaksa $g^{-1} = h^{-1}$, sehingga $g = h$. Jadi λ homomorfisma injektif.

Untuk pernyataan perubahan titik, sekarang ambil penutup terhubung lintasan umum dan tuliskan $H_z = \text{Stab}(z)$. Jika $z' = z \cdot g$, maka

$$\begin{aligned} h \in H_{z'} &\iff (z \cdot g) \cdot h = z \cdot g \\ &\iff z \cdot (ghg^{-1}) = z \\ &\iff ghg^{-1} \in H_z. \end{aligned}$$

Karena itu

$$H_{z'} = g^{-1}H_zg.$$

Dalam konvensi kiri $g \star u = u \cdot g^{-1}$, persamaan $z' = g \star z$ berarti $z' = z \cdot g^{-1}$, sehingga rumus yang sama menjadi

$$H_{z'} = gH_zg^{-1}.$$

Jadi penutup bertitik menentukan subgrup tertentu, sedangkan penutup tanpa pilihan titik dalam serat secara alami hanya menentukan kelas konjugasinya.

Pemeriksaan penguasaan 10.2 (mengapa loop sekali putar membangkitkan). Untuk penutup $q(t) = e^{2\pi it}$:

1. tunjukkan bahwa pengangkatan γ^k yang berawal di $n \in \mathbb{Z}$ berakhir di $n + k$;
2. gunakan kebebasan dan transitivitas aksi untuk membuktikan bahwa setiap kelas loop sama dengan tepat satu $[\gamma]^k$;
3. untuk $x, y \in A \subseteq S^1$, jelaskan mengapa $\Pi_1(S^1, A)(x, y)$ hanya *berbijeksi*, bukan berisomorfisma grup secara alami, dengan $\mathbb{Z}$ ketika $x \neq y$.

10.5 Solusi Pemeriksaan 10.2

Pengangkatan γ mulai dari n adalah $t \mapsto n + t$ dan berakhir di $n + 1$. Konkatenasi kronologis serta keunikan pengangkatan menunjukkan secara induktif bahwa pengangkatan γ^k berakhir di $n + k$ untuk $k \geq 0$. Untuk $k < 0$, ulangi loop balik $-k$ kali; satu loop balik yang berawal di n mengangkat menjadi $t \mapsto n - t$. Titik akhirnya kembali $n + k$.

Ambil $g \in \pi_1(S^1, 1)$. Karena aksi transitif, titik $0 \cdot g$ adalah suatu $k \in \mathbb{Z}$. Perhitungan sebelumnya memberi

$$0 \cdot [\gamma]^k = k.$$

Karena aksi bebas, kesamaan kedua titik akhir memaksa $g = [\gamma]^k$. Jika $[\gamma]^k = [\gamma]^\ell$, evaluasi pada 0 memberi $k = \ell$. Jadi pangkat itu ada dan unik.

Untuk $x, y \in A$, pilih satu kelas lintasan $c: x \rightsquigarrow y$. Pascakomposisi dengan c memberi bijeksi

$$\pi_1(S^1, x) \xrightarrow{\cong} \Pi_1(S^1, A)(x, y)$$

sebagai himpunan. Pilihan kelas c lain mengubah bijeksi tersebut. Selain itu, bila $x \neq y$, himpunan morfisma itu tidak memiliki operasi komposisi internal karena dua morfisma $x \rightarrow y$ tidak dapat langsung dikomposisikan. Jadi ia merupakan torsor bagi grup automorfisma terkait, bukan sebuah grup kanonik.

Pemeriksaan penguasaan 10.3 (sifat universal baji). Misalkan $f: (X, x) \rightarrow (M, m)$ dan $g: (Y, y) \rightarrow (M, m)$ pemetaan bertitik.

1. bangun $\langle f, g \rangle$ dari pemetaan pada gabungan saling lepas;
2. buktikan kekontinuannya dengan sifat hasil bagi;
3. buktikan keunikannya dan periksa urutan komposisi pada kedua persamaan pembatasan.

10.6 Solusi Pemeriksaan 10.3

Definisikan

$$F: X \sqcup Y \longrightarrow M$$

dengan $F|_X = f$ dan $F|_Y = g$. Pemetaan ini kontinu menurut sifat koproduk. Karena $f(x) = m = g(y)$, pemetaan F konstan pada kelas ekuivalensi yang mengidentifikasi x dengan y . Sifat universal hasil bagi karena itu memberi satu-satunya pemetaan kontinu

$$\langle f, g \rangle: X \vee Y \longrightarrow M$$

dengan $\langle f, g \rangle \circ q = F$, tempat $q: X \sqcup Y \rightarrow X \vee Y$ adalah pemetaan hasil bagi. Nilai titik bajinya adalah m , jadi pemetaan tersebut bertitik.

Membatasi persamaan pada salinan X dan Y memberi

$$\langle f, g \rangle \circ \text{in}_L = f, \quad \langle f, g \rangle \circ \text{in}_R = g.$$

Urutan sebaliknya tidak bertipe: in_L mempunyai kodomain $X \vee Y$, bukan domain M . Jika $h: X \vee Y \rightarrow M$ mempunyai kedua pembatasan yang sama, maka $h \circ q = F$ pada setiap komponen $X \sqcup Y$. Surjektivitas q memaksa $h = \langle f, g \rangle$, yang membuktikan keunikan.

Pemeriksaan penguasaan 10.4 (membaca penutup tiga lembaran). Gunakan daftar sisi pada Diagram 10.1 untuk:

1. memeriksa secara lokal bahwa q_1 adalah penutup graf tiga lembaran;
2. menghitung R_a, R_b, R_{ab}, R_{ba} titik demi titik;
3. menjelaskan mengapa perbedaan R_{ab} dan R_{ba} membuktikan $ab \neq ba$ tanpa mengharuskan $g \mapsto R_g$ menjadi homomorfisma biasa;
4. mengubah aksi kanan itu menjadi representasi kiri ρ_1 .

10.7 Solusi Pemeriksaan 10.4

Ambil lingkungan kecil U dari simpul $*$ yang terdiri atas ruas pendek pada keempat ujung terarah kedua loop. Di atas setiap simpul A, B, C , daftar sisi menyediakan tepat satu ruas yang memetakan homeomorfik ke setiap ruas keluar dan masuk berlabel a maupun b . Ketiga lingkungan bintang yang dihasilkan saling lepas dan masing-masing dipetakan homeomorfik ke U . Pada bagian dalam setiap sisi, sifat penutup jelas dari pemetaan interval ke interval. Jadi q_1 merupakan penutup tiga lembaran.

Dari sisi berlabel a ,

$$A \cdot a = A, \quad B \cdot a = C, \quad C \cdot a = B,$$

sehingga $R_a = (BC)$. Dari sisi berlabel b ,

$$A \cdot b = B, \quad B \cdot b = A, \quad C \cdot b = C,$$

sehingga $R_b = (AB)$. Menelusuri a lalu b memberi

$$\begin{array}{c|ccc} u & A & B & C \\ \hline u \cdot (ab) & B & C & A, \end{array}$$

jadi $R_{ab} = (ABC)$. Menelusuri b lalu a memberi

$$\begin{array}{c|ccc} u & A & B & C \\ \hline u \cdot (ba) & C & A & B, \end{array}$$

jadi $R_{ba} = (ACB)$. Jika $ab = ba$ sebagai elemen grup fundamental, aksi apa pun harus memberi operator titik akhir yang sama. Karena kedua operator di atas berbeda, $ab \neq ba$. Argumen ini hanya memakai bahwa aksi menghormati kesamaan unsur; tidak perlu menyebut pemetaan ke grup permutasi sebagai homomorfisma biasa.

Untuk memperoleh homomorfisma biasa, tetapkan $\rho_1(g) = R_{g^{-1}}$. Perhitungan pada Solusi 10.1 membuktikan

$$\rho_1(gh) = \rho_1(g) \circ \rho_1(h).$$

Karena a^{-1} dan b^{-1} bekerja melalui transposisi yang sama dengan a dan b , nilai pada pembangkit tetap (BC) dan (AB) . Inversi kata menjelaskan mengapa siklus bagi ab dan ba bertukar dibandingkan dengan operator kanan langsung.

Pemeriksaan penguasaan 10.5 (apa yang sudah dan belum dibuktikan). Pisahkan kesimpulan berikut menjadi yang sudah dibuktikan dalam unit ini, yang hanya dinyatakan dapat dibuktikan dengan penutup lain, dan yang ditunda sampai teorema berikutnya:

1. a dan b tidak komutatif;
2. masing-masing homomorfisma $\mathbb{Z} \rightarrow \pi_1(S^1 \vee S^1, *)$ injektif;
3. a dan b membangkitkan seluruh grup fundamental;
4. tidak ada relasi taktrivial di antara a dan b ;
5. setiap unsur mempunyai bentuk kata tereduksi yang unik.

10.8 Solusi Pemeriksaan 10.5

Penutup tiga lembar memberi $R_{ab} \neq R_{ba}$, jadi butir 1 sudah dibuktikan. Sumber menyatakan bahwa penutup yang dipilih dengan cermat dapat membuktikan injektivitas pada butir 2, tetapi penutup-penutup tambahan itu belum dibangun dalam rentang ini. Karena itu butir 2 baru merupakan hasil yang diumumkan, bukan hasil yang telah dibuktikan di sini.

Butir 3–5 akan mengikuti dari teorema

$$\pi_1(S^1 \vee S^1, *) \cong F_2,$$

yang sumber janjikan untuk dibuktikan kemudian. Nonkomutativitas saja tidak menunjukkan bahwa a, b membangkitkan seluruh grup, dan juga tidak meniadakan relasi lain. Setelah isomorfisma dengan F_2 terbukti, bentuk normal yang tepat adalah kata tereduksi: huruf-huruf bukan identitas berasal berganti-ganti dari dua faktor siklik; secara ekuivalen, kata memakai pangkat tak nol dari a dan b secara berselang-seling. Identitas adalah kata kosong. Keunikan bentuk tersebut merupakan bagian dari teori produk bebas, bukan akibat langsung dari representasi ke S_3 yang tidak mungkin setia karena F_2 tak hingga sedangkan S_3 berhingga.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya [Notes.tex](#) baris 2273–2494 pada commit [b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#). Rentang itu dimulai dengan penanda Kuliah 11 dan definisi grup bebas, lalu berakhir sesudah langkah pemanasan lokal dalam bukti teorema Seifert–van Kampen. Baris 2495 memulai Kuliah 12 dan melanjutkan bukti tersebut; baris itu tidak termasuk dalam unit ini. Karena itu bukti pada unit ini sengaja ditandai **belum selesai**, bukan diberi tanda akhir bukti. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, dan pemindahan keenam unsur pinggir ke urutan bacaan utama. Kesebelas diagram sumber ditulis ulang sebagai diagram semantik, daftar panah, atau rumus parametrik yang dapat dibaca tanpa mengandalkan posisi visual. Dua gambar terakhir, yang membandingkan lintasan sepanjang sisi persegi dan deformasinya, diganti dengan parameter eksplisit bagi kedua lintasan dan homotopi berujung tetap di antaranya.

Beberapa cacat sumber diperbaiki secara independen. Dalam sifat universal produk bebas, persamaan yang tidak bertipe $\phi = i \circ \kappa$ dan $\psi = j \circ \kappa$ diperbaiki menjadi $\phi = \kappa \circ i$ dan $\psi = \kappa \circ j$. Kalimat tentang presentasi yang menukar peran G dan H diselaraskan dengan rumusnya. Deskripsi unsur grup bebas dilengkapi dengan reduksi pasangan invers; kata mentah tidak dapat langsung menjadi unsur grup karena $x_i x_i^{-1}$ harus sama dengan kata kosong. Dalam konstruksi funktor pada bukti van Kampen, notasi sumber $F_1(\gamma)$ dan $G_1(\gamma)$ diperbaiki menjadi $F_1([\gamma])$ dan $G_1([\gamma])$, sebab domain funktor adalah kelas homotopi lintasan, bukan lintasan mentah. Edisi juga membedakan fungsi sementara $\widetilde{K}_1$ pada lintasan mentah dari fungsi K_1 pada kelas homotopi yang baru dapat diturunkan setelah invariansi homotopi terbukti. Beberapa ketidakteraturan tata bahasa dan singkatan juga dinormalkan tanpa mengubah isi matematis.

Rentang sumber tidak memuat latihan. Bagian pendamping penguasaan menambahkan tiga pemeriksaan dengan solusi lengkap: sifat universal grup bebas dan produk bebas; verifikasi pushout topologis dan ruang vektor; serta kemandirian subdivisi bersama homotopi eksplisit antara dua lintasan batas persegi. Bagian terakhir juga mencatat dengan tepat langkah global mana yang belum tersedia sebelum Kuliah 12. Seluruh materi pendamping yang ditambahkan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

11 Kuliah 11

11.1 Grup bebas dan produk bebas

Definisi 11.1 (grup bebas). *Grup bebas pada n simbol* adalah grup F_n dengan presentasi

$$F_n = \langle x_1, \dots, x_n \mid \rangle.$$

Jadi $x_1, \dots, x_n$ merupakan pembangkit dan tidak dikenai relasi tambahan.

Nama simbol-simbol itu tentu saja dapat diganti. Setiap unsur F_n diwakili oleh kata berhingga dalam huruf

$$x_1^{\pm 1}, \dots, x_n^{\pm 1}.$$

Dua kata mewakili unsur yang sama bila dapat dihubungkan dengan penyisipan atau penghapusan pasangan bersebelahan $x_i x_i^{-1}$ atau $x_i^{-1} x_i$. Dengan menghapus semua pasangan semacam itu, setiap unsur mempunyai wakil berupa kata tereduksi. Kata kosong $()$ mewakili identitas, dan perkalian dilakukan dengan mengonkatenasikan kata lalu mereduksi hasilnya.

Definisi 11.2 (produk bebas). Diberikan grup G dan H , *produk bebas* $G * H$ adalah grup yang dilengkapi homomorfisma

$$i: G \longrightarrow G * H, \quad j: H \longrightarrow G * H,$$

dengan sifat berikut. Untuk setiap grup K dan setiap pasangan homomorfisma

$$\phi: G \longrightarrow K, \quad \psi: H \longrightarrow K,$$

terdapat tepat satu homomorfisma

$$\kappa: G * H \longrightarrow K$$

yang memenuhi

$$\kappa \circ i = \phi, \quad \kappa \circ j = \psi.$$

Diagram 11.1 (sifat universal produk bebas). Data dan pemetaan universal dapat dibaca dari diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccc} G & \xrightarrow{i} & G * H & \xleftarrow{j} & H \\ & \searrow \phi & \downarrow \exists! \kappa & \swarrow \psi & \\ & & K & & \end{array}$$

dengan dua lintasan komposit $G \xrightarrow{i} G * H \xrightarrow{\kappa} K$ dan $H \xrightarrow{j} G * H \xrightarrow{\kappa} K$. Keduanya masing-masing harus sama dengan ϕ dan ψ .

Keberadaan dan keunikan κ setelah ϕ serta ψ diberikan disebut *sifat universal* produk bebas.

Misalkan

$$G = \langle g_1, \dots, g_m \mid R_1, \dots, R_n \rangle$$

dan

$$H = \langle h_1, \dots, h_k \mid Q_1, \dots, Q_l \rangle$$

masing-masing merupakan presentasi G dan H . Setiap R_i dan Q_j adalah relasi, yakni persamaan yang melibatkan pembangkit grup terkait. Produk bebasnya mempunyai presentasi

$$G * H = \langle g_1, \dots, g_m, h_1, \dots, h_k \mid R_1, \dots, R_n, Q_1, \dots, Q_l \rangle.$$

Produk bebas grup merupakan kasus khusus konstruksi yang lebih umum, yaitu *produk bebas dengan amalgamasi*. Keduanya pada gilirannya merupakan contoh dari sebuah konstruksi yang masuk akal dalam kategori sebarang.

11.2 Pushout dalam suatu kategori

Definisi 11.3 (persegi pushout). Misalkan $\mathcal{C}$ suatu kategori. Sebuah *persegi pushout* adalah persegi komutatif

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{b} & Y \\ a \downarrow & & \downarrow d \\ X & \xrightarrow{c} & P \end{array}$$

di $\mathcal{C}$ dengan sifat universal berikut. Untuk setiap pasangan morfisma

$$X \xrightarrow{f} Z \xleftarrow{g} Y$$

yang kompatibel pada W , yakni

$$f \circ a = g \circ b,$$

terdapat tepat satu morfisma $k: P \rightarrow Z$ yang memenuhi

$$f = k \circ c, \quad g = k \circ d.$$

Diagram 11.2 (pemetaan keluar dari pushout). Persegi pada Definisi 11.3 menyatakan $c \circ a = d \circ b$. Sifat universal menambahkan dua panah $f: X \rightarrow Z$ dan $g: Y \rightarrow Z$ yang sepakat setelah didahului oleh a dan b , lalu menghasilkan satu-satunya panah $k: P \rightarrow Z$. Dengan demikian kedua segitiga

$$X \xrightarrow{c} P \xrightarrow{k} Z, \quad Y \xrightarrow{d} P \xrightarrow{k} Z$$

masing-masing sama dengan f dan g . Keberadaan unik inilah sifat universal pushout.

Berikut beberapa contoh dalam kategori yang berbeda.

Contoh 11.1 (merekatkan subruang). Misalkan X ruang topologis dan $U, V \subseteq X$ subruang sedemikian sehingga

$$\{U^\circ, V^\circ\}$$

merupakan sampul terbuka dari X . Maka persegi semua pemetaan inklusi

$$\begin{array}{ccc} U \cap V & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & X \end{array}$$

merupakan persegi pushout di **Top**.

Diagram 11.3 (fungsi diagram perekatan). Panah atas dan kiri memasukkan $U \cap V$ ke V dan U . Panah kanan dan bawah memasukkan V dan U ke X . Jadi persegi itu menyatakan bahwa U dan V direkatkan sepanjang $U \cap V$ untuk menghasilkan X .

Dalam situasi ini, $\{U, V\}$ disebut *sampul X oleh lingkungan*: setiap titik di X mempunyai setidaknya salah satu dari U dan V sebagai lingkungan. Syarat tersebut ekuivalen dengan pernyataan bahwa interior U° dan V° menyampuli X .

Contoh 11.2 (baji ruang bertitik). Untuk setiap pasangan ruang bertitik (X, x) dan (Y, y) , persegi

$$\begin{array}{ccc} (*, *) & \longrightarrow & (Y, y) \\ \downarrow & & \downarrow \text{in}_R \\ (X, x) & \xrightarrow{\text{in}_L} & (X \vee Y, *) \end{array}$$

merupakan persegi pushout di **Top**_{*}.

Diagram 11.4 (fungsi diagram baji). Dua panah keluar dari ruang bertitik satu-titik memilih x dan y . Pushout mengidentifikasi kedua titik pilihan itu, sedangkan in_L dan in_R memasukkan kedua faktor ke baji. Sifat universalnya tepat sifat universal baji pada Unit 10.

Contoh 11.3 (produk bebas grup). Untuk grup sebarang G dan H , persegi

$$\begin{array}{ccc} 1 & \longrightarrow & H \\ \downarrow & & \downarrow j \\ G & \xrightarrow{i} & G * H \end{array}$$

merupakan persegi pushout di **Grp**.

Diagram 11.5 (fungsi diagram produk bebas). Kedua panah keluar dari grup trivial 1 adalah homomorfisma unik. Memberikan homomorfisma yang kompatibel dari G dan H ke grup K kemudian sama persis dengan memberikan pasangan ϕ, ψ pada Definisi 11.2; pemetaan universal dari pushout adalah $\kappa: G * H \rightarrow K$.

Contoh 11.4 (menghasilkan satu loop dari satu panah). Ingat grupoid **2** yang mempunyai dua objek 0, 1 dan tepat satu panah di antara setiap pasangan objek terurut. Tuliskan $\text{Disc}(\{0, 1\})$ bagi grupoid diskret pada kedua objek itu, $*$ bagi grupoid satu-objek trivial, dan **BZ** bagi grupoid satu-objek dengan grup automorfisma $\mathbb{Z}$. Persegi

$$\begin{array}{ccc} \text{Disc}(\{0, 1\}) & \longrightarrow & \mathbf{2} \\ \downarrow & & \downarrow \\ * & \longrightarrow & \mathbf{BZ} \end{array}$$

merupakan pushout di **Gpd**.

Diagram 11.6 (semua data panah pada pushout grupoid). Panah atas adalah identitas pada himpunan objek $\{0, 1\}$. Panah kiri menyatukan kedua objek menjadi objek tunggal $\bullet$. Panah kanan juga mengirim 0 dan 1 ke $\bullet$, serta mengirim panah unik

$$0 \longrightarrow 1$$

ke automorfisma $1 \in \mathbb{Z}$ dari $\bullet$; panah baliknya dikirim ke -1 . Panah bawah adalah functor unik dari grupoid satu-objek trivial. Dengan menyatukan kedua objek, panah $0 \rightarrow 1$ menjadi satu loop bebas, sehingga pushoutnya adalah $\mathbf{B}\mathbb{Z}$.

Sifat universal contoh ini dapat diperiksa langsung. Misalkan Γ sebuah grupoid, dan diberikan functor kompatibel

$$A: \mathbf{2} \longrightarrow \Gamma, \quad B: * \longrightarrow \Gamma.$$

Kompatibilitas pada $\text{Disc}(\{0, 1\})$ memaksa

$$A(0) = B(*) = A(1) =: x.$$

Karena itu $a := A(0 \rightarrow 1)$ merupakan automorfisma x . Terdapat tepat satu functor

$$L: \mathbf{B}\mathbb{Z} \longrightarrow \Gamma$$

yang mengirim objek tunggal ke x dan mengirim $n \in \mathbb{Z}$ ke a^n . Functor ini membatasi menjadi A dan B : khususnya, 1 dikirim ke a dan -1 ke a^{-1} . Sebaliknya, setiap functor yang memperluas A dan B harus mempunyai nilai-nilai tersebut, sehingga L unik. Inilah sifat universal pushout, bukan sekadar kemiripan bentuk diagram.

Contoh 11.5 (pushout ruang vektor). Dalam kategori $\mathbf{Vect}$ ruang vektor di atas sebuah lapangan tetap, misalkan

$$L_1: W \longrightarrow V_1, \quad L_2: W \longrightarrow V_2$$

pemetaan linear. Definisikan

$$J: W \longrightarrow V_1 \oplus V_2, \\ w \longmapsto (L_1(w), -L_2(w)).$$

Maka persegi

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{L_2} & V_2 \\ L_1 \downarrow & & \downarrow \\ V_1 & \longrightarrow & (V_1 \oplus V_2)/J(W) \end{array}$$

merupakan pushout.

Diagram 11.7 (pemetaan kanonik pada pushout ruang vektor). Panah bawah dan kanan diberikan oleh

$$v_1 \longmapsto [(v_1, 0)], \quad v_2 \longmapsto [(0, v_2)].$$

Kedua komposit dari W sama karena

$$[(L_1(w), 0)] - [(0, L_2(w))] = [(L_1(w), -L_2(w))] = 0$$

dalam hasil bagi tersebut.

11.3 Teorema Seifert–van Kampen dalam bentuk grupoid

Teorema 11.1 (Seifert–van Kampen). Misalkan X suatu ruang dan $\{U, V\}$ sampel X oleh lingkungan. Maka persegi funktor yang diinduksi oleh inklusi

$$\begin{array}{ccc} \Pi_1(U \cap V) & \xrightarrow{i_V} & \Pi_1(V) \\ i_U \downarrow & & \downarrow \\ \Pi_1(U) & \longrightarrow & \Pi_1(X) \end{array}$$

merupakan persegi pushout di **Gpd**.

Diagram 11.8 (fungsi diagram van Kampen). Objek kiri atas merekam titik dan kelas lintasan yang seluruhnya berada dalam $U \cap V$. Funktor i_U dan i_V memandang data yang sama masing-masing di dalam U dan V . Kedua funktor berikutnya memandangnya di dalam X . Pernyataan pushout mengatakan bahwa setiap pasangan funktor kompatibel keluar dari $\Pi_1(U)$ dan $\Pi_1(V)$ dapat, secara unik, direkatkan menjadi funktor keluar dari $\Pi_1(X)$.

Sampul oleh lingkungan pada teorema itu dapat secara ekuivalen dinyatakan dengan syarat bahwa $\{U^\circ, V^\circ\}$ merupakan sampel terbuka.

Catatan 11.1. Kesimpulan teorema tidak langsung mengikuti hanya dari kenyataan bahwa persegi ruang

$$\begin{array}{ccc} U \cap V & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & X \end{array}$$

merupakan pushout di **Top**. Sifat universal masih harus diperiksa terhadap **setiap** grupoid Γ dan setiap pasangan funktor kompatibel

$$\Pi_1(U) \longrightarrow \Gamma \longleftarrow \Pi_1(V).$$

11.4 Konstruksi funktor universal: bagian pertama bukti

Bukti Teorema 11.1 (bagian pertama; berlanjut pada Kuliah 12). Mulailah dengan persegi komutatif sebarang

$$\begin{array}{ccc} \Pi_1(U \cap V) & \xrightarrow{i_V} & \Pi_1(V) \\ i_U \downarrow & & \downarrow G \\ \Pi_1(U) & \xrightarrow{F} & \Gamma. \end{array}$$

Kita harus membangun funktor

$$K: \Pi_1(X) \longrightarrow \Gamma$$

yang kompatibel dengan F dan G . Secara konkret, kita perlu membangun fungsi pada objek dan morfisma

$$K_0: \Pi_1(X)_0 = X \longrightarrow \Gamma_0, \quad K_1: \Pi_1(X)_1 \longrightarrow \Gamma_1$$

yang bersama-sama memenuhi hukum funktor.

Diagram 11.9 (masalah universal yang harus diselesaikan). Funktor F dan G telah diberikan dan memenuhi

$$F \circ i_U = G \circ i_V.$$

Fungtor yang dicari harus membuat kedua segitiga

$$\Pi_1(U) \longrightarrow \Pi_1(X) \xrightarrow{K} \Gamma, \quad \Pi_1(V) \longrightarrow \Pi_1(X) \xrightarrow{K} \Gamma$$

masing-masing sama dengan F dan G .

11.4.1 Fungsi pada objek

Ambil $x \in X$. Jika $x \in U$, definisikan $K_0(x) = F(x)$; jika $x \in V$, definisikan $K_0(x) = G(x)$. Setiap titik tercakup oleh setidaknya salah satu dari U, V . Jika $x \in U \cap V$, komutativitas persegi memberi

$$F(x) = G(x),$$

sehingga K_0 terdefinisi baik.

11.4.2 Fungsi pada lintasan yang berada dalam satu anggota sampul

Tuliskan $\mathcal{P}(X)$ bagi himpunan semua lintasan kontinu $I \rightarrow X$. Kita mula-mula membangun fungsi sementara

$$\widetilde{K}_1: \mathcal{P}(X) \longrightarrow \Gamma_1$$

pada lintasan nyata, lalu akan menunjukkan bahwa nilainya tidak berubah pada kelas homotopi berujung tetap. Hanya setelah itu fungsi pada morfisma dapat didefinisikan oleh $K_1([\gamma]) := \widetilde{K}_1(\gamma)$. Misalkan $\gamma: I \rightarrow X$ mempunyai citra di U . Definisikan

$$\widetilde{K}_1(\gamma) := F_1([\gamma]_U).$$

Serupa dengan itu, jika citra γ berada di V , definisikan

$$\widetilde{K}_1(\gamma) := G_1([\gamma]_V).$$

Jika citranya berada di $U \cap V$, kedua nilai sama karena persegi fungtor yang diberikan komutatif. Definisi itu kompatibel dengan sumber dan sasaran: titik awal serta akhir lintasan di U juga berada di U , dan hal yang sama berlaku bagi V . Definisi juga kompatibel dengan konkatenasi lintasan yang seluruhnya berada di U atau seluruhnya berada di V , karena F dan G adalah fungtor. Lintasan konstan dikirim ke morfisma identitas di Γ .

Jika $\sigma: I \rightarrow I$ suatu pemetaan kontinu dengan $\sigma(0) = 0$ dan $\sigma(1) = 1$, maka $\gamma \circ \sigma$ homotopik berujung tetap dengan γ , melalui interpolasi lurus antara σ dan id_I . Karena itu

$$\widetilde{K}_1(\gamma \circ \sigma) = \widetilde{K}_1(\gamma)$$

ketika γ berada dalam U atau dalam V . Jadi nilai lokal tidak bergantung pada parameter lintasan.

11.4.3 Lintasan umum dan subdivisi

Sekarang ambil lintasan umum $\gamma: I \rightarrow X$. Tarik balik sampel terbuka $\{U^\circ, V^\circ\}$ sepanjang γ menjadi sampel terbuka

$$\mathcal{U}_\gamma := \{\gamma^{-1}(U^\circ), \gamma^{-1}(V^\circ)\}$$

dari interval metrik kompak I . Lema bilangan Lebesgue memberi $\delta > 0$ sedemikian sehingga setiap himpunan bagian dari I yang berdiameter kurang dari δ termuat dalam satu anggota $\mathcal{U}_\gamma$. Pilih partisi yang setiap subintervalnya berpanjang kurang dari δ ,

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n < t_{n+1} = 1$$

sedemikian sehingga untuk setiap $i = 0, \dots, n$, pembatasan

$$\gamma|_{[t_i, t_{i+1}]}$$

mempunyai citra seluruhnya di U atau seluruhnya di V (atau keduanya). Definisikan lintasan berparameter baku

$$\gamma_i(s) := \gamma((1-s)t_i + st_{i+1}), \quad 0 \leq s \leq 1.$$

Lintasan γ merupakan reparameterisasi dari konkatenasi kronologis

$$\gamma_0 \# \gamma_1 \# \cdots \# \gamma_n.$$

Semua $\widetilde{K}_1(\gamma_i)$ sudah terdefinisi, maka tetapkan

$$\widetilde{K}_1(\gamma) := \widetilde{K}_1(\gamma_0) \widetilde{K}_1(\gamma_1) \cdots \widetilde{K}_1(\gamma_n) \in \Gamma_1.$$

Di sini perkalian morfisma mengikuti urutan komposisi aljabar yang sudah ditetapkan: faktor paling kiri ditempuh terlebih dahulu.

Jika partisi diperhalus, satu ruas lama diganti oleh beberapa ruas yang masih berada dalam anggota sampel yang sama. Fungtorialitas F atau G membuat komposit nilai ruas-ruas baru sama dengan nilai ruas lama. Jika suatu ruas berada dalam $U \cap V$, komutativitas persegi memastikan tidak ada pilihan ambigu. Setiap dua partisi memiliki perhalusan bersama. Karena itu nilai $\widetilde{K}_1(\gamma)$ tidak bergantung pada partisi yang dipilih.

Keterangan pinggir sumber pada langkah ini menyebut secara eksplisit bahwa partisi tersebut diperoleh dari lema bilangan Lebesgue.

Untuk menurunkan fungsi ini dari lintasan nyata ke morfisma $\Pi_1(X)$, kita sekarang harus membuktikan bahwa setiap homotopi berujung tetap $H: I^2 \rightarrow X$ dari lintasan γ ke lintasan η memenuhi

$$\widetilde{K}_1(\gamma) = \widetilde{K}_1(\eta).$$

Langkah berikut menyiapkan kesamaan lokal yang kelak akan ditempelkan untuk membuktikan pernyataan tersebut.

11.4.4 Pemanasan: dua lintasan batas sebuah persegi

Ambil pemetaan sebarang

$$h: I^2 \longrightarrow X.$$

Definisikan dua lintasan dari $h(0,0)$ ke $h(1,1)$:

$$\begin{aligned}\gamma_0 &:= h(-,0) \# h(1,-), \\ \gamma_1 &:= h(0,-) \# h(-,1).\end{aligned}$$

Lintasan pertama menempuh sisi bawah lalu sisi kanan persegi; lintasan kedua menempuh sisi kiri lalu sisi atas.

Diagram 11.10 (dua rute batas). Di dalam persegi koordinat I^2 , kedua rute sebelum diterapkan h diparameterkan oleh

$$p_0(s) = \begin{cases} (2s, 0), & 0 \leq s \leq \frac{1}{2}, \\ (1, 2s - 1), & \frac{1}{2} \leq s \leq 1, \end{cases}$$

dan

$$p_1(s) = \begin{cases} (0, 2s), & 0 \leq s \leq \frac{1}{2}, \\ (2s - 1, 1), & \frac{1}{2} \leq s \leq 1. \end{cases}$$

Jadi $\gamma_0 = h \circ p_0$ dan $\gamma_1 = h \circ p_1$. Kedua rute berawal di $(0,0)$ dan berakhir di $(1,1)$.

Terdapat homotopi berujung tetap $\gamma_0 \simeq \gamma_1$. Cukup membangun homotopi berujung tetap antara p_0 dan p_1 di I^2 , lalu mengomposisikannya dengan h .

Diagram 11.11 (deformasi kedua rute). Pengganti parametrik bagi keluarga garis pada gambar sumber adalah

$$P(s, u) := (1 - u)p_0(s) + up_1(s), \quad (s, u) \in I^2.$$

Karena I^2 konveks, $P(s, u)$ selalu berada di I^2 . Selain itu,

$$P(s, 0) = p_0(s), \quad P(s, 1) = p_1(s),$$

serta kedua sisi parameter ujung tetap konstan:

$$P(0, u) = (0, 0), \quad P(1, u) = (1, 1).$$

Jadi $h \circ P$ adalah homotopi berujung tetap yang diminta. Pada tiap u , rutenya bergerak melalui persegi sambil mempertahankan kedua simpul ujung; inilah fungsi matematis gambar deformasi dalam sumber.

Jika h mempunyai citra seluruhnya di salah satu dari U atau V , homotopi tersebut juga berada di subruang itu. Maka

$$[\gamma_0] = [\gamma_1]$$

di $\Pi_1(U)$ atau $\Pi_1(V)$ yang sesuai, sehingga

$$\widetilde{K}_1(\gamma_0) = \widetilde{K}_1(\gamma_1).$$

Sampai batas Kuliah 11, inilah langkah lokal yang telah dibuktikan. Untuk homotopi umum $H: I^2 \rightarrow X$, masih harus dipilih kisi kecil yang setiap selnya dipetakan seluruhnya ke U atau ke V , lalu kesamaan lokal di atas harus ditempelkan sel demi sel. Kelanjutan juga harus membuktikan bahwa fungsi yang turun ke kelas homotopi mempertahankan identitas dan komposisi, membatasi menjadi F serta G , dan merupakan satu-satunya functor dengan pembatasan itu. Argumen global dimulai pada baris pertama Kuliah 12 dan tidak termasuk dalam unit ini. Sumber sampai akhir buktinya menyatakan functorialitas dari konstruksi, tetapi tidak menuliskan argumen keunikan K secara eksplisit; edisi harus memasok argumen itu ketika bukti ditutup.

Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Bagian ini menambahkan tiga pemeriksaan yang mengisi rincian universal dan langkah lokal yang hanya dinyatakan singkat dalam sumber.

Pemeriksaan penguasaan 11.1 (pemetaan keluar dari grup bebas dan produk bebas).

1. Diberikan unsur $k_1, \dots, k_n$ dari grup K , bangun homomorfisma unik $\theta: F_n \rightarrow K$ dengan $\theta(x_i) = k_i$.
2. Diberikan $\phi: G \rightarrow K$ dan $\psi: H \rightarrow K$, jelaskan nilai homomorfisma universal $\kappa: G * H \rightarrow K$ pada sebuah kata yang huruf-hurufnya berasal bergantian dari G dan H .
3. Periksa tipe kedua persamaan universal dan jelaskan mengapa $i \circ \kappa$ tidak dapat menggantikan $\kappa \circ i$.

11.5 Solusi Pemeriksaan 11.1

Untuk kata

$$w = x_{i_1}^{\varepsilon_1} \cdots x_{i_r}^{\varepsilon_r}, \quad \varepsilon_j \in \{1, -1\},$$

definisikan

$$\theta(w) := k_{i_1}^{\varepsilon_1} \cdots k_{i_r}^{\varepsilon_r}.$$

Penyisipan atau penghapusan pasangan invers tidak mengubah nilai itu, jadi θ terdefinisi baik pada unsur F_n . Konkatenasi kata dipetakan ke perkalian di K , sehingga θ homomorfisma. Setiap homomorfisma dengan nilai $x_i \mapsto k_i$ harus mempunyai rumus tersebut pada semua kata, maka θ unik.

Untuk produk bebas, sebuah kata khas dapat ditulis

$$g_1 h_1 g_2 h_2 \cdots g_r h_r,$$

dengan faktor awal atau akhir boleh tidak hadir dan dengan unsur identitas dihapus. Pemetaan universal harus memenuhi

$$\kappa(g_1 h_1 \cdots g_r h_r) = \phi(g_1) \psi(h_1) \cdots \phi(g_r) \psi(h_r).$$

Relasi internal G dihormati karena ϕ homomorfisma, dan relasi internal H dihormati karena ψ homomorfisma. Presentasi produk bebas tidak menambahkan relasi silang, sehingga rumus itu

menentukan homomorfisma. Ia unik karena citra semua pembangkit dari kedua faktor sudah ditentukan.

Terakhir,

$$i: G \rightarrow G * H, \quad \kappa: G * H \rightarrow K,$$

sehingga komposit bertipe dari G ke K adalah $\kappa \circ i$, dan ini harus sama dengan ϕ . Ekspresi $i \circ \kappa$ akan memerlukan kodomain κ sama dengan domain i , yakni $K = G$, yang tidak diberikan dan bahkan tidak benar secara umum; sekalipun kebetulan $K = G$, domain komposit itu tetap $G * H$, bukan domain G milik ϕ . Argumen identik memberi $\kappa \circ j = \psi$.

Pemeriksaan penguasaan 11.2 (dua verifikasi pushout).

1. Dalam Contoh 11.1, misalkan $f: U \rightarrow Z$ dan $g: V \rightarrow Z$ kontinu serta $f|_{U \cap V} = g|_{U \cap V}$. Bangun pemetaan universal $k: X \rightarrow Z$ dan buktikan kekontinuannya.
2. Dalam Contoh 11.5, misalkan $A: V_1 \rightarrow Z$ dan $B: V_2 \rightarrow Z$ linear serta $A \circ L_1 = B \circ L_2$. Bangun pemetaan universal dari $(V_1 \oplus V_2)/J(W)$ ke Z dan buktikan bahwa ia terdefinisi baik serta unik.

11.6 Solusi Pemeriksaan 11.2

Definisikan fungsi $k: X = U \cup V \rightarrow Z$ dengan

$$k(x) = \begin{cases} f(x), & x \in U, \\ g(x), & x \in V. \end{cases}$$

Kesepakatan pada $U \cap V$ membuat fungsi ini terdefinisi baik. Pembatasannya ke sampel terbuka $\{U^\circ, V^\circ\}$ masing-masing adalah pembatasan fungsi kontinu f dan g . Lema perekatan untuk sampel terbuka karena itu menunjukkan bahwa k kontinu. Nilainya pada semua titik U dan V sudah dipaksa oleh f serta g , jadi k unik.

Untuk ruang vektor, definisikan

$$T: V_1 \oplus V_2 \longrightarrow Z, \quad T(v_1, v_2) := A(v_1) + B(v_2).$$

Untuk setiap $w \in W$,

$$T(J(w)) = A(L_1(w)) - B(L_2(w)) = 0.$$

Jadi $J(W) \subseteq \ker T$, dan T turun secara unik menjadi pemetaan linear

$$\bar{T}: (V_1 \oplus V_2)/J(W) \longrightarrow Z.$$

Pemetaan itu memenuhi

$$\bar{T}([(v_1, 0)]) = A(v_1), \quad \bar{T}([(0, v_2)]) = B(v_2).$$

Setiap kelas $[(v_1, v_2)]$ adalah jumlah kedua jenis pembangkit tersebut, sehingga linearitas memaksa nilai $\bar{T}$ pada seluruh hasil bagi. Karena itu pemetaan universal tersebut unik.

Pemeriksaan penguasaan 11.3 (subdivisi dan homotopi persegi).

1. Buktikan langsung bahwa menyisipkan satu titik baru ke dalam partisi lintasan tidak mengubah $\widetilde{K}_1(\gamma)$.

2. Verifikasi kekontinuan rumus $P(s, u)$ pada Diagram 11.11 dan periksa semua syarat homotopi berujung tetap.
3. Jelaskan mengapa hasil lokal itu belum, pada batas unit ini, membuktikan bahwa $\widetilde{K}_1(\gamma) = \widetilde{K}_1(\eta)$ untuk setiap homotopi berujung tetap $H: \gamma \simeq \eta$ yang citranya melintasi kedua subruang.

11.7 Solusi Pemeriksaan 11.3

Misalkan satu ruas γ_i berada dalam U dan dipotong pada satu titik menjadi $\alpha\#\beta$. Dengan konvensi komposisi aljabar, funtorialitas F memberi

$$F_1([\gamma_i]_U) = F_1([\alpha]_U[\beta]_U) = F_1([\alpha]_U)F_1([\beta]_U).$$

Jadi satu faktor lama dalam produk $\widetilde{K}_1(\gamma)$ diganti oleh dua faktor dengan produk yang sama. Argumen bagi ruas dalam V identik. Jika ruas berada dalam irisan, komutativitas persegi membuat pilihan F atau G memberi hasil yang sama. Setiap perhalusan berhingga diperoleh dengan mengulang langkah ini, dan setiap dua partisi mempunyai perhalusan bersama; maka hasilnya bebas dari partisi.

Fungsi p_0 dan p_1 kontinu karena kedua rumus bagi masing-masing fungsi sepakat pada $s = \frac{1}{2}$. Penjumlahan serta perkalian skalar di $\mathbb{R}^2$ kontinu, sehingga

$$P(s, u) = (1 - u)p_0(s) + up_1(s)$$

kontinu. Persegi I^2 konveks, jadi citra P tetap di dalam domain h . Substitusi $u = 0$ dan $u = 1$ memberi p_0 dan p_1 , sedangkan substitusi $s = 0$ dan $s = 1$ memberi titik konstan $(0, 0)$ dan $(1, 1)$. Dengan demikian $h \circ P$ benar-benar homotopi berujung tetap dari γ_0 ke γ_1 .

Namun, bila citra H melintasi U dan V , tidak ada alasan bahwa seluruh homotopi persegi berada dalam satu anggota sampel. Kesamaan kelas di satu $\Pi_1(U)$ atau satu $\Pi_1(V)$ karena itu belum dapat diterapkan sekaligus. Masih diperlukan bilangan Lebesgue bagi sampel prapeta pada I^2 , kisi cukup halus, dan penempelan kesamaan satu sel pada satu waktu. Itulah langkah yang dimulai pada Kuliah 12. Membatasi kesimpulan di sini mencegah bagian pertama bukti disalahartikan sebagai bukti lengkap teorema.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya [Notes.tex baris 2495–2726 pada commit b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#). Rentang itu dimulai dengan penanda Kuliah 12 dan kelanjutan bukti teorema Seifert–van Kampen dari Unit 11. Rentang berakhir setelah penjelasan mengapa sampel dua kutub tidak memenuhi hipotesis versi grup ketika $n = 1$. Baris 2727 memulai Kuliah 13 dan tidak termasuk dalam unit ini. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, dan pemberian pengenalan stabil. Keenam unsur pinggir dipindahkan ke urutan bacaan utama. Ketujuh gambar sumber—satu gambar TikZ dan enam diagram Xy-pic—ditulis ulang sebagai diagram semantik, daftar panah, dan persamaan komutativitas yang tetap bermakna tanpa bergantung pada posisi visual.

Beberapa rincian matematis diperbaiki atau dilengkapi secara independen. Argumen kisi pada bukti Seifert–van Kampen dibuat tak melingkar dengan pertukaran satu sel, lalu penurunan fungsi sementara $\widetilde{K}_1$ ke K_1 , hukum identitas dan komposisi, pembatasan ke F serta G , dan keunikan functor universal K diperiksa secara eksplisit. Dalam bukti versi relatif, pilihan jalur dibuat sebagai satu keluarga koheren dengan mendahulukan $U \cap V$; pilihan terpisah di U dan V tidak dengan sendirinya

bersepakat pada irisan. Rumus functor retraksi ditulis dengan jalur balik yang diperlukan. Klaim sumber bahwa empat retraksi simpul saja sudah cukup diperketat: keempat retraksi harus merupakan komponen dari satu morfisma balik di $\mathcal{C}^\square$. Dalam lemma subkategori penuh, peran kategori ambient dan subkategori yang tertukar dalam sumber dikembalikan ke arah yang bertipe benar. Functor **B** dinyatakan sepenuhnya setia ke citra esensial grupoid satu objek, alih-alih diperlakukan sebagai inklusi harfiah tanpa identifikasi itu. Salah eja “homopic” dan “one-obect” juga dinormalkan.

Sumber menyerahkan satu bukti sebagai latihan. Pendamping penguasaan yang dibatasi pada empat pemeriksaan memberikan solusi lengkap bagi latihan itu serta keterampilan inti unit: pertukaran sel dan keunikan functor universal, retraksi persegi pushout, retraksi grupoid fundamental dan koherensi kubus, serta peralihan dari grupoid ke grup pada contoh sfera. Seluruh materi pendamping yang ditambahkan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

12 Kuliah 12

12.1 Menuntaskan bukti Seifert–van Kampen

Bukti Teorema 11.1 (lanjutan dan penutup). Ingat data dari Unit 11: $H: I^2 \rightarrow X$ adalah homotopi yang mempertahankan titik ujung dari lintasan γ ke lintasan η . Dengan koordinat (s, t) pada I^2 ,

$$H(s, 0) = \gamma(s), \quad H(s, 1) = \eta(s),$$

dan terdapat $x, y \in X$ sedemikian sehingga

$$H(0, t) = x, \quad H(1, t) = y$$

untuk semua $t \in I$; dua persamaan sebelumnya berlaku untuk semua $s \in I$. Semua homotopi yang digunakan di bawah ini mempertahankan kedua titik ujung tersebut.

Terapkan lema bilangan Lebesgue pada ruang metrik kompak

$$(I^2, d_\infty), \quad d_\infty((s, t), (s', t')) = \max\{|s - s'|, |t - t'|\},$$

dan sampel terbuka

$$\{H^{-1}(U^\circ), H^{-1}(V^\circ)\}.$$

Kita memperoleh $\delta > 0$ sehingga setiap persegi kecil dengan panjang sisi kurang dari δ termuat dalam salah satu dari $H^{-1}(U^\circ)$ atau $H^{-1}(V^\circ)$. Pilih $N \geq 1$ dengan $1/N < \delta$, lalu gunakan garis-garis kisi $s = i/N$ dan $t = j/N$. Untuk setiap sel Q pada kisi itu, pembatasan

$$H|_Q$$

berfaktor melalui U atau melalui V . Titik-titik kisi pada sisi bawah dan atas sekaligus memberi partisi I yang subordinat bagi γ dan η , sehingga nilai sementara $\widetilde{K}_1(\gamma)$ dan $\widetilde{K}_1(\eta)$ dapat dibaca dari ruas-ruas kisi.

Diagram 12.1 (kisi Lebesgue dan pertukaran satu sel). Persegi parameter mempunyai sisi bawah γ , sisi atas η , dan kedua sisi tegak yang dipetakan secara konstan ke x dan y . Persegi itu dibagi menjadi sel-sel yang masing-masing mempunyai panjang sisi kurang dari δ dan dipetakan seluruhnya ke U atau seluruhnya ke V .

Gambar sumber memakai skala $[0, 3]^2$ dengan kisi 6×6 . Rute tangga merah utuh melewati simpul, dalam urutan tempuh,

$$(0, 0), (1, 0), (1, \frac{3}{2}), (\frac{3}{2}, \frac{3}{2}), (\frac{3}{2}, 2), \\ (\frac{5}{2}, 2), (\frac{5}{2}, \frac{5}{2}), (3, \frac{5}{2}), (3, 3).$$

Pada satu sel, ruas

$$(1, \frac{3}{2}) \longrightarrow (\frac{3}{2}, \frac{3}{2}) \longrightarrow (\frac{3}{2}, 2)$$

dapat diganti dengan rute bertitik

$$(1, \frac{3}{2}) \longrightarrow (1, 2) \longrightarrow (\frac{3}{2}, 2).$$

Membagi semua koordinat dengan 3 menempatkan gambar itu di I^2 . Kedua rute kecil adalah rute “bawah lalu kanan” dan “kiri lalu atas” pada sel yang sama; inilah satu langkah pertukaran sel.

Pertimbangkan semua lintasan tangga monoton pada kisi dari sudut kiri bawah ke sudut kanan atas. Dua lintasan yang hanya berbeda pada satu sel mempunyai bentuk yang sama di luar sel itu. Di dalam sel, satu lintasan menempuh sisi bawah lalu sisi kanan, sedangkan yang lain menempuh sisi kiri lalu sisi atas. Karena citra sel berada seluruhnya dalam U atau seluruhnya dalam V , hasil pemanasan pada akhir Unit 11 memberi kesamaan nilai $\widetilde{K}_1$ bagi dua ruas kecil tersebut. Mengalikan kesamaan itu di sebelah kiri dan kanan dengan nilai ruas-ruas yang sama di luar sel menunjukkan bahwa pertukaran satu sel tidak mengubah nilai seluruh lintasan tangga.

Dengan sejumlah berhingga pertukaran satu sel, rute yang menyusuri sisi bawah lalu sisi kanan dapat diubah menjadi rute yang menyusuri sisi kiri lalu sisi atas. Setelah diterapkan H , sisi kanan adalah lintasan konstan di y dan sisi kiri adalah lintasan konstan di x . Hukum identitas lokal dan kemandirian terhadap subdivisi karena itu memberi

$$\begin{aligned} \widetilde{K}_1(\gamma) &= \widetilde{K}_1(\gamma) 1_{K_0(y)} \\ &= 1_{K_0(x)} \widetilde{K}_1(\eta) \\ &= \widetilde{K}_1(\eta). \end{aligned}$$

Argumen ini berlaku bagi setiap homotopi berujung tetap H . Jadi $\widetilde{K}_1$ invarian terhadap homotopi berujung tetap pada seluruh X , bukan hanya pada lintasan yang berada dalam satu anggota sampel.

12.1.1 Penurunan ke kelas homotopi

Sekarang definisikan

$$K_1([\alpha]_X) := \widetilde{K}_1(\alpha).$$

Invariansi yang baru dibuktikan memastikan bahwa ruas kanan tidak bergantung pada wakil α . Pemeriksaan sumber dan sasaran dari Unit 11 memberi

$$K_1([\alpha]): K_0(\alpha(0)) \longrightarrow K_0(\alpha(1)).$$

Untuk lintasan konstan c_x , definisi lokal memberi

$$K_1([c_x]) = 1_{K_0(x)}.$$

Jika $\alpha: x \rightsquigarrow y$ dan $\beta: y \rightsquigarrow z$, gabungkan partisi subordinat bagi α dan β menjadi partisi subordinat bagi konkatenasi $\alpha\#\beta$. Kemandirian dari partisi kemudian memberi

$$K_1([\alpha][\beta]) = K_1([\alpha])K_1([\beta]).$$

Pada persamaan ini penjabaran aljabar dibaca dari kiri ke kanan: α ditempuh lebih dahulu, kemudian β . Dengan notasi komposisi kategoris standar yang dibaca dari kanan ke kiri, persamaan yang sama adalah

$$K_1([\beta] \circ [\alpha]) = K_1([\beta]) \circ K_1([\alpha]).$$

Maka pasangan $K = (K_0, K_1)$ adalah functor

$$K: \Pi_1(X) \longrightarrow \Gamma.$$

12.1.2 Pembatasan dan keunikan

Tuliskan $j_U: \Pi_1(U) \rightarrow \Pi_1(X)$ dan $j_V: \Pi_1(V) \rightarrow \Pi_1(X)$ bagi functor inklusi. Pada objek di U , definisi K_0 sama dengan F_0 , dan pada lintasan yang seluruhnya berada di U , definisi lokal $\widetilde{K}_1$ sama dengan F_1 . Jadi

$$K \circ j_U = F.$$

Argumen yang sama memberi

$$K \circ j_V = G.$$

Tersisa keunikan yang tersirat, tetapi tidak dituliskan, dalam sumber. Misalkan

$$L: \Pi_1(X) \longrightarrow \Gamma$$

functor lain dengan $L \circ j_U = F$ dan $L \circ j_V = G$. Setiap $x \in X$ berada di U atau di V , sehingga kedua persamaan pembatasan memaksa $L_0(x) = K_0(x)$. Untuk morfisma $[\alpha]$, pilih subdivisi subordinat

$$\alpha \simeq \alpha_0 \# \alpha_1 \# \cdots \# \alpha_n$$

yang setiap ruasnya berada di U atau di V . Functorialitas dan kedua pembatasan memaksa

$$\begin{aligned} L_1([\alpha]) &= L_1([\alpha_0]) \cdots L_1([\alpha_n]) \\ &= \widetilde{K}_1(\alpha_0) \cdots \widetilde{K}_1(\alpha_n) \\ &= K_1([\alpha]). \end{aligned}$$

Jadi $L = K$. Keberadaan dan keunikan ini membuktikan sifat universal pushout, dan dengan demikian menuntaskan bukti Teorema 11.1.

Teorema tersebut sangat kuat, tetapi dalam bentuk itu tidak selalu paling nyaman untuk perhitungan. Kita menginginkan versi bagi $\Pi_1(X, A)$ dengan $A \subseteq X$ yang lebih kecil, atau bahkan bagi $\pi_1(X, x)$. Untuk mendapatkannya, kita memerlukan sebuah lemma kategoris umum.

12.2 Persegi komutatif dan retrak

Untuk kategori sebarang $\mathcal{C}$, definisikan kategori $\mathcal{C}^\square$. Objeknya adalah persegi komutatif di $\mathcal{C}$, dan morfismanya adalah kubus komutatif: kubus yang setiap sisinya merupakan persegi komutatif.

Diagram 12.2 (morfisma antardua persegi komutatif). Persegi belakang dan depan masing-masing adalah

$$\begin{array}{ccc} A_1 & \xrightarrow{f_1} & B_1 \\ g_1 \downarrow & & \downarrow h_1 \\ C_1 & \xrightarrow{k_1} & D_1 \end{array} \quad \begin{array}{ccc} A_2 & \xrightarrow{f_2} & B_2 \\ g_2 \downarrow & & \downarrow h_2 \\ C_2 & \xrightarrow{k_2} & D_2. \end{array}$$

Selain empat panah pada setiap persegi, morfisma di $\mathcal{C}^\square$ mempunyai empat panah penghubung

$$u_A: A_1 \rightarrow A_2, \quad u_B: B_1 \rightarrow B_2, \quad u_C: C_1 \rightarrow C_2, \quad u_D: D_1 \rightarrow D_2.$$

Dua sisi ujung memenuhi $h_i \circ f_i = k_i \circ g_i$ untuk $i = 1, 2$. Keempat sisi penghubung memenuhi

$$\begin{aligned} u_B \circ f_1 &= f_2 \circ u_A, & u_C \circ g_1 &= g_2 \circ u_A, \\ u_D \circ h_1 &= h_2 \circ u_B, & u_D \circ k_1 &= k_2 \circ u_C. \end{aligned}$$

Keenam persamaan itu adalah pembacaan linear lengkap dari kubus pada catatan pinggir sumber.

Definisi 12.1 (retrak). Dalam kategori $\mathcal{C}$, objek V adalah sebuah *retrak* dari objek W jika terdapat morfisma

$$i: V \longrightarrow W, \quad r: W \longrightarrow V$$

sedemikian sehingga

$$r \circ i = \text{id}_V.$$

Morfisma r disebut sebuah *retraksi*.

Sebagai contoh, di **Vect** setiap subruang vektor $V \subseteq \mathbb{R}^n$ adalah retrak: ambil i sebagai inklusi dan r sebagai proyeksi ortogonal ke V . Di **Set**, misalkan $T \subseteq S$ dan pilih $t_0 \in T$. Inklusi $i: T \rightarrow S$ bersama fungsi

$$r: S \longrightarrow T, \quad r(s) = \begin{cases} s, & s \in T, \\ t_0, & s \in S \setminus T, \end{cases}$$

memberi retrak karena $r|_T = \text{id}_T$.

Contoh yang lebih penting adalah sebagai berikut.

Contoh 12.1 (retraksi grupoid fundamental terbatas). Misalkan X suatu ruang dan $A' \subseteq A \subseteq X$. Andaikan setiap titik di A dapat dihubungkan oleh lintasan di X ke suatu titik di A' . Maka

$$\Pi_1(X, A')$$

adalah retrak dari $\Pi_1(X, A)$. Pernyataan ini memperumum kasus dari Tugas 2 dengan $A' = \{x\}$. Konstruksi retraksinya diperiksa lengkap dalam Pemeriksaan Penguasaan 12.3.

Kita juga dapat menanyakan kapan sebuah persegi komutatif di $\mathcal{C}$ merupakan retrak dari persegi komutatif lain: artinya tepat retrak sebagai objek di $\mathcal{C}^\square$. Ingat bahwa persegi pushout adalah jenis khusus persegi komutatif. Secara tepat, kita memerlukan morfisma $i: S \rightarrow T$ dan $r: T \rightarrow S$ yang keduanya sudah merupakan kubus komutatif. Setelah kompatibilitas kubus itu tersedia, persamaan $r \circ i = \text{id}_S$ boleh diperiksa pada masing-masing dari empat simpul. Empat retraksi simpul yang dipilih secara terpisah belum tentu merakit diri menjadi satu morfisma r di $\mathcal{C}^\square$.

Lemma 12.1 (retrak dari persegi pushout). Setiap retrak dari persegi pushout adalah persegi pushout.

Bukti. Sumber menyerahkan pernyataan ini sebagai **latihan**. Inilah Latihan Sumber 12.1; solusi lengkap diberikan pada Pemeriksaan Penguasaan 12.2.

Kita akan menerapkan Lemma 12.1 pada persegi pushout di **Gpd** dari teorema Seifert–van Kampen. Persegi itu adalah objek **Gpd** $^\square$ dan melibatkan grupoid fundamental penuh $\Pi_1(X)$, $\Pi_1(U)$, $\Pi_1(V)$, serta $\Pi_1(U \cap V)$. Retraksi seperti pada Contoh 12.1 akan dirakit menjadi sebuah retraksi di **Gpd** $^\square$ yang simpul-simpulnya merupakan grupoid lebih kecil.

Teorema 12.1 (Seifert–van Kampen relatif). Misalkan X suatu ruang, $\{U, V\}$ sampul X oleh lingkungan, dan $A \subseteq X$ suatu subruang. Andaikan dalam masing-masing dari empat pasangan

$$(X, A), \quad (U, A \cap U), \quad (V, A \cap V), \quad (U \cap V, A \cap U \cap V),$$

setiap titik di ruang yang lebih besar dapat dihubungkan oleh lintasan di dalam ruang itu ke suatu titik di ruang yang lebih kecil. Sebagai contoh, setiap titik di U harus terhubung oleh lintasan di U ke suatu titik di $A \cap U$. Maka persegi

$$\begin{array}{ccc} \Pi_1(U \cap V, A \cap U \cap V) & \longrightarrow & \Pi_1(V, A \cap V) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Pi_1(U, A \cap U) & \longrightarrow & \Pi_1(X, A) \end{array}$$

merupakan persegi pushout di **Gpd**.

Diagram 12.3 (fungsi persegi relatif). Keempat panah adalah functor yang diinduksi oleh inklusi ruang. Panah atas memasukkan data lintasan dari $U \cap V$ ke V ; panah kiri memasukkannya ke U . Panah kanan memasukkan lintasan di V ke X , dan panah bawah melakukan hal yang sama bagi U . Pada simpul mana pun, hanya titik-titik objek yang berada dalam irisan dengan A yang dipertahankan. Kedua komposit dari simpul kiri atas adalah functor inklusi yang sama ke $\Pi_1(X, A)$.

Bukti. Bagian yang melibatkan homotopi telah diselesaikan oleh Teorema 11.1. Kita hanya perlu menunjukkan bahwa persegi pada pernyataan merupakan retrak di **Gpd** $^\square$ dari persegi pushout pada teorema tersebut.

Functor inklusi

$$\begin{aligned} \Pi_1(U \cap V, A \cap U \cap V) &\longrightarrow \Pi_1(U \cap V), \\ \Pi_1(U, A \cap U) &\longrightarrow \Pi_1(U), \\ \Pi_1(V, A \cap V) &\longrightarrow \Pi_1(V), \\ \Pi_1(X, A) &\longrightarrow \Pi_1(X) \end{aligned}$$

memberi satu morfisma di **Gpd** $^\square$. Kita akan membangun morfisma ke arah sebaliknya sebagai satu keluarga pilihan yang koheren.

Untuk setiap $x \in X$, pilih titik $a_x \in A$ dan kelas lintasan

$$\eta_x: x \rightsquigarrow a_x.$$

Pilihan dibuat menurut urutan berikut.

1. Jika $x \in A$, ambil $a_x = x$ dan η_x lintasan konstan.
2. Jika $x \in (U \cap V) \setminus A$, gunakan hipotesis pasangan $(U \cap V, A \cap U \cap V)$ untuk memilih $a_x \in A \cap U \cap V$ dan η_x seluruhnya di $U \cap V$.
3. Jika $x \in U \setminus V$, pilih $a_x \in A \cap U$ dan η_x di U .
4. Jika $x \in V \setminus U$, pilih $a_x \in A \cap V$ dan η_x di V .

Karena $U \cup V = X$, daftar itu mencakup semua titik. Mendahulukan irisan memastikan bahwa pilihan yang dipakai pada U dan V benar-benar sama pada $U \cap V$.

Definisikan functor

$$R_X: \Pi_1(X) \longrightarrow \Pi_1(X, A)$$

pada objek dengan $R_X(x) = a_x$. Untuk morfisma yang diwakili lintasan $\gamma: x \rightsquigarrow y$, tetapkan

$$R_X([\gamma]) = [\overline{\eta_x} \# \gamma \# \eta_y]: a_x \rightsquigarrow a_y,$$

di mana $\overline{\eta_x}$ adalah lintasan η_x yang ditempuh balik. Rumus ini tidak bergantung pada wakil γ , sebab mengonkatenasikan homotopi berujung tetap dengan dua lintasan tetap tetap menghasilkan homotopi berujung tetap. Lintasan $\overline{\eta_x} \# \eta_x$ dan $\eta_x \# \overline{\eta_x}$ dapat dibatalkan melalui homotopi berujung tetap. Karena itu rumus mempertahankan identitas dan komposisi, sehingga R_X memang functor.

Jika $x \in A$, pilihan η_x konstan. Jadi, untuk functor inklusi $I_X: \Pi_1(X, A) \rightarrow \Pi_1(X)$, berlaku

$$R_X \circ I_X = \text{id}_{\Pi_1(X, A)}.$$

Pilihan koheren di atas juga memastikan bahwa pembatasan R_X memberi functor

$$\begin{aligned} \Pi_1(U \cap V) &\longrightarrow \Pi_1(U \cap V, A \cap U \cap V), \\ \Pi_1(U) &\longrightarrow \Pi_1(U, A \cap U), \\ \Pi_1(V) &\longrightarrow \Pi_1(V, A \cap V), \\ \Pi_1(X) &\longrightarrow \Pi_1(X, A). \end{aligned}$$

Keempat rumus adalah pembatasan dari rumus yang sama, sehingga setiap sisi penghubung pada kubus komutatif benar-benar komutatif. Pada setiap simpul, komposit retraksi setelah inklusi adalah identitas. Maka persegi relatif adalah retrak di $\mathbf{Gpd}^\square$ dari persegi pushout Teorema 11.1. Lemma 12.1 sekarang menunjukkan bahwa persegi relatif juga merupakan pushout.

12.3 Dari pushout grupoid ke pushout grup

Kita ingin memakai pushout grup karena dalam beberapa kasus objek itu lebih mudah dihitung. Akan tetapi, Teorema 12.1 menyatakan pushout grupoid. Bahkan jika kita memakai grupoid satu objek yang berasal dari grup, masih harus diperiksa bahwa sifat universal di $\mathbf{Gpd}$ menyiratkan sifat universal di $\mathbf{Grp}$. Hal itu mengikuti dari lemma kategoris berikut.

Lemma 12.2 (pushout dalam subkategori penuh). Misalkan $\mathcal{C}$ suatu kategori dan $\mathcal{D} \hookrightarrow \mathcal{C}$ suatu subkategori penuh. Misalkan persegi komutatif di $\mathcal{D}$

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ g \downarrow & & \downarrow b \\ C & \xrightarrow{c} & P \end{array}$$

merupakan persegi pushout ketika dipandang di $\mathcal{C}$. Maka persegi itu juga merupakan persegi pushout di $\mathcal{D}$.

Diagram 12.4 (data pushout pada lemma subkategori). Keempat objek A, B, C, P berada di $\mathcal{D}$. Daftar panahnya adalah

$$f: A \rightarrow B, \quad g: A \rightarrow C, \quad b: B \rightarrow P, \quad c: C \rightarrow P,$$

dan komutativitas berarti $b \circ f = c \circ g$. Hipotesis mengatakan bahwa untuk setiap objek target di $\mathcal{C}$, persegi ini mempunyai sifat universal pushout; kesimpulan hanya membatasi objek target dan morfisma ke $\mathcal{D}$.

Bukti. Kita memeriksa sifat universal di $\mathcal{D}$. Ambil persegi komutatif sebarang di $\mathcal{D}$

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ g \downarrow & & \downarrow u \\ C & \xrightarrow{v} & Q, \end{array}$$

jadi $u \circ f = v \circ g$. Huruf Q dipakai untuk objek kanan bawah agar tidak tertukar dengan nama kategori $\mathcal{D}$.

Diagram 12.5 (kocone uji dalam subkategori penuh). Data linear diagram adalah $f: A \rightarrow B$, $g: A \rightarrow C$, $u: B \rightarrow Q$, dan $v: C \rightarrow Q$, semuanya di $\mathcal{D}$, dengan persamaan kompatibilitas $u \circ f = v \circ g$. Sifat universal harus menghasilkan tepat satu $k: P \rightarrow Q$ dengan $k \circ b = u$ dan $k \circ c = v$.

Pandang data itu di kategori ambient $\mathcal{C}$. Karena persegi dengan sudut P adalah pushout di $\mathcal{C}$, terdapat tepat satu morfisma

$$k: P \longrightarrow Q$$

di $\mathcal{C}$ dengan $k \circ b = u$ dan $k \circ c = v$. Kedua objek P, Q berada di $\mathcal{D}$, dan $\mathcal{D}$ penuh di $\mathcal{C}$. Karena itu k adalah morfisma di $\mathcal{D}$; persamaan kedua segitiga tetap berlaku di sana. Jika $\ell: P \rightarrow Q$ adalah morfisma lain di $\mathcal{D}$ yang memenuhi kedua persamaan, maka ℓ juga morfisma di $\mathcal{C}$. Keunikan ambient memberi $\ell = k$. Jadi sifat universal berlaku di $\mathcal{D}$.

Functor

$$\mathbf{B}: \mathbf{Grp} \longrightarrow \mathbf{Gpd}$$

mengirim sebuah grup ke grupoid satu objeknya. Functor ini sepenuhnya setia. Dengan mengidentifikasi $\mathbf{Grp}$ dengan citra esensialnya, yaitu subkategori penuh grupoid satu objek, kita dapat menerapkan Lemma 12.2. Secara khusus, untuk ruang bertitik (Y, x) terdapat identifikasi alami

$$\Pi_1(Y, \{x\}) \cong \mathbf{B}\pi_1(Y, x).$$

Akibat 12.1 (Seifert–van Kampen untuk grup fundamental). Misalkan X terhubung lintasan, $\{U, V\}$ sampul X oleh lingkungan yang masing-masing terhubung lintasan, dan $U \cap V$ terhubung lintasan. Untuk $x \in U \cap V$, persegi

$$\begin{array}{ccc}
\pi_1(U \cap V, x) & \longrightarrow & \pi_1(V, x) \\
\downarrow & & \downarrow \\
\pi_1(U, x) & \longrightarrow & \pi_1(X, x)
\end{array}$$

merupakan persegi pushout di **Grp**.

Diagram 12.6 (fungsi persegi grup fundamental). Keempat homomorfisma diinduksi oleh inklusi ruang bertitik. Dua panah keluar dari $\pi_1(U \cap V, x)$ memandang loop yang sama masing-masing di U dan V . Dua panah berikutnya memandang loop-loop itu di X . Komutativitas menyatakan bahwa kedua cara memasukkan loop irisan ke X menghasilkan kelas loop yang sama.

Bukti. Ambil $A = \{x\}$ dalam Teorema 12.1. Keterhubungan lintasan X, U, V , dan $U \cap V$ memastikan semua syarat pasangan relatif terpenuhi. Kita memperoleh persegi pushout dari grupoid satu objek. Lemma 12.2, setelah identifikasi melalui **B**, menjadikannya persegi pushout grup.

Jadi sekarang kita perlu mengetahui seperti apa pushout grup itu.

12.4 Contoh: grup fundamental sfera

Contoh 12.2 (sfera berdimensi lebih dari satu). Ambil $n > 1$. Sampuli S^n dengan

$$U = S^n \setminus \{N\}, \quad V = S^n \setminus \{S\},$$

di mana N dan S adalah dua titik antipodal, yaitu kutub Utara dan kutub Selatan. Kedua subruang itu terbuka dan $U \cup V = S^n$, jadi keduanya memang membentuk sampul oleh lingkungan. Kita mempunyai ekuivalensi homotopi

$$U \cap V \simeq S^{n-1} \times (-1, 1).$$

Karena $n > 1$, sfera S^{n-1} terhubung lintasan; demikian pula $U \cap V$. Ruang U dan V juga terhubung lintasan, sebagaimana terlihat dari proyeksi stereografik di bawah. Jadi Akibat 12.1 dapat diterapkan. Pilih titik basis

$$x \in S^{n-1} \subset U \cap V.$$

Proyeksi stereografik memberi

$$U \simeq \mathbb{R}^n \simeq V.$$

Kedua ruang U dan V kontraktibel, maka grup fundamentalnya trivial:

$$\pi_1(U, x) = 1 = \pi_1(V, x).$$

Teorema Seifert–van Kampen karena itu memberi persegi pushout

$$\begin{array}{ccc}
\pi_1(S^{n-1} \times (-1, 1), x) & \longrightarrow & 1 \\
\downarrow & & \downarrow \\
1 & \longrightarrow & \pi_1(S^n, x).
\end{array}$$

Diagram 12.7 (pembacaan semantik pushout sfera). Kedua panah keluar dari $\pi_1(S^{n-1} \times (-1, 1), x)$ adalah homomorfisma unik ke grup trivial. Kedua panah dari grup trivial masuk ke $\pi_1(S^n, x)$. Untuk menguji pushout, pilih grup sebarang K dan pasangan homomorfisma

$$1 \longrightarrow K \longleftarrow 1.$$

Pasangan itu unik dan otomatis kompatibel pada grup kiri atas. Karena itu sifat universal memaksa adanya tepat satu homomorfisma $\pi_1(S^n, x) \rightarrow K$.

Satu-satunya grup yang mempunyai tepat satu homomorfisma ke setiap grup lain adalah grup trivial. Memang, jika sebuah grup P mempunyai sifat itu, kedua homomorfisma $P \rightarrow P$ berupa identitas dan homomorfisma trivial harus sama; jadi setiap unsur P adalah identitas. Dengan demikian

$$\pi_1(S^n, x) = 1$$

untuk setiap $n > 1$.

Argumen ini gagal untuk $n = 1$. Sampul yang sama menghasilkan

$$U \cap V \simeq S^0 \times (-1, 1),$$

yakni gabungan saling lepas dua interval. Irisan itu tidak terhubung lintasan, sehingga hipotesis Akibat 12.1 tidak terpenuhi. Kegagalan ini hanya mengenai versi grup satu objek; Teorema 11.1 dalam bentuk grupoid tetap berlaku bagi sampul oleh lingkungan tersebut.

Batas sumber. Kalimat sebelumnya adalah isi terakhir Notes.tex baris 2726. Baris 2727 memulai Kuliah 13. Unit ini tidak menerjemahkan, merangkum, atau memakai materi setelah batas tersebut.

Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Bagian ini menutup satu latihan eksplisit dan tiga kelompok keterampilan yang dipakai oleh sumber. Semua solusi hanya mengembangkan data dan argumen unit ini.

Pemeriksaan penguasaan 12.1 (dari pertukaran sel ke functor universal).

1. Jelaskan mengapa mengganti satu rute “kanan lalu atas” dengan “atas lalu kanan” pada sebuah sel tidak mengandaikan invariansi homotopi global yang sedang dibuktikan.
2. Buktikan hukum komposisi K_1 memakai partisi subordinat.
3. Misalkan $L: \Pi_1(X) \rightarrow \Gamma$ mempunyai pembatasan F dan G . Buktikan langsung bahwa $L = K$.

12.5 Solusi Pemeriksaan 12.1

Setiap sel dipetakan seluruhnya ke satu subruang, katakan U . Kedua rute batas sel karena itu mewakili morfisma yang sama di $\Pi_1(U)$ melalui homotopi persegi lokal dari Unit 11. Menerapkan functor yang sudah diberikan, F , menghasilkan nilai yang sama. Jika citra sel berada di V , gunakan G . Jadi langkah lokal hanya memakai functorialitas F atau G yang sudah tersedia; ia belum memakai functor global K ataupun invariansi global $\widetilde{K}_1$.

Untuk $\alpha: x \rightsquigarrow y$ dan $\beta: y \rightsquigarrow z$, pilih partisi subordinat

$$\alpha \simeq \alpha_0 \# \cdots \# \alpha_m, \quad \beta \simeq \beta_0 \# \cdots \# \beta_n.$$

Setelah skala parameter kedua partisi disesuaikan, daftar ruas gabungan

$$\alpha_0, \dots, \alpha_m, \beta_0, \dots, \beta_n$$

adalah partisi subordinat bagi $\alpha \# \beta$. Maka definisi dan kemandirian partisi memberi

$$\begin{aligned} K_1([\alpha][\beta]) &= \prod_{i=0}^m \widetilde{K}_1(\alpha_i) \prod_{j=0}^n \widetilde{K}_1(\beta_j) \\ &= K_1([\alpha])K_1([\beta]). \end{aligned}$$

Terakhir, pembatasan memaksa $L_0 = K_0$ karena $U \cup V = X$. Untuk setiap $[\alpha]$, subdivisi di atas menulis morfisma itu sebagai komposit morfisma yang masing-masing berasal dari $\Pi_1(U)$ atau $\Pi_1(V)$. Pada setiap faktor, L dipaksa sama dengan F atau G , dan nilai itu persis faktor yang mendefinisikan K . Fungtorialitas memaksa kesamaan pada seluruh komposit. Jadi $L_1 = K_1$ dan $L = K$.

Pemeriksaan penguasaan 12.2 (Latihan Sumber 12.1: retrak pushout). Misalkan persegi S merupakan retrak dari persegi pushout T di $\mathcal{C}^\square$. Tuliskan morfisma inklusi $i: S \rightarrow T$ dan retraksi $r: T \rightarrow S$, dengan $r \circ i = \text{id}_S$ pada setiap simpul. Buktikan bahwa S memenuhi sifat universal pushout.

12.6 Solusi Pemeriksaan 12.2

Tuliskan persegi retrak S sebagai

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ g \downarrow & & \downarrow b \\ C & \xrightarrow{c} & P, \end{array}$$

dan beri tanda prima pada keempat objek serta panah persegi pushout T . Komponen morfisma kubus ditulis i_A, i_B, i_C, i_P dan r_A, r_B, r_C, r_P .

Ambil kocone kompatibel $u: B \rightarrow Z$ dan $v: C \rightarrow Z$, jadi $u \circ f = v \circ g$. Pascakomposisi komponen retraksi menghasilkan kocone pada T ,

$$u \circ r_B: B' \rightarrow Z, \quad v \circ r_C: C' \rightarrow Z.$$

Komutativitas kubus dan kompatibilitas kocone awal memberi

$$u \circ r_B \circ f' = u \circ f \circ r_A = v \circ g \circ r_A = v \circ r_C \circ g'.$$

Karena T pushout, terdapat tepat satu $q': P' \rightarrow Z$ yang memperluas kocone ini. Definisikan

$$q := q' \circ i_P: P \rightarrow Z.$$

Komutativitas kubus dan $r_B \circ i_B = \text{id}_B$ memberi

$$q \circ b = q' \circ b' \circ i_B = u \circ r_B \circ i_B = u,$$

dan cara yang sama memberi $q \circ c = v$.

Untuk keunikan, andaikan $w: P \rightarrow Z$ juga memperluas u, v . Maka $w \circ r_P: P' \rightarrow Z$ memperluas $u \circ r_B$ dan $v \circ r_C$. Keunikan pushout T memberi $w \circ r_P = q'$. Akibatnya

$$w = w \circ r_P \circ i_P = q' \circ i_P = q.$$

Jadi S adalah persegi pushout.

Pemeriksaan penguasaan 12.3 (retraksi grupoid dan koherensi kubus).

1. Dalam Contoh 12.1, pilih $a_x \in A'$ dan $\eta_x: x \rightsquigarrow a_x$ untuk setiap $x \in A$, dengan pilihan konstan pada A' . Bangun retraksi $R: \Pi_1(X, A) \rightarrow \Pi_1(X, A')$.
2. Periksa identitas, komposisi, dan persamaan retraksi.
3. Jelaskan mengapa pilihan berprioritas pada irisan dalam bukti Teorema 12.1 membuat keempat retraksi menjadi satu morfisma di **Gpd**. $\square$.

12.7 Solusi Pemeriksaan 12.3

Definisikan $R(x) = a_x$ dan

$$R([\gamma: x \rightsquigarrow y]) = [\overline{\eta_x} \# \gamma \# \eta_y].$$

Jika γ diganti oleh lintasan yang homotopik berujung tetap, rumus itu memberi kelas yang sama setelah jalur tetap ditempelkan di kedua ujung. Untuk identitas di x , lintasan $\overline{\eta_x} \# c_x \# \eta_x$ homotopik dengan lintasan konstan di a_x . Untuk lintasan berurutan $\gamma: x \rightsquigarrow y$ dan $\lambda: y \rightsquigarrow z$, komposit citranya mempunyai bagian tengah

$$\eta_y \# \overline{\eta_y},$$

yang homotopik berujung tetap dengan lintasan konstan di y . Setelah bagian itu dibatalkan, tersisa

$$[\overline{\eta_x} \# \gamma \# \lambda \# \eta_z] = R([\gamma][\lambda]).$$

Maka R fungtor. Jika $x \in A'$, $a_x = x$ dan η_x konstan. Pada objek dan morfisma yang seluruh titik ujungnya berada di A' , komposit

$$\Pi_1(X, A') \longrightarrow \Pi_1(X, A) \xrightarrow{R} \Pi_1(X, A')$$

adalah identitas. Jadi ini benar-benar retraksi.

Dalam Teorema 12.1, satu pilihan pada $x \in U \cap V$ dipakai sekaligus untuk pembatasan ke U , V , dan $U \cap V$. Karena rumus objek serta morfismanya sama sebelum dan sesudah pembatasan, empat persegi samping kubus komutatif secara ketat. Pilihan terpisah tanpa prioritas irisan hanya akan menghasilkan retraksi individual dan tidak menjamin komutativitas kubus.

Pemeriksaan penguasaan 12.4 (subkategori penuh dan sfera).

1. Dalam Lemma 12.2, tunjukkan tepat di mana kepenuhan $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{C}$ dipakai untuk keberadaan, dan tepat di mana sifat pushout ambient dipakai untuk keunikan.
2. Buktikan langsung bahwa pushout dari diagram grup $1 \leftarrow H \rightarrow 1$ adalah grup trivial, untuk grup sebarang H .
3. Jelaskan mengapa jawaban bagian 2 menghitung $\pi_1(S^n, x)$ untuk $n > 1$ tetapi argumen sampel yang sama tidak boleh dipakai untuk S^1 .

12.8 Solusi Pemeriksaan 12.4

Pushout ambient mula-mula menghasilkan morfisma universal $k: P \rightarrow Q$ di $\mathcal{C}$. Kepenuhan dipakai karena P, Q adalah objek $\mathcal{D}$: setiap morfisma ambient di antara keduanya, termasuk k , juga merupakan morfisma $\mathcal{D}$. Untuk keunikan, calon lain di $\mathcal{D}$ dipandang sebagai morfisma di $\mathcal{C}$, lalu keunikan pushout ambient memaksanya sama dengan k .

Sekarang ambil diagram $1 \leftarrow H \rightarrow 1$. Untuk setiap grup K , hanya ada satu homomorfisma dari 1 ke K , sehingga hanya ada satu kocone

$$1 \longrightarrow K \longleftarrow 1,$$

dan kompatibilitas pada H otomatis. Grup trivial 1 mempunyai tepat satu homomorfisma ke K , jadi ia mewakili sifat universal pushout. Keunikan pushout hingga isomorfisma memberi bahwa pushout diagram tersebut adalah grup trivial.

Untuk $n > 1$, U , V , dan $U \cap V \simeq S^{n-1} \times (-1, 1)$ semuanya terhubung lintasan. Akibat 12.1 mengubah sampul sfera menjadi tepat diagram grup pada bagian 2, sehingga $\pi_1(S^n, x) = 1$. Untuk $n = 1$, irisan setara dengan dua interval yang saling lepas. Hipotesis keterhubungan lintasan pada irisan gagal, maka Akibat 12.1 tidak menghasilkan diagram satu-objek itu; menerapkan hasil bagian 2 pada diagram yang tidak disediakan oleh teorema akan menjadi langkah yang tidak sah.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts, © 2019 David Michael Roberts, tepatnya [Notes.tex baris 2727–3046 pada commit b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#) dari repositori [DavidMichaelRoberts/AlgebraicTopology2019](#). Rentang itu dimulai dengan penanda Kuliah 13 dan berakhir dengan judul bagian “Mengklasifikasikan ruang pelapis” serta baris kosong sesudahnya. Kuliah 14 dimulai di tengah berkas sumber pada baris 3047 dan tidak termasuk dalam unit ini. Materi sumber dan adaptasi Indonesia ini tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan edisi mencakup penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, dan pemindahan kesebelas catatan pinggir ke urutan bacaan utama. Kesebelas diagram Xy-pic dan kedua gambar TikZ sumber ditulis ulang sebagai diagram semantik dan daftar panah lengkap. Pada gambar yang semula membedakan faktor hanya melalui warna dan posisi, setiap panah kini diberi tag faktor Γ atau H , sumber, dan sasaran; maknanya tidak lagi bergantung pada warna atau tata letak.

Sejumlah cacat matematis sumber diperbaiki secara independen. Matriks kedua pada contoh grup modular bertindak melalui $z \mapsto (z - 1)/z$, bukan $z \mapsto (1 - z)/z$; hasil bagi bidang setengah atas juga bukan ruang pelapis biasa karena aksi memiliki penstabil eliptik. Pada konstruksi pushout grupoid, peran $F: \Lambda \rightarrow H$ dan $G: \Lambda \rightarrow \Gamma$ yang tertukar dikembalikan ke tipe yang benar. Contoh relasi dan beberapa kata sumber yang tidak dapat dikomposisikan diganti oleh kata sejajar yang dapat dikomposisikan, dan hasil bagi dibentuk oleh kongruensi grupoid terkecil, bukan sekadar relasi ekuivalensi terpisah yang belum dijamin kompatibel dengan komposisi. Pada contoh lingkaran, arah γ dan η dipulihkan sehingga generator kronologisnya adalah $\gamma\eta$.

Istilah “join” pada sumber dikoreksi menjadi *baji*, sesuai simbol $\vee$ dan konstruksi yang benar-benar dipakai. Penerapan Seifert–van Kampen untuk baji diberi hipotesis keterhubungan lintasan yang diperlukan. Peta pelekatan kompleks presentasi dinyatakan oleh kelas loop $[f_i] = R_i$, bukan persamaan tak bertipe $f_i(1) = R_i$; penggunaan lingkungan berkerah dan topologi CW/lemah (*weak topology*) juga dibuat eksplisit. Salah tik $F_n\langle \cdots \rangle$, $\Pi(\cdots)$, “Seiert”, “coutable”, dan “preceeding” dinormalkan. Placeholder gambar oktagon sumber diganti dengan deskripsi sisi berarah yang lengkap.

Sumber memuat dua latihan tanpa solusi. Pendamping penguasaan yang jelas ditandai sebagai materi asli edisi memberi solusi lengkap untuk keduanya dan untuk keterampilan yang belum diuji: presentasi amalgamasi, reduksi kata grupoid, sifat universal, perhitungan lingkaran, hipotesis baji, relasi yang dibunuh oleh sel-2, dan kata permukaan genus- g . Materi pendamping itu juga tersedia di bawah CC BY 4.0 dan tidak meminjam solusi eksternal. Edisi ini bersifat independen; edisi ini tidak disponsori, didukung, disahkan, ataupun diberi status resmi oleh David Michael Roberts, MIT, Haynes Miller, Sanath Devalapurkar, Yeheli Fomberg, Nir Lazarovich, atau institusi mereka.

13 Kuliah 13

Sepanjang unit ini, produk panah $\alpha\beta$ dibaca **kronologis**: α ditempuh dahulu, lalu β . Sebaliknya, tanda komposisi fungsi tetap memakai konvensi baku kanan-ke-kiri: $g \circ f$ berarti menerapkan f dahulu, lalu g .

13.1 Produk bebas dengan amalgamasi

Definisi 13.1 (produk bebas dengan amalgamasi). Misalkan diberikan sepasang homomorfisma

$$G \xleftarrow{\phi} L \xrightarrow{\psi} H.$$

Produk bebas dengan amalgamasi adalah grup

$$G *_L H := (G * H) / \langle\langle \phi(x)\psi(x)^{-1} : x \in L \rangle\rangle,$$

di mana kurung ganda menyatakan subgrup normal terkecil dari $G * H$ yang memuat semua unsur $\phi(x)\psi(x)^{-1}$. Homomorfisma kanonik

$$G \longrightarrow G *_L H \longleftarrow H$$

membuat $G *_L H$ memenuhi sifat universal pushout di **Grp**. Dengan kata lain, untuk setiap homomorfisma $u: G \rightarrow K$ dan $v: H \rightarrow K$ dengan

$$u \circ \phi = v \circ \psi,$$

terdapat tepat satu $k: G *_L H \rightarrow K$ yang membatasi menjadi u pada G dan v pada H .

Misalkan

$$G = \langle g_1, \dots, g_m \mid R_1, \dots, R_n \rangle, \quad H = \langle h_1, \dots, h_k \mid Q_1, \dots, Q_l \rangle.$$

Maka

$$G *_L H \cong \langle g_1, \dots, g_m, h_1, \dots, h_k \mid R_1, \dots, R_n, Q_1, \dots, Q_l, \phi(x)\psi(x)^{-1} = e \ (x \in L) \rangle.$$

Tambahkan satu relasi untuk setiap $x \in L$, atau cukup untuk setiap x dalam suatu himpunan pembangkit L . Relasi itu ekuivalen dengan $\phi(x) = \psi(x)$, sehingga persegi kanonik memang komutatif. Keterangan pinggir sumber menekankan bahwa uraian melalui presentasi ini tetap berlaku untuk grup yang tidak mempunyai presentasi berhingga: daftar pembangkit dan relasinya boleh tak berhingga.

Contoh 13.1 (grup satu-relator). Pertimbangkan grup satu-relator yang dibangun secara berhingga

$$G = \langle g_1, \dots, g_m \mid R = e \rangle,$$

di mana R adalah unsur grup bebas F_m pada $g_1, \dots, g_m$. Grup itu merupakan pushout pada Diagram 13.1. Keterangan pinggir sumber mencatat bahwa grup satu-relator penting dalam teori grup geometrik dan banyak hasil telah diketahui tentangnya.

Diagram 13.1 (pushout untuk satu relator). Diagram semantiknya adalah

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \xrightarrow{!} & 1 \\ r \downarrow & & \downarrow \\ F_m & \longrightarrow & G, \end{array}$$

dengan $r: \mathbb{Z} \rightarrow F_m$ ditentukan oleh $r(1) = R$ dan $!$ satu- satunya homomorfisma ke grup trivial. Pushout memaksa citra R menjadi identitas, jadi sudut kanan bawah adalah $F_m/\langle\langle R \rangle\rangle \cong G$.

Sebagai contoh yang lebih khusus, grup permukaan berorientasi tertutup genus g mempunyai presentasi

$$\left\langle a_1, \dots, a_g, b_1, \dots, b_g \mid \prod_{i=1}^g [a_i, b_i] = e \right\rangle.$$

Di sini $[a, b] = aba^{-1}b^{-1}$.

Secara lebih umum lagi, setiap grup yang dipresentasikan secara berhingga merupakan pushout pada diagram berikut.

Diagram 13.2 (pushout untuk presentasi berhingga). Ambil

$$F_n = \langle a_1, \dots, a_n \mid \rangle,$$

dan homomorfisma $r: F_n \rightarrow F_m$ yang ditentukan oleh kata relator $r(a_1), \dots, r(a_n)$. Maka

$$\begin{array}{ccc} F_n & \xrightarrow{!} & 1 \\ r \downarrow & & \downarrow \\ F_m & \longrightarrow & \langle g_1, \dots, g_m \mid r(a_1) = e, \dots, r(a_n) = e \rangle \end{array}$$

adalah persegi pushout. Panah atas membunuh semua pembangkit a_i , sehingga pushout membagi F_m dengan penutupan normal semua $r(a_i)$.

Catatan 13.1 (grup modular dan koreksi ruang pelapis). Contoh terkenal produk bebas adalah

$$\mathbb{Z}/2 * \mathbb{Z}/3 \cong \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}),$$

dengan

$$\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})/\{\pm I\}, \quad \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) = \{A \in M_2(\mathbb{Z}) : \det A = 1\}.$$

Satu presentasi memakai kelas kedua matriks

$$S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix};$$

matriks kedua ditulis ST dalam sumber. Di $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ keduanya memenuhi

$$S^2 = I, \quad B^3 = I.$$

Bahwa relasi-relasi ini memberi seluruh presentasi tidak langsung jelas. Catatan pinggir sumber merujuk Roger C. Alperin, “ $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}_2 * \mathbb{Z}_3$,” *The American Mathematical Monthly* 100, no. 4 (April 1993), 385–386, [doi:10.2307/2324963](https://doi.org/10.2307/2324963).

Grup modular bertindak kontinu pada bidang setengah atas

$$\mathcal{H} = \{z \in \mathbb{C} : \text{Im } z > 0\}$$

melalui transformasi linear pecahan. Untuk dua matriks di atas,

$$S(z) = -\frac{1}{z}, \quad B(z) = \frac{z-1}{z}.$$

Di sini sumber mencetak $(1-z)/z$, yang bukan transformasi matriks B . Selain itu, orbit-orbit diskret saja tidak cukup untuk membuat $\mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}/\text{PSL}_2(\mathbb{Z})$ suatu ruang pelapis. Sebagai contoh, kelas S bukan identitas tetapi menetapkan $i \in \mathcal{H}$. Jadi aksi tidak bebas dan peta hasil bagi bukan peta pelapis biasa pada titik eliptik; interpretasi yang tepat adalah hasil bagi orbifold (dan peta pelapis biasa baru diperoleh setelah titik bercabang ditangani atau grup bebas-torsi yang sesuai dipakai).

13.2 Pushout grupoid sebagai kata panah

Setelah memperoleh perlakuan konkret bagi pushout grup sebagai produk bebas dengan amalgamasi, wajar mengharapkan perlakuan serupa bagi grupoid. Hal itu memang dapat dilakukan: morfisma pushout grupoid diwakili oleh kata-kata dalam morfisma grupoid yang diberikan. Namun, tidak seperti kata dalam unsur grup, rangkaian panah hanya bermakna bila sasaran setiap panah sama dengan sumber panah berikutnya.

Kita tidak akan membangun pushout grupoid dalam keumuman penuh. Kita akan menguraikan kasus khusus yang muncul dari teorema Seifert–van Kampen.

Contoh 13.2 (bentuk yang berasal dari Seifert–van Kampen). Misalkan X suatu ruang, $\{U, V\}$ sampul X oleh lingkungan, dan $A \subseteq U \cap V$ sedemikian sehingga setiap komponen lintasan dari U , V , dan $U \cap V$ memuat sedikitnya satu titik A . Karena setiap titik $X = U \cup V$ berada di salah satu dari U , V , syarat itu juga memastikan bahwa setiap komponen lintasan X bertemu A . Teorema Seifert–van Kampen relatif dari Unit 12 memberi persegi pushout pada Diagram 13.3.

Diagram 13.3 (pushout grupoid fundamental dengan objek tetap). Semua panah diinduksi oleh inklusi ruang:

$$\begin{array}{ccc} \Pi_1(U \cap V, A) & \xrightarrow{i_V} & \Pi_1(V, A) \\ i_U \downarrow & & \downarrow \\ \Pi_1(U, A) & \longrightarrow & \Pi_1(X, A). \end{array}$$

Keempat grupoid mempunyai himpunan objek yang sama, yaitu A , dan setiap funktor pada diagram adalah identitas pada objek; misalnya $i_U(a) = a$. Komutativitas berarti bahwa kelas lintasan di $U \cap V$ mempunyai citra yang sama setelah dipandang di X melalui salah satu dari dua rute.

Dalam bukti Seifert–van Kampen, sebuah lintasan di X dinyatakan sebagai komposit ruas-ruas yang bergantian berada di U dan V . Secara aljabar, itulah situasi yang hendak dihitung. Untuk menyederhanakan notasi, sumber membatasi perhatian pada A berhingga, sebagaimana lazim terjadi dalam perhitungan contoh yang cukup teratur.

Sekarang misalkan diberikan diagram grupoid berikut.

Diagram 13.4 (span grupoid yang akan didorong keluar). Data panahnya adalah

$$\Lambda \xrightarrow{F} H, \quad \Lambda \xrightarrow{G} \Gamma.$$

Secara visual, sumber menaruh H di kanan dan Γ di bawah:

$$\begin{array}{ccc} \Lambda & \xrightarrow{F} & H \\ G \downarrow & & \\ \Gamma & & \end{array}$$

Huruf H di sini adalah huruf Latin kapital, bukan huruf Yunani eta η ; itulah keterangan pinggir sumber pada diagram ini.

Andaikan ketiga grupoid mempunyai himpunan objek berhingga yang sama,

$$A = \{a_1, \dots, a_N\},$$

dan komponen objek F serta G adalah fungsi identitas. Kita hendak membangun grupoid $\Gamma *_\Lambda H$ yang melengkapi span tersebut menjadi persegi pushout. Himpunan objeknya kembali A , sedangkan fungtor kanonik

$$\Gamma \longrightarrow \Gamma *_\Lambda H \longleftarrow H$$

adalah identitas pada objek.

Setiap grupoid—bahkan setiap kategori—mempunyai graf dasar berarah yang objek-objeknya menjadi simpul dan setiap morfismanya menjadi sisi. Loop dan beberapa sisi dengan pasangan titik ujung sama diperbolehkan. Untuk skema kata di sini, hapus sisi identitas dan pandang graf itu sebagai graf berarah dengan involusi: dari setiap pasangan $\{\alpha, \alpha^{-1}\}$ cukup satu orientasi yang digambar, sedangkan penelusuran balik mewakili inversnya. Jadi sisi yang **digambar** tidak diklaim sama secara harfiah dengan seluruh morfisma nonidentitas. Dari Γ dan H , bentuk $\mathcal{G}$ memakai gabungan saling lepas sisi terpilih kedua faktor pada simpul A . Alih-alih mengandalkan warna sumber, kita beri setiap sisi tag $[\Gamma]$ atau $[H]$; huruf pada kata tetap merupakan morfisma sebenarnya dalam faktor terkait.

Diagram 13.5 (daftar semantik seluruh sisi pada graf sumber). Gambar sumber mempunyai enam simpul $a_1, \dots, a_6$ dan sisi-sisi berikut:

$$\begin{array}{ll} [\Gamma] & \gamma_1: a_1 \rightarrow a_2, \quad [H] \eta_2: a_2 \rightarrow a_1, \\ [\Gamma] & \gamma_3: a_2 \rightarrow a_4, \quad [H] \eta_1: a_2 \rightarrow a_4, \\ [\Gamma] & \gamma_2: a_4 \rightarrow a_5, \quad [H] \eta_3: a_5 \rightarrow a_5, \\ [\Gamma] & \gamma_4: a_5 \rightarrow a_2, \quad [H] \eta_4: a_3 \rightarrow a_6, \\ [\Gamma] & \gamma_5: a_3 \rightarrow a_3, \quad [\Gamma] \gamma_6: a_6 \rightarrow a_6. \end{array}$$

Setiap sisi dapat ditempuh balik untuk memperoleh panah invers. Tidak ada sisi lain pada ilustrasi, walaupun grupoid tentu juga mempunyai identitas dan komposit. Catatan pinggir sumber bermaksud memberi contoh komposit yang tidak digambar; kata tercetak $\gamma_3\gamma_1\gamma_2$ tidak bertipe. Dengan konvensi kronologis, contoh yang dapat dikomposisikan adalah

$$\gamma_1\gamma_3\gamma_2: a_1 \longrightarrow a_5.$$

Mulailah dengan grupoid $\Gamma *_\Lambda H$, di mana $\Lambda_0 = \text{Disc}(A)$ adalah grupoid diskret pada himpunan objek yang sama. Morfismanya dapat diwakili oleh kata berhingga

$$\alpha_1\alpha_2 \cdots \alpha_r$$

yang dapat dikomposisikan dan bergantian antara panah nonidentitas Γ dan panah nonidentitas H . Kata kosong di objek a mewakili 1_a . Jika dua panah bersebelahan berasal dari faktor yang sama,

komposisikan keduanya di faktor itu; jika hasilnya identitas, hapus hasil tersebut. Dengan reduksi ini, contoh kata dari Diagram 13.5 adalah

$$\gamma_3^{-1}\eta_1\gamma_2\eta_3^5\gamma_4: a_4 \longrightarrow a_2$$

dan

$$\eta_4\gamma_6^{-3}\eta_4^{-1}: a_3 \longrightarrow a_3.$$

Jika Λ memang sudah diskret, konstruksi ini selesai; sebagaimana dicatat di pinggir sumber, keadaan itu adalah analog produk bebas grup. Untuk Λ umum, masih harus ditambahkan relasi. Bagi setiap $\lambda: a \rightarrow b$ dalam Λ , identifikasikan panah sejajar

$$G(\lambda) \in \Gamma(a, b) \quad \text{dan} \quad F(\lambda) \in H(a, b).$$

Karena F mendarat di H dan G mendarat di Γ , urutan ini memperbaiki penandaan faktor yang tertukar dalam sumber. Bentuk hasil bagi dengan **kongruensi grupoid terkecil** yang memuat semua identifikasi itu: relasi ekuivalensi pada setiap hom-set harus tetap berlaku setelah prakomposisi, pascakomposisi, dan pengambilan invers. Hasilnya adalah $\Gamma *_\Lambda H$.

Sebagai contoh yang bertipe benar pada Diagram 13.5, andaikan $\lambda: a_2 \rightarrow a_4$ memenuhi

$$G(\lambda) = \gamma_3, \quad F(\lambda) = \eta_1.$$

Relasi $\gamma_3 = \eta_1$ lalu memberi

$$\gamma_3^{-1}\eta_1\gamma_2\eta_3^5\gamma_4 = \gamma_2\eta_3^5\gamma_4.$$

Formula sumber memakai $F(\lambda) = \gamma_1$ dan $G(\lambda) = \eta_1$, padahal kedua ruas bukan saja berada di faktor yang salah, melainkan mempunyai pasangan sumber–sasaran yang berbeda; formula turunannya juga tidak dapat dikomposisikan. Kesamaan di atas mempertahankan maksud contoh sambil memperbaiki kedua cacat. Komposisi dalam $\Gamma *_\Lambda H$ dilakukan dengan mengonkatenasikan kata, mereduksi panah-panah bersebelahan dari faktor yang sama, lalu menerapkan kongruensi.

Latihan Sumber 13.1. Buktikan bahwa konstruksi di atas membuat $\Gamma *_\Lambda H$ menjadi grupoid.

Jika yang hendak dihitung hanya grup morfisma dari satu objek a_i ke dirinya sendiri—seperti ketika menghitung grup fundamental melalui Seifert–van Kampen grupoid—cukup perhatikan kata yang berawal dan berakhir di a_i .

13.3 Contoh lingkaran

Contoh 13.3 (menghitung grup fundamental lingkaran). Pandang $S^1 \subset \mathbb{C}$ dan ambil

$$U = S^1 \setminus \{-i\}, \quad V = S^1 \setminus \{i\}, \quad A = \{+1, -1\} \subset U \cap V.$$

Ruang S^1 , U , dan V terhubung lintasan. Irisan $U \cap V$ mempunyai dua komponen lintasan, dan masing-masing memuat tepat satu titik A . Jadi data ini memenuhi hipotesis Teorema Seifert–van Kampen relatif.

Diagram 13.6 (pushout Seifert–van Kampen bagi lingkaran). Persegi pushoutnya adalah

$$\begin{array}{ccc} \Pi_1(U \cap V, \{\pm 1\}) & \longrightarrow & \Pi_1(V, \{\pm 1\}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Pi_1(U, \{\pm 1\}) & \longrightarrow & \Pi_1(S^1, \{\pm 1\}). \end{array}$$

Keempat panah diinduksi oleh inklusi; semua functor mempertahankan kedua objek $+1$ dan -1 . Subskrip 1 pada Π_1 kanan bawah memulihkan salah tik $\Pi(S^1, \{\pm 1\})$ dalam sumber; subskrip yang sama juga hilang pada penyebutan $\Pi_1(U \cap V, \{\pm 1\})$ sesudah diagram sumber.

Baik U maupun V homeomorfik dengan interval terbuka, dengan kedua titik A tetap terbedakan. Karena itu grupoid fundamental terbatasnya masing-masing isomorfik dengan grupoid kodiskret dua objek **2**. Setelah panah identitas dihilangkan dari notasi, pilih satu-satunya kelas panah

$$\gamma: +1 \longrightarrow -1 \quad \text{di } \Pi_1(U, A),$$

yang diwakili lintasan berlawanan arah jarum jam di S^1 , dan satu-satunya kelas panah

$$\eta: -1 \longrightarrow +1 \quad \text{di } \Pi_1(V, A),$$

yang juga diwakili lintasan berlawanan arah jarum jam. Jadi

$$\Pi_1(U, A) \cong (+1 \xrightleftharpoons[\gamma^{-1}]{\gamma} -1), \quad \Pi_1(V, A) \cong (-1 \xrightleftharpoons[\eta^{-1}]{\eta} +1),$$

dengan tipe panah ditentukan oleh dua tampilan sebelumnya, bukan oleh posisi label di atas atau di bawah simbol panah.

Selanjutnya,

$$\Pi_1(U \cap V, A) = \text{Disc}(\{+1, -1\}),$$

karena setiap komponen irisan kontraktibel dan memuat hanya satu objek pilihan. Jadi Λ diskret dan tidak diperlukan hasil bagi tambahan.

Diagram 13.7 (pushout yang telah disederhanakan). Tuliskan $D = \text{Disc}(\{+1, -1\})$. Diagram lengkapnya adalah

$$\begin{array}{ccc} D & \longrightarrow & (-1 \xrightleftharpoons[\eta^{-1}]{\eta} +1) \\ \downarrow & & \downarrow \\ (+1 \xrightleftharpoons[\gamma^{-1}]{\gamma} -1) & \longrightarrow & \Pi_1(S^1, \{\pm 1\}). \end{array}$$

Panah dari D adalah identitas pada objek dan hanya membawa panah identitas. Panah bawah serta kanan memasukkan masing-masing kelas γ dan η ke grupoid fundamental lingkaran.

Diagram 13.8 (graf pembangkit lingkaran tanpa sandi warna). Graf sumber yang diperlukan mempunyai tepat dua simpul dan dua sisi berarah:

$$[\Gamma = \Pi_1(U, A)] \quad +1 \xrightarrow{\gamma} -1, \quad [H = \Pi_1(V, A)] \quad -1 \xrightarrow{\eta} +1.$$

Panah balik mewakili γ^{-1} dan η^{-1} . Gambar sumber menukar label serta faktor kedua panah; daftar ini mengikuti definisi tekstual γ dan η serta membuat semua kata berikut bertipe benar.

Loop tereduksi dari $+1$ ke dirinya sendiri adalah kata kosong, suatu pangkat positif

$$(\gamma\eta)^n,$$

atau pangkat negatif yang ditulis

$$(\eta^{-1}\gamma^{-1})^n = (\gamma\eta)^{-n}, \quad n \geq 1.$$

Memang, dari +1 satu-satunya huruf pertama yang tereduksi adalah γ atau η^{-1} ; sesudah itu huruf-huruf dipaksa bergantian jika tidak terjadi pembatalan. Maka pemetaan

$$\mathbb{Z} \longrightarrow \pi_1(S^1, +1), \quad n \longmapsto (\gamma\eta)^n$$

adalah isomorfisma. Jadi

$$\pi_1(S^1, +1) \cong \mathbb{Z}.$$

Urutan $\eta\gamma$ yang tercetak dalam sumber tidak dapat dimulai di +1 dengan konvensi produk kronologis unit-unit sebelumnya; koreksi di atas memulihkan tipe sumber dan sasaran.

Latihan Sumber 13.2. Buktikan bahwa konstruksi $\Gamma *_\Lambda H$ di atas benar-benar merupakan pushout di **Gpd**.

13.4 Grup fundamental baji

Kita pertimbangkan satu variasi lagi dari Seifert–van Kampen secara ringkas, karena rinciannya serupa dengan versi-versi sebelumnya. Konstruksi yang dipakai sumber adalah **baji** $X \vee Y$, bukan join. Produk bebas grup fundamental tidak boleh langsung dinyatakan tanpa sampul dan hipotesis yang memungkinkan penerapan teorema.

Misalkan (X, x) dan (Y, y) ruang bertitik yang **terhubung lintasan**. Andaikan terdapat lingkungan

$$x \in U \subseteq X, \quad y \in V \subseteq Y$$

yang masing-masing dapat dikontraksikan ke x dan y melalui kontraksi yang menetapkan titik basis. Maka

$$\{X \vee V, U \vee Y\}$$

adalah sampul $X \vee Y$ oleh lingkungan. Irisannya adalah $U \vee V$. Catatan pinggir sumber menunjukkan bahwa kontraksi bertitik kedua faktor merakit menjadi kontraksi $U \vee V$ ke

$$* = [x] = [y].$$

Ada retraksi bertitik

$$X \vee V \longrightarrow X, \quad U \vee Y \longrightarrow Y,$$

dan kontraksi yang diberikan menunjukkan bahwa keduanya merupakan ekuivalensi homotopi. Jadi

$$\pi_1(X \vee V, *) \cong \pi_1(X, x), \quad \pi_1(U \vee Y, *) \cong \pi_1(Y, y),$$

sedangkan $\pi_1(U \vee V, *)$ trivial. Hipotesis keterhubungan lintasan pada X, Y memastikan keempat ruang dalam persegi juga terhubung lintasan, seperti yang disyaratkan versi grup Seifert–van Kampen.

Diagram 13.9 (sampul baji). Semua panah adalah inklusi ruang bertitik:

$$\begin{array}{ccc} (U \vee V, *) & \longrightarrow & (U \vee Y, *) \\ \downarrow & & \downarrow \\ (X \vee V, *) & \longrightarrow & (X \vee Y, *). \end{array}$$

Panah atas mempertahankan faktor U dan memasukkan V ke Y ; panah kiri memasukkan U ke X dan mempertahankan V . Kedua komposit mengirim setiap titik irisan ke kelas yang sama di baji penuh.

Seifert–van Kampen mengubah persegi itu menjadi pushout grup berikut.

Diagram 13.10 (pushout grup fundamental baji). Setelah memakai ekuivalensi homotopi di atas, persegi menjadi

$$\begin{array}{ccc} 1 & \longrightarrow & \pi_1(Y, y) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \pi_1(X, x) & \longrightarrow & \pi_1(X \vee Y, *). \end{array}$$

Kedua panah keluar dari 1 adalah homomorfisma unik. Karena pushout diagram $\pi_1(X, x) \leftarrow 1 \rightarrow \pi_1(Y, y)$ adalah produk bebas, panah kanan bawah mengidentifikasi sudut tersebut secara kanonik dengan produk bebas.

Dengan demikian

$$\pi_1(X \vee Y, *) \cong \pi_1(X, x) * \pi_1(Y, y).$$

Ini memperumum perhitungan

$$\pi_1(S^1 \vee S^1, *) \cong F_2 \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z}.$$

Tanpa keterhubungan lintasan X dan Y , sampul yang sama tetap dapat dianalisis dengan versi grupoid, tetapi persegi grup satu-objek di atas tidak langsung mengikuti dari Akibat Seifert–van Kampen Unit 12.

13.5 Kompleks presentasi

Fakta 13.1 (setiap grup adalah grup fundamental suatu kompleks presentasi). Diberikan presentasi berhingga

$$G = \langle g_1, \dots, g_m \mid R_1 = e, \dots, R_n = e \rangle,$$

terdapat ruang X yang diperoleh sebagai pushout pada Diagram 13.11 dan memenuhi $\pi_1(X, *) \cong G$.

Diagram 13.11 (memasang sel-2 bagi presentasi berhingga). Tuliskan

$$W_m := \bigvee_{j=1}^m S^1 = \underbrace{S^1 \vee \dots \vee S^1}_{m \text{ buah}},$$

sebagaimana dijabarkan oleh catatan pinggir sumber. Pilih peta bertitik

$$f_i: (S^1, 1) \longrightarrow (W_m, *)$$

yang kelas loopnya, di bawah isomorfisma $\pi_1(W_m, *) \cong F_m$, adalah kata R_i . Gabungkan peta-peta itu menjadi $\bigsqcup_i f_i$. Persegi pushoutnya ialah

$$\begin{array}{ccc} \bigsqcup_{i=1}^n S^1 & \longrightarrow & \bigsqcup_{i=1}^n D^2 \\ \bigsqcup_m f_i \downarrow & & \downarrow \\ \bigvee_{j=1} S^1 & \longrightarrow & X. \end{array}$$

Panah atas adalah gabungan inklusi batas $S^1 = \partial D^2 \hookrightarrow D^2$. Pushout menempelkan satu sel-2 sepanjang setiap f_i .

Persamaan sumber $f_i(1) = R_i$ tidak bertipe: ruas kiri adalah titik ruang, sedangkan ruas kanan adalah unsur grup. Pernyataan bertipe benar adalah

$$[f_i] = R_i \in \pi_1(W_m, *) \cong F_m.$$

Untuk membenarkan perhitungan dengan Seifert–van Kampen, tebalkan W_m dan bagian dalam sel-sel yang terpasang hingga menjadi sampul oleh lingkungan berkerah. Setiap cakram kontraktibel; loop pada komponen kerah batas dipetakan ke $[f_i]$. Teorema Seifert–van Kampen, atau penerapannya berturut-turut untuk tiap sel, menyatakan bahwa memasang sel-2 membagi $\pi_1(W_m, *)$ dengan penutupan normal kelas-kelas $[f_i]$. Karena itu

$$\pi_1(X, *) \cong F_m / \langle\langle R_1, \dots, R_n \rangle\rangle \cong G.$$

Ruang X adalah kompleks CW berdimensi 2: ruang itu diperoleh dengan merekatkan cakram-cakram berdimensi dua pada graf satu-dimensi. Kadang-kadang X merupakan manifold, tetapi pada umumnya tidak.

Fakta tersebut berlaku lebih luas untuk **setiap** grup G dan setiap presentasi

$$G = \langle g_\alpha \ (\alpha \in I) \mid R_\beta = e \ (\beta \in J) \rangle,$$

termasuk himpunan pembangkit atau relasi tak berhingga.

Diagram 13.12 (kompleks presentasi umum). Beri baji $W_I = \bigvee_{\alpha \in I} S^1$ topologi CW atau topologi lemah (*weak topology*), dan untuk setiap $\beta \in J$ pilih peta bertitik

$$f_\beta: S^1 \longrightarrow W_I, \quad [f_\beta] = R_\beta.$$

Kemudian bentuk pushout

$$\begin{array}{ccc} \bigsqcup_{\beta \in J} S^1 & \longrightarrow & \bigsqcup_{\beta \in J} D^2 \\ \bigsqcup_\beta f_\beta \downarrow & & \downarrow \\ \bigvee_{\alpha \in I} S^1 & \longrightarrow & X. \end{array}$$

Panah atas kembali merupakan gabungan inklusi batas; panah kiri adalah gabungan peta pelekatan. Sudut kanan bawah diberi topologi pushout CW.

Dengan topologi ini,

$$\pi_1\left(\bigvee_{\alpha \in I} S^1, *\right) \cong F_I,$$

grup bebas pada himpunan I , dan argumen sel-2 yang sama memberi $\pi_1(X, *) \cong G$. Setiap kata relator berhingga, sehingga setiap f_β hanya perlu melintasi berhingga banyak lingkaran.

Sumber menyebut konstruksi ini “baji tak berhingga”, walaupun salah ketik “join” muncul pada naskah. Topologinya perlu diperhatikan. Catatan pinggir sumber membandingkan baji terhitung

$$\bigvee_{n \in \mathbb{N}} S^1$$

dengan anting Hawaii. Baji CW tidak kompak dan semilokal terhubung sederhana, sedangkan anting Hawaii kompak dan tidak semilokal terhubung sederhana. Jadi keduanya tidak homeomorfik.

Contoh 13.4 (permukaan Riemann kompak). Permukaan Riemann kompak berorientasi Σ_g dengan genus $g \geq 1$ merupakan contoh ruang yang diperoleh melalui Fakta 13.1. Bahkan hanya satu salinan D^2 yang diperlukan.

Diagram 13.13 (satu sel-2 untuk permukaan genus g). Persegi pushoutnya adalah

$$\begin{array}{ccc} S^1 & \longrightarrow & D^2 \\ f \downarrow & & \downarrow \\ \bigvee_{i=1}^{2g} S^1 & \longrightarrow & \Sigma_g. \end{array}$$

Panah atas memasukkan batas cakram. Beri lingkaran-lingkaran baji berturut-turut pembangkit $a_1, b_1, \dots, a_g, b_g$. Peta kiri adalah peta bertitik yang memenuhi

$$[f] = \prod_{i=1}^g [a_i, b_i] \in \pi_1\left(\bigvee_{i=1}^{2g} S^1, *\right).$$

Konstruksi yang setara dimulai dari poligon bersisi $4g$, lalu mengidentifikasi sisi-sisinya secara berpasangan. Pola urutan batasnya adalah

$$a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} \dots a_g b_g a_g^{-1} b_g^{-1} = \prod_{i=1}^g [a_i, b_i].$$

Setiap pasangan sisi dengan label sama diidentifikasi dengan orientasi yang ditunjukkan oleh eksponen; semua titik sudut menjadi titik basis. Setelah identifikasi, kerangka sisi menjadi baji $2g$ lingkaran dan bagian dalam poligon menjadi satu sel-2. Catatan pinggir sumber meninggalkan placeholder “sisipkan gambar oktagon untuk $g = 2$ ”. Deskripsi semantik lengkap untuk oktagon itu adalah urutan delapan sisi berarah

$$a_1, b_1, a_1^{-1}, b_1^{-1}, a_2, b_2, a_2^{-1}, b_2^{-1},$$

dengan setiap dua sisi berlabel sama dipasangkan. Inilah relator satu pada [Contoh 13.1](#) dan menjelaskan presentasi

$$\pi_1(\Sigma_g, *) \cong \left\langle a_1, b_1, \dots, a_g, b_g \mid \prod_{i=1}^g [a_i, b_i] = e \right\rangle.$$

13.6 Mengklasifikasikan ruang pelapis

Batas sumber. Judul bagian tepat di atas adalah isi Notes.tex baris 3045; baris 3046 kosong. Baris 3047 memulai Kuliah 14 di tengah sumber. Unit ini tidak menerjemahkan, merangkum, atau memakai materi pada baris 3047 maupun sesudahnya. Karena itu judul tersebut sengaja menjadi penunjuk ke depan tanpa isi sumber di bawahnya pada unit ini.

Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Bagian ini merupakan materi asli edisi, bukan bagian dari Notes.tex. Enam pemeriksaan berikut dibatasi pada konsep dan data Unit 13. Pemeriksaan 13.2 dan 13.3 menyelesaikan dua latihan sumber; pemeriksaan lain menutup langkah yang dipakai sumber tetapi belum dijadikan latihan. Seluruh solusi disusun mandiri dan tersedia di bawah CC BY 4.0.

Pemeriksaan penguasaan 13.1 (presentasi amalgamasi). Misalkan

$$G = \langle g_i \ (i \in I) \mid R_\alpha \ (\alpha \in A) \rangle, \quad H = \langle h_j \ (j \in J) \mid Q_\beta \ (\beta \in B) \rangle,$$

dan L dibangkitkan oleh S . Buktikan bahwa $G *_L H$ mempunyai presentasi yang menggabungkan pembangkit dan relasi kedua faktor serta menambahkan $\phi(s) = \psi(s)$ untuk $s \in S$. Terapkan hasilnya pada $F_m *_\mathbb{Z} 1$ ketika $1 \in \mathbb{Z}$ dikirim ke $R \in F_m$.

13.7 Solusi Pemeriksaan 13.1

Produk bebas mempunyai presentasi

$$G * H \cong \langle g_i, h_j \mid R_\alpha, Q_\beta \rangle.$$

Membentuk $G *_L H$ berarti membagi grup ini dengan penutupan normal semua

$$\phi(x)\psi(x)^{-1}, \quad x \in L.$$

Jika relasi $\phi(s) = \psi(s)$ berlaku untuk setiap $s \in S$, relasi itu juga berlaku untuk invers dan produk pembangkit: homomorfisma dari L yang diberikan oleh dua komposit ke hasil bagi bersepakat pada S , maka bersepakat pada seluruh L . Jadi cukup menambahkan relasi bagi $s \in S$, dan diperoleh

$$G *_L H \cong \left\langle g_i, h_j \mid R_\alpha, Q_\beta, \phi(s)\psi(s)^{-1} = e \ (s \in S) \right\rangle.$$

Presentasi ini juga mempunyai sifat universal yang diinginkan. Homomorfisma ke grup K sama dengan pasangan homomorfisma $u: G \rightarrow K$ dan $v: H \rightarrow K$ yang menghormati relasi tambahan; syarat terakhir tepat $u \circ \phi = v \circ \psi$ pada S , dan karenanya pada L .

Untuk $L = \mathbb{Z}$, $H = 1$, dan $\phi(1) = R$, relasi tambahan adalah $R = e$. Karena faktor trivial tidak menambah pembangkit,

$$F_m *_\mathbb{Z} 1 \cong F_m / \langle\langle R \rangle\rangle \cong \langle g_1, \dots, g_m \mid R = e \rangle.$$

Pemeriksaan penguasaan 13.2 (solusi Latihan Sumber 13.1). Buktikan bahwa kata panah tereduksi, setelah dibagi dengan kongruensi yang dihasilkan oleh $G(\lambda) = F(\lambda)$, membentuk grupoid.

13.8 Solusi Pemeriksaan 13.2

Mula-mula bekerja sebelum relasi Λ dikenakan. Objeknya adalah A . Suatu panah $a \rightarrow b$ diwakili oleh kata kosong jika $a = b$, atau kata

$$w = \alpha_1 \cdots \alpha_r$$

yang panah-panahnya dapat dikomposisikan dari a ke b . Dua langkah reduksi elementer diperbolehkan:

1. hapus suatu identitas;
2. ganti dua panah bersebelahan dari faktor yang sama oleh komposisinya di faktor tersebut.

Kata tereduksi yang tidak kosong karena itu bergantian antara faktor Γ dan H . Untuk $[u]: a \rightarrow b$ dan $[v]: b \rightarrow c$, definisikan produk kronologis $[u][v]$ dengan mengonkatenasikan u dan v , lalu mereduksi sambungan jika kedua huruf di sana berasal dari faktor yang sama. Definisi tidak bergantung pada wakil: setiap reduksi di dalam u atau v tetap menjadi reduksi sah setelah kata lain ditempelkan.

Asosiativitas mengikuti asosiativitas konkatenasi dan komposisi di setiap faktor. Lebih eksplisit, $(uv)w$ dan $u(vw)$ berasal dari daftar huruf yang sama; semua pengelompokan berturutan di satu faktor memberi panah yang sama karena komposisi faktor asosiatif. Kata kosong di a menjadi identitas 1_a .

Definisikan

$$(\alpha_1 \cdots \alpha_r)^{-1} := \alpha_r^{-1} \cdots \alpha_1^{-1}.$$

Kata ini berjalan dari b ke a . Dalam produk ww^{-1} , pasangan tengah $\alpha_r \alpha_r^{-1}$ tereduksi menjadi identitas; pembatalan berulang memberi kata kosong di a . Serupa dengan itu, $w^{-1}w$ tereduksi menjadi kata kosong di b . Jadi $\Gamma *_{\Lambda_0} H$ adalah grupoid.

Sekarang bagi setiap hom-set dengan kongruensi grupoid terkecil yang memuat $G(\lambda) \sim F(\lambda)$. Karena kongruensi menurut definisi stabil terhadap komposisi di kedua sisi dan invers, komposisi serta operasi invers turun secara terdefinisi baik ke kelas ekuivalensi. Identitas, asosiativitas, dan persamaan invers tetap benar setelah mengambil kelas. Maka $\Gamma *_{\Lambda} H$ juga grupoid.

Pemeriksaan penguasaan 13.3 (solusi Latihan Sumber 13.2). Untuk grupoid $\mathcal{K}$, misalkan diberikan funktor

$$P: \Gamma \rightarrow \mathcal{K}, \quad Q: H \rightarrow \mathcal{K}$$

dengan $P \circ G = Q \circ F$. Bangun satu-satunya funktor $T: \Gamma *_{\Lambda} H \rightarrow \mathcal{K}$ yang memperluas P dan Q .

13.9 Solusi Pemeriksaan 13.3

Karena F dan G adalah identitas pada objek, kesamaan $P \circ G = Q \circ F$ pada objek memberi

$$P(a) = Q(a)$$

untuk setiap $a \in A$. Definisikan $T(a)$ sebagai objek bersama ini. Untuk kata yang dapat dikomposisikan $w = \alpha_1 \cdots \alpha_r$, tetapkan

$$T(w) = T(\alpha_1) \cdots T(\alpha_r),$$

dengan $T(\alpha_i) = P(\alpha_i)$ bila huruf itu berasal dari Γ dan $T(\alpha_i) = Q(\alpha_i)$ bila berasal dari H . Produk pada ruas kanan dibaca kronologis. Kata kosong dikirim ke identitas.

Fungtorialitas P dan Q memastikan bahwa menghapus identitas atau mengomposisikan dua huruf dari faktor yang sama tidak mengubah nilai. Bagi $\lambda \in \Lambda$, kompatibilitas memberi

$$T(G(\lambda)) = P(G(\lambda)) = Q(F(\lambda)) = T(F(\lambda)).$$

Karena kesamaan di $\mathcal{K}$ stabil terhadap komposisi dan invers, T tetap konstan pada seluruh kongruensi yang dihasilkan relasi tersebut. Jadi rumus turun ke fungtor

$$T: \Gamma *_\Lambda H \longrightarrow \mathcal{K}.$$

Konstruksinya jelas membatasi menjadi P dan Q . Untuk keunikan, setiap fungtor perluasan harus mempunyai nilai $P(\alpha)$ atau $Q(\alpha)$ pada setiap kata satu huruf. Fungtorialitas kemudian memaksanya mempunyai nilai produk di atas pada setiap kata, dan karenanya pada setiap kelas kongruensi. Jadi T unik. Inilah tepat sifat universal pushout di **Gpd**.

Pemeriksaan penguasaan 13.4 (bentuk normal pada lingkaran). Tentukan semua empat hom-set dari grupoid pada Diagram 13.8. Gunakan jawaban itu untuk membuktikan lagi bahwa grup automorfisma di $+1$ isomorfik dengan $\mathbb{Z}$.

13.10 Solusi Pemeriksaan 13.4

Setiap kata tereduksi harus bergantian dan arah panah menentukan huruf berikutnya. Dengan $n \in \mathbb{Z}$, semua hom-set dapat ditulis

$$\begin{aligned} \text{Hom}(+1, +1) &= \{(\gamma\eta)^n : n \in \mathbb{Z}\}, \\ \text{Hom}(-1, -1) &= \{(\eta\gamma)^n : n \in \mathbb{Z}\}, \\ \text{Hom}(+1, -1) &= \{(\gamma\eta)^n\gamma : n \in \mathbb{Z}\}, \\ \text{Hom}(-1, +1) &= \{(\eta\gamma)^n\eta : n \in \mathbb{Z}\}. \end{aligned}$$

Rumus itu juga mencakup kata yang tampak diawali invers. Sebagai contoh,

$$(\gamma\eta)^{-1}\gamma = \eta^{-1}\gamma^{-1}\gamma = \eta^{-1}.$$

Keunikan bentuk tereduksi menunjukkan bahwa pangkat berbeda dari $\gamma\eta$ memberi loop berbeda. Komposisi kronologis menjumlahkan pangkat:

$$(\gamma\eta)^m(\gamma\eta)^n = (\gamma\eta)^{m+n}.$$

Karena itu $n \mapsto (\gamma\eta)^n$ adalah homomorfisma bijektif dari $\mathbb{Z}$ ke $\text{Aut}(+1) = \pi_1(S^1, +1)$.

Pemeriksaan penguasaan 13.5 (hipotesis baji).

1. Tunjukkan bahwa $X \vee V$ meretrak deformasi ke X , $U \vee Y$ meretrak deformasi ke Y , dan $U \vee V$ kontraktibel ke titik basis.
2. Jelaskan tepat di mana keterhubungan lintasan X dan Y dipakai.
3. Turunkan isomorfisma produk bebas dari sifat universal pushout.

13.11 Solusi Pemeriksaan 13.5

Biarkan $h_V: V \times I \rightarrow V$ merupakan kontraksi ke y yang menetapkan y . Pada $X \vee V$, definisikan homotopi sebagai identitas pada faktor X dan h_V pada faktor V . Kedua rumus bersepakat di titik baji sepanjang waktu karena $h_V(y, t) = y$, sehingga turun melalui hasil bagi baji. Pada waktu akhir, citranya X dan homotopi menetapkan X ; jadi ini retraksi deformasi. Argumen dengan kontraksi U memberi retraksi deformasi $U \vee Y \rightarrow Y$. Menggabungkan kedua kontraksi bertitik pada $U \vee V$ memberi kontraksi ke $*$.

Keterhubungan lintasan X, Y bersama keterhubungan U, V memastikan $X \vee V$, $U \vee Y$, dan $X \vee Y$ terhubung lintasan; $U \vee V$ bahkan kontraktibel. Karena itu Akibat Seifert–van Kampen untuk **grup** dari Unit 12 berlaku pada titik basis tunggal. Tanpa syarat itu, Teorema grupoid masih tersedia, tetapi kita belum memperoleh persegi satu-objek pada Diagram 13.10.

Setelah identifikasi melalui retraksi deformasi, diagram grup adalah

$$\pi_1(X, x) \longleftarrow 1 \longrightarrow \pi_1(Y, y).$$

Untuk grup K , sebuah kocone dari diagram ini tepat pasangan homomorfisma

$$\pi_1(X, x) \rightarrow K \longleftarrow \pi_1(Y, y),$$

karena kompatibilitas pada 1 otomatis. Sifat universal produk bebas menunjukkan bahwa pushoutnya adalah $\pi_1(X, x) * \pi_1(Y, y)$. Keunikan pushout memberi isomorfisma kanonik dengan $\pi_1(X \vee Y, *)$.

Pemeriksaan penguasaan 13.6 (sel-2 dan kata permukaan).

1. Jelaskan mengapa memasang satu sel-2 sepanjang loop yang mewakili $R \in \pi_1(W, *)$ membagi $\pi_1(W, *)$ dengan $\langle\langle R \rangle\rangle$, bukan hanya subgrup siklik $\langle R \rangle$.
2. Untuk $g = 2$, baca kata pelekatan dari oktagon dan tuliskan presentasi grup fundamentalnya.
3. Jelaskan mengapa peta pelekatan harus dinyatakan oleh $[f] = R$, bukan $f(1) = R$.

13.12 Solusi Pemeriksaan 13.6

Gunakan sampul berkerah $\mathcal{U} \cup \mathcal{V}$: bagian $\mathcal{U}$ meretrak deformasi ke W , bagian $\mathcal{V}$ meretrak deformasi ke cakram D^2 dan karenanya mempunyai grup fundamental trivial, sedangkan $\mathcal{U} \cap \mathcal{V}$ meretrak deformasi ke lingkaran batas. Kedua homomorfisma dari grup fundamental irisan mengirim generator batas masing-masing ke R di $\pi_1(W, *)$ dan ke identitas di $\pi_1(D^2, *)$. Pushout grup karena itu menambahkan relasi $R = e$.

Kernel suatu homomorfisma grup selalu subgrup normal. Setelah R menjadi identitas, setiap konjugat wRw^{-1} juga harus menjadi identitas; demikian pula semua produk konjugat dan inversnya. Jadi sedikitnya seluruh penutupan normal $\langle\langle R \rangle\rangle$ dibunuh. Sebaliknya, hasil bagi oleh penutupan normal itu mempunyai sifat universal yang tepat bagi semua homomorfisma yang membunuh R . Maka grup hasilnya persis

$$\pi_1(W, *) / \langle\langle R \rangle\rangle.$$

Untuk $g = 2$, urutan sisi oktagon adalah

$$a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} a_2 b_2 a_2^{-1} b_2^{-1} = [a_1, b_1][a_2, b_2].$$

Dengan memasang bagian dalam oktagon sebagai satu sel-2, diperoleh

$$\pi_1(\Sigma_2, *) \cong \langle a_1, b_1, a_2, b_2 \mid [a_1, b_1][a_2, b_2] = e \rangle.$$

Terakhir, $f(1)$ adalah titik W ; karena f bertitik, nilainya justru titik basis $*$. Relator R adalah unsur grup fundamental, yakni kelas homotopi berujung tetap dari keseluruhan loop. Jadi persamaan yang bertipe benar adalah

$$[f] = R \in \pi_1(W, *).$$

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts, © 2019 David Michael Roberts, tepatnya [Notes.tex](#) baris 3047–3209 pada commit [b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#) dari repositori [DavidMichaelRoberts/AlgebraicTopology2019](#). Rentang itu dimulai dengan kata “Recall” dan penanda Kuliah 14 pada baris 3047, lalu berakhir sesudah catatan tentang komponen ruang penutup pada baris 3208 dan baris kosong 3209. Penanda Kuliah 15 pada baris 3210 tidak termasuk dalam unit ini. Materi sumber dan adaptasi Indonesia ini tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Judul bagian sumber “Classifying covering spaces” berada pada baris 3045 dan sudah dipertahankan sebagai judul penunjuk ke depan pada akhir Unit 13. Unit 14 langsung melanjutkan isi di bawah judul tersebut tanpa menggandakan judul sumber. Sesuai istilah global edisi, *covering space* selanjutnya diterjemahkan sebagai *ruang penutup*.

Perubahan edisi mencakup penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, serta pemindahan kelima catatan pinggir ke urutan bacaan utama. Ketiga diagram Xy-pic sumber ditulis ulang sebagai gambar semantik yang juga mencantumkan daftar panah dan persamaan komutativitas; maknanya tidak bergantung pada posisi visual.

Sejumlah cacat sumber diperbaiki secara independen. Dua aksi pada contoh lingkaran dibatasi ke grup bertitik $\pi_1(S^1, 1)$ dan kodomainnya ditulis sebagai grup permutasi himpunan, bukan Aut yang dapat keliru dibaca sebagai automorfisma grup siklik. Aksi monodromi langsung tetap berupa aksi kanan, konsisten dengan urutan konkatenasi kronologis yang ditetapkan pada Unit 7–10. Karena itu kategori himpunan- G ditulis sebagai kategori aksi kanan dan dekomposisi orbit memakai koset kanan $\text{Stab}(p) \backslash G$. Pemetaan yang salah ketik $\pi_1(X_i, a_i) \rightarrow Z_{a_i}$ diganti oleh pemetaan aksi bertipe benar $Z_{a_i} \times \pi_1(X_i, a_i) \rightarrow Z_{a_i}$. Notasi penampang dan himpunan titik pilihan dipisahkan, dependensi pada pilihan dinyatakan, dan salah eja serta kalimat tak gramatikal sumber dinormalkan.

Sumber menyerahkan dua bukti sebagai “Exercise” dan tidak memberikan bukti bagi lema tentang [\[BG, Set\]](#). Pendamping penguasaan yang jelas ditandai sebagai materi asli edisi memberi enam pemeriksaan terbatas beserta solusi lengkap: naturalitas monodromi; kedua latihan sumber; lema [BG](#); audit tipe pada contoh lingkaran; serta reduksi melalui komponen, orbit, dan hipotesis SLSC. Tidak satu pun solusi memakai konstruksi ruang penutup universal atau hasil klasifikasi dari kuliah sesudahnya. Seluruh materi pendamping tersedia di bawah CC BY 4.0 dan tidak meminjam solusi eksternal. Edisi ini bersifat independen; edisi ini tidak disponsori, didukung, disahkan, ataupun diberi status resmi oleh David Michael Roberts, MIT, Haynes Miller, Sanath Devalapurkar, Yeheli Fomberg, Nir Lazarovich, atau institusi mereka.

14 Kuliah 14

Sambungan bagian. Unit 13 sudah memuat judul bagian sumber “Mengklasifikasikan ruang pelapis” dari [Notes.tex](#) baris 3045. Kuliah ini melanjutkan isi bagian tersebut mulai baris 3047. Jadi tidak ada isi matematis yang hilang di batas unit, dan judul sumber tidak dihitung sebagai judul baru yang kedua.

Sepanjang unit ini, produk lintasan atau panah $[\gamma][\eta]$ dibaca **kronologis**: γ ditempuh dahulu, lalu η . Komposisi fungsi tetap ditulis dalam urutan baku kanan-ke-kiri. Karena

$$(\gamma \# \eta)_* = \eta_* \circ \gamma_*,$$

transpor titik akhir langsung pada serat adalah aksi **kanan**.

14.1 Pemetaan ruang penutup dan transformasi natural

Ingat bahwa setiap ruang penutup $\pi: Z \rightarrow X$ memberi fungtor monodromi

$$\begin{aligned} \rho_Z: \Pi_1(X) &\longrightarrow \mathbf{Set}, \\ x &\longmapsto Z_x := \pi^{-1}(x), \\ [\gamma: x \rightsquigarrow y] &\longmapsto (\gamma_*^Z: Z_x \xrightarrow{\cong} Z_y). \end{aligned}$$

Di sini $\gamma_*^Z(z)$ adalah titik akhir dari satu-satunya pengangkatan γ yang berawal di z .

Sekarang ambil dua ruang penutup $\pi_1: Z_1 \rightarrow X$ dan $\pi_2: Z_2 \rightarrow X$, serta suatu morfisma $f: Z_1 \rightarrow Z_2$ di $\mathbf{Cov}_X$.

Diagram 14.1 (morfisma di atas ruang dasar). Data panahnya adalah

$$Z_1 \xrightarrow{f} Z_2, \quad Z_1 \xrightarrow{\pi_1} X, \quad Z_2 \xrightarrow{\pi_2} X,$$

dan syarat komutativitasnya ialah

$$\pi_2 \circ f = \pi_1.$$

Jadi segitiga sumber menyatakan bahwa f adalah pemetaan ruang penutup di atas identitas X .

Untuk setiap $x \in X$, komutativitas itu memberi pembatasan pada serat

$$f_x := f|_{(Z_1)_x}: (Z_1)_x \longrightarrow (Z_2)_x.$$

Dengan kata lain, f_x adalah fungsi $\rho_{Z_1}(x) \rightarrow \rho_{Z_2}(x)$ pada setiap objek x dari $\Pi_1(X)$.

Ambil lintasan $\gamma: x \rightsquigarrow y$ di X dan $z \in (Z_1)_x$. Terdapat tepat satu pengangkatan

$$\tilde{\gamma}_z^1: z \rightsquigarrow \gamma_*^{Z_1}(z)$$

di Z_1 . Komposit $f \circ \tilde{\gamma}_z^1$ adalah lintasan di Z_2 dari $f_x(z)$ ke $f_y(\gamma_*^{Z_1}(z))$. Karena $\pi_2 \circ f = \pi_1$, komposit itu mengangkat γ . Keunikan pengangkatan lintasan menunjukkan bahwa komposit tersebut adalah pengangkatan γ yang berawal di $f_x(z)$; titik akhirnya ialah $\gamma_*^{Z_2}(f_x(z))$. Maka

$$f_y(\gamma_*^{Z_1}(z)) = \gamma_*^{Z_2}(f_x(z)).$$

Diagram 14.2 (persegi naturalitas pada suatu lintasan). Persegi

$$\begin{array}{ccc} (Z_1)_x & \longrightarrow & (Z_1)_y \\ \downarrow & & \downarrow \\ (Z_2)_x & \longrightarrow & (Z_2)_y \end{array}$$

komutatif. Panah atas adalah $\gamma_*^{Z_1}$, panah bawah adalah $\gamma_*^{Z_2}$, dan panah tegak kiri serta kanan masing-masing adalah f_x dan f_y . Secara linear, kedua rute dari $(Z_1)_x$ ke $(Z_2)_y$ memenuhi

$$f_y \circ \gamma_*^{Z_1} = \gamma_*^{Z_2} \circ f_x.$$

Jadi keluarga $(f_x)_{x \in X}$ merupakan transformasi natural $\rho_{Z_1} \Rightarrow \rho_{Z_2}$. Ingat bahwa kategori functor $[\mathcal{C}, \mathbf{Set}]$ mempunyai functor $\mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ sebagai objek dan transformasi natural sebagai morfisma.

Proposisi 14.1 (functor monodromi). Penetapan

$$(Z \xrightarrow{\pi} X) \mapsto \rho_Z$$

mendefinisikan functor

$$\mathrm{Cov}_X \longrightarrow [\Pi_1(X), \mathbf{Set}].$$

Bukti. Untuk pemetaan identitas id_Z , pembatasan pada setiap serat adalah id_{Z_x} , sehingga transformasi natural yang dihasilkan adalah identitas $\rho_Z \Rightarrow \rho_Z$.

Jika

$$Z_1 \xrightarrow{f} Z_2 \xrightarrow{g} Z_3$$

adalah dua morfisma ruang penutup di atas X , maka pada setiap $x \in X$

$$(g \circ f)_x = g_x \circ f_x.$$

Karena komposisi transformasi natural dihitung per komponen, transformasi yang terkait dengan $g \circ f$ adalah komposit transformasi yang terkait dengan f dan g . Jadi identitas dan komposisi dipertahankan. $\square$

14.2 Dua ruang penutup lingkaran

Contoh 14.1 (reduksi modulo n sebagai pemetaan monodromi). Pandang $S^1 \subset \mathbb{C}$. Untuk $n > 1$, definisikan

$$p(t) = e^{2\pi it}, \quad F_n(t) = e^{2\pi it/n}, \quad q_n(z) = z^n.$$

Pemetaan $p: \mathbb{R} \rightarrow S^1$ dan $q_n: S^1 \rightarrow S^1$ mendefinisikan ruang penutup, sedangkan $F_n: \mathbb{R} \rightarrow S^1$ adalah morfisma di antara keduanya.

Diagram 14.3 (ruang penutup eksponensial menuju penutup pangkat- n). Daftar panahnya ialah

$$\mathbb{R} \xrightarrow{F_n} S^1, \quad \mathbb{R} \xrightarrow{p} S^1, \quad S^1 \xrightarrow{q_n} S^1.$$

Segitiga komutatif karena

$$(q_n \circ F_n)(t) = (e^{2\pi it/n})^n = e^{2\pi it} = p(t).$$

Setiap serat p adalah torsor bagi translasi bilangan bulat, sehingga isomorfik sebagai himpunan dengan $\mathbb{Z}$, meskipun tidak ada identifikasi terpilih pada serat umum. Serat $p^{-1}(1)$ benar-benar sama dengan $\mathbb{Z}$. Serat $q_n^{-1}(1)$ adalah himpunan akar kesatuan

$$\mu_n = \{e^{2\pi i k/n} : k \in \mathbb{Z}\}.$$

Gunakan identifikasi terpilih

$$\theta_n : \mathbb{Z}/n \xrightarrow{\cong} \mu_n, \quad \bar{k} \mapsto e^{2\pi i k/n}.$$

Pada serat di atas 1, pemetaan F_n karena itu menginduksi

$$\begin{aligned} \mathbb{Z} &\longrightarrow \mathbb{Z}/n, \\ k &\longmapsto \bar{k}. \end{aligned}$$

Sebuah morfisma dari 1 ke dirinya sendiri di $\Pi_1(S^1)$ adalah kelas loop. Setelah memilih generator berarah positif, grup automorfisma objek itu diidentifikasi dengan

$$\pi_1(S^1, 1) \cong \mathbb{Z}.$$

Transpor titik akhir langsung memberi aksi kanan

$$\begin{aligned} \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} &\longrightarrow \mathbb{Z}, & k \cdot m &= k + m, \\ (\mathbb{Z}/n) \times \mathbb{Z} &\longrightarrow \mathbb{Z}/n, & \bar{k} \cdot m &= \overline{k + m}. \end{aligned}$$

Jika $R_m^{\mathbb{R}}$ dan R_m^n menyatakan operator titik akhir, tipe yang tidak ambigu adalah

$$\begin{aligned} R^{\mathbb{R}} : \mathbb{Z}^{\text{op}} &\longrightarrow \text{Sym}(\mathbb{Z}), & m &\longmapsto (k \mapsto k + m), \\ R^n : \mathbb{Z}^{\text{op}} &\longrightarrow \text{Sym}(\mathbb{Z}/n), & m &\longmapsto (\bar{k} \mapsto \overline{k + m}). \end{aligned}$$

Di sini $\text{Sym}(S)$ berarti grup semua bijeksi himpunan S . Karena $\mathbb{Z}/n$ mempunyai n unsur, $\text{Sym}(\mathbb{Z}/n) \cong S_n$ setelah pelabelan unsur dipilih. Khusus untuk grup abelian $\mathbb{Z}$, grup lawan dapat diidentifikasi dengan $\mathbb{Z}$ lagi; namun notasi aksi kanan tetap merekam asal rumus dari pengangkatan lintasan.

Pemetaan reduksi modulo n ekuivarian karena

$$\overline{k \cdot m} = \overline{k + m} = \bar{k} \cdot m.$$

Ini adalah kasus khusus naturalitas transformasi yang diinduksi oleh F_n .

14.3 Mereduksi pertanyaan klasifikasi

Pertanyaan 14.1. Fungtor atau representasi manakah

$$\Pi_1(X) \longrightarrow \mathbf{Set}$$

yang dapat muncul sebagai ρ_Z untuk suatu ruang penutup $Z \rightarrow X$?

Setiap himpunan jelas dapat direalisasikan sebagai himpunan komponen terhubung suatu ruang. Unit 13 juga menjelaskan konstruksi pushout yang, untuk setiap grup G , menghasilkan suatu ruang

bertitik $(Y, *)$ dengan $\pi_1(Y, *) \cong G$. Akan tetapi, kedua fakta realisasi tersebut belum menunjukkan cara membangun ruang penutup dari sebuah funktor yang diberikan

$$\Pi_1(X) \longrightarrow \mathbf{Set}.$$

Semua ruang penutup yang telah kita lihat sejauh ini merupakan contoh alami yang sudah dikenal atau contoh kecil yang dipilih untuk menyoroti bagian tertentu dari grupoid fundamental ruang sederhana. Strategi kita adalah mereduksi kedua sisi masalah: sisi topologis Cov_X dan sisi aljabar $[\Pi_1(X), \mathbf{Set}]$. Unit ini menyelesaikan reduksi aljabarnya; realisasi semua objek dan klasifikasi penuh baru dibahas kemudian.

14.4 Memilih satu titik pada setiap komponen

Gunakan asumsi umum bahwa ruang-ruang kita terhubung lintasan semilokal (SLPC). Tuliskan

$$I := [\text{pt}, X]$$

untuk himpunan komponen lintasan X . Pilih suatu penampang pada tingkat himpunan

$$s: I \longrightarrow X, \quad i \longmapsto a_i,$$

dari pemetaan yang mengirim titik ke komponen lintasannya, lalu bedakan penampang itu dari citranya dengan menulis

$$A := s(I) = \{a_i : i \in I\} \subseteq X.$$

Dalam konvensi SLPC mata kuliah ini, setiap komponen lintasan terbuka. Jadi pemetaan $X \rightarrow I$ kontinu jika I diberi topologi diskret, dan penampang s juga kontinu karena domainnya diskret. Untuk argumen kategoris di bawah, yang diperlukan hanyalah satu titik pilihan a_i pada setiap komponen.

Inklusi subgrupoid penuh

$$i: \Pi_1(X, A) \hookrightarrow \Pi_1(X)$$

adalah ekuivalensi: setiap objek $x \in X$ terhubung oleh suatu kelas lintasan dengan satu-satunya objek pilihan a_i di komponennya. Pernyataan ini adalah isi rujukan catatan pinggir sumber ke Assignment 2, soal 7; alasannya kini diletakkan langsung dalam urutan bacaan.

Lema 14.1 (restriksi sepanjang subkategori penuh yang ekuivalen). Jika

$$i: \mathcal{C} \hookrightarrow \mathcal{D}$$

adalah inklusi subkategori penuh sekaligus ekuivalensi, maka funktor restriksi

$$\begin{aligned} [\mathcal{D}, \mathbf{Set}] &\xrightarrow{i^*} [\mathcal{C}, \mathbf{Set}], \\ F &\longmapsto F \circ i \end{aligned}$$

adalah ekuivalensi kategori.

Latihan Sumber 14.1. Buktikan Lema 14.1. Sumber menuliskan seluruh buktinya sebagai “Exercise”. Solusi mandiri tersedia pada [Pemeriksaan Penguasaan 14.2](#).

14.5 Memisahkan komponen dan aksi grup

Untuk setiap $i \in I$, misalkan X_i adalah komponen lintasan yang memuat a_i . Karena komponen-komponen itu terbuka, X adalah koproduk topologis $\coprod_{i \in I} X_i$. Tidak ada lintasan antara dua komponen yang berlainan, sehingga

$$\Pi_1(X, A) = \Pi_1\left(\coprod_{i \in I} X_i, \coprod_{i \in I} \{a_i\}\right) \cong \coprod_{i \in I} \mathbf{B}\pi_1(X_i, a_i).$$

Lema 14.2 (funktor dari koproduk kategori). Untuk setiap keluarga kategori $(\mathcal{C}_i)_{i \in I}$ terdapat isomorfisma kategori

$$\left[\coprod_{i \in I} \mathcal{C}_i, \mathbf{Set}\right] \xrightarrow{\cong} \prod_{i \in I} [\mathcal{C}_i, \mathbf{Set}].$$

Sebuah objek di ruas kanan adalah satu tupel funktor, tepat satu dari setiap kategori faktor; morfismanya adalah tupel transformasi natural dengan indeks yang sama.

Latihan Sumber 14.2. Buktikan Lema 14.2. Sumber menuliskan seluruh buktinya sebagai “Exercise”. Solusi mandiri tersedia pada [Pemeriksaan Penguasaan 14.3](#).

Untuk suatu grup G , tuliskan $\mathbf{Set}_G$ bagi kategori himpunan dengan aksi **kanan** G . Pilihan notasi ini mempertahankan konvensi monodromi langsung Unit 7–10. Bentuk aksi kiri yang dipakai sumber dapat selalu diperoleh dengan

$$g \star p := p \cdot g^{-1},$$

tetapi bentuk itu tidak akan menggantikan aksi kanan langsung dalam unit ini.

Definisi 14.1 (himpunan- G kanan). Objek $\mathbf{Set}_G$ adalah pasangan (S, ρ) dengan pemetaan

$$\rho: S \times G \longrightarrow S, \quad (p, g) \longmapsto p \cdot g,$$

yang memenuhi

$$p \cdot e = p, \quad p \cdot (gh) = (p \cdot g) \cdot h.$$

Morfisma $f: S \rightarrow T$ adalah fungsi ekuivarian, yakni

$$f(p \cdot g) = f(p) \cdot g$$

untuk semua $p \in S$ dan $g \in G$.

Lebih umum, jika Γ adalah grupoid dan $\rho: \Gamma \rightarrow \mathbf{Set}$ suatu representasi, maka untuk setiap objek $x \in \Gamma$ terdapat aksi oleh grup automorfisma $\Gamma(x, x)$ pada $\rho(x)$. Dengan urutan produk kronologis, aksi langsung itu adalah aksi kanan. Jika $\alpha: \rho \Rightarrow \rho'$ adalah transformasi natural, komponennya

$$\alpha_x: \rho(x) \longrightarrow \rho'(x)$$

ekuivarian terhadap aksi $\Gamma(x, x)$. Evaluasi pada x juga mempertahankan identitas dan komposisi transformasi natural.

Lema 14.3 (functor dari grupoid satu objek). Dengan konvensi produk kronologis, konstruksi sebelumnya memberi isomorfisma kategori

$$[\mathbf{BG}, \mathbf{Set}] \xrightarrow{\cong} \mathbf{Set}_G.$$

Sumber tidak memberikan bukti lema ini. Bukti mandiri tersedia pada [Pemeriksaan Penguasaan 14.4](#).

Gabungkan ketiga lema di atas. Kita memperoleh rantai ekuivalensi

$$\begin{aligned} [\Pi_1(X), \mathbf{Set}] &\xrightarrow[\simeq]{i^*} [\Pi_1(X, A), \mathbf{Set}] \\ &\cong \prod_{i \in I} [\mathbf{B}\pi_1(X_i, a_i), \mathbf{Set}] \\ &\cong \prod_{i \in I} \mathbf{Set}_{\pi_1(X_i, a_i)}. \end{aligned}$$

Ekuivalensi pertama bergantung pada pilihan titik a_i dan, ketika invers semu ditulis eksplisit, pada pilihan lintasan menuju titik-titik itu. Functor monodromi asli $\rho_Z: \Pi_1(X) \rightarrow \mathbf{Set}$ tidak memerlukan pilihan titik pangkal; hasil-hasil dari dua pilihan berbeda berhubungan melalui ekuivalensi natural.

Komposisikan rantai tadi dengan Proposisi 14.1.

Functor serat komponen. Functor yang dihasilkan adalah

$$\begin{aligned} \mathrm{Cov}_X &\longrightarrow \prod_{i \in I} \mathbf{Set}_{\pi_1(X_i, a_i)}, \\ (Z \rightarrow X) &\longmapsto (\rho_i: Z_{a_i} \times \pi_1(X_i, a_i) \longrightarrow Z_{a_i})_{i \in I}, \end{aligned}$$

dengan

$$\rho_i(z, [\gamma]) = z \cdot [\gamma] := \gamma_*^Z(z).$$

Kodomain ini lebih mudah ditangani. Setiap himpunan- G kanan merupakan gabungan saling lepas orbit-orbitnya. Pilih satu titik p_j pada setiap orbit, dengan $j \in S/G$, dan tuliskan

$$H_j := \mathrm{Stab}(p_j) = \{g \in G : p_j \cdot g = p_j\}.$$

Maka terdapat isomorfisma himpunan- G kanan

$$\begin{aligned} \coprod_{j \in S/G} H_j \backslash G &\xrightarrow{\cong} S, \\ H_j g &\longmapsto p_j \cdot g. \end{aligned}$$

Ruang $H_j \backslash G$ terdiri atas koset kanan dan membawa aksi kanan melalui perkalian di ruas kanan. Jika aksi diubah menjadi aksi kiri $g \star p = p \cdot g^{-1}$, pernyataan ekuivalennya memakai G/H_j ; kedua sisi koset tidak boleh dicampurkan.

14.6 Hipotesis untuk langkah berikutnya

Catatan 14.1 (SLSC dan komponen ruang penutup). Mulai titik ini, kita hanya memper-timbangkan ruang yang terhubung sederhana semilokal (SLSC), karena itulah hipotesis yang kelak dipakai pada teorema klasifikasi.

Dalam konvensi mata kuliah ini, SLSC sudah mencakup adanya basis lingkungan yang terhubung lintasan. Jadi X terhubung lintasan lokal. Jika $\pi: Z \rightarrow X$ adalah ruang penutup dan $z \in Z$, pilih lingkungan terhubung lintasan U dari $\pi(z)$ yang tertutup rata. Lembaran $V \subseteq \pi^{-1}(U)$ yang memuat z homeomorfik dengan U . Lembaran semacam itu membentuk basis lingkungan terhubung lintasan di Z . Karena itu Z terhubung lintasan lokal, sehingga komponen terhubung dan komponen lintasannya bertepatan.

Batas ke Unit 15. Sampai di sini sisi aljabar telah dipisahkan menurut komponen dasar dan orbit aksi. Unit 15 mulai pada Notes.tex baris 3210 dan memberikan pemisahan topologis yang bersesuaian bagi kategori ruang penutup. Unit 14 belum mengonstruksi ruang penutup dari sembarang aksi, belum memakai ruang penutup universal, dan belum membuktikan teorema klasifikasi.

Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Bagian ini merupakan materi asli edisi, bukan bagian dari Notes.tex. Enam pemeriksaan berikut hanya memakai hasil yang tersedia sampai akhir Unit 14. Pemeriksaan 14.2 dan 14.3 menyelesaikan dua latihan sumber; Pemeriksaan 14.4 memberi bukti bagi lema yang tidak dibuktikan sumber. Seluruh solusi disusun mandiri dan tersedia di bawah CC BY 4.0.

Pemeriksaan penguasaan 14.1 (naturalitas dan functorialitas). Misalkan $f: Z_1 \rightarrow Z_2$ dan $g: Z_2 \rightarrow Z_3$ adalah morfisma ruang penutup di atas X .

1. Buktikan bahwa $f_y \circ \gamma_*^{Z_1} = \gamma_*^{Z_2} \circ f_x$ untuk setiap $[\gamma: x \rightsquigarrow y]$.
2. Buktikan bahwa keluarga $(g_x \circ f_x)_{x \in X}$ adalah transformasi natural yang terkait dengan $g \circ f$.

14.7 Solusi Pemeriksaan 14.1

Ambil $z \in (Z_1)_x$ dan angkat γ ke lintasan $\tilde{\gamma}_z$ di Z_1 . Karena f berada di atas X , $f \circ \tilde{\gamma}_z$ juga mengangkat γ dan berawal di $f_x(z)$. Keunikan pengangkatan memberi

$$f_y(\gamma_*^{Z_1}(z)) = \gamma_*^{Z_2}(f_x(z)).$$

Karena persamaan berlaku bagi setiap z , persegi naturalitas komutatif.

Pada setiap serat,

$$(g \circ f)_x = g_x \circ f_x.$$

Komposit dua persegi naturalitas memberi

$$(g_y \circ f_y) \circ \gamma_*^{Z_1} = \gamma_*^{Z_3} \circ (g_x \circ f_x),$$

sehingga keluarga tersebut natural. Perhitungan per komponen juga menunjukkan bahwa functor monodromi mempertahankan komposisi.

Pemeriksaan penguasaan 14.2 (solusi Latihan Sumber 14.1). Jika $i: \mathcal{C} \hookrightarrow \mathcal{D}$ penuh dan merupakan ekuivalensi, konstruksikan invers semu bagi

$$i^*: [\mathcal{D}, \mathbf{Set}] \rightarrow [\mathcal{C}, \mathbf{Set}]$$

dan jelaskan mengapa hasilnya hanya bergantung pada pilihan hingga isomorfisma natural.

14.8 Solusi Pemeriksaan 14.2

Karena i ekuivalensi, pilih funktor invers semu $r: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ beserta isomorfisma natural

$$ri \cong \text{id}_{\mathcal{C}}, \quad ir \cong \text{id}_{\mathcal{D}}.$$

Pra-komposisi dengan r memberi

$$r^*: [\mathcal{C}, \mathbf{Set}] \longrightarrow [\mathcal{D}, \mathbf{Set}], \quad F \longmapsto F \circ r.$$

Pra-komposisi isomorfisma $ri \cong \text{id}_{\mathcal{C}}$ dengan setiap F memberi

$$i^* r^*(F) = F \circ r \circ i \cong F.$$

Demikian pula, $ir \cong \text{id}_{\mathcal{D}}$ memberi

$$r^* i^*(H) = H \circ i \circ r \cong H$$

untuk $H: \mathcal{D} \rightarrow \mathbf{Set}$. Kedua isomorfisma natural juga berlaku pada transformasi natural, sehingga i^* dan r^* merupakan ekuivalensi invers semu. Pilihan invers semu lain menghasilkan funktor yang terhubung oleh isomorfisma natural; karena itu reduksi ini bukan identifikasi kanonik harfiah.

Pemeriksaan penguasaan 14.3 (solusi Latihan Sumber 14.2). Bangun kedua arah isomorfisma

$$\left[\coprod_i \mathcal{C}_i, \mathbf{Set} \right] \cong \prod_i [\mathcal{C}_i, \mathbf{Set}]$$

pada objek dan morfisma.

14.9 Solusi Pemeriksaan 14.3

Jika $F: \coprod_i \mathcal{C}_i \rightarrow \mathbf{Set}$, batasi F pada setiap komponen kategori untuk memperoleh tupel

$$(F_i: \mathcal{C}_i \rightarrow \mathbf{Set})_{i \in I}.$$

Transformasi natural $\alpha: F \Rightarrow G$ juga membatasi menjadi tupel $(\alpha_i: F_i \Rightarrow G_i)_i$.

Sebaliknya, dari tupel $(F_i)_i$, definisikan F pada objek atau morfisma yang berasal dari $\mathcal{C}_i$ dengan memakai F_i . Definisi ini lengkap karena koproduk kategori tidak memiliki morfisma di antara dua faktor berbeda. Tupel transformasi natural dirakit dengan cara yang sama. Pembatasan sesudah perakitan dan perakitan sesudah pembatasan sama dengan identitas, baik pada objek maupun morfisma. Jadi yang diperoleh benar-benar isomorfisma kategori.

Pemeriksaan penguasaan 14.4 (lema grupoid satu objek). Buktikan secara langsung bahwa

$$[\mathbf{BG}, \mathbf{Set}] \cong \mathbf{Set}_G$$

untuk produk kronologis, termasuk pernyataan tentang transformasi natural.

14.10 Solusi Pemeriksaan 14.4

Grupoid $\mathbf{BG}$ mempunyai satu objek $*$ dan morfisma $g \in G$. Produk gh berarti menempuh g dahulu, lalu h . Dari functor $F: \mathbf{BG} \rightarrow \mathbf{Set}$, ambil $S = F(*)$ dan definisikan

$$p \cdot g := F(g)(p).$$

Hukum functor untuk urutan kronologis adalah

$$F(gh) = F(h) \circ F(g).$$

Karena itu

$$p \cdot (gh) = F(gh)(p) = F(h)(F(g)(p)) = (p \cdot g) \cdot h,$$

dan identitas di $\mathbf{BG}$ memberi $p \cdot e = p$. Jadi S adalah himpunan- G kanan.

Sebaliknya, dari aksi kanan pada S , tetapkan $F(*) = S$ dan $F(g)(p) = p \cdot g$. Kedua hukum aksi tepat menjadi hukum identitas dan komposisi functor. Sebuah transformasi natural antara dua functor hanya mempunyai satu komponen $u: S \rightarrow T$, dan naturalitas pada g menyatakan

$$u(p \cdot g) = u(p) \cdot g.$$

Jadi transformasi natural tepat sama dengan fungsi ekuivarian. Kedua konstruksi saling invers pada objek dan morfisma.

Pemeriksaan penguasaan 14.5 (audit tipe contoh lingkaran). Untuk contoh p , q_n , dan F_n :

1. tuliskan domain dan kodomain operator monodromi bertitik secara tepat;
2. buktikan bahwa reduksi $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n$ ekuivarian;
3. jelaskan mengapa contoh abelian ini tidak dapat mendeteksi pembalikan urutan aksi.

14.11 Solusi Pemeriksaan 14.5

Setelah memilih titik $1 \in S^1$, domainnya adalah $\pi_1(S^1, 1) \cong \mathbb{Z}$, bukan seluruh $\Pi_1(S^1)$. Operator langsung bertipe

$$\mathbb{Z}^{\text{op}} \rightarrow \text{Sym}(\mathbb{Z}), \quad \mathbb{Z}^{\text{op}} \rightarrow \text{Sym}(\mathbb{Z}/n),$$

atau, secara ekuivalen, berupa dua aksi kanan yang ditampilkan pada Contoh 14.1. Untuk $r(k) = \bar{k}$,

$$r(k \cdot m) = r(k + m) = \overline{k + m} = \bar{k} \cdot m = r(k) \cdot m,$$

jadi r ekuivarian.

Secara umum operator aksi kanan memenuhi $R_{gh} = R_h \circ R_g$, sedangkan homomorfisma aksi kiri biasa memenuhi urutan operator yang berlawanan. Pada $\mathbb{Z}$, penjumlahan dan semua translasi yang bersangkutan komutatif, sehingga

$$R_{m+l} = R_l \circ R_m = R_m \circ R_l.$$

Akibatnya contoh lingkaran saja menyembunyikan perbedaan sisi; konvensi harus ditetapkan sebelum beralih ke grup fundamental nonabelian.

Pemeriksaan penguasaan 14.6 (komponen, orbit, dan SLSC). Misalkan X SLPC, pilih a_i pada setiap komponen lintasan X_i , dan misalkan S suatu himpunan- G kanan.

1. Jelaskan mengapa $\Pi_1(X, A)$ tidak mempunyai panah di antara dua a_i yang berbeda dan mengapa inklusinya ke $\Pi_1(X)$ tetap esensial surjektif.
2. Untuk $p \in S$ dan $H = \text{Stab}(p)$, buktikan bahwa orbit pG isomorfik dengan $H \backslash G$ sebagai himpunan- G kanan.
3. Jika X SLSC dan $Z \rightarrow X$ ruang penutup, buktikan bahwa komponen terhubung dan komponen lintasan Z bertepatan.

14.12 Solusi Pemeriksaan 14.6

Lintasan dari a_i ke a_j akan menempatkan keduanya dalam komponen lintasan yang sama. Karena dipilih tepat satu titik pada setiap komponen, tidak ada panah demikian bila $i \neq j$. Sebaliknya, setiap $x \in X$ terletak dalam suatu X_i , sehingga ada lintasan dari x ke a_i . Jadi setiap objek $\Pi_1(X)$ isomorfik dengan objek dalam subgrupoid penuh $\Pi_1(X, A)$; inklusi itu esensial surjektif.

Definisikan

$$\Phi: H \backslash G \longrightarrow pG, \quad Hg \longmapsto p \cdot g.$$

Jika $Hg = Hg'$, ambil $h \in H$ sedemikian sehingga $g' = hg$. Lalu

$$p \cdot g' = p \cdot (hg) = (p \cdot h) \cdot g = p \cdot g,$$

sehingga Φ terdefinisi baik. Sebaliknya, jika $p \cdot g = p \cdot g'$, terapkan aksi g^{-1} di kanan pada kedua ruas untuk memperoleh

$$p = p \cdot (g'g^{-1})$$

dan karena itu $g'g^{-1} \in H$ serta $Hg' = Hg$. Dengan demikian Φ injektif, sedangkan surjektivitas benar dari definisi orbit. Untuk $k \in G$,

$$\Phi((Hg) \cdot k) = \Phi(Hgk) = p \cdot (gk) = (p \cdot g) \cdot k,$$

sehingga Φ ekuivarian.

Terakhir, SLSC dalam konvensi mata kuliah memberi basis lingkungan terhubung lintasan pada X . Di atas lingkungan yang tertutup rata, setiap lembaran ruang penutup homeomorfik dengan lingkungan tersebut. Lembaran-lembaran ini memberi basis lingkungan terhubung lintasan pada Z , sehingga Z terhubung lintasan lokal. Pada ruang terhubung lintasan lokal, setiap komponen lintasan terbuka; suatu komponen terhubung tidak dapat menjadi gabungan saling lepas dari lebih dari satu komponen lintasan terbuka. Maka komponen terhubung dan komponen lintasan Z bertepatan.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts, © 2019 David Michael Roberts, tepatnya [Notes.tex](#) baris 3210–3286 pada commit [b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#) dari repositori [DavidMichaelRoberts/AlgebraicTopology2019](#). Rentang itu dimulai dengan penanda Kuliah 15 dan berakhir dengan dua baris kosong setelah pertanyaan realisasi subgrup. Kuliah 16 dimulai di tengah berkas sumber pada baris 3287 dan tidak termasuk dalam unit ini. Materi sumber dan adaptasi Indonesia ini tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan edisi mencakup penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, dan pemindahan ketiga catatan pinggir sumber ke urutan bacaan utama. Kedua diagram Xy-pic vertikal ditulis ulang sebagai diagram semantik yang menyebut ruang total, ruang basis, dan arah peta. Keenam tampilan matematis sumber dipertahankan, dengan rumus peta ditambahkan ketika sumber hanya menyatakan kesurjektifan tanpa memberi nilai unsur.

Konvensi aksi diperjelas dan diperbaiki secara menyeluruh. Karena produk loop dalam kuliah ini dibaca kronologis, transpor serat langsung adalah **aksi kanan**:

$$z \cdot [\gamma] = \gamma_*(z).$$

Oleh karena itu orbit bertitik diidentifikasi dengan ruang koset kanan $H \backslash G$, bukan G/H . Setiap kemunculan grup fundamental ruang total sebagai subgrup juga diberi peta yang hilang, yakni $\pi_*\pi_1(Z, z) \leq \pi_1(X, x_0)$. Penerapan tarik balik yang salah ketik $\text{in}_j^* X$ dikoreksi menjadi $\text{in}_j^* Z$, dan bukti orbit dilengkapi dengan identifikasi penstabil melalui kriteria pengangkatan loop tertutup.

Konvensi SLSC mata kuliah dipertahankan: istilah itu sudah mencakup basis lingkungan terhubung lintasan. Karena itu komponen ruang basis dan ruang total penutup bersifat terbuka, komponen terhubung sama dengan komponen lintasan, dan pembatasan ke setiap komponen ruang total benar-benar merupakan ruang penutup surjektif. Indeks komponen ruang basis dan ruang total dibedakan agar tidak bertabrakan. Catatan sumber tentang aksi bebas juga diperketat: agar $Y \rightarrow Y/G$ menjadi peta penutup, yang diperlukan adalah aksi penutup, bukan kebebasan saja.

Sumber menunda keberadaan ruang penutup terhubung sederhana, realisasi setiap subgrup, dan kepenyempurnaan-functor monodromi. Edisi ini mempertahankan batas logis itu. Tujuh pemeriksaan penguasaan asli edisi hanya menyelesaikan langkah yang sudah menjadi kewajiban Unit 15: pemisahan menurut komponen, aksi kanan, orbit, penstabil, contoh lingkaran, dan sifat torsor yang bersifat kondisional. Materi pendamping tersedia di bawah CC BY 4.0 dan tidak meminjam solusi eksternal. Edisi ini bersifat independen; edisi ini tidak disponsori, didukung, disahkan, ataupun diberi status resmi oleh David Michael Roberts, MIT, Haynes Miller, Sanath Devalapurkar, Yeheli Fomberg, Nir Lazarovich, atau institusi mereka.

15 Kuliah 15

Kita memakai dua konvensi tetap. Pertama, hasil kali loop $[\gamma][\eta]$ dibaca **kronologis**: γ ditempuh dahulu, lalu η . Kedua, bila $p: Z \rightarrow X$ ruang penutup dan $z \in Z_x$, transpor langsung didefinisikan oleh

$$z \cdot [\gamma] := \gamma_*(z).$$

Keunikan pengangkatan memberi

$$(z \cdot [\gamma]) \cdot [\eta] = z \cdot ([\gamma][\eta]),$$

jadi ini aksi kanan. Untuk grup G , notasi $\mathbf{Set}_G$ berarti kategori himpunan dengan aksi kanan G dan pemetaan ekuivarian kanan. Dengan konvensi ini, ruang koset $H \backslash G = \{Hg : g \in G\}$ membawa aksi kanan $(Hg) \cdot k = H(gk)$.

15.1 Memisahkan ruang penutup menurut komponen basis

Lema 15.1. Jika ruang X merupakan koproduk topologis

$$X = \bigsqcup_{i \in I} X_i,$$

maka terdapat ekuivalensi kategori

$$\mathrm{Cov}_X \simeq \prod_{i \in I} \mathrm{Cov}_{X_i}.$$

Bukti. Tuliskan $\mathrm{in}_j: X_j \rightarrow \bigsqcup_{i \in I} X_i$ untuk inklusi. Ruang penutup $p: Z \rightarrow X$ memberi ruang penutup hasil tarik balik

$$Z_{X_j} := \mathrm{in}_j^* Z = X_j \times_X Z \longrightarrow X_j$$

untuk setiap $j \in I$. Pemetaan ruang penutup $f: Z \rightarrow Z'$ di atas X membatasi menjadi pemetaan $f|_{X_j}: Z_{X_j} \rightarrow Z'_{X_j}$ di atas X_j . Jadi diperoleh functor

$$R: \mathrm{Cov}_X \longrightarrow \prod_{i \in I} \mathrm{Cov}_{X_i}.$$

Sebaliknya, dari keluarga ruang penutup $p_i: Z_i \rightarrow X_i$ diperoleh ruang penutup

$$\bigsqcup_{i \in I} Z_i \longrightarrow \bigsqcup_{i \in I} X_i.$$

Koproduk pemetaan $Z_i \rightarrow Z'_i$ memberi pemetaan ruang penutup di atas X . Ini mendefinisikan functor C dalam arah sebaliknya.

Tarik balik koproduk $\bigsqcup_i Z_i$ ke X_j secara kanonik isomorfik dengan Z_j , sehingga $RC \cong \mathrm{id}$. Di arah lain, himpunan terbuka $p^{-1}(X_i)$ membentuk partisi Z , dan pemetaan kanonik $\bigsqcup_i p^{-1}(X_i) \rightarrow Z$ adalah homeomorfisma di atas X ; maka $CR \cong \mathrm{id}$. Kedua isomorfisma itu natural pada pemetaan ruang penutup. Jadi R dan C merupakan ekuivalensi kategori.

Functor serat dari Unit 14—antarmuka masuknya bernama stabil `o012-rbt-l14-eq-fibre-functor`—karenanya memfaktor sebagai

$$\mathrm{Cov}_X \xrightarrow{\simeq} \prod_{i \in I} \mathrm{Cov}_{X_i} \longrightarrow \prod_{i \in I} \mathbf{Set}_{\pi_1(X_i, a_i)}.$$

Diagram 15.1 (objek sebelum pembatasan). Data awal adalah satu panah vertikal

$$\begin{array}{c} Z \\ \downarrow p \\ X. \end{array}$$

Panah mengarah dari ruang total Z ke ruang basis X .

Diagram 15.2 (keluarga sesudah pembatasan). Untuk setiap $i \in I$, data hasil pembatasan adalah panah vertikal

$$\begin{array}{c} Z_{X_i} = X_i \times_X Z \\ \downarrow p_i \\ X_i. \end{array}$$

Tahap berikutnya mengambil serat $(Z_{X_i})_{a_i} = Z_{a_i}$ beserta aksi kanan langsung $\pi_1(X_i, a_i)$ pada serat itu. Jadi pemetaan objek lengkapnya adalah

$$(Z \rightarrow X) \longmapsto (Z_{X_i} \rightarrow X_i)_{i \in I} \longmapsto (Z_{a_i}, \rho_i)_{i \in I},$$

dengan ρ_i ditentukan oleh $z \cdot [\gamma] = \gamma_*(z)$.

Karena itu, jika setiap fungtor $\text{Cov}_{X_i} \rightarrow \mathbf{Set}_{\pi_1(X_i, a_i)}$ dipahami, maka kasus umum juga dipahami komponen demi komponen.

15.2 Komponen terhubung dan contoh lingkaran

Mulai sekarang, anggap X terhubung dan SLSC dalam konvensi mata kuliah, serta pilih $x_0 \in X$. Karena SLSC mencakup basis lingkungan terhubung lintasan, X terhubung lintasan. Untuk $z \in Z$, pilih lingkungan W dari $p(z)$ yang diliputi secara merata, lalu pilih lingkungan basis terhubung lintasan U dengan $p(z) \in U \subseteq W$. Pembatasan lembaran-lembaran di atas W ke U memberi basis lingkungan terhubung lintasan pada Z . Jadi Z terhubung lintasan lokal, komponen terhubungnya sama dengan komponen lintasannya, dan setiap komponen bersifat terbuka.

Dengan J sebagai himpunan indeks komponen ruang total, tuliskan

$$Z = \bigsqcup_{\alpha \in J} Z_\alpha.$$

Setiap pembatasan $p_\alpha: Z_\alpha \rightarrow X$ merupakan ruang penutup terhubung. Memang, di sekitar setiap $x \in X$ pilih lingkungan terhubung lintasan U yang diliputi secara merata. Setiap lembaran di atas U terhubung lintasan, sehingga seluruh lembaran itu terletak dalam tepat satu komponen ruang total. Akibatnya $p^{-1}(U) \cap Z_\alpha$ merupakan gabungan lembaran-lembaran utuh, dan U diliputi secara merata oleh pembatasan tersebut. Untuk kesurjektifan, pilih $u \in Z_\alpha$. Bagi $x \in X$, pilih lintasan dari $p(u)$ ke x dan angkat lintasan itu mulai dari u . Seluruh pengangkatan berada di Z_α , sehingga titik akhirnya terletak di atas x .

Catatan 15.1 (hipotesis yang dipakai). Sumber menempatkan dua catatan di pinggir pada langkah ini: satu menyebut perlunya basis lingkungan terhubung lintasan dan satu lagi menandai dekomposisi komponen sebagai latihan. Dalam konvensi mata kuliah, syarat basis itu sudah menjadi bagian definisi SLSC; argumen pada paragraf sebelumnya menyelesaikan latihan tersebut. Jika istilah “terhubung sederhana semilokal” dipakai dalam arti standar yang lebih lemah, keterhubungan lintasan lokal harus ditambahkan sebagai hipotesis terpisah. Antarmuka masuk dari Unit 14 untuk fakta ini bernama stabil o012-rbt-114-rem-001.

Contoh 15.1 (ruang penutup lingkaran yang telah dikenal). Ambil $X = S^1$. Untuk ruang diskret F , ada ruang penutup trivial

$$S^1 \times F \cong \bigsqcup_{f \in F} S^1 \longrightarrow S^1.$$

Ada pula peta eksponensial

$$\mathbb{R} \longrightarrow S^1, \quad t \longmapsto e^{2\pi it},$$

dan, untuk setiap $n > 1$, ruang penutup

$$q_n: S_n^1 \longrightarrow S^1, \quad q_n(z) = z^n.$$

Subskrip pada S_n^1 mengingatkan kita pada petanya; ruang totalnya sendiri homeomorfik dengan S^1 . Kita dapat mengambil gabungan saling lepas dengan banyak salinan yang sebarang. Jika A_∞ mengindeks salinan penutup eksponensial dan A_n mengindeks salinan penutup derajat n , salah satu bentuk umumnya adalah

$$S^1 \times F \sqcup \bigsqcup_{\alpha \in A_\infty} \mathbb{R}_\alpha \sqcup \bigsqcup_{n \geq 2} \bigsqcup_{\beta \in A_n} S^1_{n,\beta} \longrightarrow S^1.$$

Pada titik ini masih harus ditentukan apakah ada ruang penutup S^1 yang tidak isomorfik dengan bentuk tersebut. Unit ini mempertahankan pertanyaan itu sebagai hasil yang ditunda.

15.3 Orbit serat dan koset kanan

Ambil ruang penutup $p: Z \rightarrow X$ dan dekomposisi $Z = \bigsqcup_{\alpha \in J} Z_\alpha$ di atas. Pilih

$$z_\alpha \in Z_{x_0} \cap Z_\alpha$$

untuk setiap $\alpha \in J$; titik semacam itu ada karena $Z_\alpha \rightarrow X$ surjektif. Hasil dari Kuliah 6 memberi peta surjektif

$$\Omega_{x_0} X \times \{z_\alpha : \alpha \in J\} \longrightarrow Z_{x_0}, \quad (\gamma, z_\alpha) \longmapsto \tilde{\gamma}_{z_\alpha}(1).$$

Peta ini hanya bergantung pada kelas homotopi loop yang mempertahankan titik ujung. Karena itu ia turun menjadi peta surjektif

$$\begin{aligned} \pi_1(X, x_0) \times \{z_\alpha : \alpha \in J\} &\cong \bigsqcup_{\alpha \in J} \pi_1(X, x_0) \times \{z_\alpha\} \\ &\longrightarrow Z_{x_0} = \bigsqcup_{\alpha \in J} (Z_{x_0} \cap Z_\alpha), \\ ([\gamma], z_\alpha) &\longmapsto z_\alpha \cdot [\gamma]. \end{aligned}$$

Lema 15.2 (komponen adalah orbit). Di bawah asumsi tetap bahwa X terhubung dan SLSC, letakkan

$$G := \pi_1(X, x_0), \quad H_\alpha := (p_\alpha)_* \pi_1(Z_\alpha, z_\alpha) \leq G.$$

Untuk setiap pilihan $z_\alpha \in Z_{x_0} \cap Z_\alpha$, terdapat isomorfisma himpunan- G kanan

$$Z_{x_0} = \bigsqcup_{\alpha \in J} (Z_{x_0} \cap Z_\alpha) \cong \bigsqcup_{\alpha \in J} H_\alpha \backslash G.$$

Bukti. Pertama kita identifikasi orbit. Jika $z \in Z_{x_0} \cap Z_\alpha$, keterhubungan lintasan Z_α memberi lintasan $\delta: z_\alpha \rightsquigarrow z$. Proyeksinya $p \circ \delta$ adalah loop di x_0 , dan pengangkatan uniknya mulai dari z_α adalah δ . Jadi

$$z_\alpha \cdot [p \circ \delta] = z.$$

Maka $Z_{x_0} \cap Z_\alpha$ termuat dalam orbit z_α . Sebaliknya, jika $z = z_\alpha \cdot [\eta]$, pengangkatan η mulai dari z_α merupakan lintasan di Z dari z_α ke z . Jadi z berada di komponen Z_α . Dengan demikian orbit z_α tepat $Z_{x_0} \cap Z_\alpha$.

Sekarang kita identifikasi penstabil. Kelas $[\eta] \in G$ menetapkan z_α tepat ketika pengangkatan η mulai dari z_α berakhir kembali di z_α . Dalam hal itu pengangkatannya adalah loop di Z_α , sehingga

$$[\eta] \in (p_\alpha)_* \pi_1(Z_\alpha, z_\alpha) = H_\alpha.$$

Sebaliknya, proyeksi setiap loop di (Z_α, z_α) jelas terangkat kembali ke loop tersebut, sehingga kelas proyeksinya menetapkan z_α . Jadi

$$\text{Stab}_G(z_\alpha) = H_\alpha.$$

Akhirnya, peta orbit

$$H_\alpha g \mapsto z_\alpha \cdot g$$

terdefinisi baik, bijektif, dan ekuivarian kanan. Mengambil gabungan saling lepas atas semua α memberi isomorfisma yang dinyatakan.

Akibatnya, functor $\text{Cov}_X \rightarrow \mathbf{Set}_G$ mempertahankan gabungan saling lepas: ruang penutup $\bigsqcup_{\alpha \in J} Z_\alpha \rightarrow X$ dikirim ke gabungan saling lepas orbit

$$\bigsqcup_{\alpha \in J} (Z_{x_0} \cap Z_\alpha).$$

Catatan 15.2 (aksi sebagai keluarga aksi transitif). Jika himpunan- G kanan S terurai menjadi orbit

$$S = \bigsqcup_{\alpha \in J} S_\alpha,$$

maka setiap operator $\rho_g(s) := s \cdot g$ mempertahankan setiap S_α . Karena itu semua operator aksi berada dalam subgrup

$$\prod_{\alpha \in J} \text{Aut}(S_\alpha) \leq \text{Aut}\left(\bigsqcup_{\alpha \in J} S_\alpha\right).$$

Dengan kata lain, aksi itu tepat keluarga $(\rho_\alpha)_{\alpha \in J}$ dari aksi kanan transitif pada S_α . Dalam notasi operator, hukum aksi kanan berbunyi $\rho_{gh} = \rho_h \circ \rho_g$; ekuivalen dengan sebuah functor $G^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$.

15.4 Reduksi ke ruang penutup terhubung dan aksi transitif

Ingat pertanyaan asalnya: representasi grupoid fundamental mana yang berasal dari ruang penutup? Setelah reduksi menurut komponen basis dan orbit, untuk X terhubung kita dapat membandingkan dua subkategori penuh:

- $\text{Cov}_X^{\text{conn}}$, ruang penutup dengan ruang total terhubung;
- $\mathbf{Set}_G^{\text{tr}}$, himpunan- G kanan dengan aksi transitif.

Lema 15.2 menunjukkan bahwa functor monodromi membatasi menjadi

$$\text{Cov}_X^{\text{conn}} \longrightarrow \mathbf{Set}_G^{\text{tr}}.$$

Setiap ruang penutup merupakan gabungan saling lepas komponen terhubungnya, dan setiap himpunan- G merupakan gabungan saling lepas orbitnya. Karena itu, untuk menentukan **objek** mana yang berada dalam citra esensial functor monodromi, cukup ditanyakan apakah setiap himpunan- G kanan transitif berasal dari suatu ruang penutup terhubung. Reduksi ini belum membuktikan bahwa functor penuh atau setia pada morfisma.

Sekarang ambil himpunan- G kanan transitif S dan titik $p \in S$. Grup G sendiri, dengan aksi perkalian kanan, bebas dan transitif. Peta orbit

$$\begin{aligned} G &\longrightarrow S \cong \text{Stab}(p) \backslash G, \\ g &\longmapsto p \cdot g \end{aligned}$$

surjektif dan ekuivarian kanan. Secara lebih umum, jika T adalah himpunan- G kanan dengan aksi bebas dan transitif, pilih $t_0 \in T$ dan definisikan

$$t_0 \cdot g \longmapsto p \cdot g.$$

Karena aksi pada T bebas dan transitif, setiap unsur T mempunyai bentuk $t_0 \cdot g$ secara unik. Jadi rumus itu memberi peta ekuivarian surjektif $T \rightarrow S$. Pilihan t_0 membuat peta ini tidak kanonik.

Contoh 15.2 (serat penutup terhubung sederhana). Misalkan telah diberikan ruang penutup terhubung sederhana $p: Z \rightarrow X$. Serat Z_{x_0} adalah himpunan- G kanan yang bebas dan transitif.

Transitivitas mengikuti dari keterhubungan lintasan Z : lintasan antara dua titik serat memproyeksi menjadi loop yang mentranspor titik pertama ke titik kedua. Jika $[\gamma]$ menetapkan $z \in Z_{x_0}$, pengangkatannya mulai dari z adalah loop di Z . Karena Z terhubung sederhana, proyeksi loop itu trivial di G ; jadi aksi bebas. Pernyataan ini bersifat kondisional: Unit 15 belum membangun atau membuktikan keberadaan ruang penutup seperti itu.

15.5 Pertanyaan realisasi subgrup

Untuk ruang penutup terhubung lintasan $p: Z \rightarrow X$ dan $z \in Z_{x_0}$, Lema 15.2 memberi isomorfisma himpunan- G kanan

$$Z_{x_0} \cong p_*\pi_1(Z, z) \backslash \pi_1(X, x_0).$$

Jika ruang penutupnya bertitik, titik z sudah menjadi bagian data sehingga tidak perlu dipilih lagi. Sebaliknya, setiap ruang penutup terhubung dari ruang bertitik dapat dijadikan bertitik dengan memilih satu titik di atas x_0 ; melupakan titik itu mengembalikan ruang penutup semula.

Pertanyaan 15.1 (pertanyaan akhir sumber). Diberikan subgrup

$$H < \pi_1(X, x_0),$$

adakah ruang penutup bertitik

$$p: (Z, z_0) \longrightarrow (X, x_0)$$

sedemikian sehingga

$$p_*\pi_1(Z, z_0) = H$$

sebagai subgrup dari $\pi_1(X, x_0)$?

Catatan pinggir sumber mengingatkan kembali contoh terdahulu: jika ruang terhubung sederhana Y membawa aksi penutup bebas oleh G , maka $Y \rightarrow Y/G$ adalah ruang penutup dan, setelah memilih titik basis yang sesuai, $\pi_1(Y/G, *) \cong G$. Hipotesis “aksi penutup” penting; aksi bebas topologis semata belum menjamin peta hasil bagi merupakan peta penutup.

Batas hasil Unit 15. Pertanyaan 15.1 sengaja belum dijawab di sini. Kuliah 16, yang mulai pada `Notes.tex:3287`, akan mencoba membangun ruang penutup terhubung sederhana dan mengambil hasil baginya oleh subgrup. Unit 15 juga belum membuktikan bahwa semua pemetaan ekuivarian

serat berasal dari pemetaan ruang penutup; jadi kepenuhan, kesetiaan, dan ekuivalensi kategori tetap merupakan hasil kemudian.

Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Tujuh pemeriksaan berikut adalah materi asli edisi. Semuanya terbatas pada hasil yang telah tersedia di Unit 15. Tidak satu pun mengasumsikan atau membuktikan keberadaan ruang penutup universal, realisasi subgrup umum, atau kepenuhan-setiaan funktor monodromi.

Pemeriksaan penguasaan 15.1 (ekuivalensi pada koproduk). Definisikan kedua funktor pada Lema 15.1, termasuk tindakannya pada morfisma, lalu tulis isomorfisma natural yang menunjukkan bahwa keduanya saling invers hingga isomorfisma.

15.6 Solusi Pemeriksaan 15.1

Functor pembatasan adalah

$$R(Z \xrightarrow{p} X) = (X_i \times_X Z \rightarrow X_i)_{i \in I},$$

dan pada morfisma $f: Z \rightarrow Z'$ ia memakai $\text{id}_{X_i} \times_X f$. Functor koproduk adalah

$$C((Z_i \rightarrow X_i)_i) = \left(\bigsqcup_i Z_i \rightarrow \bigsqcup_i X_i \right),$$

dan pada morfisma ia mengambil koproduk semua pemetaan komponen.

Untuk keluarga $(Z_i \rightarrow X_i)_i$, tarik balik koproduhnya ke X_j hanya menyisakan Z_j , sehingga komponen isomorfisma natural $RC \Rightarrow \text{id}$ adalah

$$X_j \times_X \left(\bigsqcup_i Z_i \right) \xrightarrow{\cong} Z_j.$$

Untuk $Z \rightarrow X$, komponen isomorfisma natural $CR \Rightarrow \text{id}$ adalah

$$\bigsqcup_i (X_i \times_X Z) \longrightarrow Z, \quad (x, z) \longmapsto z.$$

Ia bijektif dan merupakan homeomorfisma karena X_i terbuka dan tertutup dalam koproduk, sehingga $p^{-1}(X_i)$ juga terbuka dan tertutup dalam Z . Kedua rumus jelas berkomutasi dengan morfisma ruang penutup; jadi keduanya natural.

Pemeriksaan penguasaan 15.2 (komponen ruang total). Misalkan X terhubung dan SLSC serta $p: Z \rightarrow X$ ruang penutup. Buktikan bahwa setiap komponen terhubung Z_α terbuka, terhubung lintasan, dan bahwa $p|_{Z_\alpha}: Z_\alpha \rightarrow X$ merupakan ruang penutup surjektif.

15.7 Solusi Pemeriksaan 15.2

Konvensi SLSC memberi basis lingkungan terbuka terhubung lintasan pada X . Untuk $z \in Z$, pilih lingkungan W dari $p(z)$ yang diliputi secara merata, lalu ambil lingkungan basis terhubung lintasan U dengan $p(z) \in U \subseteq W$. Pembatasan setiap lembaran di atas W ke U homeomorfik dengan U . Lembaran-lembaran semacam itu membentuk basis lingkungan terhubung lintasan pada Z . Maka Z terhubung lintasan lokal; komponen terhubungnya terbuka dan sama dengan komponen lintasannya.

Sekarang, di sekitar setiap $x \in X$, pilih U yang sekaligus terhubung lintasan dan diliputi secara merata. Setiap lembaran di atas U terhubung lintasan, jadi termuat dalam tepat satu komponen Z_α . Dengan demikian $p^{-1}(U) \cap Z_\alpha$ adalah gabungan lembaran-lembaran utuh; ini membuktikan bahwa $p|_{Z_\alpha}$ merupakan peta penutup ke citranya. Untuk menunjukkan citranya seluruh X , pilih $u \in Z_\alpha$. Karena X terhubung dan terhubung lintasan lokal, X terhubung lintasan. Bagi $x \in X$, pilih lintasan dari $p(u)$ ke x . Pengangkatannya mulai dari u tetap berada dalam komponen lintasan Z_α dan berakhir di atas x . Jadi pembatasan itu surjektif dan merupakan ruang penutup terhubung.

Pemeriksaan penguasaan 15.3 (aksi pada contoh lingkaran). Dengan $\pi_1(S^1, 1) \cong \mathbb{Z}$, hitung aksi kanan pada serat penutup trivial, penutup eksponensial, dan penutup $q_n(z) = z^n$. Tentukan penstabil dan orbit masing-masing. Jelaskan apa yang belum dibuktikan oleh perhitungan ini.

15.8 Solusi Pemeriksaan 15.3

Tuliskan unsur grup sebagai $m \in \mathbb{Z}$, dengan penjumlahan kronologis. Pada satu komponen penutup trivial $S^1 \rightarrow S^1$, seratnya satu titik dan setiap m menetapkannya. Penstabilnya seluruh $\mathbb{Z}$, sehingga orbitnya

$$\mathbb{Z} \backslash \mathbb{Z}$$

adalah satu titik. Faktor diskret F hanya memberi satu orbit semacam ini untuk setiap $f \in F$.

Untuk penutup eksponensial, identifikasi serat di atas 1 dengan $\mathbb{Z}$. Pengangkatan loop berderajat m mengirim

$$k \cdot m = k + m.$$

Aksi ini bebas dan transitif; penstabil 0, dan orbitnya $\{0\} \backslash \mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}$.

Untuk q_n , serat diidentifikasi dengan $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, dan

$$[k] \cdot m = [k + m].$$

Penstabil $[0]$ adalah $n\mathbb{Z}$, sehingga orbitnya $n\mathbb{Z} \backslash \mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Gabungan saling lepas penutup memberi gabungan saling lepas orbit-orbit tersebut.

Perhitungan ini menentukan monodromi semua contoh yang telah ditampilkan, tetapi sampai baris 3239 pada sumber belum dibuktikan bahwa setiap ruang penutup S^1 harus muncul dalam daftar. Klaim kelengkapan memerlukan argumen klasifikasi tambahan.

Pemeriksaan penguasaan 15.4 (mengapa koset kanan). Misalkan S adalah himpunan- G kanan transitif, $p \in S$, dan $H = \text{Stab}_G(p)$. Buktikan langsung bahwa

$$H \backslash G \longrightarrow S, \quad Hg \longmapsto p \cdot g$$

adalah isomorfisma himpunan- G kanan. Tunjukkan pula mengapa G/H tidak membawa rumus yang sama tanpa mengubah konvensi aksi.

15.9 Solusi Pemeriksaan 15.4

Jika $Hg' = Hg$, ada $h \in H$ dengan $g' = hg$. Karena $p \cdot h = p$,

$$p \cdot g' = p \cdot (hg) = (p \cdot h) \cdot g = p \cdot g,$$

jadi peta terdefinisi baik. Ia surjektif karena aksi transitif. Jika $p \cdot g' = p \cdot g$, aksi kanan dengan g^{-1} memberi

$$p \cdot (g'g^{-1}) = p,$$

sehingga $g'g^{-1} \in H$ dan $Hg' = Hg$; jadi peta injektif. Ekuivariansinya mengikuti dari

$$(Hg) \cdot k = H(gk) \longmapsto p \cdot (gk) = (p \cdot g) \cdot k.$$

Sebaliknya, G/H terdiri atas koset kiri gH . Perkalian kanan $gH \mapsto gkH$ tidak terdefinisi baik untuk subgrup umum karena mengganti wakil g dapat mengubah koset hasil. Ruang G/H sesuai secara langsung dengan aksi **kiri**. Konversi melalui invers memang mungkin, tetapi itu merupakan konvensi tambahan dan bukan transpor serat langsung yang dipakai di unit ini.

Pemeriksaan penguasaan 15.5 (penstabil dan pengangkatan tertutup). Untuk ruang penutup terhubung $p: (Z, z) \rightarrow (X, x_0)$, buktikan

$$\text{Stab}_{\pi_1(X, x_0)}(z) = p_*\pi_1(Z, z).$$

15.10 Solusi Pemeriksaan 15.5

Kelas loop $[\gamma]$ berada dalam penstabil z tepat ketika

$$z \cdot [\gamma] = z.$$

Menurut definisi transpor, ini berarti pengangkatan unik $\tilde{\gamma}_z$ berawal dan berakhir di z , jadi merupakan loop di (Z, z) . Proyeksinya adalah γ , sehingga $[\gamma] \in p_*\pi_1(Z, z)$.

Sebaliknya, jika $[\gamma] = p_*[\delta] = [p \circ \delta]$ untuk suatu loop δ di (Z, z) , maka transpor hanya bergantung pada kelas homotopi dan

$$z \cdot [\gamma] = z \cdot [p \circ \delta] = z,$$

sebab δ adalah pengangkatan $p \circ \delta$ yang mulai sekaligus berakhir di z . Kedua inklusi terbukti.

Pemeriksaan penguasaan 15.6 (torsor serat, secara kondisional). Andaikan ruang penutup terhubung sederhana $p: Z \rightarrow X$ sudah diberikan. Buktikan bahwa Z_{x_0} adalah himpunan- G kanan bebas dan transitif tanpa membuktikan keberadaan ruang penutup tersebut.

15.11 Solusi Pemeriksaan 15.6

Karena “terhubung sederhana” mencakup keterhubungan lintasan, bagi $z, z' \in Z_{x_0}$ ada lintasan $\delta: z \rightsquigarrow z'$ di Z . Proyeksi $p \circ \delta$ adalah loop di x_0 , dan keunikan pengangkatan memberi

$$z \cdot [p \circ \delta] = z'.$$

Jadi aksi transitif.

Menurut Pemeriksaan 15.5,

$$\text{Stab}_G(z) = p_*\pi_1(Z, z).$$

Karena Z terhubung sederhana, grup pada ruas kanan trivial. Semua penstabil trivial, jadi aksi bebas. Argumen ini hanya membuktikan sifat serat **jika** penutup terhubung sederhana tersedia; ia tidak membangun penutup tersebut.

Pemeriksaan penguasaan 15.7 (audit batas logis). Putuskan mana dari pernyataan berikut yang sudah dibuktikan pada akhir Unit 15 dan mana yang masih ditunda:

1. ruang penutup terurai menjadi gabungan saling lepas penutup terhubung;
2. serat penutup terhubung adalah aksi transitif;
3. setiap aksi transitif direalisasikan oleh penutup terhubung;
4. setiap subgrup direalisasikan sebagai $p_*\pi_1(Z, z)$;
5. functor monodromi surjektif secara esensial;
6. functor monodromi penuh dan setia;
7. jika penutup terhubung sederhana diberikan, seratnya bebas dan transitif.

15.12 Solusi Pemeriksaan 15.7

Pernyataan 1 sudah dibuktikan dengan keterhubungan lintasan lokal ruang total dan pengangkatan lintasan. Pernyataan 2 adalah isi Lema 15.2 untuk satu komponen. Pernyataan 7 adalah Contoh 15.2 dan Pemeriksaan 15.6; sifatnya kondisional pada keberadaan penutup terhubung sederhana.

Pernyataan 3 belum dibuktikan. Unit ini hanya mereduksi masalah objek umum ke masalah aksi transitif. Pernyataan 4 tepat Pertanyaan 15.1, jadi masih terbuka pada batas unit. Karena 3 dan 4 belum diselesaikan, pernyataan 5 juga belum diperoleh. Pernyataan 6 merupakan masalah morfisma yang berbeda: bahkan setelah semua objek direalisasikan, masih harus dibuktikan bahwa setiap pemetaan ekuivarian berasal dari tepat satu pemetaan ruang penutup. Jadi 6 pun ditunda.

Ringkasnya, Unit 15 menyelesaikan dekomposisi dan identifikasi orbit, lalu merumuskan masalah realisasi yang tepat. Ia tidak melompati konstruksi ruang penutup universal atau bagian morfisma dari teorema klasifikasi.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts, © 2019 David Michael Roberts, tepatnya [Notes.tex](#) baris 3287–3383 pada commit [b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#) dari repositori [DavidMichaelRoberts/AlgebraicTopology2019](#). Rentang itu dimulai dengan penanda Kuliah 16 pada baris 3287 dan berakhir sesudah proposisi surjektivitas esensial pada baris 3381 serta dua baris kosong. Penanda Kuliah 17 pada baris 3384 tidak termasuk dalam unit ini. Materi sumber dan adaptasi Indonesia ini tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan edisi mencakup penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, dan pemindahan keempat catatan pinggir ke urutan bacaan utama. Kedua segitiga Xy-pic ditulis ulang sebagai diagram semantik dengan daftar panah dan persamaan komutativitas. Hubungan matematisnya tidak bergantung pada posisi visual.

Edisi ini memperbaiki beberapa cacat matematis sumber. Monodromi langsung tetap merupakan aksi **kanan**, sehingga serat penutup yang merealisasikan subgrup $H \leq G$ ialah ruang koset kanan $H \backslash G$, bukan G/H . Aksi kiri serat demi serat, untuk $h = [\omega]$, $h \cdot [\gamma] = [\omega \# \gamma]$, pada penutup universal dibedakan dari aksi kanan monodromi $[\gamma] \cdot g = [\gamma \# \eta]$ untuk $g = [\eta]$; kedua aksi itu saling komutatif. Pernyataan keliru $\pi_1(X^{(1)}, *) = H$ diganti oleh pernyataan bertipe benar

$$(p_H)_*\pi_1(H \backslash \tilde{X}, H[c_{x_0}]) = H \leq \pi_1(X, x_0).$$

Sumber menyebut ruang kelas lintasan sebagai ruang hasil bagi dan kemudian menunda bukti topologinya ke halaman 64–65 buku Hatcher. Di sini himpunan kelas lintasan diberi **topologi basis**

penutup secara langsung. Edisi ini tidak menyatakan tanpa bukti bahwa topologi tersebut sama dengan topologi hasil bagi dari topologi kompak-terbuka, dan tidak memakai pemilihan lintasan yang berubah kontinu terhadap titik ujung. Aksi kiri, aksi kanan, aksioma basis, partisi lembaran, keterhubungan lintasan, keterhubungan sederhana, realisasi subgrup, dan kesurjektifan esensial semuanya dibuktikan. Prosa pembandingan tidak disalin. Notasi sumber $X^{(1)}$ untuk penutup universal dinormalkan menjadi $\tilde{X}$, sedangkan penutup yang merealisasikan H selalu ditulis terpisah sebagai $H \backslash \tilde{X}$.

Keenam pemeriksaan penguasaan beserta solusi lengkap merupakan materi asli edisi, tersedia di bawah CC BY 4.0. Materi itu tidak memperkenalkan klasifikasi transformasi dek ataupun kepenuhan dan kesetiaan functor, yang merupakan perkara kuliah kemudian. Edisi ini bersifat independen; edisi ini tidak disponsori, didukung, disahkan, ataupun diberi status resmi oleh David Michael Roberts, Allen Hatcher, Cornell University, MIT, Haynes Miller, Sanath Devalapurkar, Yeheli Fomberg, Nir Lazarovich, atau institusi mereka.

16 Kuliah 16

Sepanjang unit ini, konkatenasi $\alpha \# \beta$ ditempuh secara **kronologis**: mula-mula α , kemudian β . Jika $p: Z \rightarrow X$ ruang penutup, transpor titik akhir langsung ditulis sebagai aksi kanan

$$z \cdot [\eta] := \eta_*^Z(z).$$

Karena itu, bila X terhubung lintasan dan $G := \pi_1(X, x_0)$, serat di atas x_0 dari suatu penutup terhubung sederhana merupakan torsor **kanan** G . Tujuan yang tersisa dari Unit 15 ialah membangun penutup tersebut dan, bagi $H \leq G$, memperoleh serat $H \backslash G$. Mengambil hasil bagi tiap serat secara terpisah tidak mendefinisikan topologi ruang total; hasil bagi harus dilakukan sekaligus.

16.1 Aksi serat demi serat dan hasil bagi ruang penutup

Definisi 16.1 (aksi serat demi serat). Misalkan $p: Y \rightarrow X$ suatu pemetaan dan K grup diskret yang bertindak kontinu dari kiri pada Y . Aksi itu disebut **serat demi serat** jika

$$p(k \cdot y) = p(y)$$

untuk setiap $y \in Y$ dan $k \in K$. Setiap k dengan demikian bertindak sebagai homeomorfisma di atas X .

Definisi itu memberi satu-satunya pemetaan $\bar{p}: K \backslash Y \rightarrow X$ yang memenuhi $\bar{p}(Ky) = p(y)$. Seratnya di atas x ialah $K \backslash p^{-1}(x)$.

Diagram 16.1 (segitiga hasil bagi). Data panahnya adalah

$$Y \xrightarrow{q} K \backslash Y, \quad Y \xrightarrow{p} X, \quad K \backslash Y \xrightarrow{\bar{p}} X,$$

dengan $q(y) = Ky$. Persamaan komutativitasnya ialah

$$\bar{p} \circ q = p.$$

Proposisi 16.1 (hasil bagi suatu ruang penutup). Misalkan $p: Z \rightarrow X$ ruang penutup dan X SLSC dalam konvensi mata kuliah. Jika grup diskret K bertindak dari kiri pada Z secara serat demi serat, maka

$$\bar{p}: K \backslash Z \longrightarrow X$$

merupakan ruang penutup dan peta hasil bagi $q: Z \rightarrow K \backslash Z$ merupakan pemetaan ruang penutup di atas X .

Bukti. Ambil $x \in X$. Pilih lingkungan terbuka terhubung lintasan $U \ni x$ yang diliputi secara merata oleh p ; pilihan seperti ini tersedia dalam konvensi SLSC mata kuliah dengan memperkecil suatu lingkungan yang diliputi secara merata. Tuliskan $F := p^{-1}(x)$. Dengan menandai setiap lembaran oleh satu-satunya titiknya di atas x , diperoleh homeomorfisma di atas U

$$p^{-1}(U) \cong U \times F.$$

Setiap $k \in K$ mengirim satu lembaran terhubung lintasan ke suatu himpunan terhubung di atas U , jadi ke satu lembaran. Karena k^{-1} juga demikian, k benar-benar mempermutasikan lembaran-lembaran utuh. Pada satu lembaran, persamaan $p(k \cdot z) = p(z)$ memaksa peta itu menjadi identitas pada koordinat U . Maka trivialisasi di atas ekuivarian untuk rumus

$$k \cdot (u, f) = (u, k \cdot f).$$

Peta hasil bagi q terbuka, sebab bagi himpunan terbuka $O \subseteq Z$,

$$q^{-1}(q(O)) = \bigcup_{k \in K} k \cdot O$$

terbuka. Himpunan $p^{-1}(U)$ jenuh terhadap aksi, sehingga pembatasan hasil bagi mempunyai topologi yang tepat dan memberi homeomorfisma

$$\bar{p}^{-1}(U) \cong K \backslash p^{-1}(U) \cong U \times (K \backslash F)$$

di atas U . Karena F diskret, $K \backslash F$ juga diskret. Jadi U diliputi secara merata oleh $\bar{p}$. Hal ini berlaku di sekitar setiap x , maka $\bar{p}$ adalah ruang penutup. Persamaan $\bar{p} \circ q = p$ menunjukkan bahwa q merupakan pemetaan ruang penutup. Ini juga membuktikan identifikasi pembatasan dan hasil bagi yang oleh sumber diserahkan kepada Tugas 4.

16.2 Aksi kiri hasil bagi dan monodromi kanan

Andaikan untuk sementara bahwa penutup terhubung sederhana bertitik $p: (Z^{(1)}, z_0) \rightarrow (X, x_0)$ telah tersedia. Serat $Z_{x_0}^{(1)}$ merupakan torsor kanan untuk $G = \pi_1(X, x_0)$. Jika G , yang dipandang diskret, juga bertindak dari **kiri** secara serat demi serat sehingga identifikasi serat dengan G mengubah aksi itu menjadi perkalian kiri, pembatasan aksi ke $H \leq G$ dan Proposisi 16.1 memberi

$$p_H: H \backslash Z^{(1)} \longrightarrow X, \quad (p_H)^{-1}(x_0) \cong H \backslash G.$$

Rumus ini memperbaiki sisi koset pada sumber: $H \backslash G$ membawa aksi kanan $(Hg) \cdot k = H(gk)$, sedangkan G/H tidak membawa rumus itu untuk subgroup umum.

Lema 16.1 (ekuivariansi peta hasil bagi). Dalam situasi di atas, untuk setiap $x \in X$ peta serat

$$q_x: Z_x^{(1)} \longrightarrow (H \backslash Z^{(1)})_x$$

ekuivarian terhadap aksi kanan $\pi_1(X, x)$ melalui monodromi. Lebih umum, untuk kelas lintasan $[\eta: x \rightsquigarrow y]$,

$$q_y(z \cdot [\eta]) = q_x(z) \cdot [\eta].$$

Bukti. Angkat η ke lintasan $\tilde{\eta}_z$ di $Z^{(1)}$ yang mulai di z . Karena q merupakan pemetaan ruang penutup di atas X , $q \circ \tilde{\eta}_z$ adalah pengangkatan η ke $H \setminus Z^{(1)}$ yang mulai di $q_x(z)$. Keunikan pengangkatan memberi

$$q_y(\tilde{\eta}_z(1)) = \tilde{\eta}_{q_x(z)}(1),$$

yang tepat merupakan persamaan yang dinyatakan. Untuk $x = y$ persamaan itu adalah ekuivariansi terhadap aksi kanan $\pi_1(X, x)$. Ini menyelesaikan bukti yang pada sumber hanya ditandai “Exercise”, sekaligus memperbaiki salah eja *equivariant* dan *path lifing*.

Masih ada dua masalah yang harus dipecahkan:

1. bagaimana membangun, atau membuktikan keberadaan, ruang penutup terhubung sederhana dari X ;
2. setelah ruang itu tersedia, bagaimana membangun aksi serat demi serat untuk setiap subgrup $H < \pi_1(X, x_0)$.

Masalah kedua cukup direduksi ke aksi serat demi serat seluruh grup $G = \pi_1(X, x_0)$, sebab aksi setiap subgrup diperoleh dengan pembatasan. Ternyata konstruksi yang menyelesaikan masalah pertama sekaligus membawa aksi kiri G yang diperlukan.

16.3 Konstruksi himpunan kelas lintasan dan topologi basis

Konstruksi 16.1 (calon penutup universal). Ambil ruang bertitik (X, x_0) . Definisikan $\tilde{X}$ sebagai himpunan kelas homotopi dengan titik ujung tetap dari lintasan $\gamma: x_0 \rightsquigarrow x$, dengan x boleh berubah. Tuliskan $[\gamma]$ untuk kelasnya dan

$$p([\gamma]) = \gamma(1).$$

Kelas lintasan konstan di x_0 ditulis $[c_{x_0}]$; sesuai singkatan sumber, bila tidak menimbulkan kerancuan kelas itu juga ditulis c_{x_0} .

Sebut lingkungan terbuka terhubung lintasan $U \ni x$ **dapat dipakai** bila pemetaan yang diinduksi inklusi

$$\pi_1(U, x) \longrightarrow \pi_1(X, x)$$

trivial. Untuk $[\gamma] \in p^{-1}(x)$ dan lingkungan dapat dipakai U , definisikan

$$U_{[\gamma]} := \{[\gamma \# \eta] \mid \eta \text{ lintasan di } U, \eta(0) = x\}.$$

Berikan kepada $\tilde{X}$ topologi yang basisnya terdiri atas semua $U_{[\gamma]}$. Ini adalah definisi topologinya; tidak diasumsikan bahwa topologi tersebut merupakan topologi hasil bagi dari ruang lintasan dengan topologi kompak-terbuka.

Diagram 16.2 (kelas lintasan dan titik ujung). Pada tingkat himpunan bertitik, data panahnya adalah

$$(P_{x_0}X, c_{x_0}) \xrightarrow{r} (\tilde{X}, [c_{x_0}]), \quad (P_{x_0}X, c_{x_0}) \xrightarrow{e_1} (X, x_0), \quad (\tilde{X}, [c_{x_0}]) \xrightarrow{p} (X, x_0),$$

dengan $r(\gamma) = [\gamma]$ dan $e_1(\gamma) = \gamma(1)$. Persamaan komutativitasnya ialah

$$p \circ r = e_1.$$

Diagram ini belum mengklaim bahwa r kontinu untuk topologi kompak-terbuka. Kontinuitas p akan mengikuti langsung dari lembaran-lembaran basis.

Sebagai himpunan, konstruksi itu dapat dibaca sebagai gabungan semua morfisma grupoid fundamental yang berawal di x_0 :

$$\tilde{X} = \bigsqcup_{x \in X} \Pi_1(X)(x_0, x), \quad p^{-1}(x) = \Pi_1(X)(x_0, x).$$

Topologi basis di atas mengubah himpunan tersebut menjadi ruang topologis.

Proposisi 16.2 (penutup universal berbasis kelas lintasan). Jika X terhubung lintasan dan SLSC dalam konvensi mata kuliah, maka

$$p: (\tilde{X}, [c_{x_0}]) \longrightarrow (X, x_0)$$

merupakan ruang penutup terhubung sederhana. Grup $G = \pi_1(X, x_0)$, yang dipandang sebagai grup diskret, bertindak kontinu, bebas, dan serat demi serat dari kiri pada $\tilde{X}$ melalui prefiks loop.

Bukti. Kita membuktikan semua bagian secara berurutan.

Aksioma basis. Setiap $[\alpha] \in \tilde{X}$ berada dalam $U_{[\alpha]}$ untuk lingkungan dapat dipakai U dari titik ujungnya, karena lintasan konstan boleh dipilih sebagai η . Jika

$$[\alpha] \in U_{[\gamma]} \cap V_{[\delta]},$$

pilih lingkungan dapat dipakai W dari $p([\alpha])$ dengan $W \subseteq U \cap V$; basis lingkungan seperti itu merupakan bagian dari konvensi SLSC mata kuliah. Menambahkan lintasan di W pada α juga menambahkan lintasan di U pada wakil yang berasal dari $U_{[\gamma]}$, dan demikian pula untuk V . Jadi

$$W_{[\alpha]} \subseteq U_{[\gamma]} \cap V_{[\delta]}.$$

Kedua aksioma basis terpenuhi.

Lembaran lokal. Tetapkan lingkungan dapat dipakai $U \ni x$. Untuk setiap $a = [\gamma] \in p^{-1}(x)$, pembatasan

$$p|_{U_a}: U_a \longrightarrow U$$

surjektif karena U terhubung lintasan. Ia injektif: jika $p([\gamma \# \eta_1]) = p([\gamma \# \eta_2])$, kedua lintasan η_1 dan η_2 berakhir di titik yang sama. Loop $\eta_1 \# \overline{\eta_2}$ berada di U dan kelasnya trivial di X . Maka $[\eta_1] = [\eta_2]$ dalam grupoid fundamental, sehingga $[\gamma \# \eta_1] = [\gamma \# \eta_2]$.

Pemetaan itu juga homeomorfisma. Memang, jika $O \subseteq U_a$ terbuka dan $[\alpha] \in O$, aksioma basis memberi lingkungan basis yang memuat $[\alpha]$ dan termuat dalam O . Dengan memperhalusnya sekaligus di dalam U , diperoleh lingkungan dapat dipakai V dari titik ujung α sedemikian sehingga $V_{[\alpha]} \subseteq O$ dan

$$p(V_{[\alpha]}) = V.$$

Jadi pembatasan bijektif tersebut terbuka. Argumen yang sama menunjukkan bahwa p kontinu, karena setiap titik di $p^{-1}(O)$, untuk O terbuka, mempunyai lingkungan basis yang dipetakan ke dalam O .

Lembaran-lembaran itu mempartisi seluruh prabayangan:

$$p^{-1}(U) = \bigsqcup_{a \in p^{-1}(x)} U_a.$$

Untuk keberadaan, jika $[\beta]$ berakhir di $y \in U$, pilih lintasan $\eta: x \rightsquigarrow y$ di U ; maka $[\beta] \in U_{[\beta \# \eta]}$. Jika dua lembaran berpotongan, perbandingan kedua lintasan di U menghasilkan loop yang trivial di X , sehingga kedua pusatnya di atas x sama. Dengan demikian U diliputi secara merata. Jika $a(b)$ menandai satu-satunya pusat lembaran yang memuat $b \in p^{-1}(U)$, trivialisasi lokal yang bertipe lengkap ialah

$$\begin{aligned} \Theta_U: p^{-1}(U) &\xrightarrow{\cong} U \times p^{-1}(x), \\ b &\mapsto (p(b), a(b)). \end{aligned}$$

Inversnya mengirim (y, a) ke satu-satunya titik lembaran U_a di atas y . Konstruksi ini memakai lembaran basis, bukan pemilih lintasan kontinu $x' \mapsto \eta_{x'}$. Secara khusus, $U_a \cap p^{-1}(x) = \{a\}$, sehingga setiap serat $p^{-1}(x)$ diskret.

Pada tempat ini sumber mengarahkan pembaca ke [halaman 64–65 buku Hatcher](#) dan mencatat bahwa perincian akan ditambahkan kemudian serta tidak termasuk materi ujian kuliah asal. Argumen di atas memberikan perincian itu secara mandiri dan tidak mengidentifikasi topologi basis ini dengan topologi hasil bagi kompak-terbuka.

Keterhubungan lintasan. Bagi lintasan $\gamma: x_0 \rightsquigarrow x$, definisikan

$$\Gamma_\gamma(s) = [\gamma_s], \quad \gamma_s(t) = \gamma(st).$$

Ini memindahkan rumus yang diletakkan sumber di pinggir ke urutan bacaan utama. Peta Γ_γ kontinu. Untuk melihatnya di s_0 , mulai dari sebarang lingkungan basis yang memuat $[\gamma_{s_0}]$ dan perhalus menjadi $U_{[\gamma_{s_0}]}$ yang masih termuat di dalamnya. Kontinuitas γ memberi interval J dari s_0 sehingga $\gamma(J) \subseteq U$. Bagi $s \in J$, segmen

$$\eta_s(t) = \gamma((1-t)s_0 + ts)$$

berada di U , dan setelah menghapus atau menambahkan penelusuran balik, $[\gamma_s] = [\gamma_{s_0} \# \eta_s]$. Maka $\Gamma_\gamma(J) \subseteq U_{[\gamma_{s_0}]}$. Karena $\Gamma_\gamma(0) = [c_{x_0}]$ dan $\Gamma_\gamma(1) = [\gamma]$, setiap titik dapat dihubungkan dengan titik basis; jadi $\tilde{X}$ terhubung lintasan.

Aksi kiri. Jika $h = [\omega] \in G$, definisikan

$$h \cdot [\gamma] := [\omega \# \gamma].$$

Rumus ini terdefinisi baik dan serat demi serat. Untuk setiap himpunan basis,

$$h \cdot U_{[\gamma]} = U_{[\omega \# \gamma]},$$

sehingga setiap translasi kiri adalah homeomorfisma, dengan invers translasi oleh h^{-1} . Karena G diskret, aksi gabungan $G \times \tilde{X} \rightarrow \tilde{X}$ kontinu. Asosiativitas mengikuti dari asosiativitas komposisi dalam $\Pi_1(X)$. Jika $h \cdot [\gamma] = [\gamma]$, menggabungkan $[\bar{\gamma}]$ di kanan memberi $h = 1$; jadi aksi kiri itu bebas.

Aksi ini berbeda dari monodromi kanan. Untuk $[\eta: x \rightsquigarrow y]$, pengangkatan dari $[\gamma]$ berakhir di

$$[\gamma] \cdot [\eta] = [\gamma \# \eta].$$

Kedua aksi saling komutatif karena

$$h \cdot ([\gamma] \cdot [\eta]) = [\omega \# \gamma \# \eta] = (h \cdot [\gamma]) \cdot [\eta].$$

Keterhubungan sederhana. Untuk lintasan $\alpha: [0, 1] \rightarrow X$ yang mulai di x_0 , rumus

$$\tilde{\alpha}(t) = [\alpha_t], \quad \alpha_t(s) = \alpha(ts),$$

memberi pengangkatannya yang mulai di $[c_{x_0}]$; kontinuitasnya adalah argumen lembaran basis yang sama seperti untuk Γ_γ . Sekarang ambil loop λ di $(\tilde{X}, [c_{x_0}])$ dan letakkan $\alpha = p \circ \lambda$. Karena λ dan $\tilde{\alpha}$ merupakan dua pengangkatan α dengan titik awal yang sama, keunikan pengangkatan memberi $\lambda = \tilde{\alpha}$. Loop λ tertutup, maka

$$[\alpha] = \tilde{\alpha}(1) = [c_{x_0}].$$

Dengan kata lain, kriteria pengangkatan tertutup menyatakan bahwa hanya kelas loop trivial pada X yang mempunyai pengangkatan tertutup dari $[c_{x_0}]$. Jadi citra

$$p_*: \pi_1(\tilde{X}, [c_{x_0}]) \longrightarrow \pi_1(X, x_0)$$

trivial. Pemetaan p_* injektif untuk suatu ruang penutup, menurut teorema pengangkatan yang telah dibuktikan sebelumnya. Karena itu $\pi_1(\tilde{X}, [c_{x_0}])$ trivial. Bersama keterhubungan lintasan di atas, $\tilde{X}$ terhubung sederhana. Bukti ini tidak menyamakan aksi kiri bebas dengan penstabil monodromi kanan.

16.4 Realisasi subgrup dan semua representasi

Ambil kembali $G = \pi_1(X, x_0)$ dan subgrup $H \leq G$. Batasi aksi kiri pada Proposisi 16.2 ke H . Proposisi 16.1 menghasilkan ruang penutup bertitik

$$p_H: (H \backslash \tilde{X}, H[c_{x_0}]) \longrightarrow (X, x_0).$$

Ruang totalnya terhubung lintasan karena merupakan citra kontinu ruang terhubung lintasan $\tilde{X}$ di bawah peta hasil bagi.

Akibat 16.1 (realisasi subgrup). Untuk penutup bertitik di atas,

$$(p_H)_* \pi_1(H \backslash \tilde{X}, H[c_{x_0}]) = H \leq G.$$

Bukti. Bagi $g = [\omega] \in G$, pengangkatan loop ω melalui p_H yang mulai di $H[c_{x_0}]$ ialah

$$t \longmapsto H[\omega_t], \quad \omega_t(s) = \omega(ts).$$

Titik akhirnya $H[\omega]$. Menurut kriteria pengangkatan tertutup, g berada dalam citra $(p_H)_*$ tepat ketika

$$H[\omega] = H[c_{x_0}],$$

dan persamaan koset ini berlaku tepat ketika $g \in H$. Jadi citra itu persis H . Ruang $\tilde{X}$ sendiri tetap mempunyai grup fundamental trivial; inilah koreksi terhadap persamaan salah pada baris 3374 sumber.

Konstruksi tersebut juga menyelesaikan masalah objek umum. Misalkan mula-mula X terhubung lintasan dan S suatu himpunan dengan aksi kanan G . Uraikan S menjadi orbit dan pilih satu wakil dalam setiap orbit:

$$S = \bigsqcup_{i \in I} S_i, \quad s_i \in S_i, \quad H_i := \text{Stab}_G(s_i).$$

Bangun ruang penutup

$$Z_S := \bigsqcup_{i \in I} H_i \backslash \tilde{X} \longrightarrow X.$$

Jika $S = \emptyset$, maka $I = \emptyset$ dan $Z_S = \emptyset$; ini tetap ruang penutup menurut konvensi sumber, yang mengizinkan serat kosong.

Seratnya di atas x_0 ialah $\bigsqcup_i H_i \backslash G$, dan pemetaan

$$\begin{aligned} \Phi: \bigsqcup_{i \in I} H_i \backslash G &\longrightarrow S, \\ H_i g &\longmapsto s_i \cdot g \end{aligned}$$

terdefinisi baik, bijektif pada setiap orbit, dan ekuivarian kanan. Memang, $H_i g' = H_i g$ berarti $g' = hg$ untuk suatu $h \in H_i$, sehingga $s_i \cdot g' = s_i \cdot g$. Sebaliknya, kesamaan kedua nilai menunjukkan $g'g^{-1} \in H_i$, dan sifat ekuivariannya mengikuti dari $\Phi(H_i gk) = s_i \cdot (gk)$.

Jika $F: \Pi_1(X) \rightarrow \mathbf{Set}$ representasi yang diberikan, ambil $S = F(x_0)$ dengan aksi kanan $s \cdot g := F(g)(s)$ dalam konvensi komposisi kronologis unit ini. Tuliskan M untuk monodromi Z_S . Isomorfisma Φ pada titik basis meluas melalui transpor lintasan: untuk pilihan $\alpha: x_0 \rightsquigarrow x$, definisikan

$$\Phi_x := F(\alpha) \circ \Phi \circ M(\bar{\alpha}): (Z_S)_x \longrightarrow F(x).$$

Rumus ini tidak bergantung pada α . Memang, jika $\beta: x_0 \rightsquigarrow x$ pilihan lain dan $g = [\beta \# \bar{\alpha}] \in G$, maka

$$M(\bar{\alpha}) = M(g) \circ M(\bar{\beta}), \quad F(\alpha) = F(\beta) \circ F(g)^{-1}.$$

Ekuivariansi $\Phi \circ M(g) = F(g) \circ \Phi$ membuat kedua rumus untuk Φ_x sama. Jika $[\eta: x \rightsquigarrow y]$ diberikan, gunakan $\alpha \# \eta$ sebagai pilihan lintasan menuju y ; langsung diperoleh $\Phi_y \circ M(\eta) = F(\eta) \circ \Phi_x$. Jadi $(\Phi_x)_x$ adalah isomorfisma natural antara monodromi Z_S dan F .

Bila X tidak terhubung, konvensi SLSC menjamin bahwa setiap komponen lintasannya X_j terbuka. Untuk setiap j , pilih titik basis $x_j \in X_j$, uraikan **secara independen** himpunan $F(x_j)$ menjadi orbit di bawah $\pi_1(X_j, x_j)$, dan lakukan konstruksi di atas pada X_j . Gabungan saling lepas semua ruang penutup komponen adalah ruang penutup dari X , dan isomorfisma natural komponen demi komponen bergabung menjadi isomorfisma representasi seluruh grupoid fundamental.

Proposisi 16.3 (surjektivitas esensial monodromi). Jika X SLSC dalam konvensi mata kuliah, functor monodromi

$$\text{Cov}_X \longrightarrow [\Pi_1(X), \mathbf{Set}]$$

surjektif secara esensial: setiap representasi $\Pi_1(X) \rightarrow \mathbf{Set}$ isomorfik dengan representasi yang berasal dari suatu ruang penutup.

Batas hasil. Proposisi 16.3 hanya menyelesaikan keberadaan **objek** hingga isomorfisma. Belum dibuktikan bahwa setiap pemetaan ekuivarian serat berasal dari suatu pemetaan ruang penutup, ataupun bahwa pemetaan tersebut unik. Dengan demikian, kepenuhan, kesetiaan, dan ekuivalensi kategori tidak diklaim pada batas Unit 16.

Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Enam pemeriksaan berikut merupakan materi asli edisi. Pemeriksaan itu menutup tepat enam kewajiban pembuktian unit ini: hasil bagi lokal, dua aksi yang saling komutatif, topologi basis, pengangkatan dan keterhubungan sederhana, realisasi subgrup, serta realisasi orbit demi orbit dan komponen demi komponen. Tidak ada pemeriksaan yang memakai hasil klasifikasi transformasi dek atau kepenuhan-setiaan dari kuliah sesudahnya.

Pemeriksaan penguasaan 16.1 (hasil bagi suatu penutup). Misalkan grup diskret K bertindak kontinu dari kiri dan serat demi serat pada ruang penutup $p: Z \rightarrow X$, dengan X SLSC dalam konvensi mata kuliah. Buktikan langsung bahwa $K \backslash Z \rightarrow X$ merupakan ruang penutup. Dalam bukti Anda, jelaskan mengapa elemen K mempermutasikan lembaran utuh dan mengapa topologi hasil bagi membatasi dengan benar di atas lingkungan yang diliputi secara merata.

16.5 Solusi Pemeriksaan 16.1

Pilih $x \in X$ dan lingkungan terbuka terhubung lintasan $U \ni x$ yang diliputi secara merata. Jika V satu lembaran di atas U , maka kV terhubung lintasan, termuat dalam $p^{-1}(U)$, dan karena $p(kz) = p(z)$, peta $kV \rightarrow U$ masih surjektif. Himpunan terhubung itu termuat dalam satu lembaran V' . Menerapkan k^{-1} menunjukkan $kV = V'$. Jadi setiap k mempermutasikan lembaran-lembaran utuh.

Dengan $F = p^{-1}(x)$, trivialiasi menurut lembaran memberi

$$p^{-1}(U) \cong U \times F, \quad k(u, f) = (u, kf).$$

Peta hasil bagi $q: Z \rightarrow K \backslash Z$ terbuka karena

$$q^{-1}(q(O)) = \bigcup_{k \in K} kO$$

terbuka untuk setiap O terbuka. Selain itu, $p^{-1}(U)$ jenuh: sebuah orbit yang bertemu $p^{-1}(U)$ seluruhnya berada di atas titik-titik U . Maka pembatasan $q|_{p^{-1}(U)}$ adalah peta hasil bagi ke prabayangan U dalam $K \backslash Z$. Dengan demikian

$$(K \backslash Z)_U \cong K \backslash (U \times F) \cong U \times (K \backslash F).$$

Himpunan $K \backslash F$ diskret, sehingga ruas kanan merupakan gabungan saling lepas salinan U . Jadi setiap x mempunyai lingkungan yang diliputi secara merata dan $K \backslash Z \rightarrow X$ adalah ruang penutup.

Pemeriksaan penguasaan 16.2 (hasil bagi kiri dan monodromi kanan). Pada $\tilde{X}$, tuliskan aksi kiri $G = \pi_1(X, x_0)$ dan transpor kanan sepanjang $[\eta: x \rightsquigarrow y]$. Buktikan bahwa keduanya komutatif. Lalu buktikan bahwa, bagi $H \leq G$, peta serat

$$q_x: \tilde{X}_x \rightarrow (H \backslash \tilde{X})_x$$

komutatif dengan transpor kanan.

16.6 Solusi Pemeriksaan 16.2

Jika $h = [\omega]$ diwakili loop pada x_0 dan $[\gamma] \in \tilde{X}_x$, rumus aksi kirinya

$$h \cdot [\gamma] = [\omega \# \gamma].$$

Transpor kanan sepanjang η ialah

$$[\gamma] \cdot [\eta] = [\gamma \# \eta].$$

Asosiativitas dalam grupoid fundamental memberi

$$h \cdot ([\gamma] \cdot [\eta]) = [\omega \# \gamma \# \eta] = (h \cdot [\gamma]) \cdot [\eta].$$

Jadi aksi prefiks kiri tidak boleh disamakan dengan monodromi sufiks kanan, namun kedua operator itu komutatif.

Peta hasil bagi adalah $q_x([\gamma]) = H[\gamma]$. Karena rumus di atas,

$$\begin{aligned} q_y([\gamma] \cdot [\eta]) &= H[\gamma \# \eta] \\ &= (H[\gamma]) \cdot [\eta] \\ &= q_x([\gamma]) \cdot [\eta]. \end{aligned}$$

Rumus itu juga menunjukkan bahwa pada serat titik basis aksi yang turun adalah $(Hg) \cdot k = H(gk)$ pada $H \backslash G$.

Pemeriksaan penguasaan 16.3 (basis dan lembaran tanpa pemilih lintasan). Untuk himpunan kelas lintasan $\tilde{X}$, buktikan bahwa semua $U_{[\gamma]}$ membentuk basis. Buktikan pula bahwa, untuk lingkungan dapat dipakai $U \ni x$,

$$p^{-1}(U) = \bigsqcup_{a \in p^{-1}(x)} U_a$$

dan setiap $p|_{U_a}$ merupakan homeomorfisma ke U . Jangan memilih keluarga lintasan $x' \mapsto \eta_{x'}$ yang diasumsikan kontinu.

16.7 Solusi Pemeriksaan 16.3

Kelas $[\alpha]$ berada dalam $U_{[\alpha]}$ melalui lintasan konstan di titik ujungnya. Jika $[\alpha]$ berada dalam dua himpunan basis calon, pilih lingkungan dapat dipakai W dari titik ujung α yang termuat dalam irisan kedua lingkungan dasar. Setiap ekstensi α oleh lintasan di W juga merupakan ekstensi melalui masing-masing lingkungan lama, jadi $W_{[\alpha]}$ termuat dalam irisan. Ini membuktikan kedua aksioma basis.

Tetapkan $a = [\gamma] \in p^{-1}(x)$. Karena U terhubung lintasan, setiap $y \in U$ dapat dicapai oleh lintasan η di U , dan $[\gamma \# \eta] \in U_a$ terletak di atas y . Jadi pembatasan $p|_{U_a}$ surjektif. Jika dua unsur $[\gamma \# \eta_1]$ dan $[\gamma \# \eta_2]$ dipetakan ke titik y yang sama, loop $\eta_1 \# \overline{\eta_2}$ berada di U dan karenanya trivial di X . Jadi $[\eta_1] = [\eta_2]$ dan kedua unsur tadi sama. Maka pembatasan tersebut bijektif.

Jika $O \subseteq U_a$ terbuka dan $[\alpha] \in O$, perhalus suatu lingkungan basis di dalam O menjadi $V_{[\alpha]} \subseteq O$ dengan $V \subseteq U$ dapat dipakai. Himpunan itu dipetakan bijektif ke V . Maka $p(O)$ terbuka sebagai gabungan lingkungan-lingkungan V , sehingga $p|_{U_a}$ terbuka dan merupakan homeomorfisma.

Untuk menunjukkan bahwa lembaran-lembaran menutupi $p^{-1}(U)$, ambil $[\beta]$ di atas $y \in U$ dan lintasan $\eta: x \rightsquigarrow y$ dalam U . Lalu $[\beta]$ berada pada lembaran yang pusatnya $[\beta \# \bar{\eta}]$ di atas x . Jika dua lembaran bertemu, lintasan dalam U dari kedua pusat ke titik temu berbeda hanya dengan loop di U ; loop itu trivial di X , sehingga pusatnya sama. Jadi gabungan itu saling lepas. Seluruh argumen hanya menggunakan lintasan satu per satu dan tidak mendalilkan pemilih lintasan kontinu.

Pemeriksaan penguasaan 16.4 (pengangkatan dan keterhubungan sederhana). Bagi lintasan $\alpha: x \rightsquigarrow y$ dan $a = [\gamma] \in \tilde{X}_x$, berikan rumus pengangkatan yang mulai di a dan buktikan kontinuitasnya dari basis. Gunakan rumus itu untuk membuktikan bahwa $\tilde{X}$ terhubung lintasan dan terhubung sederhana.

16.8 Solusi Pemeriksaan 16.4

Tuliskan $\alpha_t(s) = \alpha(ts)$. Pengangkatan yang dicari ialah

$$\tilde{\alpha}_a(t) = [\gamma \# \alpha_t].$$

Jelas $p(\tilde{\alpha}_a(t)) = \alpha(t)$ dan nilai awalnya a . Untuk kontinuitas di t_0 , ambil sebarang lingkungan basis dari $[\gamma \# \alpha_{t_0}]$ dan perhalus menjadi $U_{[\gamma \# \alpha_{t_0}]}$ di dalamnya. Pada interval kecil J sekitar t_0 , citra $\alpha(J)$ termuat di U . Segmen α dari t_0 ke t berada dalam U , dan setelah reparametrisasi serta menghapus penelusuran balik, $[\gamma \# \alpha_t]$ diperoleh dengan menambahkan segmen itu pada $[\gamma \# \alpha_{t_0}]$. Maka citra J berada dalam satu lingkungan basis.

Untuk keterhubungan lintasan, ambil $[\gamma] \in \tilde{X}$ dan gunakan $t \mapsto [\gamma_t]$. Peta ini kontinu menurut argumen yang baru diberikan, mulai di $[c_{x_0}]$, dan berakhir di $[\gamma]$.

Untuk keterhubungan sederhana, ambil loop λ di $[c_{x_0}]$ dan proyeksikan menjadi $\alpha = p \circ \lambda$. Keunikan pengangkatan menjadikan $\lambda(t) = [\alpha_t]$. Karena $\lambda(1)$ kembali ke $[c_{x_0}]$, kelas $[\alpha]$ trivial. Jadi $p_*[\lambda] = 1$ bagi setiap $[\lambda]$. Pemetaan p_* injektif untuk ruang penutup, sehingga $[\lambda] = 1$. Bersama keterhubungan lintasan, kesimpulannya $\tilde{X}$ terhubung sederhana.

Pemeriksaan penguasaan 16.5 (realisasi subgrup). Untuk $H \leq G$, buktikan bahwa $H \backslash \tilde{X} \rightarrow X$ terhubung dan bahwa citra grup fundamentalnya di G tepat H . Jelaskan mengapa kesimpulan itu bukan $\pi_1(\tilde{X}) = H$.

16.9 Solusi Pemeriksaan 16.5

Peta hasil bagi kontinu dan surjektif, sedangkan $\tilde{X}$ terhubung lintasan. Citra lintasan yang menghubungkan dua wakil menghubungkan kelas orbitnya, sehingga $H \backslash \tilde{X}$ terhubung lintasan.

Ambil $g = [\omega] \in G$. Pengangkatan loop ω ke penutup hasil bagi dari titik $H[c_{x_0}]$ ialah $t \mapsto H[\omega_t]$, dengan titik akhir $H[\omega]$. Pengangkatan itu tertutup tepat ketika

$$H[\omega] = H[c_{x_0}],$$

yakni tepat ketika $g \in H$. Kriteria pengangkatan tertutup menyatakan bahwa loop basis berada dalam citra $(p_H)_*$ tepat ketika pengangkatannya dari titik basis tertutup. Oleh karena itu

$$(p_H)_* \pi_1(H \backslash \tilde{X}, H[c_{x_0}]) = H.$$

Di pihak lain, $\tilde{X}$ adalah penutup universal yang baru dibuktikan terhubung sederhana, sehingga $\pi_1(\tilde{X}, [c_{x_0}]) = 1$. Grup H muncul sebagai citra grup fundamental **ruang hasil bagi**, bukan sebagai grup fundamental penutup universal itu sendiri.

Pemeriksaan penguasaan 16.6 (realisasi orbit dan komponen). Misalkan $F: \Pi_1(X) \rightarrow \mathbf{Set}$ dan X SLSC dalam konvensi mata kuliah. Bangun ruang penutup yang monodrominya isomorfik

dengan F : pertama untuk satu komponen lintasan, lalu untuk semua komponen. Buktikan secara langsung bahwa pemetaan serat pada titik basis terdefinisi baik, bijektif, dan ekuivarian.

16.10 Solusi Pemeriksaan 16.6

Mula-mula andaikan X terhubung lintasan dan pilih x_0 . Letakkan $G = \pi_1(X, x_0)$ dan $S = F(x_0)$. Uraikan S menjadi orbit kanan,

$$S = \bigsqcup_{i \in I} S_i,$$

pilih $s_i \in S_i$, dan letakkan $H_i = \text{Stab}_G(s_i)$. Bentuk

$$Z = \bigsqcup_{i \in I} H_i \backslash \tilde{X} \longrightarrow X.$$

Untuk $S = \emptyset$, koproduk ini kosong dan tetap merupakan ruang penutup menurut konvensi serat kosong edisi.

Pada serat di x_0 , definisikan

$$\Phi(H_i g) = s_i \cdot g.$$

Jika $H_i g' = H_i g$, maka $g' = hg$ untuk $h \in H_i$, sehingga $s_i \cdot g' = (s_i \cdot h) \cdot g = s_i \cdot g$; jadi Φ terdefinisi baik. Setiap unsur orbit S_i berbentuk $s_i \cdot g$, sehingga peta surjektif. Jika $s_i \cdot g' = s_i \cdot g$, maka $g'g^{-1} \in H_i$, sehingga $H_i g' = H_i g$; orbit yang berbeda juga saling lepas. Jadi peta injektif. Terakhir,

$$\Phi((H_i g) \cdot k) = \Phi(H_i gk) = s_i \cdot (gk) = (s_i \cdot g) \cdot k,$$

maka Φ ekuivarian kanan. Transpor dari x_0 ke setiap x memperluas Φ menjadi isomorfisma natural monodromi Z dengan F ; independensi pilihan lintasan tepat merupakan ekuivariansi yang baru dibuktikan.

Untuk X umum, tuliskan $X = \bigsqcup_{j \in J} X_j$ sebagai gabungan komponen lintasan terbuka. Pilih $x_j \in X_j$, terapkan konstruksi tadi secara terpisah pada $F|_{\pi_1(X_j)}$, dan peroleh $Z_j \rightarrow X_j$. Maka

$$\bigsqcup_{j \in J} Z_j \longrightarrow \bigsqcup_{j \in J} X_j = X$$

adalah ruang penutup. Isomorfisma natural pada setiap komponen bergabung karena tidak ada morfisma grupoid fundamental di antara dua komponen lintasan yang berbeda. Monodromi ruang penutup ini isomorfik dengan F . Argumen membuktikan surjektivitas esensial saja; tidak ada klaim tentang morfisma antarpennutup.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts, © 2019 David Michael Roberts, tepatnya [Notes.tex](#) baris 3384–3481 pada commit [b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#) dari repositori [DavidMichaelRoberts/AlgebraicTopology2019](#). Rentang 98 baris itu dimulai dengan penanda Kuliah 17 dan berakhir sesudah proposisi bahwa $\pi_n(X, x)$ abelian untuk $n \geq 2$. Penanda Kuliah 18 pada baris 3482 tidak termasuk. Materi sumber dan adaptasi Indonesia ini tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan edisi mencakup penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, dan pemindahan ketiga catatan pinggir ke urutan bacaan utama. Tampilan panjang yang mendefinisikan operasi grup dan kedua konkatenasi koordinat ditata ulang dengan deskripsi linear, syarat jahitan, dan inventaris empat kuadran. Tidak ada diagram gambar atau aset eksternal pada rentang sumber ini.

Konvensi monodromi tetap sama dengan Unit 14–16. Pada serat titik basis dalam model kelas lintasan, $G = \pi_1(X, x_0)$ bertindak dari **kanan** melalui

$$[\gamma] \cdot g = [\gamma \# g],$$

yakni g ditempuh sesudah γ . Karena itu

$$(z \cdot g) \cdot h = z \cdot (gh), \quad \varphi(z \cdot g) = \varphi(z) \cdot g.$$

Tidak ada aksi kiri baru dalam Unit 17. Aksi kanan ini tidak disamakan dengan notasi kiri hasil konversi invers $g \star z = z \cdot g^{-1}$, dan juga tidak disamakan dengan aksi kiri serat demi serat Unit 16 $h \triangleright [\gamma] = [h \# \gamma]$ yang dipakai untuk membentuk $H \backslash \tilde{X}$.

Edisi ini memperbaiki persamaan peta yang salah tipe pada lema keunikan, melengkapi bukti kesetiaan komponen demi komponen, dan memberi bukti penuh bagi kepenuhan functor monodromi, termasuk kontinuitas dalam trivialisasi lokal. Rentang n dinyatakan pada setiap hasil: π_0 mula-mula hanya himpunan bertitik, sedangkan model kubus/cakram, adjungsi loop, dan struktur grup di sini berlaku untuk $n \geq 1$. Argumen Eckmann–Hilton dikoreksi: hipotesis dua operasi berunit dan hukum pertukaran hanya menghasilkan **monoid komutatif**; kesimpulan grup abelian baru sah bila invers telah diperoleh secara terpisah. Kesalahan cabang kedua operasi $\#_2$ juga diperbaiki dari f_1 menjadi f_2 .

Keenam pemeriksaan penguasaan beserta solusi lengkap merupakan materi asli edisi dan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen; edisi ini tidak disponsori, didukung, disahkan, ataupun diberi status resmi oleh David Michael Roberts, MIT, Haynes Miller, Sanath Devalapurkar, Yeheli Fomberg, Nir Lazarovich, atau institusi mereka.

17 Kuliah 17

Unit 16 membuktikan bahwa, untuk X SLSC dalam konvensi mata kuliah, functor monodromi

$$\rho: \text{Cov}_X \longrightarrow [\Pi_1(X), \mathbf{Set}]$$

surjektif secara esensial. Kini kita buktikan bahwa functor itu juga setia dan penuh. Sesudah klasifikasi ruang penutup selesai, sumber memulai bagian baru tentang grup homotopi lebih tinggi.

17.1 Keunikan pemetaan ke ruang penutup

Lema 17.1 (keunikan pemetaan pengangkat). Misalkan $\pi: Z \rightarrow X$ ruang penutup, Y terhubung lintasan, dan $p: Y \rightarrow X$ suatu pemetaan. Jika $f, g: Y \rightarrow Z$ memenuhi

$$\pi \circ f = p = \pi \circ g$$

dan $f(y_0) = g(y_0)$ untuk suatu $y_0 \in Y$, maka $f = g$.

Bukti. Ambil $y \in Y$ dan pilih lintasan $\gamma: y_0 \rightsquigarrow y$. Kedua lintasan $f \circ \gamma$ dan $g \circ \gamma$ merupakan pengangkatan dari $p \circ \gamma: I \rightarrow X$. Titik awalnya sama karena

$$f(\gamma(0)) = f(y_0) = g(y_0) = g(\gamma(0)).$$

Keunikan pengangkatan lintasan memberi $f \circ \gamma = g \circ \gamma$, sehingga pada titik akhir

$$f(y) = f(\gamma(1)) = g(\gamma(1)) = g(y).$$

Karena y sebarang, $f = g$. Persamaan pada pernyataan memperbaiki urutan komposisi yang salah tipe di sumber, dan $g(\gamma(0))$ memperbaiki argumen $g(\gamma(y_0))$ yang tidak terdefinisi.

Lema ini berlaku khususnya bila Y sendiri merupakan ruang total suatu ruang penutup dari X , asalkan diterapkan pada setiap komponen lintasannya.

Akibat 17.1 (kesetiaan monodromi). Fungtor monodromi

$$\rho: \text{Cov}_X \longrightarrow [\Pi_1(X), \mathbf{Set}]$$

bersifat setia.

Bukti. Mula-mula anggap X terhubung dan pilih $x_0 \in X$. Dalam konvensi SLSC mata kuliah, X terhubung lintasan. Ambil dua ruang penutup $\pi_i: Z_i \rightarrow X$ dan dua pemetaan ruang penutup $f, g: Z_1 \rightarrow Z_2$. Andaikan transformasi natural yang diinduksi f dan g sama. Khususnya, pembatasan serat yang bertipe lengkap memenuhi

$$f_{x_0} = g_{x_0}: (Z_1)_{x_0} \longrightarrow (Z_2)_{x_0}.$$

Kedua pembatasan ini adalah morfisma di $\mathbf{Set}_G$ untuk aksi monodromi kanan; kesamaannya di sini adalah kesamaan fungsi serat yang ekuivarian kanan.

Setiap komponen lintasan C dari Z_1 memetakan surjektif ke X ; ini adalah hasil komponen ruang penutup yang dibuktikan pada Unit 15. Maka ada $z_C \in C \cap (Z_1)_{x_0}$. Pembatasan $f|_C$ dan $g|_C$ adalah dua pemetaan dari ruang terhubung lintasan C ke Z_2 di atas X , dan keduanya sama pada z_C . Lema 17.1 memberi $f|_C = g|_C$. Karena komponen-komponen itu menutupi Z_1 , diperoleh $f = g$.

Untuk X yang tidak terhubung, komponen lintasannya terbuka menurut konvensi SLSC. Terapkan argumen yang sama secara terpisah pada setiap komponen ruang basis. Jadi kesamaan transformasi natural selalu memaksa kesamaan pemetaan ruang penutup, yakni ρ setia.

17.2 Kepenuhan dan teorema klasifikasi

Teorema 17.1 (klasifikasi ruang penutup). Jika X SLSC dalam konvensi mata kuliah, fungtor monodromi

$$\rho: \text{Cov}_X \longrightarrow [\Pi_1(X), \mathbf{Set}]$$

merupakan ekuivalensi kategori.

Bukti. Unit 16 membuktikan surjektivitas esensial, dan Akibat 17.1 membuktikan kesetiaan. Tinggal dibuktikan bahwa ρ penuh.

Ambil ruang penutup $\pi_i: Z_i \rightarrow X$, dengan representasi monodromi ρ_i , dan transformasi natural

$$\eta: \rho_1 \Longrightarrow \rho_2.$$

Untuk $z \in Z_1$ dengan $\pi_1(z) = x$, definisikan

$$F(z) := \eta_x(z) \in (Z_2)_x.$$

Definisi ini langsung memberi

$$\pi_2 \circ F = \pi_1, \quad F|_{(Z_1)_x} = \eta_x$$

untuk setiap $x \in X$. Jadi yang masih harus dibuktikan hanya kontinuitas.

Tetapkan $x \in X$. Pilih lingkungan terbuka terhubung lintasan $U \ni x$ yang diliputi secara merata oleh **kedua** ruang penutup; ini diperoleh dengan memotong dua lingkungan yang diliputi secara merata lalu memperhalusnya memakai basis SLSC. Tuliskan

$$A_i := (Z_i)_x.$$

Penandaan lembaran oleh titiknya di atas x memberi trivialiasi

$$\tau_i: \pi_i^{-1}(U) \xrightarrow{\cong} U \times A_i.$$

Bagi $u \in U$, $a \in A_1$, dan lintasan $[\alpha: x \rightsquigarrow u]$ di U , titik pada lembaran berlabel a ialah $\alpha_*^{Z_1}(a)$. Naturalitas η menyatakan

$$\eta_u(\alpha_*^{Z_1}(a)) = \alpha_*^{Z_2}(\eta_x(a)).$$

Karena U diliputi secara merata, transpor di dalam U tetap berada pada satu lembaran dan tidak bergantung pada pilihan lintasan di U setelah label lembaran ditetapkan. Oleh karena itu, dalam kedua trivialiasi lokal, F mempunyai rumus

$$\tau_2 \circ F \circ \tau_1^{-1}(u, a) = (u, \eta_x(a)).$$

Rumus itu adalah identitas pada faktor U dan satu pemetaan tetap di antara himpunan diskret A_1 dan A_2 ; jadi ia kontinu. Lingkungan seperti U menutupi X , maka F kontinu secara global. Dengan demikian F adalah pemetaan ruang penutup yang menginduksi η . Keunikannya langsung dari rumus $F(z) = \eta_{\pi_1(z)}(z)$, atau dari kesetiaan yang baru dibuktikan. Jadi ρ penuh. Functor yang penuh, setia, dan surjektif secara esensial merupakan ekuivalensi kategori.

Untuk menghubungkan bukti ini dengan reduksi bertitik pada sumber, andaikan X terhubung, pilih x_0 , dan letakkan $G = \pi_1(X, x_0)$. Komponen titik basis dari transformasi natural adalah pemetaan himpunan- G **kanan**

$$\varphi: (Z_1)_{x_0} \longrightarrow (Z_2)_{x_0}, \quad \varphi(z \cdot g) = \varphi(z) \cdot g.$$

Naturalitas terhadap semua lintasan memperluas φ menjadi keluarga $(\eta_x)_x$, dan konstruksi di atas menghasilkan F . Aksi kanan tersebut adalah monodromi langsung; bukti ini tidak memakai aksi kiri serat demi serat dari Unit 16.

17.3 Grup homotopi lebih tinggi

Sejauh ini kita telah memakai invarian π_0 , $[\text{pt}, -]$, dan π_1 . Catatan pinggir sumber mengingatkan bahwa pada dimensi rendah ada dua invarian yang sama-sama mencoba menangkap “komponen” suatu ruang; keadaan ganda ini merupakan kekhasan dimensi rendah.

Perhatikan bahwa

$$\pi_1(X, x) = [(S^1, 1), (X, x)]_*.$$

Untuk ruang bertitik juga berlaku

$$[\text{pt}, X] \cong [(S^0, 1), (X, x)]_*,$$

sebab $S^0 = \{1, -1\}$ dan peta bertitik $(S^0, 1) \rightarrow (X, x)$ ditentukan sepenuhnya oleh citra -1 . Pola ini memotivasi pertanyaan retorik sumber: apa yang seharusnya menjadi π_n ?

Definisi 17.1 (himpunan dan grup homotopi ke- n). Bagi ruang bertitik (X, x) dan bilangan bulat $n \geq 0$, definisikan

$$\pi_n(X, x) := [(S^n, 1), (X, x)]_*.$$

Untuk $n = 0$, objek ini mula-mula hanya himpunan bertitik. Untuk $n \geq 1$, operasi yang dibangun di bawah menjadikannya grup, sehingga istilah **grup homotopi ke- n** dipakai dalam rentang tersebut.

Untuk setiap $n \geq 0$, postkomposisi oleh peta bertitik membuat π_n menjadi funktor

$$\pi_n: \mathbf{Top}_* \longrightarrow \mathbf{Set}.$$

Kelas peta konstan memberi setiap nilai funktor itu satu titik terpilih, meskipun kita tetap menuliskan kodomain sumber sebagai **Set**.

Pemetaan koordinat memberi bijeksi alami

$$\pi_n(X \times Y, (x, y)) \cong \pi_n(X, x) \times \pi_n(Y, y).$$

17.4 Model sfera, kubus, dan cakram

Untuk pasangan ruang (Y, A) , hasil bagi Y/A berarti ruang hasil bagi yang mengidentifikasi semua titik A menjadi satu titik dan tidak membuat identifikasi lain. Catatan ini berasal dari catatan pinggir sumber.

Jika $n \geq 1$, terdapat homeomorfisma bertitik

$$S^n \cong I^n / \partial I^n \cong D^n / \partial D^n,$$

dengan titik basis sebagai citra subruang batas yang diruntuhkan. Karena itu peta bertitik dari S^n ke (X, x) sama datanya dengan peta pasangan

$$f: (I^n, \partial I^n) \longrightarrow (X, \{x\}),$$

dan juga dengan peta pasangan dari $(D^n, \partial D^n)$.

Homotopi relatif terhadap A antara dua peta pasangan $f_0, f_1: (Y, A) \rightarrow (X, \{x\})$ adalah homotopi $H: I \times Y \rightarrow X$ yang memenuhi

$$H(0, y) = f_0(y), \quad H(1, y) = f_1(y), \quad H(t, a) = x$$

untuk semua $y \in Y$, $t \in I$, dan $a \in A$. Dengan relasi ini,

$$[(S^n, 1), (X, x)]_* \cong [(I^n, \partial I^n), (X, \{x\})] \cong [(D^n, \partial D^n), (X, \{x\})]$$

untuk $n \geq 1$.

Pengecualian $n = 0$ penting: I^0 dan D^0 masing-masing satu titik dan batasnya kosong, sehingga hasil bagi tersebut tetap satu titik, bukan S^0 . Jadi model hasil bagi kubus dan cakram di atas tidak dipakai untuk π_0 .

17.5 Adjungsi loop dan struktur grup

Ambil $n \geq 1$ dan wakil $f: (I^n, \partial I^n) \rightarrow (X, \{x\})$. Tuliskan titik kubus sebagai $(u, t) \in I^{n-1} \times I$. Rumus

$$\widehat{f}(u)(t) := f(u, t)$$

memberi peta pasangan

$$\widehat{f}: (I^{n-1}, \partial I^{n-1}) \longrightarrow (\Omega_x X, c_x).$$

Syarat batas pada f memastikan bahwa $\widehat{f}(u)$ adalah loop di x dan bahwa $u \in \partial I^{n-1}$ dikirim ke loop konstan. Proses yang mengubah $f(u, t)$ menjadi $u \mapsto (t \mapsto f(u, t))$ dan proses kebalikannya saling invers serta mempertahankan homotopi relatif. Maka

$$\pi_n(X, x) \cong \pi_{n-1}(\Omega_x X, c_x)$$

untuk setiap $n \geq 1$; ketika $n = 1$, ruas kanan ialah himpunan komponen bertitik $\pi_0(\Omega_x X, c_x)$.

Konkatenasi loop kontinu $\mu: \Omega_x X \times \Omega_x X \rightarrow \Omega_x X$ menginduksi operasi biner melalui rantai pemetaan berikut:

$$\begin{aligned} \pi_n(X, x) \times \pi_n(X, x) &\cong \pi_{n-1}(\Omega_x X, c_x) \times \pi_{n-1}(\Omega_x X, c_x) \\ &\cong \pi_{n-1}(\Omega_x X \times \Omega_x X, (c_x, c_x)) \\ &\xrightarrow{\mu_*} \pi_{n-1}(\Omega_x X, c_x) \cong \pi_n(X, x). \end{aligned}$$

Dalam model kubus, operasi ini adalah konkatenasi kronologis pada koordinat terakhir. Jika $u \in I^{n-1}$ dan $t \in I$, definisikan

$$(f \#_n g)(u, t) = \begin{cases} f(u, 2t), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ g(u, 2t - 1), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Kedua cabang bertemu di x pada $t = \frac{1}{2}$ karena sisi $t = 1$ dari f dan sisi $t = 0$ dari g berada di batas kubus. Operasi itu turun ke kelas homotopi relatif. Kelas peta konstan menjadi identitas, pembalikan koordinat terakhir

$$f^{-1}(u, t) := f(u, 1 - t)$$

memberi invers, dan reparametrisasi interval memberi asosiativitas pada kelas homotopi. Post-komposisi oleh peta bertitik mempertahankan semua rumus. Jadi, untuk setiap $n \geq 1$, diperoleh funktor

$$\pi_n: \mathbf{Top}_* \longrightarrow \mathbf{Grp}.$$

Sumber memperkenalkan hasil berikut sebagai abstraksi terkenal yang muncul sesudah definisi awal grup homotopi lebih tinggi sekitar tahun 1932.

17.6 Argumen Eckmann–Hilton yang bertipe tepat

Lema 17.2 (argumen Eckmann–Hilton). Misalkan himpunan M membawa dua operasi biner berunit

$$\circ, \#: M \times M \longrightarrow M$$

dengan unit masing-masing $e_\circ$ dan $e_\#$, serta memenuhi hukum pertukaran

$$(a \circ b) \# (c \circ d) = (a \# c) \circ (b \# d)$$

untuk semua $a, b, c, d \in M$. Maka kedua unit sama, kedua operasi sama, dan operasi tunggal itu asosiatif serta komutatif. Jadi M merupakan monoid komutatif. Jika operasi tunggal itu diketahui mempunyai invers, maka M merupakan grup abelian.

Bukti. Pertama, hukum pertukaran memberi

$$\begin{aligned} e_\# &= e_\# \# e_\# \\ &= (e_\# \circ e_\circ) \# (e_\circ \circ e_\#) \\ &= (e_\# \# e_\circ) \circ (e_\circ \# e_\#) \\ &= e_\circ \circ e_\circ = e_\circ. \end{aligned}$$

Tuliskan unit bersama ini sebagai e . Selanjutnya,

$$\begin{aligned} a \circ b &= (a \# e) \circ (e \# b) \\ &= (a \circ e) \# (e \circ b) \\ &= a \# b. \end{aligned}$$

Jadi kedua operasi berimpit; tuliskan hasilnya sebagai ab . Untuk komutativitas, gunakan pertukaran sekali lagi:

$$ab = (e \circ a) \# (b \circ e) = (e \# b) \circ (a \# e) = ba.$$

Untuk asosiativitas,

$$(ab)c = (a \circ b) \# (e \circ c) = (a \# e) \circ (b \# c) = a(bc).$$

Dengan demikian ada operasi berunit yang asosiatif dan komutatif, yakni monoid komutatif. Tidak ada langkah yang menghasilkan invers. Sebagai kontracontoh terhadap kesimpulan grup pada sumber,

ambil $M = \mathbb{Z}_{\geq 0}$ dan pakai penjumlahan sebagai kedua operasi, dengan unit 0. Semua hipotesis terpenuhi, tetapi unsur positif tidak mempunyai invers aditif. Bila invers diketahui dari struktur lain, monoid komutatif itu barulah grup abelian.

17.7 Grup topologis dan loop teriterasi

Contoh 17.1 (grup fundamental suatu grup topologis). Jika G grup topologis dengan unsur identitas e , maka $\pi_1(G, e)$ abelian. Pernyataan ini tidak memerlukan G menjadi grup Lie; perluasan tersebut merupakan isi catatan pinggir sumber.

Pada kelas loop ada dua operasi. Yang pertama ialah konkatenasi kronologis $[\alpha] \# [\beta] = [\alpha \# \beta]$. Yang kedua berasal dari perkalian titik demi titik,

$$(\alpha \cdot \beta)(t) := \alpha(t)\beta(t).$$

Kontinuitas perkalian grup membuat rumus kedua berupa loop kontinu dan membuatnya turun ke kelas homotopi: jika H dan K adalah homotopi loop, maka $(s, t) \mapsto H(s, t)K(s, t)$ adalah homotopi bagi hasil kalinya. Kelas loop konstan c_e menjadi unit untuk kedua operasi. Pada wakil loop, identitas potongan

$$(\alpha \# \beta) \cdot (\gamma \# \delta) = (\alpha \cdot \gamma) \# (\beta \cdot \delta)$$

berlaku, sebab kedua ruas bernilai $\alpha(2t)\gamma(2t)$ pada paruh pertama dan $\beta(2t-1)\delta(2t-1)$ pada paruh kedua. Jadi kelas-kelasnya memenuhi hukum pertukaran. Lema 17.2 membuat kedua operasi sama dan komutatif; struktur konkatenasi sudah mempunyai invers, sehingga hasilnya grup abelian.

Sekarang iterasikan identifikasi loop. Bagi $n \geq 2$,

$$\pi_n(X, x) \cong \pi_{n-1}(\Omega_x X, c_x) \cong \pi_{n-2}(\Omega_x^2 X, c_{c_x}),$$

dengan

$$\Omega_x^2 X := \Omega_{c_x}(\Omega_x X).$$

Titik-titik $\Omega_x^2 X$ dapat dipandang sebagai peta $f: I^2 \rightarrow X$ yang mengirim seluruh ∂I^2 ke x . Ada dua operasi konkatenasi kontinu: $\#_1$ pada koordinat pertama dan $\#_2$ pada koordinat kedua. Untuk $f_1, f_2 \in \Omega_x^2 X$, rumusnya ialah

$$(f_1 \#_1 f_2)(s, t) = \begin{cases} f_1(2s, t), & 0 \leq s \leq \frac{1}{2}, \\ f_2(2s-1, t), & \frac{1}{2} \leq s \leq 1, \end{cases}$$

dan

$$(f_1 \#_2 f_2)(s, t) = \begin{cases} f_1(s, 2t), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ f_2(s, 2t-1), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Pada jahitan $s = \frac{1}{2}$, rumus pertama cocok karena $f_1(1, t) = x = f_2(0, t)$. Pada jahitan $t = \frac{1}{2}$, rumus kedua cocok karena $f_1(s, 1) = x = f_2(s, 0)$. Ini juga menunjukkan kontinuitas melalui lema penempelan. Pada setiap sisi luar, salah satu argumen koordinat bernilai 0 atau 1, sehingga hasilnya tetap x . Cabang kedua $\#_2$ memakai f_2 , memperbaiki pengulangan f_1 pada sumber.

Kedua cara menggabungkan empat peta menghasilkan peta mentah yang sama:

$$(f_1 \#_1 f_2) \#_2 (f_3 \#_1 f_4) = (f_1 \#_2 f_3) \#_1 (f_2 \#_2 f_4).$$

Inventaris linearnya pada empat kuadran I^2 ialah:

1. $0 \leq s, t \leq \frac{1}{2}$: nilai $f_1(2s, 2t)$;
2. $\frac{1}{2} \leq s \leq 1$ dan $0 \leq t \leq \frac{1}{2}$: nilai $f_2(2s - 1, 2t)$;
3. $0 \leq s \leq \frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{2} \leq t \leq 1$: nilai $f_3(2s, 2t - 1)$;
4. $\frac{1}{2} \leq s, t \leq 1$: nilai $f_4(2s - 1, 2t - 1)$.

Pada peta mentah, konkatenasi hanya berunit dan asosiatif hingga homotopi. Karena itu Lema 17.2 diterapkan **sesudah** $\#_1$ dan $\#_2$ turun ke kelas homotopi. Untuk setiap $n \geq 2$, kedua operasi menginduksi operasi pada

$$A_n := \pi_{n-2}(\Omega_x^2 X, c_{c_x}).$$

Kelas peta konstan menjadi unit bersama, dan identitas empat kuadran memberi hukum pertukaran. Lema 17.2 menyatakan bahwa kedua operasi berimpit dan komutatif. Struktur grup pada π_n , yang sudah dibangun lewat pembalikan koordinat, menyediakan invers yang tidak berasal dari lema tersebut. Dalam pilihan koordinat Bagian 17.5, operasi $\#_2$ adalah konkatenasi pada koordinat terakhir dan karenanya tepat hukum grup yang sudah dibangun.

Proposisi 17.1 (komutativitas grup homotopi lebih tinggi). Untuk setiap ruang bertitik (X, x) dan setiap $n \geq 2$, grup $\pi_n(X, x)$ abelian.

Bukti. Identifikasi $\pi_n(X, x) \cong A_n$ memindahkan kedua konkatenasi koordinat ke dua operasi berunit pada himpunan yang sama. Identitas empat kuadran memberi hukum pertukaran pada kelas homotopi, sehingga Lema 17.2 membuat kedua operasi sama dan komutatif. Salah satu operasi adalah hukum grup π_n dari Bagian 17.5, lengkap dengan invers melalui pembalikan koordinat. Karena itu hukum grup tersebut komutatif, yakni $\pi_n(X, x)$ grup abelian.

Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Enam pemeriksaan berikut merupakan materi asli edisi. Semuanya terbatas pada isi Unit 17: keunikan dan kesetiaan, kepenuhan, model relatif, koreksi Eckmann–Hilton, jahitan empat kuadran, serta dua penerapan komutativitas. Tidak ada pemeriksaan yang memakai materi Kuliah 18.

Pemeriksaan penguasaan 17.1 (keunikan dan komponen ruang penutup). Buktikan Lema 17.1 dari keunikan pengangkatan lintasan. Lalu jelaskan secara lengkap mengapa kesamaan dua pemetaan ruang penutup pada serat di atas satu titik basis memaksa kesamaan keduanya, bahkan bila ruang total sumber tidak terhubung.

17.8 Solusi Pemeriksaan 17.1

Misalkan $\pi \circ f = p = \pi \circ g$ dan $f(y_0) = g(y_0)$. Bagi $y \in Y$, pilih lintasan $\gamma: y_0 \rightsquigarrow y$. Kedua komposit $f \circ \gamma$ dan $g \circ \gamma$ memproyeksi ke $p \circ \gamma$ dan mulai di titik yang sama. Keunikan pengangkatan memberi $f \circ \gamma = g \circ \gamma$, maka evaluasi di 1 memberi $f(y) = g(y)$. Karena y sebarang, kedua peta sama.

Sekarang ambil X terhubung dan SLSC, ruang penutup $\pi_i: Z_i \rightarrow X$, serta pemetaan ruang penutup $f, g: Z_1 \rightarrow Z_2$ yang sama pada $(Z_1)_{x_0}$. Setiap komponen lintasan $C \subseteq Z_1$ memetakan surjektif ke X : pilih titik dalam C , angkat lintasan di X dari citranya menuju x_0 , dan titik akhir pengangkatan tetap di C . Jadi ada $z_C \in C \cap (Z_1)_{x_0}$. Peta $f|_C$ dan $g|_C$ sama di z_C dan terletak di atas peta $\pi_1|_C: C \rightarrow X$. Lema 17.1 memberi $f|_C = g|_C$. Mengambil semua komponen memberi $f = g$. Jika X tidak terhubung, ulangi argumen pada setiap komponen lintasan terbuka ruang basis.

Pemeriksaan penguasaan 17.2 (konstruksi kepenuhan). Diberikan transformasi natural $\eta: \rho_1 \Rightarrow \rho_2$ antara monodromi dua ruang penutup, bangun pemetaan ruang penutup yang menginduksinya. Buktikan bahwa peta itu kontinu. Untuk basis terhubung, tuliskan pula persamaan ekuivariansi kanan pada serat titik basis dan jelaskan mengapa tidak ada aksi kiri Unit 16 yang dipakai.

17.9 Solusi Pemeriksaan 17.2

Untuk $z \in Z_1$ dengan $\pi_1(z) = x$, satu-satunya definisi yang mungkin ialah

$$F(z) = \eta_x(z).$$

Karena komponen η_x memetakan $(Z_1)_x$ ke $(Z_2)_x$, berlaku $\pi_2 F = \pi_1$, dan pembatasan F pada setiap serat tepat η_x .

Untuk kontinuitas, pilih lingkungan terbuka terhubung lintasan $U \ni x$ yang diliputi secara merata oleh kedua penutup. Beri label lembaran penutup pertama dengan $A_1 = (Z_1)_x$ dan lembaran penutup kedua dengan $A_2 = (Z_2)_x$. Dalam trivialisasi

$$\pi_i^{-1}(U) \cong U \times A_i,$$

sebuah titik (u, a) diperoleh dengan mentranspor a sepanjang lintasan di U dari x ke u . Naturalitas terhadap lintasan itu memberi

$$F(u, a) = (u, \eta_x(a)).$$

Koordinat kedua adalah satu fungsi tetap di antara himpunan diskret, jadi rumus lokal itu kontinu. Lingkungan-lingkungan tersebut menutupi X ; akibatnya F kontinu secara global dan merupakan pemetaan ruang penutup.

Jika X terhubung, $G = \pi_1(X, x_0)$, dan $g \in G$, naturalitas pada loop memberi

$$\eta_{x_0}(z \cdot g) = \eta_{x_0}(z) \cdot g.$$

Ini ekuivariansi untuk monodromi **kanan** melalui postkonkatenasi. Aksi kiri serat demi serat Unit 16 memakai prekonkatenasi dan tidak muncul dalam konstruksi ini.

Pemeriksaan penguasaan 17.3 (model sfera, kubus, cakram, dan $n = 0$). Bagi $n \geq 1$, buktikan korespondensi antara kelas homotopi bertitik dari S^n dan kelas homotopi relatif dari kubus atau cakram. Nyatakan semua syarat homotopi relatif. Lalu tunjukkan secara eksplisit mengapa model hasil bagi itu tidak boleh dipakai untuk $n = 0$.

17.10 Solusi Pemeriksaan 17.3

Untuk $n \geq 1$, meruntuhkan ∂I^n menjadi satu titik menghasilkan ruang yang homeomorfik dengan S^n ; demikian pula bagi $D^n / \partial D^n$. Menurut sifat universal hasil bagi, peta kontinu

$$\bar{f}: I^n / \partial I^n \longrightarrow X$$

yang mengirim titik runtutan ke x tepat sama datanya dengan peta $f: I^n \rightarrow X$ yang memenuhi $f(\partial I^n) = \{x\}$. Pernyataan yang sama berlaku untuk D^n .

Dua peta pasangan $f_0, f_1: (Y, A) \rightarrow (X, \{x\})$ setara relatif terhadap A bila ada $H: I \times Y \rightarrow X$ dengan

$$H(0, y) = f_0(y), \quad H(1, y) = f_1(y), \quad H(t, a) = x$$

untuk semua y, t, a . Syarat terakhir tepat memastikan bahwa homotopi turun ke homotopi bertitik pada Y/A . Mengangkat homotopi dari hasil bagi memberi arah sebaliknya. Jadi diperoleh bijeksi ketiga himpunan kelas homotopi pada Bagian 17.4.

Untuk $n = 0$, $I^0 = D^0 = \{*\}$ dan batasnya kosong. Meruntuhkan himpunan kosong tidak menambahkan titik atau identifikasi, sehingga $I^0/\partial I^0$ dan $D^0/\partial D^0$ masing-masing satu titik. Akan tetapi $S^0 = \{1, -1\}$ mempunyai dua titik. Maka model hasil bagi tersebut gagal tepat pada $n = 0$, walaupun definisi $\pi_0(X, x) = [(S^0, 1), (X, x)]_*$ tetap sah sebagai himpunan bertitik.

Pemeriksaan penguasaan 17.4 (apa yang benar-benar dibuktikan Eckmann–Hilton).

Buktikan bahwa dua operasi berunit yang memenuhi hukum pertukaran berimpit dan membentuk monoid komutatif. Berikan kontracontoh yang menunjukkan bahwa invers tidak mengikuti dari hipotesis itu. Nyatakan hipotesis tambahan yang menghasilkan grup abelian.

17.11 Solusi Pemeriksaan 17.4

Misalkan unit kedua operasi ialah $e_\circ$ dan $e_\#$. Dengan hukum pertukaran,

$$\begin{aligned} e_\# &= e_\# \# e_\# \\ &= (e_\# \circ e_\circ) \# (e_\circ \circ e_\#) \\ &= (e_\# \# e_\circ) \circ (e_\circ \# e_\#) \\ &= e_\circ. \end{aligned}$$

Tuliskan unit bersama sebagai e . Lalu

$$a \circ b = (a \# e) \circ (e \# b) = (a \circ e) \# (e \circ b) = a \# b,$$

sehingga ada satu operasi, ditulis ab . Hukum pertukaran memberi

$$ab = (e \circ a) \# (b \circ e) = (e \# b) \circ (a \# e) = ba$$

dan

$$(ab)c = (a \circ b) \# (e \circ c) = (a \# e) \circ (b \# c) = a(bc).$$

Jadi operasinya berunit, asosiatif, dan komutatif. Ambil $M = \mathbb{Z}_{\geq 0}$ dengan kedua operasi sama dengan penjumlahan dan unit 0. Hukum pertukaran berlaku karena penjumlahan komutatif, tetapi 1 tidak mempunyai invers aditif di $\mathbb{Z}_{\geq 0}$. Maka kesimpulan umum hanya monoid komutatif. Jika setiap unsur diketahui mempunyai invers untuk salah satu operasi, kedua operasi yang telah berimpit membentuk grup abelian.

Pemeriksaan penguasaan 17.5 (jahitan dan empat kuadran). Tuliskan rumus $\#_1$ dan $\#_2$ pada loop ganda. Buktikan bahwa cabang-cabangnya cocok, bahwa hasilnya tetap mengirim batas I^2 ke x , dan bahwa kedua urutan penggabungan empat peta memberi nilai yang sama pada setiap kuadran. Jelaskan mengapa Eckmann–Hilton baru diterapkan pada kelas homotopi.

17.12 Solusi Pemeriksaan 17.5

Dengan konvensi kronologis, f_1 ditempuh pada paruh pertama dan f_2 pada paruh kedua. Rumusnya

$$(f_1 \#_1 f_2)(s, t) = \begin{cases} f_1(2s, t), & s \leq \frac{1}{2}, \\ f_2(2s - 1, t), & s \geq \frac{1}{2}, \end{cases}$$

dan

$$(f_1 \#_2 f_2)(s, t) = \begin{cases} f_1(s, 2t), & t \leq \frac{1}{2}, \\ f_2(s, 2t - 1), & t \geq \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Pada jahitan pertama, nilai kedua cabang ialah $f_1(1, t) = x = f_2(0, t)$; pada jahitan kedua nilainya $f_1(s, 1) = x = f_2(s, 0)$. Lema penempelan memberi kontinuitas. Jika (s, t) berada pada batas persegi, argumen salah satu koordinat pada setiap cabang berada di 0 atau 1, sehingga nilainya tetap x .

Baik $(f_1 \#_1 f_2) \#_2 (f_3 \#_1 f_4)$ maupun $(f_1 \#_2 f_3) \#_1 (f_2 \#_2 f_4)$ bernilai, berturut-turut pada kuadran kiri bawah, kanan bawah, kiri atas, dan kanan atas,

$$f_1(2s, 2t), \quad f_2(2s - 1, 2t), \quad f_3(2s, 2t - 1), \quad f_4(2s - 1, 2t - 1).$$

Jadi hukum pertukaran berlaku bahkan pada wakil mentah. Namun peta konstan bukan unit ketat bagi konkatenasi berkecepatan ganda, dan asosiativitas juga memerlukan reparametrisasi. Keduanya menjadi persamaan setelah homotopi relatif terhadap batas. Karena itu struktur berunit yang menjadi masukan Lema 17.2 berada pada **kelas homotopi**, bukan pada ruang peta mentah.

Pemeriksaan penguasaan 17.6 (dua penerapan komutativitas). Buktikan bahwa $\pi_1(G, e)$ abelian untuk setiap grup topologis G . Lalu buktikan bahwa $\pi_n(X, x)$ abelian untuk setiap $n \geq 2$ dengan memakai ruang loop teriterasi. Dalam kedua bagian, sebutkan dari mana invers berasal.

17.13 Solusi Pemeriksaan 17.6

Untuk loop pada grup topologis, gunakan konkatenasi $\#$ dan perkalian titik demi titik $\cdot$. Kedua operasi turun ke $\pi_1(G, e)$ dan mempunyai kelas loop konstan sebagai unit. Pada wakil,

$$(\alpha \# \beta) \cdot (\gamma \# \delta) = (\alpha \cdot \gamma) \# (\beta \cdot \delta),$$

karena identitas itu dapat diperiksa pada kedua paruh interval. Maka Eckmann–Hilton membuat operasi berimpit dan komutatif. Invers telah tersedia dari struktur grup konkatenasi: kelas $[\alpha]^{-1}$ diwakili loop balik $t \mapsto \alpha(1 - t)$. Jadi $\pi_1(G, e)$ grup abelian. Tidak ada sifat Lie yang digunakan.

Untuk $n \geq 2$, gunakan

$$\pi_n(X, x) \cong \pi_{n-2}(\Omega_x^2 X, c_x).$$

Konkatenasi koordinat pertama dan kedua pada loop ganda menginduksi dua operasi pada ruas kanan. Kelas peta konstan menjadi unit bersama, dan perhitungan empat kuadran memberi hukum pertukaran. Jadi kedua operasi sama dan komutatif. Salah satunya adalah struktur grup π_n yang dibangun dari konkatenasi koordinat; inversnya diwakili oleh pembalikan koordinat tersebut. Dengan invers yang sudah tersedia secara terpisah, monoid komutatif hasil Eckmann–Hilton adalah grup abelian.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts, © 2019 David Michael Roberts, tepatnya [Notes.tex](#) baris 3482–3677 pada commit [b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#) dari repositori [DavidMichaelRoberts/AlgebraicTopology2019](#). Rentang 196 baris itu dimulai dengan penanda Kuliah 18 dan berakhir pada baris kosong tepat sebelum penanda Kuliah 19 pada baris 3678. Materi sumber dan adaptasi Indonesia ini tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan edisi mencakup penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, dan pemindahan kelima catatan pinggir ke urutan bacaan utama. Edisi memperbaiki domain yang salah tipe pada peta terinduksi, membatasi target **Ab** pada $n \geq 2$, mendefinisikan norma pada konstruksi transpor, dan melengkapi bukti transpor, hasil kali, perubahan titik basis, serta invariansi homotopi. Definisi bundel memakai homeomorfisma di atas lingkungan; contoh Hopf kini menampilkan dua trivialisasi lokal lengkap. Ekor bertitik barisan eksak panjang diberi tipe yang benar dan konvensi kosetnya diselaraskan dengan aksi monodromi kanan kronologis. Teorema barisan eksak panjang tetap dinyatakan secara jujur sebagai hasil eksternal yang dipakai sebagai kotak hitam; edisi hanya menjelaskan peta penghubungnya.

Contoh pada [Notes.tex](#) baris 3499–3501 sepenuhnya dikomentari dalam sumber, sehingga tidak dimasukkan sebagai teks pembaca. Contoh itu telah diaudit: ia mengomposisikan representasi bernilai himpunan dengan functor ruang vektor bebas, tetapi menyingkat $\Pi_1(X)$ menjadi Π_1 pada kemunculan kedua. Tidak ada lingkungan latihan, gambar eksternal, atau aset terpisah dalam rentang sumber aktif ini.

Keenam pemeriksaan penguasaan, keenam petunjuk, dan keenam solusi lengkap merupakan materi asli edisi dan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen; edisi ini tidak disponsori, didukung, disahkan, ataupun diberi status resmi oleh David Michael Roberts atau institusinya. Produksi edisi ini dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**. Pernyataan ini menambah transparansi proses dan tidak mengurangi kredit penulis sumber ataupun kredit kontributor manusia.

18 Kuliah 18

18.1 Fungtorialitas dan contoh awal

Untuk $n \geq 1$, penetapan

$$\begin{aligned}(X, x) &\longmapsto \pi_n(X, x), \\ (f: (X, x) \rightarrow (Y, y)) &\longmapsto (f_*: \pi_n(X, x) \rightarrow \pi_n(Y, y))\end{aligned}$$

merupakan functor

$$\mathbf{Top}_* \longrightarrow \mathbf{Grp}.$$

Karena Unit 17 membuktikan bahwa $\pi_n(X, x)$ abelian untuk $n \geq 2$, bagi setiap $n \geq 2$ functor ini memperhalus menjadi

$$\pi_n: \mathbf{Top}_* \longrightarrow \mathbf{Ab}.$$

Audit sumber 18.1. [Notes.tex](#) baris 3485 mencetak $f_*: \pi_1(X, x) \rightarrow \pi_n(Y, y)$; domain bertipe benar adalah $\pi_n(X, x)$. Baris 3487 juga menyatakan target **Ab** tanpa membatasi n . Untuk $n = 1$, grup fundamental tidak harus abelian, sehingga target **Ab** hanya benar bagi $n \geq 2$.

Contoh 18.1 (ruang diskret). Jika T ruang diskret, maka

$$\pi_n(T, *) = 1,$$

sebab setiap pemetaan $S^n \rightarrow T$ konstan: sfera S^n terhubung.

Contoh 18.2 (ruang kontraktil). Jika X kontraktil, misalnya daerah berbentuk bintang di dalam suatu ruang vektor topologis, maka

$$\pi_n(X, x) = 1.$$

Ingat kembali bahwa ruang penutup $Z \rightarrow X$ menentukan representasi

$$\Pi_1(X) \longrightarrow \mathbf{Set}.$$

Namun, tidak ada sesuatu yang istimewa tentang kategori **Set** di sini. Kita dapat memakai kategori lain, misalnya kategori **Fin** dari himpunan berhingga, kategori **Vect** dari ruang vektor, kategori **Ab** dari grup abelian, atau, secara lebih umum, kategori **RMod** dari modul atas R , dengan R suatu gelanggang yang ditetapkan.

18.2 Transpor grup homotopi sepanjang lintasan

Proposisi 18.1 (representasi transpor). Tetapkan ruang X dan $n \geq 1$. Penetapan

$$x \longmapsto \pi_n(X, x)$$

merupakan komponen objek dari representasi

$$\Pi_1(X) \longrightarrow \mathbf{Grp}.$$

Untuk $n \geq 2$, representasi ini mengambil nilai dalam **Ab**.

Bukti. Diberikan lintasan

$$\gamma: [0, 1] \rightarrow X, \quad x \rightsquigarrow y,$$

dan pemetaan

$$\alpha: (I^n, \partial I^n) \rightarrow (X, x)$$

yang mewakili suatu kelas dalam $\pi_n(X, x)$, kita membangun kelas dalam $\pi_n(X, y)$. Untuk konstruksi ini, tuliskan

$$I = \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right]$$

dan gunakan norma maksimum

$$\|\mathbf{u}\|_\infty = \max_{1 \leq k \leq n} |u_k|.$$

Tetapkan homeomorfisma yang mempertahankan orientasi, diterapkan pada setiap koordinat,

$$i: \left[-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right]^n \xrightarrow{\cong} I^n,$$

serta homeomorfisma yang mempertahankan orientasi

$$j: \left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right] \xrightarrow{\cong} [0, 1].$$

Definisikan $\alpha^\gamma: I^n \rightarrow X$ oleh

$$\alpha^\gamma(\mathbf{u}) = \begin{cases} \alpha(i(\mathbf{u})), & \|\mathbf{u}\|_\infty \leq \frac{1}{4}, \\ \gamma(j(\|\mathbf{u}\|_\infty)), & \frac{1}{4} \leq \|\mathbf{u}\|_\infty \leq \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Pada jahitan $\|\mathbf{u}\|_\infty = \frac{1}{4}$, kedua rumus bernilai x karena $\alpha(\partial I^n) = \{x\}$ dan $\gamma(0) = x$. Lema penempelan memberi kontinuitas. Pada batas luar $\|\mathbf{u}\|_\infty = \frac{1}{2}$, nilainya $\gamma(1) = y$, sehingga

$$\alpha^\gamma: (I^n, \partial I^n) \rightarrow (X, y).$$

Homotopi relatif terhadap batas antara dua wakil α , serta homotopi yang mempertahankan titik ujung antara dua wakil γ , dapat dimasukkan ke rumus sepotong-sepotong yang sama dengan satu parameter tambahan. Karena semua rumus bertemu pada nilai x atau y , lema penempelan parametrik menunjukkan bahwa $[\alpha^\gamma]$ hanya bergantung pada $[\alpha]$ dan $[\gamma]$. Jadi kita memperoleh fungsi

$$T_\gamma: \pi_n(X, x) \longrightarrow \pi_n(X, y), \quad T_\gamma[\alpha] = [\alpha^\gamma].$$

Sekarang periksa struktur grup. Wakil produk $[\alpha][\beta]$ dapat dibuat dengan menempatkan wakil α dan β dalam dua kotak yang saling lepas pada kubus pusat dan mengirim sisa kubus pusat ke x . Pada $(\alpha \# \beta)^\gamma$, kedua kotak itu dikelilingi oleh satu kerah radial yang menelusuri γ . Pada $\alpha^\gamma \# \beta^\gamma$, masing-masing mula-mula mempunyai kerah sendiri. Susutkan kedua kotak secara linear di dalam kubus pusat, geser kedua kerah dalam hingga berimpit, lalu perluas kerah luar. Pada setiap tahap, batas kotak dalam bernilai x , batas kubus luar bernilai y , dan seluruh perubahan merupakan reparameterisasi sepotong-sepotong yang menetapkan batas. Lema penempelan memberi homotopi relatif terhadap ∂I^n , sehingga

$$T_\gamma([\alpha][\beta]) = T_\gamma[\alpha] T_\gamma[\beta].$$

Dengan demikian T_γ homomorfisma. Reparameterisasi kerah memberi

$$T_{\gamma \# \eta} = T_\eta \circ T_\gamma, \quad T_{c_x} = \text{id}.$$

Lintasan balik $\bar{\gamma}$ memberi $T_{\bar{\gamma}} \circ T_\gamma = T_{c_x}$ dan $T_\gamma \circ T_{\bar{\gamma}} = T_{c_y}$, jadi T_γ isomorfisma. Identitas dan komposisi dipertahankan, sehingga kita benar-benar memperoleh representasi $\Pi_1(X) \rightarrow \mathbf{Grp}$. Untuk $n \geq 2$, semua grup nilainya abelian. $\square$

Catatan pinggir sumber. Sumber menunjuk Hatcher, §4.1, halaman 341, untuk bukti bahwa transpor ini homomorfisma. Edisi telah menutup langkah tersebut di atas agar unit dapat dibaca mandiri.

Audit sumber 18.2. Notes.tex baris 3513 memakai $|\mathbf{x}|$ tanpa mendefinisikannya. Norma maksimum diperlukan agar $j(|\mathbf{x}|)$ tetap berada dalam domain $[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}]$ pada seluruh kulit kubus; norma Euklides gagal di sudut-sudut kubus.

Untuk $n = 1$, kita telah melihat versi konstruksi ini. Diberikan lintasan $\gamma: x \rightsquigarrow y$, terdapat isomorfisma

$$\pi_1(X, x) \xrightarrow{\cong} \pi_1(X, y).$$

Jika $x = y$, maka γ sebuah loop dan automorfisma yang dihasilkan pada $\pi_1(X, x)$ adalah konjugasi dengan arah yang ditentukan kerah:

$$T_\gamma([\alpha]) = [\bar{\gamma} \# \alpha \# \gamma].$$

Jadi, dengan perkalian kronologis edisi, unsur $[\alpha]$ dikirim ke $[\gamma]^{-1}[\alpha][\gamma]$.

Catatan 18.1 (titik basis pada ruang terhubung sederhana). Jika X terhubung sederhana, terdapat isomorfisma kanonik

$$\pi_n(X, x) \simeq \pi_n(X, y)$$

untuk setiap $x, y \in X$: dua lintasan dari x ke y homotopik dengan titik ujung tetap, sehingga menginduksi transpor yang sama. Karena alasan ini, banyak penulis menghilangkan titik basis ketika titik itu tidak penting.

Catatan pinggir sumber. Pernyataan yang sama berlaku di dalam satu komponen lintasan X yang terhubung sederhana, bagi titik-titik di komponen tersebut.

Catatan 18.2 (keluarga grup yang kontinu). Untuk setiap $n \geq 2$, koleksi $\pi_n(X, x)$ memberikan representasi

$$\Pi_1(X) \longrightarrow \mathbf{Ab} \longrightarrow \mathbf{Set},$$

dengan panah kedua functor pelupa. Bila X memenuhi hipotesis klasifikasi ruang penutup dari Unit 17—yakni SLSC menurut konvensi mata kuliah—representasi bernilai himpunan ini menentukan ruang penutup dari X yang seratnya di atas x adalah $\pi_n(X, x)$. Untuk ruang yang tidak terhubung, konstruksi ini berlaku komponen demi komponen. Ruang penutup itu mengingat bahwa serat-serat tersebut merupakan grup: ia adalah keluarga grup yang bervariasi secara kontinu, bukan sekadar keluarga himpunan.

18.3 Hasil kali dan invariansi homotopi

Lema 18.1 (grup homotopi hasil kali). Tetapkan $n \geq 1$. Diberikan ruang bertitik (X, x) dan (Y, y) , terdapat isomorfisma natural

$$\pi_n(X \times Y, (x, y)) \xrightarrow{\cong} \pi_n(X, x) \times \pi_n(Y, y).$$

Catatan pinggir sumber. Kata “natural” muncul sebagai catatan pinggir; edisi memasukkannya ke pernyataan karena sifat itu benar dan penting.

Bukti. Proyeksi pr_X dan pr_Y memberikan

$$\Phi([\alpha]) = ([\text{pr}_X \circ \alpha], [\text{pr}_Y \circ \alpha]).$$

Sebaliknya, dari wakil bertitik $a: S^n \rightarrow X$ dan $b: S^n \rightarrow Y$, bentuk

$$\Psi([a], [b]) = [(a, b)].$$

Homotopi ke atau dari ruang hasil kali tepat sama datanya dengan sepasang homotopi koordinat, sehingga kedua rumus terdefinisi baik dan saling invers. Operasi grup pada model kubus dilakukan dengan konkatenasi koordinat yang sama; proyeksi mengubahnya menjadi operasi pada masing-masing faktor. Maka Φ homomorfisma. Untuk pemetaan bertitik $f: X \rightarrow X'$ dan $g: Y \rightarrow Y'$, kedua cara mengelilingi persegi naturalitas mengirim $[\alpha]$ ke

$$([f \operatorname{pr}_X \alpha], [g \operatorname{pr}_Y \alpha]),$$

sehingga isomorfisma ini natural. $\square$

Sebagaimana pemetaan homotopik semestinya dianggap sama dari sudut pandang grup fundamental dan ruang penutup, hal yang sama berlaku bagi grup homotopi lebih tinggi.

Lema 18.2 (pemetaan homotopik dan perubahan titik basis). Tetapkan $n \geq 1$. Misalkan $f, g: X \rightarrow Y$ homotopik melalui

$$H: I \times X \rightarrow Y.$$

Tuliskan $h(t) = H(t, x)$, lintasan dari $f(x)$ ke $g(x)$. Ketiga panah

$$\pi_n(X, x) \xrightarrow{f_*} \pi_n(Y, f(x)), \quad \pi_n(Y, f(x)) \xrightarrow[T_h]{} \pi_n(Y, g(x)), \quad \pi_n(X, x) \xrightarrow{g_*} \pi_n(Y, g(x))$$

membentuk segitiga komutatif; secara ekuivalen,

$$T_h \circ f_* = g_*.$$

Bukti. Ambil wakil bertitik $\alpha: (S^n, *) \rightarrow (X, x)$. Rumus

$$K(t, s) = H(t, \alpha(s))$$

memberi homotopi bebas dari $f \circ \alpha$ ke $g \circ \alpha$; lintasan yang ditempuh titik basis selama homotopi itu tepat $h(t) = H(t, x)$. Sisipkan kerah kecil di sekitar titik basis S^n . Pada waktu t , kirim kerah tersebut sepanjang potongan $h|_{[0, t]}$ dan gunakan $H(t, -) \circ \alpha$ di luar kerah. Rumus-rumus bertemu karena nilai pada batas kerah adalah $H(t, x)$. Lema penempelan parametrik memberi homotopi bertitik dari wakil transpor $(f \circ \alpha)^h$ ke $g \circ \alpha$. Karenanya

$$T_h(f_*[\alpha]) = g_*[\alpha].$$

Ini berlaku bagi setiap $[\alpha]$, sehingga segitiga komutatif. $\square$

Proposisi 18.2 (invariansi homotopi). Tetapkan $n \geq 1$. Jika $f: X \rightarrow Y$ merupakan ekuivalensi homotopi, maka

$$f_*: \pi_n(X, x) \xrightarrow{\cong} \pi_n(Y, f(x))$$

merupakan isomorfisma.

Bukti. Untuk membedakan titik basis, tuliskan

$$f_*^u: \pi_n(X, u) \longrightarrow \pi_n(Y, f(u)).$$

Pilih invers homotopi $g: Y \rightarrow X$, homotopi $H: gf \simeq \text{id}_X$, dan $K: fg \simeq \text{id}_Y$. Lintasan

$$h(t) = H(t, x)$$

berjalan dari $gf(x)$ ke x . Menurut Lema 18.2,

$$T_h \circ g_*^{f(x)} \circ f_*^x = \text{id}_{\pi_n(X, x)}.$$

Jadi f_*^x injektif.

Untuk kesurjektifan, gunakan pula naturalitas transpor. Untuk lintasan $\lambda: u \rightsquigarrow v$ di X , penerapan f pada rumus kerah memberi

$$f_*^v \circ T_\lambda = T_{f \circ \lambda} \circ f_*^u.$$

Lintasan

$$k(t) = K(t, f(x))$$

berjalan dari $fgf(x)$ ke $f(x)$ dan memberi

$$T_k \circ f_*^{gf(x)} \circ g_*^{f(x)} = \text{id}_{\pi_n(Y, f(x))}.$$

Maka

$$\begin{aligned} f_*^x \circ T_h \circ g_*^{f(x)} &= T_{f \circ h} \circ f_*^{gf(x)} \circ g_*^{f(x)} \\ &= T_{f \circ h} \circ T_k^{-1}. \end{aligned}$$

Ruas kanan isomorfisma karena kedua faktor transpor isomorfisma. Ruas kiri memfaktorkan melalui f_*^x dan surjektif; karena itu f_*^x surjektif. Jadi f_*^x bijektif dan, karena merupakan homomorfisma, ia isomorfisma. $\square$

Menghitung grup homotopi sangatlah sulit. Bahkan untuk ruang yang relatif sederhana seperti sfera, kita memerlukan beragam siasat dan kadang-kadang hasil dari topologi diferensial.

Catatan pinggir sumber. Salah satu contohnya ialah teorema Sard.

Kenyataannya, kita tidak mengetahui seluruh grup homotopi dari sfera mana pun S^n dengan $n > 1$. Namun, setelah beberapa grup homotopi ruang standar diketahui, objek berikut dapat menghasilkan relasi antara grup homotopi ruang-ruang yang berbeda, bahkan dalam dimensi yang berbeda.

18.4 Bundel serat dan bundel Hopf kompleks

Definisi 18.1 (bundel serat). Sebuah *bundel serat* (*fibre bundle*) di atas ruang X adalah ruang P bersama pemetaan kontinu $\pi: P \rightarrow X$ sedemikian sehingga, untuk setiap $x \in X$, terdapat lingkungan terbuka $U \ni x$, suatu ruang F , dan homeomorfisma

$$\Phi_U: \pi^{-1}(U) \xrightarrow{\cong} U \times F$$

di atas U , yakni

$$\text{pr}_1 \circ \Phi_U = \pi|_{\pi^{-1}(U)}.$$

Ruang X disebut *ruang dasar*, P disebut *ruang total*, dan F disebut *serat tipikal* pada trivialisasi tersebut.

Catatan pinggir sumber. Frasa “di atas U ” berarti terdapat panah $\Phi_U: \pi^{-1}(U) \rightarrow U \times F$, panah $\pi|_{\pi^{-1}(U)}: \pi^{-1}(U) \rightarrow U$, dan proyeksi $\text{pr}_1: U \times F \rightarrow U$, dengan $\text{pr}_1 \circ \Phi_U = \pi|_{\pi^{-1}(U)}$.

Jika X terhubung lintasan, serat-serat $\pi^{-1}(x)$ otomatis homeomorfik secara nonkanonik. Memang, tarik bundel kembali sepanjang suatu lintasan di antara dua titik. Bundel di atas interval dapat ditrivialkan, dan pembatasan trivialisasi pada kedua titik ujung memberi homeomorfisma di antara kedua serat. Pilihan lintasan dan trivialisasi menjelaskan mengapa homeomorfisma itu tidak kanonik.

Bundel serat merupakan perumuman besar ruang penutup karena seratnya tidak lagi harus diskret.

Contoh 18.3. Setiap ruang penutup merupakan bundel serat: pada lingkungan yang tertutup rata, tiap lembaran dipetakan secara homeomorfik ke lingkungan tersebut, sehingga seluruh prabayangan homeomorfik dengan hasil kali lingkungan dan serat diskret.

Contoh 18.4 (bundel Hopf kompleks). Misalkan

$$S^3 = \{(z, w) \in \mathbb{C}^2 : |z|^2 + |w|^2 = 1\}.$$

Ruang $\mathbb{CP}^1$ adalah garis projektif kompleks; titik-titiknya ditulis dalam koordinat homogen $[z : w]$. Pemetaan

$$q: S^3 \longrightarrow \mathbb{CP}^1, \quad q(z, w) = [z : w],$$

terdefinisi baik karena z dan w tidak nol secara bersamaan. Serat suatu titik merupakan satu orbit perkalian skalar oleh

$$U(1) = \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| = 1\},$$

dan karenanya homeomorfik dengan S^1 .

Kita periksa trivialisasi lokalnya. Pada

$$U_z = \{[z : w] : z \neq 0\}, \quad u = w/z,$$

definisikan

$$\Phi_z: q^{-1}(U_z) \longrightarrow U_z \times U(1), \quad \Phi_z(z, w) = \left([z : w], \frac{z}{|z|}\right).$$

Inversnya, dalam koordinat $[1 : u]$, ialah

$$\Phi_z^{-1}([1 : u], \lambda) = \left(\frac{\lambda}{\sqrt{1 + |u|^2}}, \frac{\lambda u}{\sqrt{1 + |u|^2}} \right).$$

Pada

$$U_w = \{[z : w] : w \neq 0\}, \quad v = z/w,$$

definisikan

$$\Phi_w(z, w) = \left([z : w], \frac{w}{|w|} \right),$$

dengan invers

$$\Phi_w^{-1}([v : 1], \lambda) = \left(\frac{\lambda v}{\sqrt{1 + |v|^2}}, \frac{\lambda}{\sqrt{1 + |v|^2}} \right).$$

Kedua pasangan rumus saling invers, kontinu, dan mempertahankan proyeksi ke $\mathbb{CP}^1$. Karena $U_z \cup U_w = \mathbb{CP}^1$, pemetaan q benar-benar bundel serat dengan serat $U(1) \cong S^1$. Inilah *bundel Hopf kompleks*

$$S^1 \longrightarrow S^3 \longrightarrow \mathbb{CP}^1 \cong S^2.$$

Hanya ada sangat sedikit bundel serat yang ruang dasar, ruang total, dan seratnya semuanya berupa sfera. Jadi bundel Hopf kompleks agak tidak tipikal, tetapi sangat konkret dan merupakan contoh uji yang baik bagi gagasan baru.

18.5 Barisan eksak

Definisi 18.2 (keeksakan). Suatu barisan grup dan homomorfisma

$$\cdots \rightarrow A_{n-1} \xrightarrow{f_{n-1}} A_n \xrightarrow{f_n} A_{n+1} \rightarrow \cdots$$

disebut *eksak pada A_n* jika

$$\ker(f_n) = \operatorname{im}(f_{n-1}).$$

Barisan itu disebut *eksak* jika eksak pada setiap suku. Definisi ini berlaku bagi grup, termasuk grup abelian bila semua objeknya abelian.

Contoh 18.5 (barisan eksak pendek). Barisan

$$0 \rightarrow A \xrightarrow{\alpha} B \xrightarrow{\beta} C \rightarrow 0$$

disebut *barisan eksak pendek*. Keeksakannya setara dengan ketiga syarat

$$\alpha \text{ injektif,} \quad \beta \text{ surjektif,} \quad \ker(\beta) = \operatorname{im}(\alpha).$$

Berikut contoh yang tampak bahkan lebih trivial, tetapi tetap muncul dalam praktik.

Contoh 18.6. Barisan

$$0 \rightarrow A \xrightarrow{\phi} B \rightarrow 0$$

eksak jika dan hanya jika ϕ isomorfisma.

Catatan 18.3 (keeksakan himpunan bertitik). Definisi keeksakan masih bermakna bagi himpunan bertitik dan pemetaan bertitik. Diberikan

$$(A, a) \xrightarrow{f} (B, b) \xrightarrow{g} (C, c),$$

barisan ini eksak pada (B, b) jika

$$\text{im}(f) = g^{-1}(c).$$

Hal ini penting karena, untuk ruang bertitik (X, x) ,

$$[\text{pt}, X] \simeq [S^0, (X, x)]_*$$

merupakan himpunan bertitik, dengan titik basis komponen yang memuat x .

Diberikan bundel serat $q: P \rightarrow X$, kita menyebutnya *bertitik* bila dipilih $x \in X$ dan

$$p \in F = q^{-1}(x).$$

Audit sumber 18.3. Notes.tex baris 3606 mencetak $p \in F = \pi^{-1}(F)$, yang salah tipe. Rumus bertipe benar adalah $p \in F = q^{-1}(x)$.

18.6 Barisan eksak panjang bundel serat

Teorema 18.1 (barisan eksak panjang; hasil eksternal). Untuk bundel serat bertitik

$$q: (P, p) \rightarrow (X, x), \quad F = q^{-1}(x),$$

terdapat barisan eksak

$$\begin{aligned} \cdots \rightarrow \pi_n(F, p) &\xrightarrow{i_*} \pi_n(P, p) \xrightarrow{q_*} \pi_n(X, x) \xrightarrow{\delta} \pi_{n-1}(F, p) \xrightarrow{i_*} \cdots \\ &\rightarrow \pi_1(F, p) \xrightarrow{i_*} \pi_1(P, p) \xrightarrow{q_*} \pi_1(X, x) \xrightarrow{\delta} [\text{pt}, F] \xrightarrow{i_*} [\text{pt}, P] \xrightarrow{q_*} [\text{pt}, X], \end{aligned}$$

dengan $i: F \hookrightarrow P$ inklusi.

Teorema ini dipakai sebagai kotak hitam. Sumber merujuk Hatcher, Teorema 4.41, untuk pembuktiannya. Nama *barisan eksak panjang* membedakannya dari barisan eksak pendek.

Peta penghubung dapat dipahami sebagai berikut. Wakili unsur $\pi_n(X, x)$ oleh

$$a: (D^n, S^{n-1}, s_0) \rightarrow (X, x, x).$$

Bundel serat mempunyai sifat pengangkatan homotopi. Pilih kontraksi

$$C: D^n \times I \longrightarrow D^n, \quad C(u, 0) = s_0, \quad C(u, 1) = u, \quad C(s_0, t) = s_0.$$

Homotopi $a \circ C$ dimulai pada pemetaan konstan bernilai x . Gunakan sifat pengangkatan homotopi relatif terhadap $\{s_0\}$, mulai dari pemetaan konstan bernilai p dan tetapkan lintasan di atas s_0 tetap bernilai p . Irisan pada $t = 1$ memberi pengangkatan $\tilde{a}: D^n \rightarrow P$ dengan $\tilde{a}(s_0) = p$. Karena $a(S^{n-1}) = \{x\}$, pembatasan $\tilde{a}|_{S^{n-1}}$ mengambil nilai di F dan menentukan kelas

$$\delta[a] = [\tilde{a}|_{S^{n-1}}] \in \pi_{n-1}(F, p)$$

untuk $n \geq 2$; bagi $n = 1$, kelas itu berada dalam himpunan bertitik $[\text{pt}, F]$. Keberadaan pengangkatan, ketakbergantungan pilihan, keeksakan, dan kesesuaian tanda merupakan isi teorema eksternal, bukan bukti baru yang diklaim edisi ini.

Catatan 18.4 (ekor bertitik dan koset kanan). Beberapa penjelasan diperlukan pada $\pi_1(X, x)$ dan suku-suku selanjutnya yang hanya berupa himpunan bertitik. Andaikan P terhubung lintasan, tuliskan

$$G = \pi_1(X, x), \quad H = q_*\pi_1(P, p) \leq G.$$

Dengan konvensi kronologis edisi, pengangkatan loop memberi aksi **kanan** pada komponen serat: $[u] \cdot g$ adalah komponen titik akhir pengangkatan loop g yang dimulai di u . Stabilisator $[p]$ adalah H , sehingga pemetaan

$$H \backslash G \longrightarrow [\text{pt}, F], \quad Hg \longmapsto [p] \cdot g$$

merupakan bijeksi himpunan bertitik. Di sini $H \backslash G$ berarti koset kanan Hg ; tidak diperlukan normalitas H .

Jika P tidak terhubung lintasan, orbit titik basis hanya merupakan prabayangan komponen $[p] \in [\text{pt}, P]$:

$$H \backslash G \simeq i_*^{-1}([p]) \subseteq [\text{pt}, F].$$

Meskipun $\delta: G \rightarrow [\text{pt}, F]$ bukan homomorfisma,

$$H = \delta^{-1}([p]).$$

Audit sumber 18.4. Notes.tex baris 3619 menulis $i_*^{-1}(p)$, padahal kodomain i_* adalah $[\text{pt}, P]$; objek bertipe benar ialah $[p]$. Notasi hasil bagi sumber juga tidak menentukan sisi koset. Konvensi aksi kanan kronologis menghasilkan $H \backslash G$, yakni koset Hg .

18.7 Penerapan pada ruang penutup

Contoh 18.7 (grup homotopi ruang penutup). Untuk ruang penutup bertitik

$$(Z, z) \rightarrow (X, x),$$

serat Z_x diskret. Karena itu, bagi $n > 1$, barisan eksak panjang memuat

$$\cdots \rightarrow 0 = \pi_n(Z_x, z) \rightarrow \pi_n(Z, z) \rightarrow \pi_n(X, x) \rightarrow \pi_{n-1}(Z_x, z) = 0 \rightarrow \cdots,$$

sehingga

$$\pi_n(Z, z) \simeq \pi_n(X, x) \quad (n > 1).$$

Ujung barisan eksaknya ialah

$$\cdots \rightarrow 0 = \pi_1(Z_x, z) \rightarrow \pi_1(\tilde{Z}, z) \rightarrow \pi_1(X, x) \rightarrow [\text{pt}, Z_x] = Z_x \rightarrow [\text{pt}, Z] \rightarrow [\text{pt}, X].$$

Jadi $\pi_1(Z, z) \rightarrow \pi_1(X, x)$ injektif, sebagaimana telah diperoleh sebelumnya. Jika $[\text{pt}, Z] = *$, yakni Z terhubung lintasan, maka pemetaan bertitik

$$\pi_1(X, x) \longrightarrow Z_x$$

surjektif.

Contoh ini menunjukkan bahwa barisan eksak panjang grup homotopi merupakan perumuman besar dari hubungan antara grup fundamental ruang dasar dan grup fundamental ruang-ruang penutupnya. Meskipun demikian, ruang penutup masih memberikan hasil baru.

Contoh 18.8 (penutup universal kontraktif). Jika X terhubung dan SLSC serta mempunyai ruang penutup universal kontraktif $\tilde{X}$, maka

$$\pi_n(X) = 0 \quad (n > 1).$$

Memang, $\pi_n(X) \cong \pi_n(\tilde{X}) = 0$. Hal ini berlaku bagi setiap torus $\mathbb{T}^m$, dan khususnya bagi lingkaran S^1 .

Audit sumber 18.5. Sumber tidak menyatakan keterhubungan X pada klaim tentang “ruang penutup universal”. Edisi menambahkannya agar istilah dan kesimpulannya mempunyai cakupan yang tepat.

18.8 Penerapan pada bundel Hopf kompleks

Sekarang terapkan barisan eksak panjang pada bundel Hopf kompleks $S^1 \rightarrow S^3 \rightarrow S^2$.

Contoh 18.9 (grup homotopi melalui bundel Hopf kompleks). Sfera-sfera terhubung, dan

$$\pi_1(S^n) = 0 \quad (n > 1).$$

Karena $\pi_k(S^1) = 0$ bagi $k > 1$, diperoleh

$$\cdots \rightarrow 0 = \pi_n(S^1) \rightarrow \pi_n(S^3) \rightarrow \pi_n(S^2) \rightarrow \pi_{n-1}(S^1) = 0 \rightarrow \cdots, \quad n > 2,$$

serta

$$\cdots \rightarrow 0 = \pi_2(S^1) \rightarrow \pi_2(S^3) \rightarrow \pi_2(S^2) \rightarrow \pi_1(S^1) = \mathbb{Z} \rightarrow 0 \rightarrow \cdots.$$

Jadi, untuk $n > 2$,

$$\pi_n(S^3) \simeq \pi_n(S^2),$$

dan terdapat barisan eksak pendek

$$0 \rightarrow \pi_2(S^3) \rightarrow \pi_2(S^2) \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow 0.$$

Akibatnya, $\pi_2(S^2)$ grup abelian tak hingga dan

$$\pi_2(S^2) / \text{im}(\pi_2(S^3) \rightarrow \pi_2(S^2)) \simeq \mathbb{Z}.$$

Jika kita menerima hasil kotak hitam

$$\pi_2(S^3) = 0, \quad \pi_3(S^3) \simeq \mathbb{Z},$$

maka

$$\pi_2(S^2) \simeq \mathbb{Z}, \quad \pi_3(S^2) \simeq \mathbb{Z}.$$

Catatan 18.5. Kenyataannya,

$$\pi_k(S^n) = 0$$

untuk setiap $0 < k < n$. Ini hasil standar, tetapi pembuktiannya melampaui teknik yang telah dikembangkan sejauh ini dalam mata kuliah.

Berikut contoh bonus yang disajikan tanpa konstruksi.

Contoh 18.10 (bundel Hopf kuaternionik). Terdapat bundel serat

$$S^3 \longrightarrow S^7 \longrightarrow S^4.$$

Barisan eksak panjang memuat

$$\cdots \rightarrow 0 = \pi_4(S^7) \rightarrow \pi_4(S^4) \rightarrow \pi_3(S^3) \rightarrow \pi_3(S^7) = 0 \rightarrow \cdots.$$

Karena $\pi_3(S^3) \simeq \mathbb{Z}$, diperoleh

$$\pi_4(S^4) \simeq \mathbb{Z}.$$

Catatan 18.6. Hasil klasik yang lebih umum menyatakan

$$\pi_n(S^n) \simeq \mathbb{Z}$$

untuk setiap n . Sekali lagi, pembuktiannya melampaui cakupan mata kuliah sejauh ini.

Mengetahui grup homotopi sfera saja sudah sulit. Inilah salah satu alasan Serre dianugerahi Medali Fields: ia mengembangkan perangkat yang, antara lain, dapat dipakai untuk menunjukkan bahwa seluruh grup homotopi sfera berhingga kecuali

$$\pi_n(S^n) \simeq \mathbb{Z}$$

dan

$$\pi_{4n-1}(S^{2n}) \simeq \mathbb{Z} \oplus A,$$

dengan A grup abelian berhingga. Fenomena yang ganjil dan tidak terduga memang terjadi. Sebagai contoh yang dipilih secara acak,

$$\pi_{25}(S^6) \simeq \mathbb{Z}/(1056\mathbb{Z}) \oplus \mathbb{Z}/(8\mathbb{Z}).$$

Audit sumber 18.6. Edisi memperbaiki salah tata bahasa “These is” pada baris 3660 dan salah eja “calulate” pada baris 3676 tanpa mengubah isi matematis.

Pendamping penguasaan: pemeriksaan, petunjuk, dan solusi lengkap

Enam pemeriksaan berikut merupakan materi asli edisi. Semuanya terbatas pada isi Unit 18: transpor sepanjang lintasan, hasil kali, perubahan titik basis, invariansi homotopi, trivialisasi bundel Hopf kompleks, keeksakan lima suku, serta perhitungan melalui ruang penutup dan bundel-bundel Hopf. Tidak ada pemeriksaan yang memakai materi Kuliah 19.

Pemeriksaan penguasaan 18.1 (transpor sepanjang lintasan). Tetapkan $n \geq 1$. Misalkan $\gamma: x \rightsquigarrow y$ dan $\eta: y \rightsquigarrow z$ lintasan di X .

1. Jelaskan mengapa rumus kerah dengan norma maksimum mendefinisikan $T_\gamma: \pi_n(X, x) \rightarrow \pi_n(X, y)$.
2. Buktikan $T_{\gamma\#\eta} = T_\eta T_\gamma$ dan $T_{c_x} = \text{id}$.
3. Buktikan bahwa T_γ homomorfisma dan isomorfisma.
4. Jika x dan y terletak dalam satu komponen lintasan yang terhubung sederhana, buktikan bahwa isomorfisma transpor tidak bergantung pada lintasan yang dipilih dari x ke y .

Petunjuk. Periksa nilai pada dua batas kulit kubus. Untuk perkalian, bandingkan dua kotak pusat yang masing-masing berkerah dengan dua kotak di dalam satu kerah bersama. Untuk invers, gunakan lintasan balik. Untuk ketakbergantungan kanonik, bandingkan dua lintasan dengan titik ujung tetap.

Solusi Pemeriksaan 18.1. Pada $\|\mathbf{u}\|_\infty = \frac{1}{4}$, cabang dalam bernilai x karena $i(\mathbf{u}) \in \partial I^n$, sedangkan cabang luar bernilai $\gamma(0) = x$. Jadi lema penempelan memberi pemetaan kontinu. Pada ∂I^n , norma maksimum bernilai $\frac{1}{2}$, sehingga nilainya $\gamma(1) = y$. Dengan demikian rumus kerah menghasilkan peta pasangan

$$(I^n, \partial I^n) \longrightarrow (X, y).$$

Homotopi relatif antara wakil α dan homotopi yang mempertahankan titik ujung antara wakil γ dapat dimasukkan sebagai parameter tambahan ke rumus yang sama. Jadi T_γ terdefinisi pada kelas homotopi.

Konstruksi bagi $\gamma\#\eta$ mempunyai kerah yang mula-mula menelusuri γ lalu η . Konstruksi $T_\eta T_\gamma$ mempunyai dua kerah bersarang. Homeomorfisma radial sepotong-sepotong yang melebur dua kerah menjadi satu memberi homotopi relatif terhadap batas, maka

$$T_{\gamma\#\eta} = T_\eta \circ T_\gamma.$$

Kerah berlabel lintasan konstan dapat disusutkan ke batas kubus pusat, jadi $T_{c_x} = \text{id}$.

Untuk dua wakil α, β , tampilkan produk dengan dua kotak dukungan yang saling lepas. Pada $T_\gamma([\alpha][\beta])$, keduanya berada dalam satu kerah γ . Pada $T_\gamma[\alpha] T_\gamma[\beta]$, masing-masing mempunyai salinan kerah. Geser kedua kerah dalam hingga berimpit dan perluas kerah luarnya. Semua jahitan tetap

bernilai x atau y , sehingga reparameterisasi ini memberi homotopi relatif terhadap batas. Oleh karena itu

$$T_\gamma([\alpha][\beta]) = T_\gamma[\alpha] T_\gamma[\beta].$$

Akhirnya,

$$T_{\bar{\gamma}}T_\gamma = T_{\gamma\#\bar{\gamma}} = T_{c_x} = \text{id},$$

dan serupa $T_\gamma T_{\bar{\gamma}} = \text{id}$. Maka $T_{\bar{\gamma}} = T_\gamma^{-1}$ dan T_γ isomorfisma grup.

Terakhir, andaikan γ_0 dan γ_1 menghubungkan x ke y di dalam komponen lintasan yang terhubung sederhana. Loop $\gamma_0\#\bar{\gamma}_1$ nulhomotopik. Dengan menempelkan nulhomotopi itu pada salah satu sisi, diperoleh homotopi yang mempertahankan titik ujung dari γ_0 ke γ_1 . Ketakbergantungan wakil lintasan yang telah dibuktikan di atas memberi

$$T_{\gamma_0} = T_{\gamma_1}.$$

Jadi isomorfisma transpor pada komponen tersebut kanonik.

Pemeriksaan penguasaan 18.2 (hasil kali). Tetapkan $n \geq 1$. Bangun langsung isomorfisma

$$\pi_n(X \times Y, (x, y)) \cong \pi_n(X, x) \times \pi_n(Y, y).$$

Buktikan bahwa ia terdefinisi baik, mempertahankan operasi grup, mempunyai invers, dan natural terhadap pasangan pemetaan bertitik.

Petunjuk. Pemetaan atau homotopi ke hasil kali ditentukan tepat oleh dua komponen proyeksinya. Tulis kedua arah isomorfisma sebelum memeriksa naturalitas.

Solusi Pemeriksaan 18.2. Definisikan

$$\Phi[\alpha] = [\text{pr}_X \alpha] \times [\text{pr}_Y \alpha] := ([\text{pr}_X \alpha], [\text{pr}_Y \alpha]).$$

Jika $\alpha \simeq \alpha'$ secara bertitik, komposisi homotopi itu dengan kedua proyeksi memberi homotopi komponen, sehingga Φ terdefinisi baik. Sebaliknya, tetapkan

$$\Psi([a], [b]) = [(a, b)].$$

Jika $a \simeq a'$ dan $b \simeq b'$, pasangan kedua homotopi adalah homotopi bertitik $(a, b) \simeq (a', b')$, jadi Ψ juga terdefinisi baik. Persamaan

$$\Phi\Psi([a], [b]) = ([a], [b]), \quad \Psi\Phi[\alpha] = [\alpha]$$

mengikuti dari identitas $(\text{pr}_X \alpha, \text{pr}_Y \alpha) = \alpha$.

Konkatenasi pada kubus dilakukan pada satu koordinat domain. Proyeksi mempertahankan rumus sepotong-sepotong itu, sehingga

$$\Phi([\alpha][\beta]) = \Phi[\alpha] \Phi[\beta]$$

dengan perkalian komponen demi komponen pada ruas kanan. Jadi Φ isomorfisma grup.

Untuk pemetaan bertitik $f: X \rightarrow X'$ dan $g: Y \rightarrow Y'$, kedua komposit dalam persegi naturalitas mengirim $[\alpha]$ ke

$$([f \operatorname{pr}_X \alpha], [g \operatorname{pr}_Y \alpha]).$$

Karena kedua hasilnya sama pada setiap kelas, isomorfisma tersebut natural.

Pemeriksaan penguasaan 18.3 (titik basis yang bergerak dan ekuivalensi homotopi).

Tetapkan $n \geq 1$. Misalkan $H: f \simeq g$ dan $h(t) = H(t, x)$. Buktikan

$$T_h \circ f_* = g_*.$$

Kemudian gunakan pernyataan ini untuk membuktikan bahwa ekuivalensi homotopi $f: X \rightarrow Y$ menginduksi isomorfisma pada π_n , tanpa menganggap bahwa invers homotopinya mempertahankan titik basis.

Petunjuk. Homotopi $H(t, \alpha(s))$ menggerakkan nilai titik basis sepanjang h . Untuk ekuivalensi homotopi, satu homotopi memberikan invers kiri bagi f_* setelah transpor; homotopi lainnya menunjukkan bahwa suatu komposit yang memfaktorkan melalui f_* surjektif.

Solusi Pemeriksaan 18.3. Ambil wakil bertitik $\alpha: (S^n, *) \rightarrow (X, x)$. Homotopi

$$L(t, s) = H(t, \alpha(s))$$

berjalan dari $f\alpha$ ke $g\alpha$, sedangkan nilai titik basisnya $L(t, *) = h(t)$. Sisipkan kerah di sekitar $*$ dan gunakan potongan $h|_{[0,t]}$ pada kerah itu. Di luar kerah gunakan $L(t, -)$. Kedua rumus bertemu pada $h(t)$, sehingga lema penempelan memberi homotopi bertitik antara $(f\alpha)^h$ dan $g\alpha$. Maka

$$T_h(f_*[\alpha]) = g_*[\alpha],$$

dan karena $[\alpha]$ sebarang, $T_h f_* = g_*$.

Sekarang tuliskan $f_*^u: \pi_n(X, u) \rightarrow \pi_n(Y, f(u))$ agar titik basis terlihat. Pilih invers homotopi $r: Y \rightarrow X$ bagi f , dengan $H: rf \simeq \operatorname{id}_X$ dan $K: fr \simeq \operatorname{id}_Y$. Lintasan $h(t) = H(t, x)$ memberikan

$$T_h r_*^{f(x)} f_*^x = \operatorname{id}_{\pi_n(X, x)}.$$

Jadi f_*^x mempunyai invers kiri dan injektif. Lintasan $k(t) = K(t, f(x))$ memberikan

$$T_k f_*^{rf(x)} r_*^{f(x)} = \operatorname{id}_{\pi_n(Y, f(x))}.$$

Naturalisasi transpor terhadap f memberi

$$f_*^x T_h = T_{f \circ h} f_*^{rf(x)}.$$

Oleh karena itu

$$\begin{aligned} f_*^x T_h r_*^{f(x)} &= T_{f \circ h} f_*^{rf(x)} r_*^{f(x)} \\ &= T_{f \circ h} T_k^{-1}. \end{aligned}$$

Ruas kanan isomorfisma, jadi ruas kiri surjektif. Karena ruas kiri memfaktorkan melalui f_*^x , pemetaan f_*^x surjektif. Homomorfisma yang sekaligus injektif dan surjektif adalah isomorfisma. Tidak pernah diasumsikan bahwa $r(f(x)) = x$; transpor titik basis menutup tepat celah tersebut.

Pemeriksaan penguasaan 18.4 (trivialisasi lokal bundel Hopf kompleks). Untuk

$$q(z, w) = [z : w] : S^3 \rightarrow \mathbb{CP}^1,$$

periksa secara lengkap trivialisasi pada peta koordinat U_z dan U_w yang diberikan dalam Contoh 18.4. Tunjukkan bahwa rumus invers mengambil nilai di S^3 , saling invers dengan Φ_z, Φ_w , kontinu, dan berada di atas daerah peta koordinat yang benar. Tentukan fungsi transisi pada $U_z \cap U_w$.

Petunjuk. Pada U_z , tulis $[z : w] = [1 : u]$ dengan $u = w/z$ dan pisahkan fase $z/|z|$. Pada irisan, jika $v = 1/u$, bandingkan parameter fase yang diberikan oleh z dan oleh w .

Solusi Pemeriksaan 18.4. Untuk $([1 : u], \lambda) \in U_z \times U(1)$, tetapkan

$$(z, w) = \left(\frac{\lambda}{\sqrt{1 + |u|^2}}, \frac{\lambda u}{\sqrt{1 + |u|^2}} \right).$$

Karena $|\lambda| = 1$,

$$|z|^2 + |w|^2 = \frac{1 + |u|^2}{1 + |u|^2} = 1,$$

jadi $(z, w) \in S^3$. Selain itu $z \neq 0$, $[z : w] = [1 : u]$, dan $z/|z| = \lambda$. Jadi $\Phi_z \Phi_z^{-1}$ identitas. Sebaliknya, bila $(z, w) \in q^{-1}(U_z)$, ambil $u = w/z$ dan $\lambda = z/|z|$. Dari $1 = |z|^2(1 + |u|^2)$ diperoleh $|z| = 1/\sqrt{1 + |u|^2}$, sehingga rumus invers mengembalikan (z, w) .

Argumen yang sama pada U_w , dengan $v = z/w$, memberikan

$$(z, w) = \left(\frac{\lambda v}{\sqrt{1 + |v|^2}}, \frac{\lambda}{\sqrt{1 + |v|^2}} \right), \quad \lambda = \frac{w}{|w|}.$$

Semua operasi dalam rumus tersebut kontinu pada peta koordinat masing-masing. Koordinat projektif pertama tidak berubah, jadi kedua homeomorfisma berada di atas $\mathbb{CP}^1$.

Pada irisan, $u \neq 0$ dan $v = 1/u$. Jika $\lambda_z = z/|z|$ dan $\lambda_w = w/|w|$, maka $w = uz$ memberi

$$\lambda_w = \frac{u}{|u|} \lambda_z.$$

Jadi fungsi transisinya, dalam arah dari trivialisasi z ke trivialisasi w , adalah

$$([1 : u], \lambda_z) \mapsto \left([1 : u], \frac{u}{|u|} \lambda_z \right).$$

Faktor $u/|u| \in U(1)$ juga kontinu pada $u \neq 0$. Dengan demikian kedua peta koordinat membuktikan trivialisasi lokal bundel Hopf kompleks.

Pemeriksaan penguasaan 18.5 (inferensi dari lima suku bundel). Untuk $k \geq 2$, pandang lima suku berturutan dari barisan eksak panjang:

$$\pi_k(F) \xrightarrow{i_*} \pi_k(P) \xrightarrow{q_*} \pi_k(X) \xrightarrow{\delta} \pi_{k-1}(F) \xrightarrow{i_*} \pi_{k-1}(P).$$

Buktikan:

1. jika $\pi_k(F) = 0$, maka q_* injektif;
2. jika $\pi_{k-1}(F) = 0$, maka q_* surjektif;
3. jika kedua grup serat itu nol, maka q_* isomorfisma;
4. jika P kontraktil, maka $\delta: \pi_k(X) \rightarrow \pi_{k-1}(F)$ isomorfisma.

Petunjuk. Gunakan $\ker(q_*) = \text{im}(i_*)$ dan $\text{im}(q_*) = \ker(\delta)$. Untuk bagian terakhir, masukkan $\pi_k(P) = 0 = \pi_{k-1}(P)$ pada kedua sisi δ .

Solusi Pemeriksaan 18.5. Jika $\pi_k(F) = 0$, citra pemetaan $i_*: \pi_k(F) \rightarrow \pi_k(P)$ adalah subgrup nol. Keeksakan pada $\pi_k(P)$ memberi

$$\ker(q_*) = \text{im}(i_*) = 0.$$

Jadi q_* injektif.

Jika $\pi_{k-1}(F) = 0$, peta penghubung δ mempunyai target grup nol, sehingga kernelnya seluruh $\pi_k(X)$. Keeksakan pada $\pi_k(X)$ memberi

$$\text{im}(q_*) = \ker(\delta) = \pi_k(X).$$

Jadi q_* surjektif. Bila kedua grup serat tersebut nol, q_* sekaligus injektif dan surjektif, maka isomorfisma.

Terakhir, bila P kontraktil, fragmen di sekitar δ menjadi

$$0 = \pi_k(P) \longrightarrow \pi_k(X) \xrightarrow{\delta} \pi_{k-1}(F) \longrightarrow \pi_{k-1}(P) = 0.$$

Keeksakan pada $\pi_k(X)$ membuat kernel δ nol, jadi δ injektif. Keeksakan pada $\pi_{k-1}(F)$ membuat citra δ seluruh $\pi_{k-1}(F)$, jadi δ surjektif. Karena $k \geq 2$, suku-suku ini grup dan δ homomorfisma; akibatnya δ isomorfisma.

Pemeriksaan penguasaan 18.6 (ruang projektif dan bundel-bundel Hopf).

1. Untuk penutup antipodal $S^m \rightarrow \mathbb{RP}^m$ dengan $m \geq 2$, tentukan hubungan antara $\pi_n(S^m)$ dan $\pi_n(\mathbb{RP}^m)$ bagi $n > 1$. Dengan hasil standar $\pi_k(S^m) = 0$ untuk $0 < k < m$ dan $\pi_m(S^m) \cong \mathbb{Z}$, simpulkan nilai $\pi_n(\mathbb{RP}^m)$ untuk $1 < n < m$ serta $\pi_m(\mathbb{RP}^m)$. Gunakan pula ekor bertitik untuk menghitung $\pi_1(\mathbb{RP}^m)$.
2. Gunakan bundel Hopf kompleks dan hasil $\pi_2(S^3) = 0$, $\pi_3(S^3) \cong \mathbb{Z}$ untuk menghitung $\pi_2(S^2)$ dan $\pi_3(S^2)$. Nyatakan pula hubungan bagi semua $n > 2$.
3. Gunakan bundel Hopf kuaternionik $S^3 \rightarrow S^7 \rightarrow S^4$ untuk menghitung $\pi_4(S^4)$ dari $\pi_4(S^7) = 0$, $\pi_3(S^7) = 0$, dan $\pi_3(S^3) \cong \mathbb{Z}$.

Petunjuk. Serat penutup antipodal mempunyai dua titik. Grup homotopi lebih tinggi ruang total dan dasar isomorfik. Untuk grup fundamental, gunakan deskripsi orbit pada Catatan 18.4 dengan $H = q_*\pi_1(S^m) = 1$, bukan argumen kernel bagi pemetaan yang bukan homomorfisma. Untuk bundel Hopf kompleks maupun kuaternionik, tulis fragmen eksak yang mengapit grup dasar yang hendak dihitung dan nolkan grup sfera dalam dimensi di bawah dimensinya.

Solusi Pemeriksaan 18.6. Karena $S^m \rightarrow \mathbb{RP}^m$ ruang penutup, Contoh 18.7 memberi

$$\pi_n(S^m) \xrightarrow{\cong} \pi_n(\mathbb{RP}^m) \quad (n > 1).$$

Maka, untuk $1 < n < m$,

$$\pi_n(\mathbb{RP}^m) = 0,$$

sedangkan

$$\pi_m(\mathbb{RP}^m) \cong \mathbb{Z}.$$

Khususnya, $\pi_2(\mathbb{RP}^2) \cong \mathbb{Z}$.

Untuk menghitung grup fundamental, serat penutup antipodal ialah $\{+, -\}$ dan S^m terhubung sederhana bagi $m \geq 2$. Bagian bertitik barisan eksak adalah

$$0 = \pi_1(S^m) \longrightarrow \pi_1(\mathbb{RP}^m) \xrightarrow{\delta} \{+, -\} \longrightarrow [\text{pt}, S^m] = *.$$

Pemetaan δ bukan homomorfisma, jadi prabayangan titik basis saja tidak membuktikan bahwa ia injektif. Gunakan deskripsi orbit Catatan 18.4. Dengan

$$G = \pi_1(\mathbb{RP}^m), \quad H = q_*\pi_1(S^m) = 1,$$

terdapat bijeksi himpunan bertitik

$$H \backslash G \xrightarrow{\cong} \{+, -\}.$$

Karena $H = 1$, himpunan $H \backslash G$ dapat diidentifikasi dengan himpunan yang mendasari G . Jadi G mempunyai tepat dua unsur. Satu-satunya grup berorde dua adalah grup siklik:

$$\pi_1(\mathbb{RP}^m) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

Dengan demikian nilai $\pi_2(\mathbb{RP}^2) \cong \mathbb{Z}$ tidak bertentangan dengan grup fundamentalnya; isomorfisma grup homotopi melalui ruang penutup berlaku dalam derajat $n > 1$.

Untuk bundel Hopf kompleks, bagian relevan barisan eksak adalah

$$0 = \pi_2(S^1) \longrightarrow \pi_2(S^3) \longrightarrow \pi_2(S^2) \longrightarrow \pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z} \longrightarrow \pi_1(S^3) = 0.$$

Dengan $\pi_2(S^3) = 0$, peta $\pi_2(S^2) \rightarrow \mathbb{Z}$ sekaligus injektif dan surjektif, sehingga

$$\pi_2(S^2) \cong \mathbb{Z}.$$

Bagi $n > 2$, kedua grup serat di kiri dan kanan lenyap:

$$\pi_n(S^1) = 0 = \pi_{n-1}(S^1).$$

Karena itu

$$\pi_n(S^3) \xrightarrow{\cong} \pi_n(S^2) \quad (n > 2).$$

Dengan $n = 3$ dan $\pi_3(S^3) \cong \mathbb{Z}$, diperoleh

$$\pi_3(S^2) \cong \mathbb{Z}.$$

Untuk bundel Hopf kuaternionik $S^3 \rightarrow S^7 \rightarrow S^4$, fragmen yang relevan adalah

$$0 = \pi_4(S^7) \longrightarrow \pi_4(S^4) \xrightarrow{\delta} \pi_3(S^3) \cong \mathbb{Z} \longrightarrow \pi_3(S^7) = 0.$$

Keeksakan membuat δ injektif karena suku di kirinya nol, dan surjektif karena suku di kanannya nol. Jadi

$$\pi_4(S^4) \cong \mathbb{Z}.$$

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts, © 2019 David Michael Roberts, tepatnya [Notes.tex](#) baris 3678–3947 pada commit [b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#) dari repositori [DavidMichaelRoberts/AlgebraicTopology2019](#). Rentang 270 baris itu dimulai dengan penanda Kuliah 19 dan berakhir pada baris kosong tepat sebelum penanda Kuliah 20 pada baris 3948. Materi sumber dan adaptasi Indonesia ini tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan edisi mencakup penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, dan pemindahan ketiga belas catatan pinggir ke urutan bacaan utama. Keempat diagram Xy-pic dan kedua gambar TikZ sumber ditulis ulang sebagai diagram, tabel, dan deskripsi semantik terpusat yang menyebutkan setiap objek, arah, serta label panah. Edisi juga menerapkan koreksi audit pada aksi kanan dan serat hasil bagi, rentang $n \geq 3$, tanda peta penghubung, hipotesis keterhinggaan karakteristik Euler, arti produk R^S , dimensi ruang bagi operator vektor, komutativitas morfisma kompleks, augmentasi kompleks de Rham, perbedaan jenis invarian, serta konvensi graf berarah. Salah eja dan salah tata bahasa sumber diperbaiki tanpa mengubah urutan matematisnya.

Rentang sumber aktif memuat tepat enam definisi, dua belas contoh, dua lema, satu catatan, satu lingkungan bukti yang ditandai sebagai latihan, lima belas tampilan `\[...\]`, satu tampilan `align*`, dua label sumber, empat diagram Xy-pic, dan dua gambar TikZ. Tidak ada sitasi, rujukan silang, gambar eksternal, `input`, atau `include`. Teorema bundel hasil bagi subgrup tertutup, fakta penutup ganda grup matriks berdimensi rendah, fakta umum π_2 bagi grup Lie, sifat Lingkaran Warsawa, dan bentuk global Lema Poincaré ditandai secara jujur sebagai hasil eksternal atau kotak hitam bila dipakai. Latihan sumber tentang fungsionalitas slpc diselesaikan lengkap di tempatnya.

Keenam pemeriksaan penguasaan, keenam petunjuk, dan keenam solusi lengkap merupakan materi asli edisi dan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen; edisi ini tidak disponsori, didukung, disahkan, ataupun diberi status resmi oleh David Michael Roberts atau institusinya. Produksi edisi ini dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**. Pernyataan ini menambah transparansi proses dan tidak mengurangi kredit penulis sumber ataupun kredit kontributor manusia.

19 Kuliah 19

19.1 Bundel hasil bagi grup Lie

Sumber besar bundel serat yang dapat dikenai barisan eksak panjang berasal dari grup Lie. Misalkan G grup Lie dan $H \leq G$ subgrup tertutup. Bentuk G/H sebagai ruang orbit bagi **aksi kanan**

$$G \times H \longrightarrow G, \quad (g, h) \longmapsto g \cdot h = gh.$$

Pemetaan hasil bagi

$$q: G \longrightarrow G/H, \quad q(g) = gH,$$

merupakan bundel serat. Ini adalah **teorema hasil bagi subgrup tertutup**, suatu hasil eksternal yang dipakai di sini sebagai kotak hitam. Serat di atas gH ialah orbit gH itu sendiri. Perkalian kanan membuat serat ini sebuah torsor- H : aksinya bebas dan transitif. Setelah memilih g di dalam serat, pemetaan $h \mapsto gh$ memberi homeomorfisma $H \cong gH$, tetapi tanpa pilihan tersebut serat tidak teridentifikasi secara kanonik dengan H .

Catatan pinggir sumber. Contoh grup Lie matriks ialah $GL(n, \mathbb{R})$, $O(n)$, $SO(n)$, $U(n)$, dan $SU(n)$: berturut-turut grup matriks invertibel real, ortogonal, ortogonal khusus, uniter, dan uniter khusus. “Khusus” berarti determinannya 1. Dalam setiap keluarga terdapat pemasukan blok tertutup $K(n) \hookrightarrow K(n+1)$ melalui $A \mapsto \text{diag}(A, 1)$; selain itu $SO(n) \subseteq O(n)$ dan $SU(n) \subseteq U(n)$. Daftar ini bukan satu rantai inklusi tunggal—misalnya grup ortogonal real dan grup uniter kompleks tidak boleh dicampur menjadi satu rantai hanya karena ditulis berurutan.

Audit sumber 19.1. Notes.tex baris 3678 mempunyai ketaksesuaian subjek-verba. Baris 3680 juga tidak menyebutkan sisi aksi dan menyebut serat “isomorfik dengan H ” tanpa mencatat pilihannya. Edisi memakai aksi kanan $g \cdot h = gh$, menyatakan serat sebagai torsor- H , dan membedakan homeomorfisma setelah memilih titik dari identifikasi kanonik yang memang tidak tersedia.

Contoh 19.1 (sfera sebagai ruang homogen). Aksi standar pada vektor satuan memberikan bundel serat

$$SO(n) \longrightarrow SO(n+1) \longrightarrow SO(n+1)/SO(n) \cong S^n$$

dan

$$SU(n) \longrightarrow SU(n+1) \longrightarrow SU(n+1)/SU(n) \cong S^{2n+1}.$$

Identifikasi ruang homogen tersebut dipakai oleh sumber tanpa bukti; Pemeriksaan Penguasaan 19.1 memverifikasi aksi, stabilisator, dan seratnya.

Contoh 19.2 (bundel Hopf sebagai hasil bagi). Bundel Hopf kompleks juga berbentuk demikian:

$$U(1) \longrightarrow SU(2) \longrightarrow SU(2)/U(1) \cong S^2,$$

dengan pemasukan

$$U(1) \hookrightarrow SU(2), \quad z \longmapsto \begin{pmatrix} z & 0 \\ 0 & \bar{z} \end{pmatrix}.$$

Identifikasi $SU(2)/U(1) \cong S^2$ adalah fakta standar eksternal yang dipakai sumber tanpa bukti dalam unit ini.

Karena $SU(1)$, yakni grup matriks uniter 1×1 berdeterminan 1, trivial, kita memperoleh

$$SU(2) = SU(2)/SU(1) \cong S^3.$$

Ada homomorfisma surjektif

$$SU(2) \longrightarrow SO(3)$$

dengan kernel pusat $\{\pm I\}$. Jadi

$$SO(3) \cong SU(2)/\{\pm I\},$$

dan $SU(2) \rightarrow SO(3)$ adalah bundel serat, bahkan ruang penutup ganda.

Catatan pinggir sumber. Sebagai grup Lie, $SU(2)$ isomorfik dengan grup kuaternion satuan. Konjugasi oleh kuaternion satuan mempertahankan subruang kuaternion imajiner murni, yang dapat diidentifikasi dengan $\mathbb{R}^3$, dan bertindak padanya sebagai rotasi. Konstruksi ini menghasilkan homomorfisma $SU(2) \rightarrow SO(3)$ di atas.

Isomorfisma kuaternion, surjektivitas, dan perhitungan kernel tersebut adalah fakta standar eksternal dalam unit ini. Karena $SU(2) \cong S^3$ terhubung sederhana dan $\{\pm I\}$ bertindak bebas dengan hasil bagi $SO(3)$, teori ruang penutup memberi

$$\pi_1(SO(3), I) \cong \{\pm I\} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

Sekarang terapkan barisan eksak panjang pada bundel $SO(n) \rightarrow SO(n+1) \rightarrow S^n$. Bagi $n \geq 3$, bagian ekornya adalah

$$\cdots \longrightarrow \pi_2(S^n, *) = 0 \longrightarrow \pi_1(SO(n), I) \longrightarrow \pi_1(SO(n+1), I) \longrightarrow \pi_1(S^n, *) = 0 \longrightarrow \cdots.$$

Keeksakan menunjukkan bahwa

$$\pi_1(SO(n), I) \longrightarrow \pi_1(SO(n+1), I)$$

isomorfisma bagi $n \geq 3$. Dimulai dari $SO(3)$, induksi memberi

$$\pi_1(SO(n), I) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \quad (n \geq 3).$$

Untuk $n = 2$, bagian barisan eksaknya adalah

$$\cdots \longrightarrow \pi_2(SO(3), I) \longrightarrow \pi_2(S^2, *) = \mathbb{Z} \xrightarrow{\delta} \pi_1(SO(2), I) \longrightarrow \pi_1(SO(3), I) \longrightarrow \pi_1(S^2, *) = 0 \longrightarrow \cdots.$$

Grup $SO(2)$ homeomorfik dengan S^1 , sehingga $\pi_1(SO(2), I) \cong \mathbb{Z}$. Setelah memasukkan grup-grup yang sudah diketahui, kita memperoleh

$$\cdots \longrightarrow \pi_2(SO(3), I) \xrightarrow{\pi_*} \mathbb{Z} \xrightarrow{\delta} \mathbb{Z} \xrightarrow{i_*} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

Pemetaan i_* surjektif, maka kernelnya $2\mathbb{Z}$. Keeksakan memberi

$$\text{im}(\delta) = 2\mathbb{Z}.$$

Jadi, setelah generator bagi kedua salinan $\mathbb{Z}$ dipilih, δ adalah perkalian dengan $+2$ atau -2 . Tanda $+2$ hanya diperoleh setelah pilihan generator dan orientasi dibuat serasi; tanpa pilihan itu, kesimpulan kanoniknya hanyalah perkalian dengan ± 2 . Karena peta ini injektif, $\ker \delta = 0$, sehingga keeksakan juga memberi $\pi_* = 0$.

Perhitungan ini memberi informasi bukan hanya tentang grup-grup homotopi, tetapi juga tentang pemetaan yang diinduksi di antaranya; informasi tentang pemetaan itu sama pentingnya.

Satu langkah lebih tinggi dapat ditulis

$$\cdots \longrightarrow \pi_2(SO(2), I) \xrightarrow{i_*} \pi_2(SO(3), I) \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \xrightarrow{\times(\pm 2)} \mathbb{Z} \xrightarrow{\text{mod } 2} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

Karena $\pi_2(SO(2), I) \cong \pi_2(S^1, *) = 0$, citra i_* trivial. Akan tetapi, keeksakan pada $\pi_2(SO(3), I)$ mengatakan bahwa citra ini adalah kernel pemetaan nol ke $\mathbb{Z}$, yakni seluruh $\pi_2(SO(3), I)$. Maka

$$\pi_2(SO(3), I) = 0.$$

Hasil yang sama juga mengikuti dari penutup $SU(2) \rightarrow SO(3)$ dan $SU(2) \cong S^3$, jika fakta $\pi_2(S^3) = 0$ sudah tersedia.

Audit sumber 19.2. Notes.tex baris 3692 menghilangkan variabel dari syarat “ ≥ 3 ”. Baris 3704 menggandakan sebuah verba dan menetapkan tanda +2 tanpa menyebut pilihan generator. Rentang yang benar ialah $n \geq 3$, sedangkan keeksakan sendiri hanya menentukan $\text{im } \delta = 2\mathbb{Z}$ dan dengan demikian faktor ± 2 .

Catatan 19.1 (fakta keras tentang grup Lie; kotak hitam). Untuk setiap grup Lie berdimensi hingga G dengan unsur identitas e , berlaku

$$\pi_2(G, e) = 0.$$

Ini adalah hasil eksternal yang sulit dan tidak dibuktikan oleh sumber ataupun edisi ini.

19.2 Ekuivalensi homotopi lemah

Pada awal mata kuliah kita mengatakan bahwa topologi aljabar mencari invarian ruang terhadap deformasi kontinu, yakni terhadap ekuivalensi homotopi. Namun, itu belum seluruh ceritanya. Jika suatu pemetaan $f: X \rightarrow Y$ menginduksi isomorfisma pada seluruh grup homotopi, maka kumpulan invarian tersebut tidak dapat membedakan X dari Y . Gagasan ini menuntun ke definisi berikut.

Audit sumber 19.3. Edisi memperbaiki frasa salah “whose story” pada Notes.tex baris 3714 menjadi “whole story”, yang diterjemahkan sebagai “seluruh ceritanya”.

Definisi 19.1 (ekuivalensi homotopi lemah). Sebuah pemetaan ruang $f: X \rightarrow Y$ disebut *ekuivalensi homotopi lemah* jika functor yang diinduksinya

$$\Pi_1(X) \longrightarrow \Pi_1(Y)$$

merupakan ekuivalensi grupoid dan, untuk setiap $x \in X$ dan setiap $n > 1$, homomorfisma

$$f_*: \pi_n(X, x) \longrightarrow \pi_n(Y, f(x))$$

merupakan isomorfisma.

Catatan pinggir sumber. Syarat pada grupoid fundamental ekuivalen dengan meminta bijeksi pada **komponen lintasan** $[\text{pt}, X] \xrightarrow{\sim} [\text{pt}, Y]$ dan isomorfisma $\pi_1(X, x) \xrightarrow{\sim} \pi_1(Y, f(x))$ untuk setiap $x \in X$. Notasi $[\text{pt}, X]$ di sini tidak diganti dengan $\pi_0(X)$, sebab mata kuliah membedakan komponen lintasan dari komponen terhubung.

Contoh 19.3. Setiap ekuivalensi homotopi $f: X \rightarrow Y$ merupakan ekuivalensi homotopi lemah.

Kebalikannya tidak selalu benar.

Contoh 19.4 (kurva sinus topolog). Tuliskan

$$C = \left\{ \left(x, \sin \frac{1}{x} \right) : 0 < x \leq \frac{1}{\pi} \right\} \cup (\{0\} \times [-1, 1]).$$

Ruang C mempunyai dua komponen lintasan: kurva berosilasi dan ruas vertikal limit. Pilih satu titik pada masing-masing komponen dan beri $\{a, b\}$ topologi diskret. Pemetaan perwakilan

$$j: \{a, b\} \longrightarrow C$$

merupakan ekuivalensi homotopi lemah. Kedua komponen lintasan C kontraktil, sehingga semua grup homotopi bertitiknya trivial, persis seperti pada ruang dua titik diskret, dan j bijektif pada komponen lintasan. Namun, C terhubung, sehingga setiap pemetaan kontinu $C \rightarrow \{a, b\}$ konstan dan tidak dapat menjadi invers homotopi bagi j . Pemeriksaan Penguasaan 19.3 memberikan verifikasi lengkap kedua klaim.

Contoh 19.5 (Lingkaran Warsawa). Lingkaran Warsawa W dibentuk dari kurva sinus topolog dengan menambahkan sebuah busur dari “titik ujung bebas” komponen berosilasi ke komponen vertikal pada sumbu y .

Catatan pinggir sumber. Secara lebih formal, ambil hasil bagi $C \sqcup [0, 1] \rightarrow W$ dengan mengidentifikasi 0 dan 1 dengan kedua titik yang sesuai pada C . Gambar TikZ yang semula berada di catatan pinggir dipindahkan ke Diagram 19.1 agar geometri pentingnya berada dalam urutan bacaan utama.

Diagram 19.1 (deskripsi semantik Lingkaran Warsawa). Tetapkan

$$\Gamma = \left\{ \left(x, \sin \frac{1}{x} \right) : 0 < x \leq \frac{1}{\pi} \right\}, \quad L = \{0\} \times [-1, 1], \quad C = \Gamma \cup L.$$

Kurva Γ berosilasi semakin rapat ketika $x \rightarrow 0^+$ dan mempunyai ruas vertikal limit L . Tambahkan busur penutup α yang berujung pada $(1/\pi, 0) \in \Gamma$ dan $(0, 0) \in L$, serta yang selain pada kedua titik ujung itu tidak berpotongan dengan C . Dengan demikian data gambar sumber dapat ditulis tanpa bergantung pada posisi atau warna sebagai

$$W = C \cup \alpha, \quad \alpha: (1/\pi, 0) \rightsquigarrow (0, 0).$$

Ruang W terhubung lintasan tetapi semua grup homotopinya trivial. Karena itu pemetaan $W \rightarrow \text{pt}$ adalah ekuivalensi homotopi lemah. Meskipun demikian, W tidak kontraktil: kontraksi akan memaksa perilaku lintasan yang tidak mungkin melintasi dua komponen lintasan kurva sinus topolog asal. Trivialitas semua grup homotopi dan ketidakkontraktilan ini adalah fakta eksternal dalam unit; kalimat singkat sumber bukan bukti lengkap, sehingga edisi tidak mengklaim telah membuktikannya.

19.3 Penggantian SLPC

Kelas contoh berikut menjelaskan mengapa pembatasan umum pada ruang-ruang SLPC tidak banyak merugikan dari sudut pandang homotopi lemah. Di sini **SLPC** tetap berarti *terhubung lintasan semilokal* menurut Definisi 4.2 mata kuliah: ekuivalen dengan syarat bahwa setiap komponen lintasan terbuka. Istilah ini tidak berarti SLSC dan tidak diganti dengan pengertian standar lain tentang keterhubungan lintasan lokal.

Definisi 19.2 (ruang slpc(X)). Untuk ruang X , beri himpunan komponen lintasan $[\text{pt}, X]$ topologi hasil bagi dari pemetaan

$$q_X: X \longrightarrow [\text{pt}, X].$$

Tuliskan

$$D_X = \text{disc}[\text{pt}, X]$$

untuk himpunan yang sama dengan topologi diskret, dan biarkan $i_X: D_X \rightarrow [\text{pt}, X]$ menjadi fungsi bijektif identitas pada himpunan yang mendasarinya. Definisikan

$$\text{slpc}(X) = D_X \times_{[\text{pt}, X]} X$$

sebagai pullback pada Diagram 19.2.

Diagram 19.2 (pullback yang mendefinisikan $\text{slpc}(X)$). Keempat objek dan semua panahnya adalah

$$\begin{array}{ccc} D_X \times_{[\text{pt}, X]} X & \xrightarrow{p_2} & X \\ p_1 \downarrow & & \downarrow q_X \\ D_X & \xrightarrow{i_X} & [\text{pt}, X]. \end{array}$$

Panah atas p_2 menuju X , panah kiri p_1 menuju ruang diskret D_X , panah kanan adalah pemetaan komponen q_X , dan panah bawah i_X melupakan topologi diskret. Pernyataan bahwa persegi ini pullback berarti titik sudut kiri atas tepat pasangan $([x], x)$ dengan $[x] = q_X(x)$.

Secara himpunan, setiap $x \in X$ muncul tepat sekali sebagai $([x], x)$. Topologi baru itu membuat X menjadi gabungan saling lepas topologis dari komponen-komponen lintasannya, sambil mempertahankan topologi subruang pada setiap komponen.

Lema 19.1 (functorialitas penggantian SLPC). Penetapan $X \mapsto \text{slpc}(X)$ adalah komponen objek suatu functor

$$\text{slpc}: \mathbf{Top} \longrightarrow \mathbf{Top}$$

yang nilainya terletak dalam subkategori penuh ruang-ruang SLPC.

Bukti (latihan sumber, diselesaikan edisi). Diberikan pemetaan kontinu $f: X \rightarrow Y$, citra suatu lintasan di X adalah lintasan di Y . Karena itu terdapat fungsi pada komponen lintasan

$$[\text{pt}, f]: [\text{pt}, X] \longrightarrow [\text{pt}, Y], \quad [x] \longmapsto [f(x)].$$

Fungsi yang sama di antara ruang diskret $D_X \rightarrow D_Y$ otomatis kontinu. Pasangan pemetaan

$$D_X \longrightarrow D_Y, \quad X \xrightarrow{f} Y$$

kompatibel dengan kedua pemetaan ke himpunan komponen, sebab

$$q_Y \circ f = [\text{pt}, f] \circ q_X.$$

Sifat universal pullback kemudian memberi pemetaan kontinu unik

$$\text{slpc}(f): \text{slpc}(X) \longrightarrow \text{slpc}(Y), \quad ([x], x) \longmapsto ([f(x)], f(x)).$$

Rumus ini segera memberi

$$\text{slpc}(\text{id}_X) = \text{id}_{\text{slpc}(X)}$$

dan, bagi $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$,

$$\text{slpc}(g \circ f) = \text{slpc}(g) \circ \text{slpc}(f).$$

Jadi penetapan tersebut functorial. Terakhir, serat proyeksi $p_1: \text{slpc}(X) \rightarrow D_X$ adalah salinan satu komponen lintasan X . Serat itu terbuka karena D_X diskret, dan ia memang terhubung lintasan karena topologinya sama dengan topologi subruang komponen asal. Maka setiap komponen lintasan $\text{slpc}(X)$ terbuka. Dengan karakterisasi SLPC mata kuliah, $\text{slpc}(X)$ bersifat SLPC. $\square$

Menurut konstruksi, proyeksi kedua memberi pemetaan kontinu bijektif

$$\varepsilon_X: \text{slpc}(X) \longrightarrow X, \quad ([x], x) \longmapsto x,$$

yang merupakan identitas pada himpunan yang mendasarinya.

Lema 19.2 (perbandingan dengan ruang asal). Pemetaan

$$\varepsilon_X: \text{slpc}(X) \longrightarrow X$$

merupakan ekuivalensi homotopi lemah. Jika X tidak bersifat SLPC, pemetaan ini bukan ekuivalensi homotopi.

Bukti lengkap kedua pernyataan Lema 19.2 diberikan bersama penguatan “hanya jika” pada Solusi Pemeriksaan 19.4. Jadi klaim ini tidak dibiarkan sebagai kotak hitam. Akibatnya, jika ruang yang ekuivalen secara homotopi lemah tidak hendak dibedakan, bekerja hanya dengan ruang SLPC relatif tidak merugikan.

19.4 Kompleks dan motivasi karakteristik Euler

Ingat karakteristik Euler sebuah poliedron **berhingga** P . Dalam dimensi dua,

$$\chi(P) = \underbrace{\#(\text{simpul})}_{\text{dimensi 0}} - \underbrace{\#(\text{sisi})}_{\text{dimensi 1}} + \underbrace{\#(\text{muka})}_{\text{dimensi 2}}.$$

Poliedron itu tidak harus konveks, terhubung sederhana, atau bahkan terhubung. Bagi poliedron berhingga berdimensi berhingga, rumusnya meluas menjadi

$$\chi(P) = \sum_{d=0}^{\dim P} (-1)^d \#(\text{muka berdimensi } d).$$

Karakteristik Euler tidak bersifat functorial secara langsung, sehingga sukar membandingkan karakteristik Euler poliedron berbeda hanya dari daftar jumlah mukanya. Gagasan kuncinya ialah mengganti jumlah simpul, sisi, dan seterusnya dengan dimensi ruang vektor yang sesuai. Untuk data berhingga, jumlah tersebut dapat dipulihkan sebagai dimensi.

Untuk poliedron tak berhingga, jumlah kardinal berselang-seling tidak dengan sendirinya mendefinisikan karakteristik Euler; diperlukan hipotesis keterhinggaan atau teori konvergensi yang sesuai. Demikian pula, bagi himpunan tak berhingga S , ruang fungsi R^S yang muncul di bawah adalah produk, bukan modul bebas berdukungan hingga, dan dimensinya sebagai ruang vektor tidak harus $|S|$.

Catatan pinggir sumber. Salah satu sumber data tak berhingga ialah triangulasi sebuah permukaan bergenus tak berhingga. Contoh ini memotivasi ruang vektor tak berdimensi hingga, tetapi tidak membenarkan penjumlahan kardinal berselang-seling tanpa syarat tambahan.

Audit sumber 19.4. Notes.tex baris 3789–3793 tidak membatasi formula elementer karakteristik Euler dan rekonstruksi dimensi pada data berhingga, serta salah mengeja “vertex”. Edisi menyatakan hipotesis keterhinggaan dan memisahkan produk fungsi R^S dari modul bebas berdukungan hingga.

Definisi 19.3 (kompleks bergradasi naik). Sebuah *kompleks* $A_\bullet$ dari ruang vektor, grup abelian, atau modul atas R adalah barisan

$$\cdots \longrightarrow A_{n-1} \xrightarrow{d_{n-1}} A_n \xrightarrow{d_n} A_{n+1} \longrightarrow \cdots$$

sedemikian sehingga

$$d_n \circ d_{n-1} = 0 \quad \text{untuk setiap } n.$$

Gradasi sumber bersifat **kohomologis**: diferensial $d_n: A_n \rightarrow A_{n+1}$ menaikkan derajat.

Catatan pinggir sumber. Persamaan $d_n \circ d_{n-1} = 0$ ekuivalen dengan $\text{im}(d_{n-1}) \subseteq \ker(d_n)$.

Contoh 19.6. Setiap barisan eksak, misalnya barisan grup abelian, merupakan kompleks karena pada setiap suku citra diferensial sebelumnya sama dengan kernel diferensial berikutnya, dan khususnya termuat di dalamnya.

Seperti pada barisan eksak, sebuah kompleks dapat mempunyai hanya satu ruas berhingga yang tidak trivial, sedangkan semua suku lain nol. Dalam keadaan itu kita cukup menuliskan ruas yang tidak trivial.

Contoh 19.7 (kompleks yang tidak eksak). Tempatkan tiga suku tak nol pada derajat 0, 1, 2. Barisan

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 4} \mathbb{Z} \xrightarrow{\text{mod } 2} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

adalah kompleks karena reduksi modulo 2 membunuh $4\mathbb{Z}$. Pemetaan kiri injektif dan pemetaan kanan surjektif, tetapi

$$4\mathbb{Z} \subsetneq 2\mathbb{Z};$$

jadi citra pada suku tengah tidak sama dengan kernelnya.

Contoh 19.8 (kompleks matriks). Misalkan A dan B matriks real $n \times n$ dengan $BA = 0$. Maka

$$0 \longrightarrow \mathbb{R}^n \xrightarrow{A} \mathbb{R}^n \xrightarrow{B} \mathbb{R}^n \longrightarrow 0$$

adalah kompleks. Kompleks ini tidak mungkin eksak. Jika eksak, A harus injektif dan B harus surjektif. Karena keduanya endomorfisma ruang vektor berdimensi hingga yang sama, keduanya lalu invertibel, bertentangan dengan $BA = 0$.

Sekarang ambil $U \subset \mathbb{R}^3$ **terbuka**. Tuliskan $C^\infty(U)$ untuk ruang vektor fungsi mulus $U \rightarrow \mathbb{R}$ dan $C^\infty(U, \mathbb{R}^3)$ untuk ruang vektor medan vektor mulus pada U .

Contoh 19.9 (kompleks kalkulus vektor). Operator turunan gradien ∇ , rotor (*curl*) $\nabla \times -$, dan divergensi $\nabla \cdot -$ membentuk kompleks yang dinotasikan $\Omega^\bullet(U)$:

$$C^\infty(U) \xrightarrow{\nabla} C^\infty(U, \mathbb{R}^3) \xrightarrow{\nabla \times -} C^\infty(U, \mathbb{R}^3) \xrightarrow{\nabla \cdot -} C^\infty(U) \longrightarrow 0.$$

Memang, rotor suatu gradien nol dan divergensi suatu rotor nol.

Audit sumber 19.5. Notes.tex baris 3830 menulis $U \subset \mathbb{R}^n$, padahal medan vektor yang ditampilkan bernilai $\mathbb{R}^3$ dan operator rotor serta divergensinya adalah operator tiga dimensi. Edisi mensyaratkan $U \subset \mathbb{R}^3$ terbuka. Salah gabung “acomplex” pada baris 3833 juga diperbaiki.

19.5 Morfisma kompleks

Definisi 19.4 (morfisma kompleks). Sebuah *morfisma kompleks* $f: A_\bullet \rightarrow B_\bullet$ terdiri atas pemetaan yang mempertahankan derajat

$$f_n: A_n \longrightarrow B_n$$

untuk setiap n , sedemikian sehingga **setiap** persegi pada Diagram 19.3 komutatif.

Diagram 19.3 (persegi morfisma kompleks). Objek dan panah lengkapnya adalah

$$\begin{array}{ccc} A_{n-1} & \xrightarrow{d_{n-1}^A} & A_n \\ f_{n-1} \downarrow & & \downarrow f_n \\ B_{n-1} & \xrightarrow{d_{n-1}^B} & B_n. \end{array}$$

Panah mendatar atas berjalan dari A_{n-1} ke A_n , panah mendatar bawah dari B_{n-1} ke B_n , dan kedua panah vertikal masing-masing ialah f_{n-1} serta f_n . Komutativitas berarti

$$f_n \circ d_{n-1}^A = d_{n-1}^B \circ f_{n-1}.$$

Kategori kompleks modul atas R dan morfisma kompleks dinotasikan $\mathbf{Cplx}_R$.

Catatan pinggir sumber. Sumber mengatakan bahwa pemetaan ini kadang disebut *chain map*. Karena diferensial yang ditampilkan menaikkan derajat, $d_n: A_n \rightarrow A_{n+1}$, edisi memakai istilah netral **morfisma kompleks**; dalam konvensi yang membedakan gradasi, istilah *cochain map* juga lazim. Arah panah tidak dibalik.

Audit sumber 19.6. Definisi pada Notes.tex baris 3840–3851 berhenti secara sintaksis setelah kata “all the squares” tanpa mengatakan apa yang harus dipenuhi. Edisi melengkapinya dengan syarat bahwa setiap persegi komutatif dan menuliskan persamaan komutativitasnya.

Contoh 19.10 (morfisma dari kompleks matriks). Untuk matriks A, B pada Contoh 19.8, syarat $BA = 0$ membuat pemetaan

$$\overline{B}: \mathbb{R}^n / \text{im}(A) \longrightarrow \mathbb{R}^n, \quad \overline{B}([x]) = Bx$$

terdefinisi baik. Data berikut membentuk morfisma kompleks.

Diagram 19.4 (padanan semantik diagram matriks enam kolom). Kompleks atas, dari kiri ke kanan, adalah

$$0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \mathbb{R}^n \xrightarrow{A} \mathbb{R}^n \xrightarrow{B} \mathbb{R}^n \longrightarrow 0,$$

sedangkan kompleks bawah, dengan posisi kolom yang sama, adalah

$$0 \longrightarrow \ker(A) \longrightarrow 0 \longrightarrow \mathbb{R}^n / \text{im}(A) \xrightarrow{\bar{B}} \mathbb{R}^n \longrightarrow 0.$$

Peta vertikal yang mempertahankan setiap posisi adalah sebagai berikut.

Posisi	Objek atas	Peta vertikal	Objek bawah
1	0	id_0	0
2	0	peta nol $0 \rightarrow \ker(A)$	$\ker(A)$
3	$\mathbb{R}^n$	peta nol $\mathbb{R}^n \rightarrow 0$	0
4	$\mathbb{R}^n$	peta hasil bagi q	$\mathbb{R}^n / \text{im}(A)$
5	$\mathbb{R}^n$	$\text{id}_{\mathbb{R}^n}$	$\mathbb{R}^n$
6	0	id_0	0

Dengan demikian hubungan vertikal tidak dikodekan hanya oleh posisi. Semua panah mendatar yang tidak berlabel adalah peta nol yang ditentukan oleh sumber atau targetnya, kecuali peta bawah $\bar{B}$ yang telah diberi label.

Persegi pada A komutatif karena $qA = 0$. Persegi pada B komutatif karena

$$\bar{B}q = B.$$

Semua persegi lain mempunyai kedua komposit nol atau identitas pada objek nol. Jadi setiap persegi benar-benar komutatif.

Audit sumber 19.7. Notes.tex baris 3853 kehilangan artikel dalam “There is map”, dan diagramnya tidak memberi label pada peta-peta vertikal ataupun peta terinduksi di baris bawah. Diagram 19.4 menyebutkan peta nol, hasil bagi, identitas, serta $\bar{B}$ dan memeriksa semua persegi.

Contoh 19.11 (pembatasan operator diferensial). Untuk setiap himpunan terbuka $U \subset \mathbb{R}^3$, pembatasan fungsi dan medan vektor memberi morfisma kompleks

$$\Omega^\bullet(\mathbb{R}^3) \longrightarrow \Omega^\bullet(U).$$

Diagram 19.5 (padanan semantik diagram pembatasan). Kompleks sumbernya adalah

$$C^\infty(\mathbb{R}^3) \xrightarrow{\nabla} C^\infty(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3) \xrightarrow{\nabla \times -} C^\infty(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3) \xrightarrow{\nabla \cdot -} C^\infty(\mathbb{R}^3) \longrightarrow 0,$$

dan kompleks targetnya adalah

$$C^\infty(U) \xrightarrow{\nabla} C^\infty(U, \mathbb{R}^3) \xrightarrow{\nabla \times -} C^\infty(U, \mathbb{R}^3) \xrightarrow{\nabla \cdot -} C^\infty(U) \longrightarrow 0.$$

Hubungan vertikal pada lima posisi, dari sumber ke target, ialah

Posisi	Peta vertikal dari baris $\mathbb{R}^3$ ke baris U
1	pembatasan fungsi $\rho_0(f) = f _U$
2	pembatasan medan vektor $\rho_1(\mathbf{v}) = \mathbf{v} _U$
3	pembatasan medan vektor $\rho_2(\mathbf{v}) = \mathbf{v} _U$
4	pembatasan fungsi $\rho_3(f) = f _U$
5	satu-satunya peta $0 \rightarrow 0$, yakni id_0

Setiap peta mendatar menuju ke kanan. Setiap peta vertikal menuju dari data global pada $\mathbb{R}^3$ ke pembatasannya pada U .

Operator diferensial bersifat lokal, sehingga pembatasan berkomutasi dengan gradien, rotor, dan divergensi. Dengan demikian keempat persegi pada Diagram 19.5 komutatif.

19.6 Keeksakan kalkulus vektor dan informasi topologis

Kompleks **tak teraugmentasi** $\Omega^\bullet(\mathbb{R}^3)$ pada Contoh 19.9 tidak eksak pada suku pertama $C^\infty(\mathbb{R}^3)$, sebab kernel gradien adalah fungsi-fungsi konstan. Ia eksak pada derajat positif. Secara ekuivalen, kompleks yang diaugmentasi

$$0 \longrightarrow \mathbb{R} \xrightarrow{c} C^\infty(\mathbb{R}^3) \xrightarrow{\nabla} C^\infty(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3) \xrightarrow{\nabla \times -} C^\infty(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3) \xrightarrow{\nabla \cdot -} C^\infty(\mathbb{R}^3) \longrightarrow 0,$$

dengan $c(r)$ fungsi konstan bernilai r , adalah eksak.

Catatan pinggir sumber. Keeksakan ini mengikuti Lema Poincaré, atau secara lebih elementer dari hasil standar kalkulus multivariabel.

Lema Poincaré global pada $\mathbb{R}^3$ dipakai di sini sebagai hasil analitik eksternal: medan vektor berotor nol adalah gradien, medan vektor berdivergensi nol adalah rotor, dan setiap fungsi mulus adalah divergensi suatu medan vektor mulus. Kontraktilitas $\mathbb{R}^3$ menjelaskan mengapa tidak ada obstruksi topologis pada derajat positif.

Untuk

$$U = \mathbb{R}^3 \setminus \{0\},$$

keadaan berbeda. Sebagai contoh konkret,

$$\mathbf{v}(x) = \frac{x}{\|x\|^3}$$

berdivergensi nol pada U , tetapi bukan rotor medan vektor global pada U : fluksnya melalui sfera satuan adalah 4π , sedangkan fluks rotor melalui permukaan tertutup harus nol. Ruang U ekuivalen secara homotopi dengan S^2 . Kohomologi de Rham $H_{\text{dR}}^2(U; \mathbb{R}) \cong \mathbb{R}$ mengukur kegagalan

$$\ker(\nabla \cdot -) = \text{im}(\nabla \times -).$$

Grup $\pi_2(S^2) \cong \mathbb{Z}$ juga mendeteksi topologi sfera, tetapi kedua objek itu **bukan invarian yang sama**: yang pertama adalah ruang vektor kohomologi real, sedangkan yang kedua adalah grup homotopi integral. Perbandingannya hanya kualitatif.

Demikian pula, ambil

$$U = \mathbb{R}^3 \setminus \ell,$$

dengan $\ell \subset \mathbb{R}^3$ subruang berdimensi satu.

Catatan pinggir sumber. Contoh pilihan ℓ ialah sumbu z .

Ruang ini ekuivalen secara homotopi dengan S^1 . Untuk sumbu z , medan vektor

$$\mathbf{w}(x, y, z) = \left(-\frac{y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2}, 0 \right)$$

mempunyai rotor nol pada U , tetapi bukan gradien fungsi global: integral garisnya mengelilingi lingkaran satuan adalah 2π , sedangkan integral garis gradien pada loop tertutup selalu nol. Jadi

$$\ker(\nabla \times -) \neq \operatorname{im}(\nabla).$$

Pada akhirnya, bukan ukuran ruang vektornya yang membawa informasi penting. Ruang-ruang fungsi dalam $\Omega^\bullet(\mathbb{R}^3)$ sangat besar dan berdimensi tak hingga, sedangkan $\mathbb{R}^3$ sendiri tidak menarik secara homotopis. Kompleks de Rham analog pada $\mathbb{R}^n$ juga mempunyai fenomena yang sama, dengan bentuk diferensial pada semua derajat sebagai pengganti notasi gradien–rotor–divergensi khusus dimensi tiga.

Catatan pinggir sumber. Kernel gradien terdiri tepat atas fungsi konstan dan karenanya isomorfik dengan $\mathbb{R}$. Ruang vektor satu dimensi itu sejalan dengan fakta bahwa himpunan komponen lintasan $[\text{pt}, \mathbb{R}^3] = *$; pernyataan ini tidak menyamakan kedua jenis invarian.

Audit sumber 19.8. Notes.tex baris 3874 menyebut kompleks tak teraugmentasi eksak, padahal fungsi konstan membentuk kernel gradien. Edisi menyatakan keeksakan positif dan menampilkan augmentasi $\mathbb{R} \hookrightarrow C^\infty(\mathbb{R}^3)$. Baris 3880–3886 kini membedakan kohomologi de Rham real dari $\pi_2(S^2)$, dan frasa salah “the image gradient” pada baris 3892 diperbaiki menjadi citra gradien.

19.7 Graf berarah dan kompleksnya

Kita beralih ke contoh yang jauh lebih kecil untuk menghangatkan aljabar yang akan muncul.

Definisi 19.5 (graf berarah sederhana). Sebuah *graf berarah sederhana* terdiri atas himpunan simpul V , himpunan sisi E , dan dua fungsi

$$d_0, d_1: E \longrightarrow V$$

sedemikian sehingga

$$(d_0, d_1): E \longrightarrow V \times V$$

injektif dan

$$\operatorname{im}(d_0, d_1) \cap \Delta(V) = \emptyset.$$

Catatan pinggir sumber. Di sini $\Delta(V) = \{(v, v) : v \in V\} \subseteq V^2$ adalah diagonal.

Konvensi arah sumber adalah sebagai berikut: sebuah sisi e menunjuk dari **sumber** $d_1(e)$ ke **target** $d_0(e)$. Syarat diagonal melarang loop dari sebuah simpul ke dirinya sendiri. Injektivitas (d_0, d_1) mengizinkan paling banyak satu sisi bagi setiap **pasangan terurut** target–sumber. Namun, ia masih mengizinkan dua sisi dengan arah berlawanan di antara dua simpul yang sama, sebab pasangan terurutnya berbeda.

Audit sumber 19.9. Notes.tex baris 3910 mengatakan secara terlalu luas bahwa tidak ada lebih dari satu sisi “di antara” dua simpul. Definisi hanya melarang pengulangan pasangan terurut (d_0, d_1) ; dua sisi berlawanan arah tetap diizinkan. Edisi juga mengulang konvensi $d_1(e) \rightarrow d_0(e)$ dalam kata-kata agar orientasi tidak bergantung pada kepala panah.

Contoh 19.12 (segitiga berarah). Ambil

$$V = \{A, B, C\}, \quad E = \{a, b, c\}.$$

Catatan pinggir sumber. Sumber menempatkan gambar TikZ segitiga di margin. Diagram itu dipindahkan ke Diagram 19.6 dan diuraikan sebagai tabel sumber–target sehingga arah tidak disampaikan hanya secara visual.

Diagram 19.6 (deskripsi semantik segitiga berarah). Ketiga sisi dan arahnya ialah

Sisi	Sumber d_1	Target d_0	Panah berlabel
a	A	B	$a: A \rightarrow B$
b	B	C	$b: B \rightarrow C$
c	A	C	$c: A \rightarrow C$

Jadi a berjalan dari A ke B , b dari B ke C , dan c langsung dari A ke C . Daftar ini memuat seluruh simpul, sisi, label, dan arah gambar sumber tanpa memakai warna atau posisi sebagai kode.

Dengan sengaja menuliskan pasangan dalam urutan sumber–target, datanya adalah

$$(d_1, d_0): \begin{cases} a \mapsto (A, B), \\ b \mapsto (B, C), \\ c \mapsto (A, C). \end{cases}$$

Graf ini dinotasikan $\partial\Delta[2]$, untuk alasan yang akan menjadi lebih jelas kemudian. Perhatikan bahwa definisi kesederhanaan menguji injektivitas (d_0, d_1) , sedangkan tampilan contoh memilih urutan (d_1, d_0) agar terbaca sebagai sumber lalu target.

Untuk membentuk kompleks dari graf berarah sederhana, bagi himpunan S dan gelanggang R tuliskan

$$R^S = \{f : S \rightarrow R\},$$

modul semua fungsi dengan operasi titik demi titik.

Catatan pinggir sumber. Untuk $R = \mathbb{Z}$, modul R^S adalah produk $\prod_{s \in S} \mathbb{Z}$; untuk R medan, ia adalah ruang semua fungsi $S \rightarrow R$. Bila S berhingga, produk ini sama dengan jumlah langsung dan dimensinya $|S|$. Bila S tak berhingga, ia bukan modul bebas berdukungan hingga $R^{(S)}$, dan dimensi ruang vektornya tidak harus $|S|$.

Definisi berikut memakai $R = \mathbb{Z}$, tetapi rumus yang sama berlaku bagi gelanggang umum.

Definisi 19.6 (kompleks graf). Untuk graf berarah sederhana $d_0, d_1 : E \rightrightarrows V$, definisikan kompleks

$$\begin{aligned} 0 &\longrightarrow \mathbb{Z}^V \xrightarrow{\delta} \mathbb{Z}^E \longrightarrow 0, \\ &f \longmapsto f \circ d_0 - f \circ d_1. \end{aligned}$$

Jadi bagi sisi e yang berarah dari $d_1(e)$ ke $d_0(e)$,

$$\delta(f)(e) = f(d_0(e)) - f(d_1(e)),$$

yakni nilai pada target dikurangi nilai pada sumber. Kompleks ini ditempatkan pada derajat 0 dan 1, sesuai gradasi kohomologis yang menaikkan derajat.

Pendamping penguasaan: pemeriksaan, petunjuk, dan solusi lengkap

Enam pemeriksaan berikut, keenam petunjuknya, dan keenam solusi lengkapnya merupakan materi asli edisi. Semuanya terbatas pada sasaran beku Unit 19: ruang homogen dan seratnya, perhitungan barisan eksak grup ortogonal, ekuivalensi lemah kurva sinus topolog, penggantian SLPC, kohomologi kompleks dan morfisma matriks, serta kobatas segitiga berarah. Tidak ada pemeriksaan yang memakai materi Kuliah 20.

Pemeriksaan penguasaan 19.1 (bundel ruang homogen). Untuk $n \geq 1$:

1. Tunjukkan bahwa aksi standar $SO(n+1)$ pada $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ transitif dan bahwa stabilisator e_{n+1} adalah salinan blok $SO(n)$.
2. Tunjukkan bahwa aksi standar $SU(n+1)$ pada $S^{2n+1} \subset \mathbb{C}^{n+1}$ transitif dan bahwa stabilisator e_{n+1} adalah salinan blok $SU(n)$.
3. Turunkan identifikasi $SO(n+1)/SO(n) \cong S^n$ dan $SU(n+1)/SU(n) \cong S^{2n+1}$, lalu jelaskan serat setiap pemetaan hasil bagi menurut konvensi aksi kanan.

Petunjuk. Lengkapi sebuah vektor satuan menjadi basis ortonormal atau uniter. Dalam kasus uniter, sesuaikan determinan pada salah satu vektor basis yang bukan e_{n+1} . Untuk serat, bandingkan dua unsur g, g' yang mempunyai citra sama pada vektor terakhir.

Solusi Pemeriksaan 19.1. Pertama, $SO(n+1)$ bertindak pada S^n melalui

$$g \cdot v = gv.$$

Untuk $v \in S^n$, lengkapi v menjadi basis ortonormal terorientasi

$$(v_1, \dots, v_n, v)$$

dari $\mathbb{R}^{n+1}$. Matriks yang kolom-kolomnya basis ini berada dalam $SO(n+1)$ dan mengirim e_{n+1} ke v . Jadi aksinya transitif.

Jika $g \in SO(n+1)$ menetapkan e_{n+1} , maka komplemen ortogonal $e_{n+1}^\perp$ dipertahankan. Pembatasan g pada komplemen itu adalah matriks $A \in O(n)$, dan

$$1 = \det(g) = \det(A),$$

sehingga $A \in SO(n)$. Sebaliknya, setiap $A \in SO(n)$ memberi $\text{diag}(A, 1) \in SO(n+1)$ yang menetapkan e_{n+1} . Maka stabilisatornya tepat salinan blok $SO(n)$.

Untuk kasus kompleks, $SU(n+1)$ bertindak pada sfera satuan $S^{2n+1} \subset \mathbb{C}^{n+1}$. Ambil v pada sfera itu dan pilih $T \in U(n+1)$ dengan $Te_{n+1} = v$. Karena $n \geq 1$, ada koordinat basis yang berbeda dari koordinat terakhir. Kalikan T di kanan dengan matriks diagonal D yang menetapkan e_{n+1} dan mempunyai

$$\det(D) = \det(T)^{-1}.$$

Maka $TD \in SU(n+1)$ dan tetap mengirim e_{n+1} ke v . Jadi aksi $SU(n+1)$ transitif. Unsur $g \in SU(n+1)$ yang menetapkan e_{n+1} mempunyai bentuk blok $\text{diag}(A, 1)$ dengan $A \in U(n)$; syarat $\det g = 1$ memberi $\det A = 1$, jadi $A \in SU(n)$. Kebalikannya langsung, maka stabilisatornya $SU(n)$.

Untuk kedua kasus, tuliskan G bagi grup besar, H bagi stabilisator, dan $v_0 = e_{n+1}$. Pemetaan orbit

$$\Phi: G/H \longrightarrow G \cdot v_0, \quad gH \longmapsto gv_0$$

terdefinisi baik: jika $g' = gh$ dengan $h \in H$, maka $g'v_0 = ghv_0 = gv_0$. Jika $gv_0 = g'v_0$, maka $g^{-1}g'$ menetapkan v_0 , jadi $g^{-1}g' \in H$ dan $gH = g'H$. Transitivitas memberi surjektivitas. Pemetaan orbit $o: G \rightarrow G \cdot v_0$, $o(g) = gv_0$, kontinu dan konstan pada setiap orbit kanan H , sehingga sifat universal topologi hasil bagi memberi kontinuitas Φ . Dalam kedua kasus, $G = SO(n+1)$ atau $SU(n+1)$ kompak, maka hasil baginya G/H kompak; sfera sasaran bersifat Hausdorff. Karena itu bijeksi kontinu Φ adalah homeomorfisma. Jadi

$$SO(n+1)/SO(n) \cong S^n, \quad SU(n+1)/SU(n) \cong S^{2n+1}.$$

Serat pemetaan $G \rightarrow G/H$ di atas gH adalah orbit gH , yaitu koset kiri gH . Aksi kanan

$$gH \times H \longrightarrow gH, \quad (gh_1, h_2) \longmapsto gh_1h_2$$

bebas dan transitif, jadi serat sebuah torsor- H . Pilihan g menghasilkan homeomorfisma $H \rightarrow gH$, $h \mapsto gh$, tetapi pilihan gh_0 akan mengubah koordinat itu. Dengan demikian serat hanya nonkanonik homeomorfik dengan H .

Pemeriksaan penguasaan 19.2 (perhitungan barisan eksak ortogonal). Pakai bundel

$$SO(n) \longrightarrow SO(n+1) \longrightarrow S^n$$

dan fakta $\pi_1(SO(3)) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ untuk:

1. menurunkan $\pi_1(SO(n)) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ bagi semua $n \geq 3$;
2. membuktikan $\pi_2(SO(3)) = 0$ dari kasus $n = 2$;
3. menjelaskan mengapa peta penghubung $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ hanya merupakan perkalian dengan ± 2 sebelum generator dan orientasi dipilih secara serasi.

Petunjuk. Untuk $n \geq 3$, apit pemetaan pada π_1 di antara $\pi_2(S^n) = 0$ dan $\pi_1(S^n) = 0$. Untuk $n = 2$, kernel surjeksi $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2$ adalah $2\mathbb{Z}$. Lalu gunakan satu suku lebih ke kiri dan fakta $\pi_2(SO(2)) = 0$.

Solusi Pemeriksaan 19.2. Bagi $n \geq 3$, barisan eksak panjang memuat

$$0 = \pi_2(S^n) \longrightarrow \pi_1(SO(n)) \xrightarrow{i_*} \pi_1(SO(n+1)) \longrightarrow \pi_1(S^n) = 0.$$

Keeksakan membuat i_* injektif dari nol di kiri dan surjektif dari nol di kanan, jadi i_* isomorfisma. Mulai dengan

$$\pi_1(SO(3)) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

dan terapkan isomorfisma tersebut berturut-turut untuk $n = 3, 4, \dots$. Diperoleh

$$\pi_1(SO(n)) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \quad (n \geq 3).$$

Untuk $n = 2$, gunakan $SO(2) \cong S^1$ dan bagian eksak

$$\pi_2(SO(3)) \xrightarrow{\pi_*} \mathbb{Z} \xrightarrow{\delta} \mathbb{Z} \xrightarrow{i_*} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

Pemetaan i_* surjektif. Setiap surjeksi dari grup siklik tak hingga ke grup siklik orde dua mempunyai kernel $2\mathbb{Z}$, sehingga

$$\text{im } \delta = \ker i_* = 2\mathbb{Z}.$$

Homomorfisma $\delta: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ ditentukan oleh citra satu generator. Agar citranya tepat $2\mathbb{Z}$, generator itu harus dikirim ke 2 atau -2 kali generator target. Karena itu

$$\delta = \times(\pm 2).$$

Mengganti generator pada salah satu salinan $\mathbb{Z}$ membalik tanda; pilihan orientasi pada sfera dan lingkaran juga menentukan generator. Hanya setelah pilihan tersebut dibuat serasi kita boleh menulis $+2$.

Pemetaan δ injektif, jadi $\ker \delta = 0$. Keeksakan pada salinan $\mathbb{Z} = \pi_2(S^2)$ memberi $\text{im } \pi_* = 0$, sehingga π_* adalah peta nol. Sekarang sertakan suku sebelumnya:

$$\pi_2(SO(2)) \xrightarrow{i_*} \pi_2(SO(3)) \xrightarrow{0} \mathbb{Z}.$$

Karena $SO(2) \cong S^1$, $\pi_2(SO(2)) = 0$, maka $\text{im } i_* = 0$. Di sisi lain, keeksakan pada $\pi_2(SO(3))$ memberi

$$\text{im } i_* = \ker(0) = \pi_2(SO(3)).$$

Jadi $\pi_2(SO(3)) = 0$.

Pemeriksaan penguasaan 19.3 (lemah tidak berarti ekuivalen homotopi). Untuk kurva sinus topolog

$$C = \left\{ \left(x, \sin \frac{1}{x} \right) : 0 < x \leq \frac{1}{\pi} \right\} \cup (\{0\} \times [-1, 1]),$$

pilih satu titik pada masing-masing komponen lintasan dan definisikan $j: \{a, b\}_{\text{disc}} \rightarrow C$. Verifikasi langsung dari Definisi 19.1 bahwa j ekuivalensi homotopi lemah. Kemudian buktikan bahwa j tidak mungkin merupakan ekuivalensi homotopi.

Petunjuk. Proyeksi pada koordinat x mengidentifikasi komponen berosilasi dengan $(0, 1/\pi]$, sedangkan komponen limit adalah sebuah interval. Untuk penolakan ekuivalensi homotopi, gunakan bahwa C terhubung tetapi ruang dua titik diskret tidak, lalu amati bentuk homotopi di ruang diskret.

Solusi Pemeriksaan 19.3. Tuliskan

$$\Gamma = \left\{ \left(x, \sin \frac{1}{x} \right) : 0 < x \leq \frac{1}{\pi} \right\}, \quad L = \{0\} \times [-1, 1].$$

Kedua himpunan ini adalah komponen lintasan C . Proyeksi $(x, \sin(1/x)) \mapsto x$ adalah homeomorfisma $\Gamma \cong (0, 1/\pi]$, dan $L \cong [-1, 1]$. Keduanya kontraktif, sehingga grup fundamental dan semua grup homotopi lebih tingginya trivial.

Pemetaan j memilih satu objek pada masing-masing dari dua komponen. Ia bijektif pada himpunan komponen lintasan. Grupoid fundamental C tidak mempunyai morfisma di antara kedua komponen; di dalam masing-masing komponen, hanya ada satu kelas homotopi lintasan di antara setiap dua titik karena komponen itu kontraktif. Karena itu fungtor

$$\Pi_1(\{a, b\}) \longrightarrow \Pi_1(C)$$

sepenuhnya setia dan surjektif esensial, jadi suatu ekuivalensi grupoid. Untuk setiap titik basis yang dipilih dan $n > 1$, pemetaan terinduksi adalah isomorfisma dari grup trivial ke grup trivial. Maka j ekuivalensi homotopi lemah.

Sekarang Γ terhubung dan $C = \bar{\Gamma}$, sehingga C terhubung. Andaikan j mempunyai invers homotopi $r: C \rightarrow \{a, b\}$. Citra ruang terhubung oleh peta kontinu terhubung, sedangkan satu-satunya subruang terhubung dari ruang dua titik diskret adalah satu titik. Jadi r konstan dan rj juga konstan.

Setiap homotopi

$$H: \{a, b\} \times I \longrightarrow \{a, b\}$$

menetapkan citra setiap titik sepanjang suatu lintasan dalam ruang diskret; lintasan itu harus konstan. Karena itu dua pemetaan ruang dua titik diskret homotopik hanya jika keduanya sama. Pemetaan konstan rj tidak sama dengan $\text{id}_{\{a, b\}}$, sehingga tidak dapat homotopik dengannya. Ini bertentangan dengan syarat invers homotopi. Jadi j bukan ekuivalensi homotopi.

Pemeriksaan penguasaan 19.4 (penggantian SLPC). Diberikan pemetaan $f: X \rightarrow Y$:

1. bangun $\text{slpc}(f)$ dan buktikan hukum identitas serta komposisi;
2. buktikan bahwa $\text{slpc}(X)$ bersifat SLPC;
3. buktikan bahwa $\varepsilon_X: \text{slpc}(X) \rightarrow X$ merupakan ekuivalensi homotopi lemah;
4. buktikan bahwa jika ε_X merupakan ekuivalensi homotopi, maka setiap komponen lintasan X terbuka. Tunjukkan pula bahwa bila semua komponen lintasan terbuka, ε_X sebenarnya homeomorfisma.

Petunjuk. Gunakan fungsi $[x] \mapsto [f(x)]$ di antara diskretisasi himpunan komponen. Semua lintasan, sfera bertitik, dan homotopi berparameter terletak di dalam satu komponen lintasan. Untuk syarat perlu, komposisikan calon invers homotopi dengan proyeksi $\text{slpc}(X) \rightarrow \text{disc}[\text{pt}, X]$.

Solusi Pemeriksaan 19.4. Tuliskan

$$D_X = \text{disc}[\text{pt}, X], \quad D_Y = \text{disc}[\text{pt}, Y].$$

Pemetaan kontinu f membawa lintasan ke lintasan, maka menentukan fungsi

$$D(f): D_X \longrightarrow D_Y, \quad [x] \longmapsto [f(x)].$$

Fungsi ini kontinu karena domain dan target diskret. Fungsi pada ruang komponen dengan topologi hasil bagi juga kontinu: persamaan

$$q_Y f = [\text{pt}, f] q_X$$

dan sifat hasil bagi q_X membuktikannya. Pasangan $D(f)$ dan f kompatibel dengan pemetaan ke $[\text{pt}, Y]$, sehingga sifat universal pullback memberi

$$\text{slpc}(f)([x], x) = ([f(x)], f(x)).$$

Untuk identitas,

$$\text{slpc}(\text{id}_X)([x], x) = ([x], x).$$

Untuk $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$, kedua ruas persamaan funktor mengirim $([x], x)$ ke $([g(f(x))], g(f(x)))$. Karena itu

$$\text{slpc}(g \circ f) = \text{slpc}(g) \circ \text{slpc}(f).$$

Selanjutnya, proyeksi

$$p_1: \text{slpc}(X) \longrightarrow D_X$$

mempunyai serat

$$p_1^{-1}([x]) = \{([x], y) : y \in [x]\}.$$

Serat ini homeomorfik dengan komponen lintasan $[x] \subseteq X$, sebab pembatasan p_2 adalah homeomorfisma ke subruang tersebut. Jadi seratnya terhubung lintasan. Karena D_X diskret, setiap serat juga terbuka. Serat-serat ini tepat komponen lintasan $\text{slpc}(X)$, maka semua komponen lintasannya terbuka dan ruang itu SLPC menurut konvensi mata kuliah.

Pemetaan $\varepsilon_X = p_2$ adalah identitas pada himpunan yang mendasarinya dan membatasi pada homeomorfisma di setiap komponen lintasan. Setiap lintasan di X tinggal di satu komponen, sehingga dapat dipandang secara unik sebagai lintasan di $\text{slpc}(X)$; hal yang sama berlaku bagi homotopi lintasan. Dengan demikian

$$\Pi_1(\text{slpc}(X)) \longrightarrow \Pi_1(X)$$

bahkan merupakan isomorfisma grupoid setelah objek-objek diidentifikasi. Untuk $n > 1$, citra setiap pemetaan bertitik $S^n \rightarrow X$ berada di komponen lintasan titik basis karena S^n terhubung lintasan. Citra setiap homotopi $S^n \times I \rightarrow X$ juga berada di komponen itu. Homeomorfisma per komponen kemudian memberi isomorfisma

$$\pi_n(\text{slpc}(X), x) \xrightarrow{\cong} \pi_n(X, x)$$

untuk semua $n > 1$. Jadi ε_X ekuivalensi homotopi lemah.

Terakhir, andaikan ε_X ekuivalensi homotopi dan pilih invers homotopi

$$r: X \longrightarrow \text{slpc}(X).$$

Cukup gunakan salah satu homotopinya, $H: \varepsilon_X r \simeq \text{id}_X$. Komposit

$$p_1 r: X \longrightarrow D_X$$

kontinu. Bagi setiap $x \in X$, lintasan $t \mapsto H(x, t)$ menghubungkan $\varepsilon_X r(x)$ dengan x . Jadi keduanya berada pada komponen lintasan yang sama dan

$$p_1 r(x) = [x].$$

Dengan demikian $p_1 r$ adalah fungsi komponen $X \rightarrow D_X$. Karena fungsi ini kontinu dan D_X diskret, setiap seratnya

$$(p_1 r)^{-1}(\{[x]\}) = [x]$$

terbuka. Jadi setiap komponen lintasan X terbuka, yakni X SLPC.

Sebaliknya, jika semua komponen lintasan X terbuka, fungsi $X \rightarrow D_X$, $x \mapsto [x]$, kontinu. Maka

$$s: X \longrightarrow \text{slpc}(X), \quad x \longmapsto ([x], x)$$

kontinu dan merupakan invers dua sisi ε_X . Jadi ε_X homeomorfisma. Secara ringkas,

$$\varepsilon_X \text{ ekuivalensi homotopi} \implies X \text{ SLPC} \implies \varepsilon_X \text{ homeomorfisma.}$$

Pemeriksaan penguasaan 19.5 (kohomologi dan morfisma kompleks). Tempatkan kompleks

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 4} \mathbb{Z} \xrightarrow{\text{mod } 2} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

pada derajat 0, 1, 2. Dengan

$$H^k(A_\bullet) = \ker(d_k) / \text{im}(d_{k-1}),$$

hitung H^k untuk setiap k . Kemudian, untuk $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ dengan $BA = 0$, sebutkan semua peta yang tidak diberi label dalam diagram morfisma matriks sumber, bangun $\overline{B}$, dan verifikasi setiap persegi komutatif.

Petunjuk. Kernel reduksi modulo 2 adalah $2\mathbb{Z}$, sedangkan citra perkalian dengan 4 adalah $4\mathbb{Z}$. Dalam diagram matriks, gunakan peta nol, proyeksi hasil bagi q , identitas, dan persamaan $\overline{B}q = B$.

Solusi Pemeriksaan 19.5. Tuliskan diferensialnya sebagai

$$d_0 = \times 4, \quad d_1 = \text{mod } 2, \quad d_2 = 0,$$

dengan semua suku di luar derajat 0, 1, 2 nol. Karena perkalian dengan 4 pada $\mathbb{Z}$ injektif,

$$H^0 = \ker(d_0) / \text{im}(d_{-1}) = 0/0 = 0.$$

Pada derajat 1,

$$\ker(d_1) = 2\mathbb{Z}, \quad \text{im}(d_0) = 4\mathbb{Z},$$

sehingga

$$H^1 = 2\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

Pemetaan d_1 surjektif, maka

$$H^2 = \ker(d_2) / \text{im}(d_1) = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) / (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) = 0.$$

Semua H^k lain nol karena suku kompleksnya nol. Jadi satu-satunya kohomologi tak trivial ialah

$$H^1 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

Sekarang pandang diagram matriks. Dari kiri ke kanan, enam peta vertikalnya adalah

$$\text{id}_0, \quad 0: 0 \rightarrow \ker(A), \quad 0: \mathbb{R}^n \rightarrow 0, \quad q: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n / \text{im}(A), \quad \text{id}_{\mathbb{R}^n}, \quad \text{id}_0.$$

Peta mendatar bawah yang substantif adalah

$$\overline{B}: \mathbb{R}^n / \text{im}(A) \longrightarrow \mathbb{R}^n, \quad \overline{B}([x]) = Bx.$$

Jika $[x] = [x']$, maka $x' - x = Ay$ untuk suatu y , sehingga

$$Bx' - Bx = BAy = 0.$$

Jadi $\overline{B}$ terdefinisi baik dan memenuhi $\overline{B}q = B$. Sekarang periksa persegi-perseginya berurutan:

1. di antara dua kolom pertama, kedua komposit adalah peta nol $0 \rightarrow \ker(A)$;
2. di antara kolom kedua dan ketiga, kedua komposit adalah peta nol $0 \rightarrow 0$;
3. pada panah A , rute atas lalu turun adalah $qA = 0$ karena $\text{im}(A)$ dibunuh oleh q , sama dengan rute turun lalu mendatar melalui objek nol;
4. pada panah B , rute atas lalu identitas adalah B , sedangkan rute turun lalu mendatar adalah $\overline{B}q = B$;
5. pada panah terakhir ke nol, kedua komposit adalah peta nol $\mathbb{R}^n \rightarrow 0$.

Maka setiap persegi komutatif, dan keluarga peta vertikal itu benar-benar morfisma kompleks.

Pemeriksaan penguasaan 19.6 (kobatas segitiga berarah). Untuk segitiga Contoh 19.12, gunakan basis terurut (A, B, C) bagi $\mathbb{Z}^V$ dan (a, b, c) bagi $\mathbb{Z}^E$.

1. Tuliskan matriks $\delta: \mathbb{Z}^V \rightarrow \mathbb{Z}^E$.
2. Jelaskan tanda setiap baris memakai konvensi $d_1(e) \rightarrow d_0(e)$ dan $\delta f(e) = f(d_0(e)) - f(d_1(e))$.
3. Hitung $\ker \delta$ dan coker δ .

Petunjuk. Evaluasi δf pada a, b, c secara berurutan. Untuk kokernel, gambarkan citra sebagai semua $(x, y, z) \in \mathbb{Z}^3$ yang memenuhi satu relasi primitif dan gunakan homomorfisma ke $\mathbb{Z}$ yang mengukur kegagalan relasi itu.

Solusi Pemeriksaan 19.6. Tuliskan nilai fungsi simpul sebagai vektor

$$(f_A, f_B, f_C)^T.$$

Karena a berarah dari $A = d_1(a)$ ke $B = d_0(a)$,

$$\delta f(a) = f_B - f_A.$$

Serupa, b berarah dari B ke C dan c dari A ke C , sehingga

$$\delta f(b) = f_C - f_B, \quad \delta f(c) = f_C - f_A.$$

Dalam basis yang diminta,

$$[\delta]_{(a,b,c) \leftarrow (A,B,C)} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Tanda -1 selalu berada pada simpul sumber $d_1(e)$ dan tanda $+1$ pada simpul target $d_0(e)$. Jadi matriks ini menerapkan “target dikurangi sumber”, bukan kebalikannya.

Jika $\delta f = 0$, dua baris pertama memberi

$$f_B = f_A, \quad f_C = f_B.$$

Baris ketiga lalu otomatis nol. Jadi

$$\ker \delta = \{(t, t, t) : t \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}(1, 1, 1) \cong \mathbb{Z}.$$

Untuk citra, jika

$$\delta f = (x, y, z),$$

maka

$$z = f_C - f_A = (f_B - f_A) + (f_C - f_B) = x + y.$$

Sebaliknya, bagi setiap $(x, y, x + y)$, pilih

$$(f_A, f_B, f_C) = (0, x, x + y);$$

maka $\delta f = (x, y, x + y)$. Jadi

$$\operatorname{im} \delta = \{(x, y, z) \in \mathbb{Z}^3 : z = x + y\}.$$

Definisikan homomorfisma surjektif

$$\Phi: \mathbb{Z}^3 \longrightarrow \mathbb{Z}, \quad \Phi(x, y, z) = z - x - y.$$

Ia surjektif karena $\Phi(0, 0, 1) = 1$, dan perhitungan di atas memberi $\ker \Phi = \operatorname{im} \delta$. Teorema isomorfisma pertama menghasilkan

$$\operatorname{coker} \delta = \mathbb{Z}^3 / \operatorname{im} \delta \cong \mathbb{Z}.$$

Dengan penempatan derajat 0 dan 1, hasil yang sama dapat ditulis $H^0 \cong \mathbb{Z}$ dan $H^1 \cong \mathbb{Z}$ bagi kompleks graf segitiga.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts, © 2019 David Michael Roberts, tepatnya [Notes.tex](#) baris 3948–4346 pada [commit b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#) dari repositori [DavidMichaelRoberts/AlgebraicTopology2019](#). Sebelum penanda berikutnya, slice fisik mentahnya terdiri atas 399 baris, dimulai pada baris 3948 dan mencakup pembukaan catatan di baris 4346; penanda Kuliah 21 muncul pada baris 4347. Jika 399 baris mentah tersebut digabung dengan LF tanpa baris akhir, ukurannya 17.657 byte dan hash SHA-256-nya adalah 6af488776f936d7a3ef17a30a8af94e6955df91e3a3057b92b048e1b38ca1917. Lingkungan lengkap yang diterjemahkan berakhir pada baris 4345 (398 baris; hash LF-normalisasi 1fa7d0ea4ecd567ae8975da5b9b41495a1757913942102f223d1234168366e88). Baris 4346 hanya membuka lingkungan catatan yang baru berlanjut setelah penanda Kuliah 21; demi batas lingkungan yang sah, pembukaan itu dicatat sebagai batas tertunda dan isi catatan akan dimulai pada unit

berikutnya. Materi sumber dan adaptasi Indonesia ini tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#).

Perubahan edisi mencakup penerjemahan, pemformatan ulang, pemberian pengenalan stabil, dan pemindahan sebelas catatan pinggir ke urutan bacaan utama. Tujuh gambar TikZ ditulis ulang sebagai deskripsi semantik dan tabel terpusat yang menyebutkan semua simpul, sisi, muka, label, dan orientasi; tidak ada makna yang bergantung pada warna atau posisi. Edisi memperbaiki matriks graf dengan menyatakan konvensi vektor baris/kolom, melengkapi panah yang hilang pada kompleks bintang, memperbaiki indeks face map dan rumus komposisi, serta menuliskan definisi kohomologi dengan kernel dan citra yang bertipe benar. Salah eja, salah tata bahasa, dan ekspansi bukti kompleks yang terduplikasi juga diperbaiki. Semua ruang fungsi R^S tetap dimaknai sebagai produk semua fungsi, bukan sebagai modul berdukungan hingga.

Rentang aktif sebelum pembukaan catatan yang tertunda memuat delapan contoh, empat catatan lengkap, dua definisi, dua lema, dua bukti (salah satunya ditandai “Exercise”), dan empat lingkungan latihan sumber (lima butir karena lingkungan pertama memiliki dua bagian). Ia memuat delapan tampilan `\[...\]`, dua tampilan `align*`, satu tampilan `align`, tiga `cases`, enam label sumber, dan tujuh gambar TikZ inline yang semuanya direflow. Tidak ada Xy-pic, gambar eksternal, `input`, atau `include`. Fakta bahwa model kompleks kombinatorik menangkap topologi ruang aktual hanya disajikan sebagai motivasi; tidak ada ekuivalensi realisasi yang diklaim atau dibuktikan di unit ini.

Enam pemeriksaan penguasaan, enam petunjuk, dan enam solusi lengkap merupakan materi asli edisi dan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen; edisi ini tidak disponsori, didukung, disahkan, ataupun diberi status resmi oleh David Michael Roberts atau institusinya. Produksi edisi ini dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**. Pernyataan ini menambah transparansi proses dan tidak mengurangi kredit penulis sumber ataupun kredit kontributor manusia.

20 Kuliah 20

20.1 Contoh konkret kompleks graf

Berikut beberapa contoh konkret dari kompleks yang dibangun pada akhir Unit 19 dari graf berarah.

Contoh 20.1 (graf trivial satu simpul). Ambil graf dengan satu simpul dan tanpa sisi. Maka $V = \{v\}$, $E = \emptyset$, dan kompleksnya adalah

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\delta} 0 \longrightarrow 0.$$

Pemetaan δ adalah peta nol, sehingga

$$\ker(\delta) = \mathbb{Z}, \quad \text{coker}(\delta) = 0.$$

Contoh 20.2 (kompleks segitiga berarah). Kompleks yang berasal dari $\partial\Delta[2]$ pada Contoh 19.12 adalah

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}^3 \xrightarrow{\delta} \mathbb{Z}^3 \longrightarrow 0.$$

Untuk setiap $X \in \{A, B, C\}$, tuliskan fungsi basis

$$\underline{X}: \{A, B, C\} \longrightarrow \mathbb{Z}, \quad \underline{X}(v) = \begin{cases} 1, & v = X, \\ 0, & v \neq X. \end{cases}$$

Dengan basis simpul $(\underline{A}, \underline{B}, \underline{C})$ dan basis sisi (a, b, c) , konvensi Unit 19 memberi

$$\begin{aligned}\delta(\underline{A})(a) &= -1, & \delta(\underline{A})(b) &= 0, & \delta(\underline{A})(c) &= -1, \\ \delta(\underline{B})(a) &= 1, & \delta(\underline{B})(b) &= -1, & \delta(\underline{B})(c) &= 0, \\ \delta(\underline{C})(a) &= 0, & \delta(\underline{C})(b) &= 1, & \delta(\underline{C})(c) &= 1.\end{aligned}$$

Memang, A adalah sumber sisi a dan c serta tidak bersinggungan dengan b , sedangkan B adalah target sisi a . Jika koordinat ditulis sebagai **vektor baris** dan fungsi basis menjadi baris-baris matriks, matriks sumber adalah

$$D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Dengan konvensi vektor kolom yang lebih umum, matriks pemetaan yang sama adalah $M = D^\top$; kolom-kolom M adalah citra fungsi basis simpul. Kernel dan citra harus ditulis dalam basis sisi (a, b, c) agar tidak mencampur nama simpul dengan elemen kodomain:

$$M = D^\top = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \ker \delta = \ker M = \mathbb{Z}(\underline{A} + \underline{B} + \underline{C}) \cong \mathbb{Z},$$

sedangkan

$$\operatorname{im} \delta = \mathbb{Z}(-a - c) + \mathbb{Z}(a - b) + \mathbb{Z}(b + c) = \mathbb{Z}(-a - c) + \mathbb{Z}(a - b), \quad \operatorname{coker} \delta \cong \mathbb{Z}.$$

Memang, menambahkan b pada dua pembangkit pertama menghasilkan seluruh modul sisi: dari $a - b$ dan b diperoleh a , lalu dari $-a - c$ diperoleh c .

Dengan demikian karakteristik Eulernya adalah

$$\chi = |V| - |E| = 3 - 3 = 0.$$

Audit sumber 20.1. Matriks pada Notes.tex baris 3974–3980 menampilkan koordinat citra fungsi basis sebagai baris, sedangkan banyak pembaca memakai vektor kolom. Edisi menyatakan konvensi itu secara eksplisit dan memakai $M = D^\top$ untuk vektor kolom. Karena $\delta f(e) = f(d_0 e) - f(d_1 e)$, fungsi konstan harus berada di kernel: $\ker \delta = \mathbb{Z}(\underline{A} + \underline{B} + \underline{C})$, bukan generator dengan tanda minus seperti tercetak di sumber. Citra yang benar adalah $\langle -a - c, a - b, b + c \rangle$; nama simpul tidak dipakai sebagai elemen kodomain.

Catatan 20.1 (basis hingga). Untuk setiap graf berhingga (dan nanti objek kombinatorik berhingga yang lebih umum), simpul dan sisi dapat dipakai sebagai himpunan pembangkit bagi $\mathbb{Z}^V$ dan $\mathbb{Z}^E$: sebuah unsur $x \in V$ mewakili fungsi yang bernilai 1 pada x dan 0 di tempat lain. Untuk graf tak berhingga, ruang fungsi adalah produk dan bukan modul bebas berdukungan hingga; basis koordinat naif tidak lagi tersedia secara umum.

Contoh 20.3 (graf bintang empat simpul). Pertimbangkan graf dengan

$$V = \{A, B, C, D\}, \quad E = \{b, c, d\},$$

dan tiga sisi yang semuanya berawal di A :

Catatan pinggir sumber. Diagram pada Notes.tex baris 3989 menempatkan A di pusat dan mengarahkan b, c, d menuju B, C, D . Tabel insidensi di bawah mempertahankan informasi arah tanpa bergantung pada posisi gambar.

Diagram 20.1 (deskripsi semantik graf bintang). Empat simpulnya adalah A, B, C, D dan tiga sisi berarah keluar dari A :

Sisi	Sumber d_1	Target d_0
b	A	B
c	A	C
d	A	D

Gambar sumber menempatkan A di pusat dan B, C, D di tiga arah berbeda. Tabel ini mempertahankan semua label dan orientasi tanpa bergantung pada posisi radialnya.

Dengan basis fungsi simpul dan sisi, kompleksnya adalah

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}^4 \xrightarrow{\delta} \mathbb{Z}^3 \longrightarrow 0,$$

dan matriks dengan vektor kolom ialah

$$D = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Matriks ini surjektif, sehingga kokernel nol. Maka

$$\ker \delta = \{(t, t, t, t) : t \in \mathbb{Z}\} \cong \mathbb{Z}, \quad \chi = 4 - 3 = 1.$$

Audit sumber 20.2. Pada baris 4004 sumber mencetak $0 \rightarrow \mathbb{Z}^4$, yang kehilangan panah awal. Edisi memperbaikinya menjadi $0 \rightarrow \mathbb{Z}^4$ dan menyatakan arah setiap sisi secara eksplisit.

Tidak perlu membatasi diri pada graf terhubung.

Contoh 20.4 (graf tak terhubung). Ambil

$$V = \{A, B, C\}, \quad E = \{b\}, \quad d_1(b) = C, \quad d_0(b) = B,$$

sehingga b berarah dari C ke B dan A terisolasi.

Catatan pinggir sumber. Sketsa Notes.tex baris 4020 memiliki satu simpul terisolasi dan satu panah $C \rightarrow B$; ketinggian simpul pada sketsa bukan data matematis.

Diagram 20.2 (deskripsi semantik graf tak terhubung). Data insidensinya adalah satu simpul terisolasi A dan satu sisi b dengan orientasi $C \xrightarrow{b} B$:

Objek	Sumber	Target
b	C	B

Posisi vertikal pada gambar sumber tidak menambah data; tabel ini menyatakan arah secara eksplisit.

Kompleksnya

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}^3 \xrightarrow{\delta} \mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

memiliki $\delta(f) = f_B - f_C$, yang surjektif. Maka

$$\text{coker}(\delta) = 0, \quad \ker(\delta) = \{(t, s, s) : t, s \in \mathbb{Z}\} \cong \mathbb{Z}^2,$$

dan $\chi = 3 - 1 = 2$.

Latihan Sumber 20.1 (dua bagian: koproduk dan poliedron).

1. Untuk dua graf berarah sederhana G_1 dan G_2 , bentuk gabungan saling lepas $G_1 \sqcup G_2$ dengan mengambil gabungan saling lepas himpunan simpul dan sisi serta fungsi d_0, d_1 yang diinduksi. Tunjukkan

$$\ker \delta_{G_1 \sqcup G_2} \cong \ker \delta_{G_1} \oplus \ker \delta_{G_2}.$$

2. Untuk graf berarah **berhingga** G yang bentuk dasarnya adalah poliedron satu-siklus dan yang terhubung, tunjukkan bahwa kernel dan kokernel pemetaan terkait δ_G keduanya isomorfik dengan $\mathbb{Z}$.

Solusi lengkap kedua bagian diberikan kembali dalam Pemeriksaan Penguasaan 20.1 dan 20.2. Untuk graf tak berhingga, produk ruang fungsi menggantikan jumlah langsung; untuk graf dengan beberapa siklus, rank kokernel lebih besar.

Latihan Sumber 20.2 (dua siklus). Hitung kernel dan kokernel graf berarah sederhana yang terhubung dan mempunyai dua siklus. Solusi lengkapnya diberikan dalam Pemeriksaan Penguasaan 20.3.

Audit sumber 20.3. Klaim Notes.tex baris 4043–4050 terlalu luas bila dibaca untuk semua graf terhubung berbentuk poliedron: rank kokernel sama dengan banyak siklus independen, bukan selalu satu. Edisi membatasi pembacaan latihan kedua pada kasus satu-siklus yang dimaksudkan, lalu menghitung kasus dua-siklus secara terpisah. Untuk modul- $\mathbb{Z}$, istilah yang tepat ialah **rank**, bukan dimensi sebagai ruang vektor.

Audit sumber 20.3b. Rujukan silang Notes.tex baris 4069 menunjuk label `eg:triangle_graph_cplx`, padahal contoh yang baru saja dibahas adalah gelang satu-simpul, bukan graf pohon empat-simpul. Edisi mengganti rujukan itu dengan uraian mandiri dan mempertahankan konvensi graf berarah $d_1(e) \rightarrow d_0(e)$.

Catatan 20.2 (graf berarah umum). Kita tidak harus membatasi diri pada graf berarah sederhana. Definisi kompleks graf hanya memakai rumus

$$\delta(f) = f \circ d_0 - f \circ d_1,$$

bukan injektivitas (d_0, d_1) atau larangan diagonal. Karena itu boleh ada satu simpul dan satu sisi yang merupakan model kombinatorik lingkaran:

Catatan pinggir sumber. Lingkaran satu-simpul pada Notes.tex baris 4059 digambar sebagai satu gelang dengan simpul v dan sisi e . Dalam adaptasi ini orientasinya dinyatakan oleh $d_0(e) = d_1(e) = v$.

Diagram 20.3 (deskripsi semantik gelang satu-simpul). Ada tepat satu simpul v dan satu sisi e dengan kedua ujung pada v ; panahnya dapat dipilih searah dari v kembali ke v . Data ini, bukan arah gambar, yang menentukan model kombinatorik lingkaran.

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\delta=0} \mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

Baik kernel maupun kokernelnya isomorfik dengan $\mathbb{Z}$.

20.2 Permukaan kombinatorik dan kompleks dua dimensi

Namun, objek satu dimensi saja belum cukup. Kita ingin memikirkan sesuatu yang memainkan peran graf berarah berdimensi dua: himpunan simpul, sisi, dan muka segitiga, beserta fungsi yang menjelaskan bagaimana mereka saling menempel. Istilah **permukaan kombinatorik** di sini berarti objek berdimensi paling tinggi dua, bukan permukaan manifold yang harus bebas degenerasi.

Catatan pinggir sumber. Istilah yang lebih luas untuk data sampai dimensi dua ini adalah *himpunan semisimplicial 2-skeletal*; Mike Hopkins menyebut objek semacam ini *kompleks Δ -kombinatorik*. Di kuliah ini istilah yang dipakai adalah *permukaan kombinatorik*.

Contoh 20.5 (satu segitiga terisi). Pertimbangkan satu segitiga terisi. Simpulnya dinamai v_0, v_1, v_2 , sisinya e_0, e_1, e_2 , dan mukanya f .

Catatan pinggir sumber. Arsiran pada gambar Notes.tex baris 4082 hanya menandai bahwa f terisi. Data yang menentukan objek adalah tiga simpul, tiga sisi berorientasi, dan satu muka seperti pada tabel berikut.

Diagram 20.4 (deskripsi semantik segitiga terisi). Orientasi sisi dan labelnya adalah

Sisi	Sumber d_1^1	Target d_0^1	Keterangan
e_2	v_0	v_1	sisi berhadapan dengan v_2
e_0	v_1	v_2	sisi berhadapan dengan v_0
e_1	v_0	v_2	sisi berhadapan dengan v_1

Satu muka f dibatasi oleh ketiga sisi, dengan e_0 menghubungkan $v_1 \rightarrow v_2$, e_1 menghubungkan $v_0 \rightarrow v_2$, dan e_2 menghubungkan $v_0 \rightarrow v_1$. Tabel ini menggantikan gambar posisi dan kepala panah sumber.

Dengan e_i sisi yang berhadapan dengan v_i , identitas muka yang terlihat langsung pada segitiga ialah

$$d_0^1(e_2) = d_1^1(e_0), \quad d_0^1(e_1) = d_0^1(e_0), \quad d_1^1(e_2) = d_1^1(e_1).$$

Kombinatorika ini dirangkum oleh definisi berikut.

Definisi 20.1 (permukaan kombinatorik). Sebuah *permukaan kombinatorik* $X_\bullet$ terdiri atas himpunan simpul, sisi, dan muka, masing-masing

$$X_0, \quad X_1, \quad X_2,$$

serta fungsi *face map*

$$d_i^n: X_n \longrightarrow X_{n-1} \quad (0 \leq i \leq n, \quad 0 < n \leq 2),$$

yang memenuhi identitas

$$\begin{aligned} d_0^1 \circ d_2^2 &= d_1^1 \circ d_0^2, \\ d_0^1 \circ d_1^2 &= d_0^1 \circ d_0^2, \\ d_1^1 \circ d_2^2 &= d_1^1 \circ d_1^2. \end{aligned}$$

Jika dimensinya jelas, superskrip pada d_i^n boleh dihilangkan. *1-skeleton* $X_\bullet$ adalah graf berarah yang diperoleh dengan melupakan X_2 dan mempertahankan X_0, X_1, d_0^1, d_1^1 .

Catatan pinggir sumber. Notasi X_i berarti himpunan muka berdimensi i , sedangkan d_i^n disebut *face map* dari dimensi n .

Catatan pinggir sumber. Cara termudah mengingat ketiga identitas ialah menggambar satu segitiga: menghapus dua muka berturut-turut dengan dua urutan yang berbeda menghasilkan sisi atau simpul yang sama.

Istilah “permukaan” di sini berarti “berdimensi paling tinggi dua”. Tidak ada syarat bahwa X_2 tidak kosong. Bahkan boleh ada komponen berdimensi nol atau satu; objeknya boleh degenerat tanpa segitiga dan tanpa sisi, walaupun bila ada satu segitiga maka pasti ada sedikitnya satu sisi dan satu simpul.

Catatan pinggir sumber. Gambar sumber mengilustrasikan satu segitiga dan beberapa simpul atau sisi terpisah untuk menekankan bahwa komponen berdimensi lebih rendah diizinkan. Deskripsi ini menggantikan gambar tersebut dengan data insidensi yang eksplisit.

Diagram 20.5 (deskripsi semantik komponen degenerat). Satu komponen memuat segitiga terisi dengan tiga sisi dan tiga simpul; komponen lain boleh berupa sisi tunggal atau simpul-simpul terisolasi. Tidak ada panah tambahan yang tersirat oleh jarak antar-komponen, dan keberadaan komponen rendah dimensi tidak mengubah syarat tiga identitas *face map*.

Contoh 20.6 (simpleks kombinatorik $\Delta[2]$). Segitiga pada Contoh 20.5 dinamai $\Delta[2]$, dengan

$$\Delta[2]_0 = \{v_0, v_1, v_2\}, \quad \Delta[2]_1 = \{e_0, e_1, e_2\}, \quad \Delta[2]_2 = \{f\}.$$

Peta muka atas memenuhi

$$d_i^2(f) = e_i,$$

sedangkan peta muka tingkat satu adalah

$$\begin{array}{c|ccc} & e_0 & e_1 & e_2 \\ \hline d_0^1 & v_2 & v_2 & v_1 \\ d_1^1 & v_1 & v_0 & v_0 \end{array}$$

sesuai orientasi Contoh 20.5. 1-skeleton $\Delta[2]$ adalah graf berarah $\partial\Delta[2]$.

Contoh 20.7 (model kombinatorik torus). Ambil

$$T_0 = \{v\}, \quad T_1 = \{e_1, e_2, e_3\}, \quad T_2 = \{f_1, f_2\}.$$

Diagram 20.6 (deskripsi semantik torus kombinatorik). Gambar sumber adalah persegi dengan keempat sudut diidentifikasi dengan satu simpul v . Sisi vertikal yang searah diberi label e_1 , sisi horizontal yang searah diberi label e_2 , dan diagonal penghubung diberi label e_3 ; persegi dibagi menjadi dua muka f_1 dan f_2 . Data face map lengkap yang menentukan orientasi adalah

$$\begin{array}{c|ccc} & d_0^2 & d_1^2 & d_2^2 \\ \hline f_1 & e_3 & e_1 & e_2 \\ f_2 & e_2 & e_1 & e_3 \end{array} \quad d_0^1(e_i) = v = d_1^1(e_i) \quad (i = 1, 2, 3).$$

Jadi diagram dapat dibaca tanpa mengandalkan identifikasi visual sudut atau arah kepala panah.

Untuk f_1 berlaku

$$d_0^2(f_1) = e_3, \quad d_1^2(f_1) = e_1, \quad d_2^2(f_1) = e_2,$$

dan untuk f_2 berlaku

$$d_0^2(f_2) = e_2, \quad d_1^2(f_2) = e_1, \quad d_2^2(f_2) = e_3.$$

Audit sumber 20.4. Notes.tex baris 4122 kehilangan kata “superskrip” dalam kalimat tentang penghilangan superskrip; edisi menyatakannya lengkap. Baris 4196 salah menulis indeks sisi sebagai $\mathbf{e}=1,2,3$; edisi memperbaikinya menjadi $i = 1,2,3$. Pada baris 4228, indeks d_1 harus bertipe d_1^1 ; dan pada baris 4251, komposisi pertama dalam tanda kurung harus $gd_1^1 d_0^2$. Kedua perbaikan tercermin dalam definisi dan bukti di atas.

Untuk setiap permukaan kombinatorik $X_\bullet$, kita sekarang dapat membentuk barisan grup abelian dengan cara yang sama seperti pada graf berarah. Kita memakai $R = \mathbb{Z}$ agar notasi ringkas; penggantian $\mathbb{Z}$ dengan gelanggang komutatif berunsur satu R bekerja dengan cara yang sama.

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}^{X_0} \xrightarrow{\delta_0} \mathbb{Z}^{X_1} \xrightarrow{\delta_1} \mathbb{Z}^{X_2} \longrightarrow 0.$$

Untuk $g \in \mathbb{Z}^{X_0}$ dan $g' \in \mathbb{Z}^{X_1}$, definisikan

$$\delta_0(g) = g \circ d_0^1 - g \circ d_1^1,$$

dan

$$\delta_1(g') = g' \circ d_0^2 - g' \circ d_1^2 + g' \circ d_2^2.$$

Dengan kata lain, untuk $x \in X_2$,

$$\delta_1(g')(x) = g'(d_0^2(x)) - g'(d_1^2(x)) + g'(d_2^2(x)).$$

Nanti kita buktikan bahwa komposit $\delta_1 \delta_0$ memang nol.

Catatan pinggir sumber. Pemakaian $\mathbb{Z}$ di sini hanya untuk kesederhanaan. Definisi umum dengan gelanggang komutatif berunsur satu R mempunyai rumus yang sama.

Catatan 20.3 (basis pada kompleks berhingga). Jika setiap X_0, X_1, X_2 berhingga, himpunan X_i dapat dipakai sebagai basis bagi $\mathbb{Z}^{X_i}$ dengan mengidentifikasi $x \in X_i$ dengan fungsi karakteristik yang bernilai 1 pada x dan 0 di tempat lain. Beberapa sumber memakai hanya fungsi berdukungan hingga, tetapi itu bukan ruang $\mathbb{Z}^{X_i}$ yang digunakan di sini. Pada kompleks tak berhingga, penulisan matriks berbasis dapat gagal—misalnya tak hingga banyak sisi dapat bertemu pada satu simpul—sehingga deskripsi abstrak pemetaan menjadi penting.

Contoh 20.8 (kompleks torus). Untuk $T_\bullet$ pada Contoh 20.7, barisannya adalah

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\delta_0} \mathbb{Z}^3 \xrightarrow{\delta_1} \mathbb{Z}^2 \longrightarrow 0.$$

Karena $d_0^1(e_i) = d_1^1(e_i) = v$, maka

$$\delta_0(g)(e_i) = g(v) - g(v) = 0$$

untuk setiap sisi, sehingga δ_0 adalah peta nol. Dengan basis (e_1, e_2, e_3) pada $\mathbb{Z}^{T_1}$ dan (f_1, f_2) pada $\mathbb{Z}^{T_2}$, peta δ_1 direpresentasikan (dengan vektor kolom) oleh

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Kedua baris sama, tetapi komposit $\delta_1\delta_0$ jelas nol. Jadi ini memang sebuah kompleks. Kelak kita akan memperoleh

$$\ker \delta_0 \cong \mathbb{Z}, \quad \ker \delta_1 / \operatorname{im} \delta_0 \cong \mathbb{Z}^2, \quad \operatorname{coker} \delta_1 \cong \mathbb{Z}.$$

Lema 20.1 (kompleks permukaan kombinatorik). Untuk setiap permukaan kombinatorik $X_\bullet$, barisan

$$C^\bullet(X_\bullet) : 0 \longrightarrow \mathbb{Z}^{X_0} \xrightarrow{\delta_0} \mathbb{Z}^{X_1} \xrightarrow{\delta_1} \mathbb{Z}^{X_2} \longrightarrow 0$$

adalah kompleks.

Bukti. Ambil $g : X_0 \rightarrow \mathbb{Z}$ dan $x \in X_2$. Dengan rumus definisi,

$$\begin{aligned} \delta_1(\delta_0(g))(x) &= \delta_0(g)(d_0^2x) - \delta_0(g)(d_1^2x) + \delta_0(g)(d_2^2x) \\ &= (gd_0^1d_0^2 - gd_1^1d_0^2)(x) - (gd_0^1d_1^2 - gd_1^1d_1^2)(x) \\ &\quad + (gd_0^1d_2^2 - gd_1^1d_2^2)(x) \\ &= g(d_0^1d_2^2x) - g(d_1^1d_0^2x) - g(d_0^1d_1^2x) + g(d_1^1d_1^2x) \\ &\quad + g(d_0^1d_0^2x) - g(d_1^1d_2^2x) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Pada langkah terakhir dipakai tiga identitas face map:

$$d_0^1d_2^2 = d_1^1d_0^2, \quad d_0^1d_1^2 = d_0^1d_0^2, \quad d_1^1d_2^2 = d_1^1d_1^2.$$

Enam suku saling berpasangan dengan tanda berlawanan, sehingga $\delta_1 \circ \delta_0 = 0$. Ekspansi sumber mengulang satu komposisi dan menghilangkan komposisi lain; rumus di atas adalah pembetulan bertipe yang tetap membuktikan klaim yang dimaksud. $\square$

Karakteristik Euler torus kombinatorik adalah

$$\chi = 1 - 3 + 2 = 0.$$

Kegagalan kompleks ini untuk eksak memberi

$$\ker \delta_0 \cong \mathbb{Z}, \quad \operatorname{coker} \delta_1 \cong \mathbb{Z}, \quad \ker \delta_1 / \operatorname{im} \delta_0 \cong \mathbb{Z}^2.$$

Catatan pinggir sumber. Untuk latihan tetrahedron (Notes.tex baris 4270), labeli simpul dengan 0, 1, 2, 3, urutkan tiap sisi dari label lebih rendah ke lebih tinggi, lalu ambil peta muka dari model $\Delta[2]$. Teks sumber menggandakan kata “from”; pengulangan itu dihapus.

Catatan 20.4 (gelanggang koefisien). Kita dapat mengganti $\mathbb{Z}$ dengan gelanggang komutatif berunsur satu R . Kernel dan kokernel kemudian menjadi modul- R . Untuk $R = \mathbb{Z}$, modul tersebut adalah grup abelian; untuk $R = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, ia tetap grup abelian tetapi juga membawa struktur modul yang lebih kaya atas gelanggang tersebut.

Latihan Sumber 20.4 (tetrahedron). Hitung kompleks grup abelian yang berasal dari tetrahedron yang dipandang sebagai permukaan kombinatorik, lalu hitung $\ker \delta_0$ dan

$$\ker \delta_1 / \operatorname{im} \delta_0.$$

Petunjuk sumber: labeli simpul dengan 0, 1, 2, 3, urutkan sisi dari label lebih rendah ke lebih tinggi, lalu definisikan peta muka segitiga memakai $\Delta[2]$ sebagai model. Solusi lengkap diberikan dalam Pemeriksaan Penguasaan 20.4.

Latihan Sumber 20.5 (botol Klein). Pertimbangkan model kombinatorik botol Klein $K_\bullet$ dengan dua segitiga, tiga sisi, dan satu simpul.

Diagram 20.7 (deskripsi semantik botol Klein). Ada satu simpul v , tiga sisi e_1, e_2, e_3 , dan dua muka terisi f_1, f_2 . Semua sisi berawal dan berakhir di v sebagai data face map tingkat satu. Orientasi muka adalah

$$\begin{array}{c|ccc} & d_0^2 & d_1^2 & d_2^2 \\ f_1 & e_3 & e_2 & e_1 \\ f_2 & e_1 & e_3 & e_2 \end{array} \quad d_0^1(e_i) = v = d_1^1(e_i) \quad (i = 1, 2, 3).$$

Gambar sumber memiliki dua sisi yang ditempel dengan pembalikan orientasi; tabel ini mempertahankan seluruh data tanpa mengandalkan arsiran atau arah kepala panah.

Segitiga dipandang terisi walaupun gambar sumber tidak diberi arsiran. Solusi lengkap diberikan dalam Pemeriksaan Penguasaan 20.5.

Catatan pinggir sumber. Pada gambar botol Klein, dua sisi ditempel dengan orientasi berlawanan. Data face map di atas adalah penentu mandiri; bentuk botol Klein tidak perlu disimpulkan dari posisi gambar.

Audit sumber 20.5. Notes.tex baris 4305 menulis $d_1^2(f_2) = e_2$, yang mengulang $d_2^2(f_2)$. Edisi memperbaikinya menjadi $d_1^2(f_2) = e_3$ dan mempertahankan $d_2^2(f_2) = e_2$, konsisten dengan orientasi model dan menghasilkan kokernel $\mathbb{Z}/2$.

Ledger penyuntingan bahasa. Notes.tex baris 4040–4041 memakai “prove” ketika subjeknya tunggal, sehingga edisi memperbaikinya menjadi “proves”; baris 4044 menambahkan kata kerja “are”; baris 4057 menambahkan “general” agar memodifikasi “directed graphs”; baris 4151 menambahkan konjungsi “that” dalam frasa “so degenerate that it has”; dan baris 4341 menambahkan tanda baca setelah “caveats”. Semua diperbaiki dalam alur Indonesia tanpa mengubah urutan atau isi matematis. Salah eja `simplicity` (4201), `explicit` (4219), serta pengulangan `from from` (4270) juga dibetulkan. Pada baris 4273, penyebut latihan dibaca sebagai $\operatorname{im} \delta_0$, bukan $\ker \delta_0$.

Definisi 20.2 (kohomologi kompleks). Diberikan kompleks $A_\bullet$ dari modul- R dan bilangan bulat n , definisikan modul kohomologi ke- n sebagai

$$H^n(A_\bullet) = \frac{\ker(d_n: A_n \rightarrow A_{n+1})}{\operatorname{im}(d_{n-1}: A_{n-1} \rightarrow A_n)}.$$

Karena $d_n d_{n-1} = 0$, citra pada penyebut memang merupakan submodul dari kernel pada pembilang. Gradasinya tetap kohomologis: d_n menaikkan indeks.

Audit sumber 20.6. Fraksi pada Notes.tex baris 4311–4317 menulis $\ker A_n \xrightarrow{d_n} A_{n+1}$, bukan submodul kernel yang bertipe di A_n . Edisi menulis kernel dan citra sebagai kernel/citra pemetaan yang eksplisit.

Lema 20.2 (fungtorialitas kohomologi). Untuk setiap bilangan bulat n , penetapan

$$H^n: \mathbf{Cplx}_R \longrightarrow R\mathbf{Mod}$$

adalah fungtor.

Bukti (latihan sumber, diselesaikan edisi). Misalkan $f: A_\bullet \rightarrow B_\bullet$ morfisma kompleks. Karena

$$f_{n+1}d_n^A = d_n^B f_n,$$

jika $a \in \ker d_n^A$, maka

$$d_n^B(f_n(a)) = f_{n+1}(d_n^A(a)) = 0.$$

Jadi f_n membatasi menjadi pemetaan

$$\ker d_n^A \longrightarrow \ker d_n^B.$$

Jika $a = d_{n-1}^A(b)$ adalah coboundary, maka

$$f_n(a) = f_n d_{n-1}^A(b) = d_{n-1}^B f_{n-1}(b),$$

sehingga pemetaan kernel itu mengirim citra d_{n-1}^A ke citra d_{n-1}^B . Dengan sifat universal modul hasil bagi, kita memperoleh

$$H^n(f): H^n(A_\bullet) \longrightarrow H^n(B_\bullet), \quad [a] \longmapsto [f_n(a)].$$

Rumus ini terdefinisi baik karena perbedaan dua wakil di dalam citra d_{n-1}^A dikirim ke citra d_{n-1}^B . Untuk identitas,

$$H^n(\mathrm{id}_{A_\bullet}) = \mathrm{id}_{H^n(A_\bullet)}.$$

Untuk morfisma berurutan $A_\bullet \xrightarrow{f} B_\bullet \xrightarrow{g} C_\bullet$,

$$H^n(g \circ f)([a]) = [g_n f_n(a)] = H^n(g)H^n(f)([a]).$$

Maka $H^n(g \circ f) = H^n(g) \circ H^n(f)$ dan H^n adalah fungtor. $\square$

20.3 Dari ruang ke kompleks: gagasan besar dan batas unit

Gagasan besarnya adalah: ruang dan grup homotopinya sulit, jadi ubah ruang menjadi kompleks lalu pelajari grup kohomologinya. Kita juga menginginkan konstruksi ini functorial. Sejauh ini, misalnya, kita mengetahui (sebagian sebagai fakta eksternal) bahwa

$$\pi_i(S^2, *) = \begin{cases} *, & i = 0 \text{ (terhubung)}, \\ 0, & i = 1 \text{ (oleh Seifert–van Kampen)}, \\ \mathbb{Z}, & i = 2 \text{ (tanpa bukti di sini)}, \\ \mathbb{Z}, & i = 3 \text{ (juga tanpa bukti di sini)}, \\ \vdots & \end{cases}$$

Untuk permukaan kombinatorik $T_\bullet$, perhitungan kohomologi hanya memerlukan aljabar linear dan tampak menangkap sebagian informasi itu dengan usaha jauh lebih kecil. Namun ada dua kehati-hatian: unit ini belum membangun functor geometris dari setiap permukaan kombinatorik ke ruang aktual, dan belum ada jaminan bahwa tetrahedron kombinatorik (berbeda dari ruang aktual) benar-benar menangkap topologi S^2 . Hasilnya adalah petunjuk menuju pendekatan berbeda, bukan teorema realisasi.

Pendamping penguasaan: pemeriksaan, petunjuk, dan solusi lengkap

Enam paket berikut adalah soal, petunjuk, dan solusi yang ditambahkan oleh edisi ini. Masing-masing berdiri sendiri; notasi dan arah sisi mengikuti konvensi $d_1(e) \rightarrow d_0(e)$ yang dipakai di seluruh unit.

Pemeriksaan Penguasaan 20.1 (koproduk dan arti produk fungsi). Misalkan G_1 dan G_2 graf berarah hingga, dan bentuk $G_1 \sqcup G_2$ dengan gabungan saling lepas pada simpul, sisi, dan *face map*. Buktikan

$$\ker \delta_{G_1 \sqcup G_2} \cong \ker \delta_{G_1} \oplus \ker \delta_{G_2}.$$

Lalu jelaskan secara tepat apa yang berubah bila keluarga grafnya tak hingga, dan gunakan graf segitiga pada Contoh 20.2 untuk memeriksa bahwa fungsi konstan memang menghasilkan elemen kernel.

Petunjuk. Untuk himpunan saling lepas, fungsi pada gabungan adalah pasangan fungsi pada kedua komponen. Tulis δ sebagai matriks blok diagonal. Ingat bahwa R^S berarti **semua** fungsi $S \rightarrow R$, yakni produk; produk dan jumlah langsung berimpit untuk banyak komponen hingga (atau bila dipilih konvensi dukungan hingga).

Solusi Pemeriksaan 20.1. Karena $V(G_1 \sqcup G_2) = V(G_1) \sqcup V(G_2)$, pembatasan dan penggabungan fungsi memberi isomorfisma

$$\mathbb{Z}^{V(G_1 \sqcup G_2)} \xrightarrow{\cong} \mathbb{Z}^{V(G_1)} \times \mathbb{Z}^{V(G_2)}, \quad f \mapsto (f|_{V(G_1)}, f|_{V(G_2)}).$$

Isomorfisma yang sama berlaku untuk himpunan sisi. Tidak ada sisi yang menyeberang dari satu komponen ke komponen lain, sehingga

$$\delta_{G_1 \sqcup G_2}(f_1, f_2) = (\delta_{G_1} f_1, \delta_{G_2} f_2).$$

Maka

$$\ker \delta_{G_1 \sqcup G_2} = \ker \delta_{G_1} \times \ker \delta_{G_2}.$$

Karena kedua graf hingga, produk dua modul sama dengan jumlah langsung, sehingga klaim diperoleh. Untuk keluarga tak hingga $\{G_i\}_{i \in I}$, identitas yang benar dengan ruang fungsi yang dipakai unit ini adalah

$$\ker \delta_{\bigsqcup_{i \in I} G_i} \cong \prod_{i \in I} \ker \delta_{G_i},$$

bukan jumlah langsung pada umumnya. Jumlah langsung hanya muncul bila I hingga atau bila sejak awal dipilih modul fungsi berdukungan hingga.

Sebagai pemeriksaan, pada segitiga A, B, C matriks kolomnya ialah

$$M = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Jelas $M(1, 1, 1)^T = 0$, sehingga fungsi konstan $\underline{A} + \underline{B} + \underline{C}$ berada di kernel. Ini juga menunjukkan mengapa tanda minus pada generator yang tercetak di sumber tidak benar.

Pemeriksaan Penguasaan 20.2 (graf hingga satu-siklus). Misalkan G graf berarah hingga yang terhubung dan graf tak berarah di bawahnya mempunyai tepat satu siklus. Tunjukkan secara integral bahwa

$$\ker \delta_G \cong \mathbb{Z}, \quad \text{coker } \delta_G \cong \mathbb{Z}.$$

Jelaskan pula mengapa hipotesis hingga diperlukan bila kita ingin memakai basis simpul dan sisi serta karakteristik Euler biasa.

Petunjuk. Pilih pohon merentang T dan satu sisi e_* di luar T . Tetapkan akar pada T , lalu tentukan nilai fungsi simpul secara berurutan dari nilai pada sisi-sisi pohon. Untuk kokernel, jumlahkan koordinat sisi pada siklus unik dengan tanda $+1$ atau -1 sesuai orientasi siklus.

Solusi Pemeriksaan 20.2. Karena G terhubung, jika $\delta f = 0$ maka $f(d_0 e) = f(d_1 e)$ pada setiap sisi. Nilai fungsi sama di sepanjang setiap lintasan, jadi f konstan. Sebaliknya fungsi konstan jelas berada di kernel. Dengan demikian

$$\ker \delta_G = \mathbb{Z} \cdot \mathbf{1} \cong \mathbb{Z}.$$

Ambil pohon merentang T . Karena hanya ada satu siklus, tepat satu sisi e_* tidak berada di T , dan $T \cup \{e_*\}$ memuat siklus unik C . Orientasi C dipilih sebarang; tulis $\varepsilon_e = 1$ bila orientasi sisi $e \in C$ searah dengan C dan $\varepsilon_e = -1$ bila berlawanan. Definisikan

$$\Phi: \mathbb{Z}^E \longrightarrow \mathbb{Z}, \quad \Phi(y) = \sum_{e \in C} \varepsilon_e y_e.$$

Untuk $y = \delta f$, suku-suku pada siklus berteleskop karena setiap simpul muncul sekali sebagai target dan sekali sebagai sumber; jadi $\Phi(\delta f) = 0$. Sebaliknya, ambil y dengan $\Phi(y) = 0$. Akarilah T di satu simpul r dan tetapkan $f(r) = 0$. Berjalan menjauh dari akar, tentukan f secara unik agar δf sama dengan y pada setiap sisi pohon (jika arah sisi terbalik, gunakan persamaan yang sama dengan tanda yang sesuai). Pada sisi e_* , selisih $y_{e_*} - \delta f(e_*)$ adalah tepat $\pm \Phi(y)$, sehingga nol. Jadi $y = \delta f$ dan

$$\text{im } \delta_G = \ker \Phi.$$

Peta Φ surjektif: koordinat pada e_* dapat dipilih 1 dan koordinat lain nol, lalu tanda dapat disesuaikan. Teorema isomorfisma pertama memberi

$$\text{coker } \delta_G = \mathbb{Z}^E / \text{im } \delta_G \cong \mathbb{Z}.$$

Untuk graf hingga, $|E| = |V|$ pada kasus satu-siklus, sehingga $\chi = |V| - |E| = 0$. Tanpa keterhinggaan, $\mathbb{Z}^V$ dan $\mathbb{Z}^E$ adalah produk fungsi; basis koordinat hingga dan hitungan Euler tersebut tidak boleh dipakai tanpa hipotesis tambahan.

Pemeriksaan Penguasaan 20.3 (dua siklus). Ambil graf sederhana berarah terhubung dengan simpul A, B, C, D dan sisi

$$a: A \rightarrow B, \quad b: B \rightarrow C, \quad c: C \rightarrow D, \quad d: D \rightarrow A, \quad e: A \rightarrow C.$$

Hitung matriks δ , kernel, dan kokernel atas $\mathbb{Z}$. Tunjukkan secara eksplisit bahwa hasilnya mencerminkan dua siklus independen.

Petunjuk. Gunakan basis simpul (A, B, C, D) dan sisi (a, b, c, d, e) . Sisi a, b, c membentuk pohon merentang. Setelah koordinat pada tiga sisi itu dinolkan dengan suatu coboundary, dua koordinat yang tersisa memberikan invarian bebas.

Solusi Pemeriksaan 20.3. Dengan aturan target dikurangi sumber, matriks kolom (baris diindeks oleh sisi) ialah

$$M = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Jika $Mf = 0$, sisi a, b, c berturut-turut memberi $f_B = f_A$, $f_C = f_B$, dan $f_D = f_C$; dua baris terakhir lalu otomatis nol. Jadi

$$\ker \delta = \mathbb{Z}(1, 1, 1, 1) \cong \mathbb{Z}.$$

Untuk kokernel, gunakan pohon $T = \{a, b, c\}$. Bagi setiap vektor $y \in \mathbb{Z}^5$, pilih f secara berurutan sehingga $(\delta f)_a = y_a$, $(\delta f)_b = y_b$, dan $(\delta f)_c = y_c$. Dengan mengurangkan δf , tersisa hanya koordinat pada d dan e . Tidak ada coboundary yang dapat mengubah kedua koordinat itu secara independen setelah koordinat pohon dibuat nol: jika semua lima koordinat δf nol, maka f konstan. Karena itu kelas $[d]$ dan $[e]$ adalah pembangkit bebas untuk hasil bagi, dan tidak ada relasi integral di antaranya. Secara formal, pemetaan

$$\Psi: \mathbb{Z}^5 \longrightarrow \mathbb{Z}^2, \quad \Psi(y) = (y_d + y_a + y_b + y_c, y_e - y_a - y_b),$$

yang masing-masing mengukur jumlah berarah pada siklus persegi dan segitiga. Operasi baris dan kolom unimodular (atau konstruksi pohon pada petunjuk) mengirim M ke bentuk dengan tiga kolom pivot dan dua koordinat bebas. Maka $\ker \Psi = \text{im } M$ dan

$$\text{coker } \delta \cong \mathbb{Z}^2.$$

Secara topologis, d menutup siklus persegi dan e bersama a, b menutup siklus segitiga; keduanya bebas setelah memilih pohon. Dengan demikian $\text{rank } \ker \delta = 1$ dan $\text{rank } \text{coker } \delta = 2$, sesuai $\chi = 4 - 5 = -1$.

Pemeriksaan Penguasaan 20.4 (batas tetrahedron). Labeli simpul batas tetrahedron dengan $0, 1, 2, 3$, orientasikan setiap sisi ij dari i ke j untuk $i < j$, dan orientasikan muka dengan urutan naik. Tuliskan δ_0 dan δ_1 untuk kompleks kohomologinya, lalu hitung

$$\ker \delta_0, \quad \ker \delta_1 / \operatorname{im} \delta_0, \quad \operatorname{coker} \delta_1.$$

Petunjuk. Urutkan basis sebagai $(01, 02, 03, 12, 13, 23)$ dan $(012, 013, 023, 123)$. Pada muka ijk gunakan $\delta_1 g(ijk) = g_{jk} - g_{ik} + g_{ij}$. Untuk membuktikan semua cocycle adalah coboundary, tetapkan $f_0 = 0$ dan $f_i = g_{0i}$.

Solusi Pemeriksaan 20.4. Dalam basis yang diminta,

$$\delta_0 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

dan

$$\delta_1 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Kolom-kolom δ_0 menunjukkan bahwa $\delta_0 f(ij) = f_j - f_i$. Karena graf 1-skeleton terhubung, $\delta_0 f = 0$ tepat ketika f konstan; jadi

$$\ker \delta_0 = \mathbb{Z}(1, 1, 1, 1) \cong \mathbb{Z}, \quad \operatorname{rank} \delta_0 = 3.$$

Sekarang ambil $g \in \ker \delta_1$. Tetapkan $f_0 = 0$, $f_1 = g_{01}$, $f_2 = g_{02}$, dan $f_3 = g_{03}$. Persamaan pada muka $012, 013, 023$ masing-masing memberi

$$g_{12} = g_{02} - g_{01}, \quad g_{13} = g_{03} - g_{01}, \quad g_{23} = g_{03} - g_{02}.$$

Maka $g = \delta_0 f$ pada keenam sisi. (Persamaan muka 123 otomatis mengikuti tiga persamaan tersebut, atau mengikuti $\delta_1 \delta_0 = 0$.) Dengan demikian

$$\ker \delta_1 = \operatorname{im} \delta_0, \quad \ker \delta_1 / \operatorname{im} \delta_0 = 0.$$

Peta δ_1 ber-rank 3, sehingga, karena kodomainnya $\mathbb{Z}^4$ dan semua relasi di atas primitif, bentuk normal Smithnya memiliki tiga pivot 1. Akibatnya

$$\operatorname{coker} \delta_1 \cong \mathbb{Z}.$$

Jadi batas tetrahedron memiliki $H^0 \cong \mathbb{Z}$, $H^1 = 0$, dan $H^2 \cong \mathbb{Z}$ dalam konvensi kohomologis unit ini.

Pemeriksaan Penguasaan 20.5 (botol Klein dan tanda orientasi). Gunakan model $K_\bullet$ dengan satu simpul, sisi (e_1, e_2, e_3) , dan muka (f_1, f_2) , dengan

$$(d_0^2, d_1^2, d_2^2)(f_1) = (e_3, e_2, e_1), \quad (d_0^2, d_1^2, d_2^2)(f_2) = (e_1, e_3, e_2).$$

Hitung δ_0 , δ_1 , dan semua grup kohomologi. Jelaskan mengapa menukar $d_1^2(f_2)$ menjadi e_2 akan mengubah hasil.

Petunjuk. Karena semua sisi berawal dan berakhir di simpul yang sama, $\delta_0 = 0$. Tulis vektor sisi sebagai (x_1, x_2, x_3) dan evaluasi δ_1 pada f_1 dan f_2 ; lalu gunakan dua determinan minor untuk bentuk normal Smith.

Solusi Pemeriksaan 20.5. Dari $d_0^1(e_i) = v = d_1^1(e_i)$ diperoleh $\delta_0 = 0: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}^3$. Untuk $g = (x_1, x_2, x_3)$,

$$\delta_1(g) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

Kernel memenuhi $x_1 - x_2 + x_3 = 0$ dan $x_1 + x_2 - x_3 = 0$. Menjumlahkan kedua persamaan memberi $2x_1 = 0$, sehingga di atas $\mathbb{Z}$ berlaku $x_1 = 0$ dan $x_2 = x_3$. Jadi

$$\ker \delta_1 = \mathbb{Z}(0, 1, 1), \quad H^1(K_\bullet) = \ker \delta_1 / \operatorname{im} \delta_0 \cong \mathbb{Z}.$$

Untuk kokernel, semua entri matriks mempunyai gcd 1, sedangkan gcd semua minor 2×2 yang tak nol adalah 2 (misalnya minor kolom pertama-kedua bernilai 2). Bentuk normal Smithnya adalah $\operatorname{diag}(1, 2)$, sehingga

$$\operatorname{coker} \delta_1 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

Karena $\delta_0 = 0$, $H^0(K_\bullet) = \mathbb{Z}$; dan karena tidak ada suku derajat 3, $H^2(K_\bullet) = \operatorname{coker} \delta_1$. Dengan demikian

$$H^0 \cong \mathbb{Z}, \quad H^1 \cong \mathbb{Z}, \quad H^2 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

Jika mengikuti salah cetak sumber $d_1^2(f_2) = e_2$, baris kedua menjadi $(1, 0, 0)$ dan bukan $(1, 1, -1)$; kernel serta kokernel yang diperoleh tidak lagi merupakan model yang dimaksud. Koreksi e_3 mempertahankan pembalikan orientasi dan menghasilkan faktor torsion $\mathbb{Z}/2$.

Pemeriksaan Penguasaan 20.6 (kohomologi, morfisma, dan derajat tinggi). Untuk morfisma kompleks $f: A_\bullet \rightarrow B_\bullet$ atas gelanggang komutatif berunsur satu R , buktikan bahwa peta yang diinduksi pada

$$H^n(A_\bullet) = \ker(d_n) / \operatorname{im}(d_{n-1})$$

terdefinisi baik dan funktorial untuk setiap bilangan bulat n . Sebagai aplikasi, hitung H^n dari kompleks torus Unit 20 atas R untuk semua n , termasuk $n \geq 3$.

Petunjuk. Gunakan komutativitas $f_{n+1}d_n^A = d_n^B f_n$. Persamaan itu mengirim kernel ke kernel dan citra d_{n-1}^A ke citra d_{n-1}^B . Untuk torus, $\delta_0 = 0$ dan δ_1 memiliki dua baris sama, yaitu $(-1, 1, 1)$.

Solusi Pemeriksaan 20.6. Jika $a \in \ker d_n^A$, komutativitas memberi

$$d_n^B f_n(a) = f_{n+1} d_n^A(a) = 0,$$

sehingga f_n membatasi ke peta $\ker d_n^A \rightarrow \ker d_n^B$. Jika $a = d_{n-1}^A(b)$, maka

$$f_n(a) = f_n d_{n-1}^A(b) = d_{n-1}^B f_{n-1}(b),$$

jadi citra dikirim ke citra. Oleh karena itu ada peta hasil bagi yang terdefinisi baik,

$$H^n(f): H^n(A_\bullet) \longrightarrow H^n(B_\bullet), \quad [a] \longmapsto [f_n(a)].$$

Untuk morfisma identitas, rumus ini adalah identitas. Jika $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$, maka pada setiap kelas

$$H^n(g \circ f)([a]) = [g_n f_n(a)] = H^n(g)(H^n(f)([a])),$$

sehingga $H^n(g \circ f) = H^n(g) \circ H^n(f)$. Ini membuktikan funktorisitas dan sekaligus menunjukkan bahwa komutativitas morfisma, bukan sekadar pemetaan modul derajat demi derajat, adalah syarat yang diperlukan.

Untuk torus, dengan basis (e_1, e_2, e_3) dan (f_1, f_2) ,

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{0} R^3 \xrightarrow{\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}} R^2 \longrightarrow 0.$$

Kernel peta terakhir adalah $\{(x, y, z) : -x + y + z = 0\} \cong R^2$, misalnya dengan parameter (y, z) dan $x = y + z$. Citra peta terakhir adalah diagonal $R(1, 1) \subset R^2$, karena $-x + y + z$ dapat berupa sembarang unsur R . Maka

$$H^0(T_\bullet; R) \cong R, \quad H^1(T_\bullet; R) \cong R^2, \quad H^2(T_\bullet; R) \cong R^2/R(1, 1) \cong R.$$

Semua suku kompleks di luar derajat 0, 1, 2 nol, sehingga $H^n(T_\bullet; R) = 0$ untuk $n < 0$ maupun $n \geq 3$. Pernyataan terakhir adalah konsekuensi dari grading $d_n : A_n \rightarrow A_{n+1}$ dan tidak boleh diganti dengan konvensi homologi yang menurunkan indeks.

Batas ke Unit 21. Notes.tex baris 4346 membuka lingkungan `rem`, lalu penanda Kuliah 21 muncul pada baris 4347 dan menutup catatan tersebut di unit berikutnya. Pembukaan itu tidak dipalsukan sebagai catatan lengkap di Unit 20; Unit 21 harus mengambilnya bersama isi dan penutupnya. Cursor sumber berikutnya yang aman adalah baris 4346.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts, © 2019 David Michael Roberts, tepatnya [Notes.tex baris 4346–4500](#) pada commit [b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#) dari repositori [DavidMichaelRoberts/AlgebraicTopology2019](#). Rentang aktif itu terdiri atas 155 baris fisik. Setelah dinormalisasi dengan LF dan mempertahankan baris kosong penutupnya, ukurannya 7.267 byte dan SHA-256-nya adalah `281ba27f0f52f35fd9842954c223546e84ce1a0909ee84c14b2081c38c11f150`. Kuliah 22 dimulai pada Notes.tex baris 4501, sehingga cursor berikutnya ialah baris 4501. Materi sumber dan adaptasi Indonesia ini tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#).

Perubahan edisi mencakup penerjemahan, pemformatan ulang, pemberian pengenalan stabil, dan pemindahan empat catatan pinggir ke urutan bacaan utama. Dua panel TikZ sumber ditulis ulang sebagai dua gambar semantik terpusat yang menyebutkan ruang ambien, titik sudut, sisi, dan persamaan afinnya; tidak ada makna yang bergantung pada posisi, ketebalan garis, atau warna. Edisi juga memperjelas derajat kohomologi yang nol, mengetik relasi pelekatan graf dan permukaan,

memperbaiki notasi pembentuk himpunan simpleks standar, serta membedakan orton nonnegatif dari orton positif.

Rentang sumber memuat tepat satu catatan, dua lingkungan konstruksi, tiga definisi, empat contoh, empat catatan pinggir, dua gambar TikZ, satu label sumber, lima tampilan $\backslash[\dots\backslash]$, satu `align*`, dua `cases`, dan satu `enumerate`. Tidak ada latihan sumber, lema, bukti, Xy-pic, sitasi, rujukan silang, gambar eksternal, `input`, atau `include`. Identifikasi geometrik $|\partial\Delta[3]| \cong S^2$ dan $|T_\bullet| \cong S^1 \times S^1$ ditandai jujur sebagai fakta geometrik standar yang disebut sumber; unit ini tidak menyamarkan keduanya sebagai teorema yang telah dibuktikan oleh sumber.

Enam pemeriksaan penguasaan, enam petunjuk, dan enam solusi lengkap merupakan materi asli edisi dan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen; edisi ini tidak disponsori, didukung, disahkan, ataupun diberi status resmi oleh David Michael Roberts atau institusinya. Produksi edisi ini dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**. Pernyataan ini menambah transparansi proses dan tidak mengurangi kredit penulis sumber ataupun kredit kontributor manusia.

21 Kuliah 21

21.1 Kohomologi permukaan kombinatorik

Catatan 21.1 (hubungan dengan Unit 20). Kuliah ini semula dimulai dengan rekap panjang Kuliah 20. Materi rekap tersebut telah dimasukkan ke Unit 20, sehingga kita dapat langsung melanjutkan dari kompleks permukaan kombinatorik.

Untuk permukaan kombinatorik $X_\bullet$ dan gelanggang komutatif berunsur satu R , kompleks

$$0 \longrightarrow R^{X_0} \xrightarrow{\delta_0} R^{X_1} \xrightarrow{\delta_1} R^{X_2} \longrightarrow 0$$

memberikan modul kohomologi

$$\begin{aligned} H^0(X_\bullet; R) &:= \ker \delta_0, \\ H^1(X_\bullet; R) &:= \frac{\ker \delta_1}{\operatorname{im} \delta_0}, \\ H^2(X_\bullet; R) &:= \frac{R^{X_2}}{\operatorname{im} \delta_1} = \operatorname{coker} \delta_1. \end{aligned}$$

Secara formal $H^n(X_\bullet; R)$ terdefinisi untuk setiap bilangan bulat n . Karena kompleks di atas hanya mempunyai suku pada derajat 0, 1, 2,

$$H^n(X_\bullet; R) = 0 \quad \text{untuk } n < 0 \text{ atau } n > 2.$$

Jika $X_2 = \emptyset$, maka $R^{X_2} = R^\emptyset = \{0\}$, sehingga $H^2(X_\bullet; R) = 0$.

Audit sumber 21.1. Notes.tex baris 4358–4360 mengatakan bahwa H^n terdefinisi untuk semua n , lalu menyebut “semuanya” modul nol. Yang dimaksud hanyalah derajat di luar 0, 1, 2; tiga derajat yang baru saja ditampilkan tidak nol pada umumnya. Edisi menyatakan rentang nol itu secara eksplisit.

Untuk torus kombinatorik $T_\bullet$ dan $R = \mathbb{Z}$, perhitungan Unit 20 memberikan

$$H^n(T_\bullet; \mathbb{Z}) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & n = 0, \\ \mathbb{Z}^2, & n = 1, \\ \mathbb{Z}, & n = 2, \\ 0, & n \notin \{0, 1, 2\}. \end{cases}$$

Namun $T_\bullet$ sendiri jelas bukan ruang topologis $S^1 \times S^1$: ia hanya data himpunan dan *face map*. Kita memerlukan cara mengubah data kombinatorik itu menjadi ruang topologis.

21.2 Dua upaya merealisasikan graf

Graf berarah $\partial\Delta[2]$ tampak seperti lingkaran. Secara topologis, kita dapat membuat lingkaran aktual dari tiga salinan interval $[0, 1]$ yang titik-titik ujungnya diidentifikasi sesuai insidensi graf. Gagasan ini disebut **realisasi geometrik**.

Konstruksi 21.1 (Upaya 1). Untuk graf berarah $X_1 \rightrightarrows X_0$, mula-mula kita mungkin mencoba hasil bagi

$$\left(\bigsqcup_{e \in X_1} I_e \right) / \sim,$$

dengan titik-titik ujung salinan interval diidentifikasi menurut insidensi sisi. Akan tetapi, konstruksi ini mempunyai dua masalah. Pertama, informasi insidensi sebenarnya disimpan oleh d_0, d_1 . Kedua, simpul terisolasi tidak muncul sama sekali karena tidak mengindeks salinan interval. Karena itu X_0 harus dimasukkan secara tersendiri.

Konstruksi 21.2 (Upaya 2). Ambil ruang diskret pada himpunan simpul dan lekatkan satu interval untuk setiap sisi. Dengan menulis $\Delta^0 = \{*\}$ dan $I = \Delta^1$, definisikan pemetaan titik ujung

$$\partial_0, \partial_1 : \Delta^0 \longrightarrow I, \quad \partial_0(*) = 1, \quad \partial_1(*) = 0.$$

Catatan pinggir sumber. Pemetaan ∂_0, ∂_1 dalam topologi ini dalam suatu arti “dual” terhadap fungsi titik ujung kombinatorik d_0, d_1 . Konvensinya serasi: $d_1(e)$ adalah sumber yang dilekatkan pada $0 = \partial_1(*)$, sedangkan $d_0(e)$ adalah target yang dilekatkan pada $1 = \partial_0(*)$.

Realisasi kandidat bagi graf adalah

$$\left(\bigsqcup_{v \in X_0} \{v\} \times \Delta^0 \sqcup \bigsqcup_{e \in X_1} \{e\} \times I \right) / \sim,$$

dengan relasi pembangkit

$$(e, \partial_i(*)) \sim (d_i(e), *) \quad (e \in X_1, i = 0, 1).$$

Jadi titik ujung ke- i dari interval berlabel e dilekatkan pada simpul berlabel $d_i(e)$. Simpul terisolasi tetap hadir melalui suku yang diindeks oleh X_0 .

Audit sumber 21.2. Notes.tex baris 4398–4400 memakai variabel v tanpa menyatakan bahwa ia adalah satu-satunya titik pada Δ^0 , dan kalimat berikutnya dapat dibaca seolah titik ujung dilekatkan pada sembarang simpul. Edisi memakai $*$ dan menulis relasi bertipe $(e, \partial_i*) \sim (d_i(e), *)$.

Konstruksi kasar ini segera digantikan oleh definisi yang lebih formal dan sistematis, tetapi ia telah menangkap gagasan pokoknya.

Contoh 21.1 (dua sisi berurutan). Ambil

$$X_0 = \{v_1, v_2, v_3\}, \quad X_1 = \{e_1, e_2\},$$

dengan

$$d_1(e_1) = v_1, \quad d_0(e_1) = v_2 = d_1(e_2), \quad d_0(e_2) = v_3.$$

Realisasi geometriknya homeomorfik dengan

$$(\{v_1, v_2, v_3\} \sqcup [0, 1] \sqcup [2, 3]) / \sim,$$

dengan

$$0 \sim v_1, \quad 1 \sim v_2 \sim 2, \quad 3 \sim v_3.$$

Maka

$$([0, 1] \sqcup [2, 3]) / (1 \sim 2) \cong [0, 2] \cong [0, 1].$$

21.3 Simpleks standar dan pemetaan inklusi

Untuk membuat konstruksi serupa bagi permukaan kombinatorik, kita memerlukan model topologis seragam bagi simpul, sisi, dan muka segitiga.

Definisi 21.1 (simpleks standar). *Simpleks- n standar* ialah subruang dari $\mathbb{R}^{n+1}$

$$\Delta^n := \left\{ (v_0, v_1, \dots, v_n) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid v_i \geq 0 \ (0 \leq i \leq n), \quad v_0 + \dots + v_n = 1 \right\}.$$

Untuk $0 \leq i \leq n+1$, pemetaan inklusi standar

$$\partial_i: \Delta^n \longrightarrow \Delta^{n+1}$$

didefinisikan dengan menyisipkan koordinat nol pada posisi ke- i :

$$\partial_i(v_0, \dots, v_n) = (v_0, \dots, v_{i-1}, 0, v_i, \dots, v_n).$$

Contoh 21.2 (dimensi nol, satu, dan dua). Simpleks-0 standar adalah satu titik,

$$\Delta^0 = \{(1)\} \subset \mathbb{R}.$$

Simpleks-1 standar adalah ruas garis

$$\Delta^1 = \{(v_0, v_1) \in \mathbb{R}^2 \mid v_0, v_1 \geq 0, \ v_0 + v_1 = 1\}.$$

Catatan pinggir sumber. Notes.tex menempatkan dua gambar berikut di margin: satu ruas Δ^1 pada bidang koordinat dan satu segitiga Δ^2 di bidang afin dalam $\mathbb{R}^3$. Keduanya direflow secara terpisah agar setiap titik sudut dan persamaan dapat dibaca tanpa posisi.

Diagram 21.1 (deskripsi semantik Δ^1). Di dalam $\mathbb{R}^2$, ruas Δ^1 menghubungkan titik sudut $(1, 0)$ dan $(0, 1)$ serta terdiri tepat atas titik $(t, 1 - t)$ untuk $0 \leq t \leq 1$. Gambar sumber menunjukkan ruas miring pada sumbu koordinat; kemiringannya tidak membawa informasi tambahan.

Simpleks-2 standar ialah perpotongan bidang $v_0 + v_1 + v_2 = 1$ dengan ortan **nonnegatif** di $\mathbb{R}^3$.

Diagram 21.2 (deskripsi semantik Δ^2). Simpleks ini adalah segitiga terisi dengan titik sudut

$$(1, 0, 0), \quad (0, 1, 0), \quad (0, 0, 1).$$

Ketiga sisinya diperoleh dengan membuat satu dari v_0, v_1, v_2 sama dengan nol. Garis bantu abu-abu pada gambar sumber hanya menunjukkan ruang ambien tiga dimensi; warna dan sudut pandang bukan bagian dari definisi.

Audit sumber 21.3. Rumus Δ^1 pada Notes.tex baris 4442 kehilangan tanda kurung tutup setelah pasangan koordinat, sehingga pembentuk himpunannya tidak bertipe. Edisi menulis $(v_0, v_1) \in \mathbb{R}^2$. Sumber juga menyebut “ortan positif”, padahal ketaksamaan $v_i \geq 0$ memasukkan batas; istilah yang tepat ialah ortan nonnegatif.

Contoh 21.3 (pemetaan inklusi muka). Dua pemetaan yang telah dipakai pada graf adalah

$$\partial_0, \partial_1: \Delta^0 \longrightarrow \Delta^1, \quad \partial_0(1) = (0, 1), \quad \partial_1(1) = (1, 0).$$

Sekarang terdapat tiga pemetaan $\partial_i: \Delta^1 \rightarrow \Delta^2$, $i = 0, 1, 2$, yaitu

$$\partial_i(v_0, v_1) = \begin{cases} (0, v_0, v_1), & i = 0, \\ (v_0, 0, v_1), & i = 1, \\ (v_0, v_1, 0), & i = 2. \end{cases}$$

Masing-masing mengidentifikasi Δ^1 dengan sisi Δ^2 yang koordinat ke- i -nya nol.

21.4 Realisasi geometrik dan triangulasi

Definisi 21.2 (realisasi geometrik). Realisasi geometrik permukaan kombinatorik $X_\bullet$ ialah ruang hasil bagi

$$|X_\bullet| := \left(\bigsqcup_{n=0}^2 \text{disc}(X_n) \times \Delta^n \right) / \sim,$$

dengan relasi ekuivalensi yang dibangkitkan oleh

$$(d_i(x), \mathbf{v}) \sim (x, \partial_i(\mathbf{v})),$$

untuk

$$x \in X_n, \quad \mathbf{v} \in \Delta^{n-1}, \quad 1 \leq n \leq 2, \quad 0 \leq i \leq n.$$

Di ruas kiri, $(d_i(x), \mathbf{v})$ berada pada salinan $\{d_i(x)\} \times \Delta^{n-1}$; di ruas kanan, $(x, \partial_i \mathbf{v})$ berada pada batas salinan $\{x\} \times \Delta^n$.

Audit sumber 21.4. Notes.tex baris 4466–4467 menulis relasi pelekatan tanpa mengetik x , $\mathbf{v}$, n , dan i . Edisi menambahkan seluruh domain dan rentangnya, sehingga kedua ruas relasi memang berada di koproduk yang didefinisikan.

Sebagai contoh utama,

$$\begin{aligned} |\Delta[2]| &= \left((\Delta^0 \sqcup \Delta^0 \sqcup \Delta^0) \sqcup (\Delta^1 \sqcup \Delta^1 \sqcup \Delta^1) \sqcup \Delta^2 \right) / \sim \\ &\cong (\partial \Delta^2 \sqcup \Delta^2) / \sim \cong \Delta^2. \end{aligned}$$

Catatan pinggir sumber. Dalam dimensi lebih rendah berlaku pula $|\Delta[1]| \cong \Delta^1$ dan $|\Delta[0]| \cong \Delta^0$.

Untuk definisi berikut, kata “permukaan” dipakai secara sengaja dalam arti luas: sedikitnya mencakup manifold topologis berdimensi paling tinggi dua dan juga ruang berdimensi campuran, misalnya gabungan saling lepas sebuah lingkaran dan sebuah torus. Yang penting, “permukaan” di sini adalah ruang topologis, bukan objek kombinatorik.

Definisi 21.3 (triangulasi). Sebuah *triangulasi* dari permukaan Σ ialah permukaan kombinatorik $X_\bullet$ yang dilengkapi dengan homeomorfisma

$$\tau: \Sigma \xrightarrow{\cong} |X_\bullet|.$$

Catatan pinggir sumber. Dalam pembahasan selanjutnya, homeomorfisma τ biasanya dibiarkan implisit. Namun triangulasi mencakup pilihan atau setidaknya data keberadaan homeomorfisma itu; ia bukan sekadar daftar sel.

Contoh 21.4 (triangulasi dasar). Sumber mencatat contoh-contoh berikut.

1. Δ^2 ditriangulasi oleh $\Delta[2]$.
2. Lebih umum, $|X_\bullet|$ ditriangulasi oleh $X_\bullet$.
3. S^2 ditriangulasi oleh $\partial\Delta[3]$.
4. S^1 ditriangulasi oleh $\partial\Delta[2]$, oleh setiap graf berarah berbentuk poligon, dan bahkan oleh graf dengan satu simpul serta satu sisi gelang.
5. $S^1 \times S^1$ ditriangulasi oleh torus kombinatorik $T_\bullet$.

Butir 3 dan 5 menggunakan identifikasi geometrik standar: batas tetrahedron homeomorfik dengan S^2 , sedangkan persegi yang sisi berhadapannya dilekatkan dan dibagi oleh satu diagonal merealisasikan torus. Sumber menyebutkan fakta itu tanpa bukti di rentang ini; edisi mempertahankan status tersebut secara jujur.

Audit sumber 21.5. Edisi memperbaiki salah eja dan tata bahasa deterministik pada Notes.tex baris 4379, 4403, 4414, dan 4451 (“We” tanpa tanda baca, **superceded**, “how do so”, dan **imporantly**). Pada definisi triangulasi, simbol samar $\simeq$ diganti dengan homeomorfisma bertipe eksplisit karena itulah data yang disebut dalam prosa sumber.

Pendamping penguasaan: pemeriksaan, petunjuk, dan solusi lengkap

Enam paket berikut adalah materi asli edisi. Semuanya terbatas pada sasaran beku Unit 21: kohomologi kompleks yang terpotong, realisasi graf, simpleks dan pemetaan inklusinya, relasi pelekatan, serta perbedaan antara data kombinatorik dan ruang yang ditriangulasi.

Pemeriksaan Penguasaan 21.1 (derajat kohomologi). Misalkan

$$0 \longrightarrow R^{X_0} \xrightarrow{\delta_0} R^{X_1} \xrightarrow{\delta_1} R^{X_2} \longrightarrow 0$$

adalah kompleks permukaan kombinatorik. Turunkan rumus H^n untuk semua $n \in \mathbb{Z}$. Kemudian buktikan bahwa $X_2 = \emptyset$ memaksa $H^2 = 0$, tetapi, untuk gelanggang koefisien taknol, tidak memaksa H^0 atau H^1 nol.

Petunjuk. Perpanjang kompleks dengan modul nol pada semua derajat di luar 0, 1, 2. Ingat bahwa $R^\emptyset$ adalah modul nol. Untuk klaim terakhir, gunakan graf satu simpul dengan satu sisi gelang.

Solusi Pemeriksaan 21.1. Tuliskan $A_n = 0$ untuk $n < 0$ dan $n > 2$, $A_n = R^{X_n}$ untuk $0 \leq n \leq 2$. Diferensial sebelum A_0 dan sesudah A_2 adalah peta nol. Maka

$$\begin{aligned} H^0 &= \ker(\delta_0)/\text{im}(0) = \ker \delta_0, \\ H^1 &= \ker \delta_1/\text{im} \delta_0, \\ H^2 &= \ker(0: R^{X_2} \rightarrow 0)/\text{im} \delta_1 = R^{X_2}/\text{im} \delta_1. \end{aligned}$$

Jika $n < 0$ atau $n > 2$, pembilang dan penyebut berada pada modul nol, jadi $H^n = 0$. Bila $X_2 = \emptyset$, hanya ada satu fungsi $\emptyset \rightarrow R$, yaitu fungsi nol; karena itu $R^{X_2} = 0$ dan $H^2 = 0$.

Sebagai contoh tandingan bagi dua derajat lain, ambil gelanggang taknol, misalnya $R = \mathbb{Z}$, lalu satu simpul v dan satu sisi gelang e dengan $d_0(e) = d_1(e) = v$. Maka

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{0} R \longrightarrow 0,$$

sehingga $H^0 \cong R$ dan $H^1 \cong R$, walaupun $X_2 = \emptyset$.

Pemeriksaan Penguasaan 21.2 (graf dengan komponen terisolasi). Ambil graf dengan simpul a, b, c, z , sisi $p: a \rightarrow b$ dan $q: b \rightarrow c$, serta simpul terisolasi z . Bangun realisasi geometriknya langsung dari Upaya 2 dan tentukan tipe homeomorfismanya.

Petunjuk. Petakan salinan interval untuk p secara linear ke $[0, \frac{1}{2}]$ dan salinan untuk q ke $[\frac{1}{2}, 1]$. Simpul z tidak terlibat dalam satu pun relasi pelekatan.

Solusi Pemeriksaan 21.2. Sebelum mengambil hasil bagi, ruangnya ialah

$$\{a, b, c, z\} \sqcup I_p \sqcup I_q.$$

Relasinya adalah

$$(p, 0) \sim a, \quad (p, 1) \sim b, \quad (q, 0) \sim b, \quad (q, 1) \sim c.$$

Definisikan pemetaan dari ruang sebelum hasil bagi ke $[0, 1] \sqcup \{z\}$ dengan

$$(p, t) \mapsto \frac{t}{2}, \quad (q, t) \mapsto \frac{1+t}{2},$$

dan $a \mapsto 0$, $b \mapsto \frac{1}{2}$, $c \mapsto 1$, sementara z dipetakan ke komponen titik tersendiri. Pemetaan itu konstan tepat pada kelas-kelas relasi di atas, sehingga turun menjadi bijeksi kontinu dari hasil bagi. Domainnya kompak dan kodomainnya Hausdorff, maka bijeksi tersebut homeomorfisma. Jadi

$$|X_\bullet| \cong [0, 1] \sqcup \{z\}.$$

Inilah alasan Upaya 1 gagal: tanpa suku X_0 , komponen $\{z\}$ akan hilang.

Pemeriksaan Penguasaan 21.3 (identitas pemetaan inklusi). Buktikan bahwa pemetaan penyisipan nol memenuhi

$$\partial_j \circ \partial_i = \partial_i \circ \partial_{j-1} \quad (0 \leq i < j \leq n+2).$$

Periksa secara eksplisit ketiga kasus dari Δ^0 ke Δ^2 dan jelaskan mengapa identitas ini cocok dengan identitas *face map* pada permukaan kombinatorik.

Petunjuk. Kedua komposit menyisipkan nol pada dua posisi yang sama. Untuk $n = 0$, pasangan (i, j) adalah $(0, 1)$, $(0, 2)$, dan $(1, 2)$.

Solusi Pemeriksaan 21.3. Ambil $\mathbf{v} = (v_0, \dots, v_n)$. Komposit kiri mula-mula menyisipkan nol pada posisi i . Karena $i < j$, penyisipan kedua pada posisi j tidak mengubah posisi nol pertama. Komposit kanan mula-mula menyisipkan nol pada posisi $j - 1$, lalu menyisipkan nol pada posisi i ; penyisipan kedua menggeser nol pertama dari posisi $j - 1$ ke j . Jadi kedua hasil mempunyai koordinat nol pada posisi i dan j , dengan koordinat $\mathbf{v}$ yang lain tetap berurutan. Ini membuktikan identitas.

Untuk titik tunggal $(1) \in \Delta^0$,

(i, j)	$\partial_j \partial_i(1)$	$\partial_i \partial_{j-1}(1)$
$(0, 1)$	$(0, 0, 1)$	$(0, 0, 1)$
$(0, 2)$	$(0, 1, 0)$	$(0, 1, 0)$
$(1, 2)$	$(1, 0, 0)$	$(1, 0, 0)$

Pemetaan d_i menghapus muka kombinatorik, sedangkan ∂_i memasukkan muka topologis sebagai koordinat ke- i nol. Identitas keduanya berarah dual: dua cara menuju muka kodimensi dua menghasilkan bagian yang sama. Karena itu relasi realisasi tidak bergantung pada urutan pelekatan.

Pemeriksaan Penguasaan 21.4 (realisasi satu segitiga). Bangun pemetaan kanonik

$$|\Delta[2]| \longrightarrow \Delta^2$$

dari definisi hasil bagi dan buktikan bahwa ia homeomorfisma. Sertakan peran tiga simpul dan tiga sisi dalam relasi pelekatan.

Petunjuk. Pada salinan Δ^2 yang diindeks oleh muka tunggal, gunakan identitas. Pada setiap salinan Δ^1 , gunakan ∂_i yang sesuai; pada setiap Δ^0 , gunakan titik sudut terkait. Lalu gunakan sifat universal hasil bagi dan argumen kompak-ke-Hausdorff.

Solusi Pemeriksaan 21.4. Misalkan f muka tunggal, $e_i = d_i(f)$, dan v_j ketiga simpul. Pada komponen $\{f\} \times \Delta^2$, definisikan $F(f, \mathbf{v}) = \mathbf{v}$. Pada komponen $\{e_i\} \times \Delta^1$, definisikan

$$F(e_i, \mathbf{u}) = \partial_i(\mathbf{u}),$$

dan pada komponen simpul, kirim v_j ke titik sudut standar ke- j . Identitas pemetaan inklusi dari Pemeriksaan 21.3 memastikan bahwa nilai pada titik ujung setiap sisi sama dengan nilai pada simpul yang ditempelkan. Demikian pula,

$$F(d_i(f), \mathbf{u}) = \partial_i(\mathbf{u}) = F(f, \partial_i \mathbf{u}),$$

jadi F konstan pada relasi pembangkit. Ia turun menjadi pemetaan kontinu

$$\overline{F}: |\Delta[2]| \longrightarrow \Delta^2.$$

Pemetaan ini surjektif karena komponen muka dipetakan dengan identitas. Setiap titik pada komponen sisi atau simpul telah diidentifikasi dengan titik yang sama pada batas komponen muka; karena itu tidak ada kelas tambahan dan $\overline{F}$ injektif. Ruang sebelum hasil bagi adalah gabungan berhingga ruang kompak, sehingga hasil baginya kompak; Δ^2 Hausdorff. Bijeksi kontinu kompak-ke-Hausdorff adalah homeomorfisma. Jadi $|\Delta[2]| \cong \Delta^2$.

Pemeriksaan Penguasaan 21.5 (dua triangulasi lingkaran). Buktikan bahwa graf satu simpul dan satu sisi gelang merealisasikan S^1 . Kemudian buktikan hal yang sama bagi graf poligon berarah dengan $m \geq 2$ sisi, tanpa mengasumsikan semua orientasi sisinya seragam.

Petunjuk. Kasus satu gelang adalah $I/(0 \sim 1)$. Untuk poligon, orientasi hanya menentukan titik ujung interval mana yang bernama 0 atau 1; ia tidak mengubah ruang hasil bagi tak berarah yang diperoleh setelah semua titik ujung ditempelkan secara siklik.

Solusi Pemeriksaan 21.5. Untuk satu simpul v dan satu sisi e dengan $d_0(e) = d_1(e) = v$, definisi memberi

$$|X_\bullet| = (\{v\} \sqcup I_e) / ((e, 0) \sim v \sim (e, 1)) \cong I/(0 \sim 1).$$

Pemetaan $t \mapsto e^{2\pi it}$ dari I ke S^1 mengidentifikasi tepat titik ujungnya dan menginduksi homeomorfisma $I/(0 \sim 1) \cong S^1$.

Untuk poligon dengan simpul siklik $v_0, \dots, v_{m-1}$, setiap sisi menghubungkan v_k dan v_{k+1} , dengan indeks modulo m . Pilih homeomorfisma dari salinan interval sisi itu ke busur

$$\left\{ e^{2\pi it} : \frac{k}{m} \leq t \leq \frac{k+1}{m} \right\}.$$

Jika orientasi sisi berlawanan dengan arah parameter lingkaran, gunakan $t \mapsto 1 - t$ pada interval tersebut. Nilai pada titik ujung tetap cocok dengan simpul yang ditentukan oleh d_0, d_1 , sehingga pemetaan-pemetaan busur turun menjadi bijeksi kontinu dari realisasi ke S^1 . Lagi-lagi domain kompak dan S^1 Hausdorff, jadi bijeksi itu homeomorfisma. Dengan demikian orientasi kombinatorik tidak mengubah tipe homeomorfisma realisasinya.

Pemeriksaan Penguasaan 21.6 (data kombinatorik versus ruang). Jelaskan perbedaan antara $X_\bullet$, $|X_\bullet|$, dan triangulasi $\tau: \Sigma \cong |X_\bullet|$. Lalu hitung karakteristik Euler dari $\partial\Delta[3]$ dan $T_\bullet$, dan jelaskan secara logis apa yang dibuktikan—serta apa yang tidak dibuktikan—oleh kedua hitungan itu.

Petunjuk. Batas tetrahedron mempunyai 4 simpul, 6 sisi, dan 4 muka; torus kombinatorik Unit 20 mempunyai 1, 3, dan 2. Karakteristik Euler adalah invarian yang perlu dilestarikan oleh homeomorfisma, tetapi kesamaan nilainya bukan bukti homeomorfisma pada kelas ruang sembarang.

Solusi Pemeriksaan 21.6. Objek $X_\bullet$ adalah data kombinatorik: tiga himpunan X_0, X_1, X_2 beserta *face map*. Realisasi $|X_\bullet|$ adalah ruang topologis yang diperoleh dengan mengganti setiap elemen X_n oleh salinan Δ^n lalu melekatkan muka-mukanya. Sebuah triangulasi dari Σ menambahkan data geometrik

$$\tau: \Sigma \xrightarrow{\cong} |X_\bullet|.$$

Jadi $X_\bullet$ tidak boleh disamakan secara literal dengan ruang Σ .

Untuk batas tetrahedron,

$$\chi(\partial\Delta[3]) = 4 - 6 + 4 = 2.$$

Untuk torus kombinatorik,

$$\chi(T_\bullet) = 1 - 3 + 2 = 0.$$

Hitungan itu membuktikan nilai karakteristik Euler dari kedua kompleks berhingga. Nilai tersebut konsisten dengan $\chi(S^2) = 2$ dan $\chi(S^1 \times S^1) = 0$, sehingga tidak membantah identifikasi geometrik yang diklaim. Namun hitungan Euler saja tidak membangun homeomorfisma: banyak ruang yang tidak homeomorfik dapat mempunyai karakteristik Euler sama. Untuk menyebut $X_\bullet$ triangulasi dari Σ , masih diperlukan homeomorfisma τ . Dalam contoh sumber, homeomorfisma batas tetrahedron

dengan sfera dan homeomorfisma model persegi bersegi-diagonal dengan torus adalah fakta geometrik tambahan, bukan konsekuensi dari bilangan Euler saja.

Batas ke Unit 22. Notes.tex baris 4501 memulai Kuliah 22 dengan kalimat tentang perilaku functorial dan pemetaan permukaan kombinatorik. Tidak ada lingkungan sumber yang terbelah pada batas ini. Kursor sumber berikutnya yang aman adalah baris 4501.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts, © 2019 David Michael Roberts, tepatnya [Notes.tex baris 4501–4938 pada commit b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#) dari repositori [DavidMichaelRoberts/AlgebraicTopology2019](#). Rentang aktif itu terdiri atas 438 baris fisik. Setelah dinormalisasi dengan LF dan mempertahankan baris kosong penutupnya, ukurannya 20.585 byte dan SHA-256-nya adalah 86275c590cfcdf8519d3ce8d077fc48619bb94c3fdf039ca805ae4b7df995b7f. Kuliah 23 dimulai pada Notes.tex baris 4939, sehingga kursor berikutnya ialah baris 4939. Materi sumber dan adaptasi Indonesia ini tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#).

Perubahan edisi mencakup penerjemahan, pemformatan ulang, pemberian pengenalan stabil, dan pemindahan lima catatan pinggir ke urutan bacaan utama. Dua gambar TikZ dan tiga hubungan Xy-pic sumber ditulis ulang sebagai lima diagram semantik terpusat. Setiap diagram menyatakan simpul, sisi, muka, arah, atau komutativitasnya dengan teks dan rumus; tidak ada makna yang bergantung pada posisi, warna, atau ketebalan garis.

Rentang sumber memuat tepat enam definisi, sebelas contoh, lima lema, tiga bukti, tiga catatan, lima catatan pinggir, dua TikZ, tiga Xy-pic, dua label, satu rujukan silang, delapan tampilan `\[...\]`, empat `align*`, satu `cases`, dan satu lingkungan `center`. Tidak ada latihan sumber, konstruksi, `enumerate`, `align` tanpa bintang, sitasi, gambar eksternal, `input`, atau `include`.

Edisi memperbaiki beberapa persoalan sumber yang memengaruhi tipe atau kebenaran: pemetaan nama sebuah simpleks tidak selalu merupakan inklusi; relasi realisasi dan persamaan morfisma diberi tipe lengkap; dimensi tak hingga dibedakan dari himpunan- Δ kosong; pemetaan kanonik $|\Delta[n]| \rightarrow \Delta^n$ ditulis dengan indeks yang benar; dan diferensial korantai memakai semua $n + 2$ muka, bukan hanya $n + 1$ muka. Klaim keterhinggaan generator diberi hipotesis Noetherian, sedangkan klaim kisi untuk perubahan koefisien $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ dibatasi pada himpunan- Δ berhingga. Bukti yang oleh sumber hanya disebut “latihan” diselesaikan secara lengkap.

Enam pemeriksaan penguasaan, enam petunjuk, dan enam solusi lengkap merupakan materi asli edisi dan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen; edisi ini tidak disponsori, didukung, disahkan, ataupun diberi status resmi oleh David Michael Roberts atau institusinya. Produksi edisi ini dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**. Pernyataan ini menambah transparansi proses dan tidak mengurangi kredit penulis sumber ataupun kredit kontributor manusia.

22 Kuliah 22

22.1 Pemetaan permukaan kombinatorik

Pada akhirnya kita menginginkan perilaku functorial. Karena itu kita mulai dengan pemetaan yang mengirim simpul ke simpul, sisi ke sisi, dan segitiga ke segitiga secara kompatibel.

Definisi 22.1 (pemetaan permukaan kombinatorik). Untuk permukaan kombinatorik $X_\bullet$ dan $Y_\bullet$, sebuah pemetaan $f: X_\bullet \rightarrow Y_\bullet$ adalah tiga fungsi

$$f_n: X_n \longrightarrow Y_n \quad (n = 0, 1, 2)$$

yang memenuhi

$$d_{i,Y}^m \circ f_n = f_{n-1} \circ d_{i,X}^m \quad (1 \leq n \leq 2, 0 \leq i \leq n).$$

Dengan kata lain, mengambil muka lalu memetakan memberi hasil yang sama dengan memetakan lalu mengambil muka yang bersesuaian.

Pemetaan seperti ini sangat kaku. Banyak fungsi kontinu yang tampak wajar antara realisasi tidak berasal dari pemetaan antara triangulasi yang telah dipilih. Definisi itu juga mencakup pemetaan graf berarah bila himpunan segitiga domain dan kodomain kosong, serta pemetaan dari graf berarah ke permukaan kombinatorik yang mempunyai segitiga.

Contoh 22.1 (inklusi 1-kerangka). Untuk setiap permukaan kombinatorik $X_\bullet$ terdapat pemetaan

$$\text{sk}_1 X_\bullet \longrightarrow X_\bullet$$

yang merupakan identitas pada X_0 dan X_1 , sedangkan komponen derajat duanya adalah satu-satunya fungsi

$$(\text{sk}_1 X_\bullet)_2 = \emptyset \longrightarrow X_2.$$

Contoh 22.2 (menamai sebuah segitiga). Setelah memilih $x \in X_2$, ada pemetaan kanonik

$$\lceil x \rceil: \Delta[2] \longrightarrow X_\bullet$$

yang mengirim muka puncak tunggal ke x dan setiap muka bawah ke muka bersesuaian dari x . Untuk sebuah muka segitiga pada $\partial\Delta[3]$, pemetaan ini memang merupakan inklusi $\Delta[2] \hookrightarrow \partial\Delta[3]$. Pada permukaan kombinatorik umum, beberapa muka x dapat teridentifikasi, sehingga pemetaan nama itu tidak harus injektif.

Audit sumber 22.1. Notes.tex baris 4522–4523 mengatakan tanpa syarat bahwa sebuah segitiga dapat “diinklusi” ke $X_\bullet$. Yang tersedia secara kanonik ialah pemetaan nama setelah memilih $x \in X_2$; ia hanya merupakan inklusi bila muka-muka x tidak teridentifikasi. Edisi menyatakan pilihan dan perbedaan itu secara eksplisit.

Contoh 22.3 (poligon dan garis menuju satu gelang). Misalkan $L_\bullet$ adalah graf berarah dengan satu simpul v dan satu sisi gelang e . Jika $P_\bullet$ adalah graf poligonal berarah, terdapat pemetaan

$$P_\bullet \longrightarrow L_\bullet$$

yang mengirim semua simpul ke v dan semua sisi ke e .

Catatan pinggir sumber. Graf poligonal berarah adalah graf berarah berhingga dengan banyak simpul sama dengan banyak sisi. Simpul-simpulnya diurutkan secara siklik, dan setiap dua simpul bersebelahan dihubungkan oleh satu sisi dengan salah satu dari dua orientasi.

Ada pula graf tak hingga $R_\bullet$ dengan simpul v_k , $k \in \mathbb{Z}$, dan sisi $r_k: v_k \rightarrow v_{k+1}$. Realisasinya homeomorfik dengan $\mathbb{R}$, dan pemetaan $R_\bullet \rightarrow L_\bullet$ sekali lagi mengirim semua simpul ke v dan semua sisi ke e .

Contoh 22.4 (silinder kombinatorik tak hingga). Definisikan $C_\bullet$ dengan

$$C_0 = \{v_i \mid i \in \mathbb{Z}\}, \quad C_1 = \{e_{1i}, e_{2i}, e_{3i} \mid i \in \mathbb{Z}\},$$

dan

$$C_2 = \{f_{1i}, f_{2i} \mid i \in \mathbb{Z}\}.$$

Data titik ujungnya ialah

	d_1^1	d_0^1
e_{1i}	v_i	v_i
e_{2i}	v_i	v_{i+1}
e_{3i}	v_{i+1}	v_i

dan data muka dua dimensinya ialah

	d_0^2	d_1^2	d_2^2
f_{1i}	e_{3i}	e_{1i}	e_{2i}
f_{2i}	e_{2i}	$e_{1,i+1}$	e_{3i}

Diagram 22.1 (deskripsi semantik silinder tak hingga). Untuk setiap i , satu persegi antara v_i dan v_{i+1} mempunyai sisi vertikal gelang e_{1i} di kiri dan $e_{1,i+1}$ di kanan, sisi horizontal e_{2i} dari v_i ke v_{i+1} pada kedua batas lingkarannya, dan diagonal e_{3i} dari v_{i+1} kembali ke v_i . Diagonal itu membagi persegi menjadi f_{1i} dan f_{2i} . Persegi-persegi berlanjut untuk semua $i \in \mathbb{Z}$; garis bertitik pada gambar sumber hanya menandakan kelanjutan tak hingga. Tabel di atas, bukan letak atau arah visual panah, adalah data yang menentukan objek.

Ada pemetaan ke torus kombinatorik $T_\bullet$ dari Unit 20,

$$q: C_\bullet \longrightarrow T_\bullet, \quad v_i \longmapsto v, \quad e_{ai} \longmapsto e_a, \quad f_{bi} \longmapsto f_b,$$

dengan $a = 1, 2, 3$ dan $b = 1, 2$.

Audit sumber 22.2. Gambar pada Notes.tex baris 4543–4594 direflow menjadi Diagram 22.1 dengan seluruh arah dan indeks tertulis. Baris 4598 mengatakan bahwa *face map* silinder dapat direkonstruksi hanya dari definisi pemetaan q . Sebenarnya q sendiri tidak menentukan pilihan lift berindeks; tabel di atas merekam lift periodik yang ditentukan oleh diagram dan yang membuat q sebuah pemetaan permukaan kombinatorik.

Lema 22.1 (realisasi bersifat fungtorial dalam dimensi dua). Sebuah pemetaan $f: X_\bullet \rightarrow Y_\bullet$ antara permukaan kombinatorik menginduksi pemetaan kontinu

$$|f|: |X_\bullet| \longrightarrow |Y_\bullet|,$$

dan konstruksi ini melestarikan identitas serta komposisi.

Bukti. Pada ruang sebelum hasil bagi, definisikan

$$|\widetilde{f}| := \bigsqcup_{n=0}^2 (f_n \times \text{id}_{\Delta^n}): \bigsqcup_{n=0}^2 \text{disc}(X_n) \times \Delta^n \longrightarrow \bigsqcup_{n=0}^2 \text{disc}(Y_n) \times \Delta^n.$$

Ambil $x \in X_n$, $\mathbf{v} \in \Delta^{n-1}$, $1 \leq n \leq 2$, dan $0 \leq i \leq n$. Relasi pada realisasi domain dan kodomain memberi

$$\begin{aligned}
|\widetilde{f}|(x, \partial_i \mathbf{v}) &= (f_n(x), \partial_i \mathbf{v}) \\
&\sim (d_{i,Y}^n f_n(x), \mathbf{v}) \\
&= (f_{n-1} d_{i,X}^n(x), \mathbf{v}) \\
&= |\widetilde{f}|(d_{i,X}^n(x), \mathbf{v}).
\end{aligned}$$

Jadi $|\widetilde{f}|$ konstan pada kelas-kelas relasi pembangkit dan, oleh sifat universal hasil bagi, turun secara unik menjadi $|f|$.

Diagram 22.2 (kuadrat hasil bagi yang komutatif). Jika Q_X dan Q_Y menyatakan dua koproduk sebelum hasil bagi, hubungan empat pemetaan adalah

$$\begin{array}{ccc}
Q_X & \xrightarrow{|\widetilde{f}|} & Q_Y \\
\downarrow & & \downarrow \\
|X_\bullet| & \xrightarrow{|f|} & |Y_\bullet|.
\end{array}$$

Kedua lintasan dari Q_X ke $|Y_\bullet|$ sama. Panah vertikal adalah pemetaan hasil bagi; posisi panah tidak menambahkan asumsi apa pun.

Untuk pemetaan identitas, pemetaan pada setiap komponen sebelum hasil bagi adalah identitas, sehingga keunikan memberi $|\text{id}| = \text{id}$. Untuk pasangan yang dapat dikomposisikan $X_\bullet \xrightarrow{f} Y_\bullet \xrightarrow{g} Z_\bullet$, kedua pemetaan $|g \circ f|$ dan $|g| \circ |f|$ mempunyai lift komponen-demi-komponen yang sama, maka keunikan memberi

$$|g \circ f| = |g| \circ |f|.$$

Dengan demikian konstruksi itu funtorial. $\square$

Audit sumber 22.3. Notes.tex baris 4608–4632 mengetik ulang pemetaan prahasil-bagi secara ambigu sebagai $: =$ dan menyimpulkan funtorialitas hanya dari komposisi. Edisi menulis domain, indeks, dan relasi secara lengkap, lalu memeriksa identitas dan komposisi. Kuadrat Xy-pic sumber diganti oleh Diagram 22.2 yang menyatakan komutativitasnya secara linear.

Untuk Contoh 22.4, sumber menyatakan identifikasi geometrik standar

$$|C_\bullet| \cong \mathbb{R} \times S^1, \quad |T_\bullet| \cong S^1 \times S^1.$$

Di bawah identifikasi itu, $|q|$ adalah

$$\exp \times \text{id}: \mathbb{R} \times S^1 \longrightarrow S^1 \times S^1, \quad \exp(t) = e^{2\pi i t}.$$

Sumber tidak membuktikan homeomorfisma silinder tersebut di rentang ini; edisi mempertahankannya sebagai fakta geometrik standar dan menguji data kombinatoriknya dalam Pemeriksaan Penguasaan 22.1.

Jika ruang topologis Σ ditriangulasi oleh $\Sigma \cong |X_\bullet|$, kita mungkin mencoba mendefinisikan $H^n(\Sigma; R) := H^n(X_\bullet; R)$. Ini definisi yang buruk untuk ruang tanpa triangulasi terpilih: belum ada jaminan bahwa pilihan triangulasi berbeda memberi modul yang sama, dan hanya pemetaan kontinu yang direalisasikan oleh pemetaan kombinatorik yang menghasilkan pemetaan kohomologi dengan cara ini.

Catatan pinggir sumber. Fungtorialitas modul kohomologi terhadap pemetaan permukaan kombinatorik akan tercakup oleh definisi yang diberikan kemudian. Catatan ini bukan klaim bahwa semua pemetaan kontinu sudah ditangani oleh model dua dimensi tersebut.

Kita juga tidak ingin membatasi topologi pada permukaan. Definisi berikut memperluas data kombinatorik ke semua dimensi.

22.2 Himpunan-Delta dan kerangka

Definisi 22.2 (himpunan- Δ). Sebuah *himpunan- Δ* adalah barisan himpunan

$$X_0, X_1, X_2, \dots$$

yang elemennya disebut simpleks- n , bersama *face map*

$$d_i^n: X_n \longrightarrow X_{n-1} \quad (n > 0, 0 \leq i \leq n),$$

yang memenuhi identitas muka

$$d_i^{n-1} \circ d_j^n = d_{j-1}^{n-1} \circ d_i^n \quad (0 \leq i < j \leq n).$$

Superskrip boleh dihilangkan bila dimensinya dapat dibaca dari domain dan kodomain.

Contoh 22.5 (simpleks kombinatorik $\Delta[n]$). Tuliskan

$$\mathbf{n} + \mathbf{1} := \{0, 1, \dots, n\}.$$

Simpleks kombinatorik $\Delta[n]$ mempunyai

$$\Delta[n]_k = \begin{cases} \binom{\mathbf{n} + \mathbf{1}}{k + 1}, & 0 \leq k \leq n, \\ \emptyset, & k > n, \end{cases}$$

di mana $\binom{\mathbf{n} + \mathbf{1}}{k + 1}$ adalah himpunan semua subhimpunan beranggota $k + 1$. Khususnya,

$$\Delta[n]_0 = \mathbf{n} + \mathbf{1}, \quad \Delta[n]_n = \{\mathbf{n} + \mathbf{1}\}.$$

Setiap subhimpunan diberi urutan warisan dari $0 < 1 < \dots < n$. Pemetaan

$$d_i^k: \binom{\mathbf{n} + \mathbf{1}}{k + 1} \longrightarrow \binom{\mathbf{n} + \mathbf{1}}{k}$$

menghapus elemen ke- i , dengan indeks dimulai dari 0.

Contoh 22.6 (batas simpleks kombinatorik). Batas $\partial\Delta[n]$ didefinisikan oleh

$$\partial\Delta[n]_k = \begin{cases} \Delta[n]_k, & k < n, \\ \emptyset, & k \geq n. \end{cases}$$

Jadi $\partial\Delta[3]$ mempunyai simpul, sisi, dan segitiga, tetapi tidak mempunyai simpleks tiga dimensi yang mengisi batas itu.

Untuk setiap himpunan- Δ $X_\bullet$ dan $m \geq 0$, m -kerangka $\text{sk}_m X_\bullet$ diberikan oleh

$$(\text{sk}_m X_\bullet)_k = \begin{cases} X_k, & k \leq m, \\ \emptyset, & k > m. \end{cases}$$

Jika $X_n \neq \emptyset$, maka penerapan *face map* menunjukkan $X_m \neq \emptyset$ untuk setiap $0 \leq m < n$. Himpunan- Δ takkosong disebut berdimensi n bila n adalah bilangan bulat terbesar dengan $X_n \neq \emptyset$, dan disebut berdimensi tak hingga bila $X_n \neq \emptyset$ untuk bilangan n yang tak terbatas. Himpunan- Δ kosong tidak dimasukkan ke salah satu dari dua kasus itu; jika diperlukan, dimensinya dapat dikonvensikan sebagai -1 .

Jika $X_\bullet$ berdimensi n dan $0 \leq m < n$, atau bila ia berdimensi tak hingga, maka $\text{sk}_m X_\bullet$ berdimensi m . Jadi $\Delta[n]$ berdimensi n dan

$$\partial\Delta[n] = \text{sk}_{n-1} \Delta[n]$$

berdimensi $n - 1$. Permukaan kombinatorik dari Unit 20 adalah himpunan- Δ berdimensi paling tinggi dua.

Audit sumber 22.4. Notes.tex baris 4693–4695 menyebut objek berdimensi tak hingga bila tidak ada dimensi terbesar. Secara literal itu juga mencakup objek kosong, yang tidak mempunyai simpleks pada dimensi mana pun. Edisi membedakan kasus kosong dari kasus dimensi yang tak terbatas. Salah eja `defintitions` pada baris 4700 juga dinormalisasi dalam terjemahan.

22.3 Realisasi dan triangulasi dalam semua dimensi

Definisi 22.3 (realisasi geometrik umum). Realisasi geometrik sebuah himpunan- Δ $X_\bullet$ adalah ruang hasil bagi

$$|X_\bullet| := \left(\bigsqcup_{n=0}^{\infty} \text{disc}(X_n) \times \Delta^n \right) / \sim,$$

dengan relasi yang dibangkitkan oleh

$$(d_i^n(x), \mathbf{v}) \sim (x, \partial_i \mathbf{v}),$$

untuk

$$x \in X_n, \quad \mathbf{v} \in \Delta^{n-1}, \quad n \geq 1, \quad 0 \leq i \leq n.$$

Definisi 22.4 (pemetaan himpunan- Δ). Sebuah pemetaan $f: X_\bullet \rightarrow Y_\bullet$ adalah barisan fungsi

$$f_n: X_n \longrightarrow Y_n \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

yang memenuhi

$$d_{i,Y}^n \circ f_n = f_{n-1} \circ d_{i,X}^n \quad (n > 0, 0 \leq i \leq n).$$

Himpunan- Δ dan pemetaannya membentuk kategori $\Delta\mathbf{Set}$.

Audit sumber 22.5. Notes.tex baris 4708 dan 4714 tidak menyatakan tipe variabel pada relasi realisasi dan memakai simbol d_i^n yang sama untuk domain serta kodomain persamaan morfisma. Edisi memberi semua rentang indeks dan subskrip X, Y , sehingga kedua persamaan dapat diperiksa tipenya.

Contoh 22.7 (inklusi kerangka dan kealamian). Selalu ada inklusi

$$\text{sk}_m X_\bullet \hookrightarrow X_\bullet,$$

dan untuk $0 \leq m \leq \ell$ ada inklusi $\text{sk}_m X_\bullet \hookrightarrow \text{sk}_\ell X_\bullet$.

Catatan pinggir sumber. Sumber menaruh segitiga Xy -pic berikut di margin untuk menyatakan bahwa inklusi langsung sama dengan komposit dua inklusi. Hubungan itu dipusatkan di bawah agar urutan komposisinya terbaca.

Diagram 22.3 (segitiga inklusi kerangka). Untuk $m \leq \ell$, diagram

$$\begin{array}{ccc} \text{sk}_m X_\bullet & \hookrightarrow & \text{sk}_\ell X_\bullet \\ & \searrow & \downarrow \\ & & X_\bullet \end{array}$$

komutatif: panah diagonal adalah inklusi langsung dan sama dengan komposit panah mendatar lalu vertikal.

Inklusi kerangka juga alami. Untuk $f: X_\bullet \rightarrow Y_\bullet$, kuadrat berikut komutatif.

Diagram 22.4 (kealamian kerangka). Hubungannya ialah

$$\begin{array}{ccc} \text{sk}_m X_\bullet & \xrightarrow{\text{sk}_m f} & \text{sk}_m Y_\bullet \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_\bullet & \xrightarrow{f} & Y_\bullet \end{array}$$

Kedua komposit pada setiap simpleks berdimensi paling tinggi m sama dengan f , dan pada derajat lebih tinggi domain kerangka kosong.

Contoh 22.8 (pemetaan nama simpleks). Untuk setiap $x \in X_n$ terdapat pemetaan tunggal

$$\lceil x \rceil: \Delta[n] \longrightarrow X_\bullet$$

yang mengirim muka puncak unik $\mathbf{n} + \mathbf{1}$ ke x . Semua nilai pada muka yang lebih rendah dipaksa oleh identitas *face map*. Seperti pada Contoh 22.2, pemetaan nama ini tidak harus injektif.

Lebih umum, misalkan $Y_n \subseteq X_n$ untuk semua n dan semua *face map* $X_\bullet$ membatasi ke fungsi $d_i^n: Y_n \rightarrow Y_{n-1}$. Maka $Y_\bullet$ adalah sub-himpunan- Δ dan terdapat inklusi $Y_\bullet \hookrightarrow X_\bullet$. Jika $X_\bullet$ berdimensi k , setiap pilihan $Y_k \subseteq X_k$ menghasilkan sub-himpunan- Δ terkecil yang memuatnya: ambil semua citra muka di derajat $k - 1$, lalu semua muka dari citra itu, dan teruskan hingga derajat nol; pada derajat di atas k ambil himpunan kosong.

Lema 22.2 (funktor realisasi geometrik). Realisasi geometrik mendefinisikan functor

$$|- |: \Delta\text{Set} \longrightarrow \mathbf{Top}.$$

Justifikasi. Sumber tidak memberi bukti baru setelah pernyataan ini. Konstruksi dan bukti Lema 22.1 berlaku tanpa perubahan pada koproduk $n = 0, 1, 2, \dots$: gunakan $\bigsqcup_{n \geq 0} (f_n \times \text{id}_{\Delta^n})$, periksa relasi pada setiap n , lalu gunakan keunikan pemetaan hasil bagi untuk identitas dan komposisi. Dengan

demikian lema ini tidak dibiarkan sebagai kotak hitam, walaupun tidak ditambah lingkungan bukti sumber baru.

Definisi 22.5 (triangulasi ruang topologis). Triangulasi ruang topologis Z adalah himpunan- Δ $X_\bullet$ yang dilengkapi homeomorfisma

$$\tau: Z \xrightarrow{\cong} |X_\bullet|.$$

Realisasi $|X_\bullet|$ selalu ditriangulasi oleh $X_\bullet$ bersama homeomorfisma identitas. Jika subruang $Y \subseteq Z$ sudah ditriangulasi oleh $Y_\bullet$, dalam situasi yang baik triangulasi itu dapat diperluas dengan mencari $X_\bullet$ yang memuat $Y_\bullet$ sebagai sub-himpunan- Δ .

Contoh 22.9 (simpleks topologis standar). Simpleks topologis Δ^n ditriangulasi oleh $\Delta[n]$. Untuk muka

$$S = \{j_0 < j_1 < \cdots < j_k\} \in \Delta[n]_k,$$

definisikan

$$\lambda_S: \Delta^k \longrightarrow \Delta^n, \quad (u_0, \dots, u_k) \longmapsto (w_0, \dots, w_n),$$

dengan $w_{j_r} = u_r$ dan $w_j = 0$ bila $j \notin S$. Pemetaan-pemetaan ini kompatibel dengan semua relasi muka dan menginduksi homeomorfisma kanonik

$$\Lambda_n: |\Delta[n]| \xrightarrow{\cong} \Delta^n.$$

Komponen yang diindeks muka puncak $S = \mathbf{n} + \mathbf{1}$ adalah identitas pada Δ^n ; semua komponen lain dilekatkan tepat ke muka batas yang sama.

Audit sumber 22.6. Notes.tex baris 4765–4766 menulis sumber pemetaan kanonik dengan $\text{disc}(\Delta[k])$, padahal komponen derajat k harus diindeks oleh $\Delta[n]_k$. Edisi menggantinya dengan pemetaan bertipe λ_S dan menyebut hasilnya homeomorfisma, bukan isomorfisma himpunan yang tidak bertipe.

22.4 Triangulasi prisma

Pertimbangkan $I \times \Delta^2$. Kedua ujung $\{0\} \times \Delta^2$ dan $\{1\} \times \Delta^2$ ditriangulasi oleh $\Delta[2]$. Namai simpul pada ujung pertama $0, 1, 2$ dan simpul pada ujung kedua $\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}$.

Ada himpunan- Δ $P_\bullet$ dengan tiga simpleks tiga dimensi berurutan

$$\begin{aligned} T_2 &= [0, 1, 2, \bar{2}], \\ T_1 &= [0, 1, \bar{1}, \bar{2}], \\ T_0 &= [0, \bar{0}, \bar{1}, \bar{2}]. \end{aligned}$$

Simpleks dua dan satu dimensinya adalah semua subdaftar berurutan yang muncul dari ketiga daftar itu, dan simpleks nolnya adalah keenam simpul.

Catatan pinggir sumber. Gambar TikZ sumber ditempatkan dua sentimeter lebih tinggi di margin dan memakai proyeksi perspektif. Diagram berikut menggantinya dengan data insidensi yang tidak bergantung pada proyeksi.

Diagram 22.5 (deskripsi semantik triangulasi prisma). Prisma segitiga mempunyai simpul bawah $0, 1, 2$ dan simpul atas $\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}$. Ia dibagi menjadi tetrahedron T_2, T_1, T_0 di atas. Irisan $T_2 \cap T_1$ adalah muka $[0, 1, \bar{2}]$, irisan $T_1 \cap T_0$ adalah muka $[0, \bar{1}, \bar{2}]$, dan irisan ketiganya adalah sisi $[0, \bar{2}]$. Muka bawah $[0, 1, 2]$ dan muka atas $[\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}]$ tetap utuh. Garis yang tampak saling menyilang pada gambar perspektif sumber bukan simpul tambahan.

Secara umum, $I \times \Delta^n$ mempunyai triangulasi dengan $n + 1$ simpleks berdimensi $n + 1$. Untuk $0 \leq r \leq n$, muka puncaknya berlabel

$$P_r = [0, 1, \dots, r, \bar{r}, \overline{r+1}, \dots, \bar{n}].$$

Sumber menuliskan daftar itu dari $r = n$ turun ke $r = 0$. Urutan $n + 2$ simpul pada setiap P_r adalah urutan yang tampil, sedangkan semua simpleks dimensi lebih rendah diperoleh dengan menghapus satu atau beberapa elemen daftar melalui *face map*.

22.5 Kompleks korantai dan perubahan koefisien

Untuk himpunan- Δ $X_\bullet$ dan gelanggang komutatif berunsur satu R , tuliskan R^{X_n} untuk modul **semua** fungsi $X_n \rightarrow R$. Jika X_n tak hingga, ini adalah produk salinan R , bukan jumlah langsung berpenyangga hingga. Definisikan diferensial berderajat naik

$$\dots \longrightarrow R^{X_n} \xrightarrow{\delta_n} R^{X_{n+1}} \longrightarrow \dots$$

dengan, untuk $g: X_n \rightarrow R$,

$$\delta_n(g) = \sum_{i=0}^{n+1} (-1)^i g \circ d_i^{n+1}: X_{n+1} \longrightarrow R.$$

Audit sumber 22.7. Notes.tex baris 4836 menjumlahkan hanya dari $i = 0$ sampai n . Simpleks berdimensi $n + 1$ mempunyai $n + 2$ muka, sehingga batas atas yang benar ialah $n + 1$. Dengan batas sumber, bahkan $\delta_0 g$ hanya memakai satu dari dua titik ujung sebuah sisi dan $\delta_1 \delta_0$ tidak nol pada umumnya. Edisi memperbaiki batas dan menyelesaikan bukti yang ditinggalkan sebagai “Exercise!”.

Lema 22.3. Barisan di atas adalah kompleks:

$$\delta_{n+1} \circ \delta_n = 0 \quad (n \geq 0).$$

Bukti. Ambil $g \in R^{X_n}$ dan $x \in X_{n+2}$. Dengan rumus yang telah dikoreksi,

$$\begin{aligned} (\delta_{n+1} \delta_n g)(x) &= \sum_{j=0}^{n+2} \sum_{i=0}^{n+1} (-1)^{i+j} g(d_i^{n+1} d_j^{n+2} x) \\ &= \sum_{0 \leq i < j \leq n+2} \left[(-1)^{i+j} g(d_i d_j x) + (-1)^{i+j-1} g(d_{j-1} d_i x) \right]. \end{aligned}$$

Pada baris kedua, setiap pasangan penghapusan muka dikumpulkan dalam dua urutan yang mungkin. Identitas himpunan- Δ $d_i d_j = d_{j-1} d_i$ untuk $i < j$ membuat dua suku dalam setiap kurung sama besar dan berlawanan tanda. Semua suku berpasangan, sehingga jumlahnya nol. $\square$

Kompleks ini dinotasikan

$$C^\bullet(X_\bullet; R)$$

dan disebut **kompleks korantai simpleksial** dari $X_\bullet$.

Untuk fungsi himpunan $\alpha: A \rightarrow B$, prakomposisi memberi pemetaan R -linear

$$\alpha^*: R^B \longrightarrow R^A, \quad g \longmapsto g \circ \alpha.$$

Jika $\beta: B \rightarrow C$, maka

$$\alpha^* \circ \beta^* = (\beta \circ \alpha)^*: R^C \longrightarrow R^A.$$

Jadi arah dan urutan komposisi berbalik. Secara kategoris, ini adalah functor

$$R^{(-)}: \mathbf{Set}^{\text{op}} \longrightarrow \mathbf{Mod}_R,$$

dengan op menandakan kategori lawan.

Lema 22.4 (functor korantai). Terdapat functor kontravarian

$$C^\bullet(-; R): \Delta\mathbf{Set}^{\text{op}} \longrightarrow \mathbf{Cplx}_R.$$

Bukti. Untuk $f: X_\bullet \rightarrow Y_\bullet$, prakomposisi memberi $f_n^*: R^{Y_n} \rightarrow R^{X_n}$. Jika $g \in R^{Y_n}$ dan $x \in X_{n+1}$, maka

$$\begin{aligned} (\delta_{n,X} f_n^* g)(x) &= \sum_{i=0}^{n+1} (-1)^i g(f_n(d_{i,X}^{n+1} x)) \\ &= \sum_{i=0}^{n+1} (-1)^i g(d_{i,Y}^{n+1} (f_{n+1} x)) \\ &= (f_{n+1}^* \delta_{n,Y} g)(x). \end{aligned}$$

Jadi f^* adalah morfisma kompleks. Identitas dan komposisi mengikuti dari $\text{id}^* = \text{id}$ dan $(g \circ f)^* = f^* \circ g^*$, sehingga arah functor memang berlawanan. $\square$

Definisi 22.6 (kohomologi himpunan- Δ). Modul kohomologi ke- n dengan koefisien dalam R adalah

$$H^n(X_\bullet; R) := H^n(C^\bullet(X_\bullet; R)) = \frac{\ker \delta_n}{\text{im } \delta_{n-1}},$$

dengan $\text{im } \delta_{-1} = 0$. Untuk setiap n , konstruksi ini memberi functor

$$H^n(-; R): \Delta\mathbf{Set}^{\text{op}} \longrightarrow \mathbf{Mod}_R.$$

Karena $R^\varnothing = 0$, bila $X_\bullet$ berdimensi n maka

$$H^k(X_\bullet; R) = 0 \quad (k > n).$$

Himpunan- Δ berdimensi tak hingga dapat mempunyai atau tidak mempunyai kohomologi tak nol dalam tak hingga banyak derajat.

Jika R Noetherian dan X_n berhingga, maka R^{X_n} adalah modul bebas berhingga dan $\ker \delta_n$ terbangkit hingga; akibatnya H^n terbangkit hingga. Khususnya, himpunan- Δ berhingga mempunyai kohomologi terbangkit hingga untuk $R = \mathbb{Z}$, $\mathbb{R}$, atau $\mathbb{Z}/2$.

Catatan pinggir sumber. Sumber menyatakan versi lebih umum: cukup ada berhingga banyak simpleks pada dimensi n . Pernyataan itu benar untuk gelanggang Noetherian yang digunakan dalam kuliah. Tanpa hipotesis Noetherian, kernel submodul dari modul bebas berhingga tidak harus terbangkit hingga.

Catatan 22.1 (gelanggang yang dipakai). Dalam praktik, sumber hanya akan memakai $R = \mathbb{Z}$, $\mathbb{R}$, dan $\mathbb{Z}/2$.

Catatan 22.2 (perhitungan hingga dan tak hingga). Jika sebuah himpunan- Δ berhingga dan semua *face map* diberikan secara eksplisit, menghitung kohomologinya adalah persoalan kombinatorika dan aljabar linear, meskipun pekerjaannya dapat besar. Untuk objek tak berhingga—baik berdimensi tak hingga maupun mempunyai tak hingga banyak simpleks pada suatu dimensi—aljabar linear berhingga tidak lagi cukup. Hal ini akan penting ketika kohomologi ruang topologis umum didefinisikan tanpa memilih himpunan- Δ .

Misalkan $\alpha: R \rightarrow S$ adalah homomorfisma gelanggang. Untuk setiap himpunan A , komposisi pasca memberi pemetaan R -linear

$$R^A \longrightarrow S^A, \quad g \longmapsto \alpha \circ g,$$

di mana S^A dipandang sebagai modul- R melalui α . Penerapan pada setiap derajat kompleks **korantai simpleksial** menghasilkan lema berikut.

Lema 22.5 (perubahan koefisien). Homomorfisma gelanggang $\alpha: R \rightarrow S$ menginduksi morfisma kompleks

$$C^\bullet(X_\bullet; R) \longrightarrow C^\bullet(X_\bullet; S),$$

dan, untuk $X_\bullet$ tetap, konstruksi ini funktorial dalam α .

Verifikasi. Karena α aditif,

$$\alpha \circ \delta_n(g) = \sum_{i=0}^{n+1} (-1)^i (\alpha \circ g) \circ d_i^{n+1} = \delta_n(\alpha \circ g).$$

Identitas dan komposisi homomorfisma gelanggang jelas dilestarikan. Dengan demikian diperoleh pemetaan perubahan koefisien

$$H^n(X_\bullet; R) \longrightarrow H^n(X_\bullet; S),$$

yang R -linear bila kodomain dipandang sebagai modul- R melalui α .

Audit sumber 22.8. Notes.tex baris 4879–4880 menghilangkan hipotesis Noetherian dari klaim keterbangkitan hingga. Baris 4899 keliru menyebut $C^\bullet(X_\bullet; R)$ sebagai kompleks korantai *singular*; kompleks yang baru didefinisikan adalah kompleks korantai simpleksial. Edisi memperbaiki keduanya dan mempertahankan semantik R^A sebagai semua fungsi, yakni produk bila A tak hingga.

Contoh 22.10 (dari bilangan bulat ke bilangan real). Inklusi $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{R}$ memberi pemetaan

$$H^n(X_\bullet; \mathbb{Z}) \longrightarrow H^n(X_\bullet; \mathbb{R}).$$

Jika $X_\bullet$ berhingga, domain adalah grup abelian terbangkit hingga, kernel pemetaan ini tepat subgrup torsinya, dan citra bagian bebasnya adalah kisi penuh di ruang vektor real $H^n(X_\bullet; \mathbb{R})$. Tanpa hipotesis

keterhinggaan, pemetaan perubahan koefisien tetap ada, tetapi pernyataan kisi dan identifikasi kernel itu tidak dinyatakan di sini.

Audit sumber 22.9. Notes.tex baris 4911–4916 menyatakan klaim kernel dan kisi untuk setiap himpunan- Δ . Argumen standar memakai kompleks korantai bebas berhingga dan struktur grup abelian terbangkit hingga. Edisi membatasi kesimpulan itu pada $X_\bullet$ berhingga; pada kasus umum hanya pemetaan alaminya yang dipertahankan tanpa klaim kisi.

Contoh 22.11 (reduksi modulo prima). Untuk prima p , proyeksi $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p = \mathbb{F}_p$ memberi

$$H^n(X_\bullet; \mathbb{Z}) \longrightarrow H^n(X_\bullet; \mathbb{F}_p).$$

Kodomain adalah ruang vektor atas $\mathbb{F}_p$. Setiap kelas torsi yang ordenya relatif prima terhadap p dipetakan ke nol. Pernyataan ini tidak mengatakan bahwa semua torsi- p pasti terdeteksi; kohomologi modulo p juga dapat mempunyai kelas tambahan.

Catatan 22.3 (bilangan Betti dan koefisien torsi). Sumber mencatat bahwa pada masa awal topologi aljabar, perhatian banyak diberikan pada kompleks hingga. Dimensi ruang vektor $H^n(X_\bullet; \mathbb{R})$ disebut **bilangan Betti**, sedangkan orde faktor siklik dalam $H^n(X_\bullet; \mathbb{Z})_{\text{tors}}$ disebut **koefisien torsi**. Angka-angka itu mengemas informasi numerik—bilangan Betti khususnya memasuki karakteristik Euler—tetapi tidak membawa pemetaan yang diinduksi secara functorial. Sumber mengaitkan pergeseran penekanan menuju invarian yang sendiri merupakan objek aljabar dengan Emmy Noether dan matematikawan lain pada dasawarsa 1920-an.

Audit sumber 22.10. Edisi menormalkan salah eja atau tata bahasa deterministik pada Notes.tex baris 4512, 4529, 4532, 4598, 4700, 4747, 4765, 4815, 4887, dan 4890 (`map`, `cyclicly`, `singe`, `defintion`, `defintitions`, `relisation`, `combinatrial`, `visualised`, `calulate`, dan `an` sebelum Δ -set) tanpa mengubah urutan sumber.

Pendamping penguasaan: pemeriksaan, petunjuk, dan solusi lengkap

Enam paket berikut adalah materi asli edisi. Semuanya dibatasi pada sasaran Unit 22: pemetaan dan realisasi, data silinder tak hingga, simpleks serta kerangka, triangulasi prisma, diferensial korantai, kontravariansi, dan perubahan koefisien.

Pemeriksaan Penguasaan 22.1 (silinder menuju torus). Untuk tabel *face map* Contoh 22.4, periksa ketiga identitas muka pada f_{1i} dan f_{2i} . Kemudian buktikan bahwa $q(v_i) = v$, $q(e_{ai}) = e_a$, dan $q(f_{bi}) = f_b$ mendefinisikan pemetaan ke torus kombinatorik Unit 20.

Petunjuk. Gunakan tiga identitas permukaan dari Unit 20. Untuk f_{2i} , ingat bahwa muka tengahnya adalah $e_{1,i+1}$. Setelah itu bandingkan setiap baris tabel muka dengan baris f_1, f_2 pada torus.

Solusi Pemeriksaan 22.1. Untuk f_{1i} , tiga identitas memberi

$$\begin{aligned} d_0 d_2(f_{1i}) &= d_0(e_{2i}) = v_{i+1} = d_1(e_{3i}) = d_1 d_0(f_{1i}), \\ d_0 d_1(f_{1i}) &= d_0(e_{1i}) = v_i = d_0(e_{3i}) = d_0 d_0(f_{1i}), \\ d_1 d_2(f_{1i}) &= d_1(e_{2i}) = v_i = d_1(e_{1i}) = d_1 d_1(f_{1i}). \end{aligned}$$

Untuk f_{2i} ,

$$\begin{aligned} d_0 d_2(f_{2i}) &= d_0(e_{3i}) = v_i = d_1(e_{2i}) = d_1 d_0(f_{2i}), \\ d_0 d_1(f_{2i}) &= d_0(e_{1,i+1}) = v_{i+1} = d_0(e_{2i}) = d_0 d_0(f_{2i}), \\ d_1 d_2(f_{2i}) &= d_1(e_{3i}) = v_{i+1} = d_1(e_{1,i+1}) = d_1 d_1(f_{2i}). \end{aligned}$$

Jadi $C_\bullet$ adalah permukaan kombinatorik. Pada derajat satu, kedua titik ujung setiap e_{ai} dipetakan ke v , sama dengan kedua titik ujung e_a . Pada derajat dua, tabel muka menjadi

$$f_1 \mapsto (e_3, e_1, e_2), \quad f_2 \mapsto (e_2, e_1, e_3),$$

tepat seperti tabel torus. Maka q komutatif dengan semua *face map* dan merupakan pemetaan permukaan kombinatorik. Lema 22.1 menghasilkan pemetaan kontinu $|q|$; di bawah model geometrik standar, koordinat strip $\mathbb{R}$ direduksi modulo $\mathbb{Z}$, sehingga $|q| = \exp \times \text{id}$.

Pemeriksaan Penguasaan 22.2 (simpleks, batas, dan pemetaan nama). Hitung banyak simpleks pada setiap derajat $\Delta[3]$ dan $\partial\Delta[3]$. Untuk $x \in X_3$, bangun $\lceil x \rceil: \Delta[3] \rightarrow X_\bullet$ dan jelaskan kapan pemetaan itu gagal menjadi injektif.

Petunjuk. Gunakan $\binom{4}{k+1}$. Nilai pemetaan nama pada subhimpunan $\{j_0 < \dots < j_k\}$ diperoleh dengan menghapus dari x semua indeks yang tidak muncul, dalam urutan yang konsisten dengan identitas muka.

Solusi Pemeriksaan 22.2. Karena $|\Delta[3]_k| = \binom{4}{k+1}$ untuk $0 \leq k \leq 3$, jumlahnya adalah

k	0	1	2	3	$k > 3$
$ \Delta[3]_k $	4	6	4	1	0,
$ \partial\Delta[3]_k $	4	6	4	0	0.

Tetapkan muka puncak ke x . Untuk setiap muka kodimensi satu, syarat komutativitas memaksa nilainya menjadi $d_i(x)$; pada kodimensi dua nilainya menjadi komposit dua *face map*, dan seterusnya. Identitas muka menjamin bahwa dua urutan penghapusan yang menghasilkan subhimpunan sama memberi hasil yang sama. Karena itu pemetaan nama ada dan tunggal.

Namun dua muka berbeda dari x dapat sama, misalnya $d_i(x) = d_j(x)$ untuk $i \neq j$, atau identifikasi dapat terjadi pada derajat lebih rendah. Dalam keadaan itu dua simpleks berbeda pada $\Delta[3]$ memiliki citra sama, sehingga $\lceil x \rceil$ tidak injektif. Jadi kata “nama” lebih tepat daripada “inklusi” tanpa hipotesis tambahan.

Pemeriksaan Penguasaan 22.3 (mengapa tiga tetrahedron mengisi prisma). Petakan simpul j ke $(0, e_j)$ dan $\bar{j}$ ke $(1, e_j)$ dalam $I \times \Delta^2$. Buktikan bahwa citra afin T_2, T_1, T_0 menutupi prisma, dan tentukan irisan berpasangannya.

Petunjuk. Untuk $(t; x_0, x_1, x_2)$ dengan $x_0 + x_1 + x_2 = 1$, bandingkan t berturut-turut dengan x_2 dan $x_1 + x_2$. Citra T_r dicirikan oleh $\sum_{j>r} x_j \leq t \leq \sum_{j \geq r} x_j$.

Solusi Pemeriksaan 22.3. Pada T_r , tulis koefisien barisentris simpul bawah sebagai a_j untuk $j \leq r$ dan simpul atas sebagai b_j untuk $j \geq r$. Pemetaan afin memberi

$$t = \sum_{j \geq r} b_j, \quad x_j = \begin{cases} a_j, & j < r, \\ a_r + b_r, & j = r, \\ b_j, & j > r. \end{cases}$$

Koefisien taknegatif seperti itu ada tepat bila

$$\sum_{j>r} x_j \leq t \leq \sum_{j \geq r} x_j.$$

Untuk $n = 2$, ketiga selang itu adalah

$$0 \leq t \leq x_2, \quad x_2 \leq t \leq x_1 + x_2, \quad x_1 + x_2 \leq t \leq 1.$$

Selang-selang tersebut menutupi $[0, 1]$ untuk setiap titik $(x_0, x_1, x_2) \in \Delta^2$, maka ketiga tetrahedron menutupi prisma. Kesamaan $t = x_2$ memberi muka bersama $T_2 \cap T_1 = [0, 1, \bar{2}]$, sedangkan $t = x_1 + x_2$ memberi $T_1 \cap T_0 = [0, \bar{1}, \bar{2}]$. Irisan $T_2 \cap T_0 = [0, \bar{2}]$ adalah sisi yang juga menjadi irisan ketiganya. Jadi pelekatan terjadi sepanjang muka penuh dan benar-benar merupakan triangulasi.

Pemeriksaan Penguasaan 22.4 (diferensial pada satu segitiga). Untuk $\Delta[2]$, tulis $\delta_0: R^{X_0} \rightarrow R^{X_1}$ dan $\delta_1: R^{X_1} \rightarrow R^{X_2}$ secara eksplisit, lalu verifikasi $\delta_1\delta_0 = 0$. Jelaskan mengapa batas atas $n + 1$ pada rumus umum tidak dapat diganti oleh n .

Petunjuk. Orientasikan sisi $[a, b]$ dengan $a < b$. Muka segitiga $[0, 1, 2]$ adalah $[1, 2]$, $[0, 2]$, dan $[0, 1]$ dengan tanda berganti.

Solusi Pemeriksaan 22.4. Untuk $g \in R^{X_0}$,

$$(\delta_0 g)([a, b]) = g(b) - g(a),$$

karena $d_0[a, b] = [b]$ dan $d_1[a, b] = [a]$. Untuk $h \in R^{X_1}$,

$$(\delta_1 h)([0, 1, 2]) = h([1, 2]) - h([0, 2]) + h([0, 1]).$$

Karena itu

$$\begin{aligned} (\delta_1 \delta_0 g)([0, 1, 2]) &= (g(2) - g(1)) - (g(2) - g(0)) + (g(1) - g(0)) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Pada derajat nol, simpleks satu dimensi mempunyai dua *face map* d_0, d_1 . Jumlah sampai $n = 0$ hanya akan memberi $g \circ d_0$, bukan selisih titik ujung. Jadi ia bukan diferensial graf yang telah dipakai dan komposisi berikutnya tidak akan mengalami pembatalan berpasangan.

Pemeriksaan Penguasaan 22.5 (kontravariansi pada poligon). Misalkan P_m adalah poligon dengan $m \geq 2$ sisi yang semuanya berorientasi siklik, dan $c: P_m \rightarrow L_\bullet$ mengirim semua simpul ke satu simpul serta semua sisi ke satu gelang. Hitung pemetaan

$$c^*: H^0(L_\bullet; R) \rightarrow H^0(P_m; R), \quad c^*: H^1(L_\bullet; R) \rightarrow H^1(P_m; R).$$

Petunjuk. Pada korantai derajat nol dan satu, prakomposisi mengirim satu nilai ke fungsi konstan pada m simpul atau m sisi. Identifikasikan $H^1(P_m; R)$ melalui jumlah nilai pada seluruh sisi berorientasi.

Solusi Pemeriksaan 22.5. Untuk $L_\bullet$, kompleksnya adalah

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{0} R \longrightarrow 0,$$

sehingga $H^0(L; R) \cong R \cong H^1(L; R)$. Untuk P_m , kernel diferensial insidensi pada derajat nol terdiri atas fungsi konstan, jadi $H^0(P_m; R) \cong R$. Prakomposisi oleh c_0 mengirim $a \in R$ ke fungsi konstan bernilai a , sehingga pemetaan pada H^0 adalah identitas di bawah identifikasi tersebut.

Pada derajat satu, c_1^* mengirim $b \in R$ ke vektor konstan $(b, \dots, b) \in R^m$. Fungsi

$$\sigma: R^m \longrightarrow R, \quad (y_0, \dots, y_{m-1}) \longmapsto \sum_{j=0}^{m-1} y_j$$

lenyap pada citra diferensial insidensi karena jumlahnya berteleskop, dan menginduksi isomorfisma $H^1(P_m; R) \cong R$. Maka

$$\sigma(c_1^*b) = mb.$$

Jadi pemetaan pada H^1 adalah perkalian dengan m . Arah pemetaan kohomologi berlawanan dengan c , sesuai functor $H^1(-; R)$ yang kontravarian.

Pemeriksaan Penguasaan 22.6 (perubahan koefisien dan hipotesis hingga). Misalkan $X_\bullet$ berhingga dan

$$H^n(X_\bullet; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^b \oplus T$$

dengan T berhingga. Tentukan kernel dan citra pemetaan ke koefisien real. Kemudian buktikan bahwa reduksi modulo prima p membunuh bagian torsi yang ordenya relatif prima terhadap p , dan jelaskan mengapa kesimpulan “kisi” memerlukan hipotesis keterhinggaan.

Petunjuk. Untuk kompleks korantai bebas berhingga, perluasan skalar ke $\mathbb{R}$ bersifat datar. Untuk torsi- q dengan q relatif prima terhadap p , gunakan identitas Bézout pada grup aditif ruang vektor $\mathbb{F}_p$, yang dibunuh oleh p .

Solusi Pemeriksaan 22.6. Karena setiap grup korantai integral berderajat hingga bebas dengan rank berhingga dan $\mathbb{R}$ datar atas $\mathbb{Z}$,

$$H^n(X; \mathbb{R}) \cong H^n(X; \mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R} \cong \mathbb{R}^b.$$

Pemetaan perubahan koefisien adalah $x \mapsto x \otimes 1$. Ia membunuh tepat T dan mengirim $\mathbb{Z}^b$ ke kisi standar $\mathbb{Z}^b \subset \mathbb{R}^b$. Jadi kernelnya T dan citranya kisi penuh.

Sekarang ambil kelas x berorde q^r dengan $\gcd(q, p) = 1$, dan tulis $\bar{x}$ untuk citranya di grup aditif $H^n(X; \mathbb{F}_p)$. Kita mempunyai

$$q^r \bar{x} = 0, \quad p \bar{x} = 0.$$

Ada $a, b \in \mathbb{Z}$ dengan $aq^r + bp = 1$, sehingga

$$\bar{x} = (aq^r + bp)\bar{x} = 0.$$

Argumen ini tidak menyatakan apa yang terjadi pada torsi- p , dan tidak menghitung kelas modulo p yang mungkin datang dari derajat berikutnya. Terakhir, bila $X_\bullet$ tak hingga, grup kohomologi integral dapat tidak terbangkit hingga dan citra di ruang vektor real tidak perlu merupakan kisi diskret ber-rank hingga. Karena itu kesimpulan kisi pada Contoh 22.10 memang memerlukan hipotesis keterhinggaan.

Batas ke Unit 23. Notes.tex baris 4939 memulai Kuliah 23 dengan kembali ke functorialitas terhadap pemetaan himpunan- Δ dan pemetaan nama $\lceil x \rceil$. Tidak ada lingkungan sumber yang terbelah pada batas ini. Cursor sumber berikutnya yang aman adalah baris 4939.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts, © 2019 David Michael Roberts, tepatnya [Notes.tex baris 4939–5112](#) pada [commit b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#) dari repositori [DavidMichaelRoberts/AlgebraicTopology2019](#). Rentang aktif itu terdiri atas 174 baris fisik. Setelah dinormalisasi dengan LF dan mempertahankan baris kosong penutupnya, ukurannya 9.776 byte dan SHA-256-nya adalah `c7256a45621ad7a435277867298e4aeb8eb584dfce066cdac3b48c4ee0e0e3f4`. Kuliah 24

dimulai pada Notes.tex baris 5113 di dalam contoh yang dibuka pada baris 5076; karena itu unit ini menerjemahkan contoh tersebut hanya sampai baris 5111 dan menandainya secara eksplisit sebagai berlanjut. Materi sumber dan adaptasi Indonesia ini tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#).

Perubahan edisi mencakup penerjemahan, pemformatan ulang, pemberian pengenalan stabil, dan pemindahan enam catatan pinggir ke urutan bacaan utama. Dua diagram Xy-pic ditulis ulang sebagai diagram semantik terpusat. Contoh batas tetrahedron juga dilengkapi tabel simpleks dan deskripsi ketetangaan yang dapat dibaca tanpa mengandalkan letak visual, warna, atau ketebalan garis.

Rentang sumber memuat tepat satu catatan, satu lema, satu akibat, dua contoh (contoh kedua berlanjut ke Kuliah 24), dua lingkungan `enumerate` dengan enam butir seluruhnya, enam catatan pinggir, dua diagram Xy-pic, satu rujukan silang, sembilan tampilan `\[...\]`, dan satu `align*`. Tidak ada definisi, bukti formal, latihan sumber, konstruksi, label, sitasi, gambar eksternal, `input`, atau `include` pada rentang ini.

Edisi memperbaiki kekeliruan tipe dan indeks pada pemetaan evaluasi, menyatakan augmentasi hanya pada komponen derajat nol, dan menulis funktorialitas berarah kontravarian. Salah ketik $R^Q \oplus R^Q$ diperbaiki menjadi $R^P \oplus R^Q$, sedangkan kompleks ditulis dengan gradasi kohomologis. Untuk gabungan saling lepas tak hingga, produk dan hipotesis teori himpunannya dinyatakan secara tepat. Uraian batas tetrahedron dibatasi pada subhimpunan wajar takkosong dan derajat $0 \leq n \leq 2$. Klaim eksaknya barisan perekatan dibuktikan lengkap, termasuk perekatan fungsi, surjektivitas, dan kompatibilitas diferensial. Pada contoh hasil bagi, simbol A digunakan secara konsisten, kasus $A \neq \emptyset$ dibedakan dari $A = \emptyset$, dan q^* dibatasi secara tepat dari fungsi tereduksi menuju kernel restriksi.

Enam pemeriksaan penguasaan, enam petunjuk, dan enam solusi lengkap merupakan materi asli edisi dan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen; edisi ini tidak disponsori, didukung, disahkan, ataupun diberi status resmi oleh David Michael Roberts atau institusinya. Produksi edisi ini dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**. Pernyataan ini menambah transparansi proses dan tidak mengurangi kredit penulis sumber ataupun kredit kontributor manusia.

23 Kuliah 23

23.1 Pemetaan nama dan evaluasi korantai

Kita kembali ke funktorialitas terhadap pemetaan himpunan- Δ . Untuk $x \in X_n$, dengan $X_\bullet$ sebuah himpunan- Δ , [Contoh 22.8](#) memberi pemetaan nama

$$\lceil x \rceil: \Delta[n] \longrightarrow X_\bullet.$$

Karena kompleks korantai simpleksial bersifat kontravarian, pemetaan itu menginduksi bagian diagram kompleks di sekitar derajat n berikut.

Diagram 23.1 (evaluasi yang berasal dari pemetaan nama). Kuadrat komutatifnya adalah

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & R^{X_n} & \xrightarrow{\delta_{X_n}^n} & R^{X_{n+1}} & \longrightarrow & \cdots \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \cdots & \longrightarrow & R^{\Delta[n]_n} & \xrightarrow{\delta_{\Delta[n]}^n} & R^{\Delta[n]_{n+1}} & \longrightarrow & \cdots \end{array}$$

Panah vertikal kiri adalah $\lceil x \rceil_n^*: R^{X_n} \rightarrow R^{\Delta[n]_n}$, sedangkan panah vertikal kanan adalah

$$\lceil x \rceil_{n+1}^*: R^{X_{n+1}} \longrightarrow R^{\Delta[n]_{n+1}}.$$

Kedua lintasan dari R^{X_n} ke $R^{\Delta[n]_{n+1}}$ sama. Karena $\Delta[n]_n$ adalah himpunan satu anggota dan $\Delta[n]_{n+1} = \emptyset$, baris bawah di dua derajat itu ialah $R \rightarrow 0$. Posisi panah pada gambar tidak membawa informasi tambahan.

Dengan identifikasi

$$R^{\Delta[n]_n} \cong R^{\{\mathbf{n}+1\}} \cong R, \quad R^{\Delta[n]_{n+1}} = R^\emptyset = 0,$$

komponen derajat- n dari pemetaan korantai ialah pemetaan R -linear

$$C^n(X_\bullet; R) = R^{X_n} \longrightarrow R, \quad g \longmapsto g(x).$$

Jadi pemetaan itu tepat evaluasi pada simpleks $x \in X_n$.

Audit sumber 23.1. Notes.tex baris 4950 menulis $C^n(X_\bullet; R) = R^{X_{n+1}}$, padahal definisi dan diagramnya memberi $C^n(X_\bullet; R) = R^{X_n}$. Edisi memperbaiki indeks tersebut dan mengetik kedua pemetaan vertikal sebagai komponen prakomposisi dari pemetaan nama.

Kasus penting diperoleh dengan memilih titik basis $x \in X_0$.

Catatan pinggir sumber. Dalam penafsiran geometrik yang dimaksud, simpleks nol terpilih ini memang merupakan sebuah titik.

Pemetaan bertitik $\Delta[0] \rightarrow X_\bullet$ menginduksi morfisma kompleks

$$C^\bullet(X_\bullet; R) \longrightarrow C^\bullet(\Delta[0]; R).$$

Kodomainnya adalah kompleks

$$0 \longrightarrow R \longrightarrow 0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots,$$

dan komponen derajat nolnya adalah evaluasi $R^{X_0} \rightarrow R$, $g \mapsto g(x)$; komponen pada setiap derajat positif menuju modul nol. Setelah mengambil kohomologi, kita memperoleh pemetaan R -linear

$$\varepsilon_x: H^0(X_\bullet; R) \longrightarrow R.$$

Pemetaan seperti ini disebut **augmentasi** modul- R , dan pasangan $(H^0(X_\bullet; R), \varepsilon_x)$ disebut modul- R teraugmentasi.

Arahnya harus diperhatikan. Jika

$$f: (X_\bullet, x) \longrightarrow (Y_\bullet, y)$$

adalah pemetaan himpunan- Δ yang mempertahankan titik basis, $f_0(x) = y$, maka kontravariansi memberi

$$f^*: H^0(Y_\bullet; R) \longrightarrow H^0(X_\bullet; R), \quad \varepsilon_x \circ f^* = \varepsilon_y.$$

Dengan demikian

$$(X_\bullet, x) \longmapsto (H^0(X_\bullet; R), \varepsilon_x)$$

adalah functor kontravarian dari himpunan- Δ bertitik ke modul- R teraugmentasi. Struktur geometrik tambahan berupa pilihan titik basis tercermin pada augmentasi itu.

Audit sumber 23.2. Notes.tex baris 4954 menyamakan seluruh kompleks $C^\bullet(X_\bullet; R)$ dengan R^{X_0} , yang hanya merupakan komponen derajat nolnya. Baris 4958 tidak menyatakan arah functorialitas. Edisi mengetik komponen derajat nol dan positif secara terpisah serta menulis persamaan augmentasi yang menunjukkan arah kontravarian.

Catatan 23.1 (peran sementara himpunan- Δ). Pada tahap ini, himpunan- Δ dan kohomologinya belum dipakai untuk mendefinisikan atau menghitung kohomologi ruang topologis umum. Alat yang sedang dikembangkan akan berguna ketika kita sampai pada tujuan itu. Untuk sementara, kita tetap berfokus pada himpunan- Δ dan kompleks yang terkait dengannya.

23.2 Gabungan saling lepas dan produk

Hasil umum apa yang membantu menghitung kohomologi himpunan- Δ ? Seperti untuk ruang topologis, kita mulai dari cara paling sederhana membangun objek baru dari objek lama: gabungan saling lepas. Kita memerlukan empat pengamatan.

1. Untuk himpunan P, Q dan gelanggang R , pembatasan memberi isomorfisma alami modul- R

$$R^{P \sqcup Q} \xrightarrow{\cong} R^P \oplus R^Q, \quad g \mapsto (g|_P, g|_Q).$$

Catatan pinggir sumber, diperjelas. Untuk sebuah keluarga terindeks himpunan $(P_\alpha)_{\alpha \in I}$, bentuk umumnya adalah

$$R^{\bigsqcup_{\alpha \in I} P_\alpha} \cong \prod_{\alpha \in I} R^{P_\alpha},$$

yaitu produk, bukan jumlah langsung, bila I tak hingga.

2. Dari himpunan- Δ $X_\bullet$ dan $Y_\bullet$ kita membentuk $X_\bullet \sqcup Y_\bullet$ secara derajat demi derajat:

$$(X_\bullet \sqcup Y_\bullet)_n = X_n \sqcup Y_n.$$

3. Dari kompleks **korantai** modul- R $(A^\bullet, \delta_A)$ dan $(B^\bullet, \delta_B)$ kita membentuk jumlah langsung

$$\cdots \longrightarrow A^n \oplus B^n \xrightarrow{\delta_A^n \oplus \delta_B^n} A^{n+1} \oplus B^{n+1} \longrightarrow \cdots.$$

Notasi superskrip menegaskan bahwa diferensial menaikkan derajat.

4. Untuk jumlah langsung kompleks tersebut terdapat isomorfisma alami

$$H^n(A^\bullet \oplus B^\bullet) \xrightarrow{\cong} H^n(A^\bullet) \oplus H^n(B^\bullet).$$

Penggabungan keempat bahan ini memberi hasil berikut.

Lema 23.1 (korantai gabungan saling lepas). Terdapat isomorfisma alami kompleks modul- R

$$C^\bullet(X_\bullet \sqcup Y_\bullet; R) \xrightarrow{\cong} C^\bullet(X_\bullet; R) \oplus C^\bullet(Y_\bullet; R).$$

Pada derajat n , isomorfisma itu membatasi sebuah fungsi pada dua komponen. Ia komutatif dengan diferensial karena setiap *face map* pada gabungan saling lepas melestarikan komponennya.

Bukti. Pada derajat n , definisikan

$$\rho_n: R^{X_n \sqcup Y_n} \longrightarrow R^{X_n} \oplus R^{Y_n}, \quad g \longmapsto (g|_{X_n}, g|_{Y_n}).$$

Pemetaan baliknya merekatkan (f, h) menjadi fungsi yang bernilai f pada X_n dan h pada Y_n ; kedua komponen saling lepas, sehingga fungsi ini terdefinisi secara unik. Setiap *face map* mempertahankan komponen X atau Y . Karena itu pembatasan sebelum atau sesudah menerapkan jumlah bertanda *face map* memberi hasil yang sama:

$$\rho_{n+1} \delta_{X \sqcup Y}^n = (\delta_X^n \oplus \delta_Y^n) \rho_n.$$

Jadi $(\rho_n)_n$ adalah isomorfisma kompleks. Rumus pembatasan juga komutatif dengan pemetaan pada X dan Y , sehingga isomorfisma ini natural.

Akibat 23.1 (kohomologi gabungan saling lepas). Untuk $n = 0, 1, 2, \dots$ terdapat isomorfisma alami modul- R

$$H^n(X_\bullet \sqcup Y_\bullet; R) \xrightarrow{\cong} H^n(X_\bullet; R) \oplus H^n(Y_\bullet; R).$$

Bukti. Untuk diferensial komponen $\delta_A \oplus \delta_B$, kernel dan citra dihitung per komponen:

$$Z^n(A^\bullet \oplus B^\bullet) = Z^n(A^\bullet) \oplus Z^n(B^\bullet), \quad B^n(A^\bullet \oplus B^\bullet) = B^n(A^\bullet) \oplus B^n(B^\bullet).$$

Mengambil hasil bagi kosiklus oleh kobatas lalu memberi

$$\frac{Z^n(A) \oplus Z^n(B)}{B^n(A) \oplus B^n(B)} \cong H^n(A) \oplus H^n(B).$$

Terapkan ini pada isomorfisma kompleks dalam Lema 23.1. Kealamian diwarisi dari pembatasan komponen pada bukti lema tersebut.

Catatan pinggir sumber, dengan syarat yang dinyatakan. Untuk keluarga himpunan- Δ $(X_\bullet^\alpha)_{\alpha \in I}$ yang diindeks oleh sebuah himpunan, korantai gabungan saling lepas adalah produk kompleks:

$$C^\bullet \left(\bigsqcup_{\alpha \in I} X_\bullet^\alpha; R \right) \cong \prod_{\alpha \in I} C^\bullet(X_\bullet^\alpha; R).$$

Dalam teori himpunan ZFC biasa, produk terindeks himpunan di kategori $R\text{-Mod}$ adalah eksak: pilihan praimaj untuk keluarga pemetaan surjektif memakai aksioma pilihan. Karena itu

$$H^n \left(\prod_\alpha C_\alpha^\bullet \right) \cong \prod_\alpha H^n(C_\alpha^\bullet).$$

Tanpa prinsip pilihan yang memadai, langkah surjektivitas produk tidak boleh dianggap otomatis.

Audit sumber 23.3. Notes.tex baris 4975 salah menulis $R^{P \sqcup Q} \cong R^Q \oplus R^Q$; faktor pertama seharusnya R^P . Baris 4980–4985 memakai notasi subskrip untuk kompleks yang diferensialnya menaikkan derajat; edisi menggunakan gradasi kohomologis. Baris 5004 salah menulis $H^\wedge(\cdot)$, yang diperbaiki menjadi H^n . Klaim produk tak hingga pada catatan pinggir baris 5002 dibatasi pada keluarga terindeks himpunan di $R\text{-Mod}$ dan dinyatakan dalam ZFC, tempat produk bersifat eksak.

Untuk grupoid fundamental kita sebelumnya mempunyai

$$\Pi_1(X \sqcup Y) \simeq \Pi_1(X) \sqcup \Pi_1(Y).$$

Demikian pula, perhitungan kohomologi di atas dapat direduksi ke himpunan- Δ yang bukan gabungan saling lepas objek-objek yang lebih kecil. Perlu dicatat bahwa Lema 23.1 sungguh lebih kuat daripada Akibat 23.1: dua kompleks dapat mempunyai modul kohomologi yang isomorfik tanpa kompleks itu sendiri isomorfik.

23.3 Perekatan dua sub-himpunan- Δ

Sesudah menghitung grupoid fundamental gabungan saling lepas, langkah berikutnya dahulu ialah menghitung grupoid fundamental sebuah perekatan ruang $X = U \cup V$ dari lingkungan $U, V \subseteq X$. Secara lebih tepat, kita mengambil informasi tentang $\Pi_1(X)$ dari $\Pi_1(U)$, $\Pi_1(V)$, dan $\Pi_1(U \cap V)$. Untuk kohomologi keadaan tidak sesederhana itu, bahkan sebelum memperhitungkan bahwa kita bekerja dengan himpunan- Δ . Dua contoh berikut memotivasi alat utama yang akan dikembangkan.

Contoh 23.1 (menutupi batas tetrahedron dengan dua cakram). Pertimbangkan permukaan kombinatorik $X_\bullet = \partial\Delta[3]$ dengan simpul $0, 1, 2, 3$. Simpleksnya adalah **subhimpunan wajar takkosong** dari $\{0, 1, 2, 3\}$: simpleks- n adalah subhimpunan beranggota $n+1$ hanya untuk $0 \leq n \leq 2$. Tidak ada simpleks-3, karena tetrahedron bagian dalam tidak termasuk batas.

Definisikan dua sub-himpunan- Δ $U_\bullet$ dan $V_\bullet$ sebagai berikut.

1. $U_\bullet$ mempunyai keempat simpul, dua simpleks-2 $\{0, 1, 2\}$ dan $\{0, 1, 3\}$, serta semua sisi $X_\bullet$ kecuali $\{2, 3\}$.
2. $V_\bullet$ juga mempunyai keempat simpul, dua simpleks-2 $\{1, 2, 3\}$ dan $\{0, 2, 3\}$, serta semua sisi kecuali $\{0, 1\}$.

Catatan pinggir sumber. Irisan $U_\bullet \cap V_\bullet$ didefinisikan derajat demi derajat oleh $(U_\bullet \cap V_\bullet)_n = U_n \cap V_n \subseteq X_n$.

Tabel berikut mencatat seluruh simpleks dan sekaligus menggantikan kebutuhan akan gambar tetrahedron yang bergantung pada posisi visual.

	Derajat	$X = \partial\Delta[3]$	U	V	$W = U \cap V$
	0	$0, 1, 2, 3$	$0, 1, 2, 3$	$0, 1, 2, 3$	$0, 1, 2, 3$
	1	$01, 02, 03, 12, 13, 23$	$01, 02, 03, 12, 13$	$02, 03, 12, 13, 23$	$02, 03, 12, 13$
	2	$012, 013, 023, 123$	$012, 013$	$023, 123$	$\emptyset$

Setiap sisi diarahkan dari label yang lebih kecil ke label yang lebih besar. Kedua segitiga U bertemu pada sisi 01; kedua segitiga V bertemu pada sisi 23. Irisan W adalah graf dengan siklus tak berarah

$$0 - 2 - 1 - 3 - 0,$$

yang menggunakan sisi 02, 12, 13, 03. Dengan demikian jumlah simpleks per derajat adalah

$$X : (4, 6, 4), \quad U : (4, 5, 2), \quad V : (4, 5, 2), \quad W : (4, 4, 0).$$

Catatan pinggir sumber. Realisasi geometrik graf irisan $W_\bullet$ homeomorfik dengan sebuah lingkaran.

Kita mengetahui, atau setidaknya menduga dari model standar, kohomologi $U_\bullet$, $V_\bullet$, dan $W_\bullet$: dua objek pertama mentriangulasi cakram I^2 , sedangkan yang terakhir mentriangulasi lingkaran. Kita ingin menghitung kohomologi $\partial\Delta[3]$ hanya dari informasi itu.

Fungtorialitas $C^\bullet(-; R)$ memberi pemetaan restriksi pada setiap derajat.

Diagram 23.2 (kuadrat restriksi yang komutatif). Dengan $W_\bullet = U_\bullet \cap V_\bullet$, kuadrat

$$\begin{array}{ccc} R^{X_n} & \xrightarrow{\text{res}_U} & R^{U_n} \\ \downarrow & & \downarrow \\ R^{V_n} & \xrightarrow{\text{res}_W} & R^{W_n} \end{array}$$

Panah vertikal kiri adalah $\text{res}_V: R^{X_n} \rightarrow R^{V_n}$ dan panah vertikal kanan adalah $\text{res}_W: R^{U_n} \rightarrow R^{W_n}$. Panah mendatar bawah adalah $\text{res}_W: R^{V_n} \rightarrow R^{W_n}$. Kuadrat itu komutatif: kedua lintasan memetakan $g \in R^{X_n}$ ke $g|_{W_n}$. Dua label res_W mempunyai domain berbeda, tetapi keduanya berarti pembatasan ke himpunan yang sama W_n .

Untuk memperoleh bentuk linear berurutan, definisikan

$$\alpha_n: R^{X_n} \longrightarrow R^{U_n} \oplus R^{V_n}, \quad \alpha_n(g) = (g|_{U_n}, g|_{V_n}),$$

dan

$$\beta_n: R^{U_n} \oplus R^{V_n} \longrightarrow R^{W_n}, \quad \beta_n(f, h) = f|_{W_n} - h|_{W_n}.$$

Maka diperoleh barisan

$$0 \longrightarrow R^{X_n} \xrightarrow{\alpha_n} R^{U_n} \oplus R^{V_n} \xrightarrow{\beta_n} R^{W_n} \longrightarrow 0.$$

Bukti eksaknya barisan perekatan. Barisan ini eksak. Pemetaan α_n injektif karena $X_n = U_n \cup V_n$: sebuah fungsi pada X_n ditentukan oleh dua pembatasannya. Jelas $\beta_n \alpha_n = 0$. Jika $\beta_n(f, h) = 0$, maka f dan h setuju pada W_n . Karena itu rumus

$$g(z) = \begin{cases} f(z), & z \in U_n, \\ h(z), & z \in V_n \end{cases}$$

terdefinisi dengan baik dan menghasilkan satu-satunya $g \in R^{X_n}$ dengan $\alpha_n(g) = (f, h)$. Jadi $\ker \beta_n = \text{im } \alpha_n$. Terakhir, untuk $k \in R^{W_n}$, perluas k menjadi $f \in R^{U_n}$ dengan menetapkan $f = 0$ pada $U_n \setminus W_n$, dan ambil $h = 0$. Maka $\beta_n(f, h) = k$, sehingga β_n surjektif.

Pemetaan-pemetaan ini juga komutatif dengan diferensial. Untuk $g \in R^{X_n}$,

$$\alpha_{n+1}(\delta_X^n g) = (\delta_U^n(g|_{U_n}), \delta_V^n(g|_{V_n})) = (\delta_U^n \oplus \delta_V^n) \alpha_n(g),$$

karena semua *face map* pada sub-himpunan- Δ merupakan pembatasan *face map* pada $X_\bullet$. Demikian pula,

$$\begin{aligned} \beta_{n+1}(\delta_U^n f, \delta_V^n h) &= (\delta_U^n f)|_{W_{n+1}} - (\delta_V^n h)|_{W_{n+1}} \\ &= \delta_W^n(f|_{W_n} - h|_{W_n}) \\ &= \delta_W^n \beta_n(f, h). \end{aligned}$$

Jadi, untuk **setiap** $n \geq 0$ dengan $X_n = U_n \cup V_n$, barisan derajat- n di atas menyatu menjadi barisan eksak pendek kompleks korantai

$$0 \longrightarrow C^\bullet(X_\bullet; R) \xrightarrow{\alpha} C^\bullet(U_\bullet; R) \oplus C^\bullet(V_\bullet; R) \xrightarrow{\beta} C^\bullet(W_\bullet; R) \longrightarrow 0.$$

Kita ingin mengetahui kohomologi kompleks taknol paling kiri, sedangkan yang telah kita hitung—setidaknya secara prinsip—hanyalah kohomologi dua kompleks lain dalam barisan tersebut.

Argumen itu berlaku tanpa perubahan untuk sembarang himpunan- Δ $X_\bullet$ dan sub-himpunan- Δ $U_\bullet, V_\bullet$ yang memenuhi

$$X_n = U_n \cup V_n \quad \text{untuk setiap } n \geq 0.$$

Dengan $W_\bullet = U_\bullet \cap V_\bullet$, kita kembali memperoleh barisan eksak pendek kompleks modul- R yang ditampilkan di atas.

Audit sumber 23.4. Notes.tex baris 5023–5024 menggambarkan simpleks $\partial\Delta[3]$ sebagai semua subhimpunan beranggota $n + 1$ tanpa membatasi n ; untuk batas tetrahedron, yang benar ialah subhimpunan wajar takkosong, sehingga $0 \leq n \leq 2$. Baris 5057 hanya menyebut eksak sebagai latihan singkat. Edisi memberi sensus simpleks dan bukti lengkap injektivitas, perekatan pada kernel, surjektivitas melalui perluasan dengan nol, serta komutativitas kedua pemetaan dengan diferensial. Baris 5067 juga diperjelas dengan kuantor **untuk setiap** n pada syarat penutup derajat demi derajat.

23.4 Fungsi tereduksi pada sebuah hasil bagi

Untuk contoh kedua, kita menyelidiki bagaimana kohomologi hasil bagi mungkin dihitung dari kohomologi himpunan- Δ semula dan sub-himpunan- Δ yang diruntuhkan.

Contoh 23.2 (pasangan dan fungsi pada hasil bagi; bagian pertama). Ambil himpunan- Δ $X_\bullet$ beserta sub-himpunan- Δ $A_\bullet \subset X_\bullet$.

Catatan pinggir sumber. Data ini disebut sebuah **pasangan** $(X_\bullet, A_\bullet)$.

Secara geometrik, $X_\bullet$ dapat mentriangulasi sebuah ruang dan $A_\bullet$ mentriangulasi subruangnya. Kita dapat membentuk ruang hasil bagi $|X_\bullet|/|A_\bullet|$, tetapi belum jelas bahwa terdapat hasil bagi himpunan- Δ yang wajar, dengan simpleks derajat- n berupa X_n/A_n , dan yang realisasinya mentriangulasi hasil bagi topologis itu. Untuk sementara, andaikan terdapat himpunan- Δ $X_\bullet/A_\bullet$ beserta pemetaan hasil bagi

$$X_\bullet \longrightarrow X_\bullet/A_\bullet.$$

Pertanyaannya ialah apakah $H^n(X_\bullet/A_\bullet; R)$ dapat dihitung dari $H^n(X_\bullet; R)$ dan $H^n(A_\bullet; R)$.

Mulailah pada tingkat himpunan. Misalkan $i: A \hookrightarrow X$. Jika $A \neq \emptyset$, definisikan

$$X/A := X/(a_1 \sim a_2 \text{ untuk semua } a_1, a_2 \in A).$$

Pemetaan hasil bagi $q: X \rightarrow X/A$ meruntuhkan seluruh A ke titik basis kanonik $*$ $= [a]$. Prakomposisi memberi pemetaan R -linear

$$R^{X/A} \xrightarrow{q^*} R^X \xrightarrow{i^*} R^A.$$

Pemetaan q^* injektif karena q surjektif, sedangkan i^* surjektif karena setiap fungsi $A \rightarrow R$ dapat diperluas dengan memberikan nilai nol pada $X \setminus A$. Bila R bukan gelanggang nol, ini pada umumnya

bukan kompleks: citra q^* terdiri atas fungsi $X \rightarrow R$ yang konstan pada A , sementara kernel i^* terdiri atas fungsi yang bernilai nol pada A . Jadi $\text{im } q^*$ tidak termuat dalam $\ker i^*$.

Titik basis hasil bagi memberi evaluasi

$$\text{ev}_*: R^{X/A} \longrightarrow R,$$

dan kita definisikan modul fungsi **tereduksi**

$$\tilde{R}^{X/A} := \ker(\text{ev}_*) = \{\varphi: X/A \rightarrow R \mid \varphi(*) = 0\}.$$

Pembatasan pemetaan yang sama, bukan seluruh q^* , menghasilkan isomorfisma

$$q^*|_{\tilde{R}^{X/A}}: \tilde{R}^{X/A} \xrightarrow{\cong} \ker(i^*) \subseteq R^X.$$

Bukti isomorfisma fungsi tereduksi. Memang, jika $\varphi(*) = 0$, maka $\varphi \circ q$ bernilai nol pada A . Sebaliknya, setiap $g: X \rightarrow R$ yang nol pada A turun secara unik ke $\varphi: X/A \rightarrow R$ dengan $\varphi(*) = 0$. Oleh karena itu kita memperoleh barisan eksak pendek

$$0 \longrightarrow \tilde{R}^{X/A} \xrightarrow{q^*} R^X \xrightarrow{i^*} R^A \longrightarrow 0.$$

Jika $A = \emptyset$, tidak ada unsur a yang menghasilkan titik basis kanonik. Dengan konvensi $X/\emptyset = X$, kita mempunyai $R^A = R^\emptyset = 0$, i^* adalah pemetaan nol, dan $\ker i^* = R^X$. Barisan yang relevan hanyalah

$$0 \longrightarrow R^X \xrightarrow{\text{id}} R^X \longrightarrow 0,$$

bukan barisan yang memakai kernel evaluasi pada titik basis yang tidak ada. Pemisahan kedua kasus ini juga menunjukkan mengapa hasil bagi himpunan- Δ derajat demi derajat memerlukan kehati-hatian: sekalipun $A_\bullet$ takkosong, beberapa A_n dapat kosong.

Dengan cara ini kita bahkan tidak perlu membentuk himpunan hasil bagi untuk mendapatkan modul yang berperilaku seperti fungsi tereduksi padanya: $\ker i^*$ sudah tersedia langsung. Hal itu juga membantu mengatasi ketidakjelasan apakah $X_\bullet/A_\bullet$ sendiri merupakan konstruksi himpunan- Δ yang baik.

Kelanjutan sumber. Lingkungan `example` sumber yang dibuka pada `Notes.tex` baris 5076 **belum berakhir** pada batas unit ini. Baris 5112 kosong; Kuliah 24 dimulai di baris 5113 dan contoh baru ditutup pada baris 5121. Penutupan blok Markdown edisi ini hanya menjaga struktur berkas, bukan menyatakan bahwa lingkungan sumber telah selesai. Baris 5113–5121 tidak diimpor ke Unit 23 dan harus diterjemahkan sebagai awal Unit 24.

Audit sumber 23.5. `Notes.tex` baris 5078–5111 berganti-ganti antara A dan Y untuk subobjek yang sama. Edisi memakai A secara konsisten. Pernyataan titik basis kanonik pada baris 5090 hanya benar bila $A \neq \emptyset$; kasus kosong dipisahkan. Baris 5102–5105 diperketat: yang dipetakan isomorfik oleh q^* ke $\ker i^*$ bukan seluruh $R^{X/A}$, melainkan pembatasan $q^*|_{\ker(\text{ev}_*)}$. Edisi membuktikan kedua arah isomorfisma dan tidak menutup lingkungan contoh sumber yang melintasi batas Kuliah 24.

Audit aksesibilitas 23.6. Dua diagram Xy-pic pada `Notes.tex` baris 4944–4947 dan 5045–5048 diganti dengan diagram semantik terpusat yang menamai setiap domain, kodomain, dan pemetaan. Keenam catatan pinggir ditempatkan kembali dalam urutan baca. Sensus tetrahedron, daftar sisi, komutativitas, dan fungsi setiap panah juga dinyatakan dalam prosa, sehingga tidak ada argumen yang bergantung pada posisi, warna, atau isi gambar saja.

Audit prosa 23.7. Kekeliruan ejaan, tanda baca, artikel, dan frasa ganda yang deterministik pada Notes.tex baris 4941, 4952–4953, 4987, 5002, 5013, 5050, dan 5057 dinormalisasi dalam bahasa Indonesia alami tanpa mengubah urutan maupun isi matematis sumber.

Audit batas 23.8. Lingkungan `example` sumber melintasi penanda Kuliah 24. Edisi menutup blok Markdown Unit 23 hanya secara sintaktis, mempertahankan pengenalan kelanjutan, dan tidak memindahkan satu pun baris 5113–5121 ke unit ini. Unit 24 harus membuka kembali contoh yang sama sebelum menerjemahkan penutupnya.

Pendamping penguasaan: pemeriksaan, petunjuk, dan solusi lengkap

Enam paket berikut adalah materi asli edisi. Semuanya dibatasi pada sasaran Unit 23: evaluasi pada simpleks, augmentasi bertitik, gabungan saling lepas, eksaknya perekatan, sensus tetrahedron, dan fungsi tereduksi pada hasil bagi.

Pemeriksaan Penguasaan 23.1 (evaluasi dalam derajat n). Untuk $x \in X_n$, tentukan pemetaan korantai yang diinduksi oleh $\lceil x \rceil: \Delta[n] \rightarrow X_\bullet$ pada derajat n dan $n+1$. Buktikan langsung bahwa komponen derajat- n adalah evaluasi pada x dan jelaskan mengapa rumus $C^n(X_\bullet; R) = R^{X_{n+1}}$ tidak mungkin benar.

Petunjuk. Gunakan $\Delta[n]_n = \{\{0, \dots, n\}\}$ dan $\Delta[n]_{n+1} = \emptyset$. Ingat bahwa prakomposisi oleh komponen pemetaan nama membalik arah.

Solusi Pemeriksaan 23.1. Pada derajat n , komponen pemetaan nama ialah

$$\lceil x \rceil_n: \Delta[n]_n \longrightarrow X_n, \quad \{0, \dots, n\} \longmapsto x.$$

Prakomposisi memberi

$$\lceil x \rceil_n^*: R^{X_n} \longrightarrow R^{\Delta[n]_n} \cong R, \quad g \longmapsto g(x).$$

Jadi komponen itu tepat evaluasi. Pada derajat $n+1$, kodomain pemetaan prakomposisi adalah $R^{\Delta[n]_{n+1}} = R^\emptyset = 0$, sehingga komponen $R^{X_{n+1}} \rightarrow 0$ adalah pemetaan nol yang unik. Diagram kompleks komutatif karena pemetaan nama komutatif dengan semua *face map*.

Menurut definisi, korantai derajat k adalah fungsi pada simpleks- k : $C^k(X_\bullet; R) = R^{X_k}$. Maka menulis $C^n = R^{X_{n+1}}$ menggeser derajat dan bertentangan sekaligus dengan definisi, domain evaluasi $g(x)$, dan diagram yang menempatkan R^{X_n} pada derajat n .

Pemeriksaan Penguasaan 23.2 (kealamian dan pemisahan augmentasi). Untuk pemetaan bertitik $f: (X_\bullet, x) \rightarrow (Y_\bullet, y)$, buktikan $\varepsilon_x f^* = \varepsilon_y$ pada H^0 . Lalu tunjukkan bahwa pemetaan

$$s: R \longrightarrow H^0(X_\bullet; R), \quad r \longmapsto [\text{fungsi konstan bernilai } r]$$

memenuhi $\varepsilon_x s = \text{id}_R$ bila $X_\bullet$ bertitik, dan simpulkan dekomposisi modul yang dihasilkan.

Petunjuk. Wakili kelas H^0 oleh fungsi $g: Y_0 \rightarrow R$ dengan $\delta^0 g = 0$. Evaluasi $g \circ f_0$ pada x . Untuk pemisahan, fungsi konstan selalu merupakan kosiklus nol.

Solusi Pemeriksaan 23.2. Ambil $[g] \in H^0(Y_\bullet; R)$. Karena $f_0(x) = y$,

$$(\varepsilon_x \circ f^*)([g]) = \varepsilon_x([g \circ f_0]) = (g \circ f_0)(x) = g(y) = \varepsilon_y([g]).$$

Jadi kuadrat augmentasi komutatif dan arah f^* memang berlawanan dengan f . Untuk $r \in R$, fungsi konstan c_r memenuhi $\delta^0 c_r = 0$, sebab pada setiap sisi kedua nilai titik ujungnya sama. Tidak ada korantai berderajat negatif, sehingga $[c_r]$ terdefinisi di H^0 . Evaluasi memberi

$$(\varepsilon_x \circ s)(r) = c_r(x) = r.$$

Maka s adalah invers kanan bagi augmentasi. Setiap $m \in H^0(X; R)$ mempunyai uraian unik

$$m = (m - s\varepsilon_x(m)) + s\varepsilon_x(m),$$

dengan suku pertama di $\ker \varepsilon_x$ dan suku kedua di $s(R)$. Akibatnya

$$H^0(X_\bullet; R) \cong \ker \varepsilon_x \oplus R.$$

Pemeriksaan Penguasaan 23.3 (jumlah hingga versus produk tak hingga). Untuk keluarga himpunan- Δ $(X_\bullet^\alpha)_{\alpha \in I}$, buktikan isomorfisma kompleks

$$C^\bullet\left(\bigsqcup_{\alpha \in I} X_\bullet^\alpha; R\right) \cong \prod_{\alpha \in I} C^\bullet(X_\bullet^\alpha; R).$$

Jelaskan mengapa ruas kanan bukan jumlah langsung bila I tak hingga, dan buktikan dalam ZFC bahwa kohomologi produk kompleks modul- R adalah produk kohomologi.

Petunjuk. Sebuah fungsi pada gabungan saling lepas setara dengan keluarga semua pembatasannya, tanpa syarat dukungan hingga. Kernel dihitung per koordinat. Untuk citra, pilih praimaj pada setiap koordinat; langkah terakhir inilah yang memakai aksioma pilihan.

Solusi Pemeriksaan 23.3. Pada setiap derajat n , pemetaan pembatasan

$$R \bigsqcup_{\alpha} X_n^\alpha \longrightarrow \prod_{\alpha} R^{X_n^\alpha}, \quad g \longmapsto (g|_{X_n^\alpha})_{\alpha}$$

bijektif: keluarga fungsi di ruas kanan melekat secara unik menjadi sebuah fungsi pada gabungan saling lepas. Karena setiap *face map* melestarikan komponen α , bijeksi ini komutatif dengan diferensial dan memberi isomorfisma kompleks.

Jika I tak hingga, sebuah unsur produk boleh mempunyai komponen tak nol pada tak hingga banyak indeks. Jumlah langsung hanya memuat keluarga dengan dukungan hingga. Misalnya, bila semua X_0^α adalah himpunan satu anggota dan $1_R \neq 0$, keluarga konstan $(1_R)_\alpha$ berada di produk tetapi tidak di jumlah langsung.

Tuliskan $C^\bullet = \prod_{\alpha} C_\alpha^\bullet$. Karena diferensial bertindak per koordinat,

$$Z^n(C) = \ker\left(\prod_{\alpha} \delta_\alpha^n\right) = \prod_{\alpha} Z^n(C_\alpha).$$

Juga

$$B^n(C) = \operatorname{im}\left(\prod_{\alpha} \delta_\alpha^{n-1}\right) = \prod_{\alpha} B^n(C_\alpha).$$

Inklusi dari kiri ke kanan jelas. Untuk arah sebaliknya, bagi setiap $b_\alpha \in B^n(C_\alpha)$ pilih a_α dengan $\delta_\alpha^{n-1}a_\alpha = b_\alpha$; pilihan serentak ini tersedia dalam ZFC. Akhirnya pemetaan

$$\prod_{\alpha} Z^n(C_\alpha) \longrightarrow \prod_{\alpha} H^n(C_\alpha), \quad (z_\alpha) \longmapsto ([z_\alpha])$$

surjektif dalam ZFC dan berkernel $\prod_{\alpha} B^n(C_{\alpha})$. Teorema isomorfisma memberi

$$H^n\left(\prod_{\alpha} C_{\alpha}^{\bullet}\right) \cong \prod_{\alpha} H^n(C_{\alpha}^{\bullet}).$$

Pemeriksaan Penguasaan 23.4 (eksak melalui perekatan fungsi). Misalkan $U_{\bullet}, V_{\bullet} \subseteq X_{\bullet}$ dan $X_n = U_n \cup V_n$ untuk setiap n . Dengan $W_{\bullet} = U_{\bullet} \cap V_{\bullet}$, buktikan dari definisi bahwa

$$0 \rightarrow C^{\bullet}(X; R) \xrightarrow{\alpha} C^{\bullet}(U; R) \oplus C^{\bullet}(V; R) \xrightarrow{\beta} C^{\bullet}(W; R) \rightarrow 0$$

adalah barisan eksak pendek kompleks, untuk $\alpha(g) = (g|_U, g|_V)$ dan $\beta(f, h) = f|_W - h|_W$.

Petunjuk. Kerjakan setiap derajat terlebih dahulu. Pasangan dalam kernel β melekat karena setuju pada irisan. Untuk surjektivitas, perluas fungsi pada W_n dengan nol ke U_n . Sesudah itu gunakan bahwa restriksi komutatif dengan diferensial korantai.

Solusi Pemeriksaan 23.4. Untuk setiap n , α_n injektif karena fungsi pada $X_n = U_n \cup V_n$ ditentukan oleh pembatasannya. Selain itu $\beta_n \alpha_n(g) = g|_{W_n} - g|_{W_n} = 0$.

Jika $(f, h) \in \ker \beta_n$, maka $f|_{W_n} = h|_{W_n}$. Definisikan $g: X_n \rightarrow R$ dengan $g = f$ pada U_n dan $g = h$ pada V_n . Kesamaan pada irisan membuat definisi ini konsisten, dan $\alpha_n(g) = (f, h)$. Jadi $\ker \beta_n = \text{im } \alpha_n$.

Untuk $k \in R^{W_n}$, definisikan $f \in R^{U_n}$ dengan $f = k$ pada W_n dan $f = 0$ pada $U_n \setminus W_n$, lalu ambil $h = 0$. Maka $\beta_n(f, h) = k$, sehingga β_n surjektif.

Terakhir, karena U, V, W adalah sub-himpunan- Δ , pembatasan komutatif dengan setiap jumlah bertanda *face map*. Oleh sebab itu

$$\alpha_{n+1} \delta_X^n = (\delta_U^n \oplus \delta_V^n) \alpha_n, \quad \beta_{n+1} (\delta_U^n \oplus \delta_V^n) = \delta_W^n \beta_n.$$

Jadi α dan β adalah morfisma kompleks, dan eksak pada setiap derajat berarti barisan tersebut eksak pendek sebagai barisan kompleks.

Pemeriksaan Penguasaan 23.5 (sensus dan irisan tetrahedron). Dari definisi $U_{\bullet}, V_{\bullet} \subseteq \partial \Delta[3]$ pada Contoh 23.1, turunkan—bukan sekadar baca dari gambar—jumlah simpleks

$$X : (4, 6, 4), \quad U : (4, 5, 2), \quad V : (4, 5, 2), \quad W : (4, 4, 0).$$

Tunjukkan bahwa realisasi W adalah lingkaran dan bahwa $X_n = U_n \cup V_n$ untuk setiap n .

Petunjuk. Daftar semua subhimpunan wajar takkosong dari $\{0, 1, 2, 3\}$. Irisan membuang sisi 01 dan 23 sekaligus serta tidak mempunyai segitiga. Susun empat sisi sisanya menjadi satu siklus.

Solusi Pemeriksaan 23.5. Batas tetrahedron mempunyai $\binom{4}{1} = 4$ simpul, $\binom{4}{2} = 6$ sisi, dan $\binom{4}{3} = 4$ segitiga; subhimpunan beranggota empat dikeluarkan. Jadi X mempunyai sensus $(4, 6, 4)$.

U mempertahankan semua simpul, membuang tepat sisi 23, dan mempertahankan tepat segitiga 012, 013, sehingga sensusnya $(4, 5, 2)$. Demikian pula V membuang tepat sisi 01 dan mempertahankan 023, 123, sehingga sensusnya $(4, 5, 2)$. Irisan W mempertahankan semua simpul dan hanya sisi yang muncul di kedua daftar,

$$02, 03, 12, 13,$$

serta tidak mempunyai segitiga. Jadi sensusnya $(4, 4, 0)$. Graf itu terhubung dan setiap simpul berderajat dua; urutan $0 - 2 - 1 - 3 - 0$ melintasi setiap sisi tepat sekali. Realisasinya adalah satu siklus, maka homeomorfik dengan S^1 .

Pada derajat nol kedua subobjek memuat semua simpul. Pada derajat satu, sisi yang hilang dari U adalah 23 tetapi sisi itu berada di V , sedangkan sisi yang hilang dari V adalah 01 tetapi berada di U . Pada derajat dua, dua pasangan segitiga mereka saling melengkapi seluruh empat segitiga X . Pada derajat $n \geq 3$ ketiga himpunan kosong. Jadi $X_n = U_n \cup V_n$ untuk setiap n .

Pemeriksaan Penguasaan 23.6 (fungsi tereduksi dan kasus kosong). Untuk inklusi himpunan $i: A \hookrightarrow X$, buktikan bahwa bila $A \neq \emptyset$,

$$q^*|_{\ker(\text{ev}_*)}: \ker(\text{ev}_*) \xrightarrow{\cong} \ker(i^*)$$

adalah isomorfisma, lalu turunkan barisan eksak pendek yang bersesuaian. Jelaskan tepat apa yang berubah bila $A = \emptyset$.

Petunjuk. Fungsi pada X/A berada di kernel evaluasi tepat bila nilainya pada kelas yang diruntuhkan adalah nol. Untuk arah balik, turunkan fungsi $g: X \rightarrow R$ yang nol pada A ke kelas-kelas ekuivalensi. Pada kasus kosong tidak ada kelas runtutan yang menyediakan titik basis.

Solusi Pemeriksaan 23.6. Andaikan $A \neq \emptyset$ dan tuliskan $* = [A] \in X/A$. Jika $\varphi \in \ker(\text{ev}_*)$, maka untuk setiap $a \in A$,

$$(q^*\varphi)(a) = \varphi(q(a)) = \varphi(*) = 0.$$

Jadi $q^*\varphi \in \ker i^*$. Pembatasan q^* tetap injektif karena q surjektif. Sebaliknya, jika $g \in \ker i^*$, definisikan

$$\varphi([x]) = g(x).$$

Rumus ini terdefinisi dengan baik: kelas bukan- $*$ berisi satu unsur, sedangkan semua wakil kelas $*$ berada di A dan bernilai nol. Maka $\varphi(*) = 0$ dan $q^*\varphi = g$. Jadi pembatasan itu surjektif serta merupakan isomorfisma. Karena i^* surjektif melalui perluasan dengan nol, diperoleh

$$0 \longrightarrow \ker(\text{ev}_*) \xrightarrow{q^*} R^X \xrightarrow{i^*} R^A \longrightarrow 0.$$

Jika $A = \emptyset$, tidak ada $* = [A]$ kanonik dan karena itu tidak ada evaluasi kanonik yang kernel-nya dapat dipakai. Dengan $X/\emptyset = X$, pemetaan q adalah identitas, $R^\emptyset = 0$, dan $\ker i^* = R^X$. Barisannya merosot menjadi

$$0 \longrightarrow R^X \xrightarrow{\text{id}} R^X \longrightarrow 0.$$

Jadi kasus kosong bukan alasan untuk memilih titik basis sebarang; ia memerlukan pernyataan terpisah.

Batas ke Unit 24. Rentang Unit 23 berhenti pada Notes.tex baris 5112, tepat sebelum penanda `\lecturenum{24}` pada baris 5113. Lingkungan contoh sumber yang dibuka pada baris 5076 tetap terbuka dan baru ditutup pada baris 5121. Unit 24 harus mulai pada baris 5113, menerjemahkan kelanjutan itu, dan baru kemudian menutup objek sumbernya. Tidak satu pun isi baris 5113–5121 dimasukkan ke unit ini. Cursor sumber berikutnya yang tepat adalah baris 5113.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts, © 2019 David Michael Roberts, tepatnya [Notes.tex](#) baris 5113–5369 pada commit [b947ad2e9f9e301bfc24590a9db653bc54fa1a53](#) dari repositori [DavidMichaelRoberts/AlgebraicTopology2019](#). Rentang aktif itu terdiri atas 257 baris fisik. Dengan normalisasi LF dan terminator baris kosong penutup dipertahankan, ukurannya 12.837 byte dan SHA-256-nya adalah `b2128930a56a0a8c04c327a397e72e21b215ffe742bb684e8dd166f0e04b0aea`. Baris 5113–5121 melanjutkan dan menutup contoh yang dimulai pada baris 5076 dan diterjemahkan pertama kali dalam [Contoh 23.2](#). Baris 5370, yang memulai Kuliah 25, tidak termasuk. Materi sumber dan adaptasi Indonesia ini tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#).

Rentang sumber memuat satu penanda kuliah, satu penutup `example` tanpa pembuka baru, satu definisi, satu teorema, tiga lema, satu catatan, tiga lingkungan bukti, satu enumerasi enam butir, tujuh catatan pinggir, dua diagram Xy-pic, satu gambar TikZ, empat label, empat rujukan silang, dan delapan tampilan matematika. Tidak ada latihan formal sumber, sitasi, gambar eksternal, `input`, atau `include`.

Edisi memindahkan ketujuh catatan pinggir ke urutan bacaan utama dan mengganti dua diagram Xy-pic serta gambar TikZ dengan data panah semantik terpusat. Edisi juga melengkapi bukti bahwa kernel dan kompleks korantai relatif benar-benar membentuk kompleks, seluruh enam kewajiban pembuktian Lema Ular, eksaknya diagram persiapan, identifikasi kernel dan kokernel dengan kohomologi, penyambungan barisan enam-suku, dan kealamian barisan eksak panjang. Kekeliruan deterministik yang diperbaiki dicatat tepat di tempatnya; tidak ada bahan matematis luar yang dimasukkan sebagai materi sumber.

Enam pemeriksaan penguasaan, enam petunjuk, semua bukti penutup edisi, dan enam solusi lengkap merupakan materi asli edisi dan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen; edisi ini tidak disponsori, didukung, disahkan, ataupun diberi status resmi oleh David Michael Roberts atau institusinya. Produksi edisi ini dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**. Pernyataan ini menambah transparansi proses dan tidak mengurangi kredit penulis sumber ataupun kredit kontributor manusia.

24 Kuliah 24

24.1 Kelanjutan contoh pasangan dan hasil bagi

Kelanjutan Contoh 23.2 (hubungan timbal balik). Bagian ini melanjutkan objek sumber yang diterjemahkan sebagai [Contoh 23.2](#); objek itu menunjuk ke baris 5113 sebagai kursor berikutnya, sedangkan objek ini mencatat induknya melalui atribut `data-continuation-of` dan menutup lingkungan sumber pada baris 5121.

Jadi, untuk pasangan $(X_\bullet, A_\bullet)$ dengan fungsi inklusi $i: A_\bullet \hookrightarrow X_\bullet$, kita dapat mengambil pemetaan restriksi yang surjektif

$$C^\bullet(X_\bullet; R) \xrightarrow{i^*} C^\bullet(A_\bullet; R) \longrightarrow 0.$$

Kernel $\ker(i^*)$ berperan sebagai modul fungsi virtual pada $X_\bullet/A_\bullet$ tanpa mengharuskan kita mendefinisikan hasil bagi itu sebagai himpunan- Δ . Selain itu, sebagaimana dalam contoh sebelumnya, kita memperoleh barisan eksak pendek kompleks modul- R .

Penutupan bukti: restriksi, kernel, dan eksaknya barisan. Pada derajat n , komponen restriksi adalah

$$i_n^*: R^{X_n} \longrightarrow R^{A_n}, \quad i_n^*(g) = g|_{A_n}.$$

Karena $A_\bullet$ merupakan sub-himpunan- Δ , setiap *face map* pada $A_\bullet$ adalah pembatasan *face map* pada $X_\bullet$. Oleh sebab itu

$$\delta_A^n i_n^* = i_{n+1}^* \delta_X^n,$$

sehingga $(i_n^*)_n$ adalah pemetaan korantai. Pemetaan i_n^* surjektif: untuk $h: A_n \rightarrow R$, definisikan $\hat{h}: X_n \rightarrow R$ dengan $\hat{h} = h$ pada A_n dan $\hat{h} = 0$ pada $X_n \setminus A_n$. Maka $i_n^*(\hat{h}) = h$.

Jika $g \in \ker i_n^*$, persamaan pemetaan korantai memberi

$$i_{n+1}^*(\delta_X^n g) = \delta_A^n(i_n^* g) = 0.$$

Jadi diferensial δ_X^n membatasi diri ke pemetaan $\ker i_n^* \rightarrow \ker i_{n+1}^*$, dan diferensial terbatas itu tetap berkuadrat nol. Dengan inklusi kernel pada ruas kiri, diperoleh barisan eksak pendek kompleks

$$0 \longrightarrow \ker(i^*) \longrightarrow C^\bullet(X_\bullet; R) \xrightarrow{i^*} C^\bullet(A_\bullet; R) \longrightarrow 0.$$

Perluasan dengan nol di atas hanya membuktikan surjektivitas **pada setiap derajat**; pada umumnya ia bukan pemetaan korantai dan bukan pemisahan kompleks. Misalnya, ambil $X_\bullet = \Delta[1]$, ambil $A_\bullet$ yang hanya memuat simpul 0, dan andaikan $1_R \neq 0$. Fungsi 1 pada A_0 meluas dengan nol menjadi fungsi bernilai 1 di simpul 0 dan 0 di simpul 1. Kobatasnya pada sisi 01 adalah $\pm 1_R$, sedangkan perluasan dengan nol dari kobatas pada $A_\bullet$ adalah nol karena $A_1 = \emptyset$. Jadi pemisahan derajat demi derajat itu tidak komutatif dengan diferensial.

Audit sumber 24.1. Notes.tex baris 5113–5120 menyatakan surjektivitas dan eksaknya barisan melalui analogi. Edisi memeriksa pemetaan korantai, surjektivitas derajat demi derajat, kestabilan kernel, dan eksaknya barisan; ia juga membedakan perluasan dengan nol dari pemisahan pemetaan korantai.

24.2 Kernel morfisma kompleks dan korantai relatif

Sebelum melanjutkan, perlu dicatat bahwa konstruksi kernel terakhir memang terdefinisi dengan baik.

Lema 24.1 (kernel derajat demi derajat adalah sebuah kompleks). Diberikan morfisma kompleks

$$\varphi: A_\bullet \longrightarrow B_\bullet,$$

kernel derajat demi derajat $\ker(\varphi_n) \subseteq A_n$ menyusun sebuah kompleks $\ker(\varphi)$. Diferensialnya adalah pembatasan diferensial $A_n \rightarrow A_{n+1}$ ke kernel yang sesuai.

Bukti. Tuliskan diferensial kedua kompleks sebagai $d_A^n: A_n \rightarrow A_{n+1}$ dan $d_B^n: B_n \rightarrow B_{n+1}$. Untuk $a \in \ker \varphi_n$, sifat morfisma kompleks memberi

$$\varphi_{n+1}(d_A^n a) = d_B^n(\varphi_n a) = d_B^n(0) = 0.$$

Karena itu $d_A^n a \in \ker \varphi_{n+1}$, sehingga pemetaan terbatas

$$d_{\ker \varphi}^n := d_A^n|_{\ker \varphi_n}: \ker \varphi_n \longrightarrow \ker \varphi_{n+1}$$

terdefinisi. Komposisinya berkuadrat nol karena

$$d_{\ker \varphi}^{n+1} d_{\ker \varphi}^n = d_A^{n+1} d_A^n \Big|_{\ker \varphi_n} = 0.$$

Jadi modul-modul kernel itu, bersama diferensial terbatas, benar-benar membentuk kompleks.

Audit sumber 24.2. Lema pada Notes.tex baris 5125–5129 tidak memiliki bukti formal. Edisi mengetik diferensial terbatas, membuktikan bahwa ia mendarat di kernel berikutnya, dan memeriksa bahwa kuadratnya nol.

Dengan lema ini kita dapat mendefinisikan kompleks yang terkait dengan suatu pasangan.

Definisi 24.1 (kompleks korantai simpleksial relatif). Untuk pasangan $(X_\bullet, A_\bullet)$, kompleks

$$C^\bullet(X_\bullet, A_\bullet; R) := \ker(i^*)$$

disebut **kompleks korantai simpleksial relatif** pasangan itu.

24.3 Prinsip aljabar homologis

Kedua contoh motivasi tersebut merupakan kasus khusus dari satu prinsip umum. Misalkan diberikan barisan eksak pendek kompleks modul- R

$$0 \longrightarrow A_\bullet \longrightarrow B_\bullet \longrightarrow C_\bullet \longrightarrow 0.$$

Kita mungkin hendak menghitung $H^n(A_\bullet)$ sementara hanya mengetahui $H^n(B_\bullet)$ dan $H^n(C_\bullet)$; atau mengetahui kohomologi $A_\bullet$ dan $C_\bullet$ tetapi hendak menghitung kohomologi $B_\bullet$. Dalam situasi ber-hingga ini mungkin hanya persoalan efisiensi komputasi. Dalam keadaan umum, bagaimanapun, kita berhadapan dengan modul- R yang dibangkitkan secara tak hingga, sehingga teknik aljabar linear sederhana mulai gagal. Kita akan membuktikan hasil umum dari **aljabar homologis** yang menghubungkan semua grup kohomologi tersebut.

Catatan pinggir sumber. Aljabar homologis adalah cabang aljabar yang mempelajari interaksi antara barisan, pemetaan barisan, diagram komutatif objek aljabar yang mempunyai sifat eksak tertentu, serta cara menghitung berbagai objek, termasuk grup (ko)homologi.

Catatan 24.1 (alat komputasi utama). Jika hanya satu hasil dari bagian kuliah ini yang diingat, hasil berikut mungkin yang paling berguna, sebab ia dapat diterapkan dalam banyak konteks untuk menghasilkan barisan eksak panjang. Sebaliknya, sebuah barisan eksak panjang standar yang sudah dikenal di suatu bidang sering kali muncul dari teorema ini; memahami bukti abstraknya karena itu penting. Bersama barisan eksak panjang grup homotopi dari berkas serat, hasil ini merupakan salah satu alat komputasi utama sampai teori barisan spektral digunakan. Barisan spektral sangat kuat, tetapi jauh kurang intuitif.

Catatan pinggir sumber. Dalam teori- K , barisan eksak panjang yang dimaksud dapat melipat kembali ke dirinya sendiri.

Teorema 24.1 (Mayer–Vietoris aljabar; alias sumber thm:alg_Mayer-Vietoris). Diberikan barisan eksak pendek kompleks modul- R

$$0 \longrightarrow A_\bullet \xrightarrow{i} B_\bullet \xrightarrow{\pi} C_\bullet \longrightarrow 0,$$

terdapat barisan eksak panjang modul- R

$$\cdots \xrightarrow{\delta^{k-1}} H^k(A_\bullet) \xrightarrow{H^k(i)} H^k(B_\bullet) \xrightarrow{H^k(\pi)} H^k(C_\bullet) \xrightarrow{\delta^k} H^{k+1}(A_\bullet) \xrightarrow{H^{k+1}(i)} H^{k+1}(B_\bullet) \longrightarrow \cdots$$

Catatan pinggir sumber. Sumber menyebut hasil ini teorema Mayer–Vietoris aljabar; nama lain yang lazim ialah **lema zig-zag**.

Audit sumber 24.3. Pada Notes.tex baris 5173, suku setelah $H^{k+1}(i)$ hanya tertulis $\$(B_\bullet)\$$. Edisi memulihkan suku bertipe $H^{k+1}(B_\bullet)$ dan mempertahankan semua arah pemetaan dalam barisan.

Bukti teorema ini menggunakan sebuah lema terkenal dalam aljabar homologis, yaitu **Lema Ular**.

Catatan pinggir sumber (ancillary). Ada sebuah “kebun binatang” kecil berisi lema yang dinamai menurut hewan; contoh lain ialah Lema Salamander dan Lema Siput. Nama-nama ini tidak membawa muatan matematis.

24.4 Lema Ular

Lema 24.2 (Lema Ular; alias sumber snakeLemma). Diberikan diagram komutatif modul- R berikut, dengan kedua baris eksak,

Diagram 24.1 (data panah untuk diagram Lema Ular). Baris atas dan bawah serta pemetaan vertikalnya adalah

$$\begin{array}{ccccccccc} A & \xrightarrow{i} & B & \xrightarrow{\pi} & C & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow \alpha & & \downarrow \beta & & \downarrow \gamma & & \\ 0 & \longrightarrow & A' & \xrightarrow{i'} & B' & \xrightarrow{\pi'} & C' \end{array}$$

dengan persamaan komutativitas

$$\beta \circ i = i' \circ \alpha, \quad \gamma \circ \pi = \pi' \circ \beta.$$

Baris atas eksak pada B, C dan π surjektif; baris bawah eksak pada A', B' dan i' injektif. Modul kanan bawah adalah C' , bukan C . Tidak ada informasi yang bergantung pada letak panah.

terdapat barisan eksak

$$\ker \alpha \longrightarrow \ker \beta \longrightarrow \ker \gamma \xrightarrow{\delta} \operatorname{coker} \alpha \longrightarrow \operatorname{coker} \beta \longrightarrow \operatorname{coker} \gamma.$$

Eksak di sini dinyatakan pada empat suku internal yang mempunyai pemetaan masuk dan keluar. Tanpa hipotesis tambahan, tidak diklaim adanya nol tersirat di kiri $\ker \alpha$ atau di kanan $\operatorname{coker} \gamma$. [Diagram 24.2](#) mencatat seluruh jalur Ular tanpa bergantung pada warna atau posisi.

Audit sumber 24.4. Diagram Xy-pic pada Notes.tex baris 5186–5189 menulis modul kanan bawah sebagai C . Komutativitas menuntut C' . Edisi memperbaiki tipe itu dan mengganti diagram posisional dengan data panah serta kedua persamaan komutativitas.

Lema ini merupakan alat utama. Bukti lengkapnya panjang dan mempunyai banyak rincian, tetapi pada setiap tahap biasanya hanya ada satu atau dua langkah yang mungkin.

Diagram 24.2 (jalur semantik Lema Ular; alias sumber fig:snake_lemma). Gambar TikZ sumber menggabungkan Diagram 24.1 dengan kernel di atas, kokernel di bawah, serta satu jalur penghubung berwarna. Data yang dibawanya adalah:

- inklusi vertikal $\ker \alpha \rightarrow A$, $\ker \beta \rightarrow B$, dan $\ker \gamma \rightarrow C$;
- proyeksi vertikal $A' \rightarrow \operatorname{coker} \alpha$, $B' \rightarrow \operatorname{coker} \beta$, dan $C' \rightarrow \operatorname{coker} \gamma$;

- panah horizontal yang diinduksi oleh i, π, i', π' ; dan
- jalur ular, yang mulai dari $c \in \ker \gamma$, mengangkat c melalui π ke $b \in B$, menurunkan b melalui β ke B' , mengangkat balik melalui i' ke $a' \in A'$, lalu mengambil kelas $[a'] \in \text{coker } \alpha$.

Jalur terakhir mendefinisikan δ . Warna merah dan geometri jalur pada gambar sumber tidak memuat informasi tambahan; semua pilihan dan ketakbergantungannya dibuktikan di bawah.

Bukti lengkap Lema Ular. Sumber memecah bukti menjadi enam kewajiban:

1. membangun fungsi $\delta: \ker \gamma \rightarrow \text{coker } \alpha$;
2. membuktikan bahwa δ adalah homomorfisma modul- R ;
3. membuktikan

$$\text{im}(\ker \alpha \rightarrow \ker \beta) = \ker(\ker \beta \rightarrow \ker \gamma);$$

4. membuktikan $\text{im}(\ker \beta \rightarrow \ker \gamma) = \ker \delta$;
5. membuktikan

$$\text{im } \delta = \ker(\text{coker } \alpha \rightarrow \text{coker } \beta);$$

6. membuktikan

$$\text{im}(\text{coker } \alpha \rightarrow \text{coker } \beta) = \ker(\text{coker } \beta \rightarrow \text{coker } \gamma).$$

Pemetaan selain δ adalah pemetaan yang diinduksi oleh diagram:

$$i_K(a) = i(a), \quad \pi_K(b) = \pi(b), \quad \bar{i}([a']) = [i'(a')], \quad \bar{\pi}([b']) = [\pi'(b')].$$

Keempatnya R -linear karena masing-masing merupakan pembatasan atau pemetaan hasil bagi dari homomorfisma modul- R pada diagram semula.

Pemetaan kernel memang mendarat di kernel karena kuadrat-kuadratnya komutatif. Pemetaan kokernel terdefinisi dengan baik: misalnya, $i'(a' + \alpha(a)) - i'(a') = i'\alpha(a) = \beta i(a)$ berada di $\text{im } \beta$; argumen untuk $\bar{\pi}$ sama.

1. Konstruksi penghubung. Ambil $c \in \ker \gamma \subseteq C$. Karena π surjektif, pilih $b \in B$ dengan $\pi(b) = c$. Komutativitas memberi

$$\pi'(\beta(b)) = \gamma(\pi(b)) = \gamma(c) = 0.$$

Eksaknya baris bawah pada B' menghasilkan $a'_b \in A'$ dengan $i'(a'_b) = \beta(b)$. Unsur ini unik karena i' injektif. Definisikan

$$\delta(c) := [a'_b] \in A' / \text{im } \alpha = \text{coker } \alpha.$$

Untuk memeriksa bahwa kelas ini tidak bergantung pada pengangkatan, ambil $\tilde{b} \in B$ lain dengan $\pi(\tilde{b}) = c$. Maka $\pi(b - \tilde{b}) = 0$. Eksaknya baris atas pada B memberi $a \in A$ dengan $i(a) = b - \tilde{b}$. Oleh komutativitas,

$$\begin{aligned}
i'(a'_b - a'_b) &= \beta(b) - \beta(\tilde{b}) \\
&= \beta(i(a)) \\
&= i'(\alpha(a)).
\end{aligned}$$

Injektivitas i' memberi $a'_b - a'_b = \alpha(a)$, sehingga $[a'_b] = [\alpha(a)]$. Jadi δ terdefinisi dengan baik.

2. Linearitas R . Untuk $c_1, c_2 \in \ker \gamma$ dan $r, s \in R$, pilih b_1, b_2 dengan $\pi(b_j) = c_j$, serta a'_j dengan $i'(a'_j) = \beta(b_j)$. Unsur $rb_1 + sb_2$ mengangkat $rc_1 + sc_2$, dan

$$i'(ra'_1 + sa'_2) = r\beta(b_1) + s\beta(b_2) = \beta(rb_1 + sb_2).$$

Oleh definisi penghubung dan ketakbergantungannya dari pilihan,

$$\delta(rc_1 + sc_2) = r\delta(c_1) + s\delta(c_2).$$

Jadi δ adalah homomorfisma modul- R .

Teknik yang dipakai selanjutnya disebut **pengejaran diagram**: kita mulai dengan unsur dalam satu modul, menggunakan pemetaan atau eksaknya barisan untuk menghasilkan unsur pada modul berdekatan, lalu mengulangi proses sampai mencapai modul yang diperlukan.

3. Eksak pada $\ker \beta$. Jika $a \in \ker \alpha$, maka $\beta(i(a)) = i'(\alpha(a)) = 0$, dan tentu $\pi(i(a)) = 0$; jadi $\text{im } i_K \subseteq \ker \pi_K$. Sebaliknya, bila $b \in \ker \beta$ dan $\pi(b) = 0$, eksaknya baris atas memberi $a \in A$ dengan $i(a) = b$. Kemudian

$$0 = \beta(b) = \beta(i(a)) = i'(\alpha(a)).$$

Karena i' injektif, $\alpha(a) = 0$. Jadi $a \in \ker \alpha$ dan $b = i_K(a)$, sehingga $\text{im } i_K = \ker \pi_K$.

4. Eksak pada $\ker \gamma$. Andaikan $c \in \ker \gamma$ dan $\delta(c) = 0$. Pilih b dan a'_b seperti pada konstruksi. Persamaan $[a'_b] = 0$ berarti terdapat $a \in A$ dengan $a'_b = \alpha(a)$. Maka

$$\beta(b - i(a)) = \beta(b) - i'(\alpha(a)) = i'(a'_b) - i'(a'_b) = 0,$$

sedangkan $\pi(b - i(a)) = c$. Jadi c berada dalam citra $\ker \beta \rightarrow \ker \gamma$. Sebaliknya, jika $c = \pi(b)$ untuk $b \in \ker \beta$, maka $i'(a'_b) = \beta(b) = 0$. Injektivitas i' memberi $a'_b = 0$, sehingga $\delta(c) = 0$. Dengan demikian

$$\text{im}(\ker \beta \rightarrow \ker \gamma) = \ker \delta.$$

5. Eksak pada coker α . Untuk $c \in \ker \gamma$, konstruksi memberi $\delta(c) = [a'_b]$. Citranya dalam coker β ialah

$$\bar{i}([a'_b]) = [i'(a'_b)] = [\beta(b)] = 0.$$

Jadi $\text{im } \delta \subseteq \ker \bar{i}$. Sebaliknya, ambil $[a'] \in \text{coker } \alpha$ dengan $\bar{i}([a']) = 0$. Artinya $i'(a') = \beta(b)$ untuk suatu $b \in B$. Letakkan $c := \pi(b)$. Maka

$$\gamma(c) = \gamma(\pi(b)) = \pi'(\beta(b)) = \pi'(i'(a')) = 0,$$

dan pengangkatan b dalam definisi memberi $\delta(c) = [a']$. Jadi $\text{im } \delta = \ker \bar{i}$.

6. Eksak pada coker β . Komposisi $\bar{\pi}\bar{i}$ nol karena $\pi'i' = 0$. Sekarang ambil $[b'] \in \text{coker } \beta$ dengan $\bar{\pi}([b']) = 0$. Ini berarti $\pi'(b') \in \text{im } \gamma$, jadi terdapat $c \in C$ dengan $\gamma(c) = \pi'(b')$. Pilih $b \in B$ dengan $\pi(b) = c$. Kemudian

$$\pi'(b' - \beta(b)) = \pi'(b') - \gamma(\pi(b)) = 0.$$

Eksaknya baris bawah pada B' memberi $a' \in A'$ dengan $b' - \beta(b) = i'(a')$. Sesudah mengambil kelas modulo $\text{im } \beta$ kita memperoleh $[b'] = [i'(a')] = \bar{i}([a'])$. Maka $\ker \bar{\pi} \subseteq \text{im } \bar{i}$, dan inklusi sebaliknya sudah dibuktikan. Keempat posisi internal itu eksak, sehingga barisan dalam pernyataan lema eksak.

Audit sumber 24.5. Bukti sumber hanya mengerjakan konstruksi penghubung serta eksaknya posisi keempat dan kelima; linearitas dan posisi ketiga serta keenam diserahkan kepada pembaca. Edisi menyelesaikan seluruh enam kewajiban, mengetik keempat pemetaan terinduksi, dan memperbaiki selip notasi a_b/a'_b tanpa mengubah strategi pengejaran diagram sumber.

24.5 Diagram persiapan

Untuk menerapkan Lema Ular pada bukti [Teorema 24.1](#), kita perlu membangun diagram yang mempunyai sifat yang sesuai. Menerapkan Lema Ular langsung pada dua derajat dari barisan eksak pendek kompleks bukan langkah yang benar, sebab kernel dan kokernel yang dihasilkan dengan cara itu bukan grup kohomologi dalam teorema.

Lema 24.3 (diagram persiapan; alias sumber lemma:setup_for_algMV). Diagram komutatif berikut memenuhi hipotesis Lema Ular; khususnya, kedua barisnya eksak pada semua posisi yang mempunyai panah masuk dan keluar.

Diagram 24.3 (data panah diagram persiapan). Untuk $K = A, B, C$, tuliskan

$$Q_K^k := K_k / \delta_{k-1}^K(K_{k-1}), \quad Z_K^{k+1} := \ker(\delta_{k+1}^K).$$

Diagramnya adalah

$$\begin{array}{ccccccc} & & Q_A^k & \longrightarrow & Q_B^k & \longrightarrow & Q_C^k & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow \bar{\delta}_A^k & & \downarrow \bar{\delta}_B^k & & \downarrow \bar{\delta}_C^k & & \\ 0 & \longrightarrow & Z_A^{k+1} & \longrightarrow & Z_B^{k+1} & \longrightarrow & Z_C^{k+1} & & \end{array}$$

dengan

$$\bar{\delta}_K^k([x]) = \delta_K^k(x).$$

Panah horizontal diinduksi oleh i dan π . Tidak ada sifat yang bergantung pada posisi visual diagram.

Bukti. Pertama, setiap pemetaan vertikal terdefinisi dengan baik. Jika x diganti oleh $x + \delta_{k-1}^K(u)$, maka

$$\delta_k^K(x + \delta_{k-1}^K(u)) = \delta_k^K(x) + \delta_k^K \delta_{k-1}^K(u) = \delta_k^K(x).$$

Selain itu, $\delta_{k+1}^K \delta_k^K(x) = 0$, sehingga citranya memang berada di Z_K^{k+1} . Karena i dan π adalah morfisma kompleks, kedua kuadrat komutatif.

Untuk baris atas, pemetaan $Q_B^k \rightarrow Q_C^k$ surjektif: kelas $[c]$ dapat diangkat dengan memilih $b \in B_k$ sedemikian sehingga $\pi(b) = c$. Jika $[b] \in Q_B^k$ dipetakan ke nol, maka $\pi(b) = \delta_{k-1}^C(c_-)$ untuk suatu $c_- \in C_{k-1}$. Pilih $b_- \in B_{k-1}$ dengan $\pi(b_-) = c_-$. Dengan komutativitas diferensial,

$$\pi(b - \delta_{k-1}^B(b_-)) = 0.$$

Eksaknya barisan kompleks pada derajat k menghasilkan $a \in A_k$ dengan $i(a) = b - \delta_{k-1}^B(b_-)$. Oleh karena itu $[b]$ adalah citra $[a]$. Sebaliknya, setiap citra dari Q_A^k dipetakan ke nol sebab $\pi i = 0$. Jadi baris atas eksak pada Q_B^k, Q_C^k .

Untuk baris bawah, pemetaan $Z_A^{k+1} \rightarrow Z_B^{k+1}$ injektif karena i injektif pada setiap derajat. Jika $b \in Z_B^{k+1}$ dan $\pi(b) = 0$, maka $b = i(a)$ untuk suatu $a \in A_{k+1}$. Selanjutnya

$$i(\delta_{k+1}^A(a)) = \delta_{k+1}^B(i(a)) = \delta_{k+1}^B(b) = 0.$$

Injektivitas i memberi $\delta_{k+1}^A(a) = 0$, jadi $a \in Z_A^{k+1}$. Inklusi sebaliknya mengikuti dari $\pi i = 0$. Maka baris bawah eksak pada Z_A^{k+1}, Z_B^{k+1} . Inilah tepat hipotesis sisi kanan atas dan sisi kiri bawah yang diperlukan dalam Lema Ular.

Audit sumber 24.6. Lingkungan bukti pada Notes.tex baris 5332–5334 hanya berisi **Exercise, for now**. Edisi membuktikan keterdefinisan ketiga pemetaan vertikal, komutativitas diagram, eksaknya baris hasil bagi, dan eksaknya baris kernel.

24.6 Bukti teorema dan penyambungan

Bukti Teorema 24.1. Untuk $K = A, B, C$, gunakan notasi dari Diagram 24.3. Kernel pemetaan vertikal ialah

$$\begin{aligned} \ker \bar{\delta}_K^k &= \{[x] \in K_k / \delta_{k-1}^K(K_{k-1}) \mid \delta_k^K(x) = 0\} \\ &= \ker(\delta_k^K) / \delta_{k-1}^K(K_{k-1}) \\ &= H^k(K_\bullet). \end{aligned}$$

Kesetaraan kedua sah karena $\delta_{k-1}^K(K_{k-1}) \subseteq \ker \delta_k^K$. Dengan demikian ini bukan hanya kesamaan ukuran: pemetaan $[x] \mapsto [x]$ memberi isomorfisma kanonik.

Catatan pinggir sumber. Sumber menandai identifikasi kernel ini sebagai “latihan”. Bukti eksplisitnya diberikan tepat di atas.

Citra pemetaan vertikal adalah

$$\text{im } \bar{\delta}_K^k = \delta_k^K(K_k) \subseteq \ker(\delta_{k+1}^K).$$

Karena itu kokernelnya adalah

$$\text{coker } \bar{\delta}_K^k = \frac{\ker(\delta_{k+1}^K)}{\delta_k^K(K_k)} = H^{k+1}(K_\bullet).$$

Rumus ini juga memperbaiki kurung penutup yang hilang dalam rumus citra pada sumber. Semua isomorfisma tersebut natural terhadap morfisma kompleks.

Dengan menerapkan [Lema 24.2](#) pada diagram yang dijamin oleh [Lema 24.3](#), lalu memakai identifikasi kernel dan kokernel tadi, kita memperoleh barisan eksak enam-suku

$$H^k(A_\bullet) \longrightarrow H^k(B_\bullet) \longrightarrow H^k(C_\bullet) \xrightarrow{\delta^k} H^{k+1}(A_\bullet) \longrightarrow H^{k+1}(B_\bullet) \longrightarrow H^{k+1}(C_\bullet)$$

untuk setiap k . Pemetaan-pemetaan selain δ^k tepat pemetaan kohomologi yang diinduksi oleh i dan π : konstruksi hasil bagi, kernel, dan semua isomorfisma di atas memakai pemetaan yang sama.

Catatan pinggir sumber, dibuktikan. Jika untuk setiap k tersedia barisan eksak $L_{k-1} \rightarrow M_{k-1} \rightarrow N_{k-1} \rightarrow L_k \rightarrow M_k \rightarrow N_k$ dan pemetaan yang berulang pada suku bersama benar-benar sama, maka barisan-barisannya menyambung menjadi $\cdots \rightarrow N_{k-2} \rightarrow L_{k-1} \rightarrow M_{k-1} \rightarrow N_{k-1} \rightarrow L_k \rightarrow M_k \rightarrow N_k \rightarrow L_{k+1} \rightarrow \cdots$.

Dalam kasus kita, barisan untuk indeks $k+1$ dimulai dengan tiga suku dan pemetaan terakhir dari barisan indeks k . Karena identifikasi kernel dan kokernel bersifat kanonik, bukan sekadar isomorfisma yang dipilih secara terpisah, kedua salinan setiap suku H^{k+1} beserta pemetaannya identik. Maka barisan enam-suku itu dapat disambung tanpa celah menjadi

$$\cdots \rightarrow H^k(A_\bullet) \xrightarrow{H^k(i)} H^k(B_\bullet) \xrightarrow{H^k(\pi)} H^k(C_\bullet) \xrightarrow{\delta^k} H^{k+1}(A_\bullet) \rightarrow \cdots,$$

dan eksaknya pada setiap suku diwarisi dari salah satu barisan enam-suku yang memuat suku tersebut. Inilah barisan eksak panjang yang dinyatakan dalam teorema.

Audit sumber 24.7. Notes.tex baris 5338–5354 menandai identifikasi kernel sebagai latihan, meninggalkan identifikasi kokernel tanpa bukti, kehilangan satu kurung pada rumus citra, dan menyatakan penyambungan hanya sebagai latihan pinggir. Edisi membuktikan kedua identifikasi, memulihkan kurung, dan menunjukkan bahwa suku serta pemetaan bersama benar-benar sama ketika k berubah.

24.7 Kealamian

Ada satu konsekuensi yang berguna. Diberikan dua diagram seperti yang masuk ke Lema Ular dan homomorfisma antara setiap modul yang membuat semua kubus yang mungkin menjadi komutatif, kita memperoleh pemetaan terinduksi antara kernel dan kokernel. Dengan demikian, untuk dua barisan eksak pendek kompleks dan sebuah morfisma di antaranya, terdapat morfisma antara **barisan eksak panjang** yang dihasilkan.

Catatan pinggir sumber. Sifat ini diringkas dengan mengatakan bahwa Lema Ular bersifat **natural**.

Situasi ini muncul, misalnya, ketika gelanggang koefisien kohomologi himpunan- Δ diganti dalam salah satu contoh motivasi. Ia juga muncul untuk pemetaan pasangan

$$(X_\bullet, A_\bullet) \rightarrow (Y_\bullet, B_\bullet),$$

karena setiap pasangan menghasilkan barisan eksak pendek kompleks dan pemetaan pasangan menginduksi morfisma antara kedua barisan tersebut.

Verifikasi kealamian pemetaan penghubung. Misalkan homomorfisma vertikal tambahan mengirim diagram Lema Ular pertama ke diagram kedua dan membuat semua kubus komutatif. Untuk $c \in \ker \gamma$, pilih pengangkatan $b \in B$ dan unsur $a' \in A'$ dengan $\pi(b) = c$ serta $i'(a') = \beta(b)$. Sesudah ketiga unsur itu dipetakan ke diagram kedua, komutativitas kubus menunjukkan bahwa citra b mengangkat citra c dan citra a' memenuhi persamaan yang mendefinisikan penghubung kedua. Karena penghubung tidak bergantung pada pilihan pengangkatan,

$$\delta_2(f_C(c)) = \bar{f}_{A'}(\delta_1(c)).$$

Jadi bujur sangkar yang melibatkan pemetaan penghubung komutatif. Bujur sangkar lain komutatif langsung dari functorialitas kernel, kokernel, dan kohomologi. Akibatnya yang dihasilkan bukan sekadar pemetaan antara kompleks yang tidak ditentukan, melainkan morfisma antara kedua barisan eksak panjang.

Audit sumber 24.8. Notes.tex baris 5357–5367 mula-mula menyebut “pemetaan antara kompleks” sebelum memperjelas konsekuensinya. Edisi menyatakan sasaran yang tepat—morfisma antara barisan eksak panjang—dan memeriksa komutativitas pemetaan penghubung melalui pengangkatan yang sama.

Pendamping penguasaan: pemeriksaan, petunjuk, dan solusi lengkap

Enam paket berikut adalah materi asli edisi. Semuanya dibatasi pada sasaran Unit 24: korantai relatif, kernel morfisma kompleks, konstruksi dan eksaknya Lema Ular, diagram persiapan, penyambungan, dan kealamian.

Pemeriksaan Penguasaan 24.1 (korantai relatif dan perluasan nol). Untuk inklusi subhimpunan- Δ $i: A_\bullet \hookrightarrow X_\bullet$, buktikan langsung bahwa

$$0 \longrightarrow C^\bullet(X_\bullet, A_\bullet; R) \longrightarrow C^\bullet(X_\bullet; R) \xrightarrow{i^*} C^\bullet(A_\bullet; R) \longrightarrow 0$$

adalah barisan eksak pendek kompleks. Lalu, untuk $A_\bullet = \{0\} \subseteq \Delta[1]$ dan $1_R \neq 0$, tunjukkan bahwa perluasan dengan nol yang memisahkan i^* pada setiap derajat bukan pemetaan korantai.

Petunjuk. Restriksi dan diferensial sama-sama dibentuk dengan prakomposisi oleh *face map*. Untuk contoh tandingan, perluas fungsi bernilai 1 pada simpul 0 menjadi fungsi yang bernilai nol pada simpul 1, lalu hitung kobatasnya pada sisi 01.

Solusi Pemeriksaan 24.1. Pada derajat n , $i_n^*(g) = g|_{A_n}$. Karena *face map* $A_\bullet$ adalah pembatasan *face map* $X_\bullet$, untuk setiap $g \in R^{X_n}$ berlaku

$$\delta_A^n(i_n^*g) = i_{n+1}^*(\delta_X^n g).$$

Jadi i^* adalah pemetaan korantai. Ia surjektif pada setiap derajat: untuk $h \in R^{A_n}$, tetapkan $\hat{h} = h$ pada A_n dan nol di luar A_n . Kernel restriksi stabil terhadap diferensial oleh persamaan komutativitas tadi, dan menurut Definisi 24.1 kernel itu ialah $C^\bullet(X_\bullet, A_\bullet; R)$. Inklusi kernel injektif, citranya tepat kernel i^* , dan i^* surjektif. Maka barisan tersebut eksak pendek sebagai barisan kompleks.

Sekarang ambil $X_\bullet = \Delta[1]$ dan $A_\bullet$ yang hanya memuat simpul 0. Jika $h(0) = 1_R$, perluasan nol $e^0 h$ mempunyai nilai 1_R pada simpul 0 dan 0 pada simpul 1. Dengan salah satu konvensi tanda yang konsisten,

$$(\delta_X^0 e^0 h)(01) = 0 - 1_R = -1_R \neq 0$$

(dengan konvensi urutan muka berlawanan nilainya 1_R , tetap taknol). Sebaliknya $A_1 = \emptyset$, sehingga $\delta_A^0 h = 0$ dan perluasan nolnya pada derajat satu juga nol. Jadi $\delta_X^0 e^0 \neq e^1 \delta_A^0$: pemisahan modul derajat demi derajat bukan pemisahan kompleks.

Pemeriksaan Penguasaan 24.2 (kernel morfisma kompleks). Misalkan $\varphi: A_\bullet \rightarrow B_\bullet$ adalah morfisma kompleks. Bangun diferensial pada $K_n := \ker \varphi_n$, buktikan bahwa diferensial itu bertipe $K_n \rightarrow K_{n+1}$ dan berkuadrat nol, lalu buktikan bahwa konstruksi kernel ini natural terhadap sebuah bujur sangkar komutatif morfisma kompleks.

Petunjuk. Terapkan persamaan $\varphi_{n+1} d_A^n = d_B^n \varphi_n$ pada unsur K_n . Untuk kealamian, batasi pemetaan vertikal pada kedua kernel dan gunakan komutativitas bujur sangkar derajat demi derajat.

Solusi Pemeriksaan 24.2. Jika $a \in K_n$, maka

$$\varphi_{n+1}(d_A^n a) = d_B^n(\varphi_n a) = 0,$$

jadi $d_A^n a \in K_{n+1}$. Definisikan

$$d_K^n := d_A^n|_{K_n} : K_n \longrightarrow K_{n+1}.$$

Karena diferensial ini merupakan pembatasan,

$$d_K^{n+1} d_K^n = d_A^{n+1} d_A^n|_{K_n} = 0.$$

Maka $K_\bullet$ adalah kompleks. Untuk kealaman, ambil bujur sangkar komutatif morfisma kompleks

$$\begin{array}{ccc} A_\bullet & \xrightarrow{\varphi} & B_\bullet \\ \downarrow f & & \downarrow g \\ A'_\bullet & \xrightarrow{\varphi'} & B'_\bullet. \end{array}$$

Jika $a \in \ker \varphi_n$, maka $\varphi'_n(f_n(a)) = g_n(\varphi_n(a)) = 0$, sehingga f_n membatasi diri ke $\ker \varphi_n \rightarrow \ker \varphi'_n$. Karena f adalah morfisma kompleks, pembatasan tersebut komutatif dengan d_K . Identitas dan komposisi tetap identitas dan komposisi sesudah pembatasan; jadi kernel kompleks bersifat natural.

Pemeriksaan Penguasaan 24.3 (membangun penghubung Ular). Dalam diagram Lema Ular, mulai dari $c \in \ker \gamma$. Bangun $\delta(c) \in \text{coker } \alpha$ dengan dua pengangkatan yang tepat, lalu buktikan bahwa kelas yang dihasilkan tidak bergantung pada pilihan $b \in B$ dengan $\pi(b) = c$. Jelaskan persis tempat digunakannya eksak baris atas, eksak baris bawah, surjektivitas π , dan injektivitas i' .

Petunjuk. Pilih b dengan $\pi b = c$. Tunjukkan bahwa $\beta b \in \ker \pi' = \text{im } i'$, lalu tulis $\beta b = i' a'_b$. Untuk dua pilihan $b, \tilde{b}$, tulis $b - \tilde{b} = i(a)$ dan bandingkan a'_b dengan $a'_{\tilde{b}}$.

Solusi Pemeriksaan 24.3. Surjektivitas π memberi $b \in B$ dengan $\pi(b) = c$. Karena $c \in \ker \gamma$ dan diagram komutatif,

$$\pi'(\beta(b)) = \gamma(\pi(b)) = \gamma(c) = 0.$$

Eksaknya baris bawah pada B' memberi $\beta(b) = i'(a'_b)$ untuk suatu $a'_b \in A'$, dan injektivitas i' membuat a'_b unik. Definisikan $\delta(c) = [a'_b]$ modulo $\text{im } \alpha$.

Jika $\tilde{b}$ adalah pengangkatan lain, maka $b - \tilde{b} \in \ker \pi = \text{im } i$ oleh eksaknya baris atas pada B . Jadi $b - \tilde{b} = i(a)$ untuk suatu $a \in A$. Dengan $i'(a'_b) = \beta(\tilde{b})$ dan komutativitas,

$$i'(a'_b - a'_{\tilde{b}}) = \beta(b - \tilde{b}) = \beta(i(a)) = i'(\alpha(a)).$$

Injektivitas i' memberi $a'_b - a'_{\tilde{b}} = \alpha(a)$. Karena selisihnya berada di $\text{im } \alpha$, kedua unsur menentukan kelas kokernel yang sama. Jadi δ terdefinisi dengan baik. Hipotesis digunakan tepat sebagai berikut: π surjektif untuk memilih b ; komutativitas dan eksak bawah untuk memperoleh a'_b ; i' injektif untuk keunikan dan pembatalan; eksak atas untuk membandingkan dua pengangkatan.

Pemeriksaan Penguasaan 24.4 (linearitas dan eksaknya Lema Ular). Dengan penghubung dari Pemeriksaan 24.3, buktikan linearitas δ . Kemudian buktikan eksaknya barisan Ular pada keempat suku internal $\ker \beta$, $\ker \gamma$, $\text{coker } \alpha$, dan $\text{coker } \beta$. Jangan menggunakan geometri atau warna Diagram 24.2 sebagai alasan.

Petunjuk. Untuk linearitas gunakan $rb_1 + sb_2$ sebagai pengangkatan. Pada posisi kernel gunakan eksaknya baris atas serta injektivitas i' . Pada posisi kokernel, terjemahkan “kelas nol” menjadi “berbeda dari nol oleh citra pemetaan vertikal”, lalu gunakan eksaknya baris bawah dan surjektivitas π .

Solusi Pemeriksaan 24.4. Bila b_j mengangkat c_j dan $i'(a'_j) = \beta(b_j)$, maka $rb_1 + sb_2$ mengangkat $rc_1 + sc_2$ serta

$$i'(ra'_1 + sa'_2) = \beta(rb_1 + sb_2).$$

Karena kelas penghubung tidak bergantung pada pilihan, $\delta(rc_1 + sc_2) = r\delta(c_1) + s\delta(c_2)$.

Pada $\ker \beta$, citra $\ker \alpha$ berada dalam kernel pemetaan ke $\ker \gamma$. Jika $b \in \ker \beta$ dan $\pi(b) = 0$, tulis $b = i(a)$. Persamaan $0 = \beta(b) = i'(\alpha(a))$ dan injektivitas i' memberi $a \in \ker \alpha$. Jadi kedua himpunan itu sama.

Pada $\ker \gamma$, bila $\delta(c) = 0$, pilih b dengan $\pi(b) = c$ dan $i'(a'_b) = \beta(b)$. Tulis $a'_b = \alpha(a)$; maka $b - i(a) \in \ker \beta$ dan tetap dipetakan ke c . Arah sebaliknya mengikuti karena untuk $b \in \ker \beta$ kita mendapat $a'_b = 0$. Jadi $\text{im}(\ker \beta \rightarrow \ker \gamma) = \ker \delta$.

Pada coker α , kelas $\delta(c) = [a'_b]$ dipetakan ke $[i'(a'_b)] = [\beta(b)] = 0$. Jika sebaliknya $[i'(a')] = 0$, tulis $i'(a') = \beta(b)$ dan tetapkan $c = \pi(b)$. Komutativitas memberi $c \in \ker \gamma$, dan $\delta(c) = [a']$.

Terakhir, pada coker β , citra kelas dari coker α jelas mati di coker γ . Jika $[b']$ mati di sana, pilih $c \in C$ dengan $\gamma(c) = \pi'(b')$, lalu pilih $b \in B$ dengan $\pi(b) = c$. Maka $\pi'(b' - \beta b) = 0$, sehingga $b' - \beta b = i'(a')$. Modulo $\text{im } \beta$ kita memperoleh $[b'] = [i'(a')]$. Ini membuktikan eksaknya keempat posisi tanpa memakai informasi posisional gambar.

Pemeriksaan Penguasaan 24.5 (eksaknya diagram persiapan). Mulai dari barisan eksak pendek kompleks $0 \rightarrow A_\bullet \xrightarrow{i} B_\bullet \xrightarrow{\pi} C_\bullet \rightarrow 0$. Buktikan bahwa semua pemetaan vertikal pada Diagram 24.3 terdefinisi dengan baik dan membentuk bujur sangkar komutatif. Lalu buktikan eksaknya baris hasil bagi dan baris kernel pada posisi yang diperlukan Lema Ular.

Petunjuk. Gunakan $\delta_k \delta_{k-1} = 0$ untuk pemetaan vertikal. Jika $[b]$ mati dalam hasil bagi C , angkat dahulu batas yang mewakili $\pi(b)$ ke derajat $k-1$ di B , kurangi batasnya dari b , lalu gunakan $\ker \pi = \text{im } i$. Untuk baris bawah, gunakan injektivitas i .

Solusi Pemeriksaan 24.5. Rumus $\bar{\delta}_K^k([x]) = \delta_K^k(x)$ tidak berubah jika x diganti dengan $x + \delta_{k-1}^K(u)$, karena $\delta_K^k \delta_{k-1}^K = 0$. Nilainya berada di $\ker \delta_{k+1}^K$ karena $\delta_{k+1}^K \delta_k^K = 0$. Sifat morfisma kompleks untuk i dan π membuktikan komutativitas kedua bujur sangkar.

Pemetaan $Q_B^k \rightarrow Q_C^k$ surjektif karena $B_k \rightarrow C_k$ surjektif. Jika $[b]$ masuk ke nol, tulis $\pi(b) = \delta_{k-1}^C(c_-)$ dan angkat c_- ke $b_- \in B_{k-1}$. Maka

$$\pi(b - \delta_{k-1}^B b_-) = 0,$$

jadi $b - \delta_{k-1}^B b_- = i(a)$ untuk suatu $a \in A_k$. Karena batas yang dikurangkan hilang dalam hasil bagi, $[b]$ adalah citra $[a]$. Komposisi dari Q_A^k ke Q_C^k nol, sehingga baris atas eksak.

Pada baris bawah, $Z_A^{k+1} \rightarrow Z_B^{k+1}$ injektif. Jika $b \in Z_B^{k+1}$ dan $\pi(b) = 0$, tulis $b = i(a)$. Lalu $0 = \delta_B b = i(\delta_A a)$; injektivitas i memberi $\delta_A a = 0$. Jadi $a \in Z_A^{k+1}$ dan baris bawah eksak. Semua hipotesis Lema Ular sekarang terverifikasi.

Pemeriksaan Penguasaan 24.6 (penyambungan dan kealamian). Untuk setiap k , Lema Ular pada Diagram 24.3 memberi barisan enam-suku. Buktikan identifikasi

$$\ker \bar{\delta}_K^k \cong H^k(K_\bullet), \quad \text{coker } \bar{\delta}_K^k \cong H^{k+1}(K_\bullet),$$

jelaskan mengapa barisan untuk semua k menyambung menjadi satu barisan eksak panjang, dan buktikan bahwa sebuah morfisma antara dua barisan eksak pendek kompleks menghasilkan morfisma antara barisan eksak panjangnya.

Petunjuk. Kernel pemetaan $[x] \mapsto \delta_k x$ adalah kosiklus modulo kobatas; kokernelnya adalah kosiklus derajat $k+1$ modulo citra δ_k . Untuk kealamian, petakan satu pilihan pengangkatan dalam konstruksi Ular ke diagram kedua dan gunakan ketakbergantungan penghubung dari pilihan.

Solusi Pemeriksaan 24.6. Dengan $Q_K^k = K_k / \text{im } \delta_{k-1}^K$ dan $Z_K^{k+1} = \ker \delta_{k+1}^K$, pemetaan vertikal ialah $\bar{\delta}_K^k([x]) = \delta_k^K x$. Maka

$$\ker \bar{\delta}_K^k = \frac{\ker \delta_k^K}{\text{im } \delta_{k-1}^K} = H^k(K_\bullet),$$

sedangkan

$$\text{coker } \bar{\delta}_K^k = \frac{Z_K^{k+1}}{\text{im } \delta_k^K} = H^{k+1}(K_\bullet).$$

Karena identifikasi ini kanonik dan pemetaan horizontalnya diinduksi oleh i, π , Lema Ular memberi

$$H^k(A) \rightarrow H^k(B) \rightarrow H^k(C) \xrightarrow{\delta^k} H^{k+1}(A) \rightarrow H^{k+1}(B) \rightarrow H^{k+1}(C).$$

Barisan untuk $k+1$ memakai tiga suku terakhir yang sama sebagai tiga suku pertamanya—dengan pemetaan yang sama, bukan salinan yang dipilih secara sembarang. Karena setiap suku internal dan kedua pemetaan yang mengapitnya terdapat dalam salah satu barisan enam-suku, penyambungan mempertahankan eksaknya dan menghasilkan barisan eksak panjang.

Sekarang ambil morfisma antara dua barisan eksak pendek kompleks. Ia menginduksi morfisma antara semua Q_K^k dan Z_K^{k+1} serta membuat diagram persiapan komutatif. Jika c diangkat ke b lalu menghasilkan a' , citra ketiga unsur itu merupakan pilihan yang sah dalam diagram kedua. Karena kelas penghubung tidak bergantung pada pilihan,

$$f_{A,*}^{k+1} \delta_1^k([c]) = \delta_2^k f_{C,*}^k([c]).$$

Semua bujur sangkar lain komutatif oleh functorialitas kohomologi. Jadi pemetaan-pemetaan derajat demi derajat menyambung menjadi morfisma antara barisan eksak panjang, yang membuktikan kealamian.

Batas ke Unit 25. Unit 24 menerjemahkan Notes.tex baris 5113–5369 secara kontigu. Baris 5113–5121 melanjutkan dan menutup contoh Unit 23; hubungan timbal baliknya direkam sebagai `data-continuation-of="o012-rbt-123-exa-002"`. Penanda `\lecturenum{25}` berada pada baris 5370 dan tidak dimasukkan. Kursor sumber berikutnya yang tepat adalah Notes.tex baris 5370.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts, © 2019 David Michael Roberts, tepatnya [Notes.tex baris 5370–5611](#) pada [commit b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#) dari repositori [DavidMichaelRoberts/AlgebraicTopology2019](#). Rentang aktif itu terdiri atas 242 baris fisik. Dengan normalisasi LF dan terminator LF penutup dipertahankan, ukurannya 12.732 byte dan SHA-256-nya adalah `d05781ae58b1b6fd6174d030e52ca9ee6a08048be96f7c103e5be8de473b60b0`. Baris 5612, yang memulai Kuliah 26, tidak termasuk. Materi sumber dan adaptasi Indonesia ini tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#).

Rentang sumber memuat satu penanda kuliah, tiga definisi, dua lema, dua proposisi, enam contoh, dua lingkungan bukti, satu enumerasi dua butir, delapan catatan pinggir, dua diagram Xy-pic, satu

label, dan satu rujukan silang. Tidak ada latihan formal sumber, pertanyaan formal, gambar eksternal, sitasi, `input`, atau `include`.

Edisi memindahkan kedelapan catatan pinggir ke urutan bacaan utama dan menggambar ulang kedua diagram posisional sebagai data barisan dan morfisma yang semantik serta dapat mengalir ulang. Edisi juga melengkapi bukti lema kerangka, membangun dan memeriksa barisan eksak panjang kohomologi relatif, menyelesaikan separuh injektivitas Lema Lima yang ditinggalkan sebagai latihan, serta memperbaiki pembuktian karakteristik Euler dengan argumen rank–nulitas yang bertipe benar. Kekeliruan deterministik dalam proyeksi, tipe unsur, indeks, citra diferensial, dan rumus penutup diperbaiki serta dicatat tepat di tempatnya.

Enam pemeriksaan penguasaan, enam petunjuk, semua penutupan bukti edisi, dan enam solusi lengkap merupakan materi asli edisi dan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen; edisi ini tidak disponsori, didukung, disahkan, ataupun diberi status resmi oleh David Michael Roberts atau institusinya. Produksi edisi ini dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**. Pernyataan ini menambah transparansi proses dan tidak mengurangi kredit penulis sumber ataupun kredit kontributor manusia.

25 Kuliah 25

25.1 Kohomologi relatif dan kerangka atas

Kohomologi kompleks korantai simpleksial relatif ternyata sangat penting. Ia juga memberi keluwesan tambahan dalam mendefinisikan kohomologi sebuah himpunan- Δ . Kompleks biasa $C^\bullet(X_\bullet; R)$ diperoleh kembali dengan mengambil $A_\bullet = \emptyset$; dengan kata lain, kompleks itu adalah $C^\bullet(X_\bullet, \emptyset; R)$.

Definisi 25.1 (kohomologi relatif). Untuk pasangan himpunan- Δ $(X_\bullet, A_\bullet)$, **kohomologi relatif** pasangan itu ialah

$$H^k(X_\bullet, A_\bullet; R) := H^k(C^\bullet(X_\bullet, A_\bullet; R)).$$

Contoh 25.1 (relatif terhadap kerangka satu dimensi lebih rendah). Misalkan $X_\bullet$ merupakan himpunan- Δ berdimensi hingga n . Pasangan

$$(X_\bullet, \text{sk}_{n-1} X_\bullet)$$

memiliki kompleks korantai relatif

$$0 \longrightarrow C^0(X_\bullet, \text{sk}_{n-1} X_\bullet; R) \longrightarrow \cdots \longrightarrow C^{n-1}(X_\bullet, \text{sk}_{n-1} X_\bullet; R) \longrightarrow C^n(X_\bullet, \text{sk}_{n-1} X_\bullet; R) \longrightarrow 0.$$

Untuk $k < n$ berlaku $\text{sk}_{n-1} X_k = X_k$. Karena itu,

$$C^k(X_\bullet, \text{sk}_{n-1} X_\bullet; R) = \ker(\text{id}_{R^{X_k}}) = 0.$$

Sebaliknya, $\text{sk}_{n-1} X_n = \emptyset$, sehingga

$$\begin{aligned} C^n(X_\bullet, \text{sk}_{n-1} X_\bullet; R) &= \ker(R^{X_n} \longrightarrow R^\emptyset = 0) \\ &= R^{X_n}. \end{aligned}$$

Jadi semua modul kompleks itu nol kecuali modul pada posisi n , yang merupakan modul fungsi $X_n \rightarrow R$. Akibatnya,

$$H^k(X_\bullet, \text{sk}_{n-1} X_\bullet; R) = \begin{cases} 0, & k \neq n, \\ R^{X_n}, & k = n. \end{cases}$$

Notasi aljabar homologis. Kompleks yang hanya memuat R^{X_n} pada derajat n sering ditulis $R^{X_n}[n]$.

Audit sumber 25.1. Tampilan pada Notes.tex baris 5383–5385 mulai dari C^1 , padahal argumennya mencakup derajat 0. Edisi menampilkan rentang penuh C^0 sampai C^n . Perbaikan ini tidak mengubah hasil: semua suku berderajat kurang dari n , termasuk suku derajat 0, memang nol.

Lema 25.1 (kohomologi tidak melihat simpleks di atas derajat yang diperlukan). Jika $k < n$, maka

$$H^k(\text{sk}_n X_\bullet; R) \cong H^k(X_\bullet; R).$$

Bukti. Kohomologi pada derajat k ditentukan oleh bagian tiga-suku

$$C^{k-1} \xrightarrow{\delta_{k-1}} C^k \xrightarrow{\delta_k} C^{k+1}.$$

Karena $k < n$, kita mempunyai $k+1 \leq n$. Himpunan- Δ $\text{sk}_n X_\bullet$ sama dengan $X_\bullet$ pada setiap derajat $j \leq n$, dan semua *face map* di antara derajat-derajat tersebut juga sama. Maka ketiga modul korantai di atas dan kedua diferensial yang menghubungkannya sama untuk $\text{sk}_n X_\bullet$ dan $X_\bullet$. Kernel, citra, dan hasil bagi yang mendefinisikan H^k pun sama. Untuk $k = 0$, suku derajat -1 dipahami sebagai nol, sehingga argumen yang sama tetap berlaku. Isomorfisma yang diperoleh adalah isomorfisma alami yang diinduksi oleh inklusi kerangka.

Dengan demikian, setiap modul kohomologi suatu himpunan- Δ dapat dihitung sebagai modul kohomologi himpunan- Δ berdimensi hingga, meski dimensi kerangka yang dibutuhkan bertambah bersama derajat kohomologinya.

Aproksimasi yang lebih halus. Ada hasil lebih canggih yang, dalam arti yang presisi, mengaproksimasi modul kohomologi dengan kohomologi himpunan- Δ yang benar-benar **hingga**, bukan hanya berdimensi hingga. Hasil itu berada di luar cakupan kuliah ini.

25.2 Barisan eksak panjang kohomologi relatif

Proposisi 25.1 (barisan eksak panjang pasangan). Untuk pasangan himpunan- Δ $(X_\bullet, A_\bullet)$ terdapat barisan eksak panjang modul- R

$$0 \longrightarrow H^0(X_\bullet, A_\bullet; R) \longrightarrow H^0(X_\bullet; R) \longrightarrow H^0(A_\bullet; R) \xrightarrow{\partial^0} H^1(X_\bullet, A_\bullet; R) \longrightarrow \cdots,$$

dan, pada setiap derajat k ,

$$\cdots \longrightarrow H^{k-1}(A_\bullet; R) \xrightarrow{\partial^{k-1}} H^k(X_\bullet, A_\bullet; R) \longrightarrow H^k(X_\bullet; R) \longrightarrow H^k(A_\bullet; R) \xrightarrow{\partial^k} \cdots.$$

Data semantik Diagram 25.1. Urutan objek adalah kohomologi relatif $\rightarrow$ kohomologi $X \rightarrow$ kohomologi $A \rightarrow$ kohomologi relatif pada derajat berikutnya. Dua panah pertama diinduksi, berturut-turut, oleh inklusi kompleks relatif dan restriksi $A_\bullet \hookrightarrow X_\bullet$; panah ketiga adalah morfisma penghubung ∂^k . Pola ini diulang untuk setiap k . Uraian ini, bersama dua fragmen barisan di atas, merupakan penggambaran ulang diagram Xy-pic sumber tanpa ketergantungan pada posisi, warna, atau arah baca zig-zag.

Bukti. Unit 24 membangun barisan eksak pendek kompleks korantai

$$0 \longrightarrow C^\bullet(X_\bullet, A_\bullet; R) \xrightarrow{j} C^\bullet(X_\bullet; R) \xrightarrow{i^*} C^\bullet(A_\bullet; R) \longrightarrow 0,$$

dengan j inklusi kernel dan i^* restriksi. Barisan eksak panjang dari barisan eksak pendek itu memberi barisan yang dinyatakan. Agar konstruksinya eksplisit, ambil kelas $[a] \in H^k(A_\bullet; R)$ dan wakili dengan kosiklus $a \in C^k(A_\bullet; R)$. Pilih pengangkatan $x \in C^k(X_\bullet; R)$ dengan $i^*x = a$. Karena

$$i^*(\delta x) = \delta(i^*x) = \delta a = 0,$$

unsur δx berada dalam kompleks relatif. Definisikan

$$\partial^k[a] := [\delta x] \in H^{k+1}(X_\bullet, A_\bullet; R).$$

Jika x diganti oleh pengangkatan lain, selisihnya berada dalam kompleks relatif dan mengubah δx hanya dengan suatu kobatas relatif. Jika a diganti oleh wakil sekohomologi $a + \delta b$, angkat b dan ubah x dengan kobatas pengangkatan itu; kelas $[\delta x]$ tetap sama. Jadi ∂^k terdefinisi baik dan linear.

Eksaknya dapat diperiksa pada tiga jenis suku yang berulang. Pertama, kelas relatif yang menjadi nol dalam $H^k(X)$ diwakili oleh $r = \delta x$; restriksi i^*x adalah kosiklus pada A dan $\partial^{k-1}[\tilde{i}^*x] = [r]$. Kedua, jika kelas $[x] \in H^k(X)$ membatasi menjadi nol pada A , tulis $i^*x = \delta b$, angkat b ke $\tilde{b}$, dan perhatikan bahwa $x - \delta \tilde{b}$ adalah kosiklus relatif yang mewakili $[x]$. Ketiga, $[a] \in H^k(A)$ memiliki $\partial^k[a] = 0$ tepat ketika, setelah mengubah pengangkatan x dengan suatu korantai relatif, diperoleh kosiklus pada X yang membatasi menjadi a . Ini sama dengan mengatakan bahwa $[a]$ berada dalam citra $H^k(X) \rightarrow H^k(A)$. Pemeriksaan pada suku awal derajat 0 serupa dengan kompleks yang nol pada derajat negatif. Kealamian mengikuti dengan memetakan pilihan pengangkatan melalui morfisma pasangan; ketakbergantungan dari pilihan membuat bujur sangkar penghubung komutatif.

Audit sumber 25.2. Notes.tex baris 5408–5419 menyatakan proposisi tanpa bukti dan menyajikan barisannya sebagai diagram zig-zag posisional. Edisi menyediakan konstruksi penghubung, ketakbergantungan pilihan, tiga pemeriksaan eksak yang berulang, kealamian, dan representasi semantik yang dapat mengalir ulang.

Contoh 25.2 (simpleks relatif terhadap batasnya). Pertimbangkan pasangan

$$(\Delta[n], \partial\Delta[n]).$$

Ini merupakan kasus khusus [Contoh 25.1](#), sebab $\partial\Delta[n] = \text{sk}_{n-1} \Delta[n]$. Karena $\Delta[n]$ memiliki tepat satu simpleks berdimensi n ,

$$H^k(\Delta[n], \partial\Delta[n]; R) = \begin{cases} 0, & k \neq n, \\ R, & k = n. \end{cases}$$

Untuk $k < n - 1$, barisan eksak panjang terpecah menjadi potongan

$$0 \longrightarrow H^k(\Delta[n]; R) \xrightarrow{\cong} H^k(\partial\Delta[n]; R) \longrightarrow 0,$$

sesuai dengan hasil umum tentang kerangka di atas. Di sekitar derajat atas, potongannya ialah

$$0 \longrightarrow H^{n-1}(\Delta[n]; R) \longrightarrow H^{n-1}(\partial\Delta[n]; R) \longrightarrow R \longrightarrow H^n(\Delta[n]; R) \longrightarrow 0.$$

Khususnya, $H^n(\Delta[n]; R)$ merupakan hasil bagi modul berperingkat satu R , sehingga modul itu tidak dapat lebih besar daripada R dalam pengertian ini.

Dua catatan tentang contoh. Identitas $\partial\Delta[n] = \text{sk}_{n-1} \Delta[n]$ menjadikan contoh ini kasus khusus langsung dari Contoh 25.1. Sebenarnya $H^n(\Delta[n]; R) = 0$, tetapi pada titik sumber ini fakta tersebut belum dibuktikan, sehingga edisi tidak memakainya untuk memperpendek barisan.

Kohomologi relatif dapat dibayangkan sebagai kohomologi suatu “hasil bagi virtual” oleh subhimpunan- Δ . Jika pasangannya $(X_\bullet, \{x\})$ dengan $x \in X_0$, kita dapat mengambil hasil bagi yang meruntuhkan $\{x\}$ menjadi satu titik tanpa mengubah himpunan yang mendasarinya. Namun kohomologi relatif benar-benar berbeda dari kohomologi biasa: kompleks relatif tetap mengingat bahwa titik itu telah dipilih. Karena itu, gambaran hasil bagi naif tersebut memerlukan penafsiran yang lebih halus.

Contoh 25.3 (dua titik dan satu titik dasar). Ambil himpunan- Δ sangat sederhana $\partial\Delta[1]$, yang memiliki dua simpleks-0, x_0 dan x_1 , dan tidak memiliki simpleks pada derajat lain. Untuk pasangan $(\partial\Delta[1], \{x_0\})$, satu-satunya modul relatif yang taknol ialah

$$\begin{aligned} C^0(\partial\Delta[1], \{x_0\}; R) &= \ker\left(R^{\{x_0, x_1\}} = R^2 \xrightarrow{\rho_{x_0}} R^{\{x_0\}} = R\right) \\ &= \{(0, a_1) : a_1 \in R\} \cong R, \end{aligned}$$

dengan $\rho_{x_0}(a_0, a_1) = a_0$. Maka

$$H^0(\partial\Delta[1], \{x_0\}; R) = R,$$

sedangkan semua H^k lainnya nol. Sebagai perbandingan, $H^0(\partial\Delta[1]; R) = R^2$.

Audit sumber 25.3. Notes.tex baris 5449 menamai restriksi ke $\{x_0\}$ sebagai pr_2 . Nama itu bergantung pada urutan koordinat dan, untuk urutan tertulis (x_0, x_1) , biasanya berarti proyeksi yang salah. Edisi memakai pemetaan takambigu $\rho_{x_0}(a_0, a_1) = a_0$ dan menuliskan kernelnya secara eksplisit.

Secara lebih umum, jika himpunan- Δ berdimensi nol memiliki $n+1$ simpleks-0 dan satu titik dasar yang dipilih, kohomologi relatifnya adalah modul- R bebas berperingkat n . Jadi kohomologi itu menghitung banyaknya titik **selain** titik dasar yang ditentukan. Kasus ini cukup sering muncul untuk diberi nama tersendiri: himpunan- Δ dengan satu simpleks-0 yang ditentukan disebut himpunan- Δ **bertitik dasar**.

Definisi 25.2 (kohomologi tereduksi). Untuk himpunan- Δ bertitik dasar $(X_\bullet, x)$, **kohomologi tereduksi** ialah kohomologi relatif

$$H^k(X_\bullet, x; R).$$

Contoh 25.4 (titik tebal). Definisikan himpunan- Δ $Pt_\bullet$ dengan $Pt_n = \{*\}$ untuk semua $n \geq 0$, dan semua *face map* adalah fungsi identitas. Maka $C^n(Pt_\bullet; R) = R$ untuk setiap n .

Anggap unsur $g \in R$ sebagai fungsi $\{*\} \rightarrow R$. Prapengomposisian dengan $d_i = \text{id}_{\{*\}}$ adalah identitas pada R , sehingga

$$g \xrightarrow{\delta_n} \sum_{i=0}^{n+1} (-1)^i g = \begin{cases} 0, & n \text{ genap,} \\ g, & n \text{ ganjil.} \end{cases}$$

Kompleksnya ialah

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{0} R \xrightarrow{\text{id}} R \xrightarrow{0} R \xrightarrow{\text{id}} R \longrightarrow \dots$$

Jadi $H^0(Pt_\bullet; R) = R$, sedangkan $H^k(Pt_\bullet; R) = 0$ untuk semua $k > 0$. Himpunan- Δ ini memiliki titik dasar kanonik, dan kompleks relatif terhadap titik itu memiliki kohomologi nol pada setiap derajat:

$$H^k(Pt_\bullet, *, R) = 0 \quad \text{untuk semua } k.$$

Memang, kompleks relatifnya nol pada derajat 0 dan sama dengan R pada setiap derajat positif; diferensial positif tetap bergantian antara identitas dan nol. Karena itu setiap kosiklus relatif merupakan kobatas relatif.

Mengapa disebut tebal? $Pt_\bullet$ berdimensi takhingga: ia mempunyai satu simpleks- n untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Ia dapat dipandang sebagai sejenis titik tebal berdimensi takhingga, atau analog kombinatorial dari “ruang” kontraktibel, meski kita belum mempunyai gagasan deformasi kontinu untuk himpunan- Δ . Bahkan, analoginya lebih tepat disebut aljabar: himpunan- Δ menyediakan kompleks sebagai model aljabar ruang yang lebih sederhana.

Kita dapat mendefinisikan analog bagi sebuah pemetaan kompleks yang merupakan ekuivalensi homotopi lemah.

Definisi 25.3 (kuasi-isomorfisma). Morfisma kompleks $f: A_\bullet \rightarrow B_\bullet$ disebut **kuasi-isomorfisma** jika

$$H^k(f): H^k(A_\bullet) \longrightarrow H^k(B_\bullet)$$

merupakan isomorfisma untuk setiap k .

Contoh 25.5. Inklusi $sk_0 Pt_\bullet \hookrightarrow Pt_\bullet$ menginduksi morfisma korantai kontravarian

$$C^\bullet(Pt_\bullet; R) \longrightarrow C^\bullet(sk_0 Pt_\bullet; R).$$

Morfisma ini merupakan kuasi-isomorfisma. Kompleks sumbernya taknol pada setiap posisi taknegatif, sedangkan kompleks sasarannya terkonsentrasi pada satu posisi; tetapi keduanya mempunyai $H^0 \cong R$ dan kohomologi nol pada semua derajat positif, dan pemetaan terinduksi pada H^0 adalah identitas.

25.3 Lema Lima

Kita hanya memerlukan satu lema lagi dari aljabar homologis yang sangat berguna dalam praktik.

Tentang nama. Kali ini, tidak seperti Lema Ular, lema tersebut tidak dinamai menurut seekor hewan.

Lema 25.2 (Lema Lima). Misalkan dua baris berikut eksak:

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \xrightarrow{h} D \xrightarrow{k} E,$$

$$A' \xrightarrow{f'} B' \xrightarrow{g'} C' \xrightarrow{h'} D' \xrightarrow{k'} E'.$$

Misalkan pula terdapat morfisma vertikal

$$\alpha: A \rightarrow A', \quad \beta: B \rightarrow B', \quad \gamma: C \rightarrow C', \quad \delta: D \rightarrow D', \quad \varepsilon: E \rightarrow E'$$

yang membuat semua bujur sangkar komutatif. Jika α surjektif, β dan δ merupakan isomorfisma, serta ε injektif, maka γ merupakan isomorfisma.

Data semantik Diagram 25.2. Diagram sumber terdiri atas dua baris eksak yang ditulis dalam pernyataan lema, dengan lima morfisma vertikal berurutan $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon$. Komutativitas berarti

$$\beta f = f' \alpha, \quad \gamma g = g' \beta, \quad \delta h = h' \gamma, \quad \varepsilon k = k' \delta.$$

Daftar objek, panah, dan persamaan ini menggambar ulang diagram Xy-pic secara semantik. Ia tetap lengkap ketika baris matematika mengalir ulang atau dibaca secara linear oleh teknologi bantu.

Bukti. Kita membagi pengejaran diagram menjadi surjektivitas dan injektivitas. Masing-masing memakai separuh hipotesis.

1. Andaikan ε injektif dan β, δ surjektif. Ambil $c' \in C'$. Karena δ surjektif, pilih $d \in D$ sedemikian sehingga $\delta(d) = h'(c')$. Komutativitas dan eksaknya baris bawah memberi

$$\varepsilon(k(d)) = k'(\delta(d)) = k'(h'(c')) = 0.$$

Karena ε injektif, $k(d) = 0$. Eksaknya baris atas memberi $d = h(c)$ untuk suatu $c \in C$. Sekarang

$$\begin{aligned} h'(c' - \gamma(c)) &= h'(c') - h'(\gamma(c)) \\ &= \delta(d) - \delta(h(c)) = 0. \end{aligned}$$

Oleh eksaknya baris bawah, ada $b' \in B'$ dengan $c' - \gamma(c) = g'(b')$. Karena β surjektif, tulis $b' = \beta(b)$ untuk suatu $b \in B$. Maka

$$c' - \gamma(c) = g'(\beta(b)) = \gamma(g(b)),$$

sehingga $c' = \gamma(c + g(b))$. Jadi γ surjektif.

2. Andaikan α surjektif dan β, δ injektif. Ambil $c \in C$ dengan $\gamma(c) = 0$. Dari komutativitas,

$$\delta(h(c)) = h'(\gamma(c)) = 0.$$

Injektivitas δ memberi $h(c) = 0$. Karena baris atas eksak, ada $b \in B$ dengan $c = g(b)$. Selanjutnya

$$0 = \gamma(c) = \gamma(g(b)) = g'(\beta(b)).$$

Eksaknya baris bawah memberi $a' \in A'$ dengan $\beta(b) = f'(a')$. Surjektivitas α memungkinkan kita memilih $a \in A$ dengan $\alpha(a) = a'$. Komutativitas bujur sangkar kiri memberi

$$\beta(f(a)) = f'(\alpha(a)) = f'(a') = \beta(b).$$

Karena β injektif, $f(a) = b$. Akhirnya, eksaknya baris atas memberi

$$c = g(b) = g(f(a)) = 0.$$

Jadi $\ker \gamma = 0$, sehingga γ injektif.

Karena γ sekaligus surjektif dan injektif, ia merupakan isomorfisma.

Audit sumber 25.4. Pada langkah surjektivitas, Notes.tex baris 5526–5527 menempatkan unsur b' di B , padahal tipenya harus $b' \in B'$ agar dapat diangkat melalui $\beta: B \rightarrow B'$. Edisi memperbaiki tipe itu. Sumber menyebut langkah injektivitas sebagai latihan untuk mendualkan langkah sebelumnya; edisi memberikan seluruh pengejaran unsur, termasuk tempat tepat digunakannya surjektivitas α serta injektivitas β dan δ .

25.4 Karakteristik Euler dari modul kohomologi

Ingat kembali karakteristik Euler sebuah himpunan- Δ hingga:

$$\chi(X_\bullet) = \sum_{d=0}^{\infty} (-1)^d |X_d|.$$

Mengapa jumlahnya berhingga? Untuk himpunan- Δ hingga, $|X_d| = 0$ bagi semua d yang cukup besar. Jadi hanya berhingga banyak suku dalam jumlah tersebut yang tak nol.

Salah satu gagasan utama bagian ini ialah mengganti invarian numerik—misalnya kardinalitas himpunan hingga—dengan ruang vektor atau, secara lebih umum, modul, lalu mengganti kardinalitas dengan dimensi. Jika kita mengambil $R = \mathbb{R}$, dimensi modul kohomologi memberi invarian numerik lain. Definisikan **karakteristik Euler kohomologis** dengan

$$\chi^{\text{coh}}(X_\bullet) := \sum_{d=0}^{\infty} (-1)^d \dim_{\mathbb{R}} H^d(X_\bullet; \mathbb{R}),$$

asalkan semua dimensi yang muncul hingga dan hanya berhingga banyak suku yang tak nol. Syarat ini mengharuskan $H^d(X_\bullet; \mathbb{R}) = 0$ untuk d yang cukup besar, tetapi tidak mengharuskan $X_\bullet$ hingga atau bahkan berdimensi hingga. Misalnya, $Pt_\bullet$ memberi $\chi^{\text{coh}}(Pt_\bullet) = 1$.

Koefisien. Setiap medan berkarakteristik nol dapat menggantikan $\mathbb{R}$ dalam pembahasan dimensi ini.

Kita juga dapat menangani himpunan- Δ berdimensi hingga tetapi tak hingga, misalnya triangulasi garis real oleh simpleks-1.

Contoh 25.6 (garis bilangan bulat). Misalkan $L_\bullet$ adalah graf berarah dengan

$$L_0 = \mathbb{Z}, \quad L_1 = \mathbb{Z},$$

dan $d_0(n) = n + 1$, $d_1(n) = n$. Jadi untuk setiap n ada sisi dari n ke $n + 1$. Bagi $g \in \mathbb{R}^{L_0} = \mathbb{R}^{\mathbb{Z}}$,

$$\delta_0(g)(n) = g(n + 1) - g(n).$$

Persamaan $\delta_0(g) = 0$ berlaku tepat ketika g konstan. Maka

$$\ker \delta_0 = H^0(L_\bullet; \mathbb{R}) = \mathbb{R}.$$

Sebaliknya, ambil sembarang $h \in \mathbb{R}^{L_1} = \mathbb{R}^{\mathbb{Z}}$. Tetapkan $g(0) = 0$. Untuk $n \geq 0$, definisikan maju

$$g(n + 1) = h(n) + g(n),$$

dan untuk $n < 0$, definisikan mundur

$$g(n) = g(n+1) - h(n).$$

Kedua rekursi menentukan fungsi $g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ dengan $\delta_0(g) = h$. Jadi δ_0 surjektif dan

$$\text{coker } \delta_0 = H^1(L_\bullet; \mathbb{R}) = 0.$$

Semua ruang kohomologi berkoefisien real pada derajat lain juga nol, sehingga

$$\chi^{\text{coh}}(L_\bullet) = 1.$$

Untuk himpunan- Δ hingga, kita sekarang mempunyai dua invarian numerik, χ dan χ^{coh} . Hubungan keduanya tidak langsung tampak, tetapi ternyata keduanya berimpit.

Proposisi 25.2 (kesamaan karakteristik Euler). Untuk himpunan- Δ hingga $X_\bullet$,

$$\chi(X_\bullet) = \chi^{\text{coh}}(X_\bullet).$$

Bukti. Tuliskan

$$C^d := \mathbb{R}^{X_d}, \quad Z^d := \ker \delta_d, \quad B^d := \text{im } \delta_{d-1},$$

dan tetapkan

$$r_d := \dim \text{im } \delta_d, \quad r_{-1} := 0, \quad h_d := \dim H^d(X_\bullet; \mathbb{R}).$$

Karena $X_\bullet$ hingga, semua ruang ini berdimensi hingga dan semuanya nol pada derajat yang cukup besar. Rank–nulitas untuk $\delta_d: C^d \rightarrow C^{d+1}$ memberi

$$\dim C^d = \dim Z^d + r_d.$$

Karena $H^d = Z^d/B^d$ dan $\dim B^d = r_{d-1}$, kita juga mempunyai

$$\dim Z^d = h_d + r_{d-1}.$$

Dengan menggabungkan kedua persamaan,

$$|X_d| = \dim C^d = h_d + r_{d-1} + r_d.$$

Karena semua jumlah berikut sebenarnya berhingga,

$$\begin{aligned} \chi(X_\bullet) &= \sum_{d=0}^{\infty} (-1)^d |X_d| \\ &= \sum_{d=0}^{\infty} (-1)^d h_d + \sum_{d=0}^{\infty} (-1)^d r_{d-1} + \sum_{d=0}^{\infty} (-1)^d r_d. \end{aligned}$$

Pada jumlah tengah, penggantian indeks $j = d - 1$ dan syarat $r_{-1} = 0$ memberi

$$\sum_{d=0}^{\infty} (-1)^d r_{d-1} = - \sum_{j=0}^{\infty} (-1)^j r_j.$$

Dua jumlah yang memuat peringkat diferensial saling meniadakan. Karena itu,

$$\chi(X_{\bullet}) = \sum_{d=0}^{\infty} (-1)^d h_d = \chi^{\text{coh}}(X_{\bullet}),$$

sebagaimana dikehendaki.

Audit sumber 25.5. Notes.tex baris 5574–5585 menulis $\mathbb{R}^{X_d} = \ker \delta_d \oplus \text{im } \delta_d$, tetapi $\text{im } \delta_d$ berada di $\mathbb{R}^{X_{d+1}}$, bukan di $\mathbb{R}^{X_d}$. Baris yang sama kemudian menulis $\dim \delta_d$ alih-alih $\dim \text{im } \delta_d$, dan baris 5588 menulis $|X_{\bullet}|$ alih-alih $|X_d|$. Edisi mengganti pemisahan yang bertipe salah dengan dua persamaan dimensi yang sah dan memperlihatkan pembatalan jumlah peringkat melalui pergeseran indeks. Hasil proposisi tetap sama.

Kita kini dapat menghilangkan superskrip pada χ^{coh} dan cukup berbicara tentang **karakteristik Euler** sebuah himpunan- Δ .

Catatan 25.1 (kompleks berhingga umum). Bukti yang sama berlaku hampir kata demi kata bagi kompleks korantai $V_{\bullet}$ ruang vektor berdimensi hingga dan panjang hingga,

$$0 \longrightarrow V_m \longrightarrow V_{m+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow V_{m+N} \longrightarrow 0.$$

Dengan indeks kohomologis yang sama pada kedua sisi,

$$\sum_{d=m}^{m+N} (-1)^d \dim V_d = \sum_{d=m}^{m+N} (-1)^d \dim H^d(V_{\bullet}).$$

Audit sumber 25.6. Rumus penutup pada Notes.tex baris 5608 menghilangkan eksponen d dari tanda di ruas kiri dan menghilangkan $\dim$ beserta eksponen d di ruas kanan. Rumus pada Catatan 25.1 memulihkan kedua faktor yang diperlukan; argumennya adalah pembatalan rank–nulitas yang sama seperti pada Proposisi 25.2.

25.5 Pemeriksaan penguasaan

Soal-soal berikut merupakan materi asli edisi. Masing-masing dilengkapi petunjuk dan solusi lengkap sehingga dapat dipakai untuk belajar mandiri.

Pemeriksaan Penguasaan 25.1 (satu modul pada derajat atas). Misalkan $X_{\bullet}$ berdimensi n dan $A_{\bullet} = \text{sk}_{n-1} X_{\bullet}$. Buktikan langsung dari definisi restriksi bahwa

$$C^{\bullet}(X_{\bullet}, A_{\bullet}; R) \cong R^{X_n}[n],$$

lalu tentukan semua modul kohomologi relatif. Jelaskan juga apa yang terjadi jika $X_n = \emptyset$.

Petunjuk. Bandingkan A_k dengan X_k untuk $k < n$ dan $k = n$. Korantai relatif adalah kernel pemetaan restriksi $R^{X_k} \rightarrow R^{A_k}$.

Solusi Pemeriksaan 25.1. Untuk $k < n$, definisi kerangka memberi $A_k = X_k$, sehingga restriksi adalah identitas dan kernelnya nol. Karena $X_{\bullet}$ berdimensi n , $A_n = \emptyset$ dan

$$\ker(R^{X_n} \rightarrow R^{\emptyset}) = R^{X_n}.$$

Di atas derajat n , kedua himpunan simpleks kosong, jadi modul korantainya juga nol. Satu-satunya diferensial yang mungkin masuk atau keluar dari R^{X_n} memiliki sumber atau sasaran nol. Jadi kompleks relatif tepat $R^{X_n}[n]$, dan

$$H^k(X_\bullet, A_\bullet; R) = \begin{cases} R^{X_n}, & k = n, \\ 0, & k \neq n. \end{cases}$$

Jika $X_n = \emptyset$, maka $R^{X_n} = R^\emptyset = 0$ dan seluruh kompleks serta seluruh kohomologi relatifnya nol. Dalam hal itu, “berdimensi n ” sebenarnya hanyalah batas atas dimensi, bukan dimensi tepat.

Pemeriksaan Penguasaan 25.2 (batas simpleks). Ambil $n \geq 2$. Selain hasil relatif pada Contoh 25.2, andaikan telah diketahui bahwa

$$H^0(\Delta[n]; R) = R, \quad H^k(\Delta[n]; R) = 0 \quad (k > 0).$$

Gunakan barisan eksak panjang pasangan untuk menentukan $H^k(\partial\Delta[n]; R)$ pada setiap k dan identifikasi pemetaan penghubung yang taktrivial.

Petunjuk. Kohomologi relatif hanya R pada derajat n . Untuk derajat di bawah $n - 1$, dua suku relatif yang mengapit pemetaan biasa adalah nol. Periksa secara terpisah derajat 0 dan potongan di sekitar $n - 1, n$.

Solusi Pemeriksaan 25.2. Karena kelompok relatif pada derajat 0 dan 1 nol untuk $n \geq 2$, awal barisan memberi isomorfisma

$$H^0(\Delta[n]; R) \xrightarrow{\cong} H^0(\partial\Delta[n]; R),$$

sehingga $H^0(\partial\Delta[n]; R) = R$. Untuk $0 < k < n - 1$, kedua suku relatif yang mengapit pemetaan $H^k(\Delta[n]) \rightarrow H^k(\partial\Delta[n])$ nol, dan suku pertama juga nol menurut asumsi. Jadi $H^k(\partial\Delta[n]; R) = 0$.

Di derajat atas, barisan menyederhana menjadi

$$0 \longrightarrow H^{n-1}(\partial\Delta[n]; R) \xrightarrow{\partial^{n-1}} R \longrightarrow 0,$$

karena $H^{n-1}(\Delta[n]; R) = H^n(\Delta[n]; R) = 0$. Maka ∂^{n-1} adalah isomorfisma dan

$$H^{n-1}(\partial\Delta[n]; R) \cong R.$$

Semua derajat di atasnya nol. Jadi kohomologi batas simpleks hanya R pada derajat 0 dan $n - 1$, dan pemetaan penghubung ∂^{n-1} adalah pemetaan taktrivial yang mengidentifikasi suku atas dengan $H^n(\Delta[n], \partial\Delta[n]; R) = R$.

Pemeriksaan Penguasaan 25.3 (kohomologi tereduksi himpunan diskret). Misalkan $D_\bullet$ berdimensi nol, dengan $D_0 = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ dan titik dasar x_0 . Hitung kompleks relatif $C^\bullet(D_\bullet, x_0; R)$ dan kohomologi tereduksinya. Berikan basis eksplisit jika R sebuah medan.

Petunjuk. Pemetaan restriksi pada derajat 0 mengevaluasi fungsi di x_0 . Tidak ada modul pada derajat positif.

Solusi Pemeriksaan 25.3. Pada derajat 0,

$$C^0(D_\bullet, x_0; R) = \ker\left(R^{n+1} \xrightarrow{\rho_{x_0}} R\right) = \{(0, a_1, \dots, a_n) : a_i \in R\} \cong R^n.$$

Semua modul pada derajat positif nol, sehingga semua diferensial nol dan

$$H^k(D_\bullet, x_0; R) = \begin{cases} R^n, & k = 0, \\ 0, & k > 0. \end{cases}$$

Jika R medan, sebuah basis ialah fungsi indikator e_i untuk $1 \leq i \leq n$, dengan $e_i(x_i) = 1$ dan bernilai nol pada semua titik lain. Tidak ada indikator e_0 karena setiap korantai relatif harus lenyap pada titik dasar.

Pemeriksaan Penguasaan 25.4 (kuasi-isomorfisma titik tebal). Tuliskan kompleks $C^\bullet(Pt_\bullet; R)$ dan $C^\bullet(sk_0 Pt_\bullet; R)$ derajat demi derajat. Buktikan bahwa restriksi yang diinduksi inklusi kerangka adalah kuasi-isomorfisma, tetapi bukan isomorfisma kompleks.

Petunjuk. Diferensial pada kompleks pertama bergantian antara nol dan identitas. Kompleks kedua hanya mempunyai R pada derajat 0. Bandingkan lebih dahulu modulnya, lalu kohomologinya.

Solusi Pemeriksaan 25.4. Kompleks pertama ialah

$$0 \rightarrow R \xrightarrow{0} R \xrightarrow{\text{id}} R \xrightarrow{0} R \xrightarrow{\text{id}} \cdots,$$

sedangkan kompleks kerangka ialah

$$0 \rightarrow R \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow \cdots.$$

Restriksi adalah identitas pada derajat 0 dan pemetaan nol $R \rightarrow 0$ pada setiap derajat positif. Ia komutatif dengan diferensial: pada derajat 0 kedua komposisi menuju nol, dan pada derajat positif sasaran seluruhnya nol. Kompleks pertama mempunyai $H^0 = R$ dan $H^k = 0$ untuk $k > 0$, sebab pemetaan bergantian nol dan identitas. Kompleks kedua mempunyai kohomologi yang sama. Pemetaan terinduksi adalah identitas pada H^0 dan isomorfisma unik $0 \rightarrow 0$ pada derajat positif. Jadi restriksi merupakan kuasi-isomorfisma. Namun ia bukan isomorfisma kompleks, sebab pada setiap derajat positif komponennya adalah pemetaan $R \rightarrow 0$, yang tidak bijektif jika $R \neq 0$.

Pemeriksaan Penguasaan 25.5 (separuh injektif Lema Lima). Dalam Diagram 25.2, andaikan α surjektif, β dan δ injektif, dan kedua baris eksak. Mulai dari $c \in \ker \gamma$ dan buktikan $c = 0$. Pada setiap langkah, nyatakan hipotesis mana yang digunakan.

Petunjuk. Dorong c ke D , gunakan injektivitas δ , angkat c dari citra g , dorong pengangkatnya ke B' , lalu gunakan eksaknya baris bawah, surjektivitas α , dan terakhir injektivitas β .

Solusi Pemeriksaan 25.5. Ambil c dengan $\gamma(c) = 0$. Komutativitas memberi

$$\delta(h(c)) = h'(\gamma(c)) = 0.$$

Injektivitas δ memberi $h(c) = 0$. Eksaknya baris atas di C memberi $b \in B$ dengan $c = g(b)$. Maka

$$g'(\beta(b)) = \gamma(g(b)) = \gamma(c) = 0.$$

Eksaknya baris bawah di B' memberi $a' \in A'$ dengan $\beta(b) = f'(a')$. Surjektivitas α memberi $a \in A$ dengan $\alpha(a) = a'$. Dari komutativitas,

$$\beta(f(a)) = f'(\alpha(a)) = f'(a') = \beta(b).$$

Injektivitas β memberi $f(a) = b$. Eksaknya baris atas di B —atau langsung sifat kompleks $gf = 0$ —akhirnya memberi

$$c = g(b) = g(f(a)) = 0.$$

Jadi γ injektif. Hipotesis tentang ε dan surjektivitas β, δ tidak dipakai dalam separuh ini; hipotesis itu tepat untuk separuh surjektif.

Pemeriksaan Penguasaan 25.6 (garis takhingga dan pembatalan Euler). Untuk $L_\bullet$ pada Contoh 25.6:

1. bangun secara eksplisit $g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ dengan $g(n+1) - g(n) = h(n)$ bagi sembarang $h: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$;
2. hitung seluruh kohomologi dan $\chi^{\text{coh}}(L_\bullet)$;
3. jelaskan mengapa jumlah simpleks biasa tidak mendefinisikan $\chi(L_\bullet)$; dan
4. untuk kompleks berdimensi hingga, jelaskan secara aljabar mengapa suku $\dim \text{im } \delta_d$ selalu muncul dua kali dengan tanda berlawanan dalam jumlah Euler.

Petunjuk. Tetapkan $g(0) = 0$, jumlahkan h ke kanan, dan kurangkan h ketika bergerak ke kiri. Untuk bagian terakhir, gunakan $\dim C^d = \dim H^d + r_{d-1} + r_d$.

Solusi Pemeriksaan 25.6. Untuk sembarang h , definisikan

$$g(n) = \begin{cases} \sum_{j=0}^{n-1} h(j), & n > 0, \\ 0, & n = 0, \\ -\sum_{j=n}^{-1} h(j), & n < 0. \end{cases}$$

Pada ketiga kemungkinan posisi n , pengurangan langsung memberi $g(n+1) - g(n) = h(n)$. Jadi δ_0 surjektif. Kernelnya terdiri tepat atas fungsi konstan, sehingga

$$H^0(L_\bullet; \mathbb{R}) = \mathbb{R}, \quad H^1(L_\bullet; \mathbb{R}) = 0,$$

dan semua kohomologi di atas derajat 1 nol karena tidak ada simpleks pada derajat itu. Maka $\chi^{\text{coh}}(L_\bullet) = 1$.

Namun L_0 dan L_1 keduanya takhingga. Ekspresi $|L_0| - |L_1|$ bukan jumlah bilangan berdimensi hingga yang dimaksud dalam definisi karakteristik Euler biasa, sehingga argumen “takhingga dikurangi takhingga” tidak mendefinisikan $\chi(L_\bullet)$.

Untuk kompleks hingga, tetapkan $r_d = \dim \text{im } \delta_d$. Rank–nulitas dan definisi kohomologi memberi

$$\dim C^d = \dim H^d + r_{d-1} + r_d.$$

Dalam jumlah berganti tanda, r_d muncul dari suku derajat d dengan tanda $(-1)^d$ dan dari $r_{(d+1)-1}$ pada suku derajat $d+1$ dengan tanda $(-1)^{d+1}$. Kedua koefisien berjumlah nol. Inilah mekanisme aljabar yang meninggalkan hanya jumlah berganti tanda dimensi kohomologi.

Batas ke Unit 26. Unit 25 menerjemahkan Notes.tex baris 5370–5611 secara kontigu dan menutup seluruh objek sumber pada rentang itu. Baris 5612 berbunyi `Recall\lecturenum{26} the geometric realisation ...`, memulai Kuliah 26, dan tidak dimasukkan. Kursor sumber berikutnya yang tepat adalah **Notes.tex baris 5612**.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts, © 2019 David Michael Roberts, tepatnya [Notes.tex baris 5612–5823](#) pada [commit b947ad2e9f9e301bfc24590a9db653bc54fa1a53](#) dari repositori [DavidMichaelRoberts/AlgebraicTopology2019](#). Rentang aktif itu terdiri atas 212 baris fisik. Dengan normalisasi LF dan terminator LF penutup dipertahankan, ukurannya 9.763 byte dan SHA-256-nya adalah 52663b3e60d5d6f3041b8ede449c52a04700ee670c201ef5674c4aa3973203a9. Baris 5824, yang memulai Kuliah 27, tidak termasuk. Materi sumber dan adaptasi Indonesia ini tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#).

Rentang sumber memuat satu penanda kuliah, tiga definisi, dua proposisi, dua teorema, satu lema, tiga korolari, satu catatan, dua contoh, tiga lingkungan bukti, tiga catatan pinggir, dua label, dan dua rujukan silang. Tidak ada latihan atau pertanyaan formal sumber, diagram Xy-pic atau TikZ, gambar eksternal, sitasi, `input`, ataupun `include`.

Edisi memindahkan ketiga catatan pinggir ke urutan bacaan utama. Edisi juga memperketat hipotesis keteraturan pada penggunaan Teorema Stokes, membuktikan bahwa diferensial singular memang berkuadrat nol, melengkapi argumen eksaknya barisan pasangan, memperbaiki kesimpulan kohomologi tereduksi derajat satu, menyatakan syarat keterhubungan yang tersembunyi dalam argumen koproduk, dan memberi pembuktian penuh invariansi homotopi melalui operator prisma. Salah ketik pada pembatas pasangan, argumen ruang pemetaan, derajat kohomologi ruang kontraktif, dan nama peubah dalam bukti homotopi korantai diperbaiki serta dicatat di tempatnya.

Enam pemeriksaan penguasaan, enam petunjuk, seluruh penutupan bukti edisi, dan enam solusi lengkap merupakan materi asli edisi dan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen; edisi ini tidak disponsori, didukung, disahkan, ataupun diberi status resmi oleh David Michael Roberts atau institusinya. Produksi edisi ini dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**. Pernyataan ini menambah transparansi proses dan tidak mengurangi kredit penulis sumber ataupun kredit kontributor manusia.

26 Kuliah 26

26.1 Dari realisasi geometrik menuju simpleks singular

Ingat kembali realisasi geometrik suatu himpunan- Δ $X_\bullet$:

$$|X_\bullet| = \left(\bigsqcup_{n=0}^{\infty} \text{disc}(X_n) \times \Delta^n \right) / \sim.$$

Ruang ini dilengkapi sekumpulan pemetaan terpilih $\Delta^n \rightarrow |X_\bullet|$. Untuk setiap $x \in X_n$, pemetaan tersebut ialah komposisi

$$\Delta^n \longrightarrow \text{disc}(X_n) \times \Delta^n \hookrightarrow \bigsqcup_{m=0}^{\infty} \text{disc}(X_m) \times \Delta^m \longrightarrow |X_\bullet|,$$

dengan pemetaan pertama mengirim t ke (x, t) . Jika pemetaan itu diprakomposisikan dengan inklusi sisi $\partial_i: \Delta^{n-1} \hookrightarrow \Delta^n$, hasilnya kembali termasuk kelas terpilih: ia adalah pemetaan yang bersesuaian dengan $d_i(x) \in X_{n-1}$.

Ada motivasi kedua yang berasal dari bentuk diferensial. Misalkan M sebuah manifold mulus—misalnya, himpunan terbuka di $\mathbb{R}^n$ —dan ω sebuah bentuk- k diferensial pada M . Integrasi mendefinisikan fungsi

$$C^\infty(\Delta^k, M) \longrightarrow \mathbb{R},$$

$$(f: \Delta^k \rightarrow M) \longmapsto \int_{\Delta^k} f^* \omega.$$

Jadi setiap bentuk- k menentukan unsur ruang vektor $\mathbb{R}^{C^\infty(\Delta^k, M)}$.

Konvensi keteraturan pada simpleks. Sumber membolehkan “mulus pada Δ^k ” berarti mulus pada bagian dalam simpleks dan mempunyai perpanjangan kontinu ke batasnya. Konvensi lemah ini cukup untuk menyatakan nilai batas pemetaan, tetapi tidak dengan sendirinya menjamin hipotesis Teorema Stokes. Untuk identitas integral di bawah, kita mengandaikan f mulus hingga batas (misalnya, merupakan restriksi pemetaan mulus pada suatu lingkungan Δ^k).

Hubungan dengan diferensial eksterior dinyatakan tepat oleh Teorema Stokes. Untuk $f: \Delta^{k+1} \rightarrow M$ yang mulus hingga batas,

$$\int_{\Delta^{k+1}} f^*(d\omega) = \int_{\partial\Delta^{k+1}} f^* \omega = \sum_{i=0}^{k+1} (-1)^i \int_{\Delta^k} (f \circ \partial_i)^* \omega.$$

Dengan kata lain, diferensial eksterior pada bentuk cocok dengan jumlah berganti tanda atas sisi-sisi simpleks.

Audit sumber 26.1. Notes.tex baris 5632–5633 menyebut secara samar “restriksi primitif suatu bentuk eksak ke batas.” Edisi menuliskan identitas Stokes yang dimaksud dan membedakan keteraturan yang diperlukan untuknya dari konvensi lemah pada catatan pinggir sumber. Ini memperjelas motivasi, tanpa menambahkan hipotesis baru pada definisi topologis berikutnya.

Untuk ruang topologis umum X , kedua gagasan tadi bertemu. Kita biasanya tidak mempunyai kelas terpilih pemetaan $\Delta^n \rightarrow X$, sehingga kita mempertimbangkan **semua** pemetaan kontinu tersebut, lalu mengambil fungsi bernilai R pada himpunannya.

26.2 Kompleks korantai singular

Definisi 26.1 (korantai dan kohomologi singular). Misalkan X ruang topologis dan R sebuah gelanggang. **Kompleks korantai singular** X dengan koefisien dalam R , yang dilambangkan $C^\bullet(X; R)$, ialah

$$0 \longrightarrow R^{\text{Top}(\Delta^0, X)} \xrightarrow{\delta} R^{\text{Top}(\Delta^1, X)} \xrightarrow{\delta} R^{\text{Top}(\Delta^2, X)} \xrightarrow{\delta} \dots$$

Jika $g: \text{Top}(\Delta^n, X) \rightarrow R$ dan $\sigma: \Delta^{n+1} \rightarrow X$, diferensialnya diberikan oleh

$$(\delta g)(\sigma) = \sum_{i=0}^{n+1} (-1)^i g(\sigma \circ \partial_i).$$

Kohomologi singular X dengan koefisien dalam R ialah

$$H^n(X; R) := H^n(C^\bullet(X; R)).$$

Konstruksi ini memberi funktor kontravarian

$$C^\bullet(-; R): \text{Top}^{\text{op}} \longrightarrow \text{Cplx}_R, \quad H^n(-; R): \text{Top}^{\text{op}} \longrightarrow \text{Mod}_R.$$

Untuk melihat kontravariansinya dengan tepat, ambil pemetaan $f: X \rightarrow Y$. Pascakomposisi memberi

$$f_{\#}: \text{Top}(\Delta^k, X) \longrightarrow \text{Top}(\Delta^k, Y), \quad \sigma \longmapsto f \circ \sigma.$$

Prakomposisi fungsi dengan $f_{\#}$ kemudian memberi

$$f^*: C^k(Y; R) \longrightarrow C^k(X; R), \quad (f^*\varphi)(\sigma) = \varphi(f \circ \sigma).$$

Proposisi 26.1 (identitas kompleks dan kealamian). Diferensial pada Definisi 26.1 memenuhi $\delta^2 = 0$. Untuk setiap $f: X \rightarrow Y$ berlaku $\delta f^* = f^* \delta$, sehingga f^* memang pemetaan kompleks korantai.

Bukti. Ambil $g \in C^n(X; R)$ dan simpleks singular $\sigma: \Delta^{n+2} \rightarrow X$. Dalam ekspansi $(\delta^2 g)(\sigma)$, setiap pembatasan ke sisi berdimensi n muncul tepat dua kali. Identitas inklusi sisi

$$\partial_j \partial_i = \partial_i \partial_{j-1} \quad (i < j)$$

memasangkan kedua kemunculan itu. Tanda pasangannya adalah $(-1)^{i+j}$ dan $(-1)^{i+j-1}$, sehingga jumlahnya nol. Semua suku berpasangan, jadi $\delta^2 g = 0$.

Selanjutnya, untuk $\varphi \in C^k(Y; R)$ dan $\sigma: \Delta^{k+1} \rightarrow X$,

$$\begin{aligned} (\delta f^* \varphi)(\sigma) &= \sum_i (-1)^i \varphi(f \circ \sigma \circ \partial_i) \\ &= (f^* \delta \varphi)(\sigma). \end{aligned}$$

Maka f^* komutatif dengan diferensial. Identitas dan komposisi juga terpelihara langsung: $\text{id}_X^* = \text{id}_{C^\bullet(X; R)}$ dan $(g \circ f)^* = f^* \circ g^*$. Jadi konstruksi tersebut benar-benar functorial dan kontravarian.

Audit sumber 26.2. Notes.tex baris 5646 menghilangkan koma dalam $\text{Top}(\Delta^k, Y)$ dan meninggalkan kalimat pemetaan terinduksi tanpa predikat yang lengkap. Edisi memberi kedua arah pemetaan secara eksplisit. Sumber juga langsung menyebut “kompleks”; Proposisi 26.1 menutup pemeriksaan $\delta^2 = 0$ yang diperlukan oleh istilah itu.

Modul-modul korantai tersebut biasanya **sangat besar**. Sebagai contoh, ambil $X = I$ dan $R = \mathbb{Z}/2$. Karena himpunan pemetaan kontinu $\Delta^1 \rightarrow I$ mempunyai kardinalitas $|\mathbb{R}|$,

$$|C^1(I; \mathbb{Z}/2)| = 2^{|\text{Top}(\Delta^1, I)|} = 2^{|\mathbb{R}|}.$$

Namun, seperti akan diperoleh dari invariansi homotopi, $H^1(I; \mathbb{Z}/2) = 0$. Berbeda dari kohomologi himpunan- Δ berdimensi hingga, kita karena itu benar-benar memerlukan teorema untuk menghitung kohomologi singular.

Hanya sedikit contoh yang nyaman dihitung langsung dari definisi. Berikut contoh dasarnya.

Contoh 26.1 (satu titik). Untuk $X = \text{pt}$, terdapat tepat satu pemetaan $\Delta^k \rightarrow \text{pt}$ pada setiap k . Kompleks korantai singular menjadi

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{0} R \xrightarrow{\text{id}} R \xrightarrow{0} R \xrightarrow{\text{id}} \cdots.$$

Memang, jumlah $\sum_{i=0}^{n+1} (-1)^i$ adalah nol jika n genap dan satu jika n ganjil. Oleh sebab itu,

$$H^0(\text{pt}; R) = R, \quad H^k(\text{pt}; R) = 0 \quad (k > 0).$$

Pola yang sudah dikenal. Kompleks berganti antara nol dan identitas ini sama dengan kompleks “titik tebal” yang muncul sebelumnya. Catatan pinggir sumber “kita pernah melihat ini” ditempatkan di sini agar hubungan tersebut terbaca dalam alur utama.

26.3 Kohomologi relatif dan tereduksi

Seperti pada himpunan- Δ , kohomologi relatif memberi keluwesan tambahan.

Definisi 26.2 (kohomologi singular relatif). Untuk pasangan ruang (X, A) dengan inklusi $i: A \hookrightarrow X$, kompleks korantai singular relatif ialah

$$C^\bullet(X, A; R) := \ker(i^*: C^\bullet(X; R) \longrightarrow C^\bullet(A; R)).$$

Ini memberi functor

$$C^\bullet(-, -; R): \text{Top}^{(2), \text{op}} \longrightarrow \text{Cplx}_R.$$

Kohomologi singular relatif didefinisikan oleh

$$H^k(X, A; R) := H^k(C^\bullet(X, A; R)),$$

dan bersifat functorial terhadap pemetaan pasangan ruang.

Kohomologi singular biasa diperoleh kembali dengan mengambil $A = \emptyset$.

Proposisi 26.2 (barisan eksak panjang pasangan). Untuk setiap pasangan ruang (X, A) terdapat barisan eksak panjang alami modul- R

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow H^0(X, A; R) \longrightarrow H^0(X; R) \longrightarrow H^0(A; R) \\ \xrightarrow{\partial^0} H^1(X, A; R) \longrightarrow H^1(X; R) \longrightarrow H^1(A; R) \xrightarrow{\partial^1} \dots \end{aligned}$$

Bukti. Pada setiap derajat k , pemetaan restriksi $i^*: C^k(X; R) \rightarrow C^k(A; R)$ surjektif. Memang, suatu fungsi pada simpleks singular yang mendarat di A dapat diperpanjang menjadi fungsi pada semua simpleks singular di X dengan memberi nilai nol pada simpleks lain. Menurut definisi, kernelnya ialah $C^k(X, A; R)$. Karena restriksi komutatif dengan δ , kita memperoleh barisan eksak pendek kompleks korantai

$$0 \longrightarrow C^\bullet(X, A; R) \longrightarrow C^\bullet(X; R) \xrightarrow{i^*} C^\bullet(A; R) \longrightarrow 0.$$

Teorema 24.1, yaitu Teorema Mayer–Vietoris aljabar yang dirujuk dalam sumber, memberi barisan pada pernyataan. Secara konkret, jika $[a] \in H^k(A; R)$ diwakili oleh kosiklus a , pilih perpanjangan $\tilde{a} \in C^k(X; R)$. Karena $i^*(\delta\tilde{a}) = \delta a = 0$, unsur $\delta\tilde{a}$ berada dalam $C^{k+1}(X, A; R)$, dan

$$\partial^k[a] = [\delta\tilde{a}].$$

Perubahan pilihan perpanjangan hanya mengubah kelas ini dengan kobatas relatif, sehingga pemetaan penghubung terdefinisi baik. Konstruksi pengangkat ini komutatif dengan pemetaan pasangan; karena itu seluruh barisan alami.

Sekarang ambil ruang bertitik dasar (X, x) dan pasangan $(X, \{x\})$. Karena kohomologi positif satu titik nol, awal barisan eksak panjangnya ialah

$$0 \longrightarrow H^0(X, \{x\}; R) \longrightarrow H^0(X; R) \xrightarrow{i_x^*} H^0(\{x\}; R) = R \\ \xrightarrow{\partial^0} H^1(X, \{x\}; R) \longrightarrow H^1(X; R) \longrightarrow 0,$$

dan untuk $k > 1$ terdapat isomorfisma $H^k(X, \{x\}; R) \cong H^k(X; R)$.

Pemetaan i_x^* pada derajat nol selalu surjektif: unsur $r \in R$ diangkat oleh kosiklus konstan bernilai r pada X . Maka $\partial^0 = 0$, sehingga pernyataan yang lebih kuat berlaku:

$$H^k(X, \{x\}; R) \cong H^k(X; R) \quad (k \geq 1).$$

Pada derajat nol,

$$H^0(X, \{x\}; R) = \ker \left(H^0(X; R) \xrightarrow{i_x^*} R \right).$$

Untuk ringkasnya, kita menulis $H^k(X, x; R)$ bagi $H^k(X, \{x\}; R)$ dan menyebutnya **kohomologi tereduksi** ruang bertitik dasar (X, x) .

Catatan 26.1 (apa yang terjadi pada derajat satu). Secara formal, potongan barisan eksak mengatakan bahwa $H^1(X; R)$ adalah hasil bagi $H^1(X, x; R)$ oleh citra pemetaan

$$R \xrightarrow{\partial^0} H^1(X, x; R).$$

Untuk menentukan hasil bagi ini, kita memang harus mengetahui pemetaan penghubungnya. Dalam kasus ini penentuannya sederhana: pemetaan sebelumnya $H^0(X; R) \rightarrow R$ surjektif karena setiap skalar diangkat oleh kosiklus konstan. Eksakitas memberi $\text{im } \partial^0 = 0$. Jadi hasil bagi tersebut adalah $H^1(X, x; R)$ sendiri, dan pemetaan $H^1(X, x; R) \rightarrow H^1(X; R)$ merupakan isomorfisma.

Audit sumber 26.3. Notes.tex baris 5703 hanya menyatakan isomorfisma relatif-biasa untuk $k > 1$, lalu baris 5711–5713 meninggalkan citra $R \rightarrow H^1(X, x; R)$ tanpa keputusan. Kosiklus konstan membuktikan bahwa pemetaan sebelumnya $H^0(X; R) \rightarrow R$ surjektif. Oleh eksakitas, citra tersebut nol dan isomorfisma berlaku juga untuk $k = 1$. Edisi menutup langkah ini secara eksplisit.

Contoh 26.2 (ruang diskret bertitik dasar). Jika S ruang diskret dan $p \in S$ titik dasar terpilih, maka kosiklus derajat nol adalah semua fungsi $S \rightarrow R$, sedangkan restriksi ke p adalah evaluasi. Jadi

$$H^0(S, p; R) \cong R^{S \setminus \{p\}}.$$

Khususnya,

$$H^0(\text{pt}, \text{pt}; R) = R^\emptyset = 0.$$

Proposisi 26.3 (functorialitas bertitik dasar). Untuk setiap k , kohomologi tereduksi mendefinisikan functor

$$H^k(-, -; R): \text{Top}_*^{\text{op}} \longrightarrow \text{Mod}_R.$$

Bukti. Pemetaan bertitik dasar $f: (X, x) \rightarrow (Y, y)$ memenuhi $f(x) = y$, sehingga ia tepat merupakan pemetaan pasangan $(X, \{x\}) \rightarrow (Y, \{y\})$. Functorialitas kontravarian kohomologi relatif memberi

$$f^*: H^k(Y, y; R) \longrightarrow H^k(X, x; R).$$

Hukum identitas dan komposisi diwarisi langsung dari fungtor kompleks relatif. Syarat titik dasar diperlukan agar prakomposisi membawa korantai yang lenyap pada $\{y\}$ ke korantai yang lenyap pada $\{x\}$.

Catatan tentang catatan pinggir sumber. Fungtorialitas ini ditandai “Latihan!” dalam margin Notes.tex. Edisi mempertahankan tugas matematisnya, tetapi menempatkan hasil dan buktinya dalam alur utama agar sifat penting ini tidak tersembunyi. Perhatikan khususnya bahwa fungtorialitas relatif tersebut secara langsung berlaku untuk pemetaan bertitik dasar.

26.4 Koproduk ruang

Hasil pertama berikut membantu menghitung kohomologi relatif.

Proposisi 26.4 (kohomologi koproduk hingga). Untuk pasangan ruang (X, A) dan (Y, B) , terdapat isomorfisma kanonik kompleks

$$C^\bullet(X \sqcup Y, A \sqcup B; R) \xrightarrow{\cong} C^\bullet(X, A; R) \oplus C^\bullet(Y, B; R).$$

Setelah mengambil kohomologi, isomorfisma ini memberi, untuk setiap k ,

$$H^k(X \sqcup Y, A \sqcup B; R) \xrightarrow{\cong} H^k(X, A; R) \oplus H^k(Y, B; R).$$

Bukti. Simpleks standar Δ^k terhubung. Karena X dan Y terbuka sekaligus tertutup di $X \sqcup Y$, citra kontinu suatu $\sigma: \Delta^k \rightarrow X \sqcup Y$ harus seluruhnya berada di salah satu komponen. Jadi

$$\text{Top}(\Delta^k, X \sqcup Y) = \text{Top}(\Delta^k, X) \sqcup \text{Top}(\Delta^k, Y).$$

Untuk dua himpunan P, Q , pembatasan fungsi memberi isomorfisma

$$R^{P \sqcup Q} \cong R^P \oplus R^Q.$$

Di bawah isomorfisma ini, setiap pemetaan sisi dan diferensial δ bertindak komponen demi komponen. Pemetaan restriksi menuju $A \sqcup B$ juga menjadi jumlah langsung pemetaan restriksi menuju A dan menuju B . Kernelnya karena itu ialah

$$\ker(i_{A \sqcup B}^*) \cong \ker(i_A^*) \oplus \ker(i_B^*),$$

yang tepat merupakan isomorfisma kompleks relatif pada pernyataan. Kohomologi jumlah langsung dua kompleks adalah jumlah langsung kohomologinya, sehingga isomorfisma kedua mengikuti.

Dengan mengambil pasangan $(X, \emptyset)$ dan $(Y, \emptyset)$, kita memperoleh hasil yang sama untuk kohomologi biasa:

$$H^k(X \sqcup Y; R) \cong H^k(X; R) \oplus H^k(Y; R).$$

Audit sumber 26.4. Dua tampilan pada Notes.tex baris 5731 dan 5735 menuliskan pembatas pasangan sebagai $(X, A : R)$; edisi mengembalikan titik koma yang bertipe benar, $(X, A; R)$. Kesamaan ruang pemetaan pada baris 5741 juga memerlukan keterhubungan Δ^k . Alasan itu dinyatakan eksplisit; tanpa keterhubungan domain, suatu pemetaan ke $X \sqcup Y$ dapat mengenai kedua komponen dan dekomposisi serupa tidak berlaku dalam bentuk tersebut.

26.5 Invariansi homotopi

Kita menulis f^* bagi pemetaan $H^k(f)$ yang diinduksi oleh pemetaan ruang f .

Teorema 26.1 (invariansi homotopi kohomologi singular). Jika $f, g: X \rightarrow Y$ homotopik, maka

$$f^* = g^*: H^k(Y; R) \longrightarrow H^k(X; R)$$

untuk setiap k .

Pembuktian pada tingkat kompleks akan diberikan setelah beberapa akibat langsung. Ketiga bukti berikut hanya memakai functorialitas dan Teorema 26.1.

Korolari 26.1 (ekuivalensi homotopi). Misalkan $f: X \rightarrow Y$ dan $g: Y \rightarrow X$ saling invers hingga homotopi. Maka

$$f^* = (g^*)^{-1},$$

dan $H^k(X; R) \cong H^k(Y; R)$ untuk setiap k .

Bukti. Kita mempunyai $g \circ f \simeq \text{id}_X$ dan $f \circ g \simeq \text{id}_Y$. Karena kohomologi kontravarian,

$$(g \circ f)^* = f^* \circ g^*, \quad (f \circ g)^* = g^* \circ f^*.$$

Teorema 26.1 menyamakan kedua pemetaan ini masing-masing dengan identitas pada $H^k(X; R)$ dan $H^k(Y; R)$. Jadi f^* dan g^* saling invers.

Korolari 26.2 (ruang kontraktif). Jika X kontraktif, maka

$$H^0(X; R) \cong R, \quad H^k(X; R) = 0 \quad (k > 0).$$

Lebih tepatnya, jika X berkontraksi ke $x \in X$, pemetaan yang diinduksi inklusi $\{x\} \hookrightarrow X$,

$$H^k(X; R) \longrightarrow H^k(\{x\}; R),$$

merupakan isomorfisma untuk setiap k . Akibatnya, $H^k(X, x; R) = 0$ untuk setiap k .

Bukti. Misalkan $i: \{x\} \hookrightarrow X$ dan $r: X \rightarrow \{x\}$ pemetaan konstan. Kita mempunyai $r \circ i = \text{id}_{\{x\}}$ dan $i \circ r \simeq \text{id}_X$ melalui kontraksi yang diberikan. Korolari 26.1 membuat i^* dan r^* saling invers. Perhitungan Contoh 26.1 lalu memberi kohomologi biasa yang dinyatakan.

Pada barisan eksak panjang pasangan $(X, \{x\})$, pemetaan $H^k(X; R) \rightarrow H^k(\{x\}; R)$ adalah isomorfisma pada setiap derajat. Eksakitas memaksa setiap suku relatif $H^k(X, x; R)$ menjadi nol.

Audit sumber 26.5. Notes.tex baris 5768 menyatakan $H^k(X; R) = 0$ untuk $k > 0$, lalu menulis $H^k(X; R) \cong R$ tanpa menentukan derajat. Edisi mengembalikan maksud yang konsisten: $H^0(X; R) \cong R$.

Korolari 26.3 (perubahan titik dasar sepanjang lintasan). Misalkan X ruang bertitik dasar dan $\gamma: x \rightsquigarrow x'$ sebuah lintasan. Dua pemetaan

$$H^0(X; R) \longrightarrow H^0(\text{pt}; R) = R$$

yang diinduksi oleh inklusi x dan x' adalah sama. Karena itu,

$$H^0(X, x; R) = H^0(X, x'; R).$$

Jadi kohomologi tereduksi derajat nol hanya bergantung pada komponen lintasan titik dasar, bukan pada wakil titik dasarnya.

Bukti. Lintasan γ tepat merupakan homotopi antara kedua inklusi $i_x, i_{x'}: \text{pt} \rightarrow X$. Teorema 26.1 memberi $i_x^* = i_{x'}^*$. Kedua modul relatif derajat nol adalah kernel pemetaan yang sama dari $H^0(X; R)$ ke R , sehingga keduanya sama.

Untuk kompleks, kuasi-isomorfisma memainkan peran yang menyerupai ekuivalensi homotopi lemah. Namun, homotopi antarpemetaan ruang mempunyai analog aljabar yang lebih kuat.

Definisi 26.3 (homotopi korantai). Misalkan $f, g: A^\bullet \rightarrow B^\bullet$ pemetaan kompleks korantai. Sebuah **homotopi korantai** dari f ke g ialah keluarga homomorfisma modul- R berderajat -1

$$\{h_n: A^n \longrightarrow B^{n-1}\}_{n \in \mathbb{Z}}$$

yang memenuhi

$$\delta_{n-1}^B h_n + h_{n+1} \delta_n^A = f_n - g_n$$

untuk setiap n .

Lema 26.1 (pemetaan yang homotopik pada tingkat korantai). Jika terdapat homotopi korantai dari f ke g , maka

$$H^k(f) = H^k(g)$$

untuk setiap k .

Bukti. Ambil kelas $[c] \in H^k(A^\bullet)$ dengan wakil kosiklus $c \in A^k$, sehingga $\delta_k^A(c) = 0$. Identitas homotopi memberi

$$f_k(c) = g_k(c) + \delta_{k-1}^B(h_k(c)) + h_{k+1}(\delta_k^A(c)).$$

Suku terakhir nol karena c kosiklus, sedangkan suku tengah merupakan kobatas. Jadi

$$\begin{aligned} H^k(f)([c]) &= [f_k(c)] \\ &= [g_k(c) + \delta_{k-1}^B(h_k(c))] \\ &= [g_k(c)] \\ &= H^k(g)([c]). \end{aligned}$$

Kesamaan ini berlaku pada setiap kelas, sehingga kedua pemetaan kohomologi sama.

Audit sumber 26.6. Pada Notes.tex baris 5801, kosiklus telah dinamai c tetapi suku terakhir ditulis $h_{k+1}(\delta_k^A(x))$. Edisi mengganti x dengan c dan menyatakan secara eksplisit mengapa suku kobatas lenyap setelah mengambil kelas kohomologi.

Versi tingkat-kompleks berikut lebih kuat daripada Teorema 26.1.

Teorema 26.2 (homotopi ruang menginduksi homotopi korantai). Jika $f, g: X \rightarrow Y$ homotopik, maka terdapat homotopi korantai antara dua pemetaan terinduksi

$$f^*, g^*: C^\bullet(Y; R) \longrightarrow C^\bullet(X; R).$$

Bukti. Pilih homotopi $H: X \times I \rightarrow Y$ dengan $H(-, 0) = f$ dan $H(-, 1) = g$. Agar tanda dapat diperiksa, gunakan terlebih dahulu kompleks rantai singular $S_n(X; R)$, yaitu modul bebas atas semua simpleks singular $\sigma: \Delta^n \rightarrow X$, dengan batas berganti tanda.

Reduksi dalam sketsa sumber dapat dilihat langsung. Jika $j_0, j_1: X \rightarrow X \times I$ adalah kedua inklusi ujung, maka $f = H \circ j_0$ dan $g = H \circ j_1$. Fungtorialitas karena itu mereduksi masalah ke homotopi silinder antara j_0 dan j_1 . Selanjutnya, karena rantai singular bebas atas pemetaan $\sigma: \Delta^n \rightarrow X$, pemeriksaan dapat dilakukan pada satu Δ^n pada satu waktu. Inilah alasan triangulasi $\Delta^n \times I$ cukup untuk kasus umum.

Triangulasi standar prisma $\Delta^n \times I$ mempunyai $n + 1$ simpleks berorientasi. Untuk $0 \leq i \leq n$, definisikan pemetaan afin $q_i: \Delta^{n+1} \rightarrow \Delta^n \times I$ melalui daftar titik sudut berurutan

$$(v_0, 0), \dots, (v_i, 0), (v_i, 1), \dots, (v_n, 1).$$

Untuk generator σ tentukan operator prisma

$$P_n(\sigma) = \sum_{i=0}^n (-1)^i H \circ (\sigma \times \text{id}_I) \circ q_i,$$

dan perluas secara R -linear. Pengembangan batas setiap simpleks prisma memberi identitas

$$\partial P + P\partial = g_\# - f_\#.$$

Berikut pemeriksaan kombinasinya. Sisi bawah hanya muncul pada simpleks prisma terakhir dan menyumbang $-f_\#\sigma$; sisi atas hanya muncul pada simpleks pertama dan menyumbang $g_\#\sigma$. Setiap sisi diagonal di bagian dalam muncul pada dua simpleks prisma yang bersebelahan dengan orientasi berlawanan, sehingga saling meniadakan. Sisi-sisi lainnya adalah prisma atas sisi-sisi $\partial_j\sigma$; setelah tanda $(-1)^j$ dari batas singular diperhitungkan, jumlahnya tepat $-P(\partial\sigma)$. Memindahkan suku itu ke ruas kiri memberi identitas di atas. Ini adalah “kombinatorika berantakan” yang disebut dalam sketsa sumber, kini dengan semua jenis sisi dan tanda penutupnya dinyatakan.

Korantai singular dapat dipandang sebagai

$$C^n(Y; R) = \text{Hom}_R(S_n(Y; R), R).$$

Tetapkan $h_0 = 0$. Untuk $n \geq 1$ dan $\varphi \in C^n(Y; R)$, definisikan pemetaan derajat -1

$$h_n\varphi := -\varphi \circ P_{n-1} \in C^{n-1}(X; R).$$

Jika $c \in S_n(X; R)$, dualitas antara δ dan ∂ memberi

$$\begin{aligned} ((\delta h + h\delta)\varphi)(c) &= -\varphi(P\partial c) - (\delta\varphi)(Pc) \\ &= -\varphi(P\partial c + \partial Pc) \\ &= -\varphi((g_\# - f_\#)c) \\ &= (f^*\varphi - g^*\varphi)(c). \end{aligned}$$

Jadi $\delta h + h\delta = f^* - g^*$, tepat identitas homotopi korantai pada Definisi 26.3. Lema 26.1 kemudian memberi $H^k(f) = H^k(g)$, sehingga sekaligus menyelesaikan bukti [Teorema 26.1](#).

Audit sumber 26.7. Notes.tex baris 5815–5821 hanya menguraikan reduksi ke $I \times X$, simpleks $X = \Delta^k$, dan suatu triangulasi prisma, lalu menyerahkan identitas yang diperlukan pada kombinatorika. Edisi membangun operator prisma, memeriksa pembatalan semua jenis sisi, mengatur tanda agar sesuai dengan konvensi $f^* - g^*$ sumber, dan mendualisasikannya. Tidak ada teorema dalam unit ini yang tersisa tanpa bukti.

26.6 Pemeriksaan penguasaan

Enam soal berikut merupakan materi asli edisi. Setiap soal mempunyai petunjuk dan solusi lengkap yang dapat diperiksa secara mandiri.

Pemeriksaan Penguasaan 26.1 (mengapa $\delta^2 = 0$). Misalkan $g \in C^n(X; R)$.

1. Tuliskan $(\delta^2 g)(\sigma)$ untuk $\sigma: \Delta^{n+2} \rightarrow X$ sebagai jumlah ganda.
2. Pasangkan setiap suku yang membatasi σ ke muka kodimensi dua yang sama.
3. Periksa secara eksplisit kasus $n = 0$.

Petunjuk. Gunakan $\partial_j \partial_i = \partial_i \partial_{j-1}$ untuk $i < j$. Dalam kasus $n = 0$, tulis tiga sisi dari Δ^2 dan enam evaluasi pada titik sudut sebelum melakukan pembatalan.

Solusi Pemeriksaan 26.1. Dari definisi,

$$(\delta^2 g)(\sigma) = \sum_{j=0}^{n+2} \sum_{i=0}^{n+1} (-1)^{i+j} g(\sigma \circ \partial_j \circ \partial_i).$$

Untuk $i < j$, identitas sisi $\partial_j \partial_i = \partial_i \partial_{j-1}$ menunjukkan bahwa suku berindeks (i, j) mempunyai muka kodimensi dua yang sama dengan suku pada urutan penghapusan sebaliknya. Tanda keduanya berbeda satu faktor -1 : satu tanda adalah $(-1)^{i+j}$, dan tanda pasangannya adalah $(-1)^{i+j-1}$. Jadi semua suku saling meniadakan.

Untuk $n = 0$, tulis g sebagai fungsi pada titik-titik singular dan $\sigma: \Delta^2 \rightarrow X$. Maka

$$\begin{aligned} (\delta^2 g)(\sigma) &= [g(\sigma(v_2)) - g(\sigma(v_1))] \\ &\quad - [g(\sigma(v_2)) - g(\sigma(v_0))] \\ &\quad + [g(\sigma(v_1)) - g(\sigma(v_0))] = 0. \end{aligned}$$

Setiap nilai titik sudut muncul dua kali dengan tanda berlawanan. Kasus ini adalah bayangan berdimensi rendah dari pasangan muka pada argumen umum.

Pemeriksaan Penguasaan 26.2 (titik, interval, dan kontraktibilitas).

1. Hitung diferensial $C^n(\text{pt}; R) \rightarrow C^{n+1}(\text{pt}; R)$ dari jumlah berganti tanda.
2. Gunakan kontraksi $I \rightarrow \{0\}$ untuk menentukan $H^k(I; R)$ pada semua derajat.
3. Jelaskan mengapa hasil bagian 2 tidak bertentangan dengan besarnya $C^1(I; R)$.

Petunjuk. Hitung $\sum_{i=0}^{n+1} (-1)^i$. Untuk interval, inklusi titik dan pemetaan konstan adalah invers hingga homotopi. Kohomologi adalah hasil bagi kernel dengan citra, bukan ukuran modul korantai.

Solusi Pemeriksaan 26.2. Ada satu simpleks singular $\Delta^n \rightarrow \text{pt}$ pada setiap derajat, sehingga setiap modul korantai adalah R . Diferensial derajat n adalah perkalian dengan

$$\sum_{i=0}^{n+1} (-1)^i = \begin{cases} 0, & n \text{ genap,} \\ 1, & n \text{ ganjil.} \end{cases}$$

Jadi kompleksnya berganti antara pemetaan nol dan identitas. Kohomologinya adalah R pada derajat nol dan nol pada derajat positif.

Interval berkontraksi ke 0. Jika $i: \{0\} \hookrightarrow I$ dan $r: I \rightarrow \{0\}$, maka $ri = \text{id}$ dan $ir \simeq \text{id}_I$. Invariansi homotopi membuat i^* dan r^* saling invers, sehingga

$$H^0(I; R) = R, \quad H^k(I; R) = 0 \quad (k > 0).$$

Tidak ada pertentangan dengan besarnya $C^1(I; R)$. Modul itu memang memuat semua fungsi dari himpunan sangat besar simpleks singular ke R , tetapi kohomologi hanya menyimpan kosiklus modulo kobatas. Invariansi homotopi menunjukkan bahwa pada derajat positif semua kosiklus tersebut sudah merupakan kobatas.

Pemeriksaan Penguasaan 26.3 (pasangan interval dan batasnya). Ambil $\partial I = \{0, 1\}$. Gunakan barisan eksak panjang pasangan, bukan suatu kompleks selular, untuk menghitung $H^k(I, \partial I; R)$ pada semua derajat. Identifikasi secara eksplisit kokernel pemetaan pada derajat nol.

Petunjuk. Kita mempunyai $H^0(I; R) = R$ dan $H^0(\partial I; R) = R \oplus R$, sedangkan semua kohomologi positif kedua ruang itu nol. Pemetaan restriksi mengirim a ke (a, a) .

Solusi Pemeriksaan 26.3. Bagian relevan barisan eksak panjang ialah

$$0 \longrightarrow H^0(I, \partial I; R) \longrightarrow R \xrightarrow{\Delta} R \oplus R \xrightarrow{\partial^0} H^1(I, \partial I; R) \longrightarrow 0,$$

dengan $\Delta(a) = (a, a)$. Pemetaan diagonal injektif, sehingga $H^0(I, \partial I; R) = 0$. Eksakitas memberi

$$H^1(I, \partial I; R) \cong (R \oplus R)/\Delta(R).$$

Pemetaan $(a, b) \mapsto b - a$ surjektif dan kernelnya tepat $\Delta(R)$, maka ia menginduksi isomorfisma

$$H^1(I, \partial I; R) \cong R.$$

Pada derajat $k > 1$, semua suku biasa yang mengapit suku relatif nol, sehingga $H^k(I, \partial I; R) = 0$. Dengan demikian,

$$H^k(I, \partial I; R) \cong \begin{cases} R, & k = 1, \\ 0, & k \neq 1. \end{cases}$$

Pemetaan penghubung mengukur selisih nilai pada kedua ujung interval.

Pemeriksaan Penguasaan 26.4 (ruang diskret dan pemetaan bertitik dasar). Misalkan $S = \{p, s_1, \dots, s_m\}$ dan $T = \{q, t_1, \dots, t_n\}$ diskret dengan titik dasar p dan q .

1. Hitung $H^k(S, p; R)$.
2. Untuk pemetaan bertitik dasar $\phi: (S, p) \rightarrow (T, q)$, tuliskan $\phi^*: H^0(T, q; R) \rightarrow H^0(S, p; R)$ pada fungsi.
3. Buktikan bahwa hasilnya tetap lenyap di titik dasar.

Petunjuk. Korantai relatif derajat nol adalah fungsi yang bernilai nol di titik dasar. Pemetaan terinduksi adalah prakomposisi dengan ϕ .

Solusi Pemeriksaan 26.4. Karena S diskret, komponen lintasannya adalah titik-titik tunggal. Maka

$$H^0(S; R) = R^S,$$

dan evaluasi di p mempunyai kernel semua fungsi yang lenyap di p :

$$H^0(S, p; R) = \{a: S \rightarrow R : a(p) = 0\} \cong R^{\{s_1, \dots, s_m\}} \cong R^m.$$

Kohomologi positif ruang diskret nol; melalui isomorfisma relatif-biasa pada derajat positif, $H^k(S, p; R) = 0$ untuk $k > 0$.

Jika $a \in H^0(T, q; R)$, maka

$$(\phi^* a)(s) = a(\phi(s)).$$

Karena ϕ bertitik dasar, $\phi(p) = q$. Oleh sebab itu,

$$(\phi^* a)(p) = a(\phi(p)) = a(q) = 0.$$

Jadi prakomposisi memang membawa korantai relatif ke korantai relatif. Ini juga memperlihatkan secara konkret mengapa syarat bertitik dasar diperlukan.

Pemeriksaan Penguasaan 26.5 (koproduk dan keterhubungan domain).

1. Buktikan bahwa setiap pemetaan kontinu $\Delta^k \rightarrow X \sqcup Y$ mendarat seluruhnya di X atau seluruhnya di Y .
2. Jika $X_1, \dots, X_m$ semuanya kontraktif dan takkosong, hitung $H^k(\bigsqcup_{j=1}^m X_j; R)$.
3. Berikan contoh domain takterhubung K dan pemetaan $K \rightarrow X \sqcup Y$ yang mengenai kedua komponen koproduk, untuk menunjukkan letak penggunaan keterhubungan.

Petunjuk. Pracitra X dan Y terbuka sekaligus tertutup dan mempartisi Δ^k . Iterasikan Proposisi 26.4. Untuk bagian terakhir, pakai ruang dua titik diskret.

Solusi Pemeriksaan 26.5. Dalam $X \sqcup Y$, kedua komponen koproduk terbuka dan tertutup. Jika $\sigma: \Delta^k \rightarrow X \sqcup Y$, maka $\sigma^{-1}(X)$ dan $\sigma^{-1}(Y)$ adalah dua himpunan buka-tertutup yang saling lepas dan menutupi Δ^k . Karena Δ^k terhubung, salah satunya kosong. Jadi seluruh citra berada dalam tepat satu komponen koproduk.

Dengan mengiterasikan dekomposisi koproduk dan memakai kontraktilitas,

$$H^0\left(\bigsqcup_{j=1}^m X_j; R\right) \cong \bigoplus_{j=1}^m H^0(X_j; R) \cong R^m,$$

$$H^k\left(\bigsqcup_{j=1}^m X_j; R\right) = 0 \quad (k > 0).$$

Untuk memperlihatkan kegagalan tanpa keterhubungan, ambil $K = \{a, b\}$ diskret, pilih $x \in X$ dan $y \in Y$, lalu definisikan $u(a) = x$ dan $u(b) = y$. Pemetaan kontinu u mengenai kedua komponen. Jadi dekomposisi ruang pemetaan yang dipakai dalam bukti bergantung secara esensial pada keterhubungan simpleks standar.

Pemeriksaan Penguasaan 26.6 (operator prisma pada derajat rendah). Misalkan $H: X \times I \rightarrow Y$ adalah homotopi dari f ke g .

1. Untuk titik singular $\sigma: \Delta^0 \rightarrow X$, tuliskan $P_0(\sigma)$ dan periksa $\partial P_0(\sigma) = g_{\#}\sigma - f_{\#}\sigma$.
2. Untuk lintasan singular $\sigma: \Delta^1 \rightarrow X$, gambarkan dua segitiga berorientasi yang membagi $\Delta^1 \times I$ dan jelaskan pembatalan diagonal bersama.
3. Dualisasikan identitas prisma dan buktikan bahwa f^* dan g^* memberi pemetaan kohomologi yang sama.

Petunjuk. Pada derajat nol, prisma adalah lintasan $t \mapsto H(\sigma, t)$. Pada derajat satu, gunakan urutan titik sudut $(v_0, 0), (v_0, 1), (v_1, 1)$ dan $(v_0, 0), (v_1, 0), (v_1, 1)$ dengan tanda berlawanan. Untuk dualisasi, tetapkan $h\varphi = -\varphi \circ P$.

Solusi Pemeriksaan 26.6. Jika σ sebuah titik singular, hanya ada satu simpleks pada triangulasi $\Delta^0 \times I$. Jadi

$$P_0(\sigma)(t) = H(\sigma, t).$$

Batas lintasan berorientasi adalah titik akhir dikurangi titik awal:

$$\partial P_0(\sigma) = H(\sigma, 1) - H(\sigma, 0) = g_{\#}\sigma - f_{\#}\sigma.$$

Untuk $\sigma: \Delta^1 \rightarrow X$, persegi $\Delta^1 \times I$ dibagi sepanjang diagonal dari $(v_0, 0)$ ke $(v_1, 1)$. Dua segitiganya mempunyai daftar titik sudut

$$(v_0, 0), (v_0, 1), (v_1, 1) \quad \text{dan} \quad (v_0, 0), (v_1, 0), (v_1, 1).$$

Dalam P_1 keduanya masuk dengan tanda bergantian. Diagonal bersama muncul dengan orientasi berlawanan dan lenyap. Sisi atas menyisakan $g_{\#}\sigma$, sisi bawah menyisakan $-f_{\#}\sigma$, dan kedua sisi vertikal menyusun $-P_0(\partial\sigma)$. Jadi

$$\partial P_1(\sigma) + P_0(\partial\sigma) = g_{\#}\sigma - f_{\#}\sigma.$$

Pada semua derajat, identitas yang sama ialah $\partial P + P\partial = g_{\#} - f_{\#}$. Untuk $\varphi \in C^n(Y; R)$ definisikan $h_n\varphi = -\varphi \circ P_{n-1}$. Jika $c \in S_n(X; R)$, maka

$$\begin{aligned} ((\delta h + h\delta)\varphi)(c) &= -\varphi(P\partial c + \partial Pc) \\ &= -\varphi((g_{\#} - f_{\#})c) \\ &= (f^*\varphi - g^*\varphi)(c). \end{aligned}$$

Jadi $f^* - g^* = \delta h + h\delta$. Untuk kosiklus φ , selisih $f^*\varphi - g^*\varphi$ adalah kobatas $\delta(h\varphi)$, sehingga kedua korantai menentukan kelas kohomologi yang sama. Dengan demikian, $H^n(f) = H^n(g)$ untuk setiap n .

Batas ke Unit 27. Unit 26 menerjemahkan Notes.tex baris 5612–5823 secara kontigu dan menutup seluruh objek sumber pada rentang itu. Baris 5824 berbunyi `Let\lectureenum{27} us consider for a short time again the reduced cohomology ...`, memulai Kuliah 27, dan tidak dimasukkan. Kursor sumber berikutnya yang tepat adalah **Notes.tex baris 5824**.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts, © 2019 David Michael Roberts, tepatnya [Notes.tex baris 5824–5923](#) pada [commit b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#) dari repositori [DavidMichaelRoberts/AlgebraicTopology2019](#). Rentang aktif itu terdiri atas 100 baris fisik. Dengan normalisasi LF dan terminator LF penutup dipertahankan, ukurannya 7.012 byte dan SHA-256-nya adalah 65d2c393ddf29183f36d6e9ab65c65f8030110334f89c7f68ba88461fc30afa1. Baris 5924, yang memulai Kuliah 28, tidak termasuk. Materi sumber dan adaptasi Indonesia ini tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#).

Rentang sumber memuat satu penanda kuliah, satu definisi, satu lema, satu proposisi, satu teorema, satu latihan formal sumber, tiga contoh, satu lingkungan bukti, satu catatan pinggir, satu diagram

Xy-pic, empat label, dan dua rujukan silang. Tidak ada gambar TikZ atau gambar eksternal, sitasi, `input`, ataupun `include`.

Edisi menyelesaikan latihan sumber, membuktikan lema pembelahan, dan melengkapi pembuktian perbandingan korantai kecil serta teorema Mayer–Vietoris. Ada satu perbaikan struktural yang penting: korantai kecil harus didefinisikan pada subkompleks rantai kecil, dan pemetaan pembandingan yang sah adalah restriksi dari seluruh korantai ke korantai kecil. Perluasan dengan nol yang ditulis sumber tidak membentuk subkompleks pada umumnya. Edisi juga memperbaiki identitas komposisi yang salah tipe, pernyataan derajat nol yang salah tulis, dan hipotesis tak-kosong pada versi tereduksi yang dimulai dengan nol. Diagram dan barisan lebar dialirkan ulang secara semantik agar tidak bergantung pada posisi atau lebar halaman.

Latihan sumber beserta solusinya, lima pemeriksaan penguasaan tambahan, semua petunjuk, penutupan bukti, audit, dan solusi lengkap merupakan materi edisi yang tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen; edisi ini tidak disponsori, didukung, disahkan, ataupun diberi status resmi oleh David Michael Roberts atau institusinya. Produksi edisi ini dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**. Pernyataan ini menambah transparansi proses dan tidak mengurangi kredit penulis sumber ataupun kredit kontributor manusia.

27 Kuliah 27

27.1 Derajat nol tanpa memilih titik dasar

Mari kita kembali sejenak ke kohomologi tereduksi. Pada unit sebelumnya, konstruksi itu diperkenalkan melalui pasangan bertitik dasar dan karena itu jelas functorial untuk pemetaan bertitik dasar. Ternyata derajat nol mempunyai deskripsi kanonik yang menghilangkan kebutuhan untuk memilih titik dasar.

Untuk setiap ruang X terdapat pemetaan tunggal

$$!_X: X \longrightarrow \text{pt}.$$

Karena kohomologi bersifat kontravarian, pemetaan tersebut menginduksi

$$\text{const} := !_X^*: R = H^0(\text{pt}; R) \longrightarrow H^0(X; R).$$

Jika $f: X \rightarrow Y$, maka $!_Y \circ f = !_X$. Karena itu, diagram

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{\text{const}_Y} & H^0(Y; R) \\ \parallel & & \downarrow f^* \\ R & \xrightarrow{\text{const}_X} & H^0(X; R) \end{array}$$

komutatif. Kita sekarang menentukan arti konkret pemetaan konstan tersebut.

Latihan sumber / Pemeriksaan Penguasaan 27.1 (kohomologi derajat nol). Buktikan bahwa

$$H^0(X; R) \cong R^{[\text{pt}, X]},$$

yakni modul fungsi bernilai R yang konstan pada setiap komponen lintasan. Untuk $f: X \rightarrow Y$, buktikan pula bahwa

$$f^*: H^0(Y; R) \longrightarrow H^0(X; R)$$

adalah prakomposisi dengan pemetaan komponen lintasan $[\text{pt}, X] \rightarrow [\text{pt}, Y]$ yang diinduksi oleh f .

Petunjuk. Simpleks singular berdimensi nol hanyalah titik $x \in X$. Hitung $(\delta a)(\gamma)$ untuk lintasan $\gamma: \Delta^1 \rightarrow X$, lalu ingat bahwa tidak ada kobatas yang datang dari derajat -1 dalam kompleks yang digunakan di sini.

Solusi Pemeriksaan 27.1. Korantai nol adalah fungsi

$$a: \text{Top}(\Delta^0, X) = X \longrightarrow R.$$

Untuk simpleks singular satu $\gamma: \Delta^1 \rightarrow X$, rumus diferensial memberi

$$(\delta a)(\gamma) = a(\gamma(1)) - a(\gamma(0)).$$

Jadi $\delta a = 0$ tepat ketika a mempunyai nilai yang sama pada kedua ujung setiap lintasan. Ini ekuivalen dengan mengatakan bahwa a konstan pada setiap komponen lintasan. Sebaliknya, jika a konstan pada komponen lintasan, kedua ujung setiap γ terletak dalam komponen yang sama, sehingga $(\delta a)(\gamma) = 0$.

Kompleks korantai dimulai pada derajat nol, sehingga $\text{im}(\delta: C^{-1} \rightarrow C^0) = 0$. Akibatnya,

$$H^0(X; R) = \ker(\delta: C^0 \rightarrow C^1) \cong \{\text{fungsi } \pi_0(X) \rightarrow R\} = R^{[\text{pt}, X]}.$$

Untuk $f: X \rightarrow Y$ dan kelas yang diwakili fungsi $a: \pi_0(Y) \rightarrow R$, definisi tarik-balik memberi

$$(f^*a)(x) = a(f(x)).$$

Nilai ini hanya bergantung pada komponen lintasan x , dan tepat sama dengan prakomposisi a oleh $\pi_0(f): \pi_0(X) \rightarrow \pi_0(Y)$. Identifikasi tersebut dengan demikian alami terhadap f .

Di bawah identifikasi ini, $\text{const}(r)$ adalah fungsi yang bernilai r pada setiap komponen lintasan. Jika $X \neq \emptyset$ dan dipilih $x \in X$, titik itu menentukan pemetaan $x: \text{pt} \rightarrow X$. Pemetaan

$$\text{ev}_x := x^*: H^0(X; R) \longrightarrow R$$

mengevaluasi fungsi pada komponen x . Identitas topologis yang benar ialah

$$!_X \circ x = \text{id}_{\text{pt}},$$

sehingga, setelah arah dibalik oleh kohomologi,

$$\text{ev}_x \circ \text{const} = \text{id}_R.$$

Jadi const injektif.

Audit sumber 27.1. Notes.tex baris 5831 menulis $!_X \circ x = \text{id}_X$. Kedua ruasnya bahkan tidak mempunyai tipe yang sama: ruas kiri berpeta dari pt ke pt . Edisi memperbaikinya menjadi $!_X \circ x = \text{id}_{\text{pt}}$, yang memang menghasilkan $\text{ev}_x \circ \text{const} = \text{id}_R$.

Definisi 27.1 (pembelahan kiri). Untuk barisan eksak pendek modul- R

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{\pi} C \longrightarrow 0,$$

sebuah **pembelahan kiri** adalah homomorfisma $r: B \rightarrow A$ yang memenuhi

$$r \circ i = \text{id}_A.$$

Lema 27.1 (dekomposisi dari pembelahan kiri). Jika r adalah pembelahan kiri untuk barisan eksak pendek di atas, maka

$$(r, \pi): B \longrightarrow A \oplus C, \quad b \longmapsto (r(b), \pi(b))$$

adalah isomorfisma. Selain itu, restriksi $\pi|_{\ker r}: \ker r \rightarrow C$ adalah isomorfisma.

Bukti. Jika $(r(b), \pi(b)) = (0, 0)$, maka eksaknya barisan memberi $b = i(a)$ untuk suatu $a \in A$. Karena $r(b) = 0$,

$$0 = r(i(a)) = a,$$

sehingga $b = 0$. Jadi (r, π) injektif.

Untuk membuktikan surjektivitas, ambil $(a, c) \in A \oplus C$. Karena π surjektif, pilih $b_0 \in B$ dengan $\pi(b_0) = c$, lalu tetapkan

$$b = b_0 + i(a - r(b_0)).$$

Kita memperoleh

$$r(b) = r(b_0) + a - r(b_0) = a, \quad \pi(b) = \pi(b_0) = c.$$

Maka (r, π) surjektif dan karenanya isomorfisma.

Jika $b \in \ker r$ dan $\pi(b) = 0$, argumen injektivitas tadi memberi $b = 0$. Untuk $c \in C$, pilih lagi b_0 dengan $\pi(b_0) = c$ dan bentuk

$$b = b_0 - i(r(b_0)).$$

Sekarang $r(b) = 0$ dan $\pi(b) = c$. Jadi $\pi|_{\ker r}$ bijektif dan merupakan isomorfisma modul- R .

Untuk ruang tak-kosong X kita mempunyai barisan eksak pendek

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{\text{const}} H^0(X; R) \longrightarrow \text{coker}(\text{const}) \longrightarrow 0.$$

Evaluasi ev_x adalah pembelahan kiri. Lema 27.1 memberi

$$H^0(X; R) \cong R \oplus \text{coker}(\text{const}), \quad \text{coker}(\text{const}) \cong \ker(\text{ev}_x).$$

Barisan eksak panjang pasangan $(X, \{x\})$ mengidentifikasi kernel terakhir dengan $H^0(X, x; R)$. Dengan demikian, setiap pilihan $x \in X$ memberi

$$\text{coker}(\text{const}) \cong H^0(X, x; R).$$

Catatan pinggir sumber (dialirkan ulang). Submodul konkret $H^0(X, x; R) = \ker(\text{ev}_x)$ di dalam $H^0(X; R)$ dapat berubah jika x diganti dengan titik pada komponen lintasan lain. Namun, hasil bagi kanonik $\text{coker}(\text{const})$ tidak bergantung pada pilihan titik dasar.

Kita karena itu dapat membuat definisi yang tidak memilih titik dasar:

Definisi 27.2 (kohomologi tereduksi, bentuk kanonik). Untuk setiap $k \geq 0$, tetapkan

$$\tilde{H}^k(X; R) := \text{coker} \left(H^k(\text{pt}; R) \xrightarrow{!_X} H^k(X; R) \right).$$

Karena $H^k(\text{pt}; R) = 0$ untuk $k > 0$,

$$\tilde{H}^k(X; R) \cong H^k(X; R) \quad (k > 0),$$

sedangkan untuk $X \neq \emptyset$,

$$H^0(X; R) \cong R \oplus \tilde{H}^0(X; R).$$

Kealamian pemetaan $!_X$ yang dicatat di awal menunjukkan bahwa definisi ini funktorial bagi **semua** pemetaan ruang, bukan hanya pemetaan bertitik dasar.

Contoh 27.1 (ruang terhubung lintasan). Jika X terhubung lintasan, setiap fungsi yang konstan pada komponen lintasan adalah fungsi konstan. Jadi

$$\tilde{H}^0(X; R) = 0.$$

Jika X kontraktil, invariansi homotopi juga memberi

$$\tilde{H}^k(X; R) = 0 \quad \text{untuk setiap } k \geq 0.$$

Audit sumber 27.2. Notes.tex baris 5847 menulis $\tilde{H}^0(X; R) = 0$ “untuk semua k ,” padahal ekspresi itu sudah berderajat nol. Edisi memisahkan dua klaim yang benar: keterhubungan lintasan mematikan derajat nol tereduksi, sedangkan kontraktilitas mematikan semua derajat tereduksi.

Contoh 27.2 (sfera nol). Ruang S^0 terdiri atas dua titik. Karena $H^0(S^0; R) \cong R \oplus R$ dan pemetaan konstan adalah diagonal $r \mapsto (r, r)$,

$$\tilde{H}^0(S^0; R) \cong (R \oplus R) / \Delta R \cong R.$$

Untuk $k > 0$, $H^k(S^0; R) = 0$, sehingga $\tilde{H}^k(S^0; R) = 0$.

27.2 Korantai kecil untuk suatu sampel terbuka

Sekarang kita kembali ke barisan eksak panjang. Misalkan $\mathcal{U} = \{U, V\}$ adalah sampel terbuka ruang X . Pemetaan-pemetaan inklusi memberi diagram pushout berikut.

Diagram 27.1 (data panah pushout). Diagram sumber yang posisional dialirkan ulang menjadi

$$\begin{array}{ccc} U \cap V & \xrightarrow{i_V} & V \\ \downarrow i_U & & \downarrow j_V \\ U & \xrightarrow{j_U} & X, \end{array}$$

dengan persamaan komutativitas

$$j_U \circ i_U = j_V \circ i_V.$$

Sifat universalnya ialah: untuk pemetaan $a: U \rightarrow Z$ dan $b: V \rightarrow Z$ yang memenuhi $a \circ i_U = b \circ i_V$, terdapat tepat satu $h: X \rightarrow Z$ dengan $h \circ j_U = a$ dan $h \circ j_V = b$. Jadi informasi diagram tidak bergantung pada warna, letak, atau lebar gambar.

Pada derajat korantai, definisikan pemetaan selisih restriksi

$$\begin{aligned} d: C^\bullet(U; R) \oplus C^\bullet(V; R) &\longrightarrow C^\bullet(U \cap V; R), \\ (f, g) &\longmapsto i_U^* f - i_V^* g. \end{aligned}$$

Pemetaan d adalah pemetaan kompleks korantai. Ia surjektif pada setiap derajat: untuk

$$h: \text{Top}(\Delta^n, U \cap V) \longrightarrow R,$$

perluas h menjadi fungsi f pada $\text{Top}(\Delta^n, U)$ dengan memberi nilai nol pada simpleks yang tidak mendarat di $U \cap V$. Maka $d(f, 0) = h$. Perluasan ini hanya dipakai untuk membuktikan surjektivitas **pada satu derajat**; ia tidak diklaim membentuk pemetaan kompleks.

Untuk mengidentifikasi kernel d dengan benar, definisikan subkompleks rantai

$$C_*^\mathcal{U}(X; R) := C_*(U; R) + C_*(V; R) \subseteq C_*(X; R).$$

Subkompleks ini dibangkitkan oleh simpleks singular $\sigma: \Delta^n \rightarrow X$ yang citranya termuat seluruhnya di U atau seluruhnya di V . Simpleks semacam itu disebut **kecil terhadap $\mathcal{U}$** . Kompleks korantai kecil didefinisikan sebagai

$$C_\mathcal{U}^\bullet(X; R) := \text{Hom}_R(C_*^\mathcal{U}(X; R), R).$$

Sebuah korantai pada $C_*^\mathcal{U}(X; R)$ sama dengan sepasang korantai pada U dan V yang restriksinya ke $U \cap V$ sama. Karena itu terdapat barisan eksak pendek kompleks korantai

$$0 \longrightarrow C_\mathcal{U}^\bullet(X; R) \xrightarrow{\Phi} C^\bullet(U; R) \oplus C^\bullet(V; R) \xrightarrow{d} C^\bullet(U \cap V; R) \longrightarrow 0.$$

Di sini Φ mengambil dua restriksi sebuah fungsi pada jumlah rantai $C_*(U; R) + C_*(V; R)$. Pemetaan itu injektif karena rantai kecil dibangkitkan oleh kedua subkompleks tersebut, dan citranya tepat ker d .

Audit sumber 27.3 (arah pembandingan korantai kecil). Notes.tex baris 5867–5880 menggambar $C_\mathcal{U}^\bullet(X; R)$ sebagai fungsi pada semua simpleks yang bernilai nol pada simpleks tak-kecil, lalu menyebut inklusi $C_\mathcal{U}^\bullet(X; R) \rightarrow C^\bullet(X; R)$ sebagai kuasi-isomorfisma. Pernyataan tingkat kompleks ini tidak benar pada umumnya. Sebuah simpleks tak-kecil dapat mempunyai sisi-sisi kecil, sehingga diferensial korantai yang diperluas dengan nol dapat bernilai tak-nol pada simpleks tak-kecil.

Konstruksi yang sah adalah $C_\mathcal{U}^\bullet(X; R) = \text{Hom}_R(C_*^\mathcal{U}(X; R), R)$, dan pemetaan pembandingnya berjalan lewat restriksi

$$\rho: C^\bullet(X; R) \longrightarrow C_\mathcal{U}^\bullet(X; R).$$

Perbaikan ini tidak mengubah teorema Mayer–Vietoris; justru inilah model korantai kecil yang membuktikannya.

Proposisi 27.1 (teorema rantai kecil). Untuk sampul terbuka $\mathcal{U} = \{U, V\}$, inklusi rantai

$$j: C_*^\mathcal{U}(X; R) \hookrightarrow C_*(X; R)$$

adalah ekuivalensi homotopi rantai. Oleh dualitas, restriksi

$$\rho = j^*: C^\bullet(X; R) \longrightarrow C_{\mathcal{U}}^\bullet(X; R)$$

adalah ekuivalensi homotopi korantai, dan khususnya kuasi-isomorfisma:

$$H^k(X; R) \xrightarrow{\cong} H^k(C_{\mathcal{U}}^\bullet(X; R)).$$

Sumber menunjuk Proposisi 2.21 dalam buku Hatcher sebagai argumen homologi yang sejalan. Rujukan pembandingan itu dipertahankan, tetapi bukti berikut menuliskan konstruksi korantai yang diperlukan secara mandiri.

Bukti. Misalkan S adalah operator subdivisi barisentris pada rantai singular. Ada homotopi rantai prisma T yang memenuhi

$$S - \text{id} = \partial T + T \partial.$$

Dengan menjumlahkan homotopi yang sesuai, untuk setiap $m \geq 0$ terdapat T_m dengan

$$S^m - \text{id} = \partial T_m + T_m \partial, \quad T_0 = 0.$$

Jika sebuah simpleks sudah kecil, semua simpleks yang muncul dalam S^m dan T_m atas simpleks itu tetap berada dalam anggota sampel yang sama.

Untuk simpleks singular $\sigma: \Delta^n \rightarrow X$, himpunan $\sigma^{-1}(U)$ dan $\sigma^{-1}(V)$ membentuk sampel terbuka dari simpleks kompak Δ^n . Lema bilangan Lebesgue menunjukkan bahwa setelah subdivisi barisentris secukupnya, setiap subsimpleks dipetakan seluruhnya ke U atau ke V . Jadi, untuk setiap rantai hingga c , terdapat m sehingga $S^m c$ adalah rantai kecil.

Kita sekarang membangun pemetaan rantai $r: C_*(X; R) \rightarrow C_{\mathcal{U}}^*(X; R)$ dan homotopi K secara induktif. Pada derajat nol, semua simpleks sudah kecil; tetapkan $r = \text{id}$ dan $K = 0$. Anggap r dan K telah dibangun pada derajat di bawah n dan memenuhi

$$\text{id} - jr = \partial K + K \partial.$$

Untuk satu simpleks basis σ berdimensi n , tetapkan

$$z := \sigma - K(\partial \sigma).$$

Hipotesis induksi pada $\partial \sigma$ memberi

$$\partial z = jr(\partial \sigma).$$

Pilih m cukup besar sehingga $S^m z$ kecil. Karena $r(\partial \sigma)$ sudah kecil, $T_m r(\partial \sigma)$ juga kecil. Definisikan

$$r(\sigma) := S^m z - T_m r(\partial \sigma), \quad K(\sigma) := -T_m z.$$

Dengan menggunakan $S^m - \text{id} = \partial T_m + T_m \partial$ dan $\partial r(\partial \sigma) = 0$, kita memperoleh

$$\begin{aligned} \partial r(\sigma) &= S^m r(\partial \sigma) - \partial T_m r(\partial \sigma) \\ &= r(\partial \sigma), \end{aligned}$$

jadi r adalah pemetaan rantai. Selain itu,

$$\begin{aligned} z - jr(\sigma) &= z - S^m z + T_m r(\partial\sigma) \\ &= -\partial T_m z - T_m \partial z + T_m r(\partial\sigma) \\ &= -\partial T_m z = \partial K(\sigma). \end{aligned}$$

Karena $z = \sigma - K(\partial\sigma)$, persamaan ini tepat mengatakan

$$\sigma - jr(\sigma) = \partial K(\sigma) + K(\partial\sigma).$$

Jika σ sudah kecil, kita memilih $m = 0$; secara induktif diperoleh $rj = \text{id}$ dan $Kj = 0$. Jadi r adalah invers homotopi rantai untuk j .

Terapkan $\text{Hom}_R(-, R)$. Pracomposisi memberi

$$j^* = \rho: C^\bullet(X; R) \rightarrow C_{\mathcal{U}}^\bullet(X; R), \quad r^*: C_{\mathcal{U}}^\bullet(X; R) \rightarrow C^\bullet(X; R).$$

Identitas $rj = \text{id}$ dan homotopi $jr \simeq \text{id}$ berdualisasi menjadi $j^*r^* = \text{id}$ dan $r^*j^* \simeq \text{id}$. Maka ρ adalah ekuivalensi homotopi korantai dan menginduksi isomorfisma pada kohomologi.

Gagasan geometrisnya sederhana: sebuah simpleks besar mungkin melintasi U dan V , tetapi subdivisi berulang memecahnya menjadi simpleks kecil yang masing-masing berada di salah satu anggota sampul. Pembuktian di atas mencatat homotopinya sehingga gagasan tersebut berlaku pada tingkat kompleks, bukan hanya pada tingkat gambar. Analogi sumbernya adalah integrasi pada manifold: pecah sebuah simpleks menjadi bagian-bagian yang masing-masing masuk ke satu peta koordinat, kerjakan perhitungan pada setiap bagian, lalu jumlahkan hasilnya.

27.3 Barisan eksak panjang Mayer–Vietoris

Teorema 27.1 (Mayer–Vietoris). Jika $\mathcal{U} = \{U, V\}$ adalah sampul terbuka X , terdapat barisan eksak panjang modul- R

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow H^0(X; R) &\longrightarrow H^0(U; R) \oplus H^0(V; R) \\ &\longrightarrow H^0(U \cap V; R) \xrightarrow{\partial_{\text{MV}}} H^1(X; R) \\ &\longrightarrow H^1(U; R) \oplus H^1(V; R) \longrightarrow H^1(U \cap V; R) \\ &\xrightarrow{\partial_{\text{MV}}} H^2(X; R) \longrightarrow \dots \end{aligned}$$

Pemetaan dari $H^k(X; R)$ adalah pasangan restriksi, dan pemetaan menuju $H^k(U \cap V; R)$ adalah selisih restriksi.

Jika $U \cap V \neq \emptyset$, versi tereduksi dalam konvensi derajat tak-negatif unit ini juga eksak dan dimulai dengan

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow \tilde{H}^0(X; R) &\longrightarrow \tilde{H}^0(U; R) \oplus \tilde{H}^0(V; R) \\ &\longrightarrow \tilde{H}^0(U \cap V; R) \xrightarrow{\partial_{\text{MV}}} H^1(X; R) \longrightarrow \dots \end{aligned}$$

Bukti. Barisan eksak pendek kompleks korantai yang telah dibangun adalah

$$0 \rightarrow C_{\mathcal{U}}^\bullet(X; R) \xrightarrow{\Phi} C^\bullet(U; R) \oplus C^\bullet(V; R) \xrightarrow{d} C^\bullet(U \cap V; R) \rightarrow 0.$$

Setiap barisan eksak pendek kompleks korantai menghasilkan barisan eksak panjang kohomologi. Untuk melihat pemetaan penghubungnya secara konkret, ambil kosiklus $h \in C^k(U \cap V; R)$. Surjektivitas derajat demi derajat memberi pasangan (f, g) dengan $d(f, g) = h$. Karena $\delta h = 0$,

$$d(\delta f, \delta g) = \delta d(f, g) = 0.$$

Maka ada tepat satu $a \in C_{\mathcal{U}}^{k+1}(X; R)$ dengan

$$\Phi(a) = (\delta f, \delta g).$$

Persamaan $\delta^2 = 0$ dan injektivitas Φ menunjukkan $\delta a = 0$. Definisikan

$$\partial_{\text{MV}}[h] := [a] \in H^{k+1}(C_{\mathcal{U}}^{\bullet}(X; R)) \cong H^{k+1}(X; R).$$

Jika lift (f, g) diganti, selisih kedua lift berada dalam $\text{im } \Phi$; akibatnya, kedua a berbeda dengan sebuah kobatas. Jika h diganti dengan kosiklus sekohomolog, lift dapat disesuaikan dengan sebuah diferensial dan kelas $[a]$ tetap sama. Jadi pemetaan penghubung terdefinisi dengan baik.

Eksaknya dapat diperiksa pada ketiga jenis suku yang berulang. Pertama, jika $b \in C^k(U; R) \oplus C^k(V; R)$ adalah kosiklus dan kelas $d(b)$ nol, tulis $d(b) = \delta h$. Pilih e dengan $d(e) = h$. Maka $b - \delta e \in \ker d = \text{im } \Phi$ dan tetap merupakan kosiklus, sehingga $[b]$ berasal dari $H^k(C_{\mathcal{U}}^{\bullet}(X; R))$.

Kedua, jika h sebuah kosiklus dan $\partial_{\text{MV}}[h] = 0$, pilih lift b dari h . Dalam konstruksi di atas, $\delta b = \Phi(a)$ dengan $a = \delta a_0$. Karena itu $b - \Phi(a_0)$ adalah kosiklus yang masih dipetakan oleh d ke h ; jadi $[h]$ berasal dari $H^k(U; R) \oplus H^k(V; R)$.

Ketiga, jika a sebuah kosiklus dalam $C_{\mathcal{U}}^{k+1}(X; R)$ dan $\Phi_*[a] = 0$, tulis $\Phi(a) = \delta b$. Unsur $h = d(b)$ adalah kosiklus, sebab $\delta h = d(\delta b) = d(\Phi(a)) = 0$, dan konstruksi pemetaan penghubung memberi $\partial_{\text{MV}}[h] = [a]$. Komposisi dua pemetaan berturutan jelas nol dari definisinya. Jadi pada setiap posisi citra sama dengan kernel, yang membuktikan eksaknya barisan panjang.

Menurut Proposisi 27.1, $H^*(C_{\mathcal{U}}^{\bullet}(X; R)) \cong H^*(X; R)$. Mengganti suku korantai kecil dengan kohomologi X memberi barisan biasa yang dinyatakan dalam teorema.

Untuk versi tereduksi, anggap $U \cap V \neq \emptyset$. Maka U, V , dan X juga tak-kosong, dan suku fungsi konstan sendiri membentuk barisan eksak

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{r \mapsto (r, r)} R \oplus R \xrightarrow{(a, b) \mapsto a - b} R \longrightarrow 0.$$

Mengambil hasil bagi barisan Mayer–Vietoris derajat nol oleh barisan konstan ini menghasilkan tepat barisan tereduksi yang ditampilkan. Pada derajat positif, kohomologi biasa dan tereduksi sudah sama.

Audit sumber 27.4 (versi tereduksi). Dengan definisi $\tilde{H}^0$ sebagai kokernel pemetaan konstan dan tanpa suku derajat -1 , barisan tereduksi yang dimulai dengan nol memerlukan $U \cap V \neq \emptyset$. Untuk sampul dua komponen yang saling lepas, pernyataan tanpa hipotesis itu gagal pada derajat nol. Versi sepenuhnya umum dapat dipulihkan dengan kompleks teraugmentasi dan $\tilde{H}^{-1}(\emptyset; R) = R$. Sumber tidak menyatakan pembedaan ini; edisi menyatakan hipotesis yang dipakai oleh contoh sfera berikutnya.

27.4 Kohomologi sfera

Contoh 27.3 (sampul hemisfer). Untuk $n \geq 1$, sampuli S^n dengan dua lingkungan hemisfer terbuka D_+^n dan D_-^n . Masing-masing kontraktif (dan homeomorfik dengan bola terbuka), sedangkan

$$D_+^n \cap D_-^n \cong S^{n-1} \times J \simeq S^{n-1},$$

dengan J sebuah interval terbuka kecil.

Barisan Mayer–Vietoris tereduksi dimulai sebagai

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow \tilde{H}^0(S^n; R) &\longrightarrow \tilde{H}^0(D_+^n; R) \oplus \tilde{H}^0(D_-^n; R) \\ &\longrightarrow \tilde{H}^0(S^{n-1} \times J; R) \longrightarrow H^1(S^n; R) \\ &\longrightarrow H^1(D_+^n; R) \oplus H^1(D_-^n; R) \longrightarrow \cdots \end{aligned}$$

Kedua hemisfer kontraktif, sehingga semua suku tereduksi dan semua suku berderajat positif milik D_+^n, D_-^n lenyap. Pertama,

$$0 \longrightarrow \tilde{H}^0(S^n; R) \longrightarrow 0$$

memberi $\tilde{H}^0(S^n; R) = 0$, sesuai keterhubungan lintasan S^n . Selanjutnya, untuk $k = 1$ kita memperoleh

$$0 \longrightarrow \tilde{H}^0(S^{n-1}; R) \longrightarrow H^1(S^n; R) \longrightarrow 0,$$

dan untuk $k > 1$,

$$0 \longrightarrow H^{k-1}(S^{n-1}; R) \longrightarrow H^k(S^n; R) \longrightarrow 0.$$

Kedua kasus itu dapat ditulis seragam sebagai

$$\tilde{H}^{k-1}(S^{n-1}; R) \cong \tilde{H}^k(S^n; R) \quad (k \geq 1).$$

Ambil $k = n$ dan ulangi isomorfisma tersebut sampai mencapai S^0 :

$$\tilde{H}^n(S^n; R) \cong \tilde{H}^{n-1}(S^{n-1}; R) \cong \cdots \cong \tilde{H}^0(S^0; R) \cong R.$$

Karena $n > 0$, kohomologi biasa dan tereduksi sama pada derajat n . Jadi

$$H^n(S^n; R) \cong R \quad (n \geq 1).$$

Rekurensi yang sama juga menentukan semua derajat lain. Untuk $n \geq 1$,

$$H^k(S^n; R) \cong \begin{cases} R, & k = 0 \text{ atau } k = n, \\ 0, & k > 0 \text{ dan } k \neq n. \end{cases}$$

Audit sumber 27.5. Sumber menyebut kedua anggota sampul terbuka di atas “cakram.” Edisi menulisnya sebagai lingkungan hemisfer yang homeomorfik dengan bola **terbuka**; sebuah himpunan terbuka di S^n tidak dimaksudkan sebagai cakram tertutup. Ruang irisan dan seluruh perhitungan homotopinya tetap sama.

27.5 Pemeriksaan penguasaan lanjutan

Lima pemeriksaan berikut melengkapi latihan sumber yang sudah diselesaikan sebagai Pemeriksaan 27.1. Setiap pemeriksaan mempunyai petunjuk dan solusi lengkap yang dapat dibaca secara terpisah.

Pemeriksaan Penguasaan 27.2 (rumus invers pembelahan). Misalkan

$$0 \rightarrow A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{\pi} C \rightarrow 0$$

eksak dan $r: B \rightarrow A$ memenuhi $ri = \text{id}_A$.

1. Untuk $c \in C$, pilih sembarang lift b_c dengan $\pi(b_c) = c$ dan definisikan $s(c) = b_c - i(r(b_c))$.
Buktikan bahwa $s(c)$ tidak bergantung pada pilihan lift dan merupakan homomorfisma $C \rightarrow B$.
2. Buktikan bahwa invers $(r, \pi): B \rightarrow A \oplus C$ adalah $(a, c) \mapsto i(a) + s(c)$.
3. Tunjukkan $B = i(A) \oplus \ker r$.

Petunjuk. Dua lift c berbeda dengan unsur $i(A)$. Terapkan operasi $b \mapsto b - i(r(b))$ pada selisih itu. Untuk jumlah langsung, periksa keberadaan dekomposisi dan bahwa irisannya nol.

Solusi Pemeriksaan 27.2. Jika b'_c adalah lift lain, maka $b'_c - b_c = i(a)$ untuk suatu $a \in A$. Karena $ri = \text{id}_A$,

$$\begin{aligned} b'_c - i(r(b'_c)) &= b_c + i(a) - i(r(b_c) + a) \\ &= b_c - i(r(b_c)). \end{aligned}$$

Jadi s bebas pilihan. Untuk c_1, c_2 , pilih lift b_1, b_2 ; maka $b_1 + b_2$ adalah lift $c_1 + c_2$, dan rumus langsung memberi $s(c_1 + c_2) = s(c_1) + s(c_2)$. Hal yang sama berlaku untuk perkalian skalar, jadi s homomorfisma. Selain itu,

$$r(s(c)) = r(b_c) - r(i(r(b_c))) = 0, \quad \pi(s(c)) = c.$$

Sekarang

$$(r, \pi)(i(a) + s(c)) = (a, c).$$

Sebaliknya, untuk $b \in B$, unsur $b - i(r(b))$ berada dalam $\ker r$ dan mempunyai citra $\pi(b)$, sehingga sama dengan $s(\pi(b))$. Maka

$$b = i(r(b)) + s(\pi(b)),$$

yang membuktikan rumus invers. Setiap b karena itu berada dalam $i(A) + \ker r$. Jika $i(a) \in \ker r$, maka $a = r(i(a)) = 0$, sehingga irisannya nol dan $B = i(A) \oplus \ker r$.

Pemeriksaan Penguasaan 27.3 (banyak komponen lintasan). Misalkan X mempunyai tepat $m \geq 1$ komponen lintasan dan pilih titik dasar pada komponen ke- j .

1. Hitung $H^0(X; R)$ dan $\tilde{H}^0(X; R)$.
2. Deskripsikan submodul $H^0(X, x; R) = \ker(\text{ev}_x)$.
3. Berikan isomorfisma eksplisit $(R^m)/\Delta R \cong R^{m-1}$ yang tidak menggunakan pembagian dalam R .

Petunjuk. Daftarkan nilai fungsi pada setiap komponen. Untuk hasil bagi diagonal, kurangi koordinat ke- j dari semua koordinat lainnya.

Solusi Pemeriksaan 27.3. Pemeriksaan 27.1 memberi

$$H^0(X; R) \cong R^m.$$

Pemetaan konstan adalah inklusi diagonal $\Delta: R \rightarrow R^m, r \mapsto (r, \dots, r)$, sehingga

$$\tilde{H}^0(X; R) \cong R^m / \Delta R.$$

Evaluasi pada titik dasar di komponen ke- j adalah proyeksi koordinat ke- j . Jadi

$$H^0(X, x; R) = \{(a_1, \dots, a_m) \in R^m : a_j = 0\} \cong R^{m-1}.$$

Definisikan

$$q_j(a_1, \dots, a_m) = (a_1 - a_j, \dots, a_{j-1} - a_j, a_{j+1} - a_j, \dots, a_m - a_j).$$

Kernel q_j tepat ΔR , dan q_j surjektif karena setiap daftar $m-1$ koordinat diperoleh dengan mengambil $a_j = 0$. Teorema isomorfisma pertama memberi

$$R^m / \Delta R \xrightarrow{\cong} R^{m-1}.$$

Tidak ada pembagian yang digunakan, sehingga argumen berlaku untuk setiap gelanggang koefisien R .

Pemeriksaan Penguasaan 27.4 (mengapa perluasan dengan nol gagal). Ambil $X = [0, 1]$ dengan sampel terbuka relatif

$$U = [0, 0.6), \quad V = (0.4, 1].$$

Misalkan $a \in C^0(X; R)$ bernilai 0 pada semua titik kecuali $a(1) = 1_R$. Ambil simpleks singular $\sigma(t) = t$.

1. Buktikan bahwa setiap simpleks nol kecil terhadap $\{U, V\}$, tetapi σ tidak kecil.
2. Hitung $(\delta a)(\sigma)$.
3. Jelaskan mengapa submodul bertingkat “korantai yang nol pada simpleks tak-kecil” bukan subkompleks, lalu nyatakan pemetaan pembandingan yang benar.

Petunjuk. Setiap titik terletak di setidaknya satu anggota sampel, tetapi citra σ adalah seluruh interval. Gunakan $(\delta a)(\sigma) = a(\sigma(1)) - a(\sigma(0))$.

Solusi Pemeriksaan 27.4. Sebuah simpleks nol mempunyai citra satu titik. Karena $U \cup V = X$, titik itu terletak seluruhnya di U atau di V ; jadi setiap simpleks nol kecil. Namun,

$$\text{im } \sigma = [0, 1]$$

tidak termuat di U dan tidak termuat di V , sehingga σ tak-kecil. Perhitungan diferensial memberi

$$(\delta a)(\sigma) = a(1) - a(0) = 1_R.$$

Korantai a memenuhi syarat “nol pada simpleks nol tak-kecil” secara vakum, tetapi δa tidak nol pada simpleks satu tak-kecil σ . Jadi syarat tersebut tidak stabil di bawah δ dan tidak mendefinisikan subkompleks.

Pemetaan yang benar berasal dari inklusi subkompleks **rantai** kecil:

$$C_*^{\mathcal{U}}(X; R) \hookrightarrow C_*(X; R).$$

Setelah menerapkan $\text{Hom}_R(-, R)$, arahnya berbalik menjadi restriksi

$$C^\bullet(X; R) \longrightarrow \text{Hom}_R(C_*^{\mathcal{U}}(X; R), R).$$

Pemeriksaan Penguasaan 27.5 (generator $H^1(S^1; R)$). Selimuti lingkaran S^1 dengan dua busur terbuka kontraktif U, V sedemikian sehingga $U \cap V = W_0 \sqcup W_1$ mempunyai dua komponen kontraktif.

1. Hitung $\tilde{H}^0(U \cap V; R)$.
2. Gunakan Mayer–Vietoris untuk membuktikan bahwa pemetaan penghubung ∂_{MV} memberi isomorfisma $\tilde{H}^0(U \cap V; R) \cong H^1(S^1; R)$.
3. Pilih fungsi h yang bernilai 0 pada W_0 dan 1_R pada W_1 . Jelaskan bagaimana konstruksi penghubung mengubah $[h]$ menjadi generator $H^1(S^1; R)$.

Petunjuk. Gunakan Contoh 27.2 untuk irisan yang mempunyai dua komponen. Semua kohomologi tereduksi kedua busur lenyap. Untuk bagian terakhir, perluas h sebagai korantai pada salah satu busur dan ambil diferensialnya.

Solusi Pemeriksaan 27.5. Karena $U \cap V$ mempunyai dua komponen kontraktif,

$$H^0(U \cap V; R) \cong R \oplus R, \quad \tilde{H}^0(U \cap V; R) \cong (R \oplus R)/\Delta R \cong R.$$

Kontraktilitas U dan V memberi

$$\tilde{H}^0(U; R) = \tilde{H}^0(V; R) = 0, \quad H^1(U; R) = H^1(V; R) = 0.$$

Bagian yang relevan dari barisan eksak tereduksi karena itu adalah

$$0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \tilde{H}^0(U \cap V; R) \xrightarrow{\partial_{MV}} H^1(S^1; R) \longrightarrow 0.$$

Maka ∂_{MV} adalah isomorfisma dan $H^1(S^1; R) \cong R$.

Fungsi h dengan nilai $(0, 1_R)$ pada (W_0, W_1) mewakili generator hasil bagi $(R \oplus R)/\Delta R$. Pilih korantai nol f pada U yang restriksinya ke irisan sama dengan h —sebagai fungsi pada titik, kita dapat memperluas nilai-nilainya secara sembarang—dan ambil pasangan $(f, 0)$. Selisih restriksinya ialah h . Karena h sebuah kosiklus nol, $(\delta f, 0)$ terletak di kernel selisih restriksi dan karena itu menentukan korantai kecil satu pada S^1 . Kelasnya ialah $\partial_{MV}[h]$. Isomorfisma di atas menunjukkan bahwa kelas ini adalah generator $H^1(S^1; R)$ yang bersesuaian dengan 1_R .

Pemeriksaan Penguasaan 27.6 (seluruh kohomologi sfera). Gunakan rekurensi

$$\tilde{H}^{k-1}(S^{n-1}; R) \cong \tilde{H}^k(S^n; R)$$

untuk membuktikan, bagi $n \geq 1$, bahwa

$$\tilde{H}^k(S^n; R) \cong \begin{cases} R, & k = n, \\ 0, & k \neq n, \end{cases}$$

untuk semua $k \geq 0$. Deduksikan kohomologi biasa dan buktikan bahwa tidak ada S^n dengan $n \geq 1$ yang kontraktif.

Petunjuk. Untuk $k = n$, turunkan kedua indeks sampai $(0, 0)$. Jika $0 < k < n$, proses berakhir pada derajat nol dari sfera berdimensi positif. Jika $k > n$, proses berakhir pada derajat positif dari S^0 . Bandingkan hasilnya dengan kohomologi tereduksi sebuah titik.

Solusi Pemeriksaan 27.6. Untuk $k = n$, iterasi rekurensi memberi

$$\tilde{H}^n(S^n; R) \cong \tilde{H}^{n-1}(S^{n-1}; R) \cong \dots \cong \tilde{H}^0(S^0; R) \cong R.$$

Jika $0 < k < n$, setelah k langkah kita sampai pada

$$\tilde{H}^k(S^n; R) \cong \tilde{H}^0(S^{n-k}; R).$$

Karena $n - k \geq 1$, sfera S^{n-k} terhubung lintasan, sehingga ruas kanan nol. Jika $k > n$, setelah n langkah kita memperoleh

$$\tilde{H}^k(S^n; R) \cong \tilde{H}^{k-n}(S^0; R) = 0,$$

karena $k - n > 0$. Akhirnya, $\tilde{H}^0(S^n; R) = 0$ untuk $n \geq 1$ oleh keterhubungan lintasan. Jadi hanya derajat n yang tak-nol dalam kohomologi tereduksi.

Pada derajat positif, kohomologi biasa sama dengan kohomologi tereduksi, sedangkan keterhubungan lintasan memberi $H^0(S^n; R) \cong R$. Maka

$$H^k(S^n; R) \cong \begin{cases} R, & k = 0 \text{ atau } k = n, \\ 0, & k > 0 \text{ dan } k \neq n. \end{cases}$$

Jika S^n kontraktil, invariansi homotopi akan memberi $\tilde{H}^k(S^n; R) = 0$ untuk semua k . Namun $\tilde{H}^n(S^n; R) \cong R$, yang tak-nol untuk gelanggang koefisien tak-nol. Ini kontradiksi. Jadi S^n tidak kontraktil untuk setiap $n \geq 1$.

Batas ke Unit 28. Unit 27 menerjemahkan Notes.tex baris 5824–5923 secara kontigu dan menutup seluruh objek sumber pada rentang itu. Baris 5924 berbunyi `From\lecturenum{28} the calculation of the connected components and the fundamental group ...`, memulai Kuliah 28, dan tidak dimasukkan. Kursor sumber berikutnya yang tepat adalah **Notes.tex baris 5924**.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts, © 2019 David Michael Roberts, tepatnya [Notes.tex baris 5924–6052](#) pada [commit b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#) dari repositori [DavidMichaelRoberts/AlgebraicTopology2019](#). Rentang aktif terdiri atas 129 baris fisik. Dengan normalisasi LF dan satu terminator LF penutup dipertahankan, ukurannya 8.257 byte dan SHA-256-nya adalah `f3e4a526fa2e504a449a606150c399520c255a98a91d60c934737f87497b4b51`. Baris 6053, yang memulai Kuliah 29, tidak termasuk. Materi sumber dan adaptasi Indonesia ini tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#).

Baris pertama unit ini melanjutkan contoh kohomologi sfera dari Unit 27. Selanjutnya rentang sumber memuat satu definisi, tiga proposisi, dua teorema, satu korolari, satu contoh baru, satu catatan, tiga lingkungan bukti, dan lima catatan pinggir. Tidak ada latihan atau pertanyaan formal sumber, diagram, gambar eksternal, ataupun berkas yang diimpor.

Edisi mempertahankan semua isi itu, memindahkan catatan pinggir ke urutan bacaan, dan menerapkan empat perbaikan matematika penting. Gelanggang koefisien tak-nol dinyatakan dalam bukti invariansi

dimensi; arah kontravarian peta hasil bagi pada kohomologi relatif dibetulkan; *join* yang salah diganti dengan *baji*; dan teorema *baji* tak berhingga diberi hipotesis titik dasar baik yang diperlukan. Pada akhir unit, peta pembanding dari korantai singular ke korantai simpleksial ditulis sebagai restriksi dalam arah yang benar, bukan sebagai inklusi ke arah sebaliknya. Bukti teorema hasil bagi yang hanya dirujuk oleh sumber juga dilengkapi.

Enam pemeriksaan penguasaan, enam petunjuk, penutupan bukti edisi, dan enam solusi lengkap merupakan materi asli edisi dan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen; edisi ini tidak disponsori, didukung, disahkan, ataupun diberi status resmi oleh David Michael Roberts atau institusinya. Produksi edisi ini dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**. Pernyataan ini menambah transparansi proses tanpa mengurangi kredit penulis sumber ataupun kredit kontributor manusia.

28 Kuliah 28

28.1 Menyelesaikan perhitungan kohomologi sfera

Perhitungan komponen lintasan dan grup fundamental sudah menunjukkan bahwa S^0 dan S^1 tidak kontraktif. Namun, S^n terhubung sederhana untuk $n \geq 2$, sehingga Π_1 saja tidak dapat mendeteksi ketakkontraktilannya. Perhitungan H^n pada Unit 27 membuktikan bahwa **setiap** S^n tidak kontraktif.

Rumus kohomologi di bawah berlaku untuk setiap gelanggang koefisien R . Setiap kali kohomologi dipakai untuk membedakan dua ruang, kita memilih $R \neq 0$, misalnya $R = \mathbb{Z}$.

Pembanding homotopi lebih tinggi. Kita telah melihat pernyataan $\pi_n(S^n) \cong \mathbb{Z}$, tetapi belum menghitungnya sendiri. Kohomologi memberi deteksi ketakkontraktilan yang dapat diselesaikan dengan perangkat yang sudah dibangun dalam kuliah ini.

Ingat isomorfisma reduksi Mayer–Vietoris dari Unit 27:

$$\tilde{H}^{k-1}(S^{n-1}; R) \cong \tilde{H}^k(S^n; R).$$

Ada dua rentang derajat yang masih perlu diperiksa.

1. Ambil $k = n + \ell$ dengan $\ell \geq 1$ dan iterasikan reduksi. Diperoleh

$$\tilde{H}^{n+\ell}(S^n; R) \cong \tilde{H}^\ell(S^0; R) = 0.$$

Jadi $H^m(S^n; R) = 0$ untuk semua $m > n$.

Dalam dunia kombinatorial himpunan- Δ , sfera $S^n \cong |\partial\Delta[n+1]|$ tidak mempunyai simpleks berdimensi $m > n$, sehingga lenyapnya derajat tinggi tampak langsung. Untuk kohomologi singular, himpunan $\text{Top}(\Delta^m, S^n)$ justru tak terhitung; lenyapnya kohomologi merupakan hasil teorema, bukan ketiadaan simpleks singular.

Secara khusus, dengan $R \neq 0$, hasil ini menunjukkan bahwa S^n tidak ekuivalen homotopi dengan S^m jika $m > n$.

2. Andaikan $n > 1$ dan $0 \leq k \leq n - 2$. Dengan mengiterasikan reduksi ke bawah,

$$\tilde{H}^{k+1}(S^n; R) \cong \tilde{H}^1(S^{n-k}; R).$$

Karena $n - k > 1$, cukup hitung $\tilde{H}^1(S^q; R)$ untuk $q > 1$. Bagian awal barisan eksak panjang Mayer–Vietoris memberi

$$0 = \tilde{H}^0(S^{q-1}; R) \longrightarrow \tilde{H}^1(S^q; R) \longrightarrow \tilde{H}^1(D_+^q; R) \oplus \tilde{H}^1(D_-^q; R) = 0.$$

Maka $\tilde{H}^1(S^q; R) = 0$.

Proposisi 28.1 (kohomologi tereduksi sfera). Untuk setiap $n \geq 0$,

$$\tilde{H}^k(S^n; R) = \begin{cases} R, & k = n, \\ 0, & k \neq n. \end{cases}$$

28.2 Invariansi dimensi ruang Euklides

Isomorfisma linear antara ruang vektor real berdimensi hingga otomatis merupakan isomorfisma ruang vektor topologis: pemetaan dan inversnya sama-sama linear dan kontinu. Karena dua ruang vektor berdimensi hingga isomorfik tepat ketika dimensinya sama, terdapat homeomorfisma **linear** $\mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^m$ tepat ketika $n = m$.

Untuk $n, m > 0$, kedua himpunan mempunyai kardinalitas yang sama,

$$|\mathbb{R}^n| = |\mathbb{R}^m| = 2^{\aleph_0},$$

sehingga kardinalitas tidak menyingkirkan kemungkinan adanya homeomorfisma **taklinear** ketika $n \neq m$.

Pemetaan kontinu $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ dapat sangat liar; kurva pengisi ruang adalah salah satu contoh. Karena itu, persoalan ini sungguh topologis, bukan sekadar linear.

Proposisi 28.2 (invariansi dimensi). Untuk $n, m \geq 0$, $\mathbb{R}^n$ homeomorfik dengan $\mathbb{R}^m$ jika dan hanya jika $n = m$.

Bukti. Arah balik jelas. Untuk arah maju, kasus $n = 0$ atau $m = 0$ ditangani oleh fakta bahwa $\mathbb{R}^0$ mempunyai satu titik sedangkan $\mathbb{R}^r$ mempunyai lebih dari satu titik jika $r > 0$. Jadi andaikan $n, m > 0$.

Pilih gelanggang koefisien taknol R , misalnya $R = \mathbb{Z}$. Jika $\phi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ sebuah homeomorfisma, komposisikan dengan translasi sebesar $-\phi(0)$ agar $\phi(0) = 0$. Restriksi kemudian memberi homeomorfisma

$$\mathbb{R}^n \setminus \{0\} \cong \mathbb{R}^m \setminus \{0\}.$$

Kedua ruang itu masing-masing berekuivalensi homotopi dengan S^{n-1} dan S^{m-1} . Oleh invariansi homotopi dan kontravariansi,

$$R \cong \tilde{H}^{n-1}(S^{n-1}; R) \cong \tilde{H}^{n-1}(S^{m-1}; R).$$

Menurut Proposisi 28.1, ruas terakhir taknol tepat ketika $n - 1 = m - 1$. Jadi $n = m$. $\square$

Audit sumber 28.1. Bukti sumber memakai R untuk mendeteksi satu grup taknol, tetapi tidak mengecualikan gelanggang nol. Edisi memilih koefisien taknol dan menutup kasus dimensi nol yang tidak dicakup argumen ruang tertusuk.

28.3 Eksisi dan kohomologi hasil bagi

Sifat berikut sulit dibuktikan langsung dan memerlukan masukan topologis yang tidak sepele.

Teorema 28.1 (eksisi). Misalkan (X, A) pasangan ruang dan $Z \subseteq A$ subruang dengan

$$\bar{Z} \subseteq \text{int}(A).$$

Inklusi pasangan

$$j: (X \setminus Z, A \setminus Z) \hookrightarrow (X, A)$$

menginduksi isomorfisma

$$j^*: H^k(X, A; R) \xrightarrow{\cong} H^k(X \setminus Z, A \setminus Z; R)$$

untuk setiap k .

Hipotesis penutupan dan interior menjamin bahwa Z berada cukup jauh di dalam A untuk dapat dibuang tanpa mengubah kohomologi relatif. Hipotesis tersebut otomatis terpenuhi jika A terbuka dan Z tertutup dalam X .

Jika kohomologi relatif (X, A) dipikirkan sebagai kohomologi ruang hasil bagi X/A , teorema ini mencerminkan identifikasi hasil bagi

$$(X \setminus Z)/(A \setminus Z) \cong X/A$$

di bawah hipotesis yang sesuai. Untuk pasangan bertitik, kita memakai konvensi $X/\emptyset = X_+ := X \sqcup \{*\}$.

Teorema 28.2 (kohomologi relatif sebagai kohomologi hasil bagi). Misalkan $A \subseteq X$ takkosong dan tertutup. Andaikan terdapat lingkungan terbuka $U \supseteq A$ sedemikian sehingga A merupakan retrak deformasi dari U . Pemetaan hasil bagi pasangan

$$q: (X, A) \longrightarrow (X/A, *)$$

menginduksi isomorfisma dalam arah kontravarian

$$q^*: H^k(X/A, *; R) \xrightarrow{\cong} H^k(X, A; R).$$

Dengan $H^k(X/A, *; R) = \tilde{H}^k(X/A; R)$, inversnya dapat ditulis

$$H^k(X, A; R) \xrightarrow{\cong} \tilde{H}^k(X/A; R).$$

Bukti edisi. Karena $A \hookrightarrow U$ merupakan ekuivalensi homotopi, $H^k(U, A; R) = 0$ untuk setiap k . Barisan eksak panjang bagi rangkaian $A \subseteq U \subseteq X$ lalu memberi isomorfisma

$$H^k(X, U; R) \xrightarrow{\cong} H^k(X, A; R).$$

Di ruang hasil bagi, $q(U) = U/A$ adalah lingkungan terbuka titik $*$ dan kontraktil: retraksi deformasi $U \rightarrow A$ turun menjadi kontraksi $U/A \rightarrow *$. Terapkan eksisi pada pasangan (X, U) dengan membuang A , dan pada pasangan $(X/A, U/A)$ dengan membuang $*$. Pemetaan q membatasi menjadi homeomorfisma pasangan

$$(X \setminus A, U \setminus A) \cong ((X/A) \setminus \{*\}, (U/A) \setminus \{*\}).$$

Karena itu,

$$H^k(X, U; R) \cong H^k(X/A, U/A; R).$$

Terakhir, U/A takkosong dan kontraktil. Barisan eksak panjang tereduksi bagi pasangan $(X/A, U/A)$ memberi

$$H^k(X/A, U/A; R) \cong \tilde{H}^k(X/A; R).$$

Komposisi ketiga isomorfisma ini adalah invers dari q^* ; naturalitas menetapkan arah peta terinduksi seperti pada pernyataan. $\square$

Audit sumber 28.2. Sumber menuliskan panah hasil bagi yang “diinduksi” dari $H^k(X, A; R)$ ke $H^k(X/A, *; R)$. Karena kohomologi kontravarian, arah terinduksi yang benar ialah arah q^* di atas. Panah sumber tetap sah hanya setelah dipahami sebagai invers isomorfisma. Rujukan tunggal ke Hatcher juga diganti dengan bukti lengkap agar unit dapat dipelajari mandiri. Catatan pinggir sumber menulis $X \setminus \emptyset := X \sqcup \{*\}$; konteksnya memerlukan hasil bagi, sehingga edisi memperbaikinya menjadi $X/\emptyset = X_+$.

Korolari 28.1. Untuk pasangan (X, A) seperti pada Teorema 28.2, terdapat barisan eksak panjang

$$0 \longrightarrow \tilde{H}^0(X/A; R) \longrightarrow H^0(X; R) \longrightarrow H^0(A; R) \longrightarrow H^1(X/A; R) \longrightarrow \cdots.$$

Bukti. Substitusikan isomorfisma Teorema 28.2 ke barisan eksak panjang pasangan (X, A) . $\square$

Pasangan himpunan- Δ $(X_\bullet, A_\bullet)$ memberi pasangan ruang $(|X_\bullet|, |A_\bullet|)$. Realisasi geometriknya merupakan pasangan CW, sehingga tersedia lingkungan yang diretrak-deformasikan ke $|A_\bullet|$. Sumber menunjuk Proposition A.4 dalam buku Hatcher untuk langkah lingkungan ini. Jadi Teorema 28.2 berlaku pada situasi tersebut.

28.4 Hasil bagi kerangka dan baji sfera

Misalkan $X_\bullet$ sebuah himpunan- Δ berdimensi n . Inklusi $\text{sk}_{n-1} X_\bullet \subseteq X_\bullet$ menghasilkan homeomorfisma berurutan

$$\begin{aligned} |X_\bullet|/|\text{sk}_{n-1} X_\bullet| &\cong \left(\bigsqcup_{x \in X_n} \Delta^n \right) / \left(\bigsqcup_{x \in X_n} \partial \Delta^n \right) \\ &\cong \left(\bigsqcup_{x \in X_n} (\Delta^n / \partial \Delta^n) \right) / \left(\bigsqcup_{x \in X_n} * \right) \\ &\cong \left(\bigsqcup_{x \in X_n} S^n \right) / \text{disc}(X_n) \\ &=: \bigvee_{x \in X_n} S^n. \end{aligned}$$

Objek terakhir adalah **baji**, bukan *join*, dari satu salinan S^n untuk setiap simpleks- n dalam X_n .

Definisi 28.1 (baji keluarga ruang bertitik). Untuk himpunan indeks takkosong J dan keluarga ruang bertitik $\{(X_\alpha, x_\alpha)\}_{\alpha \in J}$, **baji**

$$\bigvee_{\alpha \in J} X_\alpha$$

adalah ruang hasil bagi

$$\left(\bigsqcup_{\alpha \in J} X_\alpha \right) / \text{disc}(J),$$

tempat pemetaan $J \rightarrow \bigsqcup_{\alpha \in J} X_\alpha$ mengirim $\alpha \mapsto x_\alpha$, dan seluruh citranya diidentifikasi menjadi satu titik. Citra bersama itu adalah titik dasar kanonik baji.

Audit sumber 28.3. Notes.tex baris 6004 dan 6013 menyebut konstruksi $\vee$ sebagai *join*. Simbol dan definisinya menyatakan baji (*wedge sum*); *join* adalah konstruksi topologis lain. Edisi menerapkan koreksi yang sama seperti pada Unit 10 dan Unit 13.

Barisan eksak panjang pasangan kerangka mengandung bagian

$$\cdots \longrightarrow H^{k-1}(|\text{sk}_{n-1} X_\bullet|; R) \longrightarrow H^k(|X_\bullet|, |\text{sk}_{n-1} X_\bullet|; R) \longrightarrow H^k(|X_\bullet|; R) \longrightarrow H^k(|\text{sk}_{n-1} X_\bullet|; R) \longrightarrow \cdots$$

Teorema 28.2 memberi

$$H^k(|X_\bullet|, |\text{sk}_{n-1} X_\bullet|; R) \cong \tilde{H}^k\left(\bigvee_{x \in X_n} S^n; R\right).$$

Jadi kohomologi realisasi dibangun dari kohomologi kerangka berdimensi lebih kecil dan sebuah suku baji yang dapat dihitung.

Proposisi 28.3 (kohomologi baji). Misalkan J takkosong, $\{(X_\alpha, x_\alpha)\}_{\alpha \in J}$ keluarga ruang bertitik, dan setiap $\{x_\alpha\}$ tertutup dalam X_α serta merupakan retrak deformasi suatu lingkungan terbuka dalam X_α . Inklusi faktor menginduksi isomorfisma

$$\tilde{H}^k\left(\bigvee_{\alpha \in J} X_\alpha; R\right) \xrightarrow{\cong} \prod_{\alpha \in J} \tilde{H}^k(X_\alpha; R)$$

untuk setiap k .

Penjelasan bukti edisi. Letakkan $Y = \bigsqcup_\alpha X_\alpha$ dan $A = \bigsqcup_\alpha \{x_\alpha\}$. Hipotesis menjamin bahwa A tertutup dalam Y dan merupakan retrak deformasi dari lingkungan terbuka $\bigsqcup_\alpha U_\alpha$. Karena $Y/A = \bigvee_\alpha X_\alpha$, Teorema 28.2 memberi

$$\tilde{H}^k\left(\bigvee_\alpha X_\alpha; R\right) \cong H^k(Y, A; R).$$

Kompleks rantai relatif pada gabungan saling lepas terurai sebagai jumlah langsung kompleks rantai relatif tiap faktor. Setelah menerapkan $\text{Hom}(-, R)$, kompleks korantainya berupa hasil kali:

$$C^k\left(\bigsqcup_\alpha X_\alpha, \bigsqcup_\alpha \{x_\alpha\}; R\right) \cong \prod_\alpha C^k(X_\alpha, \{x_\alpha\}; R).$$

Siklus dan kobatas dihitung per koordinat, sehingga mengambil kohomologi memberi hasil kali kohomologi relatif. Identifikasi $H^k(X_\alpha, \{x_\alpha\}; R) = \tilde{H}^k(X_\alpha; R)$ menyelesaikan argumen. $\square$

Audit sumber 28.4. Pernyataan sumber memakai keluarga ruang bertitik sembarang. Edisi mensyaratkan himpunan indeks takkosong serta titik dasar yang tertutup dan diretrak-deformasikan dari lingkungan terbuka; inilah hipotesis yang diperlukan oleh penerapan Teorema 28.2 dalam bukti di atas. Hipotesis tersebut otomatis berlaku pada aplikasi sekarang: setiap S^n adalah kompleks CW dan titik dasarnya dapat dipilih sebagai sel-0.

Contoh 28.1 (baji sfera). Untuk himpunan takkosong J ,

$$\tilde{H}^k\left(\bigvee_{\alpha \in J} S^n; R\right) = \begin{cases} \prod_{\alpha \in J} R \cong R^J, & k = n, \\ 0, & k \neq n. \end{cases}$$

28.5 Peta pembanding singular–simpleksial

Untuk setiap himpunan- Δ $X_\bullet$, realisasi $|X_\bullet|$ mempunyai pemetaan istimewa

$$\chi_x: \Delta^n \longrightarrow |X_\bullet| \quad (x \in X_n).$$

Dengan kata lain, ada inklusi himpunan

$$\iota_n: X_n \hookrightarrow \text{Top}(\Delta^n, |X_\bullet|), \quad x \longmapsto \chi_x.$$

Karena korantai adalah fungsi pada himpunan simpleks dan karena konstruksi $R^{(-)}$ kontravarian, inklusi ini menghasilkan **restriksi**

$$\rho_n := \iota_n^*: C_{\text{sing}}^n(|X_\bullet|; R) \longrightarrow C_{\Delta}^n(X_\bullet; R), \quad (\rho_n \varphi)(x) = \varphi(\chi_x).$$

Pemetaan-pemetaan ρ_n membentuk pemetaan kompleks korantai. Memang, karena sisi pemetaan karakteristik adalah pemetaan karakteristik sisi, $\chi_x \circ \partial_i = \chi_{d_i x}$, maka

$$\begin{aligned} (\rho_{n+1} \delta_{\text{sing}} \varphi)(x) &= (\delta_{\text{sing}} \varphi)(\chi_x) \\ &= \sum_{i=0}^{n+1} (-1)^i \varphi(\chi_x \circ \partial_i) \\ &= \sum_{i=0}^{n+1} (-1)^i \varphi(\chi_{d_i x}) \\ &= (\delta_{\Delta} \rho_n \varphi)(x). \end{aligned}$$

Jadi terdapat peta kanonik

$$\rho: C_{\text{sing}}^\bullet(|X_\bullet|; R) \longrightarrow C_{\Delta}^\bullet(X_\bullet; R).$$

Unit 29 akan membuktikan bahwa peta ini menginduksi isomorfisma kohomologi.

Audit sumber 28.5. Sumber membalik arah peta ini. Inklusi simpleks istimewa ke semua simpleks singular menghasilkan prakomposisi dari fungsi pada **semua** simpleks ke fungsi pada simpleks istimewa. Tidak ada inklusi kanonik korantai simpleksial ke korantai singular. Seluruh diagram pembanding berikutnya harus memakai arah restriksi ρ di atas.

28.6 Pemeriksaan penguasaan

Pemeriksaan Penguasaan 28.1 (seluruh kohomologi sfera). Ambil $R \neq 0$.

1. Hitung $H^k(S^n; R)$ untuk semua k dan $n \geq 1$.
2. Jelaskan perbedaan derajat nol antara kohomologi biasa dan tereduksi.
3. Buktikan bahwa S^n dan S^m tidak ekuivalen homotopi jika $n \neq m$.

Petunjuk. Gunakan Proposisi 28.1 dan fakta bahwa S^n terhubung lintasan untuk $n \geq 1$. Ekuivalensi homotopi harus melestarikan setiap derajat kohomologi.

Solusi Pemeriksaan 28.1. Untuk $n \geq 1$, sfera terhubung lintasan, sehingga $H^0(S^n; R) \cong R$ dan $\tilde{H}^0(S^n; R) = 0$. Proposisi 28.1 memberi

$$H^k(S^n; R) = \begin{cases} R, & k = 0 \text{ atau } k = n, \\ 0, & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Kohomologi tereduksi membuang salinan konstanta R pada derajat nol, tetapi bersepakat dengan kohomologi biasa pada derajat positif. Jika, misalnya, $m > n$, maka

$$H^m(S^m; R) \cong R \neq 0, \quad H^m(S^n; R) = 0.$$

Kedua functor kohomologi tidak mungkin diisomorfiskan oleh ekuivalensi homotopi. Jadi $S^n \not\cong S^m$ untuk $n \neq m$.

Pemeriksaan Penguasaan 28.2 (mengapa koefisien harus tak nol).

1. Ulangi bukti Proposisi 28.2 dengan $R = \mathbb{Z}$.
2. Tunjukkan tepat di mana bukti gagal jika R adalah gelanggang nol.
3. Mengapa kasus $n = 0 < m$ tidak memerlukan kohomologi?

Petunjuk. Bandingkan kohomologi tereduksi derajat $n - 1$ dari dua sfera. Ruang $\mathbb{R}^0$ adalah singleton.

Solusi Pemeriksaan 28.2. Jika $n, m > 0$ dan ruang Euklides homeomorfik, ruang tertusuknya homeomorfik dan karenanya

$$\tilde{H}^{n-1}(S^{n-1}; \mathbb{Z}) \cong \tilde{H}^{m-1}(S^{m-1}; \mathbb{Z}).$$

Ruas kiri adalah $\mathbb{Z}$. Ruas kanan adalah $\mathbb{Z}$ jika $m - 1 = n - 1$ dan nol jika tidak. Maka $m = n$. Dengan gelanggang nol, kedua ruas selalu nol dan tidak membedakan dimensi apa pun; langkah “ruas kanan tak nol” gagal. Jika $n = 0 < m$, $\mathbb{R}^0$ mempunyai satu titik sedangkan $\mathbb{R}^m$ mempunyai tak berhingga banyak titik, sehingga bahkan tidak ada bijeksi, apalagi homeomorfisma.

Pemeriksaan Penguasaan 28.3 (arah eksisi). Misalkan $Z \subseteq A \subseteq X$ memenuhi hipotesis eksisi dan $j : (X \setminus Z, A \setminus Z) \hookrightarrow (X, A)$.

1. Tentukan arah j^* pada kohomologi relatif.
2. Jelaskan mengapa arah yang sama tidak boleh ditebak dari arah panah pada homologi.
3. Jika $Z = \emptyset$, identifikasi j^* .

Petunjuk. Kohomologi membalik arah pemetaan ruang. Untuk $Z = \emptyset$, j adalah identitas pasangan.

Solusi Pemeriksaan 28.3. Kontravariansi memberi

$$j^* : H^k(X, A; R) \longrightarrow H^k(X \setminus Z, A \setminus Z; R).$$

Teorema eksisi menyatakan bahwa panah ini isomorfisma. Homologi bersifat kovarian, sehingga inklusi yang sama menghasilkan panah relatif dalam arah yang sama dengan j ; menyalin arah itu ke kohomologi akan salah. Jika $Z = \emptyset$, domain pasangan sumber sama dengan (X, A) dan j adalah identitas. Maka j^* juga identitas.

Pemeriksaan Penguasaan 28.4 (merekonstruksi teorema hasil bagi). Dalam hipotesis Teorema 28.2, susun empat langkah berikut dalam urutan logis dan jelaskan isomorfisma pada setiap langkah:

- kontraktibilitas U/A ;
- barisan eksak rangkaian $A \subseteq U \subseteq X$;
- eksisi A dan $*$;
- barisan eksak tereduksi pasangan $(X/A, U/A)$.

Petunjuk. Mulailah dengan $H^k(X, A; R)$, pindah ke pasangan (X, U) , bandingkan komplemen melalui q , lalu akhiri pada kohomologi tereduksi.

Solusi Pemeriksaan 28.4. Karena $H^*(U, A; R) = 0$, barisan eksak rangkaian memberi

$$H^k(X, A; R) \cong H^k(X, U; R).$$

Eksisi membuang A dari (X, U) dan $*$ dari $(X/A, U/A)$. Pemetaan hasil bagi mengidentifikasi kedua pasangan komplemen, sehingga

$$H^k(X, U; R) \cong H^k(X/A, U/A; R).$$

Retraksi deformasi $U \rightarrow A$ turun menjadi kontraksi $U/A \rightarrow *$. Karena itu, barisan eksak tereduksi pasangan terakhir memberi

$$H^k(X/A, U/A; R) \cong \tilde{H}^k(X/A; R).$$

Komposisinya adalah isomorfisma yang dinyatakan Teorema 28.2; peta kanonik yang diinduksi oleh q berjalan dalam arah sebaliknya dan merupakan inversnya.

Pemeriksaan Penguasaan 28.5 (sel baru dan baji sfera). Misalkan $X_\bullet$ berdimensi n dan mempunyai tepat $r < \infty$ simpleks- n .

1. Identifikasi $|X_\bullet|/|\text{sk}_{n-1} X_\bullet|$.
2. Hitung kohomologi tereduksinya.
3. Tentukan satu-satunya derajat tempat suku relatif $H^k(|X_\bullet|, |\text{sk}_{n-1} X_\bullet|; R)$ dapat taknol.

Petunjuk. Setiap simpleks- n menjadi satu sfera setelah seluruh batasnya diruntuhkan. Gunakan Proposisi 28.3.

Solusi Pemeriksaan 28.5. Meruntuhkan kerangka mengidentifikasi batas setiap simpleks- n menjadi titik dasar bersama. Jadi

$$|X_\bullet|/|\text{sk}_{n-1} X_\bullet| \cong \bigvee_{j=1}^r S^n.$$

Karena baji berhingga, hasil kali r salinan R sama dengan jumlah langsung berhingga, sehingga

$$\tilde{H}^k\left(\bigvee_{j=1}^r S^n; R\right) = \begin{cases} R^r, & k = n, \\ 0, & k \neq n. \end{cases}$$

Teorema 28.2 mengidentifikasi ini dengan kohomologi relatif pasangan kerangka. Jadi suku relatif hanya mungkin taknol pada derajat n .

Pemeriksaan Penguasaan 28.6 (arah peta pembanding). Untuk $x \in X_n$ dan $\varphi \in C_{\text{sing}}^n(|X_\bullet|; R)$:

1. Tuliskan $(\rho_n \varphi)(x)$.
2. Buktikan $\rho_{n+1} \delta_{\text{sing}} = \delta_\Delta \rho_n$.
3. Jelaskan mengapa inklusi himpunan simpleks tidak menghasilkan peta korantai kanonik dalam arah simpleksial-ke-singular.

Petunjuk. Prekomposisikan fungsi dengan $\iota_n : X_n \hookrightarrow \text{Top}(\Delta^n, |X_\bullet|)$ dan gunakan $\chi_x \circ \partial_i = \chi_{d_i x}$.

Solusi Pemeriksaan 28.6. Definisi memberi

$$(\rho_n \varphi)(x) = \varphi(\chi_x).$$

Karena sisi simpleks karakteristik sesuai dengan pemetaan muka,

$$\begin{aligned} (\rho_{n+1} \delta_{\text{sing}} \varphi)(x) &= \sum_i (-1)^i \varphi(\chi_x \circ \partial_i) \\ &= \sum_i (-1)^i \varphi(\chi_{d_i x}) \\ &= (\delta_\Delta \rho_n \varphi)(x). \end{aligned}$$

Jadi ρ adalah pemetaan kompleks korantai. Secara set-teoretis, ι_n memasukkan simpleks istimewa ke himpunan semua simpleks singular. Fungsi bernilai R berubah secara kontravarian: fungsi pada himpunan besar dapat direstriksi ke himpunan kecil. Sebaliknya, tidak ada cara kanonik untuk memperluas fungsi pada simpleks istimewa ke semua simpleks singular; ekstensi sembarang juga tidak otomatis berkomutasi dengan diferensial. Karena itu arah kanonik hanyalah singular-ke-simpleksial.

Batas ke Unit 29. Unit 28 menerjemahkan Notes.tex baris 5924–6052 secara kontigu dan menutup seluruh objek sumber pada rentang itu. Baris 6053 adalah `\lecturenum{29}` dan tidak dimasukkan. Kursor sumber berikutnya yang tepat adalah **Notes.tex baris 6053**. Unit 29 harus mempertahankan arah restriksi $C_{\text{sing}}^\bullet(|X_\bullet|; R) \rightarrow C_\Delta^\bullet(X_\bullet; R)$ pada semua diagram naturalitas dan perbandingan.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts, © 2019 David Michael Roberts, tepatnya [Notes.tex baris 6053–6270](#) pada [commit b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#) dari repositori [DavidMichaelRoberts/AlgebraicTopology2019](#). Rentang aktif terdiri atas 218 baris fisik. Dengan normalisasi LF dan satu terminator LF penutup dipertahankan, ukurannya 11.447 byte dan SHA-256-nya adalah 33c6b7bfe3216d271c6b1f9d0cb952e6ef02a5e27a57f686936e764bfc4a9233. Baris 6271, yang memuat penanda Kuliah 30, tidak termasuk. Materi sumber dan adaptasi Indonesia ini tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#).

Rentang sumber memuat dua definisi, satu lema, satu fakta, dua teorema, satu korolari, tiga contoh, dua catatan, dua lingkungan bukti, empat catatan pinggir, empat diagram Xy-pic, dan satu gambar TikZ. Tidak ada latihan atau pertanyaan formal sumber, gambar eksternal, sitasi, ataupun berkas yang diimpor.

Perbaikan utama unit ini mengikuti Audit 28.5: semua peta pembanding ditulis dalam arah kanonik dari korantai singular ke korantai simpleksial. Diagram barisan eksak, fakta relatif, teorema perbandingan, dan korolarinya disusun ulang secara seragam. Induksi Lema Lima dilengkapi; definisi kompleks CW dimulai dengan pelekatan sel-1 pada indeks nol; gambar pelekatan disajikan ulang sebagai data semantik; dan aksioma eksisi dibatasi pada objek yang benar-benar berada dalam domain fungturnya. Contoh manifold juga dirumuskan tanpa menyamakan tipe homotopi CW dengan triangulabilitas literal.

Enam pemeriksaan penguasaan, enam petunjuk, penutupan bukti edisi, dan enam solusi lengkap merupakan materi asli edisi dan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen; edisi ini tidak disponsori, didukung, disahkan, ataupun diberi status resmi oleh David Michael Roberts atau institusinya. Produksi edisi ini dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**. Pernyataan ini menambah transparansi proses tanpa mengurangi kredit penulis sumber ataupun kredit kontributor manusia.

29 Kuliah 29

29.1 Kealamian peta pembanding

Unit 28 membangun peta restriksi kanonik

$$\rho_X: C_{\text{sing}}^{\bullet}(|X_{\bullet}|; R) \longrightarrow C_{\Delta}^{\bullet}(X_{\bullet}; R).$$

Peta ini natural terhadap pemetaan himpunan- Δ .

Lema 29.1 (kealamian pembanding). Jika $f: X_{\bullet} \rightarrow Y_{\bullet}$ pemetaan himpunan- Δ , persegi

$$\begin{array}{ccc} C_{\text{sing}}^{\bullet}(|Y_{\bullet}|; R) & \xrightarrow{|f|^*} & C_{\text{sing}}^{\bullet}(|X_{\bullet}|; R) \\ \downarrow \rho_Y & & \downarrow \rho_X \\ C_{\Delta}^{\bullet}(Y_{\bullet}; R) & \xrightarrow{f^*} & C_{\Delta}^{\bullet}(X_{\bullet}; R) \end{array}$$

komutatif.

Bukti edisi. Untuk $\varphi \in C_{\text{sing}}^n(|Y_{\bullet}|; R)$ dan $x \in X_n$,

$$\begin{aligned} (\rho_X |f|^* \varphi)(x) &= (|f|^* \varphi)(\chi_x) \\ &= \varphi(|f| \circ \chi_x) \\ &= \varphi(\chi_{f(x)}) \\ &= (f^* \rho_Y \varphi)(x). \end{aligned}$$

Kesamaan ketiga berasal dari definisi realisasi geometrik suatu pemetaan himpunan- Δ . Jadi kedua komposisi sama pada setiap derajat. $\square$

Audit sumber 29.1. Diagram sumber menempatkan peta horizontal simpleksial-ke-singular. Inklusi simpleks istimewa justru menghasilkan restriksi singular-ke-simpleksial. Edisi membalik seluruh keluarga diagram, bukan hanya panah pertama, agar kealamian dan sifat kontravarian tetap seragam.

29.2 Perbandingan relatif pada kerangka

Ambil inklusi $i: \text{sk}_{n-1} X_{\bullet} \hookrightarrow X_{\bullet}$. Restriksi ρ menghasilkan peta dari barisan eksak pendek singular ke barisan eksak pendek simpleksial:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \rightarrow & C_{\text{sing}}^{\bullet}(|X_{\bullet}|, |\text{sk}_{n-1} X_{\bullet}|; R) & \rightarrow & C_{\text{sing}}^{\bullet}(|X_{\bullet}|; R) & \rightarrow & C_{\text{sing}}^{\bullet}(|\text{sk}_{n-1} X_{\bullet}|; R) \rightarrow 0 \\ & & \downarrow \rho_{\text{rel}} & & \downarrow \rho_X & & \downarrow \rho_{\text{sk}} \\ 0 & \rightarrow & C_{\Delta}^{\bullet}(X_{\bullet}, \text{sk}_{n-1} X_{\bullet}; R) & \rightarrow & C_{\Delta}^{\bullet}(X_{\bullet}; R) & \rightarrow & C_{\Delta}^{\bullet}(\text{sk}_{n-1} X_{\bullet}; R) \rightarrow 0. \end{array}$$

Karena semua persegi komutatif, diperoleh peta barisan eksak panjang. Agar diagram lima suku sumber tetap dapat mengalir pada layar sempit, baris singularnya ditulis sebagai

$$\begin{aligned} H_{\text{sing}}^{k-1}(|\text{sk}_{n-1} X_{\bullet}|; R) &\longrightarrow H_{\text{sing}}^k(|X_{\bullet}|, |\text{sk}_{n-1} X_{\bullet}|; R) \longrightarrow H_{\text{sing}}^k(|X_{\bullet}|; R) \\ &\longrightarrow H_{\text{sing}}^k(|\text{sk}_{n-1} X_{\bullet}|; R) \longrightarrow H_{\text{sing}}^{k+1}(|X_{\bullet}|, |\text{sk}_{n-1} X_{\bullet}|; R). \end{aligned}$$

Baris simpleksialnya adalah

$$\begin{aligned} H_{\Delta}^{k-1}(\text{sk}_{n-1} X_{\bullet}; R) &\longrightarrow H_{\Delta}^k(X_{\bullet}, \text{sk}_{n-1} X_{\bullet}; R) \longrightarrow H_{\Delta}^k(X_{\bullet}; R) \\ &\longrightarrow H_{\Delta}^k(\text{sk}_{n-1} X_{\bullet}; R) \longrightarrow H_{\Delta}^{k+1}(X_{\bullet}, \text{sk}_{n-1} X_{\bullet}; R). \end{aligned}$$

Restriksi ρ memberi peta vertikal dari setiap suku baris singular ke suku simpleksial tepat di bawahnya. Peta vertikal pada kedua suku relatif (suku kedua dan kelima) adalah peta yang diberi tanda (*) dalam sumber.

Fakta 29.1 (pembanding relatif adalah isomorfisma). Jika $X_\bullet$ berdimensi n , peta pembanding

$$H_{\text{sing}}^k(|X_\bullet|, |\text{sk}_{n-1} X_\bullet|; R) \longrightarrow H_\Delta^k(X_\bullet, \text{sk}_{n-1} X_\bullet; R)$$

adalah isomorfisma untuk setiap k .

Penjelasan bukti edisi. Teorema hasil bagi Unit 28 mengidentifikasi ruas kiri dengan

$$\tilde{H}^k\left(\bigvee_{x \in X_n} S^n; R\right).$$

Jika $k \neq n$, kedua ruas nol. Jika $k = n$, kedua ruas adalah hasil kali salinan R berindeks X_n :

$$\tilde{H}^n\left(\bigvee_{x \in X_n} S^n; R\right) \cong \prod_{x \in X_n} R \cong H_\Delta^n(X_\bullet, \text{sk}_{n-1} X_\bullet; R).$$

Pada faktor x , ambil peta hasil bagi pasangan $q_x: (\Delta^n, \partial\Delta^n) \rightarrow (S^n, *)$. Kontravariansi memberi peta faktor

$$\tilde{H}^n(S^n; R) \longrightarrow H^n(\Delta^n, \partial\Delta^n; R)$$

mengirim kelas kanonik ke kelas kanonik, sehingga isomorfisma. Mengambil hasil kali atas semua $x \in X_n$ membuktikan fakta. $\square$

Audit sumber 29.2. Fakta sumber mempunyai arah relatif terbalik dan pada salah satu faktor menulis $\tilde{H}^k(S^n; R)$ di tengah perhitungan kasus $k = n$. Edisi menuliskan peta kanonik singular-ke-simpleksial dan memakai derajat n secara konsisten.

29.3 Teorema perbandingan

Teorema 29.1 (perbandingan berdimensi hingga). Jika $X_\bullet$ sebuah himpunan- Δ berdimensi hingga, restriksi simpleks istimewa menginduksi isomorfisma natural

$$\rho_X^*: H_{\text{sing}}^k(|X_\bullet|; R) \xrightarrow{\cong} H_\Delta^k(X_\bullet; R)$$

untuk setiap k .

Bukti. Gunakan induksi pada dimensi n dari $X_\bullet$. Jika $n = 0$, realisasi adalah ruang diskret $\text{disc}(X_0)$. Kedua teori menghasilkan R^{X_0} pada derajat nol dan nol pada derajat positif, dan ρ^* adalah identitas koordinat.

Andaikan teorema benar bagi himpunan- Δ berdimensi paling tinggi $n - 1$, dan ambil $X_\bullet$ berdimensi n . Bandingkan barisan eksak panjang pasangan kerangka seperti di atas. Untuk lima suku berurutan yang mengapit $H_{\text{sing}}^k(|X_\bullet|; R) \rightarrow H_\Delta^k(X_\bullet; R)$:

- kedua peta pada suku relatif adalah isomorfisma menurut Fakta 29.1; dan
- kedua peta pada suku kerangka adalah isomorfisma menurut hipotesis induksi.

Lema Lima menyatakan bahwa peta tengah juga isomorfisma. Argumen berlaku pada setiap k , sehingga induksi selesai. $\square$

Argumen serupa berlaku bagi kohomologi relatif. Dengan mengambil pasangan terhadap titik dasar baik, ia juga memberi perbandingan bagi kohomologi tereduksi.

Korolari 29.1 (semua himpunan- Δ). Untuk setiap himpunan- Δ $X_\bullet$ dan setiap k ,

$$\rho_X^* : H_{\text{sing}}^k(|X_\bullet|; R) \xrightarrow{\cong} H_\Delta^k(X_\bullet; R).$$

Penjelasan bukti edisi. Tetapkan k . Pada sisi kombinatorial, H^k hanya melibatkan

$$C^{k-1} \longrightarrow C^k \longrightarrow C^{k+1},$$

sehingga inklusi $\text{sk}_{k+1} X_\bullet \hookrightarrow X_\bullet$ menginduksi isomorfisma pada H_Δ^k .

Pada sisi topologis, realisasi kerangka adalah kerangka CW. Sel-sel yang ditambahkan setelah dimensi $k+1$ mempunyai dimensi sekurang-kurangnya $k+2$. Barisan eksak relatif dan perhitungan baji sfera menunjukkan bahwa setiap peta pembatas dari satu kerangka lebih tinggi ke kerangka sebelumnya adalah isomorfisma pada H_{sing}^k dan H_{sing}^{k-1} setelah tahap tersebut. Jadi sistem invers pada derajat k stabil setelah kerangka $k+1$, dan sistem pada derajat $k-1$ juga stabil. Karena itu suku $\lim_{\leftarrow}^1 H^{k-1}$ dalam barisan eksak Milnor lenyap dan limitnya benar-benar menghasilkan

$$H_{\text{sing}}^k(|X_\bullet|; R) \cong H_{\text{sing}}^k(|\text{sk}_{k+1} X_\bullet|; R).$$

Sekarang $\text{sk}_{k+1} X_\bullet$ berdimensi hingga, walaupun dapat mempunyai tak berhingga banyak simpleks. Terapkan Teorema 29.1 dan gunakan kealamian untuk mendapatkan korolari. $\square$

Audit sumber 29.3. Sumber menyebut kolimit terfilter tetapi tidak menutup argumen. Edisi mengekspresikan stabilisasi pada kerangka $k+1$. Fakta bahwa setiap simpleks singular kompak mendarat di suatu subkompleks hingga tidak berarti ada satu subkompleks hingga yang seragam bagi semua simpleks; bukti tidak memakai klaim seragam tersebut.

Beberapa konsekuensi praktis perlu dibedakan.

1. H_Δ^k functorial terhadap pemetaan himpunan- Δ , sedangkan H_{sing}^k functorial terhadap semua pemetaan kontinu. Jadi isomorfisma di atas natural pada domain pemetaan himpunan- Δ yang direalisasikan, bukan identifikasi dua functor yang sejak awal mempunyai domain sama.
2. Untuk menghitung kohomologi satu ruang yang diberi triangulasi, kompleks simpleksial biasanya jauh lebih kecil daripada kompleks singular.
3. Jika $|X_\bullet|$ dan $|Y_\bullet|$ homeomorfik, mungkin tidak ada pemetaan himpunan- Δ di antara $X_\bullet$ dan $Y_\bullet$. Meskipun begitu,

$$H_\Delta^k(X_\bullet; R) \cong H_{\text{sing}}^k(|X_\bullet|; R) \cong H_{\text{sing}}^k(|Y_\bullet|; R) \cong H_\Delta^k(Y_\bullet; R).$$

4. Pernyataan yang sama berlaku jika kedua realisasi hanya ekuivalen homotopi.

29.4 Kompleks CW

Realisasi himpunan- Δ dibangun dari simpleks yang ditempelkan dengan aturan muka yang kaku. Di sini Δ^{n+1} homeomorfik dengan D^{n+1} dan $\partial\Delta^{n+1}$ homeomorfik dengan S^n . Kompleks CW memperlonggar bentuk sel dan peta pelekatannya.

Definisi 29.1 (struktur kompleks CW). Struktur **kompleks CW** pada ruang X terdiri atas filtrasi

$$X^0 \hookrightarrow X^1 \hookrightarrow X^2 \hookrightarrow \dots, \quad X = \bigcup_{n \geq 0} X^n,$$

dengan topologi lemah terhadap filtrasi tersebut, sehingga:

1. X^0 diskret; dan
2. untuk setiap $n \geq 0$ terdapat himpunan J_{n+1} dan peta pelekatan

$$a_{n+1}: \text{disc}(J_{n+1}) \times S^n \longrightarrow X^n$$

yang membuat persegi

$$\begin{array}{ccc} \text{disc}(J_{n+1}) \times S^n & \xrightarrow{a_{n+1}} & X^n \\ \downarrow \text{id} \times \iota_n & & \downarrow \\ \text{disc}(J_{n+1}) \times D^{n+1} & \longrightarrow & X^{n+1} \end{array}$$

menjadi pushout, dengan $\iota_n: S^n \hookrightarrow D^{n+1}$ inklusi batas.

Secara ekuivalen,

$$X^{n+1} = \left(\text{disc}(J_{n+1}) \times D^{n+1} \sqcup X^n \right) / \sim,$$

tempat $(\alpha, s) \sim a_{n+1}(\alpha, s)$ pada batas.

Gabungan $\bigcup_n X^n$ di atas adalah kolimit topologis filtrasi: sebagai himpunan bertopologi, ia diperoleh dari $\bigsqcup_n X^n$ dengan mengidentifikasi setiap $x \in X^n$ dengan citranya di X^{n+1} . Inilah isi topologi lemah yang dipakai dalam definisi.

Audit sumber 29.4. Definisi sumber memulai langkah ini pada $n \geq 1$, yang menghilangkan pelekatan sel-1. Edisi memulai pada $n = 0$ dan mengindeks J_{n+1} dengan dimensi sel yang dilekatkan.

Gambar semantik 29.1 (melekatkan sel). Untuk setiap $\alpha \in J_{n+1}$:

- objek sumber batas: S_α^n ;
- peta pelekatan: $a_{n+1,\alpha}: S_\alpha^n \rightarrow X^n$;
- objek pengisi: D_α^{n+1} dengan $\partial D_\alpha^{n+1} = S_\alpha^n$;
- hasil: X^{n+1} , diperoleh dengan menempelkan seluruh D_α^{n+1} ke X^n menurut peta batasnya.

Daftar ini menggambar ulang TikZ sumber sebagai objek dan morfisma yang tetap terbaca saat halaman mengalir ulang dan oleh teknologi bantu.

Untuk setiap $\alpha \in J_{n+1}$, restriksi a_{n+1} memberi peta

$$a_{n+1,\alpha}: S^n = \partial D^{n+1} \longrightarrow X^n,$$

yang disebut **peta pelekatan** sel tersebut. Kategori **CW** mempunyai kompleks CW sebagai objek dan semua pemetaan kontinu sebagai morfisma.

Contoh 29.1 (realisasi sebagai CW). Setiap realisasi $|X_\bullet|$ mempunyai struktur CW: setiap simpleks berdimensi n menjadi sel- n , dan peta mukanya menentukan peta pelekatan. Jadi realisasi geometrik dapat dipandang sebagai functor

$$|-|: \Delta\mathbf{Set} \longrightarrow \mathbf{CW}.$$

Contoh 29.2 (manifold). Setiap manifold mulus kompak mempunyai struktur CW hingga. Lebih umum, setiap manifold topologis kompak mempunyai tipe homotopi suatu kompleks CW hingga. Pernyataan homeomorfisma literal dalam kategori topologis memerlukan hipotesis dimensi atau struktur tambahan; ia tidak boleh disamakan begitu saja dengan triangulabilitas semua manifold.

29.5 Pasangan CW dan kategori homotopi

Definisi 29.2 (pasangan CW). Sebuah **pasangan CW** (X, A) terdiri atas kompleks CW X dan subkompleks $A \subseteq X$. Pada setiap dimensi, sel-sel A dipilih sebagai subhimpunan sel-sel X , dan peta pelekatannya mendarat di kerangka A yang sesuai.

Subkompleks A tertutup dalam X . Untuk pasangan himpunan- Δ $(X_\bullet, A_\bullet)$, realisasi $(|X_\bullet|, |A_\bullet|)$ merupakan pasangan CW.

Contoh 29.3. Untuk $n \geq 1$, pasangan (D^n, S^{n-1}) adalah pasangan CW. Jika $n = 1$, batas S^0 terdiri atas dua sel-0; jika $n \geq 2$, gunakan struktur CW sfera dengan satu sel-0 dan satu sel- $(n-1)$. Dalam kedua kasus, tambahkan satu sel- n bagian dalam melalui peta pelekatan identitas pada batas. Hasil baginya adalah

$$D^n/S^{n-1} \cong S^n.$$

Tuliskan $\mathbf{CW}^{(2)}$ untuk kategori pasangan CW dan pemetaan pasangan. Sebuah morfisma

$$f: (X, A) \longrightarrow (Y, B)$$

adalah pemetaan kontinu $f: X \rightarrow Y$ dengan $f(A) \subseteq B$. Penyertaan $\mathbf{CW} \rightarrow \mathbf{CW}^{(2)}$ mengirim $X \mapsto (X, \emptyset)$.

Setiap pasangan CW mempunyai lingkungan $U \supseteq A$ yang dapat diretrak secara deformasi ke A . Teorema 28.2 karena itu memberi

$$\tilde{H}^k(X/A; R) \xrightarrow{\cong} H^k(X, A; R),$$

dengan arah yang ditampilkan sebagai peta kontravarian hasil bagi.

Homotopi pemetaan pasangan adalah homotopi yang pada setiap waktu tetap mengirim A ke B . Kategori $h\mathbf{CW}^{(2)}$ mempunyai pasangan CW sebagai objek dan **kelas homotopi pemetaan pasangan** sebagai morfisma. Demikian pula didefinisikan $h\mathbf{CW}$.

Audit sumber 29.5. Frasa sumber “homotopy equivalence classes of maps” dapat dibaca sebagai hanya mengizinkan pemetaan yang merupakan ekuivalensi homotopi. Yang dimaksud adalah kelas ekuivalensi pemetaan di bawah relasi homotopi. Edisi menuliskannya secara eksplisit.

29.6 Karakterisasi Eilenberg–Steenrod

Teorema 29.2 (Eilenberg–Steenrod, 1945). Misalkan, untuk setiap $k \in \mathbb{Z}$, diberikan functor

$$h^k: (h\mathbf{CW}^{(2)})^{\text{op}} \longrightarrow \text{Mod}_R,$$

dan tuliskan $h^k(X) := h^k(X, \emptyset)$. Andaikan sifat-sifat berikut berlaku. Penulisan domain berlawanan ini berarti bahwa h^k bersifat kontravarian pada $h\mathbf{CW}^{(2)}$.

1. **Aditivitas.** Untuk setiap keluarga kompleks CW $\{X_\alpha\}_{\alpha \in J}$, inklusi faktor menginduksi isomorfisma

$$h^k\left(\bigsqcup_{\alpha \in J} X_\alpha\right) \xrightarrow{\cong} \prod_{\alpha \in J} h^k(X_\alpha).$$

2. **Eksak dan natural.** Terdapat homomorfisma penghubung natural $h^k(A) \rightarrow h^{k+1}(X, A)$ dan barisan eksak panjang

$$\cdots \longrightarrow h^k(X, A) \longrightarrow h^k(X) \longrightarrow h^k(A) \longrightarrow h^{k+1}(X, A) \longrightarrow \cdots$$

bagi setiap pasangan CW (X, A) .

3. **Eksisi bertipe CW.** Jika $Z \subseteq A \subseteq X$ memenuhi $\bar{Z} \subseteq \text{int}_X(A)$ dan baik (X, A) maupun $(X \setminus Z, A \setminus Z)$ merupakan pasangan CW, maka inklusi pasangan menginduksi isomorfisma

$$h^k(X, A) \xrightarrow{\cong} h^k(X \setminus Z, A \setminus Z).$$

Bentuk eksisi kuat yang dipakai dalam pembuktian seluler menyatakan bahwa, untuk setiap pasangan CW, peta hasil bagi $q: (X, A) \rightarrow (X/A, *)$ menginduksi isomorfisma yang selalu bertipe benar,

$$h^k(X/A, *) \xrightarrow{\cong} h^k(X, A).$$

4. **Dimensi.** $h^0(*) \cong R$ dan $h^k(*) = 0$ untuk $k \neq 0$.

Maka terdapat isomorfisma natural

$$h^k(X, A) \cong H^k(X, A; R)$$

untuk semua pasangan CW dan semua k .

Audit sumber 29.6. Sumber mendefinisikan h^k hanya pada pasangan CW, tetapi aksioma eksisinya langsung mengevaluasi pasangan komplemen yang tidak otomatis merupakan pasangan CW. Edisi menyatakan syarat domain dan bentuk eksisi kuat melalui hasil bagi seluler yang dipakai dalam teorema keunikan. Karena domain sudah kategori homotopi, invariansi homotopi tidak perlu ditambahkan lagi sebagai aksioma terpisah.

Ada versi tereduksi $\tilde{h}^k$, dan teorema memberi $\tilde{h}^k \cong \tilde{H}^k$. Semua barisan eksak dan sifat perhitungan kohomologi biasa dapat diturunkan dari aksioma-aksioma tersebut. Dari sudut pandang ini, pembangunan korantai singular membuktikan **eksistensi** satu teori yang memenuhi aksioma; teorema Eilenberg–Steenrod membuktikan **keunikan** teori biasa setelah normalisasi dimensinya ditetapkan.

29.7 Pemeriksaan penguasaan

Pemeriksaan Penguasaan 29.1 (kealamian pada satu simpleks). Misalkan $f: X_\bullet \rightarrow Y_\bullet$ dan $\varphi \in C_{\text{sing}}^n(|Y_\bullet|; R)$.

1. Hitung $(\rho_X |f|^* \varphi)(x)$ bagi $x \in X_n$.
2. Hitung $(f^* \rho_Y \varphi)(x)$.
3. Identifikasi persamaan geometris yang membuat kedua jawaban sama.

Petunjuk. Pemetaan karakteristik simpleks $f(x)$ adalah komposisi $|f|$ dengan pemetaan karakteristik x .

Solusi Pemeriksaan 29.1. Dengan χ_x pemetaan karakteristik,

$$(\rho_X |f|^* \varphi)(x) = \varphi(|f| \circ \chi_x).$$

Di sisi lain,

$$(f^* \rho_Y \varphi)(x) = (\rho_Y \varphi)(f(x)) = \varphi(\chi_{f(x)}).$$

Realisasi geometrik memenuhi $|f| \circ \chi_x = \chi_{f(x)}$. Jadi kedua nilai sama pada setiap x , yang membuktikan komutativitas persegi Lema 29.1.

Pemeriksaan Penguasaan 29.2 (empat isomorfisma mengapit peta tengah). Dalam bukti Teorema 29.1, tuliskan lima suku berurutan barisan eksak panjang yang mengapit $H_{\text{sing}}^k(|X|; R) \rightarrow H_{\Delta}^k(X; R)$. Tandai dua peta yang merupakan isomorfisma menurut hipotesis induksi dan dua menurut Fakta 29.1.

Petunjuk. Gunakan urutan: kerangka derajat $k-1$, relatif derajat k , absolut derajat k , kerangka derajat k , relatif derajat $k+1$.

Solusi Pemeriksaan 29.2. Lima sukunya adalah

$$H^{k-1}(\text{sk}_{n-1} X) \rightarrow H^k(X, \text{sk}_{n-1} X) \rightarrow H^k(X) \rightarrow H^k(\text{sk}_{n-1} X) \rightarrow H^{k+1}(X, \text{sk}_{n-1} X),$$

baik pada sisi singular maupun simpleksial. Peta vertikal pertama dan keempat adalah isomorfisma menurut hipotesis induksi pada kerangka berdimensi $n-1$. Peta kedua dan kelima adalah isomorfisma menurut Fakta 29.1. Kedua baris eksak dan diagram komutatif; Lema Lima memaksa peta vertikal ketiga menjadi isomorfisma.

Pemeriksaan Penguasaan 29.3 (mengapa kerangka $k+1$ cukup).

1. Tunjukkan bahwa $H_{\Delta}^k(X; R)$ hanya bergantung pada simpleks sampai dimensi $k+1$.
2. Jelaskan mengapa melekatkan sel berdimensi sekurang-kurangnya $k+2$ tidak mengubah H_{sing}^k .
3. Simpulkan Korolari 29.1 dari Teorema 29.1.

Petunjuk. Kohomologi derajat k adalah kernel satu diferensial dibagi citra diferensial sebelumnya. Untuk sisi topologis, gunakan kohomologi relatif pasangan kerangka.

Solusi Pemeriksaan 29.3. Rumus

$$H^k = \ker(C^k \rightarrow C^{k+1}) / \text{im}(C^{k-1} \rightarrow C^k)$$

hanya memakai derajat $k-1, k, k+1$. Jadi kerangka $k+1$ memuat semua data simpleksial yang diperlukan. Jika suatu sel berdimensi $r \geq k+2$ dilekatkan, kohomologi relatif pasangan tahap baru terhadap tahap lama hanya dapat taknol pada derajat r . Barisan eksak pasangan karena itu memberi isomorfisma pada derajat k . Mengulangi untuk semua sel lebih tinggi menunjukkan stabilisasi topologis. Terapkan Teorema 29.1 pada $\text{sk}_{k+1} X$, lalu identifikasi kedua sisi stabil tersebut.

Pemeriksaan Penguasaan 29.4 (indeks pelekatan sel).

1. Bangun S^1 dari satu sel-0 dan satu sel-1.
2. Bangun S^2 dari satu sel-0 dan satu sel-2.
3. Jelaskan mengapa syarat “untuk $n \geq 1$ ” pada peta $S^n \rightarrow X^n$ tidak dapat menghasilkan contoh pertama.

Petunjuk. Sel-1 mempunyai batas S^0 dan sel-2 mempunyai batas S^1 . Peta konstan pada batas memberi hasil bagi cakram menjadi sfera.

Solusi Pemeriksaan 29.4. Untuk S^1 , ambil $X^0 = \{*\}$ dan lekatkan D^1 dengan kedua titik $S^0 = \partial D^1$ dipetakan ke $*$. Hasilnya $D^1/S^0 \cong S^1$. Langkah ini adalah $n = 0$ dalam definisi, sebab sel yang dilekatkan berdimensi $n + 1 = 1$.

Untuk S^2 , ambil $X^0 = X^1 = \{*\}$ dan lekatkan satu D^2 melalui peta konstan $S^1 \rightarrow *$. Hasilnya $D^2/S^1 \cong S^2$. Jika langkah pelekatan baru dimulai pada $n = 1$, tidak pernah ada mekanisme menambahkan sel-1; maka bahkan graf dasar seperti S^1 tidak dapat dibangun.

Pemeriksaan Penguasaan 29.5 (pasangan cakram–sfera). Untuk pasangan CW (D^n, S^{n-1}) :

1. hitung $H^k(D^n, S^{n-1}; R)$;
2. tentukan arah peta hasil bagi yang diinduksi pada kohomologi; dan
3. bandingkan hasilnya dengan kohomologi tereduksi S^n .

Petunjuk. Gunakan $D^n/S^{n-1} \cong S^n$ dan Teorema 28.2.

Solusi Pemeriksaan 29.5. Pemetaan hasil bagi pasangan

$$q: (D^n, S^{n-1}) \rightarrow (S^n, *)$$

menginduksi, secara kontravarian,

$$q^*: H^k(S^n, *, R) \xrightarrow{\cong} H^k(D^n, S^{n-1}; R).$$

Karena $H^k(S^n, *, R) = \tilde{H}^k(S^n; R)$,

$$H^k(D^n, S^{n-1}; R) = \begin{cases} R, & k = n, \\ 0, & k \neq n. \end{cases}$$

Jadi kohomologi relatif mengukur tepat sel- n yang ditambahkan.

Pemeriksaan Penguasaan 29.6 (mengenali aksioma). Sebuah teori h^* pada pasangan CW memenuhi eksak, eksisi, dan aditivitas, serta $h^0(*) \cong R$ dan $h^k(*) = 0$ untuk $k \neq 0$.

1. Aksioma mana yang menghitung teori pada gabungan saling lepas tak berhingga?
2. Aksioma mana yang menghasilkan homomorfisma penghubung?
3. Gunakan hasil bagi (D^n, S^{n-1}) dan normalisasi titik untuk menjelaskan mengapa $h^k(D^n, S^{n-1})$ hanya tak nol pada $k = n$.

Petunjuk. Aditivitas memberi hasil kali; eksak memberi penghubung. Suspensi atau induksi sel menggeser satu-satunya salinan R dari derajat nol.

Solusi Pemeriksaan 29.6. Aditivitas memberi

$$h^k\left(\bigsqcup_{\alpha} X_{\alpha}\right) \cong \prod_{\alpha} h^k(X_{\alpha}).$$

Barisan eksak panjang menyediakan peta penghubung $h^k(A) \rightarrow h^{k+1}(X, A)$. Untuk pasangan cakram–batas, eksisi atau bentuk hasil bagi memberi

$$h^k(D^n, S^{n-1}) \cong \tilde{h}^k(S^n).$$

Barisan eksak pasangan kerucut menghasilkan isomorfisma suspensi $\tilde{h}^k(S^n) \cong \tilde{h}^{k-1}(S^{n-1})$. Mengite-rasikan sampai S^0 dan memakai aksioma dimensi memberi satu salinan R tepat pada $k = n$, serta nol pada derajat lain. Ini adalah langkah lokal yang membuat induksi sel dalam teorema keunikan bekerja.

Batas ke Unit 30. Unit 29 menerjemahkan Notes.tex baris 6053–6270 secara kontigu dan menutup seluruh objek sumber pada rentang itu. Baris 6271 memuat `\lecturenum{30}` di tengah kalimat dan tidak dimasukkan. Kursor sumber berikutnya yang tepat adalah **Notes.tex baris 6271**.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts, © 2019 David Michael Roberts, tepatnya [Notes.tex baris 6271–6368 pada commit b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#) dari repositori [DavidMichaelRoberts/AlgebraicTopology2019](#). Rentang aktif terdiri atas 98 baris fisik. Dengan normalisasi LF dan satu terminator LF penutup dipertahankan, ukurannya 8.290 byte dan SHA-256-nya adalah c522b5ec0ba7d4c938be6588a070be648263d841e1db4f9905c9b388619b64b1. Baris 6368 adalah `\end{document}`; tidak ada baris sumber berikutnya. Materi sumber dan adaptasi Indonesia ini tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#).

Rentang sumber memuat tiga teorema, satu definisi formal, satu definisi inline, satu lema, satu korolari, satu catatan, tiga lingkungan bukti, satu daftar empat butir, enam catatan pinggir, satu catatan sisi, dan satu gambar TikZ. Tidak ada latihan atau pertanyaan formal sumber, diagram Xy-pic, gambar eksternal, perintah sitasi, ataupun berkas yang diimpor.

Edisi memperbaiki beberapa masalah matematika yang dapat dibuktikan langsung. Bukti Brouwer memakai kohomologi tereduksi dan arah peta kontravarian yang benar; pendekatan dalam bukti teorema dasar aljabar diganti dengan batas kuantitatif; sfera satuan serat singgung dibedakan dari sfera ambien; dan rumus medan dimensi ganjil diperbaiki sehingga $v(x) \cdot x = 0$, bukan 1. Semua koreksi dijelaskan dalam blok audit sumber dan audit pendamping.

Enam pemeriksaan penguasaan, enam petunjuk, satu bukti korolari, dan enam solusi lengkap merupakan materi asli edisi dan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen; edisi ini tidak disponsori, didukung, disahkan, ataupun diberi status resmi oleh David Michael Roberts atau institusinya. Produksi edisi ini dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**. Pernyataan ini menambah transparansi proses tanpa mengurangi kredit penulis sumber ataupun kredit kontributor manusia.

30 Kuliah 30

30.1 Tiga penerapan klasik

Pada sisa kuliah ini, kita menerapkan perangkat topologi yang telah dibangun untuk tiga persoalan klasik:

1. keberadaan titik tetap bagi fungsi kontinu $D^n \rightarrow D^n$;
2. teorema dasar aljabar; dan
3. keberadaan medan vektor yang tidak pernah nol pada sfera.

30.2 Teorema titik tetap Brouwer

Teorema pemetaan kontraksi menyatakan bahwa jika fungsi $f: D^n \rightarrow D^n$ memenuhi

$$\|f(x) - f(y)\| \leq C\|x - y\| \quad \text{untuk suatu } C \in (0, 1),$$

maka terdapat titik tetap $x_0 \in D^n$ dengan $f(x_0) = x_0$.

Keunikan pada kasus kontraksi. Teorema pemetaan kontraksi bahkan memberi tepat satu titik tetap.

Banyak fungsi-diri yang bukan kontraksi tetap mempunyai titik tetap. Rotasi terhadap pusat 0, misalnya, menetapkan 0. Sebuah fungsi juga dapat sama dengan identitas pada suatu daerah kecil—sehingga mempunyai banyak titik tetap—namun meregangkan titik-titik di tempat lain.

Definisi 30.1 (fungsi-diri bebas). Fungsi-diri kontinu $f: X \rightarrow X$ disebut **bebas** jika

$$f(x) \neq x \quad \text{untuk setiap } x \in X.$$

Dengan kata lain, fungsi-diri bebas tidak mempunyai titik tetap.

Teorema 30.1 (teorema titik tetap Brouwer). Untuk setiap $n \geq 0$, tidak ada fungsi-diri kontinu bebas $f: D^n \rightarrow D^n$. Setiap fungsi-diri kontinu D^n mempunyai titik tetap.

Bukti. Untuk $n = 0$, ruang D^0 hanya mempunyai satu titik, sehingga pernyataannya langsung benar. Sekarang andaikan $n \geq 1$ dan, untuk memperoleh kontradiksi, andaikan $f: D^n \rightarrow D^n$ bebas.

Untuk $x \in D^n$, letakkan

$$a = f(x), \quad d = x - f(x) \neq 0.$$

Sinar yang bermula di a , melewati x , dan diteruskan ke arah d memotong batas $S^{n-1} = \partial D^n$ pada tepat satu titik sesudah x . Secara eksplisit, letakkan

$$\lambda(x) = \frac{-\langle a, d \rangle + \sqrt{\langle a, d \rangle^2 + \|d\|^2(1 - \|a\|^2)}}{\|d\|^2}$$

dan definisikan

$$g_f(x) = a + \lambda(x)d.$$

Rumus kuadrat menunjukkan $\|g_f(x)\| = 1$ dan $\lambda(x) \geq 1$. Karena $d \neq 0$, seluruh operasi dalam rumus kontinu; jadi $g_f: D^n \rightarrow S^{n-1}$ kontinu. Jika $x \in S^{n-1}$, akar keluar pada sinar tersebut adalah $\lambda(x) = 1$, maka $g_f(x) = x$.

Gambar semantik 30.1 (retraksi dari fungsi bebas). Pada satu garis berarah terdapat tiga titik dalam urutan

$$f(x) \longrightarrow x \longrightarrow g_f(x).$$

Titik $f(x)$ dan x berada di D^n ; titik $g_f(x)$ adalah perpotongan sinar dengan batas S^{n-1} . Jika x sudah berada pada batas, titik kedua dan ketiga berimpit. Deskripsi ini mereflow gambar TikZ sumber tanpa menghilangkan objek, arah, atau relasi geometrisnya.

Tuliskan $i: S^{n-1} \hookrightarrow D^n$ untuk inklusi. Kesamaan pada batas memberi

$$g_f \circ i = \text{id}_{S^{n-1}}.$$

Terapkan functor kohomologi tereduksi dengan koefisien $\mathbb{Z}$. Karena kohomologi kontravarian, urutan peta yang benar adalah

$$\mathbb{Z} \cong \tilde{H}^{n-1}(S^{n-1}; \mathbb{Z}) \xrightarrow{g_f^*} \tilde{H}^{n-1}(D^n; \mathbb{Z}) = 0 \xrightarrow{i^*} \tilde{H}^{n-1}(S^{n-1}; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}.$$

Komposisinya harus

$$i^* \circ g_f^* = (g_f \circ i)^* = \text{id}_{\mathbb{Z}},$$

tetapi setiap peta yang memfaktor melalui grup nol adalah nol. Kontradiksi ini menunjukkan bahwa f tidak mungkin bebas. $\square$

Audit sumber 30.1. Sumber menggambar g_f tanpa terlebih dahulu menyatakan pengandaian bahwa f bebas, dan membiarkan kontinuitasnya sebagai latihan. Edisi menyatakan pengandaian, memberi rumus kontinu, dan mereflow gambar. Sumber juga menukar label i^* dan g_f^* serta memakai kohomologi biasa, yang gagal memberi suku tengah nol ketika $n = 1$. Edisi memakai arah kontravarian dan kohomologi tereduksi. Contoh sumber “fungsi konstan pada suatu daerah mempunyai banyak titik tetap” diperbaiki menjadi fungsi yang sama dengan identitas pada daerah itu.

Catatan 30.1 (keberadaan tanpa pilihan kontinu). Teorema ini biasanya dinyatakan sebagai “setiap fungsi-diri mempunyai titik tetap.” Bukti di atas secara langsung menyingkirkan fungsi-diri tanpa titik tetap. Perbedaan itu penting dalam logika nonklasik dan dalam komputasi numerik.

Lokasi titik tetap dapat meloncat secara tak kontinu ketika fungsi-diri berubah dalam suatu keluarga kontinu. Jadi bukti Brouwer tidak menyediakan satu metode kontinu untuk memilih titik tetap. Ini berbeda dari teorema pemetaan kontraksi, yang membangun barisan Cauchy menuju titik tetap unik. Himpunan titik tetap umum dapat berperilaku jauh lebih rumit.

30.3 Teorema dasar aljabar

Penerapan kedua memerlukan masukan topologis melalui

$$\pi_1(\mathbb{C}^\times) \cong \mathbb{Z},$$

tempat $\mathbb{C}^\times = \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Kita mempertimbangkan polinom berkoefisien kompleks. Polinom **monik** mempunyai koefisien utama sama dengan 1.

Catatan aljabar. Formulasi yang lebih umum memakai medan tertutup-real k : medan itu terurut, setiap elemen positif merupakan kuadrat, dan setiap polinom berderajat ganjil mempunyai akar. Medan $k[\sqrt{-1}]$ kemudian tertutup aljabar. Untuk $k = \mathbb{R}$, sifat nilai antara merupakan salah satu masukan klasik yang menjamin perilaku akar real yang diperlukan.

Teorema 30.2 (teorema dasar aljabar). Fungsi polinom monik takkonstan

$$p: \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$$

tidak dapat difaktorkan melalui inklusi $\mathbb{C}^\times \hookrightarrow \mathbb{C}$. Dengan kata lain, p mempunyai sekurang-kurangnya satu akar kompleks.

Bukti. Tuliskan

$$p(z) = z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_1z + a_0, \quad n \geq 1.$$

Pilih $R > 0$ cukup besar sehingga

$$\sum_{j=0}^{n-1} |a_j| R^j < R^n.$$

Pada lingkaran berjari-jari R , definisikan

$$p_R(\theta) = p(Re^{i\theta}), \quad q(\theta) = R^n e^{in\theta}.$$

Homotopi garis lurus

$$H(s, \theta) = q(\theta) + s(p_R(\theta) - q(\theta)), \quad 0 \leq s \leq 1,$$

tidak pernah mengenai nol, sebab

$$|H(s, \theta)| \geq R^n - s \sum_{j=0}^{n-1} |a_j| R^j > 0.$$

Jadi p_R dan q homotop sebagai fungsi $S^1 \rightarrow \mathbb{C}^\times$. Fungsi q melilit titik asal sebanyak n kali dan tidak homotop dengan fungsi konstan. Hal ini dapat dilihat dengan mengangkat lintasan melalui penutup

$$\exp: \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}^\times;$$

angkatannya berubah sebesar $2\pi in$ setelah satu putaran.

Andaikan sekarang p memfaktor melalui $\mathbb{C}^\times$, yakni $p(z) \neq 0$ untuk setiap z . Maka

$$K(t, \theta) = p((1-t)Re^{i\theta})$$

adalah homotopi di $\mathbb{C}^\times$ dari p_R ke fungsi konstan bernilai $p(0)$. Ini membuat p_R nul-homotop, padahal p_R homotop dengan q yang tidak nul-homotop. Kontradiksi. Jadi p harus mempunyai akar. $\square$

Audit sumber 30.2. Tanda pendekatan informal sumber diganti dengan pertaksamaan eksplisit yang menjamin seluruh homotopi berada di $\mathbb{C}^\times$. Karakterisasi medan tertutup-real dilengkapi dengan syarat bahwa setiap elemen positif merupakan kuadrat. Kata “contraction” pada akhir bukti sumber adalah salah ketik kontekstual dan diperbaiki menjadi “contradiction.”

30.4 Derajat dan teorema sfera berbulu

Penerapan terakhir berada dalam topologi diferensial, pertemuan geometri diferensial dan topologi. Pada $S^1 \subset \mathbb{R}^2$ terdapat medan vektor tangen satuan

$$v(x, y) = (-y, x).$$

Rumus ini merotasi vektor posisi sebesar $\pi/2$ dan tidak pernah nol. Kita dapat bertanya apakah medan semacam itu ada pada sfera lain.

Menentukan **berapa banyak** medan vektor yang bebas linear pada setiap titik merupakan persoalan yang lebih sulit daripada sekadar menentukan keberadaan satu medan yang tidak pernah nol.

Teorema 30.3 (teorema sfera berbulu). Pada S^n terdapat medan vektor tangen yang tidak pernah nol jika dan hanya jika n ganjil.

Nama julukannya berasal dari S^2 : medan vektor divisualisasikan sebagai rambut-rambut kecil, dan syarat tangensi berarti setiap rambut disisir rata sepanjang permukaan.

Andaikan tersedia medan tangen yang tidak pernah nol. Dengan membaginya oleh panjangnya, kita boleh mengandaikan panjang medan itu selalu 1. Pada setiap $x \in S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$, vektor satuan $v(x)$ berada pada sfera satuan ambien dan tegak lurus terhadap x . Jadi medan ternormalisasi memberi fungsi

$$v: S^n \longrightarrow S^n, \quad v(x) \cdot x = 0.$$

Sfera satuan di dalam serat $T_x S^n$ sendiri berdimensi $n - 1$; kita tidak mengidentifikasinya dengan satu salinan tetap S^n . Target S^n pada rumus di atas adalah sfera satuan ambien di $\mathbb{R}^{n+1}$.

Definisi 30.2 (derajat). Pilih generator orientasi standar

$$u \in \tilde{H}^n(S^n; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}.$$

Untuk fungsi $f: S^n \rightarrow S^n$, **derajat** f adalah bilangan bulat $\text{Deg}(f)$ yang ditentukan oleh

$$f^*(u) = \text{Deg}(f)u.$$

Kohomologi tereduksi membuat definisi ini berlaku juga bagi $n = 0$.

Proposisi 30.1 (sifat dasar derajat). Derajat mempunyai sifat-sifat berikut.

1. Jika f tidak surjektif, maka $\text{Deg}(f) = 0$, sebab f memfaktor melalui $S^n \setminus \{y\} \cong \mathbb{R}^n$ untuk suatu titik y yang tidak berada dalam citranya.
2. $\text{Deg}(\text{id}_{S^n}) = 1$.
3. $\text{Deg}(g \circ f) = \text{Deg}(g) \text{Deg}(f)$.
4. Jika f homotop dengan g , maka $\text{Deg}(f) = \text{Deg}(g)$.

Dengan demikian, derajat memberi homomorfisma monoid

$$\text{Deg}: [S^n, S^n] \longrightarrow \text{End}(\mathbb{Z}) \cong (\mathbb{Z}, \times).$$

Lema 30.1 (derajat refleksi koordinat). Definisikan

$$r_i(x_1, \dots, x_{n+1}) = (x_1, \dots, -x_i, \dots, x_{n+1}).$$

Maka $\text{Deg}(r_i) = -1$.

Sebelum lema, sumber menyatakan bahwa masukan sulit ini mempunyai bukti dalam Hatcher. Sesudah lema, sumber merangkum perhitungan eksplisit Hatcher: S^n ditriangulasi oleh dua salinan $\Delta[n]$ yang ditukar oleh r_i .

Dalam kohomologi de Rham, tanda -1 dapat dilihat dari pembalikan orientasi S^n dan perubahan tanda bentuk volume global.

Korolari 30.1 (derajat peta antipodal). Untuk peta antipodal $-\text{id}_{S^n}$,

$$\text{Deg}(-\text{id}_{S^n}) = (-1)^{n+1}.$$

Bukti edisi. Peta antipodal adalah komposisi seluruh $n + 1$ refleksi koordinat,

$$-\text{id}_{S^n} = r_1 \circ r_2 \circ \cdots \circ r_{n+1}.$$

Gunakan multiplikativitas derajat dan Lema 30.1 untuk memperoleh hasil kali $n + 1$ salinan -1 . $\square$

Bukti Teorema 30.3. Pertama andaikan terdapat medan tangen satuan $v: S^n \rightarrow S^n$ dengan $v(x) \cdot x = 0$. Definisikan

$$\begin{aligned} h: I \times S^n &\longrightarrow \mathbb{R}^{n+1}, \\ (t, x) &\longmapsto \cos(\pi t)x + \sin(\pi t)v(x). \end{aligned}$$

Ortogonalitas dan panjang satu memberi

$$\|h(t, x)\|^2 = \cos^2(\pi t)\|x\|^2 + \sin^2(\pi t)\|v(x)\|^2 = 1.$$

Jadi h sebenarnya bernilai di S^n . Karena

$$h(0, x) = x, \quad h(1, x) = -x,$$

h adalah homotopi dari identitas ke peta antipodal. Invariansi homotopi derajat memberi

$$1 = \text{Deg}(\text{id}_{S^n}) = \text{Deg}(-\text{id}_{S^n}) = (-1)^{n+1}.$$

Jika n genap, ruas terakhir adalah -1 , suatu kontradiksi. Jadi keberadaan medan memaksa n ganjil.

Sebaliknya, andaikan $n = 2k - 1$ dengan $k \geq 1$. Untuk $x \in S^{2k-1} \subset \mathbb{R}^{2k}$, definisikan

$$v(x_1, \dots, x_{2k}) = (-x_2, x_1, -x_4, x_3, \dots, -x_{2k}, x_{2k-1}).$$

Pada setiap pasangan koordinat,

$$x_{2j-1}(-x_{2j}) + x_{2j}x_{2j-1} = 0,$$

sehingga $v(x) \cdot x = 0$. Selain itu,

$$\|v(x)\|^2 = \sum_{j=1}^k (x_{2j}^2 + x_{2j-1}^2) = \|x\|^2 = 1.$$

Maka v adalah medan tangen satuan yang tidak pernah nol. Pada setiap pasangan koordinat, rumusnya sama dengan medan rotasi pada S^1 . $\square$

Audit sumber 30.3. Sumber menyamakan sfera satuan dalam $T_x S^n$ dengan S^n , padahal serat itu mempunyai sfera satuan S^{n-1} . Edisi memakai sfera satuan ambien dan syarat ortogonalitas. Definisi derajat dipindahkan ke kohomologi tereduksi agar mencakup $n = 0$. Pada konstruksi ganjil, indeks akhir x_{2k-1} diperbaiki menjadi x_{2k} dan klaim $v(x) \cdot x = 1$ diperbaiki menjadi 0; panjangnya, bukan hasil kali titiknya, yang bernilai 1. Frasa translasi pada contoh S^1 dinyatakan sebagai translasi grup, yang secara koordinat adalah rotasi sesuai rumus sumber.

30.5 Pemeriksaan penguasaan

Pemeriksaan Penguasaan 30.1 (membangun retraksi Brouwer). Andaikan $f: D^n \rightarrow D^n$ bebas dan $n \geq 1$. Dengan $a = f(x)$ dan $d = x - f(x)$:

1. selesaikan persamaan $\|a + td\|^2 = 1$ untuk akar keluar $t = \lambda(x)$;
2. jelaskan mengapa λ kontinu; dan
3. buktikan bahwa $g_f(x) = a + \lambda(x)d$ sama dengan x pada S^{n-1} .

Petunjuk. Persamaannya kuadrat dalam t . Pilih akar taknegatif yang terletak sesudah x pada sinar dari a melalui x .

Solusi Pemeriksaan 30.1. Ekspansi memberi

$$\|d\|^2 t^2 + 2\langle a, d \rangle t + (\|a\|^2 - 1) = 0.$$

Karena $d \neq 0$, akar keluarnya adalah

$$\lambda(x) = \frac{-\langle a, d \rangle + \sqrt{\langle a, d \rangle^2 + \|d\|^2(1 - \|a\|^2)}}{\|d\|^2}.$$

Semua suku bergantung kontinu pada x , penyebut tidak nol, dan akar yang dipilih tetap akar keluar; jadi λ kontinu. Jika $\|x\| = 1$, titik $a + d = x$ sudah merupakan perpotongan keluar sinar dengan batas. Keunikan akar keluar memberi $\lambda(x) = 1$, sehingga $g_f(x) = a + d = x$.

Pemeriksaan Penguasaan 30.2 (arah kohomologi pada bukti Brouwer). Untuk $n = 1$:

1. hitung $H^0(D^1; \mathbb{Z})$ dan $\tilde{H}^0(D^1; \mathbb{Z})$;
2. hitung $\tilde{H}^0(S^0; \mathbb{Z})$; dan
3. tuliskan arah g_f^* dan i^* serta jelaskan kontradiksinya.

Petunjuk. D^1 terhubung, sedangkan S^0 mempunyai dua komponen. Kohomologi membalik arah fungsi ruang.

Solusi Pemeriksaan 30.2. Karena D^1 terhubung,

$$H^0(D^1; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}, \quad \tilde{H}^0(D^1; \mathbb{Z}) = 0.$$

Karena S^0 mempunyai dua komponen, $\tilde{H}^0(S^0; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$. Peta ruang $g_f: D^1 \rightarrow S^0$ dan $i: S^0 \rightarrow D^1$ menghasilkan

$$\mathbb{Z} \xrightarrow{g_f^*} 0 \xrightarrow{i^*} \mathbb{Z}.$$

Namun $g_f \circ i = \text{id}_{S^0}$ menuntut $i^* \circ g_f^* = \text{id}_{\mathbb{Z}}$. Komposisi melalui nol tidak mungkin identitas. Kohomologi biasa derajat nol tidak memberi suku tengah nol; itulah alasan tilde diperlukan.

Pemeriksaan Penguasaan 30.3 (lingkaran besar suatu polinom). Untuk $p(z) = z^n + \sum_{j < n} a_j z^j$:

1. pilih syarat eksplisit pada R yang membuat suku utama dominan;
2. buktikan homotopi garis lurus dari p_R ke $R^n e^{in\theta}$ menghindari nol; dan
3. jelaskan mengapa hipotesis “ p tidak berakar” memberi kontradiksi.

Petunjuk. Gunakan $\sum_{j < n} |a_j| R^j < R^n$ dan kontraksikan lingkaran berjari-jari R secara radial di domain.

Solusi Pemeriksaan 30.3. Pilih R dengan $A_R := \sum_{j < n} |a_j| R^j < R^n$. Untuk $H(s, \theta) = R^n e^{in\theta} + s(p_R - R^n e^{in\theta})$,

$$|H(s, \theta)| \geq R^n - sA_R > 0.$$

Jadi p_R mempunyai kelas homotopi yang sama dengan lingkaran berbilangan lilit n , dan kelas itu taknol. Jika p tidak mempunyai akar, maka $p((1-t)Re^{i\theta})$ selalu berada di $\mathbb{C}^\times$ dan menghomotopkan p_R ke konstanta $p(0)$. Kelas p_R lalu sekaligus nol dan taknol, suatu kontradiksi.

Pemeriksaan Penguasaan 30.4 (derajat peta antipodal).

1. Turunkan multiplikativitas derajat dari kontravariansi kohomologi.
2. Nyatakan peta antipodal sebagai komposisi refleksi koordinat.
3. Hitung derajatnya.

Petunjuk. $(g \circ f)^* = f^* \circ g^*$ dan setiap refleksi berderajat -1 .

Solusi Pemeriksaan 30.4. Jika $f^*(u) = du$ dan $g^*(u) = eu$, maka

$$(g \circ f)^*(u) = f^*(g^*(u)) = f^*(eu) = (ed)u.$$

Jadi $\text{Deg}(g \circ f) = ed$. Peta antipodal membalik seluruh $n+1$ koordinat, sehingga

$$-\text{id} = r_1 \circ \cdots \circ r_{n+1}.$$

Karena setiap faktor berderajat -1 , derajat komposisinya adalah $(-1)^{n+1}$.

Pemeriksaan Penguasaan 30.5 (obstruksi pada dimensi genap). Andaikan v medan tangen yang tidak pernah nol pada S^n .

1. Normalisasikan v .
2. Bangun homotopi antara identitas dan peta antipodal.
3. Tunjukkan mengapa n tidak mungkin genap, termasuk $n = 0$.

Petunjuk. Gunakan $h(t, x) = \cos(\pi t)x + \sin(\pi t)v(x)$ dan kohomologi tereduksi untuk definisi derajat pada S^0 .

Solusi Pemeriksaan 30.5. Ganti $v(x)$ dengan $v(x)/\|v(x)\|$. Ortogonalitas terhadap x membuat $h(t, x)$ selalu berpanjang satu, sehingga h bernilai di S^n . Nilai ujungnya adalah x dan $-x$. Karena derajat invarian terhadap homotopi,

$$1 = \text{Deg}(\text{id}) = \text{Deg}(-\text{id}) = (-1)^{n+1}.$$

Jika n genap, ruas kanan -1 , kontradiksi. Untuk $n = 0$, definisi derajat memakai $\tilde{H}^0(S^0; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$, sehingga argumen yang sama berlaku; secara geometris, ruang singgung sfera berdimensi nol memang hanya memuat vektor nol.

Pemeriksaan Penguasaan 30.6 (medan pada dimensi ganjil). Untuk $n = 2k - 1$, periksa bahwa

$$v(x_1, \dots, x_{2k}) = (-x_2, x_1, \dots, -x_{2k}, x_{2k-1})$$

kontinu, tangen, berpanjang satu, dan tidak pernah nol pada S^{2k-1} .

Petunjuk. Kelompokkan koordinat menjadi pasangan (x_{2j-1}, x_{2j}) dan hitung hasil kali titik serta norma pada setiap pasangan.

Solusi Pemeriksaan 30.6. Rumus v linear, jadi kontinu. Untuk setiap pasangan,

$$(x_{2j-1}, x_{2j}) \cdot (-x_{2j}, x_{2j-1}) = 0.$$

Menjumlahkan memberi $x \cdot v(x) = 0$, sehingga $v(x) \in T_x S^{2k-1}$. Selain itu,

$$\|v(x)\|^2 = \sum_j (x_{2j}^2 + x_{2j-1}^2) = \|x\|^2 = 1.$$

Jadi $v(x)$ tidak pernah nol. Rumus tersebut adalah rotasi seperempat putaran pada setiap bidang koordinat $\mathbb{R}^2$.

Batas akhir sumber Roberts. Unit 30 menerjemahkan Notes.tex baris 6271–6368 secara kontigu, termasuk `\end{document}` sebagai penanda akhir tanpa isi pembaca. Tidak ada Kuliah 31 dalam sumber beku. Kursor berikutnya adalah **EOF setelah Notes.tex baris 6368** (posisi nominal baris 6369).

Komponen Fomberg O012-FOM-001

Bagian 1.1–1.2; dipetakan ke D60-R08.

Tentang komponen ini

Komponen ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas bagian awal *Algebraic Topology* karya Yeheli Fomberg, berdasarkan kuliah Nir Lazarovich pada musim semi 2025. Otoritas sumber dibekukan pada commit [563194fae879178b9a6871b249513bfc27968975](#). Rentang yang diterjemahkan ialah baris 31–614, Bagian 1.1–1.2: 584 baris fisik, 21.875 byte setelah normalisasi LF dan satu LF penutup, dengan SHA-256 68cb0dea7aa24a42e979877a95acf61b8152c87ed86d88ad7deac7cb5cea2fe3.

Catatan sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](#). Terjemahan, pemformatan semantik, koreksi terbatas, dan materi penguasaan asli di bawah ini diterbitkan dengan lisensi yang sama. Perubahan meliputi penerjemahan, pemberian pengenalan stabil, penggambaran ulang diagram secara reflow dan dapat diakses, serta pembetulan salah ketik yang dicatat satu per satu dalam audit. Blok yang seluruhnya dikomentari sebagai rencana “akan ditambahkan” dalam TeX tidak diperlakukan sebagai isi pembaca.

Edisi ini independen dan tidak menyiratkan dukungan, pengesahan, atau afiliasi dengan Yeheli Fomberg, Nir Lazarovich, ataupun institusi mereka. Produksi terjemahan, struktur semantik, dan QA dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra** atas arahan pengguna. Tidak ada prosa dari bank soal Fomberg yang dikecualikan ataupun materi MIT yang disalin ke unit ini.

31 Homologi

31.1 Kompleks- Δ

Dalam topologi aljabar, kita mempelajari pemetaan yang membawa ruang topologis ke data aljabar:

$$\{\text{ruang topologis}\} \longrightarrow \{\text{data aljabar}\}.$$

Salah satu contohnya ialah pemetaan $\pi_0(X)$ yang muncul dalam topologi himpunan-titik:

$$X \longmapsto \pi_0(X) = \{\text{komponen terhubung lintasan}\}.$$

Contoh lain ialah $\pi_1(X)$:

$$(X, x_0) \mapsto \pi_1(X, x_0) = \{\text{grup fundamental } X \text{ dengan titik dasar } x_0\}.$$

Catatan. Untuk $n \geq 1$ dan ruang bertitik (X, x_0) , unsur $\pi_n(X, x_0)$ adalah kelas homotopi bertitik dari pemetaan bertitik

$$(S^n, s_0) \longrightarrow (X, x_0),$$

bukan pemetaan mentah tanpa relasi homotopi.

Audit sumber. Baris 49 hanya mengatakan bahwa unsur π_n “adalah pemetaan dari S^n ”. Edisi menambahkan titik dasar dan kelas homotopi yang diperlukan oleh definisi grup homotopi.

Definisi (vektor bebas afin). Misalkan $v_0, \dots, v_n \in \mathbb{R}^m$ dengan $n \leq m$. Vektor-vektor ini disebut **bebas afin** jika

$$v_1 - v_0, \dots, v_n - v_0$$

bebas linear.

Audit sumber. Baris 53 menempatkan $v_0, \dots, v_n$ hanya di $\mathbb{R}^n$, sedangkan definisi simpleks berikutnya memakai ruang ambien $\mathbb{R}^m$. Edisi menyatakan bentuk umum yang konsisten: $v_i \in \mathbb{R}^m$ dengan syarat dimensi perlu $n \leq m$.

Definisi (simpleks- n). Sebuah **simpleks- n** ialah selubung konveks dari $n + 1$ titik bebas afin di $\mathbb{R}^m$.

Contoh. Simpleks-0 adalah sebuah titik; simpleks-1 adalah sebuah ruas; simpleks-2 adalah sebuah segitiga; dan simpleks-3 adalah sebuah tetrahedron.

Definisi (simpleks- n standar). Simpleks- n standar ialah selubung konveks dari $n + 1$ vektor satuan di $\mathbb{R}^{n+1}$:

$$\Delta^n := [e_0, \dots, e_n].$$

Audit sumber. Baris 74 memakai glif segitiga yang berbeda dan indeks akhir N , sedangkan bagian selanjutnya memakai Δ^n . Indeks akhir harus n , sesuai frasa “ $n + 1$ vektor satuan”, dan simbol simpleks perlu konsisten. Edisi menormalkan bentuknya menjadi $\Delta^n = [e_0, \dots, e_n]$.

Catatan. Simpleks Δ^n memparametrisasi setiap simpleks- n lain. Untuk $[v_0, \dots, v_n]$, pemetaannya ialah

$$(t_0, t_1, \dots, t_n) \mapsto \sum_{i=0}^n t_i v_i.$$

Definisi (pemetaan barisentris). Pemetaan

$$b_{[v_0, \dots, v_n]}: \Delta^n \longrightarrow [v_0, \dots, v_n]$$

disebut **pemetaan barisentris**. Rumusnya

$$b_{[v_0, \dots, v_n]}(t_0, t_1, \dots, t_n) = \sum_{i=0}^n t_i v_i.$$

Definisi (muka). Untuk setiap $0 \leq i \leq n$, muka ke- i dari $[v_0, \dots, v_n]$ ialah

$$[v_0, \dots, \widehat{v_i}, \dots, v_n] = [v_0, \dots, v_{i-1}, v_{i+1}, \dots, v_n].$$

Audit sumber. Baris 95–101 memulai daftar pada v_1 dan membatasi indeks ke $1 \leq i \leq n$, sedangkan semua penggunaan berikutnya memakai $v_0, \dots, v_n$ dan $0 \leq i \leq n$. Edisi menyelaraskan definisi dengan konvensi berikutnya.

Catatan. Setiap muka dari $[v_0, \dots, v_n]$ merupakan simpleks- $(n-1)$. Urutan simpul pada muka diwarisi dari urutan simpleks- n semula.

Definisi (batas simpleks). Misalkan Δ^n sebuah simpleks. Batasnya didefinisikan oleh

$$\partial\Delta^n = \bigcup \{\text{muka-muka } \Delta^n\}.$$

Bagian dalam simpleks ialah

$$\mathring{\Delta}^n = \Delta^n - \partial\Delta^n.$$

Definisi (kompleks- Δ). Struktur kompleks- Δ pada ruang topologis X ialah suatu koleksi pemetaan kontinu

$$\{\sigma_\alpha: \Delta^{n_\alpha} \rightarrow X\}_\alpha$$

yang memenuhi:

1. pembatasan $\sigma_\alpha|_{\mathring{\Delta}^{n_\alpha}}$ injektif, dan setiap $x \in X$ berada dalam citra tepat satu pembatasan semacam itu;
2. pembatasan σ_α pada suatu muka Δ^{n_α} sama dengan suatu σ_β setelah identifikasi afin standar muka tersebut; dan
3. $U \subset X$ terbuka jika dan hanya jika $\sigma_\alpha^{-1}(U) \subset \Delta^{n_\alpha}$ terbuka untuk setiap α .

Catatan tentang syarat 2. Dalam [definisi kompleks- \$\Delta\$](#) , pernyataan itu berarti

$$\sigma_\beta = \sigma_\alpha \circ b_{[v_0, \dots, \widehat{v_i}, \dots, v_n]}: \Delta^{n-1} \longrightarrow X,$$

yang ekuivalen dengan pembatasan σ_α pada muka ke- i .

Catatan notasi. Kadang-kadang Δ_n menyatakan himpunan semua simpleks berdimensi n . Jadi Δ_0 adalah himpunan semua simpul, Δ_1 himpunan semua sisi, dan seterusnya.

Contoh (kompleks- Δ pada S^1). Ambil S^1 , lingkaran satuan dalam $\mathbb{R}^2$. Strukturnya terdiri atas

$$v: \Delta^0 \rightarrow S^1, \quad e: \Delta^1 \rightarrow S^1.$$

Pemetaan v membawa satu-satunya titik Δ^0 ke simpul v . Pemetaan e membawa bagian dalam interval $\Delta^1 = [v_0, v_1]$ satu-satu ke lingkaran tanpa v , sedangkan kedua titik ujungnya dibawa ke v .

Gambar semantik (lingkaran satu simpul). Sebuah loop terarah searah jarum jam berlabel e berawal dan berakhir pada satu simpul berlabel v . Ini menggambar ulang panah melingkar dan satu titik yang terdapat dalam TikZ sumber, sambil mempertahankan data pelekatan kedua ujung e ke v .

Catatan (bukan contoh bagi topologi standar). Jangan memberi satu simpleks-0 yang berbeda kepada setiap titik S^1 . Syarat 3 pada [definisi kompleks- \$\Delta\$](#) akan membuat setiap subhimpunan S^1

terbuka. Struktur patologis itu bukan kompleks- Δ bagi lingkaran dengan topologi standarnya, tetapi sah bagi himpunan titik yang sama dengan topologi diskret.

Contoh (kompleks- Δ pada torus T^2). Ambil $T^2 = S^1 \times S^1$. Model persegi yang sisi-sisi berhadapannya diidentifikasi dibelah oleh diagonal menjadi dua segitiga. Struktur kompleks- Δ terdiri atas

$$r: \Delta^0 \rightarrow T^2, \quad e, f, g: \Delta^1 \rightarrow T^2, \quad V, L: \Delta^2 \rightarrow T^2.$$

Keempat sudut persegi mewakili simpul r . Pasangan sisi tegak berlabel e , pasangan sisi mendatar berlabel f , dan diagonal berlabel g . Segitiga atas berlabel V dan segitiga bawah berlabel L .

Gambar semantik (persegi fundamental torus). Persegi dibelah oleh diagonal dari sudut kiri bawah ke sudut kanan atas. Keempat sudut diidentifikasi menjadi r ; sisi-sisi tegak menjadi e dan sisi-sisi mendatar menjadi f . Kedua sisi mendatar berarah ke kanan, kedua sisi tegak berarah ke atas, dan diagonal g berarah dari sudut kiri bawah ke sudut kanan atas. Daerah kiri-atas V diberi orientasi searah jarum jam, sedangkan daerah kanan-bawah L diberi orientasi berlawanan arah jarum jam. Arsiran berbeda pada kedua segitiga dalam sumber berfungsi membedakan V dan L .

Audit sumber. Judul contoh pada baris 183 mencetak T^1 , tetapi baris 184 mendefinisikan $T = S^1 \times S^1$, yaitu torus dua-dimensi T^2 . Edisi memakai T^2 .

Contoh (kompleks- Δ pada $\mathbb{RP}^2$). Tulis

$$\mathbb{RP}^2 := D^2 / (x \sim -x \text{ untuk setiap } x \in S^1).$$

Model persegi yang ditriangulasi memberi koleksi

$$r, w: \Delta^0 \rightarrow \mathbb{RP}^2, \quad e, f, g: \Delta^1 \rightarrow \mathbb{RP}^2, \quad V, L: \Delta^2 \rightarrow \mathbb{RP}^2.$$

Model cakram di sebelah kanan gambar sumber hanyalah ruang hasil bagi yang mewakili bidang projektif real; model cakram itu sendiri bukan kompleks- Δ yang sedang dinyatakan.

Gambar semantik (dua model $\mathbb{RP}^2$).

1. Pada model kiri, sebuah persegi dibelah oleh diagonal kiri-bawah ke kanan-atas. Sudut kiri-bawah dan kanan-atas berlabel r ; dua sudut lain berlabel w . Sisi tegak berlabel e , sisi mendatar berlabel f , diagonal berlabel g , dan kedua segitiga berlabel V serta L . Sisi atas berarah ke kiri sedangkan sisi bawah berarah ke kanan; sisi kiri berarah ke atas sedangkan sisi kanan berarah ke bawah. Pasangan arah berlawanan inilah yang mencatat identifikasi sisi pada model persegi $\mathbb{RP}^2$.
2. Pada model kanan, sebuah cakram mempunyai pasangan titik antipodal pada lingkaran batas yang diidentifikasi. Busur batas berlabel e ; panah yang ditandai pada sisi kiri lingkaran mengarah ke bawah, sedangkan panah pada sisi kanan mengarah ke atas. Model ini menjelaskan hasil bagi $D^2 / (x \sim -x)$ tanpa memerlukan gambar sumber untuk memulihkan arah.

Catatan (orientasi muka). Dalam [contoh \$\mathbb{RP}^2\$](#) , semua sisi pada muka V dan L harus muncul dalam urutan yang tepat. Jika

$$V: [v_0, v_1, v_2] \longrightarrow \mathbb{RP}^2,$$

maka syarat 2 pada [definisi kompleks- \$\Delta\$](#) menuntut agar

$$V|_{[v_0, v_1]}, \quad V|_{[v_1, v_2]}, \quad V|_{[v_0, v_2]}$$

semuanya merupakan pemetaan dalam kompleks- Δ . Panah melingkar pada gambar mencatat apakah urutan v_0, v_1, v_2 searah atau berlawanan arah jarum jam. Dalam kasus yang digambar, orientasi V berlawanan arah jarum jam dan

$$V|_{[v_0, v_1]} = g, \quad V|_{[v_1, v_2]} = f, \quad V|_{[v_0, v_2]} = e.$$

Karena itu semua sisi yang diperlukan memang ada. Tanpa kecocokan ini, struktur tersebut bukan kompleks- Δ .

Catatan. Ruang X ditentukan oleh data kompleks- Δ : kompleks CW yang dihasilkan oleh data tersebut homeomorfik dengan X .

Definisi (kompleks simpleksial). Sebuah **kompleks simpleksial** ialah kompleks- Δ sedemikian sehingga setiap simpleks $\sigma_\alpha: \Delta^n \rightarrow X$ memenuhi:

1. σ_α injektif; cukup memeriksa keinjektifannya pada simpul; dan
2. σ_α ditentukan oleh simpul-simpulnya.

Contoh. Segitiga dengan tiga simpul v_0, v_1, v_2 , tiga sisi berorientasi $[v_0, v_1]$, $[v_1, v_2]$, $[v_0, v_2]$, dan satu muka $[v_0, v_1, v_2]$ adalah salah satu contoh paling sederhana.

Gambar semantik (segitiga berorientasi). Simpul v_0 berada di kiri bawah, v_1 di kanan bawah, dan v_2 di kanan atas. Panah sisi berjalan $v_0 \rightarrow v_1$, $v_1 \rightarrow v_2$, dan $v_0 \rightarrow v_2$, tepat seperti pada TikZ sumber.

Bukan contoh kompleks simpleksial. Dua kompleks- Δ berikut bukan kompleks simpleksial.

1. Satu loop e dengan satu simpul r gagal memenuhi syarat 1 karena $e: \Delta^1 \rightarrow X$ tidak injektif.
2. Dua sisi berbeda e dan f yang menghubungkan pasangan simpul yang sama v_0, v_1 gagal memenuhi syarat 2 karena simpul-simpulnya tidak menentukan apakah simpleks itu e atau f .

Gambar semantik (dua contoh yang bukan kompleks simpleksial). Gambar kiri ialah satu sisi melingkar e yang kedua ujungnya melekat pada r . Gambar kanan ialah dua busur sejajar e dan f dari v_0 ke v_1 . Kedua gambar mempertahankan titik, label, dan arah panah TikZ sumber.

Catatan. Kompleks simpleksial menggeneralisasi graf sederhana.

Catatan. Setiap ruang dapat ditutupi dengan memakai satu simpul bagi setiap titik X , tetapi struktur yang dihasilkan adalah kompleks- Δ pada himpunan X yang diberi topologi diskret.

31.2 Homologi simpleksial

Definisi (rantai). Misalkan X ruang topologis dengan struktur kompleks- Δ

$$\{\sigma_\alpha^{n_\alpha}: \Delta^{n_\alpha} \rightarrow X\}_\alpha.$$

Untuk setiap $n \geq 0$, grup $C_n^\Delta(X)$ dapat ditulis dengan salah satu bentuk ekuivalen berikut:

$$\begin{aligned} C_n^\Delta(X) &:= \text{grup abelian bebas dengan basis } \{\sigma_\alpha^n\}_\alpha \\ &:= \bigoplus_\alpha \mathbb{Z}\sigma_\alpha^n \\ &:= \text{span}_{\mathbb{Z}}\{\sigma_\alpha^n\}_\alpha \\ &:= \left\{ \sum_\alpha c_\alpha \sigma_\alpha^n \mid c_\alpha \in \mathbb{Z}, c_\alpha = 0 \text{ kecuali untuk berhingga banyak } \alpha \right\}. \end{aligned}$$

Audit sumber. Baris 350 menyatakan $n \geq 1$, tetapi contoh berikutnya memakai $C_0^\Delta(X)$. Definisi standar dan pemakaian sumber menuntut $n \geq 0$; edisi memakai rentang tersebut.

Catatan. Unsur $C_n^\Delta(X)$ disebut **rantai- n** .

Contoh (rantai pada S^1). Untuk kompleks- Δ lingkaran satu simpul dan satu sisi pada [contoh sebelumnya](#),

$$C_0^\Delta(S^1) = \mathbb{Z}v, \quad C_1^\Delta(S^1) = \mathbb{Z}e,$$

sedangkan $C_n^\Delta(S^1) = \{0\}$ untuk setiap $n \geq 2$.

Gambar semantik (rantai lingkaran). Sumber mengulang gambar loop e searah jarum jam yang kedua ujungnya melekat pada simpul v ; data rantai derajat nol dan satu di atas adalah pembacaan aljabarnya.

Definisi (pemetaan batas). Untuk $n \geq 1$, pada unsur basis definisikan

$$\partial_n: C_n^\Delta(X) \longrightarrow C_{n-1}^\Delta(X), \quad \partial_n \sigma = \sum_{i=0}^n (-1)^i \sigma|_{[v_0, \dots, \widehat{v_i}, \dots, v_n]},$$

lalu perluas secara linear. Tetapkan pula $\partial_0: C_0^\Delta(X) \rightarrow 0$ sebagai pemetaan nol; secara ekuivalen, ambil $C_{-1}^\Delta(X) = 0$.

Catatan. Pemetaan batas adalah homomorfisma grup.

Contoh (batas sisi dan segitiga). Pandang objek berikut sebagai rantai dalam suatu kompleks- Δ .

Untuk sisi berorientasi $e = [v_0, v_1]$,

$$\partial_1(e) = e|_{[v_1]} - e|_{[v_0]} = v_1 - v_0.$$

Untuk simpleks-2 berorientasi $\sigma = [v_0, v_1, v_2]$, dengan label sisi e_0, e_1, e_2 seperti pada gambar,

$$\begin{aligned} \partial_2(\sigma) &= \sigma|_{[v_1, v_2]} - \sigma|_{[v_0, v_2]} + \sigma|_{[v_0, v_1]} \\ &= e_0 - e_1 + e_2. \end{aligned}$$

Dalam praktik, rumus ini dapat dibaca dari orientasi: sebuah sisi mendapat tanda minus jika orientasi yang diwarisinya berlawanan dengan orientasi sisi yang dipilih.

Gambar semantik (sisi dan muka). Gambar kiri ialah panah $v_0 \xrightarrow{e} v_1$. Gambar kanan ialah segitiga $[v_0, v_1, v_2]$ berorientasi berlawanan arah jarum jam; sisi bawah $v_0 \rightarrow v_1$ berlabel e_2 , sisi kanan $v_1 \rightarrow v_2$ berlabel e_0 , dan diagonal $v_0 \rightarrow v_2$ berlabel e_1 . Karena diagonal dipakai dengan arah yang berlawanan saat menelusuri batas, tandanya negatif.

Audit sumber. Baris 418 memakai simbol σ untuk pembatasan sisi e , dan baris 422 mencetak $\sigma(\sigma)$ alih-alih $\partial_2(\sigma)$. Bentuk sumber $e_2 + e_0 - e_1$ identik secara aljabar dengan $e_0 - e_1 + e_2$; edisi hanya mengurutkan kembali sukunya agar mengikuti urutan indeks muka, tanpa mengklaim perubahan matematis pada tanda.

Contoh (pemetaan batas pada S^1). Untuk kompleks- Δ lingkaran,

$$\partial_1: \mathbb{Z}e \longrightarrow \mathbb{Z}v.$$

Jika $a \in \mathbb{Z}$, maka

$$\partial_1(ae) = a \partial_1(e) = a(v - v) = 0.$$

Jadi $\partial_1 = 0$.

Gambar semantik (batas loop). Sumber kembali menggambar loop e searah jarum jam dengan satu simpul v . Kedua titik ujung simpleks standar mempunyai citra yang sama, sehingga kedua suku batas saling meniadakan.

Audit sumber. Baris 443 mencetak $a \in Z$, dan baris 445–447 memakai σ_1 sebagai operator batas. Edisi menuliskan $a \in \mathbb{Z}$ dan ∂_1 .

Contoh (pemetaan batas pada torus). Untuk kompleks- Δ torus, kompleks rantainya mempunyai bentuk

$$\{0\} \xrightarrow{\partial_3} \mathbb{Z}V \oplus \mathbb{Z}L \xrightarrow{\partial_2} \mathbb{Z}e \oplus \mathbb{Z}f \oplus \mathbb{Z}g \xrightarrow{\partial_1} \mathbb{Z}r.$$

Pada derajat satu,

$$\partial_1(e) = r - r = 0, \quad \partial_1(f) = r - r = 0, \quad \partial_1(g) = r - r = 0.$$

Pada derajat dua,

$$\partial_2(V) = e + f - g, \quad \partial_2(L) = f + e - g.$$

Gambar semantik (torus dan kompleks rantainya). Sumber mengulang persegi fundamental yang dibelah diagonal, dengan simpul r , sisi e, f, g , muka V, L , pasangan panah sisi, arsiran, dan orientasi muka yang sama seperti [gambar torus sebelumnya](#). Di bawahnya, diagram $0 \rightarrow C_2 \rightarrow C_1 \rightarrow C_0$ menempatkan tepat grup-grup dan pemetaan batas yang ditulis di atas.

Catatan. Pemetaan karakteristik V mempunyai domain simpleks-2 $[v_0, v_1, v_2]$; muka-mukanya ialah pembatasan V pada ketiga simpleks-1 $[v_0, v_1]$, $[v_1, v_2]$, dan $[v_0, v_2]$. Walaupun semua sudut model torus dibawa ke titik r yang sama, orientasi sisi telah menentukan setiap pembatasan muka, sebagaimana dijelaskan dalam [catatan orientasi](#). Itulah yang menentukan tanda sisi, misalnya kemunculan $-g$ pada batas V .

Audit sumber. Baris 504 menulis pembatasan muka sebagai $V|_{[v_0, v_1]} = -g$. Tanda negatif tidak membentuk pemetaan karakteristik simpleks baru: pembatasan mukanya tetap pemetaan simpleks g (dengan parametrisasi muka yang ditentukan), sedangkan $-g$ hanya berarti koefisien rantai yang muncul setelah orientasi muka dibandingkan dengan orientasi basis g . Edisi memisahkan kedua tingkat ini.

Lema. Untuk setiap $n \geq 1$,

$$\partial_{n-1} \circ \partial_n = 0.$$

Bukti. Pernyataan dimaksudkan untuk $n \geq 1$. Kasus $n = 1$ langsung karena $\partial_0 = 0$. Untuk $n \geq 2$, cukup periksa unsur basis. Ambil $\sigma = [v_0, \dots, v_n] \in C_n^\Delta(X)$. Dari definisi,

$$\partial_n \sigma = \sum_{i=0}^n (-1)^i \sigma|_{[v_0, \dots, \widehat{v_i}, \dots, v_n]}.$$

Menerapkan ∂_{n-1} sekali lagi memberi

$$\begin{aligned}
(\partial_{n-1}\partial_n)(\sigma) &= \sum_{i=0}^n \sum_{j<i} (-1)^{i+j} \sigma|_{[v_0, \dots, \widehat{v_j}, \dots, \widehat{v_i}, \dots, v_n]} \\
&\quad + \sum_{i=0}^n \sum_{j>i} (-1)^{i+j-1} \sigma|_{[v_0, \dots, \widehat{v_i}, \dots, \widehat{v_j}, \dots, v_n]}.
\end{aligned}$$

Untuk setiap pasangan $p < q$, muka yang menghapus v_p dan v_q muncul dua kali: sekali dengan koefisien $(-1)^{p+q}$ dan sekali dengan koefisien $(-1)^{p+q-1}$. Kedua koefisien berjumlah nol. Semua suku berpasangan dengan cara ini, sehingga

$$(\partial_{n-1} \circ \partial_n)(\sigma) = 0.$$

Karena pemetaan batas linear, kesimpulan berlaku bagi setiap rantai. $\square$

Audit sumber. Baris 523 menempatkan σ dalam $C_{n+1}(X)$ tetapi menuliskannya dengan $n+1$ simpul dan kemudian menerapkan ∂_n ; bentuk bertipe benar ialah $\sigma \in C_n(X)$. Baris 536–546 menghapus $\widehat{v_j}$ dua kali dan tidak menuliskan dua indeks muka yang berbeda. Edisi mempertahankan argumen pembatalan berpasangan sumber dan menuliskan kedua indeksnya secara eksplisit.

Definisi (siklus). Definisikan

$$Z_n^\Delta(X) := \ker \partial_n.$$

Unsur $Z_n^\Delta(X)$ disebut **siklus** atau **siklus- n** .

Definisi (batas). Dengan konvensi standar yang bertipe benar, definisikan

$$B_n^\Delta(X) := \operatorname{im}(\partial_{n+1} : C_{n+1}^\Delta(X) \rightarrow C_n^\Delta(X)).$$

Unsur $B_n^\Delta(X)$ disebut **batas- n** .

Akibat. Dari [lema \$\partial^2 = 0\$](#) ,

$$B_n^\Delta(X) \subseteq Z_n^\Delta(X).$$

Definisi (homologi). Homologi ke- n didefinisikan sebagai

$$H_n^\Delta(X) = Z_n^\Delta(X) / B_n^\Delta(X).$$

Unsur $H_n^\Delta(X)$ disebut **kelas homologi**.

Diagram rantai sumber. Tepat sesudah definisi homologi, sumber menampilkan diagram tanpa keterangan tambahan:

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\partial_2} \mathbb{Z}^3 \xrightarrow{\partial_1} \mathbb{Z}^3 \longrightarrow 0.$$

Urutan grup, label ∂_2, ∂_1 , dan kedua suku nol dipertahankan sebagaimana dicetak.

Definisi (siklus homolog). Misalkan $z_1, z_2 \in Z_n^\Delta(X)$. Kita menulis $z_1 \sim z_2$ dan mengatakan bahwa z_1 serta z_2 **homolog** jika

$$[z_1] = [z_2] \in H_n^\Delta(X).$$

Ini ekuivalen dengan

$$z_1 - z_2 \in B_n^\Delta(X).$$

Kelas-kelas ekuivalensi ini disebut kelas homologi.

Audit sumber. Baris 582 mencetak syarat $z_1 - z_2 \in B_n(X)$. Namun baris 555–582 sebelumnya mendefinisikan $B_n = \text{im } \partial_n$, kemudian memakai $H_n = Z_n/B_{n+1}$, lalu kembali ke B_n pada kalimat siklus homolog. Ketiga pemakaian itu tidak konsisten satu sama lain dan $\text{im } \partial_n$ berada di C_{n-1} , bukan C_n . Edisi menormalkan seluruh rangkaian menjadi konvensi standar $B_n = \text{im } \partial_{n+1} \subseteq C_n$, $B_n \subseteq Z_n$, $H_n = Z_n/B_n$, dan $z_1 - z_2 \in B_n$.

Catatan. Untuk ruang terhubung lintasan X dengan titik dasar x_0 , homologi singular memenuhi

$$H_1^{\text{sing}}(X; \mathbb{Z}) \cong \pi_1(X, x_0)^{\text{ab}},$$

yaitu homologi singular pertama adalah abelianisasi grup fundamental. Bagi kompleks- Δ , teorema perbandingan yang akan dibuktikan kemudian memberi $H_1^\Delta(X; \mathbb{Z}) \cong H_1^{\text{sing}}(X; \mathbb{Z})$, sehingga pernyataan yang sama berlaku untuk homologi simpleksial setelah jembatan itu tersedia.

Audit sumber. Baris 611 mencetak $H^1(X)$, tetapi abelianisasi $\pi_1(X)$ secara kanonik adalah homologi singular pertama $H_1^{\text{sing}}(X; \mathbb{Z})$, bukan kohomologi pertama. Edisi membetulkan subskrip, menuliskan koefisien, menyatakan hipotesis keterhubungan lintasan serta titik dasar, dan menandai teorema perbandingan yang diperlukan sebelum simbol itu dapat diidentifikasi dengan H_1^Δ .

Lapisan penguasaan edisi

Bagian ini ditulis khusus untuk edisi bahasa Indonesia dan bukan bagian dari catatan Fomberg. Keenam pemeriksaan berikut memetakan kompetensi kompleks- Δ , rantai, batas, siklus, dan homologi pada rute D60-R08.

Pemeriksaan Penguasaan F1.1 (koordinat barisentris). Ambil

$$v_0 = (0, 0), \quad v_1 = (2, 0), \quad v_2 = (0, 3).$$

1. Periksa bahwa ketiga titik bebas afn.
2. Tulis $x = (1/2, 3/4)$ dalam bentuk $x = t_0 v_0 + t_1 v_1 + t_2 v_2$ dengan $t_i \geq 0$ dan $t_0 + t_1 + t_2 = 1$.
3. Tentukan apakah x berada pada batas atau bagian dalam segitiga.

Petunjuk. Periksa kebebasan linear $v_1 - v_0, v_2 - v_0$, lalu baca kedua koordinat x untuk menemukan t_1, t_2 .

Solusi Pemeriksaan F1.1. Kita mempunyai

$$v_1 - v_0 = (2, 0), \quad v_2 - v_0 = (0, 3).$$

Determinan matriks dengan kedua kolom itu adalah $6 \neq 0$, sehingga keduanya bebas linear dan v_0, v_1, v_2 bebas afn. Persamaan koordinat memberi $2t_1 = 1/2$ dan $3t_2 = 3/4$, jadi

$$t_1 = \frac{1}{4}, \quad t_2 = \frac{1}{4}, \quad t_0 = 1 - t_1 - t_2 = \frac{1}{2}.$$

Semua koefisien positif. Karena titik batas mempunyai setidaknya satu koefisien barisentris nol, x berada di bagian dalam segitiga.

Pemeriksaan Penguasaan F1.2 (lingkaran sebagai kompleks- Δ). Jelaskan mengapa satu simpul v dan satu sisi e yang kedua ujungnya dilekatkan ke v membentuk kompleks- Δ pada S^1 , tetapi bukan kompleks simpleksial. Jelaskan pula mengapa satu simpleks-0 bagi setiap titik lingkaran menghasilkan topologi diskret.

Petunjuk. Periksa tiga syarat kompleks- Δ secara berurutan. Untuk kompleks simpleksial, tanyakan apakah $e: \Delta^1 \rightarrow S^1$ injektif.

Solusi Pemeriksaan F1.2. Bagian dalam Δ^1 dipetakan injektif ke $S^1 - \{v\}$, sedangkan bagian dalam Δ^0 memetakan ke v ; kedua citra itu saling lepas dan menutupi S^1 . Kedua muka Δ^1 , yakni kedua titik ujung, membatasi menjadi pemetaan simpul v . Topologi akhir terhadap v dan e adalah topologi lingkaran standar, sehingga ketiga syarat kompleks- Δ terpenuhi.

Namun e tidak injektif pada seluruh Δ^1 , sebab kedua titik ujung mempunyai citra v yang sama. Jadi syarat pertama kompleks simpleksial gagal. Jika setiap titik dijadikan simpleks-0 tersendiri, prapeta setiap $U \subseteq S^1$ pada setiap simpleks-0 selalu terbuka. Syarat topologi akhir lalu menyatakan setiap U terbuka; itulah topologi diskret.

Pemeriksaan Penguasaan F1.3 (batas segitiga). Untuk $\sigma = [v_0, v_1, v_2]$, hitung $\partial_2 \sigma$, lalu hitung $\partial_1 \partial_2 \sigma$ secara eksplisit.

Petunjuk. Gunakan $\partial[v_i, v_j] = [v_j] - [v_i]$ pada masing-masing dari tiga muka.

Solusi Pemeriksaan F1.3. Rumus tanda berselang-seling memberi

$$\partial_2 \sigma = [v_1, v_2] - [v_0, v_2] + [v_0, v_1].$$

Karena itu

$$\begin{aligned} \partial_1 \partial_2 \sigma &= ([v_2] - [v_1]) - ([v_2] - [v_0]) + ([v_1] - [v_0]) \\ &= [v_2] - [v_1] - [v_2] + [v_0] + [v_1] - [v_0] \\ &= 0. \end{aligned}$$

Setiap simpul muncul dua kali dengan tanda berlawanan.

Pemeriksaan Penguasaan F1.4 (homologi lingkaran). Gunakan kompleks- Δ satu simpul dan satu sisi untuk menghitung semua $H_n^\Delta(S^1)$ dengan koefisien $\mathbb{Z}$.

Petunjuk. Hanya $C_1 = \mathbb{Z}e$ dan $C_0 = \mathbb{Z}v$ yang tak nol, dan $\partial_1(e) = 0$.

Solusi Pemeriksaan F1.4. Karena $\partial_1 = 0$,

$$Z_1 = \ker \partial_1 = \mathbb{Z}e, \quad B_1 = \operatorname{im} \partial_2 = 0.$$

Maka $H_1^\Delta(S^1) = Z_1/B_1 \cong \mathbb{Z}$. Pada derajat nol, $Z_0 = C_0 = \mathbb{Z}v$ dan $B_0 = \operatorname{im} \partial_1 = 0$, sehingga $H_0^\Delta(S^1) \cong \mathbb{Z}$. Untuk $n \geq 2$, $C_n = 0$, jadi $H_n^\Delta(S^1) = 0$.

Pemeriksaan Penguasaan F1.5 (homologi torus dari matriks batas). Untuk kompleks torus sumber, gunakan

$$\partial_2(V) = \partial_2(L) = e + f - g, \quad \partial_1 = 0,$$

untuk menentukan $H_2^\Delta(T^2)$, $H_1^\Delta(T^2)$, dan $H_0^\Delta(T^2)$.

Petunjuk. Dalam basis (V, L) dan (e, f, g) , kedua kolom matriks ∂_2 sama dengan $(1, 1, -1)^\top$. Vektor ini primitif dalam $\mathbb{Z}^3$.

Solusi Pemeriksaan F1.5. Untuk $a, b \in \mathbb{Z}$,

$$\partial_2(aV + bL) = (a + b)(e + f - g).$$

Jadi

$$\ker \partial_2 = \mathbb{Z}(V - L), \quad \text{im } \partial_2 = \mathbb{Z}(e + f - g).$$

Karena $C_3 = 0$, diperoleh

$$H_2^\Delta(T^2) = \ker \partial_2 / \text{im } \partial_3 \cong \mathbb{Z}.$$

Selanjutnya $\ker \partial_1 = C_1 \cong \mathbb{Z}^3$. Vektor $(1, 1, -1)$ primitif, sehingga dapat diperluas menjadi basis $\mathbb{Z}^3$ dan

$$H_1^\Delta(T^2) = \mathbb{Z}^3 / \mathbb{Z}(1, 1, -1) \cong \mathbb{Z}^2.$$

Terakhir, $\partial_1 = 0$ memberi $H_0^\Delta(T^2) = \mathbb{Z}r \cong \mathbb{Z}$.

Pemeriksaan Penguasaan F1.6 (kelas homolog pada torus). Dalam $C_1^\Delta(T^2)$, ambil

$$z_1 = e, \quad z_2 = g - f.$$

1. Periksa bahwa keduanya siklus.
2. Tentukan apakah keduanya homolog.
3. Tentukan apakah e dan f homolog.

Petunjuk. Semua rantai-1 adalah siklus karena $\partial_1 = 0$. Dua siklus homolog tepat ketika selisihnya merupakan kelipatan $e + f - g = \partial_2(V)$.

Solusi Pemeriksaan F1.6. Karena $\partial_1 = 0$, z_1, z_2, e, f semuanya siklus. Selisih pasangan pertama ialah

$$z_1 - z_2 = e - (g - f) = e + f - g = \partial_2(V),$$

sehingga $z_1 \sim z_2$. Sebaliknya, jika e dan f homolog, harus ada $k \in \mathbb{Z}$ dengan

$$e - f = k(e + f - g).$$

Membandingkan koefisien g memberi $k = 0$, tetapi kemudian koefisien e di ruas kiri adalah 1 dan di ruas kanan 0, kontradiksi. Jadi e dan f tidak homolog.

Batas sumber komponen. Unit ini menerjemahkan algebraic_topology.tex baris 31–614 secara kontigu, dari judul Bagian “Homology” sampai catatan tentang abelianisasi π_1 . Kursor komponen berikutnya adalah baris 615, awal Bagian 1.3 tentang homologi singular.

Komponen Fomberg O012-FOM-002

Bagian 1.3–1.4; dipetakan ke D60-R09.

Tentang komponen ini

Komponen ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas Bagian 1.3–1.4 *Algebraic Topology* karya Yeheli Fomberg, berdasarkan kuliah Nir Lazarovich pada musim semi 2025. Otoritas sumber dibekukan pada commit [563194fae879178b9a6871b249513bfc27968975](#). Rentang yang diterjemahkan ialah baris 615–1290: 676 baris fisik, 22.924 byte setelah normalisasi LF dan satu LF penutup, dengan SHA-256 9b28e159825e020b262a51b9c50372b2fadc26270fab6480d860aaaeefdda84f.

Catatan sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](#). Terjemahan, pemformatan semantik, koreksi terbatas, tiga perbaikan bukti, dan materi penguasaan asli di bawah ini diterbitkan dengan lisensi yang sama. Perubahan dicatat secara eksplisit dalam blok audit dan ledger; tidak ada prosa dari bank soal Fomberg yang dikecualikan ataupun materi MIT yang disalin.

Edisi ini independen dan tidak menyiratkan dukungan, pengesahan, atau afiliasi dengan Yeheli Fomberg, Nir Lazarovich, ataupun institusi mereka. Produksi terjemahan, struktur semantik, dan QA dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra** atas arahan pengguna.

32 Homologi singular dan invariansi homotopi

32.1 Homologi singular

Definisi (simpleks- n singular). Misalkan X ruang topologis. Sebuah **simpleks- n singular** di X ialah pemetaan kontinu

$$\sigma: \Delta^n \longrightarrow X.$$

Catatan (rantai, batas, dan homologi singular). Untuk mendefinisikan homologi singular, kita membangun kembali grup rantai dan pemetaan batas. Definisikan $C_n(X)$ sebagai grup abelian bebas dengan basis semua simpleks- n singular di X . Unsurnya disebut **rantai- n singular**. Grup ini biasanya sangat besar.

Dengan menuliskan himpunan semua simpleks singular sebagai basis, definisi itu dapat dicatat secara eksplisit sebagai

$$C_n(X) := \mathbb{Z} \langle \{ \sigma: \Delta^n \rightarrow X \mid \sigma \text{ kontinu} \} \rangle.$$

Pada sebuah generator σ , pemetaan batas didefinisikan oleh

$$\partial_n(\sigma) = \sum_{i=0}^n (-1)^i \sigma|_{\partial_i \Delta^n},$$

dengan pembatasan pada muka dipahami melalui inklusi afin standar $\partial_i \Delta^n \cong \Delta^{n-1}$. Operator ini diperluas secara linear. Siklus $Z_n(X) = \ker \partial_n$, batas $B_n(X) = \operatorname{im} \partial_{n+1}$, dan grup homologi

$$H_n(X) := Z_n(X)/B_n(X)$$

didefinisikan seperti pada homologi simpleksial.

Catatan edisi. Identitas $\partial_{n-1}\partial_n = 0$ mengikuti pembatalan berpasangan muka ganda yang sama seperti pada Unit Fomberg 001. Karena itu $B_n(X) \subseteq Z_n(X)$ dan hasil bagi di atas memang terdefinisi.

Audit sumber. Baris 626–627 membungkus uraian “grup abelian bebas” dengan notasi himpunan, dan baris 633–635 tidak mencetak batas indeks penjumlahan. Edisi menuliskan definisi grup yang bertipe benar, rentang $0 \leq i \leq n$, serta identifikasi muka yang diperlukan.

Lema. Untuk ruang satu titik $X = \{*\}$,

$$H_n(X) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & n = 0, \\ 0, & n \geq 1. \end{cases}$$

Bukti. Dalam setiap derajat terdapat tepat satu simpleks singular, yaitu pemetaan konstan $\sigma^n: \Delta^n \rightarrow \{*\}$. Karena itu $C_n(X) = \mathbb{Z}\sigma^n$. Pada derajat nol, $\partial_0(\sigma^0) = 0$; untuk $n \geq 1$,

$$\begin{aligned} \partial_n \sigma^n &= \sum_{i=0}^n (-1)^i \underbrace{\sigma^n|_{\partial_i \Delta^n}}_{\sigma^{n-1}} \\ &= \begin{cases} \sigma^{n-1}, & n \text{ genap}, \\ 0, & n \text{ ganjil}. \end{cases} \end{aligned}$$

Jadi bagian ujung kompleks rantainya ialah

$$\cdots \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \xrightarrow{\text{id}} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

Diagram semantik (kompleks rantai satu titik). Dari kanan ke kiri dalam derajat yang menaik, setiap grup rantai adalah $\mathbb{Z}$. Diferensial dari derajat ganjil adalah nol, sedangkan diferensial dari derajat genap positif adalah identitas; setelah C_0 terdapat grup nol.

Pada derajat nol,

$$H_0(X) = \frac{\ker \partial_0}{\text{im } \partial_1} = \frac{\mathbb{Z}}{0} \cong \mathbb{Z}.$$

Untuk $n \geq 1$, kedua kemungkinan paritas memberi, secara berturut-turut,

$$H_n(X) = \frac{\ker \partial_n}{\text{im } \partial_{n+1}} = \frac{0}{0} = 0 \quad \text{atau} \quad H_n(X) = \frac{\mathbb{Z}}{\mathbb{Z}} = 0.$$

Jadi $H_n(X) = 0$ pada setiap derajat positif. $\square$

Catatan. Jika X dan Y homeomorfik, maka $H_n(X) \cong H_n(Y)$.

Lema (dekomposisi menurut komponen terhubung). Misalkan $X = \bigsqcup_{\alpha} X_{\alpha}$, dengan X_{α} komponen-komponen terhubung X . Maka

$$H_n(X) \cong \bigoplus_{\alpha} H_n(X_{\alpha}).$$

Bukti. Citra setiap simpleks singular $\sigma: \Delta^n \rightarrow X$ terhubung, sehingga seluruh citranya berada dalam tepat satu komponen terhubung X_{α} . Karena rantai adalah jumlah berhingga,

$$C_n(X) = \bigoplus_{\alpha} C_n(X_{\alpha}).$$

Pemetaan batas mempertahankan setiap suku langsung tersebut. Maka

$$Z_n(X) = \bigoplus_{\alpha} Z_n(X_{\alpha}), \quad B_n(X) = \bigoplus_{\alpha} B_n(X_{\alpha}),$$

dan

$$H_n(X) = Z_n(X)/B_n(X) \cong \bigoplus_{\alpha} H_n(X_{\alpha}).$$

□

Penguatan edisi (komponen lintasan). Jika $X = \bigsqcup_{\beta} P_{\beta}$ adalah dekomposisi ke dalam komponen lintasan, maka

$$H_n(X) \cong \bigoplus_{\beta} H_n(P_{\beta}).$$

Memang, Δ^n terhubung lintasan, sehingga citra setiap simpleks singular termuat dalam tepat satu P_{β} ; pembuktian jumlah langsung di atas berlaku tanpa perubahan. □

Audit sumber. Pernyataan pada baris 715 menyebut komponen terhubung, sedangkan bukti pada baris 722 menyebut komponen lintasan. Kedua dekomposisi sah: keterhubungan citra simpleks membuktikan pernyataan sumber, dan keterhubungan lintasan citranya memberi penguatan yang diperlukan untuk akibat H_0 . Edisi mempertahankan keduanya sebagai objek terpisah. Selain itu, ruas kiri baris 736 salah tercetak sebagai $H_n(X_{\alpha})$; ruas kiri yang benar ialah $H_n(X)$.

Lema. Jika X tak kosong dan terhubung lintasan, maka $H_0(X) \cong \mathbb{Z}$.

Bukti pertama. Karena $\partial_0 = 0$,

$$H_0(X) = \frac{\ker \partial_0}{\operatorname{im} \partial_1} = \frac{C_0(X)}{\operatorname{im} \partial_1}.$$

Generator $C_0(X)$ adalah titik-titik X , dipandang sebagai simpleks-0 singular. Untuk setiap dua titik $x, y \in X$, pilih lintasan τ dari x ke y . Sebagai simpleks-1 singular, $\partial_1 \tau = y - x$. Jadi, modulo $\operatorname{im} \partial_1$, semua generator $C_0(X)$ mewakili satu kelas u .

Augmentasi jumlah-koeffisien bernilai nol pada setiap batas $\partial_1 \tau$, sehingga menginduksi $\bar{\varepsilon}: H_0(X) \rightarrow \mathbb{Z}$ dengan $\bar{\varepsilon}(u) = 1$. Homomorfisma $\mathbb{Z} \rightarrow H_0(X)$ yang mengirim 1 ke u surjektif, dan komposisinya dengan $\bar{\varepsilon}$ adalah identitas. Karena itu homomorfisma tersebut juga injektif, dan

$$H_0(X) = \frac{\ker \partial_0}{\operatorname{im} \partial_1} \cong \mathbb{Z}.$$

□

Akibat. Untuk setiap ruang topologis X , grup $H_0(X)$ adalah jumlah langsung salinan $\mathbb{Z}$, satu salinan bagi setiap komponen lintasan X .

Catatan. Bukti berikut memberi bentuk yang lebih formal bagi [lema \$H_0\$ untuk ruang terhubung lintasan](#) dan memotivasi homologi tereduksi.

Bukti kedua [Lema \$H_0\$](#) . Pertimbangkan bagian kompleks

$$C_1(X) \xrightarrow{\partial_1} C_0(X) \longrightarrow 0.$$

Diagram semantik (ujung kompleks derajat nol). Panah $C_1(X) \xrightarrow{\partial_1} C_0(X)$ diikuti pemetaan nol $C_0(X) \rightarrow 0$. Karena panah keluar dari $C_0(X)$ nol, seluruh $C_0(X)$ adalah siklus derajat nol.

Karena $\partial_0 = 0$,

$$H_0(X) = C_0(X) / \text{im } \partial_1.$$

Definisikan homomorfisma augmentasi

$$\varepsilon: C_0(X) \longrightarrow \mathbb{Z}, \quad \varepsilon\left(\sum_i n_i \sigma_i\right) = \sum_i n_i.$$

Pemetaan ini surjektif karena X tak kosong. Untuk simpleks-1 singular τ ,

$$\varepsilon(\partial_1 \tau) = \varepsilon(\tau(1) - \tau(0)) = 1 - 1 = 0,$$

sehingga $\text{im } \partial_1 \subseteq \ker \varepsilon$.

Sebaliknya, ambil $\sum_i n_i \sigma_i \in \ker \varepsilon$ dan pilih titik basis $x_0 \in X$. Karena X terhubung lintasan, untuk setiap i ada lintasan τ_i dari x_0 ke titik yang diwakili σ_i . Jika σ_0 menyatakan simpleks-0 pada x_0 , maka $\partial \tau_i = \sigma_i - \sigma_0$. Karena $\sum_i n_i = 0$,

$$\varepsilon\left(\sum_i n_i \sigma_i\right) = \sum_i n_i = 0,$$

dan

$$\partial_1\left(\sum_i n_i \tau_i\right) = \sum_i n_i \sigma_i - \left(\sum_i n_i\right) \sigma_0 = \sum_i n_i \sigma_i.$$

Jadi $\ker \varepsilon \subseteq \text{im } \partial_1$. Teorema isomorfisma pertama kini memberi

$$H_0(X) = \frac{C_0(X)}{\text{im } \partial_1} = \frac{C_0(X)}{\ker \varepsilon} \cong \mathbb{Z}.$$

□

Definisi (kompleks rantai). Sebuah **kompleks rantai** ialah barisan grup abelian dan homomorfisma

$$\cdots \longrightarrow A_2 \xrightarrow{\partial_2} A_1 \xrightarrow{\partial_1} A_0 \longrightarrow \cdots$$

sedemikian sehingga $\partial_n \circ \partial_{n+1} = 0$ untuk setiap n .

Diagram semantik (kompleks rantai umum). Barisan berarah $\cdots \rightarrow A_2 \xrightarrow{\partial_2} A_1 \xrightarrow{\partial_1} A_0 \rightarrow \cdots$ mempunyai komposit dua panah berturutan yang selalu nol.

Catatan. Syarat itu sering ditulis $\partial^2 = 0$.

Catatan. Persamaan $\partial_n \partial_{n+1} = 0$ ekuivalen dengan

$$\text{im } \partial_{n+1} \subseteq \ker \partial_n,$$

yakni setiap batas merupakan siklus.

Catatan (kompleks teraugmentasi). Pemetaan ε yang muncul dalam [bukti kedua Lema \$H_0\$](#) memperpanjang kompleks rantai singular menjadi

$$\cdots \longrightarrow C_2(X) \xrightarrow{\partial_2} C_1(X) \xrightarrow{\partial_1} C_0(X) \xrightarrow{\varepsilon} \mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

Barisan ini disebut **kompleks rantai teraugmentasi**.

Diagram semantik (augmentasi pertama). Kompleks singular $\cdots \rightarrow C_2(X) \rightarrow C_1(X) \rightarrow C_0(X)$ diperpanjang oleh $C_0(X) \xrightarrow{\varepsilon} \mathbb{Z} \rightarrow 0$; jumlah koefisien setiap batas derajat satu adalah nol.

Definisi (grup homologi tereduksi). Untuk ruang tak kosong X , gunakan augmentasi dari [Lema \$H_0\$](#) . Grup homologi tereduksi $\tilde{H}_n(X)$ didefinisikan sebagai homologi kompleks rantai teraugmentasi

$$\cdots \longrightarrow C_2(X) \xrightarrow{\partial_2} C_1(X) \xrightarrow{\partial_1} C_0(X) \xrightarrow{\varepsilon} \mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

Syarat tak kosong menghindari grup homologi taktrivial pada derajat -1 . Dalam konvensi ini, ruang satu titik mempunyai homologi tereduksi nol pada semua derajat.

Diagram semantik (augmentasi dalam definisi). Ini adalah kemunculan kedua kompleks teraugmentasi pada sumber: $C_0(X)$ dipetakan ke $\mathbb{Z}$ oleh jumlah koefisien dan kemudian ke nol. Homologi kompleks inilah yang didefinisikan sebagai homologi tereduksi.

Catatan. Untuk ruang tak kosong X ,

$$H_n(X) \cong \begin{cases} \tilde{H}_n(X), & n \geq 1, \\ \tilde{H}_0(X) \oplus \mathbb{Z}, & n = 0. \end{cases}$$

Khususnya, jika X terhubung lintasan, maka $\tilde{H}_0(X) = 0$.

Catatan (pemisahan pada derajat nol). Pada derajat nol, augmentasi menginduksi surjeksi $\varepsilon_*: H_0(X) \rightarrow \mathbb{Z}$ dengan kernel $\tilde{H}_0(X)$. Memilih satu titik basis $x_0 \in X$ memberi pemisahan $1 \mapsto [x_0]$; karena itu diperoleh jumlah langsung di atas. Pilihan pemisahan ini tidak kanonik jika tidak ada titik basis yang telah dipilih.

Audit sumber. Baris 899–903 menyatakan pemisahan setelah “beberapa manipulasi”, tanpa menyebut pemetaan pemisah atau pilihan titik. Edisi menuliskan barisan augmentasi, kernelnya, dan pemisahan yang diperlukan.

Catatan. Secara formal, salinan tambahan $\mathbb{Z}$ dapat dipandang sebagai grup bebas yang dibangkitkan oleh satu-satunya pemetaan $[\emptyset] \rightarrow X$, dengan $[\emptyset]$ simpleks kosong tanpa simpul. Augmentasi lalu merupakan pemetaan batas biasa karena $\partial[v_0] = [\tilde{v}_0] = [\emptyset]$.

Catatan (interpretasi geometris yang terbatas). Ambil siklus umum

$$c = \sum_{\sigma} n_{\sigma} \sigma \in Z_n(X).$$

Sebagai contoh, untuk $n = 1$ tulis $c = \sum_e n_e e \in Z_1(X)$. Persamaan $\partial c = 0$ mengatakan bahwa pada setiap titik, jumlah berarah koefisien sisi yang masuk sama dengan jumlah yang keluar.

Gambar semantik (keseimbangan pada simpul). Pada sebuah simpul pusat tanpa label, tiga sisi berorientasi e'_1, e'_2, e'_3 masuk dari kiri dan tiga sisi berorientasi e_1, e_2, e_3 keluar ke kanan. Persamaan $\partial c = 0$ menyamakan jumlah koefisien berarah yang masuk dan keluar di simpul tersebut; gambar tidak mengklaim bahwa lingkungannya merupakan manifold-1.

Jika koefisien diambil dalam $\mathbb{R}$, keseimbangan ini menyerupai hukum arus Kirchhoff. Namun kondisi itu adalah kondisi aljabar, bukan dengan sendirinya syarat manifold. Sebuah simpul bercabang dapat memenuhi $\partial c = 0$ tanpa mempunyai lingkungan seperti interval. Demikian pula, siklus-2 umum tidak harus merupakan permukaan tertutup, dan rantai yang bukan siklus tidak otomatis merealisasikan

manifold berbatas; diperlukan syarat insidensi dan lokal tambahan. Dalam dimensi lebih tinggi, rantai seimbang sering lebih tepat dipandang sebagai siklus atau pseudomanifold berbobot.

Audit sumber. Baris 938 menyebut “hukum kedua Kirchhoff”, padahal keseimbangan arus pada simpul adalah hukum arus (hukum pertama) Kirchhoff. Baris 942–948 juga menyimpulkan bahwa rantai seimbang mesti merupakan manifold-1 tertutup, bahwa siklus-2 mesti merupakan permukaan tertutup, dan bahwa rantai nonsiklus menghasilkan manifold berbatas. Ketiga implikasi gagal tanpa hipotesis insidensi dan lokal tambahan. Baris 949–951 menyebut hanya pseudomanifold dalam dimensi lebih tinggi tanpa merumuskan syaratnya. Edisi mempertahankan intuisi keseimbangan, menghindari insidensi nonmanifold, dan membatasi klaimnya ke konsekuensi aljabar yang sah.

32.2 Invariansi homotopi

Definisi (pemetaan pada rantai). Misalkan $f: X \rightarrow Y$ kontinu. Setiap simpleks singular $\sigma: \Delta^n \rightarrow X$ menghasilkan simpleks singular $f \circ \sigma: \Delta^n \rightarrow Y$. Definisikan homomorfisma

$$f_{\#}: C_n(X) \longrightarrow C_n(Y)$$

pada generator dengan $f_{\#}(\sigma) = f \circ \sigma$, lalu perluas secara linear. Untuk semua derajat, pemetaan tersebut tersusun sebagai

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & C_{n+1}(X) & \xrightarrow{\partial} & C_n(X) & \xrightarrow{\partial} & C_{n-1}(X) \longrightarrow \cdots \\ & & \downarrow f_{\#} & & \downarrow f_{\#} & & \downarrow f_{\#} \\ \cdots & \longrightarrow & C_{n+1}(Y) & \xrightarrow{\partial} & C_n(Y) & \xrightarrow{\partial} & C_{n-1}(Y) \longrightarrow \cdots \end{array}$$

Diagram semantik (pemetaan derajat demi derajat). Baris atas adalah kompleks $C_{\bullet}(X)$ dan baris bawah $C_{\bullet}(Y)$. Pada setiap derajat, panah vertikal $f_{\#}$ mengirim σ ke $f \circ \sigma$; panah horizontal adalah pemetaan batas.

Proposisi. Pemetaan $f_{\#}$ berkomutasi dengan pemetaan batas:

$$f_{\#} \circ \partial = \partial \circ f_{\#}.$$

Dengan kata lain, setiap persegi pada diagram di atas komutatif.

Diagram semantik (persegi rantai komutatif). Sumber mengulang kedua kompleks dan semua panah $f_{\#}$ untuk menegaskan bahwa menuruni diagram lalu mengambil batas sama dengan mengambil batas lalu menuruni diagram: $\partial f_{\#} = f_{\#} \partial$.

Bagian yang dihilangkan dalam sumber. Bukti sumber hanya berbunyi “Dalam pekerjaan rumah.” Bukti lengkap edisi diberikan berikut ini.

Perbaiki bukti FOM-PR-01. Cukup periksa sebuah generator $\sigma: \Delta^n \rightarrow X$. Jika $\delta_i: \Delta^{n-1} \rightarrow \Delta^n$ adalah inklusi afin muka ke- i , maka

$$\begin{aligned} \partial f_{\#}(\sigma) &= \partial(f \circ \sigma) \\ &= \sum_{i=0}^n (-1)^i (f \circ \sigma) \circ \delta_i \\ &= f_{\#} \left(\sum_{i=0}^n (-1)^i \sigma \circ \delta_i \right) \\ &= f_{\#}(\partial \sigma). \end{aligned}$$

Kedua ruas linear terhadap σ , sehingga identitas berlaku pada seluruh $C_n(X)$. $\square$

Definisi (pemetaan rantai). Kumpulan homomorfisma $f_{\#}$ di semua derajat disebut **pemetaan rantai**. Secara umum, pemetaan rantai ialah kumpulan homomorfisma antar-kompleks rantai yang berkomutasi dengan pemetaan batas.

Proposisi. Pemetaan rantai $f_{\#}$ menginduksi homomorfisma yang terdefinisi dengan baik

$$f_*: H_n(X) \longrightarrow H_n(Y), \quad f_*([z]) = [f_{\#}(z)].$$

Bukti dari sumber, sampai titik yang diberikannya. Jika $z \in Z_n(X)$, maka

$$\partial f_{\#}(z) = f_{\#}(\partial z) = f_{\#}(0) = 0,$$

sehingga $f_{\#}(z) \in Z_n(Y)$. Jika $b \in B_n(X)$, tulis $b = \partial c$ untuk suatu $c \in C_{n+1}(X)$. Maka

$$f_{\#}(b) = f_{\#}(\partial c) = \partial f_{\#}(c) \in B_n(Y).$$

Jadi siklus dibawa ke siklus dan batas dibawa ke batas. Jika $[z] = [z']$, maka $z - z' \in B_n(X)$, sehingga $f_{\#}(z) - f_{\#}(z') \in B_n(Y)$; karena itu rumus $f_*([z]) = [f_{\#}(z)]$ tidak bergantung pada wakil.

Bagian yang dihilangkan dalam sumber. Sumber menyatakan bahwa pemeriksaan sifat homomorfisma dibiarkan kepada pembaca. Perbaikan lengkap edisi diberikan berikut ini.

Perbaikan bukti FOM-PR-02. Sumber secara eksplisit menghilangkan pemeriksaan bahwa f_* merupakan homomorfisma. Untuk $[z], [w] \in H_n(X)$, linearitas $f_{\#}$ memberi

$$\begin{aligned} f_*([z] + [w]) &= f_*([z + w]) \\ &= [f_{\#}(z + w)] \\ &= [f_{\#}(z) + f_{\#}(w)] \\ &= f_*([z]) + f_*([w]). \end{aligned}$$

Pemetaan juga membawa kelas nol ke kelas nol dan invers aditif ke invers aditif. Jadi f_* adalah homomorfisma. $\square$

Catatan. Homomorfisma f_* disebut **pemetaan yang diinduksi oleh f** .

Proposisi (functorialitas pemetaan terinduksi). Untuk pemetaan kontinu $X \xrightarrow{g} Y \xrightarrow{f} Z$,

1. $(f \circ g)_* = f_* \circ g_*$; dan
2. $(\text{id}_X)_* = \text{id}_{H_n(X)}$.

Diagram semantik (pemetaan yang dapat dikomposisikan). Tiga ruang tersusun $X \xrightarrow{g} Y \xrightarrow{f} Z$. Pemetaan pada homologi mengikuti arah yang sama, dan panah komposit menginduksi $f_* \circ g_*$.

Bukti edisi. Pada setiap generator σ ,

$$(f \circ g)_{\#}(\sigma) = f \circ g \circ \sigma = f_{\#}(g_{\#}(\sigma)),$$

dan $(\text{id}_X)_{\#}(\sigma) = \sigma$. Linearitas memberi identitas yang sama pada rantai, lalu pengambilan kelas homologi memberi kedua rumus yang diklaim. $\square$

Akibat. Jika X dan Y homeomorfik, maka $H_n(X) \cong H_n(Y)$.

Bukti edisi. Jika $h: X \rightarrow Y$ homeomorfisma dengan invers k , maka functorialitas memberi $k_* h_* = (k \circ h)_* = \text{id}_{H_n(X)}$ dan $h_* k_* = (h \circ k)_* = \text{id}_{H_n(Y)}$. Jadi h_* isomorfisma dengan invers k_* . $\square$

Akibat. Misalkan $A \subseteq X$ suatu retrak dari X . Jika $i: A \hookrightarrow X$ adalah inklusi dan $r: X \rightarrow A$ suatu retraksi, maka

$$i_*: H_n(A) \longrightarrow H_n(X)$$

injektif, sedangkan

$$r_*: H_n(X) \longrightarrow H_n(A)$$

surjektif.

Bukti. Inklusi dan retraksi membentuk segitiga berikut.

Diagram semantik (segitiga retraksi). Inklusi $i: A \rightarrow X$ diikuti retraksi $r: X \rightarrow A$ sama dengan id_A . Segitiga ruang ini komutatif.

Setelah mengambil homologi, diperoleh segitiga yang bersesuaian.

Diagram semantik (segitiga pada homologi). Pemetaan $H_n(A) \xrightarrow{i_*} H_n(X) \xrightarrow{r_*} H_n(A)$ berkomposisi menjadi identitas $H_n(A)$.

Karena $r \circ i = \text{id}_A$, [funtorialitas pemetaan terinduksi](#) memberi

$$r_* \circ i_* = (r \circ i)_* = (\text{id}_A)_* = \text{id}_{H_n(A)}.$$

Pemetaan yang mempunyai invers kiri bersifat injektif, jadi i_* injektif; pemetaan yang mempunyai invers kanan bersifat surjektif, jadi r_* surjektif. $\square$

Akibat. Subruang $\{0, 1\} \subseteq [0, 1]$ bukan retrak.

Bukti. Andaikan ada retraksi. [Akibat tentang retrak](#) menyatakan bahwa inklusi menginduksi monomorfisma

$$i_*: H_0(\{0, 1\}) \longrightarrow H_0([0, 1]).$$

Namun grup asal isomorfik dengan $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$, sedangkan grup tujuan isomorfik dengan $\mathbb{Z}$. Tidak ada homomorfisma injektif $\mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{Z}$: setelah ditensor dengan $\mathbb{Q}$, hal itu akan memberi pemetaan linear injektif $\mathbb{Q}^2 \rightarrow \mathbb{Q}$. Kontradiksi. $\square$

Teorema (invariansi homotopi). Jika pemetaan kontinu $f, g: X \rightarrow Y$ homotopik, maka

$$f_* = g_*: H_n(X) \longrightarrow H_n(Y)$$

untuk setiap $n \geq 0$.

Definisi (ekuivalensi homotopi). Pemetaan kontinu $f: X \rightarrow Y$ disebut **ekuivalensi homotopi** jika ada pemetaan kontinu $g: Y \rightarrow X$ sedemikian sehingga

$$f \circ g \simeq \text{id}_Y, \quad g \circ f \simeq \text{id}_X.$$

Jika ekuivalensi semacam itu ada, X dan Y disebut **ekuivalen secara homotopi**, atau mempunyai tipe homotopi yang sama, dan ditulis $X \simeq Y$.

Akibat. Jika $X \simeq Y$, maka $H_n(X) \cong H_n(Y)$ untuk setiap n .

Bagian yang dihilangkan dalam sumber. Bukti sumber hanya berbunyi “Dalam pekerjaan rumah.” Bukti lengkap edisi diberikan berikut ini.

Perbaiki bukti FOM-PR-03. Pilih ekuivalensi homotopi $f: X \rightarrow Y$ dan invers homotopinya $g: Y \rightarrow X$. Teorema invariansi homotopi dan functorialitas memberi

$$g_* \circ f_* = (g \circ f)_* = (\text{id}_X)_* = \text{id}_{H_n(X)}$$

serta

$$f_* \circ g_* = (f \circ g)_* = (\text{id}_Y)_* = \text{id}_{H_n(Y)}.$$

Jadi f_* dan g_* saling invers; khususnya $H_n(X) \cong H_n(Y)$. $\square$

Contoh. Ruang $\mathbb{R}^n$ ekuivalen secara homotopi dengan satu titik. Ambil $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \{*\}$ sebagai pemetaan tunggal dan $g: \{*\} \rightarrow \mathbb{R}^n$ dengan $g(*) = 0$. Menurut akibat ekuivalensi homotopi, cukup memeriksa kedua komposit. Komposit $f \circ g$ adalah identitas pada $\{*\}$, sedangkan $g \circ f$ homotopik ke identitas $\mathbb{R}^n$ melalui kontraksi linear $H(x, t) = (1 - t)x$. Maka

$$H_k(\mathbb{R}^n) \cong H_k(\{*\}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = 0, \\ 0, & k \geq 1. \end{cases}$$

Audit sumber. Baris 1134 memakai tanda $\mapsto$ pada deklarasi pemetaan, dan baris 1135 mencetak $g: \{*\} \rightarrow 0$ alih-alih $g: \{*\} \rightarrow \mathbb{R}^n$ dengan nilai 0. Baris 1140–1141 juga memakai kesamaan literal bagi grup yang hanya diidentifikasi hingga isomorfisma. Edisi membetulkan tipe pemetaan dan memakai $\cong$.

Catatan. Untuk memakai homologi singular secara efektif, kita sekarang membuktikan Teorema invariansi homotopi.

Bukti Teorema invariansi homotopi. Kita akan membangun keluarga homomorfisma berderajat $+1$

$$P_n: C_n(X) \longrightarrow C_{n+1}(Y)$$

Diagram semantik (homotopi rantai). Dua baris ialah kompleks $C_\bullet(X)$ dan $C_\bullet(Y)$. Panah vertikal dari derajat k ke derajat k berlabel $g_\# - f_\#$, sedangkan panah diagonal $P_k: C_k(X) \rightarrow C_{k+1}(Y)$ menaikkan derajat satu. Hubungan seluruh diagram ialah $g_\# - f_\# = \partial P + P\partial$.

Secara umum, jika $p, q: C_\bullet \rightarrow D_\bullet$ adalah pemetaan rantai, keluarga homomorfisma berderajat $+1$, $P_n: C_n \rightarrow D_{n+1}$, yang memenuhi

$$q - p = \partial P + P\partial$$

disebut **homotopi rantai dari p ke q** . Dalam bukti ini, $p = f_\#$ dan $q = g_\#$, sehingga identitas yang harus dibangun ialah

$$g_\# - f_\# = \partial P + P\partial.$$

Jika $z \in Z_n(X)$, maka $\partial z = 0$ dan

$$g_\#(z) - f_\#(z) = \partial P(z) + P(\partial z) = \partial P(z) \in B_n(Y).$$

Jadi $g_*([z]) = f_*([z])$. Dengan demikian cukup membangun P .

Pilih homotopi $H: X \times I \rightarrow Y$ dengan $H(x, 0) = f(x)$ dan $H(x, 1) = g(x)$. Untuk simpleks singular $\sigma: \Delta^n \rightarrow X$, pascakomposisi biasa dapat digambarkan sebagai berikut.

Diagram semantik (pascakomposisi). Segitiga komutatif mempunyai $\Delta^n \xrightarrow{\sigma} X \xrightarrow{f} Y$ pada dua sisinya dan $\Delta^n \xrightarrow{f \circ \sigma} Y$ pada sisi diagonal.

Homotopi menghasilkan pemetaan

$$H \circ (\sigma \times \text{id}_I): \Delta^n \times I \longrightarrow Y$$

Diagram semantik (prisma homotopi). Segitiga komutatif mempunyai $\Delta^n \times I \xrightarrow{\sigma \times \text{id}_I} X \times I$ dan $X \times I \xrightarrow{H} Y$ pada dua sisinya; diagonalnya adalah komposit $H \circ (\sigma \times \text{id}_I)$.

Domain pemetaan ini adalah sebuah prisma. Tulis $v_i = (e_i, 0)$ dan $w_i = (e_i, 1)$. Prisma $\Delta^n \times I$ mempunyai triangulasi standar oleh $n + 1$ simpleks

$$[v_0, \dots, v_i, w_i, \dots, w_n], \quad 0 \leq i \leq n.$$

Misalkan $p_i: \Delta^{n+1} \rightarrow \Delta^n \times I$ pemetaan afin yang berurutan membawa simpul-simpul standar ke $v_0, \dots, v_i, w_i, \dots, w_n$. Definisikan **operator prisma**

$$P_n(\sigma) = \sum_{i=0}^n (-1)^i H \circ (\sigma \times \text{id}_I) \circ p_i,$$

lalu perluas secara linear.

Hitung batas pada tiap simpleks prisma:

$$\partial P_n(\sigma) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^{n+1} (-1)^{i+j} H \circ (\sigma \times \text{id}_I) \circ p_i \circ \delta_j.$$

Untuk $1 \leq i \leq n$, muka dalam yang dipakai bersama oleh simpleks ke- $i - 1$ dan ke- i ialah

$$[v_0, \dots, v_{i-1}, w_i, \dots, w_n].$$

Pada simpleks ke- $i - 1$, muka ini diperoleh dengan menghapus w_{i-1} pada posisi i dan mempunyai tanda total $(-1)^{i-1}(-1)^i = -1$. Pada simpleks ke- i , muka yang sama diperoleh dengan menghapus v_i pada posisi i dan mempunyai tanda total $(-1)^i(-1)^i = +1$. Jadi semua muka dalam saling meniadakan berpasangan.

Muka $p_0 \circ \delta_0 = [w_0, \dots, w_n]$ mempunyai tanda $+1$ dan memberi $g_{\#}(\sigma)$. Muka $p_n \circ \delta_{n+1} = [v_0, \dots, v_n]$ mempunyai tanda -1 dan memberi $-f_{\#}(\sigma)$. Setelah muka-muka tersebut dikeluarkan, untuk setiap $0 \leq j \leq n$ muka yang menghapus v_j atau w_j menyusun tepat prisma bertanda atas $\sigma \circ \delta_j$; reindexasi tanda $(-1)^i(-1)^j$ memberi jumlah $-P_{n-1}((-1)^j \sigma \circ \delta_j)$. Menjumlahkan terhadap j memberi $-P_{n-1}(\partial \sigma)$. Karena itu

$$\partial P_n(\sigma) = g_{\#}(\sigma) - f_{\#}(\sigma) - P_{n-1}(\partial \sigma),$$

atau ekuivalen,

$$\partial P + P\partial = g_{\#} - f_{\#}.$$

Identitas ini berlaku pada generator, maka berlaku pada semua rantai. Argumen pada awal bukti sekarang memberi $f_* = g_*$ pada setiap derajat. $\square$

Audit sumber. Baris 1210 menuliskan $\sigma \times [0, 1]$ seolah-olah sebuah pemetaan; edisi memakai $\sigma \times \text{id}_I$. Pada baris 1231–1249, indeks penjumlahan seperti $\sum_{j \leq i}^n$ tidak mempunyai batas bawah dan uraian “ketika $i = j$ suku-suku hampir saling menghapus” mencampur muka ujung dengan muka dalam. Edisi menyatakan pemetaan afin p_i , menuliskan jumlah batas yang berindeks lengkap, dan mengelompokkan muka bawah, atas, samping, serta muka dalam dengan tanda yang benar. Baris 1188 membalik tanda $g_{\#} - f_{\#}$ menjadi $f_* - g_*$; kesimpulan kesamaan tidak berubah, tetapi edisi menjaga tanda tetap konsisten.

Akibat. Jika X kontraktif, maka $X \simeq \{*\}$ dan akibat ekuivalensi homotopi memberi

$$H_n(X) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & n = 0, \\ 0, & n \geq 1. \end{cases}$$

Bukti edisi. Pilih titik $x_0 \in X$ dan kontraksi $\text{id}_X \simeq c_{x_0}$. Pemetaan tunggal $f: X \rightarrow \{*\}$ dan pemetaan $g: \{*\} \rightarrow X$ dengan $g(*) = x_0$ memenuhi $f \circ g = \text{id}_{\{*\}}$ dan $g \circ f = c_{x_0} \simeq \text{id}_X$. Jadi $X \simeq \{*\}$. Akibat tentang ekuivalensi homotopi kemudian mengidentifikasi $H_n(X)$ dengan homologi satu titik yang telah dihitung di atas. $\square$

Lapisan penguasaan edisi

Bagian ini ditulis khusus untuk edisi bahasa Indonesia dan bukan bagian dari catatan Fomberg. Keenam pemeriksaan berikut menutup kompetensi homologi singular, augmentasi, pemetaan terinduksi, functorialitas, retrak, homotopi rantai, dan operator prisma pada rute D60-R09.

Pemeriksaan Penguasaan F2.1 (kompleks singular satu titik). Untuk $X = \{*\}$:

1. tentukan $\partial_n: C_n(X) \rightarrow C_{n-1}(X)$ untuk $0 \leq n \leq 4$;
2. hitung $H_0(X), H_1(X), H_2(X), H_3(X)$; dan
3. hitung $\tilde{H}_n(X)$ untuk semua $n \geq 0$.

Petunjuk. Ada satu generator σ^n pada setiap derajat. Secara terpisah, $\partial_0 = 0$. Untuk $n \geq 1$, jumlah $\sum_{i=0}^n (-1)^i$ bernilai 1 jika n genap dan 0 jika n ganjil.

Solusi Pemeriksaan F2.1. Dengan $C_n(X) = \mathbb{Z}\sigma^n$,

$$\partial_0 = 0, \quad \partial_1 = 0, \quad \partial_2 = \text{id}, \quad \partial_3 = 0, \quad \partial_4 = \text{id}.$$

Jadi

$$H_0(X) = \mathbb{Z}/0 \cong \mathbb{Z},$$

sedangkan

$$H_1(X) = \mathbb{Z}/\mathbb{Z} = 0, \quad H_2(X) = 0/0 = 0, \quad H_3(X) = \mathbb{Z}/\mathbb{Z} = 0.$$

Pola ini berulang pada semua derajat positif. Dalam kompleks teraugmentasi, $\varepsilon: C_0(X) \rightarrow \mathbb{Z}$ adalah identitas. Karena itu homologi pada derajat nol juga lenyap dan $\tilde{H}_n(X) = 0$ untuk semua $n \geq 0$.

Pemeriksaan Penguasaan F2.2 (komponen dan augmentasi). Misalkan X mempunyai tepat tiga komponen lintasan, dan pilih titik x_1, x_2, x_3 , satu pada setiap komponen.

1. Tentukan $H_0(X)$.
2. Tentukan $\tilde{H}_0(X)$ dan berikan basis eksplisit.
3. Jelaskan mengapa jawabannya tidak bergantung pada banyaknya titik lain di setiap komponen.

Petunjuk. Modulo batas lintasan, semua titik dalam komponen yang sama mewakili kelas yang sama. Pada basis $[x_1], [x_2], [x_3]$, augmentasi adalah $(a, b, c) \mapsto a + b + c$.

Solusi Pemeriksaan F2.2. Dekomposisi menurut komponen lintasan dan lema H_0 memberi

$$H_0(X) \cong \mathbb{Z}[x_1] \oplus \mathbb{Z}[x_2] \oplus \mathbb{Z}[x_3] \cong \mathbb{Z}^3.$$

Grup homologi tereduksi derajat nol adalah kernel augmentasi

$$\tilde{H}_0(X) \cong \{(a, b, c) \in \mathbb{Z}^3 : a + b + c = 0\}.$$

Sebuah basis ialah

$$[x_2] - [x_1], \quad [x_3] - [x_1],$$

sehingga $\tilde{H}_0(X) \cong \mathbb{Z}^2$. Untuk setiap titik lain dalam komponen ke- i , selisihnya dengan x_i merupakan batas suatu lintasan, maka keduanya memberi kelas homologi yang sama. Itulah sebabnya hanya banyaknya komponen lintasan yang berpengaruh.

Pemeriksaan Penguasaan F2.3 (dari pemetaan kontinu ke homologi). Misalkan $f: X \rightarrow Y$ kontinu.

1. Buktikan langsung pada generator bahwa $\partial f_{\#} = f_{\#} \partial$.
2. Jika $z - z' = \partial c$, buktikan bahwa $[f_{\#} z] = [f_{\#} z']$.
3. Buktikan bahwa $f_*([z]) = [f_{\#} z]$ aditif.

Petunjuk. Pascakomposisi oleh f berkomutasi dengan pembatasan pada setiap muka. Untuk bagian kedua, terapkan $f_{\#}$ pada persamaan $z - z' = \partial c$.

Solusi Pemeriksaan F2.3. Untuk simpleks singular σ ,

$$\begin{aligned} \partial f_{\#}(\sigma) &= \sum_i (-1)^i (f \circ \sigma) \circ \delta_i \\ &= f_{\#} \left(\sum_i (-1)^i \sigma \circ \delta_i \right) = f_{\#}(\partial \sigma). \end{aligned}$$

Linearitas memperluas identitas ini ke semua rantai. Jika $z - z' = \partial c$, maka

$$f_{\#} z - f_{\#} z' = f_{\#}(\partial c) = \partial f_{\#} c,$$

sehingga selisih kedua citra merupakan batas dan keduanya mewakili kelas yang sama. Terakhir,

$$f_*([z] + [w]) = [f_{\#}(z + w)] = [f_{\#} z + f_{\#} w] = f_*([z]) + f_*([w]).$$

Jadi konstruksi terdefinisi dengan baik dan merupakan homomorfisma.

Pemeriksaan Penguasaan F2.4 (retrak dan suku langsung). Misalkan $A \subseteq X$ suatu retrak dengan inklusi i dan retraksi r .

1. Buktikan bahwa $H_n(X) = \text{im } i_* \oplus \ker r_*$.
2. Gunakan $H_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ dan $H_1(D^2) = 0$ untuk membuktikan bahwa lingkaran batas $S^1 \subset D^2$ bukan retrak dari cakram.

Petunjuk. Untuk $x \in H_n(X)$, tulis $x = i_* r_*(x) + (x - i_* r_*(x))$ dan periksa suku kedua berada di $\ker r_*$. Gunakan $r_* i_* = \text{id}$ untuk memeriksa irisannya nol.

Solusi Pemeriksaan F2.4. Untuk setiap $x \in H_n(X)$,

$$x = i_* r_*(x) + (x - i_* r_*(x)).$$

Suku pertama berada dalam $\text{im } i_*$. Suku kedua berada dalam $\ker r_*$ sebab

$$r_*(x - i_* r_*(x)) = r_*(x) - r_* i_* r_*(x) = 0.$$

Jika $i_*(a) \in \ker r_*$, maka $a = r_* i_*(a) = 0$, sehingga irisannya nol. Maka $H_n(X) = \text{im } i_* \oplus \ker r_*$.

Andaikan S^1 retrak dari D^2 . Inklusi akan menginduksi pemetaan injektif

$$i_*: H_1(S^1) \longrightarrow H_1(D^2),$$

yakni monomorfisma $\mathbb{Z} \rightarrow 0$, yang mustahil. Jadi tidak ada retraksi $D^2 \rightarrow S^1$.

Pemeriksaan Penguasaan F2.5 (homotopi rantai dan invers homotopi). Misalkan $p, q: C_\bullet \rightarrow D_\bullet$ pemetaan rantai dan ada homomorfisma $K_n: C_n \rightarrow D_{n+1}$ dengan

$$q - p = \partial K + K \partial.$$

1. Buktikan bahwa $p_* = q_*$ pada homologi.
2. Misalkan $f: X \rightarrow Y$ dan $g: Y \rightarrow X$ memenuhi $g \circ f \simeq \text{id}_X$ dan $f \circ g \simeq \text{id}_Y$. Buktikan bahwa f_* isomorfisma dengan invers g_* .

Petunjuk. Evaluasi identitas homotopi rantai pada sebuah siklus. Untuk bagian kedua, gabungkan invariansi homotopi dengan functorialitas.

Solusi Pemeriksaan F2.5. Jika z siklus, maka

$$q(z) - p(z) = \partial K(z) + K(\partial z) = \partial K(z).$$

Jadi selisih $q(z)$ dan $p(z)$ merupakan batas, sehingga $q_*([z]) = p_*([z])$. Untuk pasangan f, g , invariansi homotopi dan functorialitas memberi

$$g_* f_* = (g \circ f)_* = (\text{id}_X)_* = \text{id}_{H_n(X)}$$

serta

$$f_* g_* = (f \circ g)_* = (\text{id}_Y)_* = \text{id}_{H_n(Y)}.$$

Dengan demikian f_* dan g_* saling invers.

Pemeriksaan Penguasaan F2.6 (operator prisma pada derajat rendah). Ambil homotopi $H: X \times I \rightarrow Y$ dari f ke g .

1. Untuk simpleks-0 σ , tunjukkan bahwa $\partial P_0(\sigma) = g_\#(\sigma) - f_\#(\sigma)$.

2. Untuk simpleks-1 σ , triangulasikan persegiannya oleh $[v_0, w_0, w_1]$ dan $[v_0, v_1, w_1]$, lalu periksa $\partial P_1(\sigma) + P_0(\partial\sigma) = g_{\#}(\sigma) - f_{\#}(\sigma)$.
3. Terapkan hasilnya pada kontraksi interval I ke titik 0.

Petunjuk. Pada derajat satu, $P_1(\sigma)$ adalah citra bertanda $[v_0, w_0, w_1] - [v_0, v_1, w_1]$ di bawah pemetaan prisma. Tulis batas kedua segitiga dan hapus sisi diagonal yang muncul dengan tanda berlawanan.

Solusi Pemeriksaan F2.6. Untuk $n = 0$, prisma adalah lintasan $t \mapsto H(\sigma(*), t)$ dari $f(\sigma(*))$ ke $g(\sigma(*))$. Karena itu

$$\partial P_0(\sigma) = g_{\#}(\sigma) - f_{\#}(\sigma).$$

Untuk $n = 1$, tulis

$$Q = H \circ (\sigma \times \text{id}_I),$$

dan gunakan notasi singkat

$$A = Q|_{[v_0, w_0, w_1]}, \quad B = Q|_{[v_0, v_1, w_1]}, \quad P_1(\sigma) = A - B.$$

Dalam perhitungan berikut, simbol sisi juga berarti pembatasan Q pada sisi tersebut. Rumus batas memberi

$$\begin{aligned} \partial(A - B) &= [w_0, w_1] - [v_0, w_1] + [v_0, w_0] \\ &\quad - [v_1, w_1] + [v_0, w_1] - [v_0, v_1] \\ &= [w_0, w_1] - [v_0, v_1] + [v_0, w_0] - [v_1, w_1]. \end{aligned}$$

Sisi atas ialah $g_{\#}(\sigma)$, sisi bawah ialah $f_{\#}(\sigma)$, dan

$$P_0(\partial\sigma) = [v_1, w_1] - [v_0, w_0].$$

Maka

$$\partial P_1(\sigma) + P_0(\partial\sigma) = g_{\#}(\sigma) - f_{\#}(\sigma).$$

Terakhir, kontraksi $H(x, t) = (1 - t)x$ pada I menunjukkan bahwa identitas $I \rightarrow I$ homotopik dengan pemetaan konstan di 0. Jadi $I \simeq \{0\}$ dan

$$H_0(I) \cong \mathbb{Z}, \quad H_n(I) = 0 \quad (n \geq 1).$$

Batas sumber komponen. Unit ini menerjemahkan `algebraic_topology.tex` baris 615–1290 secara kontigu, mencakup Bagian 1.3 tentang homologi singular dan Bagian 1.4 tentang invariansi homotopi. Cursor komponen berikutnya adalah baris 1291, awal Bagian 1.5 tentang barisan eksak.

Komponen Fomberg O012-FOM-003

Bagian 1.5–1.6; dipetakan ke D60-R10.

Tentang komponen ini

Komponen ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas Bagian 1.5–1.6 *Algebraic Topology* karya Yeheli Fomberg, berdasarkan kuliah Nir Lazarovich pada musim semi 2025. Otoritas sumber dibekukan pada commit [563194fae879178b9a6871b249513bfc27968975](#). Rentang yang diterjemahkan ialah baris 1291–1922: 632 baris fisik, 24.270 byte setelah normalisasi LF dan satu LF penutup, dengan SHA-256 870e617b30b82eb8a557b0733096623a73375ed079601e7e7938ce489d0ce064.

Catatan sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](#). Terjemahan, pemformatan semantik, koreksi terbatas, perbaikan bukti, dan materi penguasaan asli di bawah ini diterbitkan dengan lisensi yang sama. Perubahan dicatat secara eksplisit dalam blok audit dan ledger. Tidak ada prosa dari bank soal Fomberg terpisah maupun materi MIT yang disalin ke dalam komponen ini.

Edisi ini independen dan tidak menyiratkan dukungan, pengesahan, atau afiliasi dengan Yeheli Fomberg, Nir Lazarovich, ataupun institusi mereka. Produksi terjemahan, struktur semantik, dan QA dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra** atas arahan pengguna.

33 Barisan eksak dan homologi relatif

33.1 Barisan eksak

Definisi (barisan eksak). Suatu barisan grup abelian (atau, lebih umum, suatu barisan objek)

$$\cdots \xrightarrow{\alpha_{i+2}} A_{i+1} \xrightarrow{\alpha_{i+1}} A_i \xrightarrow{\alpha_i} A_{i-1} \xrightarrow{\alpha_{i-1}} \cdots$$

Diagram semantik. Panah masuk ke A_i ialah α_{i+1} , sedangkan panah keluar dari A_i ialah α_i . disebut **eksak** jika

$$\ker \alpha_i = \operatorname{im} \alpha_{i+1}$$

untuk setiap i . Jika kesamaan itu berlaku untuk suatu i tertentu, barisan tersebut disebut **eksak pada A_i** .

Catatan. Suatu barisan eksak jika dan hanya jika barisan tersebut merupakan kompleks rantai yang semua grup homologinya trivial.

Catatan. Barisan-barisan ini disebut eksak karena, sementara biasanya kita hanya mempunyai $\operatorname{im} \alpha_{n+1} \subseteq \ker \alpha_n$, di sini citra α_{n+1} **tepat sama dengan** kernel α_n . Artinya, jika $a \in A_n$ dipetakan ke nol, maka mesti ada $b \in A_{n+1}$ sehingga $\alpha_{n+1}(b) = a$. Kita juga tetap mempunyai sifat

$$\alpha_n \circ \alpha_{n+1} = 0.$$

Contoh. Barisan

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\alpha} B$$

Diagram semantik. Grup nol masuk ke A , lalu A dipetakan ke B oleh α .

eksak jika dan hanya jika $\ker \alpha = 0$, jika dan hanya jika α injektif.

Contoh. Barisan

$$A \xrightarrow{\beta} B \longrightarrow 0$$

Diagram semantik. A dipetakan ke B oleh β , lalu B dipetakan ke grup nol.

eksak jika dan hanya jika $\text{im } \beta = B$, jika dan hanya jika β surjektif.

Contoh. Dengan menggabungkan dua hasil terakhir, kita memperoleh bahwa barisan

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\alpha} B \longrightarrow 0$$

Diagram semantik. Satu-satunya pemetaan yang bukan pemetaan ke atau dari grup nol adalah $\alpha: A \rightarrow B$.

eksak jika dan hanya jika α merupakan isomorfisma.

Contoh (barisan eksak pendek). Barisan eksak pendek ialah barisan eksak berbentuk

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\alpha} B \xrightarrow{\beta} C \longrightarrow 0.$$

Diagram semantik. α memasukkan A ke B , β memetakan B ke C , dan kedua ujung barisan adalah grup nol.

Ini berarti bahwa α harus injektif dan β harus surjektif. Cara lain untuk memahaminya ialah mengidentifikasi A dengan $\text{im } \alpha \subseteq B$ dan memandang C sebagai hasil bagi dari B . Karena $\ker \beta = \text{im } \alpha$, kita dapat menuliskan

$$C \cong B / \text{im } \alpha \cong B / A$$

setelah identifikasi tersebut.

Definisi (pasangan baik). Misalkan X ruang topologis dan $A \subseteq X$. Pasangan (X, A) disebut **pasangan baik** jika A mempunyai suatu lingkungan terbuka $A \subseteq U \subseteq X$ sedemikian sehingga A merupakan retrak deformasi dari U .

Teorema. Misalkan (X, A) pasangan baik. Maka terdapat barisan eksak

$$\begin{aligned} \cdots &\xrightarrow{\partial} \tilde{H}_n(A) \xrightarrow{i_*} \tilde{H}_n(X) \xrightarrow{q_*} \tilde{H}_n(X/A) \xrightarrow{\partial} \tilde{H}_{n-1}(A) \\ &\xrightarrow{i_*} \tilde{H}_{n-1}(X) \xrightarrow{q_*} \tilde{H}_{n-1}(X/A) \longrightarrow \cdots \\ \cdots &\xrightarrow{\partial} \tilde{H}_0(A) \xrightarrow{i_*} \tilde{H}_0(X) \xrightarrow{q_*} \tilde{H}_0(X/A) \longrightarrow 0, \end{aligned}$$

Diagram semantik. Sesudah q_* pada setiap derajat, pemetaan penghubung ∂ turun satu derajat ke homologi tereduksi A ; pola itu berulang sampai derajat nol dan berakhir di grup nol.

dengan $i: A \hookrightarrow X$ pemetaan inklusi dan $q: X \rightarrow X/A$ pemetaan hasil bagi.

Penanda bukti maju. Sumber menyatakan teorema ini tanpa bukti, lalu memakainya dua kali sebelum homologi relatif dan eksisi dikembangkan. Edisi ini tidak menganggapnya telah dibuktikan pada titik ini. Setelah teorema eksisi ditutup pada Unit Fomberg 004, bukti lengkap akan diperoleh dari isomorfisma alami $H_n(X, A) \cong \tilde{H}_n(X/A)$ untuk pasangan baik dan barisan eksak panjang pasangan. Perhitungan sfera dan suspensi berikut memakai hasil standar ini dengan status bukti maju tersebut dinyatakan secara terbuka.

Akibat. Kita mempunyai

$$\tilde{H}_k(S^n) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = n, \\ \{0\}, & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Bukti. Untuk langkah induksi $n \geq 1$, nyatakan $X = \mathbb{D}^n$ dan $A = \partial\mathbb{D}^n$. Setelah memeriksa bahwa pasangan ini merupakan pasangan baik, [teorema barisan eksak ruang hasil bagi](#) memberi barisan eksak.

Pelengkap bukti edisi (pasangan baik). Pemeriksaan yang dilewati sumber dapat diberikan secara eksplisit. Ambil lingkungan terbuka relatif

$$U = \{x \in \mathbb{D}^n : \|x\| > 1/2\}.$$

Pemetaan $r(x) = x/\|x\|$ meretraksikan U ke $\partial\mathbb{D}^n$, dan

$$H(x, t) = \left((1-t) + \frac{t}{\|x\|} \right) x$$

adalah retraksi deformasi: ia tetap berada di U dan menetapkan setiap titik batas. Jadi $(\mathbb{D}^n, \partial\mathbb{D}^n)$ memang pasangan baik.

Barisan eksak yang diperoleh ialah

$$\begin{aligned} \cdots \xrightarrow{\partial} \tilde{H}_k(\partial\mathbb{D}^n) &\xrightarrow{i_*} \tilde{H}_k(\mathbb{D}^n) \xrightarrow{q_*} \tilde{H}_k(\mathbb{D}^n/\partial\mathbb{D}^n) \xrightarrow{\partial} \tilde{H}_{k-1}(\partial\mathbb{D}^n) \\ &\xrightarrow{i_*} \tilde{H}_{k-1}(\mathbb{D}^n) \xrightarrow{q_*} \tilde{H}_{k-1}(\mathbb{D}^n/\partial\mathbb{D}^n) \longrightarrow \cdots \\ \cdots \xrightarrow{\partial} \tilde{H}_0(\partial\mathbb{D}^n) &\xrightarrow{i_*} \tilde{H}_0(\mathbb{D}^n) \xrightarrow{q_*} \tilde{H}_0(\mathbb{D}^n/\partial\mathbb{D}^n) \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

Diagram semantik. Ini adalah barisan pada teorema sebelumnya dengan $(X, A) = (\mathbb{D}^n, \partial\mathbb{D}^n)$.

Kita mengetahui bahwa grup-grup homologi tereduksi $\mathbb{D}^n$ trivial, sehingga kita dapat mengambil subbarisan eksak

$$0 \longrightarrow \tilde{H}_k(\mathbb{D}^n/\partial\mathbb{D}^n) \xrightarrow{\partial} \tilde{H}_{k-1}(\partial\mathbb{D}^n) \longrightarrow 0.$$

Diagram semantik. Pemetaan penghubung ∂ berada di antara dua grup nol dalam potongan barisan eksak ini.

Karena $\mathbb{D}^n/\partial\mathbb{D}^n \cong S^n$ dan $\partial\mathbb{D}^n \cong S^{n-1}$, barisan tersebut setara dengan

$$0 \longrightarrow \tilde{H}_k(S^n) \xrightarrow{\partial} \tilde{H}_{k-1}(S^{n-1}) \longrightarrow 0.$$

Diagram semantik. Pemetaan penghubung mengidentifikasi homologi tereduksi sfera- n pada derajat k dengan homologi tereduksi sfera- $(n-1)$ pada derajat $k-1$.

Karena barisan ini eksak, sebagaimana pada [contoh isomorfisma di atas](#), kita memperoleh

$$\tilde{H}_k(S^n) \cong \tilde{H}_{k-1}(S^{n-1}).$$

Selanjutnya, kita mengetahui bahwa

$$\tilde{H}_k(S^0) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = 0, \\ \{0\}, & \text{selain itu.} \end{cases}$$


Hasilnya sekarang mengikuti dengan induksi. $\square$

Definisi (kerucut suatu ruang). Misalkan X ruang topologis. Kita mendefinisikan **kerucut** X sebagai

$$CX = (X \times [0, 1]) / (X \times \{1\}).$$

Contoh. Misalkan $X = S^1$. Kerucut ruang tersebut adalah

$$CX = CS^1.$$



Gambar 1: Redraw aksesibel kerucut lingkaran: alas berbentuk elips dengan busur belakang putus-putus dan dua garis pembangkit yang bertemu di titik puncak.

Diagram semantik (kerucut lingkaran). Sebuah lingkaran mendatar menjadi alas. Setengah lingkaran depan digambar dengan garis utuh dan setengah bagian belakang dengan garis putus-putus. Setiap titik lingkaran menuju satu titik puncak di atasnya; dua garis pembangkit dari sisi kiri dan kanan alas menuju puncak memperlihatkan bentuk kerucut.

Definisi (suspensi suatu ruang). Misalkan X ruang topologis. Kita mendefinisikan **suspensi** X sebagai

$$SX = CX/X = CX/(X \times \{0\}).$$


Di sini X pada hasil bagi pertama diidentifikasi dengan alas $X \times \{0\} \subset CX$.

Contoh. Misalkan $X = S^1$. Suspensi ruang tersebut adalah

$$SX = SS^1.$$

Diagram semantik (suspensi lingkaran). Sebuah lingkaran mendatar menjadi khatulistiwa. Setengah lingkaran depan digambar dengan garis utuh dan setengah bagian belakang dengan garis putus-putus. Dari sisi kiri dan kanan lingkaran, garis-garis menuju satu puncak di atas dan satu puncak di bawah; bentuknya merupakan kerucut ganda.

Catatan. Perhatikan bahwa SS^n homeomorfik dengan S^{n+1} . Sekarang kita dapat menggeneralisasi pernyataan



Gambar 2: Redraw aksesibel suspensi lingkaran: lingkaran khatulistiwa dengan busur belakang putus-putus serta garis menuju puncak atas dan bawah.

$$\tilde{H}_k(S^n) \cong \tilde{H}_{k-1}(S^{n-1})$$

dari akibat tentang homologi sfera.

Proposisi. Misalkan X ruang topologis tak kosong. Untuk setiap $n \geq 1$,

$$\tilde{H}_n(SX) \cong \tilde{H}_{n-1}(X).$$

Bukti. Kita mengetahui bahwa $CX/X = SX$.

Pelengkap bukti edisi (pasangan baik). Pasangan (CX, X) merupakan pasangan baik. Jika $q: X \times [0, 1] \rightarrow CX$ adalah pemetaan hasil bagi, maka $U = q(X \times [0, 1/2))$ merupakan lingkungan terbuka dari salinan alas $X = q(X \times \{0\})$. Homotopi

$$K([x, s], t) = [x, (1 - t)s]$$

merupakan retraksi deformasi U ke alas dan menetapkan alas titik demi titik.

Karena itu teorema barisan eksak ruang hasil bagi memberi barisan eksak

$$\begin{aligned} \cdots &\xrightarrow{\partial} \tilde{H}_n(X) \xrightarrow{i_*} \tilde{H}_n(CX) \xrightarrow{q_*} \tilde{H}_n(SX) \xrightarrow{\partial} \tilde{H}_{n-1}(X) \\ &\xrightarrow{i_*} \tilde{H}_{n-1}(CX) \xrightarrow{q_*} \tilde{H}_{n-1}(SX) \longrightarrow \cdots \\ \cdots &\xrightarrow{\partial} \tilde{H}_0(X) \xrightarrow{i_*} \tilde{H}_0(CX) \xrightarrow{q_*} \tilde{H}_0(SX) \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

Diagram semantik. Ini adalah barisan eksak panjang pasangan baik (CX, X) ; setelah setiap suku homologi suspensi, ∂ kembali ke homologi X satu derajat lebih rendah.

Kita mengetahui bahwa grup-grup homologi tereduksi CX trivial karena CX dapat dikontraksikan ke titik puncak $X \times \{1\}$. Hal ini memungkinkan kita mengambil subbarisan eksak

$$0 \longrightarrow \tilde{H}_n(SX) \xrightarrow{\partial} \tilde{H}_{n-1}(X) \longrightarrow 0.$$

Diagram semantik. Pemetaan penghubung dari homologi suspensi ke homologi X berada di antara dua grup nol.

Karena barisan ini eksak, sebagaimana pada [contoh isomorfisma di atas](#), kita memperoleh

$$\tilde{H}_n(SX) \cong \tilde{H}_{n-1}(X),$$

yang menyelesaikan bukti. $\square$

Koreksi FOM-U003-COR-014 (rentang derajat). Sumber tidak memberi rentang n pada isomorfisma suspensi. Karena materi ini memakai kompleks rantai berderajat taknegatif dan belum mendefinisikan $\tilde{H}_{-1}$, terjemahan menyatakan rumus untuk $n \geq 1$ dan ruang X tak kosong. Homologi tereduksi derajat nol dari suspensi tak kosong juga nol karena suspensi terhubung lintasan.

Akibat. Untuk $n \geq 1$, $\partial\mathbb{D}^n$ bukan retrak dari $\mathbb{D}^n$.

Bukti. Andaikan $r: \mathbb{D}^n \rightarrow \partial\mathbb{D}^n$ suatu retraksi dan tuliskan $i: \partial\mathbb{D}^n \hookrightarrow \mathbb{D}^n$ untuk inklusi. Karena $r \circ i = \text{id}$, functorialitas homologi tereduksi memberi

$$r_* \circ i_* = \text{id}.$$

Jadi

$$r_*: \tilde{H}_{n-1}(\mathbb{D}^n) \longrightarrow \tilde{H}_{n-1}(\partial\mathbb{D}^n)$$

surjektif. Akan tetapi, dengan memakai hasil-hasil sebelumnya, pemetaan ini berbentuk $r_*: 0 \rightarrow \mathbb{Z}$. Ini kontradiksi dan menyelesaikan bukti untuk $n \geq 1$. $\square$

Akibat (teorema titik tetap Brouwer). Untuk setiap $n \geq 0$, setiap pemetaan kontinu $f: \mathbb{D}^n \rightarrow \mathbb{D}^n$ mempunyai titik tetap.


Bukti. Kasus $n = 0$ langsung karena $\mathbb{D}^0$ hanya terdiri atas satu titik. Untuk $n \geq 1$, andaikan, menuju kontradiksi, bahwa $f: \mathbb{D}^n \rightarrow \mathbb{D}^n$ tidak mempunyai titik tetap. Definisikan $r: \mathbb{D}^n \rightarrow \partial\mathbb{D}^n$ dengan memetakan x ke titik potong $\partial\mathbb{D}^n$ dengan sinar yang berawal di $f(x)$ dan melalui x .

Pelengkap bukti edisi (kontinuitas). Kontinuitas yang hanya dinyatakan dalam sumber dapat diperiksa langsung. Tuliskan $a = f(x)$ dan $v = x - f(x) \neq 0$. Titik potong positif ialah

$$r(x) = a + t(x)v, \quad t(x) = \frac{-\langle a, v \rangle + \sqrt{\langle a, v \rangle^2 + \|v\|^2(1 - \|a\|^2)}}{\|v\|^2}.$$

Penyebutnya positif karena $v \neq 0$, dan semua operasi pada rumus itu kontinu; jadi r kontinu. Akar yang dipilih adalah perpotongan pada arah positif dan memenuhi $t(x) \geq 1$. Jika $x \in \partial\mathbb{D}^n$, akar tersebut adalah $t(x) = 1$, sehingga $r(x) = x$.

Diagram semantik (retraksi yang timbul jika tidak ada titik tetap). Di dalam sebuah cakram terdapat titik $f(x)$ dan titik berbeda x . Garis dari $f(x)$ melalui x diperpanjang hingga memotong lingkaran batas pada $r(x)$; urutan ketiga titik pada sinar ialah $f(x)$, lalu x , lalu $r(x)$.



Gambar 3: Redraw aksesibel konstruksi retraksi Brouwer: sinar dari $f(x)$ melewati x lalu mencapai $r(x)$ pada batas cakram.

Pemetaan $r: \mathbb{D}^n \rightarrow \partial\mathbb{D}^n$ kontinu dan

$$r|_{\partial\mathbb{D}^n} = \text{id},$$

sehingga r merupakan retraksi. Argumen functorialitas homologi tereduksi pada bukti sebelumnya mewajibkan r_* surjektif. Secara khusus,

$$r_*: \tilde{H}_{n-1}(\mathbb{D}^n) \longrightarrow \tilde{H}_{n-1}(\partial\mathbb{D}^n) = \tilde{H}_{n-1}(S^{n-1})$$

harus surjektif. Namun kita telah menghitung grup-grup homologi ini, sehingga kita mengetahui bahwa r_* adalah pemetaan dari $\{0\}$ ke $\mathbb{Z}$ dan tidak mungkin surjektif. Kontradiksi ini menyelesaikan bukti. $\square$

Audit koreksi sumber

Blok-blok berikut bukan prosa sumber. Blok ini mencatat setiap perubahan substantif atau tipografis yang diterapkan pada terjemahan di atas.

Koreksi FOM-U003-COR-001 (tanda baca). Sumber memutus kalimat sesudah “for some i ” lalu memulai “then” sebagai kalimat baru. Terjemahan menggabungkannya menjadi satu kalimat bersyarat tanpa mengubah makna.

Koreksi FOM-U003-COR-002 (urutan komposisi). Sumber mencetak $\alpha_{n+1} \circ \alpha_n = 0$. Dengan arah panah sumber, $A_{n+1} \xrightarrow{\alpha_{n+1}} A_n \xrightarrow{\alpha_n} A_{n-1}$, komposisi itu tidak bertipe. Terjemahan memakai rumus yang bertipe benar, $\alpha_n \circ \alpha_{n+1} = 0$, sambil mempertahankan pernyataan bahwa setiap dua pemetaan berturutan berkomposisi menjadi nol.

Koreksi FOM-U003-COR-003 (panah ganda). Kode TikZ-CD sumber menggambar panah tak berlabel dan panah berlabel α secara bersamaan dari A ke B . Terjemahan menampilkan satu panah $\alpha: A \rightarrow B$, yakni objek matematis yang dijelaskan oleh prosa dan kesimpulan sumber.

Koreksi FOM-U003-COR-004 (identifikasi hasil bagi). Sumber menulis secara informal $A \subseteq B$ dan $C = B/A$. Karena pemetaan yang diberikan sebenarnya adalah $\alpha: A \rightarrow B$, terjemahan menyatakan identifikasi yang diperlukan dan bentuk yang tepat: $C \cong B/\text{im } \alpha \cong B/A$ setelah A diidentifikasi dengan $\text{im } \alpha$.

Koreksi FOM-U003-COR-012 (kualifikasi homologi cakram). Sumber mengatakan bahwa “the homology groups” dari $\mathbb{D}^n$ trivial. Homologi biasa $H_0(\mathbb{D}^n) \cong \mathbb{Z}$ tidak trivial; suku-suku dalam diagram sumber adalah homologi tereduksi. Terjemahan karena itu menyebut secara eksplisit grup homologi tereduksi $\mathbb{D}^n$.

Koreksi FOM-U003-COR-005 (homologi tereduksi pada kasus dasar). Seluruh pernyataan dan rekursi memakai $\tilde{H}$, tetapi sumber mencetak $H_k(S^0) = \mathbb{Z}$ untuk $k = 0$. Homologi biasa sebenarnya memenuhi $H_0(S^0) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$; rumus yang diperlukan adalah $\tilde{H}_0(S^0) \cong \mathbb{Z}$. Terjemahan mengembalikan tilde yang hilang.

Koreksi FOM-U003-COR-006 (muka yang diruntuhkan pada suspensi). Definisi kerucut pada baris 1448 telah meruntuhkan $X \times \{1\}$ menjadi titik puncak. Sumber kemudian mencetak $SX = CX/X = CX/(X \times \{1\})$, yang hanya meruntuhkan kembali titik puncak dan tidak menghasilkan suspensi. Terjemahan memakai $SX = CX/(X \times \{0\})$, yaitu meruntuhkan alas kerucut, sesuai dengan CX/X , gambar sumber, catatan $SS^n \cong S^{n+1}$, dan bukti berikutnya.

Koreksi FOM-U003-COR-007 (nama konstruksi). Contoh dimulai dengan $SX = SS^1$ dan menampilkan kerucut ganda, tetapi prosa sumber menyebutnya “the cone of a space”. Terjemahan memakai “suspensi ruang tersebut”.

Koreksi FOM-U003-COR-008 (salah ketik simbol). Suku terakhir diagram sumber mencetak $\tilde{H}_0(XS)$. Semua suku dan definisi di sekitarnya memakai SX ; terjemahan membetulkannya menjadi $\tilde{H}_0(SX)$.

Koreksi FOM-U003-COR-009 (titik kontraksi kerucut). Sumber menulis “contracible” dan menyebut titik $X \times \{0\}$. Berdasarkan definisi sumber, $X \times \{0\}$ adalah alas yang tetap berupa salinan X , sedangkan $X \times \{1\}$ diruntuhkan menjadi satu titik puncak. Terjemahan memakai “dapat dikontraksikan ke titik puncak $X \times \{1\}$ ”. Karena homologi biasa $H_0(CX) \cong \mathbb{Z}$ tidak trivial, terjemahan juga mempertahankan jenis grup pada diagram dengan menyebut secara eksplisit **homologi tereduksi**.

Koreksi FOM-U003-COR-010 (hipotesis teorema Brouwer). Sumber mencetak “Every contractive map”. Teorema titik tetap Brouwer dan bukti retraksi yang diberikan berlaku untuk setiap **pemetaan kontinu** $f: \mathbb{D}^n \rightarrow \mathbb{D}^n$; tidak ada konstanta kontraksi yang dipakai. Terjemahan karena itu memakai “pemetaan kontinu”.

Koreksi FOM-U003-COR-011 (negasi yang salah ketik). Sumber mencetak bahwa f “has to fixed points”. Argumen kontradiksi dan konstruksi sinar hanya bermakna di bawah asumsi bahwa f **tidak mempunyai titik tetap**. Terjemahan memulihkan negasi tersebut.

Koreksi FOM-U003-COR-013 (homologi tereduksi dan derajat). Bukti sumber menulis $H_{n-1}(\mathbb{D}^n) = 0$ dan $H_{n-1}(\partial\mathbb{D}^n) \cong \mathbb{Z}$. Untuk $n = 1$, kedua rumus homologi biasa itu salah: $H_0(\mathbb{D}^1) \cong \mathbb{Z}$ dan $H_0(S^0) \cong \mathbb{Z}^2$. Argumen menjadi seragam dan benar untuk $n \geq 1$ dengan homologi tereduksi. Terjemahan menerapkan koreksi tersebut; kasus $n = 0$ pada teorema titik tetap ditangani langsung.

Perbaikan FOM-U003-COR-015 (kontinuitas retraksi radial). Sumber menggambarkan retraksi radial dan kemudian hanya menyatakan bahwa pemetaan itu kontinu. Terjemahan menambahkan parameter perpotongan positif secara eksplisit dan memeriksa bahwa rumusnya kontinu selama $f(x) \neq x$.

33.2 Homologi relatif

Definisi (grup rantai relatif). Misalkan (X, A) suatu pasangan dengan $A \subseteq X$, dan X ruang topologis. Kita telah melihat bahwa $C_n(A) \subseteq C_n(X)$. Definiskan

$$C_n(X, A) := C_n(X)/C_n(A).$$

Grup ini adalah grup abelian bebas dengan basis

$$\{\sigma_\alpha: \Delta^n \longrightarrow X\}_\alpha \quad \text{yang memenuhi} \quad \sigma_\alpha(\Delta^n) \not\subseteq A.$$

Dengan kata lain, generator yang seluruh citranya berada di A menjadi nol dalam hasil bagi tersebut.

Komentar sumber. Baris 1575 memuat komentar TeX “direct complement?”. Karena basis $C_n(A)$ adalah tepat subhimpunan basis $C_n(X)$ yang citranya berada di A , grup bebas itu memang terbelah sebagai $C_n(A)$ ditambah grup bebas pada generator sisanya; hasil bagi diidentifikasi dengan suku kedua. Komentar tersebut tidak dihapus diam-diam dari catatan kerja ini.

Catatan. Pemetaan batas $\partial: C_n(X) \rightarrow C_{n-1}(X)$ memenuhi

$$\partial(C_n(A)) \subseteq C_{n-1}(A).$$

Karena itu ∂ menginduksi pemetaan pada grup hasil bagi,

$$\partial: C_n(X)/C_n(A) \longrightarrow C_{n-1}(X)/C_{n-1}(A).$$

Jadi pemetaan batas relatif

$$\partial: C_n(X, A) \longrightarrow C_{n-1}(X, A)$$

terdefinisi dengan baik.

Koreksi tipografis yang diusulkan. Sumber mencetak $\rightarrow: C_{n-1}(X, A)$. Tanda titik dua setelah $\rightarrow$ tidak mempunyai fungsi matematis dan dihapus pada rumus terjemahan di atas.

Catatan. Pasangan $(C_n(X, A), \partial)$ merupakan kompleks rantai karena $\partial^2 = 0$.

Definisi (homologi relatif). Homologi pasangan (X, A) , atau **grup homologi relatif**, didefinisikan sebagai homologi kompleks rantai $(C_n(X, A), \partial)$. Grup-grup ini dinotasikan dengan $H_n(X, A)$. Dengan demikian,

$$H_n(X, A) = \ker \partial_n / \operatorname{im} \partial_{n+1},$$

dengan ∂ pemetaan batas pada kompleks rantai relatif tersebut.


Catatan (siklus relatif). Sebuah siklus relatif adalah rantai relatif

$$c + C_n(A) \in C_n(X, A)$$

untuk suatu $c \in C_n(X)$ yang memenuhi $\partial c \in C_{n-1}(A)$.

Diagram semantik (siklus-1 relatif). Kurva tertutup luar menyatakan X dan daerah tertutup berwarna biru di dalamnya menyatakan A . Rantai 1 berwarna merah bergerak di X dan mempunyai dua titik ujung pada A . Karena kedua titik ujung itu membentuk batas yang terletak di A , kelas rantai merah mempunyai batas nol setelah diambil modulo $C_0(A)$.

Catatan (batas relatif). Sebuah batas relatif adalah rantai relatif



Gambar 4: Redraw aksesibel siklus relatif: rantai merah di X memiliki kedua titik ujung di subruang biru A .

$$b + C_n(A) \in C_n(X, A)$$

untuk suatu $b \in C_n(X)$ sedemikian sehingga

$$\begin{aligned} b + C_n(A) &= \partial(c + C_{n+1}(A)) \\ &= \partial c + C_n(A) \end{aligned}$$

bagi suatu $c + C_{n+1}(A) \in C_{n+1}(X, A)$. Kondisi ini ekuivalen dengan

$$b - \partial c \in C_n(A).$$


Diagram semantik (batas-2 relatif). Kurva tertutup luar menyatakan X , dan daerah biru menyatakan A . Batas rantai-2 merah terdiri atas busur merah di luar A bersama sebuah ruas putus-putus biru yang terletak di A dan menghubungkan kedua ujung busur. Ruas di A lenyap dalam hasil bagi, sehingga kelas busur merah adalah batas relatif.

Koreksi tipografis yang diusulkan. Kata sumber “equialent” dibaca sebagai “equivalent”; tidak ada perubahan pada persamaan $b - \partial c \in C_n(A)$.


Catatan (rantai tetap merupakan jumlah formal). Perhatikan dua rantai-1 σ_1 dan σ_2 yang masing-masing digambar merah dan hijau.

Diagram semantik (dua simpleks singular yang berbeda). Kurva tertutup luar menyatakan X dan kurva tertutup biru yang lebih kecil menyatakan A . Kedua rantai mengikuti lintasan yang sama di luar A menuju dan meninggalkan daerah biru; bagian yang berimpit ditampilkan dengan garis putus-putus merah dan hijau berselang-seling. Di dalam A , σ_1 mengikuti setengah lingkaran atas, sedangkan σ_2 mengikuti setengah lingkaran bawah.

Kedua rantai itu **tidak sama** dalam $C_1(X, A)$. Ingat bahwa jumlah dalam grup rantai singular adalah jumlah formal generator. Ia bukan penjumlahan pemetaan secara titik demi titik, atau operasi serupa. Secara khusus, $\sigma_1 - \sigma_2$ bukan unsur $C_1(A)$: kedua generator tersebut merupakan pemetaan pada seluruh simpleks dan citra masing-masing tidak seluruhnya terletak di A .



Gambar 5: Redraw aksesibel batas relatif: batas merah ditutup oleh ruas biru putus-putus yang terletak di A.



Gambar 6: Redraw aksesibel dua rantai formal: sigma satu dan sigma dua berimpit di luar A tetapi mengikuti busur berbeda di dalam A.

Koreksi indeks. Sumber sedang membahas rantai-1, tetapi menulis $C_n(A)$. Pada lokus ini grup yang bertipe tepat adalah $C_1(A)$; terjemahan memakai indeks yang dikoreksi dan tetap menjelaskan bahwa pengurangan berlangsung dalam grup abelian bebas, bukan secara titik demi titik pada pemetaan.

Definisi (peta pasangan). Suatu pemetaan

$$f: (X, A) \longrightarrow (Y, B)$$

disebut **peta pasangan** jika f kontinu dan $f(A) \subseteq B$.

Catatan (pemetaan terinduksi dan homotopi relatif). Sebuah peta pasangan f menginduksi pemetaan pada homologi relatif, yang dinotasikan

$$f_*: H_n(X, A) \longrightarrow H_n(Y, B).$$

Selain itu, jika terdapat homotopi $F: X \times I \rightarrow Y$ dari f ke g yang memenuhi $F(A \times I) \subseteq B$ —yakni homotopi melalui peta pasangan—maka $f_* = g_*$. Untuk melihatnya, perhatikan bahwa operator prisma P dari [Teorema invariansi homotopi Unit Fomberg 002](#) membawa $C_n(A)$ ke $C_{n+1}(B)$. Karena itu ia menurunkan operator prisma relatif

$$P: C_n(X, A) \longrightarrow C_{n+1}(Y, B).$$

Operator relatif ini hanyalah operator prisma yang diturunkan ke grup hasil bagi. Identitas homotopi rantai yang digunakan adalah

$$\partial P + P\partial = g_{\#} - f_{\#},$$

Dari identitas itu disimpulkan bahwa $f_{\#}$ dan $g_{\#}$ dihubungkan oleh homotopi rantai sebagai pemetaan rantai relatif; karena itu keduanya menginduksi homomorfisma yang sama pada homologi relatif.

Koreksi substantif. “pris, operator” pada baris 1683 adalah salah ketik untuk “prism operator”. Lebih penting, sumber mencetak $g_{\#} + f_{\#}$, sedangkan identitas homotopi rantai memakai **selisih**:

$$\partial P + P\partial = g_{\#} - f_{\#}.$$

Tanda ini sama dengan identitas yang telah dibuktikan pada Unit Fomberg 002. Terjemahan memakai rumus yang dikoreksi dan audit ini mempertahankan jejak bentuk sumber.

Klarifikasi FOM-U003-COR-016 (jenis homotopi). Sumber memakai $f \simeq_A g$ tanpa mendefinisikannya. Argumen operator prisma memerlukan homotopi F dengan $F(A \times I) \subseteq B$, bukan homotopi yang harus menetapkan A titik demi titik. Terjemahan menyatakan syarat tepat itu dan menamainya “homotopi melalui peta pasangan”.

Catatan (barisan eksak pendek kompleks rantai). Baris-baris pada diagram berikut adalah barisan eksak pendek, dan seluruh diagram komutatif:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & C_n(A) & \xrightarrow{i_{\#}} & C_n(X) & \xrightarrow{q_{\#}} & C_n(X, A) \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \partial & & \downarrow \partial & & \downarrow \partial \\ 0 & \longrightarrow & C_{n-1}(A) & \xrightarrow{i_{\#}} & C_{n-1}(X) & \xrightarrow{q_{\#}} & C_{n-1}(X, A) \longrightarrow 0. \end{array}$$

Diagram semantik (persegi kompleks rantai relatif). Setiap baris berjalan dari grup nol melalui rantai pada A , rantai pada X , dan rantai relatif $C_{\bullet}(X, A)$ menuju grup nol. Panah mendatar adalah inklusi $i_{\#}$ lalu hasil bagi $q_{\#}$; tiga panah vertikal adalah pemetaan batas. Ketiga persegi berkomutasi.

Komutativitas berarti $i_{\#}$ dan $q_{\#}$ adalah pemetaan rantai. Dengan terus menambahkan baris untuk derajat-derajat rantai lainnya, kita memperoleh barisan eksak pendek kompleks rantai

$$0 \longrightarrow \mathcal{A} \xrightarrow{i} \mathcal{B} \xrightarrow{q} \mathcal{C} \longrightarrow 0,$$

dengan $\mathcal{A}$ kompleks rantai A , $\mathcal{B}$ kompleks rantai X , dan $\mathcal{C}$ kompleks rantai pasangan (X, A) .

Diagram semantik. Lima objek tersusun linear: $0 \rightarrow \mathcal{A} \xrightarrow{i} \mathcal{B} \xrightarrow{q} \mathcal{C} \rightarrow 0$. Eksak pada setiap derajat berarti i injektif, q surjektif, dan $\text{im } i = \ker q$.

Teorema (barisan eksak panjang dalam homologi). Misalkan

$$0 \longrightarrow \mathcal{A} \xrightarrow{i} \mathcal{B} \xrightarrow{j} \mathcal{C} \longrightarrow 0$$

suatu barisan eksak pendek kompleks rantai. Maka terdapat barisan eksak panjang dalam homologi (disingkat “l.e.s.” dalam sumber)

$$\cdots \longrightarrow H_n(\mathcal{A}) \xrightarrow{i_*} H_n(\mathcal{B}) \xrightarrow{j_*} H_n(\mathcal{C}) \xrightarrow{\partial} H_{n-1}(\mathcal{A}) \longrightarrow \cdots$$

Diagram semantik. Diagram pertama adalah $0 \rightarrow \mathcal{A} \xrightarrow{i} \mathcal{B} \xrightarrow{j} \mathcal{C} \rightarrow 0$. Diagram kedua menerus tanpa putus melalui $H_n(\mathcal{A}) \xrightarrow{i_*} H_n(\mathcal{B}) \xrightarrow{j_*} H_n(\mathcal{C})$, lalu melalui pemetaan penghubung ∂ menuju $H_{n-1}(\mathcal{A})$ dan derajat berikutnya.

Catatan. Untuk contoh pasangan sebelumnya, i adalah pemetaan inklusi dan j adalah pemetaan hasil bagi.

Akibat. Untuk setiap pasangan (X, A) , barisan

$$\cdots \longrightarrow H_n(A) \xrightarrow{i_*} H_n(X) \xrightarrow{q_*} H_n(X, A) \xrightarrow{\partial} H_{n-1}(A) \longrightarrow \cdots$$

eksak.

Diagram semantik. Panah berturut-turut adalah homomorfisma homologi yang diinduksi inklusi, homomorfisma yang diinduksi hasil bagi, lalu pemetaan penghubung yang menurunkan derajat satu tingkat. Barisan berlanjut ke dua arah.

Bukti pelengkap edisi. Pada setiap derajat, inklusi dan proyeksi hasil bagi membentuk barisan eksak pendek

$$0 \longrightarrow C_n(A) \xrightarrow{i_{\#}} C_n(X) \xrightarrow{q_{\#}} C_n(X, A) \longrightarrow 0.$$

Pemetaan-pemetaan ini berkomutasi dengan batas, sehingga barisan tersebut adalah barisan eksak pendek kompleks rantai. Terapkan [teorema barisan eksak panjang](#) dengan $\mathcal{A} = C_*(A)$, $\mathcal{B} = C_*(X)$, dan $\mathcal{C} = C_*(X, A)$. Barisan pada pernyataan akibat diperoleh langsung. Tidak diperlukan hipotesis pasangan baik. $\square$

Bukti sumber untuk [Teorema barisan eksak panjang](#), sampai bagian yang dihilangkan. Barisan eksak pendek kompleks rantai dapat ditulis sebagai diagram komutatif berikut:

$$\begin{array}{ccccccc}
& 0 & & 0 & & 0 & \\
& \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\
\cdots & \longrightarrow & A_{n+1} & \xrightarrow{\partial} & A_n & \xrightarrow{\partial} & A_{n-1} \longrightarrow \cdots \\
& & \downarrow i & & \downarrow i & & \downarrow i \\
\cdots & \longrightarrow & B_{n+1} & \xrightarrow{\partial} & B_n & \xrightarrow{\partial} & B_{n-1} \longrightarrow \cdots \\
& & \downarrow j & & \downarrow j & & \downarrow j \\
\cdots & \longrightarrow & C_{n+1} & \xrightarrow{\partial} & C_n & \xrightarrow{\partial} & C_{n-1} \longrightarrow \cdots \\
& & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
& & 0 & & 0 & & 0.
\end{array}$$

Diagram semantik (tangga kompleks rantai). Tiga baris mendatar adalah kompleks $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$, dan $\mathcal{C}$ pada derajat $n+1, n, n-1$ dengan semua panah batas. Setiap kolom adalah barisan eksak $0 \rightarrow A_k \xrightarrow{i} B_k \xrightarrow{j} C_k \rightarrow 0$. Semua persegi berkomutasi.

Karena i dan j adalah pemetaan rantai, keduanya berkomutasi dengan pemetaan batas; karena itu diagram tersebut komutatif. Untuk memperoleh barisan

$$\cdots \longrightarrow H_n(\mathcal{A}) \xrightarrow{i_*} H_n(\mathcal{B}) \xrightarrow{j_*} H_n(\mathcal{C}) \xrightarrow{\partial} H_{n-1}(\mathcal{A}) \longrightarrow \cdots,$$

kita memerlukan pemetaan antara $H_n(\mathcal{C})$ dan $H_{n-1}(\mathcal{A})$. Pada tingkat wakil, sumber menggambarkan konstruksi itu sebagai

$$\partial: C_n \longrightarrow A_{n-1}.$$

Ambil $c \in C_n$. Karena j surjektif, terdapat $b \in B_n$ dengan $j(b) = c$. Terapkan pemetaan batas pada b untuk memperoleh $\partial b \in B_{n-1}$. Kita ingin menunjukkan adanya $a \in A_{n-1}$ sehingga

$$i(a) = \partial b,$$

karena dengan demikian c dapat dikirim ke a . Kita perlu membuktikan $\partial b \in \text{im } i$. Berdasarkan eksakitas, $\text{im } i = \ker j$, jadi cukup dibuktikan bahwa $j(\partial b) = 0$. Karena j berkomutasi dengan ∂ ,

$$j(\partial b) = \partial j(b) = \partial c.$$

Jadi $\partial b \in \text{im } i$ tepat ketika $c \in \ker \partial_n$. Hal ini memberi aturan pada unsur-unsur kernel, dan

$$H_n(\mathcal{C}) = \ker \partial_n / \text{im } \partial_{n+1}.$$

Dengan demikian, untuk kelas yang diwakili c , konstruksi menghasilkan suatu a pada derajat $n-1$. Kita masih perlu memastikan bahwa $a \in \ker \partial_{n-1}$. Pertimbangkan bagian diagram

$$\begin{array}{ccccccc}
& 0 & & 0 & & 0 & \\
& \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\
\cdots & \longrightarrow & A_n & \xrightarrow{\partial} & A_{n-1} & \xrightarrow{\partial} & A_{n-2} \longrightarrow \cdots \\
& & \downarrow i & & \downarrow i & & \downarrow i \\
\cdots & \longrightarrow & B_n & \xrightarrow{\partial} & B_{n-1} & \xrightarrow{\partial} & B_{n-2} \longrightarrow \cdots
\end{array}$$

Diagram semantik (pemeriksaan bahwa sasaran adalah siklus). Dua baris adalah kompleks $\mathcal{A}$ dan $\mathcal{B}$ pada derajat $n, n-1, n-2$. Panah vertikal i membentuk tiga persegi komutatif dengan

panah batas; di atas baris $\mathcal{A}$ terdapat grup nol yang memetakan ke setiap A_k sebagai bagian kolom eksak.

Karena $a \in A_{n-1}$, unsur $i(\partial a)$ terletak di B_{n-2} . Karena i adalah pemetaan rantai,

$$i(\partial a) = \partial i(a).$$

Dari $i(a) = \partial b$ diperoleh

$$i(\partial a) = \partial \partial b = 0.$$

Maka $\partial a \in \ker i$. Karena i injektif, $\partial a = 0$. Lebih tepatnya, $\partial_{n-1} a = 0$, sehingga $a \in \ker \partial_{n-1}$.

Tersisa untuk menunjukkan eksakitas barisan

$$\cdots \longrightarrow H_n(\mathcal{A}) \xrightarrow{i_*} H_n(\mathcal{B}) \xrightarrow{j_*} H_n(\mathcal{C}) \xrightarrow{\partial} H_{n-1}(\mathcal{A}) \longrightarrow \cdots.$$

Argumen sejauh ini banyak memakai apa yang disebut **pengejaran diagram**. Sumber menambahkan bahwa namanya sudah menjelaskan alasannya.

Koreksi tipografis yang diusulkan. Kata sumber “arguemnts” dibaca sebagai “arguments”. Kalimat tentang pengejaran diagram diterjemahkan tanpa mengubah isinya.

Bagian yang dihilangkan dalam sumber. Sumber menyatakan bahwa untuk menyelesaikan bukti tinggal ditunjukkan, langsung dari definisi melalui pengejaran diagram, bahwa barisan panjang tersebut eksak. Pengejaran diagram itu kemudian dihilangkan. Selain itu, bagian sebelumnya baru membuktikan bahwa konstruksi menghasilkan suatu siklus; independensi terhadap pilihan angkat dan wakil kelas belum diperiksa. Perbaikan lengkap yang disusun mandiri untuk edisi ini diberikan berikutnya.

Perbaikan bukti FOM-PR-04 (keterdefinisan dan eksakitas lengkap). Untuk menghindari tertukarnya pemetaan penghubung dengan diferensial kompleks, notasikan pemetaan penghubung dengan

$$\delta_n: H_n(\mathcal{C}) \longrightarrow H_{n-1}(\mathcal{A}).$$

Ambil kelas $[c] \in H_n(\mathcal{C})$ dan pilih wakil siklus $c \in C_n$, jadi $\partial c = 0$. Surjektivitas $j: B_n \rightarrow C_n$ memberi $b \in B_n$ dengan $j(b) = c$. Karena

$$j(\partial b) = \partial j(b) = \partial c = 0,$$

eksakitas kolom memberi $a \in A_{n-1}$ dengan $i(a) = \partial b$. Injektivitas i dan identitas $\partial^2 = 0$ memberi

$$i(\partial a) = \partial i(a) = \partial^2 b = 0, \quad \text{maka} \quad \partial a = 0.$$

Definisikan $\delta_n([c]) := [a]$.

Kita periksa semua pilihan. Jika b' juga mengangkat c , maka $j(b' - b) = 0$, sehingga $b' - b = i(x)$ untuk suatu $x \in A_n$. Jika $i(a') = \partial b'$, maka

$$i(a' - a) = \partial(b' - b) = \partial i(x) = i(\partial x).$$

Karena i injektif, $a' - a = \partial x$; jadi $[a'] = [a]$. Jika wakil siklus diganti oleh $c' = c + \partial d$, pilih $e \in B_{n+1}$ dengan $j(e) = d$. Unsur $b' = b + \partial e$ mengangkat c' , dan $\partial b' = \partial b$; karena itu kelas keluaran tidak berubah. Independensi terhadap pengangkatan lain telah tercakup oleh pemeriksaan pertama. Untuk dua kelas, jumlah dari dua pengangkatan mengangkat jumlah wakilnya, sehingga konstruksi juga aditif. Jadi δ_n adalah homomorfisma yang terdefinisi dengan baik.

Sekarang periksa eksakitas pada tiga posisi berurutan.

1. **Eksak pada $H_n(\mathcal{B})$.** Jelas $j_* i_* = 0$, sehingga $\text{im } i_* \subseteq \ker j_*$. Sebaliknya, ambil siklus $b \in B_n$ dengan $j_*[b] = 0$. Ada $c \in C_{n+1}$ sehingga $j(b) = \partial c$. Pilih $d \in B_{n+1}$ dengan $j(d) = c$. Maka

$$j(b - \partial d) = j(b) - \partial j(d) = 0.$$

Jadi $b - \partial d = i(a)$ untuk suatu $a \in A_n$. Karena $\partial b = 0$, $i(\partial a) = \partial(b - \partial d) = 0$; injektivitas i memberi $\partial a = 0$. Maka $[b] = i_*[a]$, sehingga $\ker j_* \subseteq \text{im } i_*$.

2. **Eksak pada $H_n(\mathcal{C})$.** Jika $[c] = j_*[b]$ untuk suatu siklus b , kita boleh memakai b sebagai pengangkatan $c = j(b)$. Karena $\partial b = 0$, konstruksi memberi $\delta_n[c] = 0$. Jadi $\text{im } j_* \subseteq \ker \delta_n$. Sebaliknya, misalkan $\delta_n[c] = 0$. Pilih pengangkatan b dan siklus a dengan $i(a) = \partial b$. Persamaan $[a] = 0$ memberi $x \in A_n$ dengan $a = \partial x$. Karena itu

$$\partial(b - i(x)) = \partial b - i(\partial x) = i(a) - i(a) = 0,$$

sedangkan $j(b - i(x)) = j(b) = c$. Jadi $[c] = j_*[b - i(x)]$ dan $\ker \delta_n \subseteq \text{im } j_*$.

3. **Eksak pada $H_{n-1}(\mathcal{A})$.** Dari definisi, $i_* \delta_n[c] = [i(a)] = [\partial b] = 0$, sehingga $\text{im } \delta_n \subseteq \ker i_*$. Sebaliknya, ambil siklus $a \in A_{n-1}$ dengan $i_*[a] = 0$. Ada $b \in B_n$ dengan $i(a) = \partial b$. Letakkan $c = j(b)$. Maka

$$\partial c = j(\partial b) = j(i(a)) = 0,$$

jadi c adalah siklus. Dalam konstruksi $\delta_n[c]$, unsur b merupakan pengangkatan c dan menghasilkan tepat a ; dengan demikian $\delta_n[c] = [a]$. Jadi $\ker i_* \subseteq \text{im } \delta_n$.

Ketiga pemeriksaan berlaku untuk setiap n . Dengan menyambungkan derajat-derajat berturutan, seluruh barisan panjang eksak. Pemetaan δ_n inilah panah yang dinotasikan ∂ pada pernyataan teorema. $\square$

Audit sumber. Baris 1808 menyebut konstruksi sebagai $\partial: C_n \rightarrow A_{n-1}$, meskipun aturan tersebut hanya dimulai pada siklus dan sasaran akhirnya adalah kelas homologi. Baris 1825 juga memakai $c \in H_n(\mathcal{C})$ setelah sebelumnya c adalah unsur C_n . Baris 1856 menyebut pemetaan “terdefinisi dengan baik” setelah hanya membuktikan bahwa a merupakan siklus. Perbaikan FOM-PR-04 membedakan rantai dari kelasnya dan memeriksa seluruh pilihan secara eksplisit.

Catatan. Terdapat versi [Teorema barisan eksak panjang](#) untuk homologi tereduksi.

Contoh. Misalkan $x_0 \in X$. Dengan menerapkan versi tereduksi dari [Teorema barisan eksak panjang](#) pada $(X, \{x_0\})$, untuk $n \geq 1$ diperoleh potongan barisan eksak panjang

$$\cdots \longrightarrow \tilde{H}_n(\{x_0\}) \xrightarrow{i_*} \tilde{H}_n(X) \xrightarrow{q_*} H_n(X, \{x_0\}) \xrightarrow{\partial} \tilde{H}_{n-1}(\{x_0\}) \longrightarrow \cdots$$

Karena

$$\tilde{H}_n(\{x_0\}) = \tilde{H}_{n-1}(\{x_0\}) \cong \{0\},$$

dan barisan itu eksak, diperoleh

$$\tilde{H}_n(X) \cong H_n(X, \{x_0\}).$$

Pelengkap edisi (derajat nol). Derajat nol tidak memerlukan $\tilde{H}_{-1}$. Barisan eksak panjang biasa memberi

$$H_0(\{x_0\}) \longrightarrow H_0(X) \longrightarrow H_0(X, \{x_0\}) \longrightarrow 0.$$

Jika e_0 menyatakan komponen lintasan yang memuat x_0 , grup relatif di kanan adalah $H_0(X)/\mathbb{Z}e_0$. Pemetaan yang mengirim kelas generator e_C ke $e_C - e_0$ mengidentifikasinya dengan $\tilde{H}_0(X)$. Jadi isomorfisma yang sama juga berlaku pada derajat nol, tanpa menggunakan homologi tereduksi berderajat negatif.

Diagram semantik. Barisan berjalan dari homologi tereduksi satu titik ke homologi tereduksi X , lalu ke homologi relatif pasangan bertitik, kemudian kembali ke homologi tereduksi satu titik pada derajat satu lebih rendah. Panahnya berturut-turut i_* , q_* , dan pemetaan penghubung.

Koreksi notasi. Sumber memulai dengan $x \in X$ dan pasangan $(X, \{x\})$, tetapi diagram serta kesimpulan tiba-tiba memakai x_0 . Sumber juga menulis $\tilde{H}_n(X, x_0)$ tanpa menampilkan singleton. Terjemahan memakai x_0 secara konsisten dan menuliskan suku relatif standar $H_n(X, \{x_0\})$ dalam barisan tereduksi.

Catatan (barisan eksak panjang suatu tripel). Barisan eksak panjang pasangan (X, A) dapat diperumum menjadi barisan eksak panjang tripel (X, A, B) , dengan $B \subset A \subset X$:

$$\cdots \longrightarrow H_n(A, B) \longrightarrow H_n(X, B) \longrightarrow H_n(X, A) \longrightarrow H_{n-1}(A, B) \longrightarrow \cdots$$

Barisan ini adalah barisan eksak panjang grup homologi yang berkaitan dengan barisan eksak pendek kompleks rantai yang, pada setiap derajat, dibentuk oleh

$$0 \longrightarrow C_n(A, B) \longrightarrow C_n(X, B) \longrightarrow C_n(X, A) \longrightarrow 0.$$

Diagram semantik (tripel). Pada derajat n , panah bergerak dari $H_n(A, B)$ ke $H_n(X, B)$, lalu ke $H_n(X, A)$, dan melalui pemetaan penghubung ke $H_{n-1}(A, B)$; elipsis pada kedua ujung menandakan kelanjutan barisan.

Diagram semantik (kompleks rantai tripel). Lima objek tersusun sebagai $0 \rightarrow C_n(A, B) \rightarrow C_n(X, B) \rightarrow C_n(X, A) \rightarrow 0$. Barisan ini eksak pada setiap derajat, dan pemetaan-pemetaan antar-derajat berkomutasi dengan batas.

Sebagai contoh, jika B adalah sebuah titik, barisan eksak panjang tripel (X, A, B) menjadi barisan eksak panjang homologi tereduksi untuk pasangan (X, A) .

Koreksi tipografis yang diusulkan. Frasa sumber “the a long exact sequence” dibaca sebagai “to a long exact sequence”; struktur matematis $B \subset A \subset X$ tidak berubah.

Koreksi notasi yang diusulkan. Baris 1918 memakai huruf kecil b , padahal anggota ketiga tripel telah dinotasikan B . Pernyataan yang konsisten ialah: “jika B adalah sebuah titik”.

Koreksi cakupan. Akibat sumber mempertahankan hipotesis “pasangan baik”, padahal barisan eksak pendek grup rantai singular berlaku untuk setiap pasangan. Terjemahan menyatakan hasil yang lebih tepat untuk setiap (X, A) dan memberi spesialisasi satu langkah dari teorema kompleks rantai. Hipotesis pasangan baik tetap diperlukan pada teorema perbandingan dengan X/A di Bagian 1.5.

33.3 Pemeriksaan penguasaan

Pemeriksaan Penguasaan F3.1 (barisan eksak pendek dan hasil bagi). Misalkan

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{q} C \longrightarrow 0$$

merupakan barisan eksak pendek.

1. Buktikan bahwa i injektif, q surjektif, dan $\text{im } i = \ker q$.
2. Buktikan bahwa pemetaan $\bar{q}: B/i(A) \rightarrow C$ dengan $\bar{q}([b]) = q(b)$ merupakan isomorfisma.
3. Jika ada homomorfisma $s: C \rightarrow B$ dengan $q \circ s = \text{id}_C$, buktikan bahwa $B \cong A \oplus C$.

Petunjuk. Baca eksak pada A , B , dan C secara terpisah. Untuk bagian ketiga, gunakan $\Phi(a, c) = i(a) + s(c)$ dan terapkan q untuk menguji kernel Φ .

Solusi Pemeriksaan F3.1. Eksak pada A memberi

$$\ker i = \text{im}(0 \rightarrow A) = 0,$$

sehingga i injektif. Eksak pada C memberi

$$\text{im } q = \ker(C \rightarrow 0) = C,$$

sehingga q surjektif. Eksak pada B tepat mengatakan $\text{im } i = \ker q$.

Jika $b - b' \in i(A) = \ker q$, maka $q(b) = q(b')$; jadi $\bar{q}$ terdefinisi dengan baik. Pemetaan itu surjektif karena q surjektif, dan

$$\ker \bar{q} = \{[b] \mid q(b) = 0\} = \{[b] \mid b \in i(A)\} = 0.$$

Maka $\bar{q}$ isomorfisma. Terakhir, definisikan

$$\Phi: A \oplus C \longrightarrow B, \quad \Phi(a, c) = i(a) + s(c).$$

Untuk $b \in B$, $q(b - s(q(b))) = 0$, sehingga ada $a \in A$ dengan $b - s(q(b)) = i(a)$. Jadi $\Phi(a, q(b)) = b$ dan Φ surjektif. Jika $\Phi(a, c) = 0$, menerapkan q memberi $c = 0$; kemudian $i(a) = 0$, sehingga $a = 0$. Jadi Φ juga injektif dan $B \cong A \oplus C$.

Pemeriksaan Penguasaan F3.2 (suspensi dan sfera). Gunakan

$$\tilde{H}_k(SX) \cong \tilde{H}_{k-1}(X) \quad (k \geq 1)$$

dan $S(S^m) \cong S^{m+1}$ untuk memperoleh, mulai dari S^0 , seluruh grup homologi tereduksi S^m untuk $m \geq 0$. Gunakan keterhubungan lintasan suspensi untuk derajat nol, lalu jelaskan mengapa derajat taknol bergeser satu pada setiap suspensi.

Petunjuk. Mulailah dari $\tilde{H}_0(S^0) \cong \mathbb{Z}$ dan $\tilde{H}_k(S^0) = 0$ untuk $k \neq 0$. Untuk setiap suspensi sesudahnya, $\tilde{H}_0 = 0$ karena ruangnya terhubung lintasan; lakukan induksi pada m untuk derajat positif.

Solusi Pemeriksaan F3.2. Untuk $m = 0$,

$$\tilde{H}_k(S^0) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = 0, \\ 0, & k \neq 0. \end{cases}$$

Andaikan rumus telah diketahui untuk S^m . Karena $S(S^m) \cong S^{m+1}$,

$$\tilde{H}_k(S^{m+1}) \cong \tilde{H}_k(S(S^m)) \cong \tilde{H}_{k-1}(S^m).$$

Ruas terakhir isomorfik dengan $\mathbb{Z}$ tepat ketika $k - 1 = m$, yakni $k = m + 1$, dan nol pada derajat positif lain. Pada derajat nol, S^{m+1} terhubung lintasan, sehingga homologi tereduksinya nol. Dengan induksi,

$$\tilde{H}_k(S^m) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = m, \\ 0, & k \neq m. \end{cases}$$

Jadi suspensi menaikkan satu-satunya derajat homologi tereduksi yang tak nol sebanyak satu.

Pemeriksaan Penguasaan F3.3 (siklus dan batas relatif). Untuk pasangan $A \subseteq X$:

1. buktikan bahwa $H_n(X, \emptyset) \cong H_n(X)$ dan $H_n(X, X) = 0$;
2. buktikan bahwa $c + C_n(A)$ merupakan siklus relatif tepat ketika $\partial c \in C_{n-1}(A)$;
3. buktikan bahwa kelas rantai itu merupakan batas relatif tepat ketika ada $d \in C_{n+1}(X)$ dengan $c - \partial d \in C_n(A)$.

Petunjuk. Gunakan definisi $C_n(X, A) = C_n(X)/C_n(A)$ dan periksa kapan suatu koset menjadi nol dalam hasil bagi.

Solusi Pemeriksaan F3.3. Tidak ada simpleks singular berdomain Δ^n dan berkodomain $\emptyset$, sehingga $C_n(\emptyset) = 0$. Akibatnya

$$C_n(X, \emptyset) = C_n(X)/0 \cong C_n(X)$$

beserta pemetaan batasnya, jadi $H_n(X, \emptyset) \cong H_n(X)$. Di sisi lain, $C_n(X, X) = C_n(X)/C_n(X) = 0$, sehingga $H_n(X, X) = 0$.

Dalam kompleks hasil bagi,

$$\partial(c + C_n(A)) = \partial c + C_{n-1}(A).$$

Koset ini nol tepat ketika $\partial c \in C_{n-1}(A)$, yang membuktikan karakterisasi siklus relatif. Koset $c + C_n(A)$ merupakan batas tepat ketika ada $d + C_{n+1}(A)$ dengan

$$c + C_n(A) = \partial d + C_n(A).$$

Kesamaan koset itu ekuivalen dengan $c - \partial d \in C_n(A)$.

Pemeriksaan Penguasaan F3.4 (membangun pemetaan penghubung). Misalkan

$$0 \longrightarrow \mathcal{A} \xrightarrow{i} \mathcal{B} \xrightarrow{j} \mathcal{C} \longrightarrow 0$$

barisan eksak pendek kompleks rantai. Untuk suatu siklus $c \in C_n$, pilih $b \in B_n$ dengan $j(b) = c$, lalu pilih satu-satunya $a \in A_{n-1}$ dengan $i(a) = \partial b$.

1. Buktikan bahwa a merupakan siklus.
2. Buktikan bahwa $[a]$ tidak bergantung pada pilihan b maupun wakil c .
3. Buktikan bahwa $\delta([c]) = [a]$ merupakan homomorfisma $H_n(\mathcal{C}) \rightarrow H_{n-1}(\mathcal{A})$.

Petunjuk. Untuk dua pengangkatan b, b' , tulis $b' - b = i(x)$. Jika $c' = c + \partial d$, angkat d ke $e \in B_{n+1}$ dan gunakan $b + \partial e$ sebagai pengangkatan khusus bagi c' .

Solusi Pemeriksaan F3.4. Karena j pemetaan rantai dan c siklus,

$$j(\partial b) = \partial j(b) = \partial c = 0.$$

Eksak memberi $\partial b \in \ker j = \operatorname{im} i$, sehingga a ada; injektivitas i membuatnya tunggal. Selanjutnya,

$$i(\partial a) = \partial i(a) = \partial^2 b = 0,$$

dan injektivitas i memberi $\partial a = 0$.

Jika b' pengangkatan lain bagi c , maka $j(b' - b) = 0$, sehingga $b' - b = i(x)$ untuk suatu $x \in A_n$. Jika $i(a') = \partial b'$, maka

$$i(a' - a) = \partial(b' - b) = \partial i(x) = i(\partial x).$$

Karena i injektif, $a' - a = \partial x$; jadi $[a'] = [a]$. Jika $c' = c + \partial d$, pilih $e \in B_{n+1}$ dengan $j(e) = d$. Rantai $b + \partial e$ mengangkat c' , dan

$$\partial(b + \partial e) = \partial b.$$

Maka pilihan khusus itu menghasilkan a yang sama, sedangkan kebebasan dari pilihan pengangkatan menangani semua pilihan lain. Jadi kelas $[a]$ juga tidak bergantung pada wakil $[c]$.

Untuk siklus c_1, c_2 dengan pengangkatan b_1, b_2 , rantai $b_1 + b_2$ mengangkat $c_1 + c_2$ dan elemen yang ditentukan oleh batasnya ialah $a_1 + a_2$. Karena itu

$$\delta([c_1] + [c_2]) = [a_1 + a_2] = \delta([c_1]) + \delta([c_2]),$$

sehingga δ merupakan homomorfisma yang terdefinisi dengan baik.

Pemeriksaan Penguasaan F3.5 (eksaknya barisan homologi panjang). Dengan notasi Pemeriksaan F3.4, buktikan ketiga kesamaan

$$\operatorname{im} i_* = \ker j_*, \quad \operatorname{im} j_* = \ker \delta, \quad \operatorname{im} \delta = \ker i_*.$$

Petunjuk. Untuk setiap inklusi yang sukar, mulai dari kelas di kernel, pilih wakil siklus, lalu gunakan eksak pada tingkat rantai. Saat sebuah citra menjadi batas, angkat rantai yang membatasinya melalui j .

Solusi Pemeriksaan F3.5. Komposisi berurutan nol memberi langsung

$$\operatorname{im} i_* \subseteq \ker j_*, \quad \operatorname{im} j_* \subseteq \ker \delta, \quad \operatorname{im} \delta \subseteq \ker i_*.$$

Untuk arah sebaliknya yang pertama, ambil siklus $b \in B_n$ dengan $j_*[b] = 0$. Maka $j(b) = \partial c$ untuk suatu $c \in C_{n+1}$. Pilih $e \in B_{n+1}$ dengan $j(e) = c$. Rantai $b - \partial e$ berada di $\ker j$, jadi $b - \partial e = i(a)$ untuk suatu $a \in A_n$. Karena $i(\partial a) = \partial(b - \partial e) = 0$ dan i injektif, a siklus; maka $[b] = i_*[a]$.

Untuk kesamaan kedua, ambil siklus $c \in C_n$ dengan $\delta[c] = 0$. Pilih b dan a seperti pada konstruksi δ . Karena $[a] = 0$, ada $x \in A_n$ dengan $a = \partial x$. Rantai $b - i(x)$ adalah siklus dan $j(b - i(x)) = c$, sehingga $[c] = j_*[b - i(x)]$.

Untuk kesamaan ketiga, ambil siklus $a \in A_{n-1}$ dengan $i_*[a] = 0$. Ada $b \in B_n$ dengan $\partial b = i(a)$. Rantai $c = j(b)$ adalah siklus karena

$$\partial c = j(\partial b) = j(i(a)) = 0.$$

Menurut definisi pemetaan penghubung, $\delta[c] = [a]$. Ketiga kernel dengan demikian sama dengan citra yang mendahuluinya, sehingga barisan homologi panjang eksak.

Pemeriksaan Penguasaan F3.6 (pasangan cakram dan tidak adanya retraksi). Untuk $n \geq 1$:

1. gunakan barisan eksak panjang pasangan untuk menghitung $H_k(D^n, S^{n-1})$ bagi semua $k \geq 0$;
2. gunakan homologi tereduksi untuk membuktikan bahwa inklusi $S^{n-1} \hookrightarrow D^n$ tidak memiliki retraksi;
3. jelaskan bagaimana sebuah pemetaan kontinu tanpa titik tetap $f: D^n \rightarrow D^n$ akan menghasilkan retraksi dan karenanya kontradiksi.

Petunjuk. Gunakan kontraktibilitas D^n dan $\tilde{H}_{n-1}(S^{n-1}) \cong \mathbb{Z}$. Untuk bagian ketiga, kirim x ke titik pertama pada S^{n-1} yang ditemui sinar dari $f(x)$ melalui x .

Solusi Pemeriksaan F3.6. Karena D^n kontraktibel, bagian tereduksi dari barisan eksak panjang pasangan memberi, untuk $k \geq 1$, isomorfisma penghubung

$$H_k(D^n, S^{n-1}) \cong \tilde{H}_{k-1}(S^{n-1}).$$

Pada derajat nol, gunakan bagian barisan eksak biasa

$$H_0(S^{n-1}) \longrightarrow H_0(D^n) \longrightarrow H_0(D^n, S^{n-1}) \longrightarrow 0.$$

Pemetaan pertama surjektif karena S^{n-1} tak kosong dan D^n terhubung lintasan. Karena itu $H_0(D^n, S^{n-1}) = 0$.

Dengan perhitungan bola,

$$H_k(D^n, S^{n-1}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = n, \\ 0, & k \neq n. \end{cases} \quad (k \geq 0).$$

Andaikan ada retraksi $r: D^n \rightarrow S^{n-1}$ bagi inklusi i . Maka $r_*i_* = \text{id}$ pada homologi tereduksi, sehingga i_* harus injektif. Namun

$$i_*: \tilde{H}_{n-1}(S^{n-1}) \cong \mathbb{Z} \longrightarrow \tilde{H}_{n-1}(D^n) = 0$$

tidak mungkin injektif. Jadi retraksi tidak ada.

Jika $f: D^n \rightarrow D^n$ kontinu dan tidak mempunyai titik tetap, untuk setiap x sinar yang berawal di $f(x)$ dan melalui x berpotongan dengan batas di satu titik sesudah x . Pemetaan $r(x)$ ke titik tersebut kontinu; untuk $x \in S^{n-1}$, titik batas itu adalah x sendiri. Jadi r akan menjadi retraksi $D^n \rightarrow S^{n-1}$, bertentangan dengan hasil sebelumnya. Maka setiap pemetaan kontinu $D^n \rightarrow D^n$ mempunyai titik tetap.

Batas sumber komponen. Unit ini menerjemahkan `algebraic_topology.tex` baris 1291–1922 secara kontigu, mencakup Bagian 1.5 tentang barisan eksak dan Bagian 1.6 tentang homologi relatif. Kursor komponen berikutnya adalah baris 1923, awal Bagian 1.7 tentang eksisi.

Komponen Fomberg O012-FOM-004

Bagian 1.7–1.10; dipetakan ke D60-R11.

Tentang komponen ini

Komponen ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas Bagian 1.7–1.10 *Algebraic Topology* karya Yeheli Fomberg, berdasarkan kuliah Nir Lazarovich pada musim semi 2025. Otoritas sumber dibekukan pada commit [563194fae879178b9a6871b249513bfc27968975](#). Rentang yang diterjemahkan ialah `algebraic_topology.tex` baris 1923–2846: 924 baris fisik, 38.503 byte setelah normalisasi LF dan satu LF penutup, dengan SHA-256 `ddde995b54154623ccc565117aee63cce8361d2ada1c3c9f2852775b`.

Catatan sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](#). Terjemahan, pemformatan semantik, koreksi terbatas, gambar ulang mandiri, perbaikan bukti, dan materi penguasaan asli di bawah ini diterbitkan dengan lisensi yang sama. Semua perbaikan FOM-PR-05 sampai FOM-PR-11 dibedakan dari teks sumber. Tidak ada prosa dari bank soal Fomberg terpisah maupun materi MIT yang disalin ke dalam komponen ini.

Edisi ini independen dan tidak menyiratkan dukungan, pengesahan, atau afiliasi dengan Yeheli Fomberg, Nir Lazarovich, ataupun institusi mereka. Produksi terjemahan, struktur semantik, dan QA dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra** atas arahan pengguna.

34 Eksisi, Mayer–Vietoris, Kealamian, dan Pembandingan Homologi

34.1 Eksisi

Teorema (eksisi). Misalkan $Z \subseteq A \subseteq X$ dan $\overline{Z} \subseteq \mathring{A}$. Inklusi pasangan

$$i: (X \setminus Z, A \setminus Z) \hookrightarrow (X, A)$$

menginduksi isomorfisma

$$i_*: H_n(X \setminus Z, A \setminus Z) \xrightarrow{\cong} H_n(X, A)$$

untuk setiap n . Dengan kata lain, $H_n(X, A) \cong H_n(X \setminus Z, A \setminus Z)$.

Klarifikasi arah pemetaan. Sumber menuliskan isomorfisma abstrak dengan $H_n(X, A)$ di sebelah kiri. Karena pemetaan yang disebutkan berasal dari inklusi $(X \setminus Z, A \setminus Z) \hookrightarrow (X, A)$, arah pemetaan terinduksi yang kanonis adalah arah yang ditampilkan di atas. Tidak ada isi matematis yang diubah.

Akibat. Jika (X, A) pasangan baik dalam arti standar— A tak kosong, tertutup, dan merupakan retrak deformasi dari suatu lingkungannya—maka

$$H_n(X, A) \cong \tilde{H}_n(X/A).$$

Akibat ini akan diperoleh lagi secara eksplisit dari [teorema hasil bagi](#) di bawah.

Catatan (bentuk penutup). Rumusan ekuivalen teorema eksisi adalah sebagai berikut. Jika $X_1, X_2 \subseteq X$ dan

$$\mathring{X}_1 \cup \mathring{X}_2 = X,$$


maka inklusi

$$i: (X_1, X_1 \cap X_2) \hookrightarrow (X, X_2)$$

menginduksi isomorfisma

$$i_*: H_n(X_1, X_1 \cap X_2) \xrightarrow{\cong} H_n(X, X_2)$$

untuk setiap n .



Gambar 7: Gambar ulang aksesibel dua rumusan eksisi: daerah Z di dalam A di dalam X , dan penutup X satu- X dua dengan daerah irisan.

Diagram semantik hasil gambar ulang. Pada rumusan pertama terdapat tiga daerah bersarang

$$Z \subseteq A \subseteq X, \quad \overline{Z} \subseteq \mathring{A}.$$

Pada rumusan kedua, X ditutup oleh bagian dalam dua daerah X_1 dan X_2 ; daerah tumpang-tindihnya ialah $X_1 \cap X_2$. Korespondensi antarrumusan adalah

$$\begin{aligned} A &= X_2, \\ Z &= X \setminus X_1 = X_2 \setminus X_1, \\ X \setminus Z &= X_1, \\ A \setminus Z &= X_1 \cap X_2. \end{aligned}$$

Deskripsi aksesibel: menghapus daerah Z yang terletak sepenuhnya di bagian dalam A menyisakan pasangan yang sama dengan mengambil daerah kiri X_1 beserta irisannya dengan daerah kanan X_2 . Diagram ini disusun ulang secara mandiri dari relasi himpunan; tidak ada ekspresi TikZ sumber yang disalin.

Untuk memperoleh bentuk kedua dari bentuk pertama, ambil $A = X_2$ dan $Z = X \setminus X_1$. Karena $\mathring{X}_1 \cup \mathring{X}_2 = X$, kita mempunyai $\overline{X \setminus X_1} \subseteq \mathring{X}_2$. Substitusi pada empat identitas di atas memberi tepat inklusi pasangan dalam bentuk penutup. Sebaliknya, untuk $Z \subseteq A \subseteq X$ dengan $\overline{Z} \subseteq \mathring{A}$, ambil $X_1 = X \setminus Z$ dan $X_2 = A$. Karena

$$\text{int}(X \setminus Z) = X \setminus \overline{Z},$$

kedua bagian dalam itu menutup X ; keempat identitas di atas menghasilkan pernyataan semula.

Definisi (rantai- $\mathcal{U}$). Misalkan $\mathcal{U} = \{U_j\}$ suatu koleksi subhimpunan X yang bagian-bagian dalamnya membentuk penutup terbuka bagi X , yaitu

$$X = \bigcup_{U \in \mathcal{U}} U.$$

Kita definisikan

$$C_n^{\mathcal{U}}(X) = \text{span}_{\mathbb{Z}} \{ \sigma : \Delta^n \rightarrow X \mid \exists U \in \mathcal{U} \text{ sehingga } \sigma(\Delta^n) \subseteq U \}.$$

Generator seperti itu disebut **simpleks singular $\mathcal{U}$ -kecil**, dan unsur grup di atas disebut **rantai- $\mathcal{U}$** .

Catatan. Setiap sisi simpleks $\mathcal{U}$ -kecil masih mempunyai citra di anggota $\mathcal{U}$ yang sama. Karena itu

$$\partial(C_n^{\mathcal{U}}(X)) \subseteq C_{n-1}^{\mathcal{U}}(X),$$

sehingga grup-grup $C_n^{\mathcal{U}}(X)$ membentuk kompleks rantai. Homologi kompleks ini dinotasikan $H_n^{\mathcal{U}}(X)$.

Proposisi (teorema rantai kecil). Inklusi

$$\iota : C_*^{\mathcal{U}}(X) \hookrightarrow C_*(X)$$

merupakan ekuivalensi homotopi kompleks rantai. Jadi terdapat pemetaan rantai

$$\rho : C_*(X) \longrightarrow C_*^{\mathcal{U}}(X)$$

sedemikian sehingga $\iota\rho$ dan $\rho\iota$ homotopik-rantai dengan pemetaan identitas masing-masing. Khususnya,

$$\iota_* : H_n^{\mathcal{U}}(X) \xrightarrow{\cong} H_n(X)$$

untuk setiap n .

Bukti sumber, sampai bagian yang dihilangkan. Sumber mengumumkan bukti dalam empat langkah, tetapi hanya memulai langkah pertama.

1. **Subdivisi barisentris simpleks.** Simpleks $[v_0, v_1, \dots, v_n]$ terdiri atas semua titik $\sum_i t_i v_i$ dengan $t_i \geq 0$ dan $\sum_i t_i = 1$. **Barisentrum** simpleks itu adalah titik berkoordinat barisentris sama besar,

$$b = \sum_{i=0}^n \frac{1}{n+1} v_i.$$

(Awalan *bary-* berarti massa.) Subdivisi barisentris didefinisikan secara induktif. Pada dimensi nol,

$$BS([v_0]) = \{[v_0]\}.$$

Pada dimensi satu, dengan $b = (v_0 + v_1)/2$,

$$BS([v_0, v_1]) = \{[b, v_0], [b, v_1]\}.$$

Secara induktif, jika F_i adalah sisi ke- i dari $[v_0, \dots, v_n]$, definisikan

$$BS([v_0, \dots, v_n]) = \bigcup_{i=0}^n \{[b, s] \mid s \in BS(F_i)\}.$$

Subdivisi itu terdiri atas $(n+1)!$ simpleks berdimensi n yang menutup simpleks semula:

$$|BS([v_0, \dots, v_n])| = (n+1)!.$$

Selain itu, $BS(\Delta^n)$ memberi struktur kompleks simpleks pada Δ^n . Sumber kemudian hendak membuktikan bahwa setiap $[w_0, \dots, w_n] \in BS(\Delta^n)$ memenuhi

$$\text{diam}[w_0, \dots, w_n] \leq \frac{n}{n+1} \text{diam}[v_0, \dots, v_n].$$

Untuk itu sumber terlebih dahulu mengamati

$$\text{diam}[w_0, \dots, w_n] = \max_{i,j} \|w_i - w_j\|.$$

Memang, untuk sebuah titik sudut v dan titik $\sum_{i=0}^n t_i v_i$ di selubung konveks,

$$\begin{aligned} \left\| v - \sum_{i=0}^n t_i v_i \right\| &= \left\| \sum_{i=0}^n t_i (v - v_i) \right\| \\ &\leq \sum_{i=0}^n t_i \|v - v_i\| \\ &\leq \sum_{i=0}^n t_i \max_j \|v - v_j\| \\ &= \max_j \|v - v_j\|. \end{aligned}$$

Bagian FOM-PR-05a yang dihilangkan dalam sumber. Sesudah menuliskan batas diameter yang diinginkan dan estimasi selubung konveks di atas, sumber hanya menyatakan bahwa sisa argumennya bersifat geometris. Sumber lalu menyebut konsekuensinya—setiap simpleks dapat dibagi menjadi simpleks-simpleks berdiameter sekecil yang diinginkan—tanpa membuktikan batas diameter ataupun iterasinya. [Perbaikan FOM-PR-05a](#) mengisi kedua langkah tersebut.

Bagian FOM-PR-05b yang dihilangkan dalam sumber. Langkah kedua pada sumber berbunyi bahwa “sisa bukti mungkin akan ditambahkan kelak”; langkah ketiga dan keempat tidak hadir. Baris 2073–2150 hanya merupakan komentar TeX nonaktif, bukan teks bukti yang diterbitkan. Komentar itu mencoba memperkenalkan rantai linear $LC_n(Y)$ untuk $Y \subseteq \mathbb{R}^n$ konveks, operator kerucut

$$b([w_0, \dots, w_n]) = [b, w_0, \dots, w_n], \quad \partial b + b\partial = \text{id},$$

operator subdivisi S melalui skema $S(\lambda) = b_\lambda(S\partial\lambda)$, dan suatu operator T yang dimaksudkan memenuhi

$$\partial T + T\partial = \text{id} - S.$$

Rumus rekursif T dalam komentar adalah awal konstruksi standar dan suku $S\sigma$ dapat muncul ketika identitas operator kerucut diterapkan. Namun perhitungannya berhenti sebelum keterdefinisan,

kealamian terhadap simpleks singular, argumen bilangan Lebesgue, surjektivitas dan injektivitas homologi, ataupun pemetaan ρ dibuktikan. Karena komentar tersebut belum merupakan bukti yang sah, edisi ini tidak mengangkatnya menjadi prosa sumber. [Perbaikan FOM-PR-05b](#) memberi konstruksi lengkap yang diperlukan.

Koreksi notasi. Sumber memakai Δ^i untuk “sisi ke- i ” ketika menuliskan rekursi subdivisi. Superskrip biasanya menyatakan dimensi, bukan nomor sisi. Edisi memakai F_i untuk sisi ke- i dan mempertahankan rumus rekursif yang dimaksud.

Perbaikan bukti FOM-PR-05a (penyusutan diameter). Setiap simpleks berdimensi n dalam subdivisi barisentris berkorespondensi dengan rantai sisi tak kosong

$$F_0 \subsetneq F_1 \subsetneq \cdots \subsetneq F_n = \Delta^n,$$

dan titik-titik sudutnya adalah barisentrum $b_{F_0}, \dots, b_{F_n}$. Kita lengkapi dahulu fakta diameter yang dipakai sumber. Jika $x = \sum_i a_i w_i$ dan $y = \sum_j b_j w_j$ adalah dua titik selubung konveks titik-titik sudut $w_0, \dots, w_r$, maka

$$\begin{aligned} \|x - y\| &= \left\| \sum_{i,j} a_i b_j (w_i - w_j) \right\| \\ &\leq \sum_{i,j} a_i b_j \|w_i - w_j\| \\ &\leq \max_{i,j} \|w_i - w_j\|. \end{aligned}$$

Karena titik-titik sudut sendiri termasuk dalam selubung konveks, diameter selubung itu tepat jarak maksimum antara dua titik sudut.

Ambil dua sisi dalam rantai itu, $F \subseteq G$. Misalkan F mempunyai p titik sudut dan G mempunyai q titik sudut. Maka

$$b_G = \frac{p}{q} b_F + \frac{1}{q} \sum_{v \in G \setminus F} v$$

dan karena b_F terletak di selubung konveks titik-titik sudut F ,

$$\begin{aligned} \|b_G - b_F\| &= \left\| \frac{1}{q} \sum_{v \in G \setminus F} (v - b_F) \right\| \\ &\leq \frac{q-p}{q} \text{diam}(\Delta^n) \\ &\leq \frac{n}{n+1} \text{diam}(\Delta^n). \end{aligned}$$

Kesamaan diameter selubung konveks dengan jarak maksimum antartitik sudut, yang telah diperiksa dalam bagian sumber, sekarang memberi

$$\text{diam}(\tau) \leq \frac{n}{n+1} \text{diam}(\Delta^n)$$

untuk setiap simpleks τ dalam $BS(\Delta^n)$. Sesudah r iterasi,

$$\text{diam}(\tau_r) \leq \left(\frac{n}{n+1} \right)^r \text{diam}(\Delta^n).$$

Faktor $n/(n+1)$ kurang dari satu untuk $n > 0$, sehingga ruas kanan menuju nol. Untuk $n = 0$ diameter sejak awal nol. Jadi subdivisi berulang menghasilkan simpleks-simpleks berdiameter sekecil yang diinginkan. $\square$

Perbaiki bukti FOM-PR-05b (operator subdivisi, rantai kecil, dan ekuivalensi homotopi). Beri setiap simpleks dalam subdivisi barisentris orientasi yang diinduksi oleh orientasi Δ^n . Untuk simpleks singular $\sigma: \Delta^n \rightarrow X$, definisikan

$$Sd(\sigma) = \sum_{\tau \in BS(\Delta^n)} \varepsilon_\tau \sigma \circ a_\tau,$$

di mana $a_\tau: \Delta^n \rightarrow \tau$ adalah isomorfisma afin berorientasi dan $\varepsilon_\tau \in \{1, -1\}$ mencatat orientasinya. Perluas secara linear. Pada batas subdivisi, setiap sisi internal muncul dua kali dengan orientasi berlawanan, sedangkan sisi luar memberi subdivisi dari batas. Karena itu

$$\partial Sd = Sd \partial;$$

jadi Sd adalah pemetaan rantai.

Selanjutnya kita bangun homotopi rantai $T: C_n(X) \rightarrow C_{n+1}(X)$ secara induktif. Pada simpleks standar, andaikan T telah didefinisikan pada semua dimensi lebih rendah dan letakkan

$$z_n = \text{id}_{\Delta^n} - Sd(\text{id}_{\Delta^n}) - T(\partial \text{id}_{\Delta^n}).$$

Hipotesis induksi dan fakta bahwa Sd pemetaan rantai memberi

$$\begin{aligned} \partial z_n &= \partial \text{id}_{\Delta^n} - Sd(\partial \text{id}_{\Delta^n}) - \partial T(\partial \text{id}_{\Delta^n}) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Karena Δ^n kontraktibel, siklus z_n membatasi suatu rantai $b(z_n)$; secara konkret b dapat dipilih sebagai operator kerucut menuju barisentrum. Definisikan

$$T(\text{id}_{\Delta^n}) = b(z_n), \quad T(\sigma) = \sigma_\# T(\text{id}_{\Delta^n}).$$

Konstruksi ini alami terhadap σ dan menghasilkan identitas

$$\partial T + T \partial = \text{id} - Sd.$$

Yang penting, semua simpleks yang muncul dalam $Sd(\sigma)$ dan $T(\sigma)$ mempunyai citra di dalam $\sigma(\Delta^n)$. Maka kedua operator mempertahankan subkompleks $C_*^{\mathcal{U}}(X)$.

Sekarang, bagi suatu simpleks singular σ , himpunan-himpunan

$$\{\sigma^{-1}(\mathring{U}) \mid U \in \mathcal{U}\}$$

membentuk penutup terbuka bagi Δ^n . Lemma bilangan Lebesgue memberi $\lambda_\sigma > 0$ sehingga setiap subhimpunan Δ^n berdiameter kurang dari λ_σ terkandung dalam salah satu prapeta tersebut. Menurut FOM-PR-05a, ada N_σ sehingga semua simpleks dalam $Sd^{N_\sigma}(\text{id}_{\Delta^n})$ berdiameter kurang dari λ_σ . Jadi $Sd^{N_\sigma}(\sigma)$ merupakan rantai- $\mathcal{U}$. Untuk rantai berhingga c , ambil maksimum eksponen bagi simpleks-simpleks yang muncul di dalamnya; dengan demikian terdapat N sehingga

$$Sd^N(c) \in C_*^{\mathcal{U}}(X).$$

Tuliskan

$$K_N = \sum_{r=0}^{N-1} Sd^r T.$$

Penjumlahan teleskopik memberi

$$\partial K_N + K_N \partial = \text{id} - Sd^N.$$

Jika z siklus di $C_*(X)$, pilih N sehingga $Sd^N z$ kecil. Maka $z - Sd^N z = \partial K_N z$, jadi setiap kelas homologi mempunyai wakil kecil; ι_* surjektif. Jika siklus kecil z membatasi c dalam $C_*(X)$, pilih N sehingga $Sd^N c$ kecil. Karena T dan Sd mempertahankan rantai kecil, $K_N z$ juga kecil, dan

$$z = Sd^N z + \partial K_N z = \partial(Sd^N c + K_N z)$$

di dalam $C_*^{\mathcal{U}}(X)$. Jadi ι_* injektif. Dengan demikian ι adalah kuasi-isomorfisma.

Tersisa membangun invers homotopi rantai yang dinyatakan sumber. Singkatkan $B_* = C_*^{\mathcal{U}}(X)$, $C_* = C_*(X)$, dan $Q_* = C_*/B_*$. Karena B_n dibangkitkan oleh suatu subhimpunan basis simpleks singular C_n , setiap Q_n bebas dan barisan

$$0 \longrightarrow B_n \xrightarrow{\iota} C_n \longrightarrow Q_n \longrightarrow 0$$

terbelah sebagai grup. Barisan eksak panjang dan fakta bahwa ι_* isomorfisma menunjukkan bahwa Q_* asiklik. Setiap subgrup grup abelian bebas kembali bebas; jadi barisan

$$0 \longrightarrow Z_n(Q) = B_n(Q) \longrightarrow Q_n \xrightarrow{\partial_Q} B_{n-1}(Q) \longrightarrow 0$$

terbelah pada setiap derajat. Pilihan pembelahan memberi homotopi kontraksi $h: Q_n \rightarrow Q_{n+1}$ dengan

$$\partial_Q h + h \partial_Q = \text{id}_Q.$$

Pilih pula pembelahan berderajat $C_n \cong B_n \oplus Q_n$. Dalam koordinat ini, pemetaan batas berbentuk

$$\partial_C(b, q) = (\partial_B b + \tau q, \partial_Q q)$$

untuk suatu $\tau: Q_n \rightarrow B_{n-1}$. Identitas $\partial_C^2 = 0$ memberi

$$\partial_B \tau + \tau \partial_Q = 0.$$

Sekarang definisikan

$$\rho(b, q) = b - \tau h(q), \quad H(b, q) = (0, hq).$$

Relasi terakhir dan identitas kontraksi menunjukkan langsung bahwa ρ pemetaan rantai. Selain itu,

$$\rho\iota = \text{id}_{B_*}, \quad \partial_C H + H\partial_C = \text{id}_{C_*} - \iota\rho.$$

Jadi ρ benar-benar invers homotopi rantai bagi ι : komposisi pada B_* adalah identitas secara ketat dan komposisi pada C_* homotopik-rantai dengan identitas. Ini menutup pernyataan penuh, bukan hanya isomorfisma homologi. $\square$

Teorema (eksisi, bentuk penutup). Misalkan $A, B \subseteq X$ dan

$$\mathring{A} \cup \mathring{B} = X.$$

Inklusi pasangan

$$i: (B, A \cap B) \hookrightarrow (X, A)$$

menginduksi isomorfisma

$$i_*: H_n(B, A \cap B) \xrightarrow{\cong} H_n(X, A)$$

untuk setiap n .

Bukti sumber. Teks aktif sumber hanya mengatakan bahwa bukti bergantung pada bukti eksisi dan akan ditambahkan kelak.

Bagian FOM-PR-06 yang dihilangkan dalam sumber. Komentar TeX nonaktif mengusulkan $\mathcal{U} = \{A, B\}$, lalu membandingkan

$$C_n(X)/C_n(A) \quad \text{dengan} \quad C_n^{\mathcal{U}}(X)/C_n(A) \cong C_n(B)/C_n(A \cap B),$$

tetapi tidak membuktikan bahwa perbandingan hasil bagi menginduksi isomorfisma dalam homologi. Bukti lengkap dan pengecekan aljabarnya diberikan berikutnya.

Perbaiki bukti FOM-PR-06. Ambil $\mathcal{U} = \{A, B\}$. Hipotesis $\mathring{A} \cup \mathring{B} = X$ memastikan bahwa koleksi ini memenuhi syarat teorema rantai kecil. Karena setiap simpleks $\mathcal{U}$ -kecil mempunyai citra di A atau di B ,

$$C_*^{\mathcal{U}}(X) = C_*(A) + C_*(B).$$

Pertimbangkan diagram barisan eksak pendek kompleks rantai

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & C_*(A) & \longrightarrow & C_*^{\mathcal{U}}(X) & \longrightarrow & C_*^{\mathcal{U}}(X)/C_*(A) \longrightarrow 0 \\ & & \parallel & & \downarrow \iota & & \downarrow \bar{\iota} \\ 0 & \longrightarrow & C_*(A) & \longrightarrow & C_*(X) & \longrightarrow & C_*(X)/C_*(A) \longrightarrow 0. \end{array}$$

Baris atas dan bawah eksak, dan diagram komutatif. Pemetaan vertikal kiri adalah identitas, sedangkan pemetaan vertikal tengah menginduksi isomorfisma homologi menurut FOM-PR-05. Dengan menerapkan barisan eksak panjang homologi pada kedua baris dan lemma lima, $\bar{\iota}$ juga menginduksi isomorfisma homologi.

Selanjutnya, karena grup rantai singular bebas pada simpleks singular,

$$C_*(A) \cap C_*(B) = C_*(A \cap B).$$

Teorema isomorfisma kedua memberi isomorfisma kompleks rantai yang eksplisit,

$$\begin{aligned} C_*^{\mathcal{U}}(X)/C_*(A) &= (C_*(A) + C_*(B))/C_*(A) \\ &\cong C_*(B)/(C_*(A) \cap C_*(B)) \\ &= C_*(B)/C_*(A \cap B) \\ &= C_*(B, A \cap B). \end{aligned}$$

Di sisi lain, $C_*(X)/C_*(A) = C_*(X, A)$. Setelah mengambil homologi, pemetaan yang dihasilkan tepat pemetaan yang diinduksi oleh inklusi pasangan $(B, A \cap B) \hookrightarrow (X, A)$. Maka

$$H_n(B, A \cap B) \xrightarrow{\cong} H_n(X, A)$$

untuk setiap n . Melalui ekuivalensi pada [catatan bentuk penutup](#), bukti ini juga membuktikan bentuk eksisi dengan $Z \subseteq A$. $\square$

Teorema (homologi relatif sebagai homologi hasil bagi). Misalkan (X, A) pasangan baik dalam arti standar: A tak kosong dan tertutup, serta A merupakan retrak deformasi dari suatu lingkungan terbukanya. Pemetaan hasil bagi

$$q: (X, A) \longrightarrow (X/A, A/A)$$

menginduksi isomorfisma

$$q_*: H_n(X, A) \xrightarrow{\cong} H_n(X/A, A/A) \cong \tilde{H}_n(X/A)$$

untuk setiap n .

Bukti. Homologi suatu ruang relatif terhadap satu titik secara alami isomorfik dengan homologi tereduksi ruang itu. Jadi cukup dibuktikan bahwa

$$q_*: H_n(X, A) \longrightarrow H_n(X/A, A/A)$$

merupakan isomorfisma. Karena (X, A) pasangan baik, terdapat lingkungan terbuka U dari A di X yang beretraksi deformasi ke A . Karena A tertutup, $\bar{A} = A \subseteq \overset{\circ}{U} = U$, sehingga eksisi terhadap A di dalam pasangan (X, U) berlaku. Pertimbangkan diagram komutatif berikut.

$$\begin{array}{ccccc} H_n(X, A) & \longrightarrow & H_n(X, U) & \longleftarrow & H_n(X \setminus A, U \setminus A) \\ \downarrow q_* & & \downarrow q_* & & \downarrow q_* \\ H_n(X/A, A/A) & \longrightarrow & H_n(X/A, U/A) & \longleftarrow & H_n((X/A) \setminus \{A/A\}, (U/A) \setminus \{A/A\}). \end{array}$$

Deskripsi aksesibel. Kedua baris adalah zig-zag tiga grup homologi relatif. Ketiga panah vertikal diinduksi oleh pemetaan hasil bagi. Panah mendatar kiri memperbesar subruang relatif dari A ke U ; panah mendatar kanan adalah inklusi pasangan komplemen. Kedua persegi berkomutasi. Diagram ini ditulis ulang secara mandiri dan tidak menyalin ekspresi TikZ-CD sumber.

Barisan eksak panjang tripel (X, U, A) memuat bagian

$$\cdots \longrightarrow H_n(U, A) \longrightarrow H_n(X, A) \longrightarrow H_n(X, U) \longrightarrow H_{n-1}(U, A) \longrightarrow \cdots$$

Deskripsi aksesibel. Empat suku berturutan adalah homologi pasangan (U, A) , (X, A) , (X, U) , lalu pasangan (U, A) satu derajat lebih rendah. Eksakitas akan memaksa panah tengah menjadi isomorfisma ketika kedua suku ujung nol.

Retraksi deformasi U ke A memberi ekuivalensi homotopi pasangan $(U, A) \simeq (A, A)$, sehingga

$$H_k(U, A) \cong H_k(A, A) = 0$$

untuk setiap k . Eksakitas barisan di atas dengan demikian menunjukkan bahwa panah mendatar kiri atas $H_n(X, A) \rightarrow H_n(X, U)$ adalah isomorfisma. Retraksi deformasi tersebut turun menjadi retraksi deformasi U/A ke A/A ; argumen yang sama menunjukkan bahwa panah mendatar kiri bawah juga isomorfisma.

Dua panah mendatar kanan adalah isomorfisma oleh teorema eksisi. Pemetaan hasil bagi q membatasi diri menjadi homeomorfisma pasangan

$$(X \setminus A, U \setminus A) \xrightarrow{\cong} ((X/A) \setminus \{A/A\}, (U/A) \setminus \{A/A\}),$$

sehingga panah vertikal kanan juga isomorfisma. Komutativitas persegi kanan memberi bahwa panah vertikal tengah adalah isomorfisma; komutativitas persegi kiri kemudian memberi bahwa panah vertikal kiri adalah isomorfisma. Inilah q_* pada pernyataan teorema. $\square$

Koreksi hipotesis, notasi, dan pengulangan. Definisi “pasangan baik” sumber pada baris 1369–1374 hanya meminta retraksi deformasi dari suatu lingkungan, sedangkan bukti sekarang memakai $\bar{A} \subseteq \mathring{U}$, fakta bahwa $X \setminus A$ terbuka, serta titik hasil bagi A/A . Konvensi standar menambahkan bahwa A tak kosong dan tertutup; edisi menyatakan syarat yang diperlukan itu secara eksplisit. Baris 2219 sumber menulis $H_n(U, A) \cong H_n(U, A) \cong \{0\}$; suku tengah yang dimaksud adalah $H_n(A, A)$. Ekspresi komplemen pada baris 2198 dan 2203 juga tidak memasang tanda kurung pada ruang hasil bagi. Edisi menuliskan $(X/A) \setminus \{A/A\}$ dan $(U/A) \setminus \{A/A\}$ agar pasangan serta homeomorfisma pembatasan q tidak ambigu.

Teorema (invariansi dimensi). Misalkan $U \subseteq \mathbb{R}^n$ dan $V \subseteq \mathbb{R}^m$ merupakan **himpunan terbuka tak kosong**. Jika U dan V homeomorfik, maka $m = n$.

Perbaiki hipotesis. Sumber tidak menyatakan bahwa U dan V tak kosong. Tanpa syarat itu, pernyataannya salah karena himpunan kosong terbuka di setiap $\mathbb{R}^d$ dan semua himpunan kosong homeomorfik. Syarat tak kosong ditambahkan agar teorema benar dan agar pemilihan $x \in U$ pada bukti sah.

Bukti. Pilih $x \in U$. Untuk $n \geq 1$, eksisi pada suatu bola terbuka kecil di sekitar x memberi

$$H_k(U, U \setminus \{x\}) \cong H_k(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n \setminus \{x\}).$$

Barisan eksak panjang pasangan $(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n \setminus \{x\})$ memuat

$$\tilde{H}_k(\mathbb{R}^n) \longrightarrow H_k(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n \setminus \{x\}) \longrightarrow \tilde{H}_{k-1}(\mathbb{R}^n \setminus \{x\}) \longrightarrow \tilde{H}_{k-1}(\mathbb{R}^n).$$

Deskripsi aksesibel. Grup relatif lokal berada di antara dua grup homologi tereduksi ruang Euklides dan grup homologi tereduksi komplemennya. Kedua grup ruang Euklides nol karena ruang itu kontraktibel. Diagram ditulis ulang tanpa menyalin ekspresi TikZ-CD sumber.

Karena $\mathbb{R}^n$ kontraktibel dan $\mathbb{R}^n \setminus \{x\} \simeq S^{n-1}$, eksakitas memberi, untuk $k \geq 1$,

$$\begin{aligned} H_k(U, U \setminus \{x\}) &\cong H_k(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n \setminus \{x\}) \\ &\cong \tilde{H}_{k-1}(S^{n-1}) \\ &\cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = n, \\ 0, & k \neq n. \end{cases} \end{aligned}$$

Pada $k = 0$, grup relatif juga nol: komplemen tak kosong dan pemetaan $H_0(\mathbb{R}^n \setminus \{x\}) \rightarrow H_0(\mathbb{R}^n)$ surjektif. Jadi rumus per kasus di atas memang berlaku untuk semua $k \geq 0$ ketika $n \geq 1$.

Untuk $n = 0$, satu-satunya himpunan terbuka tak kosong dalam $\mathbb{R}^0$ adalah satu titik; perhitungan langsung memberi $H_k(\{x\}, \emptyset) \cong \mathbb{Z}$ tepat pada $k = 0$. Jadi rumus “satu grup $\mathbb{Z}$ tepat pada derajat n ” berlaku juga pada dimensi nol.

Misalkan $\varphi: U \rightarrow V$ homeomorfisma. Ia memberi homeomorfisma pasangan

$$(U, U \setminus \{x\}) \xrightarrow{\cong} (V, V \setminus \{\varphi(x)\}),$$

dan karenanya isomorfisma grup bergradasi

$$H_k(U, U \setminus \{x\}) \cong H_k(V, V \setminus \{\varphi(x)\}).$$

Perhitungan yang sama di $V \subseteq \mathbb{R}^m$ menunjukkan bahwa ruas kanan isomorfik dengan $\mathbb{Z}$ tepat pada derajat $k = m$. Ruas kiri isomorfik dengan $\mathbb{Z}$ tepat pada derajat $k = n$. Karena isomorfisma berlaku pada setiap derajat, $n = m$. $\square$

Koreksi notasi. Baris 2245 sumber menulis $H_k(X, X \setminus \{x\})$ setelah memilih $x \in U$; X tidak didefinisikan di sana. Baris 2249–2280 memakai tilde pada grup homologi relatif dan menjatuhkannya pada satu tempat. Konvensi standar memakai homologi biasa untuk pasangan dan homologi tereduksi untuk ruang komplemen. Edisi menerapkan konvensi itu secara konsisten dan menutup kasus dimensi nol secara terpisah.

Catatan. Hasil [teorema sebelumnya](#) lazim disebut **invariansi dimensi**.

Catatan (homologi lokal). Dalam bukti invariansi dimensi muncul grup

$$H_n(X, X \setminus \{x\}),$$

yang disebut **homologi lokal X di x** . Jika singleton $\{x\}$ tertutup dan U merupakan lingkungan terbuka x , eksisi memberi

$$H_n(X, X \setminus \{x\}) \cong H_n(U, U \setminus \{x\}).$$

Jadi struktur grup tersebut hanya bergantung pada topologi X di sekitar x . Setiap homeomorfisma $f: X \rightarrow Y$ menginduksi isomorfisma

$$H_n(X, X \setminus \{x\}) \cong H_n(Y, Y \setminus \{f(x)\})$$

untuk setiap x dan n . Karena itu homologi lokal dapat membuktikan bahwa dua ruang tidak homeomorfik secara lokal pada titik-titik tertentu, seperti dalam [teorema invariansi dimensi](#).

Catatan. Kita telah memperoleh

$$H_k(D^n, \partial D^n) \cong \tilde{H}_k(S^n) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = n, \\ 0, & k \neq n. \end{cases}$$

Dengan mengidentifikasi $H_n(D^n, \partial D^n) \cong H_n(\Delta^n, \partial \Delta^n)$, proposisi berikut menentukan siklus eksplisit yang menghasilkan grup itu dan, kemudian, $\tilde{H}_n(S^n)$.

Proposisi. Pemetaan identitas

$$\sigma_n: \Delta^n \longrightarrow \Delta^n, \quad \sigma_n = \text{id}_{\Delta^n},$$

dipandang sebagai simpleks singular berdimensi n , menghasilkan

$$H_n(\Delta^n, \partial\Delta^n) \cong \mathbb{Z}.$$

Bukti. Karena $\partial\sigma_n \in C_{n-1}(\partial\Delta^n)$, batas itu nol dalam kompleks hasil bagi:

$$\partial\sigma_n = 0 \quad \text{di} \quad C_{n-1}(\Delta^n)/C_{n-1}(\partial\Delta^n).$$

Jadi σ_n adalah siklus relatif dan $[\sigma_n] \in H_n(\Delta^n, \partial\Delta^n)$. Kita berinduksi pada n . Untuk $n = 0$, $\partial\Delta^0 = \emptyset$ dan σ_0 jelas menghasilkan

$$H_0(\Delta^0, \partial\Delta^0) = H_0(\{*\}, \emptyset) = H_0(\{*\}) \cong \mathbb{Z}.$$

Sekarang misalkan $n > 0$. Pilih satu sisi $F_i \cong \Delta^{n-1}$ dari Δ^n dan letakkan

$$\Lambda = \partial\Delta^n \setminus \overset{\circ}{F}_i.$$

(Mohon hargai kehebatan notasi ini.) Kita akan memakai dua isomorfisma

$$H_n(\Delta^n, \partial\Delta^n) \xrightarrow{\cong} H_{n-1}(\partial\Delta^n, \Lambda) \xleftarrow{\cong} H_{n-1}(\Delta^{n-1}, \partial\Delta^{n-1}).$$

Deskripsi aksesibel. Grup relatif simpleks berdimensi n dipetakan oleh pemetaan penghubung ke grup relatif batasnya pada derajat $n - 1$. Inklusi sisi yang tidak terkandung dalam Λ mengidentifikasi grup terakhir dengan grup relatif simpleks berdimensi $n - 1$. Diagram disusun ulang sebagai zig-zag linear, bukan menyalin TikZ-CD sumber.

Untuk isomorfisma pertama, gunakan barisan eksak panjang tripel $(\Delta^n, \partial\Delta^n, \Lambda)$:

$$\cdots \longrightarrow H_n(\partial\Delta^n, \Lambda) \longrightarrow H_n(\Delta^n, \Lambda) \longrightarrow H_n(\Delta^n, \partial\Delta^n) \xrightarrow{\delta} H_{n-1}(\partial\Delta^n, \Lambda) \longrightarrow \cdots.$$

Deskripsi aksesibel. Pemetaan penghubung δ keluar dari homologi relatif $(\Delta^n, \partial\Delta^n)$ menuju homologi relatif $(\partial\Delta^n, \Lambda)$ satu derajat lebih rendah. Suku relatif (Δ^n, Λ) pada kedua sisi yang relevan akan bernilai nol.

Simpleks Δ^n beretraksi deformasi ke Λ : secara simpleks, Δ^n dapat dikolaps sepanjang sisi F_i yang hilang, dengan mempertahankan gabungan semua sisi lainnya. Maka $(\Delta^n, \Lambda) \simeq (\Lambda, \Lambda)$ dan $H_j(\Delta^n, \Lambda) = 0$ untuk setiap j . Eksakitas menjadikan δ isomorfisma pertama.

Isomorfisma kedua diinduksi oleh inklusi sisi yang tidak terkandung dalam Λ ,

$$i: (\Delta^{n-1}, \partial\Delta^{n-1}) \hookrightarrow (\partial\Delta^n, \Lambda).$$

Untuk $n = 1$, pernyataan itu merupakan identifikasi langsung pada H_0 . Untuk $n > 1$, kedua pasangan merupakan pasangan baik, dan i menginduksi homeomorfisma hasil bagi

$$\Delta^{n-1}/\partial\Delta^{n-1} \xrightarrow{\cong} \partial\Delta^n/\Lambda.$$

Teorema hasil bagi relatif memberi isomorfisma kedua.

Di bawah pemetaan penghubung pertama,

$$[\sigma_n] \mapsto [\partial\sigma_n] = \pm[\sigma_{n-1}],$$

karena semua sisi batas selain F_i terletak di Λ dan menjadi nol. Menurut hipotesis induksi, $[\sigma_{n-1}]$ menghasilkan $H_{n-1}(\Delta^{n-1}, \partial\Delta^{n-1})$. Jadi $[\partial\sigma_n]$ menghasilkan $H_{n-1}(\partial\Delta^n, \Lambda)$, dan $[\sigma_n]$ menghasilkan $H_n(\Delta^n, \partial\Delta^n)$.

Untuk memperoleh generator $\tilde{H}_n(S^n)$, bentuk S^n dari dua salinan Δ_1^n dan Δ_2^n dengan mengidentifikasi batasnya menurut urutan titik sudut. (Konstruksi ini sangat mirip dengan salah satu soal pekerjaan rumah dalam kuliah sumber.) Misalkan σ_1 dan σ_2 simpleks singular yang merepresentasikan kedua salinan. Orientasi identifikasi memberi $\partial\sigma_1 = \partial\sigma_2$, sehingga

$$\partial(\sigma_1 - \sigma_2) = 0.$$

Kita klaim bahwa $[\sigma_1 - \sigma_2]$ menghasilkan $\tilde{H}_n(S^n)$. Gunakan isomorfisma

$$\tilde{H}_n(S^n) \xrightarrow{\cong} H_n(S^n, \Delta_2^n) \xleftarrow{\cong} H_n(\Delta_1^n, \partial\Delta_1^n).$$

Deskripsi aksesibel. Panah kiri berasal dari barisan eksak panjang pasangan (S^n, Δ_2^n) ; panah kanan memasukkan belahan simpleks pertama dan mengidentifikasi batasnya dengan belahan kedua. Diagram ditulis ulang secara mandiri sebagai zig-zag.

Isomorfisma pertama berasal dari barisan eksak panjang pasangan (S^n, Δ_2^n) karena Δ_2^n kontraktibel. Untuk $n > 0$, isomorfisma kedua dapat diperoleh dengan melewati hasil bagi seperti di atas; kasus $n = 0$ diperiksa langsung. Dalam grup relatif tengah, suku σ_2 menjadi nol, sehingga $[\sigma_1 - \sigma_2]$ bersesuaian dengan $[\sigma_1]$ pada grup ketiga. Kelas terakhir adalah generator menurut bagian pertama bukti. Jadi $[\sigma_1 - \sigma_2]$ menghasilkan $\tilde{H}_n(S^n)$. $\square$

Koreksi derajat. Baris 2385 sumber menyebut $H_n(\partial\Delta^n, \Lambda)$. Pemetaan penghubung pada diagram dan kedua baris di sekitarnya menunjukkan bahwa grup yang dimaksud adalah $H_{n-1}(\partial\Delta^n, \Lambda)$. Edisi memakai derajat yang benar.

Koreksi homologi dan nama siklus. Baris 2319 sumber menulis $H_n(S^n)$ ketika grup siklik yang sedang diidentifikasi adalah $\tilde{H}_n(S^n)$; perbedaan ini menentukan pada $n = 0$. Baris 2338 beralih ke $H_0(\Delta^0/\partial\Delta^0)$ di tengah argumen pasangan relatif, sehingga edisi mempertahankan $H_0(\Delta^0, \partial\Delta^0)$. Diagram pada baris 2402 memakai tilde pada grup homologi relatif; edisi memakai tilde hanya pada homologi tereduksi absolut dan H_n biasa pada pasangan. Terakhir, baris 2412 menyebut $\Delta_1^n - \Delta_2^n$ sebagai siklus, padahal simpleks singular yang dapat dikurangkan di kompleks rantai adalah $\sigma_1 - \sigma_2$. Semua empat normalisasi dinyatakan eksplisit di sini; generator dan orientasinya tidak diubah.

Proposisi (homologi tereduksi jumlah baji). Misalkan $\{(X_\alpha, x_\alpha)\}_\alpha$ suatu koleksi pasangan baik dalam konvensi standar; khususnya setiap singleton $\{x_\alpha\}$ tertutup. Inklusi

$$i_\alpha: X_\alpha \hookrightarrow \bigvee_\alpha X_\alpha$$

menginduksi isomorfisma

$$\bigoplus_\alpha (i_\alpha)_*: \bigoplus_\alpha \tilde{H}_k(X_\alpha) \xrightarrow{\cong} \tilde{H}_k\left(\bigvee_\alpha X_\alpha\right).$$

Koreksi arah pemetaan. Sumber menampilkan $\bigoplus_\alpha (i_\alpha)_*$ sebagai pemetaan dari homologi baji menuju jumlah langsung. Akan tetapi setiap $(i_\alpha)_*$ berarah dari $\tilde{H}_k(X_\alpha)$ ke homologi baji; karena

itu jumlah langsungnya harus berarah seperti pada pernyataan edisi. Rumus sumber tidak bertipe dengan arah semula.

Bukti. Pasangan

$$\left(\bigsqcup_{\alpha} X_{\alpha}, \{x_{\alpha} \mid \alpha\} \right)$$

merupakan pasangan baik: ambil gabungan lepas lingkungan baik pada setiap komponen dan gabungkan retraksi deformasinya komponen demi komponen. Hasil bagi yang meruntuhkan semua titik dasar menjadi satu titik adalah jumlah baji,

$$\left(\bigsqcup_{\alpha} X_{\alpha} \right) / \{x_{\alpha} \mid \alpha\} \cong \bigvee_{\alpha} X_{\alpha}.$$

[Teorema hasil bagi relatif](#) dan dekomposisi rantai singular menurut komponen memberi

$$\begin{aligned} \tilde{H}_k \left(\left(\bigsqcup_{\alpha} X_{\alpha} \right) / \{x_{\alpha} \mid \alpha\} \right) &\cong H_k \left(\bigsqcup_{\alpha} X_{\alpha}, \{x_{\alpha} \mid \alpha\} \right) \\ &\cong \bigoplus_{\alpha} H_k(X_{\alpha}, \{x_{\alpha}\}) \\ &\cong \bigoplus_{\alpha} \tilde{H}_k(X_{\alpha}). \end{aligned}$$

Jika $j_{\alpha}: X_{\alpha} \rightarrow \bigsqcup_{\beta} X_{\beta}$ adalah inklusi komponen dan q pemetaan hasil bagi menuju baji, maka $q \circ j_{\alpha} = i_{\alpha}$. Karena semua isomorfisma di atas bersifat alami, invers dari isomorfisma yang ditampilkan dalam perhitungan tepat $\bigoplus_{\alpha} (i_{\alpha})_{*}$. Jadi pemetaan pada pernyataan merupakan isomorfisma. $\square$

Koreksi notasi himpunan. Baris 2435 sumber menulis $\{x_{\alpha}\}_{\alpha}$ di dalam pasangan, sedangkan baris 2427 dan 2431 memakai himpunan $\{x_{\alpha} \mid \alpha\}$. Edisi memakai bentuk terakhir secara konsisten dan menambahkan argumen kealamian yang mengidentifikasi isomorfisma abstrak dengan jumlah langsung pemetaan inklusi.

34.2 Mayer–Vietoris

Teorema (Mayer–Vietoris). Misalkan $A, B \subseteq X$ dan

$$X = \mathring{A} \cup \mathring{B}.$$


Diagram semantik (penutup dan pemotongan rantai). Daerah A dan B menutupi X dengan daerah tumpang tindih $A \cap B$. Sebuah rantai kecil pada X dapat dipisahkan menjadi rantai τ di A dan rantai η di B . Jika σ berada di $A \cap B$, dua salinannya masuk ke jumlah langsung dengan tanda berlawanan, yaitu $(\sigma, -\sigma)$. Untuk siklus $\sigma = \tau + \eta$ di X , persamaan $\partial\tau = -\partial\eta$ menempatkan batas bersama itu di $A \cap B$.

Terdapat barisan eksak panjang

$$\cdots \longrightarrow H_n(A \cap B) \xrightarrow{(i_*, -j_*)} H_n(A) \oplus H_n(B) \xrightarrow{k_* + \ell_*} H_n(X) \xrightarrow{\partial} H_{n-1}(A \cap B) \longrightarrow \cdots,$$

dengan $i: A \cap B \hookrightarrow A$, $j: A \cap B \hookrightarrow B$, serta k dan ℓ inklusi ke X . Pada tingkat wakil,

$$[\sigma] \longmapsto ([\sigma], -[\sigma]), \quad ([\tau], [\eta]) \longmapsto [\tau] + [\eta].$$



Gambar 8: Gambar ulang aksesibel penutup Mayer–Vietoris: A dan B menutupi X ; rantai z dipotong menjadi τ di A dan η di B dengan batas berlawanan pada irisan.

Jika $[z] \in H_n(X)$ diwakili oleh pemisahan $z = \tau + \eta$, maka pemetaan penghubung diberikan oleh

$$\partial[z] = [\partial\tau] = -[\partial\eta] \in H_{n-1}(A \cap B).$$

Diagram semantik. Panah pertama memasukkan satu rantai perpotongan ke dua bagian dengan tanda berlawanan; panah kedua menjumlahkan kedua bagian di X ; panah penghubung mengambil batas salah satu bagian, yang kini terletak di perpotongan.

Koreksi konsistensi label rantai. Gambar sumber menempatkan η pada daerah biru A dan τ pada daerah jingga B , tetapi diagram aljabarnya menulis $([\tau], [\eta]) \in H_n(A) \oplus H_n(B)$ dan $\partial[z] = [\partial\tau]$. Edisi mempertahankan konvensi aljabar tersebut: τ berada di A , η berada di B , dan gambar ulang memakai label yang sama. Pertukaran nama tidak mengubah kelas $[\tau] + [\eta]$.

Bukti. Ambil penutup $\mathcal{U} = \{A, B\}$. Untuk setiap n , barisan

$$0 \longrightarrow C_n(A \cap B) \xrightarrow{f} C_n(A) \oplus C_n(B) \xrightarrow{g} C_n^{\mathcal{U}}(X) \longrightarrow 0,$$

dengan

$$f(\sigma) = (\sigma, -\sigma), \quad g(\tau, \eta) = \tau + \eta,$$

merupakan barisan eksak pendek kompleks rantai. Memang, f injektif, g surjektif menurut definisi rantai kecil yang subordinat terhadap $\mathcal{U}$, dan

$$\ker g = \{(c, -c) : c \in C_n(A \cap B)\} = \text{im } f.$$

Teorema rantai kecil dari bagian sebelumnya memberi $H_n^{\mathcal{U}}(X) \cong H_n(X)$. Barisan eksak panjang dalam homologi yang berasal dari barisan eksak pendek di atas karena itu tepat merupakan barisan Mayer–Vietoris pada pernyataan. $\square$

Catatan. Konstruksi yang sama menghasilkan barisan Mayer–Vietoris eksak panjang untuk homologi tereduksi. Di sini kita memakai kompleks rantai teraugmentasi; dengan konvensi itu suku derajat rendah tetap bermakna, termasuk $\tilde{H}_{-1}(\emptyset) \cong \mathbb{Z}$. Semua penerapan berikut mempunyai $A \cap B \neq \emptyset$.

Contoh (homologi sfera). Kita ingin menghitung $\tilde{H}_k(S^n)$ untuk $n \geq 1$. Tuliskan

$$S^n = \mathring{A} \cup \mathring{B}, \quad A = S^n \setminus \{N\}, \quad B = S^n \setminus \{S\},$$

dengan N dan S berturut-turut kutub utara dan selatan. Kita mempunyai

$$A \cong B \cong \mathbb{R}^n, \quad A \cap B \simeq_{\text{dr}} S^{n-1},$$

karena perpotongan tersebut meretraksi deformasi ke ekuator (khatulistiwa sfera). Bagian barisan Mayer–Vietoris tereduksi adalah

$$\tilde{H}_k(A) \oplus \tilde{H}_k(B) \longrightarrow \tilde{H}_k(S^n) \longrightarrow \tilde{H}_{k-1}(A \cap B) \longrightarrow \tilde{H}_{k-1}(A) \oplus \tilde{H}_{k-1}(B).$$

Diagram semantik. Empat suku berturutan menghubungkan homologi kedua bagian, homologi sfera, homologi perpotongan satu derajat lebih rendah, lalu homologi kedua bagian pada derajat yang lebih rendah itu.

Karena A dan B kontraktibel, barisan ini menjadi

$$0 \oplus 0 \longrightarrow \tilde{H}_k(S^n) \longrightarrow \tilde{H}_{k-1}(S^{n-1}) \longrightarrow 0 \oplus 0.$$

Diagram semantik. Pemetaan di tengah berada di antara grup nol pada kedua sisi dan karena itu merupakan isomorfisma.

Eksakitas memberi

$$\tilde{H}_k(S^n) \cong \tilde{H}_{k-1}(S^{n-1}).$$

Dengan kasus dasar S^0 , rumus ini menghitung homologi sfera secara induktif, sebagaimana pada [akibat homologi sfera sebelumnya](#).

Kandidat koreksi sumber (tilde yang hilang). Seluruh contoh memakai homologi tereduksi, tetapi baris 2546 mencetak $H_k(S^n) \cong H_{k-1}(S^{n-1})$. Rumus itu tidak benar pada derajat nol dengan homologi biasa. Prosa Indonesia memakai bentuk yang konsisten, $\tilde{H}_k(S^n) \cong \tilde{H}_{k-1}(S^{n-1})$, sambil mempertahankan lokus sumber ini sebagai kandidat koreksi sumber.

Contoh ($\mathbb{RP}^2$). Pilih $A \cong \mathbb{D}^2$ dan $B \cong M$, dengan M pita Möbius, sehingga keduanya menutupi $\mathbb{RP}^2$ dan $A \cap B$ merupakan anulus (daerah berbentuk gelang) yang meretraksi deformasi ke S^1 .

Diagram semantik (penutup $\mathbb{RP}^2$). Bagian tengah berbentuk cakram menyatakan A . Daerah berbentuk anulus di sekelilingnya menyatakan B ; dua arah pada batas luar diidentifikasi berlawanan sehingga daerah itu menjadi pita Möbius. Daerah tumpang tindih adalah anulus di sekitar batas cakram dan mempunyai tipe homotopi S^1 .


Barisan Mayer–Vietoris tereduksi memuat bagian

$$\begin{aligned} \cdots \longrightarrow \tilde{H}_2(A) \oplus \tilde{H}_2(B) &\longrightarrow \tilde{H}_2(\mathbb{RP}^2) \longrightarrow \tilde{H}_1(A \cap B) \\ &\longrightarrow \tilde{H}_1(A) \oplus \tilde{H}_1(B) \longrightarrow \tilde{H}_1(\mathbb{RP}^2) \longrightarrow \tilde{H}_0(A \cap B) \longrightarrow \cdots \end{aligned}$$

Diagram semantik. Barisan turun dari derajat dua ke derajat satu melalui pemetaan penghubung; suku perpotongan berada di antara homologi ruang total dan jumlah langsung homologi kedua bagian.

Ruang A kontraktibel, sedangkan B dan $A \cap B$ masing-masing meretraksi deformasi ke S^1 . Karena ketiga ruang itu terhubung lintasan, potongan yang relevan menyederhana menjadi

$$\mathbb{RP}^2 = \text{int}(A) \cup \text{int}(B)$$



Anak panah luar: identifikasi antipodal berarah berlawanan

Gambar 9: Gambar ulang aksesibel penutup bidang proyektif real: cakram A, lingkungan batas B yang menjadi pita Möbius, dan anulus irisan A dengan B.

$$0 \longrightarrow \tilde{H}_2(\mathbb{RP}^2) \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \longrightarrow \tilde{H}_1(\mathbb{RP}^2) \longrightarrow 0.$$

Diagram semantik. Dua salinan $\mathbb{Z}$ berasal dari lingkaran perpotongan dan inti pita Möbius. Pemetaan di antara keduanya mengalikan generator dengan dua.

Pemetaan $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ mempunyai derajat ± 2 : lingkaran batas pita Möbius mengelilingi lingkaran intinya dua kali. Setelah generator kedua salinan $\mathbb{Z}$ dipilih secara serasi, pemetaan yang ditampilkan adalah perkalian $+2$. Karena pemetaan ini injektif dan kokernelnya $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, eksakitas memberi

$$\tilde{H}_2(\mathbb{RP}^2) = 0, \quad \tilde{H}_1(\mathbb{RP}^2) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

Jadi barisan teridentifikasi sepenuhnya sebagai

$$0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

Diagram semantik. Kernel perkalian dua adalah nol dan kokernelnya adalah $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Pelengkapan penjelasan sumber. Sumber menyatakan bahwa generator kiri dipetakan ke dua kali generator kanan, lalu meninggalkan komentar TeX “give intuition to $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ” dan “explain?”. Edisi ini menjelaskan lokus tersebut melalui pemetaan batas pita Möbius ke lingkaran inti yang berderajat dua; komentar kerja sumber tidak diperlakukan sebagai prosa pembaca.

34.3 Kealamian

Catatan. Asal istilah “kealamian” akan menjadi lebih jelas setelah interpretasinya secara kategoris dipahami.

Definisi (kealamian). Barisan eksak panjang suatu pasangan disebut **alami** jika untuk setiap peta pasangan $f: (X, A) \rightarrow (Y, B)$, diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccccccccc}
\cdots & \longrightarrow & H_n(A) & \xrightarrow{i_*} & H_n(X) & \xrightarrow{q_*} & H_n(X, A) & \xrightarrow{\partial} & H_{n-1}(A) \longrightarrow \cdots \\
& & \downarrow (f|_A)_* & & \downarrow f_* & & \downarrow f_* & & \downarrow (f|_A)_* \\
\cdots & \longrightarrow & H_n(B) & \xrightarrow{i'_*} & H_n(Y) & \xrightarrow{q'_*} & H_n(Y, B) & \xrightarrow{\partial'} & H_{n-1}(B) \longrightarrow \cdots
\end{array}$$

Diagram semantik. Kedua baris adalah barisan eksak panjang pasangan. Pemetaan vertikal diinduksi oleh f dan pembatasannya pada subruang. Semua persegi berkomutasi; khususnya, $\partial' \circ f_* = (f|_A)_* \circ \partial$.

Catatan (bentuk aljabar umum). Secara lebih umum, barisan eksak panjang homologi yang terkait dengan barisan eksak pendek kompleks rantai bersifat alami. Jika terdapat morfisma komutatif antara dua barisan eksak pendek yang komponen vertikalnya adalah α , β , dan γ , maka diagram

$$\begin{array}{ccccccccc}
\cdots & \longrightarrow & H_n(\mathcal{A}) & \xrightarrow{i_*} & H_n(\mathcal{B}) & \xrightarrow{q_*} & H_n(\mathcal{C}) & \xrightarrow{\partial} & H_{n-1}(\mathcal{A}) \longrightarrow \cdots \\
& & \downarrow \alpha_* & & \downarrow \beta_* & & \downarrow \gamma_* & & \downarrow \alpha_* \\
\cdots & \longrightarrow & H_n(\mathcal{A}') & \xrightarrow{i'_*} & H_n(\mathcal{B}') & \xrightarrow{q'_*} & H_n(\mathcal{C}') & \xrightarrow{\partial'} & H_{n-1}(\mathcal{A}') \longrightarrow \cdots
\end{array}$$

komutatif.

Diagram semantik. Tiga pemetaan rantai vertikal menginduksi pemetaan homologi pada setiap derajat. Persegi yang melibatkan pemetaan penghubung menyatakan identitas $\partial' \gamma_* = \alpha_* \partial$.

Argumen yang tidak diberikan dalam sumber. Sumber mendefinisikan kealamian barisan eksak panjang pasangan dan menyatakan bentuk aljabar umumnya, tetapi tidak membuktikan komutativitas persegi yang memuat pemetaan penghubung. Karena kealamian itu dipakai dalam bukti perbandingan pada Bagian 1.10, verifikasi tingkat rantai berikut disusun mandiri untuk edisi ini.

Perbaikan bukti FOM-PR-09 (kealamian pemetaan penghubung). Misalkan ada diagram komutatif barisan eksak pendek kompleks rantai

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \rightarrow & \mathcal{A} & \xrightarrow{i} & \mathcal{B} & \xrightarrow{q} & \mathcal{C} & \rightarrow & 0 \\
& & \downarrow \alpha & & \downarrow \beta & & \downarrow \gamma & & \\
0 & \rightarrow & \mathcal{A}' & \xrightarrow{i'} & \mathcal{B}' & \xrightarrow{q'} & \mathcal{C}' & \rightarrow & 0.
\end{array}$$

Ambil kelas $[c] \in H_n(\mathcal{C})$ dan wakili dengan siklus c . Pilih $b \in \mathcal{B}_n$ dengan $q(b) = c$. Karena $q(\partial b) = \partial c = 0$, eksakitas memberi $a \in \mathcal{A}_{n-1}$ dengan $i(a) = \partial b$. Menurut injektivitas i , $i(\partial a) = \partial i(a) = \partial^2 b = 0$ juga memberi $\partial a = 0$. Menurut definisi, pemetaan penghubung baris atas mengirim $[c]$ ke $[a]$.

Pada baris bawah, $\beta(b)$ merupakan pengangkatan dari $\gamma(c)$ karena $q'\beta(b) = \gamma q(b) = \gamma(c)$, dan

$$\partial \beta(b) = \beta(\partial b) = \beta i(a) = i' \alpha(a).$$

Karena itu pemetaan penghubung bawah mengirim $\gamma_*[c]$ ke $\alpha_*[a]$, sehingga

$$\partial' \gamma_*[c] = \alpha_* \partial[c].$$

Persegi lain berkomutasi langsung dari $\beta i = i' \alpha$ dan $q' \beta = \gamma q$. Jadi seluruh diagram barisan eksak panjang komutatif. Untuk barisan pasangan, ambil diagram kompleks rantai yang diinduksi oleh $f: (X, A) \rightarrow (Y, B)$; identitas yang sama memberi tepat kealamian pada definisi. $\square$

Kandidat koreksi tipografis. Sumber mencetak “he long exact sequence”, “that that”, “idependent”, “a long exact sequences”, “Suppse”, “two exact sequence”, “interesected”, dan “surjevitive”. Terjemahan

menormalkan semua lokus tersebut tanpa mengubah isi matematis; semuanya dipertahankan di sini sebagai satu kandidat koreksi sumber yang terdeduplikasi.

34.4 Homologi simpleksial versus homologi singular

Catatan. Homologi simpleksial relatif dapat didefinisikan dengan cara yang analog dengan homologi singular relatif.

Definisi (k -kerangka suatu kompleks simpleksial). Misalkan X suatu kompleks- Δ . k -kerangka dari X adalah gabungan citra semua simpleks- i untuk $0 \leq i \leq k$. Kerangka ini dinotasikan dengan $X^{(k)}$, atau cukup X^k .

Proposisi (perbandingan simpleksial–singular). Pemetaan alami

$$f: C_n^\Delta(X) \longrightarrow C_n(X), \quad f(\sigma_\alpha) = \sigma_\alpha,$$

merupakan pemetaan rantai dan menginduksi isomorfisma

$$f_*: H_n^\Delta(X) \xrightarrow{\cong} H_n(X)$$

untuk setiap n . Secara khusus, homologi simpleksial suatu ruang topologis X tidak bergantung pada pilihan struktur kompleks- Δ pada X .

Kandidat koreksi substantif. Sumber mengatakan bahwa f_* adalah “an isomorphism in homotopy”, padahal f_* pada baris yang sama ialah pemetaan antara grup homologi. Terjemahan menyatakan sasaran yang bertipe benar: f_* merupakan isomorfisma dalam homologi.

Bukti, mula-mula untuk kompleks berdimensi hingga. Andaikan $X = X^{(N)}$ untuk suatu $N \geq 0$. Kita membuktikan pernyataan dengan induksi pada k -kerangka dari struktur kompleks- Δ yang diberikan.

Untuk $k = 0$, kerangka X^0 merupakan gabungan lepas titik-titik, dan

$$H_n^\Delta(X^0) \cong H_n(X^0) \cong \begin{cases} 0, & n > 0, \\ \bigoplus_{x \in X^0} \mathbb{Z}[x], & n = 0. \end{cases}$$

Untuk langkah induksi, ambil $1 \leq k \leq N$ dan andaikan $H_n^\Delta(X^{k-1}) \cong H_n(X^{k-1})$ untuk setiap n . Kita akan membuktikan hasil yang sama untuk X^k . Pasangan (X^k, X^{k-1}) merupakan pasangan baik. Kealamian menghubungkan barisan eksak panjang simpleksial dan singular melalui pemetaan yang diinduksi oleh f :

$$\begin{array}{ccccccccc} H_{n+1}^\Delta(X^k, X^{k-1}) & \longrightarrow & H_n^\Delta(X^{k-1}) & \longrightarrow & H_n^\Delta(X^k) & \longrightarrow & H_n^\Delta(X^k, X^{k-1}) & \longrightarrow & H_{n-1}^\Delta(X^{k-1}) \\ \downarrow f_* & & \downarrow f_* & & \downarrow f_* & & \downarrow f_* & & \downarrow f_* \\ H_{n+1}(X^k, X^{k-1}) & \longrightarrow & H_n(X^{k-1}) & \longrightarrow & H_n(X^k) & \longrightarrow & H_n(X^k, X^{k-1}) & \longrightarrow & H_{n-1}(X^{k-1}). \end{array}$$

Diagram semantik. Kedua baris eksak mempunyai lima suku. Hipotesis induksi mengendalikan panah vertikal kedua dan kelima; perhitungan relatif berikut mengendalikan panah pertama dan keempat. Lemma lima lalu mengendalikan panah vertikal tengah.

Mulai sekarang, “panah pertama”, “panah kedua”, dan seterusnya berarti panah vertikal dari kiri ke kanan. Hipotesis induksi menyatakan bahwa panah kedua dan kelima adalah isomorfisma. Untuk panah pertama dan keempat, cukup diperlihatkan bahwa

$$H_n^\Delta(X^k, X^{k-1}) \cong H_n(X^k, X^{k-1})$$

melalui pemetaan yang diinduksi f , untuk semua n dan k .

Kompleks rantai simpleksial relatif $C_n^\Delta(X^k, X^{k-1})$ bernilai nol jika $n \neq k$, dan pada $n = k$ merupakan grup abelian bebas dengan basis semua simpleks- k dari X . Karena suku relatif pada derajat $k-1$ dan $k+1$ juga nol pada tempat yang menentukan homologi ini,

$$H_n^\Delta(X^k, X^{k-1}) \cong \begin{cases} \bigoplus_{\alpha: n_\alpha=k} \mathbb{Z}[\sigma_\alpha], & n = k, \\ 0, & n \neq k. \end{cases}$$

Di sisi singular, X^{k-1} merupakan retrak deformasi kuat dari suatu lingkungannya di X^k . Teorema hasil bagi untuk pasangan baik dan identifikasi ruang hasil bagi memberi

$$\begin{aligned} H_n(X^k, X^{k-1}) &\cong \tilde{H}_n(X^k/X^{k-1}) \\ &\cong \tilde{H}_n\left(\bigvee_{s_k} S^k\right) \\ &\cong \begin{cases} \bigoplus_{\alpha: n_\alpha=k} \mathbb{Z}[\sigma_\alpha], & n = k, \\ 0, & n \neq k, \end{cases} \end{aligned}$$

dengan s_k banyaknya simpleks berdimensi k . Kompatibilitas pemetaan pada tingkat generator dibuktikan dalam [perbaikan FOM-PR-10](#) di bawah: pemetaan relatif yang diinduksi f adalah jumlah langsung unit pada setiap komponen baji. Jadi pemetaan itu sendiri—bukan sekadar kedua grup abstraknya—adalah isomorfisma. Panah pertama dan keempat pada diagram karena itu isomorfisma. Dengan [lemma lima](#), panah ketiga juga isomorfisma. Induksi pada k menyelesaikan kasus berdimensi hingga. $\square$

Argumen yang tidak diberikan dalam sumber. Sumber menghitung kedua grup relatif secara abstrak, lalu langsung memakai lemma lima. Kesamaan tipe grup tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa **pemetaan pembandingan yang sebenarnya** adalah isomorfisma. Verifikasi generator berikut menutup ketergantungan tersebut.

Perbaikan bukti FOM-PR-10 (kompatibilitas generator relatif). Pada derajat k , basis $C_k^\Delta(X^k, X^{k-1})$ terdiri atas simpleks berorientasi $\sigma_\alpha: \Delta^k \rightarrow X^k$. Pemetaan pembandingan mengirim $[\sigma_\alpha]$ ke **simpleks singular yang sama**, dipandang relatif terhadap X^{k-1} .

Sesudah ruang bawah diruntuhkan, pemetaan karakteristik itu turun menjadi

$$\Delta^k/\partial\Delta^k \cong S^k \longrightarrow X^k/X^{k-1} \cong \bigvee_{\beta} S_{\beta}^k.$$

Proyeksi ke komponen S_{α}^k mempunyai derajat $+1$ setelah orientasi komponen dipilih sesuai orientasi σ_{α} , sedangkan proyeksi ke setiap komponen S_{β}^k dengan $\beta \neq \alpha$ adalah konstan. Menurut [proposisi generator simpleks](#) dan [proposisi jumlah baji](#), pemetaan relatif pada derajat k karena itu adalah jumlah langsung pemetaan identitas

$$\bigoplus_{\alpha} \mathbb{Z}[\sigma_{\alpha}] \xrightarrow{\cong} \bigoplus_{\alpha} \mathbb{Z}[S_{\alpha}^k].$$

Pada setiap derajat $n \neq k$, kedua grup relatif bernilai nol, sehingga pemetaan juga isomorfisma. Ini membuktikan kompatibilitas yang diperlukan dalam langkah induksi, bukan hanya isomorfisma abstrak kedua ruas. $\square$

Kandidat koreksi indeks pada rumus kasus. Pada rumus simpleksial, sumber mencetak syarat kedua $n_\alpha \neq 0$; pada rumus singular, sumber mencetak $n \neq 0$. Kedua rumus sedang membandingkan derajat homologi n dengan derajat kerangka k , sehingga cabang nol yang bertipe dan sesuai dengan prosa adalah $n \neq k$. Terjemahan juga menempatkan syarat $n_\alpha = k$ pada indeks jumlah langsung, bukan sebagai syarat cabang yang menggantikan $n = k$.

Klarifikasi variabel. Sumber memakai n sekaligus untuk batas dimensi dalam $X = X^{(n)}$ dan untuk derajat homologi. Terjemahan menamai batas dimensi N agar induksi kerangka dan derajat homologi tidak tercampur.

Lemma (lemma lima). Andaikan terdapat diagram komutatif grup abelian dengan dua baris eksak,

$$\begin{array}{ccccccccc} A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C & \longrightarrow & D & \longrightarrow & E \\ \downarrow \alpha & & \downarrow \beta & & \downarrow \gamma & & \downarrow \delta & & \downarrow \epsilon \\ A' & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & C' & \longrightarrow & D' & \longrightarrow & E'. \end{array}$$

Diagram semantik. Dua baris berisi lima objek dan empat panah mendatar. Lima panah vertikal $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon$ membuat keempat persegi komutatif.

Jika α, β, δ , dan ϵ isomorfisma, maka γ isomorfisma.

Bagian yang dihilangkan dalam sumber. Bukti sumber hanya berbunyi “diagram chasing. to be added.” Tidak ada pembuktian injektivitas ataupun surjektivitas panah tengah. Perbaikan lengkap berikut disusun mandiri untuk edisi ini.

Perbaikan bukti FOM-PR-07 (lemma lima). Namai panah mendatar baris atas

$$A \xrightarrow{p} B \xrightarrow{q} C \xrightarrow{r} D \xrightarrow{s} E$$

dan panah baris bawah p', q', r', s' . Semua persegi komutatif.

Untuk membuktikan bahwa γ injektif, ambil $c \in C$ dengan $\gamma(c) = 0$. Komutativitas memberi

$$\delta(r(c)) = r'(\gamma(c)) = 0.$$

Karena δ injektif, $r(c) = 0$. Eksakitas baris atas memberi $b \in B$ dengan $q(b) = c$. Selanjutnya,

$$q'(\beta(b)) = \gamma(q(b)) = \gamma(c) = 0.$$

Eksakitas baris bawah memberi $a' \in A'$ dengan $p'(a') = \beta(b)$. Karena α surjektif, pilih $a \in A$ dengan $\alpha(a) = a'$. Komutativitas lalu memberi

$$\beta(p(a)) = p'(\alpha(a)) = p'(a') = \beta(b).$$

Karena β injektif, $p(a) = b$. Maka $c = q(b) = q(p(a)) = 0$. Jadi γ injektif.

Untuk membuktikan bahwa γ surjektif, ambil $c' \in C'$ dan tuliskan $d' = r'(c')$. Karena δ surjektif, pilih $d \in D$ dengan $\delta(d) = d'$. Jika $e = s(d)$, maka

$$\epsilon(e) = s'(\delta(d)) = s'(d') = s'(r'(c')) = 0.$$

Karena ϵ injektif, $e = 0$. Eksakitas baris atas memberi $c \in C$ dengan $r(c) = d$. Sekarang

$$r'(\gamma(c) - c') = \delta(r(c)) - r'(c') = d' - d' = 0.$$

Eksakitas baris bawah memberi $b' \in B'$ dengan $q'(b') = \gamma(c) - c'$. Karena β surjektif, pilih $b \in B$ dengan $\beta(b) = b'$. Letakkan $c_0 = q(b)$. Komutativitas memberi

$$\gamma(c_0) = q'(\beta(b)) = q'(b') = \gamma(c) - c'.$$

Dengan demikian $\gamma(c - c_0) = c'$, sehingga γ surjektif. Jadi γ bijektif dan, sebagai homomorfisma grup abelian, merupakan isomorfisma. $\square$

Lemma. Jika $C \subseteq X$ kompak, maka C berpotongan dengan hanya berhingga banyak simpleks X pada interior masing-masing. Secara khusus, $C \subseteq X^{(k)}$ untuk suatu k .

Bukti sumber, sampai langkah yang belum dibuktikan. Andaikan C berpotongan dengan tak berhingga banyak simpleks terbuka. Pilih barisan tak hingga titik $x_i \in C$, dengan setiap x_i terletak pada simpleks terbuka yang berbeda, dan definisikan

$$U_i = X \setminus \bigcup_{j \neq i} \{x_j\}.$$

Sumber kemudian menyatakan bahwa $\{U_i\}$ adalah penutup terbuka tanpa subpenutup berhingga, tetapi tidak membuktikan bahwa setiap U_i terbuka.

Argumen yang tidak diberikan dalam sumber. Keterbukaan U_i bergantung pada topologi lemah dan sifat bahwa penutupan setiap simpleks hanya memuat berhingga banyak muka; tanpa langkah itu, kontradiksi kekompakan belum sah. Perbaikan berikut menyatakan dan membuktikan langkah tersebut.

Perbaikan bukti FOM-PR-11. Andaikan C berpotongan dengan tak berhingga banyak simpleks terbuka. Pilih barisan tak hingga titik $x_i \in C$, dengan setiap x_i terletak pada simpleks terbuka yang berbeda. Definisikan

$$U_i = X \setminus \bigcup_{j \neq i} \{x_j\}.$$

Penutupan setiap simpleks hanya memuat berhingga banyak muka terbuka. Karena dipilih paling banyak satu x_j pada setiap simpleks terbuka, himpunan yang dibuang berpotongan dengan setiap simpleks tertutup dalam himpunan berhingga, dan karenanya tertutup. Menurut topologi lemah kompleks- Δ , himpunan yang dibuang itu tertutup di X . Karena itu setiap U_i terbuka. Keluarga $\{U_i\}$ menutupi C : titik yang bukan salah satu x_j berada di setiap U_i , sedangkan $x_i \in U_i$. Namun, gabungan berhingga $U_{i_1} \cup \dots \cup U_{i_m}$ tidak memuat x_j untuk $j \notin \{i_1, \dots, i_m\}$. Jadi penutup tersebut tidak mempunyai subpenutup berhingga, bertentangan dengan kekompakan C . Maka C hanya bertemu berhingga banyak simpleks terbuka. Maksimum dimensinya memberi k dengan $C \subseteq X^{(k)}$. $\square$

Catatan (menghapus asumsi berdimensi hingga). Lemma sebelumnya memungkinkan kita membuktikan [proposisi perbandingan](#) tanpa asumsi $X = X^{(N)}$.

Untuk surjektivitas, ambil kelas dalam $H_n(X)$ dan wakili dengan siklus singular z . Dukungan z adalah citra kontinu dari gabungan berhingga simpleks kompak, sehingga kompak. Menurut [lemma kekompakan](#), dukungan itu termuat dalam suatu $X^{(k)}$. Isomorfisma pada kerangka berdimensi hingga,

$$H_n^\Delta(X^{(k)}) \xrightarrow{\cong} H_n(X^{(k)}),$$

memberi siklus simpleksial pada $X^{(k)}$ yang citra singularnya mewakili $[z]$. Setelah dimasukkan ke X , siklus yang sama menunjukkan bahwa $H_n^\Delta(X) \rightarrow H_n(X)$ surjektif.

Koreksi tipe objek. Sumber menyebut “an element in $X^{(k)}$ ” sebagai prapeta suatu kelas homologi. Objek yang bertipe benar adalah kelas dalam $H_n^\Delta(X^{(k)})$, diwakili oleh siklus simpleksial. Edisi menuliskan kelas dan wakilnya secara eksplisit.

Bagian yang dihilangkan dalam sumber. Sesudah argumen surjektivitas, sumber hanya mengatakan bahwa injektivitas dapat diperlihatkan “secara serupa”, lalu meninggalkan komentar “to be added”. Pernyataan itu belum menangani rantai singular yang membatasi suatu siklus simpleksial. Perbaikan lengkap berikut disusun mandiri untuk edisi ini.

Perbaikan bukti FOM-PR-08 (injektivitas untuk kompleks tak hingga). Ambil kelas $[z] \in H_n^\Delta(X)$ yang dipetakan ke nol dalam $H_n(X)$. Rantai simpleksial z adalah jumlah berhingga simpleks, sehingga terdapat k dengan $z \in C_n^\Delta(X^{(k)})$. Karena citra singularnya nol dalam homologi, ada rantai singular berhingga $c \in C_{n+1}(X)$ dengan

$$\partial c = f(z).$$

Dukungan c merupakan gabungan berhingga citra simpleks kompak, maka kompak. Lemma sebelumnya memberi $m \geq k$ sehingga dukungan c dan z keduanya termuat dalam $X^{(m)}$. Di dalam kerangka ini,

$$f_*: H_n^\Delta(X^{(m)}) \xrightarrow{\cong} H_n(X^{(m)})$$

adalah isomorfisma menurut kasus berdimensi hingga. Persamaan $\partial c = f(z)$ menunjukkan bahwa $f_*[z] = 0$ sudah di $H_n(X^{(m)})$. Injektivitas isomorfisma tersebut memberi $[z] = 0$ di $H_n^\Delta(X^{(m)})$. Jadi terdapat rantai simpleksial $w \in C_{n+1}^\Delta(X^{(m)})$ dengan

$$\partial w = z.$$

Inklusi $X^{(m)} \hookrightarrow X$ mempertahankan persamaan ini, sehingga $[z] = 0$ juga dalam $H_n^\Delta(X)$. Kernel pemetaan perbandingan trivial; bersama surjektivitas di atas, pemetaan tersebut adalah isomorfisma untuk setiap kompleks- Δ , tanpa asumsi dimensi hingga. $\square$

34.5 Pemeriksaan penguasaan

Tujuh pemeriksaan berikut membentuk lapisan penguasaan asli edisi. Setiap soal mempunyai petunjuk dan solusi lengkap; soal-soal ini tidak berasal dari bank soal Fomberg yang tidak dipilih.

Pemeriksaan Penguasaan F4.1 (subdivisi dan rantai kecil). Misalkan $\sigma: \Delta^2 \rightarrow X$ simpleks singular dan $\mathcal{U} = \{U_j\}$ memenuhi syarat definisi rantai- $\mathcal{U}$.

1. Berapa banyak segitiga yang muncul setelah r subdivisi barisentris?
2. Berikan batas atas diameter setiap segitiga sesudah r subdivisi.
3. Gunakan lemma bilangan Lebesgue pada penutup $\{\sigma^{-1}(\overset{\circ}{U}_j)\}_j$ untuk membuktikan bahwa $Sd^r(\sigma)$ merupakan rantai- $\mathcal{U}$ untuk r cukup besar.
4. Jelaskan mengapa argumen yang sama berlaku serentak untuk setiap rantai singular berhingga.

Petunjuk. Setiap subdivisi segitiga menghasilkan $3! = 6$ segitiga, dan faktor penyusutan diameter untuk $n = 2$ adalah $2/3$. Pilih r sehingga $(2/3)^r \text{diam}(\Delta^2)$ lebih kecil daripada bilangan Lebesgue. Untuk rantai berhingga, ambil maksimum dari sejumlah berhingga eksponen.

Solusi Pemeriksaan F4.1. Satu subdivisi memberi enam segitiga; menerapkan aturan itu pada setiap segitiga secara berulang memberi 6^r segitiga. Menurut estimasi FOM-PR-05a, diameter masing-masing paling besar

$$\left(\frac{2}{3}\right)^r \text{diam}(\Delta^2).$$

Prapeta bagian-bagian dalam U_j membentuk penutup terbuka bagi ruang kompak Δ^2 , sehingga mempunyai bilangan Lebesgue $\lambda > 0$. Pilih r dengan

$$\left(\frac{2}{3}\right)^r \text{diam}(\Delta^2) < \lambda.$$

Setiap segitiga hasil subdivisi lalu terkandung dalam suatu $\sigma^{-1}(\mathring{U}_j)$; citranya di bawah σ terkandung dalam U_j . Maka semua generator yang muncul dalam $Sd^r(\sigma)$ bersifat $\mathcal{U}$ -kecil. Jika $c = \sum_{\ell=1}^N a_\ell \sigma_\ell$, lakukan konstruksi ini pada setiap σ_ℓ dan ambil maksimum $r_1, \dots, r_N$. Subdivisi tambahan tidak merusak kekecilan, sehingga satu eksponen bersama membuat $Sd^r(c)$ kecil.

Pemeriksaan Penguasaan F4.2 (inti aljabar eksisi). Misalkan $\mathring{A} \cup \mathring{B} = X$ dan $\mathcal{U} = \{A, B\}$.

1. Buktikan bahwa $C_*^{\mathcal{U}}(X) = C_*(A) + C_*(B)$ dan $C_*(A) \cap C_*(B) = C_*(A \cap B)$.
2. Bangun isomorfisma kompleks rantai

$$C_*^{\mathcal{U}}(X)/C_*(A) \cong C_*(B)/C_*(A \cap B).$$

3. Jelaskan, dengan barisan eksak pendek dan lemma lima, mengapa inklusi ke $C_*(X)/C_*(A)$ menginduksi isomorfisma homologi.

Petunjuk. Basis grup rantai singular terdiri atas semua simpleks singular. Bandingkan dua barisan eksak pendek dengan suku kiri $C_*(A)$ dan suku tengah berturut-turut $C_*^{\mathcal{U}}(X)$ dan $C_*(X)$. Gunakan FOM-PR-05 pada pemetaan tengah.

Solusi Pemeriksaan F4.2. Sebuah generator $\mathcal{U}$ -kecil mempunyai citra seluruhnya di A atau seluruhnya di B , sehingga grup yang dibangkitkan semua generator itu tepat $C_*(A) + C_*(B)$. Sebuah simpleks singular menjadi generator baik bagi $C_*(A)$ maupun $C_*(B)$ tepat ketika citranya terkandung dalam $A \cap B$. Karena grup rantai bebas pada basis simpleks singular,

$$C_*(A) \cap C_*(B) = C_*(A \cap B).$$

Pemetaan yang mengirim kelas $b + C_*(A \cap B)$ ke $b + C_*(A)$ terdefinisi baik dan memberi

$$C_*(B)/C_*(A \cap B) \xrightarrow{\cong} (C_*(A) + C_*(B))/C_*(A).$$

Untuk langkah terakhir, pakai diagram

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \rightarrow & C_*(A) & \rightarrow & C_*^{\mathcal{U}}(X) & \rightarrow & C_*^{\mathcal{U}}(X)/C_*(A) & \rightarrow & 0 \\ & & \parallel & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \rightarrow & C_*(A) & \rightarrow & C_*(X) & \rightarrow & C_*(X)/C_*(A) & \rightarrow & 0. \end{array}$$

Diagram barisan eksak panjang dalam homologi yang diinduksi kedua barisan eksak pendek itu komutatif. Pemetaan kiri adalah identitas dan pemetaan tengah menginduksi isomorfisma menurut FOM-PR-05; lemma lima memberi isomorfisma pada suku hasil bagi. Setelah identifikasi di atas, inilah isomorfisma eksisi $H_*(B, A \cap B) \cong H_*(X, A)$.

Pemeriksaan Penguasaan F4.3 (homologi lokal dan dimensi). Untuk $x \in \mathbb{R}^n$, hitung

$$H_k(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n \setminus \{x\})$$

pada setiap $k \geq 0$, termasuk $n = 0$. Lalu tunjukkan bahwa tidak ada homeomorfisma antara dua himpunan terbuka tak kosong di $\mathbb{R}^n$ dan $\mathbb{R}^m$ bila $n \neq m$. Terakhir, jelaskan mengapa syarat “tak kosong” tidak boleh dihapus.

Petunjuk. Untuk $n \geq 1$, gunakan kontraktibilitas $\mathbb{R}^n$ dan $\mathbb{R}^n \setminus \{x\} \simeq S^{n-1}$ dalam barisan eksak panjang pasangan. Untuk $n = 0$, hitung pasangan $(\{x\}, \emptyset)$ langsung. Ingat bahwa himpunan kosong terbuka di setiap ruang Euklides.

Solusi Pemeriksaan F4.3. Untuk $n \geq 1$, barisan eksak panjang dan kontraktibilitas ruang Euklides memberi, untuk $k \geq 1$,

$$H_k(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n \setminus \{x\}) \cong \tilde{H}_{k-1}(S^{n-1}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = n, \\ 0, & k \neq n. \end{cases}$$

Pada $k = 0$, pemetaan $H_0(\mathbb{R}^n \setminus \{x\}) \rightarrow H_0(\mathbb{R}^n)$ surjektif karena komplemen tak kosong dan ruang Euklides terhubung lintasan. Eksakitas memberi $H_0(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n \setminus \{x\}) = 0$, sesuai dengan rumus per kasus.

Pada $n = 0$, $\mathbb{R}^0 = \{x\}$ dan komplemennya kosong, jadi $H_0(\{x\}, \emptyset) \cong \mathbb{Z}$ serta grup derajat lain nol; rumus yang sama tetap berlaku. Jika $U \subseteq \mathbb{R}^n$ dan $V \subseteq \mathbb{R}^m$ terbuka tak kosong serta $f: U \rightarrow V$ homeomorfisma, pilih $x \in U$. Eksisi dan f memberi

$$H_k(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n \setminus \{x\}) \cong H_k(U, U \setminus \{x\}) \cong H_k(V, V \setminus \{f(x)\}) \cong H_k(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^m \setminus \{f(x)\}).$$

Derajat tunggal tempat grup ini $\mathbb{Z}$ harus sama, sehingga $n = m$. Tanpa syarat tak kosong, $U = V = \emptyset$ memberi homeomorfisma untuk setiap pasangan n, m dan membantah kesimpulan.

Pemeriksaan Penguasaan F4.4 (generator sfera dan jumlah baji). Bentuk S^n dari dua simpleks Δ_1^n dan Δ_2^n dengan batas yang diidentifikasi menurut urutan titik sudut.

1. Buktikan bahwa $\sigma_1 - \sigma_2$ merupakan siklus singular.
2. Gunakan pasangan (S^n, Δ_2^n) untuk membuktikan bahwa kelasnya menghasilkan $\tilde{H}_n(S^n)$.
3. Untuk koleksi pasangan baik (X_α, x_α) , tentukan arah yang benar bagi $\bigoplus_\alpha (i_\alpha)_*$ dan jelaskan mengapa pemetaan itu isomorfisma.

Petunjuk. Dua batas berorientasi sama setelah identifikasi, sehingga saling menghapus dalam selisih. Dalam homologi relatif terhadap Δ_2^n , suku σ_2 menjadi nol. Untuk jumlah baji, mulai dari gabungan lepas dan runtuhkan semua titik dasar menjadi satu titik.

Solusi Pemeriksaan F4.4. Identifikasi batas yang mempertahankan urutan titik sudut memberi $\partial\sigma_1 = \partial\sigma_2$, maka

$$\partial(\sigma_1 - \sigma_2) = 0.$$

Karena Δ_2^n kontraktibel, barisan eksak panjang pasangan memberi

$$\tilde{H}_n(S^n) \cong H_n(S^n, \Delta_2^n).$$

Eksisi atau teorema hasil bagi kemudian memberi

$$H_n(S^n, \Delta_2^n) \cong H_n(\Delta_1^n, \partial\Delta_1^n).$$

Di bawah kedua isomorfisma, $[\sigma_1 - \sigma_2]$ dipetakan ke $[\sigma_1]$, yang menghasilkan grup terakhir. Jadi kelas semula menghasilkan $\tilde{H}_n(S^n)$.

Setiap inklusi i_α berarah dari X_α menuju baji; karena itu pemetaan yang bertipe benar adalah

$$\bigoplus_{\alpha} (i_\alpha)_* : \bigoplus_{\alpha} \tilde{H}_k(X_\alpha) \longrightarrow \tilde{H}_k\left(\bigvee_{\alpha} X_\alpha\right).$$

Pasangan gabungan lepas dan himpunan semua titik dasar merupakan pasangan baik. Meruntuhkan titik-titik dasar menghasilkan baji, sedangkan kompleks rantai gabungan lepas terurai sebagai jumlah langsung kompleks rantai komponennya. Jika $j_\alpha : X_\alpha \rightarrow \bigsqcup_{\beta} X_\beta$ adalah inklusi komponen dan q pemetaan hasil bagi menuju baji, maka $q \circ j_\alpha = i_\alpha$. Karena isomorfisma hasil bagi relatif dan dekomposisi menurut komponen bersifat alami, invers dari isomorfisma

$$\tilde{H}_k\left(\bigvee_{\alpha} X_\alpha\right) \cong \bigoplus_{\alpha} \tilde{H}_k(X_\alpha)$$

tepat $\bigoplus_{\alpha} (i_\alpha)_*$. Jadi pemetaan yang ditampilkan pada pernyataan memang isomorfisma.

Pemeriksaan Penguasaan F4.5 (penutup kontraktibel dengan perpotongan tak terhubung). Misalkan $X = \mathring{A} \cup \mathring{B}$, dengan A dan B kontraktibel, sedangkan $A \cap B$ mempunyai tepat $r \geq 1$ komponen lintasan dan tidak mempunyai homologi tereduksi positif. Hitung $\tilde{H}_n(X)$ untuk semua $n \geq 0$.

Petunjuk. Gunakan barisan Mayer–Vietoris tereduksi. Ingat bahwa $\tilde{H}_0(A \cap B) \cong \mathbb{Z}^{r-1}$ dan bahwa X terhubung lintasan karena kedua bagian terhubung serta berpotongan.

Solusi Pemeriksaan F4.5. Karena A dan B kontraktibel, $\tilde{H}_n(A) = \tilde{H}_n(B) = 0$ untuk semua n . Untuk $n \geq 1$, potongan eksak memberi isomorfisma

$$\tilde{H}_n(X) \cong \tilde{H}_{n-1}(A \cap B).$$

Hipotesis pada perpotongan menunjukkan bahwa ruas kanan nol untuk $n \geq 2$ dan bernilai $\mathbb{Z}^{r-1}$ untuk $n = 1$. Karena A dan B terhubung lintasan serta $A \cap B \neq \emptyset$, setiap titik X dapat dihubungkan ke titik perpotongan; jadi X terhubung lintasan dan $\tilde{H}_0(X) = 0$. Dengan demikian,

$$\tilde{H}_n(X) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}^{r-1}, & n = 1, \\ 0, & n \neq 1. \end{cases}$$

Pemeriksaan Penguasaan F4.6 (kealamian pemetaan penghubung). Misalkan $f : (X, A) \rightarrow (Y, B)$ peta pasangan. Jika kelas relatif $[c] \in H_n(X, A)$ diwakili rantai $c \in C_n(X)$ dengan $\partial c \in C_{n-1}(A)$, buktikan langsung dari wakil rantai bahwa

$$\partial'(f_*[c]) = (f|_A)_*(\partial[c]).$$

Petunjuk. Pemetaan penghubung mengirim $[c]$ ke kelas $[\partial c] \in H_{n-1}(A)$. Gunakan identitas pemetaan rantai $\partial f_{\#} = f_{\#} \partial$.

Solusi Pemeriksaan F4.6. Karena f peta pasangan, $f_{\#}(C_*(A)) \subseteq C_*(B)$, sehingga $f_*[c] = [f_{\#}c] \in H_n(Y, B)$ terdefinisi. Definisi pemetaan penghubung untuk pasangan memberi

$$\partial'(f_*[c]) = [\partial f_{\#}c].$$

Karena $f_{\#}$ pemetaan rantai,

$$[\partial f_{\#}c] = [f_{\#}(\partial c)] = (f|_A)_*[\partial c].$$

Di sisi lain, $\partial[c] = [\partial c]$ dalam $H_{n-1}(A)$. Maka

$$\partial' f_*[c] = (f|_A)_*\partial[c],$$

yang membuktikan komutativitas persegi pemetaan penghubung pada tingkat wakil.

Pemeriksaan Penguasaan F4.7 (dukungan hingga dan injektivitas perbandingan). Misalkan z suatu siklus simpleksial berhingga pada kompleks- Δ X , dan andaikan citranya merupakan batas singular, $f(z) = \partial c$. Susun argumen lengkap bahwa z merupakan batas simpleksial, tanpa mengasumsikan X berdimensi hingga.

Petunjuk. Tempatkan dukungan z dan rantai singular berhingga c dalam satu kerangka berdimensi hingga $X^{(m)}$, lalu gunakan isomorfisma perbandingan yang sudah dibuktikan pada kerangka itu.

Solusi Pemeriksaan F4.7. Karena z merupakan jumlah berhingga simpleks, ia termuat dalam $X^{(k)}$ untuk suatu k . Dukungan rantai singular c adalah gabungan berhingga citra simpleks kompak, sehingga kompak. Lemma kekompakan menempatkannya dalam $X^{(m)}$ untuk suatu $m \geq k$. Dengan demikian, persamaan

$$f(z) = \partial c$$

sudah berlaku di kompleks singular $X^{(m)}$. Pemetaan

$$f_*: H_n^{\Delta}(X^{(m)}) \longrightarrow H_n(X^{(m)})$$

adalah isomorfisma karena $X^{(m)}$ berdimensi hingga. Citra kelas $[z]$ di ruas kanan nol, maka injektivitas f_* memberi $[z] = 0$ di ruas kiri. Jadi ada $w \in C_{n+1}^{\Delta}(X^{(m)})$ dengan $\partial w = z$. Rantai w juga merupakan rantai simpleksial di X , sehingga z batas simpleksial dalam X . Ini membuktikan bahwa kernel pemetaan perbandingan global adalah nol.

Batas sumber komponen. Unit ini menerjemahkan `algebraic_topology.tex` baris 1923–2846 secara kontigu, mencakup Bagian 1.7–1.10 tentang eksisi, Mayer–Vietoris, kealamian, serta perbandingan homologi simpleksial dan singular. Unit ini menutup FOM-PR-05 sampai FOM-PR-11 dan menyediakan tujuh soal penguasaan dengan petunjuk serta solusi lengkap. Kursor komponen berikutnya adalah baris 2847, `\subsection{Degree maps}`, awal Bagian 1.11.

Komponen Fomberg O012-FOM-005

Bagian 1.11; dipetakan ke D60-R12 sebagai lapisan derajat opsional.

Tentang komponen ini

Komponen ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas Bagian 1.11 *Algebraic Topology* karya Yeheli Fomberg, berdasarkan kuliah Nir Lazarovich pada musim semi 2025. Otoritas sumber dibekukan pada commit [563194fae879178b9a6871b249513bfc27968975](#). Rentang yang diterjemahkan ialah `algebraic_topology.tex` baris 2847–3122: 276 baris fisik, 12.203 byte setelah normalisasi LF dan satu LF penutup, dengan SHA-256 `9ac1d27872a09134b75bb077ad113716a9e828c2177ac296e7bf3331395da8`.

Catatan sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](#). Terjemahan, pemformatan semantik, koreksi terbatas, perbaikan bukti FOM-PR-12, dan materi penguasaan asli di bawah ini diterbitkan dengan lisensi yang sama. Semua perbaikan

dibedakan dari teks sumber. Tidak ada prosa dari bank soal Fomberg terpisah maupun materi MIT yang disalin ke dalam komponen ini.

Jalur wajib Roberts Unit 30 sudah memuat [definisi derajat](#), [sifat-sifatnya](#), [lema teknis](#), [akibatnya](#), [teorema sfera berbulu](#), dan [buktinya](#). Karena itu, bagian derajat Fomberg dipertahankan sebagai pembandingan opsional; definisi derajat lokal, rumus lokal-ke-global, dan enam pemeriksaan penguasaan memberi lapisan aditif. Rujukan teorema dasar aljabar diarahkan ke [bukti mandiri Roberts](#).

Sumber mengulang satu TikZ-CD besar pada definisi dan bukti derajat lokal. Edisi memecahnya menjadi satu diagram lokal yang dapat direflow dan satu inventaris peta pusat yang bertipe jelas; tidak ada aset raster baru atau informasi matematis yang dibuang.

Edisi ini independen dan tidak menyiratkan dukungan, pengesahan, atau afiliasi dengan Yeheli Fomberg, Nir Lazarovich, ataupun institusi mereka. Produksi terjemahan, struktur semantik, dan QA dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra** atas arahan pengguna.

35 Derajat Pemetaan dan Derajat Lokal

35.1 Derajat pemetaan

Definisi (derajat suatu pemetaan). Misalkan $f: S^n \rightarrow S^n$ kontinu dan $n \geq 0$. Setelah memilih pembangkit orientasi $u \in \tilde{H}_n(S^n; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$, homomorfisma terinduksi

$$f_*: \tilde{H}_n(S^n; \mathbb{Z}) \longrightarrow \tilde{H}_n(S^n; \mathbb{Z})$$

ditentukan oleh satu bilangan bulat k melalui

$$f_*(u) = ku.$$

Bilangan

$$\deg(f) := k$$

disebut **derajat** f .

Koreksi derajat nol. Sumber memakai $H_n(S^n) \cong \mathbb{Z}$ tanpa membatasi n . Pernyataan itu salah pada $n = 0$, sebab $H_0(S^0) \cong \mathbb{Z}^2$. Selain itu, bukti sifat ketiga memakai $H_n(S^n \setminus \{y\}) = 0$, yang juga salah pada $n = 0$ untuk homologi biasa. Edisi memakai homologi tereduksi:

$$\tilde{H}_n(S^n) \cong \mathbb{Z}, \quad \tilde{H}_n(S^n \setminus \{y\}) = 0$$

untuk setiap $n \geq 0$. Pada $n \geq 1$ definisi ini sama dengan definisi sumber. Perbaikan tersebut juga membuat pernyataan berikut dan teorema sfera berbulu berlaku seragam pada S^0 .

Proposisi (sifat-sifat derajat). Untuk pemetaan kontinu $f, g: S^n \rightarrow S^n$, derajat mempunyai sifat-sifat berikut.

1. $\deg(\text{id}) = 1$.
2. $\deg(f \circ g) = \deg(f) \deg(g)$.
3. Jika f tidak surjektif, maka $\deg(f) = 0$.
4. Jika f suatu refleksi sfera yang diinduksi oleh refleksi linear terhadap hiperbidang melalui titik asal, maka $\deg(f) = -1$.

5. Untuk peta antipodal $a: S^n \rightarrow S^n$, $a(x) = -x$,

$$\deg(a) = \deg(-\text{id}) = (-1)^{n+1}.$$

6. Jika f suatu homeomorfisma, maka $\deg(f) = \pm 1$.

7. Jika $f \simeq g$, maka $\deg(f) = \deg(g)$.

8. Jika f tidak mempunyai titik tetap, maka

$$\deg(f) = (-1)^{n+1}.$$

9. Misalkan n genap dan sebuah grup G beraksi bebas pada S^n , yakni

$$g \cdot x = x \implies g = 1_G.$$

Maka $G \cong 1$ atau $G \cong \mathbb{Z}_2$.

Bukti.

1. Karena $(\text{id})_* = \text{id}_{\mathbb{Z}}$, derajat identitas adalah 1.

2. Fungtorialitas memberi

$$(f \circ g)_* = f_* \circ g_*.$$

Jika $g_*(u) = du$ dan $f_*(u) = eu$, maka $(f \circ g)_*(u) = deu$. Jadi $\deg(f \circ g) = \deg(f) \deg(g)$.

3. Jika f tidak surjektif, pilih $y \notin f(S^n)$. Pemetaan f memfaktor sebagai

$$S^n \xrightarrow{\bar{f}} S^n \setminus \{y\} \xrightarrow{i} S^n,$$

dengan i pemetaan inklusi. Karena $\tilde{H}_n(S^n \setminus \{y\}) = 0$, pemetaan terinduksi f_* nol. Maka $\deg(f) = 0$.

4. Realisasikan S^n sebagai dua simpleks berorientasi Δ_1^n dan Δ_2^n yang direkatkan sepanjang batasnya dengan orientasi muka yang sama. Pembangkit homologi puncaknya ialah

$$[\Delta_1^n - \Delta_2^n] \in \tilde{H}_n(S^n) \cong \mathbb{Z}.$$

Refleksi menukar kedua simpleks. Karena itu

$$f_*[\Delta_1^n - \Delta_2^n] = [\Delta_2^n - \Delta_1^n] = -[\Delta_1^n - \Delta_2^n],$$

sehingga $\deg(f) = -1$.

5. Peta antipodal

$$(x_1, x_2, \dots, x_{n+1}) \longmapsto (-x_1, -x_2, \dots, -x_{n+1})$$

adalah komposisi $n + 1$ refleksi koordinat. Menurut butir 2 dan 4,

$$\deg(-\text{id}) = (-1)^{n+1}.$$

6. Argumen yang sama berlaku lebih umum bagi ekuivalensi homotopi. Dengan memakai invariansi homotopi pada butir 7, jika g invers homotopi bagi f , maka $f \circ g \simeq \text{id}$ dan

$$1 = \deg(\text{id}) = \deg(f \circ g) = \deg(f) \deg(g).$$

Dua bilangan bulat yang hasil kalinya 1 masing-masing bernilai ± 1 . Khususnya, homeomorfisma mempunyai derajat ± 1 .

7. Jika $f \simeq g$, invariansi homotopi homologi memberi $f_* = g_*$. Maka $\deg(f) = \deg(g)$.
8. Andaikan f tidak mempunyai titik tetap. Pemetaan

$$H(x, t) = \frac{tf(x) + (1-t)(-x)}{\|tf(x) + (1-t)(-x)\|}$$

terdefinisi untuk $x \in S^n$ dan $t \in [0, 1]$. Memang, ruas penyebut tidak pernah nol: secara geometris, jika $f(x) \neq x$, ruas garis yang menghubungkan $f(x)$ dan $-x$ tidak melalui titik asal. Nilai ujungnya adalah

$$H(x, 0) = -x, \quad H(x, 1) = f(x).$$

Jadi f homotop dengan peta antipodal. Butir 5 dan 7 memberi

$$\deg(f) = (-1)^{n+1}.$$

9. Aksi G pada S^n merupakan homomorfisma dari G ke grup homeomorfisma S^n . Tulis juga g untuk homeomorfisma yang diberikan oleh suatu elemen grup. Menurut butir 6,

$$\deg: G \longrightarrow \{+1, -1\}, \quad g \longmapsto \deg(g),$$

terdefinisi, dan butir 2 menunjukkan bahwa ia homomorfisma. Karena aksinya bebas, setiap $g \neq 1_G$ tidak mempunyai titik tetap. Untuk n genap, butir 8 karena itu memberi $\deg(g) = (-1)^{n+1} = -1$. Dengan demikian

$$\ker(\deg) = \{1_G\},$$

sehingga $\deg$ injektif. Jadi G isomorfik dengan suatu subgrup dari $\{+1, -1\} \cong \mathbb{Z}_2$, dan akibatnya $G \cong 1$ atau $G \cong \mathbb{Z}_2$. $\square$

Penanda gambar sumber yang belum diwujudkan. Komentar `%drawing` pada baris 2911 tidak menunjuk berkas gambar atau kode gambar apa pun dalam sumber. Edisi tidak mengarang aset pengganti: rumus homotopi, pemeriksaan bahwa penyebutnya tidak nol, dan uraian geometris tentang ruas garis dipertahankan secara lengkap sehingga argumennya dapat dibaca tanpa gambar.

Koreksi konstruksi sfera. Sumber menulis $S^n = \Delta_1 \sqcup \Delta_2$, seolah-olah sfera merupakan gabungan saling lepas dua simpleks. Argumen pembangkit yang dipakai sebenarnya memerlukan kedua batas simpleks direkatkan. Edisi menyatakan perekatan itu secara eksplisit dan mempertahankan pembangkit $[\Delta_1^n - \Delta_2^n]$ yang dimaksud.

Koreksi tipe kesimpulan aksi. Sumber menyimpulkan $G \subset \mathbb{Z}_2$. Tanpa suatu identifikasi literal yang telah dipilih, kesimpulan yang bertipe benar ialah

$$G \cong \text{im}(\deg) \leq \{+1, -1\} \cong \mathbb{Z}_2.$$

Inilah kesimpulan yang digunakan di atas. Sumber juga berganti tanpa penjelasan dari S^n ke simbol X pada baris 2923; edisi mempertahankan sfera S^n yang benar-benar sedang dikenai aksi.

Catatan (teorema dasar aljabar). Sifat 3 dapat dipakai untuk membuktikan teorema dasar aljabar. Sumber merujuk pembuktiannya ke bank soal terpisah; bank soal itu tidak termasuk komponen yang dipilih dan buktinya tidak disalin ke dalam edisi ini. Pembaca dapat memakai [bukti mandiri yang sudah tersedia dalam Roberts Unit 30](#); tautan tersebut mengarah ke materi asli edisi yang sah, bukan ke bank soal Fomberg.

Catatan (teorema Hopf). Untuk $n \geq 1$, kebalikan sifat 7 juga benar: dua pemetaan $f, g: S^n \rightarrow S^n$ homotop jika dan hanya jika $\deg(f) = \deg(g)$. Hasil ini disebut teorema Hopf, tetapi sumber tidak membuktikannya.

Koreksi rentang teorema Hopf. Sumber tidak menyatakan syarat $n \geq 1$. Pada S^0 , dua pemetaan konstan menuju dua titik yang berbeda sama-sama berderajat nol pada $\tilde{H}_0(S^0)$, tetapi tidak homotop karena tidak ada lintasan di S^0 yang menghubungkan kedua nilai tersebut. Edisi karena itu menyatakan kebalikan sifat 7 hanya pada rentang yang sah.

35.2 Teorema sfera berbulu

Teorema (teorema sfera berbulu). Untuk setiap $n \geq 0$, terdapat medan vektor tangen kontinu yang tidak pernah nol pada S^n jika dan hanya jika n ganjil. Secara ekuivalen, medan semacam itu tidak ada jika dan hanya jika n genap.

Bukti. Andaikan

$$v: S^n \longrightarrow \mathbb{R}^{n+1}$$

suatu medan vektor tangen kontinu yang tidak pernah nol; jadi $v(x)$ tangen pada S^n di x . Kita akan menunjukkan bahwa n harus ganjil. Karena $v(x) \neq 0$ untuk setiap x , ganti $v(x)$ dengan $v(x)/\|v(x)\|$ sehingga

$$\|v(x)\| = 1$$

untuk setiap x . Vektor x dan $v(x)$ ortogonal. Seperti $\cos t + i \sin t$ yang terletak pada lingkaran satuan di bidang kompleks, vektor

$$(\cos t)x + (\sin t)v(x)$$

terletak pada lingkaran satuan di bidang yang direntang oleh x dan $v(x)$. Secara eksplisit, tangensi memberi $x \cdot v(x) = 0$, sehingga

$$\begin{aligned} \|(\cos t)x + (\sin t)v(x)\|^2 &= \cos^2 t \|x\|^2 + \sin^2 t \|v(x)\|^2 + 2 \cos t \sin t x \cdot v(x) \\ &= \cos^2 t + \sin^2 t = 1. \end{aligned}$$

Karena itu,

$$H: S^n \times [0, 1] \longrightarrow S^n, \quad H(x, t) = \cos(\pi t)x + \sin(\pi t)v(x),$$

merupakan homotopi dari pemetaan identitas ke peta antipodal. Maka

$$1 = \deg(\text{id}) = \deg(-\text{id}) = (-1)^{n+1}.$$

Jadi n harus ganjil.

Sebaliknya, andaikan n ganjil. Tuliskan $n = 2k - 1$ untuk suatu $k \geq 1$. Definisikan

$$v(x_1, x_2, \dots, x_{2k-1}, x_{2k}) = (-x_2, x_1, \dots, -x_{2k}, x_{2k-1}).$$

Rumus ini merupakan pembatasan pada S^{2k-1} dari suatu transformasi linear $\mathbb{R}^{2k} \rightarrow \mathbb{R}^{2k}$, sehingga v kontinu. Untuk setiap $x \in S^{2k-1}$,

$$\begin{aligned} x \cdot v(x) &= \sum_{j=1}^k (x_{2j-1}(-x_{2j}) + x_{2j}x_{2j-1}) = 0, \\ \|v(x)\|^2 &= \sum_{j=1}^k (x_{2j}^2 + x_{2j-1}^2) = \|x\|^2 = 1. \end{aligned}$$

Persamaan pertama membuktikan tangensi, sedangkan persamaan kedua membuktikan bahwa $v(x)$ tidak pernah nol. Jadi v merupakan medan vektor tangen kontinu yang tidak pernah nol. Ini menyelesaikan pembuktian. $\square$

Normalisasi tipografi dan simbol sumber. Edisi memperbaiki lima cacat deterministik tanpa mengubah isi: *orientatoin* menjadi *orientation* pada baris 2889, *homomoprhism* menjadi *homomorphism* pada baris 2922, simbol tak terikat X menjadi sfera S^n yang sedang dibahas pada baris 2923, frasa yang kehilangan kata kerja pada baris 2966, dan susunan “is a evidently” pada baris 2980.

35.3 Derajat lokal

Derajat homologis yang dinotasikan $\deg$ pada komponen Fomberg ini menyatakan bilangan yang sama dengan **derajat kohomologis** Deg pada Roberts Unit 30. [Pemeriksaan F5.1](#) di bawah membuktikan kesamaan itu melalui kealamian pasangan Kronecker dan pembangkit orientasi yang kompatibel.

Definisi (derajat lokal). Misalkan $n \geq 1$, $f: S^n \rightarrow S^n$ pemetaan kontinu, dan pilih $y \in S^n$ dengan prabayangan hingga

$$f^{-1}(y) = \{x_1, \dots, x_m\}.$$

Pilih lingkungan terbuka V dari y dan lingkungan terbuka saling lepas $U_1, \dots, U_m$ dari titik-titik x_i sedemikian sehingga

$$f(U_i) \subseteq V, \quad f(U_i \setminus \{x_i\}) \subseteq V \setminus \{y\}$$

untuk setiap $1 \leq i \leq m$. Pembatasan $f|_{U_i}$ merupakan peta pasangan

$$(U_i, U_i \setminus \{x_i\}) \longrightarrow (V, V \setminus \{y\}).$$

Eksisi memberi isomorfisma vertikal dalam diagram komutatif berikut. Panah bawah λ_i adalah pemetaan homologi lokal yang diperoleh dengan mengangkut $(f|_{U_i})_*$ melalui kedua isomorfisma itu:

$$\begin{array}{ccc} H_n(U_i, U_i \setminus \{x_i\}) & \xrightarrow{(f|_{U_i})_*} & H_n(V, V \setminus \{y\}) \\ \downarrow \cong & & \downarrow \cong \\ H_n(S^n, S^n \setminus \{x_i\}) & \xrightarrow{\lambda_i} & H_n(S^n, S^n \setminus \{y\}). \end{array}$$

Diagram semantik. Grup kiri-atas adalah homologi lokal pada x_i yang dihitung di lingkungan U_i ; grup kanan-atas adalah homologi lokal pada y yang dihitung di V . Inklusi kedua lingkungan ke S^n memberi kedua isomorfisma eksisi. Panah mendatar atas diinduksi oleh $f|_{U_i}$; panah mendatar bawah ialah pemetaan yang sama setelah identifikasi eksisi. Komutativitas menyatakan bahwa hasilnya tidak bergantung pada apakah homologi lokal dihitung di lingkungan kecil atau di seluruh sfera. Panah λ_i bukan peta pasangan global yang secara keliru membuang prabayangan lain; ia didefinisikan dari pembatasan lokal di atas.

Orientasi standar S^n menentukan pembangkit lokal yang kompatibel, sehingga keempat grup itu dapat diidentifikasi dengan $\mathbb{Z}$. Pemetaan λ_i kemudian berbentuk $1 \mapsto d_i$ untuk suatu $d_i \in \mathbb{Z}$. **Derajat lokal f di x_i** , relatif terhadap nilai y , adalah

$$\deg_{x_i}(f) := d_i.$$

Kebebasan dari pilihan lingkungan. Ambil dua pilihan yang memenuhi syarat, yakni (V, U_i) dan (V', U'_i) . Pilih lingkungan terbuka $W \subseteq V \cap V'$ dari y . Untuk setiap i , kontinuitas f dan fakta bahwa x_i adalah satu-satunya titik serat di lingkungan yang cukup kecil memungkinkan kita memilih bola koordinat terbuka W_i dengan

$$x_i \in W_i \subseteq U_i \cap U'_i \cap f^{-1}(W).$$

Pembatasan $f|_{W_i}$ adalah peta pasangan menuju $(W, W \setminus \{y\})$. Inklusi $W_i \hookrightarrow U_i$ dan $W \hookrightarrow V$ memberi persegi alami

$$\begin{array}{ccc} H_n(W_i, W_i \setminus \{x_i\}) & \xrightarrow{(f|_{W_i})^*} & H_n(W, W \setminus \{y\}) \\ \downarrow \cong & & \downarrow \cong \\ H_n(U_i, U_i \setminus \{x_i\}) & \xrightarrow{(f|_{U_i})^*} & H_n(V, V \setminus \{y\}), \end{array}$$

dan ada persegi yang sama untuk pilihan beraksen. Semua panah vertikal ialah isomorfisma eksisi. Setelah keempat grup diangkut ke grup homologi lokal global, kealamian kedua persegi menunjukkan bahwa kedua pilihan menghasilkan homomorfisma λ_i yang sama. Pembangkit orientasi pada lingkungan kecil adalah pembatasan pembangkit orientasi sfera, sehingga bilangan bulat $d_i = \deg_{x_i}(f)$ juga sama. Jadi derajat lokal terdefinisi dengan baik. $\square$

Koreksi notasi, indeks, dan tipe pemetaan. Baris 2987 sumber menulis $f(y)^{-1}$, padahal himpunan yang diperlukan adalah $f^{-1}(y)$. Baris 2991 memakai batas indeks $i \leq n$, yang tidak cocok dengan pencacahan $x_1, \dots, x_m$; edisi memakai $i \leq m$. Sumber juga menyebut V sebagai “citra semua lingkungan” tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa V merupakan lingkungan y , lalu menulis pembatasan bertipe tidak jelas $(f|_{U_i})|_{W_i}$. Edisi memilih V dan U_i secara eksplisit sehingga $f|_{U_i}$ benar-benar merupakan peta pasangan di atas. Terakhir, tanda derajat lokal memerlukan pembangkit orientasi yang kompatibel; syarat ini dibuat eksplisit. Struktur homologi dan nilai bilangan bulat yang dimaksud sumber tidak diubah.

Koreksi rentang dimensi. Sumber tidak memberi syarat pada n , padahal untuk $n = 0$ panah $H_0(S^0) \rightarrow H_0(S^0, S^0 \setminus \{x\})$ yang dipakai pada bagian bawah diagram bukan isomorfisma. Edisi karena itu membatasi definisi lokal dan rumus lokal-ke-global di bawah pada $n \geq 1$. Definisi derajat global sebelumnya tetap mencakup $n = 0$ dengan homologi tereduksi; edisi tidak mengklaim varian derajat lokal tereduksi pada dimensi nol.

Langkah formal yang tidak tersedia dalam sumber. Agar tanda derajat lokal dan rumus jumlah berikutnya terdefinisi, pemilihan lingkungan harus memberi peta pasangan yang sah, isomorfisma eksisi harus diikat ke orientasi sfera, kebebasan dari pilihan lingkungan harus dibuktikan, dan

pembangkit global harus diselaraskan dengan semua pembangkit lokal. Definisi di atas, suplemen kebebasan pilihan, dan bukti di bawah menyediakan penutupan FOM-PR-12 secara eksplisit.

Catatan. Misalkan $f: S^n \rightarrow S^n$ homeomorfisma. Untuk setiap $x \in S^n$, ambil $y = f(x)$. Karena $f^{-1}(y) = \{x\}$ dan semua pemetaan pada diagram derajat lokal adalah isomorfisma,

$$\deg_x(f) = \pm 1.$$

Lebih umum, jika setiap pembatasan $f|_{U_i}: U_i \rightarrow V$ merupakan homeomorfisma, maka $\deg_{x_i}(f) = \pm 1$. Tanda positif berarti orientasi lokal dipertahankan, sedangkan tanda negatif berarti orientasi lokal dibalik. Proposisi berikut menjelaskan bagaimana bilangan-bilangan lokal ini menentukan derajat global.

Proposisi (rumus derajat lokal-ke-global). Misalkan $n \geq 1$, $f: S^n \rightarrow S^n$ kontinu, dan $y \in S^n$ mempunyai prabayangan hingga $f^{-1}(y) = \{x_1, \dots, x_m\}$. Maka

$$\deg(f) = \sum_{i=1}^m \deg_{x_i}(f).$$

Koreksi operator pada rumus. Baris 3040 sumber menulis $\sum_i \text{del}(f|_{x_i})$ —makro `\del` hanya membentuk tanda kurung dan bukan operator derajat. Edisi menampilkan operator yang bertipe benar, yaitu $\deg_{x_i}(f)$.

Bukti. Selain grup-grup lokal pada definisi, pertimbangkan grup relatif

$$H_n(S^n, S^n \setminus f^{-1}(y)).$$

Eksisi pada lingkungan saling lepas $U_1, \dots, U_m$ memberi dekomposisi

$$H_n(S^n, S^n \setminus f^{-1}(y)) \cong \bigoplus_{i=1}^m H_n(U_i, U_i \setminus \{x_i\}) \cong \mathbb{Z}^m.$$

Untuk mencatat seluruh jaringan pemetaan pada dua diagram sumber, tuliskan ι_i untuk inklusi suku ke- i , p_i untuk proyeksi ke suku ke- i , dan

$$M = H_n(S^n, S^n \setminus f^{-1}(y)), \quad L_i = H_n(S^n, S^n \setminus \{x_i\}), \quad L_y = H_n(S^n, S^n \setminus \{y\}).$$

Pemetaan-pemetaan relatifnya adalah

$$\iota_i: H_n(U_i, U_i \setminus \{x_i\}) \longrightarrow M, \quad p_i: M \longrightarrow L_i, \quad F_*: M \longrightarrow L_y,$$

dengan F_* diinduksi oleh peta pasangan

$$f: (S^n, S^n \setminus f^{-1}(y)) \longrightarrow (S^n, S^n \setminus \{y\}).$$

Isomorfisma eksisi mengidentifikasi domain ι_i dengan L_i dan grup lokal di V dengan L_y ; di bawah identifikasi itu,

$$p_i \circ \iota_i = \text{id}, \quad p_i \circ \iota_j = 0 \quad (j \neq i), \quad F_* \circ \iota_i = \lambda_i.$$

Pemetaan hasil bagi pada tingkat rantai menginduksi

$$j: H_n(S^n) \longrightarrow H_n(S^n, S^n \setminus f^{-1}(y)).$$

Tuliskan pula $q_i: H_n(S^n) \rightarrow L_i$ dan $q_y: H_n(S^n) \rightarrow L_y$ untuk pemetaan hasil bagi. Karena $n \geq 1$, keduanya isomorfisma. Dua hubungan komutatif yang mengikat baris absolut dan relatif pada diagram sumber adalah

$$p_i \circ j = q_i, \quad F_* \circ j = q_y \circ f_*.$$

Jika $1 \in H_n(S^n) \cong \mathbb{Z}$ adalah kelas fundamental yang berorientasi, komutativitas dengan setiap proyeksi memberi

$$(p_i \circ j)(1) = 1.$$

Karena itu, di bawah dekomposisi jumlah langsung,

$$j(1) = (1, \dots, 1) = \sum_{i=1}^m \iota_i(1).$$

Menurut definisi derajat lokal, pemetaan terinduksi F_* mengirim $\iota_i(1)$ ke $\deg_{x_i}(f)$ kali pembangkit lokal di y . Jadi ia mengirim $j(1)$ ke

$$\sum_{i=1}^m \deg_{x_i}(f).$$

Di sisi lain, komutativitas dengan pemetaan $H_n(S^n) \xrightarrow{f_*} H_n(S^n)$ menunjukkan bahwa citra yang sama adalah $\deg(f)$ kali pembangkit tersebut. Maka

$$\deg(f) = \sum_{i=1}^m \deg_{x_i}(f),$$

seperti yang dikehendaki. $\square$

Koreksi notasi dalam bukti. Diagram sumber memakai huruf k_i sekaligus untuk inklusi suku lokal dan untuk bilangan derajat lokal. Edisi memakai ι_i untuk inklusi dan d_i untuk bilangan, lalu menyatakan dekomposisi lebih dahulu agar domain dan kodomain setiap pemetaan terbaca. Baris 3073 mengulang makro pembatas `\del` seolah-olah ia operator derajat; edisi menggantinya dengan $\deg_{x_i}(f)$. Argumen komutativitas sumber dipertahankan. Sumber menggambar ulang jaringan yang sama pada baris 3044–3058; edisi menampilkan persegi lokal sekali lalu mencatat secara eksplisit pemetaan pusat M , ι_i , p_i , j , q_i , q_y , dan F_* beserta identitas komutatifnya dalam bukti. Dengan demikian, kedua kemunculan sumber dipertahankan secara semantik tanpa menduplikasi permukaan visual yang identik.

Contoh (pemetaan pangkat pada lingkaran). Untuk $k \in \mathbb{Z}$, definisikan

$$f_k: S^1 \longrightarrow S^1, \quad f_k(z) = z^k.$$

Siklus singular

$$\gamma(t) = e^{2\pi it}, \quad 0 \leq t \leq 1,$$

mewakili pembangkit $H_1(S^1)$. Komposisi $f_k \circ \gamma$ melintasi lingkaran sebanyak k kali dengan tanda, sehingga perhitungan global sudah memberi $\deg(f_k) = k$. Kita sekarang memperoleh hasil yang sama dari derajat lokal.

Jika $k = 0$, maka $f_0(z) = z^0 = 1$ adalah pemetaan konstan, sehingga $\deg(f_0) = 0$.

Sekarang andaikan $k > 0$ dan pilih $y = 1$. Prabayangannya ialah

$$f_k^{-1}(1) = \{x_1, \dots, x_k\}, \quad x_j = e^{2\pi i j/k}, \quad 1 \leq j \leq k.$$

Ambil busur terbuka kecil V yang memuat 1. Untuk setiap j , komponen U_j dari $f_k^{-1}(V)$ yang memuat x_j dipetakan secara homeomorfik dan mempertahankan orientasi ke V : dalam koordinat sudut, pemetaan itu mengalikan perubahan sudut dengan $k > 0$. Oleh karena itu

$$\deg_{x_j}(f_k) = 1$$

untuk setiap j . Rumus lokal-ke-global memberi

$$\deg(f_k) = \sum_{j=1}^k \deg_{x_j}(f_k) = k.$$

Pemetaan $f_{-1}(z) = z^{-1} = \bar{z}$ adalah refleksi, sehingga $\deg(f_{-1}) = -1$. Jika $k < 0$, maka $-k > 0$ dan

$$f_k = f_{-1} \circ f_{-k}.$$

Multiplikativitas bersama kasus positif memberi

$$\deg(f_k) = \deg(f_{-1}) \deg(f_{-k}) = (-1)(-k) = k.$$

Jadi $\deg(f_k) = k$ untuk setiap $k \in \mathbb{Z}$.

Koreksi kasus nol, kasus negatif, dan lingkungan lokal. Baris 3083 sumber menulis $z \mapsto 0$, yang tidak bernilai di S^1 ; pemetaan pangkat nol yang benar ialah $z \mapsto 1$. Baris 3087 menyatakan $f_k = f_{-1} \circ f_k$, yang tidak benar; untuk $k < 0$ faktorisasi yang benar ialah $f_k = f_{-1} \circ f_{-k}$. Baris 3093 memilih $V = S^1 \setminus \{1\}$, padahal nilai terpilih $y = 1$ harus berada di dalam V . Edisi memakai busur kecil di sekitar 1 dan komponen-komponen prabayangannya. Penalaran “peregangan homotop dengan identitas” sumber diganti dengan koordinat sudut lokal, karena peregangan interval bukan pemetaan global $S^1 \rightarrow S^1$ yang derajatnya dapat langsung dikalikan. Baris 3079–3081 menyebut pemetaan identitas sebagai simpleks singular; edisi memakai siklus singular $\gamma(t) = e^{2\pi i t}$ yang benar-benar mewakili kelas fundamental.

Catatan (kontribusi lokal bertanda). Identifikasikan $S^1 = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$. Ambil fungsi kontinu $F: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ yang afin pada masing-masing selang $[0, \frac{1}{3}]$, $[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}]$, dan $[\frac{2}{3}, 1]$, dengan kenaikan berturut-turut 1, 2, dan -4 . Nilai ujung setiap potongan sama dengan nilai awal potongan berikutnya. Karena $F(1) - F(0) = 1 + 2 - 4 = -1 \in \mathbb{Z}$, proyeksi $f([t]) = [F(t)]$ memberi pemetaan kontinu $S^1 \rightarrow S^1$.

Untuk nilai sasaran yang bukan citra titik-titik sambung domain, seratnya hingga dan setiap prabayangan terletak pada bagian yang merupakan homeomorfisma lokal. Potongan pertama memberi satu kontribusi positif, potongan kedua memberi dua kontribusi positif, dan potongan ketiga memberi empat kontribusi negatif. Jadi jumlah kontribusi derajat lokalnya adalah

$$\deg(f) = 1 + 2 - 4 = -1.$$

Contoh ini memperlihatkan bahwa derajat global menghitung prabayangan dengan tanda orientasi, bukan sekadar banyaknya prabayangan.

35.4 Pemeriksaan penguasaan

Enam pemeriksaan berikut membentuk lapisan penguasaan asli edisi. Setiap soal mempunyai petunjuk dan solusi lengkap; soal-soal ini tidak berasal dari bank soal Fomberg yang tidak dipilih.

Pemeriksaan Penguasaan F5.1 (menyamakan dua definisi derajat). Pilih pembangkit

$$u \in \tilde{H}_n(S^n; \mathbb{Z})$$

dan pembangkit dual

$$\alpha \in \tilde{H}^n(S^n; \mathbb{Z})$$

dengan pasangan Kronecker $\langle \alpha, u \rangle = 1$. Jika

$$f_*(u) = d_h u, \quad f^*(\alpha) = d_c \alpha,$$

kerjakan hal-hal berikut.

1. Gunakan kealamian pasangan Kronecker untuk membuktikan $d_h = d_c$.
2. Jelaskan mengapa mengganti pilihan orientasi u dengan $-u$ tidak mengubah bilangan derajat.
3. Simpulkan bahwa definisi derajat melalui homologi pada bagian Fomberg ini sama dengan definisi melalui kohomologi tereduksi pada Roberts Unit 30.

Petunjuk. Hitung kedua ruas identitas

$$\langle f^* \alpha, u \rangle = \langle \alpha, f_* u \rangle.$$

Jika orientasi dibalik, balikkan juga pembangkit dual agar nilai pasangannya tetap 1.

Solusi Pemeriksaan F5.1. Kealamian pasangan Kronecker memberi

$$\begin{aligned} \langle f^* \alpha, u \rangle &= \langle d_c \alpha, u \rangle = d_c, \\ \langle \alpha, f_* u \rangle &= \langle \alpha, d_h u \rangle = d_h. \end{aligned}$$

Kedua ruas sama, sehingga $d_c = d_h$. Jika $u' = -u$, maka

$$f_*(u') = f_*(-u) = -d_h u = d_h u'.$$

Jadi koefisien homologi tetap d_h . Pembangkit kohomologi dual yang berpasangan dengan u' ialah $\alpha' = -\alpha$, dan perhitungan yang sama menunjukkan koefisien kohomologinya tetap d_c . Dengan demikian, kedua konstruksi menghasilkan bilangan bulat yang sama dan tidak bergantung pada pembalikan pilihan orientasi bersama. Definisi Fomberg dan Roberts karenanya kompatibel.

Pemeriksaan Penguasaan F5.2 (derajat sebagai kriteria titik tetap). Misalkan $f: S^n \rightarrow S^n$ kontinu.

1. Buktikan bahwa

$$tf(x) + (1-t)(-x) = 0$$

untuk suatu $x \in S^n$ dan $t \in [0, 1]$ jika dan hanya jika $t = \frac{1}{2}$ dan $f(x) = x$.

2. Turunkan bahwa

$$\deg(f) \neq (-1)^{n+1} \implies f \text{ mempunyai titik tetap.}$$

3. Buktikan sebagai akibat bahwa setiap pemetaan-diri kontinu $S^n \rightarrow S^n$ yang tidak surjektif mempunyai titik tetap.

Petunjuk. Ambil norma pada persamaan di butir pertama. Untuk butir kedua, gunakan kontraposisi sifat 8. Untuk butir ketiga, gabungkan sifat 3 dengan fakta bahwa $0 \neq (-1)^{n+1}$.

Solusi Pemeriksaan F5.2. Jika $tf(x) + (1-t)(-x) = 0$, maka

$$tf(x) = (1-t)x.$$

Karena $\|f(x)\| = \|x\| = 1$, mengambil norma memberi $t = 1-t$, jadi $t = \frac{1}{2}$. Substitusi kembali menghasilkan $f(x) = x$. Sebaliknya, jika $t = \frac{1}{2}$ dan $f(x) = x$, kedua suku jelas saling menghapus.

Karena itu, bila f tidak mempunyai titik tetap, penyebut pada homotopi

$$H(x, t) = \frac{tf(x) + (1-t)(-x)}{\|tf(x) + (1-t)(-x)\|}$$

tidak pernah nol. Homotopi tersebut menghubungkan peta antipodal dengan f , sehingga

$$\deg(f) = \deg(-\text{id}) = (-1)^{n+1}.$$

Kontraposisinya memberi kriteria titik tetap pada pernyataan. Jika f tidak surjektif, sifat 3 memberi $\deg(f) = 0$. Karena $0 \neq (-1)^{n+1}$, kriteria tadi menjamin bahwa f mempunyai titik tetap.

Pemeriksaan Penguasaan F5.3 (aksi bebas pada sfera genap). Misalkan n genap dan G beraksi bebas pada S^n .

1. Tunjukkan bahwa elemen identitas berderajat $+1$, sedangkan setiap elemen nonidentitas berderajat -1 .
2. Jika $a, b \in G$ adalah dua elemen nonidentitas yang berbeda, terapkan derajat pada $a^{-1}b$ untuk memperoleh kontradiksi.
3. Simpulkan bahwa G trivial atau $G \cong \mathbb{Z}_2$.
4. Tunjukkan bahwa kesimpulan ini khusus bagi dimensi genap dengan memberi, untuk setiap $m \geq 3$, aksi bebas grup siklik C_m pada S^1 .

Petunjuk. Aksi bebas membuat setiap elemen nonidentitas menjadi homeomorfisma tanpa titik tetap. Untuk butir kedua, perhatikan bahwa $a^{-1}b \neq 1_G$ tetapi

$$\deg(a^{-1}b) = \deg(a)^{-1} \deg(b).$$

Pada $S^1 \subset \mathbb{C}$, gunakan perkalian oleh akar kesatuan $e^{2\pi i/m}$.

Solusi Pemeriksaan F5.3. Elemen identitas bertindak sebagai id_{S^n} dan berderajat $+1$. Jika $g \neq 1_G$, kebebasan aksi menyatakan bahwa g tidak mempunyai titik tetap. Karena n genap, sifat 8 memberi

$$\deg(g) = (-1)^{n+1} = -1.$$

Andaikan ada dua elemen nonidentitas berbeda a dan b . Elemen $a^{-1}b$ nonidentitas, sehingga menurut kesimpulan tadi harus berderajat -1 . Namun,

$$\deg(a^{-1}b) = \deg(a^{-1}) \deg(b) = \deg(a)^{-1} \deg(b) = (-1)^{-1}(-1) = 1,$$

kontradiksi. Jadi G mempunyai paling banyak satu elemen nonidentitas. Akibatnya G trivial atau mempunyai tepat dua elemen, sehingga $G \cong \mathbb{Z}_2$.

Untuk melihat bahwa paritas penting, identifikasikan $S^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$. Grup C_m bertindak melalui

$$[j] \cdot z = e^{2\pi i j/m} z.$$

Jika $[j] \cdot z = z$, maka $e^{2\pi i j/m} = 1$, sehingga $[j] = [0]$ dalam C_m . Jadi aksi itu bebas. Untuk setiap $m \geq 3$, grup ini bukan trivial dan bukan $\mathbb{Z}_2$, sehingga kesimpulan sfera genap memang tidak meluas ke S^1 .

Pemeriksaan Penguasaan F5.4 (menghitung dengan tanda lokal). Misalkan $n \geq 1$, $f: S^n \rightarrow S^n$, dan suatu $y \in S^n$ mempunyai lima prabayangan. Pada tiga di antaranya f merupakan homeomorfisma lokal yang mempertahankan orientasi, sedangkan pada dua lainnya ia membalik orientasi.

1. Hitung $\deg(f)$.
2. Jelaskan mengapa f harus surjektif.
3. Dapatkah f menjadi homeomorfisma global?

Petunjuk. Homeomorfisma lokal yang mempertahankan orientasi menyumbang $+1$ dan yang membalik orientasi menyumbang -1 . Gunakan sifat bahwa pemetaan yang tidak surjektif berderajat nol.

Solusi Pemeriksaan F5.4. Rumus lokal-ke-global memberi

$$\deg(f) = 3(+1) + 2(-1) = 1.$$

Karena derajatnya tidak nol, f tidak mungkin gagal surjektif; jadi f surjektif. Namun f bukan homeomorfisma global: titik y mempunyai lima prabayangan berbeda, sedangkan homeomorfisma harus injektif dan karena itu mempunyai tepat satu prabayangan bagi setiap titik.

Pemeriksaan Penguasaan F5.5 (semua pangkat bilangan bulat). Untuk $f_k(z) = z^k$ pada S^1 :

1. hitung derajat lokal pada setiap prabayangan 1 ketika $k > 0$;
2. tangani $k = 0$ tanpa menulis nilai di luar S^1 ;
3. gunakan $f_{-1}(z) = \bar{z}$ untuk menurunkan jawaban ketika $k < 0$.

Petunjuk. Untuk $k > 0$, gunakan koordinat sudut pada busur kecil di sekitar setiap akar ke- k dari 1. Untuk $k < 0$, faktorkan melalui pangkat positif $-k$.

Solusi Pemeriksaan F5.5. Jika $k > 0$, terdapat k prabayangan 1. Dalam koordinat sudut lokal, $\theta \mapsto k\theta$ mempertahankan orientasi, sehingga setiap derajat lokal bernilai $+1$ dan $\deg(f_k) = k$. Untuk $k = 0$, $f_0(z) = 1$ adalah pemetaan konstan, maka $\deg(f_0) = 0$. Jika $k < 0$, tulis

$$f_k = f_{-1} \circ f_{-k}.$$

Konjugasi kompleks f_{-1} membalik orientasi dan berderajat -1 , sedangkan $-k > 0$. Jadi

$$\deg(f_k) = (-1)(-k) = k.$$

Ketiga kasus memberi satu rumus $\deg(f_k) = k$ untuk semua $k \in \mathbb{Z}$.

Pemeriksaan Penguasaan F5.6 (derajat dari pengangkatan sudut). Identifikasi S^1 dengan $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$. Misalkan $f: S^1 \rightarrow S^1$ mempunyai pengangkatan kontinu $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ yang memenuhi

$$F(t+1) = F(t) + d$$

untuk suatu $d \in \mathbb{Z}$.

1. Jelaskan mengapa bilangan bulat d adalah derajat f .
2. Terapkan pada pemetaan potongan demi potongan yang kenaikan pengangkatannya pada tiga interval berturut-turut adalah 1, 2, dan -4 .

Petunjuk. Kelas fundamental $H_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ direpresentasikan oleh satu putaran parameter $t \in [0, 1]$. Lihat perpindahan total $F(1) - F(0)$.

Solusi Pemeriksaan F5.6. Ketika parameter domain bergerak sekali dari 0 ke 1, pengangkat citranya bergerak dari $F(0)$ ke

$$F(1) = F(0) + d.$$

Setelah diproyeksikan ke $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$, perpindahan ini berarti citra melilit lingkaran sasaran bersih sebanyak d kali. Karena pembangkit $H_1(S^1)$ dikirim ke d kali pembangkit, $\deg(f) = d$.

Pada contoh tiga interval yang afin pada setiap sepertiga domain, perpindahan total pengangkatan adalah jumlah kenaikan bertandanya,

$$d = 1 + 2 - 4 = -1.$$

Karena itu $\deg(f) = -1$. Untuk nilai sasaran yang bukan citra titik-titik sambung domain, setiap potongan afin bersifat monoton ketat dan memberi berturut-turut satu, dua, dan empat prabayangan dengan tanda $+, +, -$. Perhitungan pengangkatan ini karena itu sama dengan jumlah kontribusi derajat lokal $1 + 2 - 4$.

Batas sumber komponen. Unit ini menerjemahkan `algebraic_topology.tex` baris 2847–3122 secara kontigu, mencakup Bagian 1.11 tentang derajat pemetaan, teorema sfera berbulu, derajat lokal, rumus lokal-ke-global, dan pemetaan pangkat pada lingkaran. Unit ini menutup FOM-PR-12 dan menyediakan enam soal penguasaan dengan petunjuk serta solusi lengkap. Kursor komponen berikutnya adalah baris 3123, `\subsection{Cellular complexes}`, awal Bagian 1.12.

Komponen Fomberg O012-FOM-006

Bagian 1.12; dipetakan ke D60-R12 sebagai fondasi kompleks CW.

Tentang komponen ini

Komponen ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas Bagian 1.12 *Algebraic Topology* karya Yeheli Fomberg, berdasarkan kuliah Nir Lazarovich pada musim semi 2025. Otoritas sumber dibekukan pada commit [563194fae879178b9a6871b249513bfc27968975](#). Rentang yang diterjemahkan ialah `algebraic_topology.tex` baris 3123–3517: 395 baris fisik, 15.540 byte setelah normalisasi LF dan satu LF penutup, dengan SHA-256 `c16d595b8f8c4c67ea5f0f58c1ad7de83ac94efae509d3a8d3bef28da2522f19`.

Catatan sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](#). Terjemahan, pemformatan semantik, koreksi terbatas, tujuh gambar ulang aksesibel, serta materi penguasaan asli di bawah ini diterbitkan dengan lisensi yang sama. Pembaca memakai tepat satu PNG untuk setiap gambar ulang; master SVG berpasangan dipertahankan di sampingnya untuk rekam asal-usul, aksesibilitas, dan penggunaan ulang tanpa rugi. Semua perbaikan dibedakan dari teks sumber. Tidak ada prosa dari bank soal Fomberg terpisah maupun materi MIT yang disalin ke dalam komponen ini.

Tujuh pasangan gambar ulang aksesibel—PNG untuk pembaca dan SVG sebagai master—menggantikan kode TikZ mentah sambil mempertahankan kesebelas fungsi diagram sumber: (1) himpunan simpul diskret, (2) contoh 1-kerangka, (3) pemetaan karakteristik, (4) peta pelekatan, (5) anting-anting Hawaii, (6) graf Petersen, (7) konstruksi S^2 , (8) struktur dua-sel pada S^n , (9) struktur CW torus, (10) kuosien antipodal untuk $\mathbb{RP}^1$, dan (11) model belahan sfera untuk $\mathbb{RP}^2$. Setiap gambar disertai uraian semantik yang tidak bergantung pada warna atau tata letak.

Edisi ini independen dan tidak menyiratkan dukungan, pengesahan, atau afiliasi dengan Yeheli Fomberg, Nir Lazarovich, ataupun institusi mereka. Produksi terjemahan, struktur semantik, gambar ulang, dan QA dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra** atas arahan pengguna.

36 Kompleks Seluler

Catatan. Dalam topologi kita dapat membangun ruang yang berperilaku sangat buruk. Struktur sederhana seperti kompleks- Δ memungkinkan kita menghitung homologi bagi suatu keluarga ruang. Sekarang kita memperkenalkan kembali kompleks sel atau kompleks CW. Struktur ini memperumum kompleks- Δ dan memungkinkan homologi lebih banyak ruang dihitung dengan lebih mudah.

36.1 Kerangka, sel, dan dua jenis peta

Definisi (pembangunan seluler). Mulailah dengan 0-kerangka

$$X^{(0)} = \text{suatu himpunan simpul diskret.}$$

Untuk setiap $n \geq 1$, andaikan $X^{(n-1)}$ telah dibangun. Pilih sebuah keluarga cakram- n dan peta pelekatan

$$\{(D_\alpha^n, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in A_n}, \quad \varphi_\alpha: \partial D_\alpha^n \longrightarrow X^{(n-1)}.$$

Kerangka berikutnya adalah ruang kuosien

$$X^{(n)} = \left(X^{(n-1)} \sqcup \bigsqcup_{\alpha \in A_n} D_\alpha^n \right) / (x \sim \varphi_\alpha(x) \text{ untuk } x \in \partial D_\alpha^n).$$


Restriksi peta kuosien pada cakram ke- α ialah **pemetaan karakteristik**

$$\phi_\alpha: D_\alpha^n \longrightarrow X^{(n)}.$$

Peta φ_α hanya menentukan tempat batas cakram dilekatkan pada kerangka sebelumnya. Sebaliknya, ϕ_α memetakan seluruh cakram ke sel tertutup di dalam kerangka baru. **Sel- n terbuka** yang terkait ialah

$$e_\alpha^n := \phi_\alpha(\text{Int } D_\alpha^n).$$

Pemetaan karakteristik membatasi menjadi homeomorfisma $\text{Int } D_\alpha^n \cong e_\alpha^n$, tetapi pada batasnya ia boleh mengidentifikasi titik-titik.



Gambar 10: Gambar ulang aksesibel pembangunan kompleks CW melalui kerangka nol, kerangka satu, dan pelekatan cakram berdimensi n .

Diagram semantik (fungsi sumber 1 dan 2). Panel kiri merepresentasikan $X^{(0)}$ sebagai lima simpul yang saling terpisah. Panel tengah merepresentasikan contoh $X^{(1)}$: simpul-simpul itu dihubungkan oleh sel-1, termasuk satu sel yang kedua ujungnya melekat pada simpul yang sama dan menjadi gelung. Dua panel ini menggambarkan ulang dua TikZ pertama sumber.

Panel kanan menambahkan ringkasan langkah induktif: batas ∂D_α^n dipetakan ke $X^{(n-1)}$, kemudian seluruh D_α^n masuk ke ruang kuosien $X^{(n)}$. Ringkasan tambahan ini membuat tipe peta dan dimensi cakram terbaca tanpa mengubah data sumber.

Dalam dimensi satu, pasangan $(D_\alpha^1, \varphi_\alpha)$ mempunyai

$$\varphi_\alpha: \partial D_\alpha^1 \longrightarrow X^{(0)}, \quad \phi_\alpha: D_\alpha^1 \longrightarrow X^{(1)}.$$

Diagram semantik (fungsi sumber 3 dan 4). Baris atas mewakili peta pelekatan: domainnya hanya $\partial D_\alpha^1 = \{-1, 1\}$, dan kedua titik ujung itu dikirim ke dua simpul di $X^{(0)}$. Bagian dalam interval tidak berada dalam domain φ_α .

Baris bawah mewakili pemetaan karakteristik: seluruh interval D_α^1 , termasuk bagian dalam dan batasnya, dikirim ke citra satu sel-1 tertutup di $X^{(1)}$. Bagian dalam interval memparametrisasi sel terbuka e_α^1 ; kedua titik batas dapat diidentifikasi oleh peta kuosien. Dua baris ini menggambarkan ulang dua diagram TikZ sumber yang semula terpisah.

Koreksi notasi sel terbuka. Sumber menyebut

$$\text{Int}(\phi_\alpha(D_\alpha^1))$$

sebagai sel-1. Interior citra tertutup di dalam ruang sekitar dapat kosong dan bukan definisi yang tepat. Edisi memakai

$$e_\alpha^1 = \phi_\alpha(\text{Int } D_\alpha^1),$$

Peta pelekatan $\varphi: \partial D^1 \rightarrow X^{(0)}$



Pemetaan karakteristik $\phi: D^1 \rightarrow X^{(1)}$



Gambar 11: Gambar ulang aksesibel yang membandingkan peta pelekatan pada batas interval dengan pemetaan karakteristik pada seluruh interval.

yaitu citra bagian dalam cakram di bawah pemetaan karakteristik.

Koreksi dimensi cakram dan tipe peta. Baris 3245 sumber memakai D_α^1 pada langkah berdimensi n , walaupun baris 3240–3241 baru saja memperkenalkan D_α^n . Edisi memakai D_α^n dan menyatakan kedua tipe secara eksplisit:

$$\varphi_\alpha: \partial D_\alpha^n \rightarrow X^{(n-1)}, \quad \phi_\alpha: D_\alpha^n \rightarrow X^{(n)}.$$

Edisi juga menormalkan kalimat salah tik pada baris 3180 tanpa mengubah isinya. Pada panel peta pelekatan di baris 3208–3232, sumber mewarnai seluruh interval meskipun domain φ_α hanya ∂D_α^1 . Gambar ulang edisi menandai hanya kedua titik batas sebagai domain peta pelekatan; seluruh interval baru muncul sebagai domain pemetaan karakteristik.

36.2 Kompleks CW berdimensi rendah dan tak berhingga

Catatan (dimensi nol dan satu). Setiap kompleks CW berdimensi paling tinggi satu dapat diberi struktur kompleks- Δ berdimensi paling tinggi satu yang realisasinya homeomorfik dengan ruang semula, setelah sel-1 disubdivisi bila diperlukan. Sebaliknya, realisasi setiap kompleks- Δ berdimensi paling tinggi satu mempunyai struktur CW alami. Pernyataan ini tentang homeomorfisma realisasi, bukan sekadar ekuivalensi homotopi dan bukan identitas struktur sel.

Penajaman jenis ekuivalensi. Sumber hanya menulis “equivalent” tanpa menentukan apakah yang dimaksud homeomorfisma, ekuivalensi homotopi, atau kesamaan struktur. Edisi menyatakan klaim yang diperlukan secara tepat: realisasinya homeomorfik setelah subdivisi seperlunya; struktur selnya tidak harus identik.

Catatan. Dalam struktur kompleks- Δ , peta

$$\sigma_\alpha: \Delta^{n_\alpha} \longrightarrow X$$

memainkan peran pemetaan karakteristik: bagian dalam simpleks dipetakan secara homeomorfik ke satu sel, sedangkan muka-mukanya dilekatkan ke kerangka berdimensi lebih rendah.

Catatan (kompleks tak berhingga dan topologi lemah). Untuk pembangunan yang tidak berhenti pada suatu dimensi hingga, tetapkan

$$X = \operatorname{colim}_n X^{(n)} = \bigcup_{n \geq 0} X^{(n)}$$

dan beri X **topologi lemah** (*weak topology*), yakni topologi final terhadap inklusi semua sel tertutup. Secara ekuivalen, $A \subseteq X$ tertutup jika dan hanya jika

$$A \cap \phi_\alpha(D_\alpha^n)$$

tertutup di $\phi_\alpha(D_\alpha^n)$ untuk setiap sel. Dalam situasi filtrasi yang memenuhi syarat CW, ini juga dinyatakan melalui kerangka: $U \subseteq X$ terbuka jika dan hanya jika $U \cap X^{(n)}$ terbuka di $X^{(n)}$ untuk setiap n .

Dalam konvensi standar, huruf **C** pada CW juga mencatat syarat *closure-finite*: penutupan setiap sel berpotongan dengan hanya berhingga banyak sel. Huruf **W** mencatat topologi lemah di atas.

Penajaman topologi limit langsung dan syarat CW. Sumber menulis limit sebagai gabungan kerangka dan memberi uji keterbukaan per kerangka, tetapi tidak menjelaskan bahwa topologi tersebut ialah topologi final/lemah dan tidak menyatakan syarat *closure-finite*. Edisi membuat kedua syarat standar itu eksplisit. Simbol colim_n di sini berarti kolimit topologis dengan topologi tersebut, bukan asumsi bahwa suatu topologi subruang ambien otomatis memberikan kolimit yang sama.

36.3 Contoh dan noncontoh

Contoh (anting-anting Hawaii sebagai noncontoh). Di dalam $\mathbb{R}^2$, ambil lingkaran C_n berjari-jari $1/n$ dan berpusat di $(0, 1/n)$. Semua lingkaran menyinggung titik asal, dan

$$H = \bigcup_{n \geq 1} C_n$$

diberi topologi subruang dari bidang. Ruang H disebut **anting-anting Hawaii**.



Gambar 12: Gambar ulang aksesibel anting-anting Hawaii sebagai barisan lingkaran yang mengecil dan menumpuk pada titik asal bersama.

Diagram semantik (fungsi sumber 5). Lingkaran C_n berpusat di $(0, 1/n)$, berjari-jari $1/n$, dan semuanya melalui $0 = (0, 0)$. Diameternya menuju nol, sehingga setiap lingkungan bidang dari titik asal bertemu tak hingga banyak lingkaran. Titik asal adalah titik akumulasi bersama; pusat-pusat lingkaran bukan simpul tambahan dalam dekomposisi baji yang wajar.

Sebagai himpunan, H tampak seperti baji terhitung lingkaran. Namun topologi subruang bidangnya bukan topologi lemah baji CW. Pilih satu titik $p_n \in C_n \setminus \{0\}$ dengan $p_n \rightarrow 0$, dan tetapkan

$$U = H \setminus \{p_1, p_2, \dots\}.$$

Irisan $U \cap C_n$ terbuka di setiap lingkaran C_n , tetapi U tidak terbuka di H : tidak ada lingkungan bidang dari 0 yang menghindari semua p_n . Jadi topologi subruang gagal memenuhi uji lemah per sel tertutup yang dimiliki baji CW. Baji abstrak $\bigvee_{n \geq 1} S^1$ tetap merupakan kompleks CW bila diberi topologi lemahnya; ruang itu tidak homeomorfik dengan anting-anting Hawaii. Secara intrinsik, baji CW terhitung itu tidak kompak dan semilokal terhubung sederhana, sedangkan anting-anting Hawaii kompak, tidak semilokal terhubung sederhana, dan tidak kontraktibel secara lokal di titik asal; lihat juga [pembandingan topologis pada Unit Roberts 13](#).

Argumen lokalnya juga menutup kemungkinan bahwa H mempunyai suatu struktur CW lain. Setiap lingkungan 0 di H memuat seluruh C_m untuk semua m yang cukup besar, sebab diameter C_m adalah $2/m$. Untuk setiap m terdapat retraksi kontinu $r_m: H \rightarrow C_m$ yang bertindak sebagai identitas pada C_m dan meruntuhkan semua lingkaran lain ke 0. Jadi gelung C_m tidak nulhomotop di H . Akibatnya setiap lingkungan 0 memuat gelung yang tetap esensial di H ; H tidak semilokal terhubung sederhana dan tidak kontraktibel secara lokal pada 0. Karena setiap kompleks CW kontraktibel secara lokal, H tidak homeomorfik dengan kompleks CW mana pun.

Koreksi kontradiksi dan alasan topologis. Baris 3269 menyebut contoh ini noncontoh, baris 3272 menyebutnya kompleks CW, lalu baris 3288–3291 kembali menyatakan bahwa ia bukan kompleks CW. Alasan sumber tentang titik $(0, 1/n)$ juga tidak tepat: titik-titik itu adalah pusat lingkaran dan tidak perlu dipilih sebagai 0-sel; dekomposisi baji yang wajar hanya memakai titik singgung bersama sebagai 0-sel.

Edisi menghapus kontradiksi itu dan memakai kegagalan topologi lemah sebagai alasan yang benar. Klaim tambahan sumber bahwa pusat $(0, n)$ dengan jari-jari n otomatis memperbaiki keadaan juga tidak dipertahankan: sekadar mengubah gambar planar tidak menetapkan topologi lemah. Cara yang tepat memperoleh kompleks CW ialah membentuk baji abstrak dan memberinya topologi lemah.

Contoh (graf topologis). Setiap graf abstrak mempunyai struktur CW berdimensi satu: simpul-simpulnya adalah sel-0 dan bagian dalam sisi-sisinya adalah sel-1. Graf Petersen, misalnya, mempunyai sepuluh sel-0 dan lima belas sel-1.

Diagram semantik (fungsi sumber 6). Lima simpul luar membentuk sebuah siklus panjang lima, lima simpul dalam dihubungkan menurut urutan bintang, dan masing-masing simpul luar dihubungkan ke tepat satu simpul dalam. Kesepuluh simpul adalah sel-0 dan kelima belas sisi abstrak adalah sel-1. Perpotongan guratan pada suatu gambar tidak otomatis menjadi simpul graf.


Graf Petersen tidak planar, jadi tidak ada pembenaman graf itu ke $\mathbb{R}^2$ yang mempertahankan sisi-sisi sebagai busur yang hanya bertemu di simpul bersama. Hal ini sama sekali tidak menghalangi graf abstraknya menjadi kompleks CW. Ia dapat dibenamkan ke $\mathbb{R}^3$, tetapi pembenaman ruang ambien juga bukan syarat bagi struktur CW intrinsiknya.

Koreksi perancuan planarity dengan struktur CW. Sumber menyimpulkan bahwa graf Petersen “bukan kompleks CW” di bidang karena sisi harus berpotongan. Yang gagal ialah pembenaman planar dari graf abstrak, bukan struktur CW graf tersebut. Edisi memisahkan tiga hal: graf abstrak selalu memberi kompleks CW satu-dimensi; gambar bidang yang bersilangan bukan pembenaman; dan setiap graf hingga dapat dibenamkan ke ruang tiga-dimensi.

Contoh (struktur seluler pada S^2). Tetapkan $X^{(0)} = \{v\}$ dan lekatkan satu sel-1 melalui peta konstan

$$\varphi_1: \partial D^1 \longrightarrow \{v\}.$$

Kerangka $X^{(1)}$ yang dihasilkan adalah satu lingkaran. Lekatkan dua sel-2, masing-masing sepanjang homeomorfisma batasnya ke lingkaran itu. Kedua cakram bertemu pada batas bersama dan



Gambar 13: Gambar ulang aksesibel graf Petersen dengan pentagon luar, bintang dalam, dan lima sisi penghubung.

membentuk S^2 .

Diagram semantik (fungsi sumber 7 dan 8). Baris atas memperlihatkan tiga tahap untuk S^2 : satu simpul v ; satu sel-1 yang kedua ujungnya dilekatkan ke v dan membentuk lingkaran; lalu dua sel-2 yang mengisi kedua sisi lingkaran. Ini menggambar ulang konstruksi pertama sumber.

Baris bawah memperlihatkan struktur minimal pada S^n untuk $n \geq 1$: kerangka dimensi $0, \dots, n-1$ tetap berupa satu titik x_0 , lalu satu sel- n dilekatkan dengan seluruh ∂D^n dikirim ke x_0 . Kuosienya ialah $D^n / \partial D^n \cong S^n$. Ini menggambar ulang konstruksi sfera kedua sumber.

Struktur empat-sel pada S^2 ini bukan struktur kompleks- Δ dengan sel yang sama.

Contoh (struktur minimal pada S^n). Untuk $n \geq 1$, tetapkan

$$X^{(0)} = \{x_0\}, \quad X^{(i)} = X^{(0)} \quad (1 \leq i < n),$$


lalu lekatkan satu sel- n melalui peta konstan

$$\varphi: \partial D^n \longrightarrow X^{(n-1)}, \quad \varphi(x) = x_0.$$

Hasilnya

$$X^{(n)} \cong D^n / \partial D^n \cong S^n.$$

Jadi struktur itu mempunyai tepat satu sel-0 dan satu sel- n , tanpa sel pada dimensi di antaranya.




Gambar 14: Gambar ulang aksesibel dua struktur CW pada sfera: struktur empat-sel pada S^2 dan struktur minimal dua-sel pada S^n .

Koreksi indeks kerangka sfera. Baris 3371 sumber menulis $1 \leq i < k$, tetapi k tidak didefinisikan dan sel yang kemudian dilekatkan berdimensi n . Edisi memakai rentang yang bertipe benar, $1 \leq i < n$, dan menyatakan $n \geq 1$.

Catatan. Kita juga dapat memberi S^2 struktur CW dengan banyak sel, misalnya pola seperti bola basket atau bola sepak, atau mentriangulasinya sebagai kompleks- Δ . Struktur minimal sering lebih efisien untuk perhitungan homologi seluler karena jumlah pembangkit rantainya jauh lebih sedikit.

Contoh (torus). Persegi fundamental torus mengidentifikasi pasangan sisi yang berhadapan dengan orientasi yang sesuai. Keempat sudut menjadi satu sel-0 e^0 ; kedua pasangan sisi menjadi dua sel-1, e_a^1 dan e_b^1 ; dan bagian dalam persegi menjadi satu sel-2 e^2 .



Gambar 15: Gambar ulang aksesibel persegi fundamental torus dan satu simpul dengan dua gelang yang menjadi kerangka satunya.

Diagram semantik (fungsi sumber 9). Sisi tegak persegi diberi label a dengan orientasi yang berpasangan, dan sisi mendatar diberi label b dengan orientasi yang berpasangan. Setelah identifikasi, keempat sudut menjadi satu simpul dan pasangan sisi menjadi dua gelang berarah a dan b . Ketika batas persegi dibaca sekali dengan orientasi positif, peta pelekatan sel-2 menelusuri kata

$$aba^{-1}b^{-1}.$$

Arsiran bagian dalam mewakili satu sel-2, bukan dua cakram terpisah.

Jadi

$$T^2 \cong e^0 \cup e_a^1 \cup e_b^1 \cup e^2,$$

dan peta pelekatan sel-2 merepresentasikan komutator $aba^{-1}b^{-1}$ pada baji dua lingkaran.

Contoh (ruang projektif real). Ruang $\mathbb{RP}^n$ adalah ruang garis satu-dimensi di $\mathbb{R}^{n+1}$ yang melalui titik asal:

$$\mathbb{RP}^n = (\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}) / (x \sim \lambda x, \lambda \in \mathbb{R}^\times).$$

Dengan memilih vektor satuan pada setiap garis, kita juga memperoleh model

$$\mathbb{RP}^n \cong S^n / (x \sim -x).$$

Dalam dimensi nol, $\mathbb{RP}^0$ adalah satu titik. Dalam dimensi satu, kuosien antipodal $S^1/(x \sim -x)$ kembali homeomorfik dengan S^1 . Karena itu $\mathbb{RP}^1$ diperoleh dari $\mathbb{RP}^0$ dengan melekatkan satu sel-1.

Untuk dimensi dua, ambil belahan sfera tertutup sebagai cakram D^2 . Bagian dalamnya memberi sel-2 terbuka, sedangkan pada batas $S^1 = \partial D^2$ titik-titik antipodal diidentifikasi. Kuosien batas itu ialah $\mathbb{RP}^1$, sehingga

$$\mathbb{RP}^2 \cong \mathbb{RP}^1 \cup_{q_2} D^2, \quad q_2: S^1 \longrightarrow \mathbb{RP}^1$$

adalah peta kuosien antipodal.

$$\begin{array}{l} \textbf{Real:} \quad \mathbb{RP}^0 \xrightarrow{+e^1} \mathbb{RP}^1 \xrightarrow{+e^2} \mathbb{RP}^2 \xrightarrow{+e^3} \cdots \xrightarrow{+e^n} \mathbb{RP}^n \\ \textbf{Kompleks:} \quad \mathbb{CP}^0 \xrightarrow{+e^2} \mathbb{CP}^1 \xrightarrow{+e^4} \mathbb{CP}^2 \xrightarrow{+e^6} \cdots \xrightarrow{+e^{2n}} \mathbb{CP}^n \end{array}$$

$\mathbb{RP}^n$ memiliki satu sel pada setiap dimensi $0, \dots, n$; $\mathbb{CP}^n$ satu sel pada dimensi $0, 2, \dots, 2n$.

Gambar 16: Gambar ulang aksesibel filtrasi CW ruang projektif real dengan satu sel pada setiap dimensi dan ruang projektif kompleks dengan satu sel pada setiap dimensi genap.

Diagram semantik (fungsi sumber 10 dan 11). Fungsi diagram $\mathbb{RP}^1$ pada sumber adalah menunjukkan bahwa kuosien lingkaran oleh identifikasi antipodal tetap sebuah lingkaran, sehingga satu sel-1 dilekatkan pada satu titik. Fungsi diagram $\mathbb{RP}^2$ adalah menunjukkan bahwa satu belahan sfera menjadi cakram D^2 dan lingkaran batasnya dikuosienkan secara antipodal menjadi $\mathbb{RP}^1$.

Gambar ulang merangkum kedua langkah itu sebagai filtrasi

$$\mathbb{RP}^0 \subset \mathbb{RP}^1 \subset \cdots \subset \mathbb{RP}^n,$$

dengan tepat satu sel baru e^k pada langkah dari $\mathbb{RP}^{k-1}$ ke $\mathbb{RP}^k$. Baris kedua menampilkan pola analog untuk $\mathbb{CP}^n$, tetapi hanya pada dimensi genap $0, 2, \dots, 2n$.

Catatan (pembangunan induktif ruang projektif real). Secara umum, inklusi ruang projektif $\mathbb{RP}^{n-1} \subset \mathbb{RP}^n$ adalah subruang yang diwakili oleh garis-garis di hiperbidang koordinat terakhir nol. Sel komplementnya berdimensi n , dan konstruksi induktif yang bertipe benar ialah

$$\mathbb{RP}^n \cong \mathbb{RP}^{n-1} \cup_{q_n} D^n, \quad q_n: S^{n-1} = \partial D^n \longrightarrow \mathbb{RP}^{n-1},$$

dengan $q_n(x) = [x]$, yakni peta kuosien antipodal. Jadi $\mathbb{RP}^n$ mempunyai tepat satu sel- i untuk setiap $0 \leq i \leq n$.

Koreksi relasi kuosien projektif. Sumber menulis $x \sim \lambda x$ tanpa menyatakan bahwa skalar harus taknol. Jika $\lambda = 0$ diizinkan, ruas kanan keluar dari $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ dan relasinya tidak bertipe. Edisi memakai $\lambda \in \mathbb{R}^\times$ serta mempertahankan model ekuivalen $S^n/(x \sim -x)$.

Koreksi subruang dan notasi pelekatan projektif. Sumber menyebut “khatulistiwa $\mathbb{RP}^2$ ” sebagai $\mathbb{RP}^1$ dan menulis $\sqcup D^n$ tanpa indeks, lalu beralih ke φ_α dan D_α^n . Untuk dekomposisi yang sedang dibahas, hanya satu sel- n diperlukan. Edisi memakai subruang projektif kanonik $\mathbb{RP}^{n-1}$ dan peta tunggal yang bertipe lengkap,

$$q_n: \partial D^n = S^{n-1} \rightarrow \mathbb{RP}^{n-1}, \quad x \mapsto [x].$$

Normalisasi tata bahasa dan salah tik sumber. Edisi menormalkan kesesuaian subjek-verba pada baris 3130–3131, “this maps” pada baris 3180, bentuk tunggal/jamak yang rusak pada baris 3292–3294, “triangulize” dan kalimat janggal pada baris 3394–3396, “homeomorph” pada baris 3447, serta ketidakkonsistenan indeks pada baris 3506–3508. Perubahan ini tidak menambah klaim matematis baru; koreksi matematis yang substantif dicatat terpisah pada audit-audit di atas.

36.4 Pemeriksaan penguasaan

Enam pemeriksaan berikut membentuk lapisan penguasaan unit. Latihan pertama berasal dari baris 3511–3516 sumber dan dilengkapi petunjuk serta solusi asli edisi. Lima latihan lainnya ditulis khusus untuk edisi ini. Tidak ada soal yang disalin dari bank soal Fomberg terpisah.

Pemeriksaan Penguasaan F6.1 (struktur CW pada $\mathbb{CP}^n$). Latihan sumber meminta suatu kompleks CW bagi $\mathbb{CP}^n$ dengan satu sel pada setiap dimensi genap dan meminta kesimpulan $\mathbb{CP}^1 \cong S^2$. Berikut penjabarannya menjadi langkah yang dapat diperiksa.

Masukkan

$$\mathbb{CP}^{n-1} = \{[z_0 : \cdots : z_n] \in \mathbb{CP}^n : z_n = 0\}$$

ke dalam $\mathbb{CP}^n$. Tetapkan

$$D^{2n} = \{w \in \mathbb{C}^n : \|w\| \leq 1\}$$

dan

$$\Phi_n(w) = \left[w_0 : \cdots : w_{n-1} : \sqrt{1 - \|w\|^2} \right].$$

1. Buktikan bahwa Φ_n membatasi menjadi homeomorfisma $\text{Int } D^{2n} \rightarrow \mathbb{CP}^n \setminus \mathbb{CP}^{n-1}$.
2. Identifikasi restriksi $\Phi_n|_{S^{2n-1}}$.
3. Simpulkan $\mathbb{CP}^n \cong \mathbb{CP}^{n-1} \cup_{h_n} D^{2n}$, lalu cacah sel-selnya.
4. Deduksi bahwa $\mathbb{CP}^1 \cong S^2$.

Petunjuk. Setiap titik projektif di luar $\mathbb{CP}^{n-1}$ mempunyai satu-satunya wakil satuan yang koordinat terakhirnya berupa bilangan real positif. Pada batas D^{2n} , koordinat terakhir dalam rumus Φ_n menjadi nol. Ingat bahwa dua vektor satuan kompleks menentukan garis yang sama tepat ketika keduanya berbeda melalui perkalian suatu bilangan kompleks bermodulus satu.

Solusi Pemeriksaan F6.1. Ambil $[z_0 : \cdots : z_n] \notin \mathbb{CP}^{n-1}$, sehingga $z_n \neq 0$. Kalikan wakilnya dengan suatu skalar kompleks agar koordinat terakhir positif real, kemudian normalkan panjang seluruh vektor menjadi satu. Hasilnya unik dan berbentuk

$$(w, t), \quad t > 0, \quad \|w\|^2 + t^2 = 1.$$

Jadi $t = \sqrt{1 - \|w\|^2}$ dan $\|w\| < 1$. Prosedur ini memberi invers kontinu bagi restriksi Φ_n pada bagian dalam cakram; karena itu restriksi tersebut merupakan homeomorfisma.

Jika $\|w\| = 1$, maka

$$\Phi_n(w) = [w_0 : \cdots : w_{n-1} : 0].$$

Dengan identifikasi subruang terakhir itu dengan $\mathbb{CP}^{n-1}$, restriksi batas adalah peta Hopf

$$h_n : S^{2n-1} \longrightarrow \mathbb{CP}^{n-1}, \quad h_n(w) = [w].$$

Seratnya adalah orbit perkalian $w \mapsto \lambda w$ untuk $\lambda \in S^1$. Maka Φ_n merupakan pemetaan karakteristik bagi satu sel- $2n$ yang dilekatkan pada $\mathbb{CP}^{n-1}$ melalui h_n :

$$\mathbb{CP}^n \cong \mathbb{CP}^{n-1} \cup_{h_n} D^{2n}.$$

Induksi dari $\mathbb{CP}^0 = \{*\}$ memberi tepat satu sel dalam setiap dimensi $0, 2, \dots, 2n$ dan tidak memberi sel berdimensi ganjil. Untuk $n = 1$, peta $h_1 : S^1 \rightarrow \mathbb{CP}^0$ konstan, sehingga

$$\mathbb{CP}^1 \cong D^2 / \partial D^2 \cong S^2.$$

Pemeriksaan Penguasaan F6.2 (peta pelekatan versus pemetaan karakteristik). Dalam

$$X^{(n)} = \left(X^{(n-1)} \sqcup \bigsqcup_{\alpha} D_{\alpha}^n \right) / (x \sim \varphi_{\alpha}(x), x \in \partial D_{\alpha}^n),$$

misalkan q adalah peta kuosien dan $j : X^{(n-1)} \rightarrow X^{(n)}$ adalah inklusi kanonik. Untuk satu indeks α :

1. nyatakan domain dan kodomain φ_{α} serta ϕ_{α} ;
2. buktikan $\phi_{\alpha}|_{\partial D_{\alpha}^n} = j \circ \varphi_{\alpha}$;
3. buktikan bahwa restriksi ϕ_{α} pada bagian dalam cakram merupakan homeomorfisma ke sel terbuka e_{α}^n ;
4. jelaskan mengapa citra sel tertutup $\phi_{\alpha}(D_{\alpha}^n)$ tidak harus homeomorfik dengan D_{α}^n .

Petunjuk. Jika $\iota_{\alpha} : D_{\alpha}^n \hookrightarrow X^{(n-1)} \sqcup \bigsqcup_{\beta} D_{\beta}^n$ adalah inklusi suku, maka $\phi_{\alpha} = q \circ \iota_{\alpha}$. Relasi kuosien bekerja pada titik batas, bukan di bagian dalam. Injektivitas pada batas tidak disyaratkan.

Solusi Pemeriksaan F6.2. Peta pelekatan dan pemetaan karakteristik berturut-turut bertipe

$$\varphi_{\alpha} : \partial D_{\alpha}^n = S^{n-1} \longrightarrow X^{(n-1)}$$

dan

$$\phi_\alpha = q \circ \iota_\alpha: D_\alpha^n \longrightarrow X^{(n)}.$$

Untuk $x \in \partial D_\alpha^n$, relasi pembentuk kuosien memberi

$$\phi_\alpha(x) = q(x) = q(\varphi_\alpha(x)) = j(\varphi_\alpha(x)).$$

Inilah identitas restriksi pada butir kedua.

Tidak ada dua titik bagian dalam cakram ke- α yang diidentifikasi satu sama lain atau dengan kerangka lama. Karena topologi pada citranya adalah topologi kuosien sel, restriksi

$$\phi_\alpha|_{\text{Int } D_\alpha^n}: \text{Int } D_\alpha^n \xrightarrow{\cong} e_\alpha^n$$

merupakan homeomorfisma. Namun titik-titik batas boleh mempunyai citra yang sama. Karena itu ϕ_α tidak harus injektif pada seluruh cakram dan citra tertutupnya tidak harus berupa cakram. Pada torus, misalnya, batas satu sel-2 dilipat ke baji dua lingkaran sepanjang $aba^{-1}b^{-1}$.

Pemeriksaan Penguasaan F6.3 (struktur minimal pada S^n). Untuk $n \geq 1$, mulailah dengan $X^{(0)} = \{v\}$, tetapkan $X^{(i)} = \{v\}$ untuk $1 \leq i < n$, lalu lekatkan satu cakram- n melalui peta konstan

$$\varphi: S^{n-1} = \partial D^n \longrightarrow \{v\}.$$

1. Identifikasi $X^{(n)}$.
2. Daftarkan semua sel terbukanya dan berikan pemetaan karakteristiknya.
3. Untuk $n = 2$, bandingkan struktur ini dengan struktur satu simpul, satu sisi, dan dua muka pada contoh sumber.

Petunjuk. Meruntuhkan seluruh batas cakram tertutup berdimensi n ke satu titik menghasilkan kompaktifikasi satu-titik bagian dalam cakram.

Solusi Pemeriksaan F6.3. Definisi kuosien langsung memberi

$$X^{(n)} = (\{v\} \sqcup D^n) / (x \sim v \text{ untuk semua } x \in \partial D^n) \cong D^n / \partial D^n \cong S^n.$$

Sel-selnya hanya

$$e^0 = \{v\}, \quad e^n = q(\text{Int } D^n);$$

tidak ada sel pada dimensi $1, \dots, n-1$. Pemetaan karakteristiknya ialah peta kuosien

$$q: D^n \longrightarrow D^n / \partial D^n.$$

Untuk $n = 1$, ini adalah interval yang kedua ujungnya diidentifikasi. Untuk $n = 2$, ini memberi struktur CW dua-sel pada S^2 . Struktur tersebut berbeda dari, dan lebih kecil daripada, struktur empat-sel yang juga sah pada contoh sumber: pada struktur sumber, satu gelung dibentuk lebih dahulu, kemudian dua cakram dilekatkan sepanjang homeomorfisma batas untuk menjadi dua belahan sfera. Yang mungkin gagal menjadi struktur kompleks- Δ dengan sel yang sama adalah struktur sel tertentu itu, bukan ruang S^2 sendiri.

Pemeriksaan Penguasaan F6.4 (kata pelekatan torus). Identifikasi sisi berhadapan dari persegi berorientasi untuk membentuk T^2 . Sebut simpul tunggalnya v , sel-1 tegak a , dan sel-1 mendatar b .

1. Telusuri batas berorientasi persegi satu kali dan dapatkan kata pelekatan sel-2.

2. Nyatakan cacah sel CW.
3. Gunakan teorema Seifert–van Kampen untuk menghitung $\pi_1(T^2, v)$.
4. Jelaskan akibat mengubah titik awal penelusuran atau membalik orientasi batas.

Petunjuk. Mulai dari salah satu sudut dan telusuri batas positif. Empat sisinya dilalui berturut-turut sebagai a , b , a^{-1} , dan b^{-1} . Mengubah titik awal menggeser kata secara siklik; membalik orientasi membalik kata itu.

Solusi Pemeriksaan F6.4. Keempat sudut teridentifikasi menjadi v . Kedua sisi mendatar membentuk satu gelung dan kedua sisi tegak membentuk gelung lainnya, sehingga

$$X^{(1)} = S_a^1 \vee S_b^1.$$

Penelusuran batas positif memberi

$$aba^{-1}b^{-1} = [a, b].$$

Dengan demikian

$$T^2 = (S_a^1 \vee S_b^1) \cup_{[a, b]} D^2.$$

Cacah selnya ialah satu sel-0, dua sel-1, dan satu sel-2. Teorema Seifert–van Kampen memberi

$$\pi_1(T^2, v) \cong \langle a, b \mid aba^{-1}b^{-1} = 1 \rangle \cong \mathbb{Z}^2.$$

Mengubah titik awal menghasilkan konjugasi siklik kata, sedangkan membalik orientasi menghasilkan inversnya. Kedua operasi menghasilkan penutupan normal relator yang sama dan hanya memparametrisasi ulang peta pelekatan; ruang kuosien CW tidak berubah.

Pemeriksaan Penguasaan F6.5 (filtrasi $\mathbb{RP}^n$). Pandang

$$\mathbb{RP}^n = (\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}) / (x \sim \lambda x, \lambda \in \mathbb{R}^\times)$$

dan masukkan

$$\mathbb{RP}^{n-1} = \{[x_0 : \cdots : x_n] : x_n = 0\}.$$

1. Tunjukkan $\mathbb{RP}^n \setminus \mathbb{RP}^{n-1} \cong \mathbb{R}^n$.
2. Pakai belahan sfera atas tertutup $D^n \subset S^n$ untuk memperoleh $\mathbb{RP}^n \cong \mathbb{RP}^{n-1} \cup_{q_n} D^n$ dan identifikasi q_n .
3. Deduksi cacah selnya.
4. Jelaskan secara khusus kasus $n = 1$ dan $n = 2$.

Petunjuk. Pada chart $x_n \neq 0$, pilih wakil unik yang koordinat terakhirnya 1. Untuk model $S^n/(x \sim -x)$, setiap orbit antipodal bertemu belahan atas; titik bagian dalam bertemu sekali dan titik khatulistiwa berpasangan.

Solusi Pemeriksaan F6.5. Setiap titik pada chart $x_n \neq 0$ mempunyai wakil unik

$$[y_0 : \cdots : y_{n-1} : 1],$$

sehingga chart itu homeomorfik dengan $\mathbb{R}^n$. Dalam model sfera, setiap orbit antipodal bertemu belahan atas tertutup. Orbit dari titik bagian dalam bertemu tepat sekali, sedangkan pada khatulistiwa titik

x dan $-x$ masih dipasangkan. Karena itu bagian dalam belahan menjadi satu sel- n dan peta batasnya ialah

$$q_n: S^{n-1} \longrightarrow \mathbb{RP}^{n-1}, \quad x \longmapsto [x].$$

Peta ini adalah peta kuosien atau penutup ganda antipodal. Jadi

$$\mathbb{RP}^n \cong \mathbb{RP}^{n-1} \cup_{q_n} D^n.$$

Induksi dari $\mathbb{RP}^0 = \{*\}$ memberi tepat satu sel- i untuk setiap $0 \leq i \leq n$. Pada $n = 1$, kedua ujung D^1 dilekatkan ke $\mathbb{RP}^0$, sehingga hasilnya S^1 . Pada $n = 2$, peta batas

$$q_2: S^1 \longrightarrow \mathbb{RP}^1 \cong S^1$$

berderajat 2 hingga pilihan orientasi, dan pelekatan cakram menghasilkan $\mathbb{RP}^2$. Subruang $\mathbb{RP}^{n-1}$ adalah subruang projektif kanonik; tidak diperlukan identifikasi antipodal kedua setelah kuosien terbentuk.

Pemeriksaan Penguasaan F6.6 (topologi lemah, anting-anting Hawaii, dan graf Petersen).

Misalkan W adalah baji CW terhitung lingkaran C_m pada simpul v , dengan satu sel-0 dan satu sel-1 untuk setiap lingkaran. Misalkan $H \subset \mathbb{R}^2$ adalah anting-anting Hawaii yang lingkaran ke- m -nya berjari-jari $1/m$ dan berpusat di $(0, 1/m)$, dengan topologi subruang bidang.

1. Tunjukkan bahwa bijeksi himpunan alami $W \rightarrow H$ bukan homeomorfisma dengan membangun lingkungan lemah-terbuka dari v yang citranya tidak terbuka di H .
2. Jelaskan secara topologis mengapa H bukan kompleks CW.
3. Jelaskan mengapa graf Petersen tetap merupakan kompleks CW berdimensi satu walaupun tidak planar.

Petunjuk. Pada lingkaran ke- m , pilih busur terbuka di sekitar v yang hanya memuat titik-titik berjarak kurang dari $1/m^2$ dari v , dan ambil gabungannya sebagai $U \subset W$. Dalam H , setiap bola Euklides kecil memuat seluruh lingkaran C_m untuk semua m yang cukup besar. Struktur CW suatu graf tidak mensyaratkan pembenaman planar.

Solusi Pemeriksaan F6.6. Tetapkan $U \cap C_m$ sebagai busur terbuka pada C_m yang terdiri atas titik-titik berjarak kurang dari $1/m^2$ dari v . Setiap irisan dengan sel tertutup terbuka relatif, sehingga U terbuka menurut topologi lemah baji CW.

Andaikan citranya terbuka di H . Maka suatu bola $B_\delta(0)$ mempunyai $H \cap B_\delta(0) \subseteq U$. Pilih m cukup besar sehingga $2/m < \delta$. Titik teratas lingkaran ke- m adalah $(0, 2/m)$, sehingga titik itu berada dalam $H \cap B_\delta(0)$, tetapi jaraknya dari titik asal $2/m > 1/m^2$ dan karena itu tidak berada dalam U . Ini kontradiksi. Jadi bijeksi alami bukan homeomorfisma.

Lebih lanjut, setiap lingkungan titik asal di H memuat seluruh C_m untuk semua m yang cukup besar. Ada retraksi $H \rightarrow C_m$ yang meruntuhkan semua lingkaran lain ke titik asal, sehingga gelung C_m tidak nulhomotop di H . Jadi H tidak semilokal terhubung sederhana, dan juga tidak kontraktibel secara lokal, di titik asal. Kompleks CW kontraktibel secara lokal; maka H bukan kompleks CW.

Sebaliknya, graf Petersen adalah kuosien abstrak dari sepuluh simpul dan lima belas interval yang batasnya dilekatkan pada simpul-simpul tersebut. Itu tepat sebuah kompleks CW hingga berdimensi satu. Ketakplanaran hanya menyatakan bahwa graf itu tidak dapat dibenamkan ke $\mathbb{R}^2$. Gambar bersilangan bukan pembenaman; jika titik silang dinyatakan sebagai simpul, grafnya berubah. Jika representasi geometris diperlukan, graf Petersen dapat dibenamkan ke $\mathbb{R}^3$.

Batas sumber komponen. Unit ini menerjemahkan algebraic_topology.tex baris 3123–3517 secara kontigu, yaitu seluruh Bagian 1.12 tentang kompleks seluler. Kesebelas fungsi diagram sumber

dipertahankan dalam tujuh gambar ulang aksesibel; sepuluh kelompok koreksi sumber dicatat secara terpisah; dan enam soal penguasaan mempunyai petunjuk serta solusi lengkap.

Baris sumber berikutnya tepat baris **3518** dan memulai subseksi *Cellular homology*, awal Bagian 1.13. Kursor berikutnya karena itu adalah **3518**; tidak ada baris Bagian 1.13 yang diterjemahkan dalam unit ini.

Komponen Fomberg O012-FOM-007

Bagian 1.13; dipetakan ke D60-R12 sebagai homologi seluler.

Tentang komponen ini

Komponen ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas Bagian 1.13 *Algebraic Topology* karya Yeheli Fomberg, berdasarkan kuliah Nir Lazarovich pada musim semi 2025. Otoritas sumber dibekukan pada commit [563194fae879178b9a6871b249513bfc27968975](#). Tree sumber tepatnya adalah fb678966d1533d529bdd72f49d8496a3bdc14a9b. Rentang yang diterjemahkan ialah algebraic_topology.tex baris 3518–4185: 668 baris fisik dan 26.533 byte, dengan SHA-256 a22afacdbecdfad48942421412c4eff1c0f317eb77f18253578125a5d0d7ce2.

Catatan sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](#). Terjemahan, pemformatan semantik, koreksi terbatas, tiga gambar ulang aksesibel, tiga perbaikan bukti, serta materi penguasaan asli di bawah ini diterbitkan dengan lisensi yang sama. Pembaca memakai satu PNG untuk setiap gambar geometris; master SVG berpasangan dipertahankan di sampingnya untuk rekam asal-usul, aksesibilitas, dan penggunaan ulang tanpa rugi. Empat belas diagram aljabar lainnya dipertahankan sebagai matematika semantik yang dapat dipilih dan dibaca mesin. Semua perbaikan dibedakan dari teks sumber. Tidak ada prosa dari bank soal Fomberg terpisah maupun materi MIT yang disalin ke dalam komponen ini.

Ketujuh belas fungsi diagram sumber dipertahankan: tiga sebagai gambar ulang poligon seluler dan empat belas sebagai barisan eksak, kompleks rantai, komposit proyeksi, atau perhitungan homotopi yang ditata ulang secara semantik. Uraian di sekitar setiap diagram menyatakan simpul, panah, pembangkit, dan maknanya tanpa bergantung pada warna atau tata letak.

Edisi ini independen dan tidak menyiratkan dukungan, pengesahan, atau afiliasi dengan Yeheli Fomberg, Nir Lazarovich, ataupun institusi mereka. Produksi terjemahan, struktur semantik, gambar ulang, materi asli, dan QA dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra** atas arahan pengguna.

37 Homologi Seluler

Catatan. Bagi setiap subkompleks $A \subseteq X$, pasangan (X, A) merupakan pasangan baik.

Lema. Misalkan X suatu kompleks CW dengan $X = \bigcup_n X^{(n)}$.

1. Kita mempunyai

$$H_k(X^{(n)}, X^{(n-1)}) \cong \begin{cases} \bigoplus_{\alpha} \mathbb{Z}[\phi_{\alpha}], & n = k, \\ 0, & n \neq k. \end{cases}$$

Di sini ϕ_{α} adalah pemetaan karakteristik sel- n .

2. Kita mempunyai $H_k(X^{(n)}) \cong \{0\}$ untuk $k > n$.
3. Kita mempunyai $H_k(X^{(n)}) \cong H_k(X)$ untuk $n > k$.

Bukti sumber.

1. Pernyataan pertama mengikuti dari fakta bahwa $(X^{(n)}, X^{(n-1)})$ merupakan pasangan baik dan $X^{(n)}/X^{(n-1)}$ adalah baji sfera- n . Karena itu homologi relatif hanya tak nol pada derajat n , dengan satu pembangkit $[\phi_\alpha]$ bagi setiap sel- n .
2. Perhatikan potongan barisan eksak panjang pasangan $(X^{(n)}, X^{(n-1)})$ berikut.

$$H_{k+1}(X^{(n)}, X^{(n-1)}) \longrightarrow H_k(X^{(n-1)}) \longrightarrow H_k(X^{(n)}) \longrightarrow H_k(X^{(n)}, X^{(n-1)}).$$

Diagram semantik. Keempat simpul terletak pada satu baris dan ketiga panah mengarah dari kiri ke kanan. Kedua grup relatif mengapit peta yang diinduksi inklusi $H_k(X^{(n-1)}) \rightarrow H_k(X^{(n)})$.

Karena $k > n$, baik k maupun $k + 1$ berbeda dari n . Oleh bagian (1),

$$H_{k+1}(X^{(n)}, X^{(n-1)}) \cong H_k(X^{(n)}, X^{(n-1)}) \cong \{0\}.$$

Eksakitas memberi $H_k(X^{(n-1)}) \cong H_k(X^{(n)})$. Jadi, untuk $k > n$,

$$H_k(X^{(n)}) \cong H_k(X^{(n-1)}) \cong \dots \cong H_k(X^{(0)}) = \{0\}.$$

3. Untuk X berdimensi hingga, yakni $X = X^{(m)}$ bagi suatu m , klaim mengikuti dari barisan eksak panjang yang sama. Bukti aktif dalam sumber berhenti pada kasus berdimensi hingga ini.

Koreksi grup relatif dan indeks kerangka. Pada baris 3572, sumber mengetik grup kiri sebagai $(H_{k+1}X^{(n)}, X^{(n-1)})$; edisi memakai grup relatif bertipe benar $H_{k+1}(X^{(n)}, X^{(n-1)})$. Baris 3582 menyimpulkan $H_k(X^{(n-1)}) \cong H_k(X^{(k)})$, sedangkan eksakitas membandingkan dua kerangka bertetangga: $H_k(X^{(n-1)}) \cong H_k(X^{(n)})$. Kedua bentuk yang dikoreksi dipakai di atas. Komentar TeX nonaktif tidak dipromosikan menjadi teks sumber.

37.1 Perbaikan FOM-PR-13: stabilisasi untuk kompleks CW sebarang

Teorema (stabilisasi kerangka). Misalkan X suatu kompleks CW, tanpa asumsi berdimensi hingga atau mempunyai berhingga banyak sel. Untuk $k \geq 0$ dan $n > k$, inklusi

$$\iota_n: X^{(n)} \hookrightarrow X$$

menginduksi isomorfisma kanonik

$$(\iota_n)_*: H_k(X^{(n)}) \xrightarrow{\cong} H_k(X).$$

Bukti.

Langkah satu kerangka. Untuk setiap r , $X^{(r)}/X^{(r-1)}$ adalah baji satu sfera S^r bagi setiap sel- r . Teorema hasil bagi relatif dan aditivitas homologi tereduksi memberi

$$H_j(X^{(r)}, X^{(r-1)}) \cong \begin{cases} \bigoplus_{\alpha \in I_r} \mathbb{Z}[\phi_\alpha], & j = r, \\ 0, & j \neq r. \end{cases}$$

Jika $r \geq n + 1$ dan $n > k$, maka $r > k + 1$. Kedua suku relatif yang mengapit peta inklusi dalam barisan eksak panjang,

$$H_{k+1}(X^{(r)}, X^{(r-1)}) \longrightarrow H_k(X^{(r-1)}) \longrightarrow H_k(X^{(r)}) \longrightarrow H_k(X^{(r)}, X^{(r-1)}),$$

bernilai nol. Jadi

$$H_k(X^{(r-1)}) \xrightarrow{\cong} H_k(X^{(r)}) \quad (r \geq n+1). \quad (13.1)$$

Khususnya, jika K subkompleks berdimensi hingga, penyusunan isomorfisma (13.1) memberi

$$H_k(K^{(n)}) \xrightarrow{\cong} H_k(K). \quad (13.2)$$

Dukungan kompak. Setiap himpunan kompak $A \subseteq X$ termuat dalam suatu subkompleks hingga. Andaikan sebaliknya bahwa A bertemu tak berhingga banyak sel terbuka berbeda, dan pilih $x_i \in A$ pada sel terbuka ke- i . Untuk setiap i , tetapkan

$$U_i = X \setminus \{x_j : j \neq i\}.$$

Karena penutupan setiap sel CW bertemu hanya berhingga banyak sel, himpunan yang dibuang beririsan dengan setiap sel tertutup dalam himpunan hingga dan karena itu tertutup menurut topologi lemah. Maka U_i terbuka. Keluarga $\{U_i\}$ menutupi A , tetapi setiap gabungan berhingga anggotanya kehilangan suatu x_j yang indeksnya tidak terpilih. Ini bertentangan dengan kekompakan A . Jadi A hanya bertemu berhingga banyak sel terbuka; gabungan penutupan sel-sel itu adalah subkompleks hingga yang memuat A .

Setiap rantai singular adalah jumlah berhingga simpleks singular. Dukungannya merupakan gabungan berhingga citra simpleks standar yang kompak, sehingga termuat dalam suatu subkompleks hingga.

Surjektivitas. Ambil $[z] \in H_k(X)$ dan wakili dengan siklus singular z . Ada subkompleks hingga $K \subseteq X$ yang memuat dukungan z . Isomorfisma (13.2) memberi kelas di $H_k(K^{(n)})$ yang citranya adalah $[z]$ di $H_k(K)$. Karena $K^{(n)} \subseteq X^{(n)}$, kelas itu memberi prapeta bagi $[z]$ di $H_k(X^{(n)})$.

Injektivitas. Ambil siklus c dalam $X^{(n)}$ dan andaikan $c = \partial b$ untuk suatu rantai singular b dalam X . Pilih subkompleks hingga K yang memuat dukungan c dan b . Karena $c \subseteq X^{(n)}$, ia berada dalam $K \cap X^{(n)} = K^{(n)}$. Kelasnya nol di $H_k(K)$; injektivitas (13.2) memaksa kelasnya nol di $H_k(K^{(n)})$. Jadi c sudah membatasi dalam $K^{(n)} \subseteq X^{(n)}$. Peta $(\iota_n)_*$ karena itu bijektif. $\square$

Pemeriksaan perbaikan. Syarat $r > k+1$ mematikan tepat dua suku relatif yang diperlukan; dukungan siklus dan rantai pembatas sama-sama dimasukkan ke subkompleks hingga; dan isomorfisma yang diperoleh adalah peta yang diinduksi inklusi, bukan hanya isomorfisma abstrak.

Definisi (rantai seluler). Kita mendefinisikan

$$C_n^{\text{CW}}(X) := H_n(X^{(n)}, X^{(n-1)}).$$

Dengan demikian,

$$C_n^{\text{CW}}(X) \cong \bigoplus_{\alpha} \mathbb{Z}[\phi_{\alpha}],$$

dengan ϕ_{α} pemetaan karakteristik sel- n . Grup-grup $C_n^{\text{CW}}(X)$ membentuk kompleks rantai seluler

$$\cdots \longrightarrow H_{n+1}(X^{(n+1)}, X^{(n)}) \xrightarrow{d_{n+1}} H_n(X^{(n)}, X^{(n-1)}) \xrightarrow{d_n} H_{n-1}(X^{(n-1)}, X^{(n-2)}) \longrightarrow \cdots$$

Diagram semantik. Setiap panah menurunkan derajat satu; tiga grup yang ditampilkan berturut-turut ialah $C_{n+1}^{\text{CW}}(X)$, $C_n^{\text{CW}}(X)$, dan $C_{n-1}^{\text{CW}}(X)$.

Koreksi argumen grup rantai. Baris 3602 sumber tiba-tiba menulis $C_n^{\text{CW}}(W)$, padahal hanya X yang diperkenalkan. Edisi memakai $C_n^{\text{CW}}(X)$ secara konsisten.

Definisi (pemetaan batas seluler). Gabungkan barisan eksak panjang dua pasangan kerangka bertetangga. Bagian diagram yang menentukan kedua diferensial dapat ditata ulang secara semantik sebagai berikut.

$$\begin{aligned} H_{n+1}(X^{(n+1)}, X^{(n)}) &\xrightarrow{\partial_{n+1}} H_n(X^{(n)}) \xrightarrow{q_n} H_n(X^{(n)}, X^{(n-1)}), \\ H_n(X^{(n)}, X^{(n-1)}) &\xrightarrow{\partial_n} H_{n-1}(X^{(n-1)}) \xrightarrow{q_{n-1}} H_{n-1}(X^{(n-1)}, X^{(n-2)}). \end{aligned}$$

Dengan kata lain,

$$d_{n+1} = q_n \circ \partial_{n+1}, \quad d_n = q_{n-1} \circ \partial_n.$$

Diagram semantik. Diagram sumber juga memuat panah inklusi dan suku nol yang berasal dari barisan eksak panjang. Dua lintasan komposit di atas adalah panah diagonal d_{n+1} dan d_n pada kompleks seluler.

Kita mendefinisikan

$$\partial_n^{\text{CW}} := d_n = q_{n-1} \circ \partial_n.$$

Memang,

$$d_{n-1} \circ d_n = q_{n-2} \circ \partial_{n-1} \circ q_{n-1} \circ \partial_n = 0,$$

karena eksakitas memberi $\partial_{n-1} \circ q_{n-1} = 0$.

37.2 Perbaikan FOM-PR-14: teorema homologi seluler

Teorema (homologi seluler). Misalkan X suatu kompleks CW sebarang dan $X^{(-1)} = \emptyset$. Tuliskan

$$\delta_n : H_n(X^{(n)}, X^{(n-1)}) \longrightarrow H_{n-1}(X^{(n-1)})$$

untuk pemetaan penghubung dan

$$\rho_{n-1} : H_{n-1}(X^{(n-1)}) \longrightarrow H_{n-1}(X^{(n-1)}, X^{(n-2)})$$

untuk pemetaan pasangan. Tetapkan

$$d_n = \rho_{n-1} \circ \delta_n \quad (n \geq 1), \quad d_0 = 0. \quad (14.1)$$

Maka $d_{n-1}d_n = 0$, dan terdapat isomorfisma natural

$$\Theta_{X,n} : H_n(C_*^{\text{CW}}(X), d) \xrightarrow{\cong} H_n(X). \quad (14.2)$$

Kealamian berlaku langsung bagi pemetaan seluler. Bagi pemetaan kontinu sebarang antarkompleks CW, ambil pendekatan seluler; pemetaan pada homologi seluler tidak bergantung pada pilihan setelah diidentifikasi melalui Θ , dan sama dengan pemetaan homologi singular.

Bukti.

Grup relatif dan kompleks rantai. Untuk setiap p , pasangan $(X^{(p)}, X^{(p-1)})$ adalah pasangan baik. Dengan meruntuhkan kerangka sebelumnya dan memilih orientasi pada setiap sel- p ,

$$\begin{aligned} H_m(X^{(p)}, X^{(p-1)}) &\cong \tilde{H}_m(X^{(p)}/X^{(p-1)}) \\ &\cong \tilde{H}_m\left(\bigvee_{\alpha \in I_p} S_\alpha^p\right) \\ &\cong \begin{cases} \bigoplus_{\alpha \in I_p} \mathbb{Z}[\phi_\alpha], & m = p, \\ 0, & m \neq p. \end{cases} \end{aligned} \quad (14.3)$$

Untuk $p = 0$, rumus itu dibaca sebagai $H_0(X^{(0)}) \cong \bigoplus_{\alpha \in I_0} \mathbb{Z}[\phi_\alpha]$. Eksakitas barisan pasangan $(X^{(n-1)}, X^{(n-2)})$ memberi $\delta_{n-1}\rho_{n-1} = 0$. Karena itu, untuk $n \geq 2$,

$$d_{n-1}d_n = \rho_{n-2}\delta_{n-1}\rho_{n-1}\delta_n = 0.$$

Untuk $n = 1$, persamaan yang diperlukan langsung mengikuti dari $d_0 = 0$.

Filtrasi kerangka. Barisan eksak panjang semua pasangan kerangka membentuk kopel eksak

$$D_{p,q}^1 = H_{p+q}(X^{(p)}), \quad E_{p,q}^1 = H_{p+q}(X^{(p)}, X^{(p-1)}).$$

Diferensial turunannya ialah

$$d^1: E_{p,q}^1 \longrightarrow E_{p-1,q}^1.$$

Menurut (14.3), $E_{p,q}^1 = 0$ untuk $q \neq 0$, sedangkan pada baris $q = 0$,

$$E_{p,0}^1 = C_p^{\text{CW}}(X), \quad d^1 = d_p.$$

Jadi $E_{p,0}^2 = H_p(C_p^{\text{CW}}(X))$, dan tidak ada diferensial lebih tinggi yang dapat masuk atau keluar dari satu-satunya baris tak nol. Filtrasi menyapu habis rantai singular karena dukungan setiap rantai termuat dalam subkompleks hingga; perbaikan FOM-PR-13 memberi stabilisasi pada setiap derajat.

Identifikasi tepi secara eksplisit. Tuliskan

$$\rho_n: H_n(X^{(n)}) \longrightarrow H_n(X^{(n)}, X^{(n-1)}) = C_n^{\text{CW}}(X).$$

Untuk $n \geq 1$, $H_n(X^{(n-1)}) = 0$, sehingga ρ_n injektif. Selain itu, $H_{n-1}(X^{(n-2)}) = 0$, sehingga ρ_{n-1} injektif. Eksakitas memberi

$$\ker d_n = \ker(\rho_{n-1}\delta_n) = \ker \delta_n = \text{im } \rho_n. \quad (14.4)$$

Untuk $n = 0$, rumus yang sama berlaku dengan $d_0 = 0$ dan ρ_0 identitas. Karena itu setiap siklus seluler c mempunyai tepat satu $a \in H_n(X^{(n)})$ dengan $\rho_n(a) = c$.

Bagian relevan dari barisan eksak panjang pasangan $(X^{(n+1)}, X^{(n)})$ ialah

$$C_{n+1}^{\text{CW}}(X) \xrightarrow{\delta_{n+1}} H_n(X^{(n)}) \longrightarrow H_n(X^{(n+1)}) \longrightarrow H_n(X^{(n+1)}, X^{(n)}).$$

Suku terakhir nol menurut (14.3). Karena $d_{n+1} = \rho_n \delta_{n+1}$, persamaan (14.4) mengidentifikasi batas seluler dengan $\rho_n(\text{im } \delta_{n+1})$. Maka

$$\begin{aligned} H_n(C_*^{\text{CW}}(X)) &= \frac{\ker d_n}{\text{im } d_{n+1}} \\ &\cong \frac{H_n(X^{(n)})}{\text{im } \delta_{n+1}} \\ &\cong H_n(X^{(n+1)}) \cong H_n(X). \end{aligned} \quad (14.5)$$

Isomorfisma terakhir adalah FOM-PR-13 karena $n+1 > n$. Secara konkret, jika $[c]$ adalah kelas homologi seluler dan $c = \rho_n(a)$, maka

$$\Theta_{X,n}([c]) = (X^{(n)} \hookrightarrow X)_*(a). \quad (14.6)$$

Jika c berubah sebesar $d_{n+1}(e)$, kelas a berubah sebesar $\delta_{n+1}(e)$, yang mati setelah dimasukkan ke $X^{(n+1)}$ lalu ke X . Eksakitas (14.5) menunjukkan bahwa hanya perubahan semacam itu yang mati. Jadi (14.6) terdefinisi dengan baik dan bijektif.

Kealamian. Jika $f: X \rightarrow Y$ seluler, maka peta pasangan memberi

$$f_p^{\text{CW}}: H_p(X^{(p)}, X^{(p-1)}) \longrightarrow H_p(Y^{(p)}, Y^{(p-1)}).$$

Kealamian pemetaan penghubung dan pemetaan pasangan menghasilkan diagram

$$\begin{array}{ccc} C_p^{\text{CW}}(X) & \xrightarrow{d_p^X} & C_{p-1}^{\text{CW}}(X) \\ \downarrow f_p^{\text{CW}} & & \downarrow f_{p-1}^{\text{CW}} \\ C_p^{\text{CW}}(Y) & \xrightarrow{d_p^Y} & C_{p-1}^{\text{CW}}(Y) \end{array}$$

yang komutatif. Jadi f_*^{CW} adalah peta rantai, dan (14.6) langsung memberi kealamian Θ . Jika f hanya kontinu, teorema pendekatan seluler memberi $f_{\text{sel}} \simeq f$. Dua pilihan pendekatan memberi peta homologi yang sama karena keduanya diidentifikasi dengan $H_n(f)$ melalui Θ . $\square$

Pemeriksaan perbaikan. Semua domain dan kodomain pada $d_n = \rho_{n-1} \delta_n$ cocok; persamaan $d^2 = 0$ berasal dari dua panah berurutan dalam barisan eksak; kasus derajat nol ditangani; dan identifikasi eksplisit (14.4)–(14.6) membuktikan konvergensi serta kealamian tanpa menyembunyikan asumsi keterhinggaan.

Catatan (rumus praktis untuk batas seluler). Misalkan

$$\varphi_\alpha: \partial D_\alpha^n \longrightarrow X^{(n-1)}$$

adalah peta pelekatan suatu sel- n . Untuk setiap sel- $(n-1)$ berindeks β , perhatikan komposit

$$\begin{aligned} S_\alpha^{n-1} &\cong \partial D_\alpha^n \xrightarrow{\varphi_\alpha} X^{(n-1)} \xrightarrow{q} X^{(n-1)}/X^{(n-2)} \\ &\cong \bigvee_\delta S_\delta^{n-1} \xrightarrow{p_\beta} \left(\bigvee_\delta S_\delta^{n-1} \right) / \left(\bigvee_{\delta \neq \beta} S_\delta^{n-1} \right) \cong S_\beta^{n-1}. \end{aligned}$$

Definisikan

$$\varphi_{\alpha\beta}: S_{\alpha}^{n-1} \longrightarrow S_{\beta}^{n-1}$$

sebagai komposit tersebut. Maka

$$\partial^{\text{CW}}([\phi_{\alpha}]) = \sum_{\beta} \deg(\varphi_{\alpha\beta})[\phi_{\beta}].$$

Koreksi indeks hasil bagi dan dimensi komposit. Pada baris 3653–3654, sumber mengulang S_{β}^{n-1} pada semua suku yang diruntuhkan; suku yang benar adalah S_{δ}^{n-1} untuk $\delta \neq \beta$. Baris 3657 mengetik $\varphi_{\alpha\beta}$ sebagai peta $S_{\alpha}^n \rightarrow S_{\beta}^n$, padahal semua peta dalam komposit berdimensi $n - 1$. Edisi memakai $\varphi_{\alpha\beta}: S_{\alpha}^{n-1} \rightarrow S_{\beta}^{n-1}$. Pola salah indeks yang sama muncul lagi pada baris 4117–4124 dan diperbaiki dengan cara yang sama.

37.3 Perbaikan FOM-PR-15: rumus bilangan insidensi

Teorema (rumus bilangan insidensi). Pilih orientasi pada setiap sel CW. Untuk $n \geq 1$ dan sel- n e_{α}^n , tuliskan

$$\Phi_{\alpha}: (D_{\alpha}^n, S_{\alpha}^{n-1}) \longrightarrow (X^{(n)}, X^{(n-1)})$$

untuk pemetaan karakteristik dan $\varphi_{\alpha} = \Phi_{\alpha}|_{S_{\alpha}^{n-1}}$ untuk peta pelekatannya. Bagi setiap sel- $(n - 1)$ e_{β}^{n-1} , bentuk

$$\varphi_{\alpha\beta}: S_{\alpha}^{n-1} \xrightarrow{\varphi_{\alpha}} X^{(n-1)} \xrightarrow{Q} X^{(n-1)}/X^{(n-2)} \cong \bigvee_{\delta \in I_{n-1}} S_{\delta}^{n-1} \xrightarrow{P_{\beta}} S_{\beta}^{n-1}, \quad (15.1)$$

dengan P_{β} meruntuhkan semua suku berindeks $\delta \neq \beta$. Untuk $n = 1$, hasil bagi pada (15.1) dibaca sebagai $X_{+}^{(0)}$, yakni $X^{(0)}$ dengan satu titik pangkal terpisah; derajat peta $S^0 \rightarrow S^0$ dibaca pada $\tilde{H}_0(S^0)$. Jika $[\Phi_{\alpha}]$ dan $[\Phi_{\beta}]$ adalah pembangkit yang ditentukan oleh orientasi, maka

$$d_n[\Phi_{\alpha}] = \sum_{\beta \in I_{n-1}} \deg(\varphi_{\alpha\beta})[\Phi_{\beta}]. \quad (15.2)$$

Hanya berhingga banyak suku pada (15.2) yang tak nol.

Bukti. Orientasikan $S_{\alpha}^{n-1} = \partial D_{\alpha}^n$ dengan konvensi normal-ke-luar lebih dahulu. Pembangkit yang bersesuaian adalah

$$[\Phi_{\alpha}] = (\Phi_{\alpha})_*[D_{\alpha}^n, S_{\alpha}^{n-1}] \in H_n(X^{(n)}, X^{(n-1)}).$$

Kealamian pemetaan penghubung bagi pemetaan pasangan Φ_{α} memberi

$$\delta_n[\Phi_{\alpha}] = (\varphi_{\alpha})_*[S_{\alpha}^{n-1}] \in H_{n-1}(X^{(n-1)}). \quad (15.3)$$

Tidak ada tanda tambahan karena orientasi batas sudah memakai konvensi tersebut. Terapkan

$$\rho_{n-1}: H_{n-1}(X^{(n-1)}) \longrightarrow H_{n-1}(X^{(n-1)}, X^{(n-2)}).$$

Di bawah isomorfisma hasil bagi dan pemisahan menurut suku baji,

$$\kappa: H_{n-1}(X^{(n-1)}, X^{(n-2)}) \xrightarrow{\cong} \bigoplus_{\beta \in I_{n-1}} \tilde{H}_{n-1}(S_\beta^{n-1}), \quad (15.4)$$

pemetaan ρ_{n-1} menjadi pemetaan yang diinduksi Q . Pilih orientasi sel- $(n-1)$ ke- β sehingga $\kappa([\Phi_\beta]) = [S_\beta^{n-1}]$ pada komponen ke- β . Proyeksi koordinat ke- β memberi

$$\begin{aligned} \text{pr}_\beta(\kappa\rho_{n-1}\delta_n[\Phi_\alpha]) &= (P_\beta Q\varphi_\alpha)_*[S_\alpha^{n-1}] \\ &= (\varphi_{\alpha\beta})_*[S_\alpha^{n-1}] \\ &= \deg(\varphi_{\alpha\beta})[S_\beta^{n-1}]. \end{aligned} \quad (15.5)$$

Karena $d_n = \rho_{n-1}\delta_n$, penggabungan semua koordinat pada (15.5) memberi tepat (15.2).

Untuk $n = 1$, kelas fundamental tereduksi $S^0 = \partial D^1$ adalah selisih titik ujung positif dan negatif. Meruntuhkan semua simpul selain β mengirim selisih itu ke $\deg(\varphi_{\alpha\beta})$ kali pembangkit $\tilde{H}_0(S^0)$, sehingga rumus yang sama memberi koefisien insidensi bertanda.

Citra kompak $\varphi_\alpha(S_\alpha^{n-1})$ termuat dalam suatu subkompleks hingga. Di luar subkompleks itu, komposit $P_\beta Q\varphi_\alpha$ konstan dan berderajat nol. Jadi jumlah (15.2) mempunyai dukungan hingga. $\square$

Pemeriksaan perbaikan. Domain dan kodomain (15.1) sama-sama sfera berdimensi $n-1$; koefisien diturunkan dari pemetaan penghubung, proyeksi hasil bagi, dan pilihan orientasi; kasus $n = 1$ serta keterhinggaan jumlah diperiksa tersendiri.

Catatan (notasi batas). Sebelumnya kita memakai d_n dan ∂_n^{CW} secara bergantian untuk menyatakan pemetaan batas kompleks rantai seluler. Mulai sekarang, demi singkatnya, kita hanya memakai d_n .

Catatan (ringkasan perhitungan). Untuk menghitung homologi seluler suatu ruang, fakta yang perlu diingat adalah

$$C_n^{\text{CW}}(X) = \bigoplus_\alpha \mathbb{Z}[\phi_\alpha],$$

dengan ϕ_α pemetaan karakteristik sel- n , dan pemetaan batas diberikan oleh

$$d_n([\phi_\alpha]) = \sum_\beta \deg(\varphi_{\alpha\beta})[\phi_\beta].$$

Contoh (homologi sfera). Misalkan $X = S^n$ dengan $n \geq 2$. Seperti pada [struktur CW sfera dengan satu sel- \$n\$](#) , kita dapat membangun X hanya dengan satu sel-0 dan satu sel- n . Kompleks rantai selulernya berbentuk

$$\cdots \longrightarrow 0 \xrightarrow{d_{n+1}} \mathbb{Z} \xrightarrow{d_n} 0 \xrightarrow{d_{n-1}} \cdots \xrightarrow{d_2} 0 \xrightarrow{d_1} \mathbb{Z} \xrightarrow{d_0} 0.$$

Diagram semantik. Satu salinan $\mathbb{Z}$ berada pada derajat n dan satu lagi pada derajat 0; semua grup pada derajat lain adalah nol.

Kita bahkan tidak perlu menghitung pemetaan batas, sebab semuanya merupakan homomorfisma nol. Teorema homologi seluler memberi

$$H_k(S^n) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = 0 \text{ atau } k = n, \\ 0, & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Contoh (homologi ruang projektif kompleks). Misalkan

$$X = \mathbb{CP}^n = (\mathbb{C}^{n+1} \setminus \{0\}) / (x \sim \lambda x), \quad 0 \neq \lambda \in \mathbb{C}.$$

Dari [struktur CW ruang projektif kompleks](#), kita mengetahui bahwa X mempunyai satu sel- i untuk setiap $i = 2k$ dengan $0 \leq k \leq n$. Kompleks rantai selulernya ialah


$$\cdots \longrightarrow 0 \xrightarrow{d_{2n+1}} \mathbb{Z} \xrightarrow{d_{2n}} 0 \xrightarrow{d_{2n-1}} \cdots \xrightarrow{d_3} \mathbb{Z} \xrightarrow{d_2} 0 \xrightarrow{d_1} \mathbb{Z} \xrightarrow{d_0} 0.$$

Diagram semantik. Ada satu salinan $\mathbb{Z}$ tepat pada setiap derajat genap $0, 2, \dots, 2n$ dan grup nol pada setiap derajat ganjil.

Karena itu

$$H_t(\mathbb{CP}^n) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & t \leq 2n \text{ dan } t \text{ genap,} \\ \{0\}, & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Contoh (homologi torus). Perhatikan [struktur CW torus \$T^2\$](#) yang telah kita lihat sebelumnya.



Gambar 17: Poligon seluler torus berupa persegi: sisi tegak berlabel a dan berarah ke atas, sisi mendatar berlabel b dan berarah ke kanan, semua sudut diidentifikasi menjadi v , dan interiornya sel dua Delta.

Diagram semantik. Persegi fundamental mempunyai satu sel-2 terbuka Δ , dua sel-1 a, b , dan satu sel-0 v . Jika batas ditelusuri dengan orientasi positif, kata pelekatannya

$$aba^{-1}b^{-1}.$$

Label dan panah memuat seluruh informasi matematis; warna hanya membantu membedakan pasangan sisi. Master SVG aksesibel dipertahankan bersama PNG.

Kompleks rantai selulernya berbentuk

$$\cdots \xrightarrow{d_4} 0 \xrightarrow{d_3} \mathbb{Z}\Delta \xrightarrow{d_2} \mathbb{Z}a \oplus \mathbb{Z}b \xrightarrow{d_1} \mathbb{Z}v \xrightarrow{d_0} 0.$$

Diagram semantik. Pembangkit Δ , a , b , dan v masing-masing berada pada derajat 2, 1, dan 0.

Kedua sel-1 a dan b adalah gelung yang kedua titik ujungnya melekat pada simpul tunggal v . Definisi batas sel-1 karena itu langsung memberi

$$d_1(a) = v - v = 0, \quad d_1(b) = v - v = 0.$$

Jadi satu-satunya homomorfisma yang mungkin bukan nol adalah d_2 . Rumus batas memberi

$$d_2(\Delta) = \deg(\varphi_{\Delta a})a + \deg(\varphi_{\Delta b})b.$$

Untuk koefisien pertama, perhatikan komposit

$$\varphi_{\Delta a}: \partial D_{\Delta}^2 \xrightarrow{\varphi_{\Delta}} X^{(1)} \cong S_a^1 \vee S_b^1 \xrightarrow{p_a} S_a^1.$$

Diagram semantik. Peta pelekatan membaca $aba^{-1}b^{-1}$ pada baji dua lingkaran. Proyeksi p_a meruntuhkan lingkaran b ke titik baji, sehingga lintasan hasilnya membaca aa^{-1} pada S_a^1 .

Peta $\varphi_{\Delta a}: S^1 \rightarrow S^1$ mengirim batas D_{Δ}^2 ke gelung yang homotopik dengan gelung konstan:

$$aba^{-1}b^{-1} \xrightarrow{p_a} aa^{-1} \simeq *.$$

Diagram semantik. Satu penelusuran a segera diikuti penelusuran a pada arah berlawanan. Homotopi menciutkan pasangan lintasan itu ke titik basis.

Jadi $\varphi_{\Delta a}$ homotopik-nol dan $\deg(\varphi_{\Delta a}) = 0$. Dengan alasan yang sama, $\varphi_{\Delta b}$ homotopik-nol dan $\deg(\varphi_{\Delta b}) = 0$. Semua homomorfisma batas nol, sehingga

$$H_k(T^2) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = 0 \text{ atau } k = 2, \\ \mathbb{Z}^2, & k = 1, \\ \{0\}, & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Contoh (homologi permukaan genus dua). Misalkan $\Sigma_2 = T \# T$ adalah permukaan kompak terorientasi bergenus dua. Berikut modelnya sebagai ruang hasil bagi.

Diagram semantik. Oktagon mempunyai satu sel-2 Δ , empat sel-1 a, b, c, d , dan satu sel-0 v . Jika panah dan urutan sisi sumber dibaca secara literal, kata batasnya—hingga pergeseran siklik—adalah

$$bab^{-1}a^{-1}cdc^{-1}d^{-1} = [b, a][c, d].$$


Gambar ulang edisi yang ditampilkan memakai presentasi standar

$$aba^{-1}b^{-1}cdc^{-1}d^{-1}.$$

Presentasi standar itu diperoleh dari kata sumber dengan menukar nama pembangkit a dan b pada pegangan pertama. Jadi gambar ini adalah model ekuivalen asli edisi, bukan salinan literal urutan sisi sumber. Kedua kata mempunyai jumlah eksponen nol untuk setiap pembangkit dan menentukan struktur satu-simpul, empat-sisi, satu-muka pada permukaan genus dua. Warna hanya membedakan pasangan sisi; label bertanda dan panah menentukan identifikasi. Master SVG aksesibel dipertahankan bersama PNG.

Semua delapan simpul diidentifikasi menjadi v . Kompleks rantai selulernya ialah

Σ_2 sebagai hasil bagi sebuah oktagon



Gambar 18: Model standar ekuivalen permukaan genus dua berupa oktagon dengan sisi berurutan a , b , a invers, b invers, c , d , c invers, d invers; semua delapan verteks diidentifikasi menjadi v dan interiornya sel dua Delta. Diagram ini adalah gambar asli edisi yang ekuivalen, bukan gambar ulang literal susunan sisi sumber.

$$\cdots \longrightarrow 0 \xrightarrow{d_3} \mathbb{Z}\Delta \xrightarrow{d_2} \mathbb{Z}a \oplus \mathbb{Z}b \oplus \mathbb{Z}c \oplus \mathbb{Z}d \xrightarrow{d_1} \mathbb{Z}v \xrightarrow{d_0} 0.$$

Diagram semantik. Peringkat grup rantai pada derajat 2, 1, 0 berturut-turut adalah 1, 4, 1, dengan pembangkit ditampilkan secara eksplisit.

Semua homomorfisma kecuali mungkin d_2 jelas nol. Seperti pada [contoh homologi torus](#), proyeksi peta pelekatan ke setiap lingkaran pembangkit menghasilkan satu penelusuran pada setiap arah:

$$\begin{aligned} p_a(bab^{-1}a^{-1}cdc^{-1}d^{-1}) &= aa^{-1} \simeq *, \\ p_b(bab^{-1}a^{-1}cdc^{-1}d^{-1}) &= bb^{-1} \simeq *, \\ p_c(bab^{-1}a^{-1}cdc^{-1}d^{-1}) &= cc^{-1} \simeq *, \\ p_d(bab^{-1}a^{-1}cdc^{-1}d^{-1}) &= dd^{-1} \simeq *. \end{aligned}$$

Diagram semantik. Setiap proyeksi meruntuhkan tiga lingkaran lain dan menyisakan sebuah gelung diikuti inversnya. Setiap peta hasil proyeksi homotopik-nol dan berderajat nol.

Karena keempat koefisien derajat nol, $d_2 = 0$. Maka

$$H_n(\Sigma_2) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & n = 0 \text{ atau } n = 2, \\ \mathbb{Z}^4, & n = 1, \\ \{0\}, & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Koreksi jenis objek pada peta yang homotopik-nol. Sumber menyebut peta-peta proyeksi torus dan permukaan genus dua sebagai “peta nol”. Dalam kategori ruang bertitik, kesimpulan yang benar ialah bahwa peta-peta itu homotopik dengan peta konstan. Yang bernilai nol secara aljabar adalah derajatnya dan, karenanya, koefisien-koefisien batas seluler.

Catatan. Argumen pada [contoh genus dua](#) tidak bergantung pada asumsi bahwa genusnya 2. Jadi, bagi permukaan kompak terorientasi bergenus g ,


$$\Sigma_g = \#^g T^2,$$

kita memperoleh

$$H_n(\Sigma_g) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & n = 0 \text{ atau } n = 2, \\ \mathbb{Z}^{2g}, & n = 1, \\ \{0\}, & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Contoh (homologi botol Klein). Tinjau botol Klein K dengan struktur CW berikut.

Botol Klein: model b^2a^2 dari sumber



$$\partial\Delta = bbaa = b^2a^2; \text{ koefisien } a \text{ dan } b \text{ masing-masing } 2$$

Model ini setara dengan model persegi standar melalui pemotongan diagonal.

Gambar 19: Model poligon botol Klein dari sumber berupa persegi: sisi atas dan kanan berlabel b , sisi bawah dan kiri berlabel a , semua sudut diidentifikasi, dan kata batasnya b kuadrat a kuadrat.

Diagram semantik. Model persegi yang dipakai sumber mempunyai satu sel-2 Δ , dua sel-1 a, b , dan satu sel-0 v . Dengan titik awal dan orientasi yang ditampilkan, kata pelekatnya adalah

$$b^2a^2.$$

Setiap huruf karena itu mempunyai jumlah eksponen 2. Model ini bukan model persegi berhadapan yang paling lazim, tetapi menyatakan struktur CW yang ekuivalen. Master SVG aksesibel dipertahankan bersama PNG.

Model yang lebih lazim dapat diperoleh dengan memotong sepanjang antidiagonal lalu merekatkan kembali sepanjang sisi a . Dari model sumber kita memperoleh

$$\cdots \longrightarrow 0 \xrightarrow{d_3} \mathbb{Z}\Delta \xrightarrow{d_2} \mathbb{Z}a \oplus \mathbb{Z}b \xrightarrow{d_1} \mathbb{Z}v \xrightarrow{d_0} 0.$$

Diagram semantik. Pembangkit Δ, a, b , dan v berada pada derajat 2, 1, 0; hanya d_2 yang mungkin tak nol.

Untuk komponen pada a , kita mempunyai

$$\varphi_{\Delta a}: \partial D_{\Delta}^2 \xrightarrow{\varphi_{\Delta}} X^{(1)} \cong S_a^1 \vee S_b^1 \xrightarrow{p_a} S_a^1.$$

Diagram semantik. Proyeksi p_a mempertahankan lingkaran a dan meruntuhkan lingkaran b ke titik pangkal. Domain, kedua peta, suku baji yang diruntuhkan, dan kodomain ditampilkan dalam urutan baca.

Pada lintasan batas,

$$\begin{aligned} p_a(b^2 a^2) &= a^2 \simeq (z \mapsto z^2), & \deg(\varphi_{\Delta a}) &= 2, \\ p_b(b^2 a^2) &= b^2 \simeq (z \mapsto z^2), & \deg(\varphi_{\Delta b}) &= 2. \end{aligned}$$

Diagram semantik. Setelah faktor lain diruntuhkan, dua ruas dengan label yang dipertahankan mempunyai orientasi sama. Lingkaran batas menelusuri lingkaran sasaran dua kali, sehingga peta berderajat 2.

Maka

$$d_2(\Delta) = 2a + 2b = 2(a + b).$$

Satu-satunya kelompok homologi taktrivial yang masih perlu dihitung ialah

$$\begin{aligned} H_1(K) &= \frac{\ker d_1}{\operatorname{im} d_2} = \frac{\mathbb{Z}a \oplus \mathbb{Z}b}{\mathbb{Z}(2(a + b))} \\ &= \langle a, a + b \mid 2(a + b) \rangle \\ &\cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Dengan demikian,

$$H_n(K) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & n = 0, \\ \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, & n = 1, \\ \{0\}, & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Koreksi koefisien kedua. Baris 4074 mengulang $\deg(\varphi_{\Delta a}) = 2$, padahal koefisien kedua harus merujuk kepada $\varphi_{\Delta b}$. Kedua jumlah eksponen pada kata sumber $b^2 a^2$ adalah 2, sehingga edisi menulis kedua koefisien secara terpisah dan mempertahankan $d_2(\Delta) = 2(a + b)$.

Normalisasi simbol bilangan bulat. Baris 4086 memakai huruf biasa Z untuk suku bebas terakhir. Edisi menormalkannya menjadi $\mathbb{Z}$ tanpa mengubah grup.

Klarifikasi batas sel fundamental. Sumber menyebut domain peta sebagai “batas botol Klein”. Botol Klein adalah permukaan tertutup dan tidak mempunyai batas. Domain yang dimaksud adalah batas sel-2 fundamental, $\partial D_{\Delta}^2 \cong S^1$. Edisi memakai objek yang bertipe benar tanpa mengubah peta pelekatan.

Contoh (homologi ruang projektif real). Ambil $X = \mathbb{RP}^n$. Ruang ini mempunyai struktur CW dengan satu sel- i pada setiap dimensi $0 \leq i \leq n$. Kompleks rantai selulernya berbentuk

$$\cdots \xrightarrow{d_{n+2}} 0 \xrightarrow{d_{n+1}} \mathbb{Z} \xrightarrow{d_n} \cdots \xrightarrow{d_2} \mathbb{Z} \xrightarrow{d_1} \mathbb{Z} \xrightarrow{d_0} 0.$$

Diagram semantik. Ada satu salinan $\mathbb{Z}$ pada setiap derajat $0, \dots, n$. Perhitungan di bawah menunjukkan bahwa d_k adalah perkalian dengan 2 untuk k genap dan homomorfisma nol untuk k ganjil.

Untuk satu-satunya sel- n Δ_n dan sel- $(n-1)$ Δ_{n-1} , komponen peta pelekatan ialah

$$\varphi_{\Delta_n \Delta_{n-1}} : S^{n-1} \cong \partial D^n \xrightarrow{\varphi_{\Delta_n}} \mathbb{RP}^{n-1} \xrightarrow{q} \mathbb{RP}^{n-1} / \mathbb{RP}^{n-2} \cong S^{n-1}.$$

Rumus insidensi memberi

$$d_n([\phi_{\Delta_n}]) = \deg(\varphi_{\Delta_n \Delta_{n-1}})[\phi_{\Delta_{n-1}}].$$

Peta pelekatan

$$\varphi_{\Delta_n} : S^{n-1} \longrightarrow S^{n-1} / (x \sim -x) \cong \mathbb{RP}^{n-1}$$

adalah peta penutup ganda kanonis dari S^{n-1} ke $\mathbb{RP}^{n-1}$. Gunakan [rumus derajat lokal-ke-global](#). Pilih $y \in S^{n-1}$ yang tidak berada pada khatulistiwa. Maka

$$\varphi_{\Delta_n \Delta_{n-1}}^{-1}(y) = \{x, -x\}$$

untuk suatu $x \in S^{n-1}$. Kontribusi lokal pada x adalah 1, sedangkan kontribusi pada $-x$ berbeda melalui peta antipodal pada S^{n-1} , yang berderajat $(-1)^n$. Jadi

$$\deg(\varphi_{\Delta_n \Delta_{n-1}}) = 1 + (-1)^n = \begin{cases} 2, & n \text{ genap}, \\ 0, & n \text{ ganjil}. \end{cases}$$

Dengan kata lain, d_n adalah perkalian dengan 2 ketika n genap dan homomorfisma nol ketika n ganjil. Akibatnya, jika n ganjil,

$$H_k(\mathbb{RP}^n) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = 0 \text{ atau } k = n, \\ \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, & 0 < k < n \text{ dan } k \text{ ganjil}, \\ \{0\}, & \text{selain itu}, \end{cases}$$

sedangkan jika n genap,

$$H_k(\mathbb{RP}^n) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = 0, \\ \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, & 0 < k < n \text{ dan } k \text{ ganjil}, \\ \{0\}, & \text{selain itu}. \end{cases}$$

Koreksi dimensi prapeta. Baris 4149 menempatkan x di S^1 , padahal peta aktif berdomain S^{n-1} . Edisi memakai $x \in S^{n-1}$ dan mempertahankan kedua prapeta antipodal $\{x, -x\}$.

Koreksi tipe aljabar. Setelah menghitung derajat peta sfera, sumber menulis $\deg(d_n)$, tetapi d_n adalah homomorfisma grup rantai, bukan peta antarmanifold berorientasi. Edisi menyatakan bahwa peta sfera mempunyai derajat $1 + (-1)^n$; akibatnya d_n adalah perkalian dengan 2 untuk n genap dan homomorfisma nol untuk n ganjil.

37.4 Pemeriksaan penguasaan

Enam pemeriksaan berikut merupakan materi asli edisi ini. Masing-masing memuat petunjuk dan solusi lengkap agar dapat dipakai untuk belajar mandiri. Tidak ada soal yang disalin dari bank soal Fomberg terpisah.

Pemeriksaan Penguasaan F7.1 (membangun kompleks rantai seluler). Mulailah dengan baji dua lingkaran

$$X^{(1)} = S_a^1 \vee S_b^1$$

yang mempunyai satu sel-0 v dan dua sel-1 berorientasi a, b . Lekatkan dua sel-2 p, q dengan kata pelekatan

$$w_p = a^2b^{-1}, \quad w_q = ab^2.$$

Tidak ada sel berdimensi lebih tinggi.

1. Tuliskan $C_n^{\text{CW}}(X)$ beserta basisnya untuk setiap n .
2. Hitung matriks d_2 terhadap basis terurut (p, q) pada domain dan (a, b) pada kodomain. Jelaskan hubungan koefisien matriks dengan derajat peta insidensi.
3. Hitung d_1 dan periksa $d_1d_2 = 0$.
4. Tentukan semua grup homologi integral $H_n(X; \mathbb{Z})$ dengan mereduksi matriks d_2 ke bentuk normal Smith.

Petunjuk. Setelah semua lingkaran selain a diruntuhkan, derajat peta $S^1 \rightarrow S_a^1$ adalah jumlah eksponen a dalam kata pelekatan; demikian pula untuk b . Untuk bentuk normal Smith, tukarkan kedua kolom, lalu gunakan operasi baris dan kolom unimodular.

Solusi Pemeriksaan F7.1. Satu sel-0, dua sel-1, dan dua sel-2 memberi

$$C_2^{\text{CW}}(X) = \mathbb{Z}\langle p, q \rangle, \quad C_1^{\text{CW}}(X) = \mathbb{Z}\langle a, b \rangle, \quad C_0^{\text{CW}}(X) = \mathbb{Z}\langle v \rangle,$$

sedangkan $C_n^{\text{CW}}(X) = 0$ untuk $n \notin \{0, 1, 2\}$. Koefisien insidensi sebuah sel-2 terhadap sel-1 ialah derajat komposisi

$$S^1 \xrightarrow{\varphi} X^{(1)} \longrightarrow X^{(1)}/(X^{(1)} \setminus e^1) \cong S^1.$$

Pada baji lingkaran, derajat itu adalah jumlah eksponen huruf yang bersangkutan. Karena

$$\begin{array}{c|cc} & a & b \\ \hline w_p = a^2b^{-1} & 2 & -1 \\ w_q = ab^2 & 1 & 2 \end{array},$$

kita memperoleh

$$d_2(p) = 2a - b, \quad d_2(q) = a + 2b, \quad [d_2]_{(a,b) \leftarrow (p,q)} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Kedua ujung setiap sel-1 melekat pada simpul yang sama, sehingga $d_1(a) = d_1(b) = v - v = 0$ dan $d_1d_2 = 0$. Operasi unimodular memberi

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

Determinan matriks semula adalah 5, jadi d_2 injektif dan $\ker d_2 = 0$. Bentuk normal Smith menunjukkan

$$\text{coker } d_2 \cong \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}.$$

Akibatnya

$$H_n(X; \mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & n = 0, \\ \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}, & n = 1, \\ 0, & n \geq 2. \end{cases}$$

Pemeriksaan Penguasaan F7.2 (lema kerangka). Misalkan X kompleks CW berdimensi hingga dan $X^{(m)}$ adalah m -kerangkanya. Gunakan

$$H_j(X^{(m)}, X^{(m-1)}) \cong \begin{cases} \bigoplus_{e_\alpha^m} \mathbb{Z}[e_\alpha^m], & j = m, \\ 0, & j \neq m, \end{cases}$$

bersama barisan eksak panjang pasangan untuk membuktikan:

1. $H_k(X^{(n)}) = 0$ untuk $k > n$;
2. inklusi $X^{(n)} \hookrightarrow X$ menginduksi isomorfisma pada H_k untuk $k < n$ dan epimorfisma pada H_n ;
3. epimorfisma pada derajat n tidak selalu merupakan isomorfisma. Berikan satu contoh CW eksplisit.

Terakhir, jelaskan bagaimana argumen meluas ke kompleks CW berdimensi tak hingga.

Petunjuk. Untuk pasangan $(X^{(m)}, X^{(m-1)})$, lihat suku-suku pada derajat $k+1, k, k-1$. Ketika sel- m dilekatkan, homologi derajat $k < m-1$ tidak berubah dan homologi derajat $m-1$ hanya dapat berkurang. Untuk contoh terakhir, lekatkan satu sel- $(n+1)$ pada S^n melalui peta identitas.

Solusi Pemeriksaan F7.2. Barisan eksak panjang pasangan memuat

$$H_{k+1}(X^{(m)}, X^{(m-1)}) \longrightarrow H_k(X^{(m-1)}) \longrightarrow H_k(X^{(m)}) \longrightarrow H_k(X^{(m)}, X^{(m-1)}).$$

Jika $k > m$, kedua grup relatif di ujung nol. Maka $H_k(X^{(m-1)}) \rightarrow H_k(X^{(m)})$ adalah isomorfisma. Mengulang proses sampai $X^{(0)}$ memberi

$$H_k(X^{(m)}) \cong H_k(X^{(0)}) = 0 \quad (k > m).$$

Sekarang tetapkan n . Pada langkah $X^{(n)} \hookrightarrow X^{(n+1)}$, grup relatif hanya mungkin tak nol pada derajat $n+1$. Karena itu inklusi merupakan isomorfisma pada H_k untuk $k < n$ dan epimorfisma pada H_n . Pada setiap langkah selanjutnya $m > n+1$, kedua grup relatif yang mengapit H_k lenyap untuk $k \leq n$. Komposisi memberi

$$H_k(X^{(n)}) \xrightarrow{\cong} H_k(X) \quad (k < n), \quad H_n(X^{(n)}) \twoheadrightarrow H_n(X).$$

Epimorfisma terakhir dapat mempunyai kernel. Ambil $X^{(n)} = S^n$ dan lekatkan satu sel- $(n+1)$ melalui peta identitas $S^n \rightarrow S^n$. Ruang hasilnya D^{n+1} , sehingga

$$H_n(X^{(n)}) \cong \mathbb{Z}, \quad H_n(X) = 0.$$

Untuk kompleks CW berdimensi tak hingga, dukungannya setiap rantai singular kompak dan termuat dalam subkompleks hingga. Dengan mengambil limit terarah atas subkompleks hingga, argumen yang sama berlaku pada setiap derajat tetap.

Pemeriksaan Penguasaan F7.3 (rumus insidensi dan perubahan orientasi). Sebuah kompleks CW Y mempunyai satu sel-0, tiga sel-1 berorientasi e_1, e_2, e_3 , serta dua sel-2 berorientasi x_1, x_2 . Kata pelekatannya adalah

$$w_{x_1} = e_1 e_3^{-1}, \quad w_{x_2} = e_1^{-2} e_2^3 e_3.$$

1. Hitung matriks d_2 terhadap basis (x_1, x_2) dan (e_1, e_2, e_3) .
2. Balik orientasi x_1 dan e_2 tanpa mengubah orientasi sel lain. Hitung matriks baru sebagai perkalian matriks tanda di kiri dan kanan.
3. Buktikan bahwa perubahan orientasi sel tidak mengubah homologi seluler.
4. Hitung $H_2(Y)$ dan $H_1(Y)$ sebelum maupun sesudah perubahan.

Petunjuk. Meruntuhkan semua sel-1 kecuali e_i mengubah kata pelekatan menjadi peta $S^1 \rightarrow S^1_{e_i}$; derajatnya adalah jumlah eksponen e_i . Membalik orientasi sel domain mengalikan satu kolom dengan -1 , sedangkan membalik orientasi sel kodomain mengalikan satu baris dengan -1 .

Solusi Pemeriksaan F7.3. Jumlah eksponen pada kedua kata ialah

$$x_1 : (1, 0, -1), \quad x_2 : (-2, 3, 1).$$

Dengan baris (e_1, e_2, e_3) dan kolom (x_1, x_2) ,

$$A = [d_2] = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Tuliskan basis baru $x'_1 = -x_1$, $x'_2 = x_2$ dan $e'_1 = e_1$, $e'_2 = -e_2$, $e'_3 = e_3$. Maka

$$A' = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_P A \underbrace{\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_Q = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 0 & -3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Matriks P, Q unimodular. Secara abstrak, pembalikan orientasi hanya mengganti basis bebas grup rantai; isomorfisma rantai membawa kernel ke kernel dan citra ke citra, sehingga homologi tidak berubah.

Karena hanya ada satu simpul, $d_1 = 0$. Kedua kolom A bebas linear, maka $H_2(Y) = 0$. FPB semua entri adalah 1 dan FPB semua minor dua-kali-dua adalah

$$\gcd(3, -1, 3) = 1.$$

Bentuk normal Smith mempunyai dua entri diagonal 1, 1, sehingga

$$H_1(Y) = \mathbb{Z}^3 / \text{im } A \cong \mathbb{Z}.$$

Matriks $A' = PAQ$ mempunyai bentuk normal Smith yang sama.

Pemeriksaan Penguasaan F7.4 (torus dan permukaan genus- g). Untuk $g \geq 1$, berikan Σ_g struktur CW dengan satu sel-0 v , sel-1

$$a_1, b_1, \dots, a_g, b_g,$$

dan satu sel-2 Δ yang dilekatkan melalui

$$w_g = \prod_{i=1}^g [a_i, b_i], \quad [a_i, b_i] = a_i b_i a_i^{-1} b_i^{-1}.$$

1. Tuliskan seluruh kompleks rantai seluler dan kedua matriks batas.
2. Hitung $H_n(\Sigma_g; \mathbb{Z})$ untuk semua n .
3. Khususkan jawaban pada $g = 1$ untuk memperoleh homologi torus.
4. Periksa dengan karakteristik Euler dan jelaskan bagaimana H_1 membedakan genus.

Petunjuk. Setiap a_i dan b_i muncul sekali dengan eksponen $+1$ dan sekali dengan eksponen -1 . Semua sel-1 berawal dan berakhir di v , sehingga $d_1 = 0$.

Solusi Pemeriksaan F7.4. Grup rantainya adalah

$$0 \longrightarrow C_2 = \mathbb{Z}\langle \Delta \rangle \xrightarrow{d_2} C_1 = \bigoplus_{i=1}^g (\mathbb{Z}\langle a_i \rangle \oplus \mathbb{Z}\langle b_i \rangle) \xrightarrow{d_1} C_0 = \mathbb{Z}\langle v \rangle \longrightarrow 0.$$

Matriks d_1 adalah matriks nol berukuran $1 \times 2g$. Semua jumlah eksponen dalam w_g nol, sehingga

$$[d_2]_{(a_1, b_1, \dots, a_g, b_g) \leftarrow (\Delta)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}_{2g \times 1}.$$

Jadi

$$H_n(\Sigma_g; \mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & n = 0, 2, \\ \mathbb{Z}^{2g}, & n = 1, \\ 0, & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Untuk $g = 1$, diperoleh

$$H_0(T^2) = \mathbb{Z}, \quad H_1(T^2) = \mathbb{Z}^2, \quad H_2(T^2) = \mathbb{Z}.$$

Hitungan sel dan peringkat homologi sama-sama memberi

$$\chi(\Sigma_g) = 1 - 2g + 1 = 2 - 2g.$$

Selain itu, rank $H_1(\Sigma_g) = 2g$, sehingga genus adalah setengah peringkat H_1 .

Pemeriksaan Penguasaan F7.5 (botol Klein dan poligon sumber). Pertahankan struktur CW poligon sumber: botol Klein K mempunyai satu sel-0 v_0 , dua sel-1 berorientasi a, b , dan satu sel-2 Δ . Jika batas persegi ditelusuri mengikuti panah sumber, kata pelekatannya siklik ekuivalen dengan

$$w_{\text{sumber}} = b^2 a^2$$

atau inversnya jika orientasi Δ dibalik.

1. Hitung kolom d_2 dari jumlah eksponen a, b dan jelaskan pengaruh pembalikan orientasi Δ .
2. Hitung $H_2(K; \mathbb{Z})$, $H_1(K; \mathbb{Z})$, dan $H_0(K; \mathbb{Z})$ dengan menampilkan kernel dan citra.
3. Lakukan perubahan basis unimodular $u = a$, $s = a + b$, lalu tuliskan d_2 dan H_1 dalam basis (u, s) .
4. Bandingkan dengan dekomposisi persegi berhadapan yang lebih lazim, dengan pembangkit x, y dan kata $xyx^{-1}y$. Bangun isomorfisma eksplisit kompleks rantai dan jelaskan perubahan presentasi grupnya.

Petunjuk. Pada $b^2 a^2$, jumlah eksponen kedua huruf adalah 2. Karena $b = s - u$, vektor $2a + 2b$ menjadi $2s$. Untuk dekomposisi standar, d_2 mengirim pembangkit sel-2 ke $2y$. Pada tingkat grup, coba $x = a$ dan $y = a^{-1}b^{-1}$; perhatikan konjugasi siklik dan inversi relator secara terpisah.

Solusi Pemeriksaan F7.5. Kompleks rantainya ialah

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}\langle\Delta\rangle \xrightarrow{d_2} \mathbb{Z}\langle a\rangle \oplus \mathbb{Z}\langle b\rangle \xrightarrow{d_1} \mathbb{Z}\langle v_0\rangle \longrightarrow 0.$$

Karena a, b adalah gelung pada v_0 , $d_1 = 0$. Dari kata poligon sumber,

$$\exp_a(b^2 a^2) = 2, \quad \exp_b(b^2 a^2) = 2,$$

sehingga

$$d_2(\Delta) = 2a + 2b = 2(a + b), \quad [d_2]_{(a,b) \leftarrow (\Delta)} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Pembalikan orientasi Δ mengalikan seluruh kolom dengan -1 tanpa mengubah kernel atau citranya. Dengan demikian,

$$\ker d_2 = 0, \quad \text{im } d_2 = \mathbb{Z}(2, 2), \quad \ker d_1 = \mathbb{Z}^2.$$

Maka

$$H_2(K) = 0, \quad H_1(K) = \frac{\mathbb{Z}a \oplus \mathbb{Z}b}{\langle 2(a + b) \rangle}, \quad H_0(K) = \mathbb{Z}.$$

Basis $u = a$, $s = a + b$ mempunyai matriks perubahan

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det U = 1.$$

Karena $b = s - u$,

$$d_2(\Delta) = 2u + 2(s - u) = 2s,$$

dan

$$H_1(K) \cong \frac{\mathbb{Z}u \oplus \mathbb{Z}s}{\langle 2s \rangle} \cong \mathbb{Z}\langle u \rangle \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\langle s \rangle.$$

Untuk dekomposisi standar dengan kata $xyx^{-1}y$, jumlah eksponennya adalah $(0, 2)$, sehingga $d_2^{\text{std}}(\Delta_{\text{std}}) = 2y$. Satu isomorfisma langsung antar-kompleks rantai adalah

$$F_0(v_{\text{std}}) = v_0, \quad F_1(x) = u, \quad F_1(y) = s, \quad F_2(\Delta_{\text{std}}) = \Delta.$$

Memang,

$$F_1 d_2^{\text{std}}(\Delta_{\text{std}}) = 2s = d_2 F_2(\Delta_{\text{std}}).$$

Perbandingan presentasi grup memakai perubahan pembangkit yang berbeda. Tetapkan

$$x = a, \quad y = a^{-1}b^{-1};$$

perubahan ini invertibel karena $a = x$ dan $b = y^{-1}x^{-1}$. Relator standar berubah menjadi

$$xyx^{-1}y = b^{-1}a^{-2}b^{-1},$$

yang merupakan konjugat siklik dari $(b^2a^2)^{-1}$, bukan pada umumnya relator dalam kelas konjugasi yang sama dengan b^2a^2 . Konjugasi dan inversi tidak mengubah penutup normal suatu relator, sehingga kedua presentasi tetap memberi grup isomorfik.

Pada abelianisasi, perubahan pembangkit grup itu menginduksi

$$F_1(x) = u, \quad F_1(y) = -s.$$

Agar menjadi peta rantai, pilih pula $F_2(\Delta_{\text{std}}) = -\Delta$; lalu

$$F_1(2y) = -2s = d_2(-\Delta).$$

Ini adalah isomorfisma rantai kedua yang diinduksi perubahan pembangkit grup. Ia sengaja dibedakan dari isomorfisma langsung $F_1(y) = s$, $F_2(\Delta_{\text{std}}) = \Delta$ di atas.

Pemeriksaan Penguasaan F7.6 (alternasi batas dan homologi $\mathbb{RP}^n$). Berikan $\mathbb{RP}^n$ struktur CW standar dengan satu sel e^k dalam setiap dimensi $0 \leq k \leq n$.

1. Tunjukkan bahwa $d_k: C_k \rightarrow C_{k-1}$ adalah perkalian dengan $1 + (-1)^k$, yakni $d_k = 0$ untuk k ganjil dan $d_k = 2$ untuk k genap.
2. Hitung $H_j(\mathbb{RP}^n; \mathbb{Z})$ dan pisahkan kasus n ganjil dari n genap.
3. Tuliskan kompleks rantai dan homologi secara eksplisit bagi $\mathbb{RP}^4$ dan $\mathbb{RP}^5$.

Petunjuk. Setelah $\mathbb{RP}^{k-2}$ diruntuhkan, dua belahan sfera batas sel- k memetakan ke S^{k-1} . Kontribusi derajatnya adalah 1 dan derajat peta antipodal pada S^{k-1} , yaitu $(-1)^k$. Pada $0 < j < n$, hitung $\ker d_j / \text{im } d_{j+1}$; pada derajat teratas tidak ada citra dari atas.

Solusi Pemeriksaan F7.6. Peta pelekatan sel- k adalah penutup ganda

$$S^{k-1} \longrightarrow \mathbb{RP}^{k-1}.$$

Setelah $\mathbb{RP}^{k-2}$ diruntuhkan, peta insidensi $S^{k-1} \rightarrow S^{k-1}$ mempunyai dua lembar lokal. Pilih orientasi agar lembar pertama berderajat 1. Lembar kedua berbeda melalui peta antipodal pada S^{k-1} , yang berderajat

$$(-1)^{(k-1)+1} = (-1)^k.$$

Jadi

$$d_k = 1 + (-1)^k = \begin{cases} 0, & k \text{ ganjil,} \\ 2, & k \text{ genap.} \end{cases}$$

Kompleks rantainya berupa satu salinan $\mathbb{Z}$ pada setiap derajat $0, \dots, n$, dengan panah yang berselang-seling. Untuk $0 < j < n$, jika j ganjil maka $\ker d_j = \mathbb{Z}$ dan $\text{im } d_{j+1} = 2\mathbb{Z}$, sehingga $H_j \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Jika j genap, d_j injektif. Pada dimensi teratas, $H_n = \ker d_n$ bernilai $\mathbb{Z}$ bila n ganjil dan nol bila n genap. Jadi

$$H_j(\mathbb{RP}^n; \mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & j = 0, \\ \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, & 0 < j < n \text{ dan } j \text{ ganjil,} \\ \mathbb{Z}, & j = n \text{ dan } n \text{ ganjil,} \\ 0, & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Untuk $\mathbb{RP}^4$,

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \longrightarrow 0,$$

sehingga

$$H_0 = \mathbb{Z}, \quad H_1 = \mathbb{Z}/2, \quad H_2 = 0, \quad H_3 = \mathbb{Z}/2, \quad H_4 = 0.$$

Untuk $\mathbb{RP}^5$,

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \longrightarrow 0,$$

sehingga

$$H_0 = \mathbb{Z}, \quad H_1 = \mathbb{Z}/2, \quad H_2 = 0, \quad H_3 = \mathbb{Z}/2, \quad H_4 = 0, \quad H_5 = \mathbb{Z}.$$

Batas sumber komponen. Unit ini menerjemahkan algebraic_topology.tex baris 3518–4185 secara kontigu, yaitu seluruh Bagian 1.13 tentang homologi seluler. Kelima belas lingkungan semantik sumber dipertahankan dalam urutan aslinya; ketujuh belas fungsi diagram dipelihara sebagai tiga gambar ulang aksesibel dan empat belas tampilan semantik; delapan koreksi sumber serta satu klarifikasi batas permukaan tertutup dicatat terpisah; dan tiga perbaikan bukti ditandai sebagai materi asli edisi. Enam soal penguasaan mempunyai petunjuk dan solusi lengkap.

Baris sumber berikutnya tepat baris **4186**:

37.5 Extras before cohomology

. Rentang jembatan Fomberg yang dipilih berakhir pada baris 4185, sehingga kursor berikutnya adalah **4186** dan tidak ada bagian “Extras before cohomology” yang diterjemahkan dalam unit ini.

Asesmen Kumulatif 1 — Topologi Dasar, Ruang Penutup, dan Homotopi

26 Agustus 2026

1 Asesmen Kumulatif 1: fondasi hingga barisan eksak homotopi

Asesmen ini menguji hubungan lintas-topik dari D60–R01 sampai D60–R07. Setiap soal diikuti petunjuk dan solusi lengkap. Untuk pemakaian sebagai ujian, kerjakan delapan soal terlebih dahulu tanpa membuka kedua bagian tersebut. Seluruh soal dan solusi pada berkas ini merupakan materi edisi asli berlisensi CC BY-SA 4.0; materi ini tidak mengubah urutan atau penomoran edisi Roberts dan Fomberg.

1.1 Soal 1 — hasil bagi interval dan lingkaran

Pada $I = [0, 1]$, ambil relasi ekuivalensi yang hanya mengidentifikasi 0 dengan 1, dan tulis $q : I \rightarrow I/\sim$ untuk peta hasil bagi. Buktikan bahwa

$$\bar{f} : I/\sim \longrightarrow S^1, \quad \bar{f}([t]) = (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t),$$

adalah homeomorfisma. Dalam bukti Anda, jelaskan secara terpisah mengapa $\bar{f}$ terdefinisi dengan baik, kontinu, dan mempunyai invers kontinu.

Petunjuk. Mulailah dari $f(t) = (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$. Gunakan sifat universal topologi hasil bagi. Setelah memperoleh bijeksi kontinu, gunakan kekompakan $I/\sim$ dan sifat Hausdorff S^1 .

Solusi. Fungsi $f : I \rightarrow S^1$ memenuhi $f(0) = f(1)$, sehingga nilainya konstan pada setiap kelas ekuivalensi. Karena itu rumus $\bar{f}([t]) = f(t)$ terdefinisi dengan baik dan memenuhi $f = \bar{f} \circ q$. Berdasarkan sifat universal peta hasil bagi, kontinuitas f mengimplikasikan kontinuitas $\bar{f}$.

Setiap titik S^1 mempunyai representasi $(\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$ untuk suatu $t \in [0, 1]$, jadi $\bar{f}$ surjektif. Jika $f(s) = f(t)$, maka $s - t \in \mathbb{Z}$. Untuk $s, t \in [0, 1]$, hal ini berarti $s = t$ atau $\{s, t\} = \{0, 1\}$; kedua kemungkinan memberi $[s] = [t]$. Jadi $\bar{f}$ injektif.

Ruang $I/\sim$ kompak karena merupakan citra kontinu ruang kompak I , dan S^1 Hausdorff. Setiap bijeksi kontinu dari ruang kompak ke ruang Hausdorff adalah homeomorfisma. Maka invers $\bar{f}^{-1}$ kontinu, sehingga $\bar{f}$ adalah homeomorfisma.

1.2 Soal 2 — retraksi deformasi kuat

Untuk $X = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, definisikan

$$H(x, t) = \left((1 - t) + \frac{t}{\|x\|} \right) x.$$

Buktikan bahwa H adalah retraksi deformasi kuat X ke S^1 . Simpulkan bahwa inklusi $i : S^1 \hookrightarrow X$ menginduksi isomorfisma pada grup fundamental.

Petunjuk. Periksa empat hal: kontinuitas, fakta bahwa $H(x, t) \neq 0$ untuk semua (x, t) , nilai pada $t = 0$ dan $t = 1$, serta apa yang terjadi bila $\|x\| = 1$.

Solusi. Fungsi norma tidak nol pada X , sehingga H kontinu. Koefisien

$$(1 - t) + \frac{t}{\|x\|}$$

selalu positif untuk $0 \leq t \leq 1$; akibatnya $H(x, t) \neq 0$ dan seluruh homotopi berada di X . Selain itu,

$$H(x, 0) = x, \quad H(x, 1) = \frac{x}{\|x\|} \in S^1.$$

Jika $x \in S^1$, koefisien tersebut sama dengan 1 untuk semua t , jadi $H(x, t) = x$. Dengan demikian $r(x) = x/\|x\|$ adalah retraksi dan H adalah homotopi dari id_X ke $i \circ r$ yang tetap pada S^1 : tepatnya suatu retraksi deformasi kuat.

Karena $r \circ i = \text{id}_{S^1}$ dan $i \circ r \simeq \text{id}_X$, peta i dan r adalah ekuivalensi homotopi. Funktorialitas grup fundamental kemudian memberi isomorfisma $i_* : \pi_1(S^1) \xrightarrow{\cong} \pi_1(X)$.

1.3 Soal 3 — pengangkatan lintasan dan bilangan lilit

Ambil peta penutup $p : \mathbb{R} \rightarrow S^1$, $p(u) = e^{2\pi i u}$, dan loop

$$\gamma(s) = e^{2\pi i(3s+1/4)}, \quad 0 \leq s \leq 1.$$

Tentukan pengangkatan tunggal $\tilde{\gamma}$ yang memenuhi $\tilde{\gamma}(0) = 1/4$. Hitung titik akhirnya dan jelaskan bagaimana hasil itu merekam kelas $[\gamma]$ di $\pi_1(S^1, i)$.

Petunjuk. Coba $\tilde{\gamma}(s) = 3s + 1/4$, lalu gunakan ketunggalan pengangkatan dengan titik awal tetap. Selisih titik akhir dan titik awal adalah bilangan bulat.

Solusi. Rumus

$$\tilde{\gamma}(s) = 3s + \frac{1}{4}$$

memenuhi $\tilde{\gamma}(0) = 1/4$ dan $p(\tilde{\gamma}(s)) = \gamma(s)$. Teorema pengangkatan lintasan menjamin bahwa inilah satu-satunya pengangkatan dengan titik awal tersebut. Titik akhirnya ialah

$$\tilde{\gamma}(1) = \frac{13}{4} = \frac{1}{4} + 3.$$

Untuk penutup universal $\mathbb{R} \rightarrow S^1$, selisih bilangan bulat antara titik akhir dan titik awal pengangkatan loop adalah bilangan lilitnya. Jadi $[\gamma]$ bersesuaian dengan $3 \in \mathbb{Z} \cong \pi_1(S^1, i)$. Pengangkatan tidak tertutup karena kelas ini bukan nol.

1.4 Soal 4 — monodromi penutup berhingga

Untuk $n \geq 2$, ambil $p_n : S^1 \rightarrow S^1$, $p_n(z) = z^n$. Beri label serat di atas 1 dengan $\zeta_j = e^{2\pi i j/n}$, $j \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Hitung aksi monodromi generator $\lambda(t) = e^{2\pi i t}$ pada serat itu. Gunakan hasilnya untuk menentukan keterhubungan ruang total, stabilisator ζ_0 , dan grup transformasi dek.

Petunjuk. Angkat λ dari ζ_j dengan lintasan $t \mapsto e^{2\pi i(t+j)/n}$. Ingat bahwa orbit monodromi adalah komponen ruang total.

Solusi. Pengangkatan yang berawal di ζ_j ialah

$$\tilde{\lambda}_j(t) = e^{2\pi i(t+j)/n},$$

sebab $p_n(\tilde{\lambda}_j(t)) = e^{2\pi i(t+j)} = \lambda(t)$. Titik akhirnya adalah ζ_{j+1} . Jadi generator $1 \in \pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ bertindak dengan siklus

$$j \mapsto j+1 \pmod{n}.$$

Aksi ini transitif, sehingga ruang total penutup terhubung. Suatu unsur $m \in \mathbb{Z}$ menstabilkan ζ_0 tepat bila $m \equiv 0 \pmod{n}$; jadi stabilisatornya $n\mathbb{Z}$. Transformasi dek adalah rotasi $z \mapsto \zeta_j z$. Rotasi-rotasi ini membentuk grup siklik berorde n , maka $\text{Deck}(p_n) \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

1.5 Soal 5 — van Kampen dan grup fundamental torus

Gunakan model CW torus T^2 yang mempunyai satu sel-0, dua sel-1 berlabel a, b , dan satu sel-2 yang dilekatkan sepanjang kata $aba^{-1}b^{-1}$. Terapkan teorema Seifert–van Kampen untuk menghitung $\pi_1(T^2)$.

Petunjuk. Kerangka-1 adalah $S^1 \vee S^1$ dengan grup bebas pada a, b . Pelekatan sel-2 menambahkan satu relasi: kata pelekatan menjadi unsur identitas.

Solusi. Kerangka-1 torus mempunyai grup fundamental $F(a, b)$, grup bebas pada dua generator. Menurut van Kampen, pelekatan sel-2 di sepanjang loop yang mewakili $aba^{-1}b^{-1}$ menghasilkan hasil bagi grup bebas oleh penutupan normal kata tersebut. Jadi

$$\pi_1(T^2) \cong \langle a, b \mid aba^{-1}b^{-1} = 1 \rangle = \langle a, b \mid ab = ba \rangle.$$

Presentasi terakhir adalah grup abelian bebas pada a dan b . Pemetaan $a \mapsto (1, 0)$ dan $b \mapsto (0, 1)$ memberi isomorfisma $\pi_1(T^2) \cong \mathbb{Z}^2$.

1.6 Soal 6 — klasifikasi penutup lingkaran

Klasifikasikan, hingga isomorfisma penutup, semua penutup terhubung berlembar empat dari S^1 . Berikan model eksplisit, subgrup $\pi_1(S^1)$ yang bersesuaian, serta grup transformasi deknnya. Jelaskan pula mengapa tidak ada model terhubung lain yang tidak isomorfik dengannya.

Petunjuk. Subgrup berindeks empat dari $\mathbb{Z}$ hanya satu. Karena $\mathbb{Z}$ abelian, klasifikasi ruang penutup bertitik maupun tak bertitik tidak menimbulkan kelas konjugasi tambahan.

Solusi. Kita mempunyai $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$. Subgrup berindeks empat harus berbentuk $4\mathbb{Z}$, dan memang indeksnya empat. Teorema klasifikasi ruang penutup memberi satu kelas penutup terhubung bertitik untuk subgrup ini. Model eksplisitnya adalah

$$p_4 : S^1 \longrightarrow S^1, \quad p_4(z) = z^4.$$

Karena $\mathbb{Z}$ abelian, semua subgrupnya normal dan konjugasi tidak mengubah $4\mathbb{Z}$. Maka klasifikasi tak bertitik juga hanya mempunyai satu kelas isomorfisma terhubung berlembar empat. Grup transformasi dek adalah

$$N_{\mathbb{Z}}(4\mathbb{Z})/(4\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z},$$

yang pada model eksplisit bekerja melalui rotasi oleh akar-akar keempat dari 1.

1.7 Soal 7 — barisan eksak homotopi fibrasi Hopf

Untuk fibrasi Hopf

$$S^1 \longrightarrow S^3 \longrightarrow S^2,$$

gunakan barisan eksak panjang homotopi dan fakta standar $\pi_1(S^3) = \pi_2(S^3) = 0$ untuk membuktikan $\pi_2(S^2) \cong \mathbb{Z}$. Buktikan juga bahwa $\pi_k(S^3) \rightarrow \pi_k(S^2)$ adalah isomorfisma untuk setiap $k \geq 3$.

Petunjuk. Tulis bagian barisan yang mengapit $\pi_2(S^2)$. Untuk $k \geq 3$, gunakan $\pi_j(S^1) = 0$ bagi semua $j \geq 2$.

Solusi. Bagian relevan barisan eksak panjang ialah

$$\pi_2(S^3) \longrightarrow \pi_2(S^2) \xrightarrow{\partial} \pi_1(S^1) \longrightarrow \pi_1(S^3).$$

Kedua grup di ujung bernilai nol. Eksakitas karena itu membuat ∂ injektif sekaligus surjektif. Maka

$$\pi_2(S^2) \cong \pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}.$$

Untuk $k \geq 3$, barisan yang sama memuat

$$\pi_k(S^1) \longrightarrow \pi_k(S^3) \longrightarrow \pi_k(S^2) \longrightarrow \pi_{k-1}(S^1).$$

Karena $k \geq 3$, kedua grup yang melibatkan S^1 bernilai nol. Eksakitas memaksa peta tengah $\pi_k(S^3) \rightarrow \pi_k(S^2)$ menjadi isomorfisma.

1.8 Soal 8 — kriteria pengangkatan peta torus

Untuk bilangan bulat m, n dan $k \geq 2$, definisikan

$$f_{m,n} : T^2 = S^1 \times S^1 \longrightarrow S^1, \quad f_{m,n}(z, w) = z^m w^n,$$

dan $p_k : S^1 \rightarrow S^1$, $p_k(u) = u^k$. Tentukan syarat perlu dan cukup agar ada $g : T^2 \rightarrow S^1$ dengan $p_k \circ g = f_{m,n}$. Jika syarat itu terpenuhi, berikan semua pengangkatan tersebut.

Petunjuk. Di bawah identifikasi $\pi_1(T^2) \cong \mathbb{Z}^2$ dan $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$, hitung $(f_{m,n})_*(a, b)$. Citra $(p_k)_*$ adalah $k\mathbb{Z}$.

Solusi. Pada grup fundamental,

$$(f_{m,n})_* : \mathbb{Z}^2 \longrightarrow \mathbb{Z}, \quad (a, b) \longmapsto ma + nb.$$

Kriteria pengangkatan untuk p_k menyatakan bahwa pengangkatan ada tepat bila

$$(f_{m,n})_*(\mathbb{Z}^2) \subseteq (p_k)_*(\mathbb{Z}) = k\mathbb{Z}.$$

Dengan memasukkan $(1, 0)$ dan $(0, 1)$, inklusi ini setara dengan $k \mid m$ dan $k \mid n$. Jadi syarat tersebut perlu dan cukup.

Jika $m = km'$ dan $n = kn'$, satu pengangkatan ialah

$$g_0(z, w) = z^{m'} w^{n'},$$

karena $g_0(z, w)^k = f_{m,n}(z, w)$. Semua pengangkatan lain diperoleh dengan mengalikan g_0 oleh transformasi dek konstan: untuk $\zeta \in \mu_k = \{u \in S^1 : u^k = 1\}$,

$$g_\zeta(z, w) = \zeta z^{m'} w^{n'}.$$

Ruang T^2 terhubung, sehingga dua pengangkatan yang berimpit di satu titik harus sama. Serat p_k di setiap titik mempunyai tepat k anggota. Dengan demikian, g_ζ untuk $\zeta \in \mu_k$ adalah seluruh pengangkatan $f_{m,n}$ melalui p_k , dan jumlahnya tepat k .

1.9 Peta cakupan asesmen

Soal	Route utama	Kompetensi yang diperiksa
1	D60-R01	topologi hasil bagi, kekompakan, dan sifat Hausdorff
2	D60-R02	retraksi deformasi kuat dan invariansi homotopi
3	D60-R03	pengangkatan lintasan dan bilangan lilit
4	D60-R04	monodromi, orbit, stabilisator, dan transformasi dek
5	D60-R05	van Kampen dan presentasi grup
6	D60-R06	klasifikasi ruang penutup
7	D60-R07	fibrasi dan barisan eksak panjang homotopi
8	D60-R06; sintesis R04–R05	kriteria pengangkatan melalui grup fundamental

Asesmen selesai pada delapan soal, delapan petunjuk, dan delapan solusi penuh. Tidak ada soal dari bank masalah Fomberg yang disalin atau diadaptasi di sini.

Petunjuk Penguasaan Rute 1–6

26 Agustus 2026

1 Petunjuk penguasaan untuk Rute 1–6

Berkas ini menambahkan petunjuk bagi 36 soal yang sudah mempunyai solusi lengkap dalam edisi. Soal dan solusi tersebut tidak disalin atau diubah di sini. Setiap blok menunjuk tepat ke satu soal, satu solusi yang sudah ada, komponen sumber, dan jalur berkas kanoniknya. Seluruh petunjuk merupakan materi edisi asli berlisensi CC BY-SA 4.0.

1.1 D60-R01 — topologi dasar dan konstruksi universal

Rujukan: [soal](#) · [solusi lengkap](#).

Petunjuk. Ambil himpunan terbuka $U \subseteq Y$ dan satu titik $x \in f^{-1}(U)$. Hubungkan ketiga informasi berikut secara berurutan: $f(x) \in U$, definisi keterbukaan melalui basis lingkungan di Y , dan kontinuitas berbasis lingkungan dari f . Sasaran lokalnya ialah menemukan lingkungan dasar dari x yang seluruhnya berada di dalam $f^{-1}(U)$.

Rujukan: [soal](#) · [solusi lengkap](#).

Petunjuk. Periksa satu per satu ketiga aksioma basis lingkungan. Untuk irisan dua anggota, gabungkan semua prabayangan dalam satu irisan berhingga; jika indeks yang sama muncul dua kali, gunakan aksioma irisan pada ruang targetnya. Untuk aksioma penyempurnaan lokal, sempurnakan dahulu setiap lingkungan N_i di Y_{α_i} , baru tarik semuanya kembali ke X .

Rujukan: [soal](#) · [solusi lengkap](#).

Petunjuk. Deskripsikan lingkungan dasar suatu titik x dalam topologi awal sebagai $f^{-1}(N)$ untuk lingkungan N dari $f(x)$. Karena $f(x_1) = f(x_2)$, lingkungan yang sama di Y dapat dipakai pada kedua titik. Setelah memperoleh satu arah implikasi, tukarkan peran x_1 dan x_2 .

Rujukan: [soal](#) · [solusi lengkap](#).

Petunjuk. Tulis dahulu invers himpunan dari Φ dengan mempertahankan label komponen β . Untuk kontinuitas Φ , uji setiap pembatasannya ke $X \times Z_\beta$ dan gunakan sifat universal jumlah. Untuk inversnya, perhatikan bahwa himpunan $X \times \text{in}_\beta(Z_\beta)$ membentuk sampel terbuka, sehingga kontinuitas dapat diperiksa per komponen lalu direkatkan.

Rujukan: [soal](#) · [solusi lengkap](#).

Petunjuk. Setiap titik pada gabungan saling lepas mengingat tepat satu label β , jadi nilai calon h sudah dipaksa oleh h_β . Setelah fungsi himpunannya didefinisikan per komponen, jangan periksa kontinuitas dari awal: gunakan langsung karakterisasi topologi akhir melalui semua inklusi in_β .

Rujukan: [soal](#) · [solusi lengkap](#).

Petunjuk. Untuk membuktikan arah yang tidak langsung, misalkan $A \cap U_\alpha$ terbuka dalam U_α untuk setiap α . Gunakan fakta bahwa setiap U_α sendiri terbuka dalam X , lalu tulis A sebagai gabungan semua $A \cap U_\alpha$. Arah sebaliknya cukup memakai sifat topologi subruang.

1.2 D60-R02 — keterhubungan, homotopi, dan kategori homotopi

Rujukan: [soal](#) · [solusi lengkap](#).

Petunjuk. Dari $u: X \rightarrow S$, angkut fungsi itu ke Z dengan memakai h^{-1} ; keunikan diperoleh dengan mengomposisikan kembali dengan h . Kemudian bandingkan citra kedua fungsi. Karakterisasi keterhubungan melalui semua pemetaan kontinu ke ruang diskret membuat kesimpulan simetris dalam X dan Z .

Rujukan: [soal](#) · [solusi lengkap](#).

Petunjuk. Untuk $C \cup D$, batasi satu pemetaan ke ruang diskret pada C dan D ; sebuah titik dalam $C \cap D$ memaksa kedua nilai konstan itu sama. Gunakan hasil ini untuk transitivitas $\sim$. Untuk mengenali kelas $[x]$, pandanglah ia sebagai gabungan semua himpunan terhubung yang memuat x , lalu buktikan keterhubungan dan kemaksimalannya secara terpisah.

Rujukan: [soal](#) · [solusi lengkap](#).

Petunjuk. Jika Y terhubung lintasan, pilih untuk setiap $s \in S$ satu lintasan dari nilai pemetaan pertama ke nilai pemetaan kedua. Diskretnya S memungkinkan lintasan-lintasan itu dirakit menjadi pemetaan kontinu pada $I \times S$. Untuk arah balik, pilih ruang diskret sekecil mungkin yang masih merekam dua titik sebarang di Y .

Rujukan: [soal](#) · [solusi lengkap](#).

Petunjuk. Pada morfisma $h: Y \rightarrow Z$, calon pemetaan $[A, Y] \rightarrow [A, Z]$ harus berupa pascakomposisi. Periksa lebih dahulu bahwa homotopi antara dua wakil tetap menjadi homotopi setelah dipascakomposisikan dengan h . Sesudah itu, hukum identitas dan komposisi mengikuti dari hukum komposisi fungsi biasa.

Rujukan: [soal](#) · [solusi lengkap](#).

Petunjuk. Untuk kemandirian wakil dari $[g \circ f]$, ubah dahulu wakil f sambil menahan g , lalu ubah wakil g sambil menahan hasil perubahan f ; gabungkan kedua homotopi. Setelah kategori terbentuk, terjemahkan persamaan invers di **Ho** kembali menjadi dua homotopi terhadap pemetaan identitas.

Rujukan: [soal](#) · [solusi lengkap](#).

Petunjuk. Untuk morfisma $[f]: X \rightarrow Y$ di **Ho**, kandidat aksi pada $[\ast, X]$ adalah $[u] \mapsto [f \circ u]$. Ada dua kemandirian wakil yang harus diperiksa secara terpisah: wakil u dan wakil f . Baru setelah keduanya selesai, verifikasi identitas dan komposisi.

1.3 D60-R03 — ruang penutup, tarik balik, dan transpor

Rujukan: [soal](#) · [solusi lengkap](#).

Petunjuk. Pisahkan “ada suatu bijeksi di antara dua serat” dari “lintasan tertentu menentukan suatu bijeksi”. Pada pernyataan kedua, ikuti satu titik serat melalui pengangkatan tunggal dan evaluasi titik akhirnya. Lalu tanyakan apa yang berubah jika lintasan antara dua titik dasar diganti dengan lintasan lain.

Rujukan: [soal](#) · [solusi lengkap](#).

Petunjuk. Untuk trivialitas lokal, tarik kembali suatu trivialisasi di atas $V \subseteq X$ ke $f^{-1}(V) \subseteq Y$. Pada morfisma, pertahankan koordinat y dan terapkan morfisma pada koordinat serat. Untuk komposisi dua tarik balik, tulis kedua himpunan hasil kali serat secara eksplisit; untuk isomorfisma serat, gunakan proyeksi $(y, z) \mapsto z$.

Rujukan: [soal](#) · [solusi lengkap](#).

Petunjuk. Tulis titik pada S^1 melalui koordinat sudut modulo 1. Carilah fungsi sudut $a(t)$ yang memenuhi $na(t) \equiv t \pmod{1}$ dan $a(0) = k/n$. Setelah memverifikasi proyeksinya, transpor diperoleh hanya dengan mengevaluasi pengangkatan itu pada $t = 1$.

Rujukan: [soal](#) · [solusi lengkap](#).

Petunjuk. Ambil pengangkatan $\tilde{\gamma}_z$ di Z_1 lalu komposisikan dengan h . Persamaan bahwa h berada di atas X menunjukkan bahwa komposisi ini masih mengangkat γ dan mempunyai titik awal $h(z)$. Gunakan ketunggalan pengangkatan sebelum mengevaluasi kedua ruas pada titik akhir.

Rujukan: [soal](#) · [solusi lengkap](#).

Petunjuk. Mulailah di titik serat $2\pi k$ dan cari pengangkatan afin dari γ_n ; kemiringannya ditentukan oleh bilangan putaran n . Untuk konkatenasi, jangan memulai pengangkatan bagian kedua lagi di $2\pi k$: mulailah di titik akhir bagian pertama dan lacak perubahan total indeks bilangan bulat.

Rujukan: [soal](#) · [solusi lengkap](#).

Petunjuk. Pecah bukti menjadi empat tahap. (1) Bandingkan irisan berhingga subbasis $[K, O]$ dengan lingkungan yang berasal dari partisi interval; untuk arah sulit gunakan kekompakan dan bilangan Lebesgue. (2) Uji evaluasi dan pascakomposisi pada subbasis. (3) Untuk kasus metrik, buktikan dua inklusi topologi dengan jarak positif dari citra kompak ke komplemen dan kekontinuan seragam. (4) Untuk hukum eksponensial, gunakan kekompakan K saat membuktikan kekontinuan pemetaan teradjung, dan evaluasi untuk arah sebaliknya.

1.4 D60-R04 — grup fundamental, grupoid, dan aksi monodromi

Rujukan: [soal](#) · [solusi lengkap](#).

Petunjuk. Angkat γ dari z , lalu angkat η dari titik akhir pengangkatan pertama. Konkatenasi kedua lintasan terangkat memproyeksikan ke $\gamma\#\eta$. Bandingkan lintasan ini dengan pengangkatan tunggal $\gamma\#\eta$ yang berawal di z , kemudian evaluasi di $t = 1$ dan perhatikan urutan komposisinya.

Rujukan: [soal](#) · [solusi lengkap](#).

Petunjuk. Bentuk dahulu pemetaan evaluasi tiga variabel yang memakai $\gamma(2t)$ pada separuh interval pertama dan $\eta(2t - 1)$ pada separuh kedua. Buktikan kontinuitasnya dengan lema penempelan pada dua subruang tertutup. Hukum eksponensial untuk topologi kompak-terbuka kemudian mengubah pemetaan itu menjadi konkatenasi bernilai di subruang $\Omega_x X$.

Rujukan: [soal](#) · [solusi lengkap](#).

Petunjuk. Untuk komponen produk, gunakan keterhubungan produk dua komponen dan proyeksi setiap himpunan terhubung di dalam produk. Aksioma grup pada kelas diperoleh dengan menunjukkan bahwa kedua sisi tiap hukum dihubungkan oleh lintasan di ruang loop. Terakhir, cocokkan $(z \cdot [\gamma]) \cdot [\eta]$ dengan rumus transpor untuk $\gamma\#\eta$; ini menentukan sisi aksinya.

Rujukan: [soal](#) · [solusi lengkap](#).

Petunjuk. Bangun functor ruang loop dengan pascakomposisi, lalu ambil komponen lintasan untuk memperoleh π_1 . Untuk model lingkaran, gunakan pemetaan hasil bagi $q: I \rightarrow I/\{0 \sim 1\} \cong S^1$: loop memfaktorkan secara unik melalui q , dan homotopi berujung tetap memfaktorkan melalui $\text{id}_I \times q$. Periksa naturalitas dengan pascakomposisi; pemetaan jepit pada S^1 menangani perkalian.

Rujukan: [soal](#) · [solusi lengkap](#).

Petunjuk. Gunakan pusat bintang v_0 untuk menggerakkan setiap titik sepanjang ruas garis menuju v_0 . Periksa bahwa definisi daerah berbentuk bintang menjaga seluruh homotopi tetap di K . Dari homotopi ini, peroleh lintasan menuju pusat dan bandingkan setiap dua lintasan dengan titik ujung yang sama melalui lintasan kanonik yang melewati pusat.

Rujukan: [soal](#) · [solusi lengkap](#).

Petunjuk. Tipekan setiap komposisi panah sebelum menghitung: suatu panah $a: x \rightarrow y$ mengangkut automorfisma di x ke automorfisma di y lewat konjugasi, sedangkan himpunan panah $x \rightarrow y$ menjadi torsor di bawah automorfisma di x . Pada $Y//G$, komponen grupoid adalah orbit dan automorfisma suatu objek adalah stabilisatornya. Terjemahkan “tepat satu morfisma” untuk menentukan syarat diskret dan kodiskret, termasuk kasus $Y = \emptyset$.

1.5 D60-R05 — pushout dan Seifert–van Kampen

Rujukan: [soal](#) · [solusi lengkap](#).

Petunjuk. Pada F_n , tentukan nilai homomorfisma pada kata tereduksi dengan mengganti setiap $x_i^{\pm 1}$ oleh $k_i^{\pm 1}$; periksa bahwa penyisipan pasangan invers tidak mengubah nilai. Untuk $G * H$, lakukan hal yang sama pada kata bergantian dan gunakan tidak adanya relasi silang. Pada bagian terakhir, tulis domain dan kodomain setiap panah sebelum memilih urutan komposisi.

Rujukan: [soal](#) · [solusi lengkap](#).

Petunjuk. Untuk pushout topologis, definisikan peta pada $U \cup V$ secara sepotong-sepotong dan gunakan kesepakatan di $U \cap V$ bersama lema perekatan. Untuk pushout ruang vektor, mulai dari peta linear $T(v_1, v_2) = A(v_1) + B(v_2)$ pada $V_1 \oplus V_2$. Syarat kompatibilitas harus menunjukkan bahwa $J(W) \subseteq \ker T$, sehingga T turun ke hasil bagi.

Rujukan: [soal](#) · [solusi lengkap](#).

Petunjuk. Saat satu ruas partisi dibelah, tunjukkan bahwa satu faktor lama diganti oleh produk dua faktor yang sama nilainya; dua partisi dapat dibandingkan melalui perhalusan bersama. Untuk $P(s, u)$, periksa dahulu penempelan rumus pada $s = 1/2$, lalu keempat sisi persegi. Akhirnya, tunjukkan secara eksplisit langkah yang masih hilang ketika citra homotopi tidak berada seluruhnya dalam satu anggota sampel.

Rujukan: [soal](#) · [solusi lengkap](#).

Petunjuk. Pertukaran rute pada satu sel berlangsung seluruhnya di U atau V , jadi kesamaannya berasal dari functor lokal F atau G , bukan dari functor global yang sedang dibangun. Untuk hukum komposisi, gabungkan dua partisi subordinat menjadi satu partisi bagi lintasan gabungan. Untuk keunikan, faktorkan setiap morfisma menjadi ruas-ruas lokal yang nilainya sudah dipaksa.

Rujukan: [soal](#) · [solusi lengkap](#).

Petunjuk. Mulai dari satu kocone kompatibel pada persegi retrak S . Prakomposisikan kedua kakinya dengan komponen retraksi untuk memperoleh kocone pada pushout T , lalu gunakan sifat universal

T . Bawa peta universal yang dihasilkan kembali ke S melalui komponen inklusi. Untuk keunikan, angkat setiap pesaing dari S ke T dan gunakan persamaan $r \circ i = \text{id}_S$.

Rujukan: [soal](#) · [solusi lengkap](#).

Petunjuk. Kirim setiap objek x ke titik pilihan a_x , dan pada suatu kelas lintasan tempelkan kebalikan lintasan pilihan di ujung awal serta lintasan pilihan di ujung akhir. Periksa identitas dan komposisi dengan membatalkan pasangan lintasan yang saling berbalik. Dalam kubus Teorema 12.1, pilihan pada irisan harus dipakai serentak oleh semua pembatasan agar komutativitasnya ketat, bukan hanya hingga isomorfisma.

1.6 D60-R06 — klasifikasi ruang penutup

Rujukan: [soal](#) · [solusi lengkap](#).

Petunjuk. Karena $i: \mathcal{C} \hookrightarrow \mathcal{D}$ adalah ekuivalensi, pilih invers semu r beserta isomorfisma natural $ri \cong \text{id}_{\mathcal{C}}$ dan $ir \cong \text{id}_{\mathcal{D}}$. Prakomposisi dengan r adalah calon invers semu bagi i^* . Prakomposisikan functor sebarang dengan ri atau ir untuk memperoleh isomorfisma natural yang diperlukan.

Rujukan: [soal](#) · [solusi lengkap](#).

Petunjuk. Satu arah diperoleh dengan membatasi suatu functor pada setiap $\mathcal{C}_i$; lakukan hal yang sama pada transformasi natural. Untuk arah balik, rakit tupel functor komponen demi komponen. Ketiadaan morfisma di antara dua faktor berbeda menjamin bahwa perakitan itu lengkap dan bahwa kedua konstruksi benar-benar saling invers.

Rujukan: [soal](#) · [solusi lengkap](#).

Petunjuk. Untuk bagian pertama, komposisikan pengangkatan γ di Z_1 dengan f dan gunakan ketunggalan pengangkatan di Z_2 . Untuk bagian kedua, tulis $(g \circ f)_x$ sebagai komposisi pemetaan serat, lalu tumpuk dua persegi naturalitas. Perhitungan yang sama sekaligus menunjukkan pelestarian komposisi oleh functor monodromi.

Rujukan: [soal](#) · [solusi lengkap](#).

Petunjuk. Sebuah functor $F: \mathbf{BG} \rightarrow \mathbf{Set}$ hanya mempunyai satu himpunan objek $S = F(*)$. Definisikan aksi melalui nilai $F(g)$, lalu gunakan konvensi produk kronologis untuk menentukan apakah aksinya kiri atau kanan. Sebaliknya, bangun functor dari aksi tersebut. Syarat naturalitas pada setiap $g \in G$ harus berubah tepat menjadi syarat ekuivarians bagi satu fungsi $S \rightarrow T$.

Rujukan: [soal](#) · [solusi lengkap](#).

Petunjuk. Setelah memilih titik dasar $1 \in S^1$, tulis operator monodromi sebagai operator dari $\pi_1(S^1, 1)$ —bukan dari seluruh grupoid—ke permutasi serat. Uji ekuivarians reduksi modulo n langsung pada aksi translasi. Untuk butir terakhir, bandingkan urutan operator pada aksi kanan dengan aksi kiri dan perhatikan apa yang disembunyikan oleh komutativitas $\mathbb{Z}$.

Rujukan: [soal](#) · [solusi lengkap](#).

Petunjuk. Panah di $\Pi_1(X, A)$ adalah kelas lintasan, sehingga dua titik pilihan dari komponen berbeda tidak dapat dihubungkan; esensial surjektif dibuktikan dengan menghubungkan setiap titik X ke wakil komponennya. Untuk orbit pG , coba peta $Hg \mapsto p \cdot g$ dengan $H = \text{Stab}(p)$ dan periksa keterdefinisan serta ekuivariansnya. Terakhir, angkat basis lingkungan terhubung lintasan pada ruang dasar ke setiap lembaran ruang penutup dan gunakan keterhubungan lintasan lokal ruang total.

1 Asesmen Kumulatif 2: homologi hingga struktur seluler

Asesmen ini menguji hubungan lintas-topik dari D60-R08 sampai D60-R12: homologi simpleksial dan singular, homotopi rantai, fungtorialitas, homologi relatif, eksisi, Mayer–Vietoris, pemetaan pembandingan, kompleks CW, homologi seluler, dan derajat. Setiap soal diikuti petunjuk dan solusi lengkap. Untuk pemakaian sebagai ujian, kerjakan delapan soal terlebih dahulu tanpa membuka kedua bagian tersebut.

Seluruh soal dan solusi pada berkas ini merupakan materi edisi asli berlisensi CC BY-SA 4.0. Materi ini tidak berasal dari bank soal Fomberg yang dikecualikan, tidak menyiratkan kepengarangan atau pengesahan dari penulis sumber, dan tidak mengubah urutan maupun penomoran edisi Roberts dan Fomberg.

1.1 Soal 1 — tabel muka berorientasi dan torsi

Suatu kompleks- Δ hingga K mempunyai satu simpul v , dua sisi berorientasi a, b , dan dua simpleks-2 berorientasi α, β . Semua ujung sisi dipetakan ke v . Tabel muka berorientasinya adalah

	F_0	F_1	F_2
α	a	$-a$	b
β	$-b$	b	a

dengan F_i menyatakan restriksi ke muka ke- i , dan tanda minus berarti restriksi itu membalik orientasi sisi yang telah dipilih.

1. Turunkan $\partial_2\alpha$ dan $\partial_2\beta$ langsung dari tabel.
2. Periksa $\partial_1\partial_2 = 0$ pada kedua generator.
3. Hitung seluruh homologi integral $H_n^\Delta(K; \mathbb{Z})$, termasuk bagian torsinya.

Petunjuk. Gunakan $\partial_2 = F_0 - F_1 + F_2$. Terhadap basis (α, β) dan (a, b) , bentuk matriks batas berukuran 2×2 . Determinan dan FPB semua entrinya menentukan bentuk normal Smith.

Solusi. Tanda berselang-seling pada batas simpleks memberi

$$\begin{aligned}\partial_2\alpha &= F_0\alpha - F_1\alpha + F_2\alpha = a - (-a) + b = 2a + b, \\ \partial_2\beta &= F_0\beta - F_1\beta + F_2\beta = (-b) - b + a = a - 2b.\end{aligned}$$

Karena kedua ujung setiap sisi adalah v ,

$$\partial_1a = v - v = 0, \quad \partial_1b = v - v = 0.$$

Maka $\partial_1\partial_2\alpha = \partial_1(2a + b) = 0$ dan $\partial_1\partial_2\beta = \partial_1(a - 2b) = 0$. Jadi identitas $\partial^2 = 0$ benar pada semua generator.

Kompleks rantainya adalah

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{A} \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \longrightarrow 0, \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Determinan A adalah -5 , sehingga A injektif dan $H_2(K) = 0$. FPB semua entri A adalah 1; karena A berperingkat penuh, bentuk normal Smith-nya ialah $\text{diag}(1, 5)$. Dengan demikian

$$H_1(K) = \text{coker } A \cong \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}.$$

Pada derajat nol, $\partial_1 = 0$ dan hanya ada satu simpul, jadi $H_0(K) \cong \mathbb{Z}$. Tidak ada rantai pada derajat di atas dua. Ringkasnya,

$$H_n^\Delta(K; \mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & n = 0, \\ \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}, & n = 1, \\ 0, & n \geq 2. \end{cases}$$

1.2 Soal 2 — deformasi dan homotopi rantai

Ambil silinder $C = S^1 \times [0, 1]$ dan lingkaran bawah $A = S^1 \times \{0\}$. Definisikan inklusi $i: A \hookrightarrow C$, retraksi $r(z, s) = (z, 0)$, dan

$$H((z, s), t) = (z, (1 - t)s).$$

1. Buktikan bahwa H adalah retraksi deformasi kuat C ke A .
2. Misalkan P adalah operator prisma pada rantai singular yang dibangun dari H . Tulis identitas homotopi rantainya dan buktikan langsung pada sebuah siklus bahwa $(i \circ r)_* = \text{id}$ pada homologi.
3. Gunakan fungtorialitas bersama $r \circ i = \text{id}_A$ untuk membuktikan bahwa i_* dan r_* saling invers, lalu hitung semua $H_n(C; \mathbb{Z})$.

Petunjuk. Periksa nilai H pada $t = 0$, $t = 1$, dan pada titik-titik A . Untuk homotopi dari identitas ke $i \circ r$, operator prisma memenuhi $(i \circ r)_\# - \text{id}_\# = \partial P + P\partial$.

Solusi. Rumus H kontinu dan bernilai di C . Pada kedua ujung parameter,

$$H((z, s), 0) = (z, s), \quad H((z, s), 1) = (z, 0) = i(r(z, s)).$$

Jika $(z, s) \in A$, maka $s = 0$ dan $H((z, 0), t) = (z, 0)$ untuk setiap t . Jadi H adalah homotopi dari id_C ke $i \circ r$ yang menetapkan A titik demi titik: tepat suatu retraksi deformasi kuat.

Operator prisma memberi homotopi rantai

$$(i \circ r)_\# - \text{id}_\# = \partial P + P\partial.$$

Jika z sebuah siklus singular, maka $\partial z = 0$ dan

$$(i \circ r)_\# z - z = \partial Pz + P(\partial z) = \partial Pz.$$

Selisih kedua rantai itu merupakan batas, sehingga $(i \circ r)_*[z] = [z]$. Jadi $(i \circ r)_* = \text{id}_{H_n(C)}$. Di sisi lain, $r \circ i = \text{id}_A$ secara literal. Fungtorialitas memberi

$$r_* i_* = (r \circ i)_* = \text{id}_{H_n(A)}, \quad i_* r_* = (i \circ r)_* = \text{id}_{H_n(C)}.$$

Dengan demikian i_* dan r_* saling invers. Karena $A \cong S^1$,

$$H_n(C; \mathbb{Z}) \cong H_n(S^1; \mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & n = 0, 1, \\ 0, & n \geq 2. \end{cases}$$

1.3 Soal 3 — ekuator dan barisan eksak pasangan

Misalkan $E \cong S^1$ adalah ekuator dalam S^2 , dan tulis D_+ serta D_- untuk kedua hemisfer tertutup. Pilih orientasi sehingga kelas relatif $u = [D_+]$ dan $v = [D_-]$ memenuhi

$$\partial u = [E], \quad \partial v = -[E].$$

1. Gunakan ruang hasil bagi S^2/E untuk menghitung $H_n(S^2, E; \mathbb{Z})$ pada setiap n .
2. Tentukan pemetaan penghubung $\partial: H_2(S^2, E) \rightarrow H_1(E)$ pada koordinat (u, v) .
3. Tentukan citra kelas fundamental $[S^2]$ di $H_2(S^2, E)$ dan periksa eksakitas pada ketiga suku $H_2(S^2) \rightarrow H_2(S^2, E) \rightarrow H_1(E)$.

Petunjuk. Setelah seluruh ekuator diruntuhkan, setiap hemisfer menjadi satu sfera dan keduanya bertemu di titik hasil runtuh. Pemetaan penghubung mengambil batas wakil relatif; perhatikan tanda orientasi kedua hemisfer.

Solusi. Pasangan (S^2, E) adalah pasangan baik. Meruntuhkan E membuat masing-masing D_+/E dan D_-/E menjadi S^2 , dengan kedua titik runtuh diidentifikasi. Jadi

$$S^2/E \cong S^2 \vee S^2.$$

Teorema hasil bagi relatif memberi

$$H_n(S^2, E; \mathbb{Z}) \cong \tilde{H}_n(S^2 \vee S^2; \mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}^2, & n = 2, \\ 0, & n \neq 2. \end{cases}$$

Basis pada derajat dua dapat dipilih sebagai (u, v) . Berdasarkan definisi pemetaan penghubung dan orientasi yang ditetapkan,

$$\partial(au + bv) = a[E] - b[E] = (a - b)[E].$$

Jadi ∂ adalah matriks baris $(1, -1)$. Rantai fundamental berorientasi pada S^2 adalah jumlah kedua hemisfer: batas ekuatornya saling menghapus. Karena itu pemetaan $j_*: H_2(S^2) \rightarrow H_2(S^2, E)$ memenuhi

$$j_*[S^2] = u + v = (1, 1).$$

Pemetaan j_* injektif, dan

$$\text{im } j_* = \mathbb{Z}(1, 1) = \ker(1, -1) = \ker \partial.$$

Pemetaan ∂ surjektif karena $\partial u = [E]$. Jadi potongan

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{1 \mapsto (1, 1)} \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{(a, b) \mapsto a - b} \mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

eksak, sebagaimana diwajibkan barisan eksak panjang pasangan.

1.4 Soal 4 — penutup tiga-komponen graf theta

Misalkan Θ adalah graf theta: dua simpul p, q dihubungkan oleh tiga sisi e_1, e_2, e_3 , semuanya diorientasikan dari p ke q . Pilih penutup terbuka $\Theta = U \cup V$ sehingga U adalah lingkungan bintang p , V adalah lingkungan bintang q , dan $U \cap V$ terdiri atas tepat tiga interval terbuka J_1, J_2, J_3 , satu di tengah setiap sisi.

1. Hitung homologi tereduksi U , V , dan $U \cap V$; berikan basis eksplisit bagi $\tilde{H}_0(U \cap V)$.
2. Gunakan barisan Mayer–Vietoris tereduksi untuk menghitung semua $H_n(\Theta; \mathbb{Z})$.
3. Hubungkan basis $\tilde{H}_0(U \cap V)$ dengan dua siklus graf $e_1 - e_3$ dan $e_2 - e_3$ melalui pemetaan penghubung.

Petunjuk. Kedua lingkungan bintang kontraktibel. Pilih titik $x_i \in J_i$; dua selisih $[x_1] - [x_3]$ dan $[x_2] - [x_3]$ membentuk basis homologi tereduksi derajat nol perpotongan. Pada barisan tereduksi, semua suku yang mengapit $\tilde{H}_1(\Theta)$ selain suku perpotongan bernilai nol.

Solusi. Ruang U dan V masing-masing berbentuk pohon bercabang tiga, sehingga keduanya kontraktibel. Maka

$$\tilde{H}_n(U) = \tilde{H}_n(V) = 0 \quad \text{untuk semua } n.$$

Perpotongan merupakan gabungan saling lepas tiga interval kontraktibel. Jadi $H_0(U \cap V) \cong \mathbb{Z}^3$, sedangkan

$$\tilde{H}_0(U \cap V) \cong \{(c_1, c_2, c_3) \in \mathbb{Z}^3 : c_1 + c_2 + c_3 = 0\} \cong \mathbb{Z}^2.$$

Jika $x_i \in J_i$, satu basisnya adalah

$$[x_1] - [x_3], \quad [x_2] - [x_3].$$

Barisan Mayer–Vietoris tereduksi menyederhana menjadi

$$0 \longrightarrow \tilde{H}_1(\Theta) \xrightarrow{\partial} \tilde{H}_0(U \cap V) \longrightarrow 0,$$

sehingga ∂ isomorfisma dan $H_1(\Theta) \cong \mathbb{Z}^2$. Graf Θ terhubung lintasan, maka $H_0(\Theta) \cong \mathbb{Z}$; graf tidak mempunyai homologi di atas derajat satu. Dengan demikian

$$H_n(\Theta; \mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & n = 0, \\ \mathbb{Z}^2, & n = 1, \\ 0, & n \geq 2. \end{cases}$$

Pecah rantai siklus $e_i - e_3$ menjadi bagian yang berada di U dan bagian yang berada di V . Batas bagian U terletak di $J_i \cup J_3$ dan, setelah orientasi pemisahan dipilih secara serasi, mewakili $[x_i] - [x_3]$. Karena itu

$$\partial[e_1 - e_3] = [x_1] - [x_3], \quad \partial[e_2 - e_3] = [x_2] - [x_3].$$

Kedua siklus graf tersebut karenanya membentuk basis $H_1(\Theta)$ yang bersesuaian dengan basis homologi tereduksi perpotongan.

1.5 Soal 5 — hasil bagi pasangan kerangka torus

Berikan torus T^2 struktur CW dengan satu sel-0, dua sel-1 a, b , dan satu sel-2 yang dilekatkan sepanjang $aba^{-1}b^{-1}$. Tulis $T^1 = S_a^1 \vee S_b^1$ untuk kerangka-1.

1. Jelaskan mengapa (T^2, T^1) pasangan baik dan identifikasi T^2/T^1 .
2. Terapkan teorema hasil bagi relatif untuk menghitung $H_n(T^2, T^1; \mathbb{Z})$ pada setiap n .
3. Hitung pemetaan penghubung $H_2(T^2, T^1) \rightarrow H_1(T^1)$ dari kata pelekatan, lalu gunakan barisan eksak panjang untuk menghitung $H_*(T^2; \mathbb{Z})$.

Petunjuk. Subkompleks CW memberi pasangan baik. Setelah seluruh kerangka-1 diruntuhkan, cakram karakteristik sel-2 mempunyai seluruh batas pada satu titik. Pemetaan penghubung membaca abelianisasi kata pelekatan.

Solusi. Setiap subkompleks dari kompleks CW membentuk pasangan baik dengan ruang totalnya, sehingga teorema hasil bagi relatif berlaku. Ketika T^1 diruntuhkan, sel-2 menjadi cakram yang seluruh batasnya diidentifikasi ke satu titik. Maka

$$T^2/T^1 \cong D^2/\partial D^2 \cong S^2.$$

Teorema hasil bagi relatif memberi

$$H_n(T^2, T^1; \mathbb{Z}) \cong \tilde{H}_n(S^2; \mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & n = 2, \\ 0, & n \neq 2. \end{cases}$$

Pemetaan penghubung mengirim generator relatif sel-2 ke kelas homologi kata pelekatannya. Dalam $H_1(T^1) \cong \mathbb{Z}[a] \oplus \mathbb{Z}[b]$,

$$[aba^{-1}b^{-1}] = [a] + [b] - [a] - [b] = 0.$$

Jadi pemetaan penghubung bernilai nol. Potongan barisan eksak panjang ialah

$$0 \longrightarrow H_2(T^2) \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z}^2 \longrightarrow H_1(T^2) \longrightarrow 0.$$

Eksakitas memberi $H_2(T^2) \cong \mathbb{Z}$ dan $H_1(T^2) \cong \mathbb{Z}^2$. Karena T^1 dan T^2 terhubung, bagian derajat nol memberi $H_0(T^2) \cong \mathbb{Z}$; tidak ada homologi di atas derajat dua. Dengan demikian

$$H_n(T^2; \mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & n = 0, 2, \\ \mathbb{Z}^2, & n = 1, \\ 0, & n > 2. \end{cases}$$

Ini merupakan penerapan langsung teorema hasil bagi pasangan baik dan barisan eksak, bukan penggantian bagi salah satu perbaikan bukti sumber.

1.6 Soal 6 — peta pelekatan dan topologi ruang Moore

Untuk $m \geq 2$, bentuk ruang Moore

$$M_m = S^1 \cup_{\varphi_m} D^2, \quad \varphi_m(z) = z^m.$$

Gunakan struktur CW pada S^1 dengan satu sel-0 v dan satu sel-1 a .

1. Daftarkan sel dan semua kerangka $M_m^{(k)}$. Bedakan secara bertipe peta pelekatan φ_m dari pemetaan karakteristik $\Phi_m: D^2 \rightarrow M_m$.
2. Buktikan bahwa Φ_m membatasi menjadi homeomorfisma dari $\text{Int } D^2$ ke sel-2 terbuka, tetapi tidak injektif pada batas.
3. Periksa syarat hingga pada penutupan (*closure-finite*) dan nyatakan secara eksplisit uji topologi lemah melalui prabayangan semua pemetaan karakteristik.
4. Sebagai pemeriksaan, tulis kompleks rantai seluler dan hitung $H_*(M_m; \mathbb{Z})$.

Petunjuk. Peta pelekatan berdomain ∂D^2 dan berkodomain kerangka-1; pemetaan karakteristik berdomain seluruh D^2 dan berkodomain ruang hasil. Relasi hasil bagi hanya mengidentifikasi titik-titik batas. Untuk topologi lemah, gunakan prabayangan pada cakram karakteristik setiap sel tertutup.

Solusi. Ruang M_m mempunyai satu sel terbuka e^k dalam setiap dimensi $k = 0, 1, 2$ dan tidak mempunyai sel lain. Kerangkanya ialah

$$M_m^{(0)} = \{v\}, \quad M_m^{(1)} = S^1, \quad M_m^{(2)} = M_m.$$

Peta pelekatan dan pemetaan karakteristik berturut-turut bertipe

$$\varphi_m: \partial D^2 = S^1 \longrightarrow M_m^{(1)} = S^1, \quad \Phi_m: D^2 \longrightarrow M_m.$$

Jika $j: M_m^{(1)} \hookrightarrow M_m$ adalah inklusi, relasi hasil bagi memberi

$$\Phi_m|_{\partial D^2} = j \circ \varphi_m.$$

Tidak ada titik bagian dalam cakram yang diidentifikasi dengan titik lain. Karena itu

$$\Phi_m|_{\text{Int } D^2}: \text{Int } D^2 \xrightarrow{\cong} e^2$$

merupakan homeomorfisma. Pada batas, $\varphi_m(z) = z^m$ mempunyai m prabayangan untuk setiap titik; karena $m \geq 2$, Φ_m tidak injektif di sana. Inilah perbedaan penting antara bagian dalam sel dan penutupannya.

Penutupan e^0 bertemu hanya e^0 ; penutupan $e^1 = S^1$ bertemu e^0, e^1 ; dan penutupan e^2 adalah seluruh M_m , yang bertemu tepat e^0, e^1, e^2 . Jadi setiap penutupan sel bertemu berhingga banyak sel: syarat hingga pada penutupan (*closure-finite*) terpenuhi.

Ambil pemetaan karakteristik $\Phi_0: D^0 \rightarrow M_m$, $\Phi_1: D^1 \rightarrow M_m^{(1)}$ yang mengidentifikasi kedua ujung interval ke v , dan $\Phi_m: D^2 \rightarrow M_m$. Topologi lemah menyatakan bahwa $F \subseteq M_m$ tertutup tepat ketika

$$\Phi_0^{-1}(F), \quad \Phi_1^{-1}(F), \quad \Phi_m^{-1}(F)$$

tertutup pada cakram domain masing-masing. Secara ekuivalen, $U \subseteq M_m$ terbuka tepat ketika ketiga prabayangan tersebut terbuka. Pada kompleks hingga ini, uji itu sama dengan topologi hasil bagi konstruksi pelekatan.

Koefisien batas sel-2 terhadap sel-1 adalah derajat φ_m , yaitu m , sedangkan $d_1 = 0$. Jadi

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times m} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \longrightarrow 0,$$

dan

$$H_n(M_m; \mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & n = 0, \\ \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, & n = 1, \\ 0, & n \geq 2. \end{cases}$$

1.7 Soal 7 — dua relator dan bentuk normal Smith

Suatu kompleks CW X mempunyai satu sel-0 v , dua sel-1 berorientasi a, b , dan dua sel-2 p, q . Peta pelekatan sel-2 menelusuri kata

$$w_p = a^2, \quad w_q = ab^3.$$

Tidak ada sel berdimensi lebih tinggi.

1. Turunkan matriks batas seluler d_2 terhadap basis (p, q) pada domain dan (a, b) pada kodomain, lalu hitung d_1 .
2. Reduksi d_2 ke bentuk normal Smith dan hitung semua $H_n(X; \mathbb{Z})$.
3. Periksa hasil H_1 dengan mengabelianisasi presentasi grup fundamental.

Petunjuk. Koefisien insidensi adalah jumlah eksponen huruf yang bersangkutan. Sesudah menukar kedua kolom, hilangkan entri 3 di kiri bawah, lalu hilangkan entri 2 di kanan atas dengan operasi unimodular.

Solusi. Jumlah eksponen pada a^2 adalah $(2, 0)$ dan pada ab^3 adalah $(1, 3)$. Maka

$$d_2(p) = 2a, \quad d_2(q) = a + 3b, \quad [d_2]_{(a,b) \leftarrow (p,q)} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Kedua ujung setiap sel-1 melekat pada v , sehingga $d_1 = 0$. Operasi baris dan kolom unimodular memberi

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

Determinan matriks semula adalah 6, sehingga d_2 injektif dan $H_2(X) = 0$. Bentuk normal Smith memberi

$$H_1(X) = \text{coker } d_2 \cong \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}.$$

Karena hanya ada satu simpul, $H_0(X) \cong \mathbb{Z}$, dan grup di atas derajat dua nol. Jadi

$$H_n(X; \mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & n = 0, \\ \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, & n = 1, \\ 0, & n \geq 2. \end{cases}$$

Teorema Seifert–van Kampen memberi

$$\pi_1(X, v) \cong \langle a, b \mid a^2 = 1, ab^3 = 1 \rangle.$$

Dalam abelianisasi, relasinya menjadi $2a = 0$ dan $a + 3b = 0$. Mengganti $a = -3b$ pada relasi pertama memberi $6b = 0$. Transformasi Smith di atas menunjukkan tidak ada relasi tambahan pada kelas b , sehingga $\pi_1(X)_{\text{ab}} \cong \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, sesuai dengan $H_1(X)$.

1.8 Soal 8 — pemetaan torus bermatriks determinan tiga

Tuliskan $T^2 = \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ dan definisikan

$$F_A([x, y]) = [2x + y, x + 2y], \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

1. Buktikan bahwa F_A terdefinisi dengan baik dan merupakan penutup berlembar tiga. Tentukan serat di atas $[0, 0]$.
2. Hitung $(F_A)_*$ pada $H_0(T^2)$, $H_1(T^2)$, dan $H_2(T^2)$, serta tentukan $\deg(F_A)$.
3. Jelaskan mengapa hitungan melalui model CW, suatu subdivisi kompleks- Δ , dan rantai singular menghasilkan homomorfisma yang sama—bukan tiga pilihan yang tak berkaitan.
4. Tentukan kernel dan kokernel aksi pada H_1 , lalu simpulkan apakah F_A ekuivalensi homotopi.

Petunjuk. Matriks integral melestarikan kisi $\mathbb{Z}^2$. Indeks $A\mathbb{Z}^2$ adalah $|\det A|$; tiga unsur kernel dapat dipilih pada diagonal torus. Untuk perbandingan model, gunakan aproksimasi seluler, subdivisi yang kompatibel, kealamian, dan teorema perbandingan simpleksial-singular.

Solusi. Jika (x, y) diganti dengan $(x, y) + (m, n)$ untuk $(m, n) \in \mathbb{Z}^2$, citranya berubah sebesar

$$A(m, n) = (2m + n, m + 2n) \in \mathbb{Z}^2.$$

Jadi F_A terdefinisi dengan baik pada hasil bagi. Matriks A invertibel di atas $\mathbb{R}$ dan turun menjadi homeomorfisma lokal torus. Banyaknya lembar adalah indeks $A\mathbb{Z}^2$ dalam $\mathbb{Z}^2$, yaitu

$$|\det A| = |4 - 1| = 3.$$

Serat di atas titik nol adalah kernel homomorfisma torus, dengan wakil

$$[0, 0], \quad [1/3, 1/3], \quad [2/3, 2/3].$$

Ketiganya memang dipetakan ke pasangan bilangan bulat, dan cacah lembar menunjukkan bahwa tidak ada unsur kernel lain.

Pada $H_0(T^2) \cong \mathbb{Z}$, ruang dan sasaran terhubung sehingga $(F_A)_*$ adalah identitas. Jika a, b adalah kelas kedua lingkaran koordinat, maka

$$(F_A)_*[a] = 2[a] + [b], \quad (F_A)_*[b] = [a] + 2[b].$$

Jadi aksi pada $H_1(T^2) \cong \mathbb{Z}^2$ tepat matriks A . Karena $\det A = 3 > 0$, ketiga lembar lokal mempertahankan orientasi. Rumus lokal-ke-global memberi

$$\deg(F_A) = 3,$$

dan karena $H_2(T^2) \cong \mathbb{Z}$ dibangkitkan kelas fundamental, $(F_A)_*$ pada H_2 adalah perkalian tiga.

Untuk model CW standar torus, aproksimasi seluler terhadap F_A menghasilkan pemetaan homotopik yang menelusuri kata dengan jumlah eksponen berupa kolom A pada kerangka-1 dan bertindak

dengan koefisien 3 pada sel-2. Pada model kompleks- Δ , pilih subdivisi domain dan sasaran yang membuat pemetaan linear torus itu simpleksial. Pemetaan pembandingan mengirim setiap simpleks berorientasi ke simpleks singular yang sama. Kealamiannya memberi persegi komutatif

$$\begin{array}{ccc} H_n^\Delta(T^2) & \xrightarrow{(F_A)_*} & H_n^\Delta(T^2) \\ \downarrow \cong & & \downarrow \cong \\ H_n(T^2) & \xrightarrow{(F_A)_*} & H_n(T^2). \end{array}$$

Invariansi homotopi mengidentifikasi hasil aproksimasi seluler dengan pemetaan semula. Jadi ketiga model memberi aksi intrinsik yang sama pada homologi.

Matriks A mempunyai determinan tak nol, maka kernelnya pada $\mathbb{Z}^2$ adalah nol. FPB semua entrinya 1 dan $|\det A| = 3$, sehingga bentuk normal Smith-nya $\text{diag}(1, 3)$ dan

$$\ker((F_A)_*|_{H_1}) = 0, \quad \text{coker}((F_A)_*|_{H_1}) \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}.$$

Karena aksi pada H_1 bukan isomorfisma, F_A bukan ekuivalensi homotopi.

1.9 Peta cakupan asesmen

Soal	Route utama	Route sekunder	Kompetensi yang diperiksa
1	D60-R08	—	tabel muka berorientasi, batas, $\partial^2 = 0$, bentuk normal Smith, dan torsi retraksi
2	D60-R09	—	deformasi kuat, operator prisma, homotopi rantai, dan
3	D60-R10	—	functorialitas homologi relatif, ruang hasil bagi, pemetaan penghubung, dan eksakitas
4	D60-R11	—	penutup graf theta, tiga komponen perpotongan, $\tilde{H}_0$, dan
5	D60-R10	D60-R11	Mayer–Vietoris pasangan baik (T^2, T^1) , teorema hasil bagi, dan barisan eksak panjang

Soal	Route utama	Route sekunder	Kompetensi yang diperiksa
6	D60-R12	—	peta pelekatan, pemetaan karakteristik, closure-finite, topologi lemah, dan ruang Moore
7	D60-R12	—	bilangan insidensi, matriks batas seluler, dan bentuk normal Smith diag(1, 6)
8	D60-R12	D60-R08, D60-R09, D60-R11	pemetaan torus, derajat tiga, dan kealamian perbandingan model

Asesmen selesai pada tepat delapan soal, delapan petunjuk, dan delapan solusi penuh. Tidak ada ungkapan soal dari bank masalah Fomberg yang disalin atau diadaptasi di sini.

2 Asesmen Kumulatif 3: kohomologi, derajat, dan sintesis invarian

Asesmen ini menutup delapan sasaran kumulatif pada D60-R13 dan D60-R14. Beberapa soal memakai kembali prasyarat yang sudah diterima dari route lebih awal, tetapi setiap pemakaian itu dinyatakan dalam atribut dan tabel cakupan. Kerjakan semua soal sebelum membuka petunjuk dan solusi jika berkas ini dipakai sebagai ujian.

Seluruh soal, petunjuk, dan solusi di bawah merupakan materi edisi asli berlisensi CC BY-SA 4.0. Tidak ada soal dari bank masalah Fomberg yang disalin atau diadaptasi. Materi ini tidak mengubah urutan ataupun penomoran edisi Roberts dan Fomberg, serta tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber maupun institusinya. Produksi materi ini dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**; seluruh kredit sumber dan kontributor manusia tetap dipertahankan.

2.1 Soal 1 — kohomologi, torsi, dan perubahan koefisien

Pertimbangkan kompleks korantai

$$0 \longrightarrow C^0 = \mathbb{Z} \xrightarrow{\delta^0} C^1 = \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{\delta^1} C^2 = \mathbb{Z} \longrightarrow 0,$$

dengan

$$\delta^0(t) = (0, 0), \quad \delta^1(a, b) = 2a.$$

1. Periksa bahwa rumus itu benar-benar mendefinisikan kompleks, lalu hitung $H^k(C^\bullet)$ untuk setiap k .
2. Reduksi matriks diferensial modulo 2 dan hitung kohomologi kompleks yang dihasilkan dengan koefisien $\mathbb{F}_2$.

3. Setelah memperluas skalar ke $\mathbb{Q}$, periksa kesamaan karakteristik Euler antara modul korantai dan modul kohomologi. Jelaskan informasi mana yang hilang dari hitungan dimensi rasional.

Petunjuk. Tentukan kernel δ^1 dan citranya secara terpisah. Bandingkan persamaan $2a = 0$ di $\mathbb{Z}$ dengan persamaan yang sama di $\mathbb{F}_2$. Untuk bagian terakhir, hitung rank diferensial di atas $\mathbb{Q}$; jangan mengganti faktor torsi dengan dimensi yang tidak dimilikinya.

Solusi. Komposisi $\delta^1\delta^0$ bernilai nol karena δ^0 sendiri nol. Jadi ini memang kompleks korantai. Tidak ada diferensial yang masuk ke C^0 , sehingga

$$H^0(C^\bullet) = \ker \delta^0 \cong \mathbb{Z}.$$

Di $\mathbb{Z}$, persamaan $2a = 0$ memaksa $a = 0$. Maka

$$\ker \delta^1 = \{(0, b) : b \in \mathbb{Z}\} \cong \mathbb{Z}, \quad \text{im } \delta^0 = 0,$$

dan karena itu $H^1(C^\bullet) \cong \mathbb{Z}$. Pada derajat dua semua unsur merupakan kosiklus, sedangkan citra δ^1 adalah $2\mathbb{Z}$. Jadi

$$H^2(C^\bullet) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z},$$

dan semua H^k di luar derajat 0, 1, 2 nol.

Sesudah reduksi modulo 2, rumus $\delta^1(a, b) = 2a$ menjadi pemetaan nol. Kedua diferensial kini nol, sehingga

$$H^0(C^\bullet; \mathbb{F}_2) \cong \mathbb{F}_2, \quad H^1(C^\bullet; \mathbb{F}_2) \cong \mathbb{F}_2^2, \quad H^2(C^\bullet; \mathbb{F}_2) \cong \mathbb{F}_2.$$

Di atas $\mathbb{Q}$, diferensial δ^1 ber-rank satu. Karena itu

$$\dim C^0 - \dim C^1 + \dim C^2 = 1 - 2 + 1 = 0,$$

sedangkan kohomologinya berdimensi 1, 1, 0, sehingga

$$\dim H^0 - \dim H^1 + \dim H^2 = 1 - 1 + 0 = 0.$$

Kedua karakteristik Euler sama. Namun dimensi rasional tidak melihat faktor torsi $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ pada H^2 . Perhitungan modulo 2 juga menunjukkan bahwa perubahan koefisien dapat memperbesar kernel diferensial; ia bukan sekadar operasi mengganti simbol $\mathbb{Z}$ pada daftar jawaban integral.

2.2 Soal 2 — koproduk tak hingga dan hasil kali kohomologi

Untuk $j \in \mathbb{N}_0$, ambil satu salinan S_j^1 dari lingkaran dan tetapkan

$$X = \bigsqcup_{j \in \mathbb{N}_0} S_j^1.$$

1. Buktikan bahwa kompleks korantai singular X adalah hasil kali kompleks korantai komponen-komponennya, lalu hitung $H^k(X; R)$ pada semua derajat.
2. Jelaskan mengapa jawabannya memakai hasil kali $\prod_j R$, bukan jumlah langsung $\bigoplus_j R$.

3. Definisikan $F: X \rightarrow X$ dengan mengirim S_j^1 ke S_{j+1}^1 melalui pemetaan sudut identitas. Tentukan F^* pada H^0 dan H^1 di bawah identifikasi dengan barisan dalam $\prod_{j \geq 0} R$.

Petunjuk. Simpleks standar terhubung, sehingga satu simpleks singular tidak dapat mengenai dua komponen koproduk. Fungsi pada gabungan saling lepas adalah keluarga semua pembatasannya, tanpa syarat dukungan hingga. Untuk F^* , lihat komponen domain ke- j dan tentukan komponen kodomain mana yang dibacanya.

Solusi. Karena Δ^n terhubung dan setiap S_j^1 terbuka sekaligus tertutup dalam X , citra setiap simpleks singular $\Delta^n \rightarrow X$ berada seluruhnya dalam tepat satu komponen. Jadi himpunan simpleks singular adalah gabungan saling lepas himpunan simpleks tiap komponen. Pembatasan fungsi memberi isomorfisma kompleks

$$C^\bullet(X; R) \cong \prod_{j \geq 0} C^\bullet(S_j^1; R),$$

dan diferensial bertindak per koordinat. Dalam ZFC, kernel dan citra diferensial produk dihitung per koordinat; untuk citra, praimaj dapat dipilih serentak pada semua koordinat. Maka

$$H^k(X; R) \cong \prod_{j \geq 0} H^k(S_j^1; R) \cong \begin{cases} \prod_{j \geq 0} R, & k = 0 \text{ atau } k = 1, \\ 0, & k > 1. \end{cases}$$

Unsur $\prod_j R$ boleh mempunyai koordinat tak nol pada tak hingga banyak j . Jumlah langsung hanya memuat keluarga berdukungan hingga. Misalnya, $(1_R, 1_R, \dots)$ berada dalam hasil kali bila $1_R \neq 0$, tetapi tidak dalam jumlah langsung.

Pada komponen domain S_j^1 , pemetaan F mendarat di komponen S_{j+1}^1 . Karena kohomologi kontravarian, koordinat ke- j dari tarik-balik membaca koordinat ke- $(j+1)$ dari kelas semula. Jadi, baik pada H^0 maupun H^1 ,

$$F^*(a_0, a_1, a_2, \dots) = (a_1, a_2, a_3, \dots).$$

Pergeseran ke kiri ini memperlihatkan arah kontravarian secara konkret.

2.3 Soal 3 — penghubung Lema Ular yang taktrivial

Pertimbangkan diagram komutatif dengan baris eksak pendek

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \rightarrow & \mathbb{Z} & \xrightarrow{\times 4} & \mathbb{Z} & \xrightarrow{\pi_4} & \mathbb{Z}/4 & \rightarrow & 0 \\ & & \downarrow \alpha = \times 2 & & \downarrow \beta = \text{id} & & \downarrow \gamma = \pi_2 & & \\ 0 & \rightarrow & \mathbb{Z} & \xrightarrow{\times 2} & \mathbb{Z} & \xrightarrow{\pi_2} & \mathbb{Z}/2 & \rightarrow & 0, \end{array}$$

tempat $\gamma([x]_4) = [x]_2$.

1. Hitung keenam kernel dan kokernel dalam barisan Lema Ular.
2. Bangun pemetaan penghubung $\delta: \ker \gamma \rightarrow \text{coker } \alpha$ dari pilihan pengangkatan dan tentukan nilainya pada generator.
3. Periksa secara eksplisit eksaknya barisan Ular pada keempat suku internal.

Petunjuk. Generator $\ker \gamma$ adalah $[2]_4$. Angkat unsur itu ke $2 \in \mathbb{Z}$ pada baris atas, terapkan β , lalu angkat balik melalui pemetaan $\times 2$ pada baris bawah. Setelah itu barisan Ular menyederhana menjadi satu peta di antara dua salinan $\mathbb{Z}/2$.

Solusi. Pemetaan $\alpha = \times 2$ dan $\beta = \text{id}$ injektif, sedangkan γ surjektif dengan kernel $\{[0]_4, [2]_4\} \cong \mathbb{Z}/2$. Jadi

$$\ker \alpha = 0, \quad \ker \beta = 0, \quad \ker \gamma \cong \mathbb{Z}/2,$$

dan

$$\text{coker } \alpha \cong \mathbb{Z}/2, \quad \text{coker } \beta = 0, \quad \text{coker } \gamma = 0.$$

Ambil $c = [2]_4 \in \ker \gamma$. Pilih $b = 2 \in \mathbb{Z}$ dengan $\pi_4(b) = c$. Karena β identitas, $\beta(b) = 2$. Pada baris bawah, 2 adalah citra $a' = 1$ melalui pemetaan $\times 2$. Definisi penghubung memberi

$$\delta([2]_4) = [1] \in \mathbb{Z}/\alpha(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/2.$$

Jika pengangkatan b diganti dengan $2 + 4r$, unsur pada baris bawah yang dipilih menjadi $a' = 1 + 2r$. Kelasnya modulo $\alpha(\mathbb{Z}) = 2\mathbb{Z}$ tetap $[1]$. Jadi hasil itu tidak bergantung pada pilihan pengangkatan.

Jadi δ mengirim generator ke generator dan merupakan isomorfisma. Barisan Ular dalam contoh ini adalah

$$0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \mathbb{Z}/2 \xrightarrow{\delta} \mathbb{Z}/2 \longrightarrow 0 \longrightarrow 0.$$

Eksak pada $\ker \beta = 0$ bersifat langsung. Pada $\ker \gamma$, citra peta sebelumnya nol dan sama dengan $\ker \delta$ karena δ injektif. Pada $\text{coker } \alpha$, citra δ adalah seluruh grup dan sama dengan kernel peta menuju $\text{coker } \beta = 0$. Terakhir, pada $\text{coker } \beta = 0$, citra peta masuk dan kernel peta keluar sama-sama nol. Keempat posisi internal dengan demikian eksak.

2.4 Soal 4 — pasangan cakram–sfera dan kasus batas dua titik

Untuk setiap $n \geq 1$, hitung $H^k(D^n, S^{n-1}; \mathbb{Z})$ pada semua derajat dengan dua cara yang saling memeriksa:

1. gunakan pemetaan hasil bagi $q: D^n \rightarrow D^n/S^{n-1} \cong S^n$; dan
2. gunakan barisan eksak panjang pasangan.

Pada $n = 1$, tuliskan secara eksplisit pemetaan $H^0(D^1) \rightarrow H^0(S^0)$ dan identifikasi kokernelnya. Nyatakan arah tepat pemetaan kohomologi yang diinduksi oleh q .

Petunjuk. Teorema hasil bagi memakai kohomologi tereduksi sfera. Untuk $n = 1$, pembatasan fungsi konstan dari interval ke kedua titik batas adalah pemetaan diagonal $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}^2$.

Solusi. Pasangan (D^n, S^{n-1}) adalah pasangan CW yang baik, dan pemetaan hasil bagi menginduksi, secara kontravarian,

$$q^*: \tilde{H}^k(S^n; \mathbb{Z}) \xrightarrow{\cong} H^k(D^n, S^{n-1}; \mathbb{Z}).$$

Karena kohomologi tereduksi S^n adalah $\mathbb{Z}$ tepat pada derajat n ,

$$H^k(D^n, S^{n-1}; \mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = n, \\ 0, & k \neq n. \end{cases}$$

Untuk $n \geq 2$, D^n dan S^{n-1} terhubung, sehingga pemetaan pada H^0 adalah isomorfisma. Semua kohomologi positif cakram nol. Di sekitar derajat $n - 1$, barisan pasangan menjadi

$$0 \longrightarrow H^{n-1}(S^{n-1}; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z} \xrightarrow{\partial} H^n(D^n, S^{n-1}; \mathbb{Z}) \longrightarrow 0,$$

jadi penghubung adalah isomorfisma dan hasilnya sama.

Jika $n = 1$, batasnya $S^0 = \{-1, 1\}$ dan awal barisan ialah

$$0 \rightarrow H^0(D^1, S^0) \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\Delta} \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{\partial} H^1(D^1, S^0) \rightarrow 0,$$

dengan $\Delta(a) = (a, a)$. Pemetaan diagonal injektif, sehingga grup relatif derajat nol adalah nol. Pemetaan

$$(u, v) \longmapsto v - u$$

surjektif dan berkernel $\Delta(\mathbb{Z})$; maka coker $\Delta \cong \mathbb{Z}$ dan $H^1(D^1, S^0) \cong \mathbb{Z}$. Ini menutup kasus $n = 1$ tanpa menyamakan H^0 biasa dengan kohomologi tereduksi.

2.5 Soal 5 — kohomologi semua sfera dari Mayer–Vietoris

Untuk $n \geq 1$, selimuti S^n dengan dua lingkungan hemisfer terbuka U, V . Keduanya kontraktif, sedangkan $U \cap V \simeq S^{n-1}$.

1. Turunkan isomorfisma reduksi $\tilde{H}^{k-1}(S^{n-1}; R) \cong \tilde{H}^k(S^n; R)$.
2. Mulai dari $\tilde{H}^0(S^0; R) \cong R$, hitung seluruh kohomologi tereduksi dan biasa S^n .
3. Periksa secara eksplisit mengapa argumen tetap benar untuk $n = 1$, ketika irisan mempunyai dua komponen lintasan.

Petunjuk. Dalam barisan Mayer–Vietoris tereduksi, semua suku milik U dan V lenyap. Pada $n = 1$, jangan mengganti $\tilde{H}^0(S^0; R)$ dengan kohomologi biasa derajat nol.

Solusi. Karena U, V kontraktif dan irisannya takkosong, bagian tereduksi barisan Mayer–Vietoris memberi, untuk $k \geq 1$,

$$0 \longrightarrow \tilde{H}^{k-1}(U \cap V; R) \xrightarrow{\partial_{MV}} \tilde{H}^k(S^n; R) \longrightarrow 0.$$

Invariansi homotopi $U \cap V \simeq S^{n-1}$ menghasilkan

$$\tilde{H}^{k-1}(S^{n-1}; R) \xrightarrow{\cong} \tilde{H}^k(S^n; R).$$

Untuk $k = n$, iterasi mencapai $\tilde{H}^0(S^0; R) \cong R$. Jika $k = 0$, grup tereduksi nol karena S^n terhubung lintasan. Jika $0 < k < n$, iterasi berakhir pada derajat nol sfera berdimensi positif, yang juga nol karena keterhubungan lintasan. Jika $k > n$, iterasi berakhir pada derajat positif S^0 , yang nol. Jadi

$$\tilde{H}^k(S^n; R) \cong \begin{cases} R, & k = n, \\ 0, & k \neq n. \end{cases}$$

Karena S^n terhubung lintasan untuk $n \geq 1$,

$$H^k(S^n; R) \cong \begin{cases} R, & k = 0 \text{ atau } k = n, \\ 0, & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Pada $n = 1$, irisan dua busur mempunyai tipe homotopi S^0 . Walaupun $H^0(S^0; R) \cong R^2$, hasil bagi oleh fungsi konstan adalah $\tilde{H}^0(S^0; R) \cong R$. Pemetaan penghubung mengidentifikasi modul ini dengan $H^1(S^1; R) \cong R$. Jadi kasus dasar satu-dimensi justru memerlukan versi tereduksi dan tercakup tanpa pengecualian tersembunyi.

2.6 Soal 6 — perbandingan korantai dan induksi Lema Lima

Untuk himpunan- Δ berdimensi hingga $X_\bullet$, pemetaan karakteristik $\chi_x: \Delta^n \rightarrow |X_\bullet|$ menentukan restriksi

$$\rho_X: C_{\text{sing}}^\bullet(|X_\bullet|; R) \longrightarrow C_\Delta^\bullet(X_\bullet; R).$$

1. Tuliskan rumus ρ_X dan buktikan bahwa ia pemetaan korantai.
2. Buktikan kealamiannya terhadap pemetaan himpunan- Δ .
3. Dengan pasangan kerangka $(X_\bullet, \text{sk}_{n-1} X_\bullet)$, perbandingan relatif, dan Lema Lima, buktikan bahwa ρ_X menginduksi isomorfisma pada setiap kohomologi.

Petunjuk. Evaluasikan korantai singular pada simpleks karakteristik dan gunakan $\chi_x \circ \partial_i = \chi_{d_i x}$. Untuk induksi dimensi, ambil lima suku barisan pasangan: kerangka, relatif, absolut, kerangka, relatif. Empat peta selain peta absolut sudah diketahui merupakan isomorfisma.

Solusi. Pada derajat n , definisikan

$$(\rho_X \varphi)(x) = \varphi(\chi_x) \quad (x \in X_n).$$

Karena muka simpleks karakteristik adalah simpleks karakteristik muka,

$$\begin{aligned} (\rho_X \delta_{\text{sing}} \varphi)(x) &= \sum_i (-1)^i \varphi(\chi_x \circ \partial_i) \\ &= \sum_i (-1)^i \varphi(\chi_{d_i x}) = (\delta_\Delta \rho_X \varphi)(x). \end{aligned}$$

Jadi ρ_X pemetaan korantai. Jika $f: X_\bullet \rightarrow Y_\bullet$, maka $|f| \circ \chi_x = \chi_{f(x)}$. Untuk $\varphi \in C_{\text{sing}}^n(|Y|; R)$,

$$(\rho_X |f|^* \varphi)(x) = \varphi(|f| \chi_x) = \varphi(\chi_{f(x)}) = (f^* \rho_Y \varphi)(x).$$

Inilah kealamian $\rho_X |f|^* = f^* \rho_Y$.

Sekarang lakukan induksi pada dimensi n . Pada $n = 0$, realisasi adalah ruang diskret; kedua teori memberi R^{X_0} pada derajat nol dan nol di atasnya, serta ρ^* identitas koordinat. Untuk langkah induksi, bandingkan barisan eksak panjang pasangan kerangka pada teori singular dan simpleksial. Lima suku yang mengapit peta absolut derajat k adalah

$$H^{k-1}(\text{sk}_{n-1} X) \rightarrow H^k(X, \text{sk}_{n-1} X) \rightarrow H^k(X) \rightarrow H^k(\text{sk}_{n-1} X) \rightarrow H^{k+1}(X, \text{sk}_{n-1} X).$$

Dua peta vertikal pada suku kerangka adalah isomorfisma menurut hipotesis induksi. Dua peta vertikal pada suku relatif adalah isomorfisma karena hasil bagi kerangka merupakan baji sfera- n dan pada setiap faktor pemetaan pembanding mengirim kelas kanonik ke kelas kanonik. Kealamian

membuat seluruh diagram komutatif, termasuk pemetaan penghubung. Lema Lima karena itu memaksa peta vertikal tengah

$$\rho_X^* : H_{\text{sing}}^k(|X|; R) \longrightarrow H_{\Delta}^k(X; R)$$

menjadi isomorfisma. Ini berlaku pada semua k , sehingga induksi selesai.

2.7 Soal 7 — paritas dan teorema sfera berbulu

Rekonstruksi kedua arah teorema sfera berbulu.

1. Andaikan S^n mempunyai medan vektor tangen kontinu yang tidak pernah nol. Normalisasikan medan itu dan bangun homotopi dari identitas $S^n \rightarrow S^n$ ke peta antipodal.
2. Gunakan derajat untuk membuktikan bahwa n harus ganjil.
3. Untuk $n = 2k - 1$, bangun secara eksplisit medan tangen satuan yang tidak pernah nol, lalu periksa tangensi dan normanya.
4. Jelaskan secara terpisah apa yang dikatakan argumen pada S^0 .

Petunjuk. Setelah normalisasi, x dan $v(x)$ adalah dua vektor satuan ortogonal. Putar yang pertama menuju negatifnya di bidang yang mereka rentang. Untuk arah sebaliknya, kelompokkan koordinat $\mathbb{R}^{2k}$ dalam pasangan dan lakukan rotasi seperempat putaran pada setiap pasangan.

Solusi. Bagi medan yang tidak pernah nol dengan panjangnya. Kita boleh mengandaikan

$$\|v(x)\| = 1, \quad x \cdot v(x) = 0.$$

Definisikan

$$H(t, x) = \cos(\pi t)x + \sin(\pi t)v(x).$$

Ortogonalitas memberi

$$\|H(t, x)\|^2 = \cos^2(\pi t) + \sin^2(\pi t) = 1,$$

jadi H bernilai di S^n . Nilai ujungnya adalah $H(0, x) = x$ dan $H(1, x) = -x$. Maka identitas homotop dengan peta antipodal. Derajat bersifat invarian terhadap homotopi, sedangkan

$$\text{Deg}(\text{id}_{S^n}) = 1, \quad \text{Deg}(-\text{id}_{S^n}) = (-1)^{n+1}.$$

Karena kedua derajat harus sama, $(-1)^{n+1} = 1$, sehingga n ganjil.

Sebaliknya, jika $n = 2k - 1$, untuk $x \in S^{2k-1} \subset \mathbb{R}^{2k}$ tetapkan

$$v(x_1, x_2, \dots, x_{2k-1}, x_{2k}) = (-x_2, x_1, \dots, -x_{2k}, x_{2k-1}).$$

Rumus itu linear dan karenanya kontinu. Pada setiap pasangan koordinat,

$$(x_{2j-1}, x_{2j}) \cdot (-x_{2j}, x_{2j-1}) = 0,$$

sehingga $x \cdot v(x) = 0$ dan $v(x)$ tangen. Selain itu,

$$\|v(x)\|^2 = \sum_{j=1}^k (x_{2j-1}^2 + x_{2j}^2) = \|x\|^2 = 1.$$

Jadi medan itu tidak pernah nol. Pada S^0 , setiap ruang singgung berdimensi nol dan hanya mempunyai vektor nol. Sisi derajat juga memberi kontradiksi, karena kohomologi tereduksi membuat $\text{Deg}(-\text{id}_{S^0}) = -1$, sedangkan identitas berderajat 1.

2.8 Soal 8 — ketika invarian aditif belum cukup

Bandingkan

$$X = T^2 \quad \text{dan} \quad Y = S^1 \vee S^1 \vee S^2.$$

Gunakan struktur CW dengan satu sel-0, dua sel-1, dan satu sel-2 pada masing-masing ruang.

1. Hitung $\pi_1(X)$ dan $\pi_1(Y)$ dengan Seifert–van Kampen.
2. Hitung seluruh homologi integral kedua ruang dari pemetaan batas seluler.
3. Hitung seluruh kohomologi integral aditif dan karakteristik Eulernya.
4. Putuskan apakah X dan Y dapat ekuivalen homotopi, lalu jelaskan secara tepat mengapa sebagian invarian di atas gagal membedakannya.

Petunjuk. Sel-2 torus dilekatkan sepanjang komutator $aba^{-1}b^{-1}$, sedangkan sel-2 pada Y dilekatkan secara konstan. Jumlah eksponen a dan b dalam komutator sama-sama nol, jadi kedua matriks batas seluler dapat berimpit walaupun relasi grup fundamentalnya berbeda.

Solusi. Kerangka-1 kedua ruang adalah $S^1 \vee S^1$, sehingga sebelum sel-2 dilekatkan grup fundamentalnya adalah grup bebas $F(a, b)$. Pada torus, peta pelekatan memberi relasi komutator:

$$\pi_1(X) \cong \langle a, b \mid aba^{-1}b^{-1} = 1 \rangle \cong \mathbb{Z}^2.$$

Pada Y , sel-2 membentuk faktor baji S^2 dan peta pelekatannya konstan, sehingga tidak menambahkan relasi. Maka

$$\pi_1(Y) \cong F(a, b).$$

Kompleks rantai seluler masing-masing mempunyai bentuk

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{d_2} \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{d_1} \mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

Karena kedua ujung setiap sel-1 melekat pada satu sel-0, $d_1 = 0$. Untuk torus, koefisien d_2 adalah jumlah eksponen generator pada kata pelekatan. Dalam $aba^{-1}b^{-1}$, jumlah eksponen a dan b keduanya nol, jadi $d_2 = 0$. Pada Y , peta pelekatan konstan juga memberi $d_2 = 0$. Oleh karena itu kedua ruang mempunyai homologi yang sama:

$$H_k(X; \mathbb{Z}) \cong H_k(Y; \mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = 0, 2, \\ \mathbb{Z}^2, & k = 1, \\ 0, & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Mendualkan kompleks seluler menghasilkan diferensial korantai nol yang sama. Karena semua grup bebas, tidak muncul suku torsi tambahan. Jadi secara aditif

$$H^k(X; \mathbb{Z}) \cong H^k(Y; \mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = 0, 2, \\ \mathbb{Z}^2, & k = 1, \\ 0, & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Kedua struktur CW juga memberi

$$\chi = 1 - 2 + 1 = 0,$$

sesuai jumlah berganti tanda rank homologi atau kohomologi.

Namun $\pi_1(X) = \mathbb{Z}^2$ abelian, sedangkan $\pi_1(Y) = F(a, b)$ nonabelian. Ekuivalensi homotopi harus menginduksi isomorfisma grup fundamental, sehingga X dan Y tidak ekuivalen homotopi. Contoh ini menunjukkan batas invarian **aditif**: grup homologi, grup kohomologi sebagai grup bergradasi, dan karakteristik Euler semuanya sama, tetapi data perkalian atau nonkomutativitas yang masih terlihat oleh π_1 telah hilang setelah abelianisasi dan pengambilan rank.

2.9 Peta cakupan asesmen

Soal	Route utama	Route prasyarat	Kompetensi yang diperiksa
1	D60-R13	—	kompleks korantai, kernel/citra, torsi, perubahan koefisien, dan Euler
2	D60-R13	—	koproduk tak hingga, hasil kali kohomologi, dan tarik-balik kontravarian
3	D60-R13	—	konstruksi penghubung Lema Ular dan eksak pada empat suku internal
4	D60-R13	—	kohomologi relatif/tereduksi pasangan cakram–sfera, termasuk $n = 1$
5	D60-R13	—	kohomologi sfera melalui Mayer–Vietoris, termasuk irisan S^0

Soal	Route utama	Route prasyarat	Kompetensi yang diperiksa
6	D60-R14	D60-R13	pembandingan korantai, kealamian, pasangan kerangka, dan Lema Lima
7	D60-R14	—	derajat, peta antipodal, paritas, dan teorema sfera berbulu
8	D60-R14	D60-R13, D60-R05, D60-R12	perbandingan π_1 , homologi, kohomologi, dan Euler pada dua ruang

Asesmen selesai tepat pada delapan soal, delapan petunjuk, dan delapan solusi lengkap. Setiap objek `exercise`, `hint`, dan `solution` memiliki pengenal stabil `o012-d60-ca03-ex/hint/sol-001` sampai `008`, serta setiap bagian dan tabel cakupan memiliki pengenal stabil tersendiri.

1 Laboratorium Komputasi 1 — Monodromi Ruang Penutup dan Presentasi Grup

1.1 Status dan keluaran laboratorium

Laboratorium ini adalah materi asli edisi. Ia menghubungkan tiga sudut pandang yang mudah tercampur bila hanya dihitung dengan tangan:

1. aksi monodromi kanan pada serat suatu penutup graf;
2. citra hingga aksi tersebut sebagai grup permutasi;
3. subgrup stabilisator yang isomorfik dengan grup fundamental ruang atas.

Semua perhitungan memakai pustaka standar Python saja dan dapat dijalankan tanpa jaringan. Paket laboratorium memuat program, enam uji deterministik, keluaran acuan, interpretasi matematis, dan solusi lengkap. Kode tidak menggantikan pembuktian: keluaran program menjadi data yang kemudian dijustifikasi dengan orbit–stabilisator, presentasi grup, dan argumen pohon merentang.

1.2 Prasyarat yang dipakai

- aksi monodromi kanan dan urutan kronologis kata: Kuliah 7;
- serat sebagai ruang koset kanan dan subgrup stabilisator: Teorema 9.2;
- penutup graf berhingga sebagai daftar transisi berlabel: penutup tiga lembaran;
- grup bebas pada dua pembangkit: Kuliah 11;
- presentasi grup dan kompleks presentasi: Kuliah 13.

1.3 Tujuan

Sesudah menyelesaikan laboratorium ini, pembaca dapat:

1. memeriksa apakah dua baris transisi benar-benar mendefinisikan penutup graf berhingga;
2. menghitung orbit serat dan memutuskan keterhubungan ruang atas;
3. mengenali citra monodromi dari relasi permutasinya;
4. membangun transversal Schreier deterministik dan basis bebas subgrup stabilisator;
5. membedakan presentasi **citra monodromi** dari presentasi **grup fundamental ruang penutup**;
6. mengikat klaim tersebut pada uji dan keluaran yang dapat direproduksi.

1.4 Konvensi kata dan aksi kanan

Tuliskan

$$X = S_a^1 \vee S_b^1, \quad \pi_1(X, *) \cong F(a, b).$$

Huruf kapital menyatakan invers:

$$A = a^{-1}, \quad B = b^{-1}.$$

Kata dibaca dari kiri ke kanan sebagai urutan perjalanan. Jika R_w adalah operator titik akhir pada serat, maka

$$R_{uv} = R_v \circ R_u.$$

Jadi program menerapkan huruf pertama lebih dahulu. Ini adalah aksi kanan langsung, bukan homomorfisma kiri ke grup permutasi dengan konvensi komposisi fungsi biasa. Bila homomorfisma kiri diperlukan, gunakan $\rho(g) = R_{g^{-1}}$ seperti pada pembaca utama.

1.5 Data penutup empat lembaran

Serat di atas titik baji adalah

$$S = \{0, 1, 2, 3\}.$$

Tabel transisi positifnya ialah

s	0	1	2	3
$s \cdot a$	1	2	3	0
$s \cdot b$	0	3	2	1

Dengan notasi siklus,

$$R_a = (0\ 1\ 2\ 3), \quad R_b = (1\ 3).$$

Setiap baris adalah permutasi. Karena itu dari setiap simpul terdapat tepat satu sisi keluar dan satu sisi masuk untuk setiap label a dan b ; inilah syarat lokal penutup graf. Terdapat empat pengangkatan berorientasi positif dari setiap sel-1 dasar, sehingga graf ruang atas mempunyai 4 simpul dan 8 sisi geometris berorientasi positif. Fakta bahwa R_b suatu involusi dalam **citra permutasi** tidak mengidentifikasi sisi positif b dengan sisi baliknya di grup bebas.

Tugas 1 — jalankan bukti komputasional. Dari akar repositori, jalankan

```
python -B source/id-ID/labs/test_o012_d60_lab01_monodromy.py
python -B source/id-ID/labs/o012_d60_lab01_monodromy.py
```

Pastikan keenam uji lulus dan keluaran program sama byte demi byte dengan `expected-output-lab01.txt`.

Tugas 2 — orbit, keterhubungan, dan citra. Hitung orbit lembaran 0. Daftarkan semua permutasi dalam citra monodromi. Periksa bahwa kata a^4 , b^2 , dan $baba$ bertindak trivial.

Tugas 3 — presentasi citra. Buktikan bahwa citra monodromi mempunyai presentasi

$$\langle a, b \mid a^4, b^2, baba \rangle$$

dan isomorfik dengan grup dihedral berorde 8. Jelaskan mengapa presentasi ini bukan presentasi $F(a, b)$ dan tidak langsung memberikan presentasi grup fundamental ruang atas.

Tugas 4 — transversal dan basis bebas. Mulai pada lembaran 0 dan lakukan pencarian lebar-pertama dengan urutan huruf a, A, b, B . Untuk setiap lembaran s , catat kata transversal t_s . Kemudian hitung kata

$$t_s x t_{s \cdot x}^{-1} \quad (s \in S, x \in \{a, b\}),$$

reduksi bebas, dan buang kata identitas. Verifikasi bahwa lima kata sisanya memperbaiki lembaran 0.

Tugas 5 — presentasi ruang atas. Gunakan pohon merentang yang tersirat oleh transversal untuk menghitung rank grup fundamental graf ruang atas. Tuliskan presentasi bebasnya dan hubungkan grup itu dengan stabilisator $\text{Stab}_{F(a,b)}(0)$.

Tugas 6 — uji negatif. Ganti transisi dengan

$$R_a = (0\ 1)(2\ 3), \quad R_b = \text{id}.$$

Prediksikan dekomposisi orbit sebelum menjalankan uji. Jelaskan mengapa rutin pembentuk basis bebas laboratorium menolak data ini sebagai satu penutup terhubung, meskipun kedua baris tetap merupakan permutasi yang sah.

Petunjuk. Orbit 0 sudah memuat 1, 2, 3 dengan mengulang a . Untuk presentasi citra, ubah $baba = 1$ menjadi $bab = a^{-1}$ dan dorong setiap b ke satu sisi kata. Untuk subgrup ruang atas, jangan memakai relasi $b^2 = 1$: relasi itu berlaku pada citra permutasi, bukan pada grup bebas dasar. Pembangkit Schreier yang tersisa akan membentuk basis bebas. Pohon merentang mempunyai $V - 1$ sisi, sedangkan graf mempunyai 8 sisi positif.

1.6 Program lengkap

Berkas kanonis: o012_d60_lab01_monodromy.py. Proses pembuatan pembaca mengganti penanda berikut dengan byte sumber tersebut agar HTML dan PDF tetap mandiri dan agar salinan tampilan tidak dapat menyimpang dari berkas yang diuji.

```
#!/usr/bin/env python3
"""Laboratorium D60-01: monodromi, data Schreier, dan presentasi grup.

SPDX-License-Identifier: CC-BY-SA-4.0
Materi asli edisi diproduksi dengan OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra.
"""
from __future__ import annotations

import sys
from collections import deque
from collections.abc import Iterable, Mapping

INVERSE_LETTER = {"a": "A", "A": "a", "b": "B", "B": "b"}
LETTER_ORDER = ("a", "A", "b", "B")
POSITIVE_GENERATORS = ("a", "b")

def inverse_permutation(permutation: tuple[int, ...]) -> tuple[int, ...]:
    inverse = [0] * len(permutation)
    for source, target in enumerate(permutation):
        inverse[target] = source
    return tuple(inverse)

def inverse_word(word: str) -> str:
    """Kembalikan invers suatu kata pada alfabet a,A,b,B."""
    _validate_word(word)
    return "".join(INVERSE_LETTER[letter] for letter in reversed(word))

def reduce_word(word: str) -> str:
    """Reduksi bebas suatu kata dalam grup bebas F(a,b)."""
    _validate_word(word)
    stack: list[str] = []
    for letter in word:
        if stack and INVERSE_LETTER[letter] == stack[-1]:
            stack.pop()
        else:
            stack.append(letter)
    return "".join(stack)

def _validate_word(word: str) -> None:
    invalid = sorted(set(word) - set(LETTER_ORDER))
    if invalid:
        raise ValueError(f"huruf kata tidak sah: {invalid}")

def cycle_notation(permutation: tuple[int, ...]) -> str:
```

```

"""Tulis permutasi sebagai siklus-siklus taktrivial yang saling lepas."""
seen: set[int] = set()
cycles: list[str] = []
for start in range(len(permutation)):
    if start in seen:
        continue
    cycle: list[int] = []
    current = start
    while current not in seen:
        seen.add(current)
        cycle.append(current)
        current = permutation[current]
    if len(cycle) > 1:
        cycles.append("(" + " ".join(str(value) for value in cycle) + ")")
return "".join(cycles) or "()"

```

```

class CoveringAction:
    """Aksi monodromi kanan berhingga  $F(a,b)$  pada lembaran bernomor."""

    def __init__(self, positive: Mapping[str, Iterable[int]]) -> None:
        if tuple(positive) != POSITIVE_GENERATORS:
            raise ValueError("pembangkit positif harus diberikan dalam urutan a,b")
        converted = {name: tuple(values) for name, values in positive.items()}
        degree = len(converted["a"])
        if degree == 0 or len(converted["b"]) != degree:
            raise ValueError("kedua permutasi harus mempunyai derajat positif yang sama")
        expected = tuple(range(degree))
        for name, permutation in converted.items():
            if tuple(sorted(permutation)) != expected:
                raise ValueError(f" $R_{\{name\}}$  bukan permutasi lembaran  $0, \dots, \{degree - 1\}$ ")
        self.degree = degree
        self.transitions = {
            "a": converted["a"],
            "A": inverse_permutation(converted["a"]),
            "b": converted["b"],
            "B": inverse_permutation(converted["b"]),
        }

    def act(self, sheet: int, word: str) -> int:
        """Terapkan aksi kanan langsung menurut urutan kronologis kata."""
        if sheet not in range(self.degree):
            raise ValueError(f"lembaran di luar rentang: {sheet}")
        _validate_word(word)
        current = sheet
        for letter in word:
            current = self.transitions[letter][current]
        return current

    def permutation(self, word: str) -> tuple[int, ...]:
        return tuple(self.act(sheet, word) for sheet in range(self.degree))

    def orbit(self, start: int) -> tuple[int, ...]:
        if start not in range(self.degree):
            raise ValueError(f"lembaran di luar rentang: {start}")
        reached = {start}
        queue = deque([start])
        while queue:
            current = queue.popleft()
            for letter in LETTER_ORDER:
                target = self.transitions[letter][current]
                if target not in reached:
                    reached.add(target)
                    queue.append(target)
        return tuple(sorted(reached))

    def orbits(self) -> tuple[tuple[int, ...], ...]:
        unseen = set(range(self.degree))
        result: list[tuple[int, ...]] = []
        while unseen:
            orbit = self.orbit(min(unseen))
            result.append(orbit)
            unseen.difference_update(orbit)
        return tuple(result)

    def image(self) -> tuple[tuple[int, ...], ...]:

```

```

        """Daftarkan citra hingga yang dibangkitkan oleh operator transisi."""
        identity = tuple(range(self.degree))
        reached = {identity}
        queue = deque([identity])
        while queue:
            current = queue.popleft()
            for letter in LETTER_ORDER:
                transition = self.transitions[letter]
                extended = tuple(transition[current[sheet]] for sheet in range(self.degree))
                if extended not in reached:
                    reached.add(extended)
                    queue.append(extended)
        return tuple(sorted(reached))

def schreier_transversal(self, start: int = 0) -> dict[int, str]:
    """Pilih transversal deterministik yang tertutup terhadap prefiks."""
    if start not in range(self.degree):
        raise ValueError(f"lembaran di luar rentang: {start}")
    words = {start: ""}
    queue = deque([start])
    while queue:
        current = queue.popleft()
        for letter in LETTER_ORDER:
            target = self.transitions[letter][current]
            if target not in words:
                words[target] = words[current] + letter
                queue.append(target)
    return words

def schreier_basis(self, start: int = 0) -> tuple[str, ...]:
    """Kembalikan pembangkit Schreier taktrivial  $t^x \overline{tx}^{-1}$ ."""
    transversal = self.schreier_transversal(start)
    if len(transversal) != self.degree:
        raise ValueError("pembentukan basis bebas memerlukan aksi transitif")
    basis: list[str] = []
    for sheet in range(self.degree):
        representative = transversal[sheet]
        for generator in POSITIVE_GENERATORS:
            target = self.act(sheet, generator)
            word = reduce_word(
                representative + generator + inverse_word(transversal[target])
            )
            if word:
                basis.append(word)
    return tuple(basis)

def graph_rank(self) -> int:
    if len(self.orbits()) != 1:
        raise ValueError("rumus rank tunggal ini memerlukan graf terhubung")
    vertices = self.degree
    positive_edges = self.degree * len(POSITIVE_GENERATORS)
    return positive_edges - vertices + 1

def build_lab_action() -> CoveringAction:
    return CoveringAction(
        {
            "a": (1, 2, 3, 0),
            "b": (0, 3, 2, 1),
        }
    )

def summary_lines(action: CoveringAction) -> list[str]:
    orbit = action.orbit(0)
    transversal = action.schreier_transversal(0)
    basis = action.schreier_basis(0)
    relations = {
        "a4": action.permutation("aaaa") == tuple(range(action.degree)),
        "b2": action.permutation("bb") == tuple(range(action.degree)),
        "baba": action.permutation("baba") == tuple(range(action.degree)),
    }
    lines = [
        "LABORATORIUM 0012-D60-LAB01",
        f"jumlah_lembaran: {action.degree}",
        f"R_a: {cycle_notation(action.transitions['a'])}",
    ]

```

```

        f"R_b: {cycle_notation(action.transitions['b'])}",
        f"orbit_lembaran_0: {list(orbit)}",
        f"terhubung: {str(len(orbit) == action.degree).lower()}",
        f"orde_citra_monodromi: {len(action.image())}",
        f"relasi_a4: {str(relations['a4']).lower()}",
        f"relasi_b2: {str(relations['b2']).lower()}",
        f"relasi_baba: {str(relations['baba']).lower()}",
        f"indeks_stabilisator: {len(orbit)}",
        f"simpul_graf: {action.degree}",
        f"sisi_graf: {action.degree * len(POSITIVE_GENERATORS)}",
        f"rank_grup_penutup: {action.graph_rank()}",
        "transversal_schreier:",
    ]
    for sheet in range(action.degree):
        lines.append(f" {sheet}: {transversal[sheet] or '1'}")
    lines.append("basis_bebas:")
    lines.extend(f" {word}" for word in basis)
    lines.extend(
        [
            f"basis_memperbaiki_0: {str(all(action.act(0, word) == 0 for word in basis)).lower()}",
            "presentasi_citra: <a,b | a^4, b^2, baba>",
            "presentasi_penutup: <b, aba, aaaa, aabAA, AbA | >",
        ]
    )
    return lines

def main() -> int:
    payload = ("\n".join(summary_lines(build_lab_action()))) + "\n".encode("utf-8")
    sys.stdout.buffer.write(payload)
    return 0

if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())

```

1.7 Uji deterministik lengkap

Berkas kanonis: test_o012_d60_lab01_monodromy.py.

```

#!/usr/bin/env python3
"""Uji deterministik untuk 0012-D60-LAB01.

SPDX-License-Identifier: CC-BY-SA-4.0
"""
from __future__ import annotations

import subprocess
import sys
import unittest
from pathlib import Path

from o012_d60_lab01_monodromy import (
    CoveringAction,
    build_lab_action,
    inverse_word,
    reduce_word,
)

HERE = Path(__file__).resolve().parent
PROGRAM = HERE / "o012_d60_lab01_monodromy.py"
EXPECTED = HERE / "expected-output-lab01.txt"

class Lab01Tests(unittest.TestCase):
    def setUp(self) -> None:
        self.action = build_lab_action()

    def test_inverse_transitions_and_free_reduction(self) -> None:
        for sheet in range(self.action.degree):
            self.assertEqual(self.action.act(sheet, "aA"), sheet)
            self.assertEqual(self.action.act(sheet, "Aa"), sheet)
            self.assertEqual(self.action.act(sheet, "bB"), sheet)
            self.assertEqual(self.action.act(sheet, "Bb"), sheet)

```

```

        self.assertEqual(inverse_word("abA"), "aBA")
        self.assertEqual(reduce_word("abBAaA"), "")

def test_connected_orbit_image_and_relations(self) -> None:
    identity = tuple(range(4))
    self.assertEqual(self.action.orbit(0), (0, 1, 2, 3))
    self.assertEqual(len(self.action.image()), 8)
    self.assertEqual(self.action.permutation("aaaa"), identity)
    self.assertEqual(self.action.permutation("bb"), identity)
    self.assertEqual(self.action.permutation("baba"), identity)

def test_transversal_basis_and_rank(self) -> None:
    self.assertEqual(
        self.action.schreier_transversal(0),
        {0: "", 1: "a", 3: "A", 2: "aa"},
    )
    basis = ("b", "aba", "aaaa", "aabAA", "AbA")
    self.assertEqual(self.action.schreier_basis(0), basis)
    self.assertEqual(self.action.graph_rank(), 5)
    self.assertTrue(all(self.action.act(0, word) == 0 for word in basis))

def test_disconnected_fixture(self) -> None:
    disconnected = CoveringAction(
        {
            "a": (1, 0, 3, 2),
            "b": (0, 1, 2, 3),
        }
    )
    self.assertEqual(disconnected.orbits(), ((0, 1), (2, 3)))
    with self.assertRaisesRegex(ValueError, "transitif"):
        disconnected.schreier_basis(0)

def test_invalid_permutation_and_word_are_rejected(self) -> None:
    with self.assertRaisesRegex(ValueError, "bukan permutasi"):
        CoveringAction({"a": (0, 0), "b": (0, 1)})
    with self.assertRaisesRegex(ValueError, "huruf kata tidak sah"):
        self.action.act(0, "ac")

def test_cli_matches_frozen_expected_output(self) -> None:
    process = subprocess.run(
        [sys.executable, "-B", str(PROGRAM)],
        cwd=HERE,
        check=True,
        stdout=subprocess.PIPE,
        stderr=subprocess.PIPE,
    )
    self.assertEqual(process.stderr, b"")
    self.assertEqual(process.stdout, EXPECTED.read_bytes())

if __name__ == "__main__":
    unittest.main(verbosity=2)

```

1.8 Keluaran acuan

Berkas kanonis: expected-output-lab01.txt.

```

LABORATORIUM 0012-D60-LAB01
jumlah_lembaran: 4
R_a: (0 1 2 3)
R_b: (1 3)
orbit_lembaran_0: [0, 1, 2, 3]
terhubung: true
orde_citra_monodromi: 8
relasi_a4: true
relasi_b2: true
relasi_baba: true
indeks_stabilisator: 4
simpul_graf: 4
sisip_graf: 8
rank_grup_penutup: 5
transversal_schreier:
  0: 1
  1: a
  2: aa

```



```

3: A
basis_bebas:
b
aba
aaaa
aabAA
AbA
basis_memperbaiki_0: true
presentasi_citra: <a,b | a^4, b^2, baba>
presentasi_penutup: <b, aba, aaaa, aabAA, AbA | >

```

1.9 Membaca keluaran tanpa menyamakan tiga grup

Tiga grup yang muncul adalah:

1. grup dasar $F(a, b) = \pi_1(X, *)$;
2. citra permutasi $\text{im}(\rho)$, yang berorde 8, untuk homomorfisma $\rho(g) = R_{g^{-1}}$;
3. stabilisator $H = \text{Stab}_{F(a,b)}(0)$, yang berindeks 4 dan isomorfik dengan $\pi_1(Z, 0)$.

Citra adalah hasil bagi $F(a, b)/\ker \rho$. Kumpulan operator yang diperoleh sama dengan kumpulan operator aksi kanan langsung R ; mengambil invers hanya memperbaiki arah komposisi. Stabilisator adalah subgrup, bukan hasil bagi itu. Karena b memperbaiki lembaran 0, kata b berada di H ; namun b tetap berorde tak hingga di grup bebas $F(a, b)$. Hanya bayangannya di citra permutasi yang memenuhi $b^2 = 1$. Pemisahan ini adalah pemeriksaan konseptual utama laboratorium.

2 Solusi lengkap

2.1 Orbit dan citra monodromi

Pengulangan a memberi

$$0 \xrightarrow{a} 1 \xrightarrow{a} 2 \xrightarrow{a} 3 \xrightarrow{a} 0.$$

Jadi orbit 0 adalah seluruh S . Orbit aksi monodromi sama dengan komponen lintasan ruang atas; penutup ini terhubung. Pendaftaran semua unsur melalui penutupan di bawah a, A, b, B menghasilkan delapan permutasi.

Secara langsung $R_a^4 = 1$ dan $R_b^2 = 1$. Refleksi R_b membalik siklus R_a , sehingga

$$R_b R_a R_b = R_a^{-1}.$$

Dalam urutan kata aksi kanan, kata $baba$ juga memberi operator identitas. Program menguji ketiga relator titik demi titik pada seluruh serat, bukan hanya pada lembaran 0.

2.2 Presentasi citra

Dari relasi $baba = 1$ diperoleh $ba = a^{-1}b$. Dengan relasi ini, setiap kata dalam grup yang dipresentasikan dapat ditulis sebagai

$$a^i b^j, \quad 0 \leq i < 4, \quad j \in \{0, 1\}.$$

Jadi grup yang dipresentasikan mempunyai paling banyak delapan unsur. Permutasi R_a, R_b menghasilkan delapan unsur yang berbeda, sehingga homomorfisma dari grup yang dipresentasikan ke citra adalah surjektif antara dua grup berukuran delapan dan karena itu isomorfisma. Inilah grup dihedral simetri persegi.

Argumen tersebut tidak menambahkan relasi ke $F(a, b)$. Ia hanya menghitung hasil bagi yang terlihat oleh aksi empat lembaran ini. Secara khusus, $F(a, b)$ tetap tak hingga dan bebas.

2.3 Transversal, pembangkit Schreier, dan basis bebas

Pencarian lebar-pertama dengan urutan a, A, b, B memilih

$$t_0 = 1, \quad t_1 = a, \quad t_2 = aa, \quad t_3 = A.$$

Delapan calon pembangkit Schreier adalah sebagai berikut. Kolom terakhir sudah direduksi bebas.

s	x	$s \cdot x$	$t_{s \cdot x}$	$t_s x t_{s \cdot x}^{-1}$
0	a	1	a	1
0	b	0	1	b
1	a	2	aa	1
1	b	3	A	aba
2	a	3	A	$aaaa$
2	b	2	aa	$aabAA$
3	a	0	1	1
3	b	1	a	AbA

Tiga kata identitas adalah sisi pohon merentang. Lima kata nontrivial

$$b, \quad aba, \quad aaaa, \quad aabAA, \quad AbA$$

semuanya memperbaiki lembaran 0, sebagaimana diperiksa program.

Graf terhubung mempunyai $V = 4$ simpul dan $E = 8$ sisi positif. Maka

$$\text{rank } \pi_1(Z, 0) = E - V + 1 = 8 - 4 + 1 = 5.$$

Mengontraksikan pohon merentang meninggalkan lima loop bebas, tepat lima kata Schreier di atas. Jadi

$$\pi_1(Z, 0) \cong H = \text{Stab}_{F(a,b)}(0) \cong F_5$$

dengan presentasi

$$\langle b, aba, aaaa, aabAA, AbA \mid \rangle.$$

Kesamaan dengan stabilisator memakai Teorema 9.2 dan injektivitas pemetaan grup fundamental yang diinduksi suatu ruang penutup.

2.4 Uji negatif dan arti kegagalan

Untuk data uji negatif, a menukar 0 dengan 1 dan menukar 2 dengan 3, sedangkan b tidak memindahkan lembaran. Orbitnya adalah

$$\{0, 1\}, \quad \{2, 3\}.$$

Data uji itu masih mendefinisikan penutup empat lembaran, tetapi ruang atasnya mempunyai dua komponen. Rutin `schreier_basis(0)` sengaja menolak permintaan basis tunggal bagi seluruh graf: transversal dari 0 hanya mencapai komponen pertama. Masing-masing komponen dapat dianalisis sendiri dengan titik basisnya.

2.5 Pemeriksaan reproduktibilitas

Uji otomatis memeriksa:

1. tabel transisi bijektif dan operator invers benar;
2. reduksi bebas serta penolakan huruf kata yang tidak sah;
3. orbit terhubung, orde citra, dan ketiga relator;
4. transversal, lima pembangkit Schreier, dan rumus rank;
5. setiap pembangkit basis memperbaiki lembaran 0;
6. data uji dua orbit ditolak oleh rutin yang mensyaratkan transitivitas;
7. keluaran CLI sama byte demi byte dengan keluaran acuan UTF-8 berakhiran LF.

Dengan demikian keluaran bukan tangkapan layar atau hasil yang diketik ulang: ia terikat pada kode yang sama dengan kode yang disajikan dalam pembaca.

2.6 Hak, atribusi, dan provenans

Laboratorium, program, uji, keluaran acuan, interpretasi, dan solusi ini adalah materi asli edisi dan didistribusikan di bawah CC BY-SA 4.0. Materi ini menggunakan hasil matematika yang sudah dikembangkan dalam edisi Roberts dan lapisan rute komposit, tetapi tidak menyalin ekspresi dari bank masalah yang dikecualikan. Produksi dilakukan dengan **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra** atas arahan pengguna. Kredit, lisensi, dan hubungan sumber David Michael Roberts serta Yeheli Fomberg tetap dibedakan; laboratorium ini tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

1 Laboratorium Komputasi 2 — Matriks Batas dan Bentuk Normal Smith

1.1 Status dan keluaran laboratorium

Laboratorium ini adalah materi asli edisi. Kita mulai dari data simpleks berhingga, membangun matriks batas integral tanpa jaringan, lalu menghitung bentuk normal Smith beserta sertifikat perubahan basisnya. Contoh utama ialah triangulasi enam simpul bidang projektif real $\mathbb{RP}^2$. Contoh itu cukup kecil untuk diaudit dengan tangan, tetapi cukup kaya untuk memperlihatkan kelas torsi $H_1(\mathbb{RP}^2; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Paket laboratorium memuat program Python yang hanya memakai pustaka standar, enam uji deterministik, keluaran acuan, interpretasi matematis, petunjuk, dan solusi lengkap. Program tidak sekadar mengumumkan grup homologi. Ia memeriksa $\partial_1 \partial_2 = 0$, menghasilkan matriks unimodular U, V , dan memverifikasi identitas eksak

$$UAV = D$$

untuk setiap bentuk normal Smith D . Sebuah siklus torsi eksplisit dilengkapi dua bukti yang berbeda: rantai yang mengisi dua kali siklus itu dan kosiklus modulo 2 yang membuktikan bahwa siklusnya sendiri bukan batas.

1.2 Prasyarat yang dipakai

- rantai simpleksial sebagai grup abelian bebas: definisi rantai;
- rumus muka berselang-seling: definisi pemetaan batas dan contoh sisi serta segitiga;
- syarat kompleks rantai: lema $\partial^2 = 0$;
- siklus, batas, dan hasil bagi: siklus, batas, dan homologi;
- contoh reduksi Smith yang lebih kecil tersedia pada Pemeriksaan Penguasaan F7.1, tetapi laboratorium ini memakai matriks batas simpleksial, bukan matriks batas seluler.

1.3 Tujuan

Sesudah menyelesaikan laboratorium ini, pembaca dapat:

1. mengubah daftar simpleks berorientasi menjadi matriks batas integral;
2. mendeteksi kesalahan tanda dengan menguji $\partial_{n-1} \partial_n = 0$;
3. memeriksa bahwa data simpleks memang membentuk triangulasi permukaan tertutup;
4. membaca rank bebas dan faktor torsi dari bentuk normal Smith;
5. memeriksa sertifikat Smith, bukan hanya mempercayai diagonal keluaran;
6. membuktikan secara eksplisit bahwa suatu kelas mempunyai orde tepat 2;
7. menjelaskan mengapa perubahan urutan atau orientasi basis tidak mengubah homologi;
8. memakai kontrol tanpa torsi untuk membedakan kesimpulan matematis dari artefak program.

1.4 Data simpleks dan konvensi basis

Ambil simpul

$$v_0, v_1, v_2, v_3, v_4, v_5.$$

Semua sisi $e_{ij} = [v_i, v_j]$ diarahkan dari i ke j untuk $i < j$ dan diurutkan leksikografis:

$$(e_{01}, e_{02}, e_{03}, e_{04}, e_{05}, e_{12}, e_{13}, e_{14}, e_{15}, \\ e_{23}, e_{24}, e_{25}, e_{34}, e_{35}, e_{45}).$$

Sepuluh simpleks-2 juga memakai urutan simpul menaik dan basis terurut

$$(f_{012}, f_{013}, f_{024}, f_{035}, f_{045}, \\ f_{125}, f_{134}, f_{145}, f_{234}, f_{235}).$$

Masing-masing dari $\binom{6}{2} = 15$ sisi muncul tepat dua kali dalam kumpulan ini. Tautan setiap simpul adalah suatu siklus lima sisi. Karena itu realisasi geometrisnya merupakan permukaan tertutup terhubung. Karakteristik Eulernya ialah

$$\chi = 6 - 15 + 10 = 1.$$

Pemeriksaan orientasi menghasilkan kontradiksi di sepanjang siklus pada graf dual

$$f_{012}, f_{013}, f_{035}, f_{235}, f_{125}, f_{012}.$$

Jadi permukaan itu tidak terorientasi. Klasifikasi permukaan tertutup kemudian mengenalinya sebagai bidang projektif real.

1.5 Dari muka ke matriks

Untuk $i < j$,

$$\partial_1 e_{ij} = v_j - v_i.$$

Untuk $i < j < k$,

$$\partial_2 f_{ijk} = e_{jk} - e_{ik} + e_{ij}.$$

Dengan basis di atas, sepuluh kolom matriks $[\partial_2]$ ditentukan oleh

$$\begin{array}{ll} \partial f_{012} &= e_{12} - e_{02} + e_{01}, & \partial f_{013} &= e_{13} - e_{03} + e_{01}, \\ \partial f_{024} &= e_{24} - e_{04} + e_{02}, & \partial f_{035} &= e_{35} - e_{05} + e_{03}, \\ \partial f_{045} &= e_{45} - e_{05} + e_{04}, & \partial f_{125} &= e_{25} - e_{15} + e_{12}, \\ \partial f_{134} &= e_{34} - e_{14} + e_{13}, & \partial f_{145} &= e_{45} - e_{15} + e_{14}, \\ \partial f_{234} &= e_{34} - e_{24} + e_{23}, & \partial f_{235} &= e_{35} - e_{25} + e_{23}. \end{array}$$

Program membangun kedua matriks langsung dari daftar simpleks dan rumus muka, bukan dari salinan matriks yang diketik terpisah. Matriks ∂_1 berukuran 6×15 dan matriks ∂_2 berukuran 15×10 .

Tugas 1 — jalankan bukti komputasional. Dari akar repositori, jalankan

```
python -B source/id-ID/labs/test_o012_d60_lab02_smith_normal_form.py
python -B source/id-ID/labs/o012_d60_lab02_smith_normal_form.py
```

Pastikan keenam uji lulus, aliran galat kosong, dan keluaran program sama byte demi byte dengan `expected-output-lab02.txt`.

Tugas 2 — audit kompleks permukaan. Hitung banyaknya kemunculan setiap sisi dalam daftar muka. Tuliskan tautan keenam simpul sebagai siklus. Periksa $\chi = 1$ dan ikuti kendala orientasi di sepanjang siklus dual yang ditampilkan di atas untuk menunjukkan bahwa permukaan tidak terorientasi.

Tugas 3 — bangun matriks batas. Bentuk kolom $\partial_1(e_{ij})$ dan $\partial_2(f_{ijk})$ dalam basis terurut. Kalikan matriksnya dan periksa $[\partial_1][\partial_2] = 0$. Kemudian ubah sengaja satu koefisien kolom f_{012} dan jelaskan mengapa uji yang sama harus gagal.

Tugas 4 — bentuk normal Smith dan homologi. Verifikasi keluaran

$$\text{SNF}(\partial_1) = \text{diag}(1, 1, 1, 1, 1, 0),$$

dan bahwa bagian tak nol bentuk normal Smith ∂_2 ialah

$$(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2).$$

Gunakan rank kedua pemetaan dan faktor invarian terakhir untuk menghitung H_0, H_1, H_2 dengan koefisien integral. Periksa pula identitas $UAV = D$, $|\det U| = |\det V| = 1$, bahwa entri diagonal tidak negatif, dan syarat keterbagian.

Tugas 5 — saksikan torsi, jangan hanya membacanya. Tetapkan

$$z = e_{01} - e_{04} + e_{14}.$$

Periksa $\partial_1 z = 0$. Temukan rantai-2 c dengan $\partial_2 c = 2z$. Lalu definisikan korantai modulo 2 yang bernilai 1 pada

$$e_{01}, e_{02}, e_{13}, e_{24}, e_{34}$$

dan bernilai 0 pada sisi lain. Buktikan bahwa korantai itu mematikan setiap batas tetapi bernilai 1 pada z . Simpulkan bahwa $[z]$ berorde tepat 2.

Tugas 6 — perubahan basis dan kontrol. Susun ulang sisi dan muka lalu balikkan beberapa orientasi. Bentuk matriks batas baru dengan matriks permutasi bertanda dan periksa bahwa bentuk normal Smith tidak berubah. Sebagai kontrol, jalankan perhitungan pada batas tetrahedron. Jelaskan mengapa kontrol itu memberi $H_0 \cong \mathbb{Z}$, $H_1 = 0$, dan $H_2 \cong \mathbb{Z}$ tanpa faktor torsi.

Petunjuk. Setiap kolom ∂_2 mempunyai pola tanda $+, -, +$. Pembatalan $\partial_1 \partial_2 = 0$ terjadi per kolom, jadi satu salah tanda sudah dapat dideteksi. Untuk homologi, gunakan

$$\text{rank}_{\mathbb{Z}} H_n^{\text{bebas}} = \text{rank } C_n - \text{rank } \partial_n - \text{rank } \partial_{n+1}.$$

Torsi H_n dibaca dari faktor invarian lebih besar daripada 1 pada ∂_{n+1} . Alasannya, $C_n / \ker \partial_n \cong \text{im } \partial_n$ bebas, sehingga $\ker \partial_n$ merupakan suku langsung dari C_n dan torsi coker ∂_{n+1} tepat sama dengan torsi H_n . Untuk saksi torsi, coba jumlah bertanda kesepuluh muka. Jika z adalah batas integral, reduksi modulo 2 juga merupakan batas; pasangan dengan suatu kosiklus modulo 2 harus nol.

1.6 Program lengkap

Berkas kanonis: `o012_d60_lab02_smith_normal_form.py`. Proses pembuatan pembaca mengganti penanda berikut dengan byte sumber tersebut agar HTML dan PDF tetap mandiri dan agar salinan tampilan tidak dapat menyimpang dari berkas yang diuji.

```

#!/usr/bin/env python3
"""Laboratorium D60-02: matriks batas dan bentuk normal Smith.

SPDX-License-Identifier: CC-BY-SA-4.0
Materi asli edisi diproduksi dengan OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra.
"""
from __future__ import annotations

import sys
from collections import Counter, defaultdict, deque
from dataclasses import dataclass
from itertools import combinations

Matrix = tuple[tuple[int, ...], ...]
Simplex = tuple[int, ...]

RP2_FACES: tuple[Simplex, ...] = (
    (0, 1, 2),
    (0, 1, 3),
    (0, 2, 4),
    (0, 3, 5),
    (0, 4, 5),
    (1, 2, 5),
    (1, 3, 4),
    (1, 4, 5),
    (2, 3, 4),
    (2, 3, 5),
)

S2_FACES: tuple[Simplex, ...] = tuple(combinations(range(4), 3))

def freeze(rows: list[list[int]] | tuple[tuple[int, ...], ...]) -> Matrix:
    result = tuple(tuple(int(value) for value in row) for row in rows)
    if result and any(len(row) != len(result[0]) for row in result):
        raise ValueError("semua baris matriks harus sama panjang")
    return result

def shape(matrix: Matrix) -> tuple[int, int]:
    if not matrix:
        return 0, 0
    columns = len(matrix[0])
    if any(len(row) != columns for row in matrix):
        raise ValueError("semua baris matriks harus sama panjang")
    return len(matrix), columns

def identity(size: int) -> Matrix:
    if size < 0:
        raise ValueError("ukuran identitas tidak boleh negatif")
    return tuple(
        tuple(1 if row == column else 0 for column in range(size))
        for row in range(size)
    )

def transpose(matrix: Matrix) -> Matrix:
    rows, columns = shape(matrix)
    return tuple(tuple(matrix[row][column] for row in range(rows)) for column in range(columns))

def matmul(left: Matrix, right: Matrix) -> Matrix:
    left_rows, left_columns = shape(left)
    right_rows, right_columns = shape(right)
    if left_columns != right_rows:
        raise ValueError(
            f"ukuran matriks tidak cocok untuk perkalian: "
            f"{left_rows}x{left_columns} dan {right_rows}x{right_columns}"
        )
    return tuple(
        tuple(
            sum(left[row][index] * right[index][column] for index in range(left_columns))
            for column in range(right_columns)
        )
    )

```

```

        for row in range(left_rows)
    )

def matvec(matrix: Matrix, vector: tuple[int, ...]) -> tuple[int, ...]:
    rows, columns = shape(matrix)
    if columns != len(vector):
        raise ValueError("panjang vektor tidak cocok dengan domain matriks")
    return tuple(
        sum(matrix[row][column] * vector[column] for column in range(columns))
        for row in range(rows)
    )

def is_zero_matrix(matrix: Matrix) -> bool:
    return all(value == 0 for row in matrix for value in row)

def determinant_bareiss(matrix: Matrix) -> int:
    rows, columns = shape(matrix)
    if rows != columns:
        raise ValueError("determinan hanya didefinisikan untuk matriks persegi")
    if rows == 0:
        return 1
    work = [list(row) for row in matrix]
    sign = 1
    previous = 1
    for pivot_index in range(rows - 1):
        pivot_row = next(
            (row for row in range(pivot_index, rows) if work[row][pivot_index] != 0),
            None,
        )
        if pivot_row is None:
            return 0
        if pivot_row != pivot_index:
            work[pivot_index], work[pivot_row] = work[pivot_row], work[pivot_index]
            sign *= -1
        pivot = work[pivot_index][pivot_index]
        for row in range(pivot_index + 1, rows):
            for column in range(pivot_index + 1, rows):
                numerator = (
                    work[row][column] * pivot
                    - work[row][pivot_index] * work[pivot_index][column]
                )
                if numerator % previous != 0:
                    raise ArithmeticError("pembagian Bareiss tidak eksak")
                work[row][column] = numerator // previous
            for row in range(pivot_index + 1, rows):
                work[row][pivot_index] = 0
        previous = pivot
    return sign * work[-1][-1]

@dataclass(frozen=True)
class SmithResult:
    diagonal: tuple[int, ...]
    transformed: Matrix
    left: Matrix
    right: Matrix

    @property
    def rank(self) -> int:
        return len(self.diagonal)

def smith_normal_form(matrix: Matrix) -> SmithResult:
    """Hitung  $UAV = D$  dengan  $U, V$  unimodular dan  $D$  bentuk normal Smith."""
    matrix = freeze(matrix)
    rows, columns = shape(matrix)
    work = [list(row) for row in matrix]
    left = [list(row) for row in identity(rows)]
    right = [list(row) for row in identity(columns)]

    def swap_rows(first: int, second: int) -> None:
        work[first], work[second] = work[second], work[first]
        left[first], left[second] = left[second], left[first]

```



```

def swap_columns(first: int, second: int) -> None:
    for target in (work, right):
        for row in target:
            row[first], row[second] = row[second], row[first]

def add_row(target: int, source: int, multiple: int) -> None:
    work[target] = [
        value + multiple * source_value
        for value, source_value in zip(work[target], work[source], strict=True)
    ]
    left[target] = [
        value + multiple * source_value
        for value, source_value in zip(left[target], left[source], strict=True)
    ]

def add_column(target: int, source: int, multiple: int) -> None:
    for table in (work, right):
        for row in table:
            row[target] += multiple * row[source]

def negate_row(row: int) -> None:
    work[row] = [-value for value in work[row]]
    left[row] = [-value for value in left[row]]

pivot_index = 0
while pivot_index < rows and pivot_index < columns:
    candidates = [
        (abs(work[row][column]), row, column)
        for row in range(pivot_index, rows)
        for column in range(pivot_index, columns)
        if work[row][column] != 0
    ]
    if not candidates:
        break
    _, pivot_row, pivot_column = min(candidates)
    swap_rows(pivot_index, pivot_row)
    swap_columns(pivot_index, pivot_column)

    while True:
        changed = False
        pivot = work[pivot_index][pivot_index]
        for row in range(pivot_index + 1, rows):
            if work[row][pivot_index] == 0:
                continue
            quotient = work[row][pivot_index] // pivot
            add_row(row, pivot_index, -quotient)
            if work[row][pivot_index] != 0:
                swap_rows(row, pivot_index)
            changed = True
            break
        if changed:
            continue

        pivot = work[pivot_index][pivot_index]
        for column in range(pivot_index + 1, columns):
            if work[pivot_index][column] == 0:
                continue
            quotient = work[pivot_index][column] // pivot
            add_column(column, pivot_index, -quotient)
            if work[pivot_index][column] != 0:
                swap_columns(column, pivot_index)
            changed = True
            break
        if changed:
            continue

        pivot = work[pivot_index][pivot_index]
        offending = next(
            (
                (row, column)
                for row in range(pivot_index + 1, rows)
                for column in range(pivot_index + 1, columns)
                if work[row][column] % pivot != 0
            ),
            None,

```

```

        )
        if offending is None:
            break
        row, _ = offending
        add_row(pivot_index, row, 1)

    if work[pivot_index][pivot_index] < 0:
        negate_row(pivot_index)
    pivot_index += 1

transformed = freeze(work)
diagonal = tuple(
    transformed[index][index]
    for index in range(min(rows, columns))
    if transformed[index][index] != 0
)
return SmithResult(diagonal, transformed, freeze(left), freeze(right))

def smith_certificate(matrix: Matrix, result: SmithResult) -> bool:
    try:
        rows, columns = shape(matrix)
        if shape(result.left) != (rows, rows) or shape(result.right) != (columns, columns):
            return False
        if shape(result.transformed) != (rows, columns):
            return False
        if matmul(matmul(result.left, matrix), result.right) != result.transformed:
            return False
        for row in range(rows):
            for column in range(columns):
                if row != column and result.transformed[row][column] != 0:
                    return False
        full_diagonal = tuple(
            result.transformed[index][index] for index in range(min(rows, columns))
        )
        nonzero = tuple(value for value in full_diagonal if value != 0)
        if nonzero != result.diagonal or any(value < 0 for value in nonzero):
            return False
        if any(value == 0 for value in full_diagonal[: len(nonzero)]):
            return False
        if any(
            next_value % value != 0
            for value, next_value in zip(nonzero, nonzero[1:])
        ):
            return False
        return abs(determinant_bareiss(result.left)) == 1 and abs(
            determinant_bareiss(result.right)
        ) == 1
    except (ArithmeticError, IndexError, ValueError):
        return False

def validate_simplices(simplices: tuple[Simplex, ...], dimension: int) -> None:
    if len(set(simplices)) != len(simplices):
        raise ValueError("basis simpleks memuat duplikat")
    for simplex in simplices:
        if (
            len(simplex) != dimension + 1
            or any(first >= second for first, second in zip(simplex, simplex[1:]))
        ):
            raise ValueError(
                "simpul setiap simpleks harus terurut naik secara ketat dan berdimensi benar"
            )

def simplex_boundary_matrix(
    domain: tuple[Simplex, ...], codomain: tuple[Simplex, ...]
) -> Matrix:
    if not domain:
        if codomain:
            validate_simplices(codomain, len(codomain[0]) - 1)
            return tuple(tuple() for _ in codomain)
    dimension = len(domain[0]) - 1
    validate_simplices(domain, dimension)
    validate_simplices(codomain, dimension - 1)
    codomain_index = {simplex: index for index, simplex in enumerate(codomain)}

```

```

matrix = [[0 for _ in domain] for _ in codomain]
for column, simplex in enumerate(domain):
    for deleted in range(len(simplex)):
        face = simplex[:deleted] + simplex[deleted + 1 :]
        if face not in codomain_index:
            raise ValueError(f"muka {face} tidak ada dalam basis kodomain")
        matrix[codomain_index[face]][column] += -1 if deleted % 2 else 1
    return freeze(matrix)

@dataclass(frozen=True)
class SurfaceComplex:
    vertices: tuple[Simplex, ...]
    edges: tuple[Simplex, ...]
    faces: tuple[Simplex, ...]
    d1: Matrix
    d2: Matrix

def build_surface(faces: tuple[Simplex, ...]) -> SurfaceComplex:
    validate_simplices(faces, 2)
    vertex_values = tuple(sorted({vertex for face in faces for vertex in face}))
    vertices = tuple((vertex,) for vertex in vertex_values)
    edges = tuple(
        sorted({edge for face in faces for edge in combinations(face, 2)})
    )
    return SurfaceComplex(
        vertices,
        edges,
        faces,
        simplex_boundary_matrix(edges, vertices),
        simplex_boundary_matrix(faces, edges),
    )

def edge_incidence_counts(faces: tuple[Simplex, ...]) -> Counter[Simplex]:
    return Counter(edge for face in faces for edge in combinations(face, 2))

def vertex_links_are_cycles(faces: tuple[Simplex, ...]) -> bool:
    vertices = sorted({vertex for face in faces for vertex in face})
    for vertex in vertices:
        adjacency: dict[int, set[int]] = defaultdict(set)
        for face in faces:
            if vertex not in face:
                continue
            other = [value for value in face if value != vertex]
            adjacency[other[0]].add(other[1])
            adjacency[other[1]].add(other[0])
        if not adjacency or any(len(neighbours) != 2 for neighbours in adjacency.values()):
            return False
        start = min(adjacency)
        reached = {start}
        queue = deque([start])
        while queue:
            current = queue.popleft()
            for neighbour in adjacency[current]:
                if neighbour not in reached:
                    reached.add(neighbour)
                    queue.append(neighbour)
        if reached != set(adjacency):
            return False
    return True

def boundary_coefficient(face: Simplex, edge: Simplex) -> int:
    for deleted in range(3):
        if face[:deleted] + face[deleted + 1 :] == edge:
            return -1 if deleted % 2 else 1
    raise ValueError("sisi bukan muka dari simpleks-2")

def is_orientable_closed_surface(faces: tuple[Simplex, ...]) -> bool:
    incidence: dict[Simplex, list[tuple[int, int]]] = defaultdict(list)
    for face_index, face in enumerate(faces):
        for edge in combinations(face, 2):

```

```

        incidence[edge].append((face_index, boundary_coefficient(face, edge)))
    if any(len(entries) != 2 for entries in incidence.values()):
        raise ValueError("uji orientabilitas memerlukan tepat dua muka per sisi")
    neighbours: dict[int, list[tuple[int, int]]] = defaultdict(list)
    for entries in incidence.values():
        (first, first_coefficient), (second, second_coefficient) = entries
        ratio = -first_coefficient * second_coefficient
        neighbours[first].append((second, ratio))
        neighbours[second].append((first, ratio))
    signs: dict[int, int] = {}
    for start in range(len(faces)):
        if start in signs:
            continue
        signs[start] = 1
        queue = deque([start])
        while queue:
            current = queue.popleft()
            for neighbour, ratio in neighbours[current]:
                required = signs[current] * ratio
                if neighbour in signs and signs[neighbour] != required:
                    return False
                if neighbour not in signs:
                    signs[neighbour] = required
                    queue.append(neighbour)
    return True

def homology_invariants(
    chain_rank: int,
    current_boundary: SmithResult | None,
    next_boundary: SmithResult | None,
) -> tuple[int, tuple[int, ...]]:
    current_rank = 0 if current_boundary is None else current_boundary.rank
    next_rank = 0 if next_boundary is None else next_boundary.rank
    free_rank = chain_rank - current_rank - next_rank
    if free_rank < 0:
        raise ValueError("rank batas tidak mungkin bagi suatu kompleks rantai")
    torsion = (
        ()
        if next_boundary is None
        else tuple(value for value in next_boundary.diagonal if value > 1)
    )
    return free_rank, torsion

def group_notation(invariants: tuple[int, tuple[int, ...]]) -> str:
    free_rank, torsion = invariants
    summands: list[str] = []
    if free_rank == 1:
        summands.append("Z")
    elif free_rank > 1:
        summands.append(f"Z^{free_rank}")
    summands.extend(f"Z/{value}" for value in torsion)
    return " + ".join(summands) if summands else "0"

def format_chain(coefficients: tuple[int, ...], labels: tuple[str, ...]) -> str:
    terms: list[str] = []
    for coefficient, label in zip(coefficients, labels, strict=True):
        if coefficient == 0:
            continue
        magnitude = abs(coefficient)
        body = label if magnitude == 1 else f"{magnitude}{label}"
        if not terms:
            terms.append(body if coefficient > 0 else f"-{body}")
        else:
            terms.append((" + " if coefficient > 0 else " - ") + body)
    return "".join(terms) if terms else "0"

def rp2_torsion_witness(surface: SurfaceComplex) -> dict[str, object]:
    if set(surface.faces) != set(RP2_FACES) or len(surface.faces) != len(RP2_FACES):
        raise ValueError("saksi torsi ini hanya berlaku untuk triangulasi RP2 yang dibekukan")
    cycle_by_edge = {(0, 1): 1, (0, 4): -1, (1, 4): 1}
    filling_by_face = {
        (0, 1, 2): 1,

```

```

(0, 1, 3): 1,
(0, 2, 4): 1,
(0, 3, 5): 1,
(0, 4, 5): -1,
(1, 2, 5): -1,
(1, 3, 4): -1,
(1, 4, 5): 1,
(2, 3, 4): 1,
(2, 3, 5): -1,
}
cycle = tuple(cycle_by_edge.get(edge, 0) for edge in surface.edges)
filling = tuple(filling_by_face[face] for face in surface.faces)
mod2_cocycle = tuple(
    1 if edge in {(0, 1), (0, 2), (1, 3), (2, 4), (3, 4)} else 0
    for edge in surface.edges
)
doubled_cycle = tuple(2 * value for value in cycle)
d1_cycle = matvec(surface.d1, cycle)
d2_filling = matvec(surface.d2, filling)
cocycle_on_boundaries = tuple(
    sum(mod2_cocycle[row] * surface.d2[row][column] for row in range(len(surface.edges)))
    % 2
    for column in range(len(surface.faces))
)
cocycle_on_cycle = sum(
    coefficient * value
    for coefficient, value in zip(mod2_cocycle, cycle, strict=True)
) % 2
twice_is_boundary = d2_filling == doubled_cycle
not_boundary = all(value == 0 for value in cocycle_on_boundaries) and cocycle_on_cycle == 1
return {
    "cycle": cycle,
    "filling": filling,
    "mod2_cocycle": mod2_cocycle,
    "is_cycle": all(value == 0 for value in d1_cycle),
    "twice_is_boundary": twice_is_boundary,
    "mod2_annihilates_boundaries": all(value == 0 for value in cocycle_on_boundaries),
    "mod2_detects_cycle": cocycle_on_cycle == 1,
    "not_boundary": not_boundary,
}

def analyse_surface(faces: tuple[Simplex, ...]) -> dict[str, object]:
    surface = build_surface(faces)
    d1_smith = smith_normal_form(surface.d1)
    d2_smith = smith_normal_form(surface.d2)
    chain_condition = is_zero_matrix(matmul(surface.d1, surface.d2))
    homology = (
        homology_invariants(len(surface.vertices), None, d1_smith),
        homology_invariants(len(surface.edges), d1_smith, d2_smith),
        homology_invariants(len(surface.faces), d2_smith, None),
    )
    incidence = edge_incidence_counts(surface.faces)
    return {
        "surface": surface,
        "d1_smith": d1_smith,
        "d2_smith": d2_smith,
        "d1_certificate": smith_certificate(surface.d1, d1_smith),
        "d2_certificate": smith_certificate(surface.d2, d2_smith),
        "chain_condition": chain_condition,
        "every_edge_twice": bool(incidence) and all(value == 2 for value in incidence.values()),
        "vertex_links_are_cycles": vertex_links_are_cycles(surface.faces),
        "orientable": is_orientable_closed_surface(surface.faces),
        "euler_characteristic": (
            len(surface.vertices) - len(surface.edges) + len(surface.faces)
        ),
    },
    "homology": homology,
}

def summary_lines() -> list[str]:
    rp2 = analyse_surface(RP2_FACES)
    sphere = analyse_surface(S2_FACES)
    surface = rp2["surface"]
    assert isinstance(surface, SurfaceComplex)
    d1_smith = rp2["d1_smith"]

```

```

d2_smith = rp2["d2_smith"]
assert isinstance(d1_smith, SmithResult)
assert isinstance(d2_smith, SmithResult)
homology = rp2["homology"]
assert isinstance(homology, tuple)
witness = rp2_torsion_witness(surface)
edge_labels = tuple(f"e{edge[0]}{edge[1]}" for edge in surface.edges)
face_labels = tuple("f" + "".join(map(str, face)) for face in surface.faces)
sphere_d1 = sphere["d1_smith"]
sphere_d2 = sphere["d2_smith"]
sphere_homology = sphere["homology"]
assert isinstance(sphere_d1, SmithResult)
assert isinstance(sphere_d2, SmithResult)
assert isinstance(sphere_homology, tuple)

return [
    "LABORATORIUM 0012-D60-LAB02",
    "kompleks: triangulasi_6_simpul_RP2",
    f"simpul: {len(surface.vertices)}",
    f"sisi: {len(surface.edges)}",
    f"muka: {len(surface.faces)}",
    f"karakteristik_euler: {rp2['euler_characteristic']}",
    f"setiap_sisi_dua_muka: {str(rp2['every_edge_twice']).lower()}",
    f"tautan_simpul_siklus: {str(rp2['vertex_links_are_cycles']).lower()}",
    f"terorientasi: {str(rp2['orientable']).lower()}",
    f"bentuk_d1: {shape(surface.d1)[0]}x{shape(surface.d1)[1]}",
    f"bentuk_d2: {shape(surface.d2)[0]}x{shape(surface.d2)[1]}",
    f"d1_d2_nol: {str(rp2['chain_condition']).lower()}",
    f"rank_d1: {d1_smith.rank}",
    f"snf_d1: {list(d1_smith.diagonal)}",
    f"rank_d2: {d2_smith.rank}",
    f"snf_d2: {list(d2_smith.diagonal)}",
    f"sertifikat_d1: {str(rp2['d1_certificate']).lower()}",
    f"sertifikat_d2: {str(rp2['d2_certificate']).lower()}",
    f"H_0: {group_notation(homology[0])}",
    f"H_1: {group_notation(homology[1])}",
    f"H_2: {group_notation(homology[2])}",
    f"siklus_torsi_z: {format_chain(witness['cycle'], edge_labels)}",
    f"rantai_pengisi_2z: {format_chain(witness['filling'], face_labels)}",
    f"z_adalah_siklus: {str(witness['is_cycle']).lower()}",
    f"dua_z_adalah_batas: {str(witness['twice_is_boundary']).lower()}",
    f"kosiklus_mod2_mematikan_batas: {str(witness['mod2_annihilates_boundaries']).lower()}",
    f"kosiklus_mod2_mendeteksi_z: {str(witness['mod2_detects_cycle']).lower()}",
    f"z_bukan_batas: {str(witness['not_boundary']).lower()}",
    "kontrol: batas_tetrahedron_S2",
    f"kontrol_terorientasi: {str(sphere['orientable']).lower()}",
    f"kontrol_snf_d1: {list(sphere_d1.diagonal)}",
    f"kontrol_snf_d2: {list(sphere_d2.diagonal)}",
    f"kontrol_H_0: {group_notation(sphere_homology[0])}",
    f"kontrol_H_1: {group_notation(sphere_homology[1])}",
    f"kontrol_H_2: {group_notation(sphere_homology[2])}",
]

def main() -> int:
    payload = ("\\n".join(summary_lines()) + "\\n").encode("utf-8")
    sys.stdout.buffer.write(payload)
    return 0

if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())

```

1.7 Uji deterministik lengkap

Berkas kanonis: test_o012_d60_lab02_smith_normal_form.py.

```
#!/usr/bin/env python3
"""Uji deterministik untuk 0012-D60-LAB02.
```

```
SPDX-License-Identifier: CC-BY-SA-4.0
"""
```

```
from __future__ import annotations
```

```
import subprocess
```

```

import sys
import unittest
from pathlib import Path

from o012_d60_lab02_smith_normal_form import (
    RP2_FACES,
    S2_FACES,
    SurfaceComplex,
    analyse_surface,
    build_surface,
    determinant_bareiss,
    edge_incidence_counts,
    freeze,
    homology_invariants,
    identity,
    is_orientable_closed_surface,
    is_zero_matrix,
    matmul,
    rp2_torsion_witness,
    shape,
    simplex_boundary_matrix,
    smith_certificate,
    smith_normal_form,
    SmithResult,
    transpose,
    vertex_links_are_cycles,
)

HERE = Path(__file__).resolve().parent
PROGRAM = HERE / "o012_d60_lab02_smith_normal_form.py"
EXPECTED = HERE / "expected-output-lab02.txt"

def signed_permutation(order: tuple[int, ...], signs: tuple[int, ...]) -> tuple[tuple[int, ...], ...]:
    if sorted(order) != list(range(len(order))) or len(signs) != len(order):
        raise ValueError("data permutasi bertanda tidak sah")
    if any(sign not in (-1, 1) for sign in signs):
        raise ValueError("tanda basis harus +1 atau -1")
    rows = [[0 for _ in order] for _ in order]
    for row, column in enumerate(order):
        rows[row][column] = signs[row]
    return freeze(rows)

class Lab02Tests(unittest.TestCase):
    def setUp(self) -> None:
        self.surface = build_surface(RP2_FACES)

    def test_closed_nonorientable_surface_fixture(self) -> None:
        self.assertEqual(len(self.surface.vertices), 6)
        self.assertEqual(len(self.surface.edges), 15)
        self.assertEqual(len(self.surface.faces), 10)
        self.assertEqual(6 - 15 + 10, 1)
        self.assertEqual(set(edge_incidence_counts(RP2_FACES).values()), {2})
        self.assertTrue(vertex_links_are_cycles(RP2_FACES))
        self.assertFalse(is_orientable_closed_surface(RP2_FACES))
        with self.assertRaisesRegex(ValueError, "dua muka"):
            is_orientable_closed_surface(RP2_FACES[:-1])
        with self.assertRaisesRegex(ValueError, "duplikat"):
            build_surface(RP2_FACES + (RP2_FACES[0],))
        with self.assertRaisesRegex(ValueError, "terurut naik secara ketat"):
            build_surface(((0, 0, 1),))
        with self.assertRaisesRegex(ValueError, "terurut naik secara ketat"):
            simplex_boundary_matrix((), ((2, 1),))

    def test_boundary_matrices_and_chain_condition(self) -> None:
        self.assertEqual(shape(self.surface.d1), (6, 15))
        self.assertEqual(shape(self.surface.d2), (15, 10))
        edge_index = {edge: index for index, edge in enumerate(self.surface.edges)}
        self.assertEqual(
            tuple(self.surface.d1[row][edge_index[(0, 1)]] for row in range(6)),
            (-1, 1, 0, 0, 0, 0),
        )
        first_face_boundary = tuple(self.surface.d2[row][0] for row in range(15))
        self.assertEqual(first_face_boundary[edge_index[(0, 1)]], 1)

```

```

self.assertEqual(first_face_boundary[edge_index[(0, 2)]], -1)
self.assertEqual(first_face_boundary[edge_index[(1, 2)]], 1)
self.assertTrue(is_zero_matrix(matmul(self.surface.d1, self.surface.d2)))

damaged = [list(row) for row in self.surface.d2]
damaged[edge_index[(0, 1)]] [0] += 1
self.assertFalse(is_zero_matrix(matmul(self.surface.d1, freeze(damaged))))

def test_smith_certificates_and_invariant_factors(self) -> None:
    d1 = smith_normal_form(self.surface.d1)
    d2 = smith_normal_form(self.surface.d2)
    self.assertEqual(d1.diagonal, (1, 1, 1, 1, 1))
    self.assertEqual(d2.diagonal, (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2))
    self.assertTrue(smith_certificate(self.surface.d1, d1))
    self.assertTrue(smith_certificate(self.surface.d2, d2))
    self.assertEqual(abs(determinant_bareiss(d1.left)), 1)
    self.assertEqual(abs(determinant_bareiss(d1.right)), 1)
    self.assertEqual(abs(determinant_bareiss(d2.left)), 1)
    self.assertEqual(abs(determinant_bareiss(d2.right)), 1)

    rank_one = freeze([[2, 4], [4, 8]])
    rank_one_smith = smith_normal_form(rank_one)
    self.assertEqual(rank_one_smith.diagonal, (2,))
    self.assertTrue(smith_certificate(rank_one, rank_one_smith))
    malformed = SmithResult(
        diagonal=(1,),
        transformed=((1, 0), (0, 0)),
        left=((1, 0), (0,)),
        right=((1, 0), (0, 1)),
    )
    self.assertFalse(smith_certificate(((1, 0), (0, 0)), malformed))

def test_rp2_homology_and_explicit_torsion_cycle(self) -> None:
    analysis = analyse_surface(RP2_FACES)
    self.assertEqual(analysis["homology"], ((1, ()), (0, (2,)), (0, ())))
    witness = rp2_torsion_witness(self.surface)
    self.assertTrue(witness["is_cycle"])
    self.assertTrue(witness["twice_is_boundary"])
    self.assertTrue(witness["mod2_annihilates_boundaries"])
    self.assertTrue(witness["mod2_detects_cycle"])
    self.assertTrue(witness["not_boundary"])
    self.assertEqual(
        tuple(
            self.surface.edges[index]
            for index, coefficient in enumerate(witness["mod2_cocycle"])
            if coefficient
        ),
        ((0, 1), (0, 2), (1, 3), (2, 4), (3, 4)),
    )
    self.assertEqual(
        witness["filling"],
        (1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, -1),
    )
    reordered_surface = build_surface(tuple(reversed(RP2_FACES)))
    reordered_witness = rp2_torsion_witness(reordered_surface)
    self.assertTrue(reordered_witness["twice_is_boundary"])
    self.assertTrue(reordered_witness["not_boundary"])
    zero_d2 = tuple(tuple(0 for _ in reordered_surface.faces) for _ in reordered_surface.edges)
    altered_surface = SurfaceComplex(
        reordered_surface.vertices,
        reordered_surface.edges,
        reordered_surface.faces,
        reordered_surface.d1,
        zero_d2,
    )
    altered_witness = rp2_torsion_witness(altered_surface)
    self.assertFalse(altered_witness["twice_is_boundary"])
    self.assertTrue(altered_witness["not_boundary"])

def test_signed_basis_invariance_and_sphere_control(self) -> None:
    edge_order = tuple(reversed(range(15)))
    edge_signs = tuple(-1 if index % 2 else 1 for index in range(15))
    face_order = (3, 1, 9, 0, 7, 5, 2, 8, 4, 6)
    face_signs = tuple(-1 if index in (0, 4, 7) else 1 for index in range(10))
    edge_change = signed_permutation(edge_order, edge_signs)
    face_change = signed_permutation(face_order, face_signs)

```



```

        changed_d2 = matmul(matmul(edge_change, self.surface.d2), face_change)
        changed_d1 = matmul(self.surface.d1, transpose(edge_change))
        self.assertEqual(matmul(edge_change, transpose(edge_change)), identity(15))
        self.assertTrue(is_zero_matrix(matmul(changed_d1, changed_d2)))
        d1 = smith_normal_form(changed_d1)
        d2 = smith_normal_form(changed_d2)
        self.assertEqual(d1.diagonal, (1, 1, 1, 1, 1))
        self.assertEqual(d2.diagonal, (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2))
        self.assertEqual(
            homology_invariants(15, d1, d2),
            (0, (2,)),
        )

        sphere = analyse_surface(S2_FACES)
        self.assertTrue(sphere["orientable"])
        self.assertEqual(sphere["homology"], ((1, ()), (0, ()), (1, ())))

    def test_cli_matches_frozen_expected_output(self) -> None:
        process = subprocess.run(
            [sys.executable, "-B", str(PROGRAM)],
            cwd=HERE,
            check=True,
            stdout=subprocess.PIPE,
            stderr=subprocess.PIPE,
        )
        self.assertEqual(process.stderr, b"")
        self.assertEqual(process.stdout, EXPECTED.read_bytes())

if __name__ == "__main__":
    unittest.main(verbosity=2)

```

1.8 Keluaran acuan

Berkas kanonis: expected-output-lab02.txt.

```

LABORATORIUM 0012-D60-LAB02
kompleks: triangulasi_6_simpul_RP2
simpul: 6
sisi: 15
muka: 10
karakteristik_euler: 1
setiap_sisi_dua_muka: true
tautan_simpul_siklus: true
terorientasi: false
bentuk_d1: 6x15
bentuk_d2: 15x10
d1_d2_nol: true
rank_d1: 5
snf_d1: [1, 1, 1, 1, 1]
rank_d2: 10
snf_d2: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2]
sertifikat_d1: true
sertifikat_d2: true
H_0: Z
H_1: Z/2
H_2: 0
siklus_torsi_z: e01 - e04 + e14
rantai_pengisi_2z: f012 + f013 + f024 + f035 - f045 - f125 - f134 + f145 + f234 - f235
z_adalah_siklus: true
dua_z_adalah_batas: true
kosiklus_mod2_mematikan_batas: true
kosiklus_mod2_mendeteksi_z: true
z_bukan_batas: true
kontrol: batas_tetrahedron_S2
kontrol_terorientasi: true
kontrol_snf_d1: [1, 1, 1]
kontrol_snf_d2: [1, 1, 1]
kontrol_H_0: Z
kontrol_H_1: 0
kontrol_H_2: Z

```

1.9 Membaca bentuk normal Smith

Operasi baris integral unimodular mengganti basis kodomain, sedangkan operasi kolom integral unimodular mengganti basis domain. Karena keduanya mempunyai invers integral, perubahan basis tersebut menghasilkan homomorfisma yang sama hingga isomorfisma. Diagonal Smith

$$D = \text{diag}(d_1, \dots, d_r, 0, \dots, 0), \quad 0 < d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_r,$$

memberi

$$\text{coker } A \cong \mathbb{Z}^{m-r} \oplus \bigoplus_{d_i > 1} \mathbb{Z}/d_i \mathbb{Z}$$

untuk $A: \mathbb{Z}^n \rightarrow \mathbb{Z}^m$. Dalam kompleks rantai, kita juga harus memperhitungkan kernel pemetaan batas keluar. Karena $C_n / \ker \partial_n \cong \text{im } \partial_n$ bebas, $\ker \partial_n$ merupakan suku langsung dari C_n ; akibatnya torsi $\text{coker } \partial_{n+1}$ tepat sama dengan torsi H_n . Jadi rank bebas H_n memakai kedua rank batas, sedangkan torsi berasal dari faktor invarian takunit ∂_{n+1} .

2 Solusi lengkap

2.1 Audit triangulasi

Menghitung kemunculan sisi pada sepuluh muka memberi nilai 2 untuk semua 15 sisi. Tautan simpul, ditulis sebagai siklus dan mengulang simpul awal pada akhir, ialah

$$\begin{array}{l|l} v_0 & (1, 2, 4, 5, 3, 1) \\ v_1 & (0, 2, 5, 4, 3, 0) \\ v_2 & (0, 1, 5, 3, 4, 0) \\ v_3 & (0, 1, 4, 2, 5, 0) \\ v_4 & (0, 2, 3, 1, 5, 0) \\ v_5 & (0, 3, 2, 1, 4, 0). \end{array}$$

Jadi setiap titik mempunyai lingkungan cakram dan tidak ada sisi batas. Kompleks juga terhubung karena graf kerangka satunya adalah graf lengkap.

Untuk orientasi global, pilih tanda pada f_{012} . Melintasi sisi bersama memaksa tanda muka tetangga agar koefisien sisi saling meniadakan. Pada siklus dual

$$f_{012} \xleftrightarrow{e_{01}} f_{013} \xleftrightarrow{e_{03}} f_{035} \xleftrightarrow{e_{35}} f_{235} \xleftrightarrow{e_{25}} f_{125} \xleftrightarrow{e_{12}} f_{012},$$

hasil kali lima kendala tanda adalah -1 . Tanda awal dipaksa menjadi negatifnya sendiri, sehingga tidak ada orientasi global. Dengan $\chi = 1$, ini adalah permukaan tidak terorientasi genus satu, yaitu $\mathbb{RP}^2$.

2.2 Matriks batas dan syarat rantai

Kolom e_{ij} pada ∂_1 mempunyai tepat dua entri taknol: -1 pada baris v_i dan $+1$ pada baris v_j . Kolom f_{ijk} pada ∂_2 mempunyai koefisien $+1, -1, +1$ pada baris e_{jk}, e_{ik}, e_{ij} .

Sebagai contoh,

$$\begin{aligned} \partial_1 \partial_2 f_{012} &= \partial_1 (e_{12} - e_{02} + e_{01}) \\ &= (v_2 - v_1) - (v_2 - v_0) + (v_1 - v_0) = 0. \end{aligned}$$

Argumen identik berlaku untuk setiap kolom. Program melakukan perkalian matriks integral dan memperoleh matriks nol 6×10 . Uji negatif menambah 1 pada koefisien e_{01} di kolom pertama. Kolom komposisi lalu bertambah $v_1 - v_0 \neq 0$, sehingga pemeriksaan gagal sebagaimana seharusnya.

2.3 Sertifikat Smith dan grup homologi

Reduksi eksak memberi

$$\text{rank } \partial_1 = 5, \quad \text{SNF}(\partial_1)_{\neq 0} = (1, 1, 1, 1, 1),$$

dan

$$\text{rank } \partial_2 = 10, \quad \text{SNF}(\partial_2) = (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2).$$

Program menyimpan semua operasi sebagai matriks U, V . Ia memeriksa $UAV = D$, determinan U, V sama dengan ± 1 , semua entri di luar diagonal nol, diagonal tidak negatif, dan setiap faktor tak nol membagi faktor berikutnya. Karena

$$\text{rank } C_0 = 6, \quad \text{rank } C_1 = 15, \quad \text{rank } C_2 = 10,$$

kita memperoleh rank bebas

$$6 - 5 = 1, \quad 15 - 5 - 10 = 0, \quad 10 - 10 = 0.$$

Tidak ada faktor torsi pada ∂_1 , sedangkan faktor terakhir ∂_2 adalah 2. Maka

$$H_n(\mathbb{RP}^2; \mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & n = 0, \\ \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, & n = 1, \\ 0, & n \geq 2. \end{cases}$$

2.4 Saksi torsi eksplisit

Untuk

$$z = e_{01} - e_{04} + e_{14},$$

kita mempunyai

$$\partial_1 z = (v_1 - v_0) - (v_4 - v_0) + (v_4 - v_1) = 0.$$

Ambil

$$\begin{aligned} c = & f_{012} + f_{013} + f_{024} + f_{035} - f_{045} \\ & - f_{125} - f_{134} + f_{145} + f_{234} - f_{235}. \end{aligned}$$

Menjumlahkan sepuluh kolom batas dengan koefisien tersebut memberi

$$\partial_2 c = 2e_{01} - 2e_{04} + 2e_{14} = 2z.$$

Jadi orde $[z]$ membagi 2. Untuk membuktikan bahwa ordonya bukan 1, definisikan korantai $\alpha \in C^1(-; \mathbb{F}_2)$ yang bernilai 1 pada

$$e_{01}, e_{02}, e_{13}, e_{24}, e_{34}$$

dan nol pada sepuluh sisi lain. Pemeriksaan terhadap kesepuluh kolom ∂_2 memberi $\alpha(\partial_2 f) = 0$ untuk setiap muka f ; jadi α adalah kosiklus modulo 2 dan mematikan setiap batas integral setelah reduksi modulo 2. Namun

$$\alpha(z) = 1 \pmod{2}.$$

Jika $z = \partial_2 b$ untuk suatu rantai integral b , maka $\alpha(z) = \alpha(\partial_2 b) = 0$, suatu kontradiksi. Karena itu z bukan batas, sedangkan $2z$ adalah batas. Kelas $[z]$ berorde tepat 2.

2.5 Perubahan basis dan kontrol sfera

Susunan ulang basis dan pembalikan orientasi dinyatakan oleh matriks permutasi bertanda P, Q . Matriks itu unimodular dan inversnya integral. Jika

$$\partial'_2 = P\partial_2 Q, \quad \partial'_1 = \partial_1 P^{-1},$$

maka

$$\partial'_1 \partial'_2 = \partial_1 P^{-1} P \partial_2 Q = \partial_1 \partial_2 Q = 0.$$

Uji memakai satu permutasi bertanda tetap pada 15 sisi dan satu lagi pada 10 muka. Bentuk normal Smith keduanya tetap sama; faktor 2 tidak dapat dihapus oleh perubahan basis integral.

Kontrol memakai empat muka batas tetrahedron. Ia mempunyai empat simpul, enam sisi, dan empat muka. Hasilnya

$$\text{SNF}(\partial_1)_{\neq 0} = (1, 1, 1), \quad \text{SNF}(\partial_2)_{\neq 0} = (1, 1, 1),$$

sehingga

$$H_0(S^2; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}, \quad H_1(S^2; \mathbb{Z}) = 0, \quad H_2(S^2; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}.$$

Tidak muncul faktor invarian lebih besar daripada 1. Kontrol ini menguji jalur kode yang sama pada permukaan terorientasi tanpa torsi.

2.6 Pemeriksaan reproduktibilitas

Uji otomatis memeriksa:

1. sepuluh muka membentuk permukaan tertutup dengan tautan simpul berupa siklus dan tidak menerima data simpleks duplikat;
2. ukuran serta tanda contoh pada kedua matriks batas dan penolakan satu kolom yang sengaja dirusak;
3. sertifikat $UAV = D$, unimodularitas, entri diagonal tidak negatif, keterbagian, rank, serta satu matriks ber-rank satu tambahan;
4. grup homologi $\mathbb{RP}^2$, rantai pengisi $2z$, dan detektor non-batas modulo 2;
5. invariansi di bawah perubahan urutan/orientasi basis dan kontrol S^2 tanpa torsi;

6. aliran galat kosong dan keluaran CLI yang sama byte demi byte dengan keluaran acuan UTF-8 berakhiran LF.

Dengan demikian keluaran bukan hasil yang diketik ulang. Matriks, diagonal, sertifikat, saksi torsi, dan kontrol semuanya dihitung dari data simpleks yang sama dengan data yang disajikan dalam pembaca.

2.7 Hak, atribusi, dan provenans

Laboratorium, program, uji, keluaran acuan, interpretasi, dan solusi ini adalah materi asli edisi dan didistribusikan di bawah CC BY-SA 4.0. Materi ini memakai konsep matematika yang sudah dikembangkan dalam edisi Roberts–Fomberg, tetapi tidak menyalin ekspresi dari bank masalah yang dikecualikan. Produksi dilakukan dengan **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra** atas arahan pengguna. Kredit, lisensi, dan hubungan sumber David Michael Roberts serta Yeheli Fomberg tetap dibedakan; laboratorium ini tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

1 Laboratorium Komputasi 3 — Batas Seluler dan Derajat

1.1 Status dan keluaran laboratorium

Laboratorium ini adalah materi asli edisi. Kita menghubungkan tiga cara membaca bilangan bulat bertanda yang sama: sebagai koefisien batas seluler, sebagai koefisien pada kelas fundamental, dan sebagai jumlah derajat lokal di atas suatu nilai sasaran. Contoh pertama ialah kompleks CW

$$X_3 = S_a^1 \cup_{z \mapsto z^3} D^2,$$

contoh kedua ialah struktur CW minimal pada torus, dan contoh ketiga ialah keluarga pemetaan torus yang diberikan oleh matriks integral. Semua perhitungan memakai aritmetika eksak pada bilangan bulat dan pecahan; tidak ada pembulatan numerik dan tidak diperlukan akses jaringan.

Paket laboratorium memuat program Python berbasis pustaka standar, enam uji deterministik, keluaran acuan, interpretasi, satu petunjuk bersama, dan solusi lengkap. Program memeriksa konvensi kolom, jumlah eksponen bertanda, grup homologi, prabayangan eksak, tanda lokal, urutan komposisi, serta kasus singular yang sengaja dipilih untuk gagal secara informatif.

1.2 Prasyarat yang dipakai

- definisi dan sifat derajat pada bagian derajat Roberts dan jembatan derajat Fomberg;
- rumus penjumlahan derajat lokal pada bagian derajat lokal;
- kompleks CW, pemetaan batas seluler, dan rumus koefisien insidensi pada Homologi Seluler;
- kelas fundamental, orientasi, produk cup, dan funktorialitas homologi serta kohomologi;
- matriks integral, determinan, dan aritmetika dalam $\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$.

1.3 Tujuan

Sesudah menyelesaikan laboratorium ini, pembaca dapat:

1. menghitung koefisien batas seluler dari derajat pemetaan pelekatan;
2. membedakan jumlah eksponen bertanda dari banyaknya kemunculan huruf;
3. memperoleh homologi X_3 dan torus dari kompleks rantai selulernya;
4. menjelaskan pengaruh pembalikan orientasi sel terhadap matriks, tetapi bukan terhadap grup homologi;
5. menentukan kapan matriks real mendefinisikan pemetaan pada torus;
6. menghitung pemetaan terinduksi pada $H_1(T^2)$ dengan konvensi kolom;
7. membuktikan bahwa derajat pemetaan torus integral sama dengan determinannya, bukan menyimpulkannya hanya dari naturalitas batas nol;
8. menemukan prabayangan eksak dan menjumlahkan tanda lokalnya;
9. membedakan urutan matriks pada komposisi pemetaan;
10. mengaudit kasus determinan nol tanpa menyatakan secara keliru bahwa setiap serat harus kosong.

1.4 Data, orientasi, dan konvensi kolom

Kita tulis $S^1 = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ dengan koordinat $[t]$ dan $T^2 = \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ dengan koordinat kolom $[x]$. Basis berorientasi $H_1(T^2; \mathbb{Z})$ ialah $([a], [b])$, masing-masing berasal dari arah koordinat pertama dan kedua. Untuk matriks integral A , definisikan

$$f_A([x]) = [Ax].$$

Entri integral bukan sekadar kemudahan komputasional. Jika x diganti oleh $x + n$ untuk $n \in \mathbb{Z}^2$, nilai Ax berubah sebesar An ; pemetaan turun ke hasil bagi tepat ketika $A\mathbb{Z}^2 \subseteq \mathbb{Z}^2$, yakni ketika kolom-kolom A integral.

Empat data uji kanonis ialah sebagai berikut.

1. X_3 mempunyai satu sel-0 v , satu sel-1 berorientasi a , dan satu sel-2 e^2 yang dilekatkan oleh $q_3([t]) = [3t]$.
2. Torus minimal mempunyai satu sel-0 v , dua sel-1 a, b , dan satu sel-2 τ dengan kata pelekatan $aba^{-1}b^{-1}$.
3. Tiga matriks yang diuji ialah

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Dengan konvensi kolom, $f_{M*}[a] = 2[a] - [b]$ dan $f_{M*}[b] = [a] + 2[b]$.

4. Nilai sasaran untuk M , N , dan komposisi ialah $y = (1/7, 2/7)$, sedangkan kasus singular memakai $y_0 = (0, 1/3)$.

Kesamaan pada torus selalu berarti kesamaan modulo $\mathbb{Z}^2$. Karena itu, $f_A([x]) = [y]$ setara dengan adanya $k \in \mathbb{Z}^2$ sehingga $Ax = y + k$.

1.5 Batas seluler dan perluasan derajat ke permukaan

Untuk sel- n e_α^n dan sel- $(n-1)$ e_β^{n-1} , koefisien e_β^{n-1} dalam $d_n(e_\alpha^n)$ adalah derajat komposisi: peta pelekatan menuju kerangka $(n-1)$, kemudian semua sel selain e_β^{n-1} diruntuhkan. Tanda koefisien bergantung pada orientasi basis.

Pada X_3 , peta pelekatan mengitari a tiga kali secara positif, sehingga

$$C_2 \xrightarrow{d_2=[3]} C_1 \xrightarrow{d_1=[0]} C_0, \quad C_2 = C_1 = C_0 = \mathbb{Z}.$$

Jika orientasi e^2 dibalik sementara orientasi a dipertahankan, kolom d_2 menjadi $[-3]$. Ini adalah perubahan basis unimodular pada C_2 ; kernel dan hasil bagi yang menentukan homologi tetap isomorfik.

Pada torus minimal, koefisien a dan b dalam batas τ adalah jumlah eksponen **bertanda** pada kata $aba^{-1}b^{-1}$:

$$(+1) + (-1) = 0 \quad \text{untuk } a, \quad (+1) + (-1) = 0 \quad \text{untuk } b.$$

Jadi $d_2(\tau) = 0a + 0b$ dan $d_1 = 0$. Menghitung kemunculan tanpa tanda akan memberi $(2, 2)^T$ dan merupakan kesalahan, bukan konvensi lain.

Proposisi asli edisi (derajat pada permukaan dan determinan torus). Jika $F: \Sigma \rightarrow \Sigma'$ adalah pemetaan kontinu antara permukaan tertutup, terhubung, dan berorientasi, definisikan $\deg(F)$ melalui

$$F_*[\Sigma] = \deg(F)[\Sigma'] \quad \text{dalam } H_2(\Sigma'; \mathbb{Z}).$$

Definisi ini bebas dari perwakilan siklus setelah orientasi kedua kelas fundamental ditetapkan. Khusus untuk matriks integral $A = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix}$, pemetaan $f_A: T^2 \rightarrow T^2$ mempunyai derajat $\det A$.

Bukti. Ambil basis kohomologi dual $\alpha, \beta \in H^1(T^2; \mathbb{Z})$ dengan $\langle \alpha \smile \beta, [T^2] \rangle = 1$. Konvensi kolom memberi

$$f_A^* \alpha = p\alpha + q\beta, \quad f_A^* \beta = r\alpha + s\beta.$$

Antikomutativitas bergradasi dan $\alpha \smile \alpha = \beta \smile \beta = 0$ menghasilkan

$$f_A^*(\alpha \smile \beta) = (ps - qr)(\alpha \smile \beta).$$

Dengan naturalitas pasangan evaluasi,

$$\begin{aligned} \deg(f_A) &= \langle \alpha \smile \beta, f_{A*}[T^2] \rangle \\ &= \langle f_A^*(\alpha \smile \beta), [T^2] \rangle \\ &= ps - qr = \det A. \end{aligned}$$

Ini juga menjelaskan langkah yang tidak boleh dilewati. Aproksimasi seluler memungkinkan kita mewakili f_A oleh pemetaan rantai seluler dan membaca A pada C_1 serta H_1 . Namun, karena kedua pemetaan batas torus adalah nol, persamaan naturalitas batas $dF_* = F_*d$ menerima **setiap** koefisien bulat pada C_2 . Persamaan itu sendiri tidak membuktikan bahwa koefisien teratas adalah $\det A$; argumen kelas fundamental dan produk cup di ataslah yang memaksanya.

Tugas 1 — jalankan bukti komputasional. Dari akar repositori, jalankan

```
python -B source/id-ID/labs/test_o012_d60_lab03_cellular_degree.py
python -B source/id-ID/labs/o012_d60_lab03_cellular_degree.py
```

Pastikan laporan `unittest` berakhir dengan enam uji lulus dan `OK`. Program pada perintah kedua harus mempunyai aliran galat kosong dan keluaran yang sama byte demi byte dengan `expected-output-lab03.txt`.

Tugas 2 — turunkan kompleks rantai X_3 . Hitung d_2 dari derajat q_3 , hitung H_0, H_1, H_2 , lalu balik orientasi sel-2 dan jelaskan apa yang berubah. Untuk nilai $[1/7] \in S^1$, temukan semua prabayangan eksak di bawah q_3 dan jumlahkan derajat lokalnya.

Tugas 3 — audit torus minimal dengan tanda. Gunakan kata $aba^{-1}b^{-1}$ untuk menghitung kedua koefisien $d_2(\tau)$. Tunjukkan secara eksplisit mengapa hitungan tanpa tanda salah. Hitung homologi torus dan bandingkan mekanismenya dengan homologi X_3 .

Tugas 4 — pisahkan H_1 dari derajat teratas. Periksa bahwa konvensi kolom untuk M memberi $f_{M*}[a] = 2[a] - [b]$ dan $f_{M*}[b] = [a] + 2[b]$. Jelaskan mengapa aproksimasi seluler diperlukan untuk pernyataan pada rantai seluler. Lalu buktikan, tanpa memakai naturalitas batas nol sebagai jalan pintas, bahwa pemetaan pada $H_2(T^2)$ adalah perkalian dengan 5.

Tugas 5 — prabayangan, tanda lokal, dan komposisi. Untuk sasaran $y = (1/7, 2/7)$, tentukan semua prabayangan eksak di bawah f_M , prabayangan di bawah f_N , serta semua prabayangan di bawah $f_N \circ f_M$. Tentukan tanda lokal tiap titik dan cocokkan jumlah bertandanya dengan derajat global. Hitung pula NM dan MN dan jelaskan mengapa urutannya tidak boleh ditukar.

Tugas 6 — audit kasus negatif. Tunjukkan bahwa matriks tak integral pada umumnya tidak mendefinisikan pemetaan torus. Temukan kesalahan dalam argumen “batas nol memaksa koefisien teratas”, “derajat sama dengan banyaknya prabayangan”, dan “ $\det C = 0$ membuat setiap serat kosong”. Terakhir, gunakan vektor null kiri $(-2, 1)$ untuk membuktikan bahwa $y_0 = (0, 1/3)$ tidak berada dalam citra f_C , tetapi berikan pula satu serat f_C yang tidak kosong.

Petunjuk. Pada kata pelekatan, invers menyumbang -1 , bukan $+1$. Untuk prabayangan torus, selesaikan $Ax = y + k$ dengan $k \in \mathbb{Z}^2$ dan pilih wakil dalam $[0, 1)^2$. Jika $\det A \neq 0$, setiap titik

prabayangan mempunyai tanda lokal $\text{sgn}(\det A)$ dan banyaknya titik pada serat ialah $|\det A|$. Untuk komposisi, tulis fungsi pada sebuah kolom: $f_N(f_M([x])) = [NMx]$. Pada kasus singular, kalikan persamaan $Cx = y_0 + k$ dari kiri dengan $(-2, 1)$.

1.6 Program lengkap

Berkas kanonis: `o012_d60_lab03_cellular_degree.py`. Proses pembuatan pembaca mengganti penanda berikut dengan byte sumber tersebut agar HTML dan PDF tetap mandiri dan agar salinan tampilan tidak dapat menyimpang dari berkas yang diuji.

```
#!/usr/bin/env python3
"""Laboratorium D60-03: pemetaan batas seluler dan derajat.

SPDX-License-Identifier: CC-BY-SA-4.0
Materi asli edisi diproduksi dengan OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra.
"""
from __future__ import annotations

import sys
from dataclasses import dataclass
from fractions import Fraction
from math import gcd
from typing import Iterable, Sequence

Letter = tuple[str, int]
Word = tuple[Letter, ...]
Matrix2 = tuple[tuple[int, int], tuple[int, int]]
Point = tuple[Fraction, Fraction]

TORUS_BASIS = ("a", "b")
TORUS_WORD: Word = (("a", 1), ("b", 1), ("a", -1), ("b", -1))
X3_BASIS = ("a",)
X3_WORD: Word = (("a", 1), ("a", 1), ("a", 1))
X3_REVERSED_WORD: Word = (("a", -1), ("a", -1), ("a", -1))

MATRIX_M: Matrix2 = ((2, 1), (-1, 2))
MATRIX_N: Matrix2 = ((0, 1), (1, 0))
MATRIX_C: Matrix2 = ((1, 1), (2, 2))
REGULAR_TARGET: Point = (Fraction(1, 7), Fraction(2, 7))
SINGULAR_TARGET: Point = (Fraction(0), Fraction(1, 3))
LEFT_NULL_C = (-2, 1)

def _is_plain_int(value: object) -> bool:
    return type(value) is int

def freeze_basis(basis: Iterable[str]) -> tuple[str, ...]:
    try:
        result = tuple(basis)
    except TypeError as error:
        raise ValueError("basis harus dapat diiterasi") from error
    if not result:
        raise ValueError("basis tidak boleh kosong")
    if any(type(label) is not str or not label for label in result):
        raise ValueError("setiap label basis harus berupa string takkosong")
    if len(set(result)) != len(result):
        raise ValueError("label basis harus unik")
    return result

def freeze_word(word: Iterable[Sequence[object]], basis: Iterable[str]) -> Word:
    frozen_basis = freeze_basis(basis)
    try:
        raw_tokens = tuple(word)
    except TypeError as error:
        raise ValueError("kata pelekatan harus dapat diiterasi") from error
    result: list[Letter] = []
    for token in raw_tokens:
        if isinstance(token, (str, bytes)):
            raise ValueError("setiap huruf harus berupa pasangan label dan tanda")
        try:
```

```

        pair = tuple(token)
    except TypeError as error:
        raise ValueError("setiap huruf harus berupa pasangan label dan tanda") from error
    if len(pair) != 2:
        raise ValueError("setiap huruf harus berupa pasangan label dan tanda")
    label, sign = pair
    if type(label) is not str or label not in frozen_basis:
        raise ValueError("kata memuat label yang tidak berada dalam basis")
    if not _is_plain_int(sign) or sign not in (-1, 1):
        raise ValueError("tanda huruf harus +1 atau -1")
    result.append((label, sign))
return tuple(result)

def free_reduce(word: Iterable[Sequence[object]], basis: Iterable[str]) -> Word:
    frozen = freeze_word(word, basis)
    stack: list[Letter] = []
    for letter in frozen:
        if stack and stack[-1][0] == letter[0] and stack[-1][1] == -letter[1]:
            stack.pop()
        else:
            stack.append(letter)
    return tuple(stack)

def incidence_vector(word: Iterable[Sequence[object]], basis: Iterable[str]) -> tuple[int, ...]:
    frozen_basis = freeze_basis(basis)
    frozen_word = freeze_word(word, frozen_basis)
    return tuple(
        sum(sign for label, sign in frozen_word if label == generator)
        for generator in frozen_basis
    )

def unsigned_occurrence_vector(
    word: Iterable[Sequence[object]], basis: Iterable[str]
) -> tuple[int, ...]:
    """Return unsigned counts only as a deliberately incorrect control."""
    frozen_basis = freeze_basis(basis)
    frozen_word = freeze_word(word, frozen_basis)
    return tuple(
        sum(1 for label, _sign in frozen_word if label == generator)
        for generator in frozen_basis
    )

@dataclass(frozen=True)
class OneColumnHomology:
    h0_free_rank: int
    h1_free_rank: int
    h1_torsion: tuple[int, ...]
    h2_free_rank: int

def one_column_homology(boundary: Iterable[int]) -> OneColumnHomology:
    try:
        column = tuple(boundary)
    except TypeError as error:
        raise ValueError("kolom batas harus dapat diiterasi") from error
    if not column:
        raise ValueError("C_1 harus mempunyai sedikitnya satu pembangkit")
    if any(not _is_plain_int(value) for value in column):
        raise ValueError("koefisien batas harus berupa bilangan bulat")
    common_divisor = 0
    for value in column:
        common_divisor = gcd(common_divisor, abs(value))
    if common_divisor == 0:
        return OneColumnHomology(1, len(column), (), 1)
    torsion = (common_divisor,) if common_divisor > 1 else ()
    return OneColumnHomology(1, len(column) - 1, torsion, 0)

def _exact_fraction(value: object) -> Fraction:
    if isinstance(value, Fraction):
        return value
    if _is_plain_int(value):

```

```

        return Fraction(value)
    raise ValueError("koordinat harus berupa bilangan bulat atau Fraction eksak")

def mod_one(value: object) -> Fraction:
    exact = _exact_fraction(value)
    return exact - exact.numerator // exact.denominator

def power_map_preimages(degree: int, target: object) -> tuple[Fraction, ...]:
    if not _is_plain_int(degree):
        raise ValueError("derajat pemetaan pangkat harus berupa bilangan bulat")
    normalized_target = mod_one(target)
    if degree == 0:
        if normalized_target == 0:
            raise ValueError("serat pemetaan konstan pada nilainya sendiri tidak hingga")
        return ()
    count = abs(degree)
    points = {
        mod_one((normalized_target + index) / degree)
        for index in range(count)
    }
    if len(points) != count:
        raise ArithmeticError("pencacahan prabayangan pemetaan pangkat tidak lengkap")
    return tuple(sorted(points))

def power_map_local_degrees(degree: int, target: object) -> tuple[int, ...]:
    points = power_map_preimages(degree, target)
    if not points:
        return ()
    sign = 1 if degree > 0 else -1
    return tuple(sign for _point in points)

def freeze_matrix2(rows: Iterable[Iterable[int]]) -> Matrix2:
    try:
        matrix = tuple(tuple(row) for row in rows)
    except TypeError as error:
        raise ValueError("matriks harus berupa dua baris yang dapat diiterasi") from error
    if len(matrix) != 2 or any(len(row) != 2 for row in matrix):
        raise ValueError("matriks torus harus berukuran 2x2")
    if any(not _is_plain_int(value) for row in matrix for value in row):
        raise ValueError("matriks torus harus mempunyai entri bilangan bulat")
    return (matrix[0], matrix[1])

def determinant2(matrix: Iterable[Iterable[int]]) -> int:
    ((a, b), (c, d)) = freeze_matrix2(matrix)
    return a * d - b * c

def matmul2(
    left: Iterable[Iterable[int]], right: Iterable[Iterable[int]]
) -> Matrix2:
    frozen_left = freeze_matrix2(left)
    frozen_right = freeze_matrix2(right)
    return tuple(
        tuple(
            sum(frozen_left[row][index] * frozen_right[index][column] for index in range(2))
            for column in range(2)
        )
        for row in range(2)
    ) # type: ignore[return-value]

def freeze_point(point: Iterable[object]) -> Point:
    try:
        coordinates = tuple(point)
    except TypeError as error:
        raise ValueError("titik torus harus dapat diiterasi") from error
    if len(coordinates) != 2:
        raise ValueError("titik torus harus mempunyai dua koordinat")
    return (mod_one(coordinates[0]), mod_one(coordinates[1]))

```

```

def torus_preimages(matrix: Iterable[Iterable[int]], target: Iterable[object]) -> tuple[Point, ...]:
    frozen_matrix = freeze_matrix2(matrix)
    normalized_target = freeze_point(target)
    ((a, b), (c, d)) = frozen_matrix
    determinant = determinant2(frozen_matrix)
    if determinant == 0:
        raise ValueError("matriks singular tidak mempunyai serat hingga seragam")

    bound = 1 + max(sum(abs(value) for value in row) for row in frozen_matrix)
    points: set[Point] = set()
    for first_shift in range(-bound, bound + 1):
        for second_shift in range(-bound, bound + 1):
            first_rhs = normalized_target[0] + first_shift
            second_rhs = normalized_target[1] + second_shift
            first = (d * first_rhs - b * second_rhs) / determinant
            second = (-c * first_rhs + a * second_rhs) / determinant
            if 0 <= first < 1 and 0 <= second < 1:
                points.add((first, second))
    expected_count = abs(determinant)
    if len(points) != expected_count:
        raise ArithmeticError(
            f"ditemukan {len(points)} prabayangan, seharusnya {expected_count}"
        )
    return tuple(sorted(points))

def torus_local_degrees(
    matrix: Iterable[Iterable[int]], target: Iterable[object]
) -> tuple[int, ...]:
    frozen_matrix = freeze_matrix2(matrix)
    determinant = determinant2(frozen_matrix)
    if determinant == 0:
        raise ValueError("derajat lokal serat hingga tidak tersedia untuk kontrol singular")
    sign = 1 if determinant > 0 else -1
    return tuple(sign for _point in torus_preimages(frozen_matrix, target))

def nonimage_certificate(
    matrix: Iterable[Iterable[int]],
    target: Iterable[object],
    left_null_vector: Iterable[int],
) -> bool:
    frozen_matrix = freeze_matrix2(matrix)
    if determinant2(frozen_matrix) != 0:
        raise ValueError("sertifikat noncitra ini hanya berlaku untuk matriks singular")
    normalized_target = freeze_point(target)
    try:
        vector = tuple(left_null_vector)
    except TypeError as error:
        raise ValueError("vektor null kiri harus dapat diiterasi") from error
    if len(vector) != 2 or any(not _is_plain_int(value) for value in vector):
        raise ValueError("vektor null kiri harus berupa dua bilangan bulat")
    if vector == (0, 0):
        raise ValueError("vektor null kiri tidak boleh nol")
    if any(
        vector[0] * frozen_matrix[0][column]
        + vector[1] * frozen_matrix[1][column]
        != 0
        for column in range(2)
    ):
        raise ValueError("vektor yang diberikan bukan vektor null kiri")
    pairing = vector[0] * normalized_target[0] + vector[1] * normalized_target[1]
    return pairing.denominator != 1

def format_fraction(value: Fraction) -> str:
    if value.denominator == 1:
        return str(value.numerator)
    return f"{value.numerator}/{value.denominator}"

def format_integer_vector(vector: Iterable[int]) -> str:
    return "[" + ", ".join(str(value) for value in vector) + "]"

def format_fraction_vector(vector: Iterable[Fraction]) -> str:

```

```

return "[" + ", ".join(format_fraction(value) for value in vector) + "]"

def format_matrix(matrix: Iterable[Iterable[int]]) -> str:
    frozen = freeze_matrix2(matrix)
    return "[" + ", ".join(format_integer_vector(row) for row in frozen) + "]"

def format_points(points: Iterable[Point]) -> str:
    return "[" + ", ".join(
        f"({format_fraction(first)}, {format_fraction(second)})"
        for first, second in points
    ) + "]"

def format_group(free_rank: int, torsion: Iterable[int] = ()) -> str:
    if not _is_plain_int(free_rank) or free_rank < 0:
        raise ValueError("rank bebas harus berupa bilangan bulat taknegatif")
    frozen_torsion = tuple(torsion)
    if any(not _is_plain_int(value) or value <= 1 for value in frozen_torsion):
        raise ValueError("faktor torsi harus berupa bilangan bulat lebih besar dari satu")
    summands: list[str] = []
    if free_rank == 1:
        summands.append("Z")
    elif free_rank > 1:
        summands.append(f"Z^{free_rank}")
    summands.extend(f"Z/{value}" for value in frozen_torsion)
    return " + ".join(summands) if summands else "0"

def summary_lines() -> list[str]:
    torus_boundary = incidence_vector(TORUS_WORD, TORUS_BASIS)
    torus_unsigned = unsigned_occurrence_vector(TORUS_WORD, TORUS_BASIS)
    torus_homology = one_column_homology(torus_boundary)
    x3_boundary = incidence_vector(X3_WORD, X3_BASIS)
    x3_reversed_boundary = incidence_vector(X3_REVERSED_WORD, X3_BASIS)
    x3_homology = one_column_homology(x3_boundary)
    x3_reversed_homology = one_column_homology(x3_reversed_boundary)
    power_target = Fraction(1, 7)
    power_preimages = power_map_preimages(3, power_target)
    power_local = power_map_local_degrees(3, power_target)

    preimages_m = torus_preimages(MATRIX_M, REGULAR_TARGET)
    local_m = torus_local_degrees(MATRIX_M, REGULAR_TARGET)
    preimages_n = torus_preimages(MATRIX_N, REGULAR_TARGET)
    local_n = torus_local_degrees(MATRIX_N, REGULAR_TARGET)
    n_after_m = matmul2(MATRIX_N, MATRIX_M)
    m_after_n = matmul2(MATRIX_M, MATRIX_N)
    singular_certificate = nonimage_certificate(
        MATRIX_C, SINGULAR_TARGET, LEFT_NULL_C
    )

    return [
        "LABORATORIUM 0012-D60-LAB03",
        "fixture_seluler_1: torus_minimal",
        "kata_pelekatan_torus: a b a^{-1} b^{-1}",
        f"insidensi_torus(a,b): {format_integer_vector(torus_boundary)}",
        f"hitung_tak_bertanda_torus: {format_integer_vector(torus_unsigned)}",
        "d1_torus_nol: true",
        f"H_0_torus: {format_group(torus_homology.h0_free_rank)}",
        f"H_1_torus: {format_group(torus_homology.h1_free_rank, torus_homology.h1_torsion)}",
        f"H_2_torus: {format_group(torus_homology.h2_free_rank)}",
        "fixture_seluler_2: X3",
        f"derajat_pelekatan_X3: {x3_boundary[0]}",
        f"d2_X3: {format_integer_vector(x3_boundary)}",
        f"H_0_X3: {format_group(x3_homology.h0_free_rank)}",
        f"H_1_X3: {format_group(x3_homology.h1_free_rank, x3_homology.h1_torsion)}",
        f"H_2_X3: {format_group(x3_homology.h2_free_rank)}",
        f"d2_X3_orientasi_dibalik: {format_integer_vector(x3_reversed_boundary)}",
        f"homologi_orientasi_dibalik_tetap: {str(x3_homology == x3_reversed_homology).lower()}",
        f"target_pangkat_3: {format_fraction(power_target)}",
        f"prabayangan_pangkat_3: {format_fraction_vector(power_preimages)}",
        f"kontribusi_lokal_pangkat_3: {format_integer_vector(power_local)}",
        f"jumlah_derajat_lokal_pangkat_3: {sum(power_local)}",
        f"matriks_M: {format_matrix(MATRIX_M)}",
        f"determinan_M: {determinant2(MATRIX_M)}",
    ]

```

```

f"aksi_H1_M: {format_matrix(MATRIX_M)}",
f"aksi_H2_M: kali_{determinant2(MATRIX_M)}",
f"target_torus: {format_fraction_vector(REGULAR_TARGET)}",
f"prabayaran_M: {format_points(preimages_m)}",
f"jumlah_prabayaran_M: {len(preimages_m)}",
f"kontribusi_lokal_M: {format_integer_vector(local_m)}",
f"jumlah_derajat_lokal_M: {sum(local_m)}",
f"matriks_N: {format_matrix(MATRIX_N)}",
f"determinan_N: {determinant2(MATRIX_N)}",
f"prabayaran_N: {format_points(preimages_n)}",
f"jumlah_derajat_lokal_N: {sum(local_n)}",
f"matriks_N_setelah_M: {format_matrix(n_after_m)}",
f"matriks_M_setelah_N: {format_matrix(m_after_n)}",
f"urutan_komposisi_berbeda: {str(n_after_m != m_after_n).lower()}",
f"derajat_N_setelah_M: {determinant2(n_after_m)}",
f"derajat_multiplikatif: {str(determinant2(n_after_m) == determinant2(MATRIX_N) * determinant2(MATRIX_M)
).lower()}",
f"matriks_C: {format_matrix(MATRIX_C)}",
f"determinan_C: {determinant2(MATRIX_C)}",
f"target_noncitra_C: {format_fraction_vector(SINGULAR_TARGET)}",
f"vektor_null_kiri_C: {format_integer_vector(LEFT_NULL_C)}",
f"sertifikat_noncitra_C: {str(singular_certificate).lower()}",
"derajat_C: 0",
]

def main() -> int:
    payload = ("\\n".join(summary_lines()) + "\\n").encode("utf-8")
    sys.stdout.buffer.write(payload)
    return 0

if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())

```

1.7 Uji deterministik lengkap

Berkas kanonis: test_o012_d60_lab03_cellular_degree.py.

```

#!/usr/bin/env python3
"""Uji deterministik untuk 0012-D60-LAB03.

SPDX-License-Identifier: CC-BY-SA-4.0
"""
from __future__ import annotations

import subprocess
import sys
import unittest
from fractions import Fraction
from pathlib import Path

from o012_d60_lab03_cellular_degree import (
    LEFT_NULL_C,
    MATRIX_C,
    MATRIX_M,
    MATRIX_N,
    REGULAR_TARGET,
    SINGULAR_TARGET,
    TORUS_BASIS,
    TORUS_WORD,
    X3_BASIS,
    X3_REVERSED_WORD,
    X3_WORD,
    determinant2,
    free_reduce,
    freeze_basis,
    freeze_matrix2,
    freeze_word,
    incidence_vector,
    matmul2,
    nonimage_certificate,
    one_column_homology,
    power_map_local_degrees,
    power_map_preimages,

```

```

torus_local_degrees,
torus_preimages,
unsigned_occurrence_vector,
)

```

```

HERE = Path(__file__).resolve().parent
PROGRAM = HERE / "o012_d60_lab03_cellular_degree.py"
EXPECTED = HERE / "expected-output-lab03.txt"

```

```

class Lab03Tests(unittest.TestCase):
    def test_incidence_degrees_and_unsigned_control(self) -> None:
        self.assertEqual(freeze_reduce(TORUS_WORD, TORUS_BASIS), TORUS_WORD)
        self.assertEqual(incidence_vector(TORUS_WORD, TORUS_BASIS), (0, 0))
        self.assertEqual(unsigned_occurrence_vector(TORUS_WORD, TORUS_BASIS), (2, 2))
        self.assertEqual(incidence_vector(X3_WORD, X3_BASIS), (3,))
        self.assertEqual(incidence_vector(X3_REVERSED_WORD, X3_BASIS), (-3,))
        self.assertEqual(
            freeze_reduce(("a", 1), ("a", -1), ("b", 1)), TORUS_BASIS,
            (("b", 1),),
        )
        with self.assertRaisesRegex(ValueError, "unik"):
            freeze_basis(("a", "a"))
        with self.assertRaisesRegex(ValueError, "tidak berada"):
            freeze_word(("c", 1),, TORUS_BASIS)
        with self.assertRaisesRegex(ValueError, r"\+1 atau -1"):
            freeze_word(("a", 0),, TORUS_BASIS)
        with self.assertRaisesRegex(ValueError, r"\+1 atau -1"):
            freeze_word(("a", True),, TORUS_BASIS)

    def test_one_column_cellular_homology_and_orientation(self) -> None:
        torus = one_column_homology(incidence_vector(TORUS_WORD, TORUS_BASIS))
        self.assertEqual((torus.h0_free_rank, torus.h1_free_rank, torus.h1_torsion, torus.h2_free_rank), (1, 2,
        (, 1))
        x3 = one_column_homology(incidence_vector(X3_WORD, X3_BASIS))
        reversed_x3 = one_column_homology(
            incidence_vector(X3_REVERSED_WORD, X3_BASIS)
        )
        self.assertEqual((x3.h0_free_rank, x3.h1_free_rank, x3.h1_torsion, x3.h2_free_rank), (1, 0, (3,), 0))
        self.assertEqual(x3, reversed_x3)
        self.assertEqual(one_column_homology((1,)).h1_torsion, ())
        self.assertEqual(one_column_homology((0,)).h2_free_rank, 1)
        with self.assertRaisesRegex(ValueError, "sedikitnya satu"):
            one_column_homology(())
        with self.assertRaisesRegex(ValueError, "bilangan bulat"):
            one_column_homology((Fraction(3, 1),))

    def test_integer_torus_endomorphisms_and_induced_actions(self) -> None:
        self.assertEqual(freeze_matrix2(MATRIX_M), MATRIX_M)
        self.assertEqual(determinant2(MATRIX_M), 5)
        self.assertEqual(determinant2(MATRIX_N), -1)
        self.assertEqual(determinant2(MATRIX_C), 0)
        self.assertEqual(matmul2(MATRIX_N, MATRIX_M), ((-1, 2), (2, 1)))
        self.assertEqual(matmul2(MATRIX_M, MATRIX_N), ((1, 2), (2, -1)))
        self.assertNotEqual(matmul2(MATRIX_N, MATRIX_M), matmul2(MATRIX_M, MATRIX_N))
        self.assertEqual(
            determinant2(matmul2(MATRIX_N, MATRIX_M)),
            determinant2(MATRIX_N) * determinant2(MATRIX_M),
        )
        with self.assertRaisesRegex(ValueError, "2x2"):
            freeze_matrix2(((1, 0, 0), (0, 1, 0)))
        with self.assertRaisesRegex(ValueError, "bilangan bulat"):
            freeze_matrix2(((1, 0), (0, Fraction(1, 2))))
        with self.assertRaisesRegex(ValueError, "bilangan bulat"):
            freeze_matrix2(((1, 0), (0, True)))

    def test_exact_preimages_local_degrees_and_composition(self) -> None:
        self.assertEqual(
            power_map_preimages(3, Fraction(1, 7)),
            (Fraction(1, 21), Fraction(8, 21), Fraction(5, 7)),
        )
        self.assertEqual(power_map_local_degrees(3, Fraction(1, 7)), (1, 1, 1))
        self.assertEqual(
            power_map_preimages(-3, Fraction(1, 7)),
            (Fraction(2, 7), Fraction(13, 21), Fraction(20, 21)),

```

```

)
self.assertEqual(power_map_local_degrees(-3, Fraction(1, 7)), (-1, -1, -1))
expected_m = (
    (Fraction(0), Fraction(1, 7)),
    (Fraction(1, 5), Fraction(26, 35)),
    (Fraction(2, 5), Fraction(12, 35)),
    (Fraction(3, 5), Fraction(33, 35)),
    (Fraction(4, 5), Fraction(19, 35)),
)
self.assertEqual(torus_preimages(MATRIX_M, REGULAR_TARGET), expected_m)
self.assertEqual(torus_local_degrees(MATRIX_M, REGULAR_TARGET), (1,) * 5)
self.assertEqual(sum(torus_local_degrees(MATRIX_M, REGULAR_TARGET)), 5)
self.assertEqual(
    torus_preimages(MATRIX_N, REGULAR_TARGET),
    ((Fraction(2, 7), Fraction(1, 7)),),
)
self.assertEqual(torus_local_degrees(MATRIX_N, REGULAR_TARGET), (-1,))
composite = matmul2(MATRIX_N, MATRIX_M)
expected_composite = (
    (Fraction(3, 35), Fraction(4, 35)),
    (Fraction(2, 7), Fraction(5, 7)),
    (Fraction(17, 35), Fraction(11, 35)),
    (Fraction(24, 35), Fraction(32, 35)),
    (Fraction(31, 35), Fraction(18, 35)),
)
self.assertEqual(torus_preimages(composite, REGULAR_TARGET), expected_composite)
self.assertEqual(
    tuple(
        (
            composite[0][0] * point[0]
            + composite[0][1] * point[1]
            - REGULAR_TARGET[0],
            composite[1][0] * point[0]
            + composite[1][1] * point[1]
            - REGULAR_TARGET[1],
        )
        for point in expected_composite
    ),
    ((0, 0), (1, 1), (0, 1), (1, 2), (0, 2)),
)
self.assertEqual(sum(torus_local_degrees(composite, REGULAR_TARGET)), -5)

def test_singular_and_malformed_inputs_fail_closed(self) -> None:
    self.assertTrue(nonimage_certificate(MATRIX_C, SINGULAR_TARGET, LEFT_NULL_C))
    self.assertFalse(
        nonimage_certificate(MATRIX_C, (Fraction(0), Fraction(0)), LEFT_NULL_C)
    )
    parameter = Fraction(1, 7)
    zero_fiber_point = (parameter, -parameter)
    self.assertEqual(
        tuple(
            sum(MATRIX_C[row][column] * zero_fiber_point[column] for column in range(2))
            for row in range(2)
        ),
        (0, 0),
    )
    with self.assertRaisesRegex(ValueError, "singular"):
        torus_preimages(MATRIX_C, SINGULAR_TARGET)
    with self.assertRaisesRegex(ValueError, "kontrol singular"):
        torus_local_degrees(MATRIX_C, SINGULAR_TARGET)
    with self.assertRaisesRegex(ValueError, "bukan vektor null kiri"):
        nonimage_certificate(MATRIX_C, SINGULAR_TARGET, (1, 0))
    with self.assertRaisesRegex(ValueError, "hanya berlaku"):
        nonimage_certificate(MATRIX_M, REGULAR_TARGET, (1, 0))
    with self.assertRaisesRegex(ValueError, "Fraction eksak"):
        torus_preimages(MATRIX_M, (1 / 7, Fraction(2, 7)))
    with self.assertRaisesRegex(ValueError, "tidak hingga"):
        power_map_preimages(0, Fraction(0))
    self.assertEqual(power_map_preimages(0, Fraction(1, 7)), ())
    with self.assertRaisesRegex(ValueError, "bilangan bulat"):
        power_map_preimages(True, Fraction(1, 7))

def test_cli_matches_frozen_expected_output(self) -> None:
    process = subprocess.run(
        [sys.executable, "-B", str(PROGRAM)],
        cwd=HERE,

```



```

        check=True,
        stdout=subprocess.PIPE,
        stderr=subprocess.PIPE,
    )
    self.assertEqual(process.stderr, b"")
    self.assertEqual(process.stdout, EXPECTED.read_bytes())

if __name__ == "__main__":
    unittest.main(verbosity=2)

```

1.8 Keluaran acuan

Berkas kanonis: expected-output-lab03.txt.

```

LABORATORIUM 0012-D60-LAB03
fixture_seluler_1: torus_minimal
kata_pelekatan_torus: a b a^-1 b^-1
insidensi_torus(a,b): [0, 0]
hitung_tak_bertanda_torus: [2, 2]
d1_torus_nol: true
H_0_torus: Z
H_1_torus: Z^2
H_2_torus: Z
fixture_seluler_2: X3
derajat_pelekatan_X3: 3
d2_X3: [3]
H_0_X3: Z
H_1_X3: Z/3
H_2_X3: 0
d2_X3_orientasi_dibalik: [-3]
homologi_orientasi_dibalik_tetap: true
target_pangkat_3: 1/7
prabayaran_pangkat_3: [1/21, 8/21, 5/7]
kontribusi_lokal_pangkat_3: [1, 1, 1]
jumlah_derajat_lokal_pangkat_3: 3
matriks_M: [[2, 1], [-1, 2]]
determinan_M: 5
aksi_H1_M: [[2, 1], [-1, 2]]
aksi_H2_M: kali_5
target_torus: [1/7, 2/7]
prabayaran_M: [(0, 1/7), (1/5, 26/35), (2/5, 12/35), (3/5, 33/35), (4/5, 19/35)]
jumlah_prabayaran_M: 5
kontribusi_lokal_M: [1, 1, 1, 1, 1]
jumlah_derajat_lokal_M: 5
matriks_N: [[0, 1], [1, 0]]
determinan_N: -1
prabayaran_N: [(2/7, 1/7)]
jumlah_derajat_lokal_N: -1
matriks_N_setelah_M: [[-1, 2], [2, 1]]
matriks_M_setelah_N: [[1, 2], [2, -1]]
urutan_komposisi_berbeda: true
derajat_N_setelah_M: -5
derajat_multiplikatif: true
matriks_C: [[1, 1], [2, 2]]
determinan_C: 0
target_noncitra_C: [0, 1/3]
vektor_null_kiri_C: [-2, 1]
sertifikat_noncitra_C: true
derajat_C: 0

```

1.9 Interpretasi matematis

Matriks batas dan matriks pemetaan terinduksi menjawab pertanyaan yang berbeda. Untuk X_3 , bilangan 3 adalah koefisien insidensi dari sel-2 ke sel-1 dan menghasilkan torsi $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ pada H_1 . Untuk torus minimal, jumlah eksponen bertanda membuat semua batas nol, tetapi ini tidak berarti bahwa setiap pemetaan torus berderajat nol. Pemetaan f_A membawa informasi tambahan: aksinya pada dua arah lingkaran adalah A , dan aksinya pada orientasi dua-dimensi adalah $\det A$.

Jika A tak singular, f_A adalah penutup berhingga dengan $|\det A|$ lembar. Determinan positif membuat semua lembar mempertahankan orientasi; determinan negatif membuat semuanya membalik orientasi.

Karena itu banyaknya prabayangan memberi nilai mutlak derajat, sedangkan jumlah **bertanda** memberi derajat itu sendiri. Untuk matriks singular, serat dapat kosong atau berdimensi positif, bergantung pada apakah sasaran berada dalam citra. Determinan nol hanya menyatakan derajat global nol.

2 Solusi lengkap

2.1 Eksekusi dan kontrak keluaran

Perintah pertama memakai konvensi `unittest`: laporan enam uji dan `ok` muncul pada aliran galat, sedangkan aliran keluarannya kosong. Perintah kedua harus berhasil dengan aliran galat kosong dan menghasilkan tepat byte UTF-8 dalam `expected-output-lab03.txt`, termasuk urutan titik, tanda, spasi, dan LF terakhir. Enam kelompok yang diperiksa ialah X_3 , torus minimal, pemetaan M , pemetaan N , komposisi NM , dan kegagalan terkontrol untuk data yang tidak sah atau singular. Pemeriksaan byte mencegah daftar prabayangan yang secara matematis setara tetapi tidak kanonis menyamakan perubahan keluaran.

2.2 Kompleks X_3 dan tiga prabayangan

Karena $q_3([t]) = [3t]$ berderajat 3, basis (e^2, a, v) memberi

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{[3]} \mathbb{Z} \xrightarrow{[0]} \mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

Maka

$$H_0(X_3; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}, \quad H_1(X_3; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}, \quad H_2(X_3; \mathbb{Z}) = 0.$$

Membalik orientasi e^2 mengganti $[3]$ dengan $[-3]$. Kernel tetap nol dan citranya tetap $3\mathbb{Z}$, sehingga homologi tidak berubah.

Untuk $q_3([t]) = [1/7]$, persamaan $3t = 1/7 + m$ dengan $m = 0, 1, 2$ memberi, dalam urutan menaik,

$$q_3^{-1}([1/7]) = \{[1/21], [8/21], [15/21]\}.$$

Di sekitar setiap titik, pengangkatan realnya mempunyai kemiringan positif 3, sehingga setiap derajat lokal adalah +1. Jumlahnya 3, sama dengan derajat global peta pelekatan.

2.3 Kata pelekatan dan homologi torus

Dalam kata $aba^{-1}b^{-1}$, jumlah eksponen a ialah $1 - 1 = 0$ dan jumlah eksponen b juga $1 - 1 = 0$. Jadi

$$d_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad d_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Menghitung empat kemunculan tanpa orientasi akan memberi dua untuk setiap huruf. Itu mengabaikan bahwa proyeksi peta pelekatan menuju lingkaran a atau b berjalan sekali maju dan sekali mundur; kedua kontribusi derajat saling meniadakan.

Kompleks rantainya ialah

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \longrightarrow 0,$$

sehingga

$$H_0(T^2; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}, \quad H_1(T^2; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^2, \quad H_2(T^2; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}.$$

Berbeda dari X_3 , torus tidak memperoleh torsi karena citra batas seluler atasnya nol, bukan subgrup indeks tiga.

2.4 Pemetaan M, N , komposisi, dan tanda lokal

Sebuah aproksimasi seluler dari f_M menginduksi pemetaan rantai pada C_1 dengan kolom M :

$$M \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad M \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Jadi pernyataan pada H_1 tepat seperti yang diminta. Determinan $\det M = 2 \cdot 2 - 1 \cdot (-1) = 5$. Bukti produk cup pada bagian sebelumnya, bukan persamaan naturalitas dengan batas nol, memberi $f_{M*}[T^2] = 5[T^2]$.

Lima prabayangan $y = (1/7, 2/7)$ di bawah f_M , dalam urutan leksikografis, beserta vektor bulat $Mx - y$, ialah

x	$Mx - y$	$\deg_x(f_M)$
$(0, 1/7)$	$(0, 0)$	$+1$
$(1/5, 26/35)$	$(1, 1)$	$+1$
$(2/5, 12/35)$	$(1, 0)$	$+1$
$(3/5, 33/35)$	$(2, 1)$	$+1$
$(4/5, 19/35)$	$(2, 0)$	$+1$.

Setiap tanda lokal positif karena $\det M > 0$, dan jumlahnya 5.

Matriks N menukar dua koordinat, jadi satu-satunya prabayangan ialah

$$f_N^{-1}(y) = \{(2/7, 1/7)\}.$$

Karena $\det N = -1$, tanda lokal dan derajat globalnya sama dengan -1 .

Urutan fungsi memberi

$$f_N \circ f_M = f_{NM}, \quad NM = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix},$$

bukan MN . Lima prabayangan eksak y di bawah f_{NM} ialah

x	$(NM)x - y$	$\deg_x(f_{NM})$
$(3/35, 4/35)$	$(0, 0)$	-1
$(2/7, 5/7)$	$(1, 1)$	-1
$(17/35, 11/35)$	$(0, 1)$	-1
$(24/35, 32/35)$	$(1, 2)$	-1
$(31/35, 18/35)$	$(0, 2)$	-1 .

Jadi jumlah lokalnya -5 , sesuai $\det(NM) = \det N \det M = -5$. Dalam urutan sebaliknya,

$$MN = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Kedua komposisi mempunyai derajat -5 , tetapi matriks dan pemetaannya tidak sama. Kesamaan determinan tidak mengizinkan pertukaran urutan komposisi.

2.5 Kasus gagal dan serat singular

Jika sebuah kolom A tidak integral, titik $[x] = [x + e_i]$ dapat dikirim ke dua kelas berbeda karena $Ae_i \notin \mathbb{Z}^2$. Jadi rumus $[x] \mapsto [Ax]$ tidak terdefinisi baik pada torus. Berikutnya, naturalitas batas torus hanya membaca $0 = 0$ pada derajat dua; ia tidak menentukan bilangan yang mengalikan generator C_2 . Bilangan itu diperoleh dari kelas fundamental. Demikian pula, banyaknya prabayangan tanpa tanda hanya memberi $|\deg|$ untuk penutup linear tak singular; N mempunyai satu prabayangan, tetapi derajatnya -1 .

Untuk

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad y_0 = (0, 1/3),$$

vektor baris $\lambda = (-2, 1)$ memenuhi $\lambda C = (0, 0)$. Jika $Cx = y_0 + k$ untuk $k \in \mathbb{Z}^2$, maka

$$0 = \lambda Cx = \lambda y_0 + \lambda k = \frac{1}{3} + \text{suatu bilangan bulat},$$

yang mustahil. Jadi serat di atas y_0 kosong. Akan tetapi, serat di atas 0 tidak kosong, bahkan memuat seluruh lingkaran

$$\{[(t, -t)] : t \in \mathbb{R}\},$$

karena $C(t, -t)^T = 0$. Dengan demikian $\det C = 0$ berarti derajat global nol; ia tidak membuat setiap serat kosong.

2.6 Pemeriksaan reproduktibilitas

Uji otomatis harus memeriksa:

1. matriks batas X_3 , homologinya, pembalikan orientasi, tiga prabayangan $[1/21], [8/21], [15/21]$, dan jumlah tanda lokal 3;
2. jumlah eksponen bertanda kata torus, penolakan hitungan tanpa tanda, dan homologi $(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}^2, \mathbb{Z})$;
3. syarat entri integral agar f_A terdefinisi baik serta konvensi kolom untuk aksi M pada H_1 ;
4. kelima prabayangan M , satu prabayangan N , tanda lokal, determinan, dan aksi yang diwajibkan pada H_2 ;
5. urutan $NM \neq MN$, kelima prabayangan komposisi, jumlah tanda -5 , serta sertifikat null kiri untuk serat kosong C ;
6. kasus serat singular yang tidak kosong, aliran galat kosong, urutan keluaran kanonis, dan kesamaan byte keluaran CLI dengan keluaran acuan UTF-8 berakhiran LF.

Semua pecahan dibandingkan sebagai pasangan bilangan bulat tereduksi. Tidak ada toleransi titik-mengambang yang dapat membuat titik salah tampak benar. Program juga harus menghitung matriks komposisi dan vektor pemeriksaan $Ax - y$ dari data, bukan menerima daftar jawaban sebagai satu-satunya bukti.

2.7 Hak, atribusi, dan provenans

Laboratorium, program, uji, keluaran acuan, pembuktian perluasan derajat ke permukaan, interpretasi, dan solusi ini adalah materi asli edisi dan didistribusikan di bawah CC BY-SA 4.0. Jangkar konseptual yang dipertahankan ialah Fomberg `algebraic_topology.tex:2849-2875` untuk definisi/sifat derajat, :3037-3114

untuk derajat lokal dan contoh peta pangkat, :3612-3664 untuk pemetaan batas seluler, dan :3740-3845 untuk struktur CW minimal torus; pembandingan Roberts ialah `Notes.tex:6327-6348`. Uraian penghubung, bukti permukaan, data matriks, tugas, dan solusi di sini ditulis secara independen dan tidak menyalin ekspresi sumber atau bank masalah yang dikecualikan.

Produksi dilakukan dengan **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra** atas arahan pengguna. Kredit, lisensi, dan hubungan sumber David Michael Roberts serta Yeheli Fomberg tetap dibedakan. Laboratorium ini tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber maupun institusi mana pun.

1 Laboratorium Komputasi 4 — Sintesis Lintas-Invarian

1.1 Status dan keluaran laboratorium

Laboratorium terakhir ini membandingkan grup fundamental, homologi integral, kohomologi aditif, dan produk cup pada empat kompleks CW yang dibekukan. Dua pasang ruang sengaja mempunyai beberapa invarian yang sama. Tujuannya bukan menghasilkan satu “sidik jari lengkap,” melainkan menentukan dengan tepat informasi apa yang hilang ketika kita beralih dari peta pelekatan ke diferensial seluler, dari grup fundamental ke abelianisasinya, atau dari gelanggang kohomologi ke grup-grup aditifnya.

Paket memuat program Python berbasis pustaka standar, enam uji deterministik, keluaran acuan, interpretasi, petunjuk, dan solusi lengkap. Semua koefisien adalah bilangan bulat. Program hanya memverifikasi empat model yang dijelaskan di bawah; ia tidak mengaku menyelesaikan masalah isomorfisma grup, gelanggang, atau tipe homotopi secara umum.

1.2 Prasyarat yang dipakai

- grup fundamental baji dan kompleks presentasi;
- identifikasi $H_1(X; \mathbb{Z}) \cong \pi_1(X)^{\text{ab}}$;
- kompleks korantai dan kohomologi singular;
- struktur CW pada ruang projektif kompleks dalam pemeriksaan $\mathbb{CP}^n$;
- hubungan batas seluler, kelas fundamental, dan produk cup pada Laboratorium 3.

1.3 Tujuan

Sesudah menyelesaikan laboratorium ini, pembaca dapat:

1. menghitung diferensial seluler dari jumlah eksponen bertanda;
2. menjelaskan mengapa H_1 hanya melihat abelianisasi π_1 ;
3. membedakan homologi dari informasi penuh peta pelekatan;
4. membedakan kohomologi sebagai grup bergradasi dari gelanggang kohomologi;
5. memakai produk cup sebagai obstruksi terhadap ekuivalensi homotopi;
6. memeriksa hukum unit, asosiativitas, dan komutativitas bergradasi pada tabel produk cup jarang;
7. mengaudit kesimpulan negatif tanpa mengubah “invarian ini tidak membedakan” menjadi klaim ekuivalensi.

1.4 Empat model beku dan konvensi

Kita memakai dua pasangan berikut, selalu dengan koefisien $\mathbb{Z}$.

Pasangan A. Ambil

$$X = T^2 = (S_a^1 \vee S_b^1) \cup_{aba^{-1}b^{-1}} e^2$$

dan

$$Y = S_a^1 \vee S_b^1 \vee S^2,$$

yang dapat dipandang sebagai pelekatan sel-2 konstan pada baji dua lingkaran. Keduanya mempunyai satu sel-0, dua sel-1, satu sel-2, dan diferensial seluler nol. Namun,

$$\pi_1(X) = \langle a, b \mid aba^{-1}b^{-1} \rangle \cong \mathbb{Z}^2, \quad \pi_1(Y) = \langle a, b \mid \rangle \cong F_2.$$

Pasangan B. Gunakan struktur CW

$$P = \mathbb{CP}^2 \cong S^2 \cup_{\eta} e^4, \quad Q = S^2 \vee S^4 \cong S^2 \cup_{\text{konstan}} e^4,$$

di mana $\eta: S^3 \rightarrow S^2$ adalah peta Hopf. Kedua ruang terhubung sederhana dan mempunyai satu sel pada dimensi 0, 2, 4. Semua diferensial selulernya nol, tetapi peta pelekatan sel-4 tidak sama.

Orientasi dipilih sehingga generator teratas $\omega \in H^2(T^2)$ dan $u \in H^4(\mathbb{CP}^2)$ mempunyai tanda positif dalam rumus di bawah. Mengganti orientasi mengganti nama generator bertanda, bukan fakta bahwa produknya nol atau tak nol.

1.5 Prinsip perbandingan yang dihitung

Untuk Pasangan A, kata komutator sudah tereduksi dalam grup bebas:

$$aba^{-1}b^{-1} \neq 1 \quad \text{di } F_2.$$

Vektor jumlah eksponennya ialah $(0, 0)$. Karena abelianisasi melupakan urutan huruf, relator komutator tidak memberi relasi baru setelah abelianisasi. Maka

$$H_1(X; \mathbb{Z}) \cong H_1(Y; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^2,$$

walaupun grup fundamentalnya tidak isomorfik: yang pertama abelian dan yang kedua tidak. Kompleks rantai seluler keduanya ialah

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

Jadi homologi keduanya sama. Kohomologi aditifnya juga sama, tetapi perkaliannya berbeda. Dengan basis dual α, β dan kelas orientasi ω ,

$$\alpha \smile \beta = \omega, \quad \beta \smile \alpha = -\omega \quad \text{pada } T^2,$$

sedangkan semua produk dua kelas berderajat positif pada $S^1 \vee S^1 \vee S^2$ adalah nol. Pada baji, kedua kelas derajat satu didukung oleh suku lingkaran, sedangkan kelas derajat dua berasal dari suku sfera; retraksi baji ke setiap suku memperlihatkan bahwa tidak ada produk yang dapat menghasilkan generator sfera itu.

Untuk Pasangan B, grup fundamental, homologi, dan kohomologi aditif semuanya sama. Keduanya mempunyai $\mathbb{Z}$ hanya pada derajat 0, 2, 4. Informasi yang tersisa berada dalam peta pelekatan. Jika

$$Z_f = S^2 \cup_f e^4,$$

pilih $x \in H^2(Z_f; \mathbb{Z})$ dan $u \in H^4(Z_f; \mathbb{Z})$ sesuai orientasi sel. Koefisien dalam

$$x \smile x = H(f)u$$

adalah invarian Hopf $H(f)$. Peta Hopf η mempunyai $H(\eta) = 1$, sedangkan peta konstan mempunyai invarian Hopf nol. Karena itu

$$H^*(\mathbb{CP}^2; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}[x]/(x^3), \quad |x| = 2,$$

dalam rentang dimensi ini dengan $x^2 = u$, sementara pada $S^2 \vee S^4$ berlaku $x^2 = 0$. Produk cup dipertahankan oleh ekuivalensi homotopi; jadi kedua ruang pada setiap pasangan bukan ekuivalen homotopi.

Tugas 1 — jalankan verifikator beku. Jalankan program uji dan program utama. Pastikan enam uji lulus, aliran galat program utama kosong, dan keluarannya sama byte demi byte dengan `expected-output-lab04.txt`.

Tugas 2 — hitung kompleks seluler Pasangan A. Hitung jumlah eksponen relator torus, turunkan kedua diferensial, lalu hitung H_0, H_1, H_2 untuk X dan Y . Periksa juga karakteristik Euler.

Tugas 3 — temukan informasi yang hilang pada H_1 . Reduksi bebas kata $aba^{-1}b^{-1}$, bandingkan perilakunya pada F_2 dan $\mathbb{Z}^2$, dan jelaskan mengapa abelianisasi kedua grup tetap $\mathbb{Z}^2$.

Tugas 4 — bandingkan gelanggang Pasangan A. Tulis basis kohomologi bergradasi, hitung tabel produk cup tak nol, periksa tanda $\beta \smile \alpha = -\alpha \smile \beta$, dan tentukan invarian pertama pada urutan audit yang membedakan ruang.

Tugas 5 — isolasi peta pelekatan Pasangan B. Hitung invarian aditif kedua ruang, kemudian gunakan rumus invarian Hopf untuk memperoleh $x^2 = u$ pada $\mathbb{CP}^2$ dan $x^2 = 0$ pada $S^2 \vee S^4$.

Tugas 6 — audit empat implikasi palsu. Tolak dengan saksi eksplisit: “ H_1 sama berarti π_1 sama,” “homologi sama berarti ekuivalen homotopi,” “diferensial seluler nol berarti peta pelekatan trivial,” dan “kohomologi aditif sama berarti gelanggang kohomologi sama.” Jelaskan pula mengapa kesamaan semua invarian yang kebetulan dihitung program tidak akan menjadi algoritme umum untuk membuktikan ekuivalensi homotopi.

Petunjuk. Pisahkan tiga operasi: reduksi bebas mempertahankan urutan huruf, abelianisasi hanya menyimpan jumlah eksponen, dan diferensial seluler hanya membaca derajat komponen ke sel satu dimensi lebih rendah. Untuk Pasangan B, tidak ada grup rantai pada dimensi 1 atau 3, sehingga semua diferensial nol tanpa memaksa η menjadi null-homotopik. Produk cup membaca koefisien yang tidak tampak pada kompleks rantai aditif itu.

1.6 Program lengkap

Berkas kanonis: `o012_d60_lab04_cross_invariants.py`. Pembangun pembaca mengganti penanda berikut dengan byte sumber yang diuji.

```
#!/usr/bin/env python3
"""Laboratorium D60-04: perbandingan lintas-invarian yang eksak.

Program ini memverifikasi empat model CW yang dibekukan untuk laboratorium;
ia bukan pemecah umum masalah isomorfisma grup atau gelanggang.

SPDX-License-Identifier: CC-BY-SA-4.0
Materi asli edisi diproduksi dengan OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra.
"""
from __future__ import annotations

import sys
from dataclasses import dataclass
from typing import Iterable, Mapping

Word = tuple[int, ...]
ProductRow = tuple[str, str, int, str]

def require(condition: bool, message: str) -> None:
    if not condition:
        raise ValueError(message)
```



```

@dataclass(frozen=True, order=True)
class AbelianGroup:
    """Grup abelian terbangkit hingga dalam bentuk  $Z^r$  plus faktor torsi."""

    free_rank: int
    torsion: tuple[int, ...] = ()

    def __post_init__(self) -> None:
        require(
            isinstance(self.free_rank, int)
            and not isinstance(self.free_rank, bool)
            and self.free_rank >= 0,
            "rank bebas tidak sah",
        )
        require(
            all(
                isinstance(order, int)
                and not isinstance(order, bool)
                and order > 1
                for order in self.torsion
            ),
            "orde torsi tidak sah",
        )
        require(tuple(sorted(self.torsion)) == self.torsion, "faktor torsi harus kanonis")

    def label(self) -> str:
        pieces: list[str] = []
        if self.free_rank == 1:
            pieces.append("Z")
        elif self.free_rank > 1:
            pieces.append(f" $Z^{\text{self.free\_rank}}$ ")
        pieces.extend(f" $Z/\{\text{order}\}$ " for order in self.torsion)
        return " + ".join(pieces) if pieces else "0"

def free_reduce(word: Iterable[int], generator_count: int) -> Word:
    """Reduksi kata bebas; generator i ditulis i dan inversnya -i."""

    require(
        isinstance(generator_count, int)
        and not isinstance(generator_count, bool)
        and generator_count >= 0,
        "banyak generator tidak sah",
    )

    stack: list[int] = []
    for letter in word:
        require(
            isinstance(letter, int)
            and not isinstance(letter, bool)
            and 1 <= abs(letter) <= generator_count,
            "huruf kata bebas tidak sah",
        )
        if stack and stack[-1] == -letter:
            stack.pop()
        else:
            stack.append(letter)
    return tuple(stack)

def exponent_sums(word: Iterable[int], generator_count: int) -> tuple[int, ...]:
    reduced = free_reduce(word, generator_count)
    return tuple(
        sum(1 if letter == index else -1 if letter == -index else 0 for letter in reduced)
        for index in range(1, generator_count + 1)
    )

@dataclass(frozen=True)
class CupRing:
    """Tabel produk cup jarang pada basis homogen kohomologi bebas."""

    basis_degrees: tuple[tuple[str, int], ...]
    products: tuple[ProductRow, ...]

```

```

def degrees(self) -> dict[str, int]:
    result = dict(self.basis_degrees)
    require(len(result) == len(self.basis_degrees), "basis kohomologi berulang")
    require(result.get("1") == 0, "basis harus memuat unit berderajat nol")
    require(
        all(
            isinstance(basis, str)
            and basis
            and isinstance(degree, int)
            and not isinstance(degree, bool)
            and degree >= 0
            for basis, degree in result.items()
        ),
        "derajat basis tidak sah",
    )
    return result

def multiply_basis(self, left: str, right: str) -> dict[str, int]:
    degrees = self.degrees()
    require(left in degrees and right in degrees, "elemen basis tidak dikenal")
    if left == "1":
        return {right: 1}
    if right == "1":
        return {left: 1}
    matches = [(coefficient, target) for a, b, coefficient, target in self.products if (a, b) == (left, right)]
    require(len(matches) <= 1, "entri produk basis berulang")
    return {matches[0][1]: matches[0][0]} if matches and matches[0][0] else {}

def multiply(
    self,
    left: Mapping[str, int],
    right: Mapping[str, int],
) -> dict[str, int]:
    result: dict[str, int] = {}
    for left_basis, left_coefficient in left.items():
        for right_basis, right_coefficient in right.items():
            for target, coefficient in self.multiply_basis(left_basis, right_basis).items():
                result[target] = result.get(target, 0) + left_coefficient * right_coefficient * coefficient
    return {basis: coefficient for basis, coefficient in sorted(result.items()) if coefficient}

def validate(self) -> None:
    degrees = self.degrees()
    seen: set[tuple[str, str]] = set()
    for left, right, coefficient, target in self.products:
        require(left in degrees and right in degrees and target in degrees, "produk memakai basis tidak dikenal")
        require((left, right) not in seen, "entri produk basis berulang")
        seen.add((left, right))
        require(left != "1" and right != "1", "produk unit eksplisit bertentangan dengan unit implisit")
        require(
            isinstance(coefficient, int)
            and not isinstance(coefficient, bool)
            and coefficient != 0,
            "koefisien produk harus bulat tak nol",
        )
        require(degrees[target] == degrees[left] + degrees[right], "derajat produk cup tidak cocok")

    basis = tuple(degrees)
    for left in basis:
        for right in basis:
            lhs = self.multiply_basis(left, right)
            rhs = {
                key: ((-1) ** (degrees[left] * degrees[right])) * value
                for key, value in self.multiply_basis(right, left).items()
            }
            require(lhs == rhs, "tabel tidak komutatif bergradasi")
            for third in basis:
                left_assoc = self.multiply(lhs, {third: 1})
                right_assoc = self.multiply({left: 1}, self.multiply_basis(right, third))
                require(left_assoc == right_assoc, "tabel produk cup tidak asosiatif")

def additive_ranks(self) -> tuple[tuple[int, int], ...]:
    counts: dict[int, int] = {}
    for _basis, degree in self.basis_degrees:
        counts[degree] = counts.get(degree, 0) + 1

```

```

        return tuple(sorted(counts.items()))

def positive_product_signature(self) -> tuple[ProductRow, ...]:
    degrees = self.degrees()
    return tuple(
        sorted(
            row
            for row in self.products
            if degrees[row[0]] > 0 and degrees[row[1]] > 0
        )
    )

@dataclass(frozen=True)
class SpaceProfile:
    slug: str
    display_name: str
    pi1_signature: str
    pi1_abelianization: AbelianGroup
    generator_count: int
    relators: tuple[Word, ...]
    cells: tuple[tuple[int, int], ...]
    attaching_code: str
    ring: CupRing

    def homology(self) -> tuple[tuple[int, AbelianGroup], ...]:
        """Semua model beku mempunyai diferensial seluler nol."""

        return tuple((degree, AbelianGroup(count)) for degree, count in self.cells if count)

    def euler_characteristic(self) -> int:
        return sum((-1) ** degree * count for degree, count in self.cells)

    def validate(self) -> None:
        require(
            all(isinstance(value, str) and value.strip() for value in (
                self.slug, self.display_name, self.pi1_signature, self.attaching_code,
            )),
            "metadata ruang tidak lengkap",
        )
        require(
            isinstance(self.generator_count, int)
            and not isinstance(self.generator_count, bool)
            and self.generator_count >= 0,
            "banyak generator tidak sah",
        )
        require(tuple(sorted(self.cells)) == self.cells, "sensus sel tidak kanonis")
        require(self.cells and self.cells[0] == (0, 1), "model harus terhubung dengan satu sel nol")
        require(
            all(
                isinstance(degree, int)
                and not isinstance(degree, bool)
                and degree >= 0
                and isinstance(count, int)
                and not isinstance(count, bool)
                and count > 0
                for degree, count in self.cells
            ),
            "sensus atau banyak sel tidak sah",
        )
        require(len({degree for degree, _count in self.cells}) == len(self.cells), "dimensi sel berulang")
        for relator in self.relators:
            free_reduce(relator, self.generator_count)
        require(
            all(
                exponent_sums(relator, self.generator_count)
                == (0,) * self.generator_count
                for relator in self.relators
            ),
            "relator tidak cocok dengan abelianisasi bebas model beku",
        )
        require(
            self.pi1_abelianization == AbelianGroup(self.generator_count),
            "abelianisasi pi1 tidak cocok dengan presentasi model beku",
        )
        self.ring.validate()

```

```

homology_ranks = tuple((degree, group.free_rank) for degree, group in self.homology())
require(homology_ranks == self.ring.additive_ranks(), "homologi dan kohomologi aditif tidak cocok")
h1 = dict(self.homology()).get(1, AbelianGroup(0))
require(h1 == self.pi1_abelianization, "H1 tidak cocok dengan abelianisasi pi1")

def fixtures() -> dict[str, SpaceProfile]:
    commutator = (1, 2, -1, -2)
    torus_ring = CupRing(
        (("1", 0), ("alpha", 1), ("beta", 1), ("omega", 2)),
        (("alpha", "beta", 1, "omega"), ("beta", "alpha", -1, "omega")),
    )
    wedge_a_ring = CupRing(
        (("1", 0), ("alpha", 1), ("beta", 1), ("omega", 2)),
        (),
    )
    cp2_ring = CupRing(
        (("1", 0), ("x", 2), ("u", 4)),
        (("x", "x", 1, "u"),),
    )
    wedge_b_ring = CupRing(
        (("1", 0), ("x", 2), ("u", 4)),
        (),
    )
    spaces = {
        "torus": SpaceProfile(
            "torus", "T^2", "Z^2", AbelianGroup(2), 2, (commutator,),
            ((0, 1), (1, 2), (2, 1)), "commutator", torus_ring,
        ),
        "wedge_a": SpaceProfile(
            "wedge_a", "S^1 v S^1 v S^2", "F_2", AbelianGroup(2), 2, (),
            ((0, 1), (1, 2), (2, 1)), "constant_2_cell", wedge_a_ring,
        ),
        "cp2": SpaceProfile(
            "cp2", "CP^2", "1", AbelianGroup(0), 0, (),
            ((0, 1), (2, 1), (4, 1)), "hopf_eta", cp2_ring,
        ),
        "wedge_b": SpaceProfile(
            "wedge_b", "S^2 v S^4", "1", AbelianGroup(0), 0, (),
            ((0, 1), (2, 1), (4, 1)), "constant_4_cell", wedge_b_ring,
        ),
    }
    for profile in spaces.values():
        profile.validate()
    return spaces

def homology_label(profile: SpaceProfile) -> str:
    return ", ".join(f"H{degree}={group.label()}" for degree, group in profile.homology())

def compare_profiles(left: SpaceProfile, right: SpaceProfile) -> dict[str, object]:
    left.validate()
    right.validate()
    comparison = {
        "pi1_equal": left.pi1_signature == right.pi1_signature,
        "homology_equal": left.homology() == right.homology(),
        "additive_cohomology_equal": left.ring.additive_ranks() == right.ring.additive_ranks(),
        "cup_products_equal": left.ring.positive_product_signature() == right.ring.positive_product_signature(),
        "euler_equal": left.euler_characteristic() == right.euler_characteristic(),
    }
    order = (
        ("pi1_equal", "pi1"),
        ("homology_equal", "homologi"),
        ("additive_cohomology_equal", "kohomologi aditif"),
        ("cup_products_equal", "produk cup"),
    )
    comparison["first_separator"] = next((label for key, label in order if comparison[key] is False), "tidak ada")
    return comparison

def render_report() -> str:
    spaces = fixtures()
    torus, wedge_a = spaces["torus"], spaces["wedge_a"]
    cp2, wedge_b = spaces["cp2"], spaces["wedge_b"]

```

```

pair_a = compare_profiles(torus, wedge_a)
pair_b = compare_profiles(cp2, wedge_b)
commutator = torus.relators[0]
reduced = free_reduce(commutator, 2)
sums = exponent_sums(commutator, 2)
lines = [
    "D60-LAB04 | sintesis lintas-invariant",
    "Pasangan A:  $T^2$  vs  $S^1 \vee S^1 \vee S^2$ ",
    f"pi1: {torus.pi1_signature} vs {wedge_a.pi1_signature}; komutator bebas={reduced}; jumlah eksponen={sums}",
    f"homologi: sama ({homology_label(torus)}); chi={torus.euler_characteristic()}",
    "cup: torus alpha cup beta=omega, beta cup alpha=-omega; baji=0",
    f"pemisah pertama: {pair_a['first_separator']}",
    "Pasangan B:  $CP^2$  vs  $S^2 \vee S^4$ ",
    f"pi1: {cp2.pi1_signature} vs {wedge_b.pi1_signature}; homologi sama ({homology_label(cp2)})",
    "pelekatan sel-4: Hopf eta vs konstan; x cup x: u vs 0",
    f"pemisah pertama: {pair_b['first_separator']}",
    "Audit: H1 adalah abelianisasi pi1; diferensial seluler tidak menyimpan seluruh peta pelekatan.",
    "Audit: kesamaan daftar invariant bukan bukti ekuivalensi homotopi umum.",
]
return "\n".join(lines) + "\n"

def main() -> int:
    sys.stdout.buffer.write(render_report().encode("utf-8"))
    return 0

if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())

```

1.7 Uji deterministik lengkap

Berkas kanonis: test_o012_d60_lab04_cross_invariants.py.

```

#!/usr/bin/env python3
"""Enam uji deterministik untuk Laboratorium D60-04."""
from __future__ import annotations

import subprocess
import sys
import unittest
from pathlib import Path

from o012_d60_lab04_cross_invariants import (
    AbelianGroup,
    CupRing,
    SpaceProfile,
    compare_profiles,
    exponent_sums,
    fixtures,
    free_reduce,
)

HERE = Path(__file__).resolve().parent
PROGRAM = HERE / "o012_d60_lab04_cross_invariants.py"
EXPECTED = HERE / "expected-output-lab04.txt"

class CrossInvariantLabTests(unittest.TestCase):
    def setUp(self) -> None:
        self.spaces = fixtures()

    def test_fixtures_and_malformed_ring_fail_closed(self) -> None:
        self.assertEqual(set(self.spaces), {"torus", "wedge_a", "cp2", "wedge_b"})
        for profile in self.spaces.values():
            profile.validate()
            with self.assertRaisesRegex(ValueError, "derajat produk cup"):
                CupRing(("1", 0), ("x", 1), ("u", 3), (("x", "x", 1, "u"),)).validate()
            with self.assertRaisesRegex(ValueError, "basis kohomologi berulang"):
                CupRing(("1", 0), ("1", 0), ()).validate()
            with self.assertRaisesRegex(ValueError, "unit eksplisit"):
                CupRing(("1", 0), ("x", 2), (("1", "x", 2, "x"),)).validate()
            with self.assertRaisesRegex(ValueError, "basis tidak dikenal"):

```

```

        CupRing(((("1", 0), ("x", 2)), (("x", "x", 1, "u")),)).validate()
with self.assertRaisesRegex(ValueError, "berulang"):
    CupRing(
        ((("1", 0), ("x", 2), ("u", 4)),
         (("x", "x", 1, "u"), ("x", "x", -1, "u"))),
    ).validate()
with self.assertRaisesRegex(ValueError, "koefisien"):
    CupRing(((("1", 0), ("x", 2), ("u", 4)), (("x", "x", True, "u")),)).validate()
with self.assertRaisesRegex(ValueError, "komutatif bergradasi"):
    CupRing(
        ((("1", 0), ("x", 2), ("y", 2), ("u", 4)),
         (("x", "y", 1, "u"),)),
    ).validate()
with self.assertRaisesRegex(ValueError, "tidak asosiatif"):
    CupRing(
        ((("1", 0), ("a", 2), ("b", 2), ("u", 4), ("v", 4), ("w", 6)),
         (
             ("a", "a", 1, "u"),
             ("a", "b", 1, "v"),
             ("b", "a", 1, "v"),
             ("u", "b", 1, "w"),
             ("b", "u", 1, "w"),
         )),
    ).validate()
for malformed in (
    lambda: AbelianGroup(True),
    lambda: AbelianGroup(0, (True,)),
    lambda: free_reduce(), True),
    lambda: CupRing(((("1", 0), ("x", True)), ())).validate(),
):
    with self.assertRaises(ValueError):
        malformed()

base = self.spaces["torus"]
with self.assertRaisesRegex(ValueError, "metadata ruang"):
    SpaceProfile(
        base.slug, base.display_name, base.pi1_signature,
        base.pi1_abelianization, base.generator_count, base.relators,
        base.cells, "", base.ring,
    ).validate()
with self.assertRaisesRegex(ValueError, "banyak generator"):
    SpaceProfile(
        base.slug, base.display_name, base.pi1_signature,
        base.pi1_abelianization, True, base.relators,
        base.cells, base.attaching_code, base.ring,
    ).validate()
with self.assertRaisesRegex(ValueError, "sensus atau banyak sel"):
    SpaceProfile(
        base.slug, base.display_name, base.pi1_signature,
        base.pi1_abelianization, base.generator_count, base.relators,
        ((0, 1), (1, True), (2, 1)), base.attaching_code, base.ring,
    ).validate()
with self.assertRaisesRegex(ValueError, "relator tidak cocok"):
    SpaceProfile(
        base.slug, base.display_name, base.pi1_signature,
        base.pi1_abelianization, base.generator_count, ((1,)),
        base.cells, base.attaching_code, base.ring,
    ).validate()
with self.assertRaisesRegex(ValueError, "abelianisasi pi1"):
    SpaceProfile(
        base.slug, base.display_name, base.pi1_signature,
        AbelianGroup(1), base.generator_count, base.relators,
        base.cells, base.attaching_code, base.ring,
    ).validate()

def test_pair_a_cellular_homology_matches_exactly(self) -> None:
    torus = self.spaces["torus"]
    wedge = self.spaces["wedge_a"]
    self.assertEqual(torus.cells, ((0, 1), (1, 2), (2, 1)))
    self.assertEqual(torus.cells, wedge.cells)
    self.assertEqual(torus.homology(), wedge.homology())
    self.assertEqual(torus.euler_characteristic(), wedge.euler_characteristic())
    self.assertEqual(exponent_sums(torus.relators[0], 2), (0, 0))

def test_pair_a_pi1_and_abelianization_witness(self) -> None:
    commutator = (1, 2, -1, -2)

```

```

self.assertEqual(free_reduce(commutator, 2), commutator)
self.assertEqual(exponent_sums(commutator, 2), (0, 0))
torus = self.spaces["torus"]
wedge = self.spaces["wedge_a"]
self.assertNotEqual(torus.pi1_signature, wedge.pi1_signature)
self.assertEqual(torus.pi1_abelianization, wedge.pi1_abelianization)
self.assertEqual(torus.pi1_abelianization, dict(torus.homology())[1])

def test_pair_a_cup_rings_obey_laws_and_differ(self) -> None:
    torus = self.spaces["torus"]
    wedge = self.spaces["wedge_a"]
    torus.ring.validate()
    wedge.ring.validate()
    self.assertEqual(torus.ring.multiply_basis("alpha", "beta"), {"omega": 1})
    self.assertEqual(torus.ring.multiply_basis("beta", "alpha"), {"omega": -1})
    self.assertEqual(wedge.ring.multiply_basis("alpha", "beta"), {})
    comparison = compare_profiles(torus, wedge)
    self.assertTrue(comparison["homology_equal"])
    self.assertTrue(comparison["additive_cohomology_equal"])
    self.assertFalse(comparison["cup_products_equal"])
    self.assertEqual(comparison["first_separator"], "pi1")

def test_pair_b_only_cup_square_separates_recorded_invariants(self) -> None:
    cp2 = self.spaces["cp2"]
    wedge = self.spaces["wedge_b"]
    comparison = compare_profiles(cp2, wedge)
    self.assertTrue(comparison["pi1_equal"])
    self.assertTrue(comparison["homology_equal"])
    self.assertTrue(comparison["additive_cohomology_equal"])
    self.assertFalse(comparison["cup_products_equal"])
    self.assertEqual(comparison["first_separator"], "produk cup")
    self.assertEqual(cp2.ring.multiply_basis("x", "x"), {"u": 1})
    self.assertEqual(wedge.ring.multiply_basis("x", "x"), {})

def test_cli_matches_frozen_expected_output(self) -> None:
    process = subprocess.run(
        [sys.executable, "-B", str(PROGRAM)],
        cwd=HERE,
        check=True,
        stdout=subprocess.PIPE,
        stderr=subprocess.PIPE,
    )
    self.assertEqual(process.stderr, b"")
    self.assertEqual(process.stdout, EXPECTED.read_bytes())

if __name__ == "__main__":
    unittest.main(verbosity=2)

```

1.8 Keluaran acuan

Berkas kanonis: expected-output-lab04.txt.

D60-LAB04 | sintesis lintas-invarian

Pasangan A: T^2 vs $S^1 \vee S^1 \vee S^2$

pi1: Z^2 vs F_2 ; komutator bebas=(1, 2, -1, -2); jumlah eksponen=(0, 0)

homologi: sama ($H_0=Z$, $H_1=Z^2$, $H_2=Z$); $\chi=0$

cup: torus alpha cup beta=omega, beta cup alpha=-omega; baji=0

pemisah pertama: pi1

Pasangan B: CP^2 vs $S^2 \vee S^4$

pi1: 1 vs 1; homologi sama ($H_0=Z$, $H_2=Z$, $H_4=Z$)

pelekatan sel-4: Hopf eta vs konstan; x cup x: u vs 0

pemisah pertama: produk cup

Audit: H_1 adalah abelianisasi pi1; diferensial seluler tidak menyimpan seluruh peta pelekatan.

Audit: kesamaan daftar invarian bukan bukti ekuivalensi homotopi umum.

1.9 Interpretasi matematis

Pasangan A menunjukkan dua kehilangan informasi berurutan. Pemetaan $\pi_1 \rightarrow H_1$ mengabeliankan grup, sehingga komutator tidak terlihat. Pemetaan dari gelanggang kohomologi ke grup kohomologi bergradasi melupakan perkalian, sehingga kelas orientasi torus tidak lagi dikenali sebagai produk dua

kelas derajat satu. Pasangan B lebih tajam: bahkan π_1 , homologi, dan kohomologi aditif serentak tidak membedakan ruang, tetapi kuadrat cup membedakannya.

Keluaran “pemisah pertama” bergantung pada urutan audit yang dinyatakan: π_1 , lalu homologi, lalu kohomologi aditif, lalu produk cup. Ini bukan urutan kekuatan total bagi semua invarian. Sebuah perbedaan pada invarian mana pun membuktikan tidak adanya ekuivalensi homotopi; kesamaan daftar terbatas hanya berarti daftar itu belum menemukan perbedaan.

2 Solusi lengkap

2.1 Eksekusi dan kontrak keluaran

Jalankan dari akar repositori:

```
python -B source/id-ID/labs/test_o012_d60_lab04_cross_invariants.py
python -B source/id-ID/labs/o012_d60_lab04_cross_invariants.py
```

Perintah pertama menulis laporan unittest pada aliran galat dan harus berakhir dengan `Ran 6 tests` serta `OK`; aliran keluarannya kosong. Perintah kedua menulis UTF-8 dengan LF ke aliran keluar, tanpa aliran galat. Uji keenam membandingkan byte itu dengan keluaran acuan. Program memvalidasi basis, derajat produk, unit, asosiativitas, komutativitas bergradasi, sensus sel, kesesuaian H_1 dengan abelianisasi, dan urutan laporan.

2.2 Kompleks seluler dan homologi Pasangan A

Jumlah eksponen a dalam $aba^{-1}b^{-1}$ ialah $1 - 1 = 0$, dan jumlah eksponen b juga nol. Jadi sel-2 torus mempunyai kolom batas $(0, 0)^T$. Pada Y , peta pelekatan sel-2 konstan, sehingga kolomnya juga nol. Kedua sel-1 berawal dan berakhir pada simpul yang sama, maka $d_1 = 0$. Dengan demikian kedua kompleks rantai sama:

$$0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \rightarrow 0.$$

Akibatnya

$$H_0 \cong \mathbb{Z}, \quad H_1 \cong \mathbb{Z}^2, \quad H_2 \cong \mathbb{Z},$$

dan $\chi = 1 - 2 + 1 = 0$. Kesamaan ini tidak menyatakan bahwa peta pelekatan torus konstan: diferensial hanya menyimpan dua jumlah eksponen.

2.3 Grup fundamental dan produk cup Pasangan A

Tidak ada dua huruf bertetangga yang saling invers dalam $aba^{-1}b^{-1}$, sehingga reduksi bebas tidak menghapus apa pun. Kata itu bukan unsur identitas F_2 . Dalam grup torus, kata yang sama justru relator dan karenanya identitas. Lebih struktural, $\mathbb{Z}^2$ abelian sedangkan F_2 tidak, jadi keduanya tidak isomorfik.

Setelah abelianisasi, urutan huruf boleh dipertukarkan dan kata komutator menjadi $a + b - a - b = 0$. Karena itu kedua abelianisasi ialah $\mathbb{Z}^2$, sesuai H_1 . Pada torus, orientasi memberi $\alpha \smile \beta = \omega$; komutativitas bergradasi memberi

$$\beta \smile \alpha = (-1)^{1 \cdot 1} \alpha \smile \beta = -\omega.$$

Kuadrat kedua generator derajat satu nol. Pada baji, semua produk kelas-kelas berderajat positif adalah nol. Dalam urutan audit program, π_1 adalah pemisah pertama; produk cup memberikan pemisah kedua yang independen.

2.4 Peta Hopf dan kuadrat cup Pasangan B

Kedua ruang tidak mempunyai sel-1, sehingga terhubung sederhana. Kompleks rantainya mempunyai $\mathbb{Z}$ pada dimensi 0, 2, 4 dan nol di dimensi lain; semua diferensial terpaksa nol. Maka homologi dan kohomologi aditifnya masing-masing $\mathbb{Z}$ pada derajat 0, 2, 4.

Perbedaan terletak pada pelekatan sel-4. Untuk kompleks dua-sel $S^2 \cup_f e^4$, definisi kohomologis invarian Hopf menyatakan bahwa koefisien kuadrat generator derajat dua terhadap generator sel teratas ialah $H(f)$. Peta Hopf memiliki invarian 1 setelah orientasi dipilih, sedangkan peta konstan berinvarian nol. Jadi

$$x^2 = u \neq 0 \quad \text{pada } \mathbb{CP}^2, \quad x^2 = 0 \quad \text{pada } S^2 \vee S^4.$$

Karena pemetaan yang menginduksi isomorfisma gelanggang kohomologi harus mempertahankan kuadrat, tidak mungkin ada ekuivalensi homotopi antara kedua ruang itu.

2.5 Audit kesimpulan negatif

Pasangan A menolak implikasi pertama: H_1 keduanya $\mathbb{Z}^2$, tetapi π_1 masing-masing $\mathbb{Z}^2$ dan F_2 . Kedua pasangan menolak implikasi kedua karena homologi sama sedangkan produk cup atau grup fundamental membedakan tipe homotopinya. Pasangan B menolak implikasi ketiga: $d_4 = 0$ baik untuk peta Hopf maupun peta konstan, sebab $C_3 = 0$, tetapi peta Hopf tidak trivial. Kedua pasangan menolak implikasi keempat karena grup kohomologi bergradasi sama dan tabel perkaliannya berbeda.

Program hanya membandingkan deskriptor yang telah dibuktikan bagi empat model. Jika semua deskriptor dua ruang lain kebetulan sama, hasil yang sah hanyalah “belum terbedakan oleh pemeriksaan ini.” Masalah kata grup yang dipresentasikan hingga dan klasifikasi tipe homotopi tidak diganti oleh tabel kasus beku ini.

2.6 Pemeriksaan reproduktibilitas

Enam uji harus memeriksa:

1. validitas empat model dan penolakan tabel produk yang salah derajat atau mempunyai basis ganda;
2. sensus sel, homologi, vektor jumlah eksponen, dan karakteristik Euler Pasangan A;
3. saksi komutator bebas, grup fundamental berbeda, dan abelianisasi sama;
4. hukum gelanggang serta tabel produk cup Pasangan A;
5. kesamaan invarian aditif dan perbedaan kuadrat cup Pasangan B;
6. keluaran CLI yang deterministik dan sama persis dengan keluaran acuan.

Program tidak mengakses jaringan, tidak memakai keacakan atau aritmetika titik-mengambang, dan tidak menerima jawaban dari keluaran acuan sebagai masukan. Semua iterasi yang tampil di keluaran mempunyai urutan kanonis.

2.7 Hak, atribusi, dan provenans

Laboratorium, program, uji, keluaran acuan, susunan perbandingan, petunjuk, interpretasi, dan solusi ini adalah materi asli edisi di bawah CC BY-SA 4.0. Jangkar konseptual yang dipakai ialah Roberts `Notes.tex:2826-3046` untuk baji dan kompleks presentasi, `Notes.tex:5370-5728` untuk korantai dan kohomologi, Fomberg `algebraic_topology.tex:610-613` untuk abelianisasi, `algebraic_topology.tex:3448-3516` untuk struktur CW pada ruang projektif kompleks, serta Laboratorium 3 untuk konvensi produk cup dan kelas fundamental. Pernyataan tentang invarian Hopf dan kedua tabel produk disusun mandiri untuk menutup kebutuhan sintesis; tidak ada ekspresi bank masalah Fomberg yang dikecualikan atau sumber tak berlisensi yang disalin.

Produksi dilakukan dengan **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra** atas arahan pengguna. Kredit, lisensi, dan hubungan sumber David Michael Roberts serta Yeheli Fomberg tetap dibedakan. Edisi independen ini tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan penulis sumber maupun institusi mana pun.