Alexander Grothendieck

Les Dérivateurs

Texte diplomatique

Français

Édition de M. Künzer, J. Malgoire et G. Maltsiniotis

12 novembre 2026

Crédits. Auteur : Alexander Grothendieck, *Les Dérivateurs* (1990–1991). L'édition transcrite est celle de M. Künzer, J. Malgoire et G. Maltsiniotis (Universités de Montpellier II et Paris VII). Le déchiffrement, l'édition et les notes des éditeurs leur appartiennent. Transcription produite par IA (*AI-transcribed*) : Claude Opus 5.5 (Anthropic). Commentaire du compagnon et corrections produits par IA (*AI-produced corrections*) : GPT-6 Astra (OpenAI, ChatGPT Pro mode), vérifiés et intégrés par Claude Opus 5.5 (Anthropic). Huit blocs de commentaire des parties II-a, III-V et XIIb-a, sept paragraphes d'autres blocs, dix-neuf lignes du registre des assertions (II-a, III-V, VII-c, VIII-X, XIIb-a) et trois entrées bibliographiques sont produits par Claude Fable 5.2 (Anthropic) à partir de réponses de GPT-6 Astra qu'il a examinées ; chaque ligne concernée indique réponse et examen. Les corrections des définitions de macros et les modifications des textes vérifiés absentes des tables ont été comparées aux pages de l'édition par Claude Opus 5.5 (`transcription/DECISIONS.md`). Traduction anglaise produite par IA (*AI-translated*) : GPT-6.1 Sol (OpenAI, effort max) ; glossaire de Claude Fable 5.2 et Claude Opus 5.5 ; consigne, contrôles, corrections, comparaison d'intégralité et livre anglais de Claude Opus 5.5 (Anthropic). Réponses de recherche brutes produites par GPT-6 Astra ; examens par Claude Fable 5.2. Le présent assemblage des lecteurs, leur apparat et leur audit sont de GPT-6 Astra (OpenAI, ChatGPT Pro mode).

https://webusers.imj-prg.fr/~georges.maltsiniotis/groth/Derivateurs.html

Droits

Les droits sur l'œuvre originale appartiennent à son auteur, à ses représentants ou à ses ayants droit. Là où nous détenons des droits, sur la transcription, la traduction, les corrections et la composition produites par IA, ils sont dédiés au domaine public sous CC0 1.0. Cette édition est publiée à des fins pédagogiques et non lucratives, et nous ne revendiquons aucun droit que nous ne détenons pas. Si vous détenez des droits sur cette œuvre et vous opposez à sa publication ici, ouvrez une issue sur GitHub et nous la retirerons.

Lecture. Les marques marginales `p. n` donnent les pages de l'édition ; les marques `[page n]` donnent les pages du manuscrit. Les arguments et l'ordre des ancres sont conservés. Les mots entre crochets en caractères de machine à écrire appartiennent aux éditeurs de l'édition transcrite. Les points d'interrogation isolés entre crochets signalent aussi leurs doutes, selon la convention exposée dans leur préface. Les variantes de notre apparat portent un identifiant FRV ou ENV et un lien vers le relevé final ; elles donnent la lecture imprimée, la correction et sa source. Pour identifier sans ambiguïté les symboles et les macros propres à chaque unité, les deux lectures de l'apparat sont citées en code LaTeX exact. Les notes originales ne sont pas réécrites. Les trois formes proviennent d'un seul maître annoté. Les réparations de composition communes aux trois formes sont consignées séparément des variantes textuelles.

Table des matières

Table des matières de l'édition 4
Chapitre I 8
Chapitre II 66
Chapitre III 116
Chapitre IV 123
Chapitre V 129
Chapitre VI 154
Chapitre VII 253
Chapitre VIII 333
Chapitre IX 339
Chapitre X 351
Chapitre XI 354
Chapitre XII, 1–4 360
Chapitre XII, 5 392
Chapitre XII, 6 449
Chapitre XII, appendice 499
Chapitre XIII 510
Chapitre XIV 559
Chapitre XV 567
Chapitre XVI 630
Chapitre XVII 677
Chapitre XVIII 726
Chapitre XIX 893

Les Dérivateurs

p. 1

Alexandre Grothendieck

I. Généralités sur les (pré)dérivateurs. [1]-[126]

1. Préliminaires sur les foncteurs images inverses des préfaisceaux sur des catégories d'indices, et leurs adjoints multiples ..... [1]
2. Préliminaires heuristiques sur les dérivateurs ..... [4]

Morphismes homotopiquement propres, homotopiquement lisses ..... [53]
Notions de $\mathbb{D}$-équivalence et de $\mathbb{D}$-contractibilité ..... [61]
$\mathbb{D}$-fibrations ..... [76]

II. Cofinalité (à droite et à gauche) (préliminaire à la cofinalité cohomologique). [1]-[99]

1. Cofinalité cohomologique ..... [1]
2. Les catégories localement filtrantes sont les catégories localement totalement 0-connexes ..... [11]
3. Retour sur la cofinalité ..... [37]
4. Foncteurs biasphériques ..... [49]
5. Dualité formelle ..... [69]
6. Transporteurs, noyaux, stabiliseurs relatifs à W ..... [83]
7. Morphismes cofiltrants et localement cofiltrants ..... [90]

III. Hom externes dans les dérivateurs. [1]-[12]

1. Relation des dérivateurs avec la catégorie Hot ..... [1]

IV. Diagrammes substantiels. [73]-[83]

Construction de diagrammes substantiels pour un dérivateur ..... [73]

V. Catégories de chemins et localisation. [1]-[52]

1. La catégorie des chemins ..... [1]
2. Calcul d'une catégorie de fractions $X\Sigma^{-1}$ ..... [5]
3. Passage aux catégories de diagrammes ..... [28]

VI. HOT. [1]-[204]

Le dérivateur HOT ..... [1]
Nouvelle version de la théorie de HOT_W ..... [171]

p. 2

VII. Catégories de chemins (2). [1]-[171]

1. Intervalles et leur variantes ..... [1]
2. Sous-catégories pleines d'un intervalle ..... [10]
3. Chemins. Catégorie de chemins d'un type donné τ ..... [13]
4. Catégorie de chemins $\underline{\mathrm{Ch}}(X)$ ..... [24]
5. Propriétés des morphismes d'intervalles ..... [31]
6. Composition dans $\underline{\mathrm{Ty}}$ ..... [48]
7. Explicitation des catégories de fractions $X\Sigma^{-1}$ en termes des $\underline{\mathrm{Ch}}(X; a, b)$ ..... [59]
8. Le lemme d'homotopie pour les morphismes d'intervalles ..... [83]
9. Théorème d'homotopie pour les catégories de chemins ..... [94]
10. Question de comparaison pour les catégories Cat-fibrées satisfaisant au "théorème d'homotopie" (base filtrante) ..... [99]
11. Rapide retour sur les $(\mathcal{M}, \Sigma)$, dans l'optique des dérivateurs ..... [129]

12. Retour sur les 'catégories de chemins' dans Cat, comme catégorie de modèles pour Hot ..... [137]
13. Où on prouve enfin que $\underline{\mathrm{Ch}}(X;-,-)$ est aussi bon (voire meilleur) que $\underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X;-,-)$ ..... [157]

VIII. 1-types d'homotopie relatifs : leur intégration ... [1]-[9]

1. Intégration des 1-types d'homotopie relatifs sur une catégorie ..... [1]
2. Questions de changement de base ..... [6]

IX. Retour sur les catégories $\mathcal{M}W^{-1}$, comparaison avec Quillen. [1]-[25]

1. Fonctorialité de $\mathrm{Ch}^\Sigma_\infty(a,b)$ en a, b dans $\mathcal{M}\Sigma^{-1}$ ..... [1]
2. Comparaison avec Quillen ..... [14]
3. Essai de construction du foncteur Ω ..... [24]

X. Comparaison de Cat avec $\Delta^\wedge$. [1]-[5]

1. Rappel des notions de $\mathbb{D}$-asphéricité, et lien avec le 'localisateur fondamental $W_\mathbb{D}$' [1]

XI. Hot-fibrations, foncteurs propres et foncteurs lisses etc. [127]-[136]

(dans Cat).

1. Hot-fibrations dans Cat ..... [127]

XII. Caractérisation de W_∞. Foncteurs W-propres, W-lisses etc. Sommes amalgamées et carrés W-cocartésiens dans Cat. [1]-[275]

I Caractérisation de W_∞ ..... [1]
II Perplexités sur les axiomes et la terminologie ..... [18]
III Classes remarquables de foncteurs liés à W ..... [22]
IV Sur l'axiome W(4) et ses variantes ..... [53]
V Sommes amalgamées et carrés W-cocartésiens dans Cat ..... [59]

1. Généralités sur $U \overset{i}{\hookrightarrow} X \overset{j}{\hookleftarrow} T$ et les sommes amalgamées ..... [59]
   1.1. Données de recollement entre un ouvert et un fermé ..... [59]
   1.2. Relation avec le recollement des topos ..... [61]
   1.3. Flèches dans Cat, de source ou but un objet recollé (X,U,T) ..... [65] p. 3
   1.4. Construction de sommes amalgamées à partir d'une immersion ouverte où fermée ..... [66]
2. Sommes amalgamées et W-équivalences ..... [75]
   2.1. Axiome du carré cocartésien et axiome du cube (ou 'Lemme des cinq') [75]
   2.2. Application aux carrés cocartésiens déduits d'une immersion ouverte ou fermée ..... [80]
   2.3. Objets totalement W-asphériques de Cat, et morphismes totalement W-asphériques ..... [87]
   2.4. Application aux immersions ouvertes dwyériennes ..... [107]
   2.5. Complément : critère d'asphéricité totale d'une catégorie W-propre sur une autre ..... [115]
3. Sommes amalgamées et intégration ..... [121]
   3.1. Réduction canonique au cas d'un diagramme d'immersions fermées [121]
   3.2. Comparaison de l'intégrale avec une somme amalgamée ordinaire. Carrés W-homotopiquement cocartésiens ..... [128]
   3.3. Intégration propre versus intégration lisse. Énoncé d'équivalence entre les deux points de vue. Commentaires sur le cas des limites W-homotopiques quelconques ..... [133]

3.4. Critères pour les carrés homotopiquement cocartésiens ..... [146]
3.5. Applications aux sommes amalgamées dans une catégorie $X^\wedge$ (avec $X \in \mathrm{Ob\,Cat}$) ..... [158]
VI Critère de W_∞-asphéricité pour les $\Omega^n(X,x)$ ..... [171]
1. Cogitations sur W_n ..... [171]
2. Critère de W_n-asphéricité ..... [187]
3. Sur la philosophie des fibres homotopiques ..... [191]
4. Axiomatisation des 'fibres W-homotopiques' ..... [207]
5. Axiomatique des W-types d'homotopie relatifs non localement constants $\mathrm{Ho}^{\mathcal{C}}_W(S)$ ..... [218]
6. Cofibre W-homotopique dans Cat ..... [227]
7. Retour sur l'axiomatique de la fibre W-homotopique ..... [240]
8. Appendice : Retour sur les axiomes W(7), W(7 bis) (pages 75, 76) ..... [265]

XIII. Catégories de modèles (1). [1]-[98]
1. Couples de Quillen (Φ, Ψ) ..... [1]
2. Catégories de Quillen faibles, et construction d'icelles (Théorème-scholie conjectural) ..... [7]
3. Catégories de Quillen (deuxième mouture) ..... [27]
4. Les variances u^*, u_*, $u_!$ pour $(\mathcal{M}(I), W(I))$ (I variable) ..... [44]
5. Catégories de modèles quillénisables ..... [50]
6. Catégories de modèles quillénisables, et foncteurs $u_!$, u_* ..... [57]
7. Filtrations cardinales et parties accessibles d'une grosse catégorie ..... [77]

p. 4

XIV. Carrés h-cartésiens et h-cocartésiens. [1]-[8]
1. Axiomes de structures quadrangulées (une tentative avortée) ..... [1]
2. Exemples ..... [7]

XV. Théorèmes de factorisation. (Modèles (2)). [1]-[137]
1. Construction fondamentale : la suite transfinie de factorisation d'une flèche f . [1]
2. Variation des factorisations $f = p_\alpha i_\alpha$ avec la partie C_0 génératrice ..... [12]
3. Majoration des cardinaux ..... [16]
4. Compléments sur les structures de Quillen ..... [28]
5. Résultats téchniques préliminaires sur les parties accessibles de $\mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$, stables par limites inductives filtrantes ..... [43]
6. Essai avorté pour un critère d'engendrement des parties L-accessibles de $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ [73]
7. Construction de triples de Quillen clos avec $C = \mathrm{Mon} \subset \mathrm{Cof}_W$ ..... [84]
8. Application aux catégories de modèles $(\widehat{A}, W_A)$ ..... [100]
9. Révision des notations, pour les axiomes d'un localiseur fondamental ..... [116]
10. Application au dérivateur HOT_W ..... [134]

XVI. Localiseurs fondamentaux dans Cat. [1]-[124]
1. Axiomes Loc (1) à Loc (3) (et variantes) : localiseurs fondamentaux ..... [1]
2. Axiomes Loc (4) et Loc (5) (des sommes directes, de connexité) ..... [8]
3. Axiome Loc (6) du carré cocartésien ..... [16′]
4. Axiome Loc (7) des W-fibrations ..... [27]
5. Axiome des limites Loc (8), et l'axiome Loc (9) d'accessibilité ..... [71]
6. La condition Loc $(5, \mathbb{D}_{W_\omega})$ implique $W \subset \mathrm{W}_\infty$ ..... [83]
7. Commentaires sur les axiomes ..... [97]

XVII. Catégories à fibrations et à cofibrations. (Modèles (3)). [1]-[118]

1. Préliminaires . . . . . [1]
2. Description de $C_I \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M}(I^\circ))$, pour I ensemble ordonné . . . . . [25]
3. Catégories de modèles à cofibrations . . . . . [39]
4. Catégories à cofibrations spéciales . . . . . [71]
5. Relation des catégories à cofibrations spéciales avec les catégories de Quillen spéciales . . . . . [84]
6. Application à la construction des dérivateurs (associés aux triples de Quillen spéciaux) . . . . . [98]

XVIII. Catégories et ensembles accessibles. [50]-[492]

4. Paratopos et l'opération $\mathcal{M} \boxtimes \mathcal{N}$ . . . . . [50]
4.1. Pseudo-topos. Problème du produit . . . . . [50]
4.2. Cafouillages sur $\mathcal{M} \boxtimes \mathcal{N}$ . . . . . [57]
4.3. L'opération $\mathcal{M} \boxtimes \mathcal{N}$ et l'axiome d'accessibilité . . . . . [64]
4.4. Étude de $\mathrm{Ind}_\pi(C)$ (pour C petite catégorie stable par $\varinjlim$ de cardinal $\leq \pi$) [79]
4.5. Filtration cardinale canonique d'une catégorie $\mathcal{U}$-paratopos . . . . . [106] p. 5
4.6. Caractérisation des catégories paratopos (démonstration de 4.3.6) . . . . . [139]
4.7. $\mathrm{Ind}_\pi C$ (C quelconque) et filtrations cardinales généralisées . . . . . [161]
4.8. Catégories $\mathcal{U}$-accessibles . . . . . [187]
4.9. Le théorème de représentation indicielle pour $\mathrm{Ind}_\pi(C)$ . . . . . [217]
4.10. Le théorème de représentation indicielle : démonstration . . . . . [243]
4.11. Application à l'existence des limites dans une catégorie de la forme $\mathrm{Ind}_{\pi_0}(C)$ [267]
4.12. Foncteurs accessibles entre catégories accessibles . . . . . [273]
4.13. Ensembles accessibles d'objets d'une catégorie accessible . . . . . [281]
4.14. Critères d'accessibilité pour grosses catégories . . . . . [370]
4.15. Catégorie accessible sur une autre . . . . . [425]
4.16. Exemples et questions . . . . . [464]
4.17. Retour sur les paratopos, et sur les opérations $\mathcal{M} \boxtimes \mathcal{N}$, $\underline{\mathrm{Hom}}_!(\mathcal{M}, \mathcal{N})$ . . [492]

Appendice. [1]-[19]

Ultraproduits de corps, et catégories accessibles . . . . . [1]
Application à un exemple d'une sous-catégorie non accessible . . . . . [11]

XIX. Modèles (4). [1]-[50]

1. Rappels sur les couples de Quillen (couples de Quillen spéciaux) . . . . . [1]
2. Rappels sur les triples de Quillen clos et les triples de Quillen spéciaux . . . . . [13]
3. Cas des catégories à cofibrations, des catégories à fibrations . . . . . [33]

Note des éditeurs de l'édition transcrite.

NOTE. Dans cette table de matières, ainsi que dans l'édition électronique provisoire des "Dérivateurs", on suit le découpage de l'ouvrage effectué a posteriori par Grothendieck. Les numéros des pages sont ceux de l'original, indiquées entre crochets dans le texte numérisé. Le chapitre XI, qui commence à la page 127, était à l'origine la dernière section du chapitre I, qui se termine à la page 126. De même, le chapitre XVIII était la section 4 du chapitre XIX.

p. –

LES DÉRIVATEURS

ALEXANDRE GROTHENDIECK

Chapitre I

Généralités sur les (pré)dérivateurs

p. –

Note des éditeurs de l'édition transcrite.

Ce texte a été déchiffré et transcrit en $\mathcal{A}_{\mathcal{M}}\mathcal{S}$-TEX par G. Maltsiniotis. Il a été édité par M. Künzer, J. Malgoire, et G. Maltsiniotis. La transcription est aussi fidèle que possible au manuscrit. Pour les quelques corrections évidentes, ou les rares commentaires des éditeurs, ainsi que pour la numérotation originale des pages du manuscrit, les caractères de machine à écrire `[typewriter]` entre crochets sont utilisés. Un point d'interrogation entre crochets signifie que l'on n'est pas sûr du mot qui précède.

Cette édition est provisoire. Les remarques, commentaires et corrections sont bienvenus. Envoyer un message à :

[e-mail address removed]

G. Maltsiniotis

p. 1
[page 1]

Dérivateurs

1. Préliminaires sur les foncteurs images inverses des préfaisceaux sur des catégories d'indices, et leurs adjoints multiples.

A "catégorie de coefficients",
I "catégorie d'indices",
$A(I) = \underline{\mathsf{Hom}}(I^\circ, A)$ préfaisceaux sur I à valeurs dans A.

Si $f : I \to J$, on en déduit :

$$f^* : A(J) \to A(I) \quad ,$$


et on s'intéresse à l'existence des foncteurs adjoints successifs à gauche et à droite. Notation provisoire :

$$f^? \; f_! \; f^* \; f_* \; f^! \quad .$$


Voici les faits principaux :

a) Sous réserve de l'existence des $\varprojlim$ (resp. $\varinjlim$) pertinentes, f_* (resp. $f_!$) existe. Par exemple s'il existe `[des]` $\varprojlim$ (resp. $\varinjlim$) *finies*, alors f_* (resp. $f_!$) existe si I, J sont des catégories finies.

b) Même si A est une catégorie abélienne, avec $\varprojlim$ et $\varinjlim$ (par exemple Ab), les *biadjoints* n'existent pas toujours. Par exemple, dans le cas particulier où $J = e$ est la catégorie ponctuelle, et I l'ensemble ordonné



(dans le cas de $f^!$), ou l'ensemble ordonné opposé (dans le cas de $f^?$). Même si f est une immersion ouverte, $f^!$ n'existe pas forcément (par exemple elle n'existe pas si I est comme [ci-]dessus, et



et si f est une immersion fermée, $f^?$ n'existe pas forcément.

c) Si f est une *immersion fermée*, et A est *ponctuée* (*i.e.* admet un objet à la fois initial et final), alors $f^!$ existe. Si f est une immersion ouverte, $f^?$ existe. (Toujours sous réserve de l'existence dans A des limites pertinentes). Si f est une immersion, f_* et $f_!$ [sont] pleinement fidèles *i.e.* f^* [est] un foncteur de localisation. p. 2

d) Supposons seulement l'existence de l'objet final e dans A (plus au besoin certaines $\varprojlim$ finies). Si

[page 2]


$$i : Y \hookrightarrow S$$

est une immersion fermée, de complémentaire U

$$Y \overset{i}{\hookrightarrow} S \overset{j}{\hookleftarrow} U$$

de sorte que j soit une immersion ouverte, alors $A(Y)$ s'identifie par le foncteur i_* à la sous-catégorie pleine de $A(S)$ formée des $F \in \mathsf{Ob}\ A(S)$ tels que $F|U \simeq e_U$ (préfaisceau final). De même, si l'objet initial $\emptyset$ existe dans A, et les $\varinjlim$ pertinentes, alors $A(U)$ s'identifie par $j_!$ à la sous-catégorie pleine de $A(S)$ formée des F tels que $F|Y = \emptyset_Y$ (préfaisceau initial, prenant partout la valeur $\emptyset$).

Si A est même *ponctuée* ($e = \emptyset$), alors on a, pour tout $F \in \mathsf{Ob}\ A(S)$, un carré à la fois cartésien et cocartésien, fonctoriel en F




. (1)

Dans le cas A abélienne, ce diagramme prend la forme d'une suite exacte

$$0 \longrightarrow j_!j^*F \longrightarrow F \longrightarrow i_*i^*F \longrightarrow 0 \quad .$$

e) Mêmes conditions pour i et j. On suppose que A a les $\varprojlim$ pertinentes, dont objet final. On a alors un carré cartésien fonctoriel en $F \in \mathsf{Ob}\ A(S)$ [il faut supposer la catégorie A ponctuée]



(2)

p. 3

[page 3]

i.e. $i^!F$ s'identifie par le foncteur pleinement fidèle i_* au *noyau* de $F \to j_*j^*F$. Dans le cas abélien, cela prend la forme d'une suite exacte

$$0 \longrightarrow i_*i^!F \longrightarrow F \longrightarrow j_*j^*F \quad .$$

Je me dispense d'écrire le carré cocartésien dual, quand A a les $\varinjlim$ pertinentes, y compris objet initial. Il semble qu'elle n'ait pas servi en pratique. Les foncteurs adjoints et biadjoints classiquement utiles sont inclus ci-dessous (où les "pas utiles" sont entre crochets)

$$[i_!]\ i^*\ i_*\ i^!$$
$$[j^?]\ j_!\ j^*\ j_*$$

i.e. les foncteurs $i_!$ et $j^?$ n'ont pas servi classiquement.

f) Cas des catégories $\mathbf{\Delta}_i$ (simplexes type, $i \in \mathbb{N}$), et des foncteurs entre ceux-ci (applications semi-simpliciales). Il semblerait que pour une telle f, si A est ponctuée, il y ait les *bi-adjoints* à la fois à gauche et à droite. De plus, pour $\mathbf{\Delta}_i$ et $\mathbf{\Delta}_j$ fixés quand on regarde toutes les $f : \mathbf{\Delta}_i \to \mathbf{\Delta}_j$ et toutes les $g : \mathbf{\Delta}_j \to \mathbf{\Delta}_i$, que les suites totales de foncteurs multi-adjoints pour chacun des f^*, g^* correspondants sont toutes les mêmes `[ce n'est pas vrai]`. Ça a l'air vrai du moins si $j = i+1$ (et je l'ai vérifié pour $i = 0$, $i = 1$), on doit trouver une "suite d'adjonctions" de longueur $2i+7 = (i+1)+(i+2)+2+2$. De façon précise, la suite comporte quatre termes "extrêmes" (les deux premiers, les deux derniers) et les $(i+1)+(i+2)$ termes intermédiaires correspondant aux foncteurs de la forme f^* ou g^*, où $f : \mathbf{\Delta}_{i+1} \to \mathbf{\Delta}_i$ est une des $(i+1)$ applications de dégénérescence, et $g : \mathbf{\Delta}_i \to \mathbf{\Delta}_{i+1}$ une des $i+2$ applications bord `[ce n'est pas tout à fait vrai; il faut se limiter aux applications qui sont injectives ou surjectives]`.

p. 4
[page 4]

2. Préliminaires heuristiques sur les dérivateurs.

On se donne une sous-catégorie pleine Dia (comme "diagrammes") de $\mathcal{C}at$. Ça peut être tout $\mathcal{C}at$, ou plus petit. Mais on supposera le plus souvent que Dia contient au moins les "catégories ordonnées" (correspondant aux ensembles ordonnés, *i.e.* telles que *a*) tout morphisme est un mono et *b*) tout iso est une identité `[ce n'est pas vrai : la catégorie réduite à une double flèche satisfait à ces conditions, mais n'est pas un ensemble ordonné]`). Par abus de langage, on identifie un ensemble ordonné avec la catégorie correspondante (et une catégorie au topos qu'elle définit ?). On considère Dia comme une 2-*catégorie.* [1]

Un *dérivateur* $\mathbb{D}$ (sur Dia, comme "*domaine*" du dérivateur) est un 2-foncteur contravariant de Dia dans $\mathcal{C}at$, satisfaisant certaines conditions. Donc

$$\mathbb{D} : \mathsf{Dia}^\circ \longrightarrow \mathcal{C}at \quad .$$

Si $I \in \mathsf{Ob}_0\mathsf{Dia}$ est une catégorie (ou un "type de diagramme") du domaine de $\mathbb{D}$, on doit donc avoir une catégorie $\mathbb{D}(I)$. Les objets de $\mathbb{D}(I)$ s'appelleront les *objets-coefficients* (ou *coefficients*) de type $\mathbb{D}$, au dessus de I. Pour

$$f : I \longrightarrow J$$

une 1-flèche de Dia, on doit avoir un foncteur

$$f^*_{\mathbb{D}} \text{ ou } f^* : \mathbb{D}(J) \longrightarrow \mathbb{D}(I) \quad ,$$

1. N.B. Il faut des conditions de stabilité pour Dia, au moins la stabilité par $I \times J$ et $I \amalg J$, en fait, nettement plus …

dit *"foncteur image inverse"*. Si F est un coefficient de type $\mathbb{D}$ sur J son "*image inverse*" est donc un coefficient de type $\mathbb{D}$ sur I. On suppose (pour simplifier !) que le 2-foncteur $\mathbb{D}$ est *strict*, donc qu'on a transitivité stricte

$$(gf)^* = f^* g^* \ , \qquad \text{si} \qquad I \xrightarrow{f} J \xrightarrow{g} K \qquad \text{dans } \mathsf{Dia} \ .$$

De plus, si on a deux foncteurs $f, g : I \rightrightarrows J$, et un morphisme entre eux [page 5]

$$I \ \underset{g}{\overset{f}{\underset{\downarrow u}{\rightrightarrows}}} \ J \quad ,$$

on se donne un morphisme $u^*_{\mathbb{D}}$ ou u^* entre les foncteurs g^* et f^*, d'où

$$\mathbb{D}(I) \ \underset{g^*}{\overset{f^*}{\underset{\uparrow u^*}{\leftrightarrows}}} \ \mathbb{D}(J) \quad .$$

On doit encore avoir transitivité pour une composition de morphismes de foncteurs : p. 5

$$I \ \underset{h}{\overset{f}{\underset{g \downarrow v}{\underset{\downarrow u}{\rightrightarrows}}}} \ J$$

doit donner

$$(vu)^* = u^* v^*$$

donc

$$\mathbb{D}(I) \ \underset{h^*}{\overset{f^*}{\underset{g^* \uparrow v^*}{\underset{\uparrow u^*}{\leftrightarrows}}}} \ \mathbb{D}(J) \quad .$$

De plus, si f est une identité, f^* aussi

$$(\mathsf{id}_I)^* = \mathsf{id}_{\mathbb{D}(I)} \quad ,$$

et de même si u est une identité

$$(\mathsf{id}_f)^* = \mathsf{id}_{f^*} \quad .$$

J'indique tout de suite l'axiome le plus important sur un dérivateur (au-delà de la donnée d'un 2-contra foncteur strict) : [page 6]

Der$_1$: Si $f : I \to J$ dans Dia, alors $f^*_{\mathbb{D}} = f^* : \mathbb{D}(J) \to \mathbb{D}(I)$ a un adjoint à droite et un adjoint à gauche.

Ces foncteurs seront notés (du moins provisoirement) $f^{\mathbb{D}}_*$ ou f_* , et $f^{\mathbb{D}}_!$ ou $f_!$, soit

$$f_! \, , \ f_* : \mathbb{D}(I) \rightrightarrows \mathbb{D}(J) \quad ,$$

de sorte qu'on trouve une suite de *trois* foncteurs adjoints entre $\mathbb{D}(I)$ et $\mathbb{D}(J)$

$$f_! \, , \ f^* , \ f_* \quad .$$

N.B. Pour la plupart des développements on n'aura pas besoin de l'existence à la fois des $f_!$ et des f_* . Un *dérivateur à gauche* ne suppose que les f_* (adjoints à droite des f^*), et l'existence de $f_!$ seulement quand f est une *immersion ouverte*. Dualement, un [page 7]
dérivateur à droite ne suppose que les $f_!$ (adjoints à gauche des f^*), et f_* seulement si f p. 6

est une *immersion fermée*. Ce sont sans doute les dérivateurs à gauche qui sont les plus importants.

Der$_2$: Si $f : I \to J$ est dans Dia, si c'est une immersion *fermée*, le biadjoint à droite $f^!_{\mathbb{D}}$ ou $f^!$ de f^* existe. Si c'est une immersion ouverte, le biadjoint à gauche $f^?$ existe. [2] Dans les deux cas, on veut que f^* soit un foncteur de localisation, ce qui équivaut à dire que f_* est pleinement fidèle, ou que $f_!$ est pleinement fidèle. [3]

N.B. Dans le cas d'un dérivateur à gauche, on suppose seulement l'existence de $f^!$ si f est une immersion fermée. Donc pour résumer, pour un tel dérivateur, on suppose l'existence de

$$\begin{cases} f_* \text{ quel que soit } f : I \to J \text{ dans Dia} \\ f_! \text{ si } f \text{ est une immersion ouverte} \\ f^! \text{ si } f \text{ est une immersion fermée (cas ponctué seulement).} \end{cases}$$


Dualement, pour un dérivateur à droite, on suppose l'existence de

$$\begin{cases} f_! \text{ quel que soit } f : I \to J \text{ dans Dia} \\ f_* \text{ si } f \text{ est une immersion fermée} \\ f^? \text{ si } f \text{ est une immersion ouverte (cas ponctué seulement).} \end{cases}$$

Je voudrais formuler des axiomes astucieux, pour le cas d'un couple

$$Y \overset{i}{\hookrightarrow} I \overset{j}{\hookleftarrow} U$$

d'une immersion ouverte j et d'une immersion fermée i dans Dia, complémentaires l'une de l'autre. D'abord une formulation si on suppose $\mathbb{D}$ "*ponctué*", *i.e.* les catégories $\mathbb{D}(I)$ ponctuées, et les foncteurs f^* compatibles avec les ponctuations. On veut "interpréter" le carré (1) page 2 :



, (1)


[page 8]

Der$'_2$: Pour tous $I, J \in$ Dia, on a

$$\mathbb{D}(I \amalg J) \xrightarrow[(\alpha^*,\beta^*)]{\sim} \mathbb{D}(I) \times \mathbb{D}(J) \quad ,$$

où α, β sont les injections canoniques de I et J dans $I \amalg J$.

carré à la fois cartésien et cocartésien. On cherche donc un carré dans $\mathbb{D}(I)$, mais mieux que ça. Soit $J = \mathbf{\Delta}_1 \times \mathbf{\Delta}_1$ le carré standard



p. 7

2. Il n'y a lieu d'exiger les biadjoints que pour un dérivateur ponctué. HOT n'y satisfait pas.

3. Il faut de plus caractériser l'image de f_* si f est une immersion fermée (les F tels que $g^*F \xrightarrow{\sim} e_{\mathbb{D}(U)}$) et celle de $f_!$ si c'est une immersion ouverte (les F tels que $g^*F \simeq \emptyset_{\mathbb{D}(Y)}$), où g est l'immersion complémentaire.

et considérons la catégorie $I \times J$. On a

$$J \longrightarrow \underline{\mathsf{Hom}}(I, I \times J)$$
$$j \longmapsto (i \longmapsto (i, j))$$

D'autre part, par $\mathbb{D}$

$$\underline{\mathsf{Hom}}(I, I \times J)^\circ \longrightarrow \underline{\mathsf{Hom}}(\mathbb{D}(I \times J), \mathbb{D}(I))$$

d'où un composé

$$J^\circ \longrightarrow \underline{\mathsf{Hom}}(\mathbb{D}(I \times J), \mathbb{D}(I))$$

ou encore

$$\mathbb{D}(I \times J) \longrightarrow \underline{\mathsf{Hom}}(J^\circ, \mathbb{D}(I)) \quad .$$

Ceci vaut pour tout $J \in \mathsf{Ob}\,\mathsf{Dia}$. On peut donc dire que la donnée d'un "coefficient" Φ sur une catégorie produit $I \times J$ donne naissance à un diagramme de type J° dans la catégorie $\mathbb{D}(I)$ des coefficients sur I. La philosophie des dérivateurs consiste en grande partie, inversement, chaque fois qu'on a un diagramme dans une catégorie de coefficients $\mathbb{D}(I)$ (sur un diagramme I), disons diagramme de type $K : K \to \mathbb{D}(I)$, de se demander s'il ne provient pas "canoniquement" d'un objet de $\mathbb{D}(I \times K^\circ)$ *i.e.* d'un coefficient sur $I \times K^\circ$. [page 9]

Ainsi pour le carré p. 8. On voudrait qu'il provienne de $\mathbb{D}(I \times J)$, où $J = \mathbf{\Delta}_1 \times \mathbf{\Delta}_1$, et ceci fonctoriellement, donc on désire un foncteur "canonique"

$$\mathbb{D}(I) \longrightarrow \mathbb{D}(I \times \mathbf{\Delta}_1 \times \mathbf{\Delta}_1)$$

qui en composant avec

$$\mathbb{D}(I \times \mathbf{\Delta}_1 \times \mathbf{\Delta}_1) \longrightarrow \underline{\mathsf{Hom}}((\mathbf{\Delta}_1 \times \mathbf{\Delta}_1)^\circ, \mathbb{D}(I))$$

donne le foncteur décrit par le carré (1). De plus, il faut exprimer dans le contexte présent la condition "bicartésienne" du carré (1), dans le contexte de la page 7. Question analogue pour le carré (2) de la page 2 : p. 8

$$\begin{array}{ccccc} & & F & & \\ & \nearrow & & \searrow & \\ i_* i^! F & & & & j_* j^* F \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & e & & \end{array} \quad , \tag{2}$$

où il faut de plus interpréter la condition cartésienne. On va définir en fait un coefficient sur la sous-catégorie ouverte W suivante de $\mathbf{\Delta}_1 \times \mathbf{\Delta}_1$

$$\begin{array}{ccc} (1,0) & & \\ & \nwarrow & \\ & & (0,0) \\ & \swarrow & \\ (0,1) & & \end{array} \quad ,$$

plus exactement sur $W \times I$, et si α

$$\alpha : W \times I \longrightarrow \mathbf{\Delta}_1 \times \mathbf{\Delta}_1 \times I$$ [page 10]

est l'inclusion canonique, on définira le carré "cartésien" comme l'image par α_* de ce coefficient. Ceci nous ramène donc au problème de "globaliser" d'abord le diagramme partiel

$$\begin{array}{ccc} F & & \\ & \searrow & \\ & & j_*j^*F \\ & \nearrow & \\ e & & \end{array} \quad .$$

Et de même pour le carré (1) sauf qu'on est embarrassé si on choisit de le regarder surtout comme cartésien (ce qui suggère à procéder comme tantôt) ou comme cocartésien (ce qui suggère de procéder de façon duale). Mais les deux coefficients qu'on trouvera par ces deux procédés, produits soit de p. 9

$$\begin{array}{ccc} F & & \\ & \searrow & \\ & & i_*i^*F \\ & \nearrow & \\ e & & \end{array} \quad ,$$

soit de

$$\begin{array}{ccc} & & F \\ & \nearrow & \\ j_!j^*F & & \\ & \searrow & \\ & & e \end{array} \quad ,$$

devraient être *canoniquement* isomorphes.
Si $\mathbb{D}$ est un dérivateur, la catégorie [page 11]

$$\mathcal{A} = A_{\mathbb{D}} = \mathbb{D}(e)$$

joue un rôle important. On l'appelle la *catégorie de base,* ou *la catégorie fondamentale*, du dérivateur, ces objets sont les *coefficients fondamentaux.* Pour I quelconque dans Dia, on a donc pour $F \in \mathbb{D}(I)$, coefficient sur I

$$I^\circ \longrightarrow \mathcal{A} \quad , \qquad i \longmapsto F_i$$

un diagramme de type I° dans $\mathcal{A}$, fonctoriellement, *i.e.*

$$\mathbb{D}(I) \longrightarrow \underline{\mathsf{Hom}}(I^\circ, \underset{\mathbb{D}(e)}{\mathcal{A}})$$

(*cf.* page 8).
Der$_3$: Pour tout $I \in \mathsf{Dia}$, ce foncteur est *conservatif,*[4] *i.e.* pour que

$$F \longrightarrow G$$

dans $\mathbb{D}(I)$ soit [un] isomorphisme, il faut et il suffit que pour tout $i \in I$, p. 10

4. N.B. Mais ce foncteur n'a aucune envie d'être *fidèle.*

$$F_i \longrightarrow G_i$$

le soit.

Corollaire. *Le foncteur canonique (pour I, $J \in \mathsf{Dia}$)*

$$\mathbb{D}(I \times J) \xrightarrow{\theta} \underline{\mathsf{Hom}}(J^\circ, \mathbb{D}(I))$$

est conservatif.

En effet, si F est dans $\mathbb{D}(I \times J)$, on a pour $(i,j) \in I \times J$

$$F_{i,j} \simeq \theta(F)(j)_i \quad .$$

Intuitivement, on regarde un dérivateur $\mathbb{D}$ comme "étant" la catégorie fondamentale $\mathcal{A}$, [page 12]
avec une "structure" supplémentaire, [à] savoir la donnée des "extensions" de $\mathcal{A}$ (comme catégorie des coefficients ponctuels) aux diagrammes $I \in \mathsf{Dia}$, de façon contravariante en I. Un coefficient F dans $\mathbb{D}(I) \overset{\text{déf}}{=} \mathcal{A}_I$ est regardé comme "étant" le diagramme $(F_i)_{i \in I}$ correspondant d'objets fondamentaux, avec une donnée supplémentaire de "globalisation". Les F_i, ou "fibres" de F en les $i \in I$, sont les caractéristiques locaux, du coefficient "global sur I" F.

Tous les dérivateurs connus sont obtenus de la façon standard suivante. On part d'une "catégorie de modèles"

$$\mathcal{M} \quad , \quad \Sigma$$

munie d'un ensemble de flèches, appelées "équivalences", et satisfaisant aux axiomes pertinents pour le passage à une catégorie des fractions

$$\mathcal{A} = \mathcal{M}\Sigma^{-1}$$

qui sera la "catégorie fondamentale". On définit pour tout I dans Dia

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_I &= \underline{\mathsf{Hom}}(I^\circ, \mathcal{M}) \\ \Sigma_I &= \{u \in \mathsf{Fl}(\mathcal{M}_I) \mid \forall i \in I, u_i \in \Sigma\} \\ \mathcal{A}_I &= \mathcal{M}_I \Sigma_I^{-1} \end{aligned}$$

Il est clair que $\mathcal{A}_I \overset{\text{déf}}{=} \mathbb{D}_{\mathcal{M},\Sigma}(I)$ dépend de I de façon fonctorielle contravariante, et même [page 13]
de façon 2-fonctorielle.

Bien entendu, pour avoir vraiment un dérivateur, il faut vérifier les axiomes. Le plus fort est l'existence des $f_!$, f_*. Elle est prouvée par Thomason lorsque $(\mathcal{M}, \Sigma)$ provient d'une "catégorie de modèles" au sens de Quillen. Ce n'est pas clair pour moi qu'alors $(\mathcal{M}_I, \Sigma_I)$ provienne également d'une catégorie de modèles (dont par exemple les fibrations et les cofibrations seraient définies à partir de ces données dans $\mathcal{M}$, comme tantôt pour p. 11
les équivalences).

Quand on prend pour $(\mathcal{M}, \Sigma)$ une catégorie de modèles pour Hot (par exemple les ensembles semi-simpliciaux $\mathcal{M} = \underline{\mathsf{Hom}}(\mathbf{\Delta}^\circ, \mathcal{E}ns)$, d'où $\mathcal{M}_I \simeq \underline{\mathsf{Hom}}(\mathbf{\Delta}^\circ \times I^\circ, \mathcal{E}ns) \simeq \underline{\mathsf{Hom}}(\mathbf{\Delta}^\circ, \underbrace{\underline{\mathsf{Hom}}(I^\circ, \mathcal{E}ns)}_{\widehat{I}})$, catégorie des objets semi-simpliciaux dans le topos $\widehat{I}$, on trouve une description d'un dérivateur (non additif), qui jouera un rôle particulièrement important. Je le désigne par

$$\mathsf{HOT} \quad ,$$

sa catégorie des coefficients fondamentaux est Hot, la catégorie homotopique standard.

La notion de "morphisme de Dérivateurs" est claire, c'est un morphisme entre deux [page 14]

2-foncteurs stricts

$$\mathsf{Dia}^\circ \longrightarrow \mathcal{C}at$$

Donc

$$u : \mathbb{D} \longrightarrow \mathbb{D}'$$

est défini par la donnée, pour tout $I \in \mathsf{Dia}$, de

$$u_I : \mathbb{D}(I) \longrightarrow \mathbb{D}'(I)$$

avec commutativité (stricte?) pour $f : I \to J$

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{D}(J) & \xrightarrow{f^*_{\mathbb{D}}} & \mathbb{D}(I) \\ {\scriptstyle u_J}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u_I} \\ \mathbb{D}'(J) & \xrightarrow{f^*_{\mathbb{D}'}} & \mathbb{D}'(I) \end{array} \quad . \tag{1}$$

On a

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathsf{Hom}}(I,J)^\circ & \xrightarrow{\mathbb{D}_{I,J}} & \underline{\mathsf{Hom}}(\mathbb{D}(J),\mathbb{D}(I)) \\ {\scriptstyle \mathbb{D}'_{I,J}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \phi \mapsto u_I \circ \phi} \\ \underline{\mathsf{Hom}}(\mathbb{D}'(J),\mathbb{D}'(I)) & \xrightarrow[\psi \mapsto \psi \circ u_J]{} & \underline{\mathsf{Hom}}(\mathbb{D}(J),\mathbb{D}'(I)) \end{array} \tag{2}$$

et la commutativité de (1) signifie la commutativité de (2) *pour les objets*. Mais bien sûr on la veut aussi pour les flèches, *i.e.* on veut la commutativité du diagramme (2). [5]

Sans doute on veut un peu plus sur les morphismes de dérivateurs - on veut une commutation aux f_* et (?) aux $f_!$ (cette fois seulement à isomorphisme canonique près) ... [6]

Par exemple, considérons le dérivateur

p. 12
[page 15]

$$\mathsf{HOTAB}$$

dont la catégorie fondamentale est Hotab, la sous-catégorie pleine de la catégorie dérivée $\mathsf{Der}(\mathsf{Ab})$ de Ab, formée des complexes à cohomologie nulle en degré > 0. On peut décrire HOTAB par la catégorie de modèles $\underline{\mathsf{Hom}}(\mathbf{\Delta}^\circ, \mathsf{Ab})$ des groupes abéliens semi-simpliciaux, avec comme équivalences les quasi-isomorphismes au sens habituel. Le "foncteur abélianisation" canonique

$$\mathsf{Hot} \longrightarrow \mathsf{Hotab}$$

se prolonge en un morphisme de dérivateurs

$$\mathsf{HOT} \longrightarrow \mathsf{HOTAB} \quad .$$

La question de sa compatibilité aux f_* ne semble pas tautologique. Elle impliquerait, par exemple, que si

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{g} & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ Y & \xleftarrow[j]{} & Y' \end{array}$$

5. Donner l'exemple de morphisme de dérivateurs défini par un foncteur de catégories de modèles $(\mathcal{M}, \Sigma) \to (\mathcal{M}', \Sigma')$.

6. Commutation à f_* (resp. $f_!$) morphisme *exact à gauche* (resp. *exact à droite*). Les morphismes *exacts* sont ceux à la fois exacts à gauche et à droite.

est un diagramme cartésien dans $\mathcal{M} = \underline{\mathsf{Hom}}(\mathbf{\Delta}^\circ, \mathcal{E}ns)$ avec f une fibration (de Thom dans le cadre des espaces topologiques, avec f par exemple fibration localement triviale) alors le diagramme de Hotab

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}\Gamma_!(X) & \longleftarrow & \mathbb{R}\Gamma_!(X') \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbb{R}\Gamma_!(Y) & \longleftarrow & \mathbb{R}\Gamma_!(Y') \end{array}$$

est hot-cartésien [7]. Et de même pour une hot-somme amalgamée (carrée hot-cocartésien dans Hot).
Si c'est vrai, et pas connu de plus, ce serait quand même scandaleux! [page 16]

En procédant comme pour les morphismes de changements de base pour les Rf_*, on trouve en tout cas un morphisme canonique, pour $f : I \to J$

$$u_J f_*^{\mathbb{D}} \longrightarrow f_*^{\mathbb{D}'} u_I$$

et de même p. 13

$$f_!^{\mathbb{D}'} u_I \longrightarrow u_J f_!^{\mathbb{D}} \quad ,$$

et la question est de savoir si c'est des isomorphismes. Questions analogues pour les $f^!$, pour f immersion fermée (ou pour $f^?$, pour f immersion ouverte). Comme la notion de morphisme de dérivateurs devrait quand même "coller" à la notion bien connue de morphisme (triangulé) de catégories triangulées [8], donc être exact en un sens convenable, cela montre bien que l'on doit exiger la commutation d'un morphisme de dérivateurs aux f_* et aux $f_!$. [9] Je devrais demander à Thomason s'il a regardé, pour un morphisme

$$\mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{M}'$$

entre catégories de modèles, qui soit disons *exact à gauche*, et "compatible" avec les équivalences, fibrations (et cofibrations (???)).
NOTATION : DER pour la 2-catégorie des *dérivateurs.*
Dualité. Si $\mathbb{D}$ est un dérivateur, on va définir un dérivateur *dual* $\mathbb{D}^\circ$ par [page 17]

$$\mathbb{D}^\circ(I) \overset{\text{déf}}{=} \mathbb{D}(I^\circ)^\circ \quad .$$

Les coefficients sur I de type $\mathbb{D}^\circ$ sont les coefficient sur la catégorie opposée I° à I de type $\mathbb{D}$, et en tant que catégorie c'est la catégorie *opposée* de celle des coefficients de type $\mathbb{D}$ sur I°. Pour définir la loi 2-fonctorielle, on note que pour I, J dans Dia on a

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathsf{Hom}}(I,J)^\circ & \xrightarrow{\mathbb{D}_{I,J}} & \underline{\mathsf{Hom}}(\mathbb{D}(J),\mathbb{D}(I)) \\ \wr\downarrow \text{dualité} & & \wr\downarrow \text{dualité} \\ \underline{\mathsf{Hom}}(I^\circ,J^\circ) & \xrightarrow{\theta} & \underline{\mathsf{Hom}}(\mathbb{D}(J)^\circ,\mathbb{D}(I)^\circ)^\circ \end{array} \quad ,$$

où θ est l'unique foncteur rendant le diagramme commutatif. Alors θ°est un foncteur

$$\underline{\mathsf{Hom}}(I^\circ,J^\circ)^\circ \longrightarrow \underline{\mathsf{Hom}}(\mathbb{D}(J)^\circ,\mathbb{D}(I)^\circ) \quad ,$$

7. C'est faux déjà si Y est l'espace ponctuel : trivialement le $\mathbb{R}\Gamma_!$ ne transforme pas produits en sommes! Ce foncteur est sûrement [pas] "exact à gauche" (comme morphisme de dérivateurs).

8. Non! Le cas des catégories triangulées est "misleading", car pour celles-ci l'exactitude à gauche et à droite revient au même.

9. N.B. On conçoit qu'un foncteur entre dérivateurs puisse être exact à gauche ou exact à droite ou les deux.

c'est ça par définition $\mathbb{D}^\circ_{I,J}$ [plutôt $\mathbb{D}^\circ_{I^\circ,J^\circ}$].

Si $\mathbb{D}$ est défini par $(\mathcal{M}, \Sigma)$, alors $\mathbb{D}^\circ$ par $(\mathcal{M}^\circ, \Sigma^\circ)$, puisque

$$(\mathcal{M}^\circ)_I \overset{\text{déf}}{=} \underline{\mathsf{Hom}}(I^\circ, \mathcal{M}^\circ) \simeq \underline{\mathsf{Hom}}(I, \mathcal{M})^\circ \simeq (\mathcal{M}_{I^\circ})^\circ$$

et $\Sigma^\circ{}_I$ est déduit de Σ_{I°, d'où p. 14

$$(\mathcal{M}^\circ)_I(\Sigma^\circ{}_I)^{-1} \simeq (\mathcal{M}_{I^\circ}\Sigma_{I^\circ}^{-1})^\circ = \mathbb{D}(I^\circ)^\circ \quad .$$

Philosophie. Chaque fois qu'on a un foncteur [page 18]

$$\mathcal{A} \xrightarrow{u_0} \mathcal{A}'$$

entre deux catégories qui peuvent s'interpréter naturellement comme les catégories fondamentales de deux dérivateurs $\mathbb{D}$, $\mathbb{D}'$, il se pose la question d'interpréter u_0 comme provenant d'un morphisme de dérivateurs

$$\mathbb{D} \xrightarrow{u} \mathbb{D}' \quad .$$

Celui-ci est, en pratique, toujours déterminé canoniquement, à isomorphisme canonique près. (Mais je doute pourtant que le foncteur restriction aux catégories fondamentales

$$\underline{\mathsf{Hom}}(\mathbb{D}, \mathbb{D}') \longrightarrow \underline{\mathsf{Hom}}(\mathcal{A}, \mathcal{A}')$$

soit pleinement fidèle …)

On va appliquer cette philosophie aux foncteurs f^*, $f_!$, f_* (et éventuellement $f^!$, $f^?$), pour $f : I \to J$, donc pour les foncteurs entre $\mathbb{D}(I)$ et $\mathbb{D}(J)$. Cela nous amène donc à regarder $\mathbb{D}(I)$ et $\mathbb{D}(J)$ comme des catégories fondamentales de dérivateurs convenables.

Dérivateur induit par un dérivateur $\mathbb{D}$, sur une catégorie d'indices $I \in \mathsf{Dia}$. C'est un dérivateur $\mathbb{D}_I$ défini par

$$\mathbb{D}_I(J) = \mathbb{D}(I \times J) \quad .$$

Le foncteur associé à $\mathbb{D}_I$, pour deux catégories J, $J' \in \mathsf{Dia}$

[page 19]

$$\underline{\mathsf{Hom}}(J, J')^\circ \xrightarrow{(\mathbb{D}_I)_{J,J'}} \underline{\mathsf{Hom}}(\mathbb{D}_I(J'), \mathbb{D}_I(J)) = \underline{\mathsf{Hom}}(\mathbb{D}(I \times J'), \mathbb{D}(I \times J))$$

est le composé

$$\underline{\mathsf{Hom}}(J, J')^\circ \longrightarrow \underline{\mathsf{Hom}}(I \times J, I \times J')^\circ \xrightarrow{\mathbb{D}_{I\times J, I\times J'}} \underline{\mathsf{Hom}}(\mathbb{D}(I \times J'), \mathbb{D}(I \times J)) \quad ,$$

où la première flèche est le foncteur

$$f \longmapsto \mathsf{id}_I \times f \quad .$$

En d'autres termes, $\mathbb{D}_I$ est le composé

$$\begin{aligned} \mathsf{Dia}^\circ &\longrightarrow \mathsf{Dia}^\circ \xrightarrow{\mathbb{D}} \mathcal{C}at \\ J &\longmapsto I \times J \qquad . \end{aligned}$$

On a

$$f^*_{\mathbb{D}_I} = (\mathsf{id} \times f)^*_{\mathbb{D}} \quad .$$

Si les f_* (resp. les $f_!$) existent pour $\mathbb{D}$, ils existent pour $\mathbb{D}_I$. (De même pour toute espèce de multiadjoints.) Comme $J \mapsto I \times J$ transforme immersion fermée (resp. ouverte) en itou, p. 15 l'axiome $\mathbf{Der}_2$ (plus précisément, chacun de ces ingrédients, *cf.* annotations marginales [page 20]

p. 7) est stable par passage de $\mathbb{D}$ à $\mathbb{D}_I$. De même pour $\mathbf{Der}_3$. (Pour chaque nouvel axiome qu'on dégagera, il faudra vérifier la stabilité.)

Soit

$$f : I \longrightarrow I' \quad .$$

Considérons entre $\mathbb{D}(I)$, $\mathbb{D}(I')$ les foncteurs

$$\mathbb{D}(I) \underset{\xrightarrow[f_*]{}}{\overset{\xrightarrow{f_!}}{\xleftarrow{f^*}}} \mathbb{D}(I')$$

(sous réserve d'existence des f_* resp. $f_!$). Peut on les interpréter en termes de morphismes de dérivateurs

$$\mathbb{D}_I \underset{\xrightarrow[\overline{f_*}]{}}{\overset{\xrightarrow{\overline{f_!}}}{\xleftarrow{\overline{f^*}}}} \mathbb{D}_{I'} \qquad ?$$

Donc il faut définir, pour J dans Dia, des foncteurs correspondants entre $\mathbb{D}_I(J)$ et $\mathbb{D}_{I'}(J)$, *i.e.* entre $\mathbb{D}(I \times J)$ et $\mathbb{D}(I' \times J)$. Or on a bien

$$f \times \mathsf{id}_J : I \times J \longrightarrow I' \times J$$

et on posera (sous réserve d'existence des deux derniers)

$$\begin{cases} \overline{f^*}(J) = (f \times \mathsf{id}_J)^*_{\mathbb{D}} \\ \overline{f_!}(J) = (f \times \mathsf{id}_J)^{\mathbb{D}}_! \\ \overline{f_*}(J) = (f \times \mathsf{id}_J)^{\mathbb{D}}_* \quad . \end{cases}$$

Autrement dit, on peut considérer [page 21]

$$\mathsf{Dia} \ni I \longmapsto \mathbb{D}_I \quad , \qquad \mathbb{D} \in \mathsf{DER} \quad ,$$

comme fonctoriel en I de trois façons (une contravariante, les deux autres covariantes), suivant qu'on utilise les f^*, les $f_!$ (s'ils existent) ou les f_* (s'ils existent). On désignera par

$$f^{\mathbb{D}}_! \quad , \qquad f^*_{\mathbb{D}} \quad , \qquad f^{\mathbb{D}}_*$$

indifféremment les foncteurs entre $\mathbb{D}(I)$ et $\mathbb{D}(I')$ ou (de façon plus fine) entre $\mathbb{D}_I$ et $\mathbb{D}_{I'}$, dont les précédents se déduisent en passant aux catégories fondamentales correspondantes. De même pour $f^!$ ou pour $f^?$ sous réserve d'existence. Par exemple, si on suppose que les $f^!$ existent pour $\mathbb{D}$, quel que soit f immersion fermée, alors on trouve pour un tel f un morphisme de dérivateurs

$$\mathbb{D}_I \xleftarrow{f^!_{\mathbb{D}}} \mathbb{D}_{I'} \quad .$$

Il s'impose de regarder si tous ces morphismes de dérivateurs sont exacts, *i.e.* si pour

$$g : J \longrightarrow J'$$

dans Dia, ils commutent à $g_!$, g_*.

p. 16

[page 22 vide]

[page 23]

Pour expliciter cette question, on est amenés à regarder le diagramme de catégories

$$\begin{array}{ccc} I \times J & \xrightarrow{G=\mathsf{id}_I \times g} & I \times J' \\ \Big\downarrow{\scriptstyle F=f\times \mathsf{id}_J} & & \Big\downarrow{\scriptstyle F'=f\times \mathsf{id}_{J'}} \\ I' \times J & \xrightarrow[G'=\mathsf{id}_{I'}\times g]{} & I' \times J' \end{array} \quad ,$$

qui est d'ailleurs un carré cartésien dans $\mathcal{C}at$. La commutativité de $f^*_{\mathbb{D}}$ aux g_* s'explicite alors par la commutativité dans

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{D}(I \times J) & \xrightarrow{G_*} & \mathbb{D}(I \times J') \\ \Big\uparrow{\scriptstyle F^*} & \overset{\text{iso ?}}{\nwarrow} & \Big\uparrow{\scriptstyle F'^*} \\ \mathbb{D}(I' \times J) & \xrightarrow{G'_*} & \mathbb{D}(I' \times J') \end{array} \quad .$$

Cette commutativité sera assurée par des axiomes ultérieures sur les dérivateurs. (cf. plus bas page 59). Ainsi, $f^*_{\mathbb{D}}$ est exact à droite `[plutôt à gauche]`, et dualement, il doit être aussi exact à gauche `[plutôt à droite]`. Donc $f^*_D : \mathbb{D}_{I'} \to \mathbb{D}_I$ est *exact.* Considérons $f^{\mathbb{D}}_*$, cette fois c'est la commutativité de

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{D}(I \times J) & \xrightarrow{G_*} & \mathbb{D}(I \times J') \\ \Big\downarrow{\scriptstyle F_*} & & \Big\downarrow{\scriptstyle F'_*} \\ \mathbb{D}(I' \times J) & \xrightarrow{G'_*} & \mathbb{D}(I' \times J') \end{array} \quad ,$$

c'est trivial (à isomorphisme canonique près). Ainsi, on trouve que $f^{\mathbb{D}}_* : \mathbb{D}_I \to \mathbb{D}_{I'}$ est *exact à gauche*, et dualement $f^{\mathbb{D}}_!$ est *exact à droite.* Mais est-ce que $f^{\mathbb{D}}_*$ est aussi exact à *droite* ? Cela signifie donc commutativité de [page 24]

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{D}(I \times J) & \xrightarrow{G_!} & \mathbb{D}(I \times J') \\ \Big\downarrow{\scriptstyle F_*} & & \Big\downarrow{\scriptstyle F'_*} \\ \mathbb{D}(I' \times J) & \xrightarrow{G'_!} & \mathbb{D}(I' \times J') \end{array} \quad .$$

On arrive bien à définir p. 17

$$G'_! F_* \overset{?}{\to} F'_* G_!$$


ou ce qui revient au même par adjonction

$$F_* \overset{?}{\to} G'^* F'_* G_!$$

en utilisant le morphisme de changement de base

$$G'^* F'_* \overset{\alpha}{\to} F_* G^*$$

qui est [un] *isomorphisme* (on l'a vu), d'où



où $\beta : \mathsf{id} \to G^*G_!$ est le morphisme d'adjonction, d'où le morphisme voulu. (On peut aussi chercher $F'^*(G'_!F_*) \to G_!$, et utiliser la commutation $G_!F^* \xrightarrow{\sim} F'^*G'_!$, *i.e.* l'exactitude à *droite* de $f^*_{\mathbb{D}}$.)

[page 25]

Mais ce morphisme est-il un isomorphisme ? Je pense que dans le cas additif ça peut être raisonnable, mais dans le cas non additif ça n'a aucune raison d'être vrai. On voit en tout cas que si pour tout $f : I \to I'$ dans Dia, $f^{\mathbb{D}}_* : \mathbb{D}_I \to \mathbb{D}_{I'}$ est (non seulement exact à gauche mais aussi) exact à droite, alors pour tout $g : J \to J'$ dans Dia, $g^{\mathbb{D}}_!$ est (non seulement exact à droite mais même) exacte à gauche.

Prenons le dérivateur des préfaisceaux d'ensembles sur des I variables, sa catégorie fondamentale est $\mathcal{E}ns$. C'est un dérivateur non ponctué. Considérons $I \to I'$ une immersion fermée non surjective, $f_* : \mathbb{D}(I) \to \mathbb{D}(I')$. Si $f^{\mathbb{D}}_*$ était exact à droite f_* devrait transformer objet initial de $\mathbb{D}(I)$ en objet initial de $\mathbb{D}(I')$, sauf erreur (*cf.* plus bas). Or il n'en est rien, puisque pour tout $F \in \mathsf{Im}(f^{\mathbb{D}}_* : \mathbb{D}(I) \to \mathbb{D}(I'))$ la restriction de F à $I' \setminus I$ est le faisceau final $e_U = (i \mapsto e)$, et non le faisceau initial $\emptyset_U = (i \mapsto \emptyset)$.

On va prouver ceci :

Proposition. *Si $\mathbb{D}$ est un dérivateur à gauche (à droite), alors les produits finis (sommes finies) existent dans les $\mathbb{D}(I)$. Tout morphisme $\varphi : \mathbb{D} \to \mathbb{D}'$ de dérivateurs qui est exact à gauche (à droite) commute aux dits produits (sommes), chaque I donnant $\varphi(I) : \mathbb{D}(I) \to \mathbb{D}'(I)$. En particulier, il transforme objet final (initial) en itou.*

Dire que les produits finis indexés par l'ensemble fini I existent dans la catégorie $\mathcal{A} = \mathbb{D}(e)$ (disons) équivaut à dire que le foncteur diagonal

p. 18

[page 26]

$$\mathcal{A} \xrightarrow{\Delta} \mathcal{A}^I$$

admet un adjoint à gauche. Or si

$$f : I \to e$$

est la projection de I (considéré comme ensemble ordonné discret) sur l'ensemble ordonné ponctuel e, le foncteur Δ s'identifie à $f^* : \mathbb{D}(e) \to \mathbb{D}(I)$ (grâce à l'axiome $\mathbf{Der}_2$ sur le comportement du dérivateur pour une somme discrète de catégories d'indices). Donc l'existence du produit revient à celle de l'adjoint à droite f_* de f^*, OK pour dérivateur à gauche. Et un homomorphisme exact à gauche de dérivateurs à gauche, comme il commute aux f_*, commute aux produits finis. Itou pour les sommes finies, et les dérivateurs à droite.

L'exemple précédent utilise le fait que le dérivateur envisagé n'est pas ponctué. Mais même pour un dérivateur ponctué $\mathbb{D}$, un morphisme $f^{\mathbb{D}}_* : \mathbb{D}_I \to \mathbb{D}_{I'}$ n'est pas forcément exact à droite. Si on prend le dérivateur associé à une catégorie $\mathcal{M}$ quelconque (avec $\Sigma = \emptyset$),

$$\mathbb{D}_{\mathcal{M}}(I) = \underline{\mathsf{Hom}}(I^\circ, \mathcal{M}) \overset{\text{déf}}{=} \mathcal{M}(I)$$

alors le dérivateur induit

$$(\mathbb{D}_{\mathcal{M}})_I = \{J \mapsto \mathbb{D}_{\mathcal{M}}(I \times J) = \underline{\mathsf{Hom}}((I \times J)^\circ, \mathcal{M}) \simeq \underline{\mathsf{Hom}}(J^\circ, \underline{\mathsf{Hom}}(I^\circ, \mathcal{M}))\}$$

[page 27]

s'identifie à

$$\mathbb{D}_{\underline{\mathsf{Hom}}(I^\circ,\mathcal{M})} = \mathbb{D}_{\mathcal{M}(I)}$$

i.e.

$$(\mathbb{D}_{\mathcal{M}})_I = \mathbb{D}_{\mathcal{M}(I)}$$

N.B. Ici $\mathcal{M}$ et $\mathbb{D}_{\mathcal{M}}$ se déterminent mutuellement et le foncteur

$$\mathcal{M} \longmapsto \mathbb{D}_{\mathcal{M}}$$

$$\mathcal{C}at \longrightarrow \mathsf{DER}$$

est 2-fidèle, *i.e.* si $\mathcal{M}$, $\mathcal{M}'$ sont deux catégories

$$\underline{\mathsf{Hom}}(\mathcal{M},\mathcal{M}') \xrightarrow{\simeq} \mathsf{Hom}(\mathbb{D}_{\mathcal{M}},\mathbb{D}_{\mathcal{M}'})$$

est une équivalence de catégories. D'autre part, on vérifie tout de suite que $u : \mathcal{M} \to \mathcal{M}'$ est exact à gauche (ou à droite) si et seulement si $\mathbb{D}_u : \mathbb{D}_{\mathcal{M}} \to \mathbb{D}_{\mathcal{M}'}$ l'est.

Ainsi, pour voir si un morphisme de dérivateurs de la forme

$$f_*^{\mathbb{D}} : \quad \begin{array}{ccc} (\mathbb{D}_{\mathcal{M}})_I & \longrightarrow & (\mathbb{D}_{\mathcal{M}})_{I'} \\ \| & & \| \\ \mathbb{D}_{\mathcal{M}(I)} & & \mathbb{D}_{\mathcal{M}(I')} \end{array}$$

est exact à *droite,* il revient au même de dire

que le foncteur pour les catégories fondamentales associées

p. 19
[page 28]

$$\mathcal{M}(I) \xrightarrow{f_*^{\mathcal{M}}} \mathcal{M}(I')$$

est exact à droite. Or ici c'est un foncteur image directe de préfaisceaux ordinaires, et ce foncteur n'a aucune envie d'être exact à *droite.* (Même si $\mathcal{M}$ est *abélienne*, d'ailleurs !) Prenons par exemple pour $f : I \hookrightarrow I'$ une immersion ouverte avec $I' = \mathbf{\Delta}_1 \times \mathbf{\Delta}_1$, $I = I' - \{c\}$, c objet final de I'

$$I' = \begin{array}{ccc} c & \longleftarrow & b \\ \uparrow & & \uparrow \\ a & \longleftarrow & 0 \end{array} \qquad I = \begin{array}{ccc} & & b \\ & & \uparrow \\ a & \longleftarrow & 0 \end{array}$$

Le foncteur f_* est celui qui associe à un diagramme

$$F = \left\{ \begin{array}{ccc} & & F_b \\ & & \downarrow \\ F_a & \longrightarrow & F_0 \end{array} \right\}$$

le carré cartésien complété

$$\overline{F} = \left\{ \begin{array}{ccc} F_a \times_{F_0} F_b & \longrightarrow & F_b \\ \downarrow & & \downarrow \beta \\ F_a & \xrightarrow{\alpha} & F_0 \end{array} \right\}$$

Or si $F \mapsto \overline{F}$ était exact à droite, $F \mapsto F_a \times_{F_0} F_b$ le serait aussi. Or $F_a \times_{F_0} F_b = K(F) = \mathsf{Ker}(F_a \times F_b \xrightarrow{\alpha pr_1 - \beta pr_2} F_0)$, en tant que foncteur additif en F, n'est pas exact à droite, par exemple il ne transforme pas nécessairement épimorphisme en épimorphisme. Prenons par exemple

$$F' = \left\{ \begin{array}{ccc} & & F_b \\ & & \downarrow \\ F_a & \longrightarrow & 0 \end{array} \right\}$$

et l'homomorphisme évident $F \to F'$ qui est l'identité sur F_a et sur F_b. C'est un épimor- [page 29]
phisme et l'homomorphisme correspondant $\overline{F} \to \overline{F'}$ est l'inclusion

$$F_a \times_{F_0} F_b \longrightarrow F_a \times F_b$$

qui n'est un épimorphisme que si $\alpha = \beta = 0$.

Perplexité : On devrait pouvoir définir une notion de dérivateur (additif) "*triangulé*" p. 20
(qui correspondrait à l'intuition des catégories triangulées ; c'est un dérivateur satisfaisant à des axiomes assez forts), de sorte que pour les morphismes entre ceux-ci l'exactitude à gauche et l'exactitude à droite soient *équivalentes.*

"Théorème de changement de base" pour dérivateurs. Soit $\mathbb{D}$ dérivateur à gauche (existence de f_*) et considérons

$$f : I \longrightarrow J \qquad \text{dans } \mathsf{Dia} \quad ,$$

soit $j_0 \in \mathsf{Ob}\ J$, on se propose de "calculer" le foncteur

$$F \mapsto f_*(F)_{j_0} = \alpha_{j_0}^*(f_*(F)) \quad ,$$

où

$$\alpha_{j_0} : e \longrightarrow J$$

est l'inclusion de la catégorie ponctuelle e dans J, de valeur j_0.

Considérons le diagramme [page 30]

$$\begin{array}{ccc} I/j_0 & \xrightarrow{q} & I \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & \overset{\gamma}{\swarrow} & \downarrow{\scriptstyle f} \\ e & \xrightarrow[p=\alpha_{j_0}]{} & J \end{array} \quad , \tag{1}$$

où I/j_0 est la catégorie $I \times_J J/j_0$ des couples

$$\{(i, \varphi) \mid i \in \mathsf{Ob}\ I,\ \varphi : f(i) \to j_0\}$$

et q est le foncteur $(i, \varphi) \mapsto i$. Ce diagramme n'est pas commutatif, mais il y a un foncteur `[plutôt morphisme de foncteurs]` canonique

$$fq \xrightarrow{\gamma} pf' \quad ,$$

où fq est le foncteur $(i, \varphi) \mapsto f(i)$ et pf' le foncteur constant $(i, \varphi) \mapsto j_0$ et où $\gamma(i, \varphi) : f(i) \to j_0$ est défini par $\gamma(i, \varphi) = \varphi$.

Plus généralement, considérons un diagramme dans Dia

$$\begin{array}{ccc} I' & \xrightarrow{q} & I \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & \overset{\gamma}{\swarrow} & \downarrow{\scriptstyle f} \\ J' & \xrightarrow[p]{} & J \end{array} \quad , \tag{2}$$ p. 21

avec $\gamma : fq \to pf'$. On définit alors un *morphisme de changement de base pour les images directes* relatif à ce diagramme

$$p^* f_* \xrightarrow{c_\gamma} f'_* q^*$$

de deux façons, qui donnent le même résultat (histoire générale de foncteurs adjoints à expliciter une bonne fois, en termes d'un diagramme de foncteurs [page 31]

$$\begin{array}{ccc} X' & \xleftarrow{q^*} & X \\ {\scriptstyle f'^*}\uparrow & \nearrow & \uparrow{\scriptstyle f^*} \\ Y' & \xleftarrow{p^*} & Y \end{array}$$

en supposant que les foncteurs adjoints à gauche f'_*, f_* des deux foncteurs verticaux existent). Un cas intéressant est celui où

$$pf' = fq \quad , \qquad \gamma = \mathsf{id}_{fq}$$

et où on pose $c_\gamma = c$.

Ici

$$p^* f_* \xrightarrow{?} f'_* q^*$$

revient à

$$\begin{array}{lll} f_* \xrightarrow{?} p_* f'_* q^* \simeq & & (pf')_* q^* \\ & & \uparrow{\scriptstyle \gamma_* * q^*} \\ & (fq)_* q^* \simeq (f_* q_*) q^* = f_*(q_* q^*) & . \end{array}$$

Or on a

$$\mathsf{id} \xrightarrow{\alpha} q_* q^* \qquad \text{(adjonction)} \quad ,$$

d'où

$$f_* \xrightarrow{f_* * \alpha} f_*(q_* q^*)$$

et en composant avec $\gamma * q^*$, on trouve ce qu'on veut. Et on peut au lieu de ceci chercher

$$\begin{array}{ccc} f'^*(p^* f_*) & \xrightarrow{\quad ? \quad} & q^* \\ \| & & \\ (pf')^* f_* & & \\ \downarrow{\scriptstyle \gamma^* * f_*} & & \\ (fq)^* f_* \simeq q^*(f^* f_*) & \xrightarrow{q^* * \gamma'} & q^* \end{array} \quad ,$$

où $\gamma' : f^* f_* \to \mathsf{id}$ est l'adjonction.

Der$_4$: Le morphisme de changement de base pour images directes f_* associé à un diagramme (1) est toujours un isomorphisme (dérivateurs à gauche). Condition duale pour dérivateurs à droite et le changement de base pour images directes $f_!$, pour le diagramme p. 22 [page 32]

$$\begin{array}{ccc} j_0 \backslash I & \longrightarrow & I \\ \downarrow & \nearrow{\scriptstyle \gamma} & \downarrow{\scriptstyle f} \\ e & \xrightarrow[p = \alpha_{j_0}]{} & J \end{array} \qquad (1')$$

associé à $f : I \to J$ dans Dia, et $j_0 \in \mathsf{Ob}\, J$.

Der$_5$ [10] : Soit $f : I \to J$ une *hot-équivalence stricte, i.e.* $\forall j_0 \in \mathsf{Ob}\ J$, I/j_0 est contractile. Alors f^* est pleinement fidèle, *i.e.* le morphisme d'adjonction

$$\mathsf{id}_{\mathbb{D}(J)} \longrightarrow f_* f^*$$

est un isomorphisme ($\mathbb{D}$ dérivateur à gauche). Dualement, si f est une équivalence costricte, *i.e.* $f^\circ : I^\circ \to J^\circ$ est une équivalence stricte, *i.e.* $\forall j_0 \in \mathsf{Ob}\ J$, $j_0 \backslash I$ est contractile, alors (si $\mathbb{D}$ est un dérivateur à droite) le foncteur f^* est pleinement fidèle, *i.e.* le morphisme d'adjonction

$$f_! f^* \longrightarrow \mathsf{id}_{\mathbb{D}(J)}$$

est un isomorphisme.

N.B. Donc les foncteurs f_* (resp. $f_!$) sont des foncteurs de localisation.

N.B. Les pages 33 à 40 ont été suprimées, car canulées.

Je vais reprendre la terminologie et les axiomes relatifs aux dérivateurs. [page 41]

Un *prédérivateur* est un 2-foncteur

$$\mathsf{Dia}^\circ \xrightarrow{\mathbb{D}} \mathcal{C}at \quad ,$$

où Dia est une 2-sous-catégorie pleine de $\mathcal{C}at$. [11] On suppose tout au moins que Dia contient les *ensembles ordonnés finis,* que Dia est stable par $\varprojlim$ finies, par sommes finies. Qu'avec toute catégorie C et toute sous-catégorie strictement pleine ouverte (resp. fermée) elle contienne la sous-catégorie complémentaire. [12]

On définit le prédérivateur $\mathbb{D}_{\mathcal{M},\Sigma}$ associé à un système p. 23 [page 42]

$$(\mathcal{M}, \Sigma) \qquad \mathcal{M} \text{ Catégorie}, \quad \Sigma \subset \mathsf{Fl}(\mathcal{M}) \quad .$$

Si $\Sigma = \emptyset$, on écrit $\mathbb{D}_{\mathcal{M}}$.

Les prédérivateurs forment une 2- catégorie PREDER, et

$$(\mathcal{M}, \Sigma) \longmapsto \mathbb{D}_{\mathcal{M},\Sigma}$$

est un 2-foncteur

$$\mathsf{PREMOD}\begin{pmatrix}\text{“Catégorie des catégories}\\ \text{de modèles” (faibles)}\end{pmatrix} \longrightarrow \mathsf{PREDER} \quad .$$

Pour $\mathbb{D}$ donné, on définit le dérivateur induit ($I \in \mathsf{Dia}$)

$$\mathbb{D}_I = \big(J \longmapsto \mathbb{D}(I \times J)\big) \quad ,$$

dépendant de I de façon contravariante, d'où un 2-foncteur

$$\begin{aligned} \mathsf{Dia}^\circ &\longrightarrow \mathsf{PREDER} \\ I &\longmapsto \mathbb{D}_I \end{aligned}$$

ou encore un bi-2-foncteur

$$\begin{aligned} \mathsf{PREDER} \times \mathsf{Dia}^\circ &\longrightarrow \mathsf{PREDER} \\ (\mathbb{D}, I) &\longmapsto \mathbb{D}_I \quad . \end{aligned}$$

Si $\mathbb{D}$ est défini par $(\mathcal{M}, \Sigma)$, alors $\mathbb{D}_I$ est défini par $(\mathcal{M}(I), \Sigma(I))$:

$$(\mathbb{D}_{\mathcal{M},\Sigma})_I \simeq \mathbb{D}_{\mathcal{M}(I),\Sigma(I)} \quad , \qquad \text{[page 43]}$$

où $\mathcal{M}(I) = \underline{\mathsf{Hom}}(I^\circ, \mathcal{M})$ (préfaisceaux sur I à valeurs dans $\mathcal{M}$), et $\Sigma(I) \subset \mathsf{Fl}\ \mathcal{M}(I)$ est déduit de Σ en regardant fibre par fibre (supposant maintenant Σ saturé).

Pour tous axiomes qu'on dégagera pour certains prédérivateurs, il faudra vérifier qu'il sont stables par passage aux prédérivateurs induits $\mathbb{D}_I$, et aussi comment ils se comportent par dualité (passage de $\mathbb{D}$ à $\mathbb{D}^\circ$).

Définition du prédérivateur dual $\mathbb{D}^\circ$

$$\mathbb{D}^\circ(I) \overset{\text{déf}}{=} \mathbb{D}(I^\circ)^\circ \qquad\qquad \textit{etc.}$$

Der 1 (Premier axiome de localisation) : *a*) Si I, $J \in \mathsf{Dia}$, alors

$$\mathbb{D}(I \amalg J) \longrightarrow \mathbb{D}(I) \times \mathbb{D}(J)$$

est une équivalence de catégories.

b) $\mathbb{D}(\emptyset)$ est la catégorie finale.

Stable par passage aux prédérivateurs induits, et passage au dual.

Corollaire. *Soit* $(I_\alpha)_{\alpha\in A}$ [une] *famille finie de catégories de* Dia, $I = \coprod_{\alpha\in A} I_\alpha$. *Alors*

$$\mathbb{D}(I) \longrightarrow \prod_{\alpha\in A} \mathbb{D}(I_\alpha)$$

est une équivalence de catégories.

Der 2 (Deuxième axiome de localisation) : Pour tout $I \in \mathsf{Dia}$, le foncteur canonique

p. 24

$$\mathbb{D}(I) \longrightarrow \underline{\mathsf{Hom}}(I^\circ, \mathcal{A}_\mathbb{D}) \quad ,$$

$\mathcal{A}_\mathbb{D} = \mathbb{D}(e)$ catégorie fondamentale pour le dérivateur $\mathbb{D}$, est conservatif.

Stable par induction, et par dualité.

[page 44]

Un prédérivateur est appelé un *dérivateur à gauche* s'il satisfait **Der 1** et **Der 2**, et de plus les axiomes suivants (dont voici le premier). [page 44]

Der 3 (g) (Existence des images directes) : Pour tout $f : I \to J$ dans Dia, le foncteur $f^* : \mathbb{D}(J) \to \mathbb{D}(I)$ admet un *adjoint à droite* f_*.

Stable par induction.

On appelle f_* le foncteur image directe (cohomologique) pour f. L'objet $f_*(F) \in \mathbb{D}(J)$ (pour $F \in \mathbb{D}(I)$) s'appelle aussi l'objet de "*cohomologie relative*" de I sur J (par f), à coefficients dans F. On a des isomorphismes canoniques

$$(gf)_* \simeq g_* f_* \quad .$$

Corollaire. *Les catégories* $\mathbb{D}(I)$ *ont des produits finis, les foncteurs* f^* *et* f_* *y commutent.*

Utilise **Der 1** pour $I = \emptyset$ et $I = e \amalg e$, et **Der 3** pour $I \xrightarrow{f} e$.

On a un axiome dual :

Der 3 (d) : existence des adjoints à gauche $f_!$ des f^*, le foncteur $f_!$ s'appelle "image directe homologique" par f, et on a une notion d'*homologie relative* de I sur J (pour f), à coefficients dans F.

Par la suite, la mention (g) ou (d) à coté de la désignation **Der** n d'un axiome, signifie qu'il s'applique aux dérivateurs à gauche, respectivement à droite. De même pour les énoncés, définitions *etc.*

[page 45]

10. Totalement canulé, devient raisonnable que pour coefficients constants sur F. [page 45]

11. Dia *domaine* du dérivateur. Les objets sont les *catégories d'indices* pour $\mathbb{D}$. Les $\mathbb{D}(I)$ sont les catégories de coefficients pour $\mathbb{D}$, les objets de $\mathbb{D}(I)$ les "coeficients de type $\mathbb{D}$ sur I".

12. Notation f^* : image inverse des coefficients.

Der $\mathbf{4}_0$ (g)[13] : Soit $U \overset{j}{\hookrightarrow} X \overset{i}{\hookleftarrow} Y$ dans Dia, immersions ouverte et fermée complémentaires l'une de l'autre. Alors le morphisme d'adjonction dans $\mathbb{D}(Y)$

$$i^* i_*(F_Y) \longrightarrow F_Y$$

est un isomorphisme, donc

$$i_* : \mathbb{D}(Y) \longrightarrow \mathbb{D}(X)$$

est pleinement fidèle, et $i^* : \mathbb{D}(X) \to \mathbb{D}(Y)$ est un foncteur de localisation. L'image essentielle de i_* est formée des objets F de $\mathbb{D}(X)$ tels que $j^*(F)$ soit l'objet final de $\mathbb{D}(U)$.
Der $\mathbf{4}_0$ (d) : Avec les notations précédentes pour i, j, le morphisme d'adjonction dans $\mathbb{D}(U)$ p. 25

$$F_U \longrightarrow j^* j_! F_U$$

est un isomorphisme, - $j_!$ est pleinement fidèle, j^* un foncteur de localisation. L'image essentielle de $j_!$ est la sous-catégorie pleine de $\mathbb{D}(X)$ formée des F tels que $i^*(F)$ soit objet initial de $\mathbb{D}(Y)$.

Il y a les deux carrés de la page 8 et 9, mais pour interpréter la condition cartésienne ou cocartésienne c'est prématuré ici.

[page 46] [page 46]

Axiomes de changement de base.
Der 4 (g) (Fibres d'une image directe) : Soient $f : X \to Y$ dans Dia, $y \in Y$, considérons le diagramme connu

$$\begin{array}{ccc} X/y & \xrightarrow{q} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ e & \xrightarrow[p=\alpha_y]{} & Y \end{array}$$

et le morphisme de changement de base correspondant

$$f_*(F)_y \overset{\text{déf}}{=} p^* f_*(F) \longrightarrow f'_*(q^*(F)) (\overset{\text{déf}}{=} \Gamma_{\mathbb{D}}(X/y, q^*(F))) \quad .$$

C'est toujours un isomorphisme.

[page 47] [page 47]

Der 5 (g) (Axiome de cofinalité pour la cohomologie)[14] : Soit $\alpha : X' \to X$ dans Dia "cohomologiquement cofinal" *i.e.* les $x \backslash X'$ sont contractiles ($x \in X$) *i.e.* $\alpha^\circ : X'^\circ \to X^\circ$ est une hot-équivalence "localement sur X° ". Alors $\forall F \in \mathbb{D}(X)$, l'homomorphisme

$$\Gamma_{\mathbb{D}}(X, F) \longrightarrow \Gamma_{\mathbb{D}}(X', \alpha^* F)$$

est un isomorphisme (dans $\mathcal{A} = \mathbb{D}(e)$).
N.B. Si $f : X \to e$, on pose $\Gamma_{\mathbb{D}}(X, F) = f_*(F)$ (cohomologie "absolue" de X, à coefficients dans F).
Même chose[15] si α est "homologiquement cofinal", i.e. les X'/x sont contractiles [phrase barrée].

p. 26

Remarque. On devrait pouvoir renforcer considérablement cet axiome, en exigeant que

$$\alpha_!(\varepsilon_{X'}) \xrightarrow{\sim} \varepsilon_X \qquad \text{dans} \quad \mathsf{HOT}(X) \quad ,$$

13. Inutile comme axiome, va devenir un théorème (résulte des autres axiomes).
14. Il est conséquence d'énoncés plus faibles.
15. Faux!

où $\varepsilon_{X'}$, ε_X [sont] les objets finaux de $\mathsf{HOT}(X')$, $\mathsf{HOT}(X)$, et où $\alpha_!(\varepsilon_{X'}) \to \varepsilon_X$ est l'homomorphisme d'adjonction, compte tenu que $\varepsilon_{X'} \simeq \alpha^*(\varepsilon_X)$. On dit que X' est *homotopiquement trivial sur* X. (Et si la condition duale est satisfaite dans $\mathsf{HOT}(X^\circ)$, on dit que X' est cohomotopiquement trivial sur X.) Cette condition n'est sans doute pas autoduale. Elle est vérifiée aussi bien si α est cohomologiquement cofinal, que s'il est homologiquement cofinal (hot-équivalence costricte ou stricte).
N.B. Pour $f : X \to e$, dire que f est cohomologiquement cofinal, homologiquement cofinal, ou que X est contractile, est équivalent.
Corollaire 1 (g) (Théorème d'asphéricité pour les coefficients constants en cohomologie). *Soit $f : X \to e$ dans* Dia*, X contractile, $M \in \mathbb{D}(e)$. Alors l'homomorphisme d'adjonction*

$$M \xrightarrow{\sim} f_* f^*(M) \quad (\overset{\text{déf}}{=} \Gamma(X, f^*(M)))$$

est un isomorphisme.
Corollaire 2 (g)[16] *Soit $f : X \to Y$* [une] *hot-équivalence stricte (i.e. $\forall y \in Y$, X/y contractile). Alors pour $F \in \mathsf{Ob}\,\mathbb{D}(Y)$*

$$F \overset{\text{adj}}{\xrightarrow{\sim}} f_* f^* F$$

[est un] *isomorphisme.* [Ce corollaire est barré, mais pas sa démonstration.]
[page 48] [page 48]
On applique **Der 2**, **Der 4** (g), pour se ramener à regarder, pour $y_0 \in Y$, l'homomorphisme α du diagramme (commutatif!) suivant :

$$\begin{array}{ccc} \Gamma(\{y_0\}, F_{y_0}) = F_{y_0} & \xrightarrow{\quad\alpha\quad} & \Gamma_{\mathbb{D}}(X/y_0, f^*(F)) \\ \varphi\wr\uparrow & \nearrow_{\alpha'} & \\ \Gamma(Y/y_0, F) & & \end{array} ,$$

où α' est déduit du foncteur induit par f

$$X/y_0 \longrightarrow Y/y_0$$

et où φ est déduit du foncteur

$$\{y_0\} \longrightarrow Y/y_0 \qquad (\text{objet final}) .$$

Donc φ est un isomorphisme par **Der 5** (g)[17] (N.B. Si $z \in Z$, d'où $\{z\} \to Z$, ce foncteur est cohomologiquement cofinal si et seulement si z est objet final, homologiquement final [plutôt cofinal] si et seulement si z est objet initial). Donc la conclusion du corollaire équivaut à dire que α' est un isomorphisme. Mais $X/y_0 \to Y/y_0$ est aussi homologiquement cofinal, car si $u : y_1 \to y_0$ est dans Y/y_0, on a un isomorphisme canonique p. 27

$$(X/y_0)/(y_1, u) \simeq X/y_1$$

qui est contractile. Donc par la deuxième partie de **Der 5** (g),[18] on gagne.
[page 49] [page 49]

16. Faux, sauf pour coefficients constants.
17. *cf.* corollaire 3, page 50, qu'on devrait remonter ici.
18. (qui est fausse)

Corollaire 4 (g) (critère de changement de base pour images directes cohomologiques). *Soit*

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{\quad q \quad} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & \swarrow\!{\scriptstyle \gamma} & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow[\quad p \quad]{} & Y \end{array}$$

dans Dia (*cf.* page 30), *d'où l'homomorphisme de changement de base*

$$p^* f_*(F) \longrightarrow f'_* q^*(F) \qquad (F \in \mathsf{Ob}\,\mathbb{D}(X)) \quad .$$

Pour que ce soit un isomorphisme pour tous F, il suffit que pour tout $y' \in \mathsf{Ob}\,Y'$, le foncteur induit par (p. 9)

$$X'/y' \longrightarrow X/p(y')$$

soit une hot-équivalence stricte (ou costricte);[19] *cela signifie aussi (dans le cas strict) que pour*

$$y'_0 \in \mathsf{Ob}\,Y' \,, \quad x_0 \in \mathsf{Ob}\,X \,, \quad u_0 : f(x_0) \longrightarrow p(y'_0)$$

la catégorie $K(y'_0, x_0, u_0)$ des objets de la forme

$$(x', v', u) \mid x' \in \mathsf{Ob}\,X', \quad v' : f'(x') \to y'_0, \quad u : q(x') \xrightarrow{\leftarrow\!-} x_0$$

rendant commutatif le carré dans Y'

$$\begin{array}{ccc} f(q(x')) & \xrightarrow{\gamma(x')} & p(f'(x')) \\ {\scriptstyle f(u)}\downarrow\uparrow & \text{cas de hot-équivalence} \leftarrow \text{costricte} & \downarrow{\scriptstyle p(v')} \\ f(x_0) & \xrightarrow[u_0]{} & p(y'_0) \end{array} \qquad (*)$$

est contractile.

p. 28

N.B. Dans le cas de la hot équivalence costricte, c'est la même description de

$$K = (x_0, u_0) \backslash (X'/y'_0) \quad ,$$

sauf que la flèche u est en sens inverse $x_0 \to q(x')$ et itou dans le diagramme commutatif $(*)$.

On applique **Der 2**, **Der 4** (g) et corollaire 1 `[plutôt Der 5 (g)]`.

`[page 50]` `[page 50]`

Corollaire 5 (g). *Soit $f : X \to Y$ pleinement fidèle dans* Dia*, et $F \in \mathbb{D}(X)$. Alors l'homomorphisme d'adjonction*

$$f^* f_*(F) \longrightarrow F$$

est un isomorphisme.

En efffet, il suffit de le vérifier fibre par fibre (**Der 2**). Soit $x \in X$, $y = f(x) \in Y$, alors

$$f^* f_*(F)_x \simeq f_*(F)_y \simeq \Gamma_{\mathbb{D}}(X/y, F)$$

or à cause de la pleine fidélité $X/y \simeq X/x$.

19. Faux pour "stricte", ne marche que pour "costricte".

Corollaire 3 (remonter page 48).[20] *Soit $Z \in \mathsf{Dia}$, supposons que Z a un objet final e_Z. Soit $p : e \to Z$ le foncteur correspondant. Alors l'homomorphisme canonique (pour F dans $\mathbb{D}(Z)$)*

$$\begin{array}{ccc} Z & & \\ {\scriptstyle p}\uparrow\downarrow{\scriptstyle f} & & f_*(F) \longrightarrow p^*(F) \\ e & & \end{array}$$

est un isomorphisme.[21]

Cet homomorphisme est `[un]` cas particulier de celui-ci, pour

$$\begin{array}{ccccc} Z' & & \xrightarrow{\quad p \quad} & & Z \\ & {\scriptstyle f'}\searrow & & \swarrow{\scriptstyle f} & \\ & & S & & \end{array}$$

(en faisant $Z' = S = e$, $f' = \mathsf{id}_e$),

$$f_*(F) \longrightarrow f'_*(p^*(F)) \quad , \qquad (\, F \in \mathsf{Ob}\,\mathbb{D}(Z)\,) \quad ,$$

et c'est un cas particulier[22] des morphismes de changement de base pour

p. 29
`[page 51]`

$$\begin{array}{ccc} Z' & \xrightarrow{p} & Z \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S & \xrightarrow{\mathsf{id}} & S \end{array} \quad .$$

Remarque : On retrouve le fait que $i^*i_*(F_Y) \xrightarrow{\sim} F_Y$ est `[un]` isomorphisme, pour i une immersion fermée. De plus, avec les notations de **Der 4** (g), $j^*(i_*(F_Y))$ se calcule par le théorème de changement de base (corollaire 2 `[plutôt 4]` ci-dessus), qui s'applique dans toute situation commutative

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{q} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & \text{cart} & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{p} & Y \end{array}$$

quand p est une immersion ouverte (et $\gamma = \mathsf{id}$) (alors $X'/y' \to X/p(y')$ est même un isomorphisme !), et on trouve, revenant aux notations de **Der 4** (g),

$$\begin{array}{ccc} \emptyset & \xrightarrow{q} & Y \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i} \\ U & \xrightarrow[j]{} & X \end{array}$$

i.e. $j^*(i_*(F_Y)) \simeq f'_*(\varphi)$, où $\varphi = q^*(F_Y)$ est l'unique élément de la catégorie (équivalente à une catégorie ponctuelle, par **Der 1**) $\mathbb{D}(\emptyset)$. D'autre part, f'_* transforme objet final en objet final, d'où $j^*i_*(F_Y)$ est objet final.

Inversement, soit F dans $\mathbb{D}(X)$, tel que $j^*(F) = e_{\mathbb{D}(U)}$. Considérons

$$F \xrightarrow{u} i_*i^*F \qquad \text{(adjonction)}\,;$$

`[page 52]`

je dis que c'est un isomorphisme. En effet, par l'axiome de localisation **Der 2**, il suffit de prouver que $i^*(u)$ et $j^*(u)$ sont [des] isomorphismes. Pour $i^*(u)$ cela résulte du fait que i^* soit foncteur de localisation, et pour j^* du fait que $j^*(F)$ et $j^*(i_*i^*(F))$ sont des objets finaux dans $\mathbb{D}(U)$.

p. 30
[page 53]

Morphismes homotopiquement propres, homotopiquement lisses.

Soit $f : X \to Y$ [un] morphisme de catégories, considérons $y_0 \in \mathsf{Ob}\, Y$, et le foncteur canonique

$$X_{y_0} \xrightarrow{\varphi} X/y_0 \qquad\qquad \varphi(x) = (x, \mathsf{id}_{f(x)}) \tag{1}$$

(X_{y_0} fibre de X en y_0). Soit $(x_0, u_0) \in \mathsf{Ob}\, X/y_0$ donc $x_0 \in \mathsf{Ob}\, X$, $u_0 : f(x_0) \to y_0$. Considérons la catégorie coinduite par φ sur (x_0, u_0)

$$(x_0, u_0)\backslash(X_{y_0}) \quad ,$$

pour tester si φ est une hot-équivalence costricte *i.e.* homologiquement [plutôt cohomologiquement] cofinal. On va l'interpréter via le foncteur induit par f

$$x_0\backslash X \xrightarrow{\psi} f(x_0)\backslash Y$$

allant de la catégorie des spécialisations de x_0 dans X vers celle des spécialisations de $f(x_0)$ dans Y. On trouve alors un isomorphisme canonique de la catégorie coinduite $(x_0, u_0)\backslash X_{y_0}$ par X_{y_0} au dessus de l'objet (x_0, u_0) de X/y_0 et de la catégorie fibre $(x_0\backslash X)_{u_0}$ de $x_0\backslash X$ au dessus de $f(x_0)\backslash Y$ en u_0. Donc

Proposition. *Pour que les foncteurs $\varphi : X_{y_0} \to X/y_0$ ($y_0 \in \mathsf{Ob}\, Y$) soient des hot-équivalences costrictes, il faut et il suffit que les fibres des foncteurs $x_0\backslash X \to f(x_0)\backslash Y$ induits par f soient contractiles.*

On dit alors que f est *homotopiquement propre.* La notion duale s'exprime, soit par la condition que les foncteurs induits par f [page 54]

$$X_{y_0} \longrightarrow y_0\backslash Y$$

soient des hot-équivalences strictes *i.e.* qu'ils soient cohomologiquement [plutôt homologiquement] cofinaux, soit que les fibres des morphismes induits sur les "catégories localisées" (catégories des générisations)

$$X/x_0 \longrightarrow Y/f(x_0)$$

soient contractiles. (N.B. On utilise ici qu'une catégorie Z est contractile si et seulement si Z° l'est.) On dit alors que f est *homotopiquement lisse.*

Proposition. *La notion de foncteur propre (resp. lisse) est stable par changement de base, par composition. Les isomorphismes, et plus généralement, les immersions fermées sont propres. L'image d'un morphisme propre est une sous-catégorie fermée.*[23]

N.B. Le foncteur $X \to e$ est toujours propre et lisse, car les catégories $x_0\backslash X$ et X/x_0 sont contractiles (ayant objet initial ou objet final). Donc tout foncteur de projection $X \times Y \xrightarrow{pr_2} Y$ est à la fois propre et lisse.

Démonstration. Stabilité par changement de base :

p. 31
[page 55]

20. Va résulter de **Der 6** (g) plus fort ci-dessous.
21. Axiome de la catégorie d'indices à objet final (coefficient quelconque).
22. déjà envisagé dans cor. 2, p. 47
23. Attention, une équivalence de catégories n'est pas propre ! Si $X' \hookrightarrow X$ [est] une inclusion d'une sous-catégorie de X, elle n'est propre que si c'est une immersion fermée.

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{q} & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \text{cart} & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ Y & \xleftarrow[p]{} & Y' \end{array} \quad ,$$

d'où pour $x' \in \mathsf{Ob}\, X'$

$$\begin{array}{ccc} X/x & \longleftarrow & X'/x' \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y/y & \longleftarrow & Y'/y' \end{array} \quad ,$$

où x, y', y sont les images de x' dans X, Y', Y. On vérifie que ce diagramme est *cartésien*, donc les fibres de $X'/x' \longrightarrow Y'/y'$ sont isomorphes à des fibres de $X/x \longrightarrow Y/y$, donc contractiles si celles-ci le sont.

Dans un cas $X \xrightarrow{f} Y$ on vérifie que pour un foncteur bilocalisé de f

$$X/x \xrightarrow{\varphi = f/x} Y/y \quad ,$$

tout "bilocalisé"

$$(X/x)/\xi \longrightarrow (Y/y)/\eta \qquad\qquad (\xi : x' \to x\,, \quad \eta : y' \to y)$$

de φ s'identifie encore à un bilocalisé de f

$$X/x' \longrightarrow Y/y' \quad .$$

Donc si f est lisse, les bilocalisés f/x ($x \in \mathsf{Ob}\, X$) le sont aussi. Notons d'autre part.

Proposition.[24] *Tout morphisme propre (ou dualement lisse) à fibres contractiles est une hot-équivalence.*

Cela provient du fait que pour un tel foncteur propre, si F est un préfaisceau, ou complexe de préfaisceaux abéliens sur X, la formation des $Rf_*(F)$ commute au passage aux fibres, et de même pour $R^1 f_*(F)$ si F est un préfaisceau en groupes (pas même abéliens). [page 56]

Corollaire 1. *Si $f : X \to Y$ est cohomologiquement propre à fibres contractiles, alors Y est contractile si et seulement si X l'est.*

Grâce à ceci, on trouve que le composé de deux foncteurs propres (lisses) est propre (lisse).

N.B. Contrairement à ce qui a lieu en topologie pour la notion de propreté, si gf est propre et g propre, f ne l'est pas nécessairement, *i.e.* un S-morphisme de S-catégories X, Y propres sur S n'est pas nécessairement propre. Ainsi une section de X/S, pour X propre sur S, n'est pas nécessairement propre, *i.e.* n'est pas nécessairement une immersion fermée. C'est déjà faux si $S = e$ (auquel cas $f : X \to e$ est toujours propre). p. 32

Corollaire 2. *Un morphisme propre ou lisse, à fibres contractiles est à la fois une hot-équivalence stricte et costricte.*

En effet, on applique le corollaire 1 à $X/y \to Y/y$ ou $y\backslash X \to y\backslash Y$.

Théorème (g) *Soit une situation de changement de base dans* Dia

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{q} & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \text{cart} & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ Y & \xleftarrow[p]{} & Y' \end{array} \quad , \qquad\qquad p^* f_*(F) \xrightarrow{c} f'_* q^*(F)$$

24. *cf.* amélioration dans cor. 2, page suivante.

($F \in \mathbb{D}(X)$), $\mathbb{D}$ dérivateur exact à gauche. Si f est (homotopiquement) propre ou p homotopiquement lisse, alors c est un isomorphisme.

La question c'est si pour tout $y' \in Y'$, posant $y = p(y')$ et considérant le foncteur induit [page 57] par q

$$X/y \longleftarrow X'/y'$$

le morphisme correspondant

$$\Gamma_{\mathbb{D}}(X/y, F) \longrightarrow \Gamma_{\mathbb{D}}(X'/y', q^*F)$$

est [un] isomorphisme. Dans le cas f propre, on considère

$$\begin{array}{ccc} X_y & \xleftarrow{\sim} & X_{y'} \\ {\scriptstyle\sim}\ \text{costricte}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\sim}\ \text{costricte} \\ X/y & \longleftarrow & X'/y' \end{array}$$

d'où la conclusion, puisque par **Der 5** (g), dans

$$\begin{array}{ccc} \Gamma(X_y) & \longrightarrow & \Gamma(X_{y'}) \\ \uparrow & & \uparrow \\ \Gamma(X/y) & \longrightarrow & \Gamma(X'/y') \end{array}$$

les flèches verticales et l'horizontale supérieure sont [des] isomorphismes, donc aussi l'horizontale inférieure.

Dans le cas p lisse, considérons du coté Y, Y' le carré de changement de base p. 33

$$\begin{array}{ccc} Y & \longleftarrow & Y' \\ \uparrow & & \uparrow \\ Y/y & \longleftarrow & Y'/y' \end{array}$$

d'où le diagramme contigu [page 58]

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & X' & & \\ \downarrow & \nwarrow & \downarrow & \nwarrow & \\ & X/y & \xleftarrow[\kappa]{} & X'/y' & \\ Y & \longleftarrow & Y' & & \\ \downarrow & \nwarrow & \downarrow & \nwarrow & \downarrow \\ & Y/y & \xleftarrow[\pi]{} & Y'/y' & \end{array} ,$$

où les carrés latéraux (verticaux) sont cartésiens. On note que π est lisse et à fibres contractiles (car p est lisse) donc κ aussi. Donc κ est une hot-équivalence costricte, donc $\Gamma(X/y) \xrightarrow{\sim} \Gamma(X'/y')$, on gagne encore.

N.B. Sauf erreur, on a une réciproque du théorème, [à] savoir : Si $f : X \to Y$ est tel que le théorème de changement de base pour $f_*(F)$ est vrai pour *tout* dérivateur (il suffit sans doute de HOTAB et HOT) et pour tout $Y' \to Y$, alors f est homotopiquement propre.

D'autre part, si $g : Y' \to Y$ est tel que le théorème de changement de base pour g est vrai pout tout $X \to Y$ et tout $F \in \mathbb{D}(X)$ ($\mathbb{D}$ dérivateur exact à droite quelconque), alors g est homotopiquement lisse.
Du côté homologique les foncteurs lisses f sont exactement ceux pour lesquels $f_!$ commute à tout changement de base. Les foncteurs propres g sont exactement ceux pour lesquels le changement de base par g commute à $f_!$, pour tout $f : X \to Y$ et tout $\mathbb{D}$ dérivateur exact à gauche.

Ainsi, les foncteurs propres $f : X \to Y$ se caractérisent de *quatre* façons remarquables [page 59]

a) f_* commute à tout changement de base ($\forall$ dérivateur $\mathbb{D}$ exact à gauche) ;

b) le changement de base f^* commute à tout $g_!$ ($g : Y' \to Y$, $\mathbb{D}$ dérivateur exact à droite) ;

c) $\forall y \in \mathsf{Ob}\, Y$, $X_y \to X/y$ est une hot-équivalence costricte *i.e.* est un foncteur homologiquement `[plutôt cohomologiquement]` cofinal ;

d) $\forall x \in \mathsf{Ob}\, X$ le foncteur induit sur les colocalisés

$$x\backslash X \longrightarrow f(x)\backslash Y$$

est à fibres contractiles.

Autre situation standard où le changement de base marche (mais où les foncteurs qui interviennent n'ont aucune raison d'être propres ou lisses). p. 34

Soient

$$f : I \longrightarrow I' \quad , \qquad g : J \longrightarrow J'$$

dans Dia, d'où le diagramme (comparer page 23)

$$\begin{array}{ccc} X' = I \times J & \xrightarrow{G'} & I \times J' = X \\ {\scriptstyle F'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle F} \\ Y' = I' \times J & \xrightarrow{G} & I' \times J' = Y \end{array} \quad .$$

Ce diagramme est tel que pour tout dérivateur à gauche

on a le changement de base

$$G^* F_* \simeq F'_* G'^* \quad , \qquad \texttt{[page 60]}$$

la raison ici étant que les foncteurs induits

$$X'/y' \longrightarrow X/y$$

sont des hot-équivalences costrictes, *i.e.* que les catégories K (page 49) sont contractiles. En effet, si $x_0 = (i_0, j'_0) \in \mathsf{Ob}X$, $y'_0 = (i'_0, j_0) \in \mathsf{Ob}Y'$, $u_0 = (u'_0, v'_0) : F(x_0) \to G(y'_0)$, où $u'_0 : f(i_0) \to i'_0$, $v'_0 : j'_0 \to g(j_0)$ sont donnés, on vérifie que la catégorie K cherchée est isomorphe simplement à $(i_0, u'_0)\backslash(I/i'_0) \times (j_0, v'_0)\backslash(J/j'_0)$ qui est contractile ayant un objet initial `[plutôt` $(i_0, u'_0)\backslash(I/i'_0) \times (j'_0\backslash J)/(j_0, v'_0)$ `qui est contractile étant produit d'une catégorie ayant un objet initial et d'une catégorie ayant un objet final]`. Ouf!

Je m'aperçois d'un très gros canular. Je croyais me rappeler que pour $f : X \to Y$ qui est une hot-équivalence stricte, on avait pour tout $F \in \mathbb{D}(Y)$, $F \xrightarrow{\sim} f_* f^* F$ (par exemple pour $\mathbb{D} = \mathsf{Der}(Ab)$, ou $\mathbb{D} = \mathsf{Hot}$), *i.e.* f^* pleinement fidèle, d'où aussi que $\Gamma_{\mathbb{D}}(Y, F) \to \Gamma_{\mathbb{D}}(X, f^*F)$ est `[un]` isomorphisme. Mais ce n'est vrai que si F est un coefficient *constant* sur Y, *i.e.* de la forme $q^*(M)$ ($q : Y \to e$, $M \in \mathbb{D}(e) = \mathcal{A}_{\mathbb{D}}$). C'est faux, pour F général, déjà dans le cas de l'immersion $f : \{\varphi\} \to Y$, où φ est un objet initial. Alors, f est toujours une hot-équivalence stricte, mais l'homomorphisme $\Gamma(Y, F) \to \Gamma(X, f^*F)$ n'est en général pas un isomorphisme. p. 35

`[page 61]`

Notions de $\mathbb{D}$-équivalence et de $\mathbb{D}$-contractibilité.

On va donc reprendre les questions d'acyclicité et de changement de base.

Définition 1. Soit $\mathbb{D}$ un prédérivateur, et soit

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad f \quad} & Y \\ & {\scriptstyle p}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle q} & \\ & e & \end{array}$$

dans Dia. On dit que f est une $\mathbb{D}$-*équivalence* si le foncteur

$$F \longmapsto f^*F \quad , \qquad \mathbb{D}(Y) \longrightarrow \mathbb{D}(X)$$

induit un foncteur pleinement fidèle sur la sous-catégorie de $\mathbb{D}(Y)$ formée des $\mathbb{D}$-coefficients *constants*, *i.e.* si pour tous $M, N \in \mathsf{Ob}\mathcal{A} = \mathbb{D}(e)$ ("coefficients absolus"), on a

$$\mathsf{Hom}(q^*M, q^*N) \xrightarrow{\sim} \mathsf{Hom}(p^*M, p^*N) \quad . \tag{1}$$

Supposons que p_* et q_* existent. On posera, pour un faisceau F sur X

$$H^*_{\mathbb{D}}(X, F) \overset{\text{déf}}{=} p_*(F) \qquad (\text{et de même } \ H^{\mathbb{D}}_*(X, F) = p_!(F)\ ).$$

N.B. Et si $F = p^*M$, $M \in \mathcal{A}$, on note simplement $H^*_{\mathbb{D}}(X, M)$, $H^{\mathbb{D}}_*(X, M)$.
L'homomorphisme (1) s'interprète par adjonction comme

$$\begin{array}{ccc} \mathsf{Hom}(M, q_*q^*N) & \longrightarrow & \mathsf{Hom}(M, p_*p^*N) \\ \| & & \| \\ \mathsf{Hom}(M, H^*_{\mathbb{D}}(Y, q^*N)) & \longrightarrow & \mathsf{Hom}(M, H^*_{\mathbb{D}}(X, p^*N)) \end{array}$$

déduit de l'homomorphisme

$$q_*q^*N \longrightarrow p_*p^*N \quad , \qquad \textit{i.e.} \quad H^*_{\mathbb{D}}(Y, N) \longrightarrow H^*_{\mathbb{D}}(X, N) \quad . \tag{2}$$

Donc dire que (1) est un isomorphisme pour tous M, N signifie que (2) est un isomorphisme pour tout N. De même, si $p_!$, $q_!$ existent cela équivaut à dire que

$$p_!p^*N \longrightarrow q_!q^*N \quad , \qquad \textit{i.e.} \quad H^{\mathbb{D}}_*(X, N) \longrightarrow H^{\mathbb{D}}_*(Y, N) \tag{2'}$$

est un isomorphisme dans $\mathcal{A}$ pour tout $N \in \mathcal{A}$.

p. 36
[page 62]

En résumé :

Proposition 1. *Si p_* et q_* existent, i.e. si $H^*_{\mathbb{D}}(X, \bullet)$ et $H^*_{\mathbb{D}}(Y, \bullet)$ existent (il suffit même que ça existe pour des coefficients constants), alors f est une $\mathbb{D}$-équivalence si et seulement si f induit un isomorphisme pour les $\mathbb{D}$-cohomologies à coefficients constants de X et Y. Si $p_!$ et $q_!$ existent, i.e. si $H^{\mathbb{D}}_*(X, \bullet)$ et $H^{\mathbb{D}}_*(Y, \bullet)$ existent, f est une $\mathbb{D}$-équivalence si et seulement si f induit un isomorphisme pour les $\mathbb{D}$-homologies à coefficients constants de X et Y.*

Remarque 1. Pour que f soit `[une]` $\mathbb{D}$-équivalence, il *suffit* que pour tout F *constant* sur Y le morphisme d'adjonction $F \to f_*f^*F$ soit `[un]` isomorphisme.

Remarque 2. Si $f, f' : X \to Y$ sont dans une même composante connexe de $\underline{\mathsf{Hom}}(X, Y)$, alors f est $\mathbb{D}$-équivalence $\Leftrightarrow$ f' $\mathbb{D}$-équivalence.

Proposition 2. *Les isomorphismes sont des $\mathbb{D}$-équivalences. Si $X \overset{f}{\to} Y \overset{g}{\to} Z$, si deux parmis f, g, gf sont des $\mathbb{D}$-équivalences, le troisième aussi.*

Définition 2. On dit que X dans Dia est $\mathbb{D}$-*asphérique* (ou $\mathbb{D}$-*contractile*, ou $\mathbb{D}$-*trivial*) si $X \xrightarrow{p} e$ est une $\mathbb{D}$-équivalence, *i.e.* si p^* est pleinement fidèle.

Si p_* existe, cela signifie donc que pour $M \in \mathsf{Ob}(\mathcal{A})$

$$M \overset{\text{adj}}{\xrightarrow{\sim}} p_* p^* M \quad , \qquad i.e. \quad M \xrightarrow{\sim} H^*_{\mathbb{D}}(X, M) \quad ,$$

et si $p_!$ existe, cela signifie que pour tout M

$$p_! p^* M \overset{\text{adj}}{\xrightarrow{\sim}} M \quad , \qquad i.e. \quad H^{\mathbb{D}}_*(X, M) \xrightarrow{\sim} M \quad .$$

Corollaire. *Si Y* (resp. X) *est contractile, alors $f : X \to Y$ est une $\mathbb{D}$-équivalence si et seulement si X* (resp. Y) *est contractile.*

Exemple. Prenons $\mathbb{D} = \mathsf{HOT}$. (On peut prendre Dia = catégorie des petites catégories). Alors, pour $M \in \mathcal{A} = \mathsf{Hot}$ et X petite catégorie, on a

$$H^*_{\mathsf{HOT}}(X, M) \simeq \mathsf{Hom}_{\mathcal{A}}(\mathsf{hot}(X), M) \quad ,$$

où

$$\mathsf{hot} : \mathcal{C}at \longrightarrow \mathcal{A} = \mathsf{Hot}$$

est le foncteur canonique qui associe à tout X son "type d'homotopie". On a

$$H^{\mathsf{HOT}}_*(X, M) = \mathsf{hot}(X) \times M \quad .$$

[page 63]

On en déduit que $f : X \to Y$ est une HOT-équivalence (au sens de la définition 1) si et seulement si c'est une hot-équivalence (ou "équivalence faible") *i.e.* si et seulement si

$$\mathsf{hot}(f) : \mathsf{hot}(X) \xrightarrow{\sim} \mathsf{hot}(Y)$$

est un isomorphisme. p. 37

Proposition 2. *Soit $f : X \to Y$. Conditions équivalentes (si $\mathbb{D}$* `[est un]` *dérivateur* à gauche).

a) *f est une $\mathbb{D}$-équivalence, et le reste après tout changement de base $Y' \to Y$ qui est un isomorphisme local (par exemple pour $Y/F \to Y$, $F \in \mathsf{Ob}\widehat{Y}$).*

b) *Pour tout $y \in \mathsf{Ob}Y$, le foncteur induit $X/y \to Y/y$ est une $\mathbb{D}$-équivalence.*

c) *Pour tout $y \in \mathsf{Ob}Y$, X/y est $\mathbb{D}$-contractile.*[25]

N.B. On dit que $g : Z \to Y$ est un *isomorphisme local* si pour tout $z \in \mathsf{Ob}Z$, posons $y = g(z)$, le morphisme induit sur les catégories localisées en z et y

$$Z/z \xrightarrow{\sim} Y/y$$

est un isomorphisme. Par exemple toute immersion ouverte, tout foncteur induit $Y/y \to Y$ (foncteur de localisation) sont des isomorphismes locaux.

Il en résulte a) $\Rightarrow$ b) trivialement.

b) $\Leftrightarrow$ c). Résulte du corollaire de la page précédente, si l'on sait que Y/y est $\mathbb{D}$-contractile[26]. Cela résultera de **Der 5** ci-dessous.

[page 64]

25. Autres conditions équivalentes :
d) *Pour tout faisceau constant M_Y sur Y, on a $M_Y \xrightarrow{\sim} f_* f^* M_Y$.*
d′) *Comme* d) *avec faisceau localement constant.*

26. Cf. cor. 1 de **Der 5** (g)

c) ⇒ a) "Passage du local au global". Comme l'hypothèse c) est stable par changement de base par immersion ouverte, il suffit de prouver que c) implique que f est une $\mathbb{D}$-équivalence, *i.e.* que pour tout $F = M_Y$ ($M \in \mathsf{Ob}\mathcal{A}$), coefficient constant sur Y, l'homomorphisme d'adjonction

$$M_Y \longrightarrow f_* f^* M_Y = f_* M_X$$

est [un] isomorphisme. Il suffit de prouver que c'est un isomorphisme fibre par fibre (**Der 2**), donc que pour tout $y \in Y$,

$$M_y \longrightarrow f_*(M_X)_y$$

est un isomorphisme. Par **Der 4** (g), on a

$$f_*(M_X)_y \xrightarrow{\sim} \Gamma(X/y, M) \quad ,$$

et l'hypothèse que X/y est $\mathbb{D}$-contractile donne ce qu'on veut.

Proposition 2′. *Dualement, si $\mathbb{D}$ est un dérivateur à gauche* [plutôt à droite]*, conditions équivalentes sur $f : X \to Y$:*

a) *f $\mathbb{D}$-équivalence,* [et] *le reste par tout changement de base $g : Y' \to Y$ qui est un "isomorphisme colocal" (i.e. pour tout $y' \in \mathsf{Ob}Y'$, le foncteur induit sur les catégories "colocalisées" $y'\backslash Y' \xrightarrow{\sim} y\backslash Y$ (où $y = g(y')$)* [est un isomorphisme]*).*

b) *Pour tout $y \in Y$, le foncteur induit $y\backslash X \to y\backslash Y$ est une $\mathbb{D}$-équivalence.*

c) *Pour tout $y \in Y$, $y\backslash Y$ est $\mathbb{D}$-contractile.*

Pour le prouver, on doit utiliser que les $y\backslash Y$ sont $\mathbb{D}$-contractiles (cf. cor. 1 de **Der 5** (d)).

p. 38

Définition 3. Soit $\mathbb{D}$ un prédérivateur (peut-être même un dérivateur à gauche ou à droite). On dit que f est une $\mathbb{D}$-équivalence *stricte* si f satisfait la condition a) de [la] proposition 2. On dit que c'est une $\mathbb{D}$-équivalence *costricte* si f satisfait celle de [la] proposition 2′; on dit aussi parfois que f est $\mathbb{D}$-cofinal. (La condition duale, *i.e.* $\mathbb{D}$-équivalence stricte, s'appelerait co-$\mathbb{D}$-cofinal!) [27]

[page 65]

Proposition 3. *Soit $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$. Si f, g sont des $\mathbb{D}$-équivalences strictes, alors gf aussi. Si gf et f sont des $\mathbb{D}$-équivalences strictes, alors g aussi. Si $\mathbb{D}$* [est un] *dérivateur à gauche ou à droite, toute équivalence* [de catégories] *est une $\mathbb{D}$-équivalence stricte.* (Car elle a un adjoint à droite.)

On utilise le fait que la notion d'isomorphisme local est stable par changement de base.

[page 66]

Proposition 4. *Soient $\mathbb{D}$ un dérivateur à droite, $f : X \to Y$ un foncteur dans* Dia*, tel que pour $y \in Y$, $y\backslash X$ soit $\mathbb{D}$-contractile (donc f une $\mathbb{D}$-équivalence costricte, sous réserve que $\mathbb{D}$ soit un dérivateur à droite …). Alors pour tout F dans $\mathbb{D}(Y)$ (pas nécessairement à coefficients constant) on a*

$$H^*_{\mathbb{D}}(Y, F) \xrightarrow{\sim} H^*_{\mathbb{D}}(X, f^*(F))$$

est un isomorphisme. Réciproquement, si la condition est vraie pour tout F, alors les $y\backslash X$ sont $\mathbb{D}$-contractiles.

Démonstration. Il revient au même de dire que pour tout $M \in \mathsf{Ob}\mathcal{A} = \mathbb{D}(e)$, on a

$$\mathsf{Hom}(M, H^*_{\mathbb{D}}(Y, F)) \xrightarrow{\text{iso}} \mathsf{Hom}(M, H^*_{\mathbb{D}}(X, f^*(F))) \ .$$

27. Meilleure terminologie : f est $\mathbb{D}$-*asphérique* ($\mathbb{D}$-équivalence stricte), $\mathbb{D}$-*coasphérique* ($\mathbb{D}$-équivalence co-stricte).

Mais par adjonction, cette flèche s'interprète comme

$$\mathsf{Hom}(M_Y, F) \longrightarrow \mathsf{Hom}(M_X, f^*F) \qquad (*)$$

D'autre part, si $f_!$ existe, on a

$$\mathsf{Hom}(M_X, f^*F) = \mathsf{Hom}(f_!(M_X), F) \ ,$$

et l'homomorphisme $(*)$ est déduit de l'homomorphisme d'adjonction

$$f_!(M_X) = f_!(f^*(M_Y)) \longrightarrow M_Y \ , \qquad (**)$$

en prenant les Hom dans F. Donc la condition équivaut à dire que cet homomorphisme est [un] isomorphisme, quel que soit le coefficient constant M_Y sur Y. Pour voir si c'est un isomorphisme, on regarde fibre par fibre (**Der 2**), or les fibres s'interprètent comme $H^{\mathbb{D}}_*(y\backslash X, M_X)$ (par **Der 4** (d)) et comme M.
Donc la flèche envisagée $(**)$ s'interprète comme

p. 39
[page 67]

$$H^{\mathbb{D}}_*(y\backslash X, M_X) \longrightarrow M$$

et c'est l'homomorphisme d'adjonction $p_!(p^*(M)) \to M$.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad f \quad} & Y \\ & {\scriptstyle p}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle q} & \\ & e & \end{array}$$

Donc c'est un isomorphisme pour tout M si et seulement si $y\backslash X$ est $\mathbb{D}$-contractile.
On va énoncer ce qu'on a prouvé.
Théorème 1. *Soit*

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad f \quad} & Y \\ & {\scriptstyle p}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle q} & \\ & e & \end{array}$$

dans Dia. *On suppose que* $\mathbb{D}$ *est un prédérivateur satisfaisant* **Der 2**, *que* p_*, q_* *et* $f_!$ *existent, que* $f_!$ *satisfait à* **Der 4** (d) *pour le calcul des fibres. Conditions équivalentes :*

a) f *est une* $\mathbb{D}$*-équivalence costricte, i.e.* (prop. 2) *pour tout* $y \in \mathsf{Ob}\, Y$, $y\backslash X$ *est* $\mathbb{D}$*-contractile ;*

b) *pour tout* $F \in \mathsf{Ob}\, \mathbb{D}(Y)$, *l'homomorphisme suivant est* [un] *isomorphisme*

$$H^*_{\mathbb{D}}(Y, F) \xrightarrow{\sim} H^*_{\mathbb{D}}(X, f^*(F)) \ ;$$

c) *pour tout* $M \in \mathsf{Ob}(\mathcal{A} = \mathbb{D}(e))$, *l'homomorphisme d'adjonction est* [un] *isomorphisme*

$$f_!(M_X) = f_!(f^*(M_Y)) \xrightarrow{\sim} M_Y \ .$$

Je vais renuméroter les axiomes sur le prédérivateurs.
Der 1, **Der 2** comme avant (p. 45).
Der 3 [28] : Soit X dans Dia, $p : X \to e$. Supposons X contractile. [29] Alors

$$p^* : M \longmapsto M_X \quad , \qquad p^* : \mathcal{A} = \mathbb{D}(e) \longrightarrow \mathbb{D}(X)$$

est pleinement fidèle.

28. Axiome des catégories d'indices asphériques, *cf.* variantes **Der 3** a) b) c) page 97, et surtout pages 111-112.

p. 40
[page 68]

29. N.B. Il suffit de supposer que X a un objet final. Mais ce n'est pas un axiome autodual.

Der 4 (g) : existence des f_*.
Der 4 (d) : existence des $f_!$.
Der 5 (g) Calcul des fibres de $f_*(F)$.
Der 5 (d) Calcul des fibres de $f_!(F)$.
L'ancien axiome **Der 5** (g) résulte de **Der 2**, **Der 3**, **Der 4** (g,d), **Der 5** (d), grâce au théorème précédent.

Un aspect intéressant du théorème précédent, si on l'envisage comme énonçant l'équivalence de a) et b), c'est que cet énoncé ne fait pas appel à des notions homologiques, mais que sa démonstration y fait appel, sous une forme relativement forte (calcul des fibres de $f_!(F)$). Pour les théorèmes de changement de base pour la $\mathbb{D}$-cohomologie relative, *i.e.* pour les $f_*^{\mathbb{D}}$, on a besoin aussi constamment du calcul des fibres des $f_*(F)$. Donc il semble qu'on ne peut se passer d'aucun des axiomes précédents, y compris **Der 4** (d) et **Der 5** (d), même si on ne veut s'intéresser qu'au formalisme des f^*, f_* (aspect cohomologique). Par la suite, on va donc supposer ces axiomes satisfaits.

Théorème 2. *Soit $f : X \to Y$ dans* Dia. *Conditions équivalentes :*

a) *Pour tout $y_0 \in \mathsf{Ob}\, Y$, le foncteur canonique*

$$X_{y_0} \xrightarrow{\varphi} X/y_0 \quad (\simeq X \times_Y Y/y_0) \ ,$$

où X_{y_0} désigne la fibre en y_0, est une $\mathbb{D}$-équivalence co-stricte.

b) *Pour tout $x_0 \in \mathsf{Ob}\, X$, le foncteur induit sur les catégories colocalisées en x_0 et en $y_0 = f(x_0)$*

$$x_0\backslash X \longrightarrow y_0\backslash Y$$

est à fibres $\mathbb{D}$-contractiles.

c) *La formation des f_*F (F dans $\mathbb{D}(X)$) commute à tout changement de base $Y' \to Y$,* [page 69]
et ça reste vrai après tout changement de base – i.e. si on a $Y'' \to Y' \to Y$, d'où

$$\begin{array}{ccccc} X'' & \longrightarrow & X' & \longrightarrow & X \\ {\scriptstyle f''}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y'' & \xrightarrow[p']{} & Y' & \xrightarrow[p]{} & Y \end{array}$$

le "théorème de changement de base" est vrai pour f'_* et p'^*.

c′) *La formation des $f_*(F)$ ($F \in \mathsf{Ob}\, \mathbb{D}(X)$) commute au passage aux fibres et ceci reste vrai après tout changement de base $p : Y' \to Y$.*

c″) *Comme* c′) *avec $Y' \to Y$ un morphisme de localisation $Y/y \to Y$.*

d) *Si $Y'' \xrightarrow{p} Y' \to Y$, avec p coasphérique, alors $q : X'' = X \times_Y Y'' \to X' = X \times_Y Y'$ est coasphérique.*

d′) *Comme* d) *avec $Y'' = e$* (donc Y' est catégorie avec objet final e). p. 41

d″) *Comme* d) *avec $Y'' = \{1\}$, $Y' = \mathbf{\Delta}_1$.*

.

Démonstration. a) ⇔ b) cf. proposition page 53. Montrons que ces conditions impliquent c). Comme elles sont stables par changement de base (*cf.* démonstration immédiate page 55) donc par **Der 2** on est ramené à prouver que $H^*_{\mathbb{D}}(X/y, F) \xrightarrow{\sim} H^*_{\mathbb{D}}(Y_y, F)$ ($F \in \mathsf{Ob}\, \mathbb{D}(Y)$), ce qui résulte du théorème 1.[30] (Cf. démonstration du théorème page 56, qui marche avec des hypothèses plus générales.)

On a c) ⇔ c′) ⇒ c″) (l'équivalence c) ⇔ c′) par **Der 2**).

Prouvons c″) ⇒ a).

[page 70]

30. Donc on utilise **Der 5** (d).

Considérons le diagramme à carrés cartésiens

$$\begin{array}{ccccc} X_{y_0} & \xrightarrow{q} & X/y_0 & \longrightarrow & X \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_0} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \{y_0\} & \longrightarrow & Y/y_0 & \longrightarrow & Y \end{array} \quad .$$

L'hypothèse c″) prouve que pour tout F dans $\mathbb{D}(X/y_0)$, on a $H^*_{\mathbb{D}}(X/y_0, F) \xrightarrow{\sim} H^*_{\mathbb{D}}(X_{y_0}, F)$. Par le théorème 1, ceci implique que f est un $\mathbb{D}$-équivalence co-stricte.

Corollaire 1. Énoncé dual du théorème, pour les foncteurs $X_{y_0} \to y_0\backslash X$, $X/x_0 \to Y/y_0$, et le changement de base des $j_!(F)$ …

Définition 4. Sous les conditions équivalentes du théorème 1, on dit que f est $\mathbb{D}$-*propre.* La condition duale s'appelle f $\mathbb{D}$-*lisse.*

Corollaire 2. *Soit $f : X \to Y$ dans* Dia. *Si f est $\mathbb{D}$-propre ou $\mathbb{D}$-lisse, et à fibres $\mathbb{D}$-contractiles, alors f est une $\mathbb{D}$-équivalence stricte et costricte. Mieux, f est une $\mathbb{D}$-équivalence* universelle *i.e. est une $\mathbb{D}$-équivalence et le reste après tout changement de base.* [31]

p. 42
[page 71]

Il suffit de prouver que f est une $\mathbb{D}$-équivalence. Supposons par exemple f $\mathbb{D}$-propre. Il suffit de prouver que si Y est $\mathbb{D}$-contractile, alors X l'est (quitte à l'appliquer aux Y/y_0 après changement de base, pour montrer que les X/y_0 sont contractiles). Pour ceci, il suffit de prouver que f est une $\mathbb{D}$-équivalence, et on sait que ceci est le cas si pour tout F *constant* sur Y, l'homomorphisme $F \xrightarrow{\text{adj}} f_*f^*F$ est `[un]` isomorphisme. En fait, c'est vrai pour *tout* F.

Corollaire 3. *Si $f : X \to Y$ est $\mathbb{D}$-propre ou $\mathbb{D}$-lisse, à fibres $\mathbb{D}$-contractiles, alors $f^* : \mathbb{D}(Y) \to \mathbb{D}(X)$ est pleinement fidèle, i.e. les homomorphismes d'adjonction*

$$F \longrightarrow f_*f^*F \quad , \qquad f_!f^*F \longrightarrow F$$

dans $\mathbb{D}(Y)$ sont des isomorphismes.

Il suffit de le voir pour f propre, et cela résulte du calcul des fibres de f_*f^*F …

Proposition 5. *La notion de foncteur $\mathbb{D}$-propre* (resp. $\mathbb{D}$-*lisse*) *est stable par changement de base,* (trivial), *et par composition* (utiliser `[le]` corollaire 2). *Toute immersion fermée est $\mathbb{D}$-propre, toute immersion ouverte $\mathbb{D}$-lisse. Plus généralement, tout isomorphisme local est $\mathbb{D}$-lisse, tout co-isomorphisme local est $\mathbb{D}$-propre.*

Proposition 6. *Soient X, Y sur S, $f : X \to Y$ un S-morphisme. Supposons X, Y propres sur S, ou X et Y lisses sur S, et que pour tout $s \in \mathsf{Ob}\, S$, $f_s : X_s \to Y_s$ soit une $\mathbb{D}$-équivalence, alors f aussi.* [32]

[page 72]

31. Se généralise : **Corollaire 2′.** *Soit*

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad f \quad} & Y \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & S & \end{array}$$

avec X, Y, $\mathbb{D}$-propres sur S. Si f induit une $\mathbb{D}$-équivalence sur les fibres c'est une $\mathbb{D}$-équivalence. Itou dans le cas lisse.

C'est la proposition 6 ci-dessous.

32. Démonstration. On prouvera même que sur la sous-catégorie des coefficients sur Y qui proviennent de $\mathbb{D}(Y)$ `[plutôt de` $\mathbb{D}(S)$`]`, $f^* : \mathbb{D}(Y) \to \mathbb{D}(X)$ induit un foncteur pleinement fidèle. Si f `[est]` propre, je l'interprète comme $q_*q^*F \xrightarrow{\sim} p_*p^*F$ pour tout F, et cela résulte du calcul de p_*, q_* par passage aux fibres (propre), et de l'hypothèse sur les f_s. OK.

Théorème 3. *Soit*

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{q} & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ Y & \xleftarrow{p} & Y' \end{array}$$

cartésien dans Dia. *Alors le morphisme de changement de base*


$$p^* f_* \longrightarrow f'_* q^*$$

est un isomorphisme si f est $\mathbb{D}$-propre, ou p $\mathbb{D}$-lisse.
Le cas $\mathbb{D}$-propre déjà prouvé. Le cas $\mathbb{D}$-lisse : la démonstration p. 56 est OK.

p. 43

Comparaison de X et X°.

Soit X [une] catégorie, on définit une catégorie $\Phi(X)$ et des foncteurs



qui seront des hot-équivalences, et des $\mathbb{D}$-équivalences si $\mathbb{D}$ est un dérivateur dont le domaine contient X et $\Phi(X)$. On pose


$$\mathsf{Ob}\,\Phi(X) = \mathsf{Fl}(X) \quad ,$$

donc mêmes objets que $\mathcal{F}\ell(X) = \underline{\mathsf{Hom}}(\mathbf{\Delta}_1, X)$, mais les morphismes sont différents : [page 73]

$$\begin{array}{ccc} Y_1 & \xrightarrow{u} & Y_0 \\ {\scriptstyle v_1}\uparrow & & \downarrow{\scriptstyle v_0} \\ Y'_1 & \xrightarrow[u']{} & Y'_0 \end{array}$$

un morphisme de u dans u' est un couple $v_0 : Y_0 \to Y'_0$, $v_1 : Y'_1 \to Y_1$ tel que $v_0 u v_1 = u'$. Ainsi source et but $s(u)$ et $b(u)$ sont l'une contravariante, l'autre covariant en u. On prend pour q le foncteur source, pour p le foncteur but.

Si on applique ceci à X°, on trouve



On a $\mathsf{Ob}\,\Phi(X^\circ) = \mathsf{Fl}(X^\circ) \simeq \mathsf{Fl}(X)$

$$\begin{array}{ccc} Y_1 & \xrightarrow{u} & Y_0 \qquad \text{dans } X \\ {\scriptstyle v_0}\uparrow & & \downarrow{\scriptstyle v_1} \\ Y'_1 & \xrightarrow[u']{} & Y'_0 \qquad \text{dans } X \end{array}$$

et mêmes homomorphismes au sens de $\Phi(X)$ et au sens de $\Phi(X^\circ)$. Donc

$$\begin{cases} \Phi(X^\circ) = \Phi(X) \\ p_{X^\circ} = q_X \\ q_{X^\circ} = p_X \end{cases} ,$$

le passage de X à X° revient à échanger p_X et q_X. La fibre de $\Phi(X)$ en $x \in \mathsf{Ob}\, X$ est $\simeq (X/x)^\circ$, celle en $y^\circ \in \mathsf{Ob}\, X^\circ$ est $\simeq y\backslash X$ p. 44

$$\begin{cases} p_X^{-1}(\{x\}) \simeq (X/x)^\circ \\ q_X^{-1}(\{y^\circ\}) \simeq y\backslash X \end{cases}$$

N.B. : p_X est W-lisse [plutôt W-propre] à fibres W-asphériques, donc dans W^u [W^u = ensemble des morphismes qui sont dans W et le restent après tout changement de base], q_X est W-propre à fibres W-asphériques, donc dans W^u.

On vérifie [page 74]

$$\begin{cases} \Phi(X)/x \simeq \Phi(X/x) & x \in \mathsf{Ob}\, X \\ \Phi(X)/x^\circ \simeq \Phi(x\backslash X) & x^\circ \in \mathsf{Ob}\, X^\circ \end{cases}$$

Je dis que p_X, q_X sont des $\mathbb{D}$-*équivalences strictes* et *costrictes*. Par les formules précédentes, cela signifie que les $\Phi(X/x)$, $\Phi(x\backslash X)$ sont $\mathbb{D}$-contractiles. Donc que si Z a un objet final, $\Phi(Z)$ est $\mathbb{D}$-contractile. Mais considérons

$$\begin{array}{ccc} \Phi(Z) & & \\ & \searrow^{qz} & \\ & & Z^\circ \end{array} \quad ;$$

il suffit de prouver que c'est une $\mathbb{D}$-équivalence stricte (puisque Z°, ayant un objet initial, est $\mathbb{D}$-contractil), donc que les $z_0\backslash\Phi(Z)$ sont $\mathbb{D}$-contractiles. On a par les formules précédentes

$$z_0\backslash\Phi(Z) \simeq \Phi(z_0\backslash Z) = \Phi(T) \quad ,$$

où cette fois T a un objet initial $\emptyset$ et un objet final e. Considérons alors l'objet

$$\emptyset \longrightarrow e$$

de $\Phi(T)$, c'est un objet final, car pour tout $x \to y$ dans $\Phi(T)$, il y a une unique flèche

$$\begin{array}{ccc} x & \longrightarrow & y \\ \uparrow & & \downarrow \\ \emptyset & \longrightarrow & e \end{array}$$

Pour résumer p. 45


Proposition 1 : *p_X et q_X sont des* hot*-équivalences strictes,* i.e. Hot*-asphériques (donc aussi des $\mathbb{D}$-équivalences strictes si $\Phi(X)$ est dans le domaine de $\mathbb{D}$) à fibres les $(X/x)^\circ$ et $y\backslash X$ respectivement (donc à fibres contractiles).* [page 75]

Corollaire 1. *Pour que X soit $\mathbb{D}$-contractile, il faut et il suffit que X° le soit.*


Plus généralement :

Corollaire 2. *Soit $f : X \to Y$. Pour que f soit une $\mathbb{D}$-équivalence, il faut et il suffit que f° le soit.*

On utilisera que le diagramme



est fonctoriel en X. On a donc



les deux carrés commutatifs. Comme p_X et p_Y sont des $\mathbb{D}$-équivalences, f est une $\mathbb{D}$-équivalence si et seulement si $\Phi(f)$ l'est, et de même pour f°. Ces raisonnements supposent que si X est dans le domaine de $\mathbb{D}$, $\Phi(X)$ aussi. C'est le cas si Dia est formé des catégories ordonnées finies.

p. 46
[page 76]

$\mathbb{D}$-fibrations

Proposition 1. *Soit $f : X \to Y$ dans* Dia*, conditions équivalentes :*

a) *Pour tout $y \in Y$, l'inclusion $X_y \to X/y$ est une $\mathbb{D}$-équivalence, et pour toute flèche $y_1 \to y_0$ de Y, $X/y_1 \to X/y_0$ est une $\mathbb{D}$-équivalence.*

b) *Pour tout coefficient* constant *F sur Y, f_*f^*F est localement constant,*[33] *et "se calcule fibre par fibre"* i.e. *l'homomorphisme canonique*

$$f_*f^*(F)_y \xrightarrow{\sim} H^*_{\mathbb{D}}(X_y, F|X_y)$$

[est un isomorphisme].

Ces conditions sont équivalentes, et impliquent les conditions de (b) pour tout F *localement* constant sur Y.

La première condition dans (a) signifie que pour tout $y \in Y$, et tout $M \in \mathsf{Ob}\,\mathcal{A}$,

$$H^*_{\mathbb{D}}(X/y, M) \longrightarrow H^*_{\mathbb{D}}(X_y, M)$$

est un isomorphisme. Or cette flèche s'interprète comme

$$f_*(M_X)_y \longrightarrow H^*_{\mathbb{D}}(X_y, M)$$

est un isomorphisme, *i.e.* que $f_*(M_X)$ se calcule fibre par fibre. Comme $M_X \simeq f^*(M_Y)$, c'est la deuxième condition (b). La deuxième condition dans (a), pour $y_1 \to y_0$ signifie que pour M dans $\mathcal{A}$,

$$H^*_{\mathbb{D}}(X/y_0, M) \longrightarrow H^*_{\mathbb{D}}(X/y_1, M)$$

est [un] isomorphisme, or cette flèche s'interprète comme

$$f_*(M_X)_{y_0} \longrightarrow f_*(M_X)_{y_1} \quad ,$$

[page 77]

que ce soit toujours un isomorphisme, c'est la première condition (b). Que (b) soit valable aussi pour F localement constant sur Y est immédiat, car c'est une condition de nature locale par rapport à Y.

La proposition duale fait appel aux foncteurs


$$y_0\backslash X \longrightarrow y_1\backslash X \qquad \text{et} \qquad X_y \longrightarrow y\backslash X \quad ,$$

et aux faisceaux $f_!f^*M$, pour M constant, ou localement constant sur Y.

Définition 1. Si les conditions équivalentes de la proposition 1 sont satisfaites, on dit que f est une $\mathbb{D}$-*fibration cohomologique* (ou $\mathbb{D}$-*fibration gauche*). Si les conditions duales sont satisfaites, on dit que c'est une $\mathbb{D}$-*fibration homologique* (ou $\mathbb{D}$-*fibration droite*). p. 47

N.B. Les $\mathbb{D}$-fibrations cohomologiques sont stables par tout changement de base qui est un isomorphisme local. Les $\mathbb{D}$-fibrations homologiques par tout changement de base qui est un co-isomorphisme local. Mais ce ne sont pas des notions stables par *tout* changement de base[34]. Mais la notion de $\mathbb{D}$-fibration cohomologique est stable par changement de base $\mathbb{D}$-lisse, et celle de $\mathbb{D}$-fibration homologique par changement de base $\mathbb{D}$-propre.


Je vais essayer de construire un exemple où le changement de base canule, en posant $Y = \mathbf{\Delta}_1$. Se donner X sur $\mathbf{\Delta}_1$ revient à se donner une sous-catégorie ouverte X_0, et son complémentaire fermé X_1



Dire que $X \to Y = \mathbf{\Delta}_1$ est une $\mathbb{D}$-fibration cohomologique signifie simplement que les restrictions [page 78]

$$X_0 \xrightarrow{j} X \quad , \qquad X_1 \xrightarrow{i} X$$

sont des $\mathbb{D}$-équivalences. Prenons un changement de base $Y' \to Y = \mathbf{\Delta}_1$, *i.e.* un Y' avec Y'_0, Y'_1




On voit que la condition Y' lisse sur $\mathbf{\Delta}_1$ signifie que pour tout $y'_1 \in \mathsf{Ob}\, Y'_1$, la catégorie Y'_0/y'_1 des objets y_0 de Y'_0 au dessus de y'_1 (*i.e.* munis de $y_0 \to y'_1$) est contractile. On voit que si $Y'_1 \neq \emptyset$ alors $Y'_0 \neq \emptyset$ – mais un exemple avec $Y'_0 = \emptyset$, où $Y'_1 = \emptyset$, n'est pas intéressant (car une projection $I \times J \to I$ est toujours une $\mathbb{D}$-fibration cohomologique). p. 48

33. Par là on entend que pour tout $u : y \to y'$ dans Y, $G_{y'} \to G_y$ est [un] isomorphisme. Sans axiomes supplémentaires sur $\mathbb{D}$, il n'est pas clair que cela implique que les "restrictions" de G aux Y/y ou $y\backslash Y$, soient isomorphes à des coefficients constants. Voir cependant l'axiome **Der 3** a′), page 97, qui assure que c'est pareil.

34. ? donner exemple!

Prenons par exemple pour Y'



somme amalgamée de deux copies de $Y = \mathbf{\Delta}_1$, donc $X' = X \times_Y Y'$ peut se voir comme somme amalgamée $X \amalg_{X_1} X$. Mais ça semble *pas* être un contre-exemple. Il faudrait que $X_1 \to X'$ ne soit *pas* une $\mathbb{D}$-équivalence.

Proposition 2. *Soit $f : X \to Y$ dans* Dia. *Conditions équivalentes :* [page 79]

a) *Pour tout $Y'' \xrightarrow{p} Y' \to Y$, d'où*

$$\begin{array}{ccccc} X'' & \xrightarrow{q} & X' & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \text{cart} & \downarrow & \text{cart} & \downarrow f \\ Y'' & \xrightarrow[p]{} & Y' & \longrightarrow & Y \end{array} ,$$

si p est une $\mathbb{D}$-équivalence, [alors] *q aussi.*[35]

b) *f est une $\mathbb{D}$-fibration cohomologique "universelle",* i.e. *est une fibration cohomologique, et le reste après tout changement de base.*

b′) *Condition duale de* (b) *: f est une $\mathbb{D}$-fibration homologique universelle.*[36]

a) ⇒ *b*) : Supposons *a*), soit $Y' \to Y$ changement de base, d'où

$$\begin{array}{ccc} X' & \longrightarrow & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \longrightarrow & Y \end{array} .$$

Pour prouver que f' est une $\mathbb{D}$-fibration cohomologique, on regarde au dessus de Y' les foncteurs de la forme $\{y'\} \to Y'/y'$ ($y' \in \mathsf{Ob}\, Y'$) et $Y'/y'_1 \to Y'/y'_0$ (si $u' : y'_1 \to y'_0$ flèche de Y'), et on voit que les flèches dans $\mathcal{C}at/Y'$ déduites de ceux-ci par le changement de base $X' \xrightarrow{f'} Y'$ restent des $\mathbb{D}$-équivalences p. 49

[page 80]

$$\begin{array}{ccccccc} X'_1 & \xrightarrow{q} & X'_0 & \longrightarrow & X' & \longrightarrow & X \\ {\scriptstyle f'_1}\downarrow & \text{cart} & \downarrow{\scriptstyle f'_0} & \text{cart} & \downarrow{\scriptstyle f'} & \text{cart} & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y'_1 & \xrightarrow[p]{} & Y'_0 & \longrightarrow & Y' & \longrightarrow & Y \end{array} .$$

35. Il faut supposer Y', Y'' Hot-asphériques, cf. page 96, et supposer vérifié l'axiome Der 3 a') de la page 97.

36. b) ⇒ a) canulée, *cf.* annotation marginale,[37] *cf.* contre-exemple page 89. Mais ça marche pour les dérivateurs $\mathbb{D}_i$ ($i \in \mathbb{N}$) associés aux "localisateurs fondamentaux" W_i, *i.e.* à la théorie des i-types d'homotopie.

37. L'implication b) ⇒ a) pas prouvée, seulement sous forme plus faible :

a′) si Y'', Y' sont $\mathbb{D}$-asphériques et 1-connexes, alors $X'' \to X'$ est une $\mathbb{D}$-équivalence. (Il suffit même de le supposer pour Y', Y'' ayant des objets finaux (pour impliquer b) ou ayant des objets initiaux (pour impliquer b′).)

Comme p est une $\mathbb{D}$-équivalence, cela résulte bien de a).

$b) \Rightarrow a)$: Comme la condition $b)$ est évidemment stable par changement de base, on est ramené à prouver que si f satisfait $b)$, et si on a

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{\ q\ } & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \text{cart} & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ Y & \xleftarrow[\ p\ ]{} & Y' \end{array} \qquad (*)$$

si p est une $\mathbb{D}$-équivalence, alors q aussi, *i.e.*

$$\begin{array}{ccc} H^*_{\mathbb{D}}(X, M) & \xrightarrow{\ \sim\ } & H^*_{\mathbb{D}}(X', M) \\ \wr| & & \wr| \\ H^*_{\mathbb{D}}(Y, f_*(M_X)) & & H^*_{\mathbb{D}}(Y', f'_*(M_{X'})) \end{array}$$

pour tout M dans $\mathcal{A} = \mathbb{D}(e)$. Mais $F = f_*(M_X)$ est localement constant et se calcule "fibre par fibre", de même pour $F' = f'_*(M_{X'})$.

L'équivalence $a) \Leftrightarrow b')$ se déduit de $a) \Leftrightarrow b)$ par dualité (la condition $a)$ étant auto- [page 81]
duale), ou en reprenant le même raisonnement pour $a) \Rightarrow b')$, et pour $b') \Rightarrow a)$ aussi (en remplaçant la cohomologie par l'homologie).

Définition 2. Si les conditions équivalentes de la proposition 2 sont satisfaites, on dit que f est une $\mathbb{D}$-*fibration*.

N.B. C'est une notion *à la fois* locale et "colocale" sur Y (alors que fibration gauche est locale, fibration droite colocale).

Proposition 3. a) *La notion de $\mathbb{D}$-fibration est stable par changement de base et par* p. 50
composition.[38]

b) *Soient*

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad f \quad} & X' \\ & {\scriptstyle p}\searrow \quad \text{comm} \quad \swarrow{\scriptstyle p'} & \\ & Y & \end{array}$$

avec p, p' des $\mathbb{D}$-fibrations (il suffit que p, p' soient des $\mathbb{D}$-fibrations cohomologiques, ou que ce soient des $\mathbb{D}$-fibrations homologiques, ou que p, p' soient propres, ou p, p' lisses). Si f induit des $\mathbb{D}$-équivalences dans les fibres, alors f est une $\mathbb{D}$-équivalence.[39]

Démonstration. $a)$ est immédiat sous la condition $a)$ (prop. 2) de la notion de $\mathbb{D}$-fibration. Pour $b)$, supposons que f induise des $\mathbb{D}$-équivalences sur les fibres. On veux prouver que

$$H^*_{\mathbb{D}}(X, M) \longrightarrow H^*_{\mathbb{D}}(X', M)$$

est un isomorphisme, pour tout M dans $\mathcal{A}$, mais cette flèche s'identifie à

$$H^*_{\mathbb{D}}(Y, p_*(M_X)) \longrightarrow H^*_{\mathbb{D}}(Y, p'_*(M_{X'}))$$

déduite de

$$p_*(M_X) \longrightarrow p'_*(M_{X'}) \qquad (\text{NB} \quad M_X \simeq f^* M_{X'})$$

et il suffit de prouver que cette flèche est un isomorphisme. Pour ceci, on regarde fibre [page 82]

38. La stabilité par composition *n'est* pas claire.

39. Peut se préciser considérablement dans le cas où p, p' sont des $\mathbb{D}$-fibrations, *cf.* prop. 6, page 84.

par fibre, et on utilise le fait que "les images directes se calculent fibre par fibre".

Question. Soit $f : X \to Y$ une $\mathbb{D}$-fibration, et soit $F \in \mathbb{D}(Y)$. Alors $f_* f^* F$ se calcule-t-il par passage aux fibres ? Même question pour $f_! f^* F$. Pour la première propriété, concernant f_*, on montre que cela marche si F est de la forme $p_*(M_Y)$, où $p : Y' \to Y$ est $\mathbb{D}$-*propre,* et $M \in \mathsf{Ob}\,\mathcal{A}$. D'autre part, la sous-catégorie pleine C de $\mathbb{D}(Y)$ formée des F pour lesquels ça marche est (sauf erreur) "stable par $\mathbb{D}$-hot-$\varprojlim$" en le sens suivant : si on a une catégorie I avec objet final e formant une sous-catégorie fermée (*i.e.* $e \to x \Rightarrow x = e$), et si on a $\mathcal{F} \in \mathbb{D}(Y \times I)$, d'où $I^\circ \to \mathbb{D}(Y)$, $i \mapsto \mathcal{F}_i$ (diagramme squelettique), si les $\mathcal{F}_i$ pour $i \neq e$ sont dans C, et si $\mathcal{F}$ est dans l'image essentielle de j_*, où $j : Y \times (I \setminus \{e\}) \hookrightarrow Y \times I$ est l'inclusion, alors $\mathcal{F}_e$ est aussi dans C.

On peut cependant considérer que si on veux que $f : X \to Y$ satisfasse à toutes les propriétés cohomologiques et homologiques qui s'attachent à la notion d'une "fibration" ("localement triviale"), on devrait mettre dans les conditions que f est *lisse*, et *propre*, pour que les changements de base par f commutent aux foncteurs g_*, $g_!$.

Signalons : p. 51

[page 83]

Proposition 4. *Soit $f : X \to Y$* propre. *Pour que f soit une $\mathbb{D}$-fibration, il faut et il suffit que pour tout $y_1 \to y_0$ dans Y, le foncteur $X/y_1 \to X/y_0$ induit soit une $\mathbb{D}$-équivalence* (i.e. *que f soit une $\mathbb{D}$-fibration* cohomologique). *Dualement, si f est $\mathbb{D}$-lisse, pour que ce soit une $\mathbb{D}$-fibration, il faut et il suffit que pour tout $y_1 \to y_0$ dans Y, $y_0 \backslash X \to y_1 \backslash X$ soit une $\mathbb{D}$-équivalence.*

On pourrait appeler $\mathbb{D}$-fibrations *parfaites* les foncteurs à la fois propres et lisses qui sont des $\mathbb{D}$-fibrations cohomologiques (ou ce qui revient au même des $\mathbb{D}$-fibrations homologiques).

Corollaire. *Supposons f $\mathcal{C}at$-cofibration (donc propre). Pour que f soit une $\mathbb{D}$-fibration, il faut et il suffit que les foncteurs $X_{y_0} \to X_{y_1}$ (pour $y_0 \to u_1$ dans Y) soient des $\mathbb{D}$-équivalences. Duallement, pour $\mathcal{C}at$-fibration (donc lisse).*

Proposition 5. *Soit $f : X \to Y$ dans* Dia. *Conditions équivalentes :*

a) *f est une $\mathbb{D}$-équivalence, et le reste par tout changement de base ;*

b) *f est une $\mathbb{D}$-fibration à fibres $\mathbb{D}$-contractiles.*

Démonstration. *a)* $\Rightarrow$ *b)* : Que *a)* implique que f soit une $\mathbb{D}$-fibration est immédiat sur la définition de celle-ci (condition *a)* de la proposition 2), et que les fibres sont contractiles est tautologique.

b) $\Rightarrow$ *a)* : Il suffit de montrer que *b)* implique que f est une $\mathbb{D}$-équivalence. Mais c'est un cas particulier de la proposition 3 *b)* (en y prenant $X' = Y$).

Quand ces conditions sont satisfaites, on s'attend à ce que le foncteur [page 84]

$$f^* : \mathbb{D}(Y) \longrightarrow \mathbb{D}(X)$$

soit pleinement fidèle, *i.e.* que les morphisme d'adjonction

$$F \longrightarrow f_* f^* F \quad , \qquad f_! f^* \longrightarrow F$$

dans $\mathbb{D}(Y)$ soient des isomorphismes. (C'est vrai si f est $\mathbb{D}$-propre ou $\mathbb{D}$-lisse, cf. cor. 3, p.71.) Cela revient encore à dire que les $f_* f^* F$ se calculent par passage aux fibres, ou encore itou pour les $f_! f^* F$. Cela nous ramène à la question de la page 82.

Définition 3. On dit alors que f est une $\mathbb{D}$-fibration *triviale.*

Proposition 6 (précise prop. 3 page 81). *Considérons un triangle commutatif dans* Dia

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\ f\ } & X' \\ & {\scriptstyle p}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle p'} & \\ & S & \end{array} \quad .$$

a) *Supposons que p et p' soient des $\mathbb{D}$-fibrations gauches, ou que p et p' soient des $\mathbb{D}$-fibrations droites. Soit S_0 une partie de S qui rencontre toute composante connexe de S. Pour que f soit une $\mathbb{D}$-équivalence, il* suffit *que pour tout $s_0 \in S_0$, f induise une $\mathbb{D}$-équivalence $X_{s_0} \to Y_{s_0}$.* p. 52

b) *Cette condition est aussi nécessaire*[40] *si p et p' sont des $\mathbb{D}$-fibrations. Donc dans ce cas, f est une $\mathbb{D}$-équivalence si et seulement si f induit des $\mathbb{D}$-équivalences fibre par fibre.*

[page 85]

Démonstration. a) Il suffit, en vertu de la proposition 3, de montrer que l'hypothèse implique que pour *tout* $s \in S$, f induit une $\mathbb{D}$-équivalence $f_s : X_s \to X'_s$. Cela résulte aussitôt du lemme :

Lemme. *Si p et p' sont toutes deux soit des $\mathbb{D}$-fibrations gauches, soit des $\mathbb{D}$-fibrations droites, et si $s_1 \to s_0$ est une flèche dans S, alors f_{s_1} est une $\mathbb{D}$-équivalence si et seulement si f_{s_0} l'est. (Donc l'ensemble $S' \subset \mathsf{Ob}\, S$ des $s \in S$ tels que f_s soit une $\mathbb{D}$-équivalence est une réunion de composantes connexes de S.)*

Supposons par exemple que p, p' soient des $\mathbb{D}$-fibrations gauches. Considérons, pour $s \in S$, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X_s & \xrightarrow{f_s} & X'_s \\ \downarrow & & \downarrow \\ X/s & \xrightarrow[f/s]{} & X'/s \end{array} \quad .$$

Les flèches verticales sont des $\mathbb{D}$-équivalences par l'hypothèse sur p, p', donc f_s est une $\mathbb{D}$-équivalence si et seulement si f/s l'est. Considérons maintenant

$$\begin{array}{ccc} X/s_1 & \xrightarrow{f/s_1} & X'/s_1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ X/s_0 & \xrightarrow[f/s_0]{} & X'/s_0 \end{array} \quad .$$

Ici encore, l'hypothèse sur p, p' implique que les flèches verticales sont des $\mathbb{D}$-équivalences, donc f_{s_1} est une $\mathbb{D}$-équivalence si et seulement si f_{s_0} l'est.

[page 86]

Si $Y' = S$, l'énoncé (non prouvé) dit que si $f : X \to S$ est une $\mathbb{D}$-fibration et une $\mathbb{D}$-équivalence, alors les fibres sont $\mathbb{D}$-contractiles. Ce n'est pas sûr même pour une projection $X = T \times S \to S$. Si $\eta = hot_0(S)$, $\xi = hot_0(T)$, la question se réduit à celle-ci : Si pour tout M dans $\mathcal{A}$, on a : l'homomorphisme

$$\alpha_M : \xi \times_{\mathbb{D}} M \longrightarrow M$$

satisfait

p. 53

$$\eta \times_{\mathbb{D}} \alpha_M : \eta \times_{\mathbb{D}} (\xi \times_{\mathbb{D}} M) \xrightarrow{\sim} \eta \times_{\mathbb{D}} M$$

est un isomorphisme, alors α_M est lui même un isomorphisme.

[page 87]

Voici un *contre-exemple*[42] que je donne d'abord dans le contexte des espaces topolo-

40. Pas prouvé ![41] Même si $X' = S$, ce n'est pas clair, même si $\mathbb{D} = \mathsf{HOTAB}$, f propre et lisse. Mais OK si S est $\mathbb{D}$-contractile.

41. Faux, *cf.* contre-exemple, p. 87.

42. Voir un contre-exemple encore plus simple pages 93, 94. (Mais il a l'inconvenient de ne pas être à fibres connexes.)

giques, au lieu de $\mathcal{C}at$. Je vais construire une fibration localement triviale et non triviale

$$\begin{array}{ll} X & \supset S^1 \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \\ S & = S^1 \end{array} \quad ,$$

de fibre S^1, telle que f soit une $\mathbb{D}$-équivalence pour tout $\mathbb{D} = \mathsf{Der}(k\text{-}\mathsf{Mod})$, k étant un anneau où 2 est inversible. Cela signifie que

$$H_*(X,k) \longrightarrow H_*(S,k)$$

est un isomorphisme modulo 2-torsion (noyau et conoyau sont annulés par une puissance de 2 - en fait par 2 ici), ou encore $H_*(X,k) \xrightarrow{\sim} H_*(S,k)$ si 2 inversible dans k. Mais la fibre S^1 n'est pas $\mathbb{D}$-contractile (sauf si $k = 0$!). [43]

La fibration est donnée à isomorphisme unique près, en se fixant un point $s \in S$, et en se donnant un automorphisme u de la fibre X_s ("monodromie"). (La classe d'isomorphie du fibré ne dépend que de la classe d'isotopie de u). Je prend pour u la symétrie (inversant l'orientation) $z \mapsto z^{-1}$ du cercle standard $\{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$. Cette fibration "se réalise" par des ensembles ordonés $X \to S$, S^1 étant représenté (sur la base, comme sur les fibres) par

$$S \;=\; \begin{array}{ccccc} & & a & & \\ & \nearrow & & \nwarrow & \\ 0 & & & & 0' \\ & \searrow & & \swarrow & \\ & & b & & \end{array} \;=\; S' \amalg_R S'' \quad ,$$

où R est la catégorie discrète ayant deux éléments a, b. On définit X comme $X' \amalg_Y X''$, où $X' = X|S'$, $X'' = X|S''$, $Y = X|R$. [44]

On pose

$$X' = S' \times \bar{S} \qquad\qquad X'' = S'' \times \bar{S}$$

p. 54
[page 88]

($\bar{S}$ copie conforme de S, cf ci-dessous) et il faut, pour recoller X' et X'', se donner un isomorphisme entre $X'|R \simeq R \times \bar{S} = \bar{S} \amalg \bar{S}$ et $X''|R \simeq R \times \bar{S} = \bar{S} \amalg \bar{S}$ qui soit un R-foncteur, *i.e.* qui provient de deux isomorphismes

$$\begin{array}{l} \bar{S} \xrightarrow{u_a} \bar{S} \\ \bar{S} \xrightarrow{u_b} \bar{S} \end{array} \quad .$$

On prend

$u_a = \mathsf{id}_{\bar{S}}$


$u_b =$ symétrie par rapport à l'axe $\bar{0}, \bar{0}'$ *i.e.*

u_b laisse fixes $\bar{0}, \bar{0}'$ et intervertit $\bar{a}$ et $\bar{b}$.

43. Exemple beaucoup plus simple encore : on prend $X = S^1$, et $X \to S$ le revêtement à deux feuillets. Si on prend le revêtement à n feuillets, c'est aussi OK si k anneau où n est inversible.

44. N.B. S', S'', $R = S' \cap S''$ fermés dans S, X', X'', $Y = X' \cap X''$ fermés dans X.

(C'est plus clair si on désidentifie la base et la fibre, en prenant fibre



Pour voir que X est une $\mathbb{D}$-fibration sur S (quelque soit $\mathbb{D}$) prouvons qu'il est *propre*[45] sur S - on est ramenés à voir que $X' \to S'$ et $X'' \to S''$ sont propres, ce qui est trivial. Pour voir que c'est une $\mathbb{D}$-fibration, on est ramenés également au cas de $X' \to S'$ et $X'' \to S''$, où c'est aussi trivial. On a utilisé le :

Lemme. *Soient $f : X \to S$, $(S_i)_{i\in I}$ une famille de sous-catégories fermées recouvrant S. Pour tout i, soit $X_i = X \times_S S_i \xrightarrow{f_i} S_i$. Pour que f soit propre, il faut et il suffit que les f_i le soient. Pour que f soit une $\mathbb{D}$-fibration propre il faut et il suffit que les f_i le soient.*

Voici le petit calcul qui montre que $f : X \to S$ est une $\mathbb{D}$-équivalence. On fait le calcul [page 89] en cohomologie.[46] On doit prouver que

$$H^*(S,k) \longrightarrow H^*(X,k) \qquad (*)$$

est un isomorphisme (et de même pour tout coefficient constant M sur S). Or p. 55

$$H^*(X,k) \overset{\text{def}}{=} \mathbb{R}\Gamma_X(k_X) = \mathbb{R}\Gamma_S(\mathbb{R}f_*(k_X)) \quad ,$$

et $(*)$ est induit par

$$i : k_S \longrightarrow \mathbb{R}f_*k_X \quad .$$

Or on a

$$\mathbb{R}f_*k_X \simeq \underbrace{k_S}_{=\mathsf{Im}(i)} \quad \oplus \quad \underbrace{k_S[1]}_{k_S \text{ en degré } 1} \quad \underline{\text{tordu}}$$

savoir "tordu" par l'action de monodromie sur $S = S^1$, laquelle est la symétrie $\lambda \mapsto -\lambda$. On a

$$\mathbb{R}\Gamma_S(k_S[1]^{\text{tordu}}) = H^1(\underbrace{\pi_1(S)}_{=\mathbb{Z}}, k_S^{\text{tordu}}) = k_{(\mathbb{Z})} = k/(u - \mathsf{id})k = k/2k = 0 \ ,$$

d'où le résultat.

Notons que si on regarde

$$X' = X \times_S X \xrightarrow{f'} S \quad ,$$

on a par Künneth relatif

$$\mathbb{R}f'_*(k_{X'}) \simeq \mathbb{R}f_*(k_X) \otimes^{\mathbb{L}} \mathbb{R}f_*(k_X) \simeq k_S \oplus k_S[1]^t \oplus k_S[1]^t \oplus \underbrace{k_S[1]^t \otimes k_S[1]^t}_{\simeq k_S[2] \text{ non tordu}} \ ,$$

d'où

$$H^*_{\mathbb{D}}(X',k) \simeq \mathbb{R}\Gamma_{X'}(k_{X'}) \simeq \mathbb{R}\Gamma_S(\mathbb{R}f'_*(k_{X'})) \simeq \mathbb{R}\Gamma_S(k_S) \oplus \mathbb{R}\Gamma_S(k_S)[2]$$

et

$$H^*_{\mathbb{D}}(S,k) \longrightarrow H^*_{\mathbb{D}}(X',k) \qquad [\text{page 90}]$$

n'est *pas* un isomorphisme.

Ainsi $f : X \to S$ qui est une $\mathbb{D}$ fibration (propre et lisse) satisfait bien les conditions équivalentes b), b') de la proposition 2 (page 79), mais pas la condition a), puisque le changement de base

$$\begin{array}{ccc} X' = X \times_S X & \xrightarrow{q=pr_1} & X \\ {\scriptstyle f'=pr_2}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' = X & \xrightarrow[p=f]{} & S \end{array}$$

est une $\mathbb{D}$-équivalence $S' \to S$, alors que $X' \to X$ ne l'est pas.

Voici un autre contre-exemple, sur le même principe mais un peu plus simple. Soit G un groupe fini (par exemple $G = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$), faisons le opérer sur un objet Z de $\mathcal{C}at$, soit $S = [G] = B_G$ la catégorie réduite à un objet a, avec $G = \mathsf{End}(a)$. Soit E_G la catégorie (isomorphe à $(B_G)/a$)

$$\mathsf{Ob}\ E_G = G \quad , \qquad \mathsf{Hom}_{E_G}(g, g') = \{h \in G \mid g = g'h\} \quad ,$$

composition évidente - alors E_G est un groupoïde trivial (1-connexe). Le goupe G y opère à gauche librement par translations, et $B_G = E_G/G$.

Si G opère à gauche sur Z, on peut alors l'utiliser pour tordre Z, par p. 56
[page 91]

$$X = E_G \times_G Z = (E_G \times Z)/\text{opérations “diagonales” de G} \quad .$$

Donc on a un diagramme cartésien

$$\begin{array}{ccccc} & & X' & & X'' \\ & & \| & & \| \\ X & \longleftarrow & Z \times E_G & \overset{\mathbb{D}}{\underset{\sim}{\dashleftarrow}} & Z \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle pr_2} & & \downarrow \\ B_G & \longleftarrow & E_G & \overset{\mathbb{D}}{\underset{\sim}{\dashleftarrow}} & e \\ \| & & \| & & \| \\ S & & S' & & S'' \end{array}$$

Comme le changement de base $S' = E_G = (B_G)/a \to B_G = S$ transforme X sur B_G en un produit (lequel est un $\mathbb{D}$-fibré propre et lisse sur S'), on voit que X sur B_G est un $\mathbb{D}$-fibré propre et lisse (car c'est là une condition locale sur B_G).

On suppose maintenant que G est fini d'ordre $n > 1$, et soit k un anneau où n est invesible, $\mathbb{D} = \mathsf{Der}(k - \mathsf{Mod})$. Alors $E_G \to B_G$ est une $\mathbb{D}$-équivalence, ou ce qui revient au même $e \to B_G$ l'est.[47] Pourtant, après changement de base soit par $S' = E_G$, soit par $S'' = e$, $X' \to X$ (ou ce qui revient au même, $X'' \to X$) n'a guère de raison d'en être aussi. On a en cohomologie

$$\mathbb{R}\Gamma_X(k_X) \simeq \mathbb{R}\Gamma_{BG}(f_*(k_X)) \simeq \mathbb{R}\Gamma_G(G, H^*(Z, k))$$

donc (n étant inversible dans k) : [page 92]

45. N.B. $f : X \to S$ est également *lisse*, car c'est un fibré trivial (un produit) au dessus de deux ouverts $S - \{a\}$, $S - \{b\}$ qui recouvrent S. Mieux : f est à la fois $\mathcal{C}at$-fibrant et $\mathcal{C}at$-cofibrant (car cette condition n'utilise que les propriétés des $X \times_S \mathbf{\Delta}_2 \to \mathbf{\Delta}_2$, pour $\mathbf{\Delta}_2 \to S$).

46. Mais dans le cas du revêtement à 2 feuillets de S, il n'y a pas même de calcul à faire !

47. En fait, e, E_G, B_G sont $\mathbb{D}$-asphériques.

$$H^*(X,k) = \mathbb{R}\Gamma_X(k_X) \simeq H^*(Z,k)^G \longrightarrow H^*(Z,k) \quad ,$$

ce n'est pas en général un isomorphisme. On peut prendre par exemple $G = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, $Z \sim S^1$ comme avant, et G opérant par symétrie de S^1 comme précédemment.

Cet exemple est particulièrement convainquant, car c'est un exemple *avec* S, S' $\mathbb{D}$-*asphériques,* et $S' \to S$ un isomorphisme local (en fait, un revêtement principal de S). C'est aussi un exemple d'un $\mathbb{D}$-fibré lisse et propre $X \to S$, sur une base *asphérique* S, et tel que l'inclusion d'une fibre dans X

$$X_s \longrightarrow X$$

ne soit *pas* une $\mathbb{D}$-équivalence.

Le seul reproche qu'on puisse faire à cet exemple, en comparaison avec le précédent, c'est que les catégories X, S ne sont pas des ensembles ordonnés. Et S ne peut être un ensemble ordonné fini, car l'espace classifiant d'un groupe fini a de la cohomologie en toutes dimensions (sauf erreur).

Mais on peut s'inspirer de cet exemple pour le modifier de façon qu'il se transpose à des ensembles ordonnés. Il suffit de réaliser, pour G donné : p. 57 [page 93]


a) Une opération *libre* de G sur un objet E de $\mathcal{C}at$, telle que $H^*(E,k)^G \simeq k$, *i.e.* $B = E/G$ soit $\mathbb{D}$-asphérique.

b) Une opération de G sur un objet Z, telle que l'inclusion

$$H^*(Z,k)^G \longrightarrow H^*(Z,k)^G$$

ne soit pas [un] isomorphisme.

c) Choisir pour E, Z des ensembles ordonnés, et s'assurer que $B = E/G$ est également représenté par une catégorie ordonnée. Sauf erreur, il en sera de même pour $X = E \times Z/G$. On aura en tout les cas



Cela donne encore un exemple avec X $\mathbb{D}$-fibré propre et lisse, sur une base S $\mathbb{D}$-asphérique, tel que l'inclusion d'une fibre X_s dans X ne soit pas une $\mathbb{D}$-équivalence. On peut même se débrouiller pour que $H^*(Z,k)^G \simeq k$ ce qui implique que X est lui aussi asphérique (mais les fibres de $X \to S$ ne sont pas $\mathbb{D}$-asphériques). Cela donne donc un autre contre-exemple au b) de la prop. 6 (p. 84). [page 94]

Voici la façon la plus économique, je crois, de réaliser la situation que j'ai dite. Topo-

logiquement, je prend

$G = \{\pm 1\}$	
$E = S^2$	sphère euclidienne, sur laquelle $\{\pm 1\}$
	opère par antipodisme $x \mapsto -x$
$B = S^2/\{\pm 1\}$	plan projectif réel
$Z = S^1$	où G opère comme précédemment par la symétrie.

C'est donc un exemple très proche de celui du début (p. 87), où on pouvait aussi considérer la base ($B = S^1$) comme quotient d'un E ($= S^1$) par $G = \{\pm 1\}$ opérant librement (par l'antipodisme $z \mapsto -z$ dans $\mathbb{C} \simeq \mathbb{R}^2$). Mais dans cet exemple, la base n'était pas $\mathbb{D}$-asphérique. p. 58

La façon la plus économique de réaliser la sphère S^2 par un ensemble ordonné est sans doute par sa décomposition "globulaire" par trois paires de cellules de dimension 0, 1, 2, donnant l'ensemble ordonné

$$I \quad = \quad \begin{array}{ccc} S_2^- & & S_2^+ \\ \uparrow & \nearrow\!\!\!

et G y opère par symétrie échangeant S_1^- et S_1^+. Donc l'ensemble ordonné X aura $4\times 13 = 52$ sommets et c'est modeste …

p. 59

Finalement, il semble qu'il ne reste plus rien de la proposition 2 (p.79) introduisant la notion de $\mathbb{D}$-fibration – pas même l'équivalence des deux conditions b) et b') ($\mathbb{D}$-fibration à gauche universelle, $\mathbb{D}$-fibration à droite universelle). On songe à leur relation à une condition a) modifiée ainsi (pour $f : X \to Y$) :

[page 96]

a) Pour tout $Y'' \to Y' \to Y$, avec Y' et Y'' Hot-asphériques (et pas seulement $\mathbb{D}$-asphériques) $X'' = X \times_Y Y'' \to X' = X \times_Y Y'$ est une $\mathbb{D}$-équivalence. (Quand on suppose que Y'' et Y' ont des éléments finaux, c'est la condition que f soit une $\mathbb{D}$-fibration à gauche universelle; quand on suppose que Y'' et Y' ont des éléments initiaux, c'est la condition $\mathbb{D}$-fibration à droite universelle.) [48]

On a évidemment $a) \Rightarrow b)$ et $a) \Rightarrow b')$ et on aimerait que ce soient des équivalences. Voici un axiome intéressant [49] sur $\mathbb{D}$, qui semble vérifié dans tous les cas connus, qui assure l'équivalence souhaitée. Je vais en même temps reformuler **Der 3** en trois volets (*cf.* p. 67).

[page 97]

Der 3 a) Si $Z \in$ Dia est Hot-asphérique, alors $p : Z \to e$ est une $\mathbb{D}$-équivalence, *i.e.* par exemple $p^* : \mathcal{A} = \mathbb{D}(e) \to \mathbb{D}(Z)$ est pleinement fidèle.

b) Soit $f : Z \to Z'$ une flèche dans Dia. Si f est une Hot-équivalence, c'est une $\mathbb{D}$-équivalence (*i.e.* $f^* : \mathbb{D}(Z') \to \mathbb{D}(Z)$ induit une équivalence entre les sous-catégories de Z, Z' `[plutôt de` $\mathbb{D}(Z)$`,` $\mathbb{D}(Z')$`]` formées des objets constants).

a') (Précise considérablement a). Si $Z \in$ Dia est Hot-asphérique, alors on a a), et l'image essentielle de $\mathbb{D}(e) = \mathcal{A}$ dans $\mathbb{D}(Z)$ est formée des objets localement constants de Z, *i.e.* des objets tels que le foncteur

$$Z^\circ \longrightarrow \mathcal{A} \qquad z \longmapsto F_z$$

soit localement constant (*i.e.* transforme toute flèche en isomorphisme) donc isomorphe à un foncteur constant (puisque Z est Hot-asphérique, donc 1-connexe).

Il faut bien noter que dans a'), il ne suffit pas de supposer que Z soit $\mathbb{D}$-asphérique, au lieu de Hot-asphérique. Dès que la $\mathbb{D}$-équivalence est strictement plus faible que Hot, il semble que a') devient toujours faux, en tant que condition sur $\mathbb{D}$, si on y suppose seulement que Z soit $\mathbb{D}$-asphérique. Par exemple, même si $\mathbb{D} = \mathbb{D}_i$ (théorie des i-types d'homotopie relative), la catégorie des objets localement constants sur Z s'exprime en termes du $(i+1)$-type d'homotopie, mais pas en termes de son i-type d'homotopie seul.

[page 98]

Il semble bien que ce soit l'axiome **Der** 3 (a') qui assure l'existence d'une bonne notion ("bilatère") de $\mathbb{D}$-fibration, qui soit stable par changement de base, et qui se réduise soit à "$\mathbb{D}$-fibration à gauche universelle" soit à "$\mathbb{D}$-fibration à droite universelle" et donc qui soit en plus une condition vérifiable pratiquement. Dans le cas où f est propre ou lisse, le critère est particulièrement simple, puisque il se borne à la condition que les $f_* f^* a_Y$, ou les $f_! f^* a_Y$ (pour $a \in \mathcal{A}$), soient des objets localements constants sur Y (donc constants si Y est Hot-asphérique, en vertu de **Der** 3 (a').

p. 60

Je vais également introduire une variante renforcée de **Der** 3 b) :

Der 3 b') Soit $Z' \to Z$ une Hot-équivalence dans Dia. Alors $f^* : \mathbb{D}(Z) \to \mathbb{D}(Z')$ induit une équivalence entre les catégories des coefficients localements constants sur Z et sur Z'. [50]

[page 99]

48. Il faut expliciter le raisonnement. Il suffit de tester même sur $Y'' \to Y'$, où Y'' est ponctuelle, et où Y' a un objet final (resp. initial).

49. *cf.* **Der 3** a') page suivante.

50. **Der** 3 b'_0) : le foncteur est fidèle
b'_1) : le foncteur est pleinement fidèle
b'_2) : le foncteur est une équivalence

Dans certaines questions il suffit de savoir que le dit foncteur est pleinement fidèle. Cela implique que

$$H^*_{\mathbb{D}}(Z,F) \xrightarrow{\sim} H^*_{\mathbb{D}}(Z', f^*F)$$

quand F est localement constant sur Z [51] (mais il n'est pas clair que cette condition implique toujours la pleine fidélité [52]) et de même pour l'homologie

$$H^{\mathbb{D}}_*(Z', f^*F) \longrightarrow H^{\mathbb{D}}_*(Z,F) \quad .$$

Moyennant cette condition, on a la :

Proposition : *On suppose* **Der** 3 b′) *satisfait. Soit* $f : X \to Y$ *dans* Dia. *Pour que* f *soit une* $\mathbb{D}$*-fibration, il faut et il suffit que pour* $Y'' \to Y'$ *sur* Y *qui soit une* Hot*-équivalence,* $X'' = X \times_Y Y'' \to X' = X \times_Y Y'$ *soit une* $\mathbb{D}$*-équivalence.*

À vrai dire, on peut énoncer quelque chose de raisonnable, sans supposer l'axiome **Der** 3 b'). On doit introduire la :

Définition : Soit $f : Z' \to Z$ dans Dia. On dit que f et une $\mathbb{D}$-équivalence 1-*complète* si le foncteur $f^* : \mathbb{D}(Z) \to \mathbb{D}(Z')$ est pleinement fidèle sur la sous-catégorie pleine de $\mathbb{D}(Z)$ formée des coefficients localement constants. On dit que f est une $\mathbb{D}$-équivalence 2-*complète* si elle induit une équivalence entre les catégories des coefficients localement constants.

On dit que Z est *complètement* $\mathbb{D}$*-asphérique*, si $Z \to e$ est une $\mathbb{D}$-équivalence 2-complète. [page 100]

Ainsi, l'axiome **Der** 3 a') peut se reformuler, en disant que si Z est Hot-asphérique, alors Z est complètement $\mathbb{D}$-asphérique. Et de même, **Der** 3 b') en disant que si $f : X \to Y$ dans Dia est une Hot-équivalence, alors f est une $\mathbb{D}$-équivalence 2-complète. Nous allons donner une variante affaiblie, de **Der** 3 a'), qui suffit pour donner une notion raisonnable de $\mathbb{D}$-fibration : p. 61

Der 3 a'') Tout Z dans Dia qui a soit un objet final, soit un objet initial, est complètement $\mathbb{D}$-asphérique.

Définition. On dit que $f : X \to Y$ dans Dia est une $\mathbb{D}$-fibration, si pour

$$Y'' \longrightarrow Y' \longrightarrow Y$$

avec $Y'' \to Y'$ une $\mathbb{D}$-équivalence 1-complète (par exemple Y' et Y'' complètement $\mathbb{D}$-asphèriques), $X'' = X \times_Y Y'' \longrightarrow X' = X \times_Y Y'$ est une $\mathbb{D}$-équivalence.

Cela équivaut à chacune des conditions b), b') de la prop. 2 (page 79), *i.e.* que f soit universellement une $\mathbb{D}$ fibration à gauche, ou universellement une $\mathbb{D}$-fibration à droite (grâce à **Der 3** b'' `[plutôt` a''`]`).

Définition 1. $f : X \to Y$ dans Dia est appelé $\mathbb{D}$-*équivalence cohomologique* (sous-entendu : *complète*) si pour tout $F \in \mathsf{Ob}\,\mathbb{D}(Y)$, F localement constant, on a [page 101]

$$H^*_{\mathbb{D}}(Y,F) \xrightarrow{\sim} H^*_{\mathbb{D}}(X, f^*(F)) \quad .$$

Notion duale $\mathbb{D}$-*équivalence homologique*

$$H^{\mathbb{D}}_*(X, f^*(F)) \xrightarrow{\sim} H^{\mathbb{D}}_*(Y,F) \quad .$$

Si Y est complètement $\mathbb{D}$-asphérique, alors les coefficients localement constants sur Y sont constants, et f est une $\mathbb{D}$-équivalence cohomologique (resp. homologique) si et seulement si c'est une $\mathbb{D}$-équivalence *i.e.* si X est $\mathbb{D}$-asphérique. [53]

51. On pourra dire que $f : Z' \to Z$ est une $\mathbb{D}$-équivalence 0-*complète à gauche,* et 0-*complète à droite* dans le cas homologique.

52. Mais c'est OK si on a des Hom internes dans $\mathbb{D}(Z)_{\text{loc.const.}}$ satisfaisant

$$\mathsf{Hom}(F,G) \simeq \mathsf{Hom}(e_Z, \underline{\mathsf{Hom}}(F,G)) \quad ,$$

où e est l'élément final de $\mathcal{A}$, les Hom étant compatibles aux images inverses.

53. L'axiome **Der** 3 b'_1) implique que toute Hot-équivalence est une $\mathbb{D}$-équivalence cohomologique.

Proposition 1 (Soritale). *Soient $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$. Si f et g sont des $\mathbb{D}$-équivalences cohomologiques, alors gf aussi. Si gf et f sont des $\mathbb{D}$-équivalences cohomologiques, alors g aussi. Si gf est une $\mathbb{D}$-équivalence cohomologique, et si g est une $\mathbb{D}$-équivalence 2-complète* (donc tout F localement constant sur Y provient d'un G localement constant sur Z), *alors f est une $\mathbb{D}$-équivalence cohomologique.*

Définition 2. 1°) $f : X \to Y$ dans Dia est appelé une $\mathbb{D}$-*fibration cohomologique complète,* je dis bien complète, si

a) Pour tout $y \in \overline{\mathsf{Ob}\, Y}$, $X_y \to X/y$ est une $\mathbb{D}$-équivalence cohomologique (complète).

b) Pour tout $y' \to y$ dans Y, $X/y' \to X/y$ est une $\mathbb{D}$-équivalence cohomologique (complète).

c) Ces conditions restent satisfaites après tout changement de base $Y' \to Y$. p. 62

2°) Notion duale de fibration homologique complète. [page 102]

Exemple. Si f est Hot-propre, les flèches des *a*) et *b*) sont des Hot-équivalences, donc en vertu de **Der 3** b'_1) (qu'il faut admettre), ce sont des $\mathbb{D}$-équivalences cohomologiques. Cela signifie que *a*) et *b*) sont valables, et *c*) aussi, car la notion de flèche Hot-propre est stable par changement de base.

Proposition 2. *Soient $f : X \to Y$ $\mathbb{D}$-fibration cohomologique complète, $F \in \mathsf{Ob}\,\mathbb{D}(X)$ localement constant sur X. Alors $f_*(F)$ est localement constant, sa formation commute à tout changement de base, et en particulier se calcule fibre par fibre.*[54]

Corollaire 1. *Soit un diagramme cartésien*

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{q} & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ Y & \xleftarrow{p} & Y' \end{array} \quad .$$

On suppose f $\mathbb{D}$-fibration cohomologique et p une $\mathbb{D}$-équivalence cohomologique. Alors q est une $\mathbb{D}$-équivalence cohomologique.

En effet, on a pour F localement constant sur X [page 103]

$$H^*_{\mathbb{D}}(X, F) \simeq H^*_{\mathbb{D}}(Y, f_*F) \xrightarrow{\sim} H^*_{\mathbb{D}}(Y', p^*f_*F) \simeq H^*_{\mathbb{D}}(Y', f'_*q^*F) \simeq H^*_{\mathbb{D}}(X', q^*F)$$

qed.

Proposition 3. *La notion de $\mathbb{D}$-fibration cohomologique complète est stable par changement de base* (trivial) *et par composition.*

Pour la stabilité par composition, il suffit de noter le corollaire suivant de la proposition 2.

Corollaire 2 (de prop. 2). *Soit $f : X \to Y$. Pour que f soit une $\mathbb{D}$-fibration cohomologique complète, il faut et il suffit que pour tout $Y'' \xrightarrow{p} Y' \to Y$ sur Y, avec p une $\mathbb{D}$-équivalence cohomologique, la flèche correspondante $X'' = X \times_Y Y'' \longrightarrow X' = X \times_Y Y'$ soit aussi une $\mathbb{D}$-équivalence cohomologique.*

C'est nécessaire par le corollaire 1, compte tenu que $f' : X' = X \times_Y Y' \to Y'$ est aussi une $\mathbb{D}$-fibration cohomologique. C'est suffisant, car il suffit de l'appliquer aux cas $\{y\} \to Y/\{y\}$, $Y/y \to Y/y'$, qui sont des $\mathbb{D}$-équivalences cohomologiques en vertu de **Der** 3 b'_1) (ou seulement **Der** 3 a')). [page 104]

Proposition 4. *On suppose que* **Der** 3 a′) *est satisfait* (*i.e.* tout Z dans Dia qui est Hot-asphérique, est complètement $\mathbb{D}$-asphérique). *Soit $f : X \to Y$ dans* Dia. *Les conditions suivantes sont équivalentes* p. 63

1°) *f est une $\mathbb{D}$-fibration cohomologique complète* (conditions *a*), *b*), *c*) de `[la]` définition 2, page 101).

54. Il y a une réciproque *cf.* prop. 3′.

2°) *Pour tout* $F \in \mathsf{Ob}\,\mathbb{D}(X)$*, localement constant,* $f_*(F)$ *est localement constant, se calcule fibre par fibre; et ça reste vrai après tout changement de base* $Y' \to Y$ *(avec* F' *localement constant sur* $X' = X \times_Y Y'$*). (Alors la formation de* $f_*(F)$ *commute à* tout *changement de base).*

3°) *Pour tout* $Y'' \xrightarrow{p} Y'$ *sur* Y*, si* p *est une* $\mathbb{D}$*-équivalence cohomologique, alors* $X'' = X \times_Y Y'' \longrightarrow X' = X \times_Y Y'$ *aussi.*

3′) *Comme 3, en supposant que* Y'' *est la catégorie ponctuelle, et que* Y' *a un élément final : il faut que* $X'' \to X'$ *soit une* $\mathbb{D}$*-équivalence cohomologique.*

[page 105]

Définition 3. On dit que $f : X \to Y$ dans Dia est une $\mathbb{D}$-*fibration complète* si c'est une $\mathbb{D}$-fibration cohomologique complète et une $\mathbb{D}$-fibration homologique complète.

C'est stable par changement de base, par composition.

La définition 3 équivaut à ceci : pour tout $p : Y'' \to Y'$ sur Y, avec Y'' et Y' Hot-asphériques, le morphisme correspondant $X'' \to X'$ est à la fois une $\mathbb{D}$-équivalence cohomologique, et une $\mathbb{D}$-équivalence homologique. (Et il suffit même de le supposer pour $Y'' = e$ et pour Y' avec objet final ou objet initial.) On peut songer à renforcer encore cette condition en exigeant (sans regarder à gauche ni à droite) que $X'' \to X'$ soit une $\mathbb{D}$-équivalence 1-complète. Mais il n'est pas clair que cette notion renforcée soit stable par composition – à moins de la renforcer encore, en exigeant que si $Y'' \to Y'$ est une $\mathbb{D}$-équivalence 1-complète, alors $X'' \to X'$ l'est aussi. L'ennui avec cette définition renforcée, c'est que faute d'avoir une description cohomologique ou homologique de la notion de $\mathbb{D}$-équivalence 1-complète, je ne me sens pas capable de donner des exemples intéressants (non totalement triviaux) de $\mathbb{D}$-fibrations en ce sens très fort. Sauf les Hot-fibrations triviales (*i.e.* à fibres Hot-asphériques) – mais ce n'est pas drôle!

[page 106]

Mais quand on a des produits $*$ associatifs et unitaires et des $\underline{\mathsf{Hom}}$ internes correspondants dans les $\mathbb{D}(X)_{\text{loc. const.}}$, compatibles avec `[les]` images inverses, donc on aura sur X si F et G sont localement constants dans $\mathbb{D}(X)$, et si ε_X désigne l'unité pour $*$ dans $\mathbb{D}(X)$,

$$\mathsf{Hom}(F,G) \simeq \mathsf{Hom}(\varepsilon_X * F, G) \simeq \mathsf{Hom}(\varepsilon_X, \underline{\mathsf{Hom}}(F,G)) \simeq \mathsf{Hom}_{\mathcal{A}}(\varepsilon_e, p_*\,\underline{\mathsf{Hom}}(F,G))\ ,$$

car $\varepsilon_X = p^*(\varepsilon_e)$, où $p : X \to e$, donc dans ce cas une flèche $f : X \to Y$ dans Dia est une $\mathbb{D}$-équivalence 1-complète si (et seulement si) c'est une $\mathbb{D}$-équivalence cohomologique. Donc dans ce cas, si f est une $\mathbb{D}$-fibration cohomologique complète, c'est aussi une $\mathbb{D}$-fibration homologique complète, donc aussi une $\mathbb{D}$-fibration complète (définition 3). (Et même au sens soit-disant renforcé de tantôt : si $Y'' \to Y'$ sur Y est une $\mathbb{D}$-équivalence 1-complète ($\Leftrightarrow$ une $\mathbb{D}$-équivalence cohomologique!) alors $X'' \to X'$ aussi.

p. 64

Il se pose la question de trouver des f qui soient des $\mathbb{D}$-fibrations cohomologiques, ou homologiques. Je ne sais si je serai capable d'en trouver, qui ne soient déjà des HOT-fibrations cohomologiques, ou homologiques (cela revient maintenant au même[55]), car pratiquement je ne sais guère dire qu'une flèche $Z' \to Z$ dans $\mathcal{C}at$ est une $\mathbb{D}$-équivalence cohomologique complète, que si cette flèche est une HOT-équivalence (et en admettant l'axiome **Der** 3 b'_1), ou sa variante affaiblie cohomologique).

[page 107]

Je vais donc chercher les HOT-fibrations, *i.e.* les $f : X \to Y$ tels que pour tout $Y'' \to Y' \to Y$, avec Y'' et Y' asphériques (sous-entendu : pour HOT), $X'' \to X'$ est une Hot-équivalence. (Il suffit même de supposer Y'' réduit à un point, Y' avec objet final ...)

Supposons par exemple f propre (*i.e.* HOT-propre), donc la condition a) de la définition 2, p. 101 satisfaite et de même après tout changement de base. Suffit-il de vérifier

55. Les HOT-équivalences cohomologiques = HOT-équivalences homologiques = HOT-équivalences sans plus.

de plus la condition b), *i.e.* que

$$X/y \longrightarrow X/y' \quad , \qquad \text{pour } y \to y' \text{ dans } Y \ ,$$

sont des Hot-équivalences ? (J'entends en restant sur Y, sans supposer aussi d'avoir la même chose après changement de base). Mais cela reste-il vrai après tout changement de base ? [page 108]

La situation semble ici meilleur pour f lisse (au lieu de propre), en interprétant les conditions a) et b) sous forme homologique, comme signifiant que $f_!(e_X)$ est un objet localement constant de $\mathsf{HOT}(Y)$, qui se calcule fibre par fibre. Comme f lisse implique que $f_!$ commute à tout changement de base, cette hypothèse sur f (que f soit une HOT-fibration cohomologique, peut-être pas complète) est stable par changement de base, donc implique que c'est une HOT-fibration cohomologique complète. Mais cet argument utilise les propriétés générales des dérivateurs pour HOT, que je n'ai pas encore établies - surtout pas dans le domaine $\mathcal{C}at$ tout entier ! Donc il est sain de me méfier. Je préfère tâter la difficulté en restant d'abord dans le cadre du formalisme cohomologique (non commutatif), dont j'ai une certaine maîtrise. Je suppose donc f propre à nouveau, et que les

$$X_y \longrightarrow X/y \quad , \qquad X/y \longrightarrow X/y'$$

soient des HOT-équivalences, je veux prouver la même chose après tout changement de base, au moins que dans la situation [page 109]

$$\begin{array}{ccccc} X & \xleftarrow{q} & X' & \xleftarrow{q'} & X'' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f''} \\ Y & \xleftarrow[p]{} & Y' & \xleftarrow[p']{} & Y'' \end{array}$$

si Y', Y'' sont asphériques, alors q' est une Hot-équivalence. Si je veux l'établir par critère cohomologique, je dois commencer par prendre sur X' un faisceau d'*ensembles* localement constant F, et prouver que $\Gamma(X', F) \xrightarrow{\sim} \Gamma(X'', q'^* F)$. Comme ce faisceau ne provient pas de X, je suis ennuyé pour appliquer l'hypothèse sur f, qui concerne à priori des faisceaux d'ensembles constants sur X, ou sur les X/y. Mais on devrait avoir ceci : p. 65

Lemme. *Soit $f : X'' \to X'$. Alors f est une* HOT*-équivalence* i.e.

$$H^*_{\mathsf{HOT}}(X', a_{X'}) \xrightarrow{\sim} H^*_{\mathsf{HOT}}(X'', a_{X''})$$

est [un] *isomorphisme pour tout $a \in \mathsf{Hot} = \mathsf{HOT}(e)$, si et seulement si f est une* Hot*-équivalence,*[56] *et alors f est même une* HOT*-équivalence* 2*-complète* (j'ai besoin seulement de : HOT-équivalence cohomologique et homologique complète) i.e. *pour tout $\xi \in \mathbb{D}(X')$ localement constant sur X', on a*[57]

$$H^*_{\mathsf{HOT}}(X', \xi) \xrightarrow{\sim} H^*_{\mathsf{HOT}}(X'', q'^*(\xi)) \quad .$$

[page 110]

La première assertion doit résulter des formules

$$H^*_{\mathsf{HOT}}(Z, a_Z) \simeq \underline{\mathsf{Hom}}_{\mathsf{Hot}}(\mathsf{hot}(Z), a) \qquad (*)$$

$$\text{(et aussi} \qquad H_*^{\mathsf{HOT}}(Z, a_Z) \simeq \mathsf{hot}(Z) \times a \qquad \text{)}$$

56. Attention ici [mot illisible] la distinction entre HOT-équivalence et Hot-équivalence.
57. Est-ce vrai aussi pour les dérivateurs $\mathbb{D}_i$?

donc si

$$\mathsf{hot}(X'') \xrightarrow{\sim} \mathsf{hot}(X') \qquad (**)$$

est [un] isomorphisme, alors

$$H^*_{\mathsf{HOT}}(X', a_{X'}) \longrightarrow H^*_{\mathsf{HOT}}(X'', a_{X''})$$

est [un] isomorphisme, puisque c'est déduit de $(*)$ en prenant $\underline{\mathsf{Hom}}_{\mathsf{Hot}}(\,.\,, a)$. Inversement, si $(*)$ est toujours [un] isomorphisme, exprimant les deux membres [mot illisible] de $\underline{\mathsf{Hom}}_{\mathsf{Hot}}(\,.\,, a)$ et prenant les π_0, on trouve que

$$\mathsf{Hom}_{\mathsf{Hot}}(\mathsf{hot}(X'), a) \xrightarrow{\sim} \mathsf{Hom}_{\mathsf{Hot}}(\mathsf{hot}(X''), a)$$

est un isomorphisme pour tout a, donc $(**)$ est un isomorphisme.

Mais le fait que ça implique que f'' soit une HOT-équivalence cohomologique complète, *i.e.* que la relation $(*)$ reste vraie pour un $\xi \in \mathbb{D}(X')$ localement constant sur X', me paraît une propriété délicate du dérivateur HOT, sur laquelle il me faudra revenir.

Donc le lemme est loin d'être établi, faute d'avoir seulement construit le dérivateur HOT, sans même parler d'en établir les propriétés spéciales délicates ! Mais je n'ai aucune raison de douter du lemme, il fait partie de la kyrielle des intuitions de base que je voudrais fonder solidement.

Le lemme implique qu'une $\mathbb{D}$ = HOT-fibration (au sens de la définition 2 page 81, revue et corrigée à la page 96-97) est en fait déjà une HOT-fibration cohomologique et homologique complète. Or on a vu que si f est propre, f est une $\mathbb{D}$-fibration si et seulement si les conditions précédentes sur Y (sans changement de base) sont satisfaites. Et dualement pour f lisse. p. 66 [page 111]

11.11.90

Je sens le besoin de revoir les notions de $\mathbb{D}$-fibrations en tous genres (p. 76 ff). D'abord les diverses variantes utiles de l'axiome **Der** 3 sur les dérivateurs :

Der 3 *a*) [58] Si $Z \in$ Dia est Hot-asphérique, il est $\mathbb{D}$-asphérique *i.e.* $\mathcal{A} = \mathbb{D}(e) \to \mathbb{D}(Z)$ est pleinement fidèle.

a') Comme *a*), avec en plus la caractérisation de l'image essentielle de $\mathcal{A}$ dans $\mathbb{D}(Z)$, comme formée des $\mathbb{D}$-coefficients localements constants.

Der 3 *b*) Si $f : Z' \to Z$ dans Dia est une Hot-équivalence, alors c'est une $\mathbb{D}$-équivalence, *i.e.* le foncteur $f^* : \mathbb{D}(Z) \to \mathbb{D}(Z')$ induit une équivalence entre les sous-catégories formées des coefficients constants (ou encore un foncteur pleinement fidèle $\mathbb{D}(Z)_{\text{loc. const.}} \longrightarrow \mathbb{D}(Z')$).

b'_1) Si f comme ci-dessus, alors f est une $\mathbb{D}$-équivalence 1-complète, *i.e.* le foncteur $f^* : \mathbb{D}(Z) \to \mathbb{D}(Z')$ induit un foncteur pleinement fidèle entre les sous-catégories pleines formées des objets localement constants. [page 112]

b'_2) Comme b'_1), mais avec $\mathbb{D}$-équivalence 2-complète au lieu de 1-complète, *i.e.* f^* induit une équivalence entre les sous-catégories formées des coefficients localement constants.


b''_{coh}) Si $f : Z' \to Z$ dans Dia est une Hot-équivalence, alors c'est une $\mathbb{D}$-équivalence cohomologique complète, *i.e.* pour tout $F \in \mathsf{Ob}\ \mathbb{D}(Z)$ qui est localement constant, on a

$$H^*_{\mathbb{D}}(Z, F) \xrightarrow{\sim} H^*_{\mathbb{D}}(Z', f^*F) \quad .$$

b''_{hom}) Si $f : Z' \to Z$ dans Dia est une Hot-équivalence, c'est une $\mathbb{D}$-équivalence homologique complète, *i.e.* pour tout $F \in \mathsf{Ob}\ \mathbb{D}(Z)$ qui est localement constant, on a [59]

$$H^{\mathbb{D}}_*(Z', f^*F) \xrightarrow{\sim} H^{\mathbb{D}}_*(Z, F) \quad . \qquad \text{p. 67}$$

On a le diagramme d'implications tautologiques pour les variantes de **Der** 3 :



.

Dans tous les cas à ma connaissance, les dérivateurs satisfont la condition la plus forte **Der** 3 b'_2. [page 113]

Je rappelle aussi la :

Définition 1 : Soit $f : X \to Y$ dans Dia. On dit que f est une $\mathbb{D}$-*équivalence cohomologique* (sous-entendu : "*complète*") si pour tout $\mathbb{D}$-coefficient F localement constant sur Y,

$$H^*_{\mathbb{D}}(Y, F) \xrightarrow{\sim} H^*_{\mathbb{D}}(X, f^*F) \quad ;$$


on dit que f est une $\mathbb{D}$-*équivalence homologique* ("*complète*") si pour tout F comme [ci-]dessus,

$$H^{\mathbb{D}}_*(X, f^*F) \xrightarrow{\sim} H^{\mathbb{D}}_*(Y, F) \quad .$$

On dit que f est une $\mathbb{D}$-*équivalence* 1-*complète* (resp. 2-*complète*) si le foncteur

$$f^* : \mathbb{D}(Y)_{\text{loc. const.}} \longrightarrow \mathbb{D}(X)_{\text{loc. const.}}$$

est pleinement fidèle (resp. une équivalence).



.

Si dans les sous-catégories $\mathbb{D}(X)_{\text{loc. const.}}$ il y a une loi $*$ (associative, unitaire, commutative) et des Hom internes associés, préservés par les images inverses, alors les $\mathbb{D}$-équivalences cohomologiques sont déjà 1-complètes et sont donc des $\mathbb{D}$-équivalences homologiques, donc dans ce cas particulier p. 68

[page 114 vide]

[page 115]

58. *cf.* aussi la série **Der 3** $c\ldots$, page 124 ff.
59. *cf.* variante $\pm$ spéciale pour HOT pages 124-125.

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{D}\text{-équivalence 2-complète} & & \\ \Downarrow & & \\ \mathbb{D}\text{-équivalence 1-complète} & \Longleftrightarrow & \mathbb{D}\text{-équivalence cohomologique} \\ & & \Downarrow \\ & & \mathbb{D}\text{-équivalence homologique} \\ & & \Downarrow \\ & & \mathbb{D}\text{-équivalence} \end{array} .$$

Dans $\mathbb{D} = \mathsf{HOT}$, toutes ces notions devraient être équivalentes, et équivalentes à la condition encore plus faible en apparence, que $f : X \to Y$ soit une Hot-équivalence. Mais je ne connais que HOT comme dérivateur où la $\mathbb{D}$-équivalence d'une flèche $f : X \to Y$ dans Dia implique déjà la $\mathbb{D}$-équivalence cohomologique (complète), ou la $\mathbb{D}$-équivalence homologique (complète), voire même la $\mathbb{D}$-équivalence 1-complète. (Je reviendrai là-dessus tantôt.)

Proposition 1. *Soit $f : X \to Y$ dans* Dia. *Conditions équivalentes :*

a) *Pour tout $y \in \mathsf{Ob}\, Y$, l'inclusion $X_y \to X/y$ est une $\mathbb{D}$-équivalence, et pour toute flèche $y' \to y$ dans Y, $X/y' \to X/y$ est une $\mathbb{D}$-équivalence.*

b) *Pour tout coefficient <u>constant</u> F sur Y, $f_* f^* F$ est localement constant, et se calcule "fibre par fibre".*

(C'est la prop. 1, p. 76).

Proposition 1′. Dual.

[page 116]

Définition 2. Sous les conditions équivalentes de la proposition 1, on dit que f est une $\mathbb{D}$-*fibration cohomologique faible.* Sous les conditions duales, que f est une $\mathbb{D}$-*fibration homologique faible.*

C'est ce que dans la définition 1, p. 77 j'appelais "$\mathbb{D}$-fibration cohomologique" ou "$\mathbb{D}$-fibration à gauche", et dualement. Maintenant la notion me paraît trop faible pour mériter ce nom, que je réserve pour le cas "complet".

Proposition 2. *Les $\mathbb{D}$-fibrations cohomologiques faibles sont stables par changements de base lisses, les $\mathbb{D}$-fibrations homologiques faibles stables par changements de base propres.*

Je devrais construire un exemple où f est une $\mathbb{D}$-fibration cohomologique faible, et ne l'est plus après changement de base.

Proposition 3. *Soit*

p. 69

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad f \quad} & X' \\ & {\scriptstyle p}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle p'} & \\ & S & \end{array}$$

dans Dia, *avec p et p' des $\mathbb{D}$-fibrations cohomologiques faibles* (resp. *des $\mathbb{D}$-fibrations homologiques faibles*), *soit $S_0 \subset S$ tel que $\pi_0(S_0) \to \pi_0(S)$ soit surjective. Pour que f soit une $\mathbb{D}$-équivalence, il suffit que les $f_s : X_s \to X'_s$, pour $s \in S_0$, le soient.*

Proposition 4. *Si $f : X \to Y$ dans* Dia *est $\mathbb{D}$-propre* (resp. $\mathbb{D}$-*lisse*), *alors f est une $\mathbb{D}$-fibration cohomologique* (resp. *homologique*) *faible si et seulement si pour tout F constant sur Y, $f_* f^* F$* (resp. *$f_! f^* F$*) *est localement constant sur Y. Et s'il en est ainsi, pour tout $Y' \to Y$ dans* Dia, *$f' : X' = X \times_Y Y' \to Y'$ est encore une $\mathbb{D}$-fibration cohomologique* (resp. *homologique*) *faible.*

Immédiat sur le critère *b*) de la proposition 1.

Proposition 5. *Soit $f : X \to Y$ dans* Dia. *Considérons les conditions suivantes :*

[page 117]

a) *Pour tout $Y'' \to Y'$ sur Y dans* Dia, *si Y'' et Y' sont* Hot*-asphériques, alors*

$$X'' = X \times_Y Y'' \longrightarrow X' = X \times_Y Y'$$

est une $\mathbb{D}$-équivalence.

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & X' & \longleftarrow & X'' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longleftarrow & Y' & \xleftarrow[p]{} & Y'' \end{array}$$

a′) *Comme* a), *mais en supposant $p : Y'' \to Y'$ une* Hot*-équivalence (au lieu de supposer Y', Y''* Hot*-asphériques).*

a$_1$) *Comme* a), *mais en supposant (au lieu de l'asphéricité) que Y' a un objet final, et Y'' est la catégorie unité.*

a$_2$) *Comme* a), *mais en supposant que Y' a un objet cofinal, et Y'' est la catégorie unité.*

b$_1$) *f est une $\mathbb{D}$-fibration cohomologique faible, et le reste après tout changement de base.*

b$_2$) *f est une $\mathbb{D}$-fibration homologique faible, et le reste après tout changement de base.*

On a alors le diagramme d'implications tautologiques p. 70

$$\begin{array}{ccccccc} & & & a' & & & \\ & & & \Downarrow & & & \\ & & & a & & & \\ & \swarrow & & & & \searrow & \\ a_1 & \Longleftrightarrow & b_1 & & b_2 & \Longleftrightarrow & a_2 \end{array} \quad .$$

Lorsque $\mathbb{D}$ satisfait à l'axiome **Der** 3 a′ (p. 111), *alors toutes ces conditions, sauf* a′), *sont équivalentes. Lorsque $\mathbb{D}$ satisfait à l'axiome* **Der** 3 b$'_1$ *(ou seulement* **Der** 3 b$''_{\text{coh}}$ ou b$''_{\text{hom}}$*), alors toutes les conditions (y inclus* a′*) sont équivalentes.*

Pour simplifier, on va par la suite supposer que l'axiome **Der** 3 a') est satisfait.

Définition 3. Sous les conditions équivalentes a, a_1, b_1, a_2, b_2 de la proposition 4, on dit que f est une $\mathbb{D}$*-fibration.*

Proposition 6. *Supposons que $f : X \to Y$ dans* Dia *soit $\mathbb{D}$-propre* (resp. $\mathbb{D}$*-lisse*). *Conditions équivalentes :* [page 118]

a) *f est une $\mathbb{D}$-fibration.*

b) *f est une $\mathbb{D}$-fibration cohomologique* (resp. *homologique*) *faible.*

c) *Pour tout $y' \to y$ dans Y, $X/y' \to X/y$* (resp. $y\backslash X \to y'\backslash X$) *est une $\mathbb{D}$-équivalence.*

d) *Pour tout F constant sur Y, $f_* f^* F$* (resp. $f_! f^* F$) *est localement constant sur Y.*

d′) *Pour tout F localement constant sur Y, $f_* f^* F$* (resp. $f_! f^* F$) *est localement constant sur Y.*

Cela résulte formellement de Prop. 4 et Prop. 5.

Corollaire. *Supposons $f : X \to Y$ $\mathcal{C}at$-fibrant* (resp. $\mathcal{C}at$*-cofibrant*). *Pour que f soit une $\mathbb{D}$-fibration, il faut et il suffit que pour tout $u : y \to y'$ dans Y, $u^* : X_{y'} \to X_y$* (resp. $u_* : X_y \to X_{y'}$) *soit une $\mathbb{D}$-équivalence.*

Il est immédiat que la notion de $\mathbb{D}$-fibration est stable par changement de base, mais il est douteux qu'elle le soit par composition. [60] (Ici encore, j'ai omis de faire un contre-

60. N.B. Si les $\mathbb{D}$-équivalences sont déjà des Hot-équivalences, alors la notion coïncide avec celle de Hot-fibration, et elle est stable par composition. Également, si les $\mathbb{D}$-équivalences sont au sens des $\mathbb{D}$-équivalences cohomologiques, ou homologiques, alors la notion coïncide avec celle des $\mathbb{D}$-fibrations cohomologiques (resp. homologiques) ci-dessous, et est également stable par composition.

exemple, avec des dérivateurs $\mathbb{D} = \mathsf{Der}(k\text{-}\mathsf{Mod})$ disons.) Autre lacune de la notion : il n'est pas clair, si f est une $\mathbb{D}$-fibration et F un $\mathbb{D}$-coefficient sur Y, si

$$f_* f^* F \qquad \text{et} \qquad f_! f^* F$$

se calculent "fibre par fibre", comme on s'attendrait dans le cas d'un "fibré". p. 71

Par contre, voici un résultat sympa : [page 119]

Proposition 7. *Soit $f : X \to Y$ dans* Dia*. Conditions équivalentes :*

a) *f est une $\mathbb{D}$-équivalence "universelle",* i.e. *pour tout $Y' \to Y$ dans* Dia*, $f' : X' = X \times_Y Y' \to Y'$ est une $\mathbb{D}$-équivalence.*

b) *f est une $\mathbb{D}$-fibration à fibres $\mathbb{D}$-asphériques.*

Définition 4. Sous les conditions équivalentes de la proposition 7, on dit que f est une $\mathbb{D}$-fibration *triviale*.

Mais attention, f peut-être une $\mathbb{D}$-fibration et une $\mathbb{D}$-équivalence, sans que la $\mathbb{D}$-fibration soit triviale *i.e.* sans que les fibres soient $\mathbb{D}$-asphériques, cf. p. 87 et suivantes. Et également (devrait remonter) même si $\mathbb{D}$ satisfait **Der** 3 b_2 (la plus forte des variantes de **Der** 3), donc quand toutes les conditions de la proposition 5, y inclus a'), sont équivalentes, celles-ci (*i.e.* que f soit une $\mathbb{D}$-fibration) n'impliquent pourtant pas, en général, que dans la condition a') on puisse se borner à $p : Y'' \to Y'$ une $\mathbb{D}$-équivalence (au lieu d'une Hot-équivalence). En d'autres termes, si on a un diagramme cartésien dans Dia

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{q} & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ Y & \xleftarrow[p]{} & Y' \end{array} \quad ,$$

avec f une $\mathbb{D}$-fibration, et p une $\mathbb{D}$-équivalence, il ne s'ensuit pas forcément que q soit une $\mathbb{D}$-équivalence. (Mais ce sera pourtant le cas, "bien sûr", si $\mathbb{D} = \mathsf{HOT}$.)

Par contre, on a : [page 120]

Proposition 8. *Soit $f : X \to Y$ dans* Dia*. Conditions équivalentes :*

a) *f est une $\mathbb{D}$-fibration.*

b) *Pour tout $p : Y'' \to Y'$ sur Y, si p est une $\mathbb{D}$-équivalence* 1*-complète* (déf. 1, p. 113)*, alors $q : X'' \to X'$ est une $\mathbb{D}$-équivalence.*

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & X' & \xleftarrow{q} & X'' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f''} \\ Y & \longleftarrow & Y' & \xleftarrow[p]{} & Y'' \end{array}$$

Corollaire. *Supposons que dans* Dia*, toute $\mathbb{D}$-équivalence soit* 1*-complète.* (N.B. Je ne connais que le dérivateur HOT pour satisfaire à cette condition, qui paraît quasiment caractéristique de HOT.) *Alors $f : X \to Y$ est une $\mathbb{D}$-fibration si et seulement si pour tout $p : Y'' \to Y'$ sur Y, si p est une $\mathbb{D}$-équivalence, alors $q : X'' \to X'$ aussi. Dans ce cas exceptionnel parmi les dérivateurs, la notion de $\mathbb{D}$-fibration est stable par composition* (ce qui est tautologique sur le critère que je viens de donner.)

On va renforcer la notion de $\mathbb{D}$-fibration, pour la rendre plus souple, et notamment stable par composition. p. 72

Proposition 9. *Soit $f : X \to Y$ dans* Dia*. Conditions équivalentes :*

a) *Pour tout $y \in Y$, $X_y \to X/y$ est une $\mathbb{D}$-équivalence cohomologique* (déf. 1, p. 113)*, et de même pour $X/y \to X/y'$ pour toute flèche $y \to y'$ dans Y. Et ces conditions sur f restent valables après tout changement de base* (N.B. il suffit que la première de ces conditions le reste). [page 121]

b) *pour tout $F \in \mathsf{Ob}\ \mathbb{D}(X)$ localement constant, f_*F est localement constant sur Y et se calcule "fibre par fibre" – et itou après tout changement de base.*

c) *Pour tout $p : Y'' \to Y'$ sur Y, si p est une $\mathbb{D}$-équivalence cohomologique, alors il en est de même de $q : X'' \to X'$.*

c$'$) *Comme* c, *mais en supposant comme hypothèse sur p que Y'' soit la catégorie finale, et Y' ait un objet final.*

Démonstration. Dans l'ordre ($\pm$ tautologique)

$$\mathrm{a} \Longrightarrow \mathrm{b} \Longrightarrow \mathrm{c} \Longrightarrow \mathrm{c}' \Longrightarrow \mathrm{a} \quad .$$

Définition 5. Sous les conditions équivalentes de la proposition 9, on dit que f est une $\mathbb{D}$-*fibration cohomologique*. Sous les conditions duales, on dit que f est une $\mathbb{D}$-*fibration homologique*. On dit que f est une $\mathbb{D}$-*fibration forte*, si c'est à la fois une $\mathbb{D}$-fibration cohomologique et une $\mathbb{D}$-fibration homologique.

Ces notions renforcent la notion de $\mathbb{D}$-fibration. Elles ont l'avantage de plus d'être stables par composition, non seulement par changement de base.

La notion de $\mathbb{D}$-fibration forte a été choisie pour coiffer les deux notions duales de $\mathbb{D}$-fibration cohomologique et homologique (à défaut d'une meilleur notion) tout en restant stable par composition. On pourrait exiger que pour tout [page 122]

$$Y'' \longrightarrow Y'$$

sur Y, avec Y', Y'' Hot-asphériques, $q : X'' \to X'$ soit une $\mathbb{D}$-équivalence 1-complète (voire même 2-complète), appeler ça les $\mathbb{D}$-*fibrations* 1-*complètes* (resp. 2-*complètes*). Ça renforce de façon assez élégante la notion de $\mathbb{D}$-fibration forte, mais a le grand tort de ne pas être stable par composition (que je sache !), sauf dans le cas particulier où on a des Hom internes sympas (cf. bas de la page 113), auquel cas la notion de $\mathbb{D}$-équivalence implique déjà celle de $\mathbb{D}$-équivalence 1-complète, donc aussi celle de $\mathbb{D}$-équivalence homologique. p. 73 Donc dans ce cas [page 123]

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{D}\text{-fibration cohomologique} & \Longleftrightarrow & \mathbb{D}\text{-fibration 1-complète} \\ \Downarrow & & \\ \mathbb{D}\text{-fibration homologique} & , & \end{array}$$

et il n'y a pas à chercher plus loin que les $\mathbb{D}$-fibrations cohomologiques.

On pourrait songer, il est vrai, à définir (dans le cas général) une notion plus forte, en exigeant que pour tout $p : Y'' \to Y'$ sur Y qui soit une $\mathbb{D}$-équivalence 1-complète, $q : X'' \to X'$ soit aussi une $\mathbb{D}$-équivalence 1-complète. Cette fois-ci, la notion est stable par composition, mais elle me paraît néanmoins inutilisable (en dehors du cas qu'on vient de dire, où elle coïncide avec la notion de $\mathbb{D}$-fibration cohomologique, ou encore de $\mathbb{D}$-fibration forte), car n'étant pas en mesure de décrire les $\mathbb{D}$-équivalences 1-complètes, je suis aussi incapable de donner des exemples non triviaux de $\mathbb{D}$-fibrations "strictement 1-complètes".

Pour vérifier qu'une $f : X \to Y$ dans Dia est une $\mathbb{D}$-fibration cohomologique, il faut savoir vérifier que des flèches $q : Z' \to Z$ dans Dia sont des $\mathbb{D}$-équivalences cohomologiques, donc que $H^*_{\mathbb{D}}(Z, F) \xrightarrow{\sim} H^*_{\mathbb{D}}(Z', q^*(F))$ est [un] isomorphisme pour tout $F \in \mathsf{Ob}\ \mathbb{D}(Z)$ qui est localement constant sur Z. Or je ne sais vérifier un énoncé de cette nature (en dehors du cas où je sais d'avance que Z est complètement $\mathbb{D}$-asphérique, *i.e.* que les coefficients localement constants sur Z sont en fait constant) que si q est déjà une Hot-équivalence. C'est dire que je ne sais exhiber des $\mathbb{D}$-fibrations cohomologiques, que quand ce sont déjà des HOT-fibrations cohomologiques. Je veux, dans la suite, donner des critères utilisables [page 124]

pour des HOT-fibrations. Mais on va axiomatiser ces développements, en gardant un $\mathbb{D}$ général, sur lequel je vais faire une hypothèse si draconienne que pratiquement, je ne connais que le dérivateur HOT qui y satisfait. Il s'agit de c_1 ci dessous.


Der 3 c_1) Toute $\mathbb{D}$-équivalence est une $\mathbb{D}$-équivalence cohomologique.

c_2) Toute $\mathbb{D}$-équivalence est une $\mathbb{D}$-équivalence homologique.

c') Toute $\mathbb{D}$-équivalence est 1-complète. [page 125]

c'') Toute $\mathbb{D}$-équivalence est 2-complète.

N.B. On a



tautologiquement. Je ne connais que HOT pour satisfaire l'ensemble des deux plus faibles conditions c_1, c_2. Et en fait, sous réserve d'écrire la théorie du dérivateur HOT, il doit être vrai qu'elle satisfait même la forme la plus forte c''. (Et les HOT-équivalences doivent être simplement les Hot-équivalences.) (Cf. le "lemme" p. 109.) p. 74

La proposition suivante est une tautologie.

Proposition 10. *Supposons que $\mathbb{D}$ satisfasse la condition* **Der** 3 c_1 (p. 124), *par exemple $\mathbb{D} = HOT$. Alors la notion de $\mathbb{D}$-fibration coïncide avec celle de $\mathbb{D}$-fibration cohomologique. Elle est donc stable par composition. Pour que $f : X \to Y$ soit une $\mathbb{D}$-fibration, il faut et il suffit que pour $p : Y'' \to Y'$ sur Y, si p est une $\mathbb{D}$-équivalence, il en est de même de $q : X'' \to X'$.*

Corollaire 1. *Si $f : X \to Y$ dans* Dia *est $\mathbb{D}$-propre, alors f est une $\mathbb{D}$-fibration cohomologique si et seulement si pour toute flèche $y' \to y$ dans Y, $X/y' \to X/y$ est une $\mathbb{D}$-équivalence* (i.e. *si et seulement si f est une $\mathbb{D}$-fibration cohomologique faible*).

Appliquer le critère c) de [1a] prop. 6.

Corollaire 2. *Supposons que $\mathbb{D}$ satisfasse* **Der** 3 (c_1, c_2) (par exemple $\mathbb{D} = \mathsf{HOT}$). *Alors pour une flèche $f : X \to Y$ dans* Dia, *il revient au même que f soit une $\mathbb{D}$-fibration, une $\mathbb{D}$-fibration cohomologique, ou une $\mathbb{D}$-fibration homologique. Si f est propre* (resp. *lisse*), *il revient au même de dire que f est une $\mathbb{D}$-fibration cohomologique* (resp. *homologique*), *faible.* [page 126]

On voit donc que dans $\mathcal{C}at$, on doit avoir une seule notion raisonnable de HOT-fibration, qui coïncidera avec celle de HOT-fibration cohomologique ou homologique. Mais pour que cette notion soit dès à présent disponible, il faudrait que le dérivateur HOT soit déjà construit sur le domaine Dia $= \mathcal{C}at$ tout entier. Or ce n'est pas chose faite encore (et il n'a donc pas pu être question de prouver les propriétés de HOT dont il vient d'être question, disons la plus forte **Der** 3 c'').

Néanmoins, je voudrais développer de façon directe ("élémentaire") la notion de Hot-fibration, sans me référer à la théorie du dérivateur HOT, et aux développements théoriques précédents.

p. –

LES DÉRIVATEURS

ALEXANDRE GROTHENDIECK

Chapitre II
Cofinalité (à droite et à gauche)
(préliminaire à la cofinalité cohomologique)

p. –

Note des éditeurs de l'édition transcrite.

Ce texte a été déchiffré et transcrit en LaTeX 2_ε par M. Künzer. Il a été édité par M. Künzer, J. Malgoire, et G. Maltsiniotis. La transcription est aussi fidèle que possible au manuscrit. Pour les quelques corrections évidentes, ou rares commentaires des éditeurs, ainsi que pour la numérotation originale des pages du manuscrit, les caractères de machine à écrire `[typewriter]` entre crochets sont utilisés. Un point d'interrogation entre crochets signifie que l'on n'est pas sûr du mot qui précède.
Cette édition est provisoire. Les remarques, commentaires et corrections sont bienvenus. Envoyer un message à :
[**e-mail address removed**]

G. Maltsiniotis

p. 1
`[page 1]`

1 Cofinalité cohomologique

Soit

$$\alpha : C' \longrightarrow C$$

un foncteur de (petites) catégories, $\mathcal{M}$ une catégorie ayant les $\varprojlim$ pertinentes, F un préfaisceau (donc contravariant en i) sur C à valeurs dans $\mathcal{M}$. On a un homomorphisme canonique dans $\mathcal{M}$

$$\varprojlim_{C} F \longrightarrow \varprojlim_{C'} \underbrace{\alpha^*(F)}_{F\circ\alpha} \tag{1}$$

et on veut des conditions sur α pour que ce soit toujours un isomorphisme ([1]). On est ramené aussitôt au cas où $\mathcal{M} = (\mathrm{Ens})$. Disons qu'une catégorie I est *faiblement filtrante à gauche* si $I \neq \emptyset$ et si $\forall\, i', i'' \in \mathrm{Ob}\, I$, $\exists\, i \in \mathrm{Ob}\, I$ et des flèches

$$\begin{array}{ccc} & & i' \\ & \nearrow & \\ i & & \\ & \searrow & \\ & & i''. \end{array}$$

Cela signifie aussi que $\mathrm{Ob}\, I$ en tant qu'ensemble ordonné est filtrant à gauche.

Proposition. *Pour que* (1) *soit toujours un isomorphisme* (α *'anodin pour* $\varprojlim$ *'), il suffit que pour tout* $x_0 \in \mathrm{Ob}\, C$*, la catégorie* $x_0\backslash C'$ *des couples* (x', u)*, avec* $x' \in \mathrm{Ob}\, C'$*,* $u : \alpha(x') \longrightarrow x$*, soit faiblement filtrante à gauche* ([2], [3]).

Ceci n'implique pas la conclusion plus forte

$$F \underbrace{\xrightarrow{\sim}}_{\text{adj.}} \alpha_*\alpha^* F$$

que le morphisme d'adjonction canonique soit un isomorphisme. Pour qu'il soit ainsi, il suffit que $\forall\, x_0 \in C$, le foncteur $\alpha/x_0 : C'/x_0 \longrightarrow C/x_0$ induit par α soit 'anodin pour les $\varprojlim$ ', ce qui signifie aussi que pour toute flèche $u : x_1 \longrightarrow x_0$ dans C, la catégorie $C' \underset{u}{\vee}$ formée des triples (x', ξ, η) avec $x' \in \mathrm{Ob}\, C'$ et $\xi : x_1 \longrightarrow \alpha(x')$, $\eta : \alpha(x') \longrightarrow x_0$ rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} x_1 & & \xrightarrow{\quad u \quad} & & x_0 \\ & \searrow^{\xi} & & \nearrow_{\eta} & \\ & & \alpha(x'), & & \end{array}$$

est faiblement filtrante à gauche.

[page 2]
p. 2

Plus généralement, considérons

$$\begin{array}{ccccc} X' = C' & & \xrightarrow{\quad \alpha \quad} & & C = X \\ & \searrow^{f'} & & \swarrow_{f} & \\ & & S & & \end{array}$$

et posons nous la question quand l'homomorphisme fonctoriel, par rapport à un préfaisceau F variable sur X,

$$f_*(F) \longrightarrow f'_*(\alpha^*(F))$$

est toujours un isomorphisme. (Le cas précédent est celui où $S = X$, $f = \mathrm{id}_X$.) On trouve qu'il suffit que $\forall\, s_0 \in \mathrm{Ob}\, S$, le foncteur

$$\alpha/s_0 : X'/s_0 \longrightarrow X/s_0$$

1. On dit alors que α est *cofinal,* cf. SGA 4, I 8.1, ou 3.3, p. 45.
2. Cf. amélioration des remarques p. 5.
3. Cf. 3.2, p. 43-44, pour conditions nécessaires et suffisantes de cofinalité.

soit 'anodin pour les $\varprojlim$ ', et pour ceci, il suffit que pour `[tout]` objet (x_0, u_0) de X/s_0 (où

$$f(x_0) \xrightarrow{u_0} s_0)$$

la catégorie $(x_0, u_0)\backslash(X'/s_0)$ soit faiblement filtrante à gauche.

Cette catégorie s'interprète comme celle des triples (x', ξ, u) avec [page 3]

$$\begin{cases} x' \in \mathrm{Ob}\, C' \\ u : g(x') = f(\alpha(x')) \longrightarrow s_0 \\ \xi : x_0 \longrightarrow \alpha(x') \end{cases}$$

`[plutôt` $f'(x')$ `au lieu de` $g(x')$`]` de façon à rendre commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc} f(x_0) & \xrightarrow{\quad u_0 \quad} & s_0 \\ & {\scriptstyle f(\xi)} \searrow \quad \nearrow {\scriptstyle u} & \\ & f(\alpha(x')). & \end{array}$$

Je voudrais dégager des variantes de ces énoncés dans le cadre cohomologique, les foncteurs $\varprojlim$ étant remplacés par des $R\Gamma$ (de préfaisceaux abéliens p.ex. - mais on pense aussi aux 'cas non commutatifs', définis par des dérivateurs notamment.)

Si I est une catégorie *ordonnée finie*, la condition `[faiblement]` filtrante à gauche p. 3
équivaut à l'existence d'un objet initial, ce qui implique que I est contractile. Dans les énoncés précedents, il se pourrait que la bonne philosophie soit de remplacer partout 'faiblement filtrante à gauche' par 'contractile'. Si p.ex. C est la catégorie finale, alors remplacer la condition que C' soit filtrante à gauche, par l'acyclicité. C'est en tous cas en accord avec l'esprit de l'axiome Der_5 (cas où J est la catégorie finale). En effet, dans le cas où $C = e$, la condition que α soit anodin pour les $\varprojlim$ équivaut visiblement à dire que le foncteur $\alpha^* : \mathcal{M} \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(C'^o, \mathcal{M})$, associant à tout $F \in \mathcal{M}$ le préfaisceau constant de valeur F sur C', donne un morphisme d'adjonction [page 4]

$$\varprojlim_{e} F = F \longrightarrow \alpha_*(\alpha^*(F)) = \varprojlim_{C'} \alpha^* F$$

qui est un isomorphisme. Et l'axiome Der_5 assure qu'il doit en être ainsi si C' est contractile.

La condition filtrante dans la proposition est d'ailleurs une condition *suffisante* d'anodinité, mais nullement nécessaire. Si p.ex. C est la catégorie finale, alors la condition d'anodinité pour $C' \longrightarrow C$ est simplement que C' soit connexe non vide, i.e. $\pi_0(C') = \{0\}$. (Condition qui visiblement néglige les π_i supérieurs.)

Soit $\boxed{\alpha : X' \longrightarrow X}$ un foncteur de petites catégories. La condition suggérée par la proposition, que les $x_0\backslash X'$ soient contractiles, signifie que α est une hot-équivalence costricte, i.e. que $\alpha^o : X'^o \longrightarrow X^o$ est une hot-équivalence 'localement sur X^o', donc aussi globalement. Si α lui-même était une hot-équivalence stricte, au lieu de α^o, alors on aurait par Der_5, que pour $F \in \mathbf{D}(X)$, $F \xrightarrow{\sim} \alpha_*\alpha^* F$ ($\mathbf{D}$ dérivateur à gauche), ce qui est bien [page 5]
plus fort que $\Gamma_{\mathbf{D}}(X, F) \xrightarrow[\sim]{\alpha^*} \Gamma_{\mathbf{D}}(X', \alpha^* F)$. La condition duale implique (si $\mathbf{D}$ `[est un]` dérivateur à droite) $\alpha_!\alpha^* F \xrightarrow{\sim} F$. Mais est-il raisonnable de s'attendre qu'elle implique aussi la condition 'du côté cohomologie, au lieu de l'homologie',

$$\Gamma_{\mathbf{D}}(X, F) \xrightarrow{\sim} \Gamma_{\mathbf{D}}(X', \alpha^*(F)) \quad ?$$

Le premier cas, qui devrait emporter conviction, est celui du dérivateur DerAb, i.e. des catégories dérivées des faisceaux abéliens :

Question. *Soit $\alpha : X' \longrightarrow X$ une* hot-*équivalence co-stricte, F un préfaisceau abélien sur X. A-t-on alors $H^i(X,F) \xrightarrow[\sim]{\alpha^*} H^i(X', \alpha^*(F))$ pour tout $i \in \mathbf{Z}$?*

Si X admet un objet initial $\emptyset$, alors $\emptyset\backslash X' \simeq X'$, donc X' contractile, donc c'est OK pour F constant.

Remarque. Je m'aperçois que dans la proposition 1, au lieu de la condition que les $x\backslash C'$ soient faiblement filtrantes à gauche, il suffirait qu'elles soient non vides et connexes, i.e.

0-connexes ([4]). Le fait que les $x\backslash C'$ non vide implique que $\varprojlim_C \longrightarrow \varprojlim_{C'}$ soit *injectif.* Pour la sujectivité, si $\xi' \in \varprojlim_{C'}$ (cas ensembliste), on définit $\xi \in \varprojlim_C$ par les $\xi(x) \in F(x)$ à l'aide de [page 6]

p. 4

$$x \xrightarrow{u} \alpha(x')$$


en prenant $u^*(\xi(x'))$ (où $\xi(x') \in (\alpha^*(F))(x') = F(\alpha(x'))$), le point essentiel est de montrer que les $u^*(\xi(x'))$ ne dépendent que de x, pas du choix de $(x',u) \in x\backslash C'$. Or pour (x',u) variable dans $x\backslash C'$, l'application

$$\begin{array}{rcl} \varphi : \mathrm{Ob}(x\backslash C') & \longrightarrow & F(x) \\ (x',u) & \longmapsto & u^*(\xi(x')) \end{array}$$

est telle que s'il existe une flèche

$$(x',u) \xrightarrow{u'} (\bar{x}', \bar{u}) \qquad \text{où} \qquad u' : x' \longrightarrow \bar{x}'$$

(donc le diagramme



est commutatif), alors $\varphi(x',u) = \varphi(\bar{x}', \bar{u})$. Donc φ est constant sur les composantes connexes de $x\backslash C'$, donc constant si $x\backslash C'$ est 0-connexe, d'où $\xi(x)$. On prouve alors aussitôt que pour x variable,

$$\xi \overset{\text{déf}}{=} (\xi(x))_{x \in \mathrm{Ob}\, C} \simeq \varprojlim F, \qquad \texttt{[plutôt} \quad \in \varprojlim F, \texttt{]}$$

et que $\alpha^*(\xi) = \xi'$, cqfd.

On peut dire que pour $x_0 \in \mathrm{Ob}\, C_0$ fixé, si on regarde le préfaisceau *constant* sur $x_0\backslash C'$ de valeur $F(x_0)$, soit Φ_{x_0}, l'application

$$(x',u) \longmapsto \xi^*(u') : x_0\backslash C' \longrightarrow F(x_0)$$

peut être regardée comme une section de ce préfaisceau sur $x\backslash C'$, défini par $\xi' \in \varprojlim_{C'} \alpha^* F$, donc on a

$$\varprojlim_{C'} \alpha^* F \xrightarrow{c_{x_0}} \Gamma(x_0\backslash C', \Phi_{x_0}) \qquad (\xleftarrow{\sim} F(x_0) \text{ si } x_0\backslash C \text{ 0-connexe}).$$

4. Cela signifie aussi que α est W_0-coasphérique. Pour un traitement ab ovo, cf. prop. 3.2, page 43.

Si on a $\boxed{x_0 \xrightarrow{v} x_1}$ dans C', on en déduit

$$x_1\backslash C' \xrightarrow{V} x_0\backslash C'$$

(les $x\backslash C'$ sont les fibres d'une *catégorie fibrée* $C\backslash C'$ sur C …) et on a $F(x_1) \longrightarrow F(x_0)$, d'où $\boxed{\Phi_{x_1} \longrightarrow V^*\Phi_{x_0}}$ pour les faisceaux constants correspondants sur $x_0\backslash C'$ resp. $x_1\backslash C'$ et on a commutativité dans

p. 5 [page 7]

$$\begin{array}{ccc}
\varprojlim_{C'} \alpha^* F & \xrightarrow{c_{x_1}} & \Gamma(x_0\backslash C', F(x_0)) \simeq \mathrm{Hom}(\pi_0(x_0\backslash C'), F(x_0)) \\
\downarrow{\scriptstyle c_{x_0}} & & \downarrow{\scriptstyle V^*} \\
\mathrm{Hom}(\pi_0(x_1\backslash C'), F(x_1)) \simeq \Gamma(x_1\backslash C', F(x_1)) & \xrightarrow[(F(x_1)\longrightarrow F(x_0))]{v^*} & \Gamma(x_1\backslash C', F(x_0)) \simeq \mathrm{Hom}(\pi_0(x_1\backslash C'), F(x_0))
\end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
\pi_0(x_1\backslash C') & \xrightarrow{\pi_0(V)} & \pi_0(x_0\backslash C') \\
\downarrow & & \downarrow \\
F(x_1) & \xrightarrow{F(v)} & F(x_0)
\end{array}$$

commutatif.

On considère le préfaisceau d'ensembles

$$x \longmapsto \pi_0(x\backslash C') \qquad \text{sur } C,$$

appelons-le $\pi_0(C'/C)$, on aura un morphisme canonique

$$\boxed{\varprojlim_{C'} \alpha^*(F) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\substack{\text{préfaisceaux} \\ \text{d'ensembles sur } C}} (\pi_0(C'/C), F),}$$

sans doute toujours [un] isomorphisme.

Si on travaille dans la catégorie dérivée des préfaisceaux des k-modules (k un anneau), la formule précédente suggère conjecturalement

$$\boxed{\mathbf{R}\Gamma(C', \alpha^* F) \simeq \mathbf{R}\underbrace{\mathrm{Hom}}_{\substack{\text{Hom internes}}}(\underbrace{\mathbf{L}\alpha_!(k_{C'})}_{\substack{\text{homologie} \\ \text{relative de} \\ C' \text{ sur } C}}, F).}$$

L'augmentation canonique

[page 8]

$$\mathbf{L}\alpha_!(k_{C'}) \longrightarrow k_C$$

redonne, en prenant les $\mathbf{R}$Hom dans F,

$$\mathbf{R}\Gamma(C, F) \longrightarrow \mathbf{R}\,\mathrm{Hom}(\mathbf{L}\alpha_!(k_{C'}), F) \xleftarrow{\sim} \mathbf{R}\Gamma(C', \alpha^* F)$$

l'homomorphisme canonique de 'contravariance' de la cohomologie.

Si par contre on travaille avec le dérivateur non additif HOT, donc F un 'type d'homotopie relatif' sur C, on doit avoir

$$\boxed{\mathbf{R}\Gamma_{\mathrm{HOT}}(C', \alpha^* F) \xrightarrow{\sim} \mathbf{R}\Gamma(C\,,\ \underbrace{\mathrm{Hom}}_{\substack{\text{Hom interne} \\ \text{de la catégorie des} \\ \text{types d'homotopie} \\ \text{relatifs sur } C}}\ (\ \alpha_!\ (\ \underbrace{e_{C'}}_{\substack{\text{objet final} \\ \text{de HOT}(C'), \\ \text{type d'homotopie} \\ \text{relatif final} \\ \text{sur } C'}}\ ),\ F)).}$$

En fait, ces formules sont quasi-tautologiques, si on admet l'existence des foncteurs $\alpha_!$ comme adjoints *à gauche* des α^*. Dans le cas abélien, disons, l'isomorphie des H^0 des

p. 6 [page 9]

deux membres est la formule d'adjonction

$$\mathrm{Hom}_{C'}(k_{C'}, \alpha^* F) \simeq \mathrm{Hom}_C(\alpha_!(k_{C'}), F),$$

d'où l'isomorphie pour les H^i des deux membres, par décalage. De même dans le cas de HOT, l'isomorphie canonique des π_0 des deux membres est la formule d'adjonction. Pour avoir l'isomorphisme plus fin dans $\mathbf{D}(e)$, la catégorie fondamentale du dérivateur envisagé, en termes de Hom internes, on doit admettre l'existence d'objets unité (les k_X dans un cas, les e_X `[plutôt` ε_X`]` dans l'autre), compatibles avec images inverses, de telle façon `[que]` $\mathrm{Hom\,int}(\varepsilon_X, \underbrace{F}_{\in \mathbf{D}_X}) \simeq F$. On aura

$$\Gamma(C', \alpha^* F) \overset{\text{déf}}{=} f'_*(\alpha^*(F)) \simeq f_*(\alpha_* \alpha^*(F)),$$

et la question est donc de donner une interprétation de $\alpha_* \alpha^* F$ comme

$$\alpha_* \alpha^* F \simeq \mathrm{Hom\,int}(\alpha_!(\varepsilon_{C'}), F) \qquad \text{dans } \mathbf{D}(C).$$

Pour ceci, on va écrire

$$\alpha^*(F) \simeq \mathrm{Hom\,int}(\varepsilon_{C'}, F),$$

et la formule doit résulter d'une 'formule d'adjonction interne'

? $\boxed{\alpha_*(\mathrm{Hom\,int}_{C'}(G', \alpha^* F)) \simeq \mathrm{Hom\,int}_C(\alpha_! G', F).}$ `[page 10]`

(*Formule d'adjonction 'interne',* pour $\alpha_!$ et α^*, valable en principe pour *tout* $\alpha : C' \longrightarrow C$ dans Diag, tout G' dans $\mathbf{D}(C')$ et tout F dans $\mathbf{D}(C)$.)

Comment prouver cette formule ? En prenant l'opération produit $\otimes$ associé à l'opération Hom int, on est ramené (en prenant les foncteurs contravariants associés) à une formule

$$G \otimes \alpha_! G' \xrightarrow{\sim} \alpha_!(\alpha^* G \otimes G').$$

On trouve par adjonction un homomorphisme canonique, il faut voir s'il est toujours `[un]` isomorphisme.

2 Les catégories localement filtrantes sont les catégories localement totalement 0-connexes

p. 7 `[page 11]`

Soit $\mathcal{T}$ un topos. On dit que $\mathcal{T}$ est *irréductible* si l'ensemble ordonné $\mathrm{Ouv}(\mathcal{T})$ des sous-objets de $e_{\mathcal{T}}$ a la propriété suivante : a) $\mathrm{Ouv}(\mathcal{T})$ n'est pas réduit à un élément, i.e. $\emptyset_{\mathcal{T}} \longrightarrow e_{\mathcal{T}}$ n'est pas un isomorphisme ($\mathcal{T}$ n'est pas identique à son sous-topos vide). b) Si U', U'' sont deux objets 'non vides', i.e. non initiaux, de $\mathrm{Ouv}(\mathcal{T})$, leur intersection est 'non vide'. Il revient au même pour b) de dire que si $\mathcal{T}'$, $\mathcal{T}''$ sont deux sous-topos fermés distinct de $\mathcal{T}$, alors leur supremum $\mathcal{T}' \cup \mathcal{T}''$ est distinct de $\mathcal{T}$, ou encore que tout ouvert de $\mathcal{T}$ est connexe. On dit que $\mathcal{T}$ est *localement irréductible* si a) $\mathcal{T}$ est localement connexe (i.e. chaque faisceau sur $\mathcal{T}$ est somme de faisceaux 0-connexes), et si b) pour tout faisceau 0-connexe U sur $\mathcal{T}$, le topos induit $\mathcal{T}/U$ est irréductible (i.e. l'ensemble ordonné $\mathrm{Ouv}(U)$ des sous-objets de U a la propriété b) ci-dessus (a) signifie simplement que $U \not\simeq \emptyset_{\mathcal{T}}$, i.e. que U n'est pas objet initial dans $\mathcal{T}^\wedge$; ou plus simplement) : tout sous-faisceau d'un faisceau connexe est connexe ([5]) ([6]).

5. **NB** Irréductible n'implique pas localement irréductible, pas plus que connexe n'implique pas localement connexe etc.

6. $\mathcal{T}$ est localement irréductible si et seulement s'il a un ensemble des générateurs (U_α), avec les U_α irréductibles (donc 0-connexes, donc $\mathcal{T}$ est localement connexe).

Quand $\mathcal{T}$ est de la forme $\mathrm{Top}(T)$, où T est un espace topologique, alors $\mathcal{T}$ irréductible signifie que T est irréductible (car alors $\mathrm{Ouv}(\mathcal{T}) \simeq \mathrm{Ouv}(T)$). Cela implique déjà trivialement que T est localement connexe (tout ouvert est somme disjoint d'ouverts connexes), donc $\mathrm{Top}(\mathcal{T})$ est localement connexe. De plus, cela implique aussi que $\mathrm{Top}(T)$ est localement irréductible ([7]). (**NB** Les objets 0-connexes de $\mathrm{Top}(T)^\wedge$, i.e. les faisceaux [page 12] d'ensembles 0-connexes sur T, sont ceux dont la 'fibre générique' a exactement un point …) Aussi $\mathcal{T} = \mathrm{Top}(T)$ est localement irréductible si et seulement si T `[est]` localement connexe, et les composantes connexes de T sont irréductibles, i.e. si et seulement si $T = \coprod_i T_i$, les T_i irréductibles.

Si $\mathcal{T}$ est de la forme $\mathrm{Top}(X)$, X une catégorie, on sait que $\mathcal{T}$ est localement connexe (et même localement ∞-connexe). On voit d'autre part que $\mathcal{T}$ est irréductible si et seulement si $\mathrm{Esp}(X)$ (l'espace topologique associé, dont l'ensemble sous-jacent est $\mathrm{Ob}\, X$) est irréductible ([8]) ; et on dit alors que X est irréductible ([9]). Comme les composantes connexes de X et celles de $\mathrm{Esp}(X)$ ou $\mathrm{Top}(X) = \mathcal{T}$ se correspondent, on voit donc que les conditions suivantes sont équivalentes : a) le topos $\mathrm{Top}(X)$ est localement irréductible, b) $\mathrm{Esp}(X)$ est localement irréductible, c) les composantes connexes de X sont irréduc- p. 8 tibles, d) les X/x `[sont]` irréductibles. On dit alors que X est localement irréductible ([10]).

Cela implique donc que pour tout X' étale sur X, avec X' 0-connexe, X' est irréductible.

Dire conditions équivalentes.

a) $\mathrm{Top}(X)$ est localement irréductible.

b) Les X/x `[sont]` irréductibles.

c) Tout objet 0-connexe de $X^\wedge$ est irréductible.

d) Les composantes connexes de X sont faiblement cofiltrantes (i.e. faiblement filtrantes à gauche).

e) Condition PS 1_g de SGA 4, I 2.

Si X est `[une]` catégorie, X irréductible signifie aussi que $X \neq \emptyset$ et $\forall\, x, y \in \mathrm{Ob}\, X$, `[il]` existe `[un]` s avec $s \begin{array}{l} \nearrow x \\ \searrow y \end{array}$. (Cela signifie aussi que X est *faiblement filtrante* ([11]) à gauche, ou faiblement cofiltrante.) X localement irreductible signifie que pour x, y *appartenant à une même composante connexe,* `[il]` existe `[un]` s avec $s \begin{array}{l} \nearrow x \\ \searrow y \end{array}$, i.e. $X/[x] \cap X/[y] \neq \emptyset$ (où $[x]$ est considéré comme élément de l'ensemble ordonné $\mathrm{Ob}\, X$). Il [page 13] revient encore au même de dire que les catégories induites X/x sont irréductibles ([12]).

---

7. expliciter la démonstration.

8. car les ouverts de $\mathrm{Top}(X)$, ceux de $\mathrm{Esp}(X)$ et ceux de X se correspondent.

9. Cela signifie aussi que pour x, y dans X, $\exists\, z$ avec $z \begin{array}{l} \nearrow x \\ \searrow y \end{array}$, i.e. $\mathrm{Ord}(X)$ est filtrant à gauche.

10. Faux, on a (a $\iff$ d) $\implies$ (b $\iff$ c) X irréductible n'implique *pas* que les X/x le soient, exemple $X = (0 \underset{\beta}{\overset{\alpha}{\rightrightarrows}} 1)$ $(\alpha \neq \beta)$, on a $X/1 = \begin{array}{l} 0' \searrow \\ \qquad 1 \\ 0'' \nearrow \end{array}$, qui n'est *pas* irréductible, ni localement irréductible puisqu'il est connexe. Pourtant il est étale sur X.

11. Il est mieux l'appeler *pseudo-filtrante,* et réservons faiblement filtrante à : localement faiblement filtrante + connexe.

12. faux, cf. annotation marginale plus haut.

Exemple. Une catégorie *ayant un objet initiale,* ou seulement un 'plus petit objet', est irréductible. Inversement, si l'ensemble *ordonné* $\mathrm{Ord}(X)$ associé à X (quotient de $\mathrm{Ob}(X)$ par la relation d'équivalence associé à son préordre) est fini, p.ex. X fini, ou seulement localement fini, p.ex. X localement fini (i.e. les catégories X/x finies), alors si X est irréductible, $\mathrm{Ob}\,X$ a un plus petit élément, i.e. X a un plus petit objet. C'est vrai plus généralement encore, si $\mathrm{Ord}(X)$ est artinien, i.e. toute suite décroissante dans $\mathrm{Ord}(X)$ est stationnaire.

Mais la condition intéressante est la condition topossique de *locale* irréductibilité, qui équivaut : I pseudo-filtrante à gauche, i.e. les composantes connexes de I filtrantes, i.e. les conditions PS 1, PS 2

PS 1 Tout diagramme $\begin{array}{ccc} x & & \\ & \searrow & \\ & & s \\ & \nearrow & \\ y & & \end{array}$ se complète en $\begin{array}{ccccc} & & x & & \\ & \nearrow & & \searrow & \\ z & & & & s \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & y & & \end{array}$ *commutatif.*

PS 2 Pour toute double flèche $x \rightrightarrows y$, [il] existe un égalisateur $z \longrightarrow x \rightrightarrows y$.

En résumé, on a la p. 9 [page 14]

Proposition 2.1. *Soit X un objet de* Cat. *Conditions équivalentes :*

a) Le topos associé $\mathrm{Top}(X)$ *est localement irréductible, i.e. (étant localement connexe) pour tout objet F de $X^\wedge$ et tout sous-objet F' de F, si F est connexe, F' l'est.*

a′) Pour tout X' étale sur X, si X' est connexe, tout ouvert de X' est connexe.

a″) Tout ouvert d'une catégorie localisée X/a ($a \in \mathrm{Ob}\,X$) est connexe (i.e. X/a est une catégorie irréductible, i.e. le topos $\mathrm{Top}(X/a)$ *l'est).*

b) Pour tout objet a de X, $\mathrm{Esp}(X/a)$ *est un espace topologique irréductible.*

c) Les catégories X/a sont faiblement filtrantes à gauche (ou faiblement cofiltrantes), i.e. pour deux objets ξ, η d'une telle catégorie, [il] *existe un objet ζ et deux flèches* $\begin{array}{ccc} & & \xi \\ & \nearrow & \\ \zeta & & \\ & \searrow & \\ & & \eta \end{array}$ *(i.e. l'ensemble ordonné Ord(X/a) associé à X/a est filtrant à gauche)*

c′) Pour tout diagramme en traits pleins dans X, $\begin{array}{ccccc} & & x & & \\ & \cdots\nearrow & & \searrow & \\ z & & & & s \\ & \cdots\searrow & & \nearrow & \\ & & y & & \end{array}$ *, on peut le compléter en un carré* commutatif *comme indiqué. (Condition* PS 1 *des catégories localement filtrantes.)*

Ces conditions impliquent que toute composante connexe X_α de X est irréductible, ou ce qui revient au même, que $\mathrm{Esp}(X_\alpha)$ est irréductible,
mais ne sont pas impliquées par celle-ci. [page 15]


Contrexemple, la catégorie 0-connexe $0 \overset{\alpha}{\underset{\beta}{\rightrightarrows}} 1$, avec $\alpha \neq \beta$. On a $X/1 \simeq \begin{array}{ccc} 0 & & \\ & \searrow & \\ & & 1 \\ & \nearrow & \\ 0' & & \end{array}$, qui n'est *pas* irréductible, puisque $\Phi\backslash\{1\} \simeq \varepsilon$ est un ouvert disconnexe [$\Phi = X/1$, $\varepsilon = \bullet\ \bullet$].

J'aimerais une condition 'topossique' sur X, équivalente à X 'pseudo-filtrante à gauche', i.e. les composantes connexes filtrantes, i.e. PS 1^{opp} (condition c′) ci-dessus) + PS 2^{opp} (condition de la double flèche), et qui de plus implique que tout objet 0-connexe de $X^\wedge$ (i.e. tout objet X' de Cat étale sur X et 0-connexe) soit W_∞-asphérique. Et je songe à la notion de 'totale asphéricité' de Pursuing Stacks.

Définition 2.2. ([13]) Soit X une catégorie.

a) On dit que X est *faiblement filtrante* ([14]) si $X \neq \emptyset$, et si pour $a, b \in \mathrm{Ob}\, X$, $\exists\, c$ et des flèches $c \to a$, $c \to b$, i.e. $X/[a] \cap X/[b] \neq \emptyset$. (**NB** X est faiblement filtrante ([15]) à gauche si et seulement si $\mathrm{Ord}(X)$ l'est, i.e. est filtrante à gauche. **ReNB** X faiblement filtrante $\Longrightarrow$ X 0-connexe.)

b) On dit que X est *localement faiblement filtrante à gauche* ou plus simplement préfiltrante à gauche si les catégories X/x ($x \in \mathrm{Ob}\, X$) sont faiblement filtrantes à gauche, i.e. si X satisfait la condition : $\forall$ diagrammes $a \to x \leftarrow b$, $\exists\, c$ dans X et des flèches de c dans a, b rendant *commutatif* le carré



([16]). (**NB** Cette condition implique que $\mathrm{Ord}(X)$ est localement faiblement filtrant, mais n'équivaut pas à cette dernière. Exemple, $X = 0 \underset{\beta}{\overset{\alpha}{\rightrightarrows}} 1$, $X/1 = 0' \to 1 \leftarrow 0''$ n'est pas faiblement filtrante à gauche.)

NB Si X localement faiblement filtrante à gauche, tout X' étale sur X itou.

NB ([17]) X localement faiblement filtrante à gauche $\Longleftrightarrow$ les composantes connexes sont faiblement filtrantes à gauche, ou encore si X est 0-connexe, X localement faiblement filtrante à gauche $\Longleftrightarrow$ X est faiblement filtrante ([18]) à gauche. On a en effet $\Longleftarrow$ tautologiquement ([19]), et $\Longrightarrow$ en montrant que si PS 1 `[est]` satisfait, alors $PS(a, b)$ défini par $X/[a] \cap X/[b] \neq \emptyset$ est une relation d'équivalence, impliquée par la relation $C(a, b)$: $\{\mathrm{Hom}(a, b) \neq \emptyset$ *ou* $\mathrm{Hom}(b, a) \neq \emptyset\}$, donc la relation d'équivalence (homotopie) engendrée par $C(a, b)$ est plus fine que $PS(a, b)$.

c) On dit que X est *filtrante à gauche*, ou *cofiltrante,* si elle est faiblement filtrante ([20]) à gauche (donc *non vide*), et satisfait (en plus de la condition PS $1'_{\mathrm{g}}$ de a)) la condition PS 2_{g} suivante :

p. 10

[page 16]

13. Cf. tableau récapitulatif pages 97, 98 et surtout 99.

14. dire plutôt *pseudo-filtrante*, réserver 'faiblement filtrante' à 'localement faiblement filtrante' (ou *irréductible*) + connexe, condition PS $1'_{\mathrm{g}}$.

15. pseudo-filtrante.

16. Condition PS 1_{g}.

17. **Faux.**

18. pseudo-filtrante.

19. **faux,** ainsi $0 \underset{\beta}{\overset{\alpha}{\rightrightarrows}} 1$ est 0-connexe et faiblement filtrante à gauche, mais non pas localement faiblement filtrante à gauche car $0 \overset{\alpha}{\to} 1 \overset{\beta}{\leftarrow} 0$ ne se complète pas en un carré *commutatif.*

20. pseudo-filtrante.

Pour toute double flèche $a \overset{u}{\underset{v}{\rightrightarrows}} b$, [il] existe [une] flèche $c \xrightarrow{w} a$ telle que $uw = vw$ ([21]).

Il revient au même de dire que X satisfait les trois conditions a′) X est 0-connexe (plus forte que $X \neq \emptyset$), b′) PS 1, i.e. X localement faiblement filtrante à gauche et c′) PS 2 comme avant.

d) On dit que X est *localement filtrante à gauche* si les composantes connexes sont filtrantes à gauche, i.e. si X satisfait les conditions PS 1 et PS 2 ('pseudo-cofiltrante' dans la terminologie de SGA 4). **NB** Si X est localement filtrante à gauche, il en est de même de tout X' étale sur X, car c'est évident pour PS 1 qui concerne les X/x, et pour PS 2 cela résulte du fait que $X' \longrightarrow X$ est fidèle. Donc si X est localement cofiltrante, les X/a sont filtrantes, mais la réciproque est fausse.

On a les notions duales : *faiblement filtrante à droite* (ou simplement faiblement filtrante), et *filtrante à droite* ou simplement filtrante. (Notions duales de a), c) ci-dessus.) Pour la notion duale de b), savoir que les $x\backslash X$ soient faiblement filtrantes, on ne peut plus l'appeler 'localement faiblement filtrante', mais ce serait *co*localement faiblement filtrante. p. 11

Exemple. $X = \left(0 \xrightarrow{\gamma} 1 \overset{\alpha'}{\underset{\beta'}{\rightrightarrows}} 2 \overset{\alpha}{\underset{\beta}{\rightrightarrows}} 3\right)$ avec $(\alpha\alpha' = \beta\beta') \neq (\alpha\beta' = \beta\alpha')$.

Seule la notion a) (faiblement filtrante ([22]) à gauche) ne dépend que de $\operatorname{Ord} X$ - mais bien sûr si X est *pré*ordonnée, toutes trois ne dépendent que de $\operatorname{Ord} X$. Notons que dire que ça ne dépend que de $\operatorname{Ord} X$, ou que de $\operatorname{Esp}\operatorname{sep} X$, revient au même, puisque les deux se déterminent mutuellement. La condition a) signifie que $\operatorname{Esp} X$, ou aussi $\operatorname{Top}(X)$, est *irréductible.* On dira que X est *irréductible* (au lieu de pseudo-filtrante). Les trois autres notions ne peuvent s'exprimer en termes de $\operatorname{Esp} X$ ou de $\operatorname{Ord} X$ seul, mais elles s'expriment en termes du $\operatorname{Topos} X$. La condition b) (X localement faiblement filtrante) signifie que $\operatorname{Top}(X)$ est *localement irréductible,* et on dira aussi que X est *localement irréductible* (au lieu de localement faiblement filtrante). Ça signifie que pour tout X' étale sur X et 0-connexe, X' est faiblement filtrante à gauche, i.e. est irréductible. [page 17]

Reste à exprimer la condition filtrante elle-même en termes de $\operatorname{Top} X$. Je rappelle à ce propos :

Proposition 2.3. *Les conditions suivantes sur un topos $\mathcal{X}$ sont équivalentes (quand S (comme 'site') désigne une partie génératrice de* $\operatorname{Fais}(\mathcal{X}) = S^{\wedge}$, formée d'objets 0-connexes ([23])*.)*

a) Si U, V sont deux objets 0-connexes de $\operatorname{Ob}\mathcal{X}$*, $U \times V$ est 0-connexe.*

b) Si U est un objet 0-connexe de $\mathcal{X}^{\wedge}$, alors $U \longrightarrow e$ est 'W_0-asphérique', i.e. pour tout V, la projection $V \times U \longrightarrow V$ induit $\pi_0(U \times V) \xrightarrow{\sim} \pi_0(U)$.

c) Si U, V [sont] dans $\mathcal{X}^{\wedge}$, alors

$$\pi_0(U \times V) \xrightarrow{\sim} \pi_0(U) \times \pi_0(V).$$

d) Comme a), avec U, V dans S. (Mais on suppose les objets de S 0-connexes.)

([24]).

De plus, ces conditions impliquent que $\mathcal{X}$ est connexe, donc 0-connexe si $\mathcal{X} \neq \emptyset$. Cela implique de plus que $\mathcal{X}$ est W_∞-asphérique, cf. Pursuing Stacks §35 (Corollary p. 52) ([25]). [page 18]

21. i.e. trois conditions a) $X \neq \emptyset$ b) PS 1′ habituelle c) PS 2 (double flèche).
22. pseudo-filtrant.
23. donc $\mathcal{X}$ est localement 0-connexe.
24. Il faudrait expliciter la démonstation avec celle de 2.9 ci-dessous (p. 25).
25. **Faux,** loc. cit. ne dit rien de tel.

C'est essentiellement Proposition 1 de Pursuing Stacks §65, cf. loc. cit. p. 170-171 ([26]). Cf. aussi Pursuing Stacks, §35, pages 50-55.

Définition 2.4. On dit que $\mathcal{X}$ est *totalement* 0*-connexe* s'il est localement connexe, non vide et satisfait les conditions équivalentes de 2.3. (NB c'est un cas particulier de la notion 'totalement W-asphérique' de loc. cit. On a ainsi la notion de totalement n-connexe.) p. 12

Notons que pour un objet X de Cat, dire que $\mathrm{Top}(X)$ est totalement 0-connexe revient à dire que $X \neq \emptyset$, et que pour $x, y \in \mathrm{Ob}\, X$, $x \times y$ dans $X^\wedge$ est 0-connexe, i.e. $X/x \times y$ est 0-connexe ([27]). C'est une condition très forte. On dira aussi que X est *totalement* 0*-connexe.* Notons ici

Proposition 2.5. *Soit $\mathcal{X}$ un topos. Si $\mathcal{X}$ est totalement* 0*-connexe, alors $\mathcal{X}$ est irréductible. (En fait la conclusion vaut, tautologiquement, en supposant seulement que le produit de deux objets* 0*-connexes de $\mathcal{X}^\wedge$ est non vide, et il suffit même de le supposer pour des sous-objets de l'objet final $e_{\mathcal{X}}$.) En particulier, si $\mathcal{X} = Top(X)$, où X est dans* Cat*, alors X est faiblement filtrante à gauche.*

Mais bien sûr, cela n'implique *pas* que $\mathcal{X}$ soit localement irréductible.

Par exemple la catégorie $\mathbf{\Delta}$, ou toute petite catégorie stable par produits binaires, est totalement 0-connexe, mais $\mathbf{\Delta}$ n'est pas localement irréductible (les catégories induites $\mathbf{\Delta}/\mathbf{\Delta}^n$, pour $n > 0$, ne sont visiblement *pas* irréductibles). (Mais rappelons que si $\mathcal{X} = \mathrm{Top}(T)$, T un espace topologique, alors T irréductible implique que $\mathcal{X}$ est aussi *localement* irréductible. Donc T totalement 0-connexe implique $\mathrm{Top}(T)$ globalement *et* localement irréductible, i.e. pour tout T' étale sur T, et 0-connexe, T' est irréductible.) [page 19]

Théorème 2.6. *Soit $\mathcal{X}$ un topos localement connexe, $S \subseteq \mathcal{X}^\wedge$ une petite partie génératrice formée d'objets* 0*-connexes. Conditions équivalentes (*sauf *c, c′, qui semblent ([28]) plus faibles, cf. démonstration).)*

a) Tout topos induit $\mathcal{X}/U$ sur U 0*-connexe dans $\mathcal{X}^\wedge$ est totalement* 0*-connexe.*

a′) Tout produit fibré $U \times_W V$ d'objets 0*-connexes dans $\mathcal{X}^\wedge$ est* 0*-connexe.*

b) $\mathcal{X}$ est localement irréductible, et ses composantes connexes sont totalement 0*-connexes.*

c) Comme a), avec U dans S, i.e. les $\mathcal{X}/U$ ($U \in \mathrm{Ob}\, S$) sont totalement 0*-connexes.*

c′) Comme a′), avec U, V, W dans S.

d) S est localement filtrante à gauche, i.e. S satisfait les deux conditions

PS* 1 *Tout diagramme* $\begin{array}{ccc} a & & \\ & \searrow & \\ & & x \\ & \nearrow & \\ b & & \end{array}$ *dans S s'insère dans* $\begin{array}{ccccc} & & a & & \\ & \cdots\searrow & & \searrow & \\ c & & & & x \\ & \cdots\nearrow & & \nearrow & \\ & & b & & \end{array}$ *commutatif.*

PS* 2 *Tout diagramme $a \rightrightarrows b$ s'insère dans un diagramme commutatif $c \longrightarrow a \rightrightarrows b$.*

([29]).

Ces conditions impliquent que les objets 0-connexes de $\mathcal{X}^\wedge$ (en particulier les éléments de S) sont ∞-connexes. p. 13 [page 20]

26. Mais je m'y borne aux topos de la forme $\mathrm{Top}(A)$, avec A dans Cat.

27. Cela signifie aussi que $\mathrm{diag}_X : X \longrightarrow X \times X$ est co-cofinale, i.e. $X^o \longrightarrow X^o \times X^o$ est cofinale, et implique qu'il en est de même de $X \longrightarrow X^E$ pour tout ensemble *fini* E.


28. **sont.**

29. NB On a équivalence de (a), a′), b), d),) qui impliquent c), c′), lesquels sont équivalents. Mais il semble ([30]) que c), c′) soient strictement plus faible. Cf. cependant les variantes e), e′) dans 2.12 (p. 28, 29).

30. Il s'avère. C'est bien vrai, c) et c′) n'impliquent *pas* les autres conditions, cf. annotation marginale p. 28 (cas de $X = B_G$).

Corollaire 2.7 (de l'équivalence b $\iff$ d). *Soit X un objet de* Cat. *Pour que X soit filtrant à gauche il faut et il suffit que $Top(X)$ soit totalement* 0*-connexe et localement (et donc aussi globalement) irréductible (ou encore que X soit totalement* 0*-connexe et que pour tout $x \in \mathrm{Ob}\, X$, la catégorie localisée X/x soit irréductible (elle est même totalement* 0*-connexe), ou encore que pour deux objets a, b dans X, $a \times b \in X^\wedge$ soit* 0*-connexe, et pour* $\begin{matrix} a & \searrow & \\ & & x \\ b & \nearrow & \end{matrix}$ *dans X, $a \times_x b$ (dans $X^\wedge$) soit* 0*-connexe)* ([31]).

Démonstration de 2.6. On a le diagramme d'implications ± tautologiques



Montrons quand même les deux implications c′) $\Longrightarrow$ PS 1 et b $\Longrightarrow$ PS 1.
C'est contenu dans le [page 21]

Corollaire 2.8. *Soient $\mathcal{X}$, S comme dans 2.6. Conditions équivalentes :*

a) $\mathcal{X}$ est localement irréductible, i.e. les topos induits $\mathcal{X}/U$, où U est 0*-connexe, sont irréductibles.*

b) Tout produit fibré $U \times_W V$ d'objets 0*-connexes U, V est 'non vide'.*

b′) Tout produit fibré $U \times_W V$, avec U, V 'non vide', W 0*-connexe, est non vide.*


c) Les $\mathcal{X}/x$ avec $x \in S$ sont irréductibles.

d) Comme b), avec U, V, W dans S.

e) S est localement faiblement filtrante à gauche, i.e. satisfait PS 1.*

Ici les implications ± évidentes sont

p. 14



Prouvons les implications de la ligne du bas. Considérons d). Si $\begin{matrix} a & \searrow & \\ & & x \\ b & \nearrow & \end{matrix}$ [est] dans S, dire que le produit fibré dans $\mathcal{X}$ est 'non vide' signifie, puisque S est un système de générateurs et en particulier *non vide,* qu'il existe c dans S et $c \longrightarrow a \times_x b$, ou ce qui revient au même, $c \begin{matrix} \nearrow & a \\ \searrow & b \end{matrix}$, rendant commutatif le diagramme $c \begin{matrix} \nearrow & a & \searrow & \\ \searrow & b & \nearrow & x \end{matrix}$. Donc d) équivaut à PS 1, i.e. à e) ($\mathcal{X}$ localement faiblement filtrant à gauche). Considérons la condition c) : les $\mathcal{X}/a = (S/a)^\sim$ sont irréductibles. Cela signifie que pour deux sous-objets *non vides* $U, V \subseteq a$ dans $\mathcal{X}^\wedge$, on a $U \cap V \neq \emptyset$, ou encore que pour deux cribles

31. Exemple de X totalement 0-connexe, mais non cofiltrant, i.e. non localement irréductible ? La catégorie $\mathbf{\Delta}$ des simplexes type est totalement 0-connexe, mais n'est pas cofiltrante car $\mathbf{\Delta}^0 = e \overset{\partial_0}{\underset{\partial_1}{\rightrightarrows}} \mathbf{\Delta}^1$ ne peut être égalisé ! Donc [la catégorie opposée] $\mathbf{\Delta}^o = I$ est telle que $I \longrightarrow I^E$ soit cofinal pour tout ensemble fini E, mais I non filtrante. [page 22]

$\underline{U}$, $\underline{V}$ de S/x, si $\underline{U}$, $\underline{V}$ non vides (ce qui signifie que les sous-objets de x dans $\mathcal{X}^\wedge$ qu'ils définissent sont 'non vides', ou que les objets de S sont 'non vides' dans $\mathcal{X}^\wedge$), alors $\underline{U} \cap \underline{V}$ est non vide. On peut supposer que $\underline{U}$, $\underline{V}$ est engendré chacun par une seule flèche $a \xrightarrow{u} x$, $b \xrightarrow{v} x$. Le crible intersection est formé des objets $c \longrightarrow x$ de S/x tels que $c \longrightarrow x$ se factorise par un $c \overset{a}{\searrow} \underset{b}{}$, donc dire que ce crible n'est pas vide, signifie que PS 1 est satisfait pour les deux flèches données u, v. Donc c) équivaut à la condition PS 1[, i.e. à] e.

Ainsi on a établi

$$\mathrm{b}' \Longrightarrow \mathrm{b} \Longrightarrow \mathrm{a} \Longrightarrow (\mathrm{c} \Longleftrightarrow \mathrm{d} \Longleftrightarrow \mathrm{e}),$$

reste à prouver que c $\Longrightarrow$ b′. Soit donc $U \searrow W \swarrow V$ un diagramme d'objets 'non vides', avec W 0-connexe, il faut prouver que le produit fibré est non vide. Considérant $a \longrightarrow U$ et $b \longrightarrow V$ avec $a, b \in S$, on est ramené au cas où $U = a$, $V = b$ dans S. Prouvons que si $a \times_W b$ est 'vide', alors W est disconnexe. Pour ceci, considérons la sous-catégorie C de S/W formée des $x \longrightarrow W$ tels que $a \times_W x$ soit 'non vide'. Désignant par $w(a)$, $w(x)$ l'image de a, x dans W, cela signifie que $w(a) \cap w(x) \neq \emptyset$.

Notons que tout quotient dans $\mathcal{X}^\wedge$ d'un objet irréductible est irréductible, donc $w(a)$, [page 23]
$w(x)$ sont des objets irréductibles. Cela montre que pour x dans C et x' dans S/W, on a x' dans C, i.e. $w(a) \cap w(x') \neq \emptyset$ si et seulement si $w(x) \cap w(x') \neq \emptyset$. (Lemme direct : dans un objet W d'un topos $\mathcal{X}$, si on a [des] sous-objets W_1, W_2, W_3 irréductibles, si l'un des deux [plutôt trois] rencontre les deux autres, ceux-ci se rencontrent.) Cela montre que C est un crible, puisque $x' \longrightarrow x$ implique $w(x') \subseteq w(x)$, donc $w(x')$ rencontre $w(x)$, donc aussi $w(a)$. Mais alors le co-crible $C' = (S/W) \backslash C$ est également un crible, car si c est dans C', i.e. [si] $w(c)$ ne rencontre pas $w(x)$, a fortiori pas tout x' au-dessus de x, p. 15
pour lequel on aura $w(x') \subseteq w(x)$. Ainsi, S/W est décomposé en somme de deux ouverts C, C', non vides puisque l'un contient a, l'autre b. Par suite, W est décomposé en somme de deux sous-objets non vides, donc W est non 0-connexe.

On a prouvé 2.8, donc aussi (revenant à 2.6) les implications vers PS 1 dans le diagramme page 20. Il reste à prouver

$$\begin{cases} \mathrm{b} \Longrightarrow \text{PS 2}, \ \mathrm{c}' \Longrightarrow \text{PS 2} \\ \text{PS 1} + \text{PS 2 (i.e. d)} \Longrightarrow \mathrm{a}' \end{cases}$$

([32]).

Nous nous plaçons donc dans l'hypothèse où PS 1 est satisfait (puisque b), c′) et [page 24]
d) impliquent PS 1), donc où on est sous les conditions équivalentes de 2.8 - $\mathcal{X}$ est localement irréductible. Considérons alors la condition PS 2, et prouvons qu'elle est impliquée tant par b), que par c′), et qu'elle implique a′). Elle signifie que pour une double flèche $a \overset{u}{\underset{v}{\rightrightarrows}} b$ dans S, le conoyau [plutôt noyau] dans $S^\wedge$, ou, ce qui revient au même, dans $\mathcal{X}^\wedge = S^\sim \subseteq S^\wedge$, est 'non vide'. On peut l'écrire sous la forme d'un produit fibré

$$\begin{array}{ccc} a & \xrightarrow{(u,v)} & b \times b \\ \uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \mathrm{diag}} \\ \mathrm{Ker}(u,v) & \longrightarrow & b. \end{array}$$

Ici par hypothèse a et b sont des objets 0-connexes de $\mathcal{X}^\wedge$ (ceux de S l'étant), c) est vérifié (($\mathcal{X}$ localement irréductible et) ses composantes connexes [sont] totalement 0-connexes), alors $b \times b$ est 0-connexe comme produit de deux objets 0-connexes sur une

32. NB finalement on ne prouve pas c′ $\Longrightarrow$ PS 2.

même composante connexe, laquelle est totalement 0-connexe. Comme $\mathcal{X} \times \mathcal{X}$ est localement irréductible, il s'ensuit que le produit fibré est non vide (2.8), donc b) $\Longrightarrow$ d). Prouvons d) $\Longrightarrow$ a), i.e. si

[page 25]

S est localement cofiltrante, alors les topos induits $\mathcal{X}/W$, où W est 0-connexe, sont totalement 0-connexes. Ce topos induit est décrit par le site S/W, i.e. S/W est un système de générateurs. Or si S est localement filtrante, S/W (étale sur S) l'est aussi. Donc on peut supposer $W = e$, et à prouver que si S est localement cofiltrante et $\mathcal{X}$ 0-connexe, alors $\mathcal{X}$ est totalement 0-connexe. Notons que $\mathcal{X}$ 0-connexe équivaut à S 0-connexe - il faudrait quand même l'expliciter :

Lemme 2.9. *Soit $\mathcal{X}$ un topos, $S \subseteq \mathcal{X}^\wedge$ une sous-catégorie pleine génératrice formée d'objets* 0-connexes. *Alors $\mathcal{X}$ est* 0*-connexe si et seulement si S l'est - plus généralement, l'ensemble ordonné des sous-objets à la fois ouverts et fermés de S dans* Cat *(ou encore des sous-objets ouverts = cribles de S qui sont aussi fermés, i.e. des cocribles) est isomorphe à celui des sommandes directs de $\mathcal{X}$.*

p. 16

Je l'ai utilisé tacitement dans la démonstration de 2.8, pour le topos induit $\mathcal{X}/W$. Je n'explicite pas la démonstration.

Ainsi (revenant à la démonstration de d) $\Longrightarrow$ c) dans 2.6.) S étant 0-connexe et localement cofiltrante,

[page 26]

`[elle]` est en fait cofiltrante. Donc pour deux objets a, b de S, $\exists$ c avec $c \longrightarrow a$, $c \longrightarrow b$ (condition PS 1′, plus forte que PS 1). Pour prouver que $\mathcal{X}$ est totalement 0-connexe, on est réduit à prouver par 2.3 que les $a \times b$ dans $\mathcal{X}^\wedge$ sont 0-connexes. Par 2.9, il revient au même de prouver qu'ils sont 0-connexes dans $S^\wedge$. Donc on est ramené à prouver le

Lemme 2.10. *Soit S une catégorie cofiltrante. Si a, b sont deux objets de S, $a \times b$ est un objet* 0*-connexe de $S^\wedge$.*

On voit de suite qu'il suffit de prouver (et en fait il revient au même, compte tenu que $a \times b$ est localement irréductible) que si on a deux flèches

$$\begin{array}{ccc} x & \longrightarrow & a \times b \\ & & \uparrow \\ & & y, \end{array}$$

alors $x \times_{a\times b} y \neq \emptyset$, i.e. $\exists$ z dans S rendant commutatif

$$\begin{array}{ccc} x & \longrightarrow & a \times b \\ \uparrow & & \uparrow \\ z & \longrightarrow & y. \end{array}$$

Or par PS 1′ il existe bien un z s'envoyant dans x et dans y, mais les deux flèches composées

$$z \rightrightarrows a \times b,$$

i.e. chacune des double flèches

$$z \rightrightarrows a \qquad (*)$$

$$z \rightrightarrows b \qquad (*')$$

peuvent n'être pas égales. Mais par PS 2,

[page 27]

on peut trouver

$$z' \longrightarrow z$$

égalisant la double flèche $(*)$, donc on peut supposer que celle-ci est déjà triviale. Ap-

p. 17

pliquant encore une fois PS 2, par un $z'' \longrightarrow z'$, on égalise de même la double flèche $(*')$, et on gagne. On a donc prouvé, finalement,

$$\begin{array}{ccccccc} \mathrm{a} & \Longleftrightarrow & \mathrm{a}' & \Longrightarrow & \mathrm{b} & \Longleftrightarrow & \mathrm{d}\ (=\mathrm{PS}\ 1+\mathrm{PS}\ 2) \\ \Downarrow & & & & & & \\ \mathrm{c} & \Longleftrightarrow & \mathrm{c}', & & & & \end{array}$$


mais pas l'implication inverse. En d'autres termes, si les topos induits $\mathcal{X}/a$, pour a dans S, sont totalement 0-connexes, je n'ai pas prouvé qu'il en est de même des $\mathcal{X}/W$, W un objet 0-connexe *quelconque* de $\mathcal{X}^\wedge$. Ainsi, on en est au point suivant

Perplexité 2.11. *Soit X dans* Cat. *Si X est localement filtrante à gauche, alors les produits fibrés $a \times_x b$ d'objets dans X sont des objets* 0*-connexes de $X^\wedge$, et cette condition à son tour implique PS 1, i.e. que X est localement irréductible. Mais en présence de cette hypothèse PS 1, ou X localement irréductible, la condition sur les produits fibrés $a \times_x b$ équivaut à la suivante : pour tout diagramme* [en] *traits pleins*

[page 28]

$$\begin{array}{ccc} c & \longrightarrow & a \times_x b \\ \vdots & & \uparrow \\ e & \cdots\cdots\rightarrow & d, \end{array} \qquad \textit{avec } x,\ a,\ b,\ c,\ d \textit{ dans } X,$$

on peut compléter en un diagramme commutatif, *avec e dans X. En d'autre termes, tout diagramme commutatif à traits pleins ci-dessous se complète en y rajoutant un 'objet initial' e*



([33]).

Cette condition est donc impliquée par X localement cofiltrante, et elle est satisfaite aussi par ce qui précède plus généralement si et seulement si ([34]) les X/x sont cofiltrantes ([35]). Mais la réciproque est-elle vraie - cette condition de totale 0-connexité des X/x implique-t-elle que X soit totalement 0-connexe ? Mais je n'ai pas construit d'exemple où les X/x sont cofiltrantes sans que X soit localement cofiltrante (ou ce qui revient au même, de X 0-connexe avec les X/x cofiltrantes sans que X en soit cofiltrante)([36]) ; ni

p. 18

33. Il suffit d'exiger pour e la commutativité des deux carrés $(e\ c\ b\ d)$ et $(e\ d\ a\ c)$.

34. si et seulement si ?

35. Elle signifie que X satisfait PS 1, et la condition

PS′ 2 Tout diagramme commutatif

$$a \rightrightarrows b \longrightarrow x$$

s'insère dans un diagramme commutatif

$$y \longrightarrow a \rightrightarrows b \longrightarrow x.$$

36. Mais il y a un *contre-exemple* évident, si X est un groupoïde 0-connexe, les X/x sont $\approx e$, donc cofiltrantes, mais X n'est cofiltrant (i.e. [mot(s) illisible(s)]) que si X est 1-connexe. P.ex. si C est un groupoïde $\neq 1$, alors $X = B_G$ est tel que les X/x sont cofiltrantes, mais X non cofiltrant.

d'exemple où les X/x sont totalement 0-connexes, sans que les X/x soient cofiltrantes. Mais notons le

Corollaire 2.12 : *Les conditions équivalentes a), a′), b), d) (à l'exclusion de c), c′), plus faibles apparemment) du théorème 2.6*

équivalent encore à la suivante [page 29]

e) $\forall$ *x dans S, le topos induit* $\mathcal{X}/x$ *et le topos induit* $\mathcal{X}/x \times x$ *est irréductible* ([37]),

où encore à la suivante

e′) $\forall$ *x dans S,* $S^\wedge/x$ *et* $S^\wedge/x{\times}x$ *sont irréductibles, i.e.* S/x *et* $S/x{\times}x$ *sont irréductibles* ([38]).

C'est la forme 'topologique' la plus faible en apparence que je peux trouver pour la condition S localement cofiltrante, i.e. $\mathcal{X}$ (ou Top(S), au choix) localement totalement 0-connexe.

Définition 2.13. On dit qu'un topos $\mathcal{X}$ est *localement totalement* 0*-connexe* s'il satisfait aux conditions équivalentes a, a′, b, d du théorème 2.6, i.e. si $\mathcal{X}$ est localement connexe et si de plus tout topos induit 0-connexe est totalement 0-connexe - le produit fibré de deux objets 0-connexes sur un troisième est 0-connexe. Il revient au même de dire que toute (ou que une) sous-catégorie pleine génératrice S de $\mathcal{X}^\wedge$ formée d'objets 0-connexes est localement cofiltrante (en supposant toujours $\mathcal{X}$ localement connexe, ou ce qui revient au même, l'existence d'un S formé d'objets 0-connexes).

On n'a pas terminé encore la démonstration de 2.6 - il reste à prouver que si $\mathcal{X}$ (supposé localement totalement 0-connexe) est 0-connexe, il est ∞-connexe - ou encore que les composantes connexes de $\mathcal{X}$, supposé localement totalement 0-connexe, sont ∞-connexes, i.e. W_∞-asphériques.

Corollaire 2.14. *Notons quand même que si* $\mathcal{X}$ *est de la forme Top*(T)*, T un espace topologique, alors* $\mathcal{X}$ *est localement totalement* 0*-connexe si et seulement si il est localement irréductible, i.e. si et seulement si T est localement irréductible.* [page 30]

On est ramené à prouver que cette dernière condition implique la condition d) de 2.6, et on peut prendre pour S l'ensemble ordonné des ouverts connexes non vides de S, cela devient alors évident. p. 19

Ceci dit, il faut se rappeler que la théorie cohomologique des espaces topologiques irréductibles n'est nullement triviale - comme nous le montre FAC de Serre ! D'autre part, c'est Serre qui m'avait fait observer que pour des coefficients *constants,* la cohomologie d'un espace irréductible est triviale.

Dans le cas actuel, prouvons déjà, si $\mathcal{X}$ est 0-connexe et localement totalement 0-connexe, que tout revêtement de l'objet final de $\mathcal{X}$ est trivial. Il suffit de voir que si U est 0-connexe, $U \longrightarrow e$ est un isomorphisme. Mais considérons $U \hookrightarrow U \times U$, on sait que c'est un sommande direct, et comme $U \times U$ est connexe, c'est un isomorphisme. Donc $U \longrightarrow e$ `[est un]` monomorphisme, donc sommande direct, et comme $U \neq \emptyset$, on a $U \longrightarrow e$ isomorphisme.

Reste à prouver que pour tout faisceau abélien constant F sur $\mathcal{X}$, on a $H^i(X, F) = 0$ pour $i > 0$. On procède par récurrence sur i, c'est déjà fait pour $i = 1$. Supposons que ce soit prouvé pour les $j < i$ (i fixé) pour tout topos *totalement* 0*-connexe.* Soit $\xi \in H^i(\mathcal{X}, F)$, soit $U \longrightarrow e$ `[un]` épimorphisme tel que $\xi|U = 0$, et considérons la suite spectrale [page 31]

$$E_2^{pq} = H^p(C(U^*, \mathcal{H}^q(F))) \Longrightarrow H^*(\mathcal{X}, F).$$


37. NB $\mathcal{X}/x$ inutile.

38. S/x inutile, car $x \xrightarrow{\text{diag}} x \times x$ est une immersion ouverte non vide, donc si $x \times x$ est irréductible, x l'est aussi. Mais il revient au même de dire que les S/x sont irréductibles (condition PS* 1, cf. 2.8, p. 21) *et* que les $x \xrightarrow{\text{diag}} x \times x$ sont dominants (ce que implique en effet que $x \times x$ est irréductible). Ceci redonne immédiatement la forme PS* 2 de la condition cofiltrante.

On a par hypothèse totalement 0-connexe

$$\pi_0(U^q) \simeq \pi_0(U)^q, \qquad (*)$$

et les composantes connexes de U^q sont totalement 0-asphériques,



donc par hypothèse de récurrence

$$E_1^{pq} = 0 \qquad \text{si } 0 < q < i,$$

donc on trouve une suite exacte

$$0 \longrightarrow H^i(C(U^*,F)) \longrightarrow H^i(\mathcal{X},F) \longrightarrow H^0(\underbrace{H^i(U^*,F)}_{\substack{\text{complexe}\\ \text{co-semisimplicial}\\ \text{pour } i\\ \text{variable}}}) = \mathrm{Ker}(H^i(U,F) \rightrightarrows H^i(U^2,F)).$$

Par hypothèse sur U, l'image de ξ dans le troisième terme est nulle, donc ξ appartient au premier terme. Mais pour $(*)$, le complexe $C(U^*,F)$ est le complexe *trivial* des puissances de $I = \pi_0(U)$, à coefficients dans M (si $F = M_{\mathcal{X}}$). Sa cohomologie en degrés > 0 est nulle, donc $\xi = 0$, q.e.d. p. 20 [page 32]

Proposition 2.15. ([39]) *Soit X un objet de* Cat. *Conditions équivalentes :*

a) X est filtrant, i.e. X est 0-connexe et X^o satisfait les conditions équivalentes du théorème 2.6 ($X^{o,\wedge}$ est localement totalement 0-connexe).

b) L'objet final de $X^\wedge$ est ind-représentable.

Démonstration. On sait qu'on a

$$e_{X^\wedge} \simeq \varinjlim_{x\in X} x, \qquad (2.15.1)$$

limite inductive prise dans $X^\wedge$. En effet, cela signifie aussi que pour tout objet a dans X, on a

$$\varinjlim_{x\in X} \underbrace{x(a)}_{\mathrm{Hom}_X(a,x)} \xrightarrow{\sim} e \qquad \text{(ensemble ponctuel)}$$

Mais considérons l'objet $X' = a\backslash X \longrightarrow X$ coétale sur X, qui est donc Cat-cofibré sur X, on sait que l'on a

$$\pi_0(X') \simeq \varinjlim_{x\in X} \pi_0(X'_x),$$

où $X'_x = \mathrm{Hom}(a,x)$, donc on trouve

$$\varinjlim_{x\in X} \mathrm{Hom}(a,x) = \pi_0(a\backslash X) = e$$

[page 33]

car $a\backslash X$ est 0-connexe.

La formule (2.15.1) montre que si X est filtrant, $e_{X^\wedge}$ est limite inductive filtrante de foncteurs représentables. On sait d'ailleurs qu'on peut réindexer par une catégorie *ordonnée* filtrante (cf. SGA 4, I 8.1.6 (c'est dû à P. Deligne !)).

On a prouvé a $\Longrightarrow$ b, prouvons b $\Longrightarrow$ a. Supposons donc

$$e_{X^\wedge} = \varinjlim_{i\in I} x_i,$$

où I est un (petit) ensemble ordonné filtrant, et $I \longrightarrow X$ un foncteur. Prouvons PS 1′ (forme droite), i.e. pour a, b dans X, `[il]` existe $\begin{matrix} a & \searrow & \\ & & x \\ b & \nearrow & \end{matrix}$. En effet, comme $\varinjlim_I \mathrm{Hom}(a, x_i) = e$, il s'ensuit que $\mathrm{Hom}(a, x_i) \neq \emptyset$ pour i grand, de même $\mathrm{Hom}(b, x_i) \neq \emptyset$, donc il suffit de prendre $\begin{matrix} a & \searrow & \\ & & x_i \\ b & \nearrow & \end{matrix}$. Prouvons PS 2_{d}, i.e. que pour `[une]` double flèche $a \overset{u}{\underset{v}{\rightrightarrows}} b$, `[il]` existe $b \longrightarrow x$ qui égalise.

Soit ξ_{i_0} dans $\mathrm{Hom}(b, x_{i_0})$, ses deux images dans $\mathrm{Hom}(a, x_{i_0})$ ne sont pas nécessairement égales, mais le deviennent dans la limite inductive, réduite à e, donc deviennent égales en composant avec $x_{i_0} \longrightarrow x_i$ pour i assez grand, donc le composé $b \longrightarrow x_{i_0} \longrightarrow x_i$ p. 21 [page 34]

$$a \rightrightarrows b \longrightarrow x_{i_0} \longrightarrow x_i$$

égalise la double flèche.

Corollaire 2.16. *Soit W un localiseur fondamental satisfaisant l'axiome des limites* Loc (8)*. Si X dans* Cat *est une catégorie filtrante ou cofiltrante, alors X est W-asphérique.*

Plus généralement et agréablement :

Corollaire 2.17. *Soit W comme dans 2.16. Alors toute catégorie filtrante est* totalement W-asphérique ([40])*, i.e. pour toute flèche $f : X \longrightarrow Y$ dans* Cat*, l'objet $f_!(e_X)$ de e_Y (défini aussi comme $y \longmapsto \pi_0(y\backslash X)$, et intervenant dans la factorisation canonique de f en ip, avec p étale et les cofibres `[?]` de p 0-connexes) est W-asphérique. En fait, $Y/f_!(e_{X^\wedge})$ est même une catégorie filtrante.*

En effet, le foncteur $f_!$ commute aux limites inductives, donc $f_! e_{X^\wedge}$ est limite inductive filtrante des $f_!(x_i) = f(x_i)$. Donc $Y/f_!(e_{X^\wedge})$ est limite inductive filtrante des $Y/f(x_i)$. Donc c'est même une catégorie filtrante, a fortiori elle est W-asphérique. [page 35]

Donc finalement, on trouve des exemples non triviaux de catégories totalement W-asphériques, i.e. des exemples donc des catégories sans objet final.

Corollaire 2.18. ([41]) *Soit X dans* Cat*, F dans $X^\wedge$. Pour que F soit ind-représentable il faut et il suffit que X/F soit filtrante.*

En effet, par (2.15), X/F est filtrante si et seulement si l'objet final F de X/F provient d'un ind-objet de X/F, mais cela signifie aussi que F est la limite inductive dans $X^\wedge$ d'un ind-objet de X, i.e. que F est ind-représentable.

Question. *Si X dans* Cat *est totalement W_∞-asphérique, i.e. les $f_!(e_{X^\wedge})$ sont W_∞-asphériques pour toute flèche $f : X \longrightarrow Y$ dans* Cat*, ou encore pour toute telle flèche, avec les $y\backslash Y$ 0-connexes ($y \in \mathrm{Ob}\, Y$), Y est W_∞-asphérique - cela implique-t-il que X soit filtrante ?* Ça ne m'étonnerait pas - et même en supposant seulement les $f_!(e_{X^\wedge})$ 1-connexes ([42]) (ils sont 0-connexes, dès que X l'est). Mais je ne veux pas m'attarder à [page 36]

39. C'est déjà dans SGA 4, I 8.
40. cf. XII, §V pour cette notion, que j'ai beaucoup peiné à dégager et à comprendre !
41. déjà dans SGA 4, I 8.
42. Ils le sont toujours (cf. XII, p. 101), c'est 2-*connexe* qu'il faut lire ici !

présent sur cette question.

La réponse à la question précédente est négative, comme on voit par la :

Proposition 2.19. ([43]) *Soit X dans* Cat *telle que $diag_X : X \longrightarrow X \times X$ soit cofinal* ([44]), *i.e. telle que X^o soit totalement* 0*-connexe. Alors X est totalement W_∞-asphérique (donc aussi totalement W-asphérique pour tout localiseur fondamental W tel que $W \supseteq W_\infty$).* p. 22

Soit en effet un foncteur cofinal $f : X \longrightarrow Y$, il faut prouver que Y est W_∞-asphérique. Or on sait que totalement 0-connexe implique W_∞-asphérique ([45]) (cf. proposition 2.3, p. 17-18), donc il suffit de voir que Y^o est totalement 0-connexe, i.e. $Y \xrightarrow{d_Y} Y \times Y$ cofinal. Or on a le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{d_X} & X \times X \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f\times f} \\ Y & \xrightarrow{d_Y} & Y \times Y, \end{array}$$

où par hypothèse f, donc aussi $f \times f$, et d_X sont cofinaux. Donc $\varphi = (f \times f) \circ p_X$ [plutôt $\varphi = (f \times f) \circ d_X$] est cofinal, et comme $\varphi = d_Y f$ et f est aussi cofinal, on conclut que d_Y l'est, q.e.d.

Corollaire. $\mathbf{\Delta}$ *étant totalement* 0*-connexe, $\mathbf{\Delta}^o$ est totalement W_∞-asphérique, pourtant elle n'est pas filtrante.*

Question. *X totalement W_∞-asphérique $\Longrightarrow$ X^o totalement* 0*-connexe ? Ou du moins implique PS 1′ ?*

Contrexemple 2.20 à la proposition fausse 2.19. [page 36bis]

Soit X un objet de Cat, rajoutons-lui la catégorie finale e comme fermé, i.e. considérons un objet X' de Cat dans lequel X soit un sous-objet ouvert, e le fermé complémentaire :

$$X \overset{i}{\hookrightarrow} X' \overset{j}{\hookleftarrow} e.$$

On sait (cf. XII) qu'une telle opération est déterminée, à isomorphisme près, par la donnée d'un objet

$$H \in \mathrm{Ob}\, X^\wedge$$

en posant

$$H(x) = \mathrm{Hom}_{X'}(x, e),$$

la catégorie X/e s'identifiant (à isomorphisme près) à X/H. Elle est donc 0-connexe si et seulement si l'objet H de $X^\wedge$ est 0-connexe. Cela signifie aussi que le morphisme i est cocofinal, i.e. que $i^o : X^o \longrightarrow X'^o$ est cofinal. Supposons maintenant X W_∞-asphérique et totalement 0-connexe, i.e. l'actuel Loc (6), cf. XVI. La proposition 2.19 affirme que, sous ces conditions, X' (qui est lui aussi totalement 0-connexe) est même W-asphérique. Il s'ensuivrait donc que $i \in W_\infty$. Mais par XII, th. 4, cor. 4 (p. 149), il s'ensuivrait que p. 23
X/e est W_∞-asphérique, i.e. H W_∞-asphérique. Ainsi, si X est totalement 0-asphérique, [page 36ter]
tout objet 0-connexe de $X^\wedge$ serait ∞-connexe. Mais c'est manifestement faux, p.ex. si on prend pour X une catégorie-test pour W_∞, p.ex. $X = \mathbf{\Delta}$.

Cela me fait soupçonner que la conjecture

$$X \text{ totalement } W_\infty\text{-asphérique} \Longrightarrow X \text{ filtrante}$$

pourrait être valable.

p. 24
[page 37]

43. **Faux.**
44. cf. définition 3.3, p. 45.
45. C'est **faux.**

3 Retour sur la cofinalité

Il est instructif de relier les questions de cofinalité (pour une flèche $u : I' \longrightarrow I$ dans Cat) au dérivateur HOT_{W_0}, où $W_0 \subseteq \mathrm{Fl}\,\mathrm{Cat}$ est le plus grossier des localiseurs dans Cat satisfaisant l'axiome de connexité Loc 5, i.e.

$$W_0 = \{f \in \mathrm{Fl}\,\mathrm{Cat} \mid \pi_0(f) \text{ bijectif}\}. \tag{3.1}$$

On trouve alors, pour I dans Cat, une équivalence canonique, 2-fonctorielle en I,

$$\mathrm{HOT}_{W_0}(I) \xrightarrow{\sim} I^\wedge \overset{\text{déf}}{=} \underline{\mathrm{Hom}}(I, (\mathrm{Ens})), \quad \texttt{[plutôt } \underline{\mathrm{Hom}}(I^o, \mathrm{Ens})\texttt{]} \tag{3.2}$$

en d'autres termes, on a une équivalence

$$\mathrm{HOT}_{W_0} \simeq \mathbf{D}_{(\mathrm{Ens})}. \tag{3.3}$$

Quand HOT_{W_0} est défini par localisation à partir de la catégorie $\mathrm{Cat}(I) \overset{\text{déf}}{=} \underline{\mathrm{Hom}}(I^o, \mathrm{Cat})$, la flèche (3.2) est celle déduite, par localisation, de la flèche

$$\begin{array}{rcl} \pi_0^I : \underline{\mathrm{Hom}}(I^o, \mathrm{Cat}) & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Hom}}(I^o, (\mathrm{Ens})) \\ X & \longmapsto & \pi_0 \circ X, \end{array} \tag{3.4}$$

où

$$\pi_0 : \mathrm{Cat} \longrightarrow (\mathrm{Ens}) \tag{3.5}$$

est le foncteur 'composantes connexes'. Si on décrit $\mathrm{HOT}_{W_0}(I)$ comme localisée de Cat/I, (3.2) est déduit de la flèche

$$\left\{ \begin{array}{rcl} \mathrm{Cat}/I & \longrightarrow & I^\wedge = \underline{\mathrm{Hom}}(I^o, (\mathrm{Ens})) \\ X & \longmapsto & \underline{\pi_0}(X/I) = (i \longmapsto \pi_0(i\backslash X)). \end{array} \right. \tag{3.6}$$

Ainsi, les foncteurs familiers, pour une flèche [page 38]

$$u : I' \longrightarrow I$$

dans Cat

$$\left\{ \begin{array}{ccc} & \xrightarrow{u_!} & \\ I'^\wedge & \xleftarrow{u^*} & I^\wedge, \\ & \xrightarrow{u_*} & \end{array} \right. \tag{3.7}$$

s'interprètent comme les foncteurs de même nom pour le dérivateur HOT_{W_0}, ou plus directement, pour le dérivateur (qu'on pourrait faussement considérer comme canularesque) $\mathbf{D}_{(\mathrm{Ens})}$. p. 25

Cela donne un sens à la cohorte des notions cohomologiques associées à un dérivateur, ou plus particulièrement, à un localiseur fondamental W sur Cat (donnant naissance au dérivateur HOT_W). On les désignera par le nom de W_0-fourbi (au lieu de HOT_{W_0}-fourbi,

ou $\mathbf{D}_{(\mathrm{Ens})}$-fourbi), notamment pour une flèche $u : I' \longrightarrow I$ de Cat telle la notion

$$\left\{\begin{array}{lll}
W_0\text{-équivalence} & \big(\Longleftrightarrow & \pi_0(u) \text{ bijectif.}\big) \\
W_0\text{-asphérique} & \big(\Longleftrightarrow & \text{les } I'/i \text{ pour } i \in \mathrm{Ob}I \text{ sont} \\
 & & \text{0-connexes.}\big) \\
W_0\text{-coasphérique} & \big(\Longleftrightarrow & \text{les } i\backslash I' \text{ pour } i \in \mathrm{Ob}I \text{ sont} \\
 & & \text{0-connexes.}\big) \\
W_0\text{-propre } ([46]) & \big(\Longleftrightarrow & \text{les inclusions } I'_i \longrightarrow I'/i \ (i \in \mathrm{Ob}I) \\
 & & \text{sont } W_0\text{-coasphériques, i.e. les fibres} \\
 & & \text{des colocalisées } i'\backslash I' \longrightarrow i\backslash I \\
 & & (i' = u(i)) \ \texttt{[plutôt}\ (i = u(i'))] \\
 & & \text{sont 0-connexes.}\big) \\
W_0\text{-lisse } ([47]) & \big(\Longleftrightarrow & \text{les inclusions } I'_i \longrightarrow i\backslash I' \\
 & & \text{sont } W_0\text{-asphériques, i.e. les fibres} \\
 & & \text{des flèches localisées } I'/i' \longrightarrow I/i \\
 & & (i = u(i')) \text{ sont 0-connexes.}\big) \\
W_0\text{-parfait} & \big(\Longleftrightarrow & W_0\text{-propre et } W_0\text{-lisse.}\big) \\
W_0\text{-équivalence universelle } ([48]) & \big(\Longleftrightarrow & \pi_0 \text{ bijectif et le reste par tout} \\
 & & \text{changement de base. Ce sont aussi} \\
 & & \text{les } W_0\text{-fibrations (ou } W_0\text{-fibrations} \\
 & & \text{faibles à fibres } W_0\text{-asphériques,} \\
 & & \text{i.e. 0-connexes.}\big) \\
W_0\text{-fibration} & \big(\Longleftrightarrow & u^* : \mathrm{Cat}/I \longrightarrow \mathrm{Cat}/I' \text{ transforme} \\
 & & W_0\text{-équivalences en } W_0\text{-équivalences.}\big) \\
W_0\text{-fibration faible } ([49]) & \big(\Longleftrightarrow & \text{le changement de base} \\
 & & u^* : \mathrm{Cat}/I \longrightarrow \mathrm{Cat}/I' \text{ transforme} \\
 & & \text{homotopismes } J_1 \longrightarrow J_2 \text{ en} \\
 & & W_0\text{-équivalences - et il suffit de} \\
 & & \text{l'exiger pour l'inclusion d'un objet} \\
 & & \text{final (ou au choix initial) et pour} \\
 & & \text{l'inclusion d'un point dans } \mathbf{\Delta}^1.\big)
\end{array}\right. \tag{3.8}$$

[page 39]

p. 26

`[Nous avons une]` implication *stricte* (et comment)

$$W_0\text{-équivalence universelle} \Longrightarrow W_0\text{-fibration}$$

46. Exemple : les Cat-cofibrations.
47. Exemple : les Cat-fibrations.
48. Exemple : les flèches W_0-lisses ou W_0-propres, à fibres 0-connexes.
49. Exemple : les flèches W_0-lisses telles que $\pi_0(I'/I) = (i \longmapsto \pi_0(i\backslash I')) = u_!(e_{I'^\wedge})$ soit localement constant sur I, i.e. $\underline{\pi_0}(I'/I)$ soit un *revêtement* étale de I, ou si u^{opp} satisfait cette condition.

`[et une]` implication *stricte* (et comment !) ([50])

$$W_0\text{-fibration} \Longrightarrow W_0\text{-fibration faible.}$$

Signalons, comme exemple d'utilisation de ces notions, que pour un diagramme cartésien dans Cat

$$\begin{array}{ccc} I' & \xleftarrow{p'} & J' \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle v} \\ I & \xleftarrow{p} & J, \end{array} \tag{3.9}$$

la flèche de changement de base pour u_*, v_* pour les préfaisceaux est `[un]` isomorphisme si u est W_0-propre, ou p W_0-lisse, et la flèche de changement de base pour $u_!$, $v_!$ est `[un]` isomorphisme si u est W_0-lisse ou p W_0 propre ([51]). Je signale à ce propos que ces énoncés, qui a priori se formulent pour les préfaisceaux à valeurs dans (Ens), restent valables pour des préfaisceaux à valeurs dans une catégorie $\mathcal{M}$ quelconque (sous réserve d'existence des operations d'images directes cohomologiques ou homologiques envisagées). Cela se voit p.ex. en notant que `[page 40]`

$$W_0\text{-équivalence} \implies \mathbf{D}_{\mathcal{M}}\text{-équivalence} \tag{3.10}$$

pour toute $\mathcal{U}$-catégorie $\mathcal{M}$, d'où résulte que toute ([52]) 'W_0-notion' implique la $\mathbf{D}_{\mathcal{M}}$-notion correspondante, et permet donc d'appliquer à $\mathbf{D}_{\mathcal{M}}$ les résultats le concernant. (Il y a bien sûr un argument direct, moins savant, consistant à se ramener au cas où $\mathcal{M}$ est petite, et à utiliser alors le plongement pleinement fidèle $\mathcal{M} \hookrightarrow \mathcal{M}^\wedge$ resp. $\mathcal{M} \hookrightarrow ((\mathcal{M}^o)^\wedge)^o$.)

Je rappelle pour mémoire une (troisième ?) caractérisation des flèches $u : I' \longrightarrow I$ W_0-propres (resp. W_0-lisses) : ce sont celles pour lesquelles le foncteur changement de base $u^* : \mathrm{Cat}/I \longrightarrow \mathrm{Cat}/I'$ transforme flèches W_0-coasphériques (resp. W_0-asphériques) en itou. Cela gagne en intérêt, du fait que la notion de foncteur W_0-coasphérique (resp. W_0-asphérique) s'interprète comme celle de foncteur cofinal (resp. co-cofinal), cf. plus bas.

La notion de W_0-fibration apparaît comme extrêmement forte - beaucoup plus forte à certains égards que celle (disons) de W_∞-fibration ou de W_ω-fibration. Elle équivaut à ceci (comme on voit aussitôt) : pour toute composante connexe I'_α de I', désignant par I_α la composante connexe correspondante de I, et pour tout J_α 0-connexe et au dessus de I_α, le produit fibré $I'_\alpha \times_{I_\alpha} J_\alpha$ est encore 0-connexe. (Ça ressemble aux histoires de totale 0-connexité d'un topos !) Mais cela signifie aussi que $I'_\alpha \longrightarrow I_\alpha$ est une W_0-équivalence universelle. Cela implique que ses fibres sont 0-connexes, et la réciproque est vraie si $u : I' \longrightarrow I$ est W_0-propre ou W_0-lisse. Ainsi, la condition essentielle pour une W_0-fibration est celle que les fibres des flèches induites $I'_\alpha \longrightarrow I_{u(\alpha)}$ `[plutôt` $I'_\alpha \longrightarrow I_\alpha$`]` soient 0-connexes. En fait, on a ceci p. 27 `[page 41]`

Proposition 3.1. *Soit $u : I' \longrightarrow I$ une flèche dans* Cat.

a) Pour que ce soit une W_0-équivalence universelle, il faut et il suffit que pour toute $\mathbf{\Delta}^1 \longrightarrow I$, i.e. toute flèche α de I, la catégorie $I' \times_I \mathbf{\Delta}^1 \overset{déf}{=} I'|\alpha$ soit 0*-connexe, ou encore que les fibres de I soient* 0*-connexes, et que pour toute flèche* non identique *α de I, $I'|\alpha$ soit* 0*-connexe.*

b) Pour que $u : I' \longrightarrow I$ soit une W_0-fibration, il faut et il suffit que pour toute composante connexe $I'_{\alpha'}$ de I', posant $\alpha = u(\alpha')$, la flèche induite $I'_{\alpha'} \longrightarrow I_\alpha$ soit `[page 42]`

50. Mais si les fibres sont 0-connexes, les deux notions de W_0-fibrations sont équivalentes et signifient qu'on a une W_0-équivalence universelle …

51. Sauf erreur, ca donne *deux caractérisations* des morphismes W_0-propres, ou des morphismes W_0-lisses.

52. Pas tout à fait exacte pour *toute* 'W_0-notion', il faut excepter les deux notions de W_0-fibration forte, et faible.

une W_0-équivalence universelle (cf. critère a) pour cette notion).

c) *Pour que ce soit une W_0-fibration faible, il* faut *que $\forall\, i \in I$, l'inclusion $I'_i \hookrightarrow i\backslash I'$ soit une W_0-équivalence, i.e. $\pi_0(I'_i) \xrightarrow{\sim} \pi_0(i\backslash I')$ soit bijectif,* et *que $i \longmapsto \pi_0(i\backslash I')$ soit un préfaisceau localement constant sur I (i.e. $\underline{\pi_0}(I'/I)$ soit un* revêtement *étale de I). Cette condition est aussi suffisante, si u est W_0-lisse. De plus (pour mémoire) u est une W_0-fibration faible si et seulement si u^{opp} l'est.*

La plus grande différence entre la notion de W_0-fibration, et celle de W_0-fibration faible, me paraît que les morphismes W_0-parfaits (i.e. W_0-lisses et W_0-propres), et a fortiori les W-parfaits pour un localiseur fondamental $W \subseteq W_0$, sont forcément des W-fibrations faibles, mais (*même si $W = W_\omega$,* le plus fin de tous les localiseurs fondamentaux) ne sont pas des W-fibrations. L'exemple le plus frappant à cet égard est sans doute celui des revêtements étales, qui sont W_ω-parfaits (donc des W_ω-fibrations faibles [page 43]
et a fortiori des W_0-fibrations faibles), mais pas des W_0-fibrations ; car dans le cas où I', I sont 0-connexes, il faudrait que les fibres soient 0-connexes (cf. b) ci-dessus), i.e. que u soit un isomorphisme !

Une propriété sympathique des morphismes W_0-lisses (resp. W_0-propres), c'est que ce sont des applications *ouvertes* (resp. fermées) pour les espaces topologiques sous-jacents, ce qui signifie en effet que les fibres locales, i.e. des flèches localisées en haut $I'/i' \longrightarrow I/i$ (resp. colocales, i.e. les flèches colocalisées en bas $i'\backslash I' \longrightarrow i\backslash I$), sont surjectives, i.e. à fibres non-vides (ce qui est impliqué par la condition que celles-ci soient 0-connexes).

Dans tout ça je n'ai encore guère parlé des flèches W_0-asphériques resp. co- p. 28
asphériques, qui pourtant sont ici une motivation principale pour introduire W_0 !

Proposition 3.2. *Conditions équivalentes sur la flèche $u : I' \longrightarrow I$ dans* Cat :

a) *Pour toute $\mathcal{U}$-catégorie $\mathcal{M}$ et tout foncteur $F : I \longrightarrow \mathcal{M}$, la flèche canonique (sous réserve que les petites limites inductives soient représentables dans $\mathcal{M}$),*

$$\varinjlim_{I'} u^*(F) \longrightarrow \varinjlim_{I} F \tag{3.2.1}$$

est [un] *isomorphisme.* [page 44]

a′) *Pour toute $\mathcal{U}$-catégorie $\mathcal{M}$ où les petites limites projectives sont représentables et tout $F \in \mathcal{M}(I) = \underline{\mathrm{Hom}}(I^o, \mathcal{M})$, i.e. tout préfaisceau sur I à valeurs dans $\mathcal{M}$, la flèche canonique*

$$\varprojlim_{I} F \longrightarrow \varprojlim_{I'} u^*(F) \tag{3.2.2}$$

est [un] *isomorphisme.*

a″) ([53]) *Comme a′, avec $\mathcal{M} = (\mathrm{Ens})$, i.e. $F \in \mathrm{Ob} I^\wedge$.* ([54]).

b) *La flèche u est W_0-coasphérique, i.e. pour tout $i \in I$, $i\backslash I'$ est 0-connexe.*

---

53. C'est une condition sur les morphismes de topos, savoir que si F [est] dans $\mathcal{X}^\wedge$, on a

$$H^0(\mathcal{X}, F) \xrightarrow{\sim} H^0(\mathcal{X}', u^*F).$$

Il y a [une] notion similaire pour les H^i ($i \leq n$), à dégager. Notion de morphismes W_0-coasphériques de topos ! C'est dans la nature d'une condition de 0-connexité relative, duale de la notion W_0-asphérique, qui signifie simplement que pour U 0-connexe dans $U^\wedge$ [plutôt $\mathcal{X}^\wedge$], $f^*(U)$ [plutôt $u^*(U)$] est 0-connexe. De même, on a sans doute des notions ('duales' des précédentes) de W_n-coasphéricité (bien comprise en principe si $\mathcal{X}$ est localement n-asphérique) (La W_n-coasphéricité, étant celle évoquée plus haut.)

54. **NB** On peut introduire

a‴) Comme a), mais avec $\mathcal{M} = (\mathrm{Ens})$.

a^{IV}) Comme a), avec le foncteur canonique $I' \longrightarrow I'^\wedge$.

L' équivalence de a, a′, a″ est ± tautologique en termes des définitions (cf. SGA 4, I, 8…). La forme a″ s'écrit, posant $\mathbf{D} = \mathrm{HOT}_{W_0}$, que $\forall\, F \in \mathbf{D}(I)$, on veut que

$$\underbrace{H^\bullet_{\mathbf{D}}(I,F)}_{\overset{\text{déf}}{=} p_{I,*}(F)} \longrightarrow \underbrace{H^\bullet_{\mathbf{D}}(I',u^*F)}_{\overset{\text{déf}}{=} p_{I',*}(F)} \qquad \texttt{[plutôt} \quad \underbrace{H^\bullet_{\mathbf{D}}(I',u^*F)}_{\overset{\text{déf}}{=} p_{I',*}(u^*F)} \texttt{]} \tag{3.2.3}$$

($p_I : I \longrightarrow e$ et $p_{I'} : I' \longrightarrow e$ les foncteurs canoniques) soit `[un]` isomorphisme. On sait que cela équivaut à u **D**-coasphérique. La démonstration est un jeu amusant entre $u_!$, u^*, u_* à la fois. Il faut exprimer que le Hom d'un objet M de $\mathbf{D}(e)$ (= (Ens) en l'occurence) dans la flèche (3.2.3) est bijective. Ici, il

est plus naturel de prendre $M = e$ (ensemble ponctuel) et d'interpréter la flèche (3.2.3) comme p. 29 [page 45]

$$\mathrm{Hom}(e_I, F) \longrightarrow \mathrm{Hom}(e_{I'}, u^*F) \tag{3.2.4}$$

et par adjonction de $u_!$, u^* le deuxième membre s'interprète comme $\mathrm{Hom}(u_!(e_{I'}), F)$, et la flèche est déduite de

$$u_! e_{I'} = u_! u^*(e_I) \xrightarrow{\text{adj.}} e_I \tag{3.2.5}$$

en prenant le Hom dans F. Donc dire que (3.2.4) est `[un]` isomorphisme pour tout F signifie que (3.2.5) est `[un]` isomorphisme. Passant aux valeurs des deux membres en i, on trouve $\pi_0(i\backslash I') \xrightarrow{\sim} 1$, i.e. que $i\backslash I'$ est 0-connexe, q.e.d.

Définition 3.3.

a) Quand les conditions équivalentes de 3.2 sont satisfaites, donc quand les $i\backslash I'$ ($i \in \mathrm{Ob}\, I$) sont 0-connexes, on dit que $u : I' \longrightarrow I$ est un foncteur *cofinal.* On dit que u est *co-cofinal* si $u^o : I'^o \longrightarrow I^o$ est cofinal, i.e. si les localisées I'/i de I' sur I ($i \in \mathrm{Ob}\, I$) sont 0-connexes.

b) Si I' est une *sous-catégorie* de I, on dit que I' *est cofinale dans* I si le foncteur d'inclusion est cofinal, *co-cofinale* si ce foncteur est co-cofinal.

Corollaire 3.4. ([55])

a) Pour que u soit cofinal, il faut *que les catégories colocalisées $i\backslash I'$ soient non-vides, i.e. qu'on ait* [page 46]

F 0) $\pi_0(f)$ `[plutôt` $\pi_0(u)$`]` *est bijectif.*

F 1) Pour tout $i \in \mathrm{Ob}\, I$, `[il]` *existe* `[un]` *$i' \in I'$ et une flèche $i \longrightarrow u(i')$ dans I.*

([56]).

b) Si I' est faiblement filtrante, pour que u soit cofinale, il suffit *qu'elle satisfasse F 1, ainsi que la condition :*

F 2) Pour toute double flèche $i \overset{\beta}{\underset{\gamma}{\rightrightarrows}} u(i')$ (avec $i \in \mathrm{Ob}\, I$, $i' \in \mathrm{Ob}\, I'$), `[il]` *existe une flèche $i' \xrightarrow{\alpha'} j'$ dans I', de telle façon que $u(\alpha')$ égalise (β, γ), i.e. $u(\alpha')\beta = u(\alpha')\gamma$.*

et ces conditions F 1, F 2 impliquent que les $i\backslash I'$ sont faiblement filtrantes, et I aussi ([57]).

p. 30

55. **NB** Pour un énoncé complémentaire de cofinalité, cf. XVIII prop. 4.9.6.3 (p. 224-225, 228-242). Il faudrait un énoncé qui coiffe les deux.

56. **NB** F 1 implique déjà `[la]` surjectivité de π_0, donc sa bijectivité si I' est 0-connexe - dans ce cas F 0 résulte de F 1.

57. Si I' est localement faiblement filtrante (= préfiltrante), alors pour la cofinalité de u, il suffit qu'on ait F 0, F 1, F 2, et alors les $i\backslash I'$ sont faiblement filtrantes, et I est préfiltrante tout comme I'.


c) Si I' est filtrante, alors u est cofinal si et seulement s'*il satisfait les deux conditions F1, F2, ou encore si et seulement si les $i\backslash I'$ sont* filtrantes *(et non seulement* 0*-connexes). Et cela implique que I' est également filtrante* ([58]).

d) Si I est préfiltrante (= localement faiblement filtrante, i.e. PS 1), et u pleinement fidèle, *pour que u soit cofinal, il* faut *et il* suffit *que u satisfasse la condition F 1 plus haut. Et alors I' est également préfiltrante, et les $i\backslash I'$ sont faiblement filtrantes. Si de plus I est filtrante, les $i\backslash I'$ et I' le sont également. (Comparer SGA 4, I 8.1.3.)*

[page 47]

Démonstration. a) F 1 est évident, car 0-connexe $\Longrightarrow$ non vide. F 0 car W_0-coasphérique $\Longrightarrow$ W_0-équivalence, i.e. $\pi_0(u)$ bijectif.

Pour *prouver* b), il suffit de prouver que F 1, F 2 (si I' est faiblement filtrante) impliquent que les $i\backslash I'$ sont faiblement filtrantes (a fortiori 0-connexes) et de plus que I l'est également. On sait déjà qu'ils sont non vides par F 1, reste à voir que si (i', α), (j', β) sont dans $i\backslash I'$, alors ils sont 'majorés' par un troisième objet de $i\backslash I'$. Comme I' est faiblement filtrante, on trouve $\begin{array}{ccc} i' & \xrightarrow{r} & \\ & & k' \\ j' & \xrightarrow{s} & \end{array}$, d'où $u(r)$, $u(s)$ dans I (cf. diagramme)




appliquant F 2 à la double flèche $u(r)\alpha, u(s)\beta : i \rightrightarrows u(k')$, on trouve $k' \xrightarrow{t} l'$ (en pointillés sur `[1e]` diagramme) telle que $(u(t)u(r))\alpha = (u(t)u(s))\beta$, soit γ, ce qui montre que l'objet $(l', \gamma : i \longrightarrow u(l'))$ majore (i', α) et (j', β).

La démonstration que si I' est faiblement filtrante et u satisfait F 1, alors I est faiblement filtrante, est immédiate.

Prouvons c). Il reste à prouver que si I' est *filtrante* (non seulement faiblement filtrante), alors si u `[est]` cofinal, alors F 2 est vérifiée, et de plus les $i\backslash I'$ et I sont filtrantes (pas seulement faiblement filtrantes). Mais notons tout de suite que $i\backslash I' \longrightarrow I'$ est coétale, donc I' filtrante, donc localement filtrante implique que $i\backslash I'$ est aussi localement filtrante ; comme par hypothèse les $i\backslash I'$ sont 0-connexes, ils sont donc filtrantes. La condition F 2 sort facilement à présent :

p. 31

[page 48]



58. Si I' est localement filtrante, u est cofinal si et seulement si elle satisfait F 0, F 1, F 2, i.e. si et seulement si les $i\backslash I'$ sont filtrantes, et alors I est localement filtrante.

Comme $i\backslash I'$ est filtrante, donc faiblement filtrante (PS 1), on peut trouver $i' \overset{r}{\underset{s}{\rightrightarrows}} j'$ telles que

$$u(r)\alpha = u(s)\beta,$$

et comme I' est filtrante, on peut trouver $t : j' \longrightarrow k'$ qui égalise la double flèche (r, s) :

$$tr = ts(\overset{\text{déf}}{=} \tau),$$

alors

$$\underbrace{u(t)u(r)}_{u(tr)}\,\alpha = \underbrace{u(t)u(s)}_{u(ts)}\,\beta \qquad \text{i.e.} \qquad u(\tau)\alpha = u(\tau)\beta,$$

i.e. on a vérifié F 2.

Reste à prouver que I est filtrante (si I' l'est et `[si]` $u : I' \longrightarrow I$ est cofinal). On sait déjà que I est faiblement filtrante par b), reste à vérifier la condition de la double flèche

$$i \overset{\alpha}{\underset{\beta}{\rightrightarrows}} j$$

(PS 2). Soit i' dans I' et $j \longrightarrow u(i')$, et considérons

$$i \overset{\gamma\alpha}{\underset{\gamma\beta}{\rightrightarrows}} u(i'),$$

par hypothèse F 2 $\exists\, r : i' \longrightarrow j'$ dans I' telle que $u(r)(\gamma\alpha) = u(r)(\gamma\beta)$, donc $u(r)\gamma$ égalise (α, β), q.e.d. `[page 49]`

La vérification de d) par AQT `[abréviation dont le sens échappe aux éditeurs]`.

p. 32

4 Foncteurs biasphériques

Soit encore

$$u : I' \longrightarrow I$$

une flèche de Cat, soit $\mathcal{M}$ une catégorie, d'où

$$u^* : \mathcal{M}(I) \longrightarrow \mathcal{M}(I'); \tag{4.1}$$

nous cherchons des conditions sur u, $\mathcal{M}$ pour que ce foncteur soit pleinement fidèle. Si le foncteur adjoint à gauche $u_!$ (resp. adjoint à droite u_*) existe, on sait qu'il revient au même de dire que le morphisme d'adjonction

$$u_! u^* F \longrightarrow F \tag{4.2}$$

resp.

$$u_* u^* F \longleftarrow F \tag{4.2 bis}$$

soit `[un]` isomorphisme pour tout F dans $\mathcal{M}(I)$. Disons alors que u est $\mathcal{M}$-connexe, ou $\mathcal{M}$-biasphérique, cette terminologie sous-entendant que c'est là une propriété qui se réfère au dérivateur $\mathbf{D}_{\mathcal{M}} = (S \longmapsto \mathcal{M}(S))$ sur Cat défini par $\mathcal{M}$. Notons que

Si u est $\mathcal{M}$-connexe, alors il est aussi $\mathcal{M}(S)$-connexe, pour tout S dans Cat, puisque $\mathcal{M}(S)(I) \simeq \mathcal{M}(I)(S) \overset{\text{déf}}{=} \underline{\mathrm{Hom}}(S^o, \mathcal{M}(I))$, (4.3)

et

Si $\mathcal{M}' \hookrightarrow \mathcal{M}$ est pleinement fidèle, alors $\mathcal{M}$-connexe implique $\mathcal{M}'$-connexe, (4.4) `[page 50]`

enfin, inversement,

pour que u soit $\mathcal{M}$-connexe, il faut et il suffit que pour toute *petite* sous-catégorie pleine $\mathcal{M}'$ de $\mathcal{M}$, u soit $\mathcal{M}'$-connexe. (4.5)

Comme toute petite $\mathcal{M}'$ se plonge dans $\mathcal{M}'^{\wedge} = \mathrm{Ens}(\mathcal{M}')$, il résulte de (4.3), (4.4), (4.5) que

Si u est Ens-connexe, il est $\mathcal{M}$-connexe pour toute catégorie $\mathcal{M}$, (4.6)

car c'est le cas si $\mathcal{M}$ est petite par (4.3), donc pour tout $\mathcal{M}$ par (4.5).

Disons qu'un foncteur u dans Cat est $\mathcal{M}$-*cofinal* ou $\mathcal{M}$-coasphérique si l'homomorphisme fonctoriel

$$\varprojlim_{I} F \longrightarrow \varprojlim_{I'} u^*(F) \tag{4.7}$$

(flèche dans $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathcal{M}(I), \mathcal{M})$ si les $\varprojlim$ de types I, I' existent dans $\mathcal{M}$, sinon flèche dans $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathcal{M}(I), \mathcal{M}^{\wedge})$) est un isomorphisme. En se ramenant au cas de petites catégories $\mathcal{M}$, chacune plongée dans $\mathcal{M}^{\wedge}$, on voit par le critère (4.2 bis) que

$$u \text{ est } \mathcal{M}\text{-connexe si pour tout } i \in \mathrm{Ob}\, I, \tag{4.8}$$

le foncteur induit $I'/i \longrightarrow I/i$ est $\mathcal{M}$-cofinal. La réciproque n'est pas claire, car u est $\mathcal{M}$-connexe si et seulement si pour tout $i \in \mathrm{Ob}\, I$ et tout $\mathcal{M}$-préfaisceau F_i sur I/i *induit par un préfaisceau F sur I,* l'homomorphisme $\varprojlim_{I/i} F_i \longrightarrow \varprojlim_{I'/i}(u/i)^*(F/i)$ est [un] isomorphisme. On ne peut donc affirmer d'emblée que cela implique itou pour *tout* F_i sur I/i, que si on sait que $(u/i)^* : \mathcal{M}(I) \longrightarrow \mathcal{M}(I/i)$ est essentiellement surjectif. Il en est ainsi pour tout i quand I est *ordonné,* car alors $I/i \longrightarrow I$ est pleinement fidèle, donc $\mathcal{M}(I/i) \longrightarrow \mathcal{M}(I)$ [est] pleinement fidèle, donc $\mathcal{M}(I) \longrightarrow \mathcal{M}(I/i)$ [est] un foncteur de localisation, en particulier essentiellement surjectif.

p. 33
[page 51]

Mais quand $\mathcal{M} = (\mathrm{Ens})$, cette perplexité disparaît. On trouve la

[page 52]

Proposition 4.1. *Soit $u : I' \longrightarrow I$ une flèche dans* Cat. *Conditions équivalentes :*

a) Pour toute catégorie $\mathcal{M}$, $u^*_{\mathcal{M}} : \mathcal{M}(I) \longrightarrow \mathcal{M}(I')$ est pleinement fidèle (i.e. u est $\mathcal{M}$-connexe).

a′) Pour toute catégorie $\mathcal{M}$ où les limites inductives de type I, I' existent, la flèche d'adjonction pour F dans $\mathcal{M}(I)$

$$u_! u^* F \xrightarrow{\sim} F$$

est [un] *isomorphisme.*

a″) Dual de a′), avec [la] *flèche d'adjonction*

$$u_* u^* \xleftarrow{\sim} F.$$

b) b′) b″) Comme a) a′) a″), avec $\mathcal{M} = (\mathrm{Ens})$.

c) Comme b′), avec F représentable, i.e. de la forme $j \longmapsto \mathrm{Hom}_I(j, i)$.

d) Pour tout I dans I, $I'/i \longrightarrow I/i$ est cofinal.

d′) Pour tout i dans I, $i\backslash I' \longrightarrow i\backslash I$ est cofinal.

d″) Pour toute flèche $i_0 \xrightarrow{\alpha} i_1$ dans I, la catégorie $i_0\backslash\underset{\alpha}{I'}/i_1 \overset{\text{déf}}{=} I' \times_I \underbrace{i_0\backslash\underset{\alpha}{I}/i_1}_{\substack{\text{catégorie biïnduite} \\ (i_0,\alpha)\backslash(I/i_1) \simeq (i_0\backslash I)/(i_1,\alpha)}}$

est

0-*connexe.*

[page 53]

DÉMONSTRATION. On sait déjà, par les préliminaires, l'équivalence de a, a′, a″, b, b′, b″, soit A cette condition - nous dirons que u est W_0-*connexe* ou W_0-*biasphérique,* si ces conditions équivalentes sont satisfaites. On a de plus l'autodualité

$$u \text{ est } W_0\text{-connexe si et seulement si } u^o \text{ l'est,} \tag{4.8}$$

car on a évidemment

$$u \text{ est } \mathcal{M}\text{-connexe si et seulement si } u^o \text{ est } \mathcal{M}^o\text{-connexe.} \tag{4.9}$$

Ceci montre l'équivalence de d, d′, qui se voit aussi par l'equivalence de chacune de ces deux conditions avec d″, par le critère de cofinalité du paragraphe précedent. Soit D cette condition sur u. On a par (4.8) D $\Longrightarrow$ A, donc p. 34

$$\mathrm{D} \Longrightarrow \mathrm{A} \Longrightarrow \mathrm{c},$$

il reste à prouver que c $\Longrightarrow$ D, plus précisément c $\Longrightarrow$ d″ et c′ $\Longrightarrow$ d″ [c′?]. Explicitons le morphisme d'adjonction (pour i dans I)

$$u_! \underbrace{u^* i} \longrightarrow i,$$

i.e. pour j dans I

$$\underbrace{(u_! u^* i)(j)}_{\pi_0(j\backslash(I'/u^*(i)))} \longrightarrow i(j) = \mathrm{Hom}(j,i).$$

Or $I'/u^*(i) \simeq I'/i$, donc on a la flèche [page 54]

$$(u_! u^*(i))(j) \simeq \pi_0(j\backslash(I'/i)) \longrightarrow \mathrm{Hom}_I(j,i). \tag{4.10}$$

Or on voit aussitôt que pour $\alpha : j \longrightarrow i$ dans $\mathrm{Hom}(j,i)$, la fibre de (4.10) en u s'identifie à $\pi_0(j\backslash \underset{\alpha}{I'/i}\ )$, de façon plus précise, $j\backslash \underset{\alpha}{I'/i}$ est la sous-catégorie ouverte et fermée de $J = j\backslash(I'/i)$ correspondant à la partie du $\pi_0(J)$ qui est au dessus de α dans (4.10). Cela achève la démonstration de 4.1.

NB Une autre façon de prouver que c $\Longrightarrow$ A c'est de noter que les deux membres dans le morphisme d'adjonction $u_! u^* F \longrightarrow F$ dans $I^\wedge$ sont des foncteurs $I^\wedge \longrightarrow I^\wedge$ qui commutent aux $\varinjlim$ quelconques. Donc pour vérifier que c'est [un] isomorphisme, il suffit de le vérifier pour F dans I, puisque I engendre $I^\wedge$ par $\varinjlim$. Par contre, un argument de ce type ne semble pas prouver que pour vérifier que l'on a un *isomorphisme* $F \longrightarrow u_* u^* F$, il suffise de le faire pour F représentable, i.e. de vérifier b″ pour F représentable.

Il resterait à voir si c′ $\Longrightarrow$ d″ [c′?].

Explicitons le morphisme d'adjonction [page 55]

$$i \longrightarrow u_* u^* i$$

(pour $i \in \mathrm{Ob}\, I$) par ses valeurs sur j

$$\underbrace{i(j)}_{\mathrm{Hom}(j,i)} \longrightarrow \Gamma(I'/j, u^* i). \tag{$*$}$$

Soit donc

$$u_j : I'/j \longrightarrow I,$$

on a p. 35

$$\Gamma(I'/j, \underbrace{u^*(i)|I'/j)}_{u_j^*(i)} \simeq \mathrm{Hom}(e_{I'/j}, u^*(i))$$
$$\overset{\mathrm{adj}}{\simeq} \mathrm{Hom}(u_{j,!}e_{I'/j}, i),$$

et la flèche $(*)$, fonctorielle en i, est déduite d'une flèche

$$u_{j,!}(e_{I'/j}) \longrightarrow j. \qquad (**)$$

On voit tout de suite, comme ci-dessus, que $(**)$ est [un] isomorphisme si et seulement si pour tout $\alpha : k \longrightarrow j$, la catégorie $k\backslash I'/j$ est 0-connexe, et si on l'exige pour tout j, k, α, c'est la condition d''. Mais il n'est pas clair que pour qu'on ait $(**)$ isomorphisme, il suffise que le Hom des deux membres à valeurs dans tout i dans I (et non tout F dans $I^\wedge$) soit [un] isomorphisme. La difficulté provient du fait que $u_{j,!}(e_{I'/j})$ n'est pas forcément représentable, et qu'un F quelconque dans $I^\wedge$ n'est pas forcément $\varinjlim$ de [page 56]
foncteurs représentables. Donc il est douteux que c' [c'?] suffise à entraîner que u est W_0-connexe.

Corollaire 4.2. *Pour que u soit W_0-connexe, il* suffit *qu'il soit une W_0-équivalence universelle, i.e. (cf. 3.1) que les fibres soient 0-connexes, et que pour toute flèche non identique dans I, définissant $\mathbf{\Delta}^1 \longrightarrow I$, $I' \times_I \mathbf{\Delta}^1$ soit 0-connexe.*

4.3. Cette condition de W_0-équivalence universelle est cependant *strictement* plus forte que la W_0-connexité, comme on le voit sur l'exemple où u est une *équivalence de catégories* non surjective sur les objets (p.ex. l'inclusion d'un sommet dans un groupoïde 1-connexe ayant plus d'un objet). Plus généralement, tout foncteur de localisation est W_0-connexe, alors que ses fibres ne sont pas forcément connexes, et a fortiori ce n'est pas une W_0-équivalence universelle.

Cependant, si tout endomorphisme p d'un i dans I, tel que $p^2 = p$ (projecteur) est l'identité, et si $I' \longrightarrow I$ est 'transportable', p.ex. si dans I tout isomorphisme est une [page 57]
identité, alors u W_0-connexe implique que les fibres de u sont 0-connexes, comme on voit en exprimant d'' pour α flèche identique. Les conditions envisagées sur I sont satisfaites si I est ordonnée. Mais même si I' et I sont toutes deux ordonnées, u peut être W_0-connexe, sans être une W_0-équivalence universelle. Voici un exemple avec $I = \mathbf{\Delta}^2$:

$$I' = \left\{ \begin{array}{ccc} & & 1' \longrightarrow 2 \\ & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & 1 \end{array} \right\} \qquad \downarrow$$
$$I = \left\{ \; 0 \longrightarrow 1 \longrightarrow 2 \; \right\}.$$

Les catégories bilocalisées de I sont les trois sommets $\{0\}$, $\{1\}$, $\{2\}$, et les trois p. 36
segments $[0,1]$, $[1,2]$ et $[0,2] = I$, les images inverses sont respectivement

$$\bullet\,, \quad \downarrow\,, \quad \bullet\,, \quad \longrightarrow\!\downarrow\,, \quad \downarrow \overset{\longrightarrow}{}\,, \quad I'\,,$$

elles sont toutes 0-connexes, i.e. W_0-asphériques, et même contractiles donc W_ω-asphériques (donc u est même W_ω-connexe, i.e. W_ω-biasphérique). Mais ce n'est pas une W_0-équivalence universelle, car l'image inverse de I' par $\mathbf{\Delta}^1 \overset{\partial}{\to} \mathbf{\Delta}^2$, $\partial(0) = 0$, $\partial(1) = 2$, est la catégorie disconnexe $\varepsilon = \{\bullet \quad \bullet\}$. [page 58]

J'avais espéré un moment que les foncteurs W_0-connexes $I' \xrightarrow{u} I$ seraient ceux qui se factorisent en $I' \xrightarrow{u_0} I'' \xrightarrow{v} I$, avec u_0 une équivalence, et v une W_0-équivalence universelle. Mais l'exemple précédent le met en défaut, avec u même W_ω-connexe. En effet, I'' serait déduit d'un ensemble préordonné, et v se factoriserait par l'ensemble ordonné correspondant, savoir I', donc serait de la forme

$$I'' \longrightarrow I' \xrightarrow{u} I,$$

où $I'' \longrightarrow I'$ est un passage au quotient, et l'image inverse de $\mathbf{\Delta}^1 \xrightarrow{\partial} I$ serait encore disconnexe (un π_0 de cardinal 2). Donc c'est vraiment sans espoir.

Cependant

Corollaire 4.3. *Supposons que u soit W_0-lisse, ou W_0-propre, ou une W_0-fibration faible. Alors u est W_0-connexe si et seulement si c'est une W_0-équivalence universelle, i.e. si et seulement si a) ses fibres sont 0-connexes et b) $I' \times_I \mathbf{\Delta}^1$* `[est]` *0-connexe pour tout $\mathbf{\Delta}^1 \longrightarrow I$ (correspondant à une flèche non identique).*

Dans les trois cas on sait que u est une W_0-équivalence universelle si et seulement si ses fibres sont W_0-connexes. Or la W_0-lissité implique que $\forall i \in \mathrm{Ob}\, I$, l'inclusion [page 59]

$$I'_i \longrightarrow i\backslash I'$$

est une W_0-équivalence, d'autre part $i\backslash I' \longrightarrow i\backslash I$ étant W_0-asphérique, donc une W_0-équivalence par hypothèse, $i\backslash I'$ est 0-connexe, donc I'_i aussi. Le cas u W_0-propre est dual. Dans le cas `[où]` u `[est]` une W_0-fibration faible, on sait encore que $I'_i \longrightarrow i\backslash I'$ est une W_0-équivalence, et on conclut comme dans le cas lisse (ou, au choix, via $I'_i \longrightarrow I'/i$).

Mais l'idée me vient que les foncteurs W_0-connexes pourraient être exactement les foncteurs de localisation ? Il revient au même de dire qu'un foncteur $u : I' \longrightarrow I$ *conservatif* (i.e. $u(\alpha)$ isomorphisme $\Longrightarrow \alpha$ isomorphisme) qui est W_0-connexe, est une équivalence. Mais c'est faux, comme on voit en prenant $I = e$, I' un groupoïde 0-connexe et non 1-connexe : $I' \longrightarrow e$ est W_0-connexe (et même une W_0-équivalence universelle), mais ce n'est pas une équivalence (et pas un foncteur de localisation).

Je voudrais généraliser la notion de flèche W_0-biasphérique au cas d'un dérivateur $\mathbf{D}$ quelconque. p. 37

Proposition 4.4. *Soit $\mathbf{D}$ un dérivateur sur* Diag, *et $u : I' \longrightarrow I$ une flèche dans* Diag. *Supposons que u_* et $u_!$ existent, et se calculent de façon standard, pour tout flèche u dans* Diag. *(En fait, il suffit que ce soit le cas pour u et ses localisées $u/i : I'/i \longrightarrow I/i$, ou u et ses colocalisées $i\backslash u : i\backslash I' \longrightarrow i\backslash I$.) Considérons les conditions :* [page 60]

a) $u^* : \mathbf{D}(I) \longrightarrow \mathbf{D}(I')$ `[est]` *pleinement fidèle.*

a') $\forall$ *F dans $\mathbf{D}(I)$, la flèche*

$$u_! u^* F \longrightarrow F$$

est un isomorphisme.

a'') $\forall$ *F dans $\mathbf{D}(I)$, la flèche*

$$u_* u^* F \longleftarrow F$$

est un isomorphisme.

b) $\forall$ *i dans I, la flèche $i\backslash I' \longrightarrow i\backslash I$ est $\mathbf{D}$-asphérique.*

b') $\forall$ *i dans I, la flèche $I'/i \longrightarrow I/i$ est $\mathbf{D}$-coasphérique.*

b'') $\forall$ *$\alpha : i_0 \longrightarrow i_1$ dans I, la catégorie $i_0\backslash I'/i_1$ est $\mathbf{D}$-asphérique.*

On a alors les implications

$$(b \Longleftrightarrow b' \Longleftrightarrow b'') \Longrightarrow (a \Longleftrightarrow a' \Longleftrightarrow a'').$$

On a $a \Longrightarrow b$ (i.e. toutes les conditions licites envisagées sont équivalentes) dans chacun des cas suivants. [page 61]

1° *I est préordonné.*

2° *$\forall$ i dans I, $\alpha_i^* : \mathbf{D}(I) \longrightarrow \mathbf{D}(I/i)$ est essentiellement surjectif.*

3° *$\forall$ i dans I, considérant $\alpha_i : I/i \longrightarrow I$, le foncteur $\alpha_{i,!} : \mathbf{D}(I/i) \longrightarrow \mathbf{D}(I)$ est conservatif.*

4° $\mathcal{D} = \mathrm{HOT}_{W_0} \approx \mathbf{D}_{\mathrm{Ens}}$.

Démonstration. L'équivalence de a, a′, a″ est claire, soit A. De même l'equivalence de b, b′, b″, soit B.

Prouvons

$$B \Longrightarrow A$$

en supposant p.ex. l'existence de u_*. On admet tacitement, avec l'existence de $u_* : \mathbf{D}(I') \longrightarrow \mathbf{D}(I)$, le mode de calcul des fibres de $u_*(-)$. Donc A, via a″, équivaut à

$$H^\bullet_{\mathbf{D}}(I'/i, u^*F) \overset{iso}{\longleftarrow} H^\bullet_{\mathbf{D}}(I/i, F) \simeq F(i)$$

pour tout F dans $\mathbf{D}(I)$, tout i dans I. p. 38

Soit

$$\alpha_i : I/i \longrightarrow F, \qquad F_i = \alpha_i^*(F),$$

on doit donc exprimer que pour tout F_i provenant d'un F, on a

$$H^\bullet_{\mathbf{D}}(I/i, F_i) \xrightarrow{\text{iso}} H^\bullet_{\mathbf{D}}(I'/i, (u/i)^*(F_i)). \qquad (*)$$

Or sous réserve d'existence de $(u/i)_!$, dire que $(*)$ est `[un]` isomorphisme pour *tout* F_i de $\mathbf{D}(I/i)$, signifie que

$$u/i : I'/i \longrightarrow I/i$$

est $\mathbf{D}$-coasphérique, d'où b′ $\Longrightarrow$ a″. Il est clair que l'implication inverse est valable si α_i^* est essentiellement surjectif, c'est le cas 2°. Or 2° est satisfait si I est préordonné, d'où le cas 1°. Le cas 4° a déjà été traité (4.1). Il faut encore traiter le cas 3°, qui contient d'ailleurs le cas 2°, donc le cas 1° (et aussi le cas 4°, cf. plus bas). [page 62]

Il faut exprimer l'isomorphie de la flèche $(*)$ pour F_i de la forme $\alpha_i^*(F)$. Soit ξ `[un]` objet de $\mathcal{A} = \mathcal{D}(e)$, il faut exprimer l'isomorphie de $\mathrm{Hom}(\xi, -)$ dans les deux membres de $(*)$, i.e. de

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(I/i, F_i) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(\xi'_{I'/i}, (u/i)^*(F_i)) \\ & \overset{\text{adj.}}{\simeq} & \mathrm{Hom}((u/i)_!(\xi'_{I'/i}), F_i), \end{array} \qquad (**)$$

`[plutôt` $\xi_{I'/i}$`]` flèche qui se déduit de

$$(u/i)_!(u/i)^*(\xi_{I'/i}) \xrightarrow{\text{adj.}} \xi_{I'/i} \qquad (***)$$

en prenant le Hom dans F_i. La condition u/i coasphérique (i.e. b′) signifie que $(***)$ est un isomorphisme pour tout ξ dans $\mathcal{A}$. *Suffit*-il pour ceci que son Hom dans un F_i soit bijectif, quand on restreint F_i dans $\mathbf{D}(I/i)$ à être dans l'image de $\mathbf{D}(I)$ par α_i^* ? Or cette flèche $(**)$, pour $F_i = \alpha_i^* F$, s'explicite par la formule d'adjonction relative au foncteur α_i, comme [page 63]

$$\mathrm{Hom}(\alpha_{i,!}(\xi_{I/i}), F) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\alpha_{i,!}(\ldots), F).$$

Dire que c'est un isomorphisme pour tout F, signifie donc *exactement* que la transformée de la flèche $(***)$ par $\alpha_!$ est un isomorphisme. Pour en conclure que $(***)$ elle-même est `[un]` isomorphisme, la condition naturelle à imposer est donc que $\alpha_{i,!} : \mathbf{D}(I/i) \longrightarrow \mathbf{D}(I)$ soit conservatif. C'est le cas 3°. Cela achève la démonstration de 4.4. p. 39

4.5. Montrons que la condition 3° sur I n'est pas toujours satisfaite, dans le cas de $\mathbf{D} = (\mathrm{HOT}_{W_0})^{\mathrm{opp}} \approx (\mathbf{D}_{\mathrm{Ens}})^{\mathrm{opp}}$, bien que dans ce cas, il soit pourtant vrai que pour toute I' sur

I satisfaisant la condition a'' (autoduale), la condition b' (elle aussi autoduale) est aussi satisfaite (par cas 4° ci-dessus). Je dis donc qu'il existe I et i dans I, tels que

$$\beta_{i,*} : (i\backslash I)^\wedge \longrightarrow I^\wedge$$

ne soit pas conservatif. (**NB** Par contre $\alpha_{i,!} : (I/i)^\wedge \longrightarrow I^\wedge$ est toujours conservatif, ce qui redonne le cas 4° comme cas particulier de 3°). Comme $\beta_i : i\backslash I \longrightarrow I$ est W_0-propre (et même W_ω-propre !), $\beta_{i,*}$ 'se calcule fibre par fibre', donc on a [page 64]

$$\beta_{i,*}(G)(j) \simeq \prod_{\alpha \in \mathrm{Hom}(i,j)} G(\alpha),$$

la fibre en question en j étant discrète. Prenons

$$I = 0 \overset{\alpha}{\underset{\beta}{\rightrightarrows}} 1, \qquad \text{avec } \alpha \neq \beta,$$

alors $0\backslash I$ est $\Psi = \begin{array}{ccc} & \overset{\alpha'}{\nearrow} & 1 \\ 0 & & \\ & \underset{\beta'}{\searrow} & 1' \end{array}$, et $\Psi^\wedge$ est la catégorie des diagrammes d'ensembles $G = \begin{array}{ccc} & \overset{\lambda}{\swarrow} & G_1 \\ G_0 & & \\ & \underset{\mu}{\nwarrow} & G_{1'} \end{array}$. Le foncteur β_* déduit de $\beta : i\backslash I \longrightarrow I$ transforme ce diagramme en

$$G_1 \times G_{1'} \overset{\lambda\,\mathrm{pr}_1}{\underset{\lambda\,\mathrm{pr}_2}{\rightrightarrows}} G_0.$$

[plutôt $\mu\,\mathrm{pr}_2$]. Si on se borne aux diagrammes G pour lesquels $G_{1'} = \emptyset$, β_* sur ceux-ci donne

$$\emptyset \rightrightarrows G_0,$$

donc la restriction de β_* à cette sous-catégorie (équivalente à $(\mathbf{\Delta}^1)^\wedge$) n'est pas fidèle, ni conservative, ne tenant compte que de la composante G_0, et non pas de G_1.

[page 63bis]

Definition 4.6. *On dit que $u : I' \longrightarrow I$ dans* Diag *est* **D**-biasphérique *si elle satisfait les conditions équivalentes b, b', b'' de 4.4,* **D**-connexe *si elle satisfait la condition a, ou encore (sous réserve d'existence de $u_!$ resp. de u_*) les conditions équivalentes a', a''.*

Ainsi, **D**-biasphérique implique **D**-connexe, et la réciproque est vraie quand I satisfait (par rapport à **D**) la condition 3° de 4.4 (donc aussi, si elle satisfait l'une des conditions plus faibles 2°, 1°), ou la condition duale de celle-ci (vu que les notions **D**-biasphérique, **D**-connexe sont autoduales). À cet égard, notons le

Corollaire 4.7. *Supposons que $\mathcal{A} = \mathbf{D}(e)$ satisfasse la condition suivante : le foncteur*

$$\begin{cases} \mathcal{A} \times \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{A} \\ (\xi \quad , \quad \eta) \longrightarrow \xi \amalg \eta \end{cases}$$

est conservatif (resp. fidèle). Alors pour toute flèche étale $u : J \longrightarrow I$ dans Diag *(et en particulier pour $I/i \longrightarrow I$), le foncteur $u_! : \mathbf{D}(J) \longrightarrow \mathbf{D}(I)$ est conservatif (resp. fidèle)* ([4]). *Si cette condition, ou la condition duale, impliquant les produits $\xi \times \eta$ (ξ, η dans* p. 40 [page 64bis]

$\mathcal{A}$), est satisfaite, alors pour toute flèche $u : I' \longrightarrow I$ dans Diag, *u est* **D***-connexe si et seulement si u est* **D***-biasphérique.*


Démonstration. L'hypothèse de conservativité, ou de fidélité se transporte aux sommes indexées par un ensemble quelconque (sous réserve d'existence), comme on voit en écrivant $\coprod_{\lambda} \xi_\lambda = \xi_{\lambda_0} \amalg \coprod_{\lambda \neq \lambda_0} \xi_\lambda$. L'assertion faite sur $u_!$ résulte alors du calcul de $u_!$ fibre par fibre (qui est valable vu que u est étale donc lisse), en tenant compte que les fibres sont discrètes.

Je ne connais pas d'exemple d'un couple $(\mathbf{D}, u)$ d'un dérivateur $\mathbf{D}$ et d'une flèche u dans Diag, pour lesquels u soit $\mathbf{D}$-connexe sans être $\mathbf{D}$-asphérique. On a donné des conditions sur $\mathbf{D}$, qui assurent équivalence des deux notions. Si $\mathbf{D}$ est de la forme $\mathbf{D}_{\mathcal{M}}$, et si $\mathcal{M}$ satisfait la condition dite dans 4.7 ou sa duale, alors par 4.7 c'est OK. Donc un contrexemple avec un $\mathbf{D}_{\mathcal{M}}$ devrait en tenir compte. Je ne vais pas m'obstiner pour tirer au clair ce qui en est.

[page 65]

Corollaire 4.8. *Une flèche u de* Diag *qui est une* **D***-équivalence universelle est* **D***-biasphérique, et* a fortiori **D***-connexe. Inversement, si u est soit* **D***-lisse, soit* **D***-propre, soit une* **D***-fibration faible, et si u est* **D***-biasphérique, c'est une* **D***-équivalence universelle.*

La démonstration est celle du cas particulier 4.3. On a donc un diagramme d'implications :



([5]). Rappelons que pour $u : I' \longrightarrow I$ donné

a) u est $\mathbf{D}$-asphérique si et seulement si $\forall\, F$ *constant* dans $\mathbf{D}(I)$

$$F \xrightarrow[\sim]{\text{adj.}} u_* u^* F \qquad \text{est } \texttt{[un]} \text{ isomorphisme.} \qquad (*)$$

p. 41

b) u est $\mathbf{D}$-coasphérique si et seulement si $\forall\, F$ *constant* dans $\mathbf{D}(I)$

$$F \xleftarrow[\sim]{\text{adj.}} u_! u^* F \qquad \text{est } \texttt{[un]} \text{ isomorphisme.} \qquad (**)$$

c) u est $\mathbf{D}$-connexe si et seulement si pour *tout* F dans $\mathbf{D}(I)$ (pas forcément constant, ni localement constant), $(*)$ est `[un]` isomorphisme, ou ce qui revient au même, pour tout F $(**)$ est `[un]` isomorphisme.

[page 66]

4. **NB** Cette condition est satisfaite si $\forall\, \xi, \eta \in \mathcal{A}$ on a $\mathrm{Hom}(\xi, \eta) \neq \emptyset$, (car on se ramène à ceci : si u_1, u_2 sont deux flèches dans Ens entre ensembles *non vides,* et si $u_1 \times u_2$ est `[un]` isomorphisme, u_1, u_2 sont `[des]` isomorphismes). Cela s'applique en particulier si $\mathcal{A}$ admet un objet neutre, p.ex. si $\mathcal{A}$ est additive.

5. **NB** Ces sept classes de morphismes dans Cat sont stables par composition sauf la notion de $\mathbf{D}$-connexité, toutes ces notions ne dépendent que de l'ensemble $W = W_{\mathbf{D}}$ des $\mathbf{D}$-équivalences.

Rappelons que la classe W_{asph} [des] flèches W-asphériques et celle, Liss_W, des flèches W-lisses, se déterminent mutuellement, ainsi

$$\begin{cases} (f : X \longrightarrow Y) \in W_{\text{asph}} & \iff & \forall\, (Y' \xrightarrow{u} Y) \in \text{Liss}_W, \\ & & X' = X \times_Y Y' \longrightarrow X' \text{ est } \in W. \\ (f : Y' \longrightarrow Y) \in \text{Liss}_W & \iff & \text{Le foncteur } X \longmapsto X' = X \times_Y Y' \\ & & \text{de Cat}/Y \text{ dans Cat}/Y' \text{ transforme} \\ & & \text{flèches dans } W_{\text{asph}} \text{ dans [plutôt en]} \\ & & \text{flèches dans } W_{\text{asph}}. \end{cases} \tag{4.10}$$

Pour toute partie A de Fl(Cat) stable par isomorphismes, on peut associer une partie $\mathbf{L}(A)$ de Fl(Cat), par la relation

$$\begin{array}{rcl} (u : Y' \longrightarrow Y) \in \mathbf{L}(A) & \iff & u^* : \text{Cat}/Y \longrightarrow \text{Cat}/Y' \\ & & \text{transforme flèches} \\ & & \in A \text{ en flèches } \in A. \end{array} \tag{4.11}$$

On voit que $\mathbf{L}(A)$ contient les isomorphismes, est stable par composition, et est stable aussi par changement de base (comme c'est le cas de Liss_W). Inversement, à une partie L de Fl(Cat), stable par isomorphismes, on associe une partie $\mathbf{A}_W(L)$ par

$$\begin{array}{rcl} (f : X \longrightarrow Y) \in \mathbf{A}_W(L) & \iff & \forall\, (Y' \longrightarrow Y) \text{ dans } L, \\ & & X' = X \times_Y Y' \longrightarrow Y' \\ & & \text{est dans } W. \end{array} \tag{4.12}$$

Si L est stable par changement de base, alors $\mathbf{A}_W(L)$ est stable par composition. Il contient les isomorphismes (car W les contient), est contenu dans W si L contient les identités. Mais aucune raison qu'il soit stable par changement de base quelconque (et en fait, W_{asph} ne l'est pas). [page 67]

([6]). On a, pour un $A \subseteq W \subseteq \text{Fl(Cat)}$ donné, stable par isomorphismes,

$$A \subseteq \mathbf{A}_W(\mathbf{L}(A)) \overset{\text{déf}}{=} A^\natural \subseteq W, \qquad \begin{array}{l} \text{partie stable par composition,} \\ \text{contient [les] isomorphismes,} \end{array} \tag{4.13}$$

et pour toute partie L de Fl(Cat) qui est stable par changement de base, et par composition p. 42

$$L \subseteq \mathbf{L}(\mathbf{A}_W(L)) \overset{\text{déf}}{=} L^\flat, \qquad \begin{array}{l} \text{partie de Fl Cat stable} \\ \text{par composition et par changement} \\ \text{de base, contenant les isomorphismes.} \end{array} \tag{4.14}$$

On a

$$\begin{cases} A^{\natural\natural} = A^\natural, & \text{car } \mathbf{A}_W(L)^\natural = \mathbf{A}_W(L) \\ L^{\flat\flat} = L^\flat, & \text{car } \mathbf{L}(A)^\flat = \mathbf{L}(A). \end{cases}$$

Exemples :

$1^o)$ $L = \text{Ét}$, $\mathbf{A}_W(L) = W_{\text{asph}}$, $\mathbf{L}(\mathbf{A}_W(L)) = L^\flat = \text{Liss}_W$.

$2^o)$ $L = \text{Coét}$, $\mathbf{A}_W(L) = W_{\text{coas}}$, $\mathbf{L}(\mathbf{A}_W(L)) = L^\flat = \text{Prop}_W$.

$3^o)$ $A = W$, $\mathbf{L}(A) = \text{Fib}_W$, $A^\natural = W$.

$4^o)$ $L = \text{Fl Cat}$, $\mathbf{A}_W(L) = W_{\text{univ}}$, $L^\flat = L$.

[page 68 vide]

6. Canulé [jusqu'à la fin du §4], cf. §6. p. 43

[page 69]

5 Dualité formelle

Soient $\mathcal{P}$, $\mathcal{Q}$ deux ensembles ordonnés. J'essaye de dégager une notion de 'dualité' (formelle) reliant $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$. Ce sera une relation entre $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$

$$\mathcal{R} \subseteq \mathcal{P} \times \mathcal{Q} \tag{5.1}$$

ayant les propriétés suivantes

(D) Pour toute partie A de $\mathcal{P}$, l'ensemble

$$A^{\cup} \overset{\text{déf}}{=} \{q \in \mathcal{Q} \mid (p,q) \in \mathcal{R} \text{ pour tout } p \in A, \text{ i.e. } A \times \{q\} \subseteq \mathbf{R}\}$$

est une partie ouverte de $\mathcal{Q}$ ayant un plus grand élément $\beta(A)$: $A^{\cup} = \mathcal{Q}/\beta(A)$. Dualement, pour toute partie B de $\mathcal{Q}$, l'ensemble

$$B^{\cap} \overset{\text{déf}}{=} \{p \in \mathcal{P} \mid (p,q) \in \mathcal{R} \text{ pour tout } q \in B, \text{ i.e. } \{p\} \times B \subseteq \mathcal{R}\}$$

est une partie ouverte de $\mathcal{P}$ ayant un plus grand élément $\alpha(B)$, i.e. $B^{\cap} = \mathcal{P}/\alpha(B)$.

Le plus souvent, $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$ seront stables par sup quelconques (donc aussi par inf quelconques). Dans ce cas, (D) équivaut, du côté des $A^{\cup}$ (pour $A \in \mathfrak{P}(\mathcal{P})$) à ceci :

(D_0) Pour tout $p \in \mathcal{P}$, $\mathcal{R}(p) = \{q \in Q \mid (p,q) \in \mathcal{R}\}$ est une partie ouverte *filtrante* de $\mathcal{Q}$, ou ce qui revient au même, une partie non vide ($\Longleftrightarrow$ contenant le plus petit élément $\emptyset_{\mathcal{Q}}$ de $\mathcal{Q}$) stable par sup de deux éléments. De plus, $\mathcal{R}(p)$ est stable par sup filtrants, ou ce qui revient au même (étant lui-même filtrant), il contient un plus grand élément. Il revient au même de dire que $\mathcal{R}(p)$ est un *ouvert* de $\mathcal{Q}$ stable par sup quelconques (ce qui implique qu'il contient $\emptyset_{\mathcal{Q}}$). Dualement, pour tout $q \in \mathcal{Q}$, ${}^{s}\mathcal{R}(q) = \{p \in \mathcal{P} \mid (p,q) \in \mathcal{R}\}$ est une partie *ouverte* de $\mathcal{P}$, stable par sup quelconques, i.e. une partie ouverte ayant un plus grand élément. [page 70]

En d'autres termes, quand on postule la condition (D) pour A resp. B réduit à un élément, alors elle reste vérifiée pour toute partie. Cela provient des formules

$$\begin{cases} (\bigcup_i A_i)^{\cup} &= \bigcap_i A_i^{\cup} \\ (\bigcup_j B_j)^{\cap} &= \bigcap_j B_j^{\cap}, \end{cases} \tag{5.2}$$

et du fait que l'intersection de parties ouvertes de la forme $\mathcal{P}/\alpha_i$ dans $\mathcal{P}$ est de la forme $\mathcal{P}/\alpha$, où $\alpha = \inf_i \alpha_i$, et de même dans $\mathcal{Q}$. Ainsi on trouve

$$\begin{cases} \beta(\bigcup_i A_i) &= \inf_i \beta(A_i) \\ \alpha(\bigcup_j B_j) &= \inf_j \alpha(B_j). \end{cases} \tag{5.3}$$

On posera, pour une partie A de $\mathcal{P}$ resp. B de $\mathcal{Q}$ p. 44

$$A^{\natural} = (A^{\cup})^{\cap}, \qquad B^{\flat} = (B^{\cap})^{\cup} \tag{5.4}$$

de sorte qu'on aura

$$A \subseteq A^{\natural}, \qquad B \subseteq B^{\flat} \tag{5.5}$$

On dira que A est $\mathcal{R}$-*clos* si $A = A^{\natural}$ (ou encore si A est de la forme $B'^{\cap}$ pour $B' \subseteq \mathcal{Q}$, cf. 5.6), que B est $\mathcal{R}$-*clos* si $B = B^{\flat}$. On aura pour tout $A \subseteq \mathcal{P}$, $B \subseteq \mathcal{Q}$ [71]

$$\begin{cases} (A^{\cup})^{\flat} &= A^{\cup}, \quad \text{i.e. } A^{\cup} \text{ est } \mathcal{R}\text{-clos}, \\ (B^{\cap})^{\natural} &= B^{\cap}, \quad \text{i.e. } B^{\cap} \text{ est } \mathcal{R}\text{-clos}. \end{cases} \tag{5.6}$$

En particulier

$$(A^\natural)^\natural = A^\natural, \qquad (B^\flat)^\flat = B^\flat, \tag{5.7}$$

i.e. la $\mathcal{R}$-clôture $A^\natural$ de $A \subseteq \mathcal{P}$ est $\mathcal{R}$-clos, et de même la $\mathcal{R}$-cloture $B^\flat$ de $B \subseteq \mathcal{Q}$.

En fait, je m'aperçois que je suis en train de mélanger deux espèces de faits différents. Les relations (5.2), et (5.4) à (5.7), ne dépendent pas de la donné de relations d'ordre sur $\mathcal{P}$, $\mathcal{Q}$, ni d'axiomes reliant celles-ci à la relation donnée $\mathcal{R}$, mais seulement de cette relation, laquelle n'a pas à être soumise à aucune condition. Notons que

$$\emptyset^\cup = \mathcal{Q}, \qquad \emptyset^\cap = \mathcal{P}, \tag{5.8}$$

tandis que

$$\emptyset^\natural = \mathcal{Q}^\cap, \qquad \emptyset^\flat = \mathcal{P}^\cup \tag{5.9}$$

sont respectivement la plus petite partie $\mathcal{R}$-close de $\mathcal{P}$ et de $\mathcal{Q}$.

L'application

$$A \longmapsto A^\natural \tag{5.10}$$

est une application *croissante* (et *idempotente*) de $\mathfrak{P}(\mathcal{P})$ dans lui-même, ayant donc la propriété [72]

$$(\bigcup_i A_i)^\natural = (\bigcup_i A_i^\natural)^\natural.$$

Pour tout $A \subseteq \mathcal{P}$, $A^\natural$ est la plus petite partie $\mathcal{R}$-close de $\mathcal{P}$ contenant A, et de même p. 45
pour tout $B \subseteq \mathcal{Q}$, $B^\flat$ est la plus petite partie $\mathcal{R}$-close de Q contentant B. On a de plus (c'était même à dire avant de dire que $A \longmapsto A^\natural$ est croissante)

$$\begin{cases} A \subseteq A' & \Longrightarrow \quad A'^\cup \subseteq A^\cup \\ B \subseteq B' & \Longrightarrow \quad B'^\cap \subseteq B^\cap, \end{cases} \tag{5.11}$$

i.e. les applications

$$\mathfrak{P}(\mathcal{P}) \underset{\alpha}{\overset{\beta}{\rightleftarrows}} \mathfrak{P}(\mathcal{Q}) \qquad \begin{matrix} A \longmapsto A^\cup \\ B \longmapsto B^\cap \end{matrix} \tag{5.12}$$

sont décroissantes (ce qui implique que les deux composés $\alpha\beta = (A \longmapsto A^\natural)$ et $\beta\alpha = (B \longmapsto B^\flat)$ sont croissantes). Leurs restrictions aux sous-ensembles $\mathfrak{P}_\mathcal{R}(\mathcal{P})$ et $\mathfrak{P}_{^s\mathcal{R}}(\mathcal{Q})$ des parties $\mathcal{R}$-closes de $\mathcal{P}$ resp. de $\mathcal{Q}$, sont, par définition de celles-ci comme

$$\begin{aligned} \mathfrak{P}_\mathcal{R}(\mathcal{P}) &= \{A \subseteq \mathcal{P} \mid A^\natural \ (\overset{\text{déf}}{=} \alpha\beta(A)) = A\} \\ \mathfrak{P}_{^s\mathcal{R}}(\mathcal{Q}) &= \{B \subseteq \mathcal{Q} \mid B^\flat \ (\overset{\text{déf}}{=} \beta\alpha(B)) = B\}, \end{aligned}$$

inverse l'une de l'autre. On trouve ainsi

Proposition 5.1. *Soient $\mathcal{P}$, $\mathcal{Q}$ deux ensembles, $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{P} \times \mathcal{Q}$ une relation. Alors les applications α, β de (5.12) induisent des bijections inverses l' une de l'autre, entre* [73]
l'ensemble $Cl_\mathcal{R}(\mathcal{P})$ des parties $\mathcal{R}$-closes de $\mathcal{P}$, et l'ensemble $Cl_{^s\mathcal{R}}(\mathcal{Q})$ des parties ${}^s\mathcal{R}$-closes (nous dirons $\mathcal{R}$-closes par abus de langage) de $\mathcal{Q}$. Ces bijections sont décroissantes, donc des antiisomorphismes pour les relations d'ordre naturelles (d'inclusion).

Corollaire 5.2. *Soit $(A_i)_i$ une famille de parties $\mathcal{R}$-closes de $\mathcal{P}$. Alors $\bigcap A_i$ est une partie $\mathcal{R}$-close de $\mathcal{P}$, et*

$$(\bigcap_i A_i)^\cup = \underbrace{(\bigcup_i A_i^\cup)^\flat}_{\substack{\text{sup des} \\ \text{parties } \mathcal{R}\text{-closes} \\ A_i^\cup \text{ de } \mathcal{Q}}} . \tag{5.2.1}$$

Mais la relation $\mathcal{R}$ se 'prolonge' en une relation $\bar{\mathcal{R}}$ entre

$$\bar{\mathcal{P}} = \mathfrak{P}(\mathcal{P}), \qquad \bar{\mathcal{Q}} = \mathfrak{P}(\mathcal{Q}) \tag{5.13}$$

par la prescription

$$\underbrace{\bar{\mathcal{R}}}_{\subseteq \bar{\mathcal{P}} \times \bar{\mathcal{Q}}} = \{(A, B) \in \bar{\mathcal{P}} \times \bar{\mathcal{Q}} \mid B \subseteq A^{\cup}, \text{ i.e. } A \subseteq B^{\cap}, \text{ i.e. } A \times B \subseteq \mathcal{R}\}. \tag{5.14}$$

Les ensembles $\bar{\mathcal{P}}$, $\bar{\mathcal{Q}}$ sont stables par sup quelconques (réunion de parties de $\mathcal{P}$ resp. $\mathcal{Q}$), et la relation $\bar{\mathcal{R}}$ sur ces ensembles ordonnés satisfait à la condition (D_0) ci-dessus (p. 69), p. 46 de façon évidente : pour A fixé, les B tels que $(A, B) \in \bar{\mathcal{R}}$ sont ceux qui sont contenus [74] dans $A^{\cup}$, donc l'ensemble $\bar{\mathcal{R}}(A)$ n'est autre que $\bar{\mathcal{Q}}/A^{\cup}$, et dualement ${}^{s}\bar{\mathcal{R}}(B)$ n'est autre que $\bar{\mathcal{P}}/B^{\cap}$. Ainsi

$$\beta(A) = A^{\cup}, \qquad \alpha(B) = B^{\cap}. \tag{5.14}$$

Si j'ai songé à introduire l'axiome (D_0), pour un couple d'ensembles ordonnés quelconques, c'est à cause des cas où ceux-ci ne sont *pas* de la forme $\mathfrak{P}(\mathcal{P})$, $\mathfrak{P}(\mathcal{Q})$, et (alors même qu'ils le seraient) où la relation de base n'est pas déduite comme ci-dessus d'une relation quelconque entre ensembles $\mathcal{P}$, $\mathcal{Q}$.

Je reviens donc à l'axiomatique du début, avec $\mathcal{P}$, $\mathcal{Q}$ ordonnés, et $\mathcal{R}$ satisfaisant (D). Dans tous les cas auxquels je peux songer, $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$ sont stables par sup quelconques, donc (D) équivaut à (D_0). Notons que l'application

$$\mathcal{P} \longrightarrow \mathfrak{P}(\mathcal{P}), \qquad p \longmapsto \mathcal{P}/p$$

est injective, et de même pour $\mathcal{Q} \longrightarrow \mathfrak{P}(\mathcal{Q})$. Ainsi, la connaisance de $A \longmapsto A^{\cup}$ équivaut à celle de

$$\begin{array}{rcl} A & \longmapsto & \beta(A) \\ \beta : \mathfrak{P}(\mathcal{P}) & \longrightarrow & \mathcal{Q}, \end{array}$$

et de même celle de $B \longmapsto B^{\cap}$ équivaut à celle de [75]

$$\alpha : \mathfrak{P}(\mathcal{Q}) \longrightarrow \mathcal{P}.$$

En fait, il suffit de se donner

$$\begin{array}{lcll} \beta_0 : & \mathcal{P} & \longrightarrow & \mathcal{Q} \\ \alpha_0 : & \mathcal{Q} & \longrightarrow & \mathcal{P} \end{array} \qquad \begin{array}{l} \text{applications} \\ \textit{décroissantes} \end{array} \tag{5.15}$$

définies par

$$\left\{ \begin{array}{rcl} \beta_0(p) & = & \beta(\{p\}) \\ \alpha_0(q) & = & \alpha(\{q\}), \end{array} \right.$$

puisqu'on en déduit β, α par

$$\left\{ \begin{array}{rcl} \beta(A) & = & \inf_{p \in A} \beta_0(p) \\ \alpha(B) & = & \inf_{q \in B} \alpha_0(q). \end{array} \right. \tag{5.16}$$

La relation $\mathcal{R}$ se déduit de la donnée de β_0, ou au choix de α_0, par

$$(p, q) \in \mathcal{R} \iff q \leq \beta_0(p) \iff p \leq \alpha_0(q). \tag{5.17}$$

p. 47
[76]

Cela implique donc que α_0, β_0 se déterminent mutuellement, par les formules

$$\left\{\begin{array}{rcl}\alpha_0(q) & = & \sup \underbrace{\{p \in \mathcal{P} \mid q \leq \beta_0(p)\}}_{\{q\}^\cap} \\ \beta_0(p) & = & \sup \underbrace{\{q \in \mathcal{Q} \mid p \leq \alpha_0(q)\}}_{\{p\}^\cup}.\end{array}\right. \tag{5.18}$$

Reste à se demander quelles sont les applications $\alpha_0 : \mathcal{P} \longrightarrow \mathcal{Q}$, ou $\beta_0 : \mathcal{Q} \longrightarrow \mathcal{P}$, qui correspondent à une *'relation dualisante'* $\mathcal{R}$ sur $\mathcal{P} \times \mathcal{Q}$. Voici les conditions sur $\beta_0 : \mathcal{P} \longrightarrow \mathcal{Q}$:

ⓐ β_0 est *décroissante*,

ce qui implique que la relation

$$\underbrace{\mathcal{R}_{\beta_0}}_{\subseteq \mathcal{P}\times\mathcal{Q}} = \{(p,q) \in \mathcal{P} \times \mathcal{Q} \mid q \leq \beta_0(p)\}$$

satisfait à la condition (D_0) du côté gauche, et il faut encore la vérifier du côté droit, i.e. regarder, pour q fixé, l'ensemble

$$\{q\}^\cap = \{p \in \mathcal{P} \mid q \leq \beta_0(p)\}.$$

Comme β_0 est décroissant, on voit que $p \in \{q\}^\cap$, et $p' \leq p \Longrightarrow p' \in \{q\}^\cap$, i.e. $\{q\}^\cap$ est *ouvert.* On doit vérifier encore (supposant l'existence des sup quelconques dans $\mathcal{P}$) que cet ensemble est stable par sup quelconques - il en résultera qu'il est de la forme $\mathcal{P}/\alpha(q)$. Cela équivaut à la condition

ⓑ β_0 transforme sup quelconques dans $\mathcal{P}$ en inf dans $\mathcal{Q}$.

Si on regarde β_0 comme un foncteur contravariant $\mathcal{P}^o \longrightarrow \mathcal{Q}$, cela signifie qu'il commute aux limites projectives, ou encore qu'il a un adjoint à gauche $\mathcal{Q} \longrightarrow \mathcal{P}^o$, lequel commute aux limites inductives, et correspond à l'application décroissante $\alpha_0 : \mathcal{Q} \longrightarrow \mathcal{P}$, transformant sup en inf. [77]

Ici il est commode de considérer $\natural$ et $\flat$ comme des opérations sur $\mathcal{P}$ resp. $\mathcal{Q}$, par

$$p^\natural = \alpha_0\beta_0(p), \qquad q^\flat = \beta_0\alpha_0(q). \tag{5.19}$$

La relation entre ces endomorphismes, et l'opération de même nom sur $\mathfrak{P}(\mathcal{P})$, $\mathfrak{P}(\mathcal{Q})$, est donnée par

$$\left\{\begin{array}{rcl} p^\natural & = & \text{Plus grand élément de } \{p\}^\natural \\ A^\natural & = & \sup_{p\in A} p^\natural, \end{array}\right. \tag{5.20}$$

et symétriquement du côté de $\mathcal{Q}$.

On dit que p est $\mathcal{R}$-*clos,* ou β_0-clos, ou α_0-clos, si $p = p^\natural$, et de même $q \in \mathcal{Q}$ est dit $\mathcal{R}$-*clos* etc. si $q = q^\flat$. Les applications p. 48

$$\left\{\begin{array}{rcccc} p & \longmapsto & p^\natural & : & \mathcal{P} \longrightarrow \mathcal{P} \\ q & \longmapsto & q^\flat & : & \mathcal{Q} \longrightarrow \mathcal{Q} \end{array}\right. \tag{5.21}$$

sont *croissantes* et *idempotentes.* On peut caractériser $p^\natural$ comme le plus petit élément clos de $\mathcal{P}$ majorant p, et de même pour $q^\flat$. On trouve alors, par (5.19), que α_0 et β_0 induisent des bijections inverses l'une de l'autre, entre l'ensemble des éléments clos de $\mathcal{P}$, et l'ensemble des éléments clos de $\mathcal{Q}$ [78]

$$\mathcal{P}^\natural \underset{\bar{\alpha}_0}{\overset{\bar{\beta}_0}{\underset{\sim}{\rightleftarrows}}} \mathcal{Q}^\flat. \tag{5.22}$$

Mais en pratique, les applications α_0, β_0 ne sont pas obtenues directement, mais on dispose de la relation $\mathcal{R}$, satisfaisant la condition (D_0), dont on déduit α_0, β_0. Dans tous les cas auxquels je pense ici, ou bien $\mathcal{P}$, $\mathcal{Q}$ sont de la forme $\mathfrak{P}(P_0)$, $\mathfrak{P}(Q_0)$, et $\mathcal{R}$ se déduit d'une relation $R_0 \subseteq P_0 \times Q_0$ comme ci-dessus (de loin le plus fréquent, il me semble), ou bien $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$ apparaissent comme sous-ensembles convenables d'ensembles $\mathfrak{P}(P_0)$, $\mathfrak{P}(Q_0)$, munis de l'ordre induit, et la relation $\mathcal{R}$ sur $\mathcal{P} \times \mathcal{Q}$ s'obtient d'une façon plus complexe.
Exemples.

1) Relations d'*orthogonalité* entre parties de deux modules sur un anneau, muni d'un accouplement de dualité. Dans le cas des `[espaces]` vectoriels de dimension finie et d'une vraie dualité, les parties closes sont les sous-espaces vectoriels, dans le cas infini, ce sont les sous-espaces vectoriels fermés pour la 'topologie faible' définie par l'accouplement.

2) Relations d'*orthogonalité* entre parties de deux groupes topologiques commutatifs localement compacts duales l'une de l'autre, au sens de Pontrjagin. `[79]`

   Les parties closes sont les sous-groupes fermés.

3) Pour deux espaces vectoriels 'en dualité' sur un corps valué complet, tel $\mathbf{R}$ où $\mathbf{C}$, la relation

$$|\langle x, x' \rangle| \leq 1.$$

   Dans le cas réel ou complexe, les parties closes sont les parties convexes cerclées [?] faiblement fermées.

4) Pour les espaces vectoriels réels, la relation de semi-polarité

$$\langle x, x' \rangle \geq -1.$$

   Les parties closes sont les parties convexes faiblement fermées contenant l'origine.

5) Soit K un corps (pour simplifier), L une extension galoisienne de groupe G. Relation entre L et G p. 49

$$\gamma \cdot x = x, \qquad \text{i.e. } x \in L^{\gamma}.$$

   Les parties closes de L sont les sous-extensions, les parties closes de G les sous-groupes de G.

Il y a des analogues divers dans des cas inséparables (à coups de p-algèbres de Lie par exemple), et des énoncés de descente en tous genres.

Tous ces exemples sont de 1ère espèce, les ensembles ordonnés qui interviennent sont de la forme $\mathfrak{P}(P_0)$, $\mathfrak{P}(Q_0)$, et la relation entre eux est déduite d'une relation R_0 entre P_0 et Q_0. Voici maintenant des exemples plus complexes. `[page 80]`

6) Soit $\mathcal{M}$ une catégorie ('grosse', le plus souvent …). On prend

$$\mathcal{P} = \mathcal{Q} = \mathfrak{P}(\mathrm{Fl}(\mathcal{M})).$$

   La relation $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{P} \times \mathcal{Q}$ est la relation de Quillen, que j'écris, pour $\Phi, \Psi \in \mathfrak{P}$

$$\Psi \subseteq \Phi_*,$$

   ou encore de façon équivalente

$$\Phi \subseteq \Psi^*,$$

   (Ψ a la LLP `[left lifting property]` pour Ψ, Φ la RLP `[right lifting property]` pour Ψ). Donc les applications α_0, β_0 sont données par

$$\beta_0(\Phi) = \Phi_*, \qquad \alpha_0(\Psi) = \Psi^*.$$

L'idée ici ne viendrait à personne d'introduire $\mathfrak{P}(\mathcal{P})$, $\mathfrak{P}(\mathcal{Q})$ - c'est déjà assez gros comme ça ! La notation pour $\Phi^\natural$ est ici $\tilde{\Phi}$, pour $\Psi^\flat$ c'est $\bar{\Psi}$. Les parties closes sont celles que j'appelle Q-closes à gauche et à droite.

La relation $\mathcal{R}$, que j'écris

$$\Phi \longleftrightarrow \Psi,$$

n'est pas déduite d'une relation entre flèches de $\mathcal{M}$, i.e. d'une partie de $\mathrm{Fl}(\mathcal{M}) \times \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$, mais est de nature plus complexe. Pour la décrire, il faut introduire l'ensemble $\mathcal{D}$ des diagrammes carrés commutatifs (traits pleins) de la forme [page 81]

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & X \\ \downarrow{\scriptstyle i} & \overset{f}{\nearrow} & \downarrow{\scriptstyle p} \\ B & \longrightarrow & Y \end{array} \qquad (*)$$

(qu'on peut interpréter comme $\mathrm{Fl}(\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M}))$, ensemble des flèches dans $\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M})$). On a une partie $\mathcal{D}_0$ de $\mathcal{D}$, formée des diagrammes pour lesquels `[il]` existe `[un]` f avec deux triangles commutatifs (c'est donc l'image de $\underbrace{\mathrm{Fl}_3(\mathcal{M})}_{\mathrm{Hom}(\mathbf{\Delta}^3,\mathcal{M})}$ dans $\mathrm{Hom}(\mathbf{\Delta}^1 \times \mathbf{\Delta}^1, \mathcal{M})$, transposée de $\mathbf{\Delta}^1 \times \mathbf{\Delta}^1 \longrightarrow \mathbf{\Delta}^3$ donné par $(0,0) \longmapsto 0$, $(0,1) \longmapsto 1$, $(1,0) \longmapsto 2$, $(1,1) \longmapsto 3$), et une application p. 50

$$\mathcal{D}_0 \subseteq \mathcal{D} \xrightarrow{\varphi} \mathrm{Fl}(\mathcal{M}) \times \mathrm{Fl}(\mathcal{M}),$$

associant à $(*)$ le couple (i,j) `[plutôt` (i,p)`]` (source et but de $(*)$, considéré comme flèche dans $\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M})$ de i dans p). La relation $\mathcal{R}$ est alors déduite de φ, $\mathcal{D}_0$ par la condition [page 82]

$$\Phi \longleftrightarrow \Psi \qquad \Longleftrightarrow \qquad \varphi^{-1}(\Phi \times \Psi) \subseteq \mathcal{D}_0.$$

Mais à vrai dire, je m'aperçois que c'est quand-même déduit d'une relation entre éléments de $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$, et cette relation entre $i : A \longrightarrow B$ et $p : X \longrightarrow Y$ peut s'écrire ainsi :

(∗∗) pour toutes flèches $A \longrightarrow X$, $B \longrightarrow Y$ rendant commutatif le diagramme $(*)$, la flèche φ pointillée dans $(*)$ existe.

Cela me fait penser que si on a une relation $\mathcal{R}$ entre $\mathfrak{P}(P)$ et $\mathfrak{P}(Q)$, satisfaisant (D_0), donc décrite par une application décroissante

$$\mathfrak{P}(P) \longrightarrow \mathfrak{P}(Q)$$

transformant sup en inf, la donné d'une telle application équivaut à celle d'une application quelconque

$$P \longrightarrow \mathfrak{P}(Q),$$

ou ce qui revient au même, d'une relation $\mathcal{R}$ sur $P \times Q$. Donc cette structure doit être regardée comme 'de première espèce'. La situation change à partir du moment où pour décrire la relation $\mathcal{R}$ avec les propriétés voulues, on se trouve contraint de remplacer $\mathfrak{P}(P)$, $\mathfrak{P}(Q)$ par des sous-ensembles convenables - quand on ne regarde que certaines parties de P, Q. C'est ce qu'on va faire au § suivant. Le cas que je vais y traiter est le seul de son espèce que j'ai rencontré - un cas de 'dualité formelle' qui s'introduit de façon naturelle, et qui ne soit 'de 1ère espèce'. [page 83]

p. 51

6 Transporteurs, noyaux, stabiliseurs relatifs à W

Soit $\mathcal{M}$ une catégorie, munie d'une partie

$$W \subseteq \mathrm{Fl}(\mathcal{M}). \tag{6.1}$$

Je pense au cas d'un localiseur, mais n'introduirai d'hypothèse sur W qu'au besoin. Pour simplifier, je suppose $\mathcal{M}$ stable par produits fibrés.

Je pose

$$\begin{cases} (^{62})\mathcal{P} &= \mathfrak{P}(W) = \{A \in \mathfrak{P}(\mathrm{Fl}(\mathcal{M})) \mid A \subseteq W\} \\ \mathcal{Q} &= \{L \in \mathfrak{P}(\mathrm{Fl}(\mathcal{M})) \mid \begin{array}{l} L \textit{ stable} \text{ par changement de} \\ \text{base (par qui je sous-entends aussi,} \\ \text{stable par isomorphie)} \\ \text{et par composition. }\}. \end{array} \end{cases} \tag{6.2}$$

J'introduis une relation

$$\mathcal{R} \subseteq \mathcal{P} \times \mathcal{Q}$$

de la façon suivante. Pour $A \in \mathcal{P}$, $L \in \mathcal{Q}$, on pose

$$(A, L) \in \mathcal{R} \iff \text{Pour tout diagramme cartésien} \tag{6.3}$$
$$\begin{array}{ccc} X & \longleftarrow & X' \\ \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ Y & \xleftarrow[p]{} & Y' \end{array}$$
avec $f \in A$, $p \in L$, on a $f' \in W$
(i.e. A est stable par changement de base par $p \in L$).

Quand j'ordonne $\mathcal{P}, \mathcal{Q} \subseteq \mathfrak{P}(\mathrm{Fl}(\mathcal{M}))$ par la relation d'ordre induite par l'inclusion de parties de $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$, on trouve des sous-ensembles ordonnés de $\mathfrak{P}(\mathrm{Fl}(\mathcal{M}))$, stables par réunions quelconques, et aussi par intersections quelconques, avec la seul réserve que dans le cas de $\mathcal{P}$, la famille d'indices doit être $\neq \emptyset$ (puisqu'alors on trouve comme intersection $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ tout entier, qui n'est pas en général contenu dans W). [page 84]

On va vérifier la condition (D_0) de la page 69, pour $\mathcal{R}$ et les relations d'ordre. Il y a deux vérifications à faire.

1°) `[où est '2°' ?]` Donnons nous $A \in \mathcal{P}$, i.e. $A \subseteq W$, et considérons l'ensemble $\mathcal{R}(A)$ des $L \in \mathcal{Q}$ tels que l'on ait $(A, L) \in \mathcal{R}$. Il est clair que c'est un ouvert (et de même, que ${}^s\mathcal{R}(L)$ est un ouvert de $\mathcal{Q}$ pour tout L dans $\mathcal{Q}$) - i.e. $L \in \mathcal{R}(A)$, $L' \subseteq L$ implique $L' \in \mathcal{R}(A)$. Reste à trouver un plus grand élément de $\mathcal{R}(A)$. Notons que si $L \in \mathcal{R}(A)$, alors pour tout $p \in L$, $p : Y' \longrightarrow Y$, le changement de base p. 52

$$p^* : \mathrm{Cat}/Y \longrightarrow \mathrm{Cat}/Y' : X \longmapsto X \times_Y Y'$$

doit transformer flèches $f \in A$ en flèches $g \in W$, comme il résulte du fait que L est stable par changement de base.

$$\begin{array}{ccc} X_1 & \xleftarrow{q_1} & X_1' \\ f\downarrow & & \downarrow g \\ X_2 & \xleftarrow{q_2} & X_2' \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \xleftarrow{p} & Y'. \end{array}$$

[page 85]

Donc $L \subseteq \mathbf{L}_W(A)$, où on pose

$$\mathbf{L}_W(A) = \{(p : Y' \longrightarrow Y) \in \mathrm{Fl}(\mathcal{M}) \quad | \quad p^* : \mathrm{Cat}/Y \longrightarrow \mathrm{Cat}/Y' \text{ transforme flèches de } A \text{ en flèches } \textit{de } W.\}$$

([63]).

$$\begin{array}{ccc} X_1 & \longleftarrow & X_1' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \text{cart.} & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ X_2 & \longleftarrow & X_2' \\ \downarrow & \text{cart.} & \downarrow \\ Y & \xleftarrow{p} & Y' \end{array}$$

$$f \in A \implies f' \in W.$$

Il est clair d'autre part que cette partie de $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ est stable par changement de base, donc $\mathbf{L}_W(A) \in \mathcal{Q}$, et que $(A, \mathbf{L}_W(A)) \in \mathcal{R}$. Donc $\mathbf{L}_W(A)$ est un plus grand élément de $\mathcal{R}(A)$, donc on trouve

$$\mathcal{R} = \{(A, L) \in \mathcal{P} \times \mathcal{Q} \mid L \subseteq \mathbf{L}_W(A)\}. \tag{6.5}$$

p. 53

$$\begin{array}{ccc} X_1 & \xleftarrow{q_1} & X_1' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \text{cart.} & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ X_2 & \xleftarrow{q_2} & X_2' \\ \downarrow & \text{cart.} & \downarrow \\ Y_1 & \xleftarrow{p_1} & Y_1' \\ \downarrow & \text{cart.} & \downarrow \\ Y & \xleftarrow{p} & Y'. \end{array}$$

Inversement, partons de $L \in \mathcal{Q}$, et montrons que l'ouvert ${}^s\mathcal{R}(L)$ de $\mathcal{P}$ a un plus grand élément. Pour ceci, posons

$$\mathbf{A}_W(L) = \{(f : X \longrightarrow Y) \in W \subseteq \mathrm{Fl}(\mathcal{M}) \quad | \quad \forall \quad \begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{q} & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \textit{cart.} & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ Y & \xleftarrow[p]{} & Y', \end{array} \quad \text{avec } p \in L, \text{ on a } f' \in W\}. \tag{6.6}$$

(NB Quand L contient les identités, comme c'est le cas notamment s'il est de la forme $\mathbf{L}_W(A)$ - alors il contient les isomorphismes, du moins si A les contient - alors $\mathbf{A}_W(L)$ est l'ensemble de $f \in \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ satisfaisant la condition énoncée après |, sans avoir à spécifier $f \in W$.) On a $\mathbf{A}_W(L) \in \mathcal{P}$, et on vérifie que $(\mathbf{A}_W(L), L) \in \mathcal{R}$ (en utilisant la stabilité de L par composition), enfin il est clair que $(A, L) \in \mathcal{R}$ implique $A \subseteq \mathbf{A}_W(L)$ (en utilisant $A \subseteq W$), donc $\mathbf{A}_W(L)$ est un plus grand élément de ${}^s\mathcal{R}(L)$.

Notons que si W *est stable par composition* (ce que nous allons supposer désormais), il en est de même de $\mathbf{A}_W(L)$ (ce qui utilise encore le fait que L soit stable par changement [page 86]

62. cf. rectification p. 86.

63. NB le dire plutôt en termes de diagrammes cartésiens, vu qu'on n'a pas fait d'hypothèse de stabilité de W par isomorphismes.

de base). De plus, si W *contient les isomorphismes* (ce que nous supposerons également), $\mathbf{A}_W(L)$ les contient aussi. Quant à $\mathbf{L}_W(A)$, il contient les isomorphismes *pourvu que* A soit stable par isomorphismes ; quand A est stable par composition et contient les isomorphismes, cette condition sera automatiquement satisfaite. Nous tenons à cette condition, c'est pourquoi du côté de A, dans la définition de $\mathcal{P}$, je vais introduire cette condition supplémentaire que A soit *stable par isomorphismes.* Donc je pose, en corrigeant (6.2),

$$\begin{cases} \mathcal{P} &= \{A \in \mathfrak{P}(\mathrm{Fl}(\mathcal{M})) \quad | \quad \mathrm{Is}(\mathcal{M}) \subseteq A \subseteq W, \quad A \text{ stable par composition}\} \\ \mathcal{Q} &= \{L \in \mathfrak{P}(\mathrm{Fl}(\mathcal{M})) \quad | \quad \mathrm{Is}(\mathcal{M}) \subseteq L, \quad L \text{ stable par changement de base}\}. \end{cases} \tag{6.7}$$

On est bien sûr intéressé surtout aux éléments clos de $\mathcal{P}$, $\mathcal{Q}$, i.e. les parties A, L de $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$, contenant les isomorphismes, stables par composition (et L stable aussi par changement de base, $A \subseteq W$) telles que l'on ait p. 54

$$A = \mathbf{A}_W(L), \qquad L = \mathbf{L}(A) \tag{6.8}$$

`[plutôt` $\mathbf{L}_W(A)$`]`.

Je garderai les notations $\natural$, $\flat$ du paragraphe précédent. Quels sont les deux couples extrêmes ? [page 87]

Partant de $A_0 = \mathrm{Is}(\mathcal{M})$ (plus petit des éléments de $\mathcal{P}$), on trouve $\mathbf{L}_W(A_0) = \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ (plus grand élément de $\mathcal{Q}$), et $A_0^\natural = \mathbf{A}_W(\mathrm{Fl}(\mathcal{M})) = W_{\mathrm{univ}}$, ensemble des flèches qui sont dans W et le restent par tout changement de base :

$$A_0^\natural = W_{\mathrm{univ}}, \qquad \beta_0(A_0) \overset{\text{déf}}{=} \mathbf{L}_W(A_0) = \mathrm{Fl}(\mathcal{M}), \qquad \text{où } A_0 = \mathrm{Is}(\mathcal{M}) \text{ plus petit élément de } \mathcal{P}. \tag{6.9}$$

Inversement, partons de $L_0 = \mathrm{Is}(\mathcal{M})$, le plus petit élément de $\mathcal{Q}$. On a $\mathbf{A}_W(L_0) = W$ (W étant stable par composition et contenant les isomorphismes), et $L_0^\flat = \mathbf{L}_W(W) = \mathrm{Fib}_W$, les W-fibrations :

$$L_0^\flat = \mathrm{Fib}_W, \qquad \alpha_0(L_0) = W, \qquad \text{où } L_0 = \mathrm{Is}(\mathcal{M}), \text{ plus petit élément de } \mathcal{Q}. \tag{6.10}$$

Donc les parties $\mathcal{R}$-closes à gauche de $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ se promènent entre W_{univ} et W, les parties $\mathcal{R}$-closes à droite entre Fib_W et $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$.

Proposition 6.1. *Soient $A \in \mathcal{P}$, $L \in \mathcal{Q}$ tels que $A = \alpha_0(L)$, $L = \beta_0(A)$ (i.e. $A = \mathbf{A}_W(L)$, $L = \mathbf{L}_W(A)$). Pour que L soit stable par composition, il faut et il suffit que A soit stable par changement de base par les flèches $f \in L$. (Plus généralement, si $L \in \mathcal{Q}$ est un élément quelconque de $\mathcal{Q}$, et si on suppose de plus que L est stable par composition, alors $A = \mathbf{A}_W(L)$ est stable par changement de base par L.)* [page 88]

Terminologie : pour $A \in \mathcal{P}$, i.e. A une partie de $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ contenue dans W contenant les isomorphismes et stable par composition, $\mathbf{L}_W(A)$ s'appelle le *transporteur de A dans W*. (Il y a une notion duale de *cotransporteur.*) C'est un élement de $\mathcal{Q}$, donc une partie de $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ contenant les isomorphismes et stable par changement de base. D'autre part, pour L dans $\mathcal{Q}$, les $f \in \mathbf{A}_W(L)$ s'appellent flèches *W-L-asphériques,* ou les *W-L-équivalences,* ou les *W-équivalences L-universelles,* et $\mathbf{A}_W(L)$ s'appelle le *L-noyau de W*. On pourrait le noter plus simplement W_L (quand cette notation ne conflicte pas avec $W_S \subseteq \mathrm{Fl}(\mathcal{M}/S)$ pour $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$). C'est une partie de W qui (comme W lui-même) contient les isomorphismes et est stable par composition.

Enfin, il y a lieu aussi d'introduire le *stabiliseur* $\mathrm{Stab}(A)$, ou transporteur de A dans A, qui ne dépend pas de la donné de W, mais seulement de la partie A de $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$, contenant les isomorphismes et stable par composition. On pourrait aussi le noter Fib_A, et appeler ses éléments des *A-fibrations* (A jouant à présent le rôle de W). On a $\mathrm{Stab}(A) \subseteq$ p. 55 [page 89]

$\mathbf{L}_W(A)$, et il semblerait qu'en pratique, ce sont ces stabiliseurs, plus que les transporteurs $\mathbf{L}_W(A)$, qui sont importants (quand les deux ne coïncident pas). C'est ainsi que dans Cat, si W est un localiseur fondamental, les morphismes W-lisses (resp. W-propres) Liss_W (Prop_W), qui sont les stabiliseurs des ensembles W_{as} (W_{coas}) des ensembles de morphismes W-asphériques (resp. W-coasphériques), jouant un rôle essentiel, alors que je ne sais pas caractériser de façon sensible les flèches des transporteurs $\mathbf{L}_W(W_{\mathrm{as}})$, $\mathbf{L}_W(W_{\mathrm{coas}})$, lesquels contiennent, en plus des morphismes W-lisses (resp. W-propres) les W-fibrations Fib_W. Je ne sais pas comment caractériser une classe de morphismes qui apparaît aussi hétéroclite ! De même, il y a lieu d'introduire et de caractériser le stabiliseur de W_{bias} (ensemble des flèches W-biasphériques), comme les morphismes 'W-nets' Net_W, par une description similaire à celle des Liss_W, Prop_W, utilisant les bilocalisés $\underset{u}{\backslash X/}$, $\underset{v}{\backslash Y/}$, au lieu des localisés X/x, Y/y ou des colocalisés $x\backslash X$, $y\backslash Y$. Il y a lieu enfin de déterminer le stabiliseur de l'ensemble Equ des Cat-équivalences (ce qui ne dépend pas de la donné d'un W - mais on a $\mathrm{Equ} \subseteq \mathcal{P}(W)$ pour tout W fondamental).

p. 56

[page 90]

7 Morphismes cofiltrants et localement cofiltrants

Mais je ne veux pas m'attarder à présent sur ces développements, qui ne me paraissent pas urgents, et voudrais revenir aux questions liées à la notion de catégories filtrantes ou cofiltrantes.

Definition 7.1. Soit $f : X \longrightarrow Y$ une flèche dans Cat. On dit que f est *cofiltrante* (resp. *localement cofiltrante*, resp. *faiblement cofiltrante* ([64]), resp. *localement faiblement cofiltrante* ou encore *précofiltrante*) si pour tout y dans Y, la catégorie colocalisé $y\backslash X$ est cofiltrante (resp. …). (Dualement, on dit que f est *filtrante*, resp. …, si les catégories X/y sont filtrantes, resp. …, i.e. si $f^o : X^o \longrightarrow Y^o$ est cofiltrante resp. ….)

Remarque 7.2. Notions stables par changement de base coétale. Contient les isomorphismes et même les Cat-équivalences. Les morphismes *étales* sont localement filtrants.

Proposition 7.3. *Soit $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme cofiltrant (resp. localement cofiltrant, resp. faiblement cofiltrant, resp. précofiltrant), et supposons que Y soit cofiltrant (resp. localement cofiltrant, resp. faiblement cofiltrant, resp. précofiltrant). Alors X lui-même est cofiltrant (resp. …).*

Démonstration. Il s'agit, dans les quatre cas envisagés, de vérifier pour X la condition $\underbrace{\mathrm{PS}_g1' \,/\, \mathrm{PS}_g1}_{\text{deux derniers cas}} \,/\, \mathrm{PS}_g1' + \mathrm{PS}_g2 \,/\, \mathrm{PS}_g1 + \mathrm{PS}_g2$. Mais pour chacune des trois conditions

[page 91]

PS_g1, PS_g1', PS_g2 séparément, on voit immédiatement que si elle est vérifiée pour Y et pour les $y\backslash X$, elle l'est pour X, d'où la proposition.

Corollaire 7.3. *Les quatre notions envisagées dans (7.1) sont stables par composition.*

Démonstration immédiate, en utilisant la remarque (7.2).

$$\begin{array}{ccc} X & \longleftarrow & z\backslash X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longleftarrow & z\backslash Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z & \longleftarrow & z\backslash Z. \end{array}$$

Remarque 7.4.

p. 57

64. J'ai modifié la terminologie : maintenant faiblement cofiltrant = 0-connexe + localement faiblement cofiltrant, *stable par passage* à X' sur X, X' étale et ∞-connexe. Revoir la terminologie dans le cas faiblement cofiltrant, qui est une notion traîtresse, faute d'être stable par passage [à] un X' étale sur X.

1) Notons que la notion de morphisme cofiltrant ou faiblement cofiltrant n'est *pas* stable par changement de base quelconque, ni même par une immersion ouverte. Exemple : $e \longrightarrow \mathbf{\Delta}^1$, appliquant e en 1, est cofiltrant,

$$\begin{array}{ccc} & & e \\ & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & 1 \end{array}$$

mais sa fibre en 0 est vide, donc n'est ni cofiltrante, ni faiblement cofiltrante. Je n'ai pas vu d'exemple montrant que la notion de flèche *localement* cofiltrante resp. précofiltrante n'est pas stable par changement de base, et ne voudrais pas m'y attarder, n'ayant pas besoin de connaître la réponse.

2) Pour que X soit cofiltrante (resp. …), il faut et il suffit que $X \longrightarrow e$ le soit. Ainsi la notion absolue est ramenée à une notion relative.

3) Si $f : X \longrightarrow Y$ est cofiltrante, elle est W-coasphérique (donc $\in W$) pour tout W satisfaisant l'axiome Loc (8) des limites inductives. En particulier, elle est W_0-asphérique, i.e. un foncteur cofiltrant (et même seulement faiblement cofiltrant) est *cofinal.* [page 92]

La raison principale pour m'intéresser aux flèches cofiltrantes est contenue dans la

Proposition 7.4. *Soit $f : X \longrightarrow Y$ dans* Cat *localement cofiltrant (resp. localement faiblement cofiltrant). Alors :*

a) Pour tout X' étale sur X, le composé $f' : X' \longrightarrow X \longrightarrow Y$ est localement cofiltrant (resp. …), et pour toute factorisation de f' en $X' \xrightarrow{g'} Y' \longrightarrow Y$ avec $Y' \longrightarrow Y$ étale, g' est localement cofiltrant (resp. …).

b) $\forall$ x dans X, le morphisme sur les localisés

$$f/x : X/x \longrightarrow Y/x \qquad (y = f(x))$$

est cofiltrant (resp. faiblement cofiltrant).

c) Si x, y comme dans b), et U est un ouvert de X/x, désignant par V l'ouvert de Y/y engendré par l'image de f/x (i.e. l'ouvert formé des z dans Y/y tels que $z\backslash(X/x)$ soit non vide), la flèche induite $q : U \longrightarrow V$ `[est]` *cofiltrante (resp. faiblement cofiltrante), a fortiori cofinale (et même W-coasphérique, pour tout W satisfaisant l'axiome des limites Loc (8))* ([65]).

Donc pout tout cofaisceau *G sur V, à valeurs dans une catégorie $\mathcal{M}$ avec $\varinjlim$, on a* `[un]` *isomorphisme* [page 93]

$$\varinjlim_{U} g^*(G) \xrightarrow{\sim} \varinjlim_{V} G,$$

et pour tout préfaisceau F sur V, à valeurs dans une catégorie $\mathcal{M}$ avec $\varprojlim$, on a `[un]` *isomorphisme* p. 58

$$\varprojlim_{U} g^*(F) \xleftarrow{\sim} \varprojlim_{V} F.$$

Démonstration. Je vais d'abord expliciter le

Lemme 7.5. *Soit $h : X' \longrightarrow X$ un morphisme étale dans* Cat. *Alors h est localement cofiltrant. De façon plus précise, pour tout x dans X, on a*

$$\pi_0(x\backslash X') \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ob}\, X'_x,$$

65. Il suffit ici qu'on soit dans l'hypothèse respée (*f faiblement* localement cofiltrant) sauf pour le NB ici [`le NB ici' est `(et même ...Loc (8))'].

toute composante connexe de $x\backslash X'$ contient un élément et un seul de la catégorie discrète $X'_x \subseteq x\backslash X'$. Si x' est dans X'_x (i.e. x' objet de X' tel que $h(x') = x$), c'est un objet initial *de la composante connexe qui le contient. (Donc cette composante est cofiltrante.)*

Ceci prouve (et au delà) la première assertion de 7.4, compte tenu de 7.3 (stabilité par composition), ou parce qu'une catégorie étale (en l'occurrence $y\backslash X'$) au dessus d'une catégorie localement cofiltrante (resp. localement faiblement cofiltrante) (en l'occurrence $y\backslash X$) est itou. [page 94]

$$\begin{array}{ccc} y\backslash X' & \longrightarrow & X' \\ \downarrow{\scriptstyle \text{ét.}} & \text{cart.} & \downarrow{\scriptstyle \text{ét.}} \\ y\backslash X & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \text{cart.} & \downarrow \\ y\backslash Y & \longrightarrow & Y. \end{array}$$

Pour la deuxième assertion dans a), on peut maintenant supposer $X' = X$. Il faut prouver que pour tout y' dans Y', $y'\backslash X \overset{\text{déf}}{=} X \times_{Y'} y'\backslash Y'$ est localement cofiltrante (resp. localement faiblement cofiltrante). Soit y dans Y l'image de y', et considérons le diagramme de trois carrés cartésiens ci-contre.

$$\begin{array}{ccccc} y'\backslash X & \longrightarrow & y\backslash X & \longrightarrow & X \\ \downarrow{\scriptstyle \text{ét.}} & \textit{cart.} & \downarrow{\scriptstyle \text{ét.}} & \textit{cart.} & \downarrow{\scriptstyle \text{ét.}} \\ y'\backslash Y' & \longrightarrow & y\backslash Y' & \longrightarrow & Y' \\ & & \downarrow & \textit{cart.} & \downarrow \\ & & y\backslash Y & \longrightarrow & Y \end{array}$$

Le Lemme 7.5 implique que $y'\backslash Y' \longrightarrow y\backslash Y'$ est l'inclusion dans $y\backslash Y'$ d'une composante connexe de $y\backslash Y'$, c'est donc une immersion ouverte. Donc $y'\backslash X \longrightarrow y\backslash X$ est une immersion

ouverte. Comme $y\backslash X$ est localement cofiltrant (resp. localement faiblement cofiltrant) par hypothèse, il en est donc de même de $y\backslash X$. Cela prouve d). p. 59

Appliquant a) à la situation $X/x \longrightarrow Y/y$ dans b), on voit que les colocalisés $z\backslash(X/x)$ de X/x sur Y/y ($z \in \mathrm{Ob}\,(Y/y)$) sont localement cofiltrants (resp. faiblement). Mais comme X/x a un objet final au dessus de l'objet final de Y/y, il s'ensuit que $z\backslash(X/x)$ a un objet final, donc est 0-*connexe.* !

Donc ces catégories, étant localement cofiltrantes (resp. faiblement), sont en fait cofiltrantes (resp. faiblement cofiltrantes). [page 95]

Prouvons c). Notons que pour z dans V, $z\backslash U$ s'identifie à l'image inverse, par $z\backslash(X/x) \longrightarrow X/x$, de l'ouvert U de X/x, c'est donc un *ouvert* de $z\backslash(X/x)$, non vide par construction de V. Mais un ouvert non vide d'une catégorie cofiltrante (resp. faiblement cofiltrante) est encore cofiltrant (resp. faiblement cofiltrant). Cela signifie que $g : U \longrightarrow V$ est cofiltrant (resp. faiblement cofiltrant), a fortiori cofinal (et W-coasphérique, pour tout W satisfaisant Loc (8)). Cela achève la démonstration.

Remarque 7.5.

1) Le même argument que dans c) montre que si $f : X \longrightarrow Y$ est cofiltrant (resp. faiblement cofiltrant), alors pour tout ouvert U dans X, si on désigne par V l'ouvert

de Y engendré par $f(U)$, i.e. l'ouvert formé des y dans Y tels que $y\backslash X \neq \emptyset$, alors la flèche induite $g : U \longrightarrow V$ est cofiltrante (resp. faiblement cofiltrante), et a fortiori g est cofinal (et plus généralement, si f est cofiltrant, g est W-coasphérique pour tout W satisfaisant la condition Loc (8)).


[page 96]

2) Un cas particulier intéressant de 7.4 est celui où on suppose que les $y\backslash X$ ($y \in \mathrm{Ob}\, Y$) sont sommes directes de catégories ayant chacune un *objet initial.* Alors on voit que cette condition est stable par les opérations de 7.4 a) [?], et par conséquent, les colocalisés $z\backslash(X/x)$ des morphismes localisés en haut $X/x \longrightarrow Y/y$ sont des catégories à objet initial. Ceci implique alors qu'il en est de même des colocalisés $z\backslash U$ ($z \in \mathrm{Ob}\, V$) dans $g : U \longrightarrow V$. Il s'ensuit que g est W-coasphérique pour *tout* localiseur fondamental W (sans avoir à se soucier de l'axiome des limites).

La condition envisagée sur $f : X \longrightarrow Y$ est satisfaite notamment dans les deux cas suivants (qui me paraissent de loin les plus importants) : a) f est étale et b) X est discrète.

p. 60


[page 97]




66. **Ex.** $\left(\boldsymbol{\Delta}\right)$.
67. **Ex.** B_G.

p. 61

[page 98]






$\bullet \rightrightarrows \bullet$	n'est ni pseudo-cofiltrante, ni totalement 0-connexe.
B_G	n'est ni localement cofiltrante, ni totalement 0-connexe.
$\boldsymbol{\Delta}$	n'est pas pseudo-filtrante.
$B_G \amalg e$	n'est pas localement cofiltante, car B_G ne l'est pas, ni appartient à une des 4 classes d'objets connexes.
Itou pour	$\varepsilon = \bullet\ \bullet$


p. 62

[page 99]

68. **NB** Les cinq catégories typiques B_G ($G \neq 1$), $\boldsymbol{\Delta}$, $0 \rightrightarrows 1$, $\varepsilon = \bullet\ \bullet$, $B_G \amalg e$ ($G \neq 1$) sont telles qu'elles appartiennent à la classe envisagée C d'objets de Cat, mais à aucune des cinq autres classes sauf celles qui sont reliées à C par $C \Longrightarrow C'$ sur le diagramme d'implications (ou par une implication composée).



et dualement on a



donc on a une terminologie directe sauf pour 'X^o totalement 0-connexe' - je n'ose dire 'X totalement co-connexe' !!

p. –

LES DÉRIVATEURS

ALEXANDRE GROTHENDIECK

Chapitre III

Hom externes dans les dérivateurs

p. –

Note des éditeurs de l'édition transcrite.

Ce texte a été déchiffré et transcrit en LaTeX 2_ε par M. Künzer. Il a été édité par M. Künzer, J. Malgoire, et G. Maltsiniotis. La transcription est aussi fidèle que possible au manuscrit. Pour les quelques corrections évidentes, ou rares commentaires des éditeurs, ainsi que pour la numérotation originale des pages du manuscrit, les caractères de machine à écrire `[typewriter]` entre crochets sont utilisés. Un point d'interrogation entre crochets signifie que l'on n'est pas sûr du mot qui précède.

Cette édition est provisoire. Les remarques, commentaires et corrections sont bienvenus. Envoyer un message à :

[**e-mail address removed**]

G. Maltsiniotis

p. 1
[page 1]

1 Relation des dérivateurs avec la catégorie Hot

Soit $\mathbf{D}$ un dérivateur, $\mathcal{A}$ sa catégorie fondamentale,

$$\mathcal{A} = \mathbf{D}(e).$$

Je me propose de définir, si faire se peut, des foncteurs

$$\left\{ \begin{array}{ccccccc} \mathrm{Hot} & \times & \mathcal{A} & \xrightarrow{\pi_{\mathbf{D}}} & \mathcal{A} & (\xi, M) & \longmapsto & \xi \times M \text{ ou } \xi \otimes M \text{ (suivant les cas)} \\ \mathrm{Hot}^o & \times & \mathcal{A} & \xrightarrow{\varpi_{\mathbf{D}}} & \mathcal{A} & (\xi, M) & \longmapsto & \hom(\xi, M). \end{array} \right. \tag{1}$$

Ces foncteurs doivent s'échanger par dualité : si on prend les foncteurs π^o, ϖ^o sur les catégories opposées, on trouve

$$\left\{ \begin{array}{ccccc} \mathrm{Hot} & \times & \mathcal{A}^o & \xrightarrow{\varpi^o_{\mathbf{D}}} & \mathcal{A}^o \\ \mathrm{Hot}^o & \times & \mathcal{A}^o & \xrightarrow{\pi^o_{\mathbf{D}}} & \mathcal{A}^o, \end{array} \right. \tag{1'}$$

et on doit avoir

$$\left\{ \begin{array}{ccc} \varpi^o_{\mathbf{D}} & = & \pi_{\mathbf{D}^o} \\ \pi^o_{\mathbf{D}} & = & \varpi_{\mathbf{D}^o}. \end{array} \right.$$

À vrai dire, considérant (1) comme des foncteurs

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hot} & \xrightarrow{\pi_{\mathbf{D}}} & \underline{\mathrm{Hom}}(\mathcal{A}, \mathcal{A}) \\ \mathrm{Hot}^o & \xrightarrow{\varpi_{\mathbf{D}}} & \underline{\mathrm{Hom}}(\mathcal{A}, \mathcal{A}), \end{array}$$

on s'attend à ce que ces foncteurs s'étendent en

$$\left\{ \begin{array}{ccc} \mathrm{Hot} & \xrightarrow{\pi_{\mathbf{D}}} & \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{D}, \mathbf{D}) \\ \mathrm{Hot}^o & \xrightarrow{\varpi_{\mathbf{D}}} & \underline{\mathrm{Hom}}(\mathcal{A}, \mathcal{A}) \end{array} \right. \tag{2}$$

[page 2]

[plutôt deux fois $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{D},\mathbf{D})$]. Cela signifie, essentiellement, que pour $\xi \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{Hot}$ donné, les opérations $\xi \times_{\mathbf{D}} M$ et $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{D}}(\xi, M)$ [plutôt $\mathrm{hom}_{\mathbf{D}}(\xi, M)$] sont définies non seulement dans $\mathcal{A} = \mathbf{D}(e)$, mais dans tous les $\mathbf{D}(I)$, et ceci de façon à commuter aux foncteurs f^* :

Si

$$f : I' \longrightarrow I,$$

alors pour $F \in \mathrm{Ob}\,\mathbf{D}(I)$, on doit avoir des isomorphismes canoniques p. 2

$$\left\{ \begin{array}{rcl} f^*(\xi \times_{\mathbf{D}} M) & \simeq & \xi \times_{\mathbf{D}} f^*(M) \\ f^*\mathrm{hom}_{\mathbf{D}}(\xi, M) & \simeq & \mathrm{hom}_{\mathbf{D}}(\xi, f^*(M)), \end{array} \right. \tag{3}$$

avec les compatibilités habituelles pour un composé fg, relatif à $I'' \xrightarrow{g} I' \xrightarrow{f} I$.

Mais je me place de préférence dans $\mathcal{A}$, ce qui devrait impliquer les constructions similaires dans tous les $\mathbf{D}(I)$, quitte à appliquer ce qui a été dit au dérivateur $\mathbf{D}_I$.

L'intuition algébrique fondamentale est celle-ci, en désignant par

$$X \longmapsto \mathrm{hot}(X) : (\mathrm{Cat}) \longrightarrow (\mathrm{Hot})$$

le foncteur de localisation de (Cat) dans (Hot), obtenu en inversant les flèches dans (Cat) qui sont des 'équivalences faibles'. Supposons X dans Diag, soit

$$p : X \longrightarrow e$$

le foncteur à valeurs dans la catégorie ponctuelle. On veut que

$$\left\{ \begin{array}{rcccl} \mathrm{hot}(X) \times_{\mathbf{D}} M & \simeq & p_!(p^*(M)) & = & H^{\mathbf{D}}_{\bullet}(X, M) \\ \mathrm{hom}_{\mathbf{D}}(\mathrm{hot}(X), M) & \simeq & p_*(p^*(M)) & = & H^{\bullet}_{\mathbf{D}}(X, M) \end{array} \right. \tag{4}$$

(isomorphismes canoniques).

Ceci donnerait un principe de définition pour les opérations cherchées. Une difficulté [page 3] vient du fait qu'en général, Diag n'est pas égal à (Cat), et que les types d'homotopie provenant de Diag ne donnent pas (même à isomorphisme près) *tous* les types d'homotopie. Intuitivement, on ne trouve que des types d'homotopie 'assez petits'. Mais on peut localiser Diag par rapport aux équivalences faibles (il vaut mieux dire 'quasi-isomorphismes'), on trouve alors une catégorie $(\mathrm{Hot})_0$, et un foncteur canonique

$$\mathrm{Hot}_0 \longrightarrow \mathrm{Hot},$$

si on a de la chance, ce foncteur sera pleinement fidèle, et on essayera de décrire les foncteurs (1) ou (2) en y remplaçant Hot par la sous-catégorie pleine des 'petits' types d'homotopie. On peut aussi oublier (provisoirement !) Hot, et travailler avec Hot_0. C'est ce qu'on va faire pour le moment.

Pour pouvoir définir les foncteurs

$$\left\{ \begin{array}{rcccccl} \mathrm{Hot}_0 & \times & \mathcal{A} & \longrightarrow & \mathcal{A} & (\xi, F) & \longmapsto & \xi \times_{\mathbf{D}} F \\ \mathrm{Hot}_0^o & \times & \mathcal{A} & \longrightarrow & \mathcal{A} & (\xi, F) & \longmapsto & \mathrm{hom}_{\mathbf{D}}(\xi, F), \end{array} \right. \tag{5}$$

je note que pour F [plutôt M] fixé, X variable dans Diag, les derniers membres dans p. 3 (4)

$$H^{\mathbf{D}}_{\bullet}(X, M), \qquad H^{\bullet}_{\mathbf{D}}(X, M) \tag{6}$$ [page 4]

sont bien, l'un covariant, l'autre contravariant en X. Donc il y a , à isomorphisme unique près, une seule paire de bifoncteurs (5) satisfaisant (bifonctoriellement) les isomorphismes

(4), si et seulement si les expressions (6), considérées comme fonctorielles en X, transforment quasi-isomorphismes en isomorphismes. Cela équivaut donc à la validité du

Théorème (?) ([1]). *Soit $f : X' \longrightarrow X$ dans Diag. Si f est un quasi-isomorphisme, c'est une* **D***-équivalence.*

Quand X est la catégorie ponctuelle, ce n'est là autre que l'axiome Der 3 (p. 67). J'ignore si c'est une conséquence des axiomes Der 1 à Der 5 (d). Si ce n'est pas le cas, il faudrait l'ajouter aux axiomes, je crois. Je n'ai pas même prouvé qu'une équivalence de catégories dans Diag (au sens des catégories !) est une **D**-équivalence !

Notons la *formule d'adjonction*

$$\mathrm{Hom}(\xi \times_{\mathbf{D}} M, N) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(M, \mathrm{hom}_D(\xi, N)). \tag{7}$$

Si ξ provient de $X \in \mathrm{Diag}$, alors cela s'écrit


$$\mathrm{Hom}(p_! p^* M, N) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(M, p_* p^* N), \tag{8}$$

or par adjonction les deux membres sont canoniquement isomorphes à

[page 5]

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{D}(X)}(p^* M, p^* N).$$

Exemple. Prenant pour ξ le type d'homotopie du cercle standard (représenté p.ex. par l'ensemble ordonné



où on convient de prendre 0 comme origine, et d'orienter de 0 vers a), les deux foncteurs en question sont (sauf erreur) les foncteurs suspension Σ et 'cosuspension' ou foncteur 'espace des lacets' Ω. Sous réserve de vérifier que ΩF coïncide bien avec ce que j'ai décrit ailleurs, à propos des carrés substantiels cartésiens dans $\mathcal{A}$.

Dans Hot_0 on a une opération produit, en fait ça doit être le produit catégorique dans Hot_0. Mais sur les modèles il est donné par

$$\mathrm{hot}_0(X) \times \mathrm{hot}_0(Y) \;\simeq\; \mathrm{hot}_0(X \times Y) \tag{8}$$

`[deux fois (8)]`. Ceci posé, on a les isomorphismes canoniques, pour $\xi, \eta \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{Hot}_0$,

p. 4


$$\begin{cases} \xi \times_{\mathbf{D}} (\eta \times_{\mathbf{D}} M) \;\simeq\; (\xi \times \eta) \times_{\mathbf{D}} M \\ \mathrm{hom}_{\mathbf{D}}(\xi, \mathrm{hom}_{\mathbf{D}}(\eta, M)) \;\simeq\; \mathrm{hom}_{\mathbf{D}}(\xi \times \eta, M). \end{cases} \tag{9}$$

Si ξ, η sont représentés par X, Y, la première formule p.ex. s'établit en calculant le deuxième membre comme

[page 6]

$$\varphi_!(M_{X\times Y}) \simeq p_!(\underbrace{q'_!(M_{X\times Y})}_{\substack{\simeq\, q_!(M_Y)_X \\ \text{car } q \text{ est } \mathbf{D}\text{-lisse}}}) \simeq \xi \times_{\mathbf{D}} (\eta \times_{\mathbf{D}} M),$$

O.K.



1. Nouvel axiome ?

J'ai aussi envie de prouver :

Proposition 1. *Soit $\xi \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{Hot}_0$. Alors $F \longmapsto \xi \times_{\mathbf{D}} F$, en tant que morphisme de dérivateurs $\mathbf{D} \longrightarrow \mathbf{D}$, est* exact à droite, *et $F \longmapsto \mathrm{hom}_{\mathbf{D}}(\xi, F)$ est exact à gauche.*

On peut supposer que ξ est défini par X dans Diag. Soit $f : I \longrightarrow J$, soit F dans $\mathbf{D}(I)$, il faut prouver

$$f_*(\mathrm{hom}_{\mathbf{D}}(\xi, F)) \;\simeq\; \mathrm{hom}_{\mathbf{D}}(\xi, f_*(F)).$$

Considérons donc

$$\begin{array}{ccc} X \times I & \xrightarrow{f'} & X \times J \\ {\scriptstyle p=(x,i)\longmapsto i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q=(x,j)\longmapsto j} \\ I & \xrightarrow{\quad f \quad} & J. \end{array}$$

On a

$$\mathrm{hom}_{\mathbf{D}}(\xi, F) = p_*(p^*F),$$

donc

$$f_*(\mathrm{hom}_{\mathbf{D}}(\xi, F)) = \underbrace{f_*p_*}_{(fp)_*}(p^*(F)) = (qf')_*p^*(F) \simeq q_*(f'_*p^*(F)).$$

Mais

$$f'_*p^*(F) \;\simeq\; q^*f_*(F),$$

formule de changement de base des f_*, pour le changement de base q, qui est lisse, car déduit de $X \longrightarrow e$, qui est lisse, par changement de base $J \longrightarrow e$. On trouve donc p. 5 [page 7]

$$f_*(\mathrm{hom}_{\mathbf{D}}(\xi, F)) \simeq q_*q^*(f_*(F)) \overset{\text{déf}}{=} \mathrm{hom}_{\mathbf{D}}(\xi, f_*(F)),$$

q.e.d. L'énoncé pour $F \longmapsto \xi \times_{\mathbf{D}} F$ est dual de celui qu'on vient de prouver.

Reprenons, pour $\xi \in (\mathrm{hot})_0$ [= Hot_0], la formule d'adjonction

$$\mathrm{Hom}(\xi \times_{\mathbf{D}} M, N) \simeq \mathrm{Hom}(M, \mathrm{hom}_{\mathbf{D}}(\xi, N)) \overset{\text{déf}}{=} \mathrm{Hom}_{\xi}(M, N). \qquad (*)$$

Si ξ est défini par X dans Diag, les deux membres de $(*)$ s'identifient à

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{D}(X)}(p^*M, p^*N),$$

où $p : X \longrightarrow e$ est le foncteur structural.

Fixons M, N, et considérons l'expression $(*)$ comme contrafoncteur

$$(\mathrm{Hot}_0)^o \;\longrightarrow\; \mathrm{Ens}.$$

Il semblerait que dans tous les cas connus, ce foncteur soit 'représentable' par un objet, sinon de Hot_0 lui-même, du moins un objet dans Hot. Si on ne peut le définir comme objet H de Hot_0, le fait qu'on ait un isomorphisme canonique

$$\mathrm{Hom}_{\xi}(M, N) \;\simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{Hot}}(\xi, H), \qquad (10)$$

fonctoriel en $\xi \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{Hot}_0$, ne [le] définit pas forcément à isomorphisme unique près. En fait, quand [page 8]

$$\mathbf{D} = \mathbf{D}_{\mathcal{M},\Sigma}$$

est défini par une catégorie de modèles $(\mathcal{M}, \Sigma)$, alors il y a une définition naturelle d'une opération hom ext (Hom 'externe') à valeurs dans Hot, savoir un foncteur

$$\begin{cases} \mathcal{A}^o \times \mathcal{A} & \longrightarrow & \mathrm{Hot} \\ (M, N) & \longmapsto & \mathrm{hom\,ext}(M, N), \end{cases} \qquad (11)$$

où $\mathcal{A} = \mathcal{M}\Sigma^{-1}$ est la catégorie fondamentale de $\mathbf{D} = \mathbf{D}_{\mathcal{M},\Sigma}$. Il est vrai que je n'ai pas vérifié, si p. ex. $(\mathcal{M}, \Sigma)$ est sous-jacente à une catégorie de modèles quillénienne, de sorte que (par THOMASON) $\mathbf{D}$ est bien un dérivateur, que cette notion de hom ext satisfait bien à une formule de la forme (10). Ici je vais le poser [?], au besoin, ces données supplémentaires : donnée de (11), et d'un isomorphisme fonctoriel

$$\underbrace{\mathrm{Hom}_\xi(M,N)}_{\substack{= \mathrm{Hom}(\xi\times_{\mathbf{D}} M, N)\\ = \mathrm{Hom}(M, \mathrm{hom}_{\mathbf{D}}(\xi, N))}} \quad \simeq \ \mathrm{Hom}_{\mathrm{Hot}}(\xi, \hom\mathrm{ext}(M,N)). \tag{12}$$

Si maintenant η est un deuxième élément de Hot_0, on a envie d'écrire p. 6
[page 9]

$$\begin{cases} \hom\mathrm{ext}(\eta \times_{\mathbf{D}} M, N) \ \simeq \ \hom\mathrm{ext}(M, \mathrm{hom}_{\mathbf{D}}(\eta, N)) \\ \qquad\qquad\qquad\qquad \simeq \ \mathrm{hom}_{\mathrm{HOT}}(\eta, \hom\mathrm{ext}(M,N)), \end{cases} \tag{13}$$

où dans le deuxième membre, $\mathrm{hom}_{\mathrm{HOT}}$ est l'opération (1) dans le cas où $\mathbf{D} = \mathrm{HOT}$, et qui est défini aussi en termes du produit cartésien $\xi \times \eta$ dans Hot, par

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Hot}}(\xi, \mathrm{hom}_{\mathrm{HOT}}(\eta, \zeta)) \ \simeq \ \mathrm{Hom}_{\mathrm{Hot}}(\xi \times \eta, \zeta),$$

en d'autres termes, pour η fixé, le foncteur

$$\zeta \ \longmapsto \ \mathrm{hom}_{\mathrm{HOT}}(\eta, \zeta)$$

est défini comme le foncteur adjoint à droite du foncteur

$$\xi \ \longmapsto \ \xi \times \eta.$$

Pour vérifier heuristiquement la formule (13) (vérification valable 'en forme' si les trois objets envisagés sont en fait définis comme objets de Hot_0 ...), on prend $\mathrm{Hom}_{\mathrm{Hot}}(\xi, -)$ à valeurs dans les trois membres, pour ξ donné dans Hot_0. Pour le premier, on trouve

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_\xi(\eta \times_{\mathbf{D}} M, N) \ &= \ \mathrm{Hom}(\xi \times_{\mathbf{D}} (\eta \times_{\mathbf{D}} M), N) \\ &= \ \mathrm{Hom}((\xi \times \eta) \times_{\mathbf{D}} M, N). \end{aligned}$$

Pour le deuxième

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_\xi(M, \mathrm{hom}_{\mathbf{D}}(\eta, N)) \ &= \ \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(\xi \times_{\mathbf{D}} M, \mathrm{hom}_{\mathbf{D}}(\eta, N)) \\ &\simeq \ \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(\eta \times_{\mathbf{D}} (\xi \times_{\mathbf{D}} M), N) \\ &\simeq \ \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}((\eta \times \xi) \times_{\mathbf{D}} M, N), \end{aligned}$$

et enfin pour le troisième
[page 10]

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{\mathrm{Hot}}(\xi \times \eta, \hom\mathrm{ext}(M,N)) \ &\simeq \ \mathrm{Hom}_{\xi\times\eta}(M,N) \\ &\simeq \ \mathrm{Hom}((\xi \times \eta) \times_{\mathbf{D}} M, N), \end{aligned}$$

donc toujours la même chose ! Pas de doute, ça doit marcher.

S'il faut se donner le hom ext (11) comme donnée supplémentaire, avec de plus un isomorphisme trifonctoriel (12), il faut aussi se donner les isomorphismes trifonctoriels (13), *'compatibles'* avec l'isomorphisme (12) au sens du calcul précédent.

Par exemple, prenant $\eta =$ type d'homotopie du cercle S^1, les formules (13) se spécialisent en p. 7

$$\begin{aligned} \hom\mathrm{ext}(\Sigma M, N) \ &\simeq \ \hom\mathrm{ext}(M, \Omega N) \\ &\simeq \ \Omega\hom\mathrm{ext}(M,N) \\ &\overset{\text{déf}}{=} \ \mathrm{hom}_{\mathrm{HOT}}(S^1, \hom\mathrm{ext}(M,N)). \end{aligned} \tag{14}$$

Mais cette formule dans Hot n'est sans doute pas tout à fait la bonne, car le bon formalisme de Ω, Σ se fait dans les catégories *ponctuées,* et en particulier dans la catégorie homotopique ponctué $\mathrm{Hot}_\bullet$.

Je vais expliciter un exemple, en prenant le dérivateur

$$\mathrm{Dér}(A)$$

'dérivé' d'une catégorie abélienne A. Donc $\mathbf{D}(e)$ = catégorie dérivée de A. Pour éviter des difficultés accessoires ici, je vais supposer que A est la catégorie des k-modules, k un anneau quelconque. [page 11]

À tout $\xi \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{Hot}$ est associé un 'abélianisé'

$$\xi_{\mathrm{ab}} \overset{\text{déf}}{=} H_\bullet(\xi) \in \underbrace{D(\mathrm{Ab})}_{\text{ou } \mathbf{D}(\mathbf{Z}\text{-Mod})}, \qquad \text{catégorie dérivée des groupes abéliens,}$$

objet qui n'a de cohomologie qu'en degré ≤ 0. Ceci dit, si M est dans $D(k\text{-Mod})$, on aura

$$\begin{cases} \xi \times_{\mathbf{D}} M \;\simeq\; \xi_{\mathrm{ab}} \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_{\mathbf{Z}} M \\ \hom_{\mathbf{D}}(\xi, M) \;\simeq\; \mathbf{R}\mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(\xi_{\mathrm{ab}}, M), \end{cases} \tag{15}$$

formule qui est en cheville avec la formule de Künneth pour l'homologie

$$(\xi \times \eta)_{\mathrm{ab}} \simeq \xi_{\mathrm{ab}} \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_{\mathbf{Z}} \eta_{\mathrm{ab}}, \tag{16}$$

ce qui redonne un aspect familier aux formules (9), qui se réduisent à

$$\begin{cases} \xi_{\mathrm{ab}} \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_{\mathbf{Z}} (\eta_{\mathrm{ab}} \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_{\mathbf{Z}} M) \;\simeq\; (\xi_{\mathrm{ab}} \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_{\mathbf{Z}} \eta_{\mathrm{ab}}) \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_{\mathbf{Z}} M \\ \mathbf{R}\mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(\xi_{\mathrm{ab}}, \mathbf{R}\mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(\eta_{\mathrm{ab}}, M)) \;\simeq\; \mathbf{R}\mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(\xi_{\mathrm{ab}} \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_{\mathbf{Z}} \eta_{\mathrm{ab}}, M). \end{cases} \qquad ([2])$$

D'autre part, existe-t-il bien un $\hom\mathrm{ext}(M, N)$, si M, N dans $D(k\text{-Mod})$? On pense à $\mathbf{R}\mathrm{Hom}_k(M, N)$, mais pour en faire un type d'homotopie, on doit 'tronquer en degrés > 0'. On pourrait donc prendre

$$\hom\mathrm{ext}(M, N) \;\simeq\; \tau_{\leq 0}(\mathbf{R}\mathrm{Hom}_k(M, N)).$$

La formule fondamentale (10) est-elle alors valable ? Le deuxième membre est en effet [p. 8] [page 12]

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Hot}}(\xi, H) \;\simeq\; \mathrm{Hom}_{\mathrm{Hotab}}(\xi_{\mathrm{ab}}, H) \qquad ([3])$$

car H est un objet abélien de Hot (cf. le tapis sur l'abélianisation …), à partir de là c'est gagné :

$$\mathrm{Hom}_{\underbrace{\mathrm{Hotab}}_{\substack{\approx\, D(\mathbf{Z}\text{-Mod})^{\leq 0},\\ \text{sous-catégorie } \textit{pleine}\\ \text{de } D(\mathbf{Z}\text{-Mod})}}}(\xi_{\mathrm{ab}}, \tau_{\leq 0}\mathbf{R}\mathrm{Hom}_k(M, N)) \;\simeq\; \mathrm{Hom}_{D(\mathbf{Z}\text{-Mod})}(\xi_{\mathrm{ab}}, \mathbf{R}\mathrm{Hom}_k(M, N))$$

$$\simeq\; \mathrm{Hom}_{D(k\text{-Mod})}(\xi_{\mathrm{ab}} \times M, N),$$

O.K.

2. Expliciter aussi la formule d'adjonction (7) (p. 4).
3. ? ? est-ce vrai ? ? ?

D'autre part, le bifoncteur

$$(M, N) \longmapsto \hom \operatorname{ext}(M, N) = \tau_{\leq 0}\mathbf{R}\mathrm{Hom}_k(M, N)$$

se factorise canoniquement par Hotab et a fortiori par $\mathrm{Hot}_\bullet$. Le 'bon' $\hom \operatorname{ext}(M, N)$ serait ici plutôt celui dans Hotab, voire même dans la catégorie $D^-(\mathbf{Z}\text{-Mod})$, déduite de celle là 'en rendant le foncteur translation inversible'. Il est évident d'ailleurs qu'ici le $\xi_{\mathrm{ab}} \times_{\mathbf{D}} M$, où $\xi = S^1$, n'est pas 'la bonne' suspension, qui doit être le décalage des degrés – ξ_{ab} ne devrait avoir de la cohomologie qu'en degré -1, et non aussi en degré 0.

p.

LES DÉRIVATEURS

ALEXANDRE GROTHENDIECK

Chapitre IV

Diagrammes substantiels

p.

Note des éditeurs de l'édition transcrite.

Ce texte a été déchiffré et transcrit en LaTeX 2$_\varepsilon$ par M. Künzer. Il a été édité par M. Künzer, J. Malgoire, et G. Maltsiniotis. La transcription est aussi fidèle que possible au manuscrit. Pour les quelques corrections évidentes, ou rares commentaires des éditeurs, ainsi que pour la numérotation originale des pages du manuscrit, les caractères de machine à écrire `[typewriter]` entre crochets sont utilisés. Un point d'interrogation entre crochets signifie que l'on n'est pas sûr du mot qui précède.
Cette édition est provisoire. Les remarques, commentaires et corrections sont bienvenus. Envoyer un message à :
[e-mail address removed]

G. Maltsiniotis

p. 1

`[Il n'y a pas de pages 1-72]`

`[page 73]`

Construction de diagrammes substantiels pour un dérivateur.

Soit $\mathbf{D}$ un prédérivateur, I dans Diag, considérons
$\varphi_I : \mathcal{D}(I) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(I^o, \mathcal{A})$, où $\mathcal{A} = \mathbf{D}(e)$ est la catégorie fondamentale des coefficients.

Les objets de $\underline{\mathrm{Hom}}(I^o, \mathcal{A})$ s'interprètent comme des *diagrammes de type* I^o dans $\mathcal{A}$. Ce langage est surtout commode si I est ordonnée. Notons, pour $F \in \mathrm{Ob}\,\mathbf{D}(I)$, par $(F_i)_{i\in \mathrm{Ob}\,I}$ le I^o-diagramme associé dans $\mathcal{A}$. Par l'axiome Dér 2, le foncteur

$$\varphi : F \longmapsto (F_i)_{i\in \mathrm{Ob}\,I}$$

est conservatif. Mais il n'a aucune envie d'être fidèle, encore moins pleinement fidèle. Quand on connaît le diagramme $(F_i)_i$, on est loin de connaître F, pas même à isomorphisme non unique près, je présume. Il n'est nullement clair que si F, F' dans $\mathbf{D}(I)$ sont tels que les diagrammes associés soient isomorphes, ils soient eux-mêmes isomorphes.

Pour insister sur ce point, les objets de $\mathbf{D}(I)$ s'appelleront les '*diagrammes substantiels* de type I^o dans $\mathcal{A}$' (ou $\mathbf{D}$-substantiel, s'il y a risque de confusion). Pour étayer l'intuition et simplifier les explications, un objet F de $\mathbf{D}(I)$ ($\mathbf{D}$-coefficients sur I) sera représenté graphiquement par le diagramme 'faible' ou 'squelettique' correspondant – on le regarde comme une sorte de (pâle) 'squelette' du diagramme substantiel dont il provient. P. ex. `[page 74]`
si $I = \mathbf{\Delta}_0 : 0 \longrightarrow 1$ `[plutôt` $\mathbf{\Delta}_1$`]`, on note un diagramme substantiel de type $(\mathbf{\Delta}_0)^o$ `[plutôt` $(\mathbf{\Delta}_1)^o$`]` par le même graphisme, que le diagramme ordinaire :

$$F_0 \longleftarrow F_1.$$

Si

$$I = \begin{array}{ccc} a & \longrightarrow & c \\ \uparrow & & \uparrow \\ 0 & \longrightarrow & b, \end{array}$$

les diagrammes substantiels de type I se notent

$$\begin{array}{ccc} F_a & \longleftarrow & F_c \\ \downarrow & & \downarrow \\ F_0 & \longleftarrow & F_b. \end{array}$$

Il faudra bien sûr préciser chaque fois si ce graphisme désigne un diagramme squelettique, ou substantiel. Souvent on part d'un squelette, et on essaye de 'l'étoffer' avec un peu de chair, pour en faire un diagramme substantiel – si possible, de façon canonique. C'est là un point de philosophie dérivatique essentiel pour la pratique. On procédera souvent de proche en proche, en 'substantifiant' des sous-diagrammes correspondants à une suite strictement croissante $I_0 \subset I_1 \subset \cdots \subset I_n = I$ de I, au mieux de la situation particulière. p. 2

En voici un exemple typique, en supposant $\mathbf{D}$ un dérivateur *ponctué* (les $\mathbf{D}(I)$ sont ponctuées, et les f^* transforment objets nuls en objets nuls). Il s'agit de la définition du foncteur 'cosuspension' ou 'espace de lacets' dans $\mathcal{A}$, [page 75]

$$\Omega : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{A}.$$

Il est entendu que pour M dans $\mathcal{A}$, $\Omega(M)$ doit s'insérer dans un carré commutatif

$$\begin{array}{ccc} e & \longleftarrow & \Omega M \\ \downarrow & & \downarrow \\ M & \longleftarrow & e, \end{array} \tag{C}$$

où e désigne les éléments unités. Ce carré cependant devrait être substantiel, plus précisément, être un carré substantiel '$\mathbf{D}$-*cartésien*'. Étant entendu qu'un objet de $\mathbf{D}(I)$ (carré substantiel dans $\mathcal{A}$) est dit $\mathbf{D}$-cartésien, s'il est dans l'image essentielle de $\mathbf{D}(I_1)$ par i_{1*}, où

$$i_1 : I_1 \hookrightarrow I,$$

I_1 étant la sous-catégorie ouverte de I définie par

$$I_1 = \begin{array}{ccc} & & a \\ & & \uparrow \\ 0 & \longrightarrow & b. \end{array}$$

La restriction du carré substantiel cherché (C) à la sous-catégorie I_1 est donc un diagramme substantiel de squelette [page 76]

$$\begin{array}{ccc} e & & \\ \downarrow & & \\ M & \longleftarrow & e, \end{array} \tag{Sq}$$

dont il se déduit (à isomorphisme canonique près) en appliquant i_* à ce dernier, de façon à le compléter en $\begin{array}{ccc} e & \leftarrow\cdots & \Omega M \\ \downarrow & & \vdots \\ M & \longleftarrow & e \end{array}$. Il reste donc à décrire une substantiation canonique du squelette (Sq), en termes de M. Cela nous conduit à regarder la sous-catégorie ouverte p. 3

$$I_0 = \{0\} : \quad \begin{array}{ccc} & \cdots\to & \\ \uparrow & & \uparrow \\ 0 & \cdots\to & \end{array}$$

de I_1 (donc aussi de I) réduite à l'objet initial, et l'inclusion

$$I_0 \overset{i_0}{\hookrightarrow} I_1,$$

et de substantifier le squelette (Sq) par $(i_0)_!(M)$.

On peut dire a posteriori que, si on connaissait le carré substantiel, il n'y a, à isomorphisme unique près, qu'une seule façon de l'obtenir comme un $i_{1*}i_{0!}(?)$, avec ? dans $\mathbf{D}(I_0) \simeq \mathcal{A}$, car $i_{0!}$ et i_{1*} étant pleinement fidèles, il en est de même de leur composé.

En fait, on voit que le foncteur [page 77]

$$i_{1*}i_{0!} : \ \mathcal{A} \simeq \mathbf{D}(I_0) \longrightarrow \mathbf{D}(I)$$

induit une équivalence de $\mathcal{A}$ avec la sous-catégorie pleine de $\mathbf{D}(I)$ formée des carrés $\mathbf{D}$-cartésiens dont les fibres en a et b sont nulles. (Le foncteur quasi-inverse évident est i^*, où $i : U_0 \hookrightarrow I$ `[plutôt` $I_0 \hookrightarrow I$`]`.) Cela signifie donc que dans ce cas, la donnée du squelette de nature très particulière ($F_a \simeq F_b \simeq 0_{\mathcal{A}}$), plus la contrainte supplémentaire $\mathbf{D}$-cartésienne, sur le carré cherché, détermine celui-ci à isomorphisme unique près en termes de son squelette : il y a une substantiation non seulement 'canonique' de celui-ci, mais même unique à isomorphisme unique près, à cause de la contrainte $\mathbf{D}$-cartésienne.

Je voudrais commencer par regarder le cas plus simple encore où $I = \mathbf{\Delta}_1 = (0 \longrightarrow 1)$, donc les squelettes envisagés sont simplement les flèches

$$F_1 \longrightarrow F_0 \qquad \text{dans } \mathcal{A}.$$

La philosophie nous oblige, pour les flèches les plus fondamentales dans la théorie des dérivateurs $\mathbf{D}$ (flèches dans $\mathcal{A}$, ou par extension dans une $\mathbf{D}(I) \simeq \mathcal{A}_{\mathbf{D}_I}$, catégorie fondamentale du dérivateur induit $\mathbf{D}_I$) de se demander s'il n'y a pas

une façon 'canonique', 'naturelle', 'voulue par Dieu', de le 'remplumer' en un dia- p. 4
gramme substantiel. Les flèches les plus évidentes qui se présentent sont relatives à un [page 78]
foncteur

$$f : I \longrightarrow J$$

dans Diag, et aux deux morphismes d'adjonction pour le couple (f^*, f_*), savoir

$$\begin{aligned} G &\longrightarrow f_*f^*G \quad \text{dans } D(J) \\ f^*f_*F &\longrightarrow F \qquad \text{dans } D(I). \quad ([1]) \end{aligned}$$

Je vais essayer de remplumer ces deux flèches, et vais généraliser en envisageant la situation ci-contre `[ci-dessous]`

$$\begin{array}{ccc} I & & F \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \uparrow{\scriptstyle u} \\ J & & G, \end{array}$$

où

$$\mathrm{Hom}^f(G, F) \overset{\text{déf}}{=} \mathrm{Hom}(f^*G, F) \overset{\text{adj.}}{\simeq} \mathrm{Hom}(G, f_*F).$$

Donc le même u s'interprète par *deux* flèches squelettiques

$$\begin{cases} f^*(G) \longrightarrow F & \text{dans } \mathbf{D}(I) \\ G \longrightarrow f_*(F) & \text{dans } \mathbf{D}(J). \end{cases} \tag{1}$$

1. Bien sûr, problème dual pour $(f_!, f^*)$.

Les remplumer, c'est les interpréter (si faire se peut) en termes de deux objets (si possible canoniques) dans $\mathbf{D}(I \times \mathbf{\Delta}_1)$ et $\mathbf{D}(J \times \mathbf{\Delta}_1)$ respectivement.

Je vais me guider sur le cas particulier d'un dérivateur trivial

$$\mathbf{D} = \mathbf{D}_{\mathcal{M}},$$

où $\mathcal{M}$ est une catégorie de modèles 'nue' ($\Sigma = \emptyset$).

Pour f fixé, on va construire une catégorie auxiliaire $K(f)$, de telle façon que pour toute catégorie $\mathcal{M}$, les systèmes (G, F, u) d'un $\mathcal{M}$-préfaisceau G sur J, d'un autre F sur I, et d'un f-homomorphisme $G \longrightarrow F$, s'identifient (fonctoriellement) aux $\mathcal{M}$-préfaisceaux sur $K(f)$. Ceci dit, on va essayer d'interpréter les flèches (1) squelettiques, mais peu importe ici – tous les $\mathbf{D}$-squelettes sont maintenant remplumés) en termes de la géométrie de $K(f)$. [page 79] p. 5

$$\begin{cases} \operatorname{Ob} K(f) = \operatorname{Ob} K(I) \amalg \operatorname{Ob} K(J) & \texttt{[plutôt Ob } I \amalg \operatorname{Ob} J \texttt{]} \\ I,\ J \text{ s'identifiant à des sous-catégories pleines de } K(f), \\ \text{il n'y a pas des flèches d'un } j \in J \text{ dans un } i \in I. \\ (\text{Donc } I \text{ est ouverte dans } K(f),\ J \text{ son complémentaire fermé.}) \\ \text{Pour } i \in \operatorname{Ob} I,\ j \in \operatorname{Ob} J, \text{ on pose } \operatorname{Hom}_{K(f)}(i,j) = \operatorname{Hom}_J(f(i), j). \end{cases}$$

La composition des flèches dans $K(f)$ est évidente. On va définir une rétraction canonique

$$\bar{f} : K(f) \longrightarrow J$$

de $K(f)$ sur sa sous-catégorie fermée J. Donc $\bar{f}$ est connu sur $\operatorname{Ob} J$, et sur $\operatorname{Ob} I$ ce sera f :

$$\begin{cases} \bar{f}(j) = j & \text{si } j \in \operatorname{Ob} J \\ \bar{f}(i) = f(i) & \text{si } i \in \operatorname{Ob} I. \end{cases}$$

Il reste à définir, pour $x, y \in \operatorname{Ob} K(f)$, [page 80]

$$\operatorname{Hom}_{K(f)}(x,y) \longrightarrow \operatorname{Hom}_J(\bar{f}(x), \bar{f}(y)).$$

Si $x, y \in \operatorname{Ob} J$, c'est l'identité, si $x, y \in I$, c'est f. Si $x \in I$, $y \in J$, on doit définir une flèche

$$\operatorname{Hom}(f(x), y) \longrightarrow \operatorname{Hom}(f(x), y),$$

et on prend encore l'identité. On a

$$\begin{array}{ccccc} J & \xrightarrow{\ j\ } & K(f) & \xleftarrow{\ i\ } & I \\ & \searrow & \downarrow{\scriptstyle \bar{f}} & & \\ & & J & & \end{array}$$

$$\begin{cases} \bar{f} \circ j = \mathrm{id}_J \\ j \circ \bar{f} = \begin{cases} j & \text{sur } J \\ jf & \text{sur } I, \end{cases} \end{cases} \qquad \text{i.e.} \quad \boxed{\begin{array}{ll} j\bar{f}j = j & \text{sur } J \\ j\bar{f}i = jf & \text{sur } I \end{array}},$$

et on a $\texttt{[}K = K(f)\texttt{]}$

$$\begin{aligned} \alpha :\ \mathrm{id}_K &\longrightarrow j\bar{f} \qquad \text{i.e. homomorphisme fonctoriel} \\ x &\xrightarrow{\alpha(x)} j(\bar{f}(x)), \quad x \in \operatorname{Ob} K, \end{aligned}$$

p. 6

défini ainsi :

$$\begin{cases} \text{Si } x \in J,\ \alpha(x) = \mathrm{id}_x\ :\ x \xrightarrow{\sim} j(\bar{f}(x)) = j(x) = x \\ \text{Si } x \in I,\ \alpha(x) : \underbrace{x \longrightarrow f(x)}_{\text{dans } K(f)},\ \text{ou } \underbrace{f(x) \longrightarrow f(x)}_{\text{dans } J},\ \alpha(x) = \mathrm{id}_{f(x)}. \end{cases}$$

On doit vérifier la fonctorialité pour x variable dans K …

Soit Φ un $\mathcal{M}$-préfaisceau sur K. Il définit

$$\begin{aligned} F = i^*(\Phi) \quad &\in \mathrm{Ob}\,\mathbf{D}_{\mathcal{M}}(I) \\ G = j^*(\Phi) \quad &\in \mathrm{Ob}\,\mathbf{D}_{\mathcal{M}}(J). \end{aligned}$$

D'autre part $f^*(G)$ s'interprète comme $(j\bar{f})^*(\Phi)|I$, car

$$\begin{aligned} f^*(G)(i) &= G(\underbrace{f(i)}_{=\bar{f}(i)\in J}) \\ &= j^*(\Phi)(\bar{f}(i)) \\ &= \Phi(j\bar{f}(i)) \\ &= (j\bar{f})^*(\Phi)(i). \end{aligned}$$

Donc [page 81]

$$f^*(G) \simeq (j\bar{f})^*(\Phi)|I.$$

Or la flèche

$$\alpha : \mathrm{id}_K \longrightarrow j\bar{f}$$

donne

$$\underbrace{\mathrm{id}_K(\Phi)}_{=\Phi} \xleftarrow{\Phi(\alpha)} (j\bar{f})^*(\Phi), \qquad \text{fonctoriel en } \Phi,$$

d'où, en prenant les restrictions à I,

$$i^*(\Phi) \overset{\text{déf}}{=} F \xleftarrow{u} f^*G.$$

En fait, sans tellement se tortiller, on devrait pouvoir montrer que pour toute catégorie $\mathcal{M}$, la catégorie $\underline{\mathrm{Hom}}(K^o, \mathcal{M})$ des $\mathcal{M}$-préfaisceaux sur K est isomorphe à celle des triples (F, G, u), avec $F \in \mathrm{Ob}\,\underline{\mathrm{Hom}}(I^o, \mathcal{M})$, $G \in \underline{\mathrm{Hom}}(J^o, \mathcal{M})$, et $u : f^*(G) \longrightarrow F$. Ainsi, K apparaît comme solution d'un problème universel

$$\underline{\mathrm{Hom}}(K^o, \mathcal{M}) \longrightarrow \{F,\ G,\ u \text{ comme dessus}\}(\mathcal{M}).$$

Mais pour y préciser la flèche $\longrightarrow$ de façon conceptuelle simple, il est bon de se donner K avec les structures supplémentaires $I \underset{\bar{f}}{\overset{j}{\leftrightarrows}} K \xleftarrow{i} I$, $\bar{f}j = \mathrm{id}_J$, $\mathrm{id}_K \xrightarrow{\alpha} j\bar{f}$.

Et ce système $\{K,\ i,\ j,\ \bar{f},\ \alpha\}$ est (sauf erreur) défini à isomorphisme canonique près par la condition de représenter le foncteur $\mathcal{M} \longmapsto \{F,\ G,\ u\}^o(\mathcal{M})$ … p. 7 [page 82]

En particulier, le système défini par $G \in \mathrm{Ob}\,\mathbf{D}_{\mathcal{M}}(J)$

$$(f^*(G),\ G,\ \mathrm{id} : f^*(G) \longrightarrow f^*(G))$$

est défini sauf erreur par $\bar{f}^*(G)$ sur $K(f)$. On se propose [?] de trouver une interprétation similaire pour

$$(F,\ f_*(F),\ f^*f_*F \longrightarrow F)$$

($F \in \mathrm{Ob}\,\mathbf{D}(I)$). Le candidat naturel serait ici $\Phi = i_*(F)$. Admettons ce point (i.e. surtout la vérification du fait que $j^*(i_*(F)) \simeq f_*(F)$). Tout ceci montre que si $\mathbf{D}$ est à nouveau un dérivateur quelconque, on peut, par les formules précédentes, trouver un objet canonique Φ de $\mathbf{D}(K)$, en termes soit d'un $\mathbf{D}$-coefficient F sur I (en prenant $\Phi = i_*(F)$), soit d'un $\mathbf{D}$-coefficient G sur J (en prenant $\Phi = \bar{f}^*(G)$). D'autre part, on peut espérer définir canoniquement

$$\mathbf{D}(K) \longrightarrow \mathbf{D}(I \times \mathbf{\Delta}_1)$$
$$\mathbf{D}(K) \longrightarrow \mathbf{D}(J \times \mathbf{\Delta}_1)$$

dont les composés avec les foncteurs 'squelettes'

$$\mathbf{D}(I \times \mathbf{\Delta}_1) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{\Delta}_1^o, \mathbf{D}(I))$$
$$\mathbf{D}(J \times \mathbf{\Delta}_1) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{\Delta}_1^o, \mathbf{D}(J))$$

redonnent (pour $\Phi \in \mathrm{Ob}\,\mathbf{D}(K)$) les flèches squelettiques [page 83]

$$\begin{cases} f^*(G) \xrightarrow{u} F \\ G \xrightarrow{v} f_*F \end{cases}$$

associées à (F, G, u). De façon précise, $f^*(G) \longrightarrow F$ se définit en termes de $\mathbf{D}$, et $\Phi \in \mathrm{Ob}\,\mathbf{D}(K)$, comme ci-dessus, et v s'en déduit par adjonction.

L'idée naturelle ici, serait de ramener le problème de l'étoffement des flèches d'adjonction sqelettiques, au cas des immersions ouvertes ou fermées. Notons que les sous-catégories ouvertes de K correspondent justement aux foncteurs $K \longrightarrow \mathbf{\Delta}_1$, en prenant les images inverses de l'ouvert générique. Il y a donc un unique

$$\varphi : \ K(f) \longrightarrow \mathbf{\Delta}_1$$

avec $I = \varphi^{-1}(\{0\})$. Donc `[fin du chapitre]`

p.

LES DÉRIVATEURS

ALEXANDRE GROTHENDIECK

Chapitre V

Catégories de chemins et localisation

p.

Note des éditeurs de l'édition transcrite.

Ce texte a été déchiffré et transcrit en LaTeX 2_ε par M. Künzer. Il a été édité par M. Künzer, J. Malgoire, et G. Maltsiniotis. La transcription est aussi fidèle que possible au manuscrit. Pour les quelques corrections évidentes, ou rares commentaires des éditeurs, ainsi que pour la numérotation originale des pages du manuscrit, les caractères de machine à écrire `[typewriter]` entre crochets sont utilisés. Un point d'interrogation entre crochets signifie que l'on n'est pas sûr du mot qui précède.

Cette édition est provisoire. Les remarques, commentaires et corrections sont bienvenus. Envoyer un message à :

[**e-mail address removed**]

G. Maltsiniotis

p. 1

[page 1]

1 La catégorie des chemins

Soit Φ la catégorie suivante :

$$\left\{\begin{array}{rcll} \mathrm{Ob}\,\Phi & = & \mathbf{Z} & \\ \mathrm{Fl}\,\Phi & = & \mathrm{Ob}\,\Phi \sqcup \mathbf{Z} & (\mathrm{Ob}\,\Phi \leftrightarrow \text{identités}) \end{array}\right.$$

On note $\{\alpha\}$, ou simplement α, l'objet qui correspond à $\alpha \in \mathbf{Z}$. On note u_α la flèche qui correspond à l'entier $\alpha \in \mathbf{Z}$.

$$\begin{array}{rcll} s(u_\alpha) & = & \alpha & \text{si } \alpha \text{ pair}, \quad \alpha+1 \quad \text{si } \alpha \text{ impair} \\ b(u_\alpha) & = & \alpha+1 & \text{si } \alpha \text{ pair}, \quad \alpha-1 \quad \text{si } \alpha \text{ impair} \end{array}$$

[plutôt $b(u_\alpha) = \alpha+1$ si α pair, α si α impair]

Il n'y pas à définir de compositions, car si deux flèches sont composables, elles sont l'identité. En fait, Φ est une catégorie *ordonnée*, $\{\alpha\} < \{\beta\}$ si et seulement si α pair, $\beta = \alpha+1$ [plutôt $\beta = \alpha+1$ ou $\beta = \alpha-1$].

On note, pour $n \in \mathbf{N}$,

$$\Phi_n \subseteq \Phi, \quad \mathrm{Ob}\,\Phi_n = \{\alpha \in \mathrm{Ob}\,\Phi \mid -n \leq \alpha \leq +n\},$$

la sous-catégorie pleine de Φ dont les objets sont les $\{\alpha\}$ avec $-n \leq \alpha \leq +n$. Ainsi

$$\Phi_1 = \{-1 \longleftarrow 0 \longrightarrow 1\},$$

la duale est

$$\Psi_1 = \Phi_1^o = \{-1 \longrightarrow 0 \longleftarrow 1\}.$$

On peut considérer Φ comme somme amalgamée d'une suite ordonnée infinie (de deux côtés) de copies de Φ_1, ou aussi d'une suite similaire de copies de Ψ_1.

$$\cdots \quad \overbrace{\underbrace{\longleftarrow -4 \longrightarrow -3 \longleftarrow -2 \longrightarrow -1 \longleftarrow 0 \longrightarrow 1 \longleftarrow 2 \longrightarrow 3 \longleftarrow 4 \longrightarrow}_{\Psi_1 \quad \Psi_1 \quad \Psi_1 \quad \Psi_1}}^{\Phi_1 \quad \Phi_1 \quad \Phi_1 \quad \Phi_1 \quad \Phi_1} \quad \cdots$$

Les Φ_n, pour n impair, sont de même somme de copies de Φ_1 mises bout à bout, et les Ψ_n, pour n pair > 0, somme de copies de Ψ_1.

p. 2

Les Φ_n forment un système inductif avec foncteurs de transition pleinement fidèles, dont Φ est la limite inductive

$$\Phi = \varinjlim_n \Phi_n.$$

Mais pour la suite on va faire des Φ_n un système *projectif*, en définissant pour tout $n \leq m$ une *rétraction* $\varphi_{n,m}$ de Φ_m sur Φ_n, par

[page 2]

$$\left\{\begin{array}{l} \varphi_{n,m} : \Phi_m \longrightarrow \Phi_n \subset \Phi_m \\ \varphi_{n,m}(\{\alpha_i\}) = \left\{\begin{array}{rcll} \alpha_i & = & i & \in \mathrm{Ob}\,\Phi_n, \quad \text{i.e.} \quad -n \leq i \leq n \\ \alpha_i & = & n & \text{si} \quad n \leq i \leq m \\ \alpha_i & = & -n & \text{si} \quad -m \leq i \leq -n \end{array}\right. \end{array}\right.$$

[plutôt

$$\varphi_{n,m} : \Phi_m \longrightarrow \Phi_n \subset \Phi_m$$

$$\varphi_{n,m}(\{i\}) = \begin{cases} \{i\} & \texttt{si } i \in \operatorname{Ob}\Phi_n, \quad \texttt{i.e} \quad -n \leq i \leq n \\ \{n\} & \texttt{si} \quad n \leq i \leq m \\ \{-n\} & \texttt{si} \quad -m \leq i \leq -n \ \texttt{]} \end{cases}$$

On note le système projectif d'ensembles ordonnés ainsi obtenu par

$$\boldsymbol{\Phi} = (\Phi_n)_{n\in\mathbf{N}} \in \operatorname{Pro}(\mathrm{Cat}).$$

Soit X une catégorie, alors pour $n \in \mathbf{N}$

$$\underline{\mathrm{Ch}}_n(X) \overset{\text{déf}}{=} \underline{\mathrm{Hom}}(\Phi_n, X)$$

est la catégorie des diagrammes de X de la forme

$$A_{-n} \cdots \longleftarrow A_{-2} \xrightarrow{u_{-2}} A_{-1} \xleftarrow{u_{-1}} A_0 \xrightarrow{u_0} A_1 \xleftarrow{u_1} A_2 \xrightarrow{u_2} A_3 \longleftarrow \cdots A_n \qquad (*)$$

avec $2n$ flèches bout à bout u_i $(-n \leq i \leq n)$ [plutôt $(-n \leq i \leq n-1)$], deux flèches consécutives allant toujours en sens opposé,

$$\text{soit } \cdot \longrightarrow \cdot \longleftarrow \cdot, \quad \text{soit } \cdot \longleftarrow \cdot \longrightarrow \cdot.$$

Le foncteur canonique déduit de $\varphi_{n,m} : \Phi_m \longrightarrow \Phi_n$

$$\varphi_X^{m,n} : \underline{\mathrm{Ch}}_n(X) \longrightarrow \underline{\mathrm{Ch}}_m(Y), \qquad n \leq m,$$

[plutôt $\underline{\mathrm{Ch}}_m(X)$] est le 'foncteur de dégénérescence', consistant à compléter un diagramme $(*)$, par $m-n$ termes A_{-n} avec des identités à gauche, et par $m-n$ termes $[A_n]$ avec des identités à droite, donc pour n pair on trouve p. 3

$$\underbrace{A_{-n} \cdots \xrightarrow{\mathrm{id}} A_{-n}}_{m-n \text{ termes}} \xleftarrow{\mathrm{id}} A_{-n} \longrightarrow A_{-(n-1)} \cdots\cdots A_{n-1} \longleftarrow A_n \xrightarrow{\mathrm{id}} \underbrace{A_n \xleftarrow{\mathrm{id}} A_n \longrightarrow \cdots A_n}_{m-n \text{ termes}}.$$

C'est un foncteur pleinement fidèle (ce qui correspond au fait que $\varphi_{n,m}$ est surjectif sur les objets et sur les flèches.

On pose [page 3]

$$\underbrace{\underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X)}_{\text{ou simplement } \underline{\mathrm{Ch}}(X)} = \underline{\mathrm{Hom}}(\boldsymbol{\Phi}, X) \overset{\text{déf}}{=} \varinjlim_n \underline{\mathrm{Ch}}_n(X)$$

([1]) ([2]). On a une inclusion pleinement fidèle

$$\underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X) \hookrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(\Phi, X),$$

où la deuxième catégorie est celle des diagrammes infinis (dans les deux directions)

$$\cdots \longleftarrow A_{-2} \xrightarrow{u_{-2}} A_{-1} \xleftarrow{u_{-1}} A_0 \xrightarrow{u_0} A_1 \xleftarrow{u_1} A_2 \xrightarrow{u_2} \cdots$$

et où $\underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X)$ s'identifie à la sous-catégorie pleine formées des objets pour lesquels les flèches u_i sont des identités, pour $|i|$ assez grand.

1. L'ensemble des objets de cette catégorie se notera $\mathrm{Ch}_\infty(X)$ ou $\mathrm{Ch}(X)$, de même on définit les $\mathrm{Ch}_n(X)$.

2. dans cette formule: $\boldsymbol{\Phi}$ procatégorie

On appellera $\underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X)$ la *catégorie des chemins* dans X, ses objets seront les chemins dans X. Ceux qui proviennent de $\underline{\mathrm{Ch}}_n(X)$ seront appelés *chemins standards de longueur* $2n$. (Le terme 'standard' s'applique ici à nos conventions de notations. Ainsi nous ne considérons que des chemins de longueur paire, et pour une longueur déterminée, nous choisissons l'une parmi les deux espèces raisonnables, par exemple pour les chemins de longueur 2 nous avons pris seulement

$$A_{-1} \longleftarrow A_0 \longrightarrow A_1$$

et non pas

$$A_{-1} \longrightarrow A_0 \longleftarrow A_1.)$$

[page 4]

Je me rends compte que mes notations u_i ne sont pas commodes pour la dualité, je vais les changer, en u_i pour les flèches entre objets $\{i\}$ avec $i \geq 0$, et v_i la flèche symétrique de u_i par rapport à l'origine. (Le groupe des automorphismes des Φ_n est réduit au groupe à deux éléments, le seul automorphisme non trivial étant la symétrie $\{i\} \longrightarrow \{-i\}$. Donc nos chemins seront notés désormais

$$A_{-2} \xrightarrow{v_1} A_{-1} \xleftarrow{v_0} A_0 \xrightarrow{u_0} A_1 \xleftarrow{u_1} A_2 \longrightarrow \cdots . \qquad (*)$$

p. 4

(Ce n'est pas non plus enthousiasmant …)
Soit

$$\varepsilon = \{-1, +1\}$$

l'ensemble ordonné *discret,* réduit aux deux éléments -1, $+1$, et définissons des foncteurs d'inclusion (pleinement fidèles)

$$\alpha_n : \varepsilon \longrightarrow \Phi_n \quad \begin{matrix} \alpha_n(-1) = -n \\ \alpha_n(1) = n, \end{matrix}$$

ces foncteurs sont compatible avec les $\varphi_{n,m}$, d'où

$$\alpha_\infty : \varepsilon \longrightarrow \mathbf{\Phi} \in \mathrm{ProCat},$$

d'où pour tout X un foncteur

$$\kappa : \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{\Phi}, X) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(\varepsilon, X) \simeq X \times X$$

i.e.

[page 5]

$$\begin{matrix} \underline{\mathrm{Ch}}(X) \longrightarrow X \times X \\ c \longrightarrow (\sigma(x), \beta(x)). \end{matrix}$$

[plutôt $(\sigma(c), \beta(c))$] Pour tout chemin c dans X i.e. un diagramme $(*)$ (satisfaisant à la condition de dégénérescence à l'infini), on a une source ou origine du chemin, et un but ou une *extrémité*

$$\begin{cases} \sigma(x) = A_i & \text{pour } i \leq -\mathrm{long}(x) \\ \beta(x) = A_i & \text{pour } i \geq \mathrm{long}(x) \end{cases}$$

[remplacer x par c; pour $\mathrm{long}(c)$ défini convenablement]. La fibre du foncteur précédent en x, y sera notée

$$\underline{\mathrm{Ch}}(X; x, y) \qquad \text{ou simplement } \underline{\mathrm{Ch}}(x, y),$$

catégorie des chemins de x à y.

p. 5

2 Calcul d'une catégorie de fractions $X\Sigma^{-1}$

Avant de continuer le formalisme des chemins (composition etc.), je vais tester l'utilité de la notion de catégorie des chemins, pour le 'calcul' des $X\Sigma^{-1}$, où

$$\Sigma \subset \mathrm{Fl}(X), \qquad \Sigma \text{ contient les identités}$$

est une partie autrement *quelconque* de $\mathrm{Fl}(X)$. On sait que $\mathrm{Ob}\, X\Sigma^{-1} = \mathrm{Ob}\, X$, et tout revient à définir les

$$\mathrm{Hom}_{X\Sigma^{-1}}(x, y), \qquad x, y \in \mathrm{Ob}\, X,$$

et pour $x, y, z \in \mathrm{Ob}\, X$ la composition [page 6]

$$\mathrm{Hom}_\Sigma(x, y) \times \mathrm{Hom}_\Sigma(y, z) \xrightarrow{(u,v)\mapsto vu} \mathrm{Hom}_\Sigma(x, z),$$

(où on note Hom_Σ au lieu de $\mathrm{Hom}_{X\Sigma^{-1}}$, pour alléger les notations).

Grâce à Σ, on définit une sous-catégorie pleine

$$\underline{\mathrm{Ch}}_\Sigma(X) \hookrightarrow \underline{\mathrm{Ch}}(X),$$

([3]) par la condition sur $c \in \mathrm{Ch}(X)$: Pour i impair, [plutôt pair] i.e. $i-1 \xleftarrow{u_i} i$ (u_i est dite 'rétrograde'), $c(u_i) \in \Sigma$, i.e. les 'tronçons' rétrogrades dans le chemin c doivent être dans Σ. On définit de même les sous-catégories pleines

$$\underline{\mathrm{Ch}}_\Sigma(X; x, y) = \{c \in \underline{\mathrm{Ch}}(X; x, y) \mid c \in \underline{\mathrm{Ch}}_\Sigma(X)\},$$

ou encore la fibre en (x, y) du foncteur source-but pour $\underline{\mathrm{Ch}}_\Sigma(X)$

$$\underline{\mathrm{Ch}}_\Sigma(X) \longrightarrow X \times X.$$

On définit une application canonique

$$\mathrm{Ch}_\Sigma(X, x, y) \longrightarrow \mathrm{Hom}_\Sigma(x, y),$$

en associant 'a tout chemin de x dans y le Σ-homomorphisme de x dans y obtenu en *inversant* (dans $X\Sigma^{-1}$) les tronçons rétrogrades (ce qui est possible, puisqu'ils sont dans Σ), de sorte qu'on trouve dans $X\Sigma^{-1}$ un 'chemin direct' [page 7]

$$x = A_{-n} \longrightarrow \cdots \longrightarrow A_{-1} \longrightarrow A_0 \longrightarrow A_1 \longrightarrow A_2 \cdots A_n = A_{n+1} = \cdots = y.$$

et on compose tous ces morphismes.

En fait, on trouve aussitôt que l'on définit ainsi un *foncteur*

$$\underline{\mathrm{Ch}}_\Sigma(X) \longrightarrow \underline{\mathrm{Fl}}(X\Sigma^{-1}),$$

[Fl catégorie des flèches] du fait que si on a un diagramme

$$\begin{array}{ccc} A_{i-1} & \xleftarrow{u_i} & A_i \\ \downarrow{\scriptstyle f_{i-1}} & & \downarrow{\scriptstyle f_i} \\ A'_{i-1} & \xleftarrow{u'_i} & A'_i \end{array} \qquad (i \text{ pair})$$

p. 6

avec u_i, u'_i dans Σ, ce diagramme, en tant que diagramme dans $X\Sigma^{-1}$, est commutatif avec flèches horizontales des *isomorphismes,* et reste donc commutatif en inversant lesdites flèches. D'où un foncteur induit

$$\underline{\mathrm{Ch}}_\Sigma(X; x, y) \longrightarrow \underline{\mathrm{Fl}}(\underbrace{X\Sigma^{-1}}_{X'}; x, y). \qquad \text{[page 8]}$$

Mais pour toute catégorie X', et des objets x, y dans X', la catégorie $\underline{\mathrm{Fl}}(X', x, y)$ est une catégorie *discrète,* ayant comme ensemble d'objets $\mathrm{Hom}_{X'}(x, y)$. Ainsi le foncteur précédant définit en fait une application canonique

$$\boxed{\pi_0 \underline{\mathrm{Ch}}_\Sigma(X; x, y) \longrightarrow \mathrm{Hom}_\Sigma(x, y).}$$

Je dis que cette application est toujours bijective. Pour le voir, nous allons *constuire* 'from scratch' la catégorie $X\Sigma^{-1}$, en prenant comme objets ceux de X, et en *définissant*

$$\boxed{\mathrm{Hom}_\Sigma(x, y) = \pi_0 \underline{\mathrm{Ch}}_\Sigma(X; x, y).}$$

Il faut donc définir la composition

$$\mathrm{Hom}_\Sigma(x, y) \times \mathrm{Hom}_\Sigma(y, z) \longrightarrow \mathrm{Hom}_\Sigma(x, z).$$

Pour ceci, on va définir des foncteurs 'composition de chemins'

$$\begin{aligned} \underline{\mathrm{Ch}}_m(X; x, y) \times \underline{\mathrm{Ch}}_n(X; y, z) &\longrightarrow \underline{\mathrm{Ch}}_{m+n}(X; x, z) \\ (c, c') &\longmapsto c' \circ c, \end{aligned}$$

mais en nous bornant pour simplifier au cas où m, n ont *la même parité,* de telle façon qu'en 'mettant bout à bout' c et c' (dans cet ordre), on trouve bien un chemin de type $n + m$.

Cette opération est 'transposée' du couple de foncteurs [page 9]

$$\begin{aligned} \Phi_n &\xrightarrow{\alpha} \Phi_{n+m} \quad i \longmapsto (i - m) \\ \Phi_m &\xrightarrow{\beta} \Phi_{n+m} \quad i \longmapsto (i + n), \end{aligned}$$

où on aura

$$\alpha(\{n\}) = \beta(\{-m\}) = n - m, \qquad \text{p. 7}$$

et on aura

$$\Phi_{n+m} \simeq \Phi_n \sqcup_e \Phi_m,$$

i.e. Φ_{n+m} est la 'somme amalgamée' dans (Cat), obtenue en 'recollant' Φ_n et Φ_m, par identification de l''élément but' de Φ_n avec l''élément source' de Φ_m. Le foncteur composition de chemins induit `[dans ce qui précède, à partir du début de la page 9, il faut inverser` m `et` n`]`

$$\underline{\mathrm{Ch}}_{m,\Sigma}(x, y) \times \underline{\mathrm{Ch}}_{n,\Sigma}(y, z) \longrightarrow \underline{\mathrm{Ch}}_{m+n,\Sigma}(x, z),$$

d'où en passant aux π_0

$$\mathrm{Hom}_{\Sigma,m}(x, y) \times \mathrm{Hom}_{\Sigma,n}(y, z) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\Sigma,m+n}(x, z),$$

où on dénote, pour $a, b \in \mathrm{Ob}\, X$, par

$$\mathrm{Hom}_{\Sigma,n}(a, b) \overset{\text{déf}}{=} \pi_0(\underline{\mathrm{Ch}}_{m,\Sigma}(a, b)).$$

`[plutôt` $\underline{\mathrm{Ch}}_{n,\Sigma}$`]`

Pour en déduire une application sur les $\varinjlim$

$$\underbrace{\mathrm{Hom}_\Sigma(x, y)}_{= \varinjlim \mathrm{Hom}_{\Sigma,m}(x,y)} \times \underbrace{\mathrm{Hom}_\Sigma(y, z)}_{= \varinjlim \mathrm{Hom}_{\Sigma,n}(y,z)} \longrightarrow \underbrace{\mathrm{Hom}_\Sigma(x, z)}_{= \varinjlim \mathrm{Hom}_{\Sigma,n+m}(x,z)} \qquad \text{[page 10]}$$

3. L'ensemble de ses objets est noté $\mathrm{Ch}(X)$. Ses éléments sont les Σ-chemins de x à y `[de` x `à` y`?]`.

il faut prouver, pour $n \leq n'$, $m \leq m'$, la commutativité dans

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_{\Sigma,m}(x,y) \times \mathrm{Hom}_{\Sigma,n}(y,z) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{\Sigma,m+n}(x,y) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Hom}_{\Sigma,m'}(x,y) \times \mathrm{Hom}_{\Sigma,n'}(y,z) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{\Sigma,m'+n'}(x,y) \end{array}$$

[plutôt $\mathrm{Hom}_{\Sigma,m+n}(x,z)$, $\mathrm{Hom}_{\Sigma,m'+n'}(x,z)$] En d'autres termes, que pour $c : x \longrightarrow y$ et $c' : y \longrightarrow z$ deux Σ-chemins composables de longueur m et n respectivement, le composé $c'c : x \longrightarrow z$ ne change pas, 'à homotopie près' dans $\underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma}(x,z)$, quand on remplace c, c' par des chemins $\bar{c}$, $\bar{c}'$ de longueur m', n' déduits de c et c' par 'dégénérescence aux bouts'.

Plus précisément,

$$\bar{c}'\bar{c} \sim \overline{c'c},$$

le chemin composé est homotope à celui déduit de $c'c$ par 'dégénérescence aux bouts'.

Je viens de regarder pour $n = m = 1$, $n' = m' = 2$, et de constater qu'il n'y a pas de flèche naturelle entre $\bar{c}'\bar{c}$ et $\overline{c'c}$ - l'homotopie cherchée doit se définir à l'aide d'un 'chemin' dans $\underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,m',n'}(X;x,z)$. Dans le cas général, on va en fait trouver une homotopie p. 8 [page 11]

$$h = h_{(n,m),(n',m')}$$

'rendant commutatif' le diagramme de foncteurs

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{A} = \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,m}(X;x,y) \times \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,n}(X;y,z) & \xrightarrow{*_{m,n}} & \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,m+n}(X;x,z) \\ \downarrow{\scriptstyle i_{m,m'} \times j_{n,n'}} & \overset{h}{\swarrow} & \downarrow{\scriptstyle k_{m+n,m'+n'}} \\ \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,m'}(X;x,y) \times \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,n'}(X;y,z) & \xrightarrow{*_{m',n'}} & \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,m'+n'}(X;x,z) = \mathcal{B}, \end{array}$$

où les $i_{\alpha,\beta}$, $j_{\alpha,\beta}$, $k_{\alpha,\beta}$ sont les foncteurs de transition

$$\underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,\alpha}(X;a,b) \longrightarrow \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,\beta}(X;a,b)$$

$(\alpha \leq \beta)$ pour les (x,y), (y,z) et (x,z) (en guise de (a,b)) respectivement. L'homotopie h sera un chemin dans la catégorie $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathcal{A},\mathcal{B})$, allant de

$$k_{m+n,m'+n'} \circ *_{m+n} \longrightarrow *_{m'+n'} \circ (i_{m,m'} \times j_{n,n'}).$$

L'existence d'une telle homotopie signifie ni plus ni moins que le diagramme carré ci-dessus est commutatif, en tant que diagramme dans la catégorie (Cat hot) des 'catégories à homotopie près,' dont les objets sont les (petites) catégories, et où on définit [page 12]

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Cat\,hot}}(\mathcal{A},\mathcal{B}) \overset{\text{déf}}{=} \underbrace{\pi_0(\underline{\mathrm{Hom}}(\mathcal{A},\mathcal{B}))}_{\substack{\text{classes d'homotopie} \\ \text{de foncteurs de } \mathcal{A} \\ \text{dans } \mathcal{B}}} .$$

C'est cette conclusion qui sera pour nous utile, et non la description explicite du chemin h. Cette existence admise (cf. ci-dessous la preuve), on voit donc que si on regarde, pour $a, b \in \mathrm{Ob}\, X$, le système des catégories $\underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,r}(X;a,b)$ $(r \in \mathbf{N})$ comme un *ind-objet de* Cat hot*,* qu'on désigne par

$$\underline{\mathrm{Ch}}^{\mathrm{ind}}_{\Sigma}(X;a,b) \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{Ind}(\mathrm{Cat\,hot}),$$

on aura un morphisme canonique dans Ind(Cat hot)

$$\underline{\mathrm{Ch}}^{\mathrm{ind}}_{\Sigma}(X;x,y) \times \underline{\mathrm{Ch}}^{\mathrm{ind}}_{\Sigma}(X;y,z) \xrightarrow{*} \underline{\mathrm{Ch}}^{\mathrm{ind}}_{\Sigma}(X;x,z),$$

appelé *'ind-morphisme de composition de chemins.'* On aurait aimé le déduire d'un honnête *foncteur* 'composition de chemins'

$$\underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma}(X;x,y) \times \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma}(X;y,z) \xrightarrow{?} \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma}(X;x,z),$$
$$\text{qu'on noterait } (c,c') \longmapsto c' \circ c \text{ ou } c' \cdot c,$$

mais je doute qu'un tel foncteur existe,

qui par passage aux ind-objets redonne le morphisme précédent, ou, ce qui revient au même, tel que pour tout $m, n \in \mathbf{N}$ (de même parité), il existe un $N \geq m+n$ assez grand tel que l'on ait un diagramme

p. 9
[page 13]

$$\begin{array}{ccc}
\underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,m}(X;x,y) \times \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,n}(X;y,z) & \xrightarrow{*_{m,n}} & \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,m+n}(X;x,z) \\
\downarrow & \searrow & \downarrow \\
 & & \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,N}(X;x,z) \\
 & & \downarrow \\
\underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma}(X;x,y) \times \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma}(X;y,z) & \xrightarrow{?} & \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma}(X;x,z)
\end{array}$$

et où le triangle supérieur est *commutatif dans* Cat hot. (Il faut supposer que pour N assez grand, le composé $\downarrow \xrightarrow{?}$ se factorise par $\underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,N}(X;x,z)$ …) Pour voir que les foncteurs composition $*_{m,n}$ définissent un homomorphisme des ind-objets dans (Cat hot), il suffit de le prouver dans les cas particuliers $(m',n') = (m+1, n+1)$. On va faire la figure en supposant m, n *impairs.*

Je m'aperçois ici que je me suis canulé stupidement, la composition de deux chemins de longueur *impaire* m, n *n'est*

pas un chemin de longueur $m+n$, i.e. un diagramme de type Φ_n, mais un diagramme de type *dual* $\Phi_n^o = \Psi_n$. Par exemple, pour $m = n = 1$

[page 14]

$$\underbrace{A_0 \longleftarrow A_1 \longrightarrow A_2}_{c} = \underbrace{B_0 \longleftarrow B_1 \longrightarrow B_2}_{c'}$$

est de type Φ_2^o ! Donc pour ne pas trop compliquer la vie, on va dans les développements précédents se borner à m, n *pairs,* donc des chemins de longueur au moins 4. C'est un peu ridicule ! On est ramené à prouver la commutativité à homotopie près dans le cas où on laisse c' fixé et où on envoie $\underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,m}(X;x,y)$ dans $\underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,m+2}(X;x,y)$, ou inversement c fixe et $\underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,n}(X;y,z)$ dans $\underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,n+2}$ `[lire:`$\underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,n+2}(X;y,z)$`]`. Prenons le premier cas, et notons un chemin c sans indices négatifs (ce n'est pas une notation bien heureuse !)

$$A_0 \longrightarrow A_1 \longleftarrow A_2 \cdots \longleftarrow A_{2m}$$

(NB à cause de la condition n pair, tous nos chemins commencent désormais par une flèche de A_0 dans A_1, jamais en sens inverse).

Je vois que l'explicitation de l'homotopie, sans offrir de difficulté, est très fastidieuse à expliquer. Je vais essayer de donner une démonstration conceptuelle, sans 'calcul' fastidieux.

Les deux foncteurs composés

p. 10
[page 15]

$$f = k \circ *_{m,n}\ , \quad g = *_{m',n'} \circ (i \times j)$$

dans le carré page 11, dont il faut prouver qu'ils sont homotopes dans $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathcal{A},\mathcal{B})$, peuvent être vus comme obtenus de la façon suivante, en termes de deux foncteurs

$$\varphi,\psi : \Phi_{m'+n'} \rightrightarrows \Phi_{m+n}, \tag{1}$$

d'où deux foncteurs 'transposés'

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\Phi_{m,n},X) \underset{G}{\overset{F}{\rightrightarrows}} \underline{\mathrm{Hom}}(\Phi_{m',n'},X) \tag{2}$$

[plutôt Φ_{m+n}, $\Phi_{m'+n'}$] lesquels foncteurs 'induisent' f et g. De façon précise, désignant par a, b les objets source et but de Φ_{m+n}, par c l'objet qui correspond au but du chemin c de longueur m [trop de c's], à la source du chemin c' de longueur n qu'il s'agit de composer, enfin par a_0, b_0 les éléments source et but de $\Phi_{m'+n'}$, les foncteurs envisagés (1) appliquent a_0 dans a, b_0 dans b, donc définissent un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \Phi_{m'+n'} & \overset{\varphi}{\underset{\psi}{\rightrightarrows}} & \Phi_{m+n} \\ {\scriptstyle\alpha'}\uparrow & \nearrow_{\alpha} & \\ \varepsilon = \{a_0,b_0\}. & & \\ \text{catégorie discrète} & & \end{array} \tag{3}$$

Ceci dit, la catégorie but $\mathcal{B}$ pour f, g, à savoir $\underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,m'+n'}(X;x,z)$, s'interprète comme la sous-catégorie pleine de $\underline{\mathrm{Hom}}(\Phi_{m+n},X)$ formée

des foncteurs $c' : \Phi_{m'+n'} \longrightarrow X$ dont le composé avec α' est le foncteur

[page 16]

$$\beta : \varepsilon \longrightarrow X \qquad \begin{array}{l} a_0 \longrightarrow x \\ b_0 \longrightarrow z, \end{array} \tag{$*$}$$

et de même la catégorie source $\mathcal{A}$ s'interprète comme la sous-catégorie pleine de $\underline{\mathrm{Hom}}(\Phi_{m+n},X)$ formée des $c : \Phi_{m+n} \longrightarrow X$ dont la restriction à $\{a,b,c\}$ est le foncteur

$$a \longrightarrow x,\ b \longrightarrow y,\ c \longrightarrow z.$$

[plutôt $b \longrightarrow z$, $c \longrightarrow y$] Elle est contenue dans la sous-catégorie pleine $\mathcal{A}'$ des foncteurs dont la restriction à $\{a,b\}$ soit $a \longrightarrow x,\ b \longrightarrow z$, i.e. dont le composé avec α soit le foncteur $\beta : \varepsilon \longrightarrow X$ déjà envisagé ci-dessus. Ainsi les foncteurs $f,g : \mathcal{A} \rightrightarrows \mathcal{B}$ se factorisent par $\mathcal{A}'$

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{A} & \hookrightarrow & \mathcal{A}' \\ & {\scriptstyle g}\searrow \quad \overset{f}{\underset{g'}{\rightrightarrows}} & \Big\downarrow f' \\ & & \mathcal{B}, \end{array}$$

p. 11

foncteurs déduits de φ, ψ ci-dessus, donnant lieu aux triangles commutatifs (3), et du foncteur $\beta : \varepsilon \longrightarrow X$, de la façon dite. Pour prouver que f et g sont homotopes, il suffit de le prouver pour f', g'. Et pour ceci, il suffit de montrer que φ et ψ sont homotopes en tant qu'objets de la catégorie $\underline{\mathrm{Hom}}(\Phi_{m+n},\Phi_{m'+n'};\alpha)$ formée des foncteurs dont la restriction à ε est α [plutôt de la catégorie $\underline{\mathrm{Hom}}(\Phi_{m'+n'},\Phi_{m+n};\alpha')$ formée des foncteurs dont la restriction à ε est α'].

D'ailleurs, les deux assertions (sur f', g', quels que soient X, x, y, z, [plutôt x, z] et sur φ, ψ, α [plutôt α']) sont en fait équivalentes comme on voit en faisant $X = \Phi_{m+n}$, $x = a$, $y = c$, $z = b$ [plutôt $x = a$, $z = b$]. Ceci sera contenu dans le lemme plus général. ([4])

[page 17]

4. Dans les considérations qui suivent, on considère en fait tacitement que les foncteurs envisagés sont *croissants* sur les sommets pour l'ordre de leur numérotation. Donc il faudrait écrire $\underline{\mathrm{Hom}}_{cr}$ au lieu de $\underline{\mathrm{Hom}}$, dans les énoncés qui suivent, y compris dans le lemme de connexité ci-contre.

Lemme. *Soient k et l deux entiers. Alors la sous-catégorie pleine de* $\underline{\mathrm{Hom}}(\Phi_k, \Phi_l)$ *formée des foncteurs $\Phi_k \longrightarrow \Phi_l$ appliquant source en source, but en but, est connexe.* (NB Elle est non vide si et seulement si $k \geq l$.)

On va décrire entièrement ces foncteurs (= applications croissantes) $\Phi_k \xrightarrow{\varphi} \Phi_l$, en identifiant $\mathrm{Fl}(\Phi_k)$ `[plutôt l'ensemble des flèches non identiques de` Φ_k`]` à l'intervalle d'entiers $[1, 2k]$, et en associant à φ la partie

$$E_\varphi \subset \mathrm{Fl}(\Phi_k) = [1, 2k] \qquad E_\varphi = \{u \in \mathrm{Fl}(\Phi_k) \mid \varphi(u) \text{ une identité}\}$$

formée des $u \in \mathrm{Fl}(\Phi_k)$ qui sont 'contractées' par φ en une identité. Si E est un ensemble d'entiers, on y introduit la notion de composantes connexes (par la relation d'équivalence dans E engendrée par la relation de succession $y = x + 1$). On voit aussitôt que les composantes connnexes de E_φ qui ne contiennent ni la première ni la dernière flèche de Φ_k sont paires, et que

$$\underbrace{\mathrm{cardFl}(\Phi_k)}_{2k} = \mathrm{card}\,(E_\varphi) + \underbrace{\mathrm{cardFl}(\Phi_l)}_{2l},$$

i.e. [page 18]

$$\mathrm{card}\,(E_\varphi) = 2(k - l).$$

Il est immédiat qu'un foncteur φ est surjectif sur les objets et sur les flèches, donc identifie Φ_l à une catégorie quotient de Φ_k - et la relation d'équivalence dans Φ_k définie par φ est celle obtenue en identifiant tous les objets qui sont source ou but de flèches d'une même composante connexe I de E_φ p. 12

$$\cdots \longleftarrow \underbrace{\longrightarrow \longleftarrow \longrightarrow \longleftarrow}_{I} \longrightarrow \cdots$$

et les flèches dans cette composante à l'identité correspondante. Les conditions énoncées sur E (indépendamment d'un φ qui lui donnerait naissance assurent que la catégorie quotient est isomorphe (avec *préservation* de source et de but) soit à Φ_l, soit à la duale $\Psi_l = \Phi_l^o$, suivant la direction de la première flèche de $\bar{\Phi}_k$ (quotient de Φ_k). Cette 'direction initiale' est la même que celle pour Φ_k si la première flèche de Φ_k n'appartient pas à E, ou bien si elle y appartient et sa composante connexe dans E est de cardinal pair. Dans le cas inverse ($u \in E$ et sa composante connnexe dans E est de cardinal impair), la direction initiale de $\bar{\Phi}_k$ est opposée à celle de Φ_k.

On voit donc que E doit satisfaire encore à une condition supplémentaire, pour que le $\bar{\Phi}_k$ correspondant soit isomorphe à Φ_l, i.e. pour que E provienne d'un foncteur φ. Je résume toutes les conditions [page 19]

a) $\mathrm{card}E = 2(k - l)$.

b) Les composantes connexes de E qui ne contiennent pas de flèche initiale ou finale sont de cardinal pair.

c) Si Φ_k et Φ_l ont même direction initiale (k et l de même parité), alors l'éventuelle composante de E contenant la flèche initiale doit être elle aussi de cardinal pair (ce qui, à cause de a) `[plutôt a) et b)]`, équivaut à la même condition pour l'éventuelle composante connexe contenant la flèche finale de Φ_k). Si Φ_k et Φ_l ont des directions initiales différentes, il faut que la flèche initiale de Φ_k appartienne à une composante connexe de cardinal *impair* de E (ce qui équivaut à itou pour la flèche finale).

D'autre part, le foncteur φ est uniquement déterminé par la connaissance de E, car il y a un *unique* isomorphisme $\bar{\Phi}_k \xrightarrow{\sim} \Phi_l$ compatible avec sources et buts, à cause du

Lemme (immédiat) : *Un automorphisme de Φ_l qui est l'identité sur l'objet source (ou sur l'objet but) est l'identité partout.*

Les foncteurs φ, ψ de tantôt correspondaient au choix, l'un de $E_\varphi = \{1, 2, k-1, k\}$ [plutôt $E_\varphi = \{1, 2, 2k-1, 2k\}$], l'autre de $E_\psi = \{1, 2, i, i+1\}$, 2 composantes connexes dans un cas, trois [plutôt deux] dans l'autre.) [page 20]

Dans le cas général, il y a lieu d'expliciter la relation d'ordre de l'ensemble $\underline{\mathrm{Hom}}^!(\Phi_k, \Phi_l)$ (! signifie : compatible avec source et but), en termes des ensembles représentatifs E_φ, E_ψ. Je ne vais pas expliciter cette relation d'ordre, mais seulement une propriété de celle-ci qui nous sera suffisante. Soit φ_E le foncteur défini par une partie $E \subset [1, 2k]$. Tout d'abord : p. 13

Lemme 1 (immédiat) : *Soient $E, E' \subset [1, 2k]$ admissibles, et soit $j \in [1, 2k]$ tel que $E \cap [1, j] = E' \cap [1, j]$. Alors φ_E et $\varphi_{E'}$ coïncident sur le but de u_j (j une flèche de Φ_k) et sur tous les objets de Φ_k antérieurs à celle-ci (au sens de la numérotation des objets, et non de la relation d'ordre de la catégorie Φ_k bien sûr.) Dualement, si $E \cap [j, 2k] = E' \cap [j, 2k]$, alors φ_E et $\varphi_{E'}$ coïncident sur la source de y, et sur tous les objets de Φ_k postérieurs à celui-ci.*

Considérons maintenant une partie connexe I de E (pas forcément une composante connexe), $I = [r, s] \subset [1, 2k]$ (r le plus petit élément de I, s son plus grand élément) et supposons que

a) card$I$ est pair (i.e. $s - r$ est pair) [plutôt $s - r$ impair]

b) $r \neq 1$, et $r - 1 \notin E$ (i.e. $r - 1 \in [1, 2k] \backslash E$)

et soit

$$E' = (E \backslash \{s\}) \cup \{r-1\} = E \backslash I \cup \overbrace{[r-1, s-1]}^{I'}$$

déduit de I en 'translatant' sur la gauche d'un cran.

Il est immédiat que si E est admissible, E' aussi (et inversement). Ceci dit, on a le [page 21]

Lemme 2. *E et E' étant comme ci-dessus, il existe une homomorphisme de foncteurs entre φ_E et $\varphi_{E'}$* (je ne dis pas dans quel sens va la flèche !).

Corollaire. Énoncé dual, quand E' est déduit de E en translatant à droite d'un cran un intervalle connexe de longueur paire $I = [r, s]$ de E, $s \neq 2k$ et $s + 1 \notin E$.

En effet, dans ce cas E est déduit de E' par une opération du type explicité dans le lemme 2.

La connexité de la catégorie $\underline{\mathrm{Hom}}^!(\Phi_k, \Phi_l)$ est maintenant claire. Si k et l ont même parité, en poussant les composantes connexes de E vers la gauche, on écrit E sous la forme 'normale'

$$E_0 = [1, 2(k-l)].$$

Si k et l sont de parité inverse, on ne peut pousser toute la composante connexe de E qui contient l'élément dernier $2k$, car elle est de cardinal impair. Il faut laisser $2k$ dans E et pousser le reste, et on ramène E à la forme normale

$$E_0 = [1, 2(k-l) - 1] \cup \{2k\}.$$

cqfd !

Ce qui précède justifie notre raisonnement, qui donnait par composition des chemins p. 14 des applications de composition bien définies

$$\underbrace{\mathrm{Hom}_\Sigma(x, y)}_{=\pi_0 \underline{\mathrm{Ch}}_\Sigma(x,y)} \times \underbrace{\mathrm{Hom}_\Sigma(y, z)}_{=\pi_0 \underline{\mathrm{Ch}}_\Sigma(y,z)} \longrightarrow \underbrace{\mathrm{Hom}_\Sigma(x, z)}_{=\pi_0 \underline{\mathrm{Ch}}_\Sigma(x,z)}.$$ [page 22]

Je dis que cette composition est associative. Ceci résulte du fait que si on a trois chemins (d'indices *pairs* !)

$$x \xrightarrow{c} y \xrightarrow{c'} z \xrightarrow{c''} t,$$

on a (sans avoir à effectuer des homotopies …) associativité stricte

$$c''(c'c) = (c''c')c.$$

Je dis qu'il y a des identités. On définit

$$1_x \in \mathrm{Hom}_\Sigma(x, x)$$

par le chemin d'indice 0 (qui est pair !), i.e. par le diagramme réduit à x, sans flèche (ou si on veut interpréter le diagramme comme un foncteur $e \longrightarrow X$, il y a la flèche identique sous-entendue). Nos raisonnements n'excluaient pas le cas $n = 0$ ou $m = 0$, et il est tautologique que pour un chemin

$$x \xrightarrow{c} y$$

on a

$$c \cdot 1_x = 1_y \cdot c = c.$$

Donc on a bien défini une catégorie, que je vais appeler X_Σ. Ja vais définir un foncteur canonique

$$\theta : X \longrightarrow X_\Sigma$$

qui sera l'identité sur les objets, il faut le définir sur les flèches

$$\mathrm{Hom}_X(x, y) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{X_\Sigma}(x, y) = \pi_0 \mathrm{Ch}_\Sigma(x, y)$$

`[plutôt` $\pi_0 \underline{\mathrm{Ch}}_\Sigma(x, y)$`]`. Malheureusement, une flèche

$$x \xrightarrow{u} y$$

ne peut s'interpréter directement comme un chemin à notre sens, il faut payer nos fuites ! `[page 23]`
Mais on va à une telle flèche associer le chemin

$$x \longrightarrow y \xleftarrow{\mathrm{id}} y \xrightarrow{\mathrm{id}} y \xleftarrow{\mathrm{id}} y,$$

élément de $\underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,2}(x, y)$, ce qui définit l'application cherchée. Il faut vérifier la compatibi- p. 15
lité avec les identités et sous la composition. À la flèche $1_x : x \longrightarrow x$ est associé l'élément de $\Phi_2(x, x)$

$$x \xrightarrow{\mathrm{id}} x \xleftarrow{\mathrm{id}} x \xrightarrow{\mathrm{id}} x \xleftarrow{\mathrm{id}} x,$$

il faut prouver que dans $\pi_0(\underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,2}(x, x))$ il devient égal à l'élément déduit de $1_x \in \Phi_{\Sigma,0}(x, x)$, par le foncteur de transition. Mais cet élément n'est autre justement que

$$x \xrightarrow{\mathrm{id}} x \xleftarrow{\mathrm{id}} x \xrightarrow{\mathrm{id}} x \xleftarrow{\mathrm{id}} x,$$

c'est le même (sans avoir même à passer au π_0) !

Pour la compatibilité avec la composition

$$x \xrightarrow{u} y \xrightarrow{v} z,$$

on a d'une part

$$x \xrightarrow{vu} z \xleftarrow{\mathrm{id}} z \xrightarrow{\mathrm{id}} z \xleftarrow{\mathrm{id}} z, \qquad \texttt{[page 24]}$$

d'autre part

$$x \xrightarrow{u} y \xleftarrow{\mathrm{id}} y \xrightarrow{\mathrm{id}} y \xleftarrow{\mathrm{id}} y \xrightarrow{v} z \xleftarrow{\mathrm{id}} z \xrightarrow{\mathrm{id}} z \xleftarrow{\mathrm{id}} z.$$

On complète le premier chemin par dégénérescence aux deux bouts, pour le comparer au deuxième en tant qu'élément de $\underline{\mathrm{Ch}}_4(x,z)$,

$$x \xrightarrow{\mathrm{id}} x \xleftarrow{\mathrm{id}} x \xrightarrow{vu} z \xleftarrow{\mathrm{id}} z \xrightarrow{\mathrm{id}} z \xleftarrow{\mathrm{id}} z \xrightarrow{\mathrm{id}} z \xleftarrow{\mathrm{id}} z.$$

Il faut prouver que les deux sont homotopes. On a donc deux foncteurs

$$f,g : \underbrace{\overbrace{\underline{\mathrm{Fl}}(X;x,y)}^{\text{catégorie discrète}} \times \overbrace{\underline{\mathrm{Fl}}(X;y,z)}^{\text{catégorie discrète}}}_{\mathcal{A}} \underset{g}{\overset{f}{\rightrightarrows}} \underbrace{\underline{\mathrm{Ch}}_{4,\Sigma}(X;x,z)}_{\mathcal{B}}, \qquad (*)$$

on veut prouver qu'ils sont homotopes. Pour ceci, on les regarde (comme tantôt) comme 'transposés' des deux foncteurs

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{\Delta}_1 \sqcup \mathbf{\Delta}_1 \simeq \mathbf{\Delta}_2 & \underset{\psi}{\overset{\varphi}{\leftleftarrows}} & \Phi_4 \\ & \overset{\alpha}{\nwarrow} & \uparrow{\scriptstyle \alpha'} \\ & & \varepsilon, \end{array}$$

vu que les catégories $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$ des deux membres de (*) s'interprètent comme des sous-catégories pleines de $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{\Delta}_2, X)$ et $\underline{\mathrm{Hom}}(\Phi_4, X)$ respectivement ; à savoir les sous-catégories pleines formées des foncteurs dont le composé avec α resp. α' est donné par x et par z, et de plus (pour $\mathcal{A}$) dont la valeur en l'objet médian de $\mathbf{\Delta}_2$ soit y. On peut encore remplacer $\mathcal{A}$ par la sous-catégorie pleine plus grande $\mathcal{A}'$ de $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{\Delta}_2, X)$, obtenue en ignorant cette dernière condition, et il suffit de prouver que les deux foncteurs 'plus gros' p. 16

$$\mathcal{A}' \underset{g'}{\overset{f'}{\rightrightarrows}} \mathcal{B}'$$

sont homotopes. Et pour ceci, il suffit de voir encore que φ et ψ sont homotopes dans [page 25] la catégories des foncteurs $\Phi_4 \longrightarrow \mathbf{\Delta}_2$ qui sont compatibles avec la source, et le but. On voit donc que notre lemme d'homotopie de tantôt n'était pas assez général. Il faudrait définir les *catégories intervalles généralisés,* de longueur n quelconque (n = nombre de flèches bout à bout), une catégorie intervalle généralisé *standard* de longueur n a pour ensemble d'objets l'intervalle d'entiers

$$[0,n],$$

et pour tout couple d'entiers consécutifs $i-1$, i parmi les objets ($1 \leq i \leq n$), il y a exactement une flèche qui relie i, $i+1$ `[plutôt` $i-1$`,` i`]`. On affecte l'intervalle $[i,i+1]$ du signe + si $i \longrightarrow i+1$ (flèche en sens direct), du signe i `[plutôt −]` si $i \longleftarrow i+1$ (flèche en sens rétrograde) - donc les catégories standards sont définies, pour n fixé, par un système de signes + ou −, dont on affecte les n 'tronçons' consécutifs $A_i := [i-1,i]$ ($1 \leq i \leq n$) de l'intervalle d'entiers $[0,n]$. Il y en a donc exactement 2^n.

On s'attend à ce que l'énoncé suivant soit vrai :

Lemme. *Soient I, I' deux intervalles généralisés, munis d'objets source et objet but (de sorte que I, I' soient* canoniquement *isomorphes aux intervalles genéralisés standards correspondants). Soit* $\underline{\mathrm{Hom}}^!(I,I')$ *la catégorie des foncteurs de I dans I', compatibles* [page 26] *avec source et but. Si cette catégorie est $\neq \emptyset$, elle est* 0*-connexe* (et, je présume, même contractile ?).

Je vais admettre provisoirement qu'il en est ainsi, du moins dans le cas particulier de Φ_4 (intervalle généralisé de longueur 8) et $\mathbf{\Delta}_2$. Cela donne donc un foncteur

$$\theta : X \longrightarrow X_\Sigma.$$

On a gagné, car la propriété universelle de ce foncteur est pratiquement évidente. Mais j'ai oublié de vérifier que θ transforme éléments de Σ en flèches inversibles. Soit donc

$$x \xrightarrow{u} y$$

avec $u \in \Sigma$, on va définir un chemin en sens inverse

$$y \xrightarrow{c} x$$

qui définira dans X_Σ une flèche inverse de u. L'idée naturelle est de prendre le 'chemin'

$$y \xleftarrow{u} x$$

de y dans x, mais ce n'est pas un chemin au sens de nos définitions, on va le compléter en

p. 17

$$c : y \xrightarrow{\mathrm{id}} y \xleftarrow{u} x \xrightarrow{\mathrm{id}} x \xleftarrow{\mathrm{id}} x.$$

Je dis que c fait l'affaire. On doit prouver deux relations d'homotopie, de $c \cdot \bar{u}$ et de $\bar{u} \cdot c$ avec les chemins identiques en x `[resp. en` y`]` de longueur 8 (indice 4, i.e. dans $\underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,4}(X; x, x)$ resp. $\underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,4}(X; y, y)$), où $\bar{u}$ est le chemin associé à u

`[page 27]`

$$x \xrightarrow{u} y \xleftarrow{\mathrm{id}} y \xrightarrow{\mathrm{id}} y \xleftarrow{\mathrm{id}} y.$$

On a donc à regarder

$$x \xrightarrow{u} y \xleftarrow{\mathrm{id}} y \xrightarrow{\mathrm{id}} y \xleftarrow{\mathrm{id}} y \xrightarrow{\mathrm{id}} y \xleftarrow{u} x \xrightarrow{\mathrm{id}} x \xleftarrow{\mathrm{id}} x$$

et voir qu'il est homotope au chemin trivial

$$x \xrightarrow{\mathrm{id}} x \xleftarrow{\mathrm{id}} \cdots x \xrightarrow{\mathrm{id}} x \xleftarrow{\mathrm{id}} x$$

(des identités partout), et itou pour

$$y \xrightarrow{\mathrm{id}} y \xleftarrow{u} x \xrightarrow{\mathrm{id}} x \xleftarrow{\mathrm{id}} x \xrightarrow{u} y \xleftarrow{\mathrm{id}} y \xrightarrow{\mathrm{id}} y \xleftarrow{\mathrm{id}} y$$

et le chemin trivial en y. Cette fois, on a encore deux foncteurs

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{\Delta}_1 & \overset{\varphi}{\underset{\psi}{\rightleftarrows}} & \Phi_4 \\ & \overset{\alpha'}{\nwarrow} & \uparrow{\scriptstyle \alpha} \\ & & \varepsilon, \end{array}$$

compatibles avec objets sources et objets buts, et on doit prouver qu'ils sont homotopes dans $\underline{\mathrm{Hom}}^!(\Phi_4, \mathbf{\Delta}_1)$. Cela doit donc résulter du même lemme général. On a gagné - par une interprétation simple de $X\Sigma^{-1}$, et en particulier des $\mathrm{Hom}_{X\Sigma^{-1}}(x, y)$ et de leur composition, en termes de la géométrie des espaces de chemins :

$$\begin{cases} \mathrm{Hom}_{X\Sigma^{-1}} \simeq \pi_0(\underline{\mathrm{Ch}}_\Sigma(X; x, y)) \\ \text{Composition des homomorphismes dans } X\Sigma^{-1} \text{ correspond à} \\ \text{la composition des } \Sigma\text{-chemins dans } X \end{cases}$$

p. 18

`[page 28]`

3 Passage aux catégories de diagrammes

Nous aurions dû noter la catégorie $X\ \mathcal{M}$, car par la suite elle jouera le rôle d'une 'catégorie de modèles'. On désignera par contre par X les 'catégories d'indices' sur lesquelles on veut construire les 'catégories de diagrammes' de type X

$$\mathcal{M}(X) = \underline{\mathrm{Hom}}(X, \mathcal{M}).$$

On se donne donc

$$\underbrace{\Sigma}_{\text{quasi-isomorphismes}} \subseteq \mathrm{Fl}(\mathcal{M}), \qquad \Sigma \supset \text{ensemble des flèches identiques},$$

et pour toute catégorie X on définit

$$\Sigma_X \subset \mathrm{Fl}\,\mathcal{M}(X)$$

ainsi : si $F, G \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}(X)$ $(F, G : X \rightrightarrows \mathcal{M})$, une flèche $u : F \longrightarrow G$ (homomorphisme de foncteurs) est dans Σ_X si et seulement si $\forall x \in X$, $u(x) : F(x) \longrightarrow G(x)$ est dans Σ ('critère de quasi-isomorphie fibre par fibre', pour l'homomophisme entre les copréfaisceaux F, G envisagés).

Soient

$$a, b \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$$

et considérons les foncteurs constants correspondants sur X

$$a_X, b_X \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}(X).$$

On se propose d'appliquer la théorie du §2 au 'calcul' de [page 29]

$$\mathrm{Hom}_{\Sigma_X}(a_X, b_X),$$

on a donc une bijection canonique

$$\boxed{\mathrm{Hom}_{\Sigma_X}(a_X, b_X) \simeq \pi_0 \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma_X}(\mathcal{M}(X); a_x, b_x).}$$

On se propose d'expliciter la catégorie de chemins du second membre. On a, abstraction faite des données de Σ, a, b dans $\mathcal{M}$, l'expression pour la catégorie de *tous* les chemins dans $\mathcal{M}(X)$ p. 19

$$\begin{aligned}
\underline{\mathrm{Ch}}(\mathcal{M}(X)) &\simeq \underline{\mathrm{Hom}}\Big(\underbrace{\mathbf{\Phi}}_{\substack{\text{pro-catégorie}\\(\Phi_n)_{n\in\mathbf{N}}}}, \underbrace{\mathcal{M}(X)}_{\underline{\mathrm{Hom}}(X,M)}\Big) \\
&\overset{\text{déf}}{=} \varinjlim_n \underline{\mathrm{Hom}}(\Phi_n, \mathcal{M}(X)) \\
&\simeq \varinjlim_n \underline{\mathrm{Hom}}(\Phi_n \times X, \mathcal{M}) \\
&\simeq \varinjlim_n \underline{\mathrm{Hom}}(X, \underline{\mathrm{Hom}}(\Phi_n, \mathcal{M})) \\
&\overset{\text{déf}}{=} \varinjlim_n \underline{\mathrm{Hom}}(X, \underline{\mathrm{Ch}}_n(\mathcal{M})) \\
&\simeq \underline{\mathrm{Hom}}^!(X, \underline{\mathrm{Ch}}(\mathcal{M})),
\end{aligned}$$

où le signe ! signifie qu'on prend la sous-catégorie pleine des foncteurs

$$X \longrightarrow \underline{\mathrm{Ch}}(\mathcal{M}), \qquad \text{[page 30]}$$

qui se factorisent par une des sous-catégories pleines $\underline{\mathrm{Ch}}_n(\mathcal{M})$. On peut dire aussi que si on considère le système inductif des catégories $\underline{\mathrm{Ch}}_n(\mathcal{M})$ comme un ind-objet de Cat, qu'on va noter

$$\underline{\underline{\mathrm{Ch}}}(\mathcal{M}) \qquad\qquad \text{ind-objet de Cat,}$$

on a

$$\underline{\mathrm{Ch}}(\mathcal{M}(X)) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}(X, \underline{\underline{\mathrm{Ch}}}(\mathcal{M})).$$

Si on en vient à Σ, Σ_X, on trouve aussitôt qu'un chemin dans $\mathcal{M}(X)$ est un Σ_X-chemin, si et seulement si le foncteur correspondant $X \longrightarrow \underline{\mathrm{Ch}}(\mathcal{M})$ se factorise par $\underline{\mathrm{Ch}}_\Sigma(\mathcal{M})$. Ainsi on trouve

$$\underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma_X}(\mathcal{M}(X)) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}^!(X, \underline{\mathrm{Ch}}_\Sigma(\mathcal{M})),$$

où le signe ! a le même sens que plus haut. Si on introduit le ind-objet $\underline{\underline{\mathrm{Ch}}}_\Sigma(\mathcal{M})$ défini par les $\underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,n}(\mathcal{M})$, on trouve donc aussi

$$\underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma_X}(\mathcal{M}(X)) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}(X, \underline{\underline{\mathrm{Ch}}}_\Sigma(\mathcal{M})).$$

Soit c un chemin dans $\mathcal{M}(X)$, et [page 31]

$$X \longrightarrow \underline{\mathrm{Ch}}(\mathcal{M})$$

le foncteur qu'il définit, composons-le avec les foncteurs source-but

$$\underline{\mathrm{Ch}}(\mathcal{M}) \longrightarrow \mathcal{M} \times \mathcal{M},$$

on trouve un foncteur

$$X \longrightarrow \mathcal{M} \times \mathcal{M},$$

i.e. un objet (F_0, F_1) de $\mathcal{M}(X) \times \mathcal{M}(X)$. Je dis que F_0 et F_1 sont respectivement la source et le but du chemin c. De façon un peu plus précise, on a commutativité (stricte) dans le diagramme de foncteurs p. 20

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma_X}(\mathcal{M}(X)) & \xrightarrow{\sim} & \underline{\mathrm{Hom}}^!(X, \underline{\mathrm{Ch}}_\Sigma(\mathcal{M})) \\ \downarrow{\scriptstyle \sigma_{\mathcal{M}(X)}, \beta_{\mathcal{M}(X)}} & & \downarrow{\scriptstyle \text{déduit de } \sigma_{\mathcal{M}}, \beta_{\mathcal{M}}} \\ \mathcal{M}(X) \times \mathcal{M}(X) & \xrightarrow{\sim} & \underline{\mathrm{Hom}}(X, \mathcal{M} \times \mathcal{M}), \end{array}$$

où les foncteurs σ sont les foncteurs source, les foncteurs β les foncteurs but.

Si on se donne arbitrairement les objets F_0, F_1 dans $\mathcal{M}(X)$, donc un foncteur

$$X \longrightarrow \mathcal{M} \times \mathcal{M},$$

$\underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma_X}(F_0, F_1)$ s'identifie donc à la catégorie des foncteurs 'admissibles' (i.e. se factorisant par un $\underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,n}(\mathcal{M})$) $X \xrightarrow{C} \underline{\mathrm{Ch}}_\Sigma(\mathcal{M})$ qui *relèvent* le foncteur $(\sigma_{\mathcal{M}}, \beta_{\mathcal{M}})$ [plutôt (F_0, F_1)] [page 32 vide] précédent, i.e. qui donnent lieu à un triangle commutatif (strict) [page 33]

$$\begin{array}{ccc} & & \underline{\mathrm{Ch}}_\Sigma(\mathcal{M}) \\ & \overset{C}{\nearrow} & \downarrow{\scriptstyle (\sigma_{\mathcal{M}}, \beta_{\mathcal{M}})} \\ X & \xrightarrow[(F_0, F_1)]{} & \mathcal{M} \times \mathcal{M}. \end{array}$$

Mais si les foncteurs F_0, F_1 sont constants, de valeur a, b comme tantôt, i.e. (F_0, F_1) constant de valeur (a, b), alors la catégorie des foncteurs C en question est tautologiquement isomorphe à celle des foncteurs de X dans la fibre de $(\sigma_{\mathcal{M}}, \beta_{\mathcal{M}})$ en (a, b), d'où l'isomorphisme de catégories fondamental

$$\boxed{\underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma_X}(X; a_X, b_X) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}^!(X, \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma}(\mathcal{M}; a, b)).}$$

On va expliciter le contenu essentiel de cette formule en une

Scholie. Soient $\mathcal{M}$ une catégorie avec un ensemble Σ de flèches de localisation, $a, b \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$. Alors on peut trouver un objet $\underline{\underline{K}} = K(a, b)$, $K = (K_n)$, de $\mathrm{Ind}\,\mathrm{Cat}$ (indexé par $\mathbf{N}$ mais peu importe ce fait), et un isomorphisme canonique pour toute catégorie X (isomorphisme fonctoriel en X)

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{\Sigma_X}(a_X, b_X) &\simeq \pi_0(\underline{\mathrm{Hom}}(X, \underline{\underline{K}})) \\ &\overset{\text{déf}}{=} \pi_0(\varinjlim \underline{\mathrm{Hom}}(X, K_n)) \\ &\simeq \varinjlim \pi_0(\underline{\mathrm{Hom}}(X, K_n)). \end{aligned}$$

Je vais épiloguer sur ce résultat, sans me soucier pour l'instant de la façon particulière dont la ind-catégorie K [plutôt $\underline{\underline{K}}$] a été obtenue en termes de $\mathcal{M}$, Σ, a, b. p. 21 [page 34]

Comme les $\pi_0\underline{\mathrm{Hom}}(X, K_n) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Cat\,hot}}(X, K_n)$ ne dépendent que de X et de K_n en tant qu'objets de Cat hot, je vais interpréter $\underline{\underline{K}}$ comme un ind-objet de Cat hot, et écrire la formule fondamentale sous la forme

$$\mathrm{Hom}_{\Sigma_X}(a_X, b_X) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{Ind\,Cat\,hot}}(X, \underline{\underline{K}}).$$

Ainsi, l'énoncé du scholie implique deux choses :

a) Le contrafoncteur $X \longmapsto \mathrm{Hom}_{\Sigma_X}(a_X, b_X)$ sur Cat se factorise canoniquement par Cat hot, via un foncteur canonique

$$\mathrm{Cat\,hot}^o \xrightarrow{H = H^{\mathcal{M},\Sigma}_{a,b}} \mathrm{Ens}\ ;$$

b) Ce dernier contrafoncteur sur Cat hot est *ind-représentable* par un ind-objet $\underline{\underline{K}}$ de Cat hot.

C'est cet ind-objet de Cat hot qui est défini à isomorphisme unique près par $\mathcal{M}$, Σ, a, b, indépendamment de tout artifice de calcul pour expliciter les $\mathrm{Hom}_{\Sigma_X}(a_X, b_X)$.

Notons aussi la conclusion suivante, nullement évidente à priori : [page 35]

Notons d'abord (ceci étant implicite dans le scholie) que toute flèche dans Cat

$$X \xrightarrow{f} Y$$

définit

$$\mathcal{M}(Y) \xrightarrow{\mathcal{M}(f)} \mathcal{M}(X) \qquad \text{appliquant } \Sigma_Y \text{ dans } \Sigma_X,$$

d'où

$$\mathcal{M}(Y)\Sigma_Y^{-1} \overset{\text{déf}}{=} \mathbf{D}_{\mathcal{M},\Sigma}(Y) \longrightarrow \mathcal{M}_X\Sigma_X^{-1} = \mathbf{D}_{\mathcal{M},\Sigma}(X),$$

[plutôt $\mathcal{M}(X)$] d'où, pour tout $a, b \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$, vu que $\mathcal{M}(f)$ transforme a_Y, b_Y en a_X, b_X :

$$\boxed{\mathrm{Hom}_{\Sigma_Y}(a_Y, b_Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\Sigma_X}(a_X, b_X).}$$

Ceci posé, on a :

Corollaire : *Si f est un homotopisme, alors quelque soient $a, b \in \mathcal{M}$, la flèche précédente est un isomorphisme.*

La question naturelle, c'est de savoir si la même conclusion est encore valable, en supposant seulement que f soit un '*quasi-isomorphisme*' (ou 'équivalence faible'), ici que f définisse un isomorphisme dans la catégorie de fractions Hot de Cat. (À ne pas confondre avec Cat hot, nettement plus fine). S'il en était ainsi, le contrafoncteur p. 22

[page 36]

$$X \longmapsto \mathrm{Hom}_{\Sigma_X}(a_X, b_X)$$

se factoriserait non seulement par Cat hot, mais même par la catégorie de fractions plus grossière Hot. Et dès lors se poserait la question si ce contrafoncteur hypothétique

$$\mathrm{Hot}^o \longrightarrow \mathrm{Ens}$$

est encore ind-représentable; et de préférence ([5]) ind-représentable par le ind-objet image de $\underline{\underline{K}}$ dans Ind Hot par

$$\mathrm{Ind}(\mathrm{Cat\,hot}) \longrightarrow \mathrm{Ind}(\mathrm{Hot}),$$

déduit du foncteur de localisation Cat hot $\longrightarrow$ Hot. (Car cet ind-objet est un candidat tout trouvé.)

Je vais faire quelques rappels catégoriques, généralisant la situation du foncteur ca- [page 37]
nonique de localisation

$$\mathrm{Cat\,hot} \xrightarrow{\varphi} \mathrm{Hot},$$

dont on sait qu'il admet un adjoint à droite [si un lecteur a une démonstration de ce fait, prière de contacter G. Maltsiniotis : [e-mail address removed]]

$$\mathrm{Cat\,hot} \xleftarrow{\psi} \mathrm{Hot}, \qquad \mathrm{Hom}_{\mathrm{Hot}}(\varphi X, Y) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{Cat\,hot}}(X, \psi Y),$$

où ψ est le foncteur 'enveloppe de Kan' ou 'représentant de Kan'. On va donc considérer la situation plus générale

$$C \underset{\varphi}{\overset{\psi}{\leftrightarrows}} C' \qquad \mathrm{Hom}_{C'}(\varphi X, X') \simeq \mathrm{Hom}_{C}(X, \psi X')$$

i.e.

$$\varphi, \psi \text{ couple de foncteurs adjoints.}$$

On suppose de plus

$$\begin{cases} \varphi \text{ un foncteur localisation, i.e. } \psi \text{ pleinement fidèle,} \\ \text{i.e. } \varphi\psi \xrightarrow[\sim]{\mathrm{adj}} \mathrm{id}_{C'} \quad . \end{cases}$$

Soit $W = W_\varphi \subset \mathrm{Fl}\, C$, défini par $\varphi : W_\varphi = \{u \in \mathrm{Fl}\, C \mid \varphi(u) \text{ isomorphisme}\}$. Voici la proposition que j'avais oubliée, et que j'ai eu du mal à reconstituer, hélas!

Proposition 1. *Soit $K \in ObC$. Les conditions suivantes sur K sont équivalentes :*

(i) *Le foncteur* p. 23

$$X \longmapsto K(X) \overset{\text{déf}}{=} \mathrm{Hom}_C(X, K) \qquad C^o \longrightarrow \mathrm{Ens}$$

transforme flèches de W ('quasi-isomorphismes') en bijections.

(i′) *Même condition pour les flèches d'adjonction*

$$X \longrightarrow \psi\varphi X \qquad (\forall X \in \mathrm{Ob\ C})$$

5. ce sera automatique si on a ind-représentabilité comme foncteur sur Hot, cf. ci-dessous.

(i″) *Même condition pour la flèche d'adjonction* ([6])

$$K \longrightarrow \psi\varphi K.$$

(ii) *K appartient à l'image essentielle de ψ*

(ii′) *$K \longrightarrow \psi\varphi K$ (adjonction) est un isomorphisme.*

(ii″) *L'homomorphisme fonctoriel en X*


$$\mathrm{Hom}_C(X, K) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{C'}(\varphi X, \varphi K)$$

est un isomorphisme.

Démonstration. On a d'abord comme quasi-tautologies (ii′)$\Longrightarrow$ (ii)$\Longrightarrow$ (ii″)$\Longrightarrow$ (ii′), i.e. l'équivalence des trois dernières conditions. En effet, (ii′)$\Longrightarrow$ (ii) tautologique, (ii)$\Longrightarrow$ (ii″) car si $K = \psi(K')$ on a par adjonction [page 38]


$$\mathrm{Hom}_C(X, K) = \mathrm{Hom}_C(X, \psi(K')) \overset{\mathrm{adj}}{\simeq} \mathrm{Hom}_{C'}(\varphi X, K'),$$

or $\varphi(K) = \varphi\psi(K') \xrightarrow{\sim} K'$ (adjonction, et ψ pleinement fidèle).



ce qui prouve que $\varphi_{X,K}$ est un isomorphisme.

(ii″) $\Longrightarrow$ (ii′). Car la flèche



p. 24

est déduite de la flèche d'adjonction

$$K \longrightarrow \psi\varphi K$$

en prenant $\mathrm{Hom}_C(X, -)$, donc α_X est un isomorphisme pour tout X si et seulement si cette flèche d'adjonction est un isomorphisme. Donc

$$\text{(ii)} \Longleftrightarrow \text{(ii′)} \Longleftrightarrow \text{(ii″)}.$$

D'autre part,

$$\text{(ii″)} \Longrightarrow \text{(i)} \Longrightarrow \text{(i′)} \Longrightarrow \text{(i″)}$$

sont tautologiques, en tenant compte pour (i) $\Longrightarrow$ (i) [probablement (i) $\Longrightarrow$ (i′)] que les flèches d'adjonction

$$X \xrightarrow{u} \psi\varphi X \qquad \text{dans } C$$

6. N.B. Il suffit même que l'élément id_K de $F_K(K)$ provienne de $F_K(\psi\varphi K)$ [où $F_K = K(-) = \mathrm{Hom}(-, K)$], i.e.

(i‴) Il existe une rétraction de $\psi\varphi X$ sur X [plutôt $\psi\varphi K$ sur K] (NB Celle-ci sera même un isomorphisme).

sont bien dans W, car on a un triangle commutatif

$$\begin{array}{ccc} \varphi(X) & \xrightarrow{\varphi(u)} & \varphi(\psi\varphi X) = (\varphi\psi)(\varphi X) \\ & \searrow^{\mathrm{id}_{\varphi(X)}} & \Big\downarrow \wr \text{ adj } \varphi\psi \longrightarrow 1, \text{ qui est un} \\ & & \text{isomorphisme car } \psi \text{ est pleinement fidèle} \\ & & \varphi(X), \end{array}$$

donc $\varphi(u)$ est bien un isomorphisme.

Reste à prouver (i″) $\Longrightarrow$ (ii′), i.e. on suppose
que le foncteur $X \longrightarrow \mathrm{Hom}(X, K)$ transforme le morphisme d'adjonction particulier [page 39]

$$K \xrightarrow{i} \psi\varphi K$$

en

$$\begin{array}{ccc} u & \longrightarrow & u \circ i \\ \mathrm{Hom}(\psi\varphi(K), K) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(K, K), \end{array}$$

qui est une bijection. Donc id_K est dans l'image, soit p un élément du premier membre qui lui donne naissance

p. 25

$$K \underset{p}{\overset{i}{\rightleftarrows}} \psi \underbrace{\varphi(K)}_{K'} \qquad \text{donc } p \circ i = \mathrm{id}_K$$

Considérons

$$ip = q : \psi(K') \longrightarrow \psi(K') \qquad (\text{NB } q^2 = q),$$

comme ψ est pleinement fidèle, il existe un unique

$$q_0 : K' \longrightarrow K' \qquad (K' \overset{\text{déf}}{=} \varphi(K))$$

tel que l'on ait

$$q = \psi(q_0).$$

La relation $pi = \mathrm{id}_K$ donne, en appliquant φ,

$$\varphi(p)\varphi(i) = \mathrm{id},$$

donc comme $\varphi(i)$ est un isomorphisme (c'est

$$\begin{array}{ccc} \varphi(K) & \xrightarrow{\sim} & \varphi(\psi\varphi)(K) = (\varphi\psi)(\varphi K) \\ & \searrow^{\sim \text{ id}} & \wr \Big\downarrow \text{adj} \\ & & \varphi(K), \end{array}$$

rendant commutatif le triangle ci-contre), $\varphi(p)$ l'est. Donc $\varphi(q) = \varphi(i)\varphi(p)$ l'est, puisque $\varphi(i)$ et $\varphi(i)$ [plutôt $\varphi(p)$] le sont. Mais

$$\varphi(q) = \varphi\psi(q_0) \qquad \underbrace{\overset{\sim}{\longrightarrow}}_{\text{adj } \varphi\psi \overset{\sim}{\to} \text{id}} \qquad q_0,$$

donc q_0 est un isomorphisme, donc aussi $q = \psi q_0$. Comme $q^2 = q$, cela implique $q = \mathrm{id}$. Donc i et p sont des isomorphismes inverses l'un de l'autre, ce qui établit (ii″) [plutôt (ii′)] et achève la démonstration.

[page 40]

Corollaire : *Considérons des foncteurs* $C^o \xrightarrow{H}$ Ens, *et* $C'^o \xrightarrow{H'}$ Ens, *tels que* $H \simeq H' \circ \varphi$. *Pour que* H *soit représentable, il faut et il suffit que* H' *le soit, et dans ce cas, l'objet* K *de* C
qui représente H *satisfait aux conditions équivalentes de la proposition. Si* K, K' *les représentent, on a des isomorphismes canoniques* $K' \simeq \varphi K$, $K \simeq \psi K'$.

Si H' est représentable par $K' \in \mathrm{Ob}C'$, on aura donc

$$H' \circ \varphi(X) \simeq \mathrm{Hom}_{C'}(\varphi X, K') \overset{\text{adj}}{\simeq} \mathrm{Hom}_C(X, \psi(K'))$$

donc H est représentable par $K = \psi(K')$, satisfaisant la condition (ii) de la proposition. p. 26
Inversement, si H est représentable par un objet K, alors K satisfait à la condition (i), donc par (ii″) on a

$$\mathrm{Hom}_C(X, K) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{C'}(\varphi X, \varphi K),$$

donc le foncteur $H' : C^o \longrightarrow$ Ens qui factorise H s'explicite comme $X' \longmapsto \mathrm{Hom}_{C'}(X', \varphi K)$, donc est représentable par φK.

Passons aux ind-objets. Les foncteurs φ, ψ passent aux ind-objets, d'où des foncteurs

$$\mathrm{Ind}\, C \underset{\Phi=\mathrm{Ind}\,\varphi}{\overset{\Psi=\mathrm{Ind}\,\psi}{\rightrightarrows}} \mathrm{Ind}\, C'.$$

On aura encore la formule d'adjonction pour $X = (X_i)_{i\in I}$ dans $\mathrm{Ind}\, C$, $X' = (X'_{i'})_{i'\in I'}$ dans $\mathrm{Ind}\, C'$, car

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}(X, \Psi X') &= \varprojlim_i \varinjlim_{i'} \mathrm{Hom}(X_i, \psi(X'_{i'})) \\ &= \varprojlim_i \varinjlim_{i'} \mathrm{Hom}(\varphi X_i, X'_{i'}) \\ &= \mathrm{Hom}(\Phi X, X').\end{aligned}$$

On prouve de même que Ψ est pleinement fidèle, car si $X' = (X'_i)_{i\in I}$, $Y' = (Y'_j)_{j\in J}$ sont des objets de $\mathrm{Ind}\, C'$, on aura [page 41]

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Hom}(X', Y') & \simeq \varprojlim_i \varinjlim_j & \mathrm{Hom}_{C'}(X'_i, Y'_j) \\ \downarrow{\scriptstyle \Psi_{X',Y'}} & & \downarrow{\scriptstyle \psi_{X'_i,Y'_j}} \\ \mathrm{Hom}(\Psi X', \Psi Y') & \simeq \varprojlim_i \varinjlim_j & \mathrm{Hom}_C(\psi(X'_i), \psi(Y'_j)), \end{array}$$

donc $\Psi_{X',Y'}$ est un isomorphisme si les $\psi_{X'_i,Y'_j}$ le sont.

Donc la proposition 1 peut s'appliquer à la situation Φ, Ψ entre ind-objets. Je vais l'expliciter sous la forme la plus commode :

Proposition 2. *Soit* $K = (K_i)_{i\in I}$ *un ind-objet de* C, *et soit* H *le foncteur*

$$\begin{cases} H : X & \longmapsto & \underbrace{\mathrm{Hom}_C(X, K)}_{K(X)} \overset{\text{déf}}{=} \varinjlim_i \mathrm{Hom}_C(X, K_i) \\ C^o & \longrightarrow & \mathrm{Ens} \end{cases}$$

qu'il ind-représente. Conditions équivalentes

(i) *Le foncteur* H *se factorise (à isomorphisme près) par* C' *via* φ, *i.e. transforme les* $u \in W_\varphi$ *en isomorphismes.*

(i′) *Même condition pour les flèches d'adjonction* $X \longrightarrow \psi\varphi(X)$ *(lesquelles sont dans* W*).* p. 27

(i″) *Même condition pour la flèche d'adjonction* $K \longrightarrow \psi\varphi(K)$.

(ii) K *appartient à l'image essentielle de* $\operatorname{Ind} C'$ *par* Ψ.

(ii′) $K \longrightarrow \Psi\Phi(K)$ *est un* isomorphisme *dans* $\operatorname{Ind} C$.)

(ii″) *L'homomorphisme fonctoriel*

$$K(X) = \operatorname{Hom}_C(X, K) \longrightarrow \operatorname{Hom}_{C'}(\varphi(X), \varphi(K))$$

[plutôt $\operatorname{Hom}_{\operatorname{Ind}(C)}(X, K) \longrightarrow \operatorname{Hom}_{\operatorname{Ind}(C')}(\Phi(X), \Phi(K))$, en identifiant l'objet X de C à son image dans $\operatorname{Ind}(C)$] *est un isomorphisme.*

Démonstration. L'équivalence de (ii), (ii′), (ii″) est la proposition 1 appliquée à Φ et Ψ, à cela près qu'il faut noter que (ii″) reste évidemment valable si on y remplace X par un ind-objet $(X_j)_{j\in J}$ quelconque. On a

[page 42]

$$(\text{ii}'') \Longrightarrow (\text{i}) \Longrightarrow (\text{i}')$$

tautologiquement, il reste à prouver que (i′) implique (i″) et (i″) (ii′). On ne peut pas appliquer directement la proposition 1, car l'hypothèse (i′) ici ne porte que sur les objets de $\operatorname{Ind} C$ qui proviennent de C, et il n'est pas évident à priori qu'elle passe aux objets quelconques. Mais cela l'est dans le cas d'un homomorphisme de ind-objets (X_i), (Y_i) sur le même ensemble d'indices, donné par un homomorphisme ordinaire (terme à terme) de systèmes inductifs sur I, $X_i \longrightarrow Y_i$: si les $X_i \longrightarrow Y_i$ sont dans W, l'hypothèse (i) implique que $H(Y) \longrightarrow H(X)$ est un isomorphisme, et de même pour (i′) pour $\underbrace{X}_{=(X_i)_i} \longrightarrow \underbrace{\Psi\Phi(X)}_{=(\psi\varphi(X_i))_i}$, où l'homomorphisme d'adjonction est donné terme à terme par les homomorphismes d'adjonction $X_i \longrightarrow \psi\varphi(X_i)$. Donc l'hypothèse (i′) ici implique l'hypothèse (i′) de la proposition 1 pour Φ et Ψ, donc aussi (ii′) (par la proposition 1), et on gagne.

Revenons à la situation où $C = \operatorname{Cat}\text{hot}$, $C' = \text{Hot}$, φ le foncteur [de] localisation. Si $K \in \operatorname{ObCat}\text{hot}$, alors $\psi\varphi(K)$ s'appelle *l'enveloppe de Thomason-Kan* de K - si K est une catégorie, son enveloppe $\bar{K}$ et la flèche $K \longrightarrow \bar{K}$ ne sont définis que dans la catégorie $\operatorname{Cat}\text{hot}$, i.e. $\bar{K}$ n'est défini qu'à 'homotopisme près'.
Mais on peut toujours *choisir* un objet $\bar{K}$ de Cat, et une flèche

[page 43]

$$i : K \longrightarrow \bar{K} \qquad\qquad \textit{dans } \text{Cat},$$

pas seulement dans $\operatorname{Cat}\text{hot}$, de telle façon de plus que i soit une '*cofibration* de Thomason' (et en particulier une immersion ouverte ?). Il en résulte que si on a un système inductif

p. 28

$$K = (K_n)_{n\in\mathbf{N}}$$

indexé par $\mathbf{N}$, et si on choisit pour chaque n une enveloppe de Thomason-Kan

$$K_n \overset{\alpha_n}{\hookrightarrow} \bar{K}_n$$

de cette façon, on peut trouver des foncteurs de transition

$$\bar{K}_n \overset{\bar{i}_n}{\longrightarrow} \bar{K}_{n+1}$$

tels que les carrés

$$\begin{array}{ccc} K_n & \overset{\alpha_n}{\hookrightarrow} & \bar{K}_n \\ {\scriptstyle i_n}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \bar{i}_n} \\ K_{n+1} & \overset{\alpha_{n+1}}{\hookrightarrow} & \bar{K}_{n+1} \end{array}$$

soient commutatifs, de telle sorte que l'on ait donc un homomorphisme de *systèmes inductifs de* Cat

$$K \longrightarrow \bar{K}$$

et a fortiori un homomorphisme de ind-objets de Cat. Ceci posé, les conditions (i), (ii′) de la proposition 2 montrent que le foncteur ind-représenté par K *dans* $C = \mathrm{Cat\,hot}$ transforme quasi-isomorphismes
ordinaires (équivalences faibles) en bijections, *si et seulement si* l'homomorphisme pré- [page 44]
cédent est un isomorphisme de ind-objets de $\mathrm{Ind\,Cat\,hot}$.

Ce sera donc cela la condition naturelle à imposer aux ind-catégories de chemins

$$\underline{\underline{\mathrm{Ch}}}_{\Sigma}(\mathcal{M}; a, b) \qquad\qquad (a, b \in \mathrm{ob}\,\mathcal{M})$$

provenant d'une 'catégorie de modèles' $\mathcal{M}$, Σ.

Bien sûr, disposant d'un système inductif explicite de catégories (pas seulement d'objets de Cat hot)

$$K_n = \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,n}(\mathcal{M}; a, b),$$

il est tentant de passer à la limite inductive

$$K_\infty = \varinjlim_n \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,n}(\mathcal{M}; a, b) \overset{\text{déf}}{=} \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma}(\mathcal{M}; a, b),$$

et ceci d'autant plus que les foncteurs de transition sont des monomorphismes et pleinement fidèles, de sorte que les K_n s'identifient à une suite de sous-catégories pleines de

K_∞, dont la réunion est K_∞. Mais d'autre part je ne sais donner aucune interprétation p. 29
convaincante de K_∞, comme de celle du ind-objet de Cat hot defini par $\underline{\underline{K}} = (K_n)_{n\in\mathbf{N}}$, qui ind-représente le foncteur remarquable

$$H = H_{\mathcal{M};x,y} : \mathrm{Cat\,hot}^o \longrightarrow \mathrm{Ens}$$

factorisant le foncteur [page 45]

$$X \longmapsto H_{\mathcal{M};x,y}(X) \overset{\text{déf}}{=} \mathrm{Hom}_{\mathcal{M}(X)\Sigma_X^{-1}}(x_X, y_X),$$

par la formule donc

$$H(X) = \varinjlim_n \underbrace{\pi_0\underline{\mathrm{Hom}}(X, K_n)}_{\mathrm{Hom}_{\mathrm{Cat\,hot}}(X,K_n)}.$$

Je ne sais donner d'interprétation de ce type ni de la catégorie K_∞ elle-même, ni de son image dans Cat hot, ni de son image dans Hot. Il est vrai que si je restreins le foncteur H à la sous-catégorie pleine de (Cat) formée des catégories *finies* ($\mathrm{Ob}\,X$ et $\mathrm{Fl}\,X$ finis), alors on aura

$$\underline{\mathrm{Hom}}^!(X, K_\infty) = \underline{\mathrm{Hom}}(X, K_\infty),$$

et l'isomorphisme précédant s'interprète comme

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{M}(X)\Sigma_X^{-1}}(a_X, b_Y) \overset{\text{déf}}{=} H(X) \simeq \pi_0\underline{\mathrm{Hom}}(X, K_\infty) \overset{\text{déf}}{=} \mathrm{Hom}_{\mathrm{Cat\,hot}}(X, K_\infty).$$

`[plutôt` (a_X, b_X)`]` Cela prouve du moins que la connaissance de K_∞ est utile. Mais cette formule, pour X restreint aux catégories *finies,* ne définira pas K_∞ comme objet de Cat hot, à isomorphisme unique près dans cette catégorie - *sauf* dans le cas où K_∞ est elle-même homotope à une catégorie finie. (Je ne me rends pas bien compte si ça [page 46]

arrive très souvent … Mais on ne peut fonder une théorie générale des dérivateurs et des catégories de modèles 'dérivables' sur une hypothèse de ce genre.)


Mais supposons que le foncteur H envisagé se factorise même par Hot, i.e. qu'il transforme quasi-isomorphismes en bijections. On a vu que cela équivaut à la condition qu'il puisse se représenter par un système inductif sur $\mathbf{N}$ formé de catégories de Thomason-Kan. Il doit être facile de plus, si on y tient, de s'arranger pour que les foncteurs de transition soient des monomorphismes et pleinement fidèles, pour avoir une $\varinjlim$ sympathique. Ce sera bien sûr une catégorie de Thomason-Kan. Cette catégorie est-elle déterminée par le foncteur $H : \mathrm{Cat\,hot}^o \longrightarrow \mathrm{Ens}$ à isomorphisme unique près dans Cat hot ? Bien sûr, il n'est pas question qu'elle représente le foncteur H, sauf [si] celui-ci est bel et bien représentable, i.e. si le ind-objet $\underline{\underline{K}}$ de Cat hot est essentiellement constant (ce qui ne doit pratiquement jamais être le cas). Notons déjà que si u est un homomorphimse de ind-objets *dans* Cat, ou, ce qui revient maintenant au même, un homomorphisme dans Cat

p. 30 [page 47]

$$K_\infty \xrightarrow{u_\infty} K'_\infty$$

tel que $\forall n$, $u_\infty(K_n) \subseteq K'_{n'}$ pour $n' = \tau(n)$ convenable, et si on suppose que l'homomorphisme de ind-objets induit un isomorphisme pour les foncteurs ind-représentables *sur* Cat hot (par exemple, si $\underline{\underline{K}}$ et $\underline{\underline{K}}'$ ind-représentent le même foncteur H, et l'homomorphisme de ind-objets est celui qui correspond à id_H), alors u_∞ est forcément un isomorphisme *dans* Hot, donc aussi (sauf erreur) dans Cat hot puisque K_∞, K'_∞ sont des catégories de Thomason-Kan. Mais ce qui n'est pas évident, c'est l'existence d'un homomorphisme u_∞ comme [ci-]dessus, et s'il existe, qu'il soit unique (ou du moins canonique ?) comme flèche de Cat hot.

Pour l'existence d'un u_∞, on est ramené à prouver que si on a un diagramme à flèches pleines



et si une flèche u_{n+1} est donnée 'en pointillés' *dans* Cat hot, de façon à rendre le carré commutatif, alors on peut la réaliser par une flèche *dans* Cat qui rende le diagramme commutatif pour de bon (dans Cat). On est ramené au même problème dans une situation

[page 48]

$$X \underset{i}{\overset{p}{\leftrightarrows}} Y,$$

où X est une catégorie de Thomason, i une cofibration de Thomason, p une rétraction de Y dans X *dans* Cat hot, on veut la réaliser par une vraie rétraction ([7]).

En admettant que ça soit le cas, donc que tout homomorphisme des ind-objets $\underline{\underline{K}}$, $\underline{\underline{K}}'$ *dans* Cat hot se représente par un homomorphisme entre les ind-objets *dans* Cat, donc aussi par un foncteur $K_\infty \longrightarrow K'_\infty$, reste la question si l'homomorphisme correspondant dans Cat hot est unique. Donc si on a deux foncteurs f, g qui induisent le même homomorphisme sur les foncteurs ind-représentés sur Cat hot, si f et g sont homotopes. Donc

Question. Deux foncteurs $f, g : K_\infty \longrightarrow K'_\infty$ tels que pour tout $n \in \mathbf{N}$, f_n, g_n qui s'en déduisent par restriction à K_n sont homotopes (et même homotopes en tant que foncteurs de K_n dans un K'_N convenable), sont-ils homotopes ? ([8])

p. 31 [page 49]

7. [un ? dans la marge]
8. K, K' catégories de Thomason, les K_n, K'_n aussi.

Je présume que non - qu'il peut arriver que la longueur minimum requise $l(n)$ pour un chemin dans $\underline{\mathrm{Hom}}(K_n, K'_{\tau(n)})$ reliant f_n et g_n, tende vers l'infini si $n \longrightarrow \infty$. L'hypothèse que les K'_n sont des catégories de Thomason y change-t-il quelque chose (deux objets homotopes dans $\underline{\mathrm{Hom}}(X, K')$, si K' est de Thomason, sont-ils reliés par une flèche ?)

Bien sûr, on peut prétendre que les catégories $\underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,n}(\mathcal{M}; a, b)$ ont été définies 'canoniquement', et leur limite inductive $\underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma}(\mathcal{M}; a, b)$ aussi. Mais la définition était assez arbitraire et abracadabrante - je suis convaincu que dix mathématiciens, se proposant de développer cette même idée des catégories de chemins, dans le même but que moi, arriveraient à dix définitions différentes ! Pourtant, il n'est pas exclu que l'on finisse par trouver un système transitif d'isomorphismes dans Cat hot, entre les catégories de chemins 'infinis' (i.e. de longueur non précisée) $K_\infty = K_\infty(\mathcal{M}; a, b)$ que nous aurons construites, dans le but principal (disons) de représenter le foncteur H *sur les catégories finies.* Et que les [page 50] isomorphismes obtenus seront, bien entendu, des homomorphismes dans Ind(Cat hot). J'ai l'impression de ne pas avoir encore axiomatisé à fond la notion même de chemins, qui après tout a un sens géométrique assez évident et important par lui-même. Donc par ce qu'il faut entendre par '*une* théorie des chemins dans une catégorie'. Une telle théorie $\mathcal{T}$ associerait donc à $\mathcal{M}$, Σ, a, b un système inductif de catégories $\mathrm{Ch}^{\mathcal{T}}_{n,\Sigma}(\mathcal{M}; a, b)$. Et les contraintes géométriques naturelles à imposer à de telles théories, en vue aussi de leur utilisation pour expliciter

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{M}(X)\Sigma_X^{-1}}(a_X, b_X) \xrightarrow{\sim} \pi_0 \underline{\mathrm{Hom}}(X, \underline{\underline{\mathrm{Ch}}}^{\mathcal{T}}(\mathcal{M}; a, b))$$

donnerait un système transitif d'isomorphismes non seulement entre les ind-objets de Cat hot, mais peut-être aussi entre les $\mathrm{Ch}^{\mathcal{T}}_{\infty,\Sigma}(\mathcal{M}; a, b)$, pour des théories differentes. Si on dispose d'un tel énoncé, la catégorie $\mathrm{Ch}_{\infty,\Sigma}(\mathcal{M}; a, b)$, ou plus exactement ses images dans Cat hot et Hot, prendraient un sens convaincant. [page 51]

Il y a d'autre part un autre point de vue, qui peut-être pourrait 'canonifier' les catégories $\underline{\mathrm{Ch}}_\infty$ en tant qu'objet de Cat hot et surtout de Hot (on passerait à Cat hot en appliquant le foncteur ψ, enveloppe de Thomason-Kan …). En effet, on est intéressé à construire, en termes de $\mathcal{M}$, Σ, un 'dérivateur' (ou un prédérivateur) $\mathbf{D}_{\mathcal{M},\Sigma}$ surtout sur le 'domaine' des catégories finies. L'étendre à un domaine plus large est peut-être important dans un 'deuxième souffle', mais peut être considéré comme du luxe dans le premier mouvement de fondation d'une théorie des dérivateurs. Ceci dit, on peut se poser des questions du type suivant.

Soit

$$\mathrm{Hot}_0 \subset \mathrm{Hot}$$

la sous-catégorie pleine de Hot, définie par les catégories finies ([9]) - appelons les types d'homotopie 'de type fini' (ou de *présentation* finie ?). On a un foncteur évident p. 32 [page 52]

$$\begin{aligned} \mathrm{Hot} &\longrightarrow \mathrm{Hot}_0^\wedge = \underline{\mathrm{Hom}}(\mathrm{Hot}_0^o, (\mathrm{Ens}))\,, \\ X &\longmapsto \tilde{X} = (\xi \longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathrm{Hot}}(\xi, X)). \end{aligned}$$

Ce foncteur est *conservatif* `[cela semble faux]`, puisque un homomorphisme $X \longrightarrow X'$ dans Hot est un isomorphisme s'il induit des isomorphismes pour les foncteurs $\tilde{X} \longrightarrow \tilde{X}'$, et même seulement pour leurs valeurs pour les sphères S^n $(n \geq 0)$. (Sauf erreur. Y a-t-il des canulars, parce que le critère d'équivalence faible par les π_i ne s'applique pas directement, en l'absence de points bases. Ça ne doit pas être très sérieux … `[cela semble en fait sérieux]`). Mais est-il peut-être même *pleinement fidèle* ([10]) ? De sorte que Hot se réaliserait comme sous-catégorie pleine de $\mathrm{Hot}_0^\wedge$, contenant les foncteurs représentables ?

9. *NB* Hot_0 est équivalente à une petite catégorie.
10. `[un ? dans la marge]`

p. [sans numéro]

LES DÉRIVATEURS

ALEXANDRE GROTHENDIECK

Chapitre VI
HOT

p. [sans numéro]

Note des éditeurs de l'édition transcrite.

Ce texte a été déchiffré et transcrit en LaTeX 2_ε par M. Künzer. Il a été édité par M. Künzer, J. Malgoire, et G. Maltsiniotis. La transcription est aussi fidèle que possible au manuscrit. Pour les quelques corrections évidentes, ou rares commentaires des éditeurs, ainsi que pour la numérotation originale des pages du manuscrit, les caractères de machine à écrire `[typewriter]` entre crochets sont utilisés. Un point d'interrogation entre crochets signifie que l'on n'est pas sûr du mot qui précède.
Cette édition est provisoire. Les remarques, commentaires et corrections sont bienvenus. Envoyer un message à :
[e-mail address removed]

G. Maltsiniotis

p. 1
`[page 1]`

Le dérivateur HOT

14.11.90

(Les premières feuilles, d'il y a deux semaines, ont été larguées, dépassées par VII)

Je définis Hot à partir de la catégorie de modèles

$$\mathcal{M} = \mathrm{Cat},\ W \subseteq \mathrm{Fl}(\mathrm{Cat}),$$

W étant en principe les Hot-équivalences. Mais je vais dans la mesure du possible axiomatiser plus, en supposant donné un ensemble W plus général, appelé 'localisateur fondamental' (basic localiser), p. ex. $W = W_{\mathbf{D}}$, où $\mathbf{D}$ est un dérivateur déjà donné (mais en supposant que son domaine soit (Cat) tout entier). Nous allons noter au fur et à mesure de quelles propriétés de W nous aurons besoin. Aux fins de référence ultérieure, je vais rappeler ici celles que j'ai dégagées dans Pursuing Stacks.

L1 Saturation de W

a) *Les identités* `[sont]` *dans* W.

b) *Si deux parmi* gf, f, g `[sont]` *dans* W, *le troisième aussi,* $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$.

c) *Si* gf *et* fg *sont dans* W, *alors* f *et* g *aussi,* $X \underset{g}{\overset{f}{\rightleftarrows}} Y$.

L2 $\mathbf{\Delta}^1$ *est universellement* W*-asphérique, i.e.* $\mathbf{\Delta}^1 \times X \longrightarrow X$ *est dans* W *pour tout* X *dans* Cat. Cela implique

L2 bis $\mathbf{\Delta}^1$ *est* W*-asphérique.* (C'était L3′ dans Pursuing Stacks.)

L3 *Si* X *a un objet final,* X *est* W*-asphérique.* ([1])

Je note ici `[des]` variantes renforcées.

L3 bis *Si* X *est* Hot-*asphérique, il est* W*-asphérique.*

L3 ter *Si* X *est* Hot-*asphérique, il est universellement* W*-asphérique, i.e.* $X \times Y \xrightarrow{\mathrm{pr}_2} Y$ *est dans* W *pour tout* Y *dans* Cat. ([2])

L3 quater *Toute* Hot-*équivalence est dans* W. p. 2


L3 quater $\Longrightarrow$ L3 ter $\Longrightarrow$ L3 bis $\Longrightarrow$ L3.

L3 ter $\Longrightarrow$ L2 $\Longrightarrow$ L2 bis.

`[page 2]`

L4 *Si* $f : X \longrightarrow Y$ *est* W*-asphérique (i.e. les* $X/y \longrightarrow Y/y$ *dans* W, *i.e. (si on a L3) si les* X/y *sont* W*-asphériques), alors* f *aussi.* (Axiome de localisation.) ([3]) `[`aussi' = dans` $W$`]`

L5 (Axiome de fibration). *Si*



avec X *et* Y *fibrées sur* S *et* f *cartésien, si pour tout* $s \in S$ $f_s : X_s \longrightarrow Y_s$ *est dans* W, f *aussi.*

1. Il y a un L3′ dual de L3.
2. Suffit pour entraîner L2, L3.
3. il y a un L4′ dual de L4.

Dans Pursuing Stacks j'ai supposé toujours L1, L3, L4 (impliquant L2) - c'étaient ces conditions qui définissaient la notion de 'localisateur' (fondamental) dans Cat. ([4]) D'autre part, L1, L2 bis, L5 impliquent L1,2,3,4,5.
On va supposer ici aussi qu'on ait au moins L1, L3, L4 (i.e. W un localisateur). En appliquant la construction de I, p. 72-**75,** on voit que $f : X \longrightarrow Y$ est dans W si et seulement si $f^o : X^o \longrightarrow Y^o$ l'est. Donc L1, L3, L4 impliquent L3′, L4′ (axiomes duaux de L3, L4).
Il y avait des axiomes complémentaires

La $f \in W \Longrightarrow \pi_0(f)$ *bijectif.*

Lb *Le foncteur canonique de localisation*

$$\mathrm{Cat} \longrightarrow (\mathrm{Cat})W^{-1} \overset{\text{déf}}{=} \mathrm{Hot}_W$$

commute aux sommes finies.

Lc *Itou pour produits finis.*

Il faudrait quand même dégager des conditions concrètes sur W pour la validité de Lb, Lc. Les conditions L3 quater et La s'écrivent respectivement p. 3

$$W_\infty \subseteq W, \quad W \subseteq W_0.$$

[page 3]

Leur conjonction est l'axiome des plus raisonnables

$$W_\infty \subseteq W \subseteq W_0.$$

Bien sûr, l'axiome L5 a maintenant l'air un peu étriqué, i.e. faiblard. On va voir très vite de quoi on aura besoin!
On veut donc définir un dérivateur

$$\mathrm{HOT}_W$$

à partir de la catégorie de modèles

$$(\mathrm{Cat}, W \subseteq \mathrm{Fl}(\mathrm{Cat})).$$

Donc pour définir

$$\mathrm{HOT}_W(S) \qquad\qquad (S \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{Cat}),$$

la récette générale est de prendre la catégorie

$$\mathcal{M}(S) = \mathrm{Cat}(S) = \underline{\mathrm{Hom}}(S^o, (\mathrm{Cat})),$$

d'y introduire l'ensemble de flèches

$$\begin{cases} W_S \subseteq \mathrm{Fl}(\mathcal{M}(S)) \\ u \in W_S \Longleftrightarrow u_s \in W \quad \forall\, s \in \mathrm{Ob}\, S. \end{cases}$$

On doit poser

$$\mathrm{HOT}_W(S) \overset{\text{déf}}{=} \underline{\mathrm{Hom}}(S^o, \mathrm{Cat})W_S^{-1}.$$

Mais la catégorie $\underline{\mathrm{Hom}}(S^o, \mathrm{Cat})$ s'interprète, à isomorphisme canonique près, comme celle

$$\underline{\mathrm{Fibsc}}\, S$$

4. Si W [est] un localisateur, alors les catégories contractiles sont W-asphériques, les homotopismes sont dans W, les applications homotopes sont égales dans $(\mathrm{Cat})W^{-1} \overset{\text{déf}}{=} \mathrm{Hot}_W$.

des catégories X Cat-fibrées sur S, munies d'un 'scindage', i.e. d'un choix de foncteurs changement de base $u^* : X_t \longrightarrow X_s$ (pour $t \xrightarrow{u} s$ dans S) [plutôt $u^* : X_s \longrightarrow X_t$], avec de plus *transitivité stricte*

$$(vu)^* = u^* v^* \qquad \text{si } t \xrightarrow{u} s \xrightarrow{v} r \text{ dans } S$$

[page 4]

et non seulement transitivité à isomorphisme canonique près. Ainsi on peut écrire p. 4
aussi

$$\mathrm{HOT}_W(S) \xrightarrow{\sim} (\underline{\mathrm{Fibsc}}\, S)W_S^{-1}, \qquad (*)$$

où cette fois W_S est interprété comme

$$W_S \subseteq \mathrm{Fl}(\underline{\mathrm{Fibsc}}\, S),$$

savoir


$$W_S = \{u \in \mathrm{Fl}(\underline{\mathrm{Fibsc}}\, S) \mid u_s \in W \text{ pour tout } s \in \mathrm{Ob}\, S\}$$

(foncteurs strictement cartésiens, i.e. commutant aux scindages, qui induisent des W-équivalences entre les catégories fibres).

La flèche dans $(*)$ est bel et bien un isomorphisme de catégories, pas seulement une équivalence. Mais on va définir d'autres catégories, plus commodes à certains égards, qui seront *équivalentes* (on l'espère), mais sûrement pas isomorphes, à $\mathrm{HOT}_W(S)$. (On s'occupera plus tard de la variance de $\mathrm{HOT}_W(S)$ en S.)

Les catégories $\underline{\mathrm{Hom}}(S^o, \mathrm{Cat})$, $\underline{\mathrm{Fibsc}}\, S$, ainsi que les variantes que nous allons introduire maintenant, sont en fait des 2-catégories. Mais pour décrire $\mathrm{HOT}_W(S)$, seule les structures de 1-catégories sont utilisées. On a l'impression que c'est bien grossier, qu'on [page 5]
perd quelque chose ce faisant. Mais ce qui est perdu va se retrouver, et surabondamment, dans la structure des $\underline{\mathrm{Hom}}$ internes dans les $\mathrm{HOT}(S)$, si on se 'rappelle' que ces $\underline{\mathrm{Hom}}$ internes, donnant lieu à des 'types d'homotopie relatifs' $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{HOT}_W}(S; \xi, \eta)$ (si ξ, η en sont), peuvent s'interpréter en termes de ∞-champs en groupoïdes sur S, avec toute la richesse de structure qui leur appartient. Mais ceci est une autre histoire…

En fait, je vois un diagramme de 13 catégories de 'categories sur S', à examiner à présent



où $\underline{\mathrm{Fib}}$, $\underline{\mathrm{Cofib}}$ désignent les catégories Cat-fibrées, Cat-cofibrées sur S, $\underline{\mathrm{Liss}}$ et $\underline{\mathrm{Prop}}$ p. 5
les catégories lisses resp. propres sur S, $\underline{\mathrm{Parf}}$ celles qui sont à la fois lisses et propres [page 6]
(fibrations parfaites), enfin $\underline{\mathrm{Fibhot}}$ les catégories Hot-fibrées sur S. Toutes les flèches sont des foncteurs strictement pleinement fidèles, à l'exception des deux (plutôt quatre) flèches verticales supérieures, qui sont fidèles sans plus. Je viens d'en rajouter encore 4, de catégories : $\underline{\mathrm{Fibsc}}_0$, $\underline{\mathrm{Fib}}_0$, $\underline{\mathrm{Cofibsc}}_0$, $\underline{\mathrm{Cofib}}_0$ sont les sous-catégories pleines des catégories

correspondantes sans indice, formées des catégories fibrées resp. cofibrées X sur S, pour lesquelles les foncteurs changement de base resp. cochangement de base

$$u^* : X_t \longrightarrow X_s, \qquad \text{resp.} \qquad u_* : X_s \longrightarrow X_t,$$

pour $s \xrightarrow{u} t$ dans S, sont des Hot-équivalences. En termes de foncteurs

$$S^o \xrightarrow{F} \mathrm{Cat} \qquad \text{resp.} \qquad S \xrightarrow{F'} \mathrm{Cat},$$

cela signifie que ce foncteur transforme flèches quelconques dans S en éléments de W dans Cat, i.e. qu'on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} S^o & \xrightarrow{\qquad F \qquad} & \mathrm{Cat} \\ {\scriptstyle \mathrm{can}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{can}} \\ \Pi(S^o) \simeq (\Pi S)^o = S^o(\mathrm{Fl}\, S^o)^{-1} & \xrightarrow[\bar{F}]{} & \mathrm{Hot}_W = (\mathrm{Cat})W^{-1} \end{array}$$


(et de même pour F'), i.e. qu'on a un 'système local' $\bar{F}$ sur S, à valeurs dans Hot_W, défini à l'aide de F. Je rappelle qu'on trouve également un tel système local dans le cas d'une catégorie Hot-fibrée sur S (et même un système local à valeurs dans Hot lui-même, au lieu de Hot_W - on utilise ici tacitement que $W_\infty \subseteq W$, i.e. L3 quater ([5])). Et il en est de même a fortiori pour les objets de $\underline{\mathrm{Parf}}\, S$. Pour $\underline{\mathrm{Liss}}\, S$ resp. $\underline{\mathrm{Prop}}\, S$, on trouve simplement un foncteur [page 7]

$$S^o \xrightarrow{\bar{F}} \mathrm{Hot} \qquad \text{resp.} \qquad S \xrightarrow{\bar{F}'} \mathrm{Hot},$$

d'où, en composant avec $\mathrm{Hot} \longrightarrow \mathrm{Hot}_W$, des foncteurs à valeurs dans Hot_W.

Dans chacune de ces 14 [13?] catégories, on introduit un ensemble de flèches, qui serviront à localiser, et on le désignera toujours par la même notation W_S. Dans toutes ces catégories sauf seulement Cat/S, W_S désigne la W-équivalence 'fibre par fibre'. Dans Cat/S d'autre part, ce sera la W-équivalence sans plus. Toutes les flèches du diagramme sont compatibles avec les ensembles localisants de flèches.

p. 6
[page 8]



5. On va le supposer vrai dans toute la suite.

`[Dans ce diagramme, il y a aussi` $\underline{\mathrm{Liss}}_0$ `et` $\underline{\mathrm{Prop}}_0$ `mais sans connexion aux autres objets.]`

Je suis quasiment sûr du

Theorème. ([6]) *Tous les foncteurs précédents induisent des équivalences entre les catégories localisées.*

Comme il y a 16 foncteurs, ça a l'air d'un exercise de patience. Le principe général, c'est qu'on arrive à définir des foncteurs en sens inverse, compatibles avec les W_S, de telle façon que les composés soient reliées aux foncteurs identiques par des flèches qui sont dans W_S, de sorte que par passage aux localisés ces foncteurs induisent des (équivalences) quasi-inverses des foncteurs déduits de ceux du diagramme. Tous ces foncteurs en sens opposé résultent essentiellement par composition, de trois foncteurs bien familiers. Deux de ceux-ci sont indiqués en pointillés sur le diagramme, comme Φ, Ψ.

[page 9]

Le troisième est un foncteur canonique

$$C : \mathrm{Cat}/S \longrightarrow \underline{\mathrm{Parf}}\, S,$$

qu'on va expliciter également.

Le foncteur Φ (resp. Ψ) appliqué à $\underline{\mathrm{Fib}}_0 S$ (resp. $\underline{\mathrm{Cofib}}_0 S$), induit un foncteur p. 7

$$\underline{\mathrm{Fib}}_0 S \longrightarrow \underline{\mathrm{Fibsc}}_0 S \qquad \text{resp.} \qquad \underline{\mathrm{Cofib}}_0 S \longrightarrow \underline{\mathrm{Cofibsc}}_0 S \qquad (*)$$

(ce qu'il faudra vérifier). Cela fournit toutes les flèches 'inverses' dont on a besoin, à l'exception seulement de α, β, α', β'. Mais si on a prouvé, par la méthode indiquée, que toutes les flèches du diagramme induisent des équivalences sur les catégories localisées, pour prouver qu'il en est encore de même pour α, β, α', β', il suffit de le prouver pour les deux foncteurs

$$\underline{\mathrm{Fibsc}}_0 S \longrightarrow \underline{\mathrm{Fib}}\, S, \qquad \underline{\mathrm{Cofibsc}}_0 S \longrightarrow \underline{\mathrm{Cofib}}\, S,$$

donc il reste à définir les foncteurs en sens inverse

$$\underline{\mathrm{Fib}}\, S \longrightarrow \underline{\mathrm{Fibsc}}_0 S, \qquad \underline{\mathrm{Cofib}}\, S \longrightarrow \underline{\mathrm{Cofibsc}}_0 S,$$

et comme les sources sont des sous-catégories pleines de Cat/S, il suffira de définir

$$\Phi_0 : \mathrm{Cat}/S \longrightarrow \underline{\mathrm{Fibsc}}_0 S, \qquad \Psi_0 : \mathrm{Cat}/S \longrightarrow \underline{\mathrm{Cofibsc}}_0 S.$$

Pour ceci, on posera


$$\Phi_0 = \Phi r C, \qquad \Psi_0 = \Psi r C, \qquad (**)$$

où $C : \mathrm{Cat}/S \longrightarrow \underline{\mathrm{Parf}}\, S$, Φ et Ψ sont les 3 foncteurs 'rétrogrades' inversés plus haut, et $r : \underline{\mathrm{Parf}}(S) \hookrightarrow \mathrm{Cat}/S$ est l'inclusion. Il faut donc vérifier que Φ_0, Ψ_0 définis par $(**)$, qui a priori ont comme catégories but $\underline{\mathrm{Fibsc}}\, S$ et $\underline{\mathrm{Cofibsc}}\, S$, prennent leur valeur dans les sous-catégories avec indice 0.

[page 10]

Je vais donner un énoncé d'équivalence unique, qui couvrira (presque) tous les 16 cas à la fois :

Corollaire. *Considérons le diagramme*




6. C'est totalement canulé, cf. commentaires page 32 ff., solution des perplexités pages 41 ff. Voir surtout le Théorème-Scholie récapitulatif p. 70-81.

et soit $\mathcal{F}$ une sous-catégorie pleine de Cat/S*, telle que l'un des foncteurs p, q, r se factorise par $\mathcal{F}$. Soit $W_{\mathcal{F}}$ induit sur $\mathcal{F}$ par W_S dans* Cat/S*. Alors $\mathcal{F} \hookrightarrow \mathrm{Cat}/S$ induit une équivalence sur les catégories localisées.*

[page 11]

Démonstration. Je dis qu'il suffit de prouver, pour les trois foncteurs p, q, r, et pour les foncteurs en sens inverse p. 8



que les six composés

$$p\Phi_0, \Phi_0 p, q\Psi_0, \Psi_0 q, rC, Cr$$

sont reliés aux foncteurs identiques (dans la catégorie pertinente) par une flèche qui est dans le localisateur correspondant. Pour chacun de ces trois couples de foncteurs (p, Φ_0), (q, Ψ_0), (r, C), cela prouvera déjà qu'en passant aux localisés, ils induisent des équivalences quasi-inverses l'une de l'autre. Mais on a mieux à l'aide du lemme formel suivant.

Lemme. *Soient (C, W), (C', W') deux catégories avec localisateurs $W \subseteq \mathrm{Fl}\, C$, $W' \subseteq \mathrm{Fl}\, C'$. Soit*

$$p : C \longrightarrow C'$$

un foncteur compatible avec les localisateurs, et supposons qu'il existe un foncteur $\varphi : C' \longrightarrow C$ également compatible, et tel que l'on ait des flèches (à direction non précisée)

$$\varphi p \xrightarrow{u} id_C, \qquad p\varphi \xrightarrow{v} id_{C'},$$

qui soient dans W resp. W' 'argument par argument'.

[page 12]

Alors p et φ induisent des équivalences quasi-inverses l'une de l'autre en passant aux catégories localisées (elles n'ont pas de merite). De plus, pour toute sous-catégorie pleine C'_0 de C', telle que p se factorise (en $p_0 : C \longrightarrow C'_0$) par C'_0, si on désigne par W'_0 le localisateur induit dans C'_0 par C', alors $p_0 : C \longrightarrow C'_0$ et $\varphi_0 = \varphi | C'_0 : C' \longrightarrow C$ [plutôt $C'_0 \longrightarrow C$] *induisent également des équivalences quasi-inverses l'une de l'autre sur les localisés.*

En effet, $\varphi_0 p_0 = (\varphi i) p_0 = \varphi(i p_0) = \varphi p \xrightarrow{u} \mathrm{id}_C$ (ici $i : C'_0 \hookrightarrow C'$ désigne l'inclusion), et $F \overset{\text{déf}}{=} p_0 \varphi_0 = p_0 \varphi i$ satisfait à

$$iF = \underbrace{i p_0}_{p} \varphi i = (p\varphi) i.$$

Pour définir $F \xrightarrow{v_0} \mathrm{id}_{C'_0}$, qui soit dans W'_0 argument par argument, il suffit de définir

[page 13]

$$\underbrace{iF}_{=(p\varphi)i} \xrightarrow{\bar{v}_0} i,$$

qui soit dans W' argument par argument, puisque W'_0 induit par W' et que $F \longmapsto iF$


$$\underline{\mathrm{Hom}}(C'_0, C'_0) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(C'_0, C')$$

est pleinement fidèle (i l'étant). Or il suffit de prendre


p. 9

$$\bar{v}_0 = v * i : (p\varphi) \circ i \longrightarrow \mathrm{id}_{C'} \circ i.$$

Pour résumer, il faut montrer que le composé des couples de foncteurs quasi-inverses marche dans les cinq cas suivants



D'ailleurs par dualité, on est ramené aux trois cas de Fibsc, Fibsc$_0$, Parf. (Peut-être le cas Fibsc$_0$, avec Φ_0 défini en termes de Φ et de C, se ramènera-t-il aux deux cas qui l'entourent, de Fibsc et Parf.)

Je vois que je dois rectifier le tir, tout d'abord parce que j'ai oublié que les foncteurs Φ, Ψ que j'avais en vue ne sont *pas* compatibles avec les localiseurs `[= localisateurs]` - une flèche $f : X \longrightarrow Y$ de Cat/S telle que la flèche correspondante dans Cat soit dans W, ne va pas induire une flèche dans Fibsc S ou Cofibsc S qui soit dans W sur chaque fibre. Ce n'est pas grave, car on peut remplacer les foncteurs par $\Phi' = \alpha'\Phi_0$, $\Psi' = \beta'\Psi_0$, qui sauf erreur doivent marcher. Mais en vue du Lemme précédent, il y a une perplexité, car j'ai l'air d'avoir prouvé que si $\mathcal{F}$ est une sous-catégorie pleine de Cat/S dont je suppose seulement qu'elle contient l'image essentielle d'une des trois catégories Fib$_0 S$, Cofib$_0 S$, ou Parf S, alors l'inclusion dans Cat/S induit une équivalence des catégories localisées, en prenant dans $\mathcal{F}$ comme localisateur celui induit par Cat/S, i.e.  est dans $W_{\mathcal{F}}$ si et seulement si en tant que flèche de Cat, f est dans W. Or ceci coïncide bien (via un théorème non trivial sur lequel je devrai revenir dans le cadre d'un localisateur fondamental général W) avec l'ensemble de flèches de localisation 'fibre par fibre', dans le cas de $\mathcal{F} =$ Parf S, Fibhot S, Fib$_0 S$, Cofib$_0 S$. [page 14]

Par contre, ce n'est nullement le cas en prenant $\mathcal{F} =$ Fib S, Liss S ou Cofib S. Ayant choisi dans ces catégories comme localisateurs la notion de W-équivalences 'fibre par fibre', j'ai donc l'air de dire que je trouve pour ces quatre catégories les *mêmes* localisées (à équivalence près) que si je prenais le localisateur beaucoup plus grossier hérité par Cat/S. Cela semble difficile à croire, et il faudra que je fasse très attention en démontrant les énoncés-clef. [page 15]

Pour voir que les flèches en traits pleins du grand diagramme p. 6 sont toutes compatibles avec les localis(at)eurs `[sic]`, donc aussi les flèches composées au moyen de celles-ci, j'ai à utiliser déjà ceci (pour le cas des flèches Liss $\longrightarrow$ Cat/S, Prop $\longrightarrow$ Cat/S) :

① Si X, Y lisses ou propres sur S, et $f : X \longrightarrow Y$ un S-foncteur, si $f_s : X_s \longrightarrow Y_s$ est dans W pour tout $s \in S$, alors $f \in W$. ([7]). p. 10

Cela renforce considérablement la condition L5 sur W, où on supposait que f est un foncteur *cartésien* entre catégories *fibrées* sur S. (À dégager, pour les différentes propriétés dont on a besoin pour W, à quelles propriétés standard on peut les ramener. Tout sera OK si $W = W_\infty$.)

I) **Définition de Φ, Ψ.** [page 16]

On va calquer la construction canonique de Ch$(X) \longrightarrow X \times X$ (ou Ch$_\infty(X) \longrightarrow X \times X$) factorisant $X \xrightarrow{\text{diag}} X \times X$, et la factorisation canonique correspondante d'un $f : X' \longrightarrow X$ en $X' \xrightarrow{i} \bar{X}' \xrightarrow{\bar{f}} Y$ `[plutôt` $\bar{X}' \xrightarrow{\bar{f}} X$`]`. On remplacera simplement Ch(X)

7. OK si on suppose L3 quater et L4.

par la sous-catégorie $\underline{\mathrm{Ch}}_+(X)$, laquelle n'est autre que la catégorie des flèches de X

$$\underline{\mathrm{Fl}}(X) = \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{\Delta}_1, X),$$

muni des foncteurs

$$X \xrightarrow{i_X} \underline{\mathrm{Fl}}(X) \xrightarrow{p_X=(\sigma_X,\beta_X)} X \times X,$$

où i_X est la flèche $x \longmapsto \mathrm{id}_x$, et σ_X, β_X sont les foncteurs source et but. La fibre de p_X en $(a, b) \in \mathrm{Ob}(X \times X)$ est la catégorie discrète définie par l'ensemble $\mathrm{Hom}(a, b)$, ça dépend grandement de (a, b) et pas seulement de sa composante connexe dans $X \times X$ - donc p_X n'a rien d'une Hot-fibration. Il n'est en géneral ni propre ni lisse ni rien, par contre les deux flèches composées avec pr_1 et pr_2

$$\begin{array}{ccc} & \underline{\mathrm{Fl}}(X) & \\ {\scriptstyle\sigma_X}\swarrow & & \searrow{\scriptstyle\beta_X} \\ X & & X \end{array}$$

sont sympathiques, on a en effet

Lemme. *On a* [page 17]

$$\sigma_X^{-1}(\{x\}) \simeq x\backslash X, \qquad \beta_X^{-1}(\{x\}) \simeq X/x.$$

Le foncteur σ_X est Cat*-fibrant à fibres contractiles (donc asphériques, donc W-asphériques), le foncteur β_X cofibrant à fibres contractiles (donc asphériques, donc W-asphériques). Ce sont donc aussi des* Hot*-équivalences, a fortiori des W-équivalences* ([8]).

Corollaire 1. *Le foncteur $i_X : X \longrightarrow \underline{\mathrm{Fl}}(X)$ est une* Hot*-équivalence* (puisque son composé avec la Hot-équivalence σ_X est l'identité).

Voici la construction générale de la factorisation de $f : X' \longrightarrow X$, correspondant au choix précédent d'une 'catégorie de chemins' $\mathcal{C}(X) = \underline{\mathrm{Fl}}(X)$ p. 11

$$\begin{array}{ccccc} \bar{X}' & & & & \\ {\scriptstyle i_f}\uparrow & \searrow^{\pi_f} & & \searrow^{\bar{f}} & \\ X' & \text{Cart.} & \underline{\mathrm{Fl}}(X) & \xrightarrow[\beta_X]{} & X \\ & {\scriptstyle f}\searrow & {\scriptstyle\sigma_X}\downarrow & & \\ & & X & & \end{array}$$

où i_f est déduit de la section i `[plutôt` i_X`]` de $\underline{\mathrm{Fl}}(X)$ sur X ([9]). Ainsi, $\bar{X}'$ est la catégorie des couples

$$\{(x', u) \mid x' \in \mathrm{Ob}\, X', \ \underbrace{u}_{\in \mathrm{Fl}\,(X)} : f(x') \longrightarrow y\},$$

le foncteur $\bar{f}$ est défini par

$$\bar{f}(x', u) = \mathrm{but}(u) = y$$

et i_f par

$$i_f(x') = (x', \mathrm{id}_{f(x')} : f(x') \xrightarrow{\mathrm{id}} f(x')),$$

donc on a bien

$$f(x') = \bar{f} i_f(x').$$

[page 18]

Corollaire 2. *Le foncteur*

$$\bar{f} : \bar{X}' \longrightarrow X$$

a comme fibres les catégories X'/x, il est cofibrant, les foncteurs de changement de base sont les foncteurs $X'/x \longrightarrow X'/y$ associés aux flèches $x \longrightarrow y$ dans X.

En fait, on voit que cette catégorie est non seulement cofibrée, mais canoniquement *scindée.*

([10]).

Appliquant ceci à des $f : X \longrightarrow S$, on trouve une construction

$$\mathrm{Cat}/S \xrightarrow{\Psi} \underline{\mathrm{Cofibsc}}\, S,$$

c'est bel et bien fonctoriel en X variant dans Cat/S. Si

$$\psi : X \longrightarrow Y$$

dans Cat/S, alors ψ induit des p. 12

$$\psi/s : X/s \longrightarrow Y/s\ ,$$

pour $s \in S$, et ceci de façon compatible avec les foncteurs 'cochangement de base' associés [page 19] aux $u : s \longrightarrow t$ dans S

$$\begin{array}{ccc} X/s & \xrightarrow{u_*^X} & X/t \\ {\scriptstyle \psi/s}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \psi/t} \\ Y/s & \xrightarrow{u_*^Y} & Y/t \end{array} \quad .$$

Cela définit donc un morphisme de catégories scindées sur S

$$\Psi(X) \longrightarrow \Psi(Y),$$

c'est lui !

On a un morphisme fonctoriel en X

$$X \xrightarrow{i_X} \Psi(X)$$

dans Cat/X, et c'est une Hot-équivalence, donc $\in W$. Sur les fibres, le morphisme i_X induit

$$X_s \xrightarrow{i_{X,s}} X/s,$$

l'inclusion canonique.

Corollaire 1. *Si $X \xrightarrow{f} Y$ dans Cat/S est dans W, alors $\Psi(X) \xrightarrow{\Psi(f)} \Psi(Y)$ aussi.* [page 20]

Mais on se gardera de croire que c'est dans W_S au sens de $\underline{\mathrm{Cofib}}\, S$ ou $\underline{\mathrm{Cofibsc}}\, S$.

Car sur les fibres de $\Psi(X)$, $\Psi(Y)$ on trouve les flèches

$$f/s : X/s \longrightarrow Y/s$$

8. En fait, ce sont même des homotopismes, cf. remarque marginale plus bas (plus générale - on retrouve le cas de σ_X en faisant $X' = X$.)

9. **NB** $\pi_f i_f = \mathrm{id}$, et $i_f \pi_f \longrightarrow \mathrm{id}$, donc i_f, π_f sont des homotopismes inverses l'un de l'autre dans Cat hot. Cela précise [le] cor. 3, page 18.

10. **Corollaire 3.** *La flèche $i_f : X' \longrightarrow \bar{X}'$ est un X-morphisme (si X' sur X par f, $\bar{X}'$ par $\bar{f}$), i.e. $f = \bar{f} \circ i_f$, et c'est une* Hot-*équivalence* (car $\pi_f : \bar{X}' \longrightarrow X'$ est Cat-fibrant, à fibres contractiles, donc une Hot-équivalence).

induits par f, qui n'ont aucune raison d'être dans W. Qu'elles le soient signifie que $f : X \longrightarrow Y$ est dans W 'localement au dessus de S' ([11]), ce qui (pour les W qui nous intéressent) est beaucoup plus fort que d'être dans W. (Si $Y = S$, cela signifie en fait que $p : X \longrightarrow S$ est W-asphérique, beaucoup plus fort que $p \in W$.)

Donc pour prouver que

$$\underline{\mathrm{Cofib}}\, S \longrightarrow \mathrm{Cat}/S \qquad \text{ou} \qquad \underline{\mathrm{Cofibsc}}\, S \longrightarrow \mathrm{Cat}/S$$

induisent des équivalences pour les catégories localisées, le foncteur Ψ directement ne sera pas utilisable. Cependant : p. 13

Corollaire 2. *Supposons X, Y dans $\underline{\mathrm{Prop}}\, S$ ou dans $\underline{\mathrm{Fibhot}}\, S$, et considérons*

$$\Psi(f) : \Psi(X) \longrightarrow \Psi(Y),$$

pour que ce soit une W-équivalence dans $\underline{\mathrm{Cofibsc}}\, S$, i.e. une W-équivalence fibre par fibre, il faut et il suffit que f soit une W-équivalence fibre par fibre (et cela doit impliquer ([12]) que f est une W-équivalence). [page 21]

En effet, dans le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X_s & \xrightarrow{f_s} & Y_s \\ \downarrow & & \downarrow \\ X/s & \xrightarrow{f/s} & Y/s \end{array}$$

les flèches verticales sont dans W, car X, Y [sont] propres sur S (ou X, Y dans $\underline{\mathrm{Fibhot}}\, S$), donc f_s est dans W si et seulement si f/s l'est.

[Le foncteur] Φ se définit de façon duale à Ψ, ce qui revient à échanger les rôles de σ_X, β_X dans le diagramme page 17.

([13])

II) Définition de $C : \mathrm{Cat}/S \longrightarrow \underline{\mathrm{Parf}}\, S$

Cette fois, c'est la factorisation des flèches $p : X \longrightarrow S$ dans Cat, en

$$X \xrightarrow{j_{X/S}} \bar{X} \xrightarrow{\bar{p}} S,$$

où i_X [plutôt $j_{X/S}$] est une Hot-équivalence (donc dans W), et $\bar{p}$ parfait. Cela se construit formellement comme tantôt, en utilisant $\underline{\mathrm{Ch}}_\infty(S)$ au lieu de $\underline{\mathrm{Fl}}(S)$, et la factorisation

$$S \xrightarrow{j_S} \underline{\mathrm{Ch}}_\infty(S) \xrightarrow{p_S=(\sigma_S,\beta_S)} S \times S$$

de $\mathrm{diag}_S : S \longrightarrow S \times S$. La situation est plus jolie, car p_S est déjà 'parfait', ce qui implique formellement que le $\bar{p}$ qui s'en déduit, pour factoriser $p : X \longrightarrow S$, est lui-même parfait.

Ici encore, la construction est fonctorielle, on trouve le foncteur

p. 14

$$C : \mathrm{Cat}/S \longrightarrow \underline{\mathrm{Parf}}\, S$$

[page 22]

qu'il faut composer au foncteur en sens inverse

$$r : \mathrm{Cat}/S \longleftarrow \underline{\mathrm{Parf}}\, S.$$

11. cf. (1) page 15.
12. cf. (1) page 15.
13. **Corollaire 3.** *Si $X \in Ob\, \underline{\mathrm{Fibhot}}\, S$, alors $\Psi(X)$ est dans $\underline{\mathrm{Fibsc}}_0 S$.*

Cela signifie en effet que les $X/s \longrightarrow X/t$ sont dans W, or l'hypothèse sur X implique que c'est dans W_∞. OK.

Tout d'abord, vérifions que C, tout comme r, est compatible avec les localiseurs. Soit $f : X \longrightarrow Y$ dans Cat/S, supposons f est dans W, prouvons $C(f)$ est dans W_S. On a commutativité dans

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ {\scriptstyle j_X}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j_Y} \\ CX & \xrightarrow{Cf} & CY \end{array}$$

et j_X, j_Y sont dans W, donc f est dans W si et seulement si Cf l'est. Mais dans le cas $W = W_\infty$ on sait que cela équivaut à ce que Cf soit dans W_∞ fibre par fibre. Admettant ① p. 15 pour W, il reste à s'assurer d'une réciproque dans Parf, i.e.

② Soit $\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & S & \end{array}$ dans Parf S (ou seulement dans Fibhot S). Si f est dans W, alors les $f_s : X_s \longrightarrow Y_s$ aussi.

Essayons de le prouver, en calquant la démonstration dans le cas $C = C_\infty$ (XI, th. 2). [page 23]
On peut supposer S connexe ([14]), en utilisant La (i.e. $W \subseteq W_0$) et en admettant le

Lemme. *Soit $f : X \longrightarrow Y$ dans* Cat. *Alors $f \in W$ si et seulement si $\pi_0(f)$ est bijectif, et pour toute composante connexe X_i de X, si Y_i est la composante connexe correspondante de Y, $f_i : X_i \longrightarrow Y_i$ induit par f est dans W.*

Utilisons alors l'existence de

$$S' \longrightarrow S$$

Hot-fibration avec S' Hot-asphérique ([15]). On peut supposer même que $S' \longrightarrow S$ est parfait. Supposons qu'on sache qu'un changement de base par de telles fibrations parfaites transforme W-équivalences en itou. (Ça doit être vrai pour les W_i, mais on a vu que c'était faux pour l'équivalence k-homologique, cf. I p. 87 ff.) Alors $X' \xrightarrow{f'} Y'$ sur S' est une W-équivalence. Or pour $s' \in S'$, comme $\{s'\} \longrightarrow S'$ est une Hot-équivalence (S' p. 15
Hot-asphérique), et X', Y' étant Hot-fibrés sur S, il s'ensuit que $X'_{s'} \longrightarrow X'$, $Y'_{s'} \longrightarrow Y'$ sont des Hot-équivalences, donc aussi $X'_{s'} \xrightarrow{f'_{s'}} Y'_{s'}$, comme on voit sur le carré commutatif

$$\begin{array}{ccc} X'_{s'} & \xrightarrow{f'_{s'}} & Y'_{s'} \\ {\scriptstyle \wr}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \wr} \\ X' & \xrightarrow{f'} & Y'. \end{array}$$

Comme $S' \longrightarrow S$ est surjectif, cela montre que les $f_s : X_s \longrightarrow Y_s$ sont dans W, qed. [page 24]

Ainsi, (2) sera conséquence de ②. Soit $p : Y' \longrightarrow Y$ une Hot-fibration (ou même un foncteur parfait, si ça peut aider …). Soit $f : X \longrightarrow Y$ une S-flèche (dans Cat/S), alors $f' : X' \longrightarrow Y'$ par changement de base. Si $f \in W$, $f' \in W'$

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{q} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & \text{cart.} & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{p} & Y \end{array} \qquad f \in W \text{ et } p \text{ parfait} \Longrightarrow f' \in W$$

14. ne sert à rien

15. **NB** Il suffit d'avoir une Hot-fibration $S' \longrightarrow S_0 \hookrightarrow S$, où S_0 est la composante connexe de S contenant l'élément $s \in \mathrm{Ob}\, S$ envisagé.

En tous cas, il nous faut absolument ② pour pouvoir conclure que C est compatible avec les localiseurs.

Considérons $rC : \mathrm{Cat}/S \longrightarrow \mathrm{Cat}/S$, on a une flèche

$$\begin{cases} \mathrm{id}_{\mathrm{Cat}/S} \xrightarrow{j} rC \\ j_X : X \longrightarrow CX \quad \text{la flèche canonique } i_{X/S} \text{ [plutôt } j_{X/S}\text{]} \text{ (p. 21)}, \end{cases}$$

et j_X est toujours dans W.

Considérons $Cr : \underline{\mathrm{Parf}}\, S \longrightarrow \underline{\mathrm{Parf}}\, S$, i.e. appliquons la construction C à un X parfait sur S. Alors on a encore

$$\begin{cases} \mathrm{id}_{\underline{\mathrm{Parf}}\, S} \xrightarrow{j'} Cr \\ j'_X = j_{r(X)} : X = r(X) \xrightarrow{j_X} CX. \end{cases}$$

Ce morphisme est dans W, donc aussi une W-équivalence fibre par fibre, puisque source et but sont parfaits, donc des Hot-fibrés sur S.

Cela prouve déjà que les foncteurs r et C induisent des équivalences quasi-inverses l'une de l'autre sur les catégories localisées. Par le lemme p. 11, cela montre que pour toute sous-catégorie pleine $\mathcal{F}$ de Cat/S contenant $\underline{\mathrm{Parf}}\, S$, l'inclusion de $\mathcal{F}$ dans Cat/S induit une équivalence sur les localisés, en prenant comme localiseur dans $\mathcal{F}$ le localiseur 'grossier' induit par Cat/S. Cela s'applique notamment aux sous-catégories pleines [page 25] p. 16

$$\underline{\mathrm{Liss}}\, S, \quad \underline{\mathrm{Fibhot}}\, S, \quad \underline{\mathrm{Prop}}\, S,$$

mais en prenant dans $\underline{\mathrm{Liss}}\, S$ et $\underline{\mathrm{Prop}}\, S$ non pas le localiseur fin 'fibre par fibre', comme je l'avais annoncé à tort, mais le localiseur grossier induit par Cat/S. (Pour $\underline{\mathrm{Fibhot}}\, S$, il n'y a pas de risque d'ambiguïté). Il faudrait que je me convainque que si je prends la W-équivalence fine (dans le cas $W = W_\infty$, disons), je ne trouve *pas* les 'bons' localisés, i.e. le foncteur des localisés, vers le localisé de Cat/S, n'est pas une équivalence. Ceci en fait suppose que dans $\underline{\mathrm{Fib}}\, S$ et $\underline{\mathrm{Cofib}}\, S$ également, c'est l'équivalence *grossière* qu'il convient [page 26] de prendre. (Dans $\underline{\mathrm{Fib}}_0 S$ et $\underline{\mathrm{Cofib}}_0 S$, ou $\underline{\mathrm{Fibsc}}_0 S$ et $\underline{\mathrm{Cofibsc}}_0 S$, les deux équivalences sont identiques, puisque ces quatre catégories sont contenues dans $\underline{\mathrm{Fibhot}}\, S$.) La suite nous montrera s'il en est bien ainsi. Par contre, dans $\underline{\mathrm{Fibsc}}\, S$ et $\underline{\mathrm{Cofibsc}}\, S$, il n'y a pas de doute, suivant les principes généraux de construction d'un dérivateur à partir d'un $(\mathcal{M}, W)$, qu'il faut prendre l'équivalence fine, fibre par fibre. À ce sujet, il faut faire attention que les foncteurs verticaux du diagramme p. 8

$$\underline{\mathrm{Fibsc}}\, S \longrightarrow \underline{\mathrm{Fib}}\, S, \quad \underline{\mathrm{Cofibsc}}\, S \longrightarrow \underline{\mathrm{Cofib}}\, S,$$

quoique essentiellement surjectifs et fidèles, ne sont pas pleinement fidèles. Ils le seraient, et mêmes des équivalences de catégories, si dans $\underline{\mathrm{Fib}}\, S$ resp. $\underline{\mathrm{Cofib}}\, S$ je me bornais aux S-foncteurs *cartésiens* resp. *cocartésiens*. Donc on peut interpréter, à équivalence près, $\underline{\mathrm{Fibsc}}\, S$ et $\underline{\mathrm{Cofibsc}}\, S$ comme $\underline{\mathrm{Fib}}\, S$ et $\underline{\mathrm{Cofib}}\, S$, où on aurait restreint les morphismes aux seuls S-foncteurs *cartésiens* resp. *cocartésiens*. Il semblerait donc qu'en restreignant ainsi les flèches, mais en restreignant de façon plus draconienne encore le localiseur, on trouve des catégories localisées équivalentes.

C'est assez étrange - on va voir si c'est bien vrai! [page 27]

III) Construction de Φ_0, Ψ_0 : $\mathrm{Cat}/S \to \underline{\mathrm{Fibsc}}_0 S$, $\mathrm{Cat}/S \to \underline{\mathrm{Cofibsc}}_0 S$.

On doit avoir

$$\Phi_0(X) = \Phi rC(X) \qquad \Psi_0(X) = \Psi rC(X),$$

où

$$r : \underline{\mathrm{Parf}}\, S \longrightarrow \mathrm{Cat}/S$$

est l'inclusion canonique. En tant que foncteurs à valeurs dans Fibsc resp. Cofibsc, cela définit déjà Φ_0, Ψ_0 par

$$\Phi_0 = \Phi rC \qquad \Psi_0 = \Psi rC,$$

mais il faut voir que Φ_0, Ψ_0 prennent leurs valeurs dans les sous-catégories pleines à indice 0. Cela équivaut donc au Lemme suivant, appliqué à $Y = rC(X)$: p. 17

Lemme. *Soit Y parfait sur S (ou seulement un* Hot*-fibré sur S). Alors $\Phi(Y)$ est dans $\underline{\mathrm{Fibsc}}_0 S$, $\Psi(Y)$ dans $\underline{\mathrm{Cofibsc}}_0 S$.*

Il faut prouver (pour $\Psi(Y)$) que si $s \longrightarrow t$ est une flèche dans S, alors

$$\Psi(Y)_s \longrightarrow \Psi(Y)_t$$

est une W-équivalence. Or cette flèche s'identifie à

$$Y/s \longrightarrow Y/t$$

et on sait bien que c'est une Hot-équivalence, par définition des Hot-fibrés, donc c'est une W-équivalence. [page 28]

On a donc les foncteurs

$$\underline{\mathrm{Fibsc}}_0 S \underset{\Phi_0}{\overset{p}{\rightleftarrows}} \mathrm{Cat}/S,$$

il faut voir qu'ils satisfont aux conditions générales du lemme p. 11 (et ce sera pareil pour q, Ψ_0). On sait déjà que p est compatible avec les localiseurs. Prouvons le pour Ψ_0. Soit

$$f : X \longrightarrow Y$$

dans Cat/S une W-équivalence, alors $rC(f)$ l'est aussi. Il suffit de prouver ceci :

Soit

$$q : X' \longrightarrow Y'$$

un morphisme dans $\underline{\mathrm{Fibhot}}\, S$ (par exemple un morphisme de $\underline{\mathrm{Parf}}\, S$), qui soit W-équivalence, donc `[qui induit]` des W-équivalences sur les fibres. Alors $\Psi(q) : \Psi(X') \longrightarrow \Psi(Y')$ est une W-équivalence fibre par fibre, i.e.

$$X'/s \longrightarrow Y'/s$$

une W-équivalence pour tout $s \in S$ (a été vu dans le corollaire 2, page 20).

Considérons [page 29]

$$p\Phi_0 : \mathrm{Cat}/S \longrightarrow \mathrm{Cat}/S,$$ p. 18

ça transforme donc X en $\Phi C(X)$, regardé comme objet de Cat/S sans plus. On a un morphisme fonctoriel

$$X \xrightarrow{j_X} C(X) \qquad\qquad j : \mathrm{id}_{\mathrm{Cat}/S} \longrightarrow C,$$

d'où un morphisme fonctoriel

$$\Phi(X) \xrightarrow{\Phi(j_X)} \Phi C(X) \qquad\qquad \Phi * j : \Phi \longrightarrow \Phi_0$$

et également un morphisme fonctoriel

$$X \xrightarrow{i_X} \Phi(X),$$

d'où en composant

$$X \xrightarrow{i_X} \Phi(X) \xrightarrow{\Phi(j_X)} \Phi C(X), \qquad X \xrightarrow{\alpha_X} \Phi C(X),$$

i.e.

$$\alpha : \mathrm{id}_{\mathrm{Cat}/S} \longrightarrow p\Phi_0.$$

Pour X fixé dans Cat/S, on sait que j_X est dans W, donc aussi $\Phi(j_X)$ (quoique non fibre par fibre), cf. cor. 1 page 20. On sait aussi que i_X est dans W, donc aussi le composé α_X.

Considérons

$$\Phi_0 p : \underline{\mathrm{Fibsc}}_0\, S \longrightarrow \underline{\mathrm{Fibsc}}_0\, S \quad .$$

On part de X dans $\underline{\mathrm{Fibsc}}_0\, S$, on oublie le scindage et le fait même qu'il soit Cat-fibrant (on a appliqué p), on lui applique Φ_0, i.e. on regarde ΦCX comme objet de $\underline{\mathrm{Fibsc}}\, S$ (et même de $\underline{\mathrm{Fibsc}}_0\, S$). On veut définir encore [page 30]

$$X \xrightarrow{\beta_X} \Phi_0 p(X) = \Phi C(X) \qquad \textbf{dans } \underline{\mathrm{Fibsc}}_0\textbf{,}$$

fonctoriel en X. Or on a comme tantôt

$$X \xrightarrow{j_X} C(X),$$

d'où en appliquant Φ

$$\Phi(X) \xrightarrow{\Phi(j_X)} \Phi C(X),$$

mais regardé cette fois comme flèche dans $\underline{\mathrm{Fibsc}}_0\, S$ (N.B. on a bien $\Phi(X)$ dans $\underline{\mathrm{Fibsc}}_0\, S$, car X, provenant de $\underline{\mathrm{Fibsc}}_0\, S$, est dans $\underline{\mathrm{Fibhot}}\, S$, et on applique la remarque 'Cor. 3' page 21.) D'autre part, on a une flèche dans Cat/S

$$X \xrightarrow{i_X} \Phi(X),$$

est-elle une flèche dans $\underline{\mathrm{Fibsc}}_0(S)$, i.e. est-elle cartésienne? On voit tout de suite que non, que l'on a seulement, pour une flèche $u : s \longrightarrow t$ dans S, un homomorphisme de commutation (pas un isomorphisme) dans

p. 19

$$\begin{array}{ccc} X_s & \xrightarrow{u_*^X} & X_t \\ \downarrow{\scriptstyle i_s} & \overset{\alpha}{\nearrow} & \downarrow{\scriptstyle i_t} \\ X/s & \xrightarrow[=u_*^{\Phi(X)}]{(\mathrm{id}_X)/u} & X/t \end{array}$$

[page 31]

Donc il me faut remballer ! On peut considérer i_X au mieux comme une flèche de $\underline{\mathrm{Fib}}_0\, S$, et en prenant les composés on trouve une flèche dans $\underline{\mathrm{Fib}}_0\, S$:

$$X \xrightarrow{i_X} \Phi(X) \xrightarrow{\Phi(j_X)} \Phi C(X), \qquad \beta_X (= \alpha_X)$$

i.e. (regardant maintenant Φ_0 comme foncteur à valeurs dans $\underline{\mathrm{Fib}}_0\, S$) un homomorphisme de foncteurs

$$\beta : \mathrm{id}_{\underline{\mathrm{Fib}}_0} S \longrightarrow \Phi_0 p_0,$$

où $p_0 : \underline{\mathrm{Fib}}_0 S \hookrightarrow \mathrm{Cat}/S$ est l'inclusion canonique. Ce β est dans W argument par argument, et de même pour α page 29, interprété cette fois comme

$$\mathrm{id}_{\mathrm{Cat}/S} \longrightarrow p_0 \Phi_0.$$

Ce qu'on a prouvé finalement est ceci :

Théorème-remballage. *Soit $\mathcal{F}$ une sous-catégorie pleine de* Cat/S *qui contient une des trois sous-catégories pleines* $\underline{\mathrm{Fib}}_0 S$, $\underline{\mathrm{Parf}}\, S$, $\underline{\mathrm{Cofib}}_0 S$, *et munissant $\mathcal{F}$ du localiseur W 'grossier' (induit par celui de* Cat/S*). Alors l'inclusion*

$$\mathcal{F} \longrightarrow \mathrm{Cat}/S$$

induit une équivalence sur les localiseurs.

Par contre, les catégories localisées des quatre catégories de fibrés scindés

$$\underline{\mathrm{Fibsc}}\, S, \quad \underline{\mathrm{Cofibsc}}\, S, \quad \underline{\mathrm{Fibsc}}_0 S, \quad \underline{\mathrm{Cofibsc}}_0 S$$

[page 32]

échappent à nos arguments. *Et pour cause !* Il est totalement ouvert, sur S connexe disons (p. ex. $S = \mathbf{\Delta}^1$), que pour un type d'homotopie relatif ξ sur S, les types induits ξ_s ($s \in S$) forment un système local sur S, à valeurs dans Hot_W, comme ce serait le cas si le théorème annoncé au début était vrai. Au contraire, *toute* flèche de Hot_W doit provenir d'un objet de $\mathrm{Hot}_W(\mathbf{\Delta}^1)$. Les localisés des 9 autres catégories du diagramme p. 8, et de toutes celles dont il est question dans le théorème qu'on vient de prouver, doivent correspondre 'visiblement' aux sous-catégories pleines de $\mathrm{HOT}_W(S)$ formées des HOT-coefficients localement constants sur S.

Aussi, je me rends compte que c'était absurde de m'attendre à ce que $\underline{\mathrm{Fibsc}}\, S$ et $\underline{\mathrm{Cofibsc}}\, S$ donnent des catégories localisées canoniquement équivalentes. Car les éléments ξ de la première des deux catégories donnent naissance chacun à un foncteur contravariant sur S

$$\bar{\xi} : S^o \longrightarrow \mathrm{Hot}_W,$$

p. 20

ceux η de la seconde (qui n'est autre que $(\underline{\mathrm{Fibsc}}(S^o))^o$) donnent naissance chacun à un foncteur *covariant*

[page 33]

$$\bar{\eta} : S \longrightarrow \mathrm{Hot}_W,$$

ce qui n'est pas pareil ! Ce n'est 'pareil' que si ce sont des coefficients locaux, ce qui signifie exactement que ξ est dans $\underline{\mathrm{Fibsc}}_0 S$ resp. η dans $\underline{\mathrm{Cofibsc}}_0 S$. On s'attend donc bien (1°) que les flèches

$$\underline{\mathrm{Fibsc}}_0 S \longrightarrow \underline{\mathrm{Fib}}_0 S, \quad \underline{\mathrm{Cofibsc}}_0 S \longrightarrow \underline{\mathrm{Cofib}}_0 S$$

induisent des équivalences sur les localisés (chose que j'ai été incapable de prouver tantôt) ([16]). Par contre, il est pire que déraisonnable de s'attendre à ce qu'il en soit de même pour les foncteurs

$$\underline{\mathrm{Fibsc}}_0 S \longrightarrow \underline{\mathrm{Fibsc}}\, S, \quad \underline{\mathrm{Cofibsc}}_0 S \longrightarrow \underline{\mathrm{Cofibsc}}\, S,$$

16. Les quasi-inverses étant bel et bien donnés par Φ_0, Ψ_0 - car [?] par quoi d'autre donc ???

ça devrait donner par localisation les foncteurs pleinement fidèles d'inclusion, des catégories d'objets localement constants dans $\mathrm{HOT}_W(S)$ resp. dans $(\mathrm{HOT}_W(S^o))^o$. Et de même pour les foncteurs induits sur les localisés par [page 34]

$$(*) \qquad \underline{\mathrm{Fibsc}}\, S \longrightarrow \underline{\mathrm{Fib}}\, S, \quad \underline{\mathrm{Cofibsc}}\, S \longrightarrow \underline{\mathrm{Cofib}}\, S.$$

Comme les localisés des catégories but de ces deux foncteurs ont tout l'air de s'identifier aux sous-catégories précédentes d'objets localement constants, il semblerait donc que : (2°) Les foncteurs précédents définissent des rétractions de la catégorie $\mathrm{HOT}_W(S)$ resp. $\mathrm{HOT}_W(S^o)^o$ sur la sous-catégorie des objets localement constants sur S, les foncteurs localisés des foncteurs d'inclusion

$$\underline{\mathrm{Fibsc}}_0 S \longrightarrow \underline{\mathrm{Fibsc}}\, S, \quad \underline{\mathrm{Cofibsc}}_0 S \longrightarrow \underline{\mathrm{Cofibsc}}\, S$$

étant pleinement fidèles et ayant comme images essentielles les sous-catégories en question.

Cette rétraction m'apparait comme une chose tout à fait mystérieuse. C'est lié au fait que pour le dérivateur très spécial $\mathbf{D} = \mathrm{HOT}$, quand on a un $\xi \in \mathbf{D}(S)$, on en déduit (à HOT/S-équivalence près) un type de diagramme X au dessus de S, qu'on peut regarder [page 35] alors (via la construction C) comme définissant un type d'homotopie relatif *localement constant* sur S.

Donc pour élucider la situation, i.e. les relations entre les 13 catégories localisées provenant du diagramme de la page 8, il reste à regarder si les assertions hypothétiques que je viens de faire sont bien valables, savoir p. 21

(1°) Le foncteur déduit de

$$\underline{\mathrm{Fibsc}}_0 S \longrightarrow \underline{\mathrm{Fib}}_0 S$$

par passage aux localisés est une équivalence de catégories (et on peut dans cette question remplacer $\underline{\mathrm{Fib}}_0 S$ par n'importe quelle autre sous-catégorie pleine de Cat/S la contenant - cela revient au même), et


(2°) Le foncteur déduit de

$$\underline{\mathrm{Fibsc}}_0 S \longrightarrow \underline{\mathrm{Fibsc}}\, S$$

par localisation est pleinement fidèle. (Que son image soit exactement formée des objets localement constants du premier localisé, interprété comme $\mathrm{HOT}_W(S)$, est tautologique.)

Il n'y a plus lieu de se soucier du côté cofibrés, puisque tout ce qu'on pourra en dire [page 36] revient à ce que je viens d'expliciter, pour X^o au lieu de X.

Dans la direction de (1°), nos arguments précédents à coups de Φ_0, p nous donnent déjà un renseignement utile. Mais il sera plus commode à présent de laisser tomber $\underline{\mathrm{Fib}}_0 S$ ou plutôt, de le remplacer par $\underline{\mathrm{Fib}}\, S$ (ce qui est licite, on l'a dit dans (1°)), de sorte qu'on a maintenant un diagramme commutatif (traits pleins)



où i est une inclusion (strictement) pleinement fidèle, j (donc aussi k) fidèle. Enfin, on a un foncteur canonique ψ $(= \Phi_0)$ (en pointillés). Les localiseurs sur la ligne du haut sont les localiseur fins (pour $\underline{\mathrm{Fibsc}}_0 S$ c'est pareil que la W-équivalence grossière), sur $\underline{\mathrm{Fib}}\, S$ [page 37]

par contre on prend la W-équivalence grossière. (On sait que le localisé est le même, à équivalence près, que si on se restreint à la sous-catégorie pleine $\underline{\mathrm{Fib}}_0 S$, ce qui est assez remarquable.

Tous les quatre foncteurs i, j, k, Φ_0 sont compatibles aux localiseurs, donc passent aux localisés p. 22

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{HOT}_W(S) & \xleftarrow{\quad\bar{\imath}\quad} & \mathrm{HOT}^?_W(S) \\ & {\scriptstyle\bar{j}}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle\bar{k}} \quad \uparrow{\scriptstyle\bar{\psi}} & \\ & \mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S), & \end{array}$$

où l'exposant ? dans la notation signifie que je ne sais interpréter cette catégorie, sauf si je prouve que $\bar{k}$ est une équivalence, et l'exposant lc dans la catégorie du bas dois suggerer l'intuition qu'il s'agit en tous cas d'une sorte de 'types d'homotopie relatifs' (dans un sens modifié) *localement constants* sur S. Le problème est de comprendre ce diagramme. La conjecture naturelle est

1°) $\bar{k}$ est une équivalence. (Ce qui implique que $\bar{\psi}$ est l'équivalence quasi-inverse, que $\bar{k}$, $\bar{\psi}$ permettent essentiellement d'identifier $\mathrm{HOT}^?_W$ et $\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W$, de sorte que $\bar{\imath}$ et $\bar{\jmath}$ deviennent des foncteurs entre HOT_W et $\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W$.)

2°) $\bar{\imath}$ est pleinement fidèle (NB l'image essentielle est bien comprise de toutes façons.)

En direction de 1°), je sais pour l'instant que l'on a [page 38]

$$\bar{k}\bar{\psi} \simeq \mathrm{id}_{\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S)},$$

donc $\bar{k}$ est essentiellement surjectif (sur les objets), et induit des *surjections* sur les $\mathrm{Hom}(-,-)$, tandis que $\bar{\psi}$ est injectif sur les classes d'isomorphismes d'objets, et sur les $\mathrm{Hom}(-,-)$ (i.e. *fidèle*).

Si les relations entre $\mathrm{HOT}^?_W$ et $\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W$ s'avèrent imbitables (p. ex. $\bar{\psi}$ pas même pleinement fidèle, i.e. $\bar{k}$ pas même fidèle), alors la catégorie $\mathrm{HOT}^?_W$ mérite d'être larguée dans la corbeille, et on ne gardera que

$$\begin{array}{c} \mathrm{HOT}_W(S) \\ {\scriptstyle\bar{\jmath}}\downarrow \quad \uparrow{\scriptstyle\bar{\psi}'} \\ \mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S), \end{array}$$

où on définit $\bar{\psi}'$ comme

$$\bar{\psi}' = \bar{\imath}\bar{\psi} = \overline{i\psi}.$$

Et la question (plus modeste) devient à présent :

3°) $\bar{\psi}'$ est-il pleinement fidèle ? (L'image *essentielle* est la même que celle de $\underline{\mathrm{Fib}}_0$ ($\approx \underline{\mathrm{Fib}}$), elle est formée sauf erreur des objets localement constants - à vérifier au besoin …)

Il est difficile d'imaginer que $\bar{k}$, ou ce qui revient au même $\bar{\psi}$, puisse être une équivalence, sans qu'il existe au moins une 'W_S-homotopie' p. 23 [page 39]

$$\mathrm{id}_{\underline{\mathrm{Fibsc}}_0 S} \leftrightarrow \leftrightarrow \overset{h}{\leftrightarrow} \leftrightarrow \leftrightarrow \psi k$$

dans la catégorie des endofoncteurs de $\underline{\mathrm{Fibsc}}_0 S$. À vrai dire, je me rends compte maintenant que la description de $\bar{\psi}$ à partir de $\psi : X \longmapsto \Phi_0 X = \Phi C X$ est inutilement compliquée, car on avait fait le détour par $C(X)$ uniquement pour être sûr de tomber

dans $\underline{\mathrm{Fibsc}}_0 S$, pas seulement dans $\underline{\mathrm{Fibsc}}\, S$. Mais si on laisse tomber $\underline{\mathrm{Fibsc}}_0 S$, on s'en fout, et le foncteur $\Phi : X \longmapsto \Phi(X)$ est beaucoup plus naturel. Et si on ne laisse pas tomber, il n'y a pas d'inconvénient de remplacer la source $\underline{\mathrm{Fib}}\, S$ par $\underline{\mathrm{Fib}}_0 S$ (qui a même localisé, à équivalence près), et sur $\underline{\mathrm{Fib}}_0 S$ à nouveau il n'y a pas lieu de s'encombrer de CX, pour le plaisir de lui appliquer Φ, car $\Phi(X)$ lui-même est déjà dans $\underline{\mathrm{Fibsc}}_0 S$.

Donc, la question est celle-ci : Si X varie [page 40]

dans $\underline{\mathrm{Fibsc}}_0 S$, y-a-t'il une homotopie dans $\underline{\mathrm{Fibsc}}_0 S$, 'naturelle', i.e. fonctorielle en X,

$$X \xrightarrow{\quad c \quad} \Phi(X) = \text{ Catégorie fibrée scindée de fibres les } s\backslash X$$

Mais un chemin qui soit formé de flèches

$$X = X_0 \text{ —— } X_1 \text{ —— } X_2 \cdots \text{ —— } X_n = \Phi(X)$$

qui soient toutes cartésiennes (et de plus, bien sûr, dans W !). Cela signifie donc qu'on aurait des catégories fibrées scindées sur S, X_1, ..., X_{n-1}, dépendant *fonctoriellement* de X, qui relient

$$X = X_0 \qquad \text{à} \qquad \Phi(X) = X_n$$

i.e.

$$X_s \qquad \text{à} \qquad s\backslash X \qquad ???$$

Je ne vois rien à l'horizon.

15.11.90

p. 24

Je crois qu'j'ai enfin compris, cette nuit, la situation exacte. Il y a lieu, dans Cat/S et dans les autres catégories du diagramme p. 8 (s'envoyant toutes dans Cat/S) d'envisager quatre sortes de 'W-équivalences'. [page 41]

$$f : X \longrightarrow Y \qquad \searrow \quad \swarrow \qquad S$$

a) La *W-équivalence 'grossière'* : dans Cat/S est une W-équivalence grossière si en tant que flèche de Cat, c'est une W-équivalence. ([17]).

b) La *W-équivalence 'par fibres'* (sur S) : $\forall\ s \in S$, $f_s : X_s \longrightarrow Y_s$ est une W-équivalence. ([18]).

c) La *W-équivalence 'locale sur S'* : $\forall\ s \in S$, $f/s : X/s \longrightarrow Y/s$ est une W-équivalence. Signifie que c'est une W-équivalence, et le reste par tout changement de base $S' \longrightarrow S$ qui est un isomorphisme local. ([19]).

c') La *W-équivalence 'colocale sur S'* : $\forall\ s \in S$, $s\backslash f : s\backslash X \longrightarrow s\backslash Y$ est une W-équivalence. Signifie que c'est une W-équivalence, et le reste par tout changement de base $S' \longrightarrow S$ qui est un co-isomorphisme local. ([20]).

Je vais résumer dans un énoncé récapitulatif les relations entre ces quatre notions de W-équivalence, en pensant au cas $W = W_\infty$. Une fois la chose faite, je me préoccuperai de dégager les conditions minimales sur un W général qui assurent que c'est vrai pour W.

$$f : X \longrightarrow Y \qquad \searrow \quad \swarrow \qquad S$$

Proposition 1. *Soit* *dans* Cat/S.


17. stable par changement de base à la fois lisse et propre, plus généralement si $S' \longrightarrow S$ est une Hot-fibration.

18. stable par tout chagement de base $S' \longrightarrow S$


19. devrait être stable par changement de base *lisse* $S' \longrightarrow S$

20. devrait être stable par changement de base *propre* sur S

1) *La W-équivalence locale sur S, et la W-équivalence colocale sur S, impliquent la W-équivalence grossière :*



2) *Si X, Y sont propres sur S, ou X, Y lisses sur S, ou X, Y des* Hot-*fibrés sur S, alors la W-équivalence par fibres implique que c'est une W-équivalence* universelle *sur S (W-équivalence, et le reste par* tout *changement de base $S' \longrightarrow S$), donc dans ces trois cas, on a* p. 25



([21]).


Mais on peut préciser chacun de ces trois cas :

(2 fib) *Si X, Y sont* Hot-*fibrés sur S, alors la W-équivalence grossière de f implique que c'est une W-équivalence par fibres, donc les quatre notions de W-équivalence sont équivalentes pour f.*

$$\mathrm{a} \Longleftrightarrow \mathrm{c} \Longleftrightarrow \mathrm{c}' \Longleftrightarrow \mathrm{b}$$


([22])

(2 lisse) *Si X, Y sont lisse sur S, alors la W-équivalence par fibres sur S équivaut à la W-équivalence colocale sur S et implique la W-équivalence* universelle *sur S, donc dans ce cas* [page 42]



([23]). p. 26

(2 prop) *Si X, Y sont propres sur S, alors la W-équivalence par fibres sur S équivaut à la W-équivalence locale sur S :*



([24]).

21. Il suffit X, Y W-propres sur S, ou W-lisses sur S, ou W-fibrés sur S.
22. a $\Longrightarrow$ b seulement moyennant L5, voir ci-dessous p. 43.
23. il suffit même X, Y W-lisses sur S.
24. Il suffit même X, Y W-propres sur S.

Démonstration 1) n'est autre que L4 ([25]) et son dual L4′ pour un localiseur fondamental W, et on a vu que si on suppose L1, L3, alors L4 équivaut à L4′, et dans la notion de localiseur fondamental on supposera toujours que c'est vérifié. Également, nous supposons que L3 est vrai même sous la forme plus forte L3 quater (p. 1) : $W_\infty \subseteq W$, i.e. toute Hot-équivalence est une W-équivalence.

(2 lisse) Si X, Y `[sont]` lisses sur S, alors les $X_s \longrightarrow s\backslash X$, $Y_s \longrightarrow s\backslash Y$ sont des W_∞-équivalences, donc des W-équivalences (il suffirait même que X, Y soient W-lisses/S), donc le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X_s & \xrightarrow{f_s} & Y_s \\ {\scriptstyle i_s^X}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i_s^Y} \\ s\backslash X & \xrightarrow{s\backslash f} & s\backslash Y \end{array}$$

nous montre que f_s est une W-équivalence si et seulement si $s\backslash f$ l'est, d'où b $\Longleftrightarrow$ c′. Pour voir que la W-équivalence par fibres est même une W-équivalence *universelle* sur S, on est ramené à montrer que c'est une W-équivalence grossière (puisque la lissité `[est]` stable par changement de base sur S), et on gagne puisque c′ $\Longrightarrow$ a par 1).

Le cas (2 propre) est dual.

(2 fib) Si X, Y sont des Hot-fibrés sur S, alors les inclusions p. 27 `[page 43]`

$$X_s \longrightarrow s\backslash X, \qquad X_s \longrightarrow X/s,$$

et de même pour Y, sont des W_∞-équivalences, donc des W-équivalences (il suffirait même que X, Y soient des W-fibrations sur S ([26]), i.e. par définition que les foncteurs précédents soient des W-équivalences, et que la même condition soit satisfaite après tout changement de base sur S), l'argument dans le cas lisse resp. propre montre déjà que

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{c} & \Longleftarrow & \mathrm{b} & \Longleftrightarrow & \mathrm{c}' \\ & & \Downarrow & & \\ & & \mathrm{a}, & & \end{array}$$

et que la W-équivalence par fibres (ou la W-équivalence locale sur S, resp. colocale sur S) implique déjà la W-équivalence *universelle* sur S. ([27])

La question a $\Longrightarrow$ b est par contre nettement plus délicate, et on a vu que ce n'est nullement le cas pour tout localisateur fondamental - sans doute pas pour celui associé au dérivateur Der($\mathbf{Z}$-Mod), en tous cas pas à celui associé à Der(k-Mod), quand 2 est inversible dans k. (Il suffirait même que $\exists\ n \in \mathbf{N}$, $n \geq 2$, tel que n inversible dans k - le contrexemple typique est $X = S^1 \xrightarrow{n} S^1 = Y = S$, le revêtement étale d'ordre n du cercle.)

L'implication a $\Longrightarrow$ b est donc une condition très forte sur W, je vais la noter L5 (l'ancienne L5, cf. page 2, ne méritant pas de survivre, car c'est une côte mal taillée).

L5 *Soit* $\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & S & \end{array}$ *dans* Cat, *avec X, Y des* Hot-*fibrés sur S. Si f est une W-équivalence ('grossière' par rapport à S), alors c'est une W-équivalence par fibres* ([28]).

25. Non, il y a confusion, L4 est plus faible, cf. p. 44 l'axiome L4 bis.
26. comparer déf. 3, p. 117, dans (I).
27. valable en supposant seulement X, Y des W-fibrés sur S.
28. Dans XII (p. 12) on voit que si W satisfait à L1, L3 quater, L4 bis (cf. page suivante), L5, alors $\boxed{W = W_\infty}$. Donc c'est parfaitement illusoire, si on suppose L5 de continuer à traîner un W.

On a vu qu'à un ε près ('lemme' p. 23), L5 est une conséquence de

L6 *Soit $f : X \longrightarrow Y$ une W-équivalence, $Y' \longrightarrow Y$ un morphisme parfait (i.e. lisse et propre), alors $f' : X' = X \times_Y Y' \longrightarrow Y'$ est une W-équivalence.*

[page 44]

Notons la variante bien naturelle

L6 bis *Comme L6, mais en supposant seulement $Y' \longrightarrow Y$ une* Hot*-fibration.*

p. 28

Il y a des chances que pratiquement, quand L6 (ou seulement L5) est verifié, L6 bis l'est aussi.

On va introduire un axiome

L7 a) *Soit $(f_i : X_i \longrightarrow Y_i)_{i\in I}$ une famille de flèches dans* Cat*, soit $f : \coprod X_i \longrightarrow \coprod Y_i$ la flèche correspondante sur les catégories somme. Pour que $f \in W$, il faut et il suffit que $f_i \in W$ pour tout $i \in I$.*

b) *Soit $f : X \longrightarrow Y$ dans W. Si Y est 0-connexe, X aussi.*

Cet axiome équivaut à la conjonction de La ($f \in W \Longrightarrow \pi_0 f$ bijectif) et de la validité du 'Lemme' page 23, que je remets ici pour mémoire :

Lemme. *L'axiome L7 précédent sur le localiseur fondamental W équivaut à la condition suivante : $f : X \longrightarrow Y$ est dans W si et seulement si $\pi_0(f)$ est bijectif, et f induit des W-équivalences $f_i : X_i \longrightarrow Y_i$ sur les composantes connexes.*

Il me faut revenir encore sur le 1) de la proposition, il n'est pas vrai que 'c'est' la condition L4 sur W (que j'admets, ai-je dit), c'est L4 dans le cas particulier où $Y = S$. Réflexion faite, je le vois comme une variante renforcée de L4, qui ne semble pas devoir découler de L4 :

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad f \quad} & Y \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & S & \end{array}$$

L4 bis *Soit* *dans* Cat*, supposons que f soit une W-équivalence locale sur S (i.e. $f/s : X/s \longrightarrow Y/s$ une W-équivalence $\forall\ s \in S$), alors f est une W-équivalence* ([29]).

[page 45]

Par la suite, par un 'localiseur fondamental', nous entendrons un ensemble

$$W \subseteq \mathrm{Fl}\,\mathrm{Cat}$$

satisfaisant (tout au moins) les axioms

$$\text{L1, L3 quater, L4 bis, L7,}$$

i.e.

a) *Saturation* de W (conditions a) b) c) p. 1)

b) $W_\infty \subseteq W$ $[\subseteq W_0]$ ([30]) ([31]).

c) Si $f : X \longrightarrow Y$ sur S est localement sur S une W-équivalence, alors $f \in W$ (L4 bis)

p. 29

d) Pour que $f : X \longrightarrow Y$ soit dans W, il faut et il suffit que $\pi_0(f)$ soit bijectif, et que les $f_i : X_i \longrightarrow Y_i$ induits sur les composantes connexes soient dans W.

Ces axiomes sont vérifiés par tous les W qui je connais, et qu' on aurait envie de regarder comme localiseurs. Par contre, L5, L6, L6 bis (p. 43, 44) sont des axiomes de nature beaucoup plus spéciale. J'ai envie de dire qu'ils distinguent les localiseurs de nature proprement *'homotopique'* de ceux qui sont de nature *'homologique'* (ou 'cohomologique').

29. équivaut à l'axiome dual, en termes des $s\backslash f$

30. Je ne suis plus sûr s'il est vraiment utile d'imposer $W_\infty \subseteq W$. Prendre au lieu de ça l'axiome de l'objet final, soit b$'$). Si on veut a) b$'$) c) + L5, alors on aura $W \subseteq W_\infty$. **NB** a) b) c) + L5 implique $W = W_\infty$, cf. annotation page 43.

31. cf. d)

Il faudrait que je m'assure qu'ils sont satisfaits pour les W_i (i-équivalence d'homotopie) ([32]).

Le fait que L4 bis, i.e. c) ci-dessus, implique l'axiome dual, résulte du fait que L4 bis implique ceci

Proposition 2. *Soit $f : X \longrightarrow Y$ dans* Cat*, alors $f \in W$ si et seulement si $f^o : X^o \longrightarrow Y^o$ est dans W.*

Se voit par l'argument de I, page 75 (cor. 2) - n'utilise que L4, pas même L1, L3.

Je vais essayer de résumer ce que je crois avoir compris : [page 46]

1) La W-équivalence 'par fibres' n'a d'intérêt (pour construire des catégories localisées) que dans le cas où on sait qu'elle implique déjà, soit la W-équivalence locale, soit la W-équivalence colocale (soit même la W-équivalence universelle) sur S, donc quand on suppose X, Y pour le moins tous deux soit W-lisses, soit W-propres, soit W-fibrés sur S.

2) On pourrait appeler la W-équivalence locale sur S la *'W-équivalence fine à gauche'* sur S, et la W-équivalence colocale sur S la *'W-équivalence fine à droite'* sur S. Elles coïncident dans $\underline{\text{Fibhot}}\, S$, a fortiori dans $\underline{\text{Parf}}\, S$ et dans les quatre catégories (cf. diagramme p. 8) $\underline{\text{Fib}_0}S$, $\underline{\text{Fibsc}_0}S$, $\underline{\text{Cofib}_0}S$, $\underline{\text{Cofibsc}_0}S$ ([33]). Par contre, elles ne coïncident pas sur les catégories *bordantes* du diagramme, notamment sur $\underline{\text{Liss}}\, S$, $\underline{\text{Prop}}\, S$, $\underline{\text{Fib}}\, S$, $\underline{\text{Cofib}}\, S$, $\underline{\text{Fibsc}}\, S$, $\underline{\text{Cofibsc}}\, S$. À cet égard, c'est la *W-équivalence fine* **droite** (en termes des $s\backslash X$) qui est intéressante sur le côté (hélas) gauche du diagramme, i.e. pour $\underline{\text{Liss}}\, S$, $\underline{\text{Fib}}\, S$, $\underline{\text{Fibsc}}\, S$, alors que c'est la *$W$-équivalence fine* **gauche** (en termes des X/s) qui est pertinente du côté droit, pour $\underline{\text{Prop}}\, S$, $\underline{\text{Cofib}}\, S$, $\underline{\text{Cofibsc}}\, S$. On n'aura jamais à regarder simultanément les deux équivalences fines sur une même catégorie du diagramme, à la seule exception de Cat/S tout entier.

[page 47]

3) La W-équivalence grossière, elle, est 'bonne partout' - mais ça dépend pour qui. Pour les 6 catégories qui sont au dessus de $\underline{\text{Fibhot}}\, S$, i.e.

$$\underline{\text{Fibhot}}\, S, \quad \underline{\text{Parf}}\, S, \quad \underline{\text{Fib}_0}S, \quad \underline{\text{Fibsc}_0}S, \quad \underline{\text{Cofib}_0}S, \quad \underline{\text{Cofibsc}_0}S,$$

elle coïncide avec toutes les autres équivalences (moyennnant l'axiome L5), pour les trois catégories bordantes supérieures gauches p. 30

$$\underline{\text{Liss}}\, S, \quad \underline{\text{Fib}}\, S, \quad \underline{\text{Fibsc}}\, S$$

du diagramme, elle coïncide avec la W-équivalence fine droite, et dualement sur

$$\underline{\text{Prop}}\, S, \quad \underline{\text{Cofib}}\, S, \quad \underline{\text{Cofibsc}}\, S$$

elle coïncide avec la W-équivalence fine gauche. Quant à Cat/S tout entier, c'est la seule des catégories du diagramme où il y ait *trois* notions intéressantes différentes de W-équivalence, à savoir : la grossière, et les deux fines (à gauche, à droite). Sur les autres six catégories bordantes du diagramme, il y en a en principe deux : la grossière, et une spécifiée des deux fines (défendu de regarder l'autre - à ses risques et périls …) : la droite du côté gauche, la gauche du côté droit. (NB Je devrais refaire le diagramme, décidément, en mettant les fibrations à droite, pas à gauche.) Quant aux six catégories internes au diagramme, dans elles il n'y a plus qu'une seule notion de W-équivalence (puisque sur elles les quatre notions coïncident).

(**NB** il n'y a pas de page 48) [page 48 (vide)]

[page 49]

32. C'est *faux*, cf. annotation ci-dessus.

33. On pourrait les appeler les six catégories *internes* du diagramme.

Je résume maintenant ce que je crois avoir compris sur les catégories localisées correspondantes. Il y en a, à équivalence près, *trois* différentes seulement en tout et pour tout, quand on prend les localiseurs 'admissibles' dans les catégories, comme je viens de le dire (c'étant ça en somme l'intérêt objectif des prescriptions !) De façon précise :

1°) La *W-équivalence grossière* donne 'la même' catégorie localisée pour les 13 catégories du diagramme, i.e. toutes les flèches de transition du diagramme induisent des équivalences pour cette W-équivalence grossière. Le localisé sera noté $\boxed{\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S)}$, où l'exposant lc signifie : (W-types d'homotopie relatif sur S) *'localement constants.'* (Il ne me reste qu'un petit doute pour $\underline{\mathrm{Fibsc}}\, S$ et $\underline{\mathrm{Cofibsc(S)}}$ ([34]), si l'équivalence grossière y est bel et bien raisonnable. On verra en faisant la démonstration.)

2°) La *W-équivalence fine à droite* donne le même résultat pour toutes les catégories du diagramme où elle est considérée comme admise, *et où elle ne coïncide pas avec la W-équivalence grossière* déjà considérée, donc sur les quatre catégories bordantes gauches

$$\mathrm{Cat}/S, \quad \underline{\mathrm{Liss}}\, S, \quad \underline{\mathrm{Fib}}\, S, \quad \underline{\mathrm{Fibsc}}\, S$$

([35]). Le localisé est noté $\boxed{\mathrm{HOT}_W(S)}$.

[page 50]
p. 31

2$'^o$) Dualement, la *W-équivalence fine gauche* donne le même résultat sur toutes les catégories du diagramme où elle est admise, et où elle ne coïncide pas avec la grossière, i.e. sur les 4 catégories

$$\mathrm{Cat}/S, \quad \underline{\mathrm{Prop}}\, S, \quad \underline{\mathrm{Cofib}}\, S, \quad \underline{\mathrm{Cofibsc}}\, S.$$

Il y a lieu de noter la catégorie des fractions commune par le sigle

$$\mathrm{HOT}_W(S^o)^o \qquad (\text{ou aussi } \mathrm{HOT}^{\mathrm{o}}_W(S)),$$

puisqu'elle est isomorphe à celle notée par ce sigle.

Si on veut des notations sans ambiguïté, désignant des catégories bien définies, et non pas seulement 'à équivalence près', je choisirai

$$\mathrm{HOT}_W(S) \overset{\text{déf}}{=} \underline{\mathrm{Fibsc}}(S)(W^{\mathrm{d}}_S)^{-1}$$

d'où

$$\mathrm{HOT}_W(S^o) \underbrace{\simeq}_{\text{isomorphisme de catégories}} \underline{\mathrm{Cofibsc}}(S)(W^{\mathrm{g}}_S)^{-1},$$

où W^{d}_S, W^{g}_S désignent les ensembles de flèches correspondants à la W-équivalence fine droite resp. gauche. Pour $\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S)$, je préfère une définition aussi symétrique que possible en S, S^o, et de plus une catégorie aussi petite que possible, ce qui me conduit à choisir

$$\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S) \overset{\text{déf}}{=} (\underline{\mathrm{Parf}}\, S)W_S^{-1},$$

où on a noté par W_S les W-équivalences dans $\underline{\mathrm{Parf}}\, S$. (Inutile cette fois de préciser lesquelles - toutes les quatre `[notions]` coïncident dans $\underline{\mathrm{Parf}}\, S$!)

[page 51]

Notons l'isomorphisme


$$\underline{\mathrm{Parf}}(S^o) \simeq \underline{\mathrm{Parf}}\, S$$

34. Ce doute n'est pas fondé, tout marche parfaitement !
35. **NB** Sur les trois dernières cette équivalence est la W-équivalence par fibres.

(provenant du fait que $f : X \longrightarrow Y$ dans Cat est une fibration parfaite si et seulement si f^o l'est). Cet isomorphisme $X \longmapsto X^o$ est compatible avec les localiseurs (car $f \in W \iff f^o \in W$), d'où

$$\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S^o) \simeq \mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S)$$

(isomorphisme de catégories). On aura deux foncteurs canoniques entre les trois catégories de W-types d'homotopie relatifs sur S



[plutôt $\overset{\text{déf}}{=} \mathrm{HOT}_W(S^o)^o$] Ces flèches i, j sont suggerées par les flèches en pointillés i', j', provenant des inclusions p. 32

$$\underline{\mathrm{Fibsc}}_0 S \longhookrightarrow \underline{\mathrm{Fibsc}}\, S, \quad \underline{\mathrm{Cofibsc}}_0 S \longhookrightarrow \underline{\mathrm{Cofibsc}}\, S,$$

qui définiraient i, j à l'aide du choix de foncteurs quasi-inverses pour les flèches horizontales. Mais i, j ne seraient définis qu'à isomorphisme (unique) près. Il sera plus joli de choisir les quasi-inverses de façon canonique, à l'aide des flèches

$$\underline{\mathrm{Fibsc}}_0 S \xleftarrow{\Phi_0} \underline{\mathrm{Parf}}\, S \xrightarrow{\Psi_0} \underline{\mathrm{Cofibsc}}_0 S$$

(où $\Phi_0 = \Phi|\underline{\mathrm{Parf}}\, S$, $\Psi_0 = \Psi|\underline{\mathrm{Parf}}\, S$) du diagramme p. 8. La question principale qui reste non élucidée, c'est si ces foncteurs i, j sont bien *pleinement fidèles,* comme je m'y attends certes. [page 52]

Je veux maintenant prouver les affirmations précédentes sur les localisés.

① Le localisé pour la W-équivalence grossière. Il suffira, à un ε près, d'établir les conditions du lemme p. 11, dans les trois cas suivants. $\underline{\mathrm{Parf}}\, S \xrightarrow{r} \mathrm{Cat}/S$ (ça donnera le cas de $\underline{\mathrm{Fibhot}}\, S$, $\underline{\mathrm{Liss}}\, S$ et $\underline{\mathrm{Prop}}\, S$ sur Cat/S) et $\underline{\mathrm{Fibsc}}_0 S \xrightarrow{p} \mathrm{Cat}/S$, $\underline{\mathrm{Cofibsc}}_0 S \xrightarrow{q} \mathrm{Cat}/S$, qui donneront respectivement les cas de

$$\underline{\mathrm{Fib}}_0 S,\ \underline{\mathrm{Fib}}\, S,\ \underline{\mathrm{Liss}}\, S \qquad \text{et} \qquad \underline{\mathrm{Cofib}}_0 S,\ \underline{\mathrm{Cofib}}\, S,\ \underline{\mathrm{Prop}}\, S \qquad \text{sur } S.$$

Mais l'ennui pour p et q, c'est que les foncteurs en sens inverse que j'avais construit (et noté encore Φ_0, Ψ_0 (mais c'étaient essentiellement $\Phi \circ r \circ C$ et $\Psi \circ r \circ c$, à ne pas confondre avec les foncteurs Φ_0, Ψ_0 en bas de la page précédente, et marqués aussi dans le diagramme p. 8), notons les plutôt Φ', Ψ', marchent bien du côté Cat/S, i.e. $p\Phi'$, $q\Psi'$ reçoivent le foncteur $\mathrm{id}_{\mathrm{Cat}/S}$ par une W-flèche, mais pas du côté des catégories but - on n'arrive pas à trouver une flèche naturelle entre $\Phi' p$ resp. $\Psi' q$, et les foncteurs identiques de $\underline{\mathrm{Fibsc}}_0 S$ resp. $\underline{\mathrm{Cofibsc}}_0 S$. Je ne vois pas, en effet, qu'il y en ait - la difficulté, par cette voie, parait irrémédiable. Par contre, si on regarde Φ', Ψ' comme foncteurs à valeurs dans $\underline{\mathrm{Fib}}_0 S$, $\underline{\mathrm{Cofib}}_0 S$ respectivement (donc dans les catégories où on n'exige pas que les flèches soient catésiennes resp. cocartésiennes), on trouve encore des W-morphismes [page 53]

$$\mathrm{id} \longrightarrow \Phi' p, \qquad \mathrm{id} \longrightarrow \psi' q,$$

ce qui liquide au moins déjà le cas de toutes les catégories des diagrammes p. 8 qui sont des sous-catégories pleines de Cat/S ([36]). Il ne reste à traiter que le cas des quatre p. 33

catégories de structures 'scindées'

$$\underline{\mathrm{Fibsc}}\, S, \quad \underline{\mathrm{Fibsc}}_0 S \qquad \text{et} \qquad \underline{\mathrm{Cofibsc}}\, S, \quad \underline{\mathrm{Cofibsc}}_0 S.$$

Bien sûr il suffit de le faire d'un côté, disons du côté des fibrés, par dualité ($S \longmapsto S^o$) cela établira le résultat symétrique. On va donc regarder d'un peu plus près le carré de foncteurs

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{Fibsc}}\, S & \xleftarrow{\alpha'} & \underline{\mathrm{Fibsc}}_0 S \\ {\scriptstyle\varphi}\,\big\uparrow\big\downarrow{\scriptstyle p} & & {\scriptstyle p_0}\,\big\downarrow\big\uparrow{\scriptstyle\varphi_0} \\ \underline{\mathrm{Fib}}\, S & \xleftarrow{\alpha} & \underline{\mathrm{Fib}}_0 S \end{array}$$

([37], [38]). Le foncteur

$$\Phi : \mathrm{Cat}/S \longrightarrow \underline{\mathrm{Fibsc}}\, S$$

induit des foncteurs en sens inverse de p, p_0 sur les sous-catégories pleines $\underline{\mathrm{Fib}}\, S$, $\underline{\mathrm{Fib}}_0 S$ de Cat/S, foncteurs marqués en pointillés comme φ, φ_0.

Il faut seulement vérifier que si X/S est dans $\underline{\mathrm{Fib}}_0 S$, alors $\varphi(X) = \Phi(X)$ est dans la sous-catégorie pleine $\underline{\mathrm{Fibsc}}_0 S$ de $\underline{\mathrm{Fibsc}}\, S$. Mais on a vu que c'est le cas, pour peu seulement que X/S soit dans $\underline{\mathrm{Fibhot}}\, S$, car les morphismes de changement de base dans $\Phi(X)$, associés aux flèches $u : s \longrightarrow t$ dans S [page 54]

$$u^*_{\Phi_X} : t\backslash X \longrightarrow s\backslash X$$

sont des W_∞-équivalences si X est Hot-fibré sur S. D'autre part, pour X quelconque dans Cat/S, on a une flèche, fonctorielle en X,

$$X \longrightarrow \Phi(X),$$

i.e. $\mathrm{id}_{\mathrm{Cat}/S} \longrightarrow \pi\Phi$ où $\pi : \underline{\mathrm{Fibsc}}\, S \longrightarrow \mathrm{Cat}/S$ est le foncteur canonique, qui est une W_∞-équivalence (même un homotopisme), donc une W-équivalence. A fortiori les foncteurs $p\varphi$, $p_0\varphi_0$ donnent lieu ($\underline{\mathrm{Fib}}\, S$ et $\underline{\mathrm{Fib}}_0 S$ étant des sous-catégories pleines de Cat/S) à des flèches

$$\mathrm{id} \longrightarrow p\varphi, \qquad \mathrm{id} \longrightarrow p_0\varphi_0.$$

Il reste à trouver une flèche (et W-équivalence grossière) p. 34

$$\varphi p \longrightarrow \mathrm{id},$$

laquelle induira automatiquement [page 55]

$$\varphi_0 p_0 \longrightarrow \mathrm{id}$$

puisque $\underline{\mathrm{Fibsc}}_0 S$ est [une] sous-catégorie pleine de $\underline{\mathrm{Fibsc}}\, S$. En fait, on va définir $\varphi p \longrightarrow \mathrm{id}$, donc

$$\boxed{\gamma_X : \Phi(X) \longrightarrow X}$$

36. Mais c'est idiot de prendre des foncteurs si compliqués, parce qu'on veut tout ramener à Cat/S. Il est de plus simple de comparer $\underline{\mathrm{Fibhot}}\, S$ directement à $\underline{\mathrm{Fibsc}}_0 S$ et à $\underline{\mathrm{Cofibsc}}_0 S$. Φ_0 et Ψ_0 (qui sont en fait définis sur $\underline{\mathrm{Fibhot}}$, pas seulement sur $\underline{\mathrm{Parf}}$), et on trouve comme ci-dessous $\mathrm{id} \xrightarrow{W} \pi_0\Phi_0$ et $\Phi_0\pi_0 \xrightarrow{W} \mathrm{id}$ (itou pour Ψ_0 et $\underline{\mathrm{Cofibsc}}_0 S$), où $\pi_0 : \underline{\mathrm{Fibsc}}_0 S \longrightarrow \underline{\mathrm{Fibhot}}\, S$.

37. NB Il s'agit de prouver seulement que p, p_0 induisent des équivalences pour les localisés (pour la W-équivalence grossière). On sait déjà qu'il en est ainsi pour α, et ça en résultera pour α'.

38. inutile de regarder ce carré, cf. annotations marginales ci-dessus (haut de la page)

quand X est fibrée scindée sur X - une flèche *cartésienne,* donc (si on veut) compatible avec les scindages de $\Phi(X)$, et de X. En fait, on aura une telle flèche, fonctorielle en X, pour X variable dans $\underline{\mathrm{Fib}}\, S$ (donc sans se borner à des S-morphismes cartésiens entre catégories fibrées sur S), mais la flèche $\longrightarrow$ étant bien sûr *cartésienne.* (Ça a un sens, sans choisir de scindage sur X, et sans qu'il en existe forcément.) La définition de cette flèche γ fait appel de façon essentielle à l'hypothèse que X soit Cat-fibrant sur S. Bien sûr, composé à la flèche d'inclusion évidente

$$X \xrightarrow{i_X} \Phi(X)$$

on va avoir

$$\gamma_X i_X = \mathrm{id}_X$$

([39]). On définit γ fibre par fibre,

$$\gamma_{X,s} : \Phi(X)_s \overset{\text{déf}}{=} s\backslash X \longrightarrow X_s,$$

donc par une *rétraction* de $s\backslash X$ sur la sous-catégorie pleine X_s. Un objet de $s\backslash X$ est un couple (x, u), $x \in \mathrm{Ob}\, X$, $u : s \longrightarrow p_X(x)$ ($p_X : X \longrightarrow S$ le morphisme structural de X). On pose

$$\gamma(x, u) = u^*_X(x) \in \mathrm{Ob}\, X_s,$$

ce qui suppose donc qu'on a choisi des foncteurs image inverse $u^*_X : X_t \longrightarrow X_s$, pour la catégorie Cat-fibrée X/S. (Mais à isomorphisme unique près, γ ne dépend pas de ces choix.) Je me dispense de la vérification fastidieuse que cette loi est bien 'fonctorielle en s', i.e. définit bien une flèche cartésienne [page 56]

$$\gamma_X : \Phi(X) \longrightarrow X,$$

et de vérifier que celle-ci est fonctorielle en X.

Peut-être est-il plus élégant de montrer que $\pi : \underline{\mathrm{Fibsc}}\, S \longrightarrow \mathrm{Cat}/S$ et $\Phi : \mathrm{Cat}/S \longrightarrow \underline{\mathrm{Fibsc}}\, S$ sont adjoints l'un de l'autre : p. 35

$$\boxed{\mathrm{Homcart}_S(\Phi(\underbrace{X}_{\in \mathrm{Cat}/S}), \underbrace{Y}_{\in \underline{\mathrm{Fibsc}}}) \simeq \mathrm{Hom}_S(X, \pi Y),}$$

d'où résulteront des flèches d'adjonction


$$\Phi\pi \longrightarrow \mathrm{id}_{\underline{\mathrm{Fibsc}}}, \qquad \pi\Phi \longleftarrow \mathrm{id}_{\underline{\mathrm{Fib}}},$$

[plutôt $\pi\Phi \longleftarrow \mathrm{id}_{\mathrm{Cat}/S}$] et on aura gagné. Mais pour prouver cette formule d'adjonction, j'ai l'impression qu'il faut utiliser $\varphi p \longrightarrow \mathrm{id}$ … Il y a des vérifications fastidieuses …


Finalement, je vois maintenant qu'on a cinq cas à traiter, et trois si on joue sur les symétries : [page 57]

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{Parf}}\, S & & \\ {\scriptstyle r}\downarrow \;\; \curvearrowright {\scriptstyle r} & C & \\ \mathrm{Cat}/S & & \end{array} \qquad \left\{ \begin{array}{lcl} rC & \longleftarrow & \mathrm{id} \\ Cr & \longleftarrow & \mathrm{id} \end{array} \right.$$

39. NB Comme on sait que $i_X \in W$, il en résultera bien $\gamma_X \in W$ comme on le veut.



$$\begin{cases} \lambda\Phi & \longleftarrow & \mathrm{id} \\ \Phi\lambda & \longrightarrow & \mathrm{id} \end{cases} \qquad \begin{cases} \mu\Psi & \longleftarrow & \mathrm{id} \\ \Psi\mu & \longrightarrow & \mathrm{id} \end{cases}$$



$$\begin{cases} \lambda_0\Phi_0 & \longleftarrow & \mathrm{id} \\ \Phi_0\lambda_0 & \longrightarrow & \mathrm{id} \end{cases} \qquad \begin{cases} \mu_0\Psi_0 & \longleftarrow & \mathrm{id} \\ \Psi_0\mu_0 & \longrightarrow & \mathrm{id} \end{cases}$$

([40])

NB Les quatre derniers homomorphismes de foncteurs, relatifs au troisième diagramme (avec les indices 0) sont simplement induits par ceux relatifs au diagramme qui le précède. Donc les vérifications-clef sont relatives aux deux premiers diagrammes, et par symétrie, on n'a finalement qu'à regarder les *deux* couples de foncteurs (r, C), (λ, Φ), et pour chacun de ces couples, exhiber les deux homomorphismes fonctoriels, des deux composés avec les foncteurs identiques.

p. 36 [page 58]

② Les localisés pour la *W-équivalence fine droite.* Il n'y a plus lieu, on l'a dit, de regarder les catégories internes du diagramme p. 8, où ladite équivalence coïncide avec la W-équivalence grossière, pour laquelle on connait déjà les localisés. Il reste à regarder les catégories


$$\mathrm{Cat}/S, \quad \underline{\mathrm{Liss}}\, S, \quad \underline{\mathrm{Fib}}\, S, \quad \underline{\mathrm{Fibsc}}\, S.$$

Le lemme de la page 11 nous dit qu'il suffit de montrer que dans la situation

$$\underline{\mathrm{Fibsc}}\, S \xrightarrow{\lambda} \mathrm{Cat}/S,$$

il y a un foncteur en sens inverse, avec les propriétés specifiées. Il en résultera que toute sous-catégorie pleine $\mathcal{F}$ de Cat/S qui contient $\underline{\mathrm{Fib}}\, S$, quand on la munit du localiseur de la W-équivalence fine droite, donne un localisé équivalent, par le foncteur induit par l'inclusion, au localisé correspondant de Cat/S, i.e. essentiellement à $\mathrm{HOT}_W(S)$.

Comme foncteur en sens inverse, il s'impose de prendre encore Φ. Il y a à vérifier trois choses :

a) Φ [est] compatible avec les localiseurs, i.e. si  sur S est une W-équivalence fine droite, i.e. les $s\backslash X \longrightarrow s\backslash Y$ sont des W-équivalences, alors $\Phi(f)$ aussi. Mais ladite équivalence coïncide dans $\underline{\mathrm{Fibsc}}\, S$ (comme aussi dans $\underline{\mathrm{Fib}}\, S$ et $\underline{\mathrm{Liss}}\, S$) avec la W-équivalence par fibres, et d'autre part $\Phi(f)_s$ n'est autre que la flèche précédente $s\backslash X \longrightarrow s\backslash Y$. Donc il est évident que [page 59]

$$f \in \underbrace{W_S^{\mathrm{d}}}_{W\text{-équivalence droite}} \iff \Phi(f) \in \underbrace{W_S^{\mathrm{f}}}_{W\text{-équivalence par fibres}} .$$

b) Que $X \xrightarrow{i_X} \lambda\Phi(X)$ est dans W_S^{d}, pour tout X dans Cat/S. Cela signifie donc que i_X induit

$$s\backslash X \longrightarrow s\backslash\Phi(X)$$

40. **NB** Tous les foncteurs marqués sont compatibles avec la W-équivalence grossière, et des dix homomorphismes fonctoriels sont des W-équivalences grossières.

qui est une W-équivalence. Ce serait O.K. s'il était clair que $X \longmapsto \Phi(X)$ commute à tout changement de base propre sur S (donc en particulier à $s\backslash S \longrightarrow S$), puisqu'on sait que $X \longrightarrow \Phi(X)$ est une W-équivalence. C'est sans doute trop demander, mais du moins que ça commute au changement de base qui est un co-isomorphisme local (telles les $s\backslash S \longrightarrow S$).

Pour un tel changement de base $S' \xrightarrow{p} S$, vérifier que la fibre de $\Phi(X')$ en s' est isomorphe à celle de $\Phi(X)$ en $s = p(s')$, je m'en contenterai. Or cette fibre est $s'\backslash X'$, déduit de X' sur S' par le changement de base $s'\backslash S' \longrightarrow S'$, donc déduit de X par $s'\backslash S' \longrightarrow S$. Or $s'\backslash S' \longrightarrow s\backslash S$ est un isomorphisme par hypothèse sur p (co-isomorphisme local), donc le changement de base $s'\backslash S' \longrightarrow S$ s'identifie à $s\backslash S \longrightarrow S$, et l'image inverse est bien isomorphe à $s\backslash X$, OK. p. 37 [page 60]

c) Que de même

$$\Phi\lambda \longrightarrow \mathrm{id}$$

est non seulement dans W_S (grossier), mais que c'est une W-équivalence par fibres. Donc on part de X fibrée sur S. On regarde

$$\Phi(X) \longrightarrow X,$$

pour voir que c'est une W-équivalence par fibres, il suffit de voir qu'il en est ainsi de $X \longrightarrow \Phi(X)$,

$$X_s \longrightarrow s\backslash X$$

est une W-équivalence pour tout $s \in S$. Mais ceci est déjà vrai dès que X est lisse sur S.

Comme le cas de la W-équivalence fine gauche se ramène au cas actuel par $S \longmapsto S^o$, on a donc prouvé tout ce qu'était attendu, à la seule exception de la pleine fidèlité des foncteurs i, j de la page 51.

Mais dans le résumé prospectif de la situation pour les localiseurs, p. 49-51, j'ai oublié d'autres foncteurs que i, j, de nature si possible encore plus triviale. Ce sont ceux qu' on peut décrire à partir du foncteur identique, sur une des catégories du diagramme où aient cours deux, voire trois, notions de W-équivalence différentes. Ce sont, je le rappelle [page 61]

1°) Les quatre catégories


$$(*) \qquad \underline{\mathrm{Fibsc}}\, S \longrightarrow \underline{\mathrm{Fib}}\, S \longrightarrow \underline{\mathrm{Liss}}\, S \longrightarrow \mathrm{Cat}/S, \qquad W_S^{\mathrm{d}} \subseteq W$$

avec la W-équivalence fine droite d'une part, grossière de l'autre, et dualement

$$(*') \qquad \underline{\mathrm{Cofibsc}}\, S \longrightarrow \underline{\mathrm{Cofib}}\, S \longrightarrow \underline{\mathrm{Prop}}\, S \longrightarrow \mathrm{Cat}/S, \qquad W_S^{\mathrm{g}} \subseteq W$$

pour la W-équivalence fine gauche d'une part, la grossière de l'autre, et de plus

2°) Cat/S, qui était inclue dans les deux suites précédentes, et qui est la seule catégorie du diagramme donnant lieu à trois notions de W-équivalence différentes



.

Dans chacun des quatre cas (C, munie de deux localiseurs $\Sigma \subseteq \Sigma'$) de la suite $(*)$, le foncteur p. 38

$$C\Sigma^{-1} \longrightarrow C\Sigma'^{-1}$$ [page 62]

est essentiellement 'le même', à cause des théorèmes de comparaison. Il suffit de regarder ce foncteur dans un seul das, p. ex. un des deux extrêmes $\underline{\mathrm{Fibsc}}\, S$ ou Cat/S. Même remarque pour la suite $(*')$. Donc finalement il reste deux foncteurs remarquables à examiner, qui n'ont pas l'air du tout de provenir des foncteurs du diagramme p. 8 ou de quelque composé (ça ne donne que des équivalences canoniques ou bien les foncteurs i, j de page 51, quand on va des catégories internes au diagramme vers les catégories bordantes). Le plus joli est sans doute de les regarder à partir de Cat/S, puisque c'est là seulement qu'on les a tous les deux à la fois

$$\begin{array}{ccc} (\mathrm{Cat}/S)(W_S^{\mathrm{d}})^{-1} \approx \mathrm{HOT}_W(S) & & \\ & \overset{\rho}{\searrow} & \\ & & (\mathrm{Cat}/S)W_S^{-1} \approx \mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S). \\ & \underset{\sigma}{\nearrow} & \\ (\mathrm{Cat}/S)(W_S^{\mathrm{g}})^{-1} \approx \mathrm{HOT}^{o}_W(S) & & \end{array}$$

Par contre, les foncteurs (qu'on a envie d'appeler 'foncteurs d'inclusion') i, j de la page 51, en sens inverse de ρ, σ, sont ceux qui proviennent, par localisation W_S^{d} ou W_S^{g} selon le cas, d'un des foncteurs du diagramme page 8 (ou d'un composé de tels foncteurs), allant d'une des six catégories internes (où toutes les W-équivalences envisagées coïncident) vers l'une des sept catégories bordantes, sauf quand cette dernière est Cat/S, est déterminé déjà avec quelle W-équivalence, W_S^{d} ou W_S^{g}, on va travailler `[structure de cette phrase?]`. La détermi-nation peut-être la plus jolie est par [page 63]

$$(*) \qquad \underline{\mathrm{Parf}}\, S \longrightarrow \mathrm{Cat}/S$$

qui donne le foncteur i quand on travaille avec W_S^{d}, le foncteur j quand on travaille avec W_S^{g}. On voit alors tout de suite que si on compose avec le foncteur pertinent, soit ρ soit σ, défini par l'inclusion $W_S^{\mathrm{d}} \subseteq W_S$ resp. $W_S^{\mathrm{g}} \subseteq W_S$ (comme parties de $\mathrm{Fl}(\mathrm{Cat}/S)$), on trouve le foncteur

$$(**) \qquad (\underline{\mathrm{Parf}}\, S)W_S^{-1} \xrightarrow{\approx} (\mathrm{Cat}/S)W_S^{-1}$$

qui est l'*équivalence canonique* entre ces deux catégories. Ainsi le foncteur correspondant à i, j page 51, exprimé en termes de Cat/S comme foncteur en sens inverse de ρ, σ (p. 62), est-il le composé de l'équivalence quasi-inverse de $(**)$, laquelle s'explicite par le foncteur C, et du foncteur sur le localisé W_S^{d} ou W_S^{g} déduit de $(*)$, i.e.

p. 39

$$\begin{array}{ccc} & & \mathrm{HOT}_W(S) \approx (\mathrm{Cat}/S)(W_S^{\mathrm{d}})^{-1} \\ & \overset{i}{\nearrow} & \uparrow \text{car } W_S = W_S^{\mathrm{d}} \text{ sur } \underline{\mathrm{Parf}} \\ \mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S) \approx (\mathrm{Cat}/S)W_S^{-1} & \xrightarrow{\quad C \quad} & (\underline{\mathrm{Parf}}\, S)W_S^{-1} \\ & \underset{j}{\searrow} & \downarrow \text{car } W_S = W_S^{\mathrm{g}} \text{ sur } \underline{\mathrm{Parf}} \\ & & \mathrm{HOT}^{o}_W(S) \approx (\mathrm{Cat}/S)(W_S^{\mathrm{g}})^{-1}. \end{array}$$

On voit par là qu'on a des isomorphismes canoniques [page 64]

$$\rho i \simeq \mathrm{id}, \qquad \sigma j \simeq \mathrm{id}$$

dans la catégorie des endofoncteurs de $(\mathrm{Cat}/S)W_S^{-1}$ $(\approx \mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S))$, isomorphisme qui s'explicite ici par le fait que ρi, σj sont déduits du même foncteur C par passage aux

localisés W_S^{-1} (donc en fait $\rho i = \sigma j$!), et qu'on a une flèche fonctorielle en X

$$X \xrightarrow{i_X} C(X),$$

qui est dans W pour tout X. Ainsi, ρ et σ sont à isomorphisme près des *rétractions* des catégories $\mathrm{HOT}_W(S)$, $\mathrm{HOT}^o_W(S)$ sur la catégorie $\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S)$. De plus, ces rétractions sont ce qu'on appelle des foncteurs de localisation (comme on voit sur le diagramme de la page 62). (On dit que $C \xrightarrow{F} C'$ est un *foncteur de localisation* si, désignant par $\Sigma \subseteq \mathrm{Fl}\, C$ l'ensemble des flèches de C transformées en des isomorphismes par F, le foncteur

$$C\Sigma^{-1} \xrightarrow{\bar{F}} C'$$

qui factorise F est une équivalence de catégories.)

On sait d'ailleurs que si un foncteur f a un adjoint g (à gauche ou à droite), alors f est un foncteur `[de]` localisation si et seulement si l'adjoint g est pleinement fidèle. Pour prouver que i, j sont pleinement fidèles, il serait donc tentant de prouver qu'ils sont adjoints des foncteurs ρ, σ. [page 65]

Pour nous y reconnaître, je vais poser

$$\begin{cases} \mathcal{A} = \mathrm{Cat}/S, \quad \Sigma_0 = W_S^{\mathrm{d}}, \quad \Sigma = W_S \qquad (\subseteq \mathrm{Fl}(\mathcal{A})) \\ C : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{A} \quad \text{le foncteur familier, qui a la vertu} \\ \qquad\qquad C(\Sigma) \subseteq \Sigma_0 \quad . \end{cases}$$

On a donc la situation p. 40

$$(*) \qquad (\mathcal{A}, \Sigma_0) \underset{C}{\overset{\rho_0 = \mathrm{id}_{\mathcal{A}}}{\rightleftarrows}} (\mathcal{A}, \Sigma),$$

induisant par passage aux localisés

$$\mathcal{A}\Sigma_0^{-1} \underset{\bar{C}}{\overset{\rho = \bar{\rho}_0}{\rightleftarrows}} \mathcal{A}\Sigma^{-1},$$

on veut vérifier que ρ et C `[plutôt` $\bar{C}$`]` sont adjoints l'un de l'autre, C `[plutôt` $\bar{C}$`]` *sûrement à droite,* ce qui signifie que l'on doit avoir des homomorphismes fonctoriels

$$\begin{cases} \mathrm{id}_{\mathcal{A}\Sigma^{-1}} & \rightleftarrows & \rho\bar{C} & (= \overline{\rho_0 C}) \\ \mathrm{id}_{\mathcal{A}\Sigma_0^{-1}} & \rightleftarrows & \bar{C}\rho & (= \overline{C\rho_0}) \end{cases}$$

([41]) `[les flèches en bas vont en direction corrigée, mais les flèches en haut ne sont pas effacées]` satisfaisant deux relations de compatibilité sur lesquelles on reviendra. On peut espérer trouver ces homomorphismes fonctoriels à partir de

$$\begin{cases} \mathrm{id}_{\mathcal{A}} & \xrightarrow{i} & \rho_0 C & = & C \\ \mathrm{id}_{\mathcal{A}} & \xleftarrow{p} & C\rho_0 & = & C \end{cases}$$

et dans notre cas on dispose bel et bien de [page 66]

$$i : \mathrm{id}_{\mathcal{A}} \longrightarrow C \qquad \text{i.e. de} \quad i_X : X \longrightarrow C(X)$$

41. mais si C est à *droite,* les flèches ici doivent aller en sens inverse et c'est bien à quoi je dois me résoudre p. 67.

fonctoriel en $X \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{A}$ (et de plus i_X est dans Σ). Il n'y a pas cependant de flèche naturelle en sens inverse p_X

$$C(X) \xrightarrow{?} X.$$

J'avais songé à la projection $\pi_X : C(X) \longrightarrow X$, déduite de la construction $C(X) \simeq X \times_S (\underline{\mathrm{Ch}}_\infty(S), \sigma)$, mais ce n'est malheureusement pas un S-morphisme. Comme on cherche une flèche dans $\mathcal{A}\Sigma_0^{-1}$, on pourrait se contenter d'avoir une flèche fonctorielle en sens inverse, du moment qu'elle soit dans Σ_0, donc puisse s'inverser quand on travaille dans $\mathcal{A}\Sigma_0^{-1}$. Le candidat evident est $i_X : X \longrightarrow C(X)$ dont on vient de parler. L'ennui, c'est que i_X est seulement dans Σ, pas dans Σ_0 ([42]). Pourtant, quand X est lui-même de la forme $C(Y)$ (plus généralement, s'il est un Hot-fibré sur S), alors le fait que $X \longrightarrow C(X)$ soit dans Σ implique déjà qu'il soit dans Σ_0. Notons donc ceci

$$\begin{cases} i : \mathrm{id}_{\mathcal{A}} \longrightarrow C \text{ tel que} & 1^o) \quad i_X : X \longrightarrow C(X) \textit{ dans } \Sigma \\ & \qquad \text{pour tout } X \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{A} \\ & 2^o) \quad i_X \text{ dans } \Sigma_0 \text{ si } X \text{ de la} \\ & \qquad \text{forme } C(Y) \end{cases}$$

L'idée me vient, après des essais merdouillants [sic], que $\bar{C}$ pourrait être l'adjoint à droite, et non à gauche [c'est la version corrigée (droite et gauche échangées) cf. p. 65], i.e. que les flèches cherchées pourraient aller en sens inverse

p. 41
[page 67]

$$\begin{cases} \mathrm{id}_{\mathcal{A}\Sigma^{-1}} & \xleftarrow{p} & \rho\bar{C} & (= \overline{\rho_0 C}) \\ \mathrm{id}_{\mathcal{A}\Sigma_0^{-1}} & \xrightarrow{i} & \bar{C}\rho & (= \overline{C\rho_0}) \end{cases}$$

(j'inverse du coup les notations pour p et i), donc on est amené si possible à chercher des flèches

$$\begin{aligned} \mathrm{id}_{\mathcal{A}} & \xleftarrow{p} & \rho_0 C & = & C \\ \mathrm{id}_{\mathcal{A}} & \xrightarrow{i} & C\rho_0 & = & C, \end{aligned}$$

donc des flèches fonctorielles en X

$$X \xrightarrow{i_X} C(X) \xrightarrow{p_X} X.$$

On tient bel et bien une i_X fonctorielle - toujours la même ! Pour p_X, on n'en a pas plus qu'avant, mais se rappelant qu'il suffit de le trouver dans $\mathcal{A}\Sigma^{-1}$ (et non plus $\mathcal{A}\Sigma_0^{-1}$!), il suffit d'inverser la flèche i_X, qui est en effet un *isomorphisme* dans $\mathcal{A}\Sigma^{-1}$ (mais non dans $\mathcal{A}\Sigma_0^{-1}$). On posera donc

$$p_X = i_X^{-1} : C(X) \longrightarrow X \qquad \text{dans } \mathcal{A}\Sigma^{-1}.$$

Il faut prouver deux compatibilités seulement, pour les foncteurs $\bar{C}$ et ρ entre $\mathcal{A}\Sigma_0^{-1}$ et $\mathcal{A}\Sigma^{-1}$ (et j'écrirai C au lieu de $\bar{C}$) : les deux composés

$$\begin{cases} \rho \xrightarrow{\rho * i} \rho C \rho \xrightarrow{p * \rho} \rho \quad (\text{id}) & \text{(relation pour foncteurs à valeurs dans } \mathcal{A}\Sigma^{-1}) \\ C \xrightarrow{i * C} C \rho C \xrightarrow{C * p} C \quad (\text{id}) & \text{(relation pour foncteurs à valeurs dans } \mathcal{A}\Sigma_0^{-1}) \end{cases}$$

doivent être l'identité id_ρ resp. id_C.

42. S'il n'en était pas ainsi, le type d'homotopie relatif sur S défini par X/S serait localement constant (puisqu'il en est ainsi pour celui défini par $C(X)$), ce qui n'est pas toujours le cas.

[page 68]

La première relation se vérifie tautologiquement, elle revient à dire que dans $\mathcal{A}\Sigma^{-1}$, on a un composé identité des

$$X \xrightarrow{i_X} C(X) \xrightarrow{i_X^{-1}} X \qquad !$$

La seconde signifie que pour tout X, on a un composé identité dans $\mathcal{A}\Sigma_0^{-1}$

$$C(X) \xrightarrow{i_{C(X)}} C(C(X)) \xrightarrow{C(p_X)} C(X).$$

Or $p_X : C(X) \longrightarrow X$ avait été défini dans $A\Sigma^{-1}$ comme inverse i_X^{-1} de i_X, d'autre part le foncteur C sur $\mathcal{A}$ définit par hypothèse $\mathcal{A}\Sigma^{-1} \longrightarrow \mathcal{A}\Sigma_0^{-1}$, plus précisément $C(\Sigma) \subseteq \Sigma_0$ ainsi $C(i_X)$ est inversible dans $\mathcal{A}\Sigma_0^{-1}$, et $C(p_X) = C(i_X)^{-1}$. Donc la compatibilité revient à la relation p. 42

$$C(i_X)^{-1} i_{C(X)} = \mathrm{id} \qquad \textit{dans} \;\; \mathcal{A}\Sigma_0^{-1},$$

i.e.

$$\boxed{i_{C(X)} = C(i_X)} : C(X) \longrightarrow C^2(X).$$

En d'autre termes, il faut prouver le :

Lemme. *Soit X dans* Cat/S*, considérons les deux flèches*

$$i_{C(X)},\ C(i_X) : C(X) \rightrightarrows C(C(X)).$$

Ces flèches sont égales, sinon au sens absolu, du moins dans $(\mathrm{Cat}/S)(W_S^{\mathrm{d}})^{-1}$.

Ici $f_X : X \longrightarrow S$ est la projection standard et

$$C(X) \;=\; \{(x,c) \;\mid\; x \in \mathrm{Ob}\, X,\ c : f_X(x) \underbrace{\longrightarrow}_{\text{chemin dans } S} t\}$$

$$C^2(X) \;=\; \{(x,c,c') \;\mid\; x \in \mathrm{Ob}\, X,\ \underbrace{f_X(x) \xrightarrow{c} t \xrightarrow{c'} t'}_{c,\ c' \text{ chemins dans } S}\},$$

les projections dans S sont données par

$$\begin{aligned} (x,c) &\longmapsto t = \text{but } c \\ (x,c,c') &\longmapsto t' = \text{but } c' \end{aligned}$$

On trouve [page 69]

$$i_{C(X)}(x,c) = (x,c,1_t) : \quad \begin{array}{c} x \\ \downarrow \\ f_X(x) \xrightarrow{c} t \xrightarrow[\text{chemin vide}]{1_t} t \end{array}$$

$$C(i_X)(x,c) = (x,1_{f_X(x)},c) : \quad \begin{array}{c} x \\ \downarrow \\ f_X(x) \xrightarrow[\text{chemin vide}]{1_{f_X(x)}} f_X(x) \xrightarrow{c} t \end{array}$$

Mais on a le choix entre deux théories de chemins, pour construire $C(X)$: soit avec les $\underline{\mathrm{Ch}}_\infty(S)$, soit avec les $\underline{\mathrm{Ch}}(S)$. 'Ça donne les mêmes résultats', mais suivant les situations l'un est plus commode que l'autre. Je vais travailler avec les $\underline{\mathrm{Ch}}(S)$, auquel cas les 1_S sont des unités à gauche et à droite, et on a une loi de composition pour les chemins. Cette loi nous permet de définir

$$\begin{aligned} C^2(X) &\xrightarrow{\gamma} C(X) \\ (x,c,c') &\longmapsto (x, c' \circ c), \end{aligned}$$

p. 43

et les composés de $i_{C(X)}$ et de $C_{i(X)}$ avec cette flèche sont $\mathrm{id}_{C(X)}$ dans les deux cas

$$C(X) \rightrightarrows C^2(X) \xrightarrow{\gamma} C(X).$$
$$\overset{\curvearrowright}{\mathrm{id}}$$

Donc pour montrer que $i_{C(X)} = C(i_X)$ dans $(\mathrm{Cat}/S)(W_S^{\mathrm{d}})^{-1}$, il suffit de prouver que γ est dans W_S^{d}. Mais on sait que le foncteur C transforme W_S en W_S^{d}, donc $C(i_X)$ est dans W_S^{d}, et comme $\gamma \circ C(i_X) = \mathrm{id}$, γ est dans W_S^{d}, OK !

J'ai envie de grouper ce qui a été prouvé dans un énoncé récapitulatif. [page 70]

Théorème-Scholie. On considère le diagramme de catégories de la page 8 ([43]).

Ⓘ Quand on munit toutes les 13 catégories du diagramme du localiseur W_S (W-équivalence grossière, i.e. W-équivalence dans Cat, sans plus), *tous* les foncteurs du diagramme induisent des équivalences sur les catégories localisées ([44]). Désignons par

$$\mathrm{HOT}_W^{\mathrm{lc}}(S)$$

'la' catégorie localisée commune.

Ⓘⓘ Munissons les quatre catégories bordantes gauches

$$(*) \qquad \mathrm{Cat}/S \longleftarrow \underline{\mathrm{Liss}}\, S \longleftarrow \underline{\mathrm{Fib}}\, S \longleftarrow \underline{\mathrm{Fibsc}}\, S$$

du localiseur W_S^{d} de la W-équivalence fine *droite* sur S ($\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & S & \end{array}$ est dans W_S^{d} si et seulement si les $s\backslash X \longrightarrow s\backslash Y$ le sont `[plutôt, sss ils sont dans` W`]`, pour tout $s \in \mathrm{Ob}\, S$). Les foncteurs du diagramme, i.e. ceux de $(*)$, entre ces catégories, donc aussi leurs composés, induisent des équivalences entre les localisées ([45]). Désignons par

$$\mathrm{HOT}_W(S)$$

'la' catégorie localisée commune.

Enoncé dual pour

$$(*') \qquad \mathrm{Cat}/S \longleftarrow \underline{\mathrm{Prop}}\, S \longleftarrow \underline{\mathrm{Cofib}}\, S \longleftarrow \underline{\mathrm{Cofibsc}}\, S,$$

et les localiseurs W_S^{g} dans ces catégories ($f \in W_S^{\mathrm{g}}$ si et seulement si les $f/s : X/s \longrightarrow Y/s$ sont dans W). On trouve une 'même catégorie localisée', notée p. 44

$$\mathrm{HOT}_W^o(S),$$

et on a tautologiquement

$$\mathrm{HOT}_W^o(S) \approx \mathrm{HOT}_W(S^o). \qquad [\text{page 71}]$$

`[plutôt` $(\mathrm{HOT}_W(S^o))^o$ `cf. p. 50]`

Ⓘⓘⓘ Sur les six catégories internes du diagramme, les trois notions de W-équivalence, en termes de W_S, W_S^{d}, W_S^{g} coïncident, et coïncident avec la W-équivalence par fibres W_S^{f}. Sur les trois catégories de $(*)$ autres que Cat/S, les localiseurs W_S^{f}, W_S^{d} coïncident ; sur

43. On suppose sur W les conditions a) b) c) de p. 45, de plus L5 (p. 43). Cf. commentaires p. 81.

44. De plus, si $\mathcal{F}$ est une sous-catégorie pleine de Cat/S qui contient une des deux sous-catégories $\underline{\mathrm{Fib}}_0 S$, $\underline{\mathrm{Cofib}}_0 S$ (ce qui inclut le cas des 8 catégories des diagrammes, autres que Cat/S elle-même), l'inclusion $(\mathcal{F}, W_S|\mathcal{F})$ dans $(\mathrm{Cat}/S, W_S)$ induit une équivalence pour les localisés.

45. Plus généralement, ça marche pour toute sous-catégorie pleine de Cat/S qui contient $\underline{\mathrm{Fib}}\, S$ (et dualement, avec W_S^{g} au lieu de W_S^{d}, si $\mathcal{F}$ contient $\underline{\mathrm{Cofib}}\, S$).

les trois catégories de $(*')$ autres que Cat/S, les localiseurs W_S^{f}, W_S^{g} coïncident. Mais en général ([46]), sur ces six catégories, ces localiseurs W_S^{f} ne sont pas égaux à W_S, plus précisément donnent des localisées non équivalentes, elles sont donc munies chacune de *deux* localiseurs essentiellement distincts, W_S^{f} et W_S. La catégorie Cat/S est la seule catégorie du diagramme sur laquelle les localiseurs W_S, W_S^{d} et W_S^{g} sont tous les trois essentiellment distincts. C'est la seule qui permette d'obtenir simultanément les trois catégories localisées, comme

$$\begin{array}{ccc} & \mathrm{HOT}_W^{\mathrm{lc}}(S) \simeq (\mathrm{Cat}/S)W_S^{-1} & \\ \overset{\rho}{\nearrow} & & \overset{\sigma}{\nwarrow} \\ \mathrm{HOT}_W(S) \simeq (\mathrm{Cat}/S)(W_S^{\mathrm{d}})^{-1} & & \mathrm{HOT}_W^{o}(S) \simeq (\mathrm{Cat}/S)(W_S^{\mathrm{g}})^{-1} \end{array}$$

Ici, ρ et σ sont des foncteurs de localisation (comme il est évident sur la définition).

Tout foncteur ou foncteur composé du diagramme page 8, allant d'une catégorie interne au diagramme vers une catégorie bordante, induit un foncteur pour les localisées pour W_S^{d} (quand la catégorie but fait partie des quatre gauches, rappelées dans $(*)$, p. 70), [page 72] soit pour W_S^{g} (quand ces catégories font partie des quatre du côté droit, rappelées dans $(*')$), lesquels localiseurs coïncident aussi avec W_S^{f} sauf dans le seul cas de la catégorie Cat/S. Tous les foncteurs ainsi obtenus se réduisent, à équivalence près, à deux, suivant que la catégorie localisée but est $\mathrm{HOT}_W(S)$ (cas de la localisation W_S^{d}), ou qu'elle est $\mathrm{HOT}_W^o(S)$ (cas de la localisation W_S^{g}). On trouve ainsi des foncteurs (en sens inverse de ρ et de σ) p. 45

$$\begin{array}{ccc} & \mathrm{HOT}_W^{\mathrm{lc}}(S) & \\ \overset{i}{\swarrow} & & \overset{j}{\searrow} \\ \mathrm{HOT}_W(S) & & \mathrm{HOT}_W^{o}(S). \end{array}$$

Les foncteurs ρ, σ s'interchangent par dualité $S \longmapsto S^o$, et de même pour i, j.

(IV) Les foncteurs ρ, i sont adjoints l'un de l'autre dans cet ordre, i.e. on a pour deux objets $\xi \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{HOT}_W(S)$, $\eta \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{HOT}_W^{\mathrm{lc}}(S)$

$$\mathrm{Hom}(\rho(\xi), \eta) \simeq \mathrm{Hom}(\xi, i(\eta))$$

(isomorphisme de bifoncteurs). Et dualement les foncteurs σ, j sont adjoint l'un de l'autre dans cet ordre : pour $\xi \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{HOT}_W^o(S)$, $\eta \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{HOT}_W^{\mathrm{lc}}(S)$

$$\mathrm{Hom}(\xi, j(\eta)) \simeq \mathrm{Hom}(\sigma(\xi), \eta).$$

Il s'ensuit notamment que *les foncteurs i, j sont pleinement fidèles.*

(V) On a des foncteurs évidents [page 73]

$$\begin{array}{lccc} (*) & \mathrm{HOT}_W(S) & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Hom}}(S^o, \mathrm{Hot}_W) \\ (*') & \mathrm{HOT}_W^o(S) & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Hom}}(S, \mathrm{Hot}_W). \end{array}$$

Le premier s'interprète sur les quatre catégories $(*)$ (bordantes gauches) de page 70, qui servent indifférement à décrire $\mathrm{HOT}_W(S)$, par

$$s \longmapsto \mathrm{hot}_W(X_s)$$

dans le cas des trois catégories distinctes de Cat/S, et par

$$s \longmapsto \mathrm{hot}_W(s\backslash X)$$

46. sans doute dans tous les cas où S n'est pas équivalente à une catégorie dicrète.

dans le cas de Cat/S. La dépendence fonctorielle par rapport à s est évidente dans le cas de Cat/S (donnée par $s \longmapsto \mathrm{hot}_W(s\backslash X)$), et dans le cas de $\underline{\mathrm{Fibsc}}\, S$, $\underline{\mathrm{Fib}}\, S$, où on dispose, pour $u : s \longrightarrow t$ dans S, du changement de base

$$u^* : X_t \longrightarrow X_s.$$

Dans le cas de $\underline{\mathrm{Liss}}\, S$, la dépendence fonctorielle se déduit de celle de $\mathrm{hot}_W(s\backslash X)$, grâce au fait que l'inclusion

$$X_s \longrightarrow s\backslash X$$

est alors une W-équivalence.

On a une interprétation duale de l'application $(*)'$, `[mot illisible]`

p. 46

$$s \longmapsto \mathrm{hot}_W(X_s) \qquad \text{ou} \qquad s \longmapsto \mathrm{hot}_W(s\backslash X),$$

[page 74]

avec la loi fonctorielle en s déduite du foncteur $t\backslash X \longrightarrow s\backslash X$ `[plutôt` $X/s \longrightarrow X/t$`]` (pour $u : s \longrightarrow t$) dans le cas du Cat/S, du foncteur cochangement de base dans les cas de $\underline{\mathrm{Cofib}}\, S$ et $\underline{\mathrm{Cofibsc}}\, S$, et de la variante pour Cat/S et de la W-équivalence

$$X_s \longrightarrow X/s$$

dans le cas de $\underline{\mathrm{Prop}}\, S$.

On trouve alors ceci : pour qu'un objet ξ de $\mathrm{HOT}_W(S)$ (resp. $\mathrm{HOT}^o_W(S)$) soit dans l'image essentielle de $\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S)$, il faut et il suffit que le foncteur associé $S^o \longrightarrow \mathrm{Hot}_W$ (resp. $S \longrightarrow \mathrm{Hot}_W$) soit un système local ([47]), i.e. transforme toute flèche de S en un isomorphisme, i.e. se factorise par $(\Pi S)^o \longrightarrow \mathrm{Hot}_W$ resp. $\Pi S \longrightarrow \mathrm{Hot}_W$ ([48]). Donc pour un X dans Cat/S, cela signifie soit que les foncteurs


$$t\backslash X \longrightarrow s\backslash X$$

associés à des $u : s \longrightarrow t$ dans S soient tous des W-équivalences (cas de $\mathrm{HOT}_W(S)$), soit que les foncteurs

$$X/s \longrightarrow X/t$$

le soient (cas de $\mathrm{HOT}^o_W(S)$). (NB. ces conditions ne sont nullement équivalentes. Mais si X `[est]` lisse `[sur]` S, la première implique la seconde, et l'inverse est vrai si X est propre sur S, et dans ce cas, la condition équivaut à ce que X soit dans $\underline{\mathrm{Fibhot}}$. Enfin, si X est déjà dans $\underline{\mathrm{Fibhot}}\, S$, alors les deux conditions sont automatiquement satisfaites ([49]).

[page 75]



([50]). De plus, si deux éléments $\xi \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{HOT}_W(S)$, $\xi' \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{HOT}^o_W(S)$ proviennent d'un

47. il faudra encore écrire la vérification
48. où ΠS est le groupoïde fondamental de S
49. On aurait dû dans le diagramme introduire aussi $\underline{\mathrm{Liss}}_0 S$, $\underline{\mathrm{Prop}}_0 S$!

p. 47

même $\eta \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S)$, alors les deux foncteurs correspondants


$$(\Pi S)^o \xrightarrow{\varphi} \mathrm{Hot}_W \xleftarrow{\varphi'} \Pi S$$

sont *associés,* i.e. chacun est isomorphe à 'l'inverse' de l'autre.

$$\left\{ \begin{array}{lcl} \varphi^o(s) & = & \varphi(s) \\ \varphi^o(u) & = & \varphi(u)^{-1}. \end{array} \right.$$

(VI) NB Dans la nouvelle version du diagramme, où j'ai rajouté des catégories $\underline{\mathrm{Liss}}_0 S$ et $\underline{\mathrm{Prop}}_0 S$ pour rendre le tracé plus transparent, les catégories appelés 'bordantes' deviennent le 'rez-de-chausseée', et les catégories 'internes', le 'premier étage' ou 'étage'. Tous les 7 carrés du diagramme sont catésiens. Toutes les flèches sont des inclusions pleinement fidèles, sauf les quatre flèches horizontales extérieures des catégories de Cat-fibrés ou de Cat-cofibrés *scindés*, avec morphismes exclusivement cartésiens ou cocartésiens et même compatibles avec les scindages, vers les catégories correspondantes de structures non scindées.

[page 76]



J'ai tracé en pointillés verts `[couleur dans l'original seulement]` les cinq foncteurs Φ, Ψ, Φ_0, Ψ_0, C qui par passage aux localisés donnent des quasi-inverses pour toutes les équivalences de catégories énoncées dans (I) (II) du présent Scholie. De façon précise, le foncteur

$$\Phi : \mathrm{Cat}/S \longrightarrow \underline{\mathrm{Fibsc}}\, S$$

associe à toute X dans Cat/S la catégorie scindée sur S

$$s \longmapsto s\backslash X$$

sur S. Ce foncteur, et ses restrictions à $\underline{\mathrm{Liss}}\, S$, $\underline{\mathrm{Fib}}\, S$ et, plus généralement, à toute sous-catégorie pleine $\mathcal{F}$ de Cat/S contenant $\underline{\mathrm{Fib}}\, S$, est compatible avec les localiseurs W_S d'une part (sur $\mathcal{F}$ et $\underline{\mathrm{Fibsc}}\, S$), W_S^{d} d'autre part, et passe donc aux localisés correspondants, pour fournir le quasi-inverse cherché de

p. 48

$$(\underline{\mathrm{Fibsc}}\, S)\Sigma^{-1} \longrightarrow \mathcal{F}\Sigma^{-1} \qquad (\Sigma = W_S \text{ ou } W_S^{\mathrm{d}})$$

On peut aussi, pour toute sous-catégorie pleine $\mathcal{F}'$ intermédiaire

$$\underline{\mathrm{Fib}}\, S \subseteq \mathcal{F}' \subseteq \mathcal{F} \subseteq \mathrm{Cat}/S,$$

50. Le diagramme de *quinze* catégories remarquables.

regarder Φ comme un foncteur $\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}'$ (plus précisément, prendre le composé

$$\mathcal{F} \xrightarrow{\Phi|\mathcal{F}} \underline{\mathrm{Fibsc}}\, S \longrightarrow \underline{\mathrm{Fib}}\, S \hookrightarrow \mathcal{F}'\ ),$$

soit $\Phi_{\mathcal{F}',\mathcal{F}}$, et de ce qui vient d'être dit résulte que les deux foncteurs

$$\mathcal{F}' \underset{\Phi_{\mathcal{F}',\mathcal{F}}}{\overset{\longrightarrow}{\hookleftarrow}} \mathcal{F}$$

établissent des équivalences quasi-inverses l'une de l'autre [page 77]

$$\mathcal{F}'\Sigma^{-1} \underset{\Phi_{\mathcal{F}',\mathcal{F}}}{\overset{\approx}{\underset{\approx}{\rightleftarrows}}} \mathcal{F}\Sigma^{-1} \qquad (\Sigma = W_S \text{ ou } W_S^{\mathrm{d}})$$

Énoncé dual pour le foncteur

$$\Psi : \mathrm{Cat}/S \longrightarrow \underline{\mathrm{Cofibsc}}\, S,$$

associant à X dans Cat/S la catégorie cofibrée scindée sur S

$$s \longmapsto X/s.$$

Il donne des couples de foncteurs quasi-inverses

$$(\underline{\mathrm{Cofibsc}}\, S)\Sigma^{-1} \underset{\Psi_{\mathcal{F}}}{\overset{\longrightarrow}{\hookleftarrow}} \mathcal{F}\Sigma^{-1} \qquad (\Sigma = W_S \text{ ou } W_S^{\mathrm{g}})$$

pour tout sous-catégorie pleine $\mathcal{F}$ de Cat/S telle que

$$\underline{\mathrm{Cofib}}\, S \subseteq \mathcal{F} \subseteq \mathrm{Cat}/S,$$

et des couples de foncteurs quasi-inverses p. 49

$$\mathcal{F}'\Sigma^{-1} \underset{\Psi_{\mathcal{F}',\mathcal{F}}}{\overset{\approx}{\underset{\approx}{\rightleftarrows}}} \mathcal{F}\Sigma^{-1} \qquad (\Sigma = W_S \text{ ou } W_S^{\mathrm{g}})$$

pour deux sous-catégories pleines $\mathcal{F}'$, $\mathcal{F}$

$$\underline{\mathrm{Cofib}}\, S \subseteq \mathcal{F}' \subseteq \mathcal{F} \subseteq \mathrm{Cat}/S.$$

Les foncteurs Φ, Ψ envoient la sous-catégorie pleine $\underline{\mathrm{Fibhot}}\, S$ de 'l'étage', dans les sous-catégories $\underline{\mathrm{Fibsc}}_0 S$, $\underline{\mathrm{Cofibsc}}_0 S$, respectivement, donc induisent à l'étage des foncteurs Φ_0, Ψ_0

$$\underline{\mathrm{Fibsc}}_0 S \xleftarrow{\Phi_0} \underline{\mathrm{Fibhot}}\, S \xrightarrow{\Psi_0} \underline{\mathrm{Cofibsc}}_0 S,$$

jouant à l'étage exactement le même rôle que Φ, Ψ au rez-de-chaussée. La seule différence, c'est que à l'étage on a $W_S = W_S^{\mathrm{d}} = W_S^{\mathrm{g}}$ $(= W_S^{\mathrm{f}})$, donc il n'y a qu'une suite de catégories [page 78] localisées à examiner. On trouve ainsi

$$(\underline{\mathrm{Fibsc}}_0 S)W_S^{-1} \underset{\Phi_{0,\mathcal{F}}}{\overset{\approx}{\underset{\approx}{\rightleftarrows}}} \mathcal{F}W_S^{-1}$$

$$\mathcal{F}'W_S^{-1} \xrightarrow{\approx} \mathcal{F}W_S^{-1}$$
$$\overset{\approx}{\underset{\Phi_{0,\mathcal{F}',\mathcal{F}}}{\curvearrowleft}}$$

pour $\mathcal{F}$ (ou $\mathcal{F}$, $\mathcal{F}'$) sous-catégorie(s) pleine(s) de $\underline{\mathrm{Fibhot}}\, S$ telle(s) que

$$\underline{\mathrm{Fib}_0}S \subseteq \mathcal{F} \subseteq \underline{\mathrm{Fibhot}}\, S \qquad \text{resp.} \qquad \underline{\mathrm{Fib}_0}S \subseteq \mathcal{F}' \subseteq \mathcal{F} \subseteq \underline{\mathrm{Fibhot}}\, S,$$

et de même du côté droit pour les sous-catégories pleines $\mathcal{F}$ ou $\mathcal{F}$, $\mathcal{F}'$ de $\underline{\mathrm{Fibhot}}\, S$ satisfaisant


$$\underline{\mathrm{Cofib}_0}S \subseteq \mathcal{F} \subseteq \underline{\mathrm{Fibhot}}\, S \qquad \text{resp.} \qquad \underline{\mathrm{Cofib}_0}S \subseteq \mathcal{F}' \subseteq \mathcal{F} \subseteq \underline{\mathrm{Fibhot}}\, S,$$

NB. La catégorie $\underline{\mathrm{Parf}}\, S$ contient à la fois $\underline{\mathrm{Fib}_0}S$ et $\underline{\mathrm{Cofib}_0}S$, et fait donc partie des catégories admissibles tout comme $\mathcal{F}$, ou [?] $\mathcal{F}'$.

Ainsi, les quatre foncteurs Φ, Ψ, Φ_0, Ψ_0 donnent tous les quasi-inverses qu'on peut souhaiter au rez-de-chaussée d'une part (Φ et Ψ), à l'étage de l'autre (Φ_0, Ψ_0). Ils ramènent donc toutes les localisées pertinentes aux quatre suivantes

$$(\mathrm{Cat}/S)W_S^{-1}, \quad (\mathrm{Cat}/S)(W_S^{\mathrm{d}})^{-1}, \quad (\mathrm{Cat}/S)(W_S^{\mathrm{g}})^{-1} \qquad \text{(au rez-de-chaussée)}$$
$$(\underline{\mathrm{Fibhot}}\, S)W_S^{-1} \qquad \text{(à l'étage).}$$

(VII) Il reste à comparer la localisée à l'étage avec les localisées au rez-de-chaussée. Les flèches verticales descendantes de l'étage au rez-de-chaussée, sont compatibles avec W_S^{d} du côté gauche du diagramme, avec W_S^{g} du côté droit, donc elles induisent essentiellement *deux* foncteurs différents i, j sur $(\underline{\mathrm{Fibhot}}\, S)W_S^{-1}$, dans $(\mathrm{Cat}/S)(W_S^{\mathrm{d}})^{-1}$ et $(\mathrm{Cat}/S)(W_S^{\mathrm{g}})^{-1}$: p. 50
[page 79]



,

de façon à faire commuter le carré complété par les pointillés, représentant les foncteurs de localisation ρ, σ. On a bien sûr

$$(*) \qquad \rho i = \sigma j : (\underline{\mathrm{Fibhot}}\, S)W_S^{-1} \longrightarrow (\mathrm{Cat}/S)W_S^{-1}$$
induit par l'inclusion
$$\delta : \underline{\mathrm{Fibhot}}\, S \hookrightarrow \mathrm{Cat}/S$$

Nous avons énoncé dans (I) que cette flèche est une équivalence, de sorte que ρ et σ peuvent être interprétées, à isomorphisme de foncteurs près, comme des rétractions de $\mathrm{HOT}_W(S)$ et de $\mathrm{HOT}^{\mathrm{o}}_W(S)$ sur une sous-catégorie commune, s'interprétant soit comme $(\underline{\mathrm{Fibhot}}\, S)W_S^{-1}$, soit comme $(\mathrm{Cat}/S)W_S^{-1}$. Il reste à décrire le foncteur quasi-inverse de $(*)$, ce qui donnera en même temps les quasi-inverses de tous les foncteurs verticaux (de l'étage vers le rez-de-chaussée) dans le diagramme p. 76, plus exactement pour leurs localisés, pour W_S. [page 80]

C'est ce qui est obtenu à l'aide du foncteur 'montant' (du rez-de-chaussée vers l'étage) C, qu'on peut regarder comme un foncteur $\mathrm{Cat}/S \longrightarrow \underline{\mathrm{Fibhot}}\, S$, mais qui en fait prend ses valeurs dans $\underline{\mathrm{Parf}}\, S$. (C'est là un détail sans grande importance, me semble-t-il.)

$$\mathrm{Cat}/S \xrightarrow{C} \underline{\mathrm{Parf}}\, S \hookrightarrow \underline{\mathrm{Fibhot}}\, S.$$

Ce foncteur est compatible avec les localiseurs W_S des deux côtés, et établit des équivalences (quasi-inverses des équivalences

$$(\underline{\mathrm{Parf}}\, S)W_S^{-1} \xrightarrow{\sim} (\mathrm{Cat}/S)W_S^{-1} \qquad \text{et} \qquad (\underline{\mathrm{Fibhot}}\, S)W_S^{-1} \xrightarrow{\sim} (\mathrm{Cat}/S)W_S^{-1}),$$
$$(\mathrm{Cat}/S)W_S^{-1} \xrightarrow{\sim} (\underline{\mathrm{Parf}}\, S)W_S^{-1} \left(\xrightarrow{\sim} (\underline{\mathrm{Fibhot}}\, S)W_S^{-1}\right).$$

Donc, quand les trois catégories HOT pour S sont interprétées en termes de localisées de Cat/S, c'est le foncteur C (plus exactement le composé $\mathrm{Cat}/S \xrightarrow{C} \underline{\mathrm{Parf}}\, S \hookrightarrow \mathrm{Cat}/S$) p. 51 qui fournit à la fois le foncteur d'inclusion (!) i, et le foncteur d'inclusion j dans $\mathrm{HOT}_W(S)$ et $\mathrm{HOT}^{\mathrm{o}}_W(S)$ respectivement. Le foncteur en question

$$C' : \mathrm{Cat}/S \longrightarrow \mathrm{Cat}/S$$

satisfait bien

$$C'(W_S) \subseteq W_S^{\mathrm{d}} \cap W_S^{\mathrm{g}}$$

et définit les deux foncteurs

$$\begin{array}{ccc} & & (\mathrm{Cat}/S)(W_S^{\mathrm{d}})^{-1} \approx \mathrm{HOT}_W(S) \\ & \overset{i}{\nearrow} & \\ (\mathrm{Cat}/S)W_S^{-1} & & \\ \approx \mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S) & & \\ & \underset{j}{\searrow} & \\ & & (\mathrm{Cat}/S)(W_S^{\mathrm{g}})^{-1} \approx \mathrm{HOT}^{\mathrm{o}}_W(S) \end{array}$$

Cela nous permet d'expliciter les formules d'adjonction de (IV), quand on y interprète ξ, η comme provenant de X, Y dans Cat/S :

$$\boxed{\mathrm{Hom}_{W_S^{\mathrm{d}}}(X, CY) \simeq \mathrm{Hom}_{W_S^{\mathrm{g}}}(X, CY) \simeq \mathrm{Hom}_{W_S}(X, Y),}$$

[page 81]

où $\mathrm{Hom}_{W_S^{\mathrm{d}}}$, $\mathrm{Hom}_{W_S^{\mathrm{g}}}$ et Hom_{W_S} désignent respectivement les Hom dans les catégories localisées pour W_S^{d}, W_S^{g} et W_S, i.e. dans $\mathrm{HOT}_W(S)$, $\mathrm{HOT}^{\mathrm{o}}_W(S)$ et $\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S)$ respectivement ([51]).

Commentaire. Toutes les constructions et les énoncés de (I) à (VI), à l'exception du fait que les foncteurs descendants induisent des équivalences pour les localisés *grossiers*, et des formules d'adjonction de (IV), sont de nature quasiment soritale, et n'exigent d'autres conditions sur le localiseur fondamental $W \subseteq \mathrm{Fl}\,\mathrm{Cat}$ que L1, L3 quater, L4 bis, récapitulées comme a) b) c) de la page 45. (On n'a même pas à utiliser d).) Il est vrai qu'en l'absence de la condition L5 (page 43), on ignore si à l'étage les deux localiseurs pertinents, W_S et W_S^{f} (égal à W_S^{d} du côté gauche, à W_S^{g} du côté droit) sont égaux. Donc à priori on trouve à l'étage *deux* catégories localisées essentiellement distinctes, et non pas une seule, savoir $(\underline{\mathrm{Fibhot}}\, S)\Sigma^{-1}$ avec $\Sigma = W_S$ ou $\Sigma = W_S^{\mathrm{f}}$ $(= W_S^{\mathrm{d}} = W_S^{\mathrm{g}})$.

51. Cette formule suggère que si $X \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{Cat}/S$, $Y \in \mathrm{Ob}\,\underline{\mathrm{Fibhot}}\, S$, alors

$$\mathrm{Hom}_{W_S^{\mathrm{d}}}(X, Y) \simeq \mathrm{Hom}_{W_S^{\mathrm{g}}}(X, Y) \simeq \mathrm{Hom}_{W_S}(X, Y),$$

p. 52

mais ça résulte de la formule d'adjoinction et de $Y \longrightarrow C(Y)$ dans $W_S^{\mathrm{d}} \cap W_S^{\mathrm{g}}$ pour Y dans $\underline{\mathrm{Fibhot}}\, S$.

Par contre, le fait que les foncteurs de descente induisent des équivalences entre les localisés grossiers est plus profond, il exige (me semble-t-il) qu'on connaisse un foncteur 'montant' C, disons de Cat/S vers $\underline{\mathrm{Fibhot}}\, S$, compatible avec W_S, et muni de

$$X \xrightarrow{i_X} C(X),$$

qui soit dans W_S pour X quelconque. Quand on sait que Cat est une catégorie de Quillen, même sans avoir les propriétés des foncteurs $\underline{\mathrm{Ch}}_\infty$ ou $\underline{\mathrm{Ch}}$ ([52]), on doit sans doute pouvoir [page 82] se débrouiller. Mais la formule d'adjonction me semble rester inattendue et profonde, même en admettant les résultats de Quillen et Thomason ([53]). Elle parait liée ici à une propriété assez particulière du foncteur C, savoir le lemme p. 68

$$\begin{array}{c} i_{C(X)} \underset{\uparrow}{=} C(i_X) : C(X) \longrightarrow C(C(X)), \\ \text{dans } \underbrace{(\mathrm{Cat}/S)(W_S^{\mathrm{d}})^{-1}}_{\mathrm{HOT}_W(S)} \text{ et dans } \underbrace{(\mathrm{Cat}/S)(W_S^{\mathrm{g}})^{-1}}_{\mathrm{HOT}^o_W(S)} \end{array}$$

ce qui n'a pas l'air purement formel. Il serait intéressant d'examiner dans quelle mesure cette formule garde un sens dans une 'catégorie de modèles' $(\mathcal{M}, W)$ plus ou moins quelconque, ou provenant d'un triple de Quillen $(W, \mathrm{Cof}, \mathrm{Fib})$ dans $\mathcal{M}$. Il est clair que la factorisation $X \xrightarrow{f} S$ en $X \xrightarrow{i_X} C(X) \xrightarrow{\bar f} S$ ($i_X \in W$, $\bar f \in \mathrm{Parf}$), jouant le rôle des 'fibrations' dans le contexte Quillen, a un sens intrinsèque indépendant du choix d'une construction particulière, chose qu'on peut préciser de façon parfaite. C'est la description des localiseurs W_S^{d}, W_S^{g} dans $\mathcal{M}/S$ (pour $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$) qui n'est pas comprise de façon générale, en dehors du cas $\mathcal{M} = \mathrm{Cat}$. En d'autre termes, je ne comprends pas comment construire des catégories $\mathrm{HOT}_{\mathcal{M},W}(S)$, $\mathrm{HOT}^o_{\mathcal{M},W}(S)$, même si $(\mathcal{M}, W)$ provient d'un triple de Quillen, je vois seulement la description d'une catégorie $\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_{\mathcal{M},W}(S) = (\mathcal{M}/S)(W_S^{\text{grossière}})^{-1}$, et un foncteur de localisation $\mathcal{M}/S \longrightarrow \mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_{\mathcal{M},W}(S)$. Il faut arriver à décrire dans $\mathcal{M}/S$ des W-équivalences (*'relatives à S'*) plus fines que la grossière donnée par W sur la source X sans plus. Dans Cat j'y arrive en utilisant soit la famille des isomorphismes locaux (pour décrire W_S^{d}), soit celle des isomorphismes colocaux (pour décrire W_S^{g}) - en tous les cas, il y a une notion de 'localisation' (soit sur S, soit sur S^o …), avec toute la richesse [page 83] des intuitions liées à une telle notion. Peut-être, sans le savoir ai-je toujours traité Cat non comme une catégorie 'nue', mais comme un site, ou plutôt (puisqu'il y a l'involution p. 53 $X \longmapsto X^o$ qui ne peut être éludée), comme un 'bi-site' - on y a *deux* manières de localiser, soit par les X/x (topologie de Zariski !) soit par les $x\backslash X$ (topologie co-Zariskienne). Il y a aussi la topologie lisse (toute proche sans doute de l'intuition de la cohomologie étale), et la topologie propre - et on s'attend que la lisse donne essentiellement les mêmes résultats que la Zariskienne (vue que la topologie étale lui est égale - il n'y a pas lieu d'en faire un plat …) ; et la topologie propre les mêmes résultats (p. ex. la même cohomologie ?) que la topologie co-Zariskienne.

Il semble bien que dans toutes les catégories de modèles utilisées jusqu'à présent pour décrire Hot comme une localisée, on dispose de notions de localisation : (Top), $\mathbf{\Delta}^\wedge$ (ou $A^\wedge$, avec A catégorie-test quelconque), (Cat) ; et dans Cat on dispose même de *deux* telles notions. Je pense par contre aux ∞-groupoïdes, c'est peut-être la seule catégorie de modèles à tel point proche déjà de Hot elle-même, qu'on n'y discerne pas de notion de localisation, et que l'idée même de vouloir s'y localiser (si ce n'est en 'localisant' Hot lui-même) paraît quasiment saugrenue. [page 84]

---

52. ni même être sûr de l'existence d'une factorisation *fonctorielle* de $X \xrightarrow{f} S$ en $X \xrightarrow{i_X} C(X) \xrightarrow{\bar f} S$

Cette rapide digression ne convainc à présent que la compatibilité dite pour la construction de $C(X)$ et $i_X : X \longrightarrow C(X)$, ne peut en aucun cas être purement formelle, une pure histoire de catégories de Quillen disons. Ça donnera au mieux la compatibilité dans $(\mathcal{M}/S)W_S^{-1}$, ce qui est ridicule ! Mais si on prend comme localiseur Σ dans $\mathcal{M}/S$ les isomorphismes sans plus, la relation de compatibilité va devenir fausse à tous les coups ! Comme ensemble de flèches Σ un peu plus raisonnable, qui soit encore très petit, on peut songer p. ex. à la W-équivalence *universelle* sur S (nettement plus fine encore que W_S^{d}, W_S^{g} dans le cas particulier de Cat). Aurait-on encore compatibilité pour cet ensemble de flèches ? Je suis aussi un peu perplexe par le fait (pas bien compris) que les formules d'adjonction pour les topologies Zariskienne et co-Zariskienne soient en sens opposé. (Ou me serai-je trompé en dualisant à la va-vite ?) Mais à vrai dire, cette compatibilité à elle seule, même quand on utilise une structure de site sur $\mathcal{M}$, ne suffit pas à écrire une formule d'adjonction. On a deux catégories localisées,

$$\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_{\mathcal{M}} = (\mathcal{M}/S)W_S^{-1}, \qquad \mathrm{HOT}_W(S) = (\mathcal{M}/S)(W_S^{\mathrm{f}})^{-1},$$

où W_S^{f} désigne une W-équivalence 'fine', correspondant à la notion de localisation, plus exactement aux changements de base 'admissibles' qu'on a choisis, et on a un foncteur de localisation [page 85]

$$\mathrm{Hot}_W(S) \longrightarrow \mathrm{Hot}^{\mathrm{lc}}_W(S),$$

mais pas de foncteur en sens inverse. Mais si, mais si, en travaillant avec la catégorie similaire $\underline{\mathrm{Fibhot}}\, S$, ça doit garder un sens tout au moins quand on a une bonne notion de 'fibration'. Je vois un petit travail de dégrossissage conceptuel à faire, avec peut-être une formule d'adjonction à la clef, mais je ne vais pas m'y lancer à présent.

p. 54

16.11.90


Je vais quand même essayer de faire un travail 'de dégrossissage', car le diagramme des 15 catégories a l'air un peut touffu, finalement ! Je me donne

$$(\mathcal{M}, W) \qquad W \subseteq \mathrm{Fl}\,\mathcal{M},$$

un $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$, d'où $\mathcal{M}/S$, avec $W_S \subseteq \mathrm{Fl}(\mathcal{M}/S)$ induit par W. On va poser

$$\mathrm{Ho}^{\mathrm{lc}}(S) = (\mathcal{M}/S)W_S^{-1},$$

ça jouera le rôle des types d'homotopie relativement constants. Je suppose d'autre part que l'on a distingué une classe $F \subseteq \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ de flèches, jouant le rôle de 'fibrations' (ce seront les morphismes Hot-fibrants dans Cat, donnant lieu à la sous-catégorie $\underline{\mathrm{Fibhot}}\, S$ de Cat/S). Je prévois qu'il faudra supposer, outre que $\mathcal{M}$ est stable par $\varprojlim$ finie, que F est stable par changement de base quelconque, et stable par composition, qu'il contient [page 86] les isomorphismes. Et surtout qu'on a un théorème de factorisation



$$i_X \in W,\ \bar{f} \in F$$

pout toute flèche f dans $\mathcal{M}$. Chez Quillen on exige même que i_X ait la propriété de relèvement à droite relativement à F, mais ça ne devrait pas être essentiel, puisque je

avec $i_X \in W$ et $\bar{f}$ parfait.

53. Voir cependant le théorème scholie 2, p. 108-113. Ce n'est finalement pas si profond qu'il me semblait, mais quasiment sorital !

n'ai pas eu à utiliser ce fait dans Cat. Quand je travaille dans la catégorie $\mathcal{M}/S$, où f est sous-entendu pour un objet X de ladite, je noterai (par abus de langage) $C(X)$ pour $\bar{X}$, bien qu'il n'est pas dit qu'on ait un choix canonique de $C(X)$, encore moins que $C(X)$ dépende fonctoriellement de X.

Désignons par

$$\underline{\mathrm{Fib}}\, S \subseteq \mathcal{M}/S \qquad (*)$$

la sous-catégorie de $\mathcal{M}/S$ formée des X dont le morphisme structural $f_X : X \longrightarrow S$ est dans F. Désignons (par abus de notation) par W_S le localiseur induit sur $\underline{\mathrm{Fib}}\, S$ par W_S, alors l'inclusion $(*)$ définit

$$(\underline{\mathrm{Fib}}\, S)W_S^{-1} \xrightarrow{\delta} (\mathcal{M}/S)W_S^{-1} \overset{\text{déf}}{=} \mathrm{Ho}_W^{\mathrm{lc}}(S).$$

Une première question, c'est de voir que c'est une équivalence. On voit que c'est [page 87] essentiellement surjectif grâce à l'existence des $C(X)$, i_X. C'est peu ! On va essayer de définir une flèche en sens inverse

$$\bar{C} : (\mathcal{M}/S)W_S^{-1} \longrightarrow (\underline{\mathrm{Fib}}\, S)W_S^{-1},$$

i.e. un *foncteur* p. 55

$$\gamma : \mathcal{M}/S \longrightarrow (\underline{\mathrm{Fib}}\, S)W_S^{-1}$$

qui transforme $W_S \subseteq \mathrm{Fl}(\mathcal{M}/S)$ en isomorphismes. On choisira, pour X dans $\mathcal{M}/S$, un $C(X)$ dans $\underline{\mathrm{Fib}}\, S$ et une

$$i_X : X \longrightarrow C(X)\ , \qquad i_X \in W_S,$$

et on posera

$$\gamma(X) = C(X).$$

La difficulté, c'est de montrer que ça ne dépend pas des choix faits, à isomorphisme canonique près, et que c'est fonctoriel en X - et le deuxième implique le premier.

Pour voir que ça marche, visiblement il faut supposer quelque chose de plus. Je vois deux hypothèses qui, l'une et l'autre, pourraient faire marcher : l'une, c'est qu'on se donne déjà C comme foncteur et i_X fonctoriel en X (c'est ce qui était le cas dans Cat tantôt). L'autre, c'est que les i_X ont, par rapport à F, la propriété de relèvement à là Quillen. [page 88]

Je commence par l'hypothèse que C est déjà un foncteur. Le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{i_X} & CX \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle C(u)} \\ X' & \xrightarrow{i_{X'}} & CX', \end{array}$$

où $i_X,\ i_{X'} \in W$, montre que C transforme W_S en W_S, donc en des isomorphismes de $\mathrm{Ho}_W^{\mathrm{lc}}(S)$. Donc on tient le foncteur cherché γ. On a en fait des foncteurs

$$\underline{\mathrm{Fib}}\, S \underset{C}{\overset{\overset{\text{incl.}}{D}}{\hookrightarrow}} \mathcal{M}/S$$

compatibles avec les localiseurs W_S, induisant δ et γ, et on a

$$\mathrm{id}_{\mathcal{M}/S} \longrightarrow DC, \qquad \text{dans } W_S \text{ argument par argument},$$

car on a

$$X \xrightarrow{i_X} DC(X) = C(X)$$

avec $i_X \in W_S$. De même, on a

$$\mathrm{id}_{\underline{\mathrm{Fib}}\, S} \longrightarrow CD \qquad \text{dans } W_S \text{ argument par argument,}$$

avec le même

$$X \xrightarrow{i_X} CX \qquad \text{(cette fois } X \text{ dans } \underline{\mathrm{Fib}}\, S\text{).}$$

p. 56

Donc on a sans larmes les deux foncteurs δ, γ comme quasi-inverses l'un de l'autre. Et le lemme page 11 montre même que pour *toute* sous-catégorie pleine $\mathcal{F}$ de $\mathcal{M}/S$, telle que [page 89]

$$\underline{\mathrm{Fib}}\, S \subseteq \mathcal{F} \subseteq \mathcal{M}/S,$$

les inclusions induisent des équivalences sur les localisés W_S

$$(\underline{\mathrm{Fib}}\, S)W_S^{-1} \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}W_S^{-1} \xrightarrow{\sim} \underbrace{(\mathcal{M}/S)W_S^{-1}}_{\overset{\text{déf}}{=}\mathrm{Ho}^{\mathrm{lc}}_W(S)}.$$

Je vais traiter maintenant le cas de type Quillen, pour me convaincre que l'existence du foncteur C, et le choix particulier qu'on peut en faire, est irrelevant. (Ce dernier point est d'ailleurs évident a posteriori, quand on sait que δ est une équivalence, car le quasi-inverse γ sera alors unique à isomorphisme unique près, et le choix d'un foncteur C, et d'un homomorphisme fonctoriel $i : \mathrm{id} \longrightarrow C$, n'est qu'une façon parmi d'autres d'expliciter le quasi-inverse.)


On se place donc dans l'hypothèse quillénienne sur les i_X. On choisit $C(X)$, i_X pour chaque X dans $\mathcal{M}/S$, et on pose comme tantôt [page 90]

$$\gamma(X) = C(X) \qquad \text{comme objet de } (\mathcal{M}/S)W_S^{-1}.$$

Montrons que c'est fonctoriel en X. Soit

$$u : X \longrightarrow X'$$

dans $\mathcal{M}/S$, considérons le diagramme anodin (commutatif)



complétons le par la flèche en gros pointillés, $v = i_{X'}u$ (rendant le triangle supérieur commutatif). ([54]). L'hypothèse sur i_X implique que la flèche $\bar{u}$ en pointillés fins existe, de façon à avoir encore deux triangles commutatifs. Mais ça signifie exactement qu'il y a un *S-morphisme* $\bar{u}$, i.e. une flèche dans $\mathcal{M}/S$, rendant commutatif le carré

54. Lemme : soit

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{u} & X' \\ {\scriptstyle i}\downarrow & & \downarrow \\ C & \dashrightarrow & C' \end{array}$$

p. 57

dans $\mathcal{M}/S$ avec $i \in \mathrm{Cof}_0$, $(C' \longrightarrow S) \in F = \mathrm{Fib}$, alors la flèche en pointillés existe dans $\mathcal{M}/S$, de façon à rendre le carré commutatif. [cf. Lemme p. 91]

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{u} & X' \\ {\scriptstyle i_X}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i_{X'}} \\ C(X) & \xrightarrow{\bar{u}} & C(X'), \end{array}$$

et il s'impose de prendre [page 91]

$$\gamma(u) = \text{ image de } \bar{u} \text{ dans } \mathrm{Fl}((\underline{\mathrm{Fib}}\, S)W_S^{-1}).$$

Il faut prouver que cette flèche ne dépend pas du choix de $\bar{u}$. On doit dégager un Lemme, où on désigne par Cof_0 l'ensemble des flèches de $\mathcal{M}$ qu'ont la propriété de relèvement par rapport aux éléments de $\mathrm{Fib} = F$. (Cof_0 joue le rôle des cofibrations triviales.)

Lemme. *Soit un diagramme en traits pleins dans $\mathcal{M}/S$*

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{u} & X' \\ {\scriptstyle i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i'} \\ C & \overset{v}{\cdots\!\rightarrow} & C' \end{array}$$

avec $i \in Cof_0$, et $C' \in Ob\,\underline{\mathrm{Fib}}\, S$ i.e. $(C' \longrightarrow S) \in Fib$. Alors v existe, de façon à rendre le carré commutatif. De plus, si $i \in W$ et $C \in \mathrm{Ob}\,\underline{\mathrm{Fib}}\, S$, la classe de v comme flèche de $(\underline{\mathrm{Fib}}\, S)W_S^{-1}$ en est indépendante du choix fait.

Il reste à prouver cette indépendance, ce qui résultera aussitôt du corollaire : [page 92]

Corollaire. *Soit un diagramme dans $\mathcal{M}/S$*

$$X \xrightarrow{i} C \underset{v_2}{\overset{v_1}{\rightrightarrows}} C',$$

avec C et C' dans $\underline{\mathrm{Fib}}\, S$ (i.e. $C \longrightarrow S$ et $C' \longrightarrow S$ dans Fib), et $i \in Cof_0$ et $i \in W$. Si $v_1 i = v_2 i$, alors v_1 et v_2 définissent la même flèche de $(\underline{\mathrm{Fib}}\, S)W_S^{-1}$.

Démonstration. Soit p. 58

$$v = (v_1, v_2) : C \longrightarrow C' \times C',$$

`[plutôt` $C' \times_S C'$`]` qui rend commutatif par hypothèse le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{w} & C' \\ {\scriptstyle i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{diag}_{C'}} \\ C & \xrightarrow{v} & C' \times_S C', \end{array}$$

où $w = v_1 i = v_2 i$. Factorisons $\mathrm{diag}_{C'}$ en

$$C' \xrightarrow{i'} \bar{C}' \xrightarrow{\delta'} C' \times_S C', \qquad \text{avec } \delta' \in \mathrm{Fib},$$

et $i' \in W$. On trouve un carré commutatif

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{w'=i'w} & \bar{C}' & & \\ {\scriptstyle i}\downarrow & \overset{\bar{v}}{\nearrow} & \downarrow{\scriptstyle \delta'} & & \\ C & \xrightarrow{v} & C' \times_S C' & \underset{\mathrm{pr}_2}{\overset{\mathrm{pr}_1}{\rightrightarrows}} & C' \end{array}$$

[page 93]

avec $i \in \mathrm{Cof}_0$, $\delta' \in \mathrm{Fib}$, d'où l'existence de la flèche en pointillés, rendant les deux triangles commutatifs. On veut prouver $\mathrm{pr}_1 \circ v = \mathrm{pr}_2 \circ v$ dans $(\underline{\mathrm{Fib}}\, S)W_S^{-1}$, comme $v = \delta'\bar{v}$ il suffit de prouver que l'on a $\mathrm{pr}_1\delta' = \mathrm{pr}_2\delta'$ dans $(\underline{\mathrm{Fib}}\, S)W_S^{-1}$.

Il faut seulement vérifier d'abord (pour justifier l'argument) que cette assertion a un sens, i.e. que $\bar{C}'$ est lui aussi dans $\underline{\mathrm{Fib}}\, S$. Mais les hypothèses de stabilité de $F = \mathrm{Fib}$ par changement de base et composition assurent que 1°) $C' \times_S C'$ est dans $\underline{\mathrm{Fib}}\, S$ (qui est stable par produit), et par suite, 2°) que $\bar{C}'$ l'est aussi, puisque $\delta' \in \mathrm{Fib}$. Comme C' est aussi dans $\underline{\mathrm{Fib}}\, S$ et $C' \xrightarrow{i'} \bar{C}'$ est dans W_S, pour vérifier $\mathrm{pr}_1\delta' = \mathrm{pr}_2\delta'$ dans le localisé de $\underline{\mathrm{Fib}}\, S$, il suffit de voir que $(\mathrm{pr}_1\delta')i' = (\mathrm{pr}_2\delta')i'$, or comme $\delta'i' = \mathrm{diag}_{C'}$, on a l'égalité même dans $\underline{\mathrm{Fib}}\, S$ (sans localiser).

On a donc défini $\gamma(X)$, $\gamma(u)$ pour objets et flèches de $\mathcal{M}/S$. La transitivité pour $\gamma(u)$ est claire, et aussi $\gamma(\mathrm{id}) = \mathrm{id}$. Donc on tient le foncteur

$$\gamma : \mathcal{M}/S \longrightarrow (\underline{\mathrm{Fib}}\, S)W_S^{-1}.$$

Soit maintenant $\mathcal{F}$ une sous-catégorie pleine de $\mathcal{M}/S$, avec

$$\underline{\mathrm{Fib}}\, S \subseteq \mathcal{F} \subseteq \mathcal{M}/S,$$

considérons γ comme foncteur à valeurs dans $\mathcal{F}W_S^{-1}$. (J'ai oublié de vérifier que γ transforme W_S dans W_S, mais c'est tautologique.) Ainsi on a des foncteurs

p. 59

$$\mathcal{F}W_S^{-1} \underset{\gamma}{\overset{\delta}{\rightleftarrows}} (\mathcal{M}/S)W_S^{-1},$$

il faut voir qu'ils sont quasi-inverse l'une de l'autre.

[page 94]

Du côté de $\mathcal{M}/S$: on doit comparer X et $\delta\gamma(X) = C(X)$, c'est fait par

$$i_X : X \longrightarrow C(X)$$

qui est dans W_S, d'où l'isomorphisme dans le localisé

$$X \simeq \delta\gamma(X) \qquad \text{dans } (\mathcal{M}/S)W_S^{-1}.$$

Il faut vérifier que c'est fonctoriel en X.

Du côté de $\mathcal{F}$, comparer X et $\gamma\delta(X)$, i.e. X et $C(X)$. Même tabac, on choisit i_X : $X \simeq C(X) = \gamma\delta(X)$. À vérifier la fonctorialité.

Il s'agit maintenant d'introduire un localisé plus fin de $\mathcal{M}/S$. Pour ceci, on suppose donné une autre classe de morphismes, je l'appelle $\mathcal{L}$ (comme 'localisation')

$$\mathcal{L} \subseteq \mathrm{Fl}(\mathcal{M}),$$

p. ex. dans le cas de $\mathcal{M} = \mathrm{Cat}$, $\mathcal{L}$ sera formée des isomorphismes locaux ([55]) (s'il s'agit de définir W_S^{g}), ou des isomorphismes colocaux ([56]) (s'il s'agit de définir W_S^{d}). On supposera que $\mathcal{L}$ contient les isomorphismes, et $\mathcal{L}$ stable par composition ([57]), mais non par changement de base. On définit alors

$$W_S^{\mathcal{L}} \subseteq \mathrm{Fl}(\mathcal{M}/S)$$

par

$$f \in W_S^{\mathcal{L}} \overset{\text{déf}}{\iff} (f \times_S S') \in W, \quad \forall (S' \longrightarrow S) \in \mathcal{L}.$$

55. Ou aussi, des morphismes *lisses*. Ça doit donner le même résultat.

[page 95]

56. Ou aussi des morphismes propres.

57. Il n'en est peut-être pas besoin.

Comme $\mathcal{L}$ contient id_S, on aura

$$W_S^{\mathcal{L}} \subseteq W_S,$$

d'où un foncteur canonique

$$\underbrace{(\mathcal{M}/S)(W_S^{\mathcal{L}})^{-1}}_{\overset{\text{déf}}{=}\mathrm{Ho}_W^{\mathcal{L}}(S)} \xrightarrow{\rho} \underbrace{(\mathcal{M}/S)(W_S)^{-1}}_{\overset{\text{déf}}{=}\mathrm{Ho}_W^{\mathrm{lc}}\mathcal{L}(S)}$$

qui est un foncteur de localisation. Je voudrais définir un foncteur en sens inverse. Pour ceci, il est naturel de supposer (en analogie avec la situation de Cat) p. 60

Hypothèse 1. *Sur* $\underline{\mathrm{Fib}}\, S$, $W_S = W_S^{\mathcal{L}}$, *i.e. si* $f : X \longrightarrow Y$ *est dans* W *et* X, Y *dans* $\underline{\mathrm{Fib}}\, S$, *alors pour tout changement de base* $S' \longrightarrow S$ *qui est dans* $\mathcal{L}$, $f' : X_{S'} \longrightarrow Y_{S'}$ *est encore dans* W.

Dans le contexte de Quillen, cette hypothèse a une nette tendance à être vérifiée quelque soit $\mathcal{L}$, i.e. pout *tout* changement de base $S' \longrightarrow S$ sans restriction. Il suffit en fait que la structure de Quillen soit 'propre', plus précisément (et moins restrictivement), qu'un `[morphisme]` $\in W$ reste tel après changement de base par un morphisme $\in$ Fib. Dégageons ceci comme un Lemme.

Lemme. *L'hypothèse est vérifiée si on suppose que* $F = Fib$ *et* W *sont reliés par la condition supplémentaire (en plus de la factorisation* i_X*) : pour tout carré cartésien* [page 96]

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{q} & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ S & \xleftarrow{p} & S', \end{array}$$

si f *est dans Fib et* p *dans* W, *alors* $q \in W$.

Démonstration. Soit

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad f \quad} & Y \\ & {\scriptstyle p}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle q} & \\ & S & \end{array}$$

avec p, $q \in$ Fib, $f \in W$, montrons que pour *tout* changement de base $g : S' \longrightarrow S$, $f_{S'} : X_{S'} \longrightarrow Y_{S'}$ est encore dans W. On factorise g en

$$S' \xrightarrow{i} \bar{S}' \xrightarrow{\bar{g}} S, \qquad\qquad i \in W,\ g \in \mathrm{Fib},$$

`[plutôt` $\bar{g} \in$ `Fib]` et on est ramené à prouver que l'assertion est vraie dans les deux cas particuliers où $g \in$ Fib, ou $g \in W$. Le cas $g \in$ Fib résulte aussitôt de l'hypothèse du Lemme (appliquée au carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f'} & Y' \\ {\scriptstyle q}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ X & \xrightarrow{f} & Y, \end{array}$$

où $p \in$ Fib.)

Dans le cas où $S' \longrightarrow S$ est dans W, il s'ensuit par l'hypothèse du Lemme appliquée à p. 61

$$\begin{array}{ccc} Y & \xleftarrow{p} & Y' \\ \downarrow{\scriptstyle \in \mathrm{Fib}} & & \downarrow \\ S & \longleftarrow & S' \end{array}$$

[page 97]

que $p : Y' \longrightarrow Y$ est $\in W$, et de même pour $q : X' \longrightarrow X$, et $f \in W$ implique encore $f' \in W$.

Revenons à l'hypothèse p. 95. On aura donc un foncteur

$$(\underline{\mathrm{Fib}}\, S, W_S = W_S^{\mathcal{L}}) \longrightarrow (\mathcal{M}/S, W_S^{\mathcal{L}}),$$

d'où pour les localisés un foncteur horizontal

$$\begin{array}{ccc} (\underline{\mathrm{Fib}}\, S)W_S^{-1} & \xrightarrow{\quad i_0 \quad} & (\mathcal{M}/S)(W_S^{\mathcal{L}})^{-1} \overset{\text{déf}}{=} \mathrm{Ho}_W^{\mathcal{L}}(S) \\ \downarrow \approx & \nearrow & \\ \mathrm{Ho}_W^{\mathrm{lc}}(S) \overset{\text{déf}}{=} (\mathcal{M}/S)W_S^{-1} & & \end{array}$$

qui factorise le foncteur vertical induit par l'inclusion $(\underline{\mathrm{Fib}}\, S, W_S) \longrightarrow (\mathcal{M}/S, W_S)$ - foncteur dont on a vu (dans les deux cas envisagés) que c'est une équivalence. En inversant ce dernier et le composant avec i_0, on trouve donc un foncteur

$$\underbrace{\mathrm{Ho}_W^{\mathrm{lc}}(S)}_{\overset{\text{déf}}{=}(\mathcal{M}/S)W_S^{-1}} \quad \xrightarrow{\ i\ } \quad \underbrace{\mathrm{Ho}_W^{\mathcal{L}}(S)}_{\overset{\text{déf}}{=}(\mathcal{M}/S)(W_S^{\mathcal{L}})^{-1}} \quad ,$$

tel que

$$\rho i \simeq \mathrm{id},$$

donc une *rétraction* de $\mathrm{Ho}_W^{\mathcal{L}}(S)$ sur $\mathrm{Ho}_W^{\mathrm{lc}}(S)$. On s'attend que i soit pleinement fidèle, et plus précisément encore, que ρ et i soient adjoints, i étant l'adjoint à droite de ρ : [page 98]

$$\mathrm{Ho}_W^{\mathrm{lc}}(S) \underset{i}{\overset{\rho}{\leftrightarrows}} \mathrm{Ho}_W^{\mathcal{L}}(S),$$

i.e. on cherche p. 62

$$\begin{array}{lll} i\rho & \underbrace{\xleftarrow{\ i\ }}_{pas\ \text{iso}} & \mathrm{id} \quad \text{dans } \mathrm{Ho}_W^{\mathcal{L}} \quad (\text{localisation par } W_S^{\mathcal{L}}) \\ \rho i & \underbrace{\xrightarrow{\ p\ }}_{\text{iso}} & \mathrm{id} \quad \text{dans } \mathrm{Ho}_W^{\mathrm{lc}} \quad (\text{localisation par } W_S), \end{array}$$

`[trop de i's]` donc pour X dans $\mathcal{M}/S$, on cherche

$$\begin{array}{lccll} i_X : & X & \longrightarrow & C(X) & \text{tout au moins dans } (\mathcal{M}/S)(W_S^{\mathcal{L}})^{-1} \\ p_X : & X & \longleftarrow & C(X) & \text{tout au moins dans } (\mathcal{M}/S)(W_S)^{-1}. \end{array}$$

On choisira pour i_X la flèche 'canonique' de X dans $C(X)$, définie dans $\mathcal{M}/S$ lui-même, sans avoir à localiser. Mais dans le 'cas Quillen' (quand C n'est pas donné comme foncteur $\mathcal{M}/S \longrightarrow \underline{\mathrm{Fib}}\, S$), il faut voir que cet i_X est fonctoriel en X, quand on le regarde dans le localisé $(\mathcal{M}/S)W_S^{-1}$. Mais c'est contenu dans la construction de C comme *foncteur*

$$\mathcal{M}/S \longrightarrow (\underline{\mathrm{Fib}}\, S)W_S^{-1}.$$

On notera que i_X est dans W_S sans plus, pas dans $W_S^{\mathcal{L}}$, donc ne définit pas en général un isomorphisme de $\mathrm{Ho}_W^{\mathcal{L}}$.

On définit p_X à l'aide de i_X, comme l'inverse de i_X *dans* $(\mathcal{M}/S)W_S^{-1}$, qui existe car i_X est dans W_S, donc `[est un]` isomorphisme dans $(\mathcal{M}/S)W_S^{-1} = \mathrm{Ho}_W^{\mathrm{lc}}$, et p est donc [page 99]

[un] isomorphisme. On retrouve donc $\rho i \simeq \mathrm{id}$, donc que ρ est une *rétraction* de $\mathrm{Ho}^{\mathcal{L}}_W$ sur $\mathrm{Ho}^{\mathrm{lc}}_W$.

Pour prouver l'adjonction, en procédant comme dans le cas de Cat, on est ramené à prouver que pour tout X,

$$\begin{cases} C(i_X) = i_{C(X)} : C(X) \rightrightarrows C(C(X)) \\ \textit{dans } \mathrm{Ho}^{\mathcal{L}}_W \text{ (localisation par } W^{\mathcal{L}}_S). \end{cases}$$

J'y étais arrivé dans Cat, en utilisant un morphisme

$$C(C(X)) \xrightarrow{c} C(X)$$

(essentiellement, un morphisme de composition des chemins) tel que $c \in W^{\mathcal{L}}_S$, et que $c \circ C(i_X) = c \circ i_{C(X)}$. Ça avait l'air très délicat, car c'était à grand peine que j'étais arrivé à construire un foncteur $\underline{\mathrm{Ch}}$ ('chemins') raisonnable, où on puisse bel et bien composer les chemins! Je renonce pour le moment à axiomatiser les propriétés du foncteur $\underline{\mathrm{Ch}}$ dont j'ai besoin pour faire marcher la machine (je devrais y revenir tantôt). Je vais commencer plutôt par le 'cas Quillen', avec des $i_X \in \mathrm{Cof}_0$.

On reprend la description du 'foncteur' C (à valeurs dans $(\underline{\mathrm{Fib}}\, S)W_S^{-1}$, et alors sans guillemets), on trouve que $C(i_X)$, où p. 63 [page 100]

$$X \xrightarrow{u=i_X} X' = C(X)$$

est défini simplement (dans $(\underline{\mathrm{Fib}}\, S)W_S^{-1}$) par 'la' flèche $C(u)$ rendant commutatif le diagramme (dans $\underline{\mathrm{Fib}}\, S$)

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{u\ (=i_X)} & X'\ (=C(X)) \\ {\scriptstyle i_X}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i_{X'}\ (=i_{C(X)})} \\ C(X) & \xrightarrow[C(u)\ (=C(i_X))]{} & C(X')\ (=C(C(X))), \end{array}$$

de sorte qu'on a dans $\mathcal{M}/S$ le diagramme

$$X \xrightarrow{\overbrace{i_X}^{\in \mathrm{Cof}_0 \cap W}} \overbrace{C(X)}^{\in \mathrm{Ob}\, \underline{\mathrm{Fib}}\, S} \underset{C(i_X)}{\overset{i_{C(X)}}{\rightrightarrows}} \overbrace{C(C(X))}^{\in \mathrm{Ob}\, \underline{\mathrm{Fib}}\, S},$$

commutatif, i.e. $i_{C(X)} i_X = C(i_X) i_X$. Le corollaire page 92 nous dit que les flèches $i_{C(X)}$ et $C(i_X)$ sont égales dans $(\underline{\mathrm{Fib}}\, S)W_S^{-1}$. Mais par hypothèse (p. 95), dans $\underline{\mathrm{Fib}}\, S$ on a $W_S = W^{\mathcal{L}}_S$, donc les flèches sont égales dans $(\underline{\mathrm{Fib}}\, S)(W^{\mathcal{L}}_S)^{-1}$, et a fortiori dans $(\mathcal{M}/S)(W^{\mathcal{L}}_S)^{-1}$, et on gagne.

Voyons ce qu'on peut faire dans le cas où on dispose d'un *foncteur* C. On suppose bien sûr que ce foncteur dans $\mathcal{M}/S$ n'est pas lié au S particulier dans $\mathcal{M}$ qu'on a choisi comme base, que sa construction provient à la Cartan-Serre d'un foncteur [page 101]

$$X \longmapsto \mathrm{Ch}(X) : \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{M},$$


('objet des chemins') et de morphismes fonctoriels

$$X \xrightarrow{\alpha_X} \mathrm{Ch}(X) \xrightarrow{p_X} X \times X, \qquad \boxed{p_X \alpha_X = \mathrm{diag}_X}$$

([58]). Je présume qu'il faudra supposer surtout ceci

Hypothèse 2. $\alpha_X \in W$, $p_X \in \mathrm{Fib}$. p. 64

Pour un X sur S, on construira $C_S(X)$ ou $C(X)$ ainsi



Il est l'image inverse de $(\mathrm{Ch}(S), \mathrm{pr}_1^S p_S = \sigma_S)$ par $X \xrightarrow{f_X} S$, mais on a explicité la factorisation de σ_S sur le diagramme pour réinterpréter la flèche structurale $\bar{f}_X = f_{C(X)}$, définie comme

$$f_{C(X)} = \beta_S \pi (= \mathrm{pr}_2^S \underbrace{p_S \pi}_{= \pi_1 p'})$$

par la formule

$$f_{C(X)} = \underbrace{(\mathrm{pr}_2^S \pi_1)}_{\text{projection } \mathrm{pr}_2 \text{ de } X \times S \text{ dans } S} \qquad p'.$$

Or [page 102]

$p' \in \mathrm{Fib}$, car déduit de $p_S \in \mathrm{Fib}$ par changement de base π_1,

$(\mathrm{pr}_2 : X \times S \longrightarrow S) \in \mathrm{Fib}$ pourvu que $X \longrightarrow \underbrace{e}_{\text{objet final de } \mathcal{M}}$ soit dans Fib (même raison),

donc si $X \in \underline{\mathrm{Fib}}\, e$, on a $f_{C(X)} \in \mathrm{Fib}$. Comme c'est une propriété essentielle qu'on veut avoir pour *tout* X dans $\mathcal{M}/S$, on va faire l'hypothèse supplémentaire

Hypothèse 3. *$\forall\, X \in Ob\, \mathcal{M}$, $X \longrightarrow e$ est dans Fib.*

Quant à

$$i_X : X \longrightarrow C(X),$$

il est déduit de la section α_S de $(\mathrm{Ch}(S), \sigma_S)$ sur S par changement de base $X \longrightarrow S$. Notons maintenant que

$$\mathrm{Ch}(S) \underset{\beta_S}{\overset{\sigma_S}{\rightrightarrows}} S \qquad \text{sont dans } W,$$

car leurs composés avec $S \xrightarrow{\alpha_S} \mathrm{Ch}(S)$ sont l'identité, et $\alpha_S \in W$. D'autre part, $\sigma_S = \mathrm{pr}_1^S \circ p$ est dans Fib, comme composé de deux éléments dans Fib (NB $S \longrightarrow e$ dans Fib par Hypothèse 3). Ainsi σ_S, β_S sont dans $\mathrm{Fib} \cap W$. On aura besoin de


Hypothèse 4. *L'ensemble de flèches $\mathrm{Fib} \cap W$ est stable par tout changement de base.*

Cela implique donc que

$$C(X) \xrightarrow{\mathrm{pr}_1 \pi'} X$$

p. 65

`[plutôt` $\mathrm{pr}_1 p'$`]` est $\in W$ (étant déduit de $\sigma_S : \mathrm{Ch}(S) \longrightarrow S$ par changement de base), donc toute section $i_X : X \longrightarrow C(X)$ de $C(X)$ sur X est dans i_X `[plutôt dans` W`]`. On a donc bien une factorisation, fonctorielle en X [page 103]



58. **NB** On pose $\mathrm{pr}_1 \circ p_X = \sigma_X$, $\mathrm{pr}_2 \circ p_X = \beta_X$ (flèches 'source' et 'but' pour l'objet X).

avec

$$i_X \in W, \qquad f_{C(X)} \in \mathrm{Fib}.$$

C'est tout ce qu'on avait utilisé pour établir

$$(\underline{\mathrm{Fib}}\, S)W_S^{-1} \xrightarrow{\sim} (\mathcal{M}/S)W_S^{-1}.$$

Mais il s'agit maintenant, sous l'hypothèse où on introduit un $\mathcal{L}$, de prouver que pour tout X dans $\mathcal{M}/S$, les deux flèches

$$C(X) \underset{i_{C(X)}}{\overset{C(i_X)}{\rightrightarrows}} C(C(X))$$

sont égales dans $(\mathcal{M}/S)(W_S^{\mathcal{L}})^{-1}$. Comme par hypothèse on a $W_S^{\mathcal{L}} = W_S$ dans $\underline{\mathrm{Fib}}\, S$ (Hypothèse 1), et que $C(X),\ C(C(X)) \in \mathrm{Ob}\,\underline{\mathrm{Fib}}\, S$, il suffit de prouver que les deux flèches sont égales *dans* $(\underline{\mathrm{Fib}}\, S)W_S^{-1}$. Cet énoncé est indépendant de la donnée de $\mathcal{L}$, et on a envie de le prouver. [page 104]

Peut-être y a-t-il moyen d'expliciter un langage géométrique, pour s'y reconnaître. Identifions les objets X de $\mathcal{M}$ aux foncteurs $\mathcal{M}^o \longrightarrow$ (Ens) qu'ils définissent,

$$X \longmapsto (T \longmapsto X(T) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(T, X))\,.$$

Ainsi, pout tout T

$$\mathrm{Ch}(X)(T)$$

est un ensemble, appelé *l'ensemble des chemins dans* $X(T)$. Il s'envoie (par p_X) fonctoriellement (en T) dans $(X \times X)(T) = X(T) \times X(T)$, i.e. chaque chemin c dans $X(T)$ a une origine $\sigma(c)$, et un but $\beta(c)$. De plus, par α_X, $X(T)$ s'envoie (fonctoriellement en T) dans l'ensemble des chemins de $X(T)$: pour chaque élément x dans $X(T)$, il y a donc un chemin (noté 1_x ou α_x) bien défini de source et but x, qu'on appelle le chemin trivial, ou vide. Ceci dit,

pour X dans $\mathcal{M}/S$, $C(X)$ représente le contra-foncteur suivant dans $\mathcal{M}$: pour tout T dans $\mathcal{M}$, p. 66 [page 105]

$$C(X)(T) = \left\{(x, c) \;\middle|\; x \in X(T),\ c : f_X(x) \xrightarrow{c} s \text{ un chemin dans } S(T), \text{ de source } f_X(x)\right\},$$

où $f_X : X \longrightarrow S$ est le morphisme structural.

Les 'calculs' faits, il y a deux (?) jours montrent qu'on a de même une interprétation

$$C(C(X))(T) = \Big\{(x, c, c') \;\Big|\; x \in X(T),\ f_X(x) \xrightarrow{c} s \xrightarrow{c'} t,\ c \text{ un chemin de source } f_X(x),\ c' \text{ un chemin de source égale à } \beta(c)\Big\}$$

et les applications $i_{C(X)}$ et $C(i_X)$ s'identifient respectivement à

$$\begin{array}{lll} (x, c) & \longmapsto & (x, 1_{f(x)}, c) \quad f(x) \xrightarrow{1_x} f(x) \xrightarrow{c} s \\ (x, c) & \longmapsto & (x, c, 1_{\beta(c)}) \quad f(x) \longrightarrow s \xrightarrow{1_s} s \end{array}$$

[plutôt $f(x) \xrightarrow{1_{f(x)}} f(x) \xrightarrow{c} s$]. Pour les comparer, on a une envie irrésistible d'écrire

$$c \circ 1_x = 1_s \circ c = c, \qquad \text{[page 106]}$$

mais a-t-on le droit ? Il faudrait pouvoir composer les chemins, et c'est très, très difficile !

Mais on peut toujours axiomatiser. On suppose donc que pour X dans $\mathcal{M}$, $\mathrm{Ch}(X)$ n'est pas seulement une structure de (soi-disants) 'chemins' dans X amorphe, seulement la donnée de la source et du but des chemins et des chemins triviaux (ces structures sur $\mathrm{Ch}(X)$ dépendant fonctoriellement de X), mais qu'on a une composition des chemins quand ceux-ci sont 'composables', i.e. une flèche d'un produit fibré

$$(c, c') \longmapsto c' \circ c : (\mathrm{Ch}(X), \beta_X) \times_X (\mathrm{Ch}(X), \sigma_X) \xrightarrow{\pi_X} \mathrm{Ch}(X),$$

i.e. on peut composer des chemins dans $X(T)$

$$x \xrightarrow{c} y \xrightarrow{c'} z$$

si et seulement si $\mathrm{but}\, c = \mathrm{source}\, c'$, et de plus on exige bien sûr que $\mathrm{source}(c' \circ c) = \mathrm{source}\, c$, $\mathrm{but}(c' \circ c) = \mathrm{but}\, c'$, ce qui s'exprime par un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} (\mathrm{Ch}(X), \beta_X) \times_X (\mathrm{Ch}(X), \sigma_X) & \longrightarrow & \mathrm{Ch}(X) \\ & \searrow \quad \swarrow_{p_X} & \\ & X \times X. & \end{array}$$

La pensée naturelle, c'est qu'avec cette composition et ces identités, les $X(T)$, $\mathrm{Ch}(T)$ deviennent les objets et les flèches d'une *catégorie* - i.e. que $(X, \mathrm{Ch}(X), \alpha_X, p_X, \pi_X)$ définissent une structure de 'catégorie dans $\mathcal{M}$'. Mais pour ce qu'on veut faire maintenant, on n'a sans doute pas besoin de tout, i.e. de l'axiome pertinent d'associativité de la composition et celui sur les unités, mais seulement que les 1_x soient des unités bilatères pour la composition. p. 67 [page 107]

En supossant donné ce supplément de structure sur le foncteur Ch, et revenant à la considération du foncteurs associé

$$C : \mathcal{M}/S \longrightarrow \underline{\mathrm{Fib}}\, S,$$

on trouve un morphisme canonique

$$C(C(X)) \xrightarrow{\gamma_X} C(X)$$

par

$$(x, c, c') \longmapsto (x, c' \circ c),$$

et l'axiome des unités bilatères nous assure aussitôt que

$$(*) \qquad \gamma_X \circ i_{C(X)} = \gamma_X \circ C(i_X) = \mathrm{id}_{C(X)}.$$

Comme $i_{C(X)} \in W$, cela prouve déjà que $\gamma_X \in W$, donc $\gamma_X \in W_S$. Donc γ_X devient un isomorphisme dans $(\underline{\mathrm{Fib}}\, S)W_S^{-1}$, et la relation $(*)$ implique bien $i_{C(X)} = C(i_X)$ dans le localisé, q.e.d.

Je vais à nouveau résumer ce que j'ai dégagé.

Théorème-Scholie 2. Soit $\mathcal{M}$ une catégorie, munie de deux ensembles de flèches [page 108]

$$W,\ \mathrm{Fib} \subseteq \mathrm{Fl}(\mathcal{M}).$$

On fait les hypothèses suivantes.

1° W contient les isomorphismes, si f, g sont composables, si deux parmi f, g, gf sont dans W, le troisième aussi.

2° $\mathcal{M}$ est stable par $\varprojlim$ finies, Fib contient les isomorphismes, est stable par composition et par changement de base ([59]).

Pour S dans $\mathcal{M}$, $\boxed{\underline{\mathrm{Fib}}\, S}$ désigne la sous-catégorie pleine de $\mathcal{M}/S$ formée des $X \longrightarrow S$ qui sont dans Fib. On distingue deux versions différentes d'un axiome de factorisation d'une $f : X \longrightarrow S$ quelconque dans $\mathcal{M}$ en $X \xrightarrow{i} \bar{X} \xrightarrow{\bar{f}} S$, avec $i \in W$, $\bar{f} \in \mathrm{Fib}$.

p. 68

A) On se donne, pour tout S dans $\mathcal{M}$, un foncteur

$$\mathcal{M}/S \longrightarrow \mathcal{M}/S \qquad\qquad X \longmapsto C(X) \;\; (= \bar{X})$$

et un morphisme de foncteurs en X

$$X \xrightarrow{i_X} C(X)$$

avec

$$i_X \in W, \qquad\qquad C(X) \in \mathrm{Ob}\, \underline{\mathrm{Fib}}\, S.$$

B) Désignant par

$$\mathrm{Cof}_0 \subseteq \mathrm{Fl}\, \mathcal{M}$$

l'ensemble des flèches de $\mathcal{M}$ qui possèdent la propriété de relèvement à droite `[plutôt à gauche]` par rapport à Fib, on suppose 'à la Quillen', que toute flèche $f : X \longrightarrow S$ se factorise en

$$X \xrightarrow{i_X} C(X) \xrightarrow{\bar{f}} S,$$

avec

$$i \in \mathrm{Cofib}_0 \cap W, \qquad\qquad \bar{f} \in \mathrm{Fib}.$$

`[où` $\mathrm{Cof}_0 = \mathrm{Cofib}_0$`]`.

Donnons nous S dans $\mathcal{M}$, considérons

[page 109]

$$W_S \subseteq \mathrm{Fl}(\mathcal{M}/S)$$

$$f : X \longrightarrow Y \qquad \searrow \quad \swarrow \qquad S$$

l'ensemble de flèches induit par W (est dans W_S si et seulement si il l'est en oubliant S), et désignons par W_S (par abus de notation) l'ensemble de flèches induit par W_S sur $\underline{\mathrm{Fib}}\, S$, ou plus généralement sur toute sous-catégorie pleine $\mathcal{F}$ de $\mathcal{M}/S$, avec

$$\underline{\mathrm{Fib}}\, S \subseteq \mathcal{F} \subseteq \mathcal{M}/S.$$

Ⓘ Le foncteur

$$(*) \qquad\qquad (\underline{\mathrm{Fib}}\, S)W_S^{-1} \xrightarrow{\sim} (\mathcal{M}/S)W_S^{-1}$$

induit par l'inclusion est une équivalence de catégories, plus généralement pour toute $\mathcal{F}$ comme dessus

$$(\underline{\mathrm{Fib}}\, S)W_S^{-1} \longrightarrow \mathcal{F}W_S^{-1} \longrightarrow (\mathcal{M}/S)W_S^{-1}$$

sont des équivalences de catégories. Un foncteur quasi-inverse est obtenu (dans les deux cas A) et B)) à l'aide du foncteur

$$\gamma : \mathcal{M}/S \longrightarrow (\underline{\mathrm{Fib}}\, S)W_S^{-1}$$

59. Ces hypothèses de stabilité sur Fib ne serviront que dans II, et encore seulement dans le cas A), repris in toto sous la forme A′ plus bas (p. 112).

p. 69

qui est donné sur les objets par

$$\gamma(X) = C(X),$$

et qui sur les flèches se définit de façon évidente dans le cas A) (fonctorialité de $C(X)$ en X), et dans le cas de B) se construit ad hoc, comme la seule loi fonctorielle pour laquelle les homomorphismes

$$i_X : X \longrightarrow C(X)$$

(interprétés comme flèches dans $(\mathcal{M}/S)W_S^{-1}$) soient eux-mêmes fonctoriels en X. [page 110]

On désigne par

$$\mathrm{Ho}_W^{\mathrm{lc}}(S) \qquad \text{(lc comme 'localement constant')}$$

la catégorie des fractions $(\mathcal{M}/S)W_S^{-1}$, équivalente à $(\underline{\mathrm{Fib}}\, S)W_S^{-1}$.

(II) Donnons nous un localiseur W_S^0 dans $\mathcal{M}/S$

$$W_S^0 \subseteq W_S \subseteq \mathrm{Fl}(\mathcal{M}/S),$$

avec l'hypothèse formelle similaire à celle de W (cf. 1°). On suppose que

$3^o)$ $W_S^0 \cap \mathrm{Fl}(\underline{\mathrm{Fib}}\, S) = W_S|\underline{\mathrm{Fib}}\, S$.

(Cf. pages 94-96 pour une façon générale d'obtenir des tels localiseurs. Il faut bien voir que pour définir des 'types d'homotopie' relatifs sur S le localiseur W_S est beaucoup trop grossier, moralement il ne donne qu'une catégorie des types d'homotopie relatifs localement constants, et c'est justement ça qui est montré par l'equivalence de (I) , où $\underline{\mathrm{Fib}}\, S$ est visualisé comme formé des 'fibrations localement triviales' sur S.) On a alors un deuxième localisé

$$\mathrm{Ho}_{W_S^0}(S) \overset{\text{déf}}{=} (\mathcal{M}/S)(W_S^0)^{-1},$$

et deux foncteurs

$$\mathrm{Ho}_{W_S^0}(S) \underset{i}{\overset{\rho}{\rightleftarrows}} \mathrm{Ho}_W^{\mathrm{lc}}(S), \qquad (*)$$

où ρ est le foncteur de localisation (strict) évident, dû à l'inclusion $W_S^0 \subseteq W_S$, et où i est essentiellement le foncteur déduit de l'inclusion [page 111]

$$(\underline{\mathrm{Fib}}\, S, \underbrace{W_S|\underline{\mathrm{Fib}}\, S}_{=W_S^0|\underline{\mathrm{Fib}}\, S}) \longrightarrow (\mathcal{M}/S, W_S^0)$$

par localisation *au moyen de* W_S^0, donc le foncteur

$$(\underline{\mathrm{Fib}}\, S)(W_S^0)^{-1} \longrightarrow (\mathcal{M}/S)(W_S^0)^{-1}, \qquad (**)$$

compte tenu de l'équivalence $(*)$ de (I) , i.e. i est le composé du quasi-inverse de $(*)$, p. 70
avec le foncteur $(**)$ précédent. Explicitement, il est défini par

$$i(X) = \text{classe de C(X) dans } (\mathcal{M}/S)(W_S^0)^{-1},$$

en tenant compte du fait que $X \longmapsto C(X)$ transforme W_S en W_S^o, grâce à la condition $3^o)$ sur W_S^0.

Ceci posé, *sous l'hypothèse* B ('Quillen'), on a : dans le couple de foncteurs (ρ, i) de $(*)$, page 110, *i est adjoint à droite de ρ,* i.e. on a pour $\xi \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{Ho}_{W_S^0}(S)$, $\eta \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{Ho}_W^{\mathrm{lc}}(S)$

$$\mathrm{Hom}_{W_S^0}(\xi, i(\eta)) \simeq \mathrm{Hom}_{W_S}(\rho(\xi), \eta),$$

ce qui s'explicite, pour X, Y dans $\mathcal{M}/S$, par

$$\boxed{\mathrm{Hom}_{W_S^0}(X, C(Y)) \simeq \mathrm{Hom}_{W_S}(X, Y)}$$

([60]). Il s'ensuit que *le foncteur i est pleinement fidèle.*

La même formule d'adjonction, et la pleine fidélité de i, sont valables dans le cas A, quand on renforce l'hypothèse A (relative à un S particulier) en une hypothèse plus restrictive et plus compréhensive, que voici. [page 112]

A′) Le foncteur $C : \mathcal{M}/S \longrightarrow \mathcal{M}/S$ et le morphisme fonctoriel $i_X : X \longrightarrow C(X)$ sont construits 'à la Cartan-Serre' à partir d'un foncteur défini sur $\mathcal{M}$ entier

$$\mathcal{M} \xrightarrow{\mathrm{Ch}} \mathcal{M},$$

du type 'chemins', i.e. muni en plus des données suivantes

a)
$$X \xrightarrow{\alpha_X} \mathrm{Ch}(X) \xrightarrow{p_X=(\sigma_X,\beta_X)} X \times X$$

(structure de source et but des chemins, et de chemins triviaux), et

b) Une composition des chemins, sans exiger ici l'associativité de la composition mais seulement que les chemins triviaux soient unités bilatères pour la composition. De plus, on suppose que pout tout X

$$\begin{cases} \alpha_X \in W,\ p_X \in \mathrm{Fib} \\ (X \longrightarrow e) \in \mathrm{Fib}. \end{cases}$$

Corollaire. Soient X dans $\mathcal{M}/S$, Y dans $\underline{\mathrm{Fib}}\, S$, alors p. 71 [page 113]

$$\mathrm{Hom}_{W_S^0}(X, Y) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{W_S}(X, Y).$$

Démonstration. Par la formule d'adjonction (p. 111), le deuxième membre est $\mathrm{Hom}_{W_S^0}(X, CY)$. Mais comme Y et $C(Y)$ sont dans $\underline{\mathrm{Fib}}\, S$, où W_S et W_S^0 coïncident, $Y \xrightarrow{i_Y} C(Y)$ est non seulement dans W_S, mais dans W_S^0, donc $\mathrm{Hom}_{W_S^0}(X, Y) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{W_S^0}(X, CY)$, d'où le résultat.

Revenons à Cat, Cat$/S$. La digression précédente sur $(\mathcal{M}, W, \mathrm{Fib})$ a permis de mieux situer ce qui concerne le foncteur C, et les relations entre les catégories localisées de

$$\mathrm{Cat}/S \ \ (\text{pour } W_S,\ W_S^{\mathrm{d}},\ W_S^{\mathrm{g}}) \qquad \text{et} \qquad \underline{\mathrm{Parf}}\, S \ \ (\text{pour } W_S^{\mathrm{f}} = W_S = W_S^{\mathrm{d}} = W_S^{\mathrm{g}})$$

ainsi que pour les catégories intermédiaires

$$\underline{\mathrm{Parf}}\, S \subseteq \mathcal{F} \subseteq \mathrm{Cat}/S$$

pleines de Cat$/S$ (sur le diagramme p. 76, il y en a cinq autres, savoir $\underline{\mathrm{Fibhot}}\, S$, $\underline{\mathrm{Liss}}\, S$, $\underline{\mathrm{Liss}}_0 S$, $\underline{\mathrm{Prop}}\, S$, $\underline{\mathrm{Prop}}_0\, S$). Pour ce qui concerne les relations entre les localisés de ces sept catégories, qui se trouvent au centre du diagramme, les énoncés du théorème-scholie 1 (p. 70-81) ne donnent rien de plus que le contenu du théorème-scholie 2 (p. 108-113). Pour les établir, on a donc le choix entre les deux hypothèses A) ou B) dudit théorème. Soit utiliser un foncteur C_S explicite, à l'aide d'un foncteur $X \longmapsto \underline{\mathrm{Ch}}(X)$ ('chemins dans X') sur Cat, donc les structures de source, but et composition pour les chemins, et les chemins triviaux [page 114]

60. **NB** Le premier membre est indépendant du choix de W_S^0 ! (Pourvu seulement que l'hypothèse $W_S^0 \cap \mathrm{Fl}\,\underline{\mathrm{Fib}}\, S = W_S \cap \mathrm{Fl}\,\underline{\mathrm{Fib}}\, S$, en plus de $W_S^0 \subseteq W_S$, soit satisfaite.)

(agissant comme unités bilatères pour la composition). La construction d'un tel foncteur C n'a par l'air trivial et semble ne pas être connue - j'ai peiné pour y arriver ! (Avec, en plus, l'associativité de la composition …). Ou bien utiliser, à la QUILLEN, l'existence d'une classe de morphismes dits Q-fibrants, avec des bonnes propriétés de factorisation. Ce n'est pas non plus évident dans Cat, et c'est établi par THOMASON, par une voie un peu compliquée. Peut-être serai-je amené à revenir dessus - mais seulement en cas de besoin !

Par contre, les assertions concernant les catégories $\underline{\mathrm{Fib}}\, S$, $\underline{\mathrm{Fibsc}}\, S$, ou $\underline{\mathrm{Cofib}}\, S$, $\underline{\mathrm{Cofibsc}}\, S$, et leurs variantes à indices 0 (donc les huit catégories-ailes du diagramme), et leurs relations à Cat/S d'une part, à $\underline{\mathrm{Fibhot}}\, S$ de l'autre (pour les catégories à indice 0), ne peuvent être contenues dans un tapis général sur des catégories de modèles $(\mathcal{M}, W)$, me semble-t-il, vu la nature très spéciale des quatre catégories désignées ci-dessus, de leur rôle très particulier dans le formalisme catégorique. Or tout au moins les catégories 'scindées' $\underline{\mathrm{Fibsc}}\, S$, $\underline{\mathrm{Cofibsc}}\, S$, et par suite aussi leurs variantes à indice 0, jouent un rôle essentiel pour la théorie des $\mathrm{HOT}(S)$, vu que c'est elles qui interviennent dualement [page 115] quand on applique la recette générale de construction d'un dérivateur à partir d'une catégorie de modèles $(\mathcal{M}, W)$. Donc je ne vois pas de simplification substantielle à p. 72 apporter au théorème-scholie 1. Tout au plus pourrait-on élaguer le diagramme de catégories envisagées, en laissant tomber $\underline{\mathrm{Liss}}\, S$, $\underline{\mathrm{Liss}}_0 S$, $\underline{\mathrm{Prop}}\, S$, $\underline{\mathrm{Prop}}_0 S$, qui n'y jouent pas un rôle vraiment utile. Pour ce qui concerne les résultats énoncés, ce qui les concerne est couvert par ce qui est dit pour les sous-catégories pleines $\mathcal{F}$ de Cat/S qui contiennent (disons) $\underline{\mathrm{Parf}}\, S$ (ou au choix celles qui contiennent $\underline{\mathrm{Fib}}\, S$ ou $\underline{\mathrm{Cofib}}\, S$).

La description des catégories du type $\mathrm{HOT}(S)$, pour S fixé, me paraît à présent parfaitement bien comprise. Il est temps de faire varier S, et de comprendre le caractère contravariant en S. On se donne donc

$$S' \xrightarrow{f} S,$$

et on se propose de décrire les foncteurs image inverse pour les trois types de catégories $\mathrm{HOT}(S)$. Mais nous allons nous borner à présent aux $\mathrm{HOT}_W(S)$ et $\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S)$, puisque tout ce qui concerne $\mathrm{HOT}^{\mathrm{o}}_W(S) = \mathrm{HOT}_W(S^o)$ [plutôt $\mathrm{HOT}_W(S^o)^o$, cf. p. 50] s'en déduira par dualité $S \longmapsto S^o$. Donc il s'agit de décrire [page 116]

$$f^* : \mathrm{HOT}_W(S) \longrightarrow \mathrm{HOT}_W(S') \qquad (*)$$

et le foncteur induit

$$f^* : \mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S) \longrightarrow \mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S').$$

Quand on décrit les catégories $\mathrm{HOT}(S)$, conformément à la recette générale, à l'aide de foncteurs

$$F : S^o \longrightarrow \mathrm{Cat}$$

(préfaisceaux en catégories sur S), ou, ce qui revient au même, de catégories scindées, la description de la flèche $(*)$ est évidente : elle revient à la loi

$$\left|\begin{array}{rcl} F & \longmapsto & F \circ f^o \\ \underline{\mathrm{Hom}}(S^o, \mathrm{Cat}) & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Hom}}(S'^o, \mathrm{Cat}), \end{array}\right.$$

en passant aux localisés pour la W-équivalence argument par argument. Dans le langage des catégories fibrées, il est bien connu que cette opération triviale sur les préfaisceaux en catégories correspond à l'opération *image inverse* de catégories sur S - laquelle opération passe aux scindages. Cela nous donne donc

$$f^*(\mathrm{hot}_{W,S}(X)) = \mathrm{hot}_{W,S'}(\underbrace{X \times_S S'}_{X'}),$$

pour toute X fibrée scindée sur S. Or on sait que le scindage de X ne joue aucun rôle, finalement, dans la description de la classe

$$\mathrm{hot}_{W,S}(X) \in \mathrm{HOT}_W(S)$$

associée à X. On peut oublier le scindage, et même (pour étudier les $\mathrm{Hom}_{\mathrm{Hot}_W(S)}(X,Y)$) travailler avec des S-foncteurs *quelconque* entre catégories fibrées sur S - pas la peine même de les supposer cartésiens, voir même compatibles avec des scindages. Cela me paraît une chose très importante pour le formalisme des $\mathrm{HOT}_W(S)$, et très spéciale au cas de la catégorie de modèles Cat. C'est un peu tacite dans le théorème-scholie - mais mes doutes initiaux concernant la catégorie $\underline{\mathrm{Fibsc}}$ elle-même montrent bien que je sentais qu'il y avait là quelque chose de pas évident, ni même (presque) [?] de vraisemblable. Et pourtant l'existence du foncteur Φ montre qu'il en est bien ainsi. p. 73 [page 117]

On peut donc interpréter f^* en termes de $\underline{\mathrm{Fib}}\, S$, $\underline{\mathrm{Fib}}\, S'$, par le foncteur changement de base

$$f^* : \underline{\mathrm{Fib}}\, S \longrightarrow \underline{\mathrm{Fib}}\, S', \qquad X \longmapsto X \times_S S'/S',$$

lequel foncteur préserve évidemment la W-équivalence par fibres W_S^{f}, $W_{S'}^{\mathrm{f}}$, qu'est celle pertinente ici

$$f^*(W_S^{\mathrm{f}}) \subseteq W_{S'}^{\mathrm{f}},$$

de sorte que f^* induit bien

$$(\underline{\mathrm{Fib}}\, S)(W_S^{\mathrm{f}})^{-1} \longrightarrow (\underline{\mathrm{Fib}}\, S')(W_S^{\mathrm{f}})^{-1}$$

[plutôt $(\underline{\mathrm{Fib}}\, S')(W_{S'}^{\mathrm{f}})^{-1}$], i.e. le foncteur $(*)$ [page 118]

$$f^* : \mathrm{HOT}_W(S) \longrightarrow \mathrm{HOT}_W(S').$$

D'autre part, $\mathrm{HOT}_W(S)$ peut être décrit aussi comme localisé de Cat/S tout entier, par rapport au localiseur W_S^{d}, lequel sur $\underline{\mathrm{Fib}}\, S$, et même sur $\underline{\mathrm{Liss}}\, S$, coïncide avec W_S^{f}. Mais on se bute ici à la difficulté que le foncteur image inverse

$$f^* : \mathrm{Cat}/S \longrightarrow \mathrm{Cat}/S', \qquad X \longmapsto X \times_S S'/S',$$

n'est *pas* compatible en général (si S n'est isomorphe à la catégorie ponctuelle, pour S' quelconque) avec les localiseurs W_S^{d}, $W_{S'}^{\mathrm{d}}$. On le voit p.ex. en prenant $S' = \{s\}$, et en se rappelant que W_S^{d} n'implique *pas*, sur Cat/S tout entier, la W-équivalence par fibres.

Ces ennuis n'ont pas lieu sûr $\underline{\mathrm{Liss}}\, S$, où W_S^{d} et W_S^{f} coïncident. On peut donc décrire f^* sur les HOT aussi à l'aide de

$$f^* : \underline{\mathrm{Liss}}\, S \longrightarrow \underline{\mathrm{Liss}}\, S', \qquad X \longmapsto X \times_S S'/S',$$

en passant aux localisés

$$f^* : (\underline{\mathrm{Liss}}\, S)(W_S^{\mathrm{f}})^{-1} \longrightarrow (\underline{\mathrm{Liss}}\, S')(W_{S'}^{\mathrm{f}})^{-1}.$$

En d'autres termes :

Proposition 1. *Si X dans Cat/S est lisse sur S, alors on a un isomorphisme canonique*

$$f^*(\mathrm{hot}_{W,S}(X)) \simeq \mathrm{hot}_{W,S'}(X'), \qquad \text{où } X' = X \times_S S'/S'.$$

Une remarque similaire s'applique à $\underline{\mathrm{Fibhot}}\, S$, où $W_S^{\mathrm{d}} = W_S^{\mathrm{f}}$ également. Le foncteur changement de base induit p. 74 [page 119]

$$\underline{\mathrm{Fibhot}}\, S \longrightarrow \underline{\mathrm{Fibhot}}\, S', \qquad X \longmapsto X \times_S S'/S',$$

compatible avec les localiseurs relatifs pertinents (tous ceux envisagés jusqu'à présent coïncident sur ces catégories, avec les hypothèses faites sur W), d'où

$$f^* : (\underline{\text{Fibhot}}\, S)W_S^{-1} \longrightarrow (\underline{\text{Fibhot}}\, S')W_{S'}^{-1}.$$

Les localisés cette fois ne sont pas les HOT_W, mais les HOT_W^{lc}, donc on trouve une description sympathique de

$$f^* : \text{HOT}_W^{\text{lc}}(S) \longrightarrow \text{HOT}_W^{\text{lc}}(S'),$$

plus avantageuse encore qu'en termes de $\underline{\text{Liss}}_0 S$, $\underline{\text{Liss}}_0 S'$, car s'appliquant à des catégories un peu plus vastes (NB $\underline{\text{Liss}}_0 \subseteq \underline{\text{Fibhot}}$). Notons donc le

Corollaire 1. *La formule de la proposition 1 (p. 118) reste valable si X est supposé* Hot-*fibrant sur S (au lieu de lisse sur S).* (On trouve alors des types d'homotopie relatifs *localement constants* sur S, S'.)

On a donc une description de f^* qui s'applique à toutes les catégories du côté gauche du diagramme [page] 76, à la seule exception de Cat/S elle-même. Si X est dans Cat/S, [page 120] sans être ni lisse ni Hot-fibrée sur S, comment trouver l'image inverse dans $\text{HOT}_W(S')$? On a le choix entre Φ et C pour améliorer la situation! On sait que X définit la même classe dans $\text{HOT}_W(S)$ que $\Phi(X)$, $C(X)$, qui sont l'une lisse (et même fibrée scindée), l'autre Hot-fibrée (et même parfaite) sur S. Donc

Corollaire 2. *Si X dans* Cat/S *est quelconque, alors*

$$f^*(\text{hot}_{W,S}(X)) \simeq \text{hot}_{W,S'}(\Phi(X) \times_S S') \simeq \text{hot}_{W,S'}(C(X) \times_S S').$$

On peut s'attendre, d'autre part, que pour certains changements de base particuliers, la formule de la proposition 1 soit valable sans restriction sur X dans Cat/S. Il doit revenir $\pm$ au même que le foncteur image inverse

$$X \longmapsto X \times_S S'$$

soit compatible avec les localiseurs W_S^{d}, $W_{S'}^{\text{d}}$. La condition de W-équivalence 'colocale sur S' doit être vue comme une condition de nature 'homologique', pour le dérivateur HOT. Elle s'associe, pour un dérivateur quelconque $\mathbf{D}$, à la condition (pour $f : X \longrightarrow Y$ dans Cat/S) que les $s\backslash X \longrightarrow s\backslash Y$ sont des $\mathbf{D}$-équivalences, ce qui s'écrit ici élégamment p. 75 en termes d'homologie relative, par la condition que $\forall\, a \in \mathcal{A} = \mathbf{D}(e)$, la flèche induit par [page 121] f

$$\underbrace{H_\bullet^{\mathbf{D}}(X/S, a_X)}_{\overset{\text{déf}}{=}(p_X)_!(a_X)} \longrightarrow \underbrace{H_\bullet^{\mathbf{D}}(Y/S, a_Y)}_{\overset{\text{déf}}{=}(p_Y)_!(a_Y)}$$

soit [un] isomorphisme. (Utiliser le 'calcul' des faisceaux d'homologie relative $(p_X)_!(a_X)$, $(p_Y)_!(a_Y)$, par la caractérisation des fibres dans Der 4 bis). Or, les changements de base $\mathbf{D}$-*propres* $S' \longrightarrow S$ commutent aux $p_!$, de sorte qu'on trouve le

Lemme. *La notion d'équivalence* $\mathbf{D}$*-colocale sur S dans* Cat/S *est stable par tout changement de base $S' \longrightarrow S$ $\mathbf{D}$-propre. (Quel que soit le dérivateur $\mathbf{D}$.)*

On se rappelera que les $s\backslash S \longrightarrow S$ sont justement des changements des base propres! On peut dire que l'équivalence $\mathbf{D}$-colocale peut se décrire en exigeant que $f : X \longrightarrow Y$ soit transformé en W-équivalences par certains types de changement de base $S' \longrightarrow S$, en prenant au choix l'un des trois types

a) Les changements de base $s\backslash S \longrightarrow S$ (ce qui redonne la définition que nous avions prise).

b) Les changements de base qui sont des co-isomorphismes locaux.

c) Les changements de base propres.

d) Les changements de base **D**-propres.

On ne peut appliquer ces résultats qu'au dérivateur HOT, faute de l'avoir encore construit, et verifié, les axiomes pertinents. On peut poser simplement la [page 122]

Conjecture (sûre!) : *Soit $p : S' \longrightarrow S$ une flèche propre (sous-entendu :* HOT*-propre) dans* Cat. *Alors le foncteur changement de base*

$$\mathrm{Cat}/S \longrightarrow \mathrm{Cat}/S', \qquad X \longmapsto X \times_S S'/S'$$

est compatible avec les localiseurs W_S^{d}, $W_{S'}^{\mathrm{d}}$. (Pour un foncteur $S' \longrightarrow S$ lisse, le changement de base serait compatible avec W_S^{g}, $W_{S'}^{\mathrm{g}}$.) ([61]).

Mais pout tout changement de base $S' \longrightarrow S$ (propre ou non) qui a la propriété précédente, donc qui induit un foncteur

$$\underbrace{(\mathrm{Cat}/S)(W_S^{\mathrm{d}})^{-1}}_{\approx \mathrm{HOT}_W(S)} \longrightarrow \underbrace{(\mathrm{Cat}/S')(W_{S'}^{\mathrm{d}})^{-1}}_{\approx \mathrm{HOT}_W(S')},$$

il est immédiat, à l'aide du théorème de comparaison (p.ex. avec $\underline{\mathrm{Liss}}\, S$, $\underline{\mathrm{Liss}}\, S'$) sur S et sur S', que ce foncteur n'est autre (à isomorphisme canonique près) que le foncteur f^* image inverse des types d'homotopie relatifs. Donc énoncons le p. 76

Corollaire 3. *La formule de la proposition 1 reste valable sans hypothèse aucune sur X dans* Cat$/S$*, pourvu que la flèche de changement de base $f : S' \longrightarrow S$ soit telle que le foncteur $X \longmapsto X \times_S S'$ de* Cat$/S$ *dans* Cat$/S'$ *transforme W-équivalences colocales sur S en W-équivalences colocales sur S'.* (Ce qui devrait être le cas si (et seulement si?) f est W-propre, donc aussi si f est ('absolument') propre ([62]).) [page 123]

On n'a travaillé jusqu'ici qu'avec les localiseurs W_S^{d}, $W_{S'}^{\mathrm{d}}$, à l'exclusion de W_S, $W_{S'}$. (Sauf sur les catégories contenues dans $\underline{\mathrm{Fibhot}}\, S$, où les deux coïncident.) Quand on ne fait pas d'hypothèse draconienne sur $p : S' \longrightarrow S$, du type Hot-fibration, on n'a aucune chance pour que $X \longmapsto X \times_S S'$ transforme W-équivalences grossières dans itou, donc aucune chance d'attraper l'image inverse du type d'homotopie relatif 'grossier' de X, en prenant celui de $X' = X \times_S S'$. Cela est lié au fait que pour un $S' \longrightarrow S$ général, les foncteurs de localisation

$$\mathrm{HOT}_W(S) \xrightarrow{\rho_S} \mathrm{HOT}_W^{\mathrm{lc}}(S), \qquad \mathrm{HOT}_W(S') \xrightarrow{\rho_{S'}} \mathrm{HOT}_W^{\mathrm{lc}}(S')$$

n'ont aucune envie de commuter au foncteur image inverse f^* sur les HOT_W. On peut hasarder la

Proposition 2. *Conditions équivalentes sur le foncteur $S' \longrightarrow S$:*

a) Le diagramme de foncteurs

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{HOT}_W(S) & \xrightarrow{\rho_S} & \mathrm{HOT}_W^{\mathrm{lc}}(S) \\ \downarrow{\scriptstyle f^*} & & \downarrow{\scriptstyle f^*_{\mathrm{lc}}} \\ \mathrm{HOT}_W(S') & \xrightarrow{\rho_{S'}} & \mathrm{HOT}_W^{\mathrm{lc}}(S') \end{array}$$

commute (à isomorphisme de foncteurs composés près).

b) Le foncteur changment de base [page 124]

$$\underline{\mathrm{Liss}}\, S \longrightarrow \underline{\mathrm{Liss}}\, S', \qquad X \longmapsto X \times_S S'/S'$$ p. 77

transforme W_S en $W_{S'}$.

b′) Énoncé analogue pour $\underline{\mathrm{Fib}}\, S \longrightarrow \underline{\mathrm{Fib}}\, S'$.

b″) Énoncé analogue pour $\underline{\mathrm{Fibsc}}\, S \longrightarrow \underline{\mathrm{Fibsc}}\, S'$.

([63], [64]).

Démonstration. Si $\mathcal{F}$ est une des trois catégories $\underline{\mathrm{Liss}}\, S$, $\underline{\mathrm{Fib}}\, S$ ou $\underline{\mathrm{Fibsc}}\, S$, le foncteur ρ_S peut se décrire comme le foncteur de localisation canonique

$$\mathcal{F}(W_S^{\mathrm{d}})^{-1} \longrightarrow \mathcal{F}W_S^{-1}$$

(ça marcherait pour n'importe quelle sous-catégorie pleine $\mathcal{F}$ de Cat/S qui contient $\underline{\mathrm{Fib}}\, S$). Or si b), b′) ou b″) est satisfait, on trouve un diagramme commutatif de foncteurs induits par le changement de base

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}(W_S^{\mathrm{d}})^{-1} & \xrightarrow{\rho_S} & \mathcal{F}(W_S)^{-1} \\ {\scriptstyle f^*_{W_S^{\mathrm{d}}}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f^*_{W_S}} \\ \mathcal{F}'(W_{S'}^{\mathrm{d}})^{-1} & \xrightarrow{\rho_{S'}} & \mathcal{F}'(W_{S'})^{-1}, \end{array}$$

sous réserve, il est vrai, dans le cas $\mathcal{F} = \mathrm{Cat}/S$, que le foncteur image inverse soit aussi compatible avec W_S^{d}, $W_{S'}^{\mathrm{d}}$ (ce qui est automatique si $\mathcal{F} = \underline{\mathrm{Fib}}\, S$ ou $\underline{\mathrm{Fibsc}}\, S$). On sait que $f^*_{W_S^{\mathrm{d}}}$ décrit le foncteur f^* sur les types d'homotopie relatifs, et pour prouver a) comme conséquence de b) (renforcé), b′ ou b″, il reste à s'assurer que le foncteur $f^*_{W_S}$ décrit de même le foncteur induit par le précédent sur les types d'homotopie relatifs localement constants. Or on a les inclusions canoniques $\mathcal{F}_0 \subseteq \mathcal{F}$, $\mathcal{F}'_0 \subseteq \mathcal{F}'$, et sur $\mathcal{F}_0$, $\mathcal{F}'_0$ [on a] $W_S = W_S^{\mathrm{d}} = W_S^{\mathrm{f}}$, et les catégories sont OK pour décrire $\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S)$ et $\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S')$, et le foncteur f^* induit entre eux par images inverses ([65]) (**NB** Le foncteur changement de base $X \longmapsto X \times_S S'$ est compatible avec les localiseurs sur ces catégories, car c'est trivial sous la forme W_S^{f}.) On a alors, par images inverses $X \longmapsto X \times_S S'$, un diagramme commutatif

[page 125]

[on a]

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}_0(W_S)^{-1} & \xrightarrow{\approx} & \mathcal{F}(W_S)^{-1} \\ {\scriptstyle (f^*_{W_S})_0}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f^*_{W_S}} \\ \mathcal{F}'_0(W_{S'})^{-1} & \xrightarrow{\approx} & \mathcal{F}'(W_{S'})^{-1}, \end{array}$$

où les flèches horizontales sont des *équivalences* de catégories, par le théorème-scholie 1 Ⓘ . Cela prouve que $f^*_{W_S}$ lui aussi est bon pour calculer les images inverses de types d'homotopie relatifs.

p. 78

On a prouvé que b, b′, b″ impliquent chacun a), prouvons que a) les implique. Or a) dit exactement que les images inverses f^* des éléments de $\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S)$ sont, à isomorphisme près, obtenus par le foncteur image inverse sur $\mathcal{F}$ tout entier, en interprétant $\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S)$ comme $\mathcal{F}W_S^{-1}$. Mais cela implique bien que $\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}'$ doit être compatible avec les localiseurs. Mais je charrie - on trouve seulement que si $u : X \longrightarrow Y$ dans $\mathcal{F}$ est dans W_S, alors la flèche $u' : X' \longrightarrow Y'$ donne un isomorphisme dans $\mathcal{F}'(W_{S'})^{-1}$. Je ne sais pas, d'autre part, si cela implique que u' est dans $W_{S'}$.

[page 126]

61. NB Cette 'conjecture' est prouvé sans lemme à la page 168-169, sans avoir besoin de rien qui ne soit déjà connu ici. Cf. théorème 4, cas b) p. 162.

62. cf. I, pages 55-59.

63. Pas prouvée, seulement que b, b′, b″ impliquent a). Pour l'implication inverse, il faudrait savoir que toute flèche de $\mathcal{F}'$ qui devient [un] isomorphisme dans $\mathcal{F}'W_{S'}^{-1}$, est dans $W_{S'}$ (saturation forte de $W_{S'}$ dans $\mathcal{F}'$), chose que je ne sais pas. Mais je crois que ce doit être vrai.

64. **NB** Si on suppose p propre, on doit pouvoir prendre aussi $\mathcal{F} = \mathrm{Cat}/S$.

65. NB $(\mathrm{Cat}/S)_0 = \underline{\mathrm{Fibhot}}\, S$, pour les autres cas, c'est clair.

Corollaire 1. *Supposons que $p : S' \longrightarrow S$ soit une* Hot*-fibration. Alors le foncteur image inverse $X \longmapsto X \times_S S'$ de Cat/S dans Cat/S' applique W_S dans $W_{S'}$, donc le foncteur $p^* : \mathrm{HOT}_W(S) \longrightarrow \mathrm{HOT}_W(S')$ commute aux foncteurs de localisation ρ_S, $\rho_{S'}$ dans ces catégories.* (**NB** Il faut faire l'hypothèse adéquate sur W, savoir L6 bis page 44. C'est OK pour W_∞.)

Le fait que $X \longmapsto X \times_S S'$ soit compatible avec W_S, $W_{S'}$ est une tautologie, compte tenu de l'hypothèse L6 bis. Il ne semble pas qu'il soit aussi compatible à W_S^{d}, $W_{S'}^{\mathrm{d}}$ (je devrais faire un contrexemple, avec bien sûr S' non propre sur S). Donc on est sous les conditions de b), qui implique a).

Je ne me sens pas capable d'exhiber un foncteur autre qu'une Hot-fibration (ou tout au moins une W-fibration), pour lequel le foncteur image inverse sur HOT_W soit compatible aux foncteurs de localisation ρ_S, $\rho_{S'}$. Bien sûr, si X est quelconque dans Cat/S, rien n'empêche de regarder son localisé pour W_S, i.e. $\rho_S(\mathrm{hot}_{W,S}(X))$, et de demander comment trouver son image inverse. Si $p : S' \longrightarrow S$ est une Hot-fibration, alors il suffit de prendre $\mathrm{hot}_{W,S'}(X')$, $X' = S \times_S S'$. Dans tout autre cas (j'entends, sans hypothèse sur X/S, plus précisément sans supposer que X est lui-même Hot-fibré sur S), cette formule est canulée sans espoir. On doit, pour calculer $f^*\rho_S(\mathrm{hot}_{W,S}(X))$, 'calculer' $\rho_S(\mathrm{hot}_{W,S}(X))$ en 'montant à l'étage', comme $\mathrm{hot}_{W,S}(C(X))$. On trouve alors l'image inverse $\mathrm{hot}_{W,S'}(C(X) \times_S S')$ (par `[le]` corollaire 1, p. 119). [page 127]

Maintenant que la loi contravariante de $\mathrm{HOT}_W(S)$ en $S \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{Cat}$ semble bien comprise, il s'agit de voir qu'on a bien un dérivateur HOT. Je ne m'attends pas à ce que les $\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S)$ définissent eux aussi un dérivateur, mais il faudrait m'en assurer expressément. (C'est pour l'existence de $f_!$, f_* que je dois chercher.) [page 128]

À dire vrai, il faudrait, pour bien faire, regarder aussi la structure de 2-*foncteur* de

$$S \longmapsto \mathrm{HOT}_W(S) \qquad \mathrm{Cat}^o \longrightarrow \mathrm{Cat},$$

donc pour S, S' données dans Cat, définir p. 79

$$\underline{\mathrm{Hom}}(S', S)^o \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(\mathrm{HOT}_W(S), \mathrm{HOT}_W(S')).$$

Cela revient surtout, pour

$$f, g : S' \rightrightarrows S$$

deux flèches de S' dans S, et un homomorphisme de foncteurs

$$u : f \longrightarrow g,$$

à décrire un homomorphisme de foncteurs

$$u^* : g^* \longrightarrow f^*$$

entre $\mathrm{HOT}_W(S)$ et $\mathrm{HOT}_W(S')$. C'est d'ailleurs chose faite, dans le cadre général des $(\mathcal{M}, W)$, quand on décrit $\mathrm{HOT}_W(S)$ et $\mathrm{HOT}_W(S')$ par localisation de $\mathrm{Hom}(S^o, \mathrm{Cat})$ et $\mathrm{Hom}(S'^o, \mathrm{Cat})$. Ces catégories s'interprètent respectivement comme $\underline{\mathrm{Fibsc}}\, S$ et $\underline{\mathrm{Fibsc}}\, S'$, donc comme des catégories de catégories sur S resp. S', on voudrait donc interpréter u^* en termes de telles catégories, et tant qu'à faire, pour des catégories X sur S aussi générales que possible. Nous nous attendrons alors à devoir faire des hypothèses, soit sur X, soit sur f et sur g, qui assurent que les images de $\mathrm{hot}_{W,S}(X)$ par f^* et g^* ne sont autres que $\mathrm{hot}_{W,S}(f^*X)$, $\mathrm{hot}_{W,S}(g^*X)$ respectivement, où on pose [page 129]

$$f^*(X) = X \times_S (S', f), \qquad g^*(X) = X \times_S (S', g).$$

Donc on devra sans doute se placer dans l'une des hypothèses suivantes:

a) X est lisse sur S.

b) X est Hot-fibrée sur S.

c) f et g sont propres (et sous réserve de la validité de la conjecture page 122).

On s'attend alors à ce que u^* soit associé à un homomorphisme

$$u^* : g^*(X) \longrightarrow f^*(X) \qquad \textit{dans } \mathrm{Cat}/S'$$

défini en termes de u. Y a-t-il moyen de le définir bel et bien, sans supposer X au moins fibrée sur S? Prenons $S' = e$, donc f, g correspondant à des objets $s, t \in \mathrm{Ob}\, S$, et u à une fléche

$$u : s \longrightarrow t,$$

les images inverses de X/S par f, g sont les fibres X_s, X_t, et on cherche

$$u^* : X_t \longrightarrow X_s.$$

On n'a aucune chance d'en trouver canoniquement, si on ne suppose X fibrée sur S! Donc ce ne sont pas a), b) ni c) qui peuvent nous servir, mais uniquement l'hypothèse $X \in \mathrm{Ob}\, \underline{\mathrm{Fib}}\, S$. Donc on ne peut espérer trouver une description de u^* entre $\mathrm{HOT}_W(S)$ et $\mathrm{HOT}_W(S')$ en termes d'opérations sur les catégories sur S, S', comme suggéré à l'instant, qu'en se bornant à des 'modèles' X qui sont dans $\underline{\mathrm{Fib}}\, S$, tout au moins. Et je ne doute pas en effet que ça marche sur $\underline{\mathrm{Fib}}\, S$ pas moins bien que directement sur $\underline{\mathrm{Fibsc}}\, S$, en termes de $\underline{\mathrm{Hom}}(S^o, \mathrm{Cat})$.

p. 80
[page 130]

Pour les axiomes essentiels sur les dérivateurs, je renvoie à I p. 67-68 et p. 111-112. On a vu que Der 1, Der 2 ([66]) sont satisfaits pour tout prédérivateur défini par un couple $(\mathcal{M}, W \subseteq \mathrm{Fl}\,\mathcal{M})$, donc c'est OK ici pour HOT_W. Il s'ensuit que c'est OK aussi pour $\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W$, vu la caractérisation des $\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S)$ en tant que sous-catégories de $\mathrm{HOT}_W(S)$. Pour Der 1, ça marche-t-il même pour des sommes quelconque de catégories, i.e. a-t-on

$$\mathrm{HOT}_W(\coprod_i S_i) \xrightarrow{\sim} \prod_i \mathrm{HOT}_W(S_i)\,?$$

On a en tous cas

$$\underline{\mathrm{Fib}}(\overbrace{\coprod_i S_i}^{S}) \xrightarrow{\sim} \prod_i \underline{\mathrm{Fib}}(S_i),$$

et le localiseur W^{f}_S dans $\underline{\mathrm{Fib}}(S)$ s'identifie bel et bien au produit des localiseurs $W^{\mathrm{f}}_{S_i}$ dans les $\underline{\mathrm{Fib}}\, S_i$. Mais dans le cas d'une famille peut-être infinie de catégories $\mathcal{F}_i$, munies de localiseurs W_i, si on pose

[page 131]

$$\mathcal{F} = \prod \mathcal{F}_i, \qquad W = \prod W_i \subseteq \mathrm{Fl}(\mathcal{F}),$$

le foncteur canonique

$$\mathcal{F}W^{-1} \longrightarrow \prod_i (\mathcal{F}_i W_i^{-1})$$

est-il toujours une équivalence? Même dans [`Même dans' barré] le cas I fini il faut (il me semble) un argument assez soigneux, soit par la propriété universelle par récurrence sur $\mathrm{card}\, I$ (on est ramené au cas de deux foncteurs), soit à coups de catégories de chemins, en notant que

$$\underline{\mathrm{Ch}}^W_\infty(\mathcal{F}; (s_i), (t_i)) \xrightarrow{\sim} \prod_i \underline{\mathrm{Ch}}^{W_i}_\infty(\mathcal{F}_i; s_i, t_i), \qquad (*)$$

66. Canulé pour Der 2, je ne sais si c'est vrai même en supposant W *fortement* saturé, i.e. tel que $\mathrm{hot}_W(f)$ isomorphisme $\Longrightarrow f \in W$.

et en passant aux π_0, qui donne

$$\mathrm{Hom}_W((s_i),(t_i)) \xrightarrow{\sim} \prod_i \mathrm{Hom}_{W_i}(s_i,t_i).$$

Mais la formule $(*)$, visiblement, ne marche que pour I fini. Dans le cas général, on trouve la sous-catégorie $\prod_i^!$ de $\prod_i$ formée des systèmes $(c_i)_{i\in I}$ de chemins qui sont de longueur bornée.

Donc la question de la validité de Der 1 sans hypothèse de finitude sur l'ensemble d'indices I reste en suspens pour l'instant. (Je soupçonne que c'est vrai, mais il faudrait, p. 81 pour le prouver, tenir une description des flèches dans $\mathrm{HOT}_W(S)$ par des chemins de [page 132] longueur bornée, disons de longueur deux ou trois. C'est une question intéressante, mais que je réserve pour plus tard, si le besoin m'y contraint ...)

Plus importante est la question de la validité de Der 3 et de ses variantes (I, p. 111-112). Le minimum qu'on demande d'un dérivateur $\mathbf{D}$, c'est que si $S' \longrightarrow S$ dans Diag est une Hot-équivalence, ce soit une $\mathbf{D}$-équivalence, i.e. (dans le cas actuel) que le foncteur

$$f^* : \mathrm{HOT}_W(S) \longrightarrow \mathrm{HOT}_W(S')$$

soit pleinement fidèle sur la sous-catégorie des objets *constants* dans $\mathrm{HOT}_W(S)$. Cette condition devient plus tangible quand on dispose déjà soit des foncteurs cohomologie $H^\bullet_{\mathbf{D}}(S,-)$, $H^\bullet_{\mathbf{D}}(S',-)$, soit de l'homologie $H^{\mathbf{D}}_\bullet(S,-)$, $H^{\mathbf{D}}_\bullet(S',-)$. En termes de cette dernière, elle signifie que

$$p_! p^*(a) \xrightarrow{\sim} p'_! p'^*(a) \qquad \texttt{[est un]}\ \text{isomorphisme},$$

pour tout a dans $\mathcal{A} = \mathbf{D}(e)$. (Où $p : S \longrightarrow e$, $p' : S' \longrightarrow e$ sont les morphismes [page 133] structuraux sur la catégorie ponctuelle.) On a vu la formule heuristique générale

$$p_! \underbrace{p^*(a)}_{a_S} = \mathrm{hot}(S) \times a,$$

où $\mathrm{hot}\, S$ est la classe de $S \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{Cat}$ dans $\mathrm{Hot} = (\mathrm{Cat})W_\infty^{-1}$, et où le produit $\times$ est une opération externe de Hot sur $\mathcal{A} = \mathbf{D}(e)$

$$\mathrm{Hot} \times \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{A}\ .$$

Dans le cas actuel, $\mathcal{A} = \mathrm{Hot}$, et l'opération

$$\mathrm{Hot} \times \mathrm{Hot} \longrightarrow \mathrm{Hot}$$

ne doit être autre que le foncteur produit cartésien, lequel est déduit du foncteur similaire dans Cat. Quand on dispose de ce formalisme, le résultat cherché pour un $f : S' \longrightarrow S$ se réduit simplement à dire que si f est dans W, alors il en est de même de $f \times \mathrm{id}_X$ pour tout X dans Cat (en prenant X tel que $\mathrm{hot}(X) \simeq a$). Or là c'est un fait bien connu, résultant des axiomes mis sur W.

J'ai donc l'impression que je n'ai aucune chance de prouver Der 3a′ (p. 111), ni même Der 3a) (cas où S = e), sans avoir une maîtrise du formalisme des $p_!$. Et j'ai bon p. 82 espoir que cetter maîtrise va s'obtenir à bon compte, alors que la question des p_* semble [page 134] beaucoup plus délicate.

Je vais donc me tourner d'abord vers l'axiome Der 4′ d'existence de

$$f_! : \mathrm{HOT}_W(S') \longrightarrow \mathrm{HOT}_W(S),$$

comme adjoint à gauche de f^*. Je vais essayer de construire ad-hoc un foncteur $f_!$, puis les deux flèches d'adjonction

$$\begin{aligned} \mathrm{id} &\longrightarrow f^* f_! \\ \mathrm{id} &\longleftarrow f_! f^*, \end{aligned}$$

et enfin, de vérifier les deux compatibilités pertinentes.

L'idée géométrique 'évidente', c'est pour $X' \in \mathrm{Cat}/S'$, représentant $\xi' \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{HOT}_W(S')$, de définir $f_!(\xi')$ par

$$f_!(\mathrm{hot}_{S',W}(X')) = \mathrm{hot}_{S,W}(X'),$$

où dans le second membre, X' est regardé comme objet de Cat/S, grâce à $f : S' \longrightarrow S$ et au foncteur

$$f_! : \mathrm{Cat}/S' \longrightarrow \mathrm{Cat}/S$$

qu'il induit. Le seul problème, c'est de voir si ce foncteur est compatible avec les localiseurs [page 135] $W^{\mathrm{d}}_{S'}, W^{\mathrm{d}}_S$, et sinon, s'il l'est tout au moins sur la sous-catégorie $\underline{\mathrm{Fib}}\,S'$ ou $\underline{\mathrm{Fibsc}}\,S'$, qui suffit pour calculer $\mathrm{HOT}_W(S')$ par localisation. Il faut donc voir si un $X'_1 \longrightarrow X'_2$ dans Cat/S', qui est dans $W^{\mathrm{d}}_{S'}$, i.e. qui est dans W et le reste par tout changement de base de la forme $s'\backslash S' \longrightarrow S'$, plus généralement pour tout co-isomorphisme local, est aussi dans W^{d}_S, i.e. si les changements de base de la forme $s\backslash S \longrightarrow S$ le transforment en W-équivalences (grossières). Or les co-isomorphismes locaux sont stables par *tout changement de base* (cf. I, p. 55 dans le cas dual des isomorphismes locaux), donc on gagne!

$$\begin{array}{ccc} \overline{S'} = s\backslash S' & \longrightarrow & S' \\ \downarrow & & \downarrow \\ \overline{S} = s\backslash S & \longrightarrow & S \end{array} .$$

Je vais quand même le vérifier encore. Si

$$\begin{array}{ccc} \overline{S'} & \longrightarrow & S' \\ \downarrow & & \downarrow \\ \overline{S} & \longrightarrow & S \end{array}$$

est un carré cartésien dans Cat, on a dit dans loc. cit., essentiellement, que pour $\overline{s'}$ dans [p. 83] $\overline{S'}$, ayant des images s', $\overline{s}$, s dans S', $\overline{S}$, S respectivement, le carré des colocalisés

$$\begin{array}{ccc} \overline{s'}\backslash\overline{S'} & \longrightarrow & s'\backslash S' \\ \downarrow & & \downarrow \\ \overline{s}\backslash\overline{S} & \longrightarrow & s\backslash S \end{array}$$

est encore cartésien. Je viens encore le de revérifier à l'instant, pour les objets tout au [page 136] moins. Dire que $\overline{S} \longrightarrow S$ est un isomorphisme local, signifie que les $\overline{s}\backslash\overline{S} \longrightarrow s\backslash S$ sont `[des]` isomorphismes. Mais le carré cartésien précédent montre qu'alors les $\overline{s'}\backslash\overline{S'} \longrightarrow s'\backslash S'$ sont aussi `[des]` isomorphismes, on gagne!

Théorème 1. *Pour toute flèche $f : S' \longrightarrow S$ dans* Cat*, le foncteur induit*

$$f_! : \mathrm{Cat}/S' \longrightarrow \mathrm{Cat}/S$$

est compatible avec les localiseurs $(W^{\mathrm{d}}_{S'}, W^{\mathrm{d}}_S)$, donc dualement avec les localiseurs $(W^{\mathrm{g}}_{S'}, W^{\mathrm{g}}_S)$, et trivialement avec les localiseurs $(W_{S'}, W_S)$. Il induit donc un diagramme

commutatif de foncteurs sur les localisés

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{HOT}_W(S') & \xrightarrow{\rho_{S'}} & \mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S') & \xleftarrow{\sigma_{S'}} & \mathrm{HOT}^{o}_W(S') \\ \downarrow{\scriptstyle f_!} & & \downarrow{\scriptstyle f^{\mathrm{lc}}_!} & & \downarrow{\scriptstyle f^{o}_!} \\ \mathrm{HOT}_W(S) & \xrightarrow{\rho_{S}} & \mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S) & \xleftarrow{\sigma_{S}} & \mathrm{HOT}^{o}_W(S). \end{array}$$

Définition 1. *On a défini ainsi les foncteurs verticaux $f_!$, $f^{\mathrm{lc}}_!$, $f^o_! = (f^o)_!$, appelés foncteurs image directe homologique, ou foncteurs d'intégration pour f (et les types d'homotopie relatifs).*

[page 137] On a obtenu en même temps, gratuitement, la compatibilité de ces foncteurs aux foncteurs [de] localisation $\rho_{S'}$, $\sigma_{S'}$ pour $\mathrm{HOT}(S')$, et ρ_S, σ_S pour $\mathrm{HOT}(S)$. Par contre, on ne s'attendra pas qu'ils commutent avec les foncteurs pleinement fidèles d'inclusion des $\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W$ dans HOT_W. En effet, si on ne suppose pas f dans Fibhot ([67]), il est tout à fait immoral de s'attendre à ce que $f_!$ dans $\mathrm{HOT}_W(S')$ transforme types localement constants en itou. La situation est donc exactement inverse de celle pour le foncteur f^*, qui était compatible avec les foncteurs d'inclusion i_S, $i_{S'}$ et j_S, $j_{S'}$ - c'était à tel point trivial qu'il n'a pas été question même de le dire, voire en faire une proposition! La situation est

p. 84 même encore meilleure pour le foncteur $f_!$ entre les HOT, puisque la description de ce foncteur peut se faire directement sur Cat/S' tout entier, sans avoir à se borner à des sous-catégories plus ou moins astucieuses, où le foncteur induit serait compatible avec les [page 138] localiseurs (Liss S et Fibhot S dans le cas de f^*).

On a de façon immédiate la transitivité de $f_!$, $f^{\mathrm{lc}}_!$, $f^o_!$, i.e.

$$(gf)_! = g_! f_!, \qquad (gf)^{\mathrm{lc}}_! = g^{\mathrm{lc}}_! f^{\mathrm{lc}}_!, \qquad (gf)^o_! = g^o_! f^o_!.$$

Mais on ne va pas faire bouger S, S', f pour le moment, car il faut maintenant, avant toute autre chose, essayer d'établir l'adjonction de $f_!$ et de f^* (dans cet ordre).

Pour le moment, occupons-nous de HOT_W seulement - le cas de HOT^o_W s'en déduira en appliquant ce qu'on saura à f^o. Et on s'occupera de $\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W$ plus tard.

1) *L'homomorphisme*

$$\alpha : \mathrm{id}_{\mathrm{HOT}_W(S')} \longrightarrow f^* f_!.$$

Si X' est dans Cat/S', $f_!(\mathrm{hot}_{S',W}(X'))$ est $\mathrm{hot}_{S,W}(X')$, mais on ne peut trouver son image inverse f^* sur S' en prenant l'image inverse catégorique. Car même si on fait des hypothèses draconiennes sur X' en tant qu'objet de Cat/S' (p.ex. X' fibrée sur S'), celles-ci seront réduites à néant quand on aura composé avec f, sur lequel nous ne voulons ici faire aucune hypothèse. Il faut donc d'abord appliquer le foncteur Φ_S à X' sur S, puis [page 139] prendre son image inverse sur S' :

$$f^* f_!(\mathrm{hot}_{S',W}(X')) = \mathrm{hot}_{S',W}(\Phi_S(X'/S) \times_S S').$$

Il faut donc trouver une flèche

$$\alpha_{X'} : X' \longrightarrow \Phi_S(X'/S) \times_S S'$$

dans le localisé $(\mathrm{Cat}/S')(W^{\mathrm{d}}_{S'})^{-1}$, voire même une flèche dans Cat/S' lui-même. Mais par les propriétés d'adjonction des foncteurs $f_!$ et f^* au *niveau catégorique,* une telle flèche revient à une flèche

$$f_!(X') \longrightarrow \Phi_S(X'/S)$$

67. Ce cas doit être regardé avec soin ultérieurement.

dans Cat/S, i.e. à une flèche qui rend commutatif le carré

$$\begin{array}{ccc} X' & \longrightarrow & \Phi_S(X'/S') \\ \downarrow & & \downarrow \\ S' & \longrightarrow & S. \end{array}$$

Or on a une telle flèche canonique, savoir $i_{X'/S}$. Elle est fonctorielle en X' sur S (sans avoir même à se soucier si X' sur S provient d'un X' sur S', i.e. si la flèche structurale $X' \longrightarrow S$ se factorise par $S' \longrightarrow S$). p. 85

2) *L'homomorphisme* [page 140]

$$\beta : \mathrm{id}_{\mathrm{HOT}_W(S)} \longleftarrow f_! f^*.$$

On peut décrire $\mathrm{HOT}_W(S)$ par $(\underline{\mathrm{Fib}}\, S)(W_S^{\mathrm{d}})^{-1}$ ou $(\underline{\mathrm{Liss}}\, S)(W_S^{\mathrm{d}})^{-1}$ par exemple, de sorte que f^* a une description simple par

$$f^*(\mathrm{hot}_{S,W}(X)) = \mathrm{hot}_{S',W}(X \times_S S')$$

(pour X lisse sur S). On a ensuite

$$f_! f^*(\mathrm{hot}_{S,W}(X)) = \mathrm{hot}_{S,W}(X \times_S S'),$$

mais attention, $X \times_S S'$ n'est pas a priori dans $\underline{\mathrm{Liss}}\, S$, seulement dans Cat/S sans plus. Mais cela n'empêche qu'il donne ce qu'il faut, par localisation $(W_S^{\mathrm{d}})^{-1}$ dans Cat/S. Pour définir β_X, il suffit donc de trouver une flèche

$$\beta_X : X \longleftarrow X \times_S S'$$

dans Cat/S, et on voit bien pr_1^X ([68]). On a donc

$$\begin{cases} \alpha : \mathrm{id} & \longrightarrow & f^* f_! \\ \beta : \mathrm{id} & \longleftarrow & f_! f^* \end{cases}$$

3) *La compatibilité*

$$f_! \xrightarrow{f_! * \alpha} f_! f^* f_! \xrightarrow{\beta * f_!} f_!.$$
$$\qquad\qquad \underset{\mathrm{id}}{\smile}$$

On doit donc prendre X' sur S', et expliciter les flèches à partir de l'objet

$$\xi' = \mathrm{hot}_{S',W}(X').$$

On a p. 86

$$f_!(\xi') = \mathrm{hot}_{S,W}(X'/S), \qquad \text{[page 141]}$$

et pour calculer $f^* f_!(\xi')$, il faut comme tantôt prendre $\Phi_S(X')$ et on trouve

$$f^* f_!(\xi') = \mathrm{hot}_{S',W}(\Phi_S(X') \times_S S').$$

Enfin,

$$f_! f^* f_!(\xi') = \mathrm{hot}_{S,W}(\Phi_S(X') \times_S S').$$

68. quand $\xi \in \mathrm{HOT}_W(S)$ est défini par X dans Cat/S non nécessairement lisse, on doit trouver $\Phi_S(X) \times_S S' \longrightarrow X$ dans $(\mathrm{Cat}/S)(W_S^{\mathrm{d}})^{-1}$, on prend $(i_X)^{-1}\mathrm{pr}_1^{\Phi_S(X)}$ (cf. page 143).

Il faut expliciter les flèches

$$\underbrace{f_!(\xi')} \xrightarrow{f_!(\alpha_{\xi'})} \underbrace{f_!f^*f_!(\xi')} \xrightarrow{\beta_{f_!(\xi')}} \underbrace{f_!(\xi')}.$$

$$X'/S \xrightarrow[\text{déduit de } i_{X'}]{\alpha_{X'}} \Phi_S(X') \times_S S' \xrightarrow{\beta_{X'}} X'/S \qquad (*)$$

sur S

$\alpha_{X'}$ est déduit de $i_{X'} : X' \longrightarrow \Phi_S(X')$ comme l'unique S'-morphisme rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} X' & \xrightarrow{\alpha_{X'}} & \Phi_S(X') \times_S S' & \xrightarrow{\mathrm{pr}_1} & \Phi_S(X') \\ \downarrow & \overset{i_{X'}}{\nearrow} & & & \downarrow \\ S' & & \longrightarrow & & S. \end{array} \qquad (**)$$

Pour décrire $\beta_{f_!(\xi')}$, où $f_!(\xi') = \mathrm{hot}_{S,W}(X')$, il faut donner une description générale de β_ξ qui soit valable pour *tout* représentant X de ξ, pas seulement dans le cas X lisse sur S. Pour calculer $f^*(\xi)$, il faut donc prendre le $\mathrm{hot}_{S',W}$ de $\Phi(X) \times_S S'$, puis pour $f_!f^*(\xi)$, il faut prendre le $\mathrm{hot}_{S,W}$ du même $\Phi_S(X) \times_S S'$. Il faut définir, si on peut, une flèche [page 142]

$$\Phi_S(X) \times_S S' \longrightarrow X \qquad \text{dans } \mathrm{Cat}/S,$$

ou du moins dans $(\mathrm{Cat}/S)(W_S^{\mathrm{d}})^{-1}$. Mais on a

$$i_X : X \longrightarrow \Phi_S(X)$$

qui est dans W_S^{d}, et qui par produit cartésien définit

$$i_X \times_S \mathrm{id}_{S'} : X \times_S S' \longrightarrow \Phi_S(X) \times_S S'$$

(en d'autres termes on a pris l'image inverse de i_X par $S' \longrightarrow S$). Cette flèche est-elle encore dans W_S^{d} ? ([69]). Si oui, on a le diagramme p. 87

$$\begin{array}{ccc} \Phi_S(X) \times_S S' & \xrightarrow{\beta_X ?} & X \\ {\scriptstyle i_X \times_S \mathrm{id}_{S'}}\uparrow & \overset{\mathrm{pr}_1^X}{\nearrow} & \\ X \times_S S' & & \end{array} \qquad {\scriptstyle =\pi_X}$$

et on définit la flèche cherchée β_X *dans* $(\mathrm{Cat}/S)(W_S^{\mathrm{d}})^{-1}$ par la commutativité de ce triangle, donc comme

$$\beta_X = \mathrm{pr}_1^X \circ \underbrace{\pi_X^{-1}}_{\text{inverse dans } (\mathrm{Cat}/S)(W_S^{\mathrm{d}})^{-1}} .$$

Mais ça ne marche pas - cf. annotation ! On va faire alors l'inverse [page 143]

69. Non, elle ne l'est pas, car si $S' = \{s\}$, cela signifierait que $X'_s \longrightarrow s\backslash X$ est dans W, ce qui est faux en général.

$$\begin{array}{ccc} \Phi_S(X)\times_S S' & \xrightarrow{\mathrm{pr}_1^{\Phi_S(X)}} & \Phi_S(X) \\ & \overset{\beta_X?}{\searrow} & \uparrow{\scriptstyle i_X} \\ & & X \end{array} \qquad \text{dans } W_S^{\mathrm{d}}$$

([70]), on définit β_X comme $(i_X)^{-1}\mathrm{pr}_1^{\Phi_S(X)}$, où $(i_X)^{-1}$ est défini dans $(\mathrm{Cat}/S)(W_S^{\mathrm{d}})^{-1}$.

Pour prouver la commutativité de $(*)$ (p. 141), comme $i_{X'} : X' \longrightarrow \Phi_S(X')$ est dans W_S^{d}, il suffit de prouver, au lieu de $\beta_{X'}\alpha_{X'} = \mathrm{id}_{X'}$, la relation déduite en composant avec $i_{X'} : X' \longrightarrow \Phi_S(X')$

$$\underbrace{i_{X'}\beta_{X'}}_{\mathrm{pr}_1^{\Phi_S(X')}}\alpha_{X'} = i_{X'},$$

i.e.

$$\mathrm{pr}_1^{\Phi_S(X')} \circ \alpha_{X'} = i_{X'},$$

ce qui n'est autre que la relation de définition de $\alpha_{X'}$ (cf. $(**)$ p. 141), on gagne !

4) *Compatibilité*

$$f^* \xrightarrow{\alpha * f^*} f^* f_! f^* \xrightarrow{f^* * \beta} f^*.$$
$$\qquad\qquad \searrow \quad \nearrow$$
$$\qquad\qquad \mathrm{id}$$

Partons donc d'un $\xi \in \mathrm{ObHOT}_W(S)$, qu'on peut supposer défini par $X \in \mathrm{Ob}\underline{\mathrm{Fib}}\, S$. Alors

p. 88
[page 144]

$$\begin{aligned} f^*(\xi) &= \mathrm{hot}_{S',W}(X \times_S S'), \\ f_! f^*(\xi) &= \mathrm{hot}_{S,W}(X \times_S S'), \\ f^* f_! f^*(\xi) &= \mathrm{hot}_{S',W}(\Phi_S(X \times_S S') \times_S S'). \end{aligned}$$

Il faut expliciter maintenant

$$\underbrace{f^*(\xi)}_{\mathrm{hot}_{S',W}(X')} \xrightarrow{\alpha_{f^*(\xi)}} \underbrace{f^* f_! f^*(\xi)}_{\mathrm{hot}_{S',W}(\Phi_S(X')\times_S S')} \xrightarrow{f^*(\beta_\xi)} \underbrace{f^*(\xi)}_{\mathrm{hot}_{S',W}(X')},$$

et vérifier que le composé est l'identité. On a posé

$$X' = X \times_S S',$$

et le diagramme est donc aussi

$$X' \xrightarrow{\alpha_{X'}} \Phi_S(X') \times_S S' \xrightarrow{f^*(\beta_\xi)} X', \qquad \mathrm{id}_{X'} : X' \longrightarrow X'$$

dans $(\mathrm{Cat}/S')(W_{S'}^{\mathrm{d}})^{-1}$. Pour vérifier la commutativité, on peut composer avec

$$X \times_S S' = X' \xrightarrow{i_X \times_S \mathrm{id}_{S'}} \Phi_S(X') \times_S S' \qquad (\text{où } i_X : X \longrightarrow \Phi_S(X))$$

qui est dans $W_{S'}^{\mathrm{d}}$ ([71]), or on vérifie, sur la construction générale de $\beta_\xi = \beta_X$ (page précédente), que l'on a commutativité dans

$$\begin{array}{ccc} \Phi_S(X') \times_S S' & \xrightarrow{f^*(\beta_\xi)} & X' \\ & \underset{\Phi_S(\mathrm{pr}_1^X)\times_S S'}{\searrow} & \downarrow{\scriptstyle i_X \times_S S'} \\ & & \Phi_S(X) \times_S S'. \end{array}$$

70. Description de β_ξ pour $\xi = \mathrm{hot}_{S,W}(X)$, avec X quelconque dans Cat/S, à expliciter dans définition en forme.

71. **NB** Comme X est lisse/S, et $\Phi_S(X)$ aussi, $X \longrightarrow \Phi_S(X)$ reste une W-équivalence colocale par tout changement de base.

On est ramené à la commutativité de [page 145]

$$\begin{array}{ccc} X \times_S S' = X' & \xrightarrow{\alpha_{X'}} & \Phi_S(X') \times_S S' \\ & \overset{?}{\searrow} & \downarrow{\scriptstyle \Phi_S(\mathrm{pr}_1^X)\times_S S'} \\ & & \Phi_S(X) \times_S S' \end{array} \qquad (*)$$

dans $(\mathrm{Cat}/S')(W^{\mathrm{d}}_{S'})^{-1}$. Essayons de prouver que c'est commutatif dans Cat/S', pas seulement dans le localisé par $W^{\mathrm{d}}_{S'}$. On peut le regarder comme diagramme dans Cat/S et prouver la commutativité à ce titre. Cette relation de commutativité $vu = w$ se décompose alors en deux, suivant les deux facteurs $\Phi_S(X)$ et S' de l'objet but $\Phi_S(X) \times_S S'$. Suivant le facteur S', la relation signifie simplement que $\alpha_{X'}$ est un S'-morphisme, c'est OK. Pour le facteur $\Phi_S(X)$, on prolonge le diagramme $(*)$ à droite par le carré p. 89

$$\begin{array}{ccccc} X' & \xrightarrow{\alpha_{X'}} & \Phi_S(X') \times_S S' & \xrightarrow{\mathrm{pr}_1^{\Phi_S(X')}} & \Phi_S(X') \\ & \searrow & \downarrow{\scriptstyle \Phi_S(\mathrm{pr}_1 X)\times_S S'} & & \downarrow{\scriptstyle \Phi_S(\mathrm{pr}_1^X)} \\ & & \Phi_S(X) \times_S S' & \xrightarrow{\mathrm{pr}_1^{\Phi_S(X)}} & \Phi_S(X), \end{array}$$

et compte tenu que le composé de la première ligne horizontale est $i_{X'}$, par construction de $\alpha_{X'}$, on est ramené à la commutativité de [page 146]

$$\begin{array}{ccc} X \times_S S' = X' & \xrightarrow{i_{X'}} & \Phi_S(X') \\ {\scriptstyle i_X\times_S S'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \Phi_S(\mathrm{pr}_1^X)} \\ \Phi_S(X) \times_S S' & \xrightarrow{\mathrm{pr}_1^{\Phi_S(X)}} & \Phi_S(X). \end{array} \qquad (*)$$

Or le morphisme $i_X : X \longrightarrow \Phi_S(X)$ dans Cat/S donne lieu au carré commutatif (comme toute flèche $i : X \longrightarrow Y$)

$$\begin{array}{ccc} X \times_S S' & \xrightarrow{\mathrm{pr}_1^X} & X \\ {\scriptstyle i_X\times_S S'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i_X} \\ \Phi_S(X) \times_S S' & \xrightarrow{\mathrm{pr}_1^{\Phi_S(X)}} & \Phi_S(X), \end{array}$$

de sorte que le composé inférieur de $(*)$ n'est autre que celui de $(**)$, donc égal au composé supérieur de ce dernier, et la commutativité de $(*)$ revient à celle de

$$\begin{array}{ccc} X \times_S S' = X' & \xrightarrow{i_{X'}} & \Phi_S(X') \\ {\scriptstyle \mathrm{pr}_1^X}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \Phi_S(\mathrm{pr}_1^X)} \\ X & \xrightarrow{i_X} & \Phi_S(X), \end{array}$$

qui est évidente par fonctorialité de $Z \xrightarrow{i_Z} \Phi_S(Z)$, appliquée à la flèche $\mathrm{pr}_1^X : X' \longrightarrow X$ de Cat/S.

On a ainsi prouvé que les foncteurs p. 90 [page 147]

$$\mathrm{HOT}_W(S') \underset{f^*}{\overset{f_!}{\rightleftarrows}} \mathrm{HOT}_W(S) \qquad (*)$$

sont adjoints l'un de l'autre, avec des morphismes d'adjonction

$$\begin{cases} \mathrm{id} & \xrightarrow{\alpha} & f^* f_! \\ \mathrm{id} & \xleftarrow{\beta} & f_! f^* \end{cases}$$

précisés plus haut. Je présume que la même démonstration, en travaillant avec les localiseurs grossiers W_S, $W_{S'}$, au lieu de W_S^{d}, $W_{S'}^{\mathrm{d}}$, donnerait que les foncteurs correspondants

$$\mathrm{HOT}_W^{\mathrm{lc}}(S') \underset{f_{\mathrm{lc}}^*}{\overset{f_!^{\mathrm{lc}}}{\rightleftarrows}} \mathrm{HOT}_W^{\mathrm{lc}}(S) \qquad (**)$$

sont adjoints l'un de l'autre, avec essentiellement 'les mêmes' morphismes d'adjonction α, β. Je n'ai pas envie de reprendre les raisonnements précédents et préfère le *déduire* de l'adjonction dans la situation $(*)$. Cela me donnera l'occasion de mieux comprendre les traits formels essentiels de la situation. Je poserai pour simplifier

[page 148]

$$\begin{array}{lcllcl} \mathrm{HOT}_W(S) & = & \mathcal{A}, & \mathrm{HOT}_W(S') & = & \mathcal{A}', \\ \mathrm{HOT}_W^{\mathrm{lc}}(S) & = & \mathcal{A}_0, & \mathrm{HOT}_W^{\mathrm{lc}}(S') & = & \mathcal{A}'_0, \end{array}$$

et j'utilise les couples de foncteurs adjoints

$$\mathcal{A} \underset{i}{\overset{\rho}{\rightleftarrows}} \mathcal{A}_0, \qquad \mathcal{A}' \underset{i'}{\overset{\rho'}{\rightleftarrows}} \mathcal{A}'_0,$$

où ρ, ρ' sont des foncteurs de localisation, i.e. i, i' des foncteurs pleinement fidèles. Je dispose d'un couple de foncteurs adjoints

$$\mathcal{A}' \underset{f^*}{\overset{f_!}{\rightleftarrows}} \mathcal{A},$$

et je suppose de plus

a) $f_!$ est compatible avec les localiseurs de $\mathcal{A}'$, $\mathcal{A}$ définis par ρ', ρ respectivement, donc définit un foncteur (bien déterminé à isomorphisme unique près)

$$f_!^0 : \mathcal{A}'_0 \longrightarrow \mathcal{A}_0,$$

donnant donc lieu à un diagramme commutatif (à isomorphisme fonctoriel près)

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{A}' & \xrightarrow{\rho'} & \mathcal{A}'_0 \\ {\scriptstyle f_!}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_!^0} \\ \mathcal{A} & \longrightarrow & \mathcal{A}_0. \end{array} \qquad (\mathrm{I})$$

p. 91

[plutôt $\mathcal{A} \xrightarrow{\rho} \mathcal{A}_0$]

b) 'Dualement', $f^* : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{A}'$ est compatible avec les sous-catégories pleines images essentielles des foncteurs pleinement fidèles i, i', et induit alors un foncteur, défini à isomorphisme unique près :

$$f_0^* : \mathcal{A}_0 \longrightarrow \mathcal{A}'_0,$$

[page 149]

donnant lieu à un carré de foncteurs, commutatif à isomorphisme fonctoriel canonique près

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{A}_0 & \xrightarrow{i} & \mathcal{A} \\ {\scriptstyle f_0^*}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f^*} \\ \mathcal{A}'_0 & \xrightarrow{i'} & \mathcal{A}'. \end{array} \qquad (\mathrm{II})$$

Sous ces conditions, le couple de foncteurs

$$\mathcal{A}_0 \underset{f_0^*}{\overset{f_!^0}{\rightleftarrows}} \mathcal{A}'_0, \qquad \texttt{[plutôt } \mathcal{A}'_0 \underset{f_0^*}{\overset{f_!^0}{\rightleftarrows}} \mathcal{A}_0, \texttt{]}$$

est un couple de foncteurs adjoints. (NB quand je parle de couples de foncteurs adjoints, celui écrit au-dessus de l'autre est l'adjoint à gauche.)

Démonstration. Soient

$$\eta_0 \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{A}_0, \qquad \xi'_0 \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{A}'_0,$$

il faut définir une bijection bifonctorielle

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}_0}(f_!^0(\xi'_0), \eta_0) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}'_0}(\xi'_0, f_0^*(\eta_0))$$

Pour cela, on va écrire ξ'_0 sous la forme

$$\xi'_0 = \rho'(\xi')\,, \qquad \xi' \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{A}',$$

il suffira d'établir la bijection bifonctorielle en remplaçant ξ'_0 par $\rho'(\xi')$, i.e.

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}_0}(f_!^0(\rho'(\xi')), \eta_0) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}'_0}(\rho'(\xi'), f_0^*(\eta_0))$$

(En effet, la formule d'adjonction s'interprète comme un isomorphisme de bifoncteurs, ou, ce qui revient au même, de foncteurs $\mathcal{A}'_0 \underset{\psi}{\overset{\varphi}{\rightrightarrows}} \mathcal{A}_0^\wedge$, or p. 92 [page 150]

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{Hom}}(\mathcal{A}'_0, \mathcal{A}_0^\wedge) & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Hom}}(\mathcal{A}', \mathcal{A}_0^\wedge) \\ \varphi & \longmapsto & \varphi \circ \rho' \end{array}$$

est pleinement fidèle, puisque ρ' est un foncteur de localisation, donc il revient au même de se donner un isomorphisme $\varphi \simeq \psi$, ou $\varphi \circ \rho' \simeq \psi \circ \rho'$.) On doit donc transformer l'expression

$$\begin{array}{ccccc} & \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}_0}(\underbrace{f_!^0(\rho'(\xi'))}_{\rho f_!(\xi')}, \eta_0) & \underbrace{\simeq}_{\text{commutativité de (I)}} & \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}_0}(\rho f_!(\xi'), \eta_0) & \\ \underbrace{\simeq}_{\text{adjonction } \rho,\, i} & \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(f_!(\xi'), i(\eta_0)) & \underbrace{\simeq}_{\text{adjonction } f_!,\, f^*} & \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}'}(\xi', \underbrace{f^* i(\eta_0)}_{i'(f_0^*(\eta_0))}) & \\ \underbrace{\simeq}_{\text{commutativité de (II)}} & \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}'}(\xi', i'(f_0^*(\eta_0))) & \underbrace{\simeq}_{\text{adjonction } \rho',\, i'} & \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}'_0}(\underbrace{\rho'(\xi')}_{\xi'_0}, f_0^*(\eta_0)), & \end{array}$$

ce qui est la bijection annoncée.

Je résume l'essentiel des résultats obtenus sur $f_!$, $f_!^{\mathrm{lc}}$:

Théorème 2. *Soit $f : S' \longrightarrow S$ une flèche dans* Cat*, considérons les foncteurs*

$$\mathrm{HOT}_W(S') \underset{f^*}{\overset{f_!}{\rightleftarrows}} \mathrm{HOT}_W(S)$$

$$\mathrm{HOT}_W^{\mathrm{lc}}(S') \underset{f_{\mathrm{lc}}^*}{\overset{f_!^{\mathrm{lc}}}{\rightleftarrows}} \mathrm{HOT}_W^{\mathrm{lc}}(S),$$

où les foncteurs $f_!$, $f_!^{\mathrm{lc}}$ sont décrits dans le théorème 1 *(p. 136). Les morphismes d'ad-* [page 151]

jonction

$$\begin{cases} \mathrm{id} & \longrightarrow & f^* f_! \\ \mathrm{id} & \longleftarrow & f_! f^* \end{cases}$$

sont décrits p. 138 à 140.

On voudrait expliciter la formule sympathique, obtenue en passant

$$\boxed{f_! f^*(\xi) = \mathrm{hot}_{S,W}(S'/S) \times_S \xi}\ ,$$

pour ceci il faut expliciter le deuxième membre. Notons la

Proposition 4. *Il existe un unique foncteur*

$$(\xi, \eta) \longmapsto \xi \times_S \eta : \mathrm{HOT}_W(S) \times \mathrm{HOT}_W(S) \longrightarrow \mathrm{HOT}_W(S)$$

avec la propriété que pour X, Y variables dans $\underline{\mathrm{Liss}}\, S$, on ait un isomorphisme bifonctoriel en X, Y p. 93

$$\mathrm{hot}_{S,W}(X) \times_S \mathrm{hot}_{S,W}(Y) \simeq \mathrm{hot}_{S,W}(X \times_S Y) \qquad (*)$$

([72]).

C'est formel, en utilisant seulement que sur $\underline{\mathrm{Liss}}\, S$, le bifoncteur

$$(X, Y) \longrightarrow X \times_S Y$$

est compatible avec les localiseurs $W_S^{\mathrm{d}} \times W_S^{\mathrm{d}}$ et W_S^{d}. Pour le voir, on est ramené à voir que si $X \xrightarrow{u} X'$ dans $\underline{\mathrm{Liss}}\, S$ est dans W_S^{d}, alors il en est de même de $X \times_S Y \xrightarrow{u \times_S \mathrm{id}_Y} X' \times_S Y$, pour tout Y dans $\underline{\mathrm{Liss}}\, S$. En fait, on n'utilise que la lissité de X, X', pas celle de Y, et [page 152] c'est immédiat, car si $X \longrightarrow X'$ est dans W_S^{d}, $X \times_S Y \longrightarrow X' \times_S Y$ est dans W_Y^{d}, donc aussi dans W_S^{d} (cf. théorème 1 appliqué à $Y \longrightarrow S$). Cette remarque suggère en même temps :

Corollaire 1. (Faux) *La formule bifonctorielle $(*)$ reste valable pour X dans $\underline{\mathrm{Liss}}\, S$, Y quelconque dans Cat/S, et aussi dans le cas inverse.* ([73])

Dans le premier cas, considérons

$$Y \xrightarrow{i_Y} \Phi(Y)$$

dans W_S^{d}, donc un isomorphisme dans $(\mathrm{Cat}/S)(W_S^{\mathrm{d}})^{-1}$, on aura donc

$$\begin{array}{lcl} \mathrm{hot}_{S,W}(X) \times_S \mathrm{hot}_{S,W}(Y) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{hot}_{S,W}(X) \times_S \mathrm{hot}_{S,W}(\Phi(Y)) \\ & \underbrace{\xrightarrow{\sim}}_{\text{car } X \text{ et } \Phi(Y) \text{ lisses sur } S} & \mathrm{hot}_{S,W}(X \times_S \Phi(Y)), \end{array}$$

or je dis que

$$X \times_S Y \xrightarrow{X \times_S i_Y} X \times_S \Phi(Y)$$

est encore dans W_S^{d}. Il suffit de voir que c'est dans W_X^{d} (cf. théorème 1), et pour ceci, que le changement de base lisse $X \longrightarrow S$ induit $\mathrm{Cat}/S \longrightarrow \mathrm{Cat}/X$ compatible avec les localiseurs W_S^{d}, W_X^{d}. Mais c'est *faux* (prendre $X = \{s\}$).

Montrons que les corollaire est faux. Je vais prendre $Y = \{s\}$, catégorie ponctuelle en [page 153] s, alors $\Phi(Y)$ est la catégorie fibrée à fibres discrètes définie par le foncteur représentable F défini par s, donc c'est S/F et, en l'occurence S/s :

$$\Phi(\{s\}) \simeq S/s \qquad \text{comme catégorie sur } S.$$ p. 94

Si p.ex. s est élément final e de S, on trouve

$$\Phi(\underset{S}{e}) \simeq S,$$

donc

$$\mathrm{hot}_{S,W}(X) \times_S \mathrm{hot}_{S,W}(e) = \mathrm{hot}_{S,W}(X),$$

d'autre part

$$\mathrm{hot}_{S,W}(X \times_S e) = \mathrm{hot}_{S,W}(X_e).$$

Si les deux étaient isomorphes dans $\mathrm{HOT}_W(S)$ par la flèche canonique [154]

$$X_e \longrightarrow X,$$

en appliquant le foncteur $p_!$ (où $p : S \longrightarrow e$), il s'ensuiverait que $X_e \longrightarrow X$ est dans W. Si par exemple $S = \mathbf{\Delta}^1$, cela impliquerait que pour tout X lisse sur S, $X_1 \longrightarrow X$ est dans W, alors que normalement la lissité implique que $X_0 \longrightarrow X$ est dans W. Donc ça reviendrait à dire que $\underline{\mathrm{Liss}}\, \mathbf{\Delta}^1 = \underline{\mathrm{Liss}}_0 \mathbf{\Delta}^1$, d'où aussitôt $\underline{\mathrm{Liss}}\, S = \underline{\mathrm{Liss}}_0 S$, pour tout S dans Cat, ça se saurait ! Le contrexemple le plus trivial est de prendre $X = \{0\} \hookrightarrow S = \mathbf{\Delta}^1$, l'inclusion de l'ouvert 'générique', immersion ouverte, donc lisse, la fibre X_1 est vide !

Corollaire 1 rectifié. *Si X est dans* Cat/S*, pas nécessairement lisse sur S, alors le foncteur*

$$\mathrm{mult}_{X/S} : Y \longmapsto Y \times_S X : \mathrm{Cat}/S \longrightarrow \mathrm{Cat}/S$$

induit un foncteur

$$\underline{\mathrm{Liss}}\, S \longrightarrow \mathrm{Cat}/S$$

compatible avec les localiseurs W_S^{d}, W_S^{d}, donc induit un foncteur

$$(\underline{\mathrm{Liss}}\, S)(W_S^{\mathrm{d}})^{-1} \longrightarrow (\mathrm{Cat}/S)(W_S^{\mathrm{d}})^{-1},$$

ou encore (compte tenu de l'équivalence induite par l'inclusion

$$(\underline{\mathrm{Liss}}\, S)(W_S^{\mathrm{d}})^{-1} \xrightarrow{\sim} (\mathrm{Cat}/S)(W_S^{\mathrm{d}})^{-1} \quad), \qquad [155]$$

un foncteur, encore noté $\mathrm{multhot}_{X/S}$,

$$\mathrm{multhot}_{X/S} : \mathrm{HOT}_W(S) \longrightarrow \mathrm{HOT}_W(S).$$

Ce foncteur satisfait donc à la relation

$$\mathrm{multhot}_{X/S}(\mathrm{hot}_{S,W}(Y)) \underbrace{\simeq}_{\text{isomorphisme canonique}} \mathrm{hot}_{S,W}(X \times_S Y)$$

pour Y *lisse sur S,* et pour Y quelconque dans Cat/S,

$$\mathrm{multhot}_{X/S}(\mathrm{hot}_{S,W}(Y)) \underbrace{\simeq}_{\text{isomorphisme canonique}} \mathrm{hot}_{S,W}(X \times_S \Phi_S(Y)).$$

Quand X est lui-même lisse sur S, ce foncteur n'est autre que la multiplication par $\mathrm{hot}_{S,W}(X)$: p. 95

$$\mathrm{multhot}_{X/S} = \mathrm{mult}_{\mathrm{hot}_{S,W}(X)} \qquad \text{si } X \textit{ lisse sur } S.$$

Mais sa valeur pour $\mathrm{hot}_{S,W}(Y)$, quand Y n'est *pas* lisse sur S, ne doit pas être confondue avec $\mathrm{hot}_{S,W}(X \times_S Y)$.

Ainsi, si X et Y sont dans Cat/S, considérons

$$X \times_S Y \qquad \text{et} \qquad \boxed{\mathrm{hot}_{S,W}(X \times_S Y).}$$

72. **NB** La multiplication $\times_S$ dans $\mathrm{HOT}_W(S)$ est associative, commutative, unitaire *etc., etc.*, puisque c'est le cas dans $\underline{\mathrm{Liss}}\, S$.

73. Cet énoncé est sûrement *faux !* Contrexemple p. 153, cf. corollaire 1 rectifié page 154-156.

a) Si ni X ni Y ne sont supposés lisses sur S, cet élément 'n'a aucune interprétation naturelle en termes d'opérations sur les catégories $\mathrm{HOT}_W(S)$' ([74]).

[156]

b) Si X et Y sont lisses sur S, cet élément s'interprète comme

$$\mathrm{hot}_{S,W}(X) \times_S \mathrm{hot}_{S,W}(Y)$$

([75]).

c) Si l'un des deux X, Y est lisse sur S, sans rien supposer sur l'autre, on a une interprétation en termes de mult_X (si Y lisse), ou mult_Y (si X lisse), notamment

$$\begin{aligned} \mathrm{hot}_{S,W}(X \times_S Y) &\simeq \mathrm{multhot}_X(\mathrm{hot}_{S,W}(Y)) \quad \text{si } Y \text{ lisse sur } S \\ &\simeq \mathrm{multhot}_Y(\mathrm{hot}_{S,W}(X)) \quad \text{si } X \text{ lisse sur } S. \end{aligned}$$

Corollaire 2. *Soit $f : S' \longrightarrow S$ une flèche dans* Cat*, d'où $f_!$, f^* entre $\mathrm{HOT}_W(S')$ et $\mathrm{HOT}_W(S)$. On a la relation*

$$f_! f^*(\xi) \simeq \mathrm{multhot}_{S'}(\xi),$$

donc si S' est lisse sur S,

$$f_! f^*(\xi) \simeq \mathrm{hot}_{S,W}(S') \times_S \xi.$$

Nous sommes maintenant en mesure de vérifier les axiomes Der 4'b, Der 5' relatifs aux images directes (I, p. 67, 68), et de plus Der 3b (I, p. 111). L'axiome Der 4' n'est autre que l'existence des adjoints à gauche $f_!$ des f^*. L'axiome Der 5' permet le 'calcul' des fibres d'un objet $f_!(\xi)$. Il dit qu'une certaine flèche du changement de base, relatif au diagramme commutatif dans Cat

p. 96

[157]

$$\begin{array}{ccc} S' & \xleftarrow{q} & s\backslash S' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ S & \xleftarrow{p} & e \simeq \{s\} \end{array} \qquad (s \in \mathrm{Ob}\, S),$$

savoir

$$p^*(f_!(\xi')) \longrightarrow f'_!(q^*(\xi'))$$

est un isomorphisme (pour $\xi' \in \mathbf{D}(S')$). Soit donc

$$\xi' \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{HOT}_W(S'), \qquad \xi' = \mathrm{hot}_{S',W}(X')$$

avec X' dans Cat/S'. Comme

$$f_!(\xi') = \mathrm{hot}_{S,W}(X'),$$

et que X' n'a aucune raison d'être lisse sur S (si on ne suppose pas S' lui-même lisse sur S, auquel cas il pourrait être utile de prendre X' lisse sur S', donc aussi sur S), pour calculer $p^*(f_!(\xi'))$ il n'est pas question de prendre la fibre X'_s, mais il faut prendre $s\backslash X' = \Phi_S(X')_s$:

$$p^*(f_!(\xi')) \simeq \mathrm{hot}_W(s\backslash X').$$

74. Sauf dans le cas où l'un des deux soit dans Fibhot S, cf. annotation page suivante.

75. Mais aussi si l'*un* des deux éléments est dans Fibhot S (et moyennant l'axiome L6 bis sur W).

$$\begin{array}{ccc} X' & \longleftarrow & s\backslash X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ S' & \xleftarrow{q} & s\backslash S' \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \longleftarrow & s\backslash S \end{array}$$

Considérons le diagramme de changement de base par $s\backslash S \longrightarrow S$ ci-contre [i.e. ci-dessus], à carrés cartésiens. On voit d'abord que $q^*(\xi')$ n'est autre que la classe dans $\mathrm{HOT}_W(s\backslash S')$ de l'image inverse de X' par le changement de base $s\backslash S' \longrightarrow S'$. Pour l'assurer, il suffirait de prendre X' lisse sur S' (ce qui est licite) - alors la description de [158] l'image inverse est OK pour tout changement de base. Mais on a vu que dans le cas d'un co-isomorphisme local comme $s\backslash S' \longrightarrow S'$, il n'y a pas même besoin de cet artifice - la formule est OK sans restriction de lissité. Ainsi

$$q^*(\xi') = \mathrm{hot}_{s\backslash S',W}(s\backslash X'),$$

d'où p. 97

$$f'_!(q^*(\xi')) \simeq \mathrm{hot}_{S,W}(s\backslash X') = \mathrm{hot}_W(s\backslash X').$$

Donc on a bien trouvé

$$p^* f_! \simeq f'_! q^*.$$

On peut maintenant prouver aussi Der 3b. On a vu qu'une fois qu'on dispose des adjoints à gauche $f_!$ des f^*, cet axiome s'énonce sous *forme homologique* ainsi : Si

$$f : S' \longrightarrow S$$

est dans W, il faut prouver que pour tout

$$\xi \in \mathrm{HOT}_W(e) \overset{\text{déf}}{=} \mathrm{Hot}_W,$$

la flèche correspondante

$$(*) \qquad p'_! p'^*(\xi) \longrightarrow p_! p^*(\xi)$$

est [un] isomorphisme dans Hot_W, où $p : S \longrightarrow e$, $p' : S' \longrightarrow e$ sont les flèches structurales. Or comme tout objet de Cat est lisse sur e, le corollaire 2 précédent permet d'identifier cette flèche $(*)$ à

$$\eta' \times_S \xi \longrightarrow \eta \times_S \xi$$

déduite de [159]

$$\mathrm{hot}_W(f) : \quad \underbrace{\eta'}_{\overset{\text{déf}}{=} \mathrm{hot}_W(S')} \quad \longrightarrow \quad \underbrace{\eta}_{\overset{\text{déf}}{=} \mathrm{hot}_W(S)} .$$

Comme celle-ci est [un] isomorphisme par hypothèse, on gagne.

Donc on a prouvé

Théorème 3. *Le prédérivateur* HOT *satisfait aux axiomes* Der 1, Der 2 ([76]) *(pour mémoire), et* Der 3b ([77]), Der $4'$, Der $5'$.

76. *pas prouvé*, le 'résultat' auquel je pensais est canulé, cf. complément proposition 5, page 164.

77. Et même la variante la plus forte Der $3b'_2$ de Der 3, cf. démonstration page suivante. **NB** Pour Der $3b'_2$, on a utilisé l'axiome L6 sur W - et c'est essentiel. On voit que la validité de Der $3b'_2$ implique L6, et même la forme plus forte L6 bis, et même si on suppose seulement Der $3b'_1$, i.e. f_0^* pleinement fidèle.

On a envie de prouver aussi les variantes renforcées de Der 3, la forme la plus forte étant celle-ci (Der $3b'_2$) : si $f \in W$, alors f^* induit une *équivalence* de catégories

$$f_0^* : \mathrm{HOT}_W^{\mathrm{lc}}(S) \longrightarrow \mathrm{HOT}_W^{\mathrm{lc}}(S').$$

La pleine fidélité du foncteur f_0^* doit résulter de la variante naturelle Der $3b''_{\mathrm{coh}}$ de Der 3b, une fois qu'on aura développé le formalisme des Hom internes dans les $\mathrm{HOT}_W(S)$. Mais pour donner un sens à Der $3b''_{\mathrm{coh}}$, on a besoin des foncteurs *cohomologie,* i.e. de p_* et p'_* (au lieu de $p_!$, $p'_!$) pour HOT, donc c'est encore prématuré pour l'instant. La construction des f_* et celle des Hom internes se fera d'ailleurs sûrement ± conjointement.

Mais je m'aperçois à l'instant qu'on trouve quasiment 'à l'œil' le fait que f_0^* soit bien une *équivalence* de catégories, et que $f_!^0$ soit l'équivalence quasi-inverse, en utilisant l'adjonction des foncteurs $f_!^0$, f_0^*, et se rappelant que pour prouver que ce sont des équivalences quasi-inverses l'une de l'autre, il revient au même de montrer que les morphismes d'adjonction

p. 98
[160]

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{id} & \xrightarrow{\alpha_0} & f_0^* f_!^0 \\ \mathrm{id} & \xleftarrow{\beta_0} & f_!^0 f_0^* \end{array}$$

sont [des] isomorphismes. Je vais essayer de décrire ces flèches d'adjonction dans le cas général (sans supposer $f \in W$), puis de montrer qu'elles sont dans W si f l'est.

[1) Soit] $\xi = \mathrm{hot}_{S,W}^{\mathrm{lc}}(X)$ dans $\mathrm{HOT}_W(S)$. On peut supposer $X \in \mathrm{Ob}\,\underline{\mathrm{Parf}}\,S$. Comme ['Comme' barré] X lisse sur S, on a

$$f_0^*(\xi) = \mathrm{hot}_{S',W}^{\mathrm{lc}}(X \times_S S'), \qquad f_!^0 f_0^*(\xi) = \mathrm{hot}_{S,W}^{\mathrm{lc}}(X \times_S S').$$

Donc

$$\beta_{0,\xi} : f_!^0 f_0^*(\xi) \longrightarrow \xi$$

est une flèche

$$X \times_S S' \longrightarrow X \qquad \text{dans } (\mathrm{Cat}/S)(W_S)^{-1}$$

et je présume que c'est pr_1 ([78]). Est-ce dans W si $f : S' \longrightarrow S$ l'est ? Oui (car X est parfait sur S), sous réserve que W satisfait l'axiome L6 (cf. page 43).

[161]

2) Soit

$$\xi' = \mathrm{hot}_{S',W}^{\mathrm{lc}}(X') \qquad \text{dans } \mathrm{HOT}_W(S'),$$

on a

$$f_!^0(\xi') = \mathrm{hot}_{S,W}^{\mathrm{lc}}(X'),$$

mais pour expliciter f_0^* de cet élément, comme X' n'a aucune raison d'être un Hot-fibré sur S (auquel cas il suffirait de prendre $f^*(X') \overset{\text{déf}}{=} X \times_S S'$), il faut d'abord prendre $C_S(X')$, puis appliquer f^* :


$$f_0^* f_!^0(X') = \mathrm{hot}_{S',W}^{\mathrm{lc}}(C_S(X') \times_S S').$$

Il faut donc définir

$$X' \xrightarrow{\beta_{0,X'}} C_S(X') \times_S S' \qquad \text{dans } (\mathrm{Cat}/S')W_{S'}^{-1}.$$

Or on trouve une flèche canonique dans Cat/S', déduite du S-morphisme $i_{X'}$: $X' \longrightarrow C_S(X')$, i.e. du carré commutatif en traits pleins

p. 99



comme l'unique flèche pointillée $\beta_{0,X'}$ qui soit un S'-morphisme (triangle gauche commutatif) et qui rende commutatif le triangle supérieur.

Si $f \in W$, alors pr_1, déduit de f par changement de base $C_S(X') \longrightarrow S$, qui est parfait, est dans W par L6, on sait qu'il en est de même de $i_{X'}$, donc aussi de $\beta_{0,X'}$, on gagne.

Pour terminer les propriétés générales des foncteurs $f_!$ pour HOT_W, je voudrais donner les énoncés raisonnables de changement de base. Ce serait un [page 162]

Théorème 4. *Soit*

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{q} & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ S & \xleftarrow{p} & S' \end{array}$$

un diagramme cartésien dans Cat*, considérons la flèche de changement de base (dans* $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathrm{HOT}_W(X), \mathrm{HOT}_W(S'))$*) :*

$$p^* f_! \longleftarrow f'_! q^*.$$

C'est un isomorphisme dans chacun des deux cas suivants.

a) f est lisse.

b) p est propre.

Démonstration. *Cas a).* On teste avec ξ dans $\mathrm{HOT}_W(X)$, on peut supposer ξ de la forme

$$\xi = \mathrm{hot}_{X,W}(Z) \qquad \text{avec } Z \in \mathrm{Ob}\,\underline{\mathrm{Liss}}\, X.$$

Notons que Z est alors aussi lisse sur S, puisque f est lisse.

$$f_!(\xi) = \mathrm{hot}_{S,W}(Z), \qquad p^* f_!(\xi) = \mathrm{hot}_{S',W}(\underbrace{Z \times_S S'}_{Z',\ \text{cf. diagramme}})$$

$$q^*(\xi) = \mathrm{hot}_{X',W}(Z'), \qquad f'_! q^*(\xi) = \mathrm{hot}_{S',W}(Z'),$$

OK !

$$\begin{array}{ccc} Z & \longleftarrow & Z' \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xleftarrow[q]{} & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ S & \xleftarrow[p]{} & S' \end{array}$$

p. 100

Cas b). Il faut admettre que le foncteur changement de base par p :

78. **NB** On voit que l'axiome L6 est ± *nécessaire* pour que le résultat sur f_0^*, $f_!^0$ soit valable. [page 163]

$$Z \longmapsto Z \times_S S' : \mathrm{Cat}/S \longrightarrow \mathrm{Cat}/S'$$

est compatible avec les localiseurs W_S^{d}, $W_{S'}^{\mathrm{d}}$ (cf. plus bas) - c'est ça, formellemet, la propriété pertinente pour p ([79]). Il en résultera que

$$p^* : \mathrm{HOT}_W(S) \longrightarrow \mathrm{HOT}_W(S')$$

se calcule, pour un élément dans $\mathrm{HOT}_W(S)$ donné par un Z *quelconque* dans Cat/S (pas nécessairement lisse sur S), par

$$p^*(\mathrm{hot}_{S,W}(Z)) = \mathrm{hot}_{S',W}(Z \times_S S').$$

Partons alors, comme dans a), d'un élément ξ de $\mathrm{HOT}_W(X)$ donné par un Z de Cat/X (inutile cette fois de supposer Z lisse), le calcul immédiat précédent établit encore la formule de commutation.

Mais il ne semble pas que la propriété de compatibilité de $X \longmapsto X \times_S S'$, avec l'équivalence colocale sur S et sur S', résulte de façon ± évidente de la condition que $p : S' \longrightarrow S$ soit propre ([80]). J'ai envie de le déduire de fourbis généraux sur le formalisme des dérivateurs, à savoir du théorème de changement de base des $f_!^{\mathbf{D}}$ pour un morphisme **D**-propre.

Sous forme duale d'un théorème de changement de base pour $f_*^{\mathbf{D}}$, par changement de base **D**-lisse, c'est fait dans I, p. 56 à 58, et on doit pouvoir l'appliquer ici. Notons que dans la démonstration du théorème loc. cit., on n'utilise que L4 [plutôt Der 4], i.e. l'existence des $f_*^{\mathbf{D}}$, à l'exclusion des $f_!^{\mathbf{D}}$ (L4′ [plutôt Der 4′]), plus L5 [plutôt Der 5] bien sûr, donc la forme duale ne fait appel à l'existence des $f_*^{\mathbf{D}}$, seulement des $f_!^{\mathbf{D}}$. On a donc une bonne chance de pouvoir l'appliquer à HOT_W (où je n'ai pas encore établi l'existence des f_*^{HOT}). [page 164]

Notons d'abord p. 101

Proposition 5. *Soit $f : S' \longrightarrow S$ une flèche dans* Cat. *Alors f est une HOT_W-équivalence* si et seulement si $\mathrm{hot}_W(f)$ *est* [un] *isomorphisme. Si W est fortement saturé, cela signifie donc que $f \in W$ (et en tous cas $f \in W \Longrightarrow f$ [est] une HOT_W-équivalence)* ([81]).

C'est contenu dans la démonstration de Der 3b tantôt. Je rappelle que f est une HOT-équivalence, par définition, si et seulement si pour $a, b \in \mathrm{Hot}_W(= \mathrm{HOT}_W(e))$,

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{HOT}_W(S)}(a_S, b_S) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathrm{HOT}_W(S')}(a_{S'}, b_{S'}) \qquad (*)$$

est [un] isomorphisme, où a_S etc. désigne $p_S^*(a)$ etc. ($p_S : S \longrightarrow e$). Les formules d'adjonction de $p_{S!}$, p_S^* et de $p_{S'!}$, $p_{S'}^*$ permettent d'interpréter la flèche $(*)$ comme

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{HOT}_W(S)}(p_{S!}(a_S), b) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathrm{HOT}_W(S')}(p_{S'!}(a_{S'}), b),$$

déduit par 'transposition' $\mathrm{Hom}(-, b)$ de la flèche [page 165]

$$p_{S'!}(a_{S'}) \longrightarrow p_{S!}(a_S)$$

induite par f - donc il faut prouver que celle-ci est un isomorphisme (c'est la forme que nous avions utilisé tantôt). Or cette flèche s'identifie à

$$\eta' \times a \longrightarrow \eta \times a$$

79. Ça doit être *équivalent* à p propre. Comparer avec le corollaire 1, page 166.

80. Mais si, cf. démonstration page 168. Les développements des quatre pages qui suivent sont inutiles par cette démonstration.

81. devrait remonter vers le théorème 3, p. 159.

induite par

$$\mathrm{hot}_W(f) : \underbrace{\eta'}_{=\mathrm{hot}_W(S')} \longrightarrow \underbrace{\eta}_{=\mathrm{hot}_W(S)},$$

et dire que c'est [un] isomorphisme quel que soit a dans Hot_W revient à dire que $\eta' \longrightarrow \eta$ l'est (puisque la multiplication dans Hot_W a une élément unité …).

Maintenant je me rappelle que pour avoir l'axiome Der 2 des dérivateurs, je devrais également supposer W *fortement* saturé (i.e. égal au localiseur défini par le foncteur canonique $\mathrm{Cat} \longrightarrow (\mathrm{Cat})W^{-1} \overset{\text{déf}}{=} \mathrm{Hot}_W$). (C'est ce que je supposais d'emblée, en partant d'un $(\mathcal{M}, W)$ général pour définir un prédérivateur, pour avoir l'axiome Der 2.)

En appliquant le dual du théorème de I, p. 56, on trouve donc le théorème de changement de base pour $f_!$, pour changement de base $f : S' \longrightarrow S$ *W-propre.*

[page 166]

Mais la démonstration utilise sûrement Der 2 (critère d'isomorphisme par fibres, dans $\mathrm{HOT}_W(S)$), que je n'ai pas prouvé encore. Elle est incomplète pour le moment. Mais je peux noter dès maintenant le

Corollaire 1 (du théorème 4, p. 162). *Si la flèche $S' \xrightarrow{p} S$ dans* Cat *donne lieu (pour tout $f : X \longrightarrow S$ dans* Cat/S*) à la formule de changement de base pour*

p. 102

$$f_! : \mathrm{HOT}_W(X) \longrightarrow \mathrm{HOT}_W(S),$$

alors le foncteur $p^* : X \longmapsto X \times_S S'$ de Cat/S *dans* Cat/S' *est compatible avec les localiseurs W_S^{d}, $W_{S'}^{\mathrm{d}}$.* (L'implication inverse a été vue déjà, cf. pages 161-163.)

Cela résultera du

Lemme. *Soit $u : X' \longrightarrow X$ une flèche dans* Cat/S*. Pour que $u \in W_S^{\mathrm{d}}$, il faut et il suffit (si W [est] fortement saturé) que pour tout $\xi \in \mathrm{Hot}_W$, la flèche correspondante*

$$u_* : p'_!(\xi_{X'}) \longrightarrow p_!(\xi_X)$$

soit [un] *isomorphisme dans* $\mathrm{HOT}_W(S)$.

C'est suffisant, sous réserve de saturation forte de W, car si u_* est [un] isomorphisme, passant aux fibres, on trouve par Der 5′

$$H_\bullet^{\mathrm{HOT}_W}(s\backslash X', \xi) \longrightarrow H_\bullet^{\mathrm{HOT}_W}(s\backslash X, \xi),$$

si c'est [un] isomorphisme, alors $s\backslash X' \longrightarrow s\backslash X$ est par définition une HOT-équivalence, ce qui implique que c'est dans W (proposition 5).

[page 167]

C'est nécessaire, car si $\xi = \mathrm{hot}_W(T)$, donc $\xi_S = \mathrm{hot}_{S,W}(T_S)$ (où $T_S = T \times S/S$), et on a donc

$$p'_!(\xi_{X'}) = \mathrm{hot}_{S,W}(X' \times T), \qquad p_!(\xi_X) = \mathrm{hot}_{S,W}(X \times T),$$

et il faut prouver que si $u : X' \longrightarrow X$ est dans W_S^{d}, alors $\underbrace{X' \times T}_{X' \times_S T_S} \longrightarrow \underbrace{X \times T}_{X \times_S T_S}$ aussi, ce qui signifie simplement que

$$s\backslash(X' \times T) \longrightarrow s\backslash(X \times T) \qquad (*)$$

est dans W pour tout $s \in S$. Mais le changement de base $s\backslash S \longrightarrow S$ commute aux produits fibrés, donc transforme $X \times T = X \times_S T_S$ en $(s\backslash X) \times_{s\backslash S} T_{(s\backslash S)} = s\backslash X \times T$, et de même pour X'. Donc la flèche s'identifie à

$$(s\backslash X') \times T \longrightarrow (s\backslash X) \times T,$$

déduite de

$$s\backslash X' \longrightarrow s\backslash X$$

p. 103

[page 168]

par le foncteur $? \times T$. Comme ce foncteur transforme W en W, on gagne.
Finalement, je m'aperçois que j'ai eu un blocage stupide, pour la question que le changement de base propre soit compatible à la W-équivalence colocale. Soit

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & S \xleftarrow{g} S', & \end{array}$$

avec $f \in W_S^{\mathrm{d}}$ et g propre, il faut voir que $f' : X' \longrightarrow Y'$ déduit de f par changement de base $S' \longrightarrow S$ est encore dans $W_{S'}^{\mathrm{d}}$. Cela signifie que tout changement de base de la forme $s'\backslash S' \longrightarrow S'$ le transforme en $\in W$. Mais soit $s = g(s')$, on a le carré commutatif

$$\begin{array}{ccc} S & \longleftarrow & S' \\ \uparrow & & \uparrow \\ \underbrace{s\backslash S}_{=Z} & \longleftarrow & \underbrace{s'\backslash S'}_{=Z'}, \end{array}$$

et il suffit de voir que pour toute flèche $\varphi : \mathcal{X} \longrightarrow \mathcal{Y}$ dans Cat/Z qui est dans W, son image inverse par changement de base $Z' \longrightarrow Z$ est itou. (En appliquant ceci au cas $\mathcal{X} = X \times_S (s\backslash S)$, $\mathcal{Y} = Y \times_S (s\backslash S)$, $\varphi = s\backslash f$.) Or ceci résulte du fait que, par hypothèse de [page 169]
propreté, $Z' \longrightarrow Z$ est propre et à fibres Hot-asphériques, donc c'est une Hot-équivalence universelle. Il suffirait même que g soit W-propre, pour impliquer que $Z' \longrightarrow Z$ est une W-équivalence universelle, i.e. qui reste telle après tout changement de base. Or on a le
Lemme. Si $g : Z' \longrightarrow Z$ est une W-équivalence universelle, alors le foncteur

$$g^* : X \longmapsto X \times_Z Z' : \mathrm{Cat}/Z \longrightarrow \mathrm{Cat}/Z'$$

est compatible avec les localiseurs W_Z, $W_{Z'}$, i.e. si $f : X \longrightarrow Y$ dans Cat/Z est dans W, de même $f' : X' \longrightarrow Y'$ dans Cat/Z'.

$$\begin{array}{ccccc} X & \xleftarrow{g_X} & X' & & \\ & \searrow^{f} \quad \swarrow & & \searrow^{f'} & \\ & Y & \xleftarrow{g_Y} & Y' & \\ & \downarrow & & \downarrow & \\ & Z & \xleftarrow{g} & Z' & \end{array}$$

Cela est évident sur le carré supérieur du diagramme ci-dessus, où g_X, g_Y sont dans W par l'hypthèse sur g, donc f est dans W si et seulement si f' l'est, cqfd.

[page 170 manque]

[page 170 manque]
p. 104
[page 171]

Nouvelle version de la théorie de HOT_W.

Je me suis aperçu que l'hypothèse $W \supseteq W_\infty$ (L3 quater, p. 1), que j'avais fini par mettre sur W, est artificielle, et que l'hypothèse L5 (p. 43), voire L6, L6 bis (p. 43-44), est inutile pour une grande partie de la théorie de HOT_W. J'ai été ainsi amené à revoir la théorie (i.e. ce que j'en ai fait jusqu'à présent) sous les hypothèses suivantes sur W (cf. XII) :

W(1) (*Saturation* de W) : comme avant (L1 page 1)

W(2) (localisation) : c'est l'ancien L4 bis ([82]).

W(3) (objet final) : Si X a un objet final, X est W-asphérique (ancien L3).

Ces trois axiomes sont suffisants pout tout ce que j'avais fait dans Pursuing Stacks, et dans une grande partie de ce qui a été fait ici sur HOT. Parfois cependant il faut l'ancien L 5, que je réénonce ici (comparer XII, théorème `[numéro du théorème manque]`) :

W(4b) Soient X, Y W-fibrés sur S, $f : X \longrightarrow Y$ un S-morphisme. Si $f \in W$, alors $\forall s \in \mathrm{Ob}\, S$, $f_s : X_s \longrightarrow Y_s$ est dans W.

Pour la notion de W-fibré (*faible*), j'ai été long à trouver enfin *la* bonne notion, bonne pour un W ne satisfaisant que W$(1,2,3)$ (et même seulement W$(1,2\text{ bis},3)$, où W(2 bis) est l'ancien L4). Je renvoie pour cela à (XII, théorème 3, p. 51), où la notion est bien cernée à coups de conditions équivalentes. En fait, pour les applications principales à HOT_W, vues jusqu'à présent, il suffit ([83]) d'une variante affaiblie de W(4b) :

W(4b′) Comme W(4b), mais en exigeant de plus que X, Y soient dans $\underline{\mathrm{Parf}}_\omega\, S$.

Pour la notion de morphismes W-propres, W-lisses, W-parfaits dans Cat, je renvoie à XII, partie III (p. 22-52), et les notations $\underline{\mathrm{Liss}}_W S$, $\underline{\mathrm{Prop}}_W S$, $\underline{\mathrm{Parf}}_W S$ (sous-catégories de Cat$/S$), et $\mathrm{Parf}_W \subseteq \mathrm{Fl(Cat)}$. Dans l'énoncé de W(4b′) on a posé [page 172]

$$\underline{\mathrm{Parf}}_\omega S = \underline{\mathrm{Parf}}_{W_\omega} S, \qquad \text{où } W_\omega \subseteq \mathrm{Fl(Cat)} \text{ est la plus petite partie de Fl(Cat) satisfaisant W}(1,2\mathrm{bis},3).$$

Je note de même

$$W'_\omega \subseteq \mathrm{Fl(Cat)}, \qquad \text{plus petite partie de Fl(Cat) satifaisant W}(1,2,3,4\mathrm{b}).$$

L'hypothèse $W \supseteq W_\infty$ que nous avions fini par imposer sur W, et qui est apparu artificielle au cours de la réflexion du XII, a avantage à être remplacée par p. 105

$$W \supseteq W'_\omega \qquad (\text{ou par } W \supseteq \overline{W'_\omega},\ \text{où } \overline{W'_\omega} \text{ est le saturé fort de } W'_\omega)$$

([84]). Mais nous ne l'imposons pas comme condition impérative, au même titre que W$(1,2,3)$, pas plus que W(4b). Le rôle que j'ai fait jouer à W_∞ dans les semaines passées, semble revenir plus naturellement à W'_ω ou $\overline{W'_\omega}$. Il en est ainsi notamment aussi, il me semble, dans l'énoncé des conditions du type Der 3 sur un dérivateur (I, p. 111-112), qu'il faudrait revoir dans cette lumière. Mais tout dépend, si (comme j'en ai l'impression) on peut faire vraiment de l'algèbre homotopique substantielle, avec notamment les suites exactes longues de fibration et de suspension, pour HOT_W, avec des W qui sont *strictement* contenus dans W_∞. Avant de même être assuré, il est trop tôt encore pour me prononcer sur la 'bonne' formulation de Der 3,

qui est l'axiome mettant en relation le dérivateur $\mathbf{D}$ avec W_∞, ou avec quelque autre localiseur fondamental. [page 173]

Je vais faire à présent un résumé de la théorie de HOT_W, revue dans l'optique que je viens de dire : on suppose pour W *les conditions* W$(1,2,3)$ *sans plus,* sauf mention explicite.

① **Localiseurs principaux** sur Cat$/S$ et sur les principales catégories de S-catégories (cf. diagramme p. 76).

82. i.e. le L5 de la page 2. L'axiome est repris (sous une forme voisine et équivalente) au bas de la page 43.

83. C'est finalement une erreur, semble-t-il à présent. Je crois que l'axiome W(4b′) ne sert finalement à strictement rien (si ce n'est en fait à entretenir des idées fausses.)

84. $\overline{W'_\omega}$ est le plus petit sous-ensemble *fortement saturé* de Fl(Cat), satisfaisant W(4b), et il satisfait même la condition W′(4a), variante la plus forte des axiomes du type W(4).

Ils seront tous induits par les trois localiseurs familiers

$$\begin{array}{ccc} W_S^{\mathrm{d}} & & W_S^{\mathrm{g}} \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & W_S & \end{array}$$

sur Cat/S. Il y a lieu aussi de regarder W_S^{f}, mais jamais sur Cat/S tout entier, mais sur d'autres catégories du diagramme, et toujours dans des cas où W_S^{f} coïncide soit avec W_S^{d}, soit avec W_S^{g}. Mais le point de vue W_S^{f} est souvent plus directement commode, et a l'avantage de plus d'être symétrique.

ⓐ Dans $\underline{\mathrm{Liss}}_W S$, on a

p. 106

$$\begin{array}{l} W_S^{\mathrm{f}} \quad = W_S^{\mathrm{d}} = W_S^{\mathrm{univ}} \\ \Downarrow \\ W_S^{\mathrm{g}} \\ \Downarrow \\ W_S \end{array}$$

Dualement,

ⓑ dans $\underline{\mathrm{Prop}}_W S$, on a

$$\begin{array}{l} W_S^{\mathrm{f}} \quad = W_S^{\mathrm{g}} = W_S^{\mathrm{univ}} \\ \Downarrow \\ W_S^{\mathrm{d}} \\ \Downarrow \\ W_S, \end{array}$$

enfin,

[page 174]

ⓒ dans $\underline{\mathrm{Fib}}_W S$, on a

$$\begin{array}{l} W_S^{\mathrm{f}} \iff W_S^{\mathrm{d}} \iff W_S^{\mathrm{g}} \iff W_S^{\mathrm{univ}} \\ \Downarrow \\ W_S. \end{array}$$

Cette implication $W_S^{\mathrm{f}} \Longrightarrow W_S$ est stricte si on ne fait pas sur W l'axiome W(4b), dont l'utilité ici est exactement d'assurer

> $W_S^{\mathrm{f}} \iff W_S$ dans $\underline{\mathrm{Fib}}_W S$ *si* W(4b) `[est]` satisfait
>
> et alors les cinq localiseurs envisagés ci-dessus
>
> dans $\underline{\mathrm{Fib}}_W S$ sont tous égaux.

Les relations entre [?] localiseurs dans $\underline{\mathrm{Liss}}_W S$, $\underline{\mathrm{Prop}}_W S$, $\underline{\mathrm{Fib}}_W S$ se transportent automatiquement aux sous-catégories de celles-ci, plus généralement à toutes celles qui

p. 107

s'envoient par un foncteur d'inclusion dans une de celles-ci. Dans le diagramme p. 76, toutes les catégories, à la seule exception de Cat/S tout entier, sont dans ce cas.

Pour les résultats principaux développés jusqu'à présent sur HOT_W, quand l'axiome W(4b) est utilisé, la forme faible W(4b′) suffit. On a


> $W_S^{\mathrm{f}} \iff W_S$ dans $\underline{\mathrm{Parf}}_\omega S$ *si* W(4b′) `[est]` satisfait
>
> et alors les cinq localiseurs W_S^{f}, W_S^{d}, W_S^{g}, W_S^{univ}, W_S
>
> sont égaux dans $\underline{\mathrm{Parf}}_\omega S$.

② **Principales catégories de catégories sur S.**

Ce sont, à des modifications d'éclairage près, celles du diagramme p. 76. Les catégories $\underline{\mathrm{Fibsc}}\, S$, $\underline{\mathrm{Fib}}\, S$, $\underline{\mathrm{Cofibsc}}\, S$, $\underline{\mathrm{Cofib}}\, S$ et leurs variantes à indice 0, sont inchangées - leur rôle est d'être aussi petites

que possible pour remplir leur fonction (de description de $\mathrm{HOT}_W(S)$, $\mathrm{HOT}^o_W(S)$, $\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S)$, ou $\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc!}}_W(S)$ ci-dessous). La catégorie $\underline{\mathrm{Parf}}\, S$ du diagramme remplissait une fonction du même type, c'est pourquoi nous la remplaçons à présent (en surenchérissant) par $\underline{\mathrm{Parf}}_\omega S$. Les autres catégories du diagramme sont, en plus de Cat/S, $\underline{\mathrm{Liss}}\, S$ et $\underline{\mathrm{Prop}}\, S$ et leurs variantes à indice 0, ainsi que $\underline{\mathrm{Fibhot}}\, S$. (Toutes ces catégories, ainsi que $\underline{\mathrm{Parf}}\, S$, étaient donc construites par référence à W_∞, non pas à W.) Leur rôle est d'être aussi grandes que possible pour donner lieu à certaines propiétés et relations. Or il se trouve qu'ici la référence à W_∞ était artificielle, et il y a lieu de mettre plutôt les catégories $\underline{\mathrm{Liss}}_W S$, $\underline{\mathrm{Prop}}_W S$, $\underline{\mathrm{Fib}}_W S$, et en plus les variantes $\underline{\mathrm{Liss}}_{0,W} S$, $\underline{\mathrm{Prop}}_{0,W} S$. Ainsi le diagramme devient

[page 175]



([85]) (tous les carrés `[sont]` cartésiens, les foncteurs notés $\hookrightarrow$ sont pleinement fidèles),

où j'ai encore marqué en vert `[dans l'original seulement]` les cinq *'foncteurs d'inversion'*

p. 108

[page 176]

$$\Phi,\ \Psi,\ \Phi_0,\ \Psi_0,\ C,$$

qui fournissent des quasi-inverses des foncteurs sur les catégories localisées déduits par les *foncteurs d'inclusion.*

③ **Les quatre types de catégories HOT_W.**

85. NB la nouvelle notation serait plutôt $\underline{\mathrm{Fibf}}_W S$, car il s'agit de W-fibrations qu'à présent j'appelle 'faibles' (et définies seulement dans Cat, à l'opposé des W-fibrations, définissables dans toute catégorie de modèles).

Sur chacune des catégories de l'etage, il y a *deux* localiseurs à regarder,

$$\begin{array}{ccc} W_S^{\mathrm{f}} & = W_S^{\mathrm{g}} = W_S^{\mathrm{d}} = W_S^{\mathrm{univ}} \\ \Vert & & \\ \Downarrow & & \\ W_S, & & \end{array}$$

donnant lieu à deux localisés distincts, notés

$$\mathrm{HOT}_W^{\mathrm{lc}}(S) \qquad \text{et} \qquad \mathrm{HOT}_W^{\mathrm{lc!}}(S),$$

il se trouve que (grâce à Φ_0 et Ψ_0) ces localisés 'sont les mêmes' pour les 8 catégories de l'étage, à l'exception de $\underline{\mathrm{Parf}}_\omega S$; plus exactement, les foncteurs d'inclusion (à l'exception peut-être de ceux ayant pour source $\underline{\mathrm{Parf}}_\omega S$) induisent des équivalences sur les deux types de localisés, les équivalences quasi-inverses étant obtenues par Φ_0 (aile gauche) ou Ψ_0 (aile droite). Quand on localise *pour* W_S (à l'exclusion de W_S^{f}), on trouve aussi des quasi-inverses par $C|\underline{\mathrm{Liss}}_{0,W} S$ resp. $C|\underline{\mathrm{Prop}}_{0,W} S$, pour les deux inclusions

$$\underline{\mathrm{Liss}}_{0,W} S \hookleftarrow \underline{\mathrm{Parf}}_\omega S \hookrightarrow \underline{\mathrm{Prop}}_{0,W} S$$

([86]). Par raison de symétrie, le plus joli semble de définir

$$\left\{ \begin{array}{lcl} \mathrm{HOT}_W^{\mathrm{lc}}(S) & = & (\underline{\mathrm{Fib}}_W S)(W_S^{\mathrm{f}})^{-1} \\ \mathrm{HOT}_W^{\mathrm{lc!}}(S) & = & (\underline{\mathrm{Fib}}_W S)(W_S)^{-1}, \end{array} \right.$$

et on a un foncteur de localisation

$$\mathrm{HOT}_W^{\mathrm{lc}}(S) \xrightarrow{\lambda} \mathrm{HOT}_W^{\mathrm{lc!}}(S)$$

induit par l'inclusion

$$W_S^{\mathrm{f}} \subseteq W_S.$$

Pour toute sous-catégorie pleine

$$\mathcal{F} \subseteq \underline{\mathrm{Fib}}_W S$$

p. 109
[page 177]

qui contient l'une des trois sous-catégories

$$\underline{\mathrm{Fib}}_{0,W} S,\ \underline{\mathrm{Parf}}_\omega S,\ \underline{\mathrm{Prop}}_{0,W} S,$$

l'inclusion de $\mathcal{F}$ dans $\underline{\mathrm{Fib}}_W S$ définit des équivalences

$$\mathcal{F}(W_S)^{-1} \approx \mathrm{HOT}_W^{\mathrm{lc!}}(S),$$

et si $\mathcal{F}$ contient l'une des deux sous-catégories $\underline{\mathrm{Fib}}_{0,W} S$, $\underline{\mathrm{Prop}}_{0,W} S$ (à l'exclusion de $\underline{\mathrm{Parf}}_\omega S$), on trouve aussi

$$\mathcal{F}(W_S^{\mathrm{f}})^{-1} \approx \mathrm{HOT}_W^{\mathrm{lc}}(S).$$

Le rez-de-chaussée contribue deux autres variantes de HOT, en localisant soit par W_S^{d} (aile gauche), soit par W_S^{g} (aile droite). Les foncteurs d'inclusion définissent des équivalences pour les localisées soit pour W_S^{d} (aile gauche), soit pour W_S^{g} (aile droite). Le plus joli (symétrie) semble de définir ces deux localisés par Cat/S

$$\mathrm{HOT}_W(S) = (\mathrm{Cat}/S)(W_S^{\mathrm{d}})^{-1}, \qquad \mathrm{HOT}_W^{\mathrm{o}}(S) = (\mathrm{Cat}/S)(W_S^{\mathrm{g}})^{-1}.$$


86. cf. plus bas, ce qu'on peut dire pour les localisés pour W_S^{f}.

Les quasi-inverses pour les équivalences de catégories localisées, induites par les foncteurs d'inclusion, sont donnés soit par Φ (aile gauche), soit par Ψ (aile droite).


Mais Φ et Ψ fournissent des quasi-inverses également quand on localise pour W_S, la W-équivalence grossière au lieu de la fine - pareil qu'à l'étage. On trouve donc au rez-de-chaussée un (unique) troisième localisé, qu'on peut décrire plus joliment par

$$(\mathrm{Cat}/S)(W_S)^{-1},$$

mais il est équivalent à $(\underline{\mathrm{Fib}}_W S)W_S^{-1}$ par le foncteur induit par l'inclusion. (Un quasi- [page 178]
inverse étant fourni par C.) C'est donc $\mathrm{HOT}_W^{\mathrm{lc}!}(S)$. On trouve ainsi, par le diagramme commutatif de catégories avec localiseurs



(où la flèche verticale courte induit une équivalence sur les localisés), le diagramme p. 110
commutatif entre les catégories HOT_W liées à S :



$(*)$

où ρ, σ, λ sont des foncteurs de localisation, et où i, j sont ressentis comme des foncteurs d'inclusion. Ce diagramme $(*)$ semble épuiser les foncteurs naturels qui relient entre elles les quatre catégories envisagées.

Les propriétés des foncteurs Φ, Ψ, C qui ont été utilisées, pour fournir tous les quasi- [page 179]
inverses voulus de foncteurs (entre catégories localisées) induits par les foncteurs d'inclusion du diagramme, sont les suivantes.

ⓐ On a un homomorphisme fonctoriel dans Cat/S

$$X \xrightarrow{i_X} \Phi(X), \qquad \underline{i_X \in W_S^{\mathrm{d}}}.$$

Quand X est dans $\underline{\mathrm{Fib}}_W S$, $\Phi(X)$ est dans $\underline{\mathrm{Fibsc}}_0 S$ [plutôt $\underline{\mathrm{Fibsc}}_{0,W} S$, cf. diag. p. 175], donc $i_X \in W_S^{\mathrm{f}}$ $(= W_S^{\mathrm{d}}$ sur $\underline{\mathrm{Fib}}_W S)$. Ainsi Φ induit le foncteur Φ_0 du diagramme.

Dualement, on a

$$X \xrightarrow{i_X} \Psi(X), \qquad \underline{i_X \in W_S^{\mathrm{g}}},$$

et quand X est dans $\underline{\mathrm{Fib}}_W S$, $\Psi(X)$ est dans $\underline{\mathrm{Cofibsc}}_0 S$ [plutôt $\underline{\mathrm{Cofibsc}}_{0,W} S$], d'où le foncteur Ψ_0.

ⓑ On a un homomorphisme fonctoriel

$$\left|\begin{array}{l} X \xrightarrow{i_X} C(X), \qquad \underline{i_X \in W_S} \\ \text{et } C(X) \in \mathrm{Ob}\,\underline{\mathrm{Parf}}_\omega S. \end{array}\right.$$

||| Mais on fera attention qu'en l'absence de l'axiome W(4b) sur W, on ne peut *pas* affirmer $i_X \in W_S^{\mathrm{f}}$, même si X est dans $\underline{\mathrm{Fib}}_W S$ (voire, dans $\underline{\mathrm{Parf}}_\omega S$), seul cas (de toutes façons) où on est en droit de s'y attendre. Je note à ce propos le diagramme *cartésien,* pour $f : X \longrightarrow Y$ dans Cat/S p. 111

$$\begin{array}{ccc} C(Y)_s & \xleftarrow{C(f)_s} & C(X)_s \\ {\scriptstyle \pi^s_Y}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi^s_X} \\ Y & \xleftarrow{\quad f \quad} & X, \end{array} \qquad \text{flèches verticales dans } \underline{\mathrm{Parf}}_\omega \subseteq \underline{\mathrm{Fib}}_W$$

qui montre par exemple que l'on ne peut pas s'attendre que $f \in W_S \implies C(f) \in W_S^{\mathrm{f}}$ sans disposer de l'axiome W(4a′) `[qu'est-ce que c'est?]` (ou d'un axiome de force comparable, tel W(4b)). [page 180]

Ce sont ces faits négatifs (en l'absence de W(4b)) qui sont cause que je ne peux rien dire de particulier sur les foncteurs induits par *localisation fine* $(W_S^{\mathrm{f}})^{-1}$ des deux foncteurs d'inclusion

$$\underline{\mathrm{Liss}}_0 S \longleftarrow \underline{\mathrm{Parf}}_\omega S \longrightarrow \underline{\mathrm{Prop}}_0 S,$$

ou, ce qui revient au même, de celui induit par le composé commun de ceux-là avec les inclusions dans $\underline{\mathrm{Fib}}_W S$

$$\begin{array}{ccccc} & & \underline{\mathrm{Parf}}_\omega S & & \\ & \swarrow & \downarrow & \searrow & \\ \underline{\mathrm{Liss}}_0 S & & & & \underline{\mathrm{Prop}}_0 S \\ & \searrow & \downarrow & \swarrow & \\ & & \underline{\mathrm{Fib}}_W S, & & \end{array}$$

en d'autres termes, je ne peux rien dire sur les propriétés de fidélité du foncteur

$$(\underline{\mathrm{Parf}}_\omega S)(W_S^{\mathrm{f}})^{-1} \longrightarrow (\underline{\mathrm{Fib}}_W S)(W_S^{\mathrm{f}})^{-1},$$

et encore moins que ce soit une équivalence de catégories. Donc, en l'absence de W(4b), pour les sous-catégories pleines $\mathcal{F}$ de $\underline{\mathrm{Fib}}_W S$ qui contiennent $\underline{\mathrm{Parf}}_\omega S$, sans contenir ni $\underline{\mathrm{Liss}}_0 S$ ni $\underline{\mathrm{Prop}}_0 S$, il se pourrait a priori que les localisées

$$\mathcal{F}(W_S^{\mathrm{f}})^{-1}$$

soient toutes différentes. Je pense notamment à $\underline{\mathrm{Parf}}_W S$, aussi intéressante en elle-même, après tout, que $\underline{\mathrm{Parf}}_\omega S$. Donc en plus des quatre localisées du diagramme (∗), p. 178, il y a toute une série infinie 'tératologique' de localisées qui refusent de se laisser 'boucler' `[?]` par Φ_0 ou Ψ_0, et pour lesquelles même C n'est d'aucun secours, faute de l'axime W(4b). [page 181]

④ Cas où l'axiome W(4b) est satisfait.

Alors les perplexités que je viens de dire disparaissent. On a aussitôt, en vertu de W(4b) : p. 112

||| Si $X \in \mathrm{Ob}\,\underline{\mathrm{Fib}}_W S$, alors $i_X : X \longrightarrow C(X)$ est dans W_S^{f}
(*en supposant l'axiome* W(4b))

et C fournit des quasi-inverses pour les foncteurs 'd'inclusion' entre localisés fins (pour W_S^{f}) envisagés à la page précédente. Il en fournit `['Il en fournit' barré]` un également pour le foncteur λ envisagé plus haut ((∗) page 178)

$$\underbrace{(\underline{\mathrm{Fib}}_W S)(W_S^{\mathrm{f}})^{-1}}_{\overset{\text{déf}}{=}\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S)} \longrightarrow \underbrace{(\mathrm{Cat}/S)(W_S)^{-1}}_{\simeq\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}\,!}_W(S)},$$

lequel est donc une équivalence. Une autre façon, plus évidente, de dire la même chose, c'est que sur chacune des catégories de l'étage les deux localiseurs W_S^{f} et W_S sont désormais identiques (puisqu'elles sont toutes contenues dans $\underline{\mathrm{Fib}}_W S$, où elles `[plutôt ils]` le sont justement par l'axiome W(4b)), donc le foncteur λ entre ces deux localisés (définition originale de λ, dans le cas $\mathcal{F} = \underline{\mathrm{Fib}}_W S$, cf. page 176) est même le *foncteur identique,* les deux catégories localisées étant *égales :*

$$\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S) = \mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}\,!}_W(S) \qquad !$$

Ainsi le diagramme (∗) p. 178 prend la forme

$$\begin{array}{ccccc} & & \mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S) & & \\ & \overset{\rho}{\nearrow}\!\!\underset{i}{\swarrow} & & \overset{\sigma}{\nwarrow}\!\!\underset{j}{\searrow} & \\ \mathrm{HOT}_W(S) & & & & \mathrm{HOT}^{o}_W(S). \end{array} \qquad (*)$$

Quand on interprète non seulement les deux catégories latérales $\mathrm{HOT}_W(S)$, $\mathrm{HOT}^o_W(S)$, mais aussi celle du milieu, comme des localisées de Cat/S, pour les localiseurs W_S^{d}, W_S^{g} et W_S respectivement, les foncteurs ρ, σ sont ceux déduits des deux inclusions [page 182]

$$\begin{array}{ccc} W_S^{\mathrm{d}} & & W_S^{\mathrm{g}} \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & W_S & \end{array} \qquad \text{comme parties de } \mathrm{Fl}(\mathrm{Cat}/S),$$

tandis que les foncteurs i, j sont déduits, par passage aux localisés, d'un seul et même foncteur

$$\mathrm{Cat}/S \xrightarrow{C} \mathrm{Cat}/S,$$

ce foncteur ayant la vertu d'appliquer W_S dans $W_S^{\mathrm{d}} \cap W_S^{\mathrm{g}}$,

$$f \in W_S \overset{\text{moyennant W(4b)}}{\Longrightarrow} C(f) \in W_S^{\mathrm{d}} \cap W_S^{\mathrm{g}} \qquad (\text{et même } \in W_S^{\mathrm{univ}}).$$

(Et pour cause, puisque C se factorise par $\underline{\mathrm{Fib}}_W S$ (et même par $\underline{\mathrm{Parf}}_\omega S$), où W_S est identique à W_S^{d}, W_S^{g}, W_S^{univ}. Que $f \in W_S$ implique $C(f) \in W$ est indépendant de l'axiome W(4b), et se voit sur le diagramme p. 113

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad f \quad} & Y \\ {\scriptstyle i_X}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i_Y} \\ C(X) & \xrightarrow{C(f)} & C(Y), \end{array}$$

où les flèches i_X, i_Y sont dans W_S.)

Ceci dit, il est vrai que les couples

$$(\rho, i),\ (\sigma, j)$$ [page 183]

sont des couples de foncteurs adjoints, donc (ρ et σ étant des foncteurs de localisation) que i et j sont *pleinement fidèles.* La formule d'adjonction peut se lire comme

$$\boxed{\mathrm{Hom}_{W_S^{\mathrm{g}}}(X, CY) \simeq \mathrm{Hom}_{W_S^{\mathrm{d}}}(X, CY) \simeq \mathrm{Hom}_{W_S}(X, Y)} \qquad (*)$$

pour X, Y dans Cat/S sans plus. Un Hom_Σ indique le Hom dans $(\mathrm{Cat}/S)\Sigma^{-1}$.
Corollaire. *Si X dans Cat/S, Y dans $\underline{\mathrm{Fib}}_W S$, alors*

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_{W_S^{\mathrm{g}}}(X,Y) & & \mathrm{Hom}_{W_S^{\mathrm{d}}}(X,Y) \\ & \searrow^{\sim} \quad \swarrow_{\sim} & \\ & \mathrm{Hom}_{W_S}(X,Y) & \end{array}$$

sont bijectifs.

En effet, Y dans $\underline{\mathrm{Fib}}_W(S)$ implique que $Y \xrightarrow{i_Y} C(Y)$ est dans $W_S^{\mathrm{univ}} \subseteq W_S^{\mathrm{d}} \cap W_S^{\mathrm{g}}$, donc

$$\mathrm{Hom}_{W_S^{\mathrm{g}}}(X,Y) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{W_S^{\mathrm{g}}}(X,CY) \underbrace{\xrightarrow{\sim}}_{\text{adjonction}} \mathrm{Hom}_{W_S}(X,Y),$$

et itou pour $\mathrm{Hom}_{W_S^{\mathrm{d}}}(X,Y)$.

⑤ Perplexités sur les variantes affaiblies de l'axiome W(4b).

Que reste-t-il de toutes ces belles choses (plus que trois catégories HOT, au lieu de $4+\infty$!) quand on ne suppose plus que W(4b′) au lieu de W(4b), i.e. l'égalité de W_S et W_S^{f} dans

$\underline{\mathrm{Parf}}_\omega S$? Finalement, il me semble (contrairement à ce que j'avais cru voir) qu'il ne reste presque rien ([87]). On ne sait alors toujours pas, pour X dans $\underline{\mathrm{Fib}}_W S$, si p. 114

$$i_X : X \longrightarrow C(X)$$

n'est dans W_S^{f}, et non seulement dans W_S ; on ne le sait que pour $X \in \underline{\mathrm{Parf}}_\omega S$, mais dans ce cas on n'en a pas besoin, car l'utilité du foncteur $C(X)$ et de l'inclusion $i_X : X \longrightarrow C(X)$, c'est 'd'améliorer' X et de le rendre parfait, voire même W-parfait. Mais s'il l'est déjà, c'est plus la peine. Il y aura, comme avant, 4 localisées essentiellement distinctes HOT_W, HOT_W^o, $\mathrm{HOT}_W^{\mathrm{lc}}$, $\mathrm{HOT}_W^{\mathrm{lc}!}$, plus une infinité d'autres $\mathcal{F}(W_S^{\mathrm{f}})^{-1}$ pour $\mathcal{F}$ entre $\underline{\mathrm{Parf}}_\omega S$ et $\underline{\mathrm{Fib}}_W S$ (cf. page 180), avec le seul bénéfice qu'on peut maintenant exclure le cas $\mathcal{F} = \underline{\mathrm{Parf}}_\omega S$, car dans ce cas $\mathcal{F}(W_S^{\mathrm{f}})^{-1} = \mathcal{F}(W_S)^{-1} = \mathrm{HOT}_W^{\mathrm{lc}!}(S)$ fait partie des quatre canoniques. La chose décisive, c'est qu'on n'a toujours aucun moyen de prouver que [page 184]

$$\lambda : \mathrm{HOT}_W^{\mathrm{lc}}(S) \longrightarrow \mathrm{HOT}_W^{\mathrm{lc}!}(S)$$

est une équivalence, et je doute que ce soit le cas. Il faudrait regarder avec $W = W_{\mathbf{D}}$ la $\mathbf{D}$-équivalence, où $\mathbf{D}$ est un dérivateur $\mathrm{Der}(k\text{-Mod})$, k un anneau donné (p.ex. $k = \mathbf{Z}$, ou k un corps $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ ou $\mathbf{Q}$ …). Je ne vais pas le faire maintenant cependant. (Il est vrai que l'axiome W(4b′) n'est pas non plus satisfait dans ce cas …)

Si dans l'énoncé de l'axiome, on remplaçait $\underline{\mathrm{Parf}}_\omega S$ par $\underline{\mathrm{Parf}}_W S$, rien d'essentiel ne serait changé - tout au plus je remplacerais $\underline{\mathrm{Parf}}_\omega S$ par $\underline{\mathrm{Parf}}_W S$ dans le brillant diagramme p. 175. Finalement, je suis à présent convaincu qu'il faut tout ou rien : ou bien

87. **NB** Si W satisfait l'axiome des limites, alors W(4b′) implique W(4b), cf. théorème récapitulatif dans XVI 4.4.13 (p. 58-62), notamment 2°). La condition W(4b) est la condition B de cet énoncé, et W(4b′) la condition D. (Elle est impliquée par W(4a) = C, ce que je soupçonnais nullement en écrivant XII …)

quatre catégories $\mathrm{HOT}(S)$ pour W, en se contentant de $\mathrm{W}(1,2,3)$, ou bien rien que trois, i.e. pas de $\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}!}_W(S)$ - et pour ça, il ne semble pas qu'on puisse se contenter de moins de W(4b).

Il suffirait, il est vrai, de supposer que $W_S = W_S^{\mathrm{f}}$ sur l'une quelconque des sept catégories de l'étage autres que $\underline{\mathrm{Parf}}_\omega S$. Cela impliquerait alors que dans les six autres, on aura $\overline{W_S} = \overline{W_S^{\mathrm{f}}}$ (mêmes saturés forts dans $\mathrm{Fl}(\mathcal{F})$). Un des deux les plus faibles des axiomes en question serait : [page 185]


> Si $f : X \longrightarrow Y$ est un foncteur *cartésien* de catégories Cat-fibrées et W-fibrées ([88]) sur une autre S, si $f \in W$, alors $f_s \in W$ pour tout $s \in S$,

(et l'autre est la version duale, pour les foncteurs cocartésiens de catégories cofibrées). Sauf erreur, cet axiome doit déjà impliquer que $\overline{W}$ satisfait la version W(4a) la plus forte de toutes (a fortiori W(4b)) des axiomes W(4). Cet axiome me paraît donc à présent beaucoup plus raisonnable que W(4b′), et ceci d'autant plus qu'il se réfère directemment à la description de $\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S)$ en termes de foncteurs (ou de 'pseudofoncteurs', si on ne veut supposer les catégories scindées et les foncteurs compatibles aux scindages) $S^o \longrightarrow \mathrm{Cat}$. D'ailleurs, bien qu'il n'en ait pas l'air, cet axiome *est* autodual, puisque la version duale, pour S fixée, est la version directe pour S^o ! Cela rend cet axiome encore plus appétissant. Donc pour formuler W(4a′), j'ai envie à présent de laisser tomber $\underline{\mathrm{Parf}}_\omega$, et de faire pareil. Si on garde deux versions W(4a′) (l'ancienne) et W(4a″) (la nouvelle), l'une et l'autre ont la vertu d'impliquer W(4b). Et W(4b′) (nouvelle version) doit impliquer W(4a) (version ultraforte), sinon pour W, du moins pour $\overline{W}$. p. 115

Mes idées étaient tenacement [?] embrouillées jusqu'à aujourd'hui même, car j'avais l'idée que, grâce au mirifique foncteur C, la catégorie $\underline{\mathrm{Parf}}_\omega S$, comme les sept autres catégories de l'étage, pourrait servir à définir $\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S)$. Or il n'en est rien, semble-t-il, à moins de supposeer l'axiome W(4b), ou la variante W(4b′) (nouvelle version). L'ancienne version de W(4b′) s'avère parfaitement inutilisable. [page 186]

À ce propos, je n'ai toujours pas répondu clairement pourtant, pas un 'oui' ou un 'non', à la question :

Question : *les inclusions*



induisent-elles, même en l'absence de W(4b) (ou de ses variantes affaiblies) des équivalences pour les localisées fines (par W_S^{f}) ? Même question pour $\underline{\mathrm{Parf}}_\omega S$ au lieu de $\underline{\mathrm{Parf}}_W S$ ([89]). Même question pour

$$\underline{\mathrm{Bifib}}\, S \subseteq \underline{\mathrm{Parf}}_\omega S,$$

la catégorie des catégories sur S qui sont à la fois Cat*-fibrées et* Cat*-cofibrées.*

88. 'W-fibrées' signifiant ici que pour $u \in \mathrm{Fl}\, S$, les foncteurs u^* de changement de base $X_{s'} \longrightarrow X_s$, $Y_{s'} \longrightarrow Y_s$ sont dans W.

89. OK en présence de l'axiome W(6bis) sur les $\varinjlim$, cf. p. 192 ff.

Je ne me rends pas compte, même en admettant (cette fois) l'axiome W(4a), si $\underline{\mathrm{Bifib}}\, S$ est assez grosse pour pouvoir décrire tous le types d'homotopie relatifs localement constants sur S, i.e. si

$$(\underline{\mathrm{Bifib}}\, S)(W_S^{\mathrm{f}})^{-1} \longrightarrow (\underline{\mathrm{Fib}}_W S)(W_S^{\mathrm{f}})^{-1}$$

est au moins essentiellement surjectif, sinon une équivalence de catégories. Il manque un foncteur

$$\mathrm{Cat}/S \longrightarrow \underline{\mathrm{Bifib}}\, S \qquad \text{ou du moins} \qquad \underbrace{\underline{\mathrm{Fib}}_W S}_{\text{ou } \underline{\mathrm{Fib}}_\omega S\ ?} \longrightarrow \underline{\mathrm{Bifib}}\, S,$$

qui puisse jouer le rôle de Φ et de Ψ *simultanément.* Je n'ai pas même vérifié que Φ ne transforme *pas* objets de $\underline{\mathrm{Prop}}_W S$ ou de $\underline{\mathrm{Prop}}_{0,W}(S)$ en objets W-propres (donc W-parfaits, étant de toutes façons W-lisse et même W_ω-lisse) sur S ([90]). Si c'était pourtant vrai sur $\underline{\mathrm{Prop}}_W S$, ça montrerait que l'image essentielle de $\underline{\mathrm{Prop}}_W S$ dans $\mathrm{HOT}_W(S)$ ($= (\mathrm{Cat}/S)(W_S^{\mathrm{d}})^{-1}$) est contenu dans $\mathrm{HOT}_W^{\mathrm{lc}}(S)$. Prenant $S = \mathbf{\Delta}^1$, cela signifierait que si dans X on a une sous-catégorie fermée X_1 telle que $X_1 \overset{i}{\hookrightarrow} X$ soit W_ω-asphérique, alors $1\backslash X \longrightarrow 0\backslash X$ est dans W - or $0\backslash X \simeq X$, $1\backslash X \simeq X_1$, la flèche est $X_1 \longrightarrow X$, qui est bien dans W étant W-asphérique ! C'est étrange et quasiment immoral ([91]). Mais à force de gribouillis je viens de me convaincre que même si X est cofibrée sur S (donc aussi W-propre), $\Phi(X)$ n'est pas W-propre (ce qui impliquerait W-parfait), ni même un W-fibré, ce qui signifierait que

$$s'\backslash X \longrightarrow s\backslash X \qquad \text{associé à } s \longrightarrow s' \text{ dans } S$$

serait toujours dans W. Posant $Z' = s'\backslash S$, $Z = s\backslash S$, cela signifierait que si on a un *co-isomorphisme local*

$$i : \underbrace{Z'}_{\simeq z_0\backslash Z} \longrightarrow Z,$$

où Z', Z ont des éléments initiaux, et si X est cofibrée sur Z, X' son image inverse sur Z', alors $X' \longrightarrow X$ est dans W. En fait, si Z a aussi un élément *final* e (comme c'était le cas tantôt pour $\mathbf{\Delta}^1$), alors $Z' \simeq z_0\backslash Z$ en a aussi en e', qui s'envoie sur e, et on aura le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{\ j\ } & X \\ {\scriptstyle W}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle W} \\ X'_{e'} & \xrightarrow{\ \sim\ } & X_e, \end{array}$$


d'où $j \in W$. Donc pour faire un contrexemple, il faut prendre Z sans élément final.

Mais prenons Z [un] ensemble ordonné, avec un objet initial 0, mais sans objet final, et prenons pour z_0 un élément *maximal* de Z, de sorte que $Z' = z_0\backslash Z$ soit isomorphe à $\{z_0\}$. Il faut donner dans Cat un exemple où l'inclusion de X_{z_0} dans X n'est pas dans W. On va prendre

$$Z = \quad \begin{array}{ccc} & & a \\ & \nearrow & \\ 0 & & \\ & \searrow & \\ & & b = z_0, \end{array}$$

90. Voir réponse à cette intéressante question page 192.
91. On observe plus bas que c'est ainsi chaque fois que S a un objet final.

donc la donnée de X cofibrée coscindée sur Z équivaut à un diagramme dans Cat



Je pense que sous des conditions assez fortes (p.ex. si α, β sont des immersions ouvertes, ou des immersions fermées - à vérifier !), la catégorie X est isomorphe dans Hot à la somme amalgamée dans Cat

$$X_a \coprod_{X_0} X_b,$$

et il n'y [a] aucune raison (sauf si on suppose $\alpha \in W$, et encore ...) que $X_b \longrightarrow X_a \coprod_{X_0} X_b$ soit dans W. Prenons $X_0 = X_b = e$, $\beta = \mathrm{id}_e$, donc α est donné par la donnée d'un élément t de $\mathrm{Ob}(X_a = T)$. La somme amalgamée est T, qui n'est pas isomorphe à e dans Hot_W, si T n'a pas été prise W-asphérique. Mais je vais essayer de montrer directement que [page 190] l'inclusion

$$T = X_a \longrightarrow X$$


est $\in W$. Pour ceci je regarde la sous-catégorie ouverte Z'' de Z, complémentaire de la sous-catégorie pleine fermée Z', et je note que $X'' = X|Z''$ étant propre sur Z'' et a étant objet final de Z'', on a

$$X_a \longrightarrow X'' \qquad \text{dans } W,$$

il reste à voir qu'il en est de même de $X'' \longrightarrow X$. Or X'' est déduite de X en ajoutant un unique élément ξ (celui de X_b), lequel ne s'envoie dans aucun élément de X'', et qui ne reçoit aucun élément de X_a - par contre pour l'unique élément ξ_0 de X_0 il y a une unique flèche de celui-ci dans ξ. On a donc une rétraction de X sur X'', envoyant ξ sur ξ_0 et la flèche précédente sur id_{ξ_0}. Est-ce un homotopisme ? Il suffit de [montrer] qu'en tant qu'endomorphisme φ de X, c'est $\sim \mathrm{id}_X$. Or on a bien $\mathrm{id}_X \longleftarrow \varphi$, dont la valeur sur X'' est l'identité, et la valeur sur ξ est l'unique $\varphi(\xi) = \xi_0 \longrightarrow \xi$. C'est un peu bref, mais ça doit être vrai. (De toutes façons, X est la réunion de deux ouverts X'', et de l'ouvert $X|\{0, b\} = X'''$, avec $X''' \simeq \mathbf{\Delta}^1$, et $X'' \cap X''' \simeq e$, donc au moins pour la cohomologie à coefficients localement constants de X je suis à l'aise par Mayer-Vietoris, et sais bien que c'est celle du morceau X'', donc celle de X_0 [ou X_a, indice illisible] nullement celle de e !)


On a donc vu au moins ceci : Si X est cofibrée donc W-propre sur S, il ne s'ensuit nullement que $\Phi(X)$ soit encore W-propre sur S ([92]), ni que ce soit un W-fibré. Mais que se passe-t-il si $X \in \underline{\mathrm{Prop}}_{0,W} S$, par exemple s'il provient de $\underline{\mathrm{Cofibsc}}_0 S$? Alors X est dans $\underline{\mathrm{Fib}}_W S$, donc on sait déjà que $\Phi(X)$ est dans $\underline{\mathrm{Fibsc}}_{0,W} S$, donc ce n'est pas par là qu'on fera un contrexemple. Mais considérons encore X cofibrée sur

p. 118
[page 191]
‖




92. voir résultat plus précis page suivante !

donnée par le diagramme



dans Cat, en supposant cette fois $u, v \in W$ ($X \in \underline{\mathrm{Cofibsc}}_{0,W}S$). Alors $\Phi(X)$ est la catégorie fibrée scindée sur S définie par le diagramme contravariant sur S



où i, j sont les inclusions (qui sont des immersions fermées). Dire que $\mathcal{X} = \Phi(X)$ est propre sur S signifie aussi que ses restrictions au dessus des sous-catégories ouvertes $\{0, a\}$ et $\{0, b\}$ de S le sont (car toute flèche $\mathbf{\Delta}^1 \longrightarrow S$ se factorise par l'une ou l'autre). Cela signifie donc aussi que l'inclusion des fibres fermées [page 192]

$$X_a \longrightarrow X, \qquad X_b \longrightarrow X$$

sont coasphériques. Mais $X_a \longrightarrow X$ ne peut être coasphérique que si $X_b = \emptyset$, car pour $x \in X_b \subseteq X$, $x\backslash X_a$ (ainsi que X_a/x) est vide, donc *pas* W-asphérique (si on ne suppose $W = \mathrm{Fl}(\mathrm{Cat})$, cas que nous excluons). Donc $\Phi(X)$ n'est propre sur S *que* si X_a et $X_b = \emptyset$ (résultat valable pour *toute* X sur S, qu'elle soit cofibrée sur S ou W-propre, ou non). Si on veut $u, v \in W$, cela implique donc que $X_0 = \emptyset$, donc on a prouvé :

||| Soit $X \in \mathrm{Cat}/S$, $S = \begin{array}{ccc} & \nearrow & a \\ 0 & & \\ & \searrow & b \end{array}$. Si $\Phi(X)$ est propre sur S, alors $X = \emptyset$ (si on suppose $W \neq \mathrm{Fl}(\mathrm{Cat})$). p. 119

Mais chemin faisant est apparue une idée bizarre. Considérons le diagramme infini, pour X dans Cat/S :

$$X \longrightarrow \Phi(X) \longrightarrow \Psi\Phi(X) \longrightarrow \Phi\Psi\Phi(X) \longrightarrow \cdots$$

Si X est quelconque, ces flèches sont alternativement dans W_S^{d} et W_S^{g}, donc leurs composées sont dans W_S sans plus. Mais si X est dans $\underline{\mathrm{Fib}}_W S$, comme cette catégorie est *stable* par Φ, Ψ, et que sur $\underline{\mathrm{Fib}}_W S$ $W_S^{\mathrm{d}} = W_S^{\mathrm{g}} = W_S^{\mathrm{f}} = W_S^{\mathrm{univ}}$, on voit que dans ce cas les flèches sont toutes dans W_S^{f}. On a envie maintenant de poser

$$\Phi_\infty(X) = \varinjlim \text{ de tout ça}$$

et on définirait symétriquement

$$\Psi_\infty(X) = \varinjlim(X \longrightarrow \Psi(X) \longrightarrow \Phi\Psi(X) \longrightarrow \cdots). \qquad \text{[page 193]}$$

Pour que ce soit utilisable, il faut poser l'axiome W(6 bis) (comparer XII, pages 14, 15). La limite inductive d'une suite de morphismes $f_i : X_i \longrightarrow Y_i$, pour un morphisme de systèmes inductifs dans Cat indexés par $\mathbf{N}$, est dans W si les f_i le sont.

Cet axiome est voisin de W(6) de loc. cit., mais n'est impliqué par lui que moyennant W(4b). Il est plus fort dans le cas de systèmes inductifs indexés par **N** (donc aussi, plus généralement, de systèmes inductifs sur des ensembles ordonnés filtrants ayant un ensemble cofinal dénombrable), mais ne dit rien sur les systèmes inductifs sur des ensembles ordonnés d'indices plus généraux.

Cet axiome implique aussi qu'une limite inductive filtrante de morphismes f_i est W-lisse, resp. W-propre, si les f_i le sont. On trouve alors que $\Phi_\infty(X)$ est à la fois W-lisse (comme limite inductive des $\Phi(X)$, $\Phi\Psi\Phi(X)$, …, $\Phi(\Psi\Phi)^n(X)$, lesquelles sont W-lisses sur S) et W-propre (comme limite inductive des $\Psi\Phi(X)$, …, $(\Psi\Phi)^n(X)$ …). D'autre part, que $X \longrightarrow \Phi_\infty(X)$ est dans W_S^{f} - car W_S^{f} est stable par limites inductives filtrantes dénombrables dans Cat/S. On a donc trouvé un foncteur [page 194]

$$\Phi_\infty : \underline{\mathrm{Fib}}_W S \longrightarrow \underline{\mathrm{Parf}}_W S \subseteq \underline{\mathrm{Fib}}_W S$$

et un morphisme fonctoriel

$$i_X : X \longrightarrow \Phi_\infty(X), \qquad \boxed{i_X \in W_S^{\mathrm{f}}} \qquad \text{si } X \in \underline{\mathrm{Fib}}_W S.$$

Ce foncteur permet alors, en l'absence de W(4b), de faire ce que le foncteur C refusait absolument. Il est vrai que C a l'avantage d'être défini sur Cat/S tout entier, et d'y être raisonnable et même fort utile, quand on a W(4b). Mais Φ_∞ est, lui aussi, défini sur Cat/S tout entier, ainsi que i_X p. 120

$$\Phi_\infty : \mathrm{Cat}/S \longrightarrow \underline{\mathrm{Parf}}_W S$$
$$i : \mathrm{id} \longrightarrow \Phi_\infty \qquad \text{i.e.} \begin{cases} i_X : X \longrightarrow \Phi_\infty(X) \\ i_X \in W_S, \end{cases}$$

avec le seul handicap (inévitable) que si X n'est pas dans $\underline{\mathrm{Fib}}_W S$, on ne peut dire mieux que $i_X \in W_S$, à l'exclusion de $i_X \in W_S^{\mathrm{f}}$. Mais pour $C(X)$ c'était forcément pareil. Donc on a l'impression que Φ_∞, au choix, Ψ_∞, bonnet blanc, blanc bonnet, joue en présence de W(6 bis) le même rôle que C en présence de W(4b). Tout au plus (en présence des deux axiomes à la fois) le foncteur C a-t-il l'avantage esthétique de prendre ses valeurs dans $\underline{\mathrm{Parf}}_\omega S$, au lieu de $\underline{\mathrm{Parf}}_W S$ seulement ([93]). Mais il s'impose de se rendre compte à présent que Φ_∞ a un avantage exactement du même ordre sur C, en introduisant [page 195]

$$W''_\omega = \text{plus petite partie } \Sigma \text{ de } \mathrm{Fl}(\mathrm{Cat}) \text{ satisfaisant } \mathrm{W}(1, 2 \text{ bis}, 3, 6 \text{ bis})$$

et noter que

$$\Phi_\infty(X) \in \mathrm{Ob}\, \underline{\mathrm{Parf}}_{W''_\omega} S, \qquad i_x \in W''_\omega$$

- mais là je m'aperçois qu'on a

$$W_\omega \subseteq W''_\omega,$$

donc C est quand même un peu meilleur à cet égard …

Quand on dispose de Φ_∞ avec les propriétés qu'on vient d'expliciter, on trouve que l'inclusion

$$\underline{\mathrm{Parf}}_W S \longrightarrow \underline{\mathrm{Fib}}_W(S)$$

induit une équivalence non seulement pour les localisés pour W_S, mais aussi pour les localisés fins

$$(\underline{\mathrm{Parf}}_W S)(W_S^{\mathrm{f}})^{-1} \longrightarrow (\underline{\mathrm{Fib}}_W(S))(W_S^{\mathrm{f}})^{-1} \overset{\text{déf}}{=} \mathrm{HOT}_W^{\mathrm{lc}}(S)$$

93. *En fait* $\Phi_\infty = C$, si C est défini via des chemins infinis d'un seul côté simplement. Si on définit C via les chemins *finis* de tous types c, alors il prend en effet ses valeurs dans $\underline{\mathrm{Parf}}_\omega S$.

([94]). Mais on ne peut pour autant réduire le nombre des localisés utiles à trois, en l'absence de W(4b). Tout au plus, ayant un foncteur Φ_∞ qui est plus simple que C, en l'absence de W(4b), du fait qu'on sait de toutes façons que

$$i_X : X \longrightarrow \Phi_\infty(X)$$

est dans W_S^{f} si X est dans $\underline{\mathrm{Fib}}_W S$, peut on espérer s'en tirer avec la variante affaiblie de W(4b) obtenue en se bornant dans l'énoncé de W(4b) (p. 171) au cas où X, Y sont dans $\underline{\mathrm{Parf}}_{W''_\omega} S$. Cette fois, ça suffit en effet à impliquer que le foncteur

p. 121
[page 196]

$$\lambda : (\underline{\mathrm{Fib}}_W S)(W_S^{\mathrm{f}})^{-1} \longrightarrow (\underline{\mathrm{Fib}}_W S)(W_S)^{-1}$$

est une équivalence de catégories, puisque on peut le 'calculer' aussi bien en utilisant $\underline{\mathrm{Parf}}_{W''_\omega} S$ au lieu de $\underline{\mathrm{Fib}}_W S$, or l'hypothèse W(4b(W$''_\omega$)) implique que sur $\underline{\mathrm{Parf}}_{W''_\omega} S$ les deux localiseurs W_S^{f}, W_S sont *égaux.*

Il faut une conclusion pratique utilisable de toutes ces perplexités et observations. Essayons

Proposition. *Supposons que l'on soit sous l'une des conditions suivantes.*

1°) *L'axiome* W(4b) *est satisfait dans le cas de catégories X, Y qui sont dans* $\underline{\mathrm{Fibsc}}_{0,W} S$ ([95]) *(cette condition sur W est en fait autoduale).*

2°) *L'axiome* W(4b) *est satisfait dans le cas de catégories X, Y qui sont dans* $\underline{\mathrm{Parf}}_{W''_\omega} S$*, où W''_ω est le plus petit ensemble $\Sigma \subseteq Fl(\mathrm{Cat})$ satisfaisant les conditions* W$(1, 2\text{ bis}, 3, 6\text{ bis})$. *(On peut aussi se contenter de la condition, plus forte mais plus compréhensible, que* W(4b) *est OK si X, Y sont dans* $\underline{\mathrm{Parf}}_W S$ ([96])*.) De plus, on suppose que W satisfait* W(6 bis).

Sous ces conditions, le foncteur correspondant [?] λ

$$\mathrm{HOT}_W^{\mathrm{lc}}(S) \longrightarrow \mathrm{HOT}_W^{\mathrm{lc!}}(S)$$

est une équivalence de catégories (cf. diagramme p. 178), donc (ρ, i), (σ, j) peuvent être regardés comme des couples de foncteurs entre deux catégories (cf. $(*)$ p. 181). Ce sont des couples de foncteurs adjoints, *donc i, j sont pleinement fidèles, et on a la formule d'adjonction $(*)$, page 182.*

Pour prouver l'adjonction de (ρ, i) (ou dualement de (σ, j)), on exprime encore les deux catégories en présence $\mathrm{HOT}_W(S)$, $\mathrm{HOT}_W^{\mathrm{lc}}(S)$ comme $(\mathrm{Cat}/S)(W_S^{\mathrm{d}})^{-1}$, $(\mathrm{Cat}/S)(W_S)^{-1}$, le foncteur ρ étant la localisation canonique allant du premier vers le second, et le foncteur i étant donné par un foncteur d'inversion

[page 197]

$$\gamma : (\mathrm{Cat}/S, W_S) \longrightarrow (\mathrm{Cat}/S, \overline{W_S^{\mathrm{d}}})$$

qui est C dans le cas 1°, Φ_∞ dans le cas 2°. Les morphismes d'adjonction

$$\rho i \longrightarrow \mathrm{id}, \qquad i\rho \longleftarrow \mathrm{id}$$

doivent se décrire alors comme dans le cas où on suppose tout bonnement W(4b), et les compatibilités se voient de même : on est ramené à prouver que deux flèches

$$\gamma(X) \underset{\gamma(i_X)}{\overset{i_{\gamma(X)}}{\rightrightarrows}} \gamma(\gamma(X))$$

sont égales dans $(\mathrm{Cat}/S)(W_S^{\mathrm{d}})^{-1}$. La vérification dans le cas 1°), où $\gamma = C$, ne doit pas être changée. Dans le cas 2°) où $\gamma = \Phi_\infty$, je ne l'ai pas fait. Je ne le ferai que sous la pression des besoins.

p. 122

94. On peut y remplacer même $\underline{\mathrm{Parf}}_W S$ par $\underline{\mathrm{Parf}}_{W''_\omega} S$, *ou* par toute autre sous-catégorie pleine de $\underline{\mathrm{Fib}}_W S$ contenant $\underline{\mathrm{Parf}}_{W''_\omega} S$.

95. mais c'est *équivalent* à W(4b)! Cf. XVI 4.9. loc. cit.

96. Mais cela implique aussi W(4b), cf. loc. cit.

⑥ Loi contravariante de $\mathrm{HOT}_W(S)$, $\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S)$.

Il y a pour

$$f : S' \longrightarrow S$$

un homomorphisme du diagramme

$$\begin{array}{ccc} & \mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S') & \\ \swarrow & & \searrow \\ \mathrm{HOT}_W(S') & & \mathrm{HOT}^{o}_W(S') \end{array} \qquad \texttt{[Plutôt} \qquad \begin{array}{ccc} & \mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S) & \\ \swarrow & & \searrow \\ \mathrm{HOT}_W(S) & & \mathrm{HOT}^{o}_W(S) \texttt{]} \end{array}$$

dans le diagramme similaire pour S [plutôt S'], par des foncteurs f^* qui sont définis respectivement sur [page 198]

$$\begin{array}{rcccc} \underline{\mathrm{Liss}}_W S & \text{pour} & \mathrm{HOT}_W(S) & \longrightarrow & \mathrm{HOT}_W(S') \\ \underline{\mathrm{Prop}}_W S & \text{pour} & \mathrm{HOT}^{o}_W(S) & \longrightarrow & \mathrm{HOT}^{o}_W(S') \\ \underline{\mathrm{Fib}}_W S & \text{pour} & \mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S) & \longrightarrow & \mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S'), \end{array}$$

par l'intermédiare des foncteurs

$$f^* : X \longmapsto X \times_S S' : \begin{cases} \underline{\mathrm{Liss}}_W S & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Liss}}_W S' \\ \underline{\mathrm{Prop}}_W S & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Prop}}_W S' \\ \underline{\mathrm{Fib}}_W S & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Fib}}_W S', \end{cases}$$

lequel foncteur est compatible avec les localiseurs pretinents, qui sont W^{f}_S dans tous les cas. Par contre, en l'absence d'hypothèses draconiennes sur W ou sur S, on ne peut dire que f^* soit compatible avec W_S, $W_{S'}$ sur une quelconque des catégories du diagramme p. 175, permettant de définir $\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc!}}_W(S)$, de façon à nous donner un foncteur

$$\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc!}}_W(S) \longrightarrow \mathrm{HOT}^{\mathrm{lc!}}_W(S').$$

En l'absence d'axiomes sur W, le seul cas qui me soit connu est celui où f est *une W-équivalence universelle,* i.e. une W-fibration à fibres W-asphériques, auquel cas il est évident que pour *toute* flèche $u : X \longrightarrow Y$ dans Cat/S, $u \in W_S$ si et seulement si $(u' : X' \longrightarrow Y') \in W_{S'}$. On trouve alors un homomorphisme du diagramme complet $(*)$ p. 176 [plutôt p. 178] pour S, dans le diagramme correspondant pour S'.

Si on suppose W(4b), alors $W_S = W^{\mathrm{f}}_S$ sur $\underline{\mathrm{Fib}}_W S$, donc sur cette catégorie-là le foncteur f^* est compatible (sans mérite!) avec les localiseurs W_S, $W_{S'}$, mais ce n'est pas nouveau vraiment par rapport à ce qui a été dit plus haut, pour $\underline{\mathrm{Fib}}_W S$, $\underline{\mathrm{Fib}}_W S'$, et pour les $\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W$. p. 123

Mais si on suppose W(4a), et $f \in \underline{\mathrm{Fib}}_W$, alors f^* sur Cat/S tout entier est compatible [page 199] avec les localiseurs W_S, $W_{S'}$, et on trouve un calcul de f^* sur $\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc!}}_W(S) \approx \mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S)$ par

$$f^*(\mathrm{hot}^{\mathrm{lc}}_{S,W}(X)) = \mathrm{hot}^{\mathrm{lc}}_{S',W}(X \times_S S').$$

Donc c'est là un cas, exceptionellement, où les foncteurs f^* pour les HOT_W sont compatibles non seulement aux foncteurs d'inclusion i, j (de la page 176 [plutôt p. 178]), mais aussi aux foncteurs de localisation ρ, σ.

Oubli : Si $p : S' \longrightarrow S$ est W-propre, alors $p^* : \mathrm{Cat}/S \longrightarrow \mathrm{Cat}/S'$ est compatible avec W^{d}_S, $W^{\mathrm{d}}_{S'}$, et $p^* : \mathrm{HOT}_W(S) \longrightarrow \mathrm{HOT}_W(S')$ peut se 'calculer' par la formule

$$p^*(\mathrm{hot}_{S,W}(X)) = \mathrm{hot}_{S',W}(X \times_S S')$$

pour *tout* X dans Cat/S.

⑦ Produit dans $\mathrm{HOT}_W(S)$.

Le foncteur

$$(X,Y)\longmapsto X\times_S Y : \underline{\mathrm{Liss}}_W S\times \underline{\mathrm{Liss}}_W S\longrightarrow \underline{\mathrm{Liss}}_W S$$

est compatible avec les localiseurs $W_S^{\mathrm{f}}\times W_S^{\mathrm{f}}$ et W_S^{f}, donc passe aux localisés en

$$\begin{cases}\mathrm{HOT}_W(S)\times \mathrm{HOT}_W(S) & \longrightarrow & \mathrm{HOT}_W(S)\\ (\xi,\eta) & \longmapsto & \xi\times_S\eta\end{cases}$$

([97]). Ce produit est associatif, unitaire, commute avec toutes les compatibilités habituelles, comme il résulte du fait que c'est comme ça dans $\underline{\mathrm{Liss}}_S$. L'élément unité est la classe de $S\xrightarrow{\mathrm{id}} S$. La sous-catégorie $\mathrm{HOT}_W^{\mathrm{lc}}(S)$ est stable par le produit, qui induit [page 200]

$$\mathrm{HOT}_W^{\mathrm{lc}}(S)\times \mathrm{HOT}_W^{\mathrm{lc}}(S)\longrightarrow \mathrm{HOT}_W^{\mathrm{lc}}(S),$$

lui-même induit par le foncteur produit $(X,Y)\longrightarrow X\times_S Y$ dans $\underline{\mathrm{Fib}}_W S$.

Si X est quelconque dans Cat/S, le foncteur

$$\mathrm{mult}_{X/S} : Y\longmapsto X\times_S Y : \underline{\mathrm{Liss}}_W S\longrightarrow \mathrm{Cat}/S$$

est compatible avec les localiseurs W_S^{d}, car ce foncteur peut s'écrire comme le composé du foncteur correspondent *à valeurs dans* $\underline{\mathrm{Liss}}_W X$, lequel est compatible avec les localiseurs W_S^{d}, W_S^{d}, et le foncteur 'oubli de X' de $\underline{\mathrm{Liss}}_W X$ (même de Cat/X) dans Cat/S, lequel est compatible avec W_X^{d} et W_S^{d}. On trouve ainsi un foncteur p. 124

$$\begin{cases}\mathrm{mult}_{X/S} : \mathrm{HOT}_W(S)\longrightarrow \mathrm{HOT}_W(S)\\ \mathrm{mult}_{X/S}(\mathrm{hot}_{S,W}(Y))\overset{\text{déf}}{=}\mathrm{hot}_{S,W}(X\times_S Y)\qquad \text{si } Y \textit{ lisse} \text{ sur } S\end{cases}$$

([98]), puisque $\mathrm{HOT}_W(S)$ peut s'obtenir comme localisé tant de $\underline{\mathrm{Liss}}_W S$ que de Cat/S, pour W_S^{d}. Quand X est lui-même W-lisse sur S, ce foncteur n'est autre que

$$\begin{cases}\mathrm{mult}_\xi : \eta\longmapsto \xi\times_S\eta,\\ \text{où}\ \ \xi=\mathrm{hot}_{S,W}(X).\end{cases}$$

Mais il n'en est pas de même si X n'est pas lisse, i.e. il faut distinguer dans ce cas, même pour Y W-lisse sur S,

$$\mathrm{hot}_{S,W}(X\times_S Y)\qquad\text{et}\qquad \mathrm{hot}_{S,W}(X)\times_S \mathrm{hot}_{S,W}(Y).$$

Le deuxième terme peut s'expliciter comme $\mathrm{hot}_{S,W}(\Phi(X)\times_S Y)$ qui reçoit $\mathrm{hot}_{S,W}(X\times_S Y)$, i.e. on a un homomorphisme canonique [page 201]

$$\underbrace{\mathrm{hot}_{S,W}(X\times_S Y)}_{=\mathrm{mult}_{X/S}(Y)}\longrightarrow \underbrace{\mathrm{hot}_{S,W}(X)\times_S \mathrm{hot}_{S,W}(Y)}_{=\mathrm{hot}_{S,W}(\Phi(X)\times_S Y)},$$

induit par

$$X\times_S Y\longrightarrow \Phi(X)\times_S Y,$$

97. **NB** Si X, Y sont *quelconques* dans Cat/S, on a $\mathrm{hot}_{S,W}(X)\times_S \mathrm{hot}_{S,W}(Y)=\mathrm{hot}_{S,W}(\Phi_S(X)\times_S \Phi_S(Y))$. Si X ou Y est lisse sur S, on peut y remplacer $\Phi(X)$ resp. $\Phi(Y)$ par X resp. Y.

98. Cette formule est également valable si Y est dans $\underline{\mathrm{Fib}}_W S$, cf. (∗), p. 202.

mais cette dernière flèche n'a aucune raison d'être dans W_S^{d}, et n'induit donc pas nécessairement un isomorphisme dans $\mathrm{HOT}_W(S)$. (Contrexemple page 154.)

Il faut regarder à part le cas *où X est dans* $\underline{\mathrm{Fib}}_W S$, j'ai envie de dire que dans ce cas on a

$$\mathrm{hot}_{S,W}(X \times_S Y) \xrightarrow{\sim} \underbrace{\mathrm{hot}_{S,W}(X) \times_S \mathrm{hot}_{S,W}(Y)}_{=\mathrm{hot}_{S,W}(\Phi(X)\times_S \Phi(Y))} \qquad (*)$$

([99]) pour *tout* Y dans Cat/S (pas nécessairement W-lisse), a fortiori que dans ce cas

$$\begin{cases} \mathrm{mult}_{X/S} = \mathrm{mult}_\xi & \text{dans } \mathrm{HOT}_W(S) \\ \text{où } \xi = \mathrm{hot}_{S/W}(X/S) \text{ (si } X \text{ dans } \underline{\mathrm{Fib}}_W S). \end{cases} \qquad (**)$$

Dans le cas où Y est lisse sur S (ce qui suffit pour établir $(**)$), il suffit de se rappeler que $X \longrightarrow \Phi(X)$ est dans W_S^{f} (résulte du fait que X est W-fibré sur S ([100]), donc $X_s \longrightarrow s\backslash X$ est dans W, $\forall\ s \in S$), donc $\underbrace{X \times_S Y}_{X_Y} \longrightarrow \underbrace{\Phi(X) \times_S Y}_{\Phi(X)_Y}$ est aussi dans W_Y^{f}, donc (comme X_Y, $\Phi(X)_Y$ sont W-fibrés sur Y) dans W_Y^{d}, donc aussi dans W_S^{d}. En fait, même sans supposer Y lisse, ceci montre que l'on a [page 202]

p. 125

$$\mathrm{hot}_{S,W}(X \times_S Y) \xrightarrow{\sim} \mathrm{mult}_{Y/S}(\mathrm{hot}_{S,W}(X)) \qquad \text{si } X \text{ est dans } \underline{\mathrm{Fib}}_W S. \qquad (*)$$

Pour avoir $(*)$ pour Y quelconque, on peut par ce qui précède supposer X lisse (quitte à le remplacer par $\Phi(X)$), donc X dans $\underline{\mathrm{Liss}}_{0,W} S$. Il faut voir que

$$X \times_S Y \longrightarrow X \times_S \Phi(Y)$$

est encore dans W_S^{d}. Or si X est W-*propre* sur S, le changement de base $X \longrightarrow S$ est compatible avec W_S^{d}, W_X^{d} (sur Cat/S tout entier), et on gagne. (Ça doit être faux sans hypothèse de W-propreté sur X, *ou* de W-lissité sur Y …)

Quand on a

$$f : S' \longrightarrow S,$$

alors

$$f^* : \mathrm{HOT}_W(S) \longrightarrow \mathrm{HOT}_W(S')$$

est compatible avec les structures de produit.

⑧ Les foncteurs $f_!$: théorème d'adjonction, propriétés du dérivateur HOT_W.

Soit

$$f : S' \longrightarrow S$$


dans Cat, alors le foncteur induit

$$f_! : \mathrm{Cat}/S' \longrightarrow \mathrm{Cat}/S$$

est compatible avec les localiseurs $(W_{S'}^{\mathrm{d}}, W_S^{\mathrm{d}})$, ou $(W_{S'}^{\mathrm{g}}, W_S^{\mathrm{g}})$, ou $(W_{S'}, W_S)$. On trouve donc un foncteur induit pour les localisées, et [un] diagramme commutatif [page 203]

99. Cette formule n'est établie qu'en supposant ou bien Y W-lisse (en plus de X W-fibré sur S), ou bien X W-propre, p.ex. X W-parfait.

100. il suffit même W-prélisse sur S



On n'a pas de foncteur $f^{\mathrm{lc}}_!$ au niveau des $\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W$, sauf si on fait une hypothèse, telle W(4b), qui assure que $\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}\,!}_W \approx \mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W$. p. 126

Le théorème principal, que le foncteur $f_!$ est adjoint à gauche de f^*, est valable *sous la seule hypothèse* W$(1,2,3)$ ([101]). Donc dualement pour $f^o_!$, f^*_o. Mais comme on n'a pas de foncteur $f^*_{\mathrm{lc}\,!}$, la question d'adjonction ne se pose pas pour f général, et sans hypothèse W(4b) sur W. Elle ne se pose, apparemment, que pour f un W-fibré trivial (cf. fin de ⑥, p. 198), et dans ce cas l'adjonction ne doit pas faire de difficultés. Mais tant que je n'ai pas de sentiment bien net au sujet de la signification des $\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}\,!}_W$, ce n'est pas là un résultat bien bandant [sic].

L'adjonction de $f_!$, f^* pour HOT_W permet déjà de montrer que le prédérivateur HOT_W satisfait les conditions Der 1, Der $4'$, Der $5'$ des dérivateurs. De plus, on a ce qu'on peut appeler la propriété Der 3b pour HOT_W en tant que W-dérivateur, i.e. [page 204]

> *Si $f \in W$, alors f est une* HOT_W*-équivalence* ([102]) (moyennant les seuls axiomes W$(1,2,3)$ sur W). Plus précisément, f est une HOT_W-équivalence si et seulement si $\mathrm{hot}_W(f)$ est [un] isomorphisme, i.e. $f \in \overline{W}$, le saturé fort de W.

Si W *satisfait* W(4b), alors on a également un couple de foncteurs adjoints

$$\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S') \underset{f^*_{\mathrm{lc}}}{\overset{f^{\mathrm{lc}}_!}{\rightleftarrows}} \mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S)$$

pout toute flèche $S' \longrightarrow S$ dans Cat. On voit aussi dans ce cas que

> si $f : S' \longrightarrow S$ est dans W, alors f^*_{lc} et $f^{\mathrm{lc}}_!$ entre $\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S)$ et $\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S')$ sont des équivalences quasi-inverses l'une de l'autre (moyennant W(4b)),

ce qui est l'axiome Der $3\mathrm{b}_2$ 'version W-dérivateurs'. On ne peut s'attendre à mieux, du côté Der 3 !

Oubli : Soit $f : S' \longrightarrow S$, on a alors $\boxed{f_! f^*} : \mathrm{HOT}_W(S) \longrightarrow \mathrm{HOT}_W(S)$ est égal à $\mathrm{mult}_{S'/S}$ (cf. p. 200). Il est donc égal à mult_ξ, où $\xi = \mathrm{hot}_{S,W}(S')$, si on suppose ou bien S' W-lisse sur S, ou bien S' W-fibré sur S (cf. (∗∗), p. 201).

⑨ Théorème de changement de base pour $f_!$ dans HOT_W.

Si on a p. 127

101. i.e. avec ces nouvelles notations Loc$(1,2,3$ bis) (cf. XVI).

102. On le prouve en interprétant la notion de HOT_W-équivalence par la HOT_W*-homologie.* Cela revient finalement à ceci : Si $f : S' \longrightarrow S$ est dans W, alors $\forall\, T$, $S' \times T \longrightarrow S \times T$ aussi !

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{q} & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ S & \xleftarrow{g} & S', \end{array}$$

avec f W-lisse *ou* g W-propre `[la suite manque]`

p.

LES DÉRIVATEURS

ALEXANDRE GROTHENDIECK

Chapitre VII

Catégories de chemins (2)

p.

Note des éditeurs de l'édition transcrite.

Ce texte a été déchiffré et transcrit en LaTeX 2_ε par M. Künzer. Il a été édité par M. Künzer, J. Malgoire, et G. Maltsiniotis. La transcription est aussi fidèle que possible au manuscrit. Pour les quelques corrections évidentes, ou rares commentaires des éditeurs, ainsi que pour la numérotation originale des pages du manuscrit, les caractères de machine à écrire `[typewriter]` entre crochets sont utilisés. Un point d'interrogation entre crochets signifie que l'on n'est pas sûr du mot qui précède.

Cette édition est provisoire. Les remarques, commentaires et corrections sont bienvenus. Envoyer un message à :

[e-mail address removed]

G. Maltsiniotis

p. 1

Comme le formalisme 'simplifié' des chemins que j'ai voulu dégager à la va-vite s'est révélé d'une lourdeur insupportable, de nature à le rendre quasiment inutilisable, je vais essayer de dégager un formalisme souple, collant à l'intuition, au prix seulement d'un effort conceptuel supplémentaire. `[page 1]`

1 Intervalles et leur variantes

On appelle *catégorie intervalle standard* une catégorie définie par un ensemble ordonné, dont l'ensemble des élements est un intervalle d'entiers $[0, n]$ ($n \in \mathbf{N}$, on n'exclut pas le cas $n = 0$, i.e. de la catégorie ponctuelle $\{0\}$) :

$$\mathrm{Ob}\, I = [0, n] \subseteq \mathbf{N},$$

et satisfaisant l'hypothèse suivante :

a) pour toute paire de deux sommets consécutifs $i-1$, i de I ($1 \leq i \leq n$), il y a une flèche qui les relie, donc soit $i \longrightarrow i+1$, soit $i \longleftarrow i+1$ `[plutôt` $i-1 \longrightarrow i$`,` $i-1 \longleftarrow i$`]` (cette flèche est notée $\underline{u}_i$,

$$(i-1) \xrightarrow{\underline{u}_i} i \qquad \text{ou} \qquad (i-1) \xleftarrow{\underline{u}_i} i \ \ ).$$

b) La catégorie I est engendrée par l'ensemble de ses flèches $\underline{u}_i$ (appelées *flèches de transition*).

La flèche de transition est dite *directe* si elle va de $i-1$ à i, *rétrograde* dans le sens inverse. Si on affecte l'intervalle $[i-1, i]$ du signe + ou − suivant que $\underline{u}_i$ est directe ou rétrograde, on voit donc que les intervalles standard de longueur donnée n correspondent biunivoquement aux systèmes de signes + ou − sur les n intervalles de transition $[i-1, i]$ ($1 \leq i \leq n$), il y en a donc 2^n. Le sommet 0 est l'*origine* ou la *source* de l'intervalle, le sommet n l'*extrémité* ou le *but* de l'intervalle. `[page 2]`

Un intervalle standard est *orienté,* du fait qu'on à la relation d'ordre *total* naturelle sur l'ensemble de ses sommets, savoir celle des entiers dans $[0, n]$. Quand on parlera de la relation d'ordre sur I, qu'un sommet i en *'précède'* ou *'suit'* un autre j ($i \leq j$ ou

$i \geq j$ respectivement), c'est de cette relation d'ordre qu'on voudra parler. Celle associée à la structure de catégorie ne sera jamais regardée comme une relation d'ordre. Il y a également une relation d'ordre total naturelle sur l'ensemble des flèches de transition $\underline{u}_i$ $(1 \leq i \leq n)$, donnée par la relation d'ordre des entiers i, $1 \leq i \leq n$, qui les indexent. On dira qu'une flèche i `[plutôt` $\underline{u}_i$`]` de transition *précède* ou *suit* une autre `[`$\underline{u}_j$`]`, ou qu'elle est *successeur immédiat* ou *prédécesseur immédiat* d'une autre (si $i = j+1$ ou $i = j-1$).

Si on a un ensemble d'entiers p. 2

$$E \subseteq \mathbf{Z},$$

on considérera dans E la relation d'équivalence engendrée par la relation entre deux éléments (i, j) de E : j est successeur immédiat de i *dans* $\mathbf{Z}$ (i.e. $j = i + 1$). Deux éléments distinct i, j de E sont congrus pour cette relation si et seulement si l'intervalle d'entiers qu'ils déterminent est $\subseteq E$, donc

$$\text{si } i < j,\ i \text{ et } j \text{ sont } \textit{`connectés'} \text{ dans } E \text{ si et seulement si } [i, j] \subseteq E.$$

Quand on parlera des 'composantes connexes' de E, il s'agira toujours des classes suivant cette relation d'équivalence. [page 3]

Nous identifierons l'ensemble des flèches de transition $\mathrm{Fl\,tr}(I)$ de I à l'intervalle d'entiers $[1, n]$, donc à une partie de $\mathbf{Z}$. Si on a une partie $E \subseteq \mathrm{Fl\,tr}(I)$, on y a donc la notion de flèches de transition 'connectées' dans E, et la notion de connexité pour E. Si $i < j$, $\underline{u}_i$ et $\underline{u}_j$ sont connectées si et seulement si toutes les flèches de transition intermédiaires entre $\underline{u}_i$ et $\underline{u}_j$ sont dans E. Et E est connexe si et seulement s'il est soit vide, soit formée d'une suite de flèches de transition dont chacune est successeur immédiat de celle qui la précède,

$$E = \{\underline{u}_i, \underline{u}_{i+1} \ldots, \underline{u}_{i+l-1}\},$$

où l est le cardinal de E. Une telle E est appelée une *chaîne* de flèches de transition, et l est sa longueur. Une chaîne est dite *composable* si le composé $\underline{u}_{i+l-1} \circ \cdots \circ \underline{u}_{i+1} \circ \underline{u}_i$ `[ou` $\underline{u}_i \circ \underline{u}_{i+1} \circ \ldots \circ \underline{u}_{i+l-1}$`]` a un sens, i.e. si elles sont toutes de même sens, soit directe, soit rétrograde.

On désigne par $\mathrm{Fl\,tr}^+(I)$, $\mathrm{Fl\,tr}^-(I)$ l'ensemble des flèches de transition directes, ou rétrogrades, respectivement. Leurs composantes connexes ne sont autres que les chaînes composables maximales. Ainsi, les chaînes composables maximales forment une partition de l'ensemble des flèches de transition, en intervalles d'entiers mutuellement disjoints. Les chaînes forment elles-mêmes un ensemble totalement ordonné

$$C_1,\ C_2,\ \ldots\ C_r \qquad (1 \leq r \leq n).$$

L'entier r s'appelle la *'longueur utile'* de l'intervalle I, c'est donc le cardinal de l'ensemble de ses chaînes composables maximales. [page 4]

Deux chaînes composables maximales `[consécutives]` sont toujours de signe opposé, si l'une est directe l'autre est rétrograde, et inversement. La première chaîne composable maximale C_1 (disons simplement *'chaîne structurale'*) a le même signe que $\underline{u}_1$; `[on]` dit que la *direction initiale* de I est directe, resp. rétrograde, s'il en est ainsi de $\underline{u}_1$, ou ce qui revient au même, de C_1. De même on définit la *direction finale* de I comme celle de $\underline{u}_n$, ou encore celle de C_r. Direction initiale et finale sont égales si la longueur utile r est impaire, inégales si elle est paire. (**NB** Ce n'est que pour $n = 0$, i.e. quand $I = \{0\}$ est la catégorie ponctuelle, que direction initiale et direction finale ne sont pas définies.) p. 3

Les chaînes composables correspondent aux sous-catégories pleines de I qui sont isomorphes à une catégorie $\mathbf{\Delta}_i$ (où i est la longueur de la chaîne). Notons que $\mathbf{\Delta}_i$ n'a pas

d'autre automorphisme que l'identité, donc les chaînes maximales de longueur donnée $i \geq 1$ correspondent exactement aux foncteurs

$$\mathbf{\Delta}_i \longhookrightarrow I$$

qui sont injectifs sur les sommets. Un tel foncteur est pleinement fidèle, et un monomorphisme. Ce foncteur définit une application strictement croissante ou strictement décroissante sur les sommets, suivant que la chaîne est directe ou rétrograde.

[page 5]

Notons que tout simplexe type $\mathbf{\Delta}_i$, $i \geq 0$, peut être vu comme un intervalle, de longueur i, de longueur utile 1 (si $i \geq 1$, 0 si $i = 0$). Son origine est 0, son extrémité est i. Mais appelons une catégorie quelconque une *catégorie intervalle* si elle est isomorphe à un intervalle standard. Notons ici

Proposition 1. *Soit I un intervalle standard de longueur $n \geq 1$.*


a) Soit $i \in I$. Pour que $i \in \{0, n\}$, i.e. pour que i soit un des deux 'bouts' *(ou* 'extrémités'*) (source ou but) de I, il faut et il suffit que l'une des deux catégories I/i ou $i\backslash I$ soit la catégorie ponctuelle et que l'autre soit isomorphe à un $\mathbf{\Delta}_j$ ([1]). (Caractérisation intrinsèque des bouts d'un intervalle.) Pour que i soit la source, il faut et il suffit que $i\backslash I$* `[phrase incomplète]`

b) Tout foncteur $I \longrightarrow I$ qui fixe les deux extrémités de I est l'identité.

Corollaire. *Le groupe des automorphismes de I a au plus deux éléments. S'il en a deux, l'automorphisme non trivial échange les deux extrémités. (On dit alors que l'intervalle est* symétrique*.)*


NB Si i n'est pas un bout, et si néanmoins l'une des deux catégories $i\backslash I$, I/i est ponctuelle, disons I/i, alors au voisinage immédiat de i, I a la forme

[page 6]



($\underline{u}_i$ rétrograde, $\underline{u}_{i+1}$ directe - si c'était $i\backslash I$ la ponctuelle, alors $\underline{u}_i$ serait directe, $\underline{u}_{i+1}$ rétrograde - en tous les cas ces deux flèches sont de sens opposé, i.e. non composables). On trouve donc que $i\backslash I$ est une catégorie de la forme

p. 4



où r est la longueur de la chaîne structurale contenant $\underline{u}_i$, s celle de la chaîne structurale contenant $\underline{u}_{i+1}$. Cette catégorie est une somme amalgamée $\mathbf{\Delta}_r$ II $\mathbf{\Delta}_s$ (recollées suivant leur origine), mais n'est pas isomorphe à une $\mathbf{\Delta}_j$, p. ex. faute d'avoir un objet final.

Cette observation prouve a). Pour prouver b), il suffit de prouver que l'ordre total sur I est déterminé de façon intrinsèque, par le choix de *l'origine* s_0 de I (parmi ces deux extrémités). Supposons que l'on ait déjà déterminé intrinsèquement les sommets s_0, s_1, …, s_i ($i \geq 0$). Comment déterminer s_{i+1} ? (Quand $i < n$.) Soit I' la sous-catégorie pleine de I formée des $j \in I$ qui ne sont pas parmi les s_j `[plutôt` s_k`]` déjà construits, sauf le

[page 7]

1. où j est la longueur de l'unique chaîne structurale qui 'touche' i (i.e. telle que i soit dans la sous-catégorie pleine définie par ladite chaîne).

dernier s_i (donc $s_i \in I'$, $\operatorname{card} I' \geq 2$). Alors I' est isomorphe à un intervalle standard, avec s_i correspondant à l'origine. Une des catégories $i\backslash I$, I/i est ponctuelle, l'autre isomorphe à une catégorie $\mathbf{\Delta}_j$, et de plus, i est objet initial ou final de $\mathbf{\Delta}_j$. Si c'est l'objet initial 0, on prend pour s_{i+1} le successeur immédiat de i dans $\mathbf{\Delta}_j$. Si c'est l'objet final j, on prend pour s_{i+1} le prédécesseur immédiat $j-1$.

Si on était parti du but n de I, au lieu de partir de la source, on aurait trouvé la relation d'ordre total opposée. Affectant l'élément but du numéro d'ordre 0, on trouve une renumération de I, i devenant $n-i$, et les flèches de transition qui étaient directes pour la relation d'ordre initiale, deviennent rétrogrades dans la relation d'ordre opposée, et inversement. On voit ainsi :

Proposition 2. *Si I est un intervalle standard, il existe un unique couple (I', θ), où I' est un intervalle standard, et θ un isomorphisme $I \xrightarrow{\sim} I'$ qui transforme le but de I dans la source de I' (et la source de I en le but de I').*

Cet intervalle I' est appelé l'intervalle *opposé* de I. Il faut le voir, intrinsèquement, comme la 'même' categorie I, mais avec une 'orientation' opposée.

[page 8]

Une façon plus claire de voir ceci est la suivante. Soit J une catégorie intervalle, i.e. isomorphe à un intervalle standard. Alors il y a exactement (si $I \not\simeq e$) *deux* couples (I, θ) d'un intervalle standard I et d'un isomorphisme $\theta : I \xrightarrow{\sim} J$. Ces deux isomorphismes induisent sur J deux ordres totaux, opposés l'un de l'autre. Chaque couple est déterminé de façon unique par ledit ordre total, qu'on appelera une *orientation* de l'intervalle J. Ainsi J a deux orientations, et chacune détermine un *isomorphisme orienté* (i.e. respectant les orientations) de J avec un intervalle standard ([2]). Ces deux intervalles sont les même si et seulement s'il existe un automorphisme de J (nécessairement unique) qui échange ses deux orientations, ou ce qui revient au même, qui échange entre elles les deux extrémités. (Ainsi les catégories opposées l'une de l'autre

p. 5



sont chacunes des intervalles symétriques.) Choisir une orientation revient aussi 'a choisir l'origine parmi les deux extrémités.

Notons que la *catégorie opposée* à un intervalle est un intervalle, et la catégorie opposée à un intervalle standard est l'intervalle standard qui s'en déduit en changeant tous les signes sur les intervalles de transition $[i-1, i]$ $(1 \leq i \leq n)$. On se gardera de confondre la propriété $I \simeq I^o$, avec la propriété de symétrie.

[page 9]

Ainsi les deux catégories (Ψ_1 et Φ_1) ci-dessus sont symétriques, mais opposées l'une de l'autre sans être isomorphes. D'autre part, les $\mathbf{\Delta}_i$ ne sont pas symétriques, mais chacune isomorphe à la catégorie opposée.

Si I est isomorphe à la catégorie opposée I^o, et si θ est un tel isomorphisme (nécessairement unique), alors il est immédiat que θ renverse l'orientation (sinon ce serait l'identité sur les sommets, et les flèches de transition seraient à la fois directes et indirectes), donc $\theta(0) = n$, $\theta(1) = n-1$, et on veut que $\underline{u}_1$ et $\underline{u}_n$ sont de même signe. Mais si I est symétrique, $\underline{u}_1$ et $\underline{u}_n$ sont de signe opposé. Donc I ne peut être à la fois symétrique et isomorphe à l'intervalle opposé `[plutôt à la catégorie opposée; exception :` $I = \{0\}$`]`.

Pour toute catégorie $\mathbf{\Delta}_i$, celle-ci étant un intervalle, il y a (si $i > 0$) *deux orientations.* En tant qu'intervalles orientés, il y a $\mathbf{\Delta}_i^+$ (avec l'orientation ordinaire, donné par l'ordre ordinaire sur $\operatorname{Ob} \mathbf{\Delta}_i = [0, i]$), et $\mathbf{\Delta}_i^-$ avec l'orientation opposée.

p. 6

2. **NB** On parlera de l'intervalle *orienté opposé* I^{opp} d'un intervalle *orienté* I, qu'il faut se garder de confondre avec la catégorie opposée I^o. Ici I^{opp} a même catégorie sous-jacente que I, mais avec une orientation opposée.

[page 10]

2 Sous-catégories pleines d'un intervalle

Soit I une catégorie intervalle orientée, de longueur $n \geq 1$. Nous identifierons $\mathrm{Ob}\, I$ à l'ensemble des entiers $[0, n]$. Pour une chaîne $\underline{u}_i$, $\underline{u}_{i+1}$, …, $\underline{u}_{i+l-1}$ de flèches de transition dans I, on appelle *domaine* de la chaîne, l'ensemble des sources et de buts de ces éléments. C'est donc un intervalle d'entiers $[i-1, i+l-1]$, de longueur l égale à celle de la chaîne, dont l'origine est déterminé par la première flèche $\underline{u}_i$ de la chaîne (c'est sa source, si $\underline{u}_i$ est directe, et son but si $\underline{u}_i$ est rétrograde), et dont l'extrémité est déterminée par la dernière $\underline{u}_{i+l-1}$. Les intervalles d'entiers (vus comme des sommets de I) correspondant aux chaînes structurales sont appelés les *intervalles structuraux* ou *intervalles critiques* de I. Contrairement aux chaînes structurales, ces intervalles ne forment pas une partition de I, puisque deux intervalles structuraux peuvent avoir une extrémité commune. Si les chaînes structurales sont

$$C_1,\ C_2,\ \ldots\ ,\ C_r \qquad (r = \text{ longueur utile de } I)$$

de longueurs

$$l_1,\ l_2,\ \ldots\ ,\ l_r,$$

alors les intervalles structuraux sont

$$\underbrace{[0, l_1]}_{I_1},\ \underbrace{[l_1, l_1 + l_2]}_{I_2},\ \ldots\ ,\ \underbrace{[l_1 + \cdots + l_{r-1}, l_1 + \cdots + l_{r-1} + l_r]}_{I_r},$$

une suite d'intervalles d'entiers dont deux consécutifs ont une extrémité commune, et tels que si $i < j$, chaque élément de I soit $\leq$ chaque élément de I_j. On appelle *sommet critique* de I les extrémités des intervalles structuraux.

Proposition 3. *Soit $s \in I$, soit $I' = I/s$ (sous-catégorie pleine de I des s' tels qu'il existe $s' \longrightarrow s$), $I'' = I/s$* `[plutôt $I'' = s\backslash I$]`, *$I'_0 = (I/s)\backslash\{s\}$, $I''_0 = (s\backslash I)\backslash\{s\}$* ([3]). Pour que s soit critique, il faut et il suffit que $I\backslash\{s\}$ soit catégorie somme de I'_0 et I''_0.

Proposition 4. *Soient i, j dans I, avec $i < j$. Conditions équivalentes :*

a) Il existe une flèche entre i et j (soit $i \longrightarrow j$, soit $j \longrightarrow i$). `[page 11]`

b) i et j appartiennent à un même intervalle structural (nécessairement unique).

c) La sous-catégorie pleine de I définie par l'ensemble d'objets $[i, j]$ est isomorphe à une $\mathbf{\Delta}_\alpha$ (on aura $\alpha = j - i$).

On dira alors que i et j sont *directement connectés* dans I. (Et on utilisera la même terminologie dans une catégorie quelconque : i et j sont directement connectés si et seulement si $\mathrm{Hom}_I(i, j)$ *ou* $\mathrm{Hom}_I(j, i)$ est non vide.) p. 7

Proposition 5. *Soit $J \subseteq I$ une partie de I, considérons la sous-catégorie pleine de I qu'elle définit. Alors :*

a) Les composantes connexes J_α de J sont des intervalles et l'ordre induit sur un J_α par celui de I est une orientation (dite orientation induite*) de J_α.*

b) Supposons $\mathrm{card}\, J > 1$. *Soit i le plus petit élément de J, j le plus grand élément, donc $i < j$. Pour que J lui-même soit un intervalle, il faut et il suffit que tout sommet critique dans $[i, j]$ soit élément de J.*

([4]).

NB Si $s \in [i, j]$ est un sommet critique de I qui n'est pas dans J, alors par la proposition 3 il disconnecterait J, i.e. J serait somme directe de deux sous-catégories J' et J'' non vides ($i \in J'$, $j \in J''$), donc J ne serait pas un intervalle.

3. i.e. qu'on ait : il n'y a pas de flèches entre un élément de I'_0 et un élément de I''_0.

4. On appelle *sous-intervalle* de I une sous-categorie pleine connexe, i.e. qui est elle-même un intervalle. Notons d'ailleurs que *toute* sous-catégorie I' de I qui est un intervalle, est nécessairement pleine, cf. plus bas `[paragraphe]` des foncteurs entre intervalles. `[page 12]`

Corollaire. *L'ensemble des sommets critiques de I est aussi l'ensemble des sommets du plus petit sous-intervalle de I contenant les extrémités. Plus généralement, si $i < j$ sont deux sommets de I, le plus petit sous-intervalle de I contenant i, j est formé de i, j et des sommets critiques s tels que $i < s < j$.*

Définition. Un intervalle est dit *réduit* (ou *irrédondant*) si tous ses sommets sont critiques, ou ce qui revient au même, si ses chaînes structurales sont de longueur 1.

Un intervalle orienté *réduit* est connu, à isomorphisme près, quand on connaît

a) sa longueur n,

b) sa direction initiale + (directe) ou − (rétrograde).

NB Cette direction est la même que la direction finale si n est impair, elle est opposée si n est pair.

Ainsi, suivant les deux cas de direction initiale, on trouve

$$0 \longrightarrow 1 \longleftarrow 2 \longrightarrow \cdots \qquad \cdots\ n \qquad \begin{array}{ll}(\text{Avec} & n-1 \longrightarrow n \quad \text{si } n \text{ impair,} \\ & n-1 \longleftarrow n \quad \text{si } n \text{ pair.})\end{array}$$

$$0 \longleftarrow 1 \longrightarrow 2 \longleftarrow \cdots \qquad \cdots\ n \qquad \begin{array}{ll}(\text{Avec} & n-1 \longleftarrow n \quad \text{si } n \text{ impair,} \\ & n-1 \longrightarrow n \quad \text{si } n \text{ pair.})\end{array}$$

Proposition 6. *Un sous-intervalle J, ayant i et j ($i < j$) comme plus petit et plus grand sommet, est réduit si et seulement si tout $s \in J$ distinct de i et de j est critique.* p. 8

Corollaire. *La sous-catégorie pleine de I formée des sommets critiques est un sous-intervalle. On l'appelle l'intervalle réduit associé à I, noté $I_{\text{réd}}$.* p. 9

[page 13]

3 Chemins. Catégorie de chemins d'un type donné τ.

Soient I un intervalle orienté, et X une catégorie. On appelle *chemin de type I dans X* tout foncteur $I \longrightarrow X$, et *catégorie de chemins de type I dans X* la catégorie

$$\underline{\mathrm{Ch}}_I(X) = \underline{\mathrm{Hom}}(I, X).$$

Comme I est *canoniquement* isomorphe à une catégorie intervalle standard I_0, on peut identifier les chemins de type I, au de type I_0. Le type τ d'un chemin le longueur n ($= \operatorname{card} I$) dans X peut donc être décrit par une suite de n signes + ou −

$$\tau_1,\ \tau_2,\ \ldots\ ,\ \tau_n \qquad (\tau_i \in \{-1, +1\} \text{ pour } 1 \leq i \leq n).$$

À cause du fait que I est engendré pas ses flèches de transition, un foncteur $c : I \longrightarrow X$ est déterminé quand on connaît

a) Les $c(i)$ ($i \in I$), i.e. une suite de $n+1$ objets de X :

$$a_0,\ a_1,\ \ldots\ ,\ a_n\ ([5]);$$

b) Les $c(\underline{u}_i)$ (où les $\underline{u}_i$ sont les flèches de transition dans I), i.e. pour tout $i \in [1, n]$ une flèche u_i dans X entre a_{i-1} et a_i, allant de a_{i-1} dans a_i si $\underline{u}_i$ est directe ($\tau_i = +1$), et de a_i dans a_{i-1} si $\underline{u}_i$ est rétrograde ($\tau_i = -1$),

et à toute telle donnée a), b) correspond un foncteur. Ainsi on pourra identifier les chemins de type I dans X aux diagrammes du type précisé dans X. Et les morphismes [page 14]

5. a_0 est dit la *source* du chemin, a_n son but.

entre chemins correspondent de même aux morphismes entre diagrammes a et a', une flèche $a \xrightarrow{\alpha} a'$ étant donc une suite de $n+1$ flèches

$$\alpha_i : a_i \longrightarrow a'_i, \qquad i \in [0, n],$$

satisfaisant la condition de commutativité pour les n carrés

$$\begin{array}{ccc} a_{i-1} & \xrightarrow{u_i} & a_i \\ {\scriptstyle \alpha_{i-1}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \alpha_i} \\ a'_{i-1} & \xrightarrow{u'_i} & a'_i \end{array} \qquad \text{(cas } \underline{u}_i \text{ directe)}$$

ou

p. 10

$$\begin{array}{ccc} a_{i-1} & \xleftarrow{u_i} & a_i \\ {\scriptstyle \alpha_{i-1}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \alpha_i} \\ a'_{i-1} & \xleftarrow{u'_i} & a'_i. \end{array} \qquad \text{(cas } \underline{u}_i \text{ rétrograde)}$$

Si on a une flèche entre deux sommets quelconque i, j dans I, avec $i < j$ et j non successeur immédiat de i, alors i, j appartiennent à un même intervalle critique, et dans I on aura

$$i \xrightarrow{\underline{u}_{i+1}} i+1 \xrightarrow{\underline{u}_{i+2}} \cdots\ j-1 \xrightarrow{\underline{u}_j} j \qquad \text{une chaîne de longueur } j-i \geq 2$$

ou

$$i \longleftarrow i+1 \longleftarrow \quad \cdots\ j-1 \longleftarrow j,$$

et la flèche correspondante entre a_i et a_j s'obtient en composant les flèches u_i correspondantes.

Exemples. [page 15]

1. $I = \mathbf{\Delta}_0 = e$, $\underline{\mathrm{Ch}}_I(X) \simeq X$. Les chemins de longueur 0 s'identifient aux objets a de X. L'unique élément id_e de $\mathrm{Fl}(I)$ donne id_a dans X.
2. $I = \mathbf{\Delta}_1^+$, $\underline{\mathrm{Ch}}_I(X) \simeq \underline{\mathrm{Fl}}(X)$. Les chemins de type $\mathbf{\Delta}_1^+$ sont ceux de longueur 1 et *directs,* i.e. donnés par une flèche

   $$a_0 \longrightarrow a_1$$

   dont la source est aussi la source a_0 du chemin. Par contre, les chemins de type $\mathbf{\Delta}_1^-$ sont donnés par des diagrammes

   $$a_0 \longleftarrow a_1,$$

   i.e. par des flèches dont le but est considéré comme source du chemin. Bien sûr, les catégories $\underline{\mathrm{Ch}}_{\mathbf{\Delta}_1^+}(X)$ et $\underline{\mathrm{Ch}}_{\mathbf{\Delta}_1^-}(X)$ sont canoniquement isomorphes, mais par un isomorphisme qui *échange source et but du chemin.* Nous nous garderons donc bien de confondre les deux chemins précédents.
3. $\mathbf{\Delta}_2^+$, $\mathbf{\Delta}_2^-$, correspondant aux diagrammes [page 16]

   $$a_0 \longrightarrow a_1 \longrightarrow a_2$$

   resp.

   $$a_0 \longleftarrow a_1 \longleftarrow a_2,$$

   on peut faire une remarque similaire que pour $\mathbf{\Delta}_1^+$, $\mathbf{\Delta}_1^-$. p. 11

4. Φ_1, Ψ_1, ce sont respectivement les intervalles

$$\Phi_1 :\ 0 \xleftarrow{u_0} 1 \xrightarrow{u_1} 2 \qquad \text{ou} \qquad \begin{array}{ccc} & & 0 \\ & \nearrow & \\ 1 & & \\ & \searrow & \\ & & 2 \end{array} ,$$

et

$$\Psi_1 :\ 0 \xrightarrow{u_0} 1 \xleftarrow{u_1} 2 \qquad \text{ou} \qquad \begin{array}{ccc} & & 0 \\ & \swarrow & \\ 1 & & \\ & \nwarrow & \\ & & 2 \end{array} .$$

Ils correspondent respectivement aux diagrammes

$$a_0 \xleftarrow{u_0} a_1 \xrightarrow{u_1} a_2$$

et

$$a_0 \longrightarrow a_1 \longleftarrow a_2.$$

Les catégories Φ_1, Ψ_1 sont opposées l'une de l'autre, et ne sont pas isomorphes. Aussi n'y a-t-il en général aucun isomorphisme entre $\underline{\mathrm{Ch}}_{\Phi_1}(X)$ et $\underline{\mathrm{Ch}}_{\Psi_1}(X)$.

Soit I un intervalle orienté, et considérons l'*intervalle opposé* I^{opp}, ayant même catégorie sous-jacente mais l'orientation opposé. Comme la définition de la catégorie des chemins du type I ne fait pas intervenir l'orientation de I, on a donc un isomorphisme canonique

$$\underline{\mathrm{Ch}}_I(X) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Ch}}_{I^{\mathrm{opp}}}(X).$$

[page 17]

Néanmoins on se gardera de confondre un chemin de type I avec le chemin opposé de type I^{opp}, la source de l'un étant le but de l'autre et inversement. C'est dire qu'un chemin doit être vu comme *plus* qu'un simple foncteur

$$I \longrightarrow X,$$

il faut de plus se donner l'*orientation de* I comme faisant partie de la structure de chemin. Donc la définition formelle raisonnable, qui colle à l'intuition du chemin comme allant d'une *source* bien définie vers un *but* également bien défini, c'est qu'un chemin (défini en termes d'une catégorie intervalle I) est la donné d'un couple (ω, c), où ω est une orientation de I, et c un foncteur $c : I \longrightarrow X$. Quand on regarde la catégorie des chemins d'un 'type' déterminé, ce *type* est (I, ω), et non I. C'est quand ω est fixé une bonne fois que cette catégorie s'identifie impunément à $\underline{\mathrm{Hom}}(I, X)$ sans plus.

Il faut voir cette catégorie de chemins comme munie de la structure essentielle

$$\begin{array}{c} \underline{\mathrm{Ch}}_{(I,\omega)}(X) \\ \big\downarrow{\scriptstyle (\sigma,\beta)} \\ X \times X \end{array} \qquad \begin{array}{l} c \longmapsto (\sigma(c), \beta(c)) \\ \text{ou } \sigma(c) \text{ est la } \textit{source,} \\ \qquad \beta(c) \text{ le } \textit{but} \text{ de } c. \end{array}$$

Ce foncteur s'identifie au foncteur de composition

p. 12

[page 18]

$$c \longmapsto c \circ \alpha$$

où α est le foncteur d'inclusion

$$\begin{cases} \varepsilon \xrightarrow{\alpha} I \\ \varepsilon = \{0,1\}, \quad \text{catégorie discrète à deux éléments,} \\ \alpha \text{ donné par } \quad \alpha(0) = \text{ source de } I \\ \qquad\qquad\quad\ \ \alpha(1) = \text{ but de } I. \end{cases}$$

Si ω' est l'orientation opposée de I, on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{Ch}}_{(I,\omega)}(X) & \xrightarrow[\sim]{\varphi} & \underline{\mathrm{Ch}}_{(I,\omega')}(X) \\ \downarrow{\scriptstyle (\sigma,\beta)} & & \downarrow{\scriptstyle (\sigma',\beta')} \\ X \times X & \xrightarrow{\ s\ } & X \times X, \end{array}$$

où s est le foncteur de symétrie

$$s(x,y) = (y,x)$$

([6]). Donc l'isomorphisme φ ne respecte pas les flèches structurales 'source-but' (σ,β).

Il y a cependant un embarras quand il existe un isomorphisme d'intervalles *orientés*

$$\theta : (I,\omega) \xrightarrow{\sim} (I,\omega'),$$

i.e. quand I est symétrique. Ce n'est pas le cas pour les $\mathbf{\Delta}_i$ $(i \geq 1)$ (ces catégories n'ont pas d'autres automorphismes que l'identité), mais c'est le cas pour les catégories Φ_1, Ψ_1 de l'exemple 4°, plus généralement pour les catégories réduites de longueur *paire.* Comme [page 19]
chaque fois qu'on a un isomorphisme θ d'intervalles *orientés,* on trouve un isomorphisme entre les catégories de chemins de type (I,ω) et $(I,\omega)^{\mathrm{opp}} = (I,\omega')$, *compatible* cette fois avec les foncteurs (σ,β) :

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{Ch}}_{(I,\omega)}(X) & \xrightarrow[\sim]{\Psi_\theta} & \underline{\mathrm{Ch}}_{(I,\omega')}(X) \\ & {\scriptstyle (\sigma,\beta)} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle (\sigma',\beta')} & \\ & X \times X. & \end{array}$$

Il est bon de regarder un *type* de chemins comme une donné non catégorique, mais p. 13
combinatoire, une simple suite τ de n signes τ_i $(1 \leq i \leq n)$ + ou − (n = longueur des [page 20]
chemins envisagés). Cette donné combinatoire définit un intervalle orienté standard, I_τ. Quand on a un intervalle orienté quelconque (I,ω), il définit un type τ, et on l'identifie canoniquement au type I_τ. Il vaut mieux écrire $\underline{\mathrm{Ch}}_\tau(X)$, plutôt que $\underline{\mathrm{Ch}}_{(I,\omega)}(X)$, pour bien indiquer que pour X donné, c'est là une catégorie totalement 'épinglée', sans automorphismes liés à la nature particulière de τ (à des automorphismes de τ !).

On peut préciser ce point ainsi. Soit τ' un autre type d'intervalles, et proposons-nous de déterminer des 'lois' qui permettent à tout chemin de type τ dans une catégorie arbitraire X, d'associer un chemin de type τ' de cette même catégorie, et ceci de façon 'fonctorielle', i.e. compatible avec les applications horizontales

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Ch}_\tau(X) & \xrightarrow{\mathrm{Ch}_\tau(f)} & \mathrm{Ch}_\tau(X') \\ {\scriptstyle L_X}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle L_{X'}} \\ \mathrm{Ch}_{\tau'}(X) & \xrightarrow{\mathrm{Ch}_{\tau'}(f)} & \mathrm{Ch}_{\tau'}(X') \end{array}$$

[page 21]

associées à un foncteur $f : X \longrightarrow X'$.

Par exemple, prenant le type $\mathbf{\Delta}_2^+$ (i.e. $+1, +1$), correspondant aux chemins

$$a_0 \xrightarrow{u_1} a_1 \xrightarrow{u_2} a_2,$$

on peut associer à un tel chemin le chemin de type $[\mathbf{\Delta}_1^+]$

$$a_0 \xrightarrow{u_2 u_1} a_2,$$

ou aussi le chemin de type $\mathbf{\Delta}_2^+$

$$a_0 \xrightarrow{u_2 u_1} a_2 \xrightarrow{\mathrm{id}} a_2,$$

etc. Comme le foncteur

$$\begin{cases} X & \longmapsto & \mathrm{Ch}_\tau(X) & (= \mathrm{Ob}\,\underline{\mathrm{Ch}}_\tau(X)) \\ \mathrm{Cat} & \longrightarrow & (\mathrm{Ens}) \end{cases}$$

est *représenté* par l'objet I_τ de X [plutôt de Cat], le sorite des foncteurs représentables nous dit que de telles lois de formation de chemins de type τ à partir des chemins de type τ' [plutôt τ' à partir des chemins de type τ] correspondent biunivoquement aux flèches dans Cat

$$I_{\tau'} \xrightarrow{\varphi} I_\tau\ ,$$

en prenant simplement la 'loi' correspondante à φ p. 14

$$c \longmapsto c \circ \varphi \qquad \text{pour } c : I_\tau \longrightarrow X.$$

De façon plus précise, l'application naturelle

$$\underbrace{\mathrm{Hom}_{\mathrm{Cat}}(I_{\tau'}, I_\tau)}_{=\mathrm{Ob}\,\underline{\mathrm{Hom}}(I_{\tau'}, I_\tau)} \longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathrm{Ch}_\tau, \mathrm{Ch}_{\tau'}),$$

où le deuxième Hom est considéré comme un Hom d'objets dans $\mathrm{Cat}^\vee = \underline{\mathrm{Hom}}(\mathrm{Cat}, \mathrm{Ens})$. Ainsi, dans les deux exemples plus haut, où $\tau = \mathbf{\Delta}_2^+$ et $\tau' = \mathbf{\Delta}_1^+$ ou $\mathbf{\Delta}_2^+$, les foncteurs en sens inverse sont [page 22]

$$\begin{array}{lc} \mathbf{\Delta}_2^+ \left\{ \right. & 0 \longrightarrow 1 \longrightarrow 2 \\ & \uparrow \qquad\quad \uparrow \\ \mathbf{\Delta}_1^+ \left\{ \right. & 0 \longrightarrow\!\!\!\!\longrightarrow 1 \end{array}$$

et

$$\begin{array}{lc} \mathbf{\Delta}_2^+ \left\{ \right. & 0 \longrightarrow 1 \longrightarrow 2 \\ & \uparrow \qquad \nearrow \quad \uparrow \\ \mathbf{\Delta}_2^+ \left\{ \right. & 0 \longrightarrow 1 \longrightarrow 2\,. \end{array}$$

C'est là un principe général pour ramener toutes les 'opérations' $\pm$ canoniques sur des chemins dans des catégories arbitraires, et des énoncés les concernant, à des questions où X disparaît et où on travaille dans les catégories intervalles elles-mêmes. Un des avantages techniques, c'est que ce sont des catégories fort petites, donnant lieu de plus à une intuition topologique sûre (qui risque de se volatiliser par moments en travaillant [page 23]

dans des catégories de chemins), et aussi que dans de telles catégories, donc aussi dans les catégories de foncteurs entre elles, il y a toujours au plus *une seule flèche* allant d'un objet donné vers un autre. En d'autres termes, dans de telles catégories tous les diagrammes sont commutatifs.

Bien sûr, on voit aussi que si on a une loi de formation L de chemins de type τ' à partir de chemins de type τ (avec la condition de fonctorialité par rapport à la catégorie X où on prend les chemins), cette loi est nécessairement *fonctorielle par rapport aux chemins :* si on a un homomorphisme

$$c \xrightarrow{v} c' \qquad \text{dans } \underline{\mathrm{Ch}}_\tau(X),$$

alors la loi L 'se prolonge' à de tels v pour donner p. 15

$$L(c) \xrightarrow{L(v)} L(c'),$$

avec les relations habituelles

$$L(\mathrm{id}_C) = \mathrm{id}_{L(c)}, \qquad L(v'v) = L(v')L(v).$$

Cela résulte de la description de L comme une opération L_φ en termes d'un foncteur bien déterminé

$$I_{\tau'} \xrightarrow{\varphi} I_\tau,$$

lequel à son tour donne pour toute X un *foncteur*

$$\begin{cases} \underline{\mathrm{Ch}}_\tau(X) & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Ch}}_{\tau'}(X) \\ c & \longmapsto & c \circ \varphi \end{cases}$$

plus précis que simplement un *application* $\mathrm{Ch}_\tau(X) \longrightarrow \mathrm{Ch}_{\tau'}(X)$ entre les ensembles d'objets correspondants.

On a le choix maintenant entre

a) Une étude plus ou moins systématique des foncteurs entre intervalles. Je préfère attendre pour cela d'avoir besoin de ceci et de cela, et de ne faire que le strict minimum pour les constructions que j'ai en vue. [page 24]

b) Une description de la compositions des chemins.

c) Un formalisme des catégories de chemins *de type non précisé.*

Comme mon objectif est surtout de décrire de telles catégories $\underline{\mathrm{Ch}}(X)$ (sans indice τ !), avec des bonnes propriétés, je commencerai par c), regarderai ensuite b) comme un test crucial pour l'utilisabilité des notions obtenues, et enfin m'occuperai de a) quand je saurai de quoi j'aurai en besoin.

4 Catégorie de chemins $\underline{\mathrm{Ch}}(X)$ p. 16

Je veux 'inclure' toutes les catégories $\underline{\mathrm{Ch}}_\tau(X)$ de chemins de tous les types qu'on veut, dans une même catégorie $\underline{\mathrm{Ch}}(X)$. Rappelons

$$\underline{\mathrm{Ch}}_\tau(X) = \underline{\mathrm{Hom}}(I_\tau, X),$$

où I_τ est l'intervalle (orienté) standard de type τ.

L'ensemble de tous les types d'intervalles peut être identifié au monoïde libre Ty à

6. Le foncteur φ est celui qui associe à tout chemin c, de type τ, le *chemin opposé* c^{opp} ou c^{-1}, de type τ^{opp}. Si $\tau = \tau^{\mathrm{opp}}$, c'est donc un chemin *de même type,* et φ est un *automorphisme* de $\underline{\mathrm{Ch}}_\tau(X)$. Cet automorphisme (fonctoriel en X) est déduit d'un automorphisme θ de I, cf. ci-dessous. [page 25]

deux générateurs Δ^+ et Δ^-, dont les éléments sont les suites finies quelconques (eventuellement vides) d'objets alternativement égales à Δ^+ et à Δ^-. Si le premier élément est Δ^+, on a un type de chemin à direction initiale directe, rétrograde dans le cas contraire. La décomposition de I_τ, ou de $\mathrm{Fl}\,(I_\tau)$, en intervalles critiques correspond à l'écriture réduite d'un mot comme

$$(\Delta^+)^{l_1}(\Delta^-)^{l_2}\ \cdots\ (\Delta^?)^{l_r} \qquad (\Delta^? = \Delta^+ \text{ si } r \text{ impair, } \Delta^? = \Delta^- \text{ si } r \text{ pair}),$$

ou comme

$$(\Delta^-)^{l_1}(\Delta^+)^{l_2}\ \cdots\ (\Delta^?)^{l_r} \qquad (\Delta^? = \Delta^- \text{ si } r \text{ impair, } \Delta^? = \Delta^+ \text{ si } r \text{ pair}).$$

Les l_i sont les longueurs des intervalles critiques successifs (ou des chaines structurales successives), leur nombre est la longueur réduite de l'intervalle.

On va considérer Ty comme l'ensemble des objets d'une catégorie $\underline{\mathrm{Ty}}$:

$$\begin{cases} \mathrm{Ob}\,\underline{\mathrm{Ty}} = \mathrm{Ty} = \text{ monoïde libre à deux générateurs } \Delta^+,\ \Delta^- \text{ précédents.} \\ \text{Si } \tau, \tau' \in \mathrm{Ty},\ \mathrm{Hom}(\tau, \tau') = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Cat}}(I_\tau, I_{\tau'}). \end{cases}$$

([7]). On notera qu'on a non seulement un ensemble $\mathrm{Hom}_{\mathrm{Cat}}(I_\tau, I_{\tau'})$, mais même une catégorie $\underline{\mathrm{Hom}}(I_\tau, I_{\tau'})$, ce qui revient ici à dire que $\mathrm{Hom}(I_\tau, I_{\tau'})$ (i.e. $\mathrm{Hom}(\tau, \tau')$) peut être vu comme un ensemble *ordonné.* Mais pour l'instant nous allons ignorer cette relation d'ordre.

[page 26]

La composition des morphismes est la composition des foncteurs entre catégories I_τ. Ainsi on a un foncteur *pleinement fidèle* ([8]) canonique

$$\tau \longmapsto I_\tau : \underline{\mathrm{Ty}} \xrightarrow{\rho} (\mathrm{Cat}) \qquad ([9]),$$

par quoi la catégorie I_τ `[plutôt` $\underline{\mathrm{Ty}}$`]` pourrait s'identifier à une sous-catégorie pleine de (Cat) (celle des I_τ). Mais je préfère ne pas identifier $\tau \in \mathrm{Ty}$ (donnée combinatoire) avec I_τ (donnée catégorique). p. 17

Soit X une (petite ?) catégorie. On a un contrafoncteur

$$\begin{cases} S & \longmapsto & \underline{\mathrm{Hom}}(S, X) \\ (\mathrm{Cat})^o & \longrightarrow & (\mathrm{Cat}) \end{cases}$$

défini par X, d'où en composant avec ρ un contrafoncteur

$$\underline{\mathrm{Ty}}^o \xrightarrow{\mathrm{CH}_X} \mathrm{Cat}.$$

C'est le contrafoncteur

$$\begin{cases} \tau \longmapsto \underline{\mathrm{Hom}}(I_\tau, X) \overset{\text{déf}}{=} \underline{\mathrm{Ch}}_\tau(X), \\ \text{i.e. } \mathrm{CH}_X(\tau) = \underline{\mathrm{Ch}}_\tau(X). \end{cases}$$

Mais un contrafoncteur sur une petite catégorie $\underline{\mathrm{Ty}}$ donne lieu à une *catégorie fibrée* (et même scindée) sur celle-ci.

[page 27]

7. Définition un peu canulée, il faut se borner aux homomorphismes de I_τ dans $I_{\tau'}$ compatibles avec source et but - cf. p. 29.

8. faux, cf. annotation marginale page précédente - on ne prend pas *tous* les foncteurs dans Cat entre I_τ et $I_{\tau'}$.

9. foncteur *réalisation* d'un type (combinatoire) d'intervalles.

Je vais désigner cette catégorie fibrée par $\underline{\mathrm{Ch}}(X)$. (Provisoirement - si elle s'avère trop grosse, je la restreindrai …) Ainsi on a

$$\begin{array}{c} \underline{\mathrm{Ch}}(X) \\ \big\downarrow{\scriptstyle \pi_X} \\ \underline{\mathrm{Ty}}\ . \end{array}$$

La fibre de $\underline{\mathrm{Ch}}(X)$ en $\tau \in \mathrm{Ob}\,\underline{\mathrm{Ty}}$ est la catégorie $\underline{\mathrm{Ch}}_\tau(X)$ des chemins de type τ dans X. Cela nous dit donc quelles sont les flèches dans $\underline{\mathrm{Ch}}(X)$ au dessus des flèches identiques dans $\underline{\mathrm{Ty}}$. Mais que sont les flèches plus générales ? On se donne une flèche dans $\underline{\mathrm{Ty}}$

$$\varphi : \tau' \longrightarrow \tau, \qquad \text{i.e. } I_{\tau'} \xrightarrow{\varphi} I_\tau,$$

quelles sont les flèches de $\underline{\mathrm{Ch}}(X)$ au dessus de φ ? Par le sorite général des catégories fibrées, si

$$\begin{aligned} c \in \underline{\mathrm{Ch}}(X)_\tau &= \underline{\mathrm{Ch}}_\tau(X) \overset{\text{déf}}{=} \underline{\mathrm{Hom}}(I_\tau, X) \\ c' \in \underline{\mathrm{Ch}}(X)_{\tau'} &= \underline{\mathrm{Ch}}_{\tau'}(X) \overset{\text{déf}}{=} \underline{\mathrm{Hom}}(I_{\tau'}, X) \end{aligned}$$

on a

$$\boxed{\mathrm{Hom}_\varphi(c', c) \simeq \mathrm{Hom}(c', \underbrace{\varphi^*(c)}_{=c\circ\varphi}).}$$

Donc : les homomorphismes du chemin c' de type τ' dans X, dans le chemin c de type τ, 'au dessus' du morphisme φ de τ' dans τ, i.e. du foncteur

p. 18 [page 28]

$$\varphi : I_{\tau'} \longrightarrow I_\tau,$$

est un homomorphisme v de c' dans $c \circ \varphi$, i.e.

$$\begin{array}{ccc} I_{\tau'} & \xrightarrow{\varphi} & I_\tau \\ & \searrow^{c'} & \big\downarrow{\scriptstyle c} \\ & & X. \end{array} \qquad (v)$$

La composition des flèches est évidente :

$$\begin{array}{ccccc} I_{\tau''} & \xrightarrow{\varphi'} & I_{\tau'} & \xrightarrow{\varphi} & I_\tau \\ & \searrow^{c''} & \xrightarrow{v'} & \searrow^{c'} & \big\downarrow{\scriptstyle c} \\ & & & & X, \end{array} \qquad (v)$$

on a

$$\begin{aligned} v : \quad c' &\longrightarrow c \circ \varphi, \quad \text{d'où } c' \circ \varphi' \xrightarrow{v*\varphi'} \underbrace{(c \circ \varphi) \circ \varphi'}_{=c\circ(\varphi\varphi')} \\ v' : \quad c'' &\longrightarrow c' \circ \varphi' \end{aligned}$$

et

$$v'' = (v * \varphi') \circ v', \qquad \text{donc} \qquad c'' \xrightarrow{v'} c' \circ \varphi' \xrightarrow{v*\varphi'} c \circ (\varphi\varphi'). \qquad (v'')$$

Mais a-t-on des foncteurs source et but

$$\underline{\mathrm{Ch}}(X) \underset{\beta}{\overset{\sigma}{\rightrightarrows}} X \qquad \begin{array}{ccc} c & \longmapsto & \mathrm{source}(c) \\ c & \longmapsto & \mathrm{but}(c) \end{array} \qquad ?$$

Il faudrait donc qu'un homomorphisme v comme dessus

$$v : c' \longrightarrow c \circ \varphi$$

définisse

$$\begin{array}{rccc} \sigma(c): & \mathrm{source}(c') & \longrightarrow & \mathrm{source}(c) \\ \beta(c): & \mathrm{but}(c') & \longrightarrow & \mathrm{but}(c). \end{array}$$

Mais comme

p. 19

$$\begin{cases} \sigma(c) = c(0_\tau),\ \beta(c) = c(1_\tau) \\ \text{où } 0_\tau,\ 1_\tau \text{ sont les objets source et but de l'intervalle orienté standard } I_\tau\ , \end{cases}$$

[page 29]

et de même pour τ', v n'induira bien

$$\underbrace{\sigma(c')}_{=c'(0_{\tau'})} \longrightarrow c(\varphi(0_{\tau'})) \overset{?}{=} \underbrace{\sigma(c)}_{c(0_\tau)},$$

et itou pour $\beta(c')$ et $\beta(c)$, que si on impose

$$\boxed{\begin{cases} \varphi(0_{\tau'}) = 0_\tau \\ \varphi(1_{\tau'}) = 1_\tau, \end{cases}}$$

i.e. que le foncteur envisagé φ soit *compatible avec la source et le but.* C'est ce visiblement qu'il fallait imposer dans la définition de

$$\mathrm{Hom}_{\underline{\mathrm{Ty}}}(\tau', \tau) = \underline{\mathrm{Hom}}^{\textcircled{\scriptsize int}}(I_{\tau'}, I_\tau) \quad \text{-}$$

il faut prendre les foncteurs φ respectant les structures d'intervalle, i.e. rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc} I_{\tau'} & \longrightarrow & I_\tau \\ & {\scriptstyle i_{\tau'}} \nwarrow \quad \nearrow {\scriptstyle i_\tau} & \\ & \varepsilon = \{0,1\} & \end{array}$$

définissant l'orientation de $I_{\tau'}$ et de I_τ ([10]). Cette rectification faite, j'ai bon espoir que la catégorie $\underline{\mathrm{Ch}}(X)$ qu'on vient de construire est 'la bonne'. On pourrait désigner par $\underline{\mathrm{CH}}(X)$ la catégorie plus grande, sur la catégorie $\underline{\mathrm{Typ}}$ ayant mêmes objets que $\underline{\mathrm{Ty}}$, mais plus de morphismes : à savoir

$$\begin{array}{rcl} \mathrm{Hom}_{\underline{\mathrm{Typ}}}(\tau, \tau') & = & \mathrm{Hom}_{\mathrm{Cat}}(I_\tau, I_{\tau'}) \\ \mathrm{Hom}_{\underline{\mathrm{Ty}}}(\tau, \tau') & = & \mathrm{Hom}^{\mathrm{int}}_{\mathrm{Cat}}(I_\tau, I_{\tau'}) \\ & & \text{(homomorphismes respectant la structure d'intervalle).} \end{array}$$

[page 30]

On aura

$$\underline{\mathrm{Ch}}(X) \simeq \underline{\mathrm{CH}}(X) \times_{\underline{\mathrm{Typ}}} \underline{\mathrm{Ty}},$$

i.e. $\underline{\mathrm{Ch}}(X)$ est la *restriction* de la catégorie fibrée $\underline{\mathrm{CH}}(X)$ sur $\underline{\mathrm{Typ}}$, à la sous-catégorie

10. En fait, il faut sans doute restreindre encore plus les morphismes en exigeant qu'il soient *croissants* sur les objets - cf. page 31.

p. 20

(non-pleine) $\underline{\mathrm{Ty}}$ de $\underline{\mathrm{Typ}}$.

NB Les catégories fibrées $\underline{\mathrm{CH}}(X)$, $\underline{\mathrm{Ch}}(X)$ sur $\underline{\mathrm{Typ}}$, $\underline{\mathrm{Ty}}$ dépendent fonctoriellement de X, variant dans (Cat), comme il se doit. Comme de juste, on s'y intéresse surtout quand X *n'est pas* dans (Cat), i.e. quand X est une 'grosse' catégorie (telle que (Cat) elle-même). Je me dispense d'expliciter ici les questions pertinentes d'Univers.

Deux tests essentiels, pour s'assurer si la notion est bonne

a) La théorie des $\mathcal{M}\Sigma^{-1}$.

b) La composition des chemins doit bien marcher.

On a le diagramme de foncteurs canoniques [page 31]

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{Ty}} & \hookrightarrow & \varepsilon\backslash\mathrm{Cat} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \underline{\mathrm{Typ}} & \hookrightarrow & \mathrm{Cat}, \end{array}$$

où les flèches horizontales sont pleinement fidèles.

p. 21

5 Propriétés des morphismes d'intervalles

Je me suis plus ou moins convaincu que pour se prêter à des calculs et à des raisonnements simples, il faut encore plus restreindre les morphismes dans la définition de la catégorie $\underline{\mathrm{Ty}}$. Je vais exiger que les morphismes $\tau \longrightarrow \tau'$ soient des foncteurs

$$w : I_\tau \longrightarrow I_{\tau'}$$

qui sont compatibles avec la structure d'*intervalles orientés* de I_τ, $I_{\tau'}$, i.e. qu'ils transforment source en source, but en but, mais de plus qu'ils soient *croissants* sur les objets (pour la relation d'ordre de progression des chemins). C'est une restriction qui géométriquement me paraît assez naturelle. (Elle est similaire à la restriction analogue, dans la définition pré-catégorique des morphismes entre $\mathbf{\Delta}_i$ …) C'est cette hypothèse qui permet de faire une théorie de structure assez simple des morphismes d'intervalles. Mais pour l'instant je vais distinguer 'morphismes' et 'morphismes croissants'.

Soit [page 32]

$$f : I_\tau \longrightarrow I_{\tau'}$$

un morphisme d'intervalles orientés. Considérons les sous-catégories pleines, isomorphes à des Δ_i^+ ou Δ_i^- comme intervalles orientés, définis par les intervalles critiques de I_τ. Ils forment une suite Σ_τ de sous-catégories de I_τ

$$\Sigma_\tau = (\mathbf{\Delta}_{l_1}^{\varepsilon_1}(\tau), \mathbf{\Delta}_{l_2}^{\varepsilon_2}(\tau), \ldots, \mathbf{\Delta}_{l_r}^{\varepsilon_r}(\tau))$$

dont I_τ est la somme amalgamée (on reviendra sur ce point plus `[bas]`), r étant la longueur utile de τ. On les appelle les *sous-intervalles critiques* de I_τ. Ainsi f se décompose en une suite de morphismes

$$f_i : \mathbf{\Delta}_{l_i}^{\varepsilon_i} \longrightarrow I_{\tau'}, \qquad i \in [1, r],$$

tels que

a) pour $i \in [1, r-1]$, le but de f_i soit égal à la source de f_{i+1}.
De plus,

b) f_1 transforme source en source, et f_r transforme but en but. [page 33]

Inversement, quand on se donne des f_i satisfaisant ces deux conditions, ils définissent un morphisme d'intervalles f unique. (Et si la condition b) n'est pas exigée, on trouve une description des morphismes de catégories $I_\tau \longrightarrow I_{\tau'}$.)

On va d'abord regarder un foncteur quelconque

$$f : \mathbf{\Delta}_i^\varepsilon \longrightarrow I_{\tau'} \qquad (\varepsilon \in \{\pm 1\}) \quad .$$

Supposons pour fixer les idées que $\varepsilon = +1$, i.e. que le premier membre soit un intervalle critique direct … On trouve que f se factorise par un sous-intervalle critique de $I_{\tau'}$, soit $\mathbf{\Delta}_j^{\varepsilon'}$. Il est donc défini par une application croissante de $\mathbf{\Delta}_i^\varepsilon$ dans $\mathbf{\Delta}_j^{\varepsilon'}$ (si ε, ε' [sont] de même signe), une application décroissante dans le sens inverse ([11]). Mais si on exige que f soit croissant, alors il faut que *ou bien* f soit constant (auquel cas, si sa valeur n'est pas une extrémité de $I_{\tau'}$, il y a exactement *deux* intervalles critiques de $I_{\tau'}$ par lesquels se factorise f) *ou bien* f non constant et $\varepsilon = \varepsilon'$ (et en tous cas, si f non constant, alors l'intervalle critique par lequel se factorise f est unique). Pour résumer : p. 22

Proposition 7. *Soient I_τ, $I_{\tau'}$ deux intervalles orientés,*

$$f : I_\tau \longrightarrow I_{\tau'}$$

un foncteur. Alors pour tout intervalle critique $J \subseteq I_\tau$ tel que $f|J$ soit non constant, il existe un unique intervalle critique $J' \subseteq I_{\tau'}$ tel que $f|J$ se factorise par J', i.e. tel que $f(J) \subseteq J'$. Si f est croissant, alors J et J' sont de même signe, i.e. tous deux directs, ou tous deux rétrogrades. [page 34]

Ainsi, si on regarde la suite $s_0, s_1, \ldots, s_n$ des sommets critiques de τ, alors

$$t_0 = f(s_0),\ t_1 = f(s_1),\ \ldots\ ,\ t_n = f(s_n)$$

forment une suite de sommets de $I_{\tau'}$, telle que deux consécutifs soient reliés par une flèche de $I_{\tau'}$. Donc la sous-catégorie pleine de $I_{\tau'}$ définie par ces t_i est connexe, c'est donc un sous-intervalle. Si f est croissant, ce sous-intervalle est $[t_0, t_n]$. Si f est un morphisme d'intervalles, il contient tous les sommets critiques de $I_{\tau'}$. Dans tous les cas, prenant t_i, t_j $(i < j)$ et appliquant ce qui précède à $f|J$, où J est le sous-intervalle de I d'origine s_i, d'extrémité s_j, on voit que tout sommet critique de $I_{\tau'}$ compris entre t_i et t_j est parmi les t_k $(i \leq k \leq j)$. Pour résumer :

Corollaire. *Soient $s_i \leq s_j$ deux sommets critiques de $I_{\tau'}$. Alors tout sommet critique de $I_{\tau'}$ compris entre $f(s_i) = t_i$ et $f(s_j) = t_j$, est l'image d'un sommet critique s_k compris entre s_i et s_j (i.e. $i \leq k \leq j$). En particulier, si f est un morphisme d'intervalles,*


$$f(I_{\tau\,\text{réd}}) \supseteq I_{\tau'\,\text{réd}}$$

(où $I_{\tau\,\text{réd}}$ désigne l'ensemble des sommets critiques de I_τ ou aussi le sous-intervalle réduit qu'il définit).

On fera attention que même si f est croissant, on *n'a pas* en général $f(I_{\tau\,\text{réd}}) \subseteq I_{\tau'\,\text{réd}}$, i.e. f ne transforme pas forcément sommets critiques en sommets critiques, Exemple minimal : [page 35] p. 23

Φ_3^+ :

$\mathbf{\Delta}_2^+$:



Φ_3^+ est réduite, les deux sommets critiques transformés en le sommet non critique 1.

11. **Lemme.** *Si $I_{\tau'}$ est un intervalle, toute partie J de $I_{\tau'}$ telle que pour deux éléments de J, il existe toujours une flèche de l'un dans l'autre, est contenue dans un intervalle critique (unique si* $\operatorname{card} J \geq 2$*).*

Désignons par $\mathrm{Cr}(\tau)$ l'ensembles des intervalles critiques de I_τ, en correspondance biunivoque (respectant l'ordre total) avec l'ensemble des flèches de transition de $I_{\tau\,\mathrm{réd}}$,

$$\mathrm{Cr}(\tau) \simeq \mathrm{Fl\,tr}\,(I_{\tau\,\mathrm{réd}}).$$

Soit, pour un foncteur

$$f : I_\tau \longrightarrow I_{\tau'},$$

$\mathrm{Cr}(\tau, f)$ l'ensemble des intervalles critiques de I_τ sur lesquels f ne soit pas constant. On a alors une application

$$\mathrm{Cr}(\tau, f) \longrightarrow \mathrm{Cr}(\tau') \qquad (*)$$

induite par f via la proposition 7, associant à tout $J \in \mathrm{Cr}(\tau, f)$ l'unique $J' \in \mathrm{Cr}(\tau')$ tel que $f(J) \subseteq J'$. On a de plus

Corollaire 2.

a) L'image de $(*)$ *est un segment de l'ensemble totalement ordonné* $\mathrm{Cr}(\tau')$*, i.e. si deux intervalles critiques* J'*,* J'' *dans* $I'_{\tau'}$ *sont dans l'image, il en est de même de tous ceux qui sont compris entre eux.* [page 36]

b) Cette image contient aussi l'intervalle critique de $I_{\tau'}$ *(il y en a au plus un) qui contient* $f(0_\tau)$ *(resp.* $f(1_\tau)$*) et dont l'intersection avec le segment* $[f(0_\tau), f(1_\tau)]$ *est de cardinal* ≥ 2*, ainsi que tous les intervalles critiques contenus dans ledit segment.*

c) Si f *est un morphisme d'intervalles orientés, alors l'application induite*

$$\mathrm{Cr}(f) : \mathrm{Cr}(\tau, f) \longrightarrow \mathrm{Cr}(\tau')$$

est surjective. De façon plus précise, soit $J' \subseteq \mathrm{Cr}(\tau')$*, et soit* $J = f^{-1}(J')$*. Alors* $\mathrm{Cr}(f)^{-1}(\{J'\})$ *est formé des intervalles critiques dans* $\mathrm{Cr}(\tau, f)$ contenus dans J*. On a de plus,* si f est croissant,

$$\mathrm{long}(J') = \sum_{K \in \mathrm{Cr}(f)^{-1}(\{J'\})} \pi_{\mathrm{n}}(K, f),$$

où $\pi_{\mathrm{n}}(K, f)$ *est la 'partie' (numérique) de* $f|K$*, i.e. la longueur de l'intervalle* $[f(0_K), f(1_K)]$*. (***NB** *Si* K *est un intervalle critique de* I *tel que* $K \notin Cr(\tau, f)$*, i.e.* $f|K$ *est constant, on posera* $\pi_{\mathrm{n}}(K, f) = 0$*. Donc la formule précédente se lit aussi*

$$\mathrm{long}(J') = \sum_{\underbrace{K \in \mathrm{Cr}(I_\tau),\ K \subseteq J}_{\text{(i.e. } K \in \mathrm{Cr}(f^{-1}(J')))}} \pi_{\mathrm{n}}(K, f).\ )$$

Corollaire 3. *Si* f *est un morphisme* croissant *d'intervalles orientés, alors pour tout* $J' \in \mathrm{Cr}(\tau')$*, on a* p. 24

$$(0 \leq)\ \mathrm{card}\,\mathrm{Cr}(f)^{-1}(\{J\}) \longrightarrow \mathrm{long}(J'),$$

l'égalité n'étant obtenue que si les parties de f *sur les intervalles critiques de* I_τ *qui sont au dessus de* J' *sont toutes égales à* 0 *ou* 1 *(donc si et seulement si sur les* $J \in \mathrm{Cr}(f)^{-1}(\{J'\})$*, elles sont égales à* 1*).* [page 37]

Corollaire 4. *Supposons de plus* I' [$= I_{\tau'}$] *réduit. Alors*

$$Cr(f) : Cr(\tau, f) \longrightarrow Cr(\tau')\ (\simeq \mathrm{Fl\,tr}(\tau'))$$

est bijective.

Donc dans ce cas, τ' réduit, on obtient une application en sens inverse

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Tr}(\tau') \simeq \mathrm{Cr}(\tau') & \xrightarrow{\mathrm{Cr}^*(f)} & \mathrm{Cr}(\tau) \\ & {\scriptstyle \mathrm{Cr}(f)^{-1}} \searrow \quad \nearrow {\scriptstyle \text{inclusion}} & \\ & \mathrm{Cr}(\tau, f), & \end{array}$$

application qui transforme l'intervalle critique J' $(= \{i-1, i\})$ en l'*unique* intervalle critique J de I_τ tel que

$$f(J) = J'.$$

Mais $J \simeq \mathbf{\Delta}_i^\varepsilon$, et on a donc un morphisme *surjectif* [page 38]

$$f_0 : \mathbf{\Delta}_i^\varepsilon \longrightarrow J' \simeq \mathbf{\Delta}_1^\varepsilon.$$

On voit tout de suite qu'il existe alors une *unique* flèche de transition u de $\mathbf{\Delta}_i^\varepsilon$, telle que $f(u) \neq \mathrm{id}$. Donc on trouve le corollaire suivant, plus précis que le corollaire 4 :

Corollaire 5. *Soit $f : I_\tau \longrightarrow I_{\tau'}$ un morphisme croissant d'intervalles orientés, avec $I_{\tau'}$ réduit, et soit $\mathrm{Tr}(\tau, f)$ l'ensemble des flèches de transition $\underline{u}_i$ de I_τ telle que $f(\underline{u}_i) \neq \mathrm{id}$, i.e. telles que $\pi(u_i, f) = 1$. Alors f induit une application*

$$\mathrm{Tr}(\tau, f) \longrightarrow \mathrm{Tr}(\tau')$$

qui est bijective, et (bien sûr) croissante, donc un isomorphisme d'ensembles ordonnés.

Ainsi l'application $\mathrm{Tr}(\tau') \longrightarrow \mathrm{Cr}(\tau, f)$ de tantôt se précise par une application bijective

$$\mathrm{Tr}(f)^* : \mathrm{Tr}(\tau') \longrightarrow \mathrm{Tr}(\tau, f),$$

reliée à $\mathrm{Cr}(f)^*$ plus haut par le triangle commutatif

$$\begin{array}{ccc} & & \mathrm{Tr}(\tau, f) \\ & {\scriptstyle \mathrm{Tr}(f)^*} \nearrow & \big\downarrow {\scriptstyle \wr\ \alpha} \\ \mathrm{Tr}(\tau') & & \\ & {\scriptstyle \mathrm{Cr}(f)^*} \searrow & \\ & & \mathrm{Cr}(\tau, f), \end{array}$$

l'application α associant à toute $u_i \in \mathrm{Tr}(\tau, f)$ l'unique intervalle critique qui 'contienne' u_i (i.e. tel que u_i soit une flèche dudit intervalle, ou encore, fasse partie de la 'chaîne critique' associée …). p. 25 [page 39]

On a mieux encore :

Proposition 8. *Soient $\tau, \tau' \in \mathrm{Ty}$, τ' réduit. Pour tout morphisme croissant d'intervalles orientés*

$$f : I_\tau \longrightarrow I_{\tau'}$$

(on va dire simplement que f est une flèche dans $\underline{\mathrm{Ty}}$, et écrire $f \in \mathrm{Hom}_{\underline{\mathrm{Ty}}}(I_\tau, I'_\tau)$), associons lui la partie $\mathrm{Tr}(\tau, f)$ des flèches de transition de I_τ non dégénérées pour f. Ces flèches forment un ensemble totalement ordonné affecté de signes $+$ ou $-$ (caractère direct ou rétrograde des flèches), et f induit une bijection d'ensembles totalement ordonnés

$$\underbrace{E_f}_{\subseteq \mathrm{Tr}(\tau)} = \mathrm{Tr}(\tau, f) \simeq \mathrm{Tr}(\tau'),$$

et même un isomorphisme d'ensembles totalement ordonnés 'affectés de signes'. Ainsi, à toute f on associe une partie E_f de $\mathrm{Tr}(\tau)$, et telle que son 'type' soit égal à τ'. Désignons par

$$\mathfrak{P}_{\tau'}(\mathrm{Tr}(\tau)) \subseteq \mathfrak{P}(\mathrm{Tr}(\tau))$$

l'ensemble des parties E de $\mathrm{Tr}(\tau)$ dont le type soit τ'.

Alors l'application [page 40]

$$f \longmapsto \mathrm{Tr}(\tau, f) : \mathrm{Hom}_{\underline{\mathrm{Ty}}}(\tau, \tau') \longrightarrow \mathfrak{P}_{\tau'}(\mathrm{Tr}(\tau))$$

est bijective *: se donner un morphisme $f : \tau \longrightarrow \tau'$ dans* $\underline{\mathrm{Ty}}$, revient au même *que de se donner une suite strictement croissante de flèches de transition*

$$\underline{u}_{i_1},\ \underline{u}_{i_2},\ \ldots\ ,\underline{u}_{i_{n'}} \qquad (n' = \log \tau')$$

dans I_τ ($i_1 < i_2 < \cdots < i_{n'}$), telle que la suite des signatures correspondante

$$(\varepsilon_{i_1}, \varepsilon_{i_2}, \ldots, \varepsilon_{i_{n'}}) = \tau'$$

soit égale à τ'.

Corollaire 1. *Pour tout τ, on a des bijections canoniques*

$$\begin{cases} \mathrm{Tr}^+(\tau) & \simeq & \mathrm{Hom}_{\underline{\mathrm{Ty}}}(\tau, \Delta^+) \\ \mathrm{Tr}^-(\tau) & \simeq & \mathrm{Hom}_{\underline{\mathrm{Ty}}}(\tau, \Delta^-), \end{cases}$$

fonctorielles en τ *(variant dans* $\underline{\mathrm{Ty}}$*).*

Pour donner un sens au corollaire, il faut définir

$$\tau \longmapsto \mathrm{Tr}^+(\tau), \qquad \tau \longmapsto \mathrm{Tr}^-(\tau)$$ p. 26

comme *foncteurs* contravariant en τ, donc pour un morphisme

$$f : I_{\tau_2} \longrightarrow I_{\tau_1}$$

dans $\underline{\mathrm{Ty}}$, définir des applications

$$\begin{array}{rcl} \mathrm{Tr}^+(f)^* : \mathrm{Tr}^+(\tau_1) & \longrightarrow & \mathrm{Tr}^+(\tau_2) \\ \mathrm{Tr}^-(f)^* : \mathrm{Tr}^-(\tau_1) & \longrightarrow & \mathrm{Tr}^-(\tau_2), \end{array}$$ [page 41]

en d'autres termes, une application

$$\mathrm{Tr}(f)^* : \mathrm{Tr}(\tau_1) \quad \longrightarrow \quad \mathrm{Tr}(\tau_2)$$

'compatible avec les signatures'. Dans le corollaire 5 plus haut, on a défini une telle application seulement pour τ' réduit $[\tau_1 = \tau',\ \tau_2 = \tau]$ ([12]). Pour une flèche u de I_τ, appelons *partie ensembliste* de f sur u, où de u pour f, la partie ensembliste de la flèche $f(u)$ dans $I_{\tau'}$, i.e. le segment $[f(i-1), f(i)] \subseteq I_{\tau'}$ (ici $u = \underline{u}_i$). Soit

$$\underline{u}_{i_1},\ \ldots\ ,\underline{u}_{i_N} \qquad \text{ou } (v_1, v_2, \ldots, v_n)$$

la suite croissante des éléments de $\mathrm{Tr}(\tau, f)$, on voit alors par récurrence sur i que pour $i \in [1, N-1]$, on a

$$\begin{array}{rcl} f(\mathrm{but}(v_i)) & = & f(\mathrm{source}(v_{i+1}))\ \ (= t_i), \\ f(\mathrm{source}(v_1)) & = & 0_{\tau'}, \\ f(\mathrm{but}(v_N)) & = & 1_{\tau'}. \end{array}$$

12. Ce qui suit ne fait pas intervenir les signatures - c'est un sorite sur les applications croissantes entre ensembles finis totalement ordonnés.

Considérons la suite

$$\{\overbrace{0_{\tau'}}^{=t_0}, t_1, t_2, \ldots, t_{N-1}, \overbrace{1_{\tau'}}^{=t_N}\},$$

elle est définie par le sous-ensemble correspondant de $I_{\tau'}$, qu'on appelera l'ensemble des *sommets critiques de $I_{\tau'}$ pour f*. C'est une suite contenant $0_{\tau'}$, $1_{\tau'}$, et telle que deux éléments consécutifs sont reliés dans $I_{\tau'}$ par une flèche, ce qui équivaut à dire qu'elle contient les sommets critiques (intrinsèques) de $I_{\tau'}$. D'autre part, pour tout intervalle de transition $[i-1, i]$ de $I_{\tau'}$ ($i \in [1, n']$), il existe un et un seul intervalle de transition p. 27
$[t_{j-1}, t_j]$ pour cette suite ($j \in [1, N]$), telle qu'on ait $[i-1, i] = [t_{j-1}, t_j]$. C'est dire qu'il [page 42]
existe une et une seule $v_j \in \mathrm{Tr}(\tau, f)$ telle que la partie de f sur v_j (savoir justement $[j-1, j]$) contienne (celle de) $\underline{u}_i$. Pour résumer :

Corollaire 2. *Soit $f : \tau \longrightarrow \tau'$ dans $\underline{\mathrm{Ty}}$. Alors pour toute $u \in \mathrm{Tr}(\tau') = \mathrm{Tr}(I_{\tau'})$, il existe une et une seule $v \in \mathrm{Tr}(\tau)$ telle que la partie de f sur v contienne u. De plus, les signatures de u et de v sont égales.*

C'est ainsi qu'on obtient donc une application

$$\mathrm{Tr}(f)^* : \mathrm{Tr}(\tau') \quad \longrightarrow \quad \mathrm{Tr}(\tau) \qquad \text{(se factorisant par } \mathrm{Tr}(\tau, f))$$

induisant

$$\begin{array}{rcl} \mathrm{Tr}^+(f)^* : \mathrm{Tr}^+(\tau') & \longrightarrow & \mathrm{Tr}^+(\tau) \\ \mathrm{Tr}^-(f)^* : \mathrm{Tr}^-(\tau') & \longrightarrow & \mathrm{Tr}^-(\tau). \end{array}$$

La transitivité pour un composé

$$\tau \xrightarrow{f} \tau' \xrightarrow{g} \tau''$$

ou

$$I_\tau \xrightarrow{f} I_{\tau'} \xrightarrow{g} I_{\tau''}$$

est immédiate. Si u, u', u'' sont des flèches de transition dans I_τ, $I_{\tau'}$, $I_{\tau''}$ respectivement, telles que

$$\begin{array}{rcll} \pi(g, u') & \supseteq & \pi(u''), & \text{i.e. } u' = \mathrm{Tr}(g)^*(u'') \\ \pi(f, u) & \supseteq & \pi(u'), & \text{i.e. } u = \mathrm{Tr}(f)^*(u'), \end{array}$$

alors on a

$$\pi(gf, u) \supseteq \pi(u''), \qquad \text{i.e. } u = \mathrm{Tr}(gf)^*(u'').$$

Si les flèches en question ont comme partie intrinsèque $[i-1, i]$, $[i'-1, i']$, $[i''-1, i'']$ [page 43]
respectivement, l'hypothèse est

$$\begin{array}{rclcrcl} g(i'-1) & \leq & i''-1, & & g(i') & \geq & i'' \\ f(i-1) & \leq & i'-1, & & f(i) & \geq & i' \end{array}$$

et comme g est croissant, on a déduit

$$\begin{array}{rcll} gf(i-1) & \leq & g(i'-1) & (\leq i''-1) \\ gf(i) & \geq & g(i') & (\geq i''), \end{array}$$

c.q.f.d.

Ainsi, le corollaire 1 plus haut obtient un sens précis et il est démontré du même coup, vu que les correspondances du corollaire 1 sont données par p. 28

$$\underbrace{f}_{\in \mathrm{Hom}_{\underline{\mathrm{Ty}}}(\tau, \Delta^\varepsilon)} \longmapsto \mathrm{Tr}(f)^*(\underline{u}),$$

où $\underline{u}$ est l'unique flèche de transition de Δ^ε.

On va utiliser ces sorites pour donner, pour tout $\tau \in \underline{\mathrm{Ty}}$, une description combinatoire simple des catégories $\underline{\mathrm{Ty}}/\tau$ et $\tau\backslash\underline{\mathrm{Ty}}$, ou du moins de leurs ensembles d'objets.

1° Description de $\mathrm{Ob}\,(\tau\backslash\underline{\mathrm{Ty}})$**.**

À $f \in \mathrm{Ob}(\tau\backslash\underline{\mathrm{Ty}})$, i.e.

$$f : \tau \longrightarrow \tau' \qquad \text{i.e. } f : I_\tau \longrightarrow I_{\tau'}$$

dans $\underline{\mathrm{Ty}}$, est associé $E = E_f = \mathrm{Tr}(\tau, f) \subseteq \mathrm{Tr}(\tau)$, l'ensemble des flèches de transition critiques (i.e. non dégénérées) pour f. À chaque $u \in E$, associons l'entier $\mathrm{long}(\pi(f, u))$, la *partie* de f sur u. Alors (τ', f) est déterminé de façon unique par le couple [page 44]

$$(E, \pi), \qquad E \in \mathfrak{P}(\mathrm{Tr}(\tau)), \qquad \underbrace{\pi}_{\text{pondération}} : E \longrightarrow \underbrace{\mathbf{N}^*}_{\substack{=\text{ensemble des}\\ \text{entiers}\geq 1}} .$$

Ou si on préfère, par l'application $\pi = \pi_f$

$$\mathrm{Tr}(\tau) \xrightarrow{\pi} \mathbf{N}, \qquad u \longmapsto \pi(u) = \pi(u, f) = \mathrm{long}(\pi_{\tau'}(f(u)))$$

(qui redonne E comme

$$E = \pi^{-1}(\mathbf{N}^*) \qquad).$$

Cette application n'est soumise à aucune restriction,

$$\mathrm{Ob}\,(\tau\backslash\underline{\mathrm{Ty}}) \xrightarrow[\sim]{\text{bij.}} \mathrm{Hom}_{\mathrm{Ens}}(\mathrm{Tr}(\tau), \mathbf{N}).$$

On récupère τ' à partir de π ainsi. On prend $E = \pi^{-1}(\mathbf{N}^*)$ (flèches de transition non dégénérées pour π), E est totalement ordonné par l'ordre induit par celui de $\mathrm{Tr}(\tau)$, il est de plus signaturé `[sic]` par la signaturation `[sic]` de $\mathrm{Tr}(\tau)$, soit

$$(\varepsilon_1, n_1),\ \ldots\ ,\ (\varepsilon_r, n_r)$$

la suite des signatures et pondérations, de la suite des éléments de E ($\varepsilon_i \in \{\pm 1\}$, $n_i \in \mathbf{N}^*$ pour $i \in [1, r]$). Alors,

$$\tau' = \Delta_{\varepsilon_1}^{n_1} \Delta_{\varepsilon_2}^{n_2} \cdots \Delta_{\varepsilon_r}^{n_r}, \qquad r = \mathrm{card}\, E,$$

dans le monoïde libre Ty, où on a désigné par Δ_+, Δ_- (au lieu de Δ^+, Δ^-) les deux générateurs. L'application

$$I_\tau \longrightarrow I_{\tau'}$$

est décrite de façon unique en disant qu'elle est *constante* sur chacune des 'compo- p. 29
santes connexes' (au sens de la numérotation des sommets de I_τ) de l'ensemble $E' = E'(f) \subseteq I_\tau = [0, n]$ des sommets qui sont sources ou buts de flèches de transition dégénérées pour f, i.e. dans $\mathrm{Tr}(\tau)\backslash E$. Et sur le α-ème élément de E ($\alpha \in [1, r = \mathrm{card}\, E]$), d'indice i_α dans $\mathrm{Tr}(\tau)$, f induit le foncteur [page 45]

$$\mathbf{\Delta}_{\varepsilon_\alpha} \simeq \underbrace{J_{i_\alpha}}_{\substack{\text{intervalle}\\ \text{de transition}\\ \text{d'indice } i_\alpha\\ \text{dans } I_\tau}} \longrightarrow I_{\tau'}$$

donné par *l'unique* $\underline{\mathrm{Ty}}$*-flèche* dans I_τ de J_{i_α} dans le α-ème facteur, de type $\Delta_{\varepsilon_\alpha}^{n_\alpha}$, de τ', donné par $(*)$

$$\Delta_{\varepsilon_\alpha}^{n_\alpha} \simeq \text{type de } \mathbf{\Delta}_{n_\alpha}^{\varepsilon_\alpha} \quad \ldots$$

2° Détermination de $\mathrm{Ob}\,(\underline{\mathrm{Ty}}/\tau')$**.**

Si $(\tau, f) \in \mathrm{Ob}\,(\underline{\mathrm{Ty}}/\tau')$, donc

$$f : I_\tau \longrightarrow I_{\tau'},$$

on lui associe tout d'abord la partie

$$\mathrm{Cr}(\tau', f) = E'_f = E' \subseteq I_{\tau'}$$

formée des sommets (dits 'critiques pour f', cf. page 41) de $I_{\tau'}$ qui sont source ou but d'une flèche $f(u)$, où $u \in \mathrm{Tr}(\tau, f)$, i.e. $f(u)$ n'est pas dégénérée ([13]). E' contient $f(I_{\tau\,\mathrm{réd}})$ (i.e. les images par f des sommets critiques de I_τ), mais peut être plus grand. (P.ex. si [page 46]
$\tau = \tau'$, $f = \mathrm{id}$, $E' = I_{\tau'}$, qui est donc strictement plus grand que $I_{\tau'\,\mathrm{réd}}$ si τ' n'est pas réduit.) Pour tout $i \in E'$, considérons $f^{-1}(\{i\}) \subseteq I_\tau$. Comme f [est] croissant, c'est un intervalle de l'ensemble totalement ordonné I_τ, donc c'est un sous-intervalle de la catégorie intervalle I_τ. Comme tel, il a une signature $\tau_i \in \mathrm{Ty}$. On a donc une application

$$\eta_f \text{ ou } \eta : E' \longrightarrow \mathrm{Ty}.$$

Je dis que $(\tau, f) \in \mathrm{Ob}\,(\underline{\mathrm{Ty}}/\tau')$ est déterminé de façon unique par ce couple

$$(E', \eta) \begin{cases} E' \in \mathfrak{P}(I_{\tau'}) = \mathfrak{P}([0, n']) \\ \eta : E' \longrightarrow \mathrm{Ty}\ . \end{cases}$$

De plus, celui-ci est soumis à la seule restriction que

$$E' \supseteq \mathrm{Cr}(\tau') = \text{ensemble des sommets critiques de } I_{\tau'}$$

(où ce qui revient au même, que E' contient $0_{\tau'}$, $1_{\tau'}$ et que deux éléments consécutifs de p. 30
E' sont reliés par une flèche de $I_{\tau'}$) :

$$\begin{cases} \mathrm{Ob}\,(\mathrm{Ty}/\tau') \simeq \text{ensemble des couples } (E', \eta), \text{ avec} \\ \qquad\qquad E' \subseteq [0, \underbrace{n'}_{=\mathrm{long}\,\tau'}], \quad E' \supseteq \mathrm{Cr}(\tau'), \\ \qquad\qquad \eta : E' \longrightarrow \mathrm{Ty}\ . \end{cases}$$

Soit

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_r = n'$$

la suite des éléments de E', soit pour $\boxed{i \in [1, N]}$

$$\left\| \begin{array}{l} l_i = t_i - t_{i-1} \\ \varepsilon_i \quad \text{signature de } [t_{i-1}, t_i] \text{ dans } I_{\tau'}\ , \end{array} \right.$$

et pour $\boxed{i \in [0, N]}$, soit

$$\| \quad \tau_i = \eta(t_i). \qquad \text{[page 47]}$$

Alors le type τ est donné par

$$\tau = \tau_0 \Delta_{\varepsilon_1} \tau_1 \Delta_{\varepsilon_2} \cdots \Delta_{\varepsilon_N} \tau_N, \qquad (*)$$

[de] longueur $N + \sum_{i=0}^{N} \underbrace{\mathrm{long}(\tau_i)}_{\lambda_i \geq 0}$.

13. dégager un lemme f croissante inutile.

3° Description de Fl(Ty).

Si

$$f : \tau \longrightarrow \tau' \qquad \texttt{[est]} \text{ dans } \underline{\mathrm{Ty}} \ ,$$

on lui associe comme tantôt un entier $\underline{N \geq 0}$ ($N = \operatorname{card} \mathrm{Cr}(\tau', f) - 1$, $N = 0$ si et seulement si $\tau' = 1$, type de l'intervalle ponctuel), des applications

$$\begin{cases} [1, N] & \longrightarrow & [+1, -1] \times \mathbf{N}^*, & i & \longmapsto & (\varepsilon_i, l_i) \\ [0, N] & \longrightarrow & \mathrm{Ty} & i & \longmapsto & \tau_i \end{cases}$$

([14]). La flèche f dans Ty est determinée par ces données. Le type τ est donné par la formule $(*)$ ci-dessus, le type τ' par

$$\tau' = \Delta_{\varepsilon_1}^{l_1} \Delta_{\varepsilon_2}^{l_2} \ \cdots \ \Delta_{\varepsilon_N}^{l_N}, \qquad \text{longueur } n' = \sum l_i, \tag{$*'$}$$

et l'application croissante de $I_\tau = [0, N + \sum \mathrm{long}(\tau_i)]$ dans $I_{\tau'} = [0, \sum l_i]$ est donnée ainsi :

p. 31

constante sur $[0, 0 + \lambda_0]$	$\longmapsto$	0
constante sur $[\lambda_0 + 1, \lambda_0 + 1 + \lambda_1]$	$\longmapsto$	l_1
constante sur $[\lambda_0 + \lambda_1 + 2, \lambda_0 + \lambda_1 + 2 + \lambda_2]$	$\longmapsto$	l_2
$\cdots$		
constante sur $[\lambda_0 + \lambda_1 + \cdots + \lambda_i + (i+1), \lambda_0 + \cdots + \lambda_i + \lambda_{i+1} + (i+1)]$	$\longmapsto$	l_i.


6 Composition dans Ty

p. 32


On a une loi de composition (partout définie) dans $\mathrm{Ob}\,(\underline{\mathrm{Ty}}) = \mathrm{Ty}$, c'est celle du monoïde libre à deux générateurs Δ_+, Δ_-. Cette loi de composition s'interprète, au niveau catégorique (et non plus seulement combinatoire) comme une somme amalgamée [page 48]

$$I_{\tau\tau'} = I_\tau \amalg_{(e, \underline{1}_\tau, \underline{0}_{\tau'})} I_{\tau'},$$

où e est la catégorie unité, et où $\underline{1}_\tau$, $\underline{0}_{\tau'}$ représentent maintenant les morphismes $e \longrightarrow I_\tau$, $e \longrightarrow I_{\tau'}$, ayant comme image l'élément but et l'élément source respectivement de l'intervalle orienté envisagé. On a donc un carré cocartésien dans (Cat)



où toutes les flèches sont des foncteurs mono et pleinement fidèles. Que ce diagramme (évidemment commutatif) soit bien cocartésien dans (Cat) revient, par définition, à dire que pour toute X dans Cat, le diagramme transposé



14. **NB** Si $N = 0$, $[1, N] = \emptyset$, et il n'y a pas de ε_i, l_i ; l'application $\underbrace{[0, N]}_{=\{0\}} \longrightarrow$ Ty se réduit à la donnée de $\tau_0 \in$ Ty.

[est cartésien]

[page 49]

ce qui revient à la tautologie suivante qu'un chemin C dans X de type $\tau\tau'$ 'n'est autre chose' qu'un couple (c, c') d'un chemin c de type τ et d'un chemin c' de type τ' 'mis bout à bout' (dans cet ordre), i.e. tels que

$$\mathrm{but}(c) = \mathrm{source}(c')$$

(et on a alors

$$\begin{aligned} \mathrm{source}(C) &= \mathrm{source}(c) \\ \mathrm{but}(C) &= \mathrm{but}(c') \qquad\qquad). \end{aligned}$$

Il se pose ici le sempiternel problème si on va noter ce chemin $c{\cdot}c'$, ce qui semble à première vue s'imposer, ou plutôt $c' \circ c$, regardant le chemin c de $x = \mathrm{source}(c)$ vers $y = \mathrm{but}(c)$ comme une sorte de morphisme de x dans y (cf. plus bas le formalisme des catégories de fractions), c' comme un morphisme de $y = \mathrm{source}(c')$ vers $z = \mathrm{but}(c')$, et en interprétant le composé C comme le composé de ces deux morphismes c, c' (dans cet ordre du point de vue des opérations à effectuer), qu'on note traditionellement $c' \circ c$ ou $c' \cdot c$, et non $c \circ c'$ ou $c \cdot c'$, hélas ! C'est cette notation que nous allons suivre plus bas.

p. 33

Mais pour l'instant on ne va pas se soucier des chemins dans des catégories quelconques X, mais revenir au formalisme des τ et des I_τ eux-mêmes. L'interprétation catégorique de $\tau\tau'$ comme une somme amalgamée nous assure que cette opération de composition est fonctorielle :

[page 50]

$$\tau_1 \xrightarrow{f} \tau_2, \quad \tau_1' \xrightarrow{f'} \tau_2' \qquad \text{donne } \tau_1\tau_1' \xrightarrow{f*f'} \tau_2\tau_2'$$

(on n'écrira pas $f \cdot f'$ pour la flèche notée $f * f'$, à cause de la confusion possible avec la composition des flèches dans $\underline{\mathrm{Ty}}$). On a transitivité de façon évidente : si de plus $\tau_2 \xrightarrow{g} \tau_3$, $\tau_2' \xrightarrow{g'} \tau_3'$, [on a]

$$(gf) * (g'f') = (g * g') \circ (f * f').$$

Donc on a un bifoncteur de composition

$$\underline{\mathrm{Ty}} \times \underline{\mathrm{Ty}} \longrightarrow \underline{\mathrm{Ty}} \qquad (c, c') \longmapsto c \cdot c' \text{ ou } c * c'.$$

(En fait, on a aussi un bifoncteur

$$\underline{\mathrm{Typ}} \times \underline{\mathrm{Typ}} \longrightarrow \underline{\mathrm{Typ}},$$

mais on préfère oublier maintenant la catégorie $\underline{\mathrm{Typ}}$, qui donne un formalisme nettement moins simple.)

Cette composition est *strictement* associative et *strictement unitaire* (l'unité étant bien sûr l'élément unité 1 du monoïde libre Ty, correspondant à la catégorie ponctuelle $\{0\}$), et pas seulement 'à isomorphisme près'. Et pour cause, puisque dans $\underline{\mathrm{Ty}}$ les isomorphismes sont des identités. *Donc* $\underline{\mathrm{Ty}}$ *est un monoïde dans la catégorie* (Cat) des petites catégories !

Cela implique que non seulement $\mathrm{Ob}\,\underline{\mathrm{Ty}} = \mathrm{Ty}$, mais aussi $\mathrm{Fl}(\underline{\mathrm{Ty}})$, et plus généralement tous les ensembles de la forme $\mathrm{Hom}_{\mathrm{Cat}}(X, \underline{\mathrm{Ty}})$ sont des monoïdes, et ceci fonctoriellement en X, par exemple les composantes $\mathrm{Hom}_{\mathrm{Cat}}(\mathbf{\Delta}_i, \underline{\mathrm{Ty}})$ de l'ensemble semi-simplicial 'nerf' de $\underline{\mathrm{Ty}}$,

[page 49′ (il y a un décalage dans la numérotation)]

$$\mathrm{Nerf}_i(\underline{\mathrm{Ty}}) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Cat}}(\mathbf{\Delta}_i, \underline{\mathrm{Ty}}),$$

sont des monoïdes, et les applications semi-simpliciales entre elles sont des homomorphismes de monoïdes : le nerf de $\underline{\mathrm{Ty}}$ est un *monoïde semi-simplicial.*

p. 34

On va décrire ces monoïdes $\mathrm{Nerf}_i(\underline{\mathrm{Ty}})$, et constater que ce sont tous des monoïdes *libres,* tout comme $\mathrm{Nerf}_0(\underline{\mathrm{Ty}}) = \mathrm{Ob}\,\underline{\mathrm{Ty}} = \mathrm{Ty}$. Les applications semi-simpliciales entre ces monoïdes sont donc connus quand on les connaît sur les *générateurs* de ces monoïdes libres (lesquels générateurs sont aussi les éléments indécomposables, donc définis intrinsèquement en termes de la structure multiplicative).

Pour $\mathrm{Nerf}_0(\underline{\mathrm{Ty}}) = \mathrm{Ty}$, c'est une chose vue, les générateurs sont

$$\Delta_+, \Delta_-,$$

correspondant respectivement aux intervalles orientés

$$\begin{aligned} \mathbf{\Delta}_+ :&\quad 0 \longrightarrow 1 \\ \mathbf{\Delta}_- :&\quad 0 \longleftarrow 1. \end{aligned}$$

Pour $\mathrm{Nerf}_1(\underline{\mathrm{Ty}}) = \mathrm{Fl}(\underline{\mathrm{Ty}})$, i.e. pour les flèches, le résultat 3°) du paragraphe précédent (détermination de $\mathrm{Fl}(\underline{\mathrm{Ty}})$) s'interprète aussi en disant que $\mathrm{Fl}(\underline{\mathrm{Ty}})$ est le monoïde libre engendré par un système de générateurs infini [page 50′]

$$\mathfrak{f}_{\varepsilon,n}\ , \qquad (\varepsilon, n) \in \{+1, -1\} \times \mathbf{N},$$

indexé par l'ensemble produit $\{+1, -1\} \times \mathbf{N}$. Ici $\mathfrak{f}_{\varepsilon,n}$ désigne l'unique flèche dans $\underline{\mathrm{Ty}}$

$$\mathfrak{f}_{\varepsilon,l} : \Delta_\varepsilon \longrightarrow \Delta_\varepsilon^l$$

(où bien sûr l'exposant l désigne une exponentation pour la loi de composition dans $\underline{\mathrm{Ty}}$

$$\Delta_\varepsilon^l = \underbrace{\Delta_\varepsilon \circ \Delta_\varepsilon \circ \cdots \circ \Delta_\varepsilon}_{l \text{ copies}},$$

et non la puissance cartésienne dans Cat, où dans $\underline{\mathrm{Ty}}$ (où elle n'existe que si $l \in \{0, 1\}$)). Dans la description de $\mathrm{Fl}(\underline{\mathrm{Ty}})$ dans le paragraphe précédent, on a écrit le 'terme général' du monoïde libre en groupant ensemble les groupes de foncteurs successifs de la forme $f_{+,0}$, $f_{-,0}$, i.e. corréspondant aux deux flèches de dégénérescence indécomposables (pour $*$)

$$\begin{cases} f_{+,0} : & \Delta_+ & \longrightarrow & e \\ f_{-,0} : & \Delta_- & \longrightarrow & e \end{cases}$$

([15]). Le sous-monoïde libre de $\mathrm{Fl}(\underline{\mathrm{Ty}})$ engendré par ces deux éléments est le monoïde des flèches de dégénérescence (pure) quelconques dans $\underline{\mathrm{Ty}}$: p. 35 [page 51]

$$f_\tau : I_\tau \longrightarrow e \qquad (\tau \in \mathrm{Ty}),$$

et on a

$$f_\tau * f_{\tau'} = f_{\tau\tau'},$$

i.e. l'application

$$\tau \longmapsto f_\tau : \quad \underbrace{\mathrm{Ob}\,(\underline{\mathrm{Ty}})}_{=\mathrm{Ty}=\mathrm{Nerf}_0(\underline{\mathrm{Ty}})} \longrightarrow \underbrace{\mathrm{Fl}(\underline{\mathrm{Ty}})}_{\mathrm{Nerf}_1(\underline{\mathrm{Ty}})}$$

15. **NB** Le 'mot' vide de $\mathrm{Fl}(\underline{\mathrm{Ty}})$ correspond à la flèche id_1, où 1 est l'élément unité de Ty, réalisant l''intervalle' ponctuel.

est un homomorphisme de monoïdes, transformant Δ_ε ($\varepsilon \in \{+1,-1\}$) dans $\mathfrak{f}_{\varepsilon,0}$. Ce n'est pas l'application de dégénérenscence de Nerf_0 dans Nerf_1, i.e. l'application $\tau \longmapsto \mathrm{id}_\tau$. Celle-ci est donnée par

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Ob}\,(\underline{\mathrm{Ty}}) & \longrightarrow & \mathrm{Fl}(\underline{\mathrm{Ty}}) \\ \tau & \longmapsto & \mathrm{id}_\tau \end{array} \quad : \quad \left| \begin{array}{lcll} & \Delta_\varepsilon & \longmapsto & \mathfrak{f}_{\varepsilon,1} \qquad (\varepsilon \in \{+1,-1\}) \\ \text{i.e.} & \Delta_+ & \longmapsto & \mathfrak{f}_{+,1} \\ & \Delta_- & \longmapsto & \mathfrak{f}_{-,1}\ . \end{array} \right.$$

Quant aux homomorphismes source et but

$$\mathrm{Fl}(\underline{\mathrm{Ty}}) \underset{\beta\ (\mathrm{but})}{\overset{\sigma\ (\mathrm{source})}{\rightrightarrows}} \mathrm{Ob}\,(\underline{\mathrm{Ty}}),$$

ils sont évidents sur les générateurs

$$\left\{ \begin{array}{rcl} \sigma(\mathfrak{f}_{\varepsilon,l}) & = & \Delta_\varepsilon \\ \beta(\mathfrak{f}_{\varepsilon,l}) & = & \Delta_\varepsilon^l. \end{array} \right.$$

Je vais décrire maintenant $\mathrm{Nerf}_2(\underline{\mathrm{Ty}})$, i.e. les systèmes

$$\tau \xrightarrow{f} \tau' \xrightarrow{g} \tau''.$$

[page 52]

Se donner $f \in \mathrm{Fl}(\underline{\mathrm{Ty}})$ revient à se donner une suite ordonnée de générateurs $f_{\varepsilon,l}$, donc une suite

$$\begin{array}{l} \mathfrak{f}_{\varepsilon_1,l_1},\ \mathfrak{f}_{\varepsilon_2,l_2},\ \ \cdots\ \ ,\mathfrak{f}_{\varepsilon_n,l_n} \\ ((\varepsilon_i,l_i))_{1\leq i\leq n} \in [\{\pm 1\}\times \mathbf{N}]^n. \end{array}$$

On a alors

$$\begin{array}{ll} x = \Delta_{\varepsilon_1}\Delta_{\varepsilon_2}\cdots\Delta_{\varepsilon_n} & \log x = n \\ y = \Delta_{\varepsilon_1}^{l_1}\Delta_{\varepsilon_2}^{l_2}\cdots\Delta_{\varepsilon_n}^{l_n} & \log y = \textstyle\sum_{i\in[1,n]} l_i. \end{array}$$

Se donner $q : y \longrightarrow z$, i.e. un objet de $y\backslash\underline{\mathrm{Ty}}$, revient à se donner une application de l'ensemble des $m = \sum l_i$ flèches de transition de y dans $\mathbf{N}$. En fait, on a p. 36

$$\mathrm{Tr}(y) = \mathrm{Tr}(\Delta_{\varepsilon_1}^{l_1}) \amalg \mathrm{Tr}(\Delta_{\varepsilon_2}^{l_2}) \amalg \ \cdots\ \amalg \mathrm{Tr}(\Delta_{\varepsilon_n}^{l_n})$$

('ensemble somme', i.e. réunion disjointe), donc

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Ens}}(\mathrm{Tr}(y)) \simeq \prod_{i\in[1,n]} \mathrm{Hom}_{\mathrm{Ens}}(\underbrace{\mathrm{Tr}(\Delta_{\varepsilon_i}^{l_i})}_{[1,l_i]}, \mathbf{N}),$$

donc la donnée de g équivaut à la donnée d'un système de n applications

$$\left\{ \begin{array}{l} \pi_i : [1,l_i] \longrightarrow \mathbf{N} \qquad (\text{pondération de } \Delta_{\varepsilon_i}^{l_i}) \\ \text{pour } i \in [1,n]. \end{array} \right.$$

Mais pour $i \in [1,n]$, considérons l'élément de Nerf_2

$$\Delta_{\varepsilon_1} \xrightarrow{\mathfrak{f}_{\varepsilon_i,l_i}} \Delta_{\varepsilon_i}^{l_i} \xrightarrow{g_{\varepsilon,\pi_i}} \underbrace{\Delta_{\varepsilon_i}^{\pi_i(1)}\Delta_{\varepsilon_i}^{\pi_i(2)}\cdots\Delta_{\varepsilon_i}^{\pi_i(l_i)}}_{\Delta_{\varepsilon_i}^{\sum_j \pi_i(j) \overset{\text{déf}}{=} \log(\pi_i)}}, \qquad (1)$$

[page 53]

où g_{ε_i,π_i} est la flèche définie en termes de π_i au paragraphe précédent. Mais ce n'est autre aussi que

$$g_{\varepsilon_i,\pi_i} = \mathfrak{f}_{\varepsilon_i,\pi_i(1)} * \mathfrak{f}_{\varepsilon_i,\pi_i(2)} * \cdots * \mathfrak{f}_{\varepsilon_i,\pi_i(l_i)}. \tag{2}$$

L'élément de Nerf_2 envisagé ne dépend que de

$$(\varepsilon_i, l_i, \pi_i), \qquad \text{où } (\varepsilon_i, l_i) \in \{\pm 1\} \times \mathbf{N},\ \pi_i : [1, l_i] \longrightarrow \mathbf{N}.$$

(**NB** Si $l_i = 0$, $[1, l_i] = [1, 0] = \emptyset$ par convention, et π_i est l'unique application $\emptyset \longrightarrow \mathbf{N}$, donc la donnée $(\varepsilon_i, l_i, \pi_i)$ revient alors à (ε_i, l_i).)

Si

$$(\varepsilon, l, \pi) \text{ comme dessus}, \qquad (\varepsilon, l) \in \{\pm 1\} \times \mathbf{N},\ \pi : [1, l] \longrightarrow \mathbf{N},$$

désignons par

$$\mathfrak{f}_{\varepsilon,l,\pi}$$

l'élément de Nerf_2 donné par

$$\Delta_\varepsilon \xrightarrow{\mathfrak{f}_{\varepsilon,l}} \Delta_\varepsilon^l \xrightarrow{\mathfrak{f}_{\varepsilon,\pi(1)} * \cdots * \mathfrak{f}_{\varepsilon,\pi(l)}} \Delta_\varepsilon^{\pi(1)} \Delta_\varepsilon^{\pi(2)} \cdots \Delta_\varepsilon^{\pi(l)}.$$

On peut formuler la construction précédente en disant que tout élément de Nerf_2 peut se décomposer de façon unique en un produit

$$(f, g) = \mathfrak{f}_{\varepsilon_1,l_1,\pi_1} * \mathfrak{f}_{\varepsilon_2,l_2,\pi_2} * \cdots * \mathfrak{f}_{\varepsilon_n,l_n\pi_n},$$

ce qui prouve que $\mathrm{Nerf}_2(\underline{\mathrm{Ty}})$ est le monoïde libre sur les générateurs précédents $\mathfrak{f}_{\varepsilon,l,\pi}$. (**NB** à la suite vide correspond

$$1 \xrightarrow{\mathrm{id}_1} 1 \xrightarrow{\mathrm{id}_1} 1 \qquad .)$$

Si l'objet de Nerf_2 est

p. 37
[page 54]

$$x \xrightarrow{f} y \xrightarrow{g} z,$$

la construction précédente nous dit, en termes de la donnée combinatoire, i.e. de la suite de données

$$(\varepsilon_1, l_1, \pi_1),\ \ldots\ ,\ (\varepsilon_n, l_n, \pi_n),$$

quels sont x, y, z : chacun d'eux est le produit dans $\mathrm{Nerf}_0 = \mathrm{Ty}$ des n facteurs x_i, y_i ou z_i respectivement, pour $i \in [1, n]$, donnés dans la définition des $\mathfrak{f}_{\varepsilon_i,l_i,\pi_i}$, i.e. de

$$\Delta_{\varepsilon_i},\ \Delta_{\varepsilon_i}^{l_i},\ \text{ et } \Delta_{\varepsilon_i}^{\pi_i(1)} \Delta_{\varepsilon_i}^{\pi_i(2)} \cdots \Delta_{\varepsilon_i}^{\pi_i(l_i)} = \Delta_{\varepsilon_i}^{\mathrm{long}(\pi_i)}$$

(où $\mathrm{long}(\pi_i) = \sum_{j \in [1,l_i]} \pi_i(j)$). Donc

$$\begin{cases} x &= \prod_{i\in[1,n]}^{\mathrm{Ty}} \Delta_{\varepsilon_i} \\ y &= \prod_{i\in[1,n]}^{\mathrm{Ty}} \Delta_{\varepsilon_i}^{l_i} \\ z &= \prod_{i\in[1,n]}^{\mathrm{Ty}} \Delta_{\varepsilon_i}^{\mathrm{long}(\pi_i)} \end{cases}$$

([16]), et on trouve de même f, g comme des produits (au sens $*$) de n facteurs f_i resp. g_i ($i \in [1, n]$) explicités dans les formules (1), (2) (p. 52, 53) :

$$\begin{aligned} f_i &= \mathfrak{f}_{\varepsilon_i,l_i} : \ \Delta_{\varepsilon_i} \longrightarrow \Delta_{\varepsilon_i}^{l_i} \\ g_i &= g_{\varepsilon_i,l_i} : \ \Delta_{\varepsilon_i}^{l_i} \longrightarrow \Delta_{\varepsilon_i}^{\mathrm{long}(\pi_i)}, \end{aligned}$$

[page 55]

g_i lui-même étant représenté comme un $*$-produit de l_i facteurs indécomposables, de sorte que f et g apparaissent sous forme de $*$-produits de n, resp. de $\sum_{i\in[1,n]} l_i$ facteurs de la forme $\mathfrak{f}_{\varepsilon,\nu}$. Pour terminer de tenir en mains l'objet semi-simplicial tronqué $(\mathrm{Nerf}_i(\underline{\mathrm{Ty}}))_{0\leq i\leq 2}$, il reste à décrire les deux applications de dégénérescence $\mathrm{Nerf}_1 \longrightarrow \mathrm{Nerf}_2$ (cas où f ou g est une flèche identique) et surtout l'application de *composition* des flèches

$$\mathrm{Nerf}_2(\underline{\mathrm{Ty}}) \xrightarrow{\gamma} \mathrm{Nerf}_1(\underline{\mathrm{Ty}}) = \mathrm{Fl}(\underline{\mathrm{Ty}}).$$

Il suffit de donner γ sur les générateurs, et on a tautologiquement, par définition des $\mathfrak{f}_{\varepsilon,l,\pi}$

$$\gamma(\mathfrak{f}_{\varepsilon,l,\pi}) = \mathfrak{f}_{\varepsilon,\mathrm{long}(\pi)}.$$

(**NB** Il n'existe au plus qu'un seul morphisme de Δ_ε (de Δ_+ ou de Δ_-) dans un intervalle I_τ. Il existe si et seulement si τ est de la forme Δ^l_ε, $l \in \mathbf{N}$.)

Le cas $g = \mathrm{id}$ correspond au cas où p. 38

$$\pi_i(j) = 1 \qquad \forall j \in [1, l_i],$$

les $\mathfrak{f}_{\varepsilon_i,l_i,\pi_i}$ sont alors détérminés en fonction des $\mathfrak{f}_{\varepsilon_i,l_i}$, et l'application de dégénérescence est

$$\mathfrak{f}_{\varepsilon,l} \longmapsto \mathfrak{f}_{\varepsilon,l,1_l} \qquad (\text{où } 1_l \text{ est la fonction constante de valeur 1 sur } [1,l]).$$

Le $f = \mathrm{id}$ est celui où les l_i sont égaux à 1. Alors chaque $\pi_i : [1,1] \longrightarrow \mathbf{N}$ peut être vu comme un élément de $\mathbf{N}$, la donnée de $(\varepsilon_i, l_i, \pi_i)$ revient à celle des $(\varepsilon_i, n_i) \in \{\pm 1\} \times \mathbf{N}$, i.e. la donnée d'une suite de n générateurs parmi les $\mathfrak{f}_{\varepsilon,l}$. L'application de dégénérescence [page 56] $\mathrm{Nerf}_1 \longrightarrow \mathrm{Nerf}_2$ est ici donnée sur les générateurs par

$$\mathfrak{f}_{\varepsilon,l} \longmapsto \mathfrak{f}_{\varepsilon,1,l}.$$

Heureusement, on n'a plus à prouver l'associativité de la composition.

NB La simplicité de ces descriptions renforce mon sentiment que la catégorie $\underline{\mathrm{Ty}}$ définie à présent, avec les *morphismes d'intervalles orientés croissants* $I_\tau \longrightarrow I_{\tau'}$ comme flèches de $\underline{\mathrm{Ty}}$, est bien 'la bonne'. On va déjà voir si elle donne une description sympa des catégories de fractions $X\Sigma^{-1}$, sans tortillements comme précédemment.

Mais on a promis de déterminer $\mathrm{Nerf}_r(\underline{\mathrm{Ty}})$, pour tout $r \in \mathbf{N}$. Le générateur général de Nerf_r est de la forme (pour $\varepsilon \in \{\pm 1\}$ fixé)

$$\underbrace{\Delta_\varepsilon}_{=\Delta_\varepsilon^{l_0} \text{avec } l_0=1} \xrightarrow{f_1} \Delta_\varepsilon^{l_1} \xrightarrow{f_2} \Delta_\varepsilon^{l_2} \longrightarrow \cdots \xrightarrow{f_r} \Delta_\varepsilon^{l_r},$$

où les $f_i : \Delta_\varepsilon^{l_{i-1}} \longrightarrow \Delta_\varepsilon^{l_i}$, $i \in [1,r]$, sont donnés par des applications

$$\pi_{i-1} : [1, l_{i-1}] \longrightarrow \mathbf{N} \qquad \text{telles que} \quad \underbrace{\mathrm{long}(\pi_{i-1})}_{\overset{\text{déf}}{=} \Sigma_{j\in[1,l_i]}\pi_i(j)} = l_i.$$

(NB $\pi_0 : [1,1] = \{1\} \longrightarrow \mathbf{N}$ est identifié à $\mathrm{long}(\pi_0) = \pi_0(1) = l_1$.)

Pour ne pas faire dépendre la définition du domaine des π_i ($i \in [0, r-1]$) des entiers [page 57] l_i, on peut aussi considérer les π_i comme des applications

$$\mathbf{N}^* \xrightarrow{\pi} \mathbf{N} \qquad (\mathbf{N}^* = \{i \in \mathbf{N} \mid i \geq 1\})$$

16. attention, les produits doivent être pris en respectant l'ordre des facteurs donné par la notation indicielle en i.

à supports finis (i.e. tels que $\pi(i) = 0$ pour i grand), et exiger de façon précise

$$\begin{array}{l} \operatorname{supp}\pi_0 \ \subseteq\ \{1\} \\ \operatorname{supp}\pi_1 \ \subseteq\ [1, \operatorname{long}(\pi_0)] \\ \qquad \cdots \\ \boxed{\operatorname{supp}\pi_i \ \subseteq\ [1, \operatorname{long}(\pi_{i-1})]}, \qquad \text{pour } \boxed{i \in [0, r-1]} \quad . \end{array} \tag{$**$}$$

D'autre part, posant $l_i = \operatorname{long}(\pi_{i-1})$ (pour $i \in [1, r]$), p. 39

$$f_i : \Delta_\varepsilon^{l_{i-1}} \longrightarrow \Delta_\varepsilon^{l_i\ (=\operatorname{long}(\pi_{i-1}))}$$

est défini comme

$$f_i = \mathfrak{f}_{\varepsilon,\pi_{i-1}(1)} * \mathfrak{f}_{\varepsilon,\pi_{i-1}(2)} * \cdots * \mathfrak{f}_{\varepsilon,\pi_{i-1}(l_{i-1})},$$

de sorte que l'élément $(*)$ de $\operatorname{Nerf}_r(\underline{\mathrm{Ty}})$ est déterminé de façon unique par la donnée des $\varepsilon \in \{\pm 1\}$ et de

$$\pi_\bullet = (\pi_i)_{i\in[0,r-1]} \in (\operatorname{Hom}_{\mathrm{Ens}}(\mathbf{N}^*, \mathbf{N}))^r$$

satisfaisant les conditions $(**)$. Soit $F_{\varepsilon,\pi_\bullet}$ cet élément de $\operatorname{Nerf}_r(\underline{\mathrm{Ty}})$, et soit N_r l'ensemble des $\pi_\bullet$ qu'on vient d'expliciter. Alors

$$(F_{\varepsilon,\pi_\bullet})_{(\varepsilon,\pi_\bullet)\in\{\pm1\}\times N_r}$$

est un système de générateurs libre du monoïde $\operatorname{Nerf}_r(\underline{\mathrm{Ty}})$.

Si $l_i = 0$ (i.e. $\boxed{\pi_{i-1} = 0}$), on doit avoir $\operatorname{supp}(\pi_{i+1}) = \emptyset$, i.e. $\pi_{i+1} = 0$, d'où $l_{i+1} = 0$, et de même pour les l_j et π_j suivants. Géométriquement l'hypothèse s'exprime par la condition que le but de f_i est l'élément 1 de Ty (correspondant à l'intervalle ponctuel), et comme $\operatorname{Hom}(1, \tau) = \emptyset$ pour $\tau \neq 1$, cela signifie que les flèches qui suivent f_i doivent être toutes égales à la flèche $\mathrm{id}_1 : 1 \longrightarrow 1$. [page 58]

Remarque. Dans la description combinatoire de $\underline{\mathrm{Ty}}$ et de $\operatorname{Nerf}_\bullet(\underline{\mathrm{Ty}})$, l'ensemble des 'signatures' $\{\pm 1\}$ joue un rôle assez bidon. Il peut être remplacé par n'importe quel ensemble Σ (dit 'ensemble des signatures'), et on construit alors une catégorie monoïdale (ou un monoïde catégorique) ayant comme ensemble d'objets le monoïde libre engendré par Σ, interprétés comme des intervalles d'entiers $[0, n]$, munis de 'signatures' dans Σ pour chaque intervalle de transition, ou ce qui revient au même, des 'graphes' orientés Σ-pondérés de type combinatoire un intervalle $\mathbf{\Delta}_i$, ce qui revient à la donnée d'une suite (ordonnée) de n éléments $\varepsilon_1,\ \varepsilon_2,\ \ldots\ ,\ \varepsilon_n \in \Sigma$, i.e. d'un 'mot' $\varepsilon_1\varepsilon_2\ldots\varepsilon_n$, qu'on préfère écrire $\Delta_{\varepsilon_1}\Delta_{\varepsilon_2}\cdots\Delta_{\varepsilon_n}$. On peut définir de façon évidente les homomorphismes *croissants* de tels graphes pondérés orientés (sous-entendu : avec l'élément source et l'élément but dans la structure, à respecter par les morphismes), sans avoir besoin d'une interprétation catégorique. La fonctorialité de l'opération de composition des intervalles pondérés, pour cette notion de morphisme, est évidente. Le choix $\Sigma = \{\pm 1\}$ est à ma connaissance le seul utile, à cause de son lien avec la notion de chemins et le calcul de π_0 d'un objet de X `[plutôt d'un objet` X `de` Cat`]`, etc. [page 59]

p. 40

7 Explicitation des catégories de fractions $X\Sigma^{-1}$ en termes des $\underline{\mathrm{Ch}}(X; a, b)$

Si X est une catégorie, on désigne par $\underline{\mathrm{Ch}}(X)$ la catégorie des chemins dans X (cf. §4), et pour $a, b \in \operatorname{Ob} X$, par

$$\underline{\mathrm{Ch}}(X; a, b) \qquad \text{ou simplement } \underline{\mathrm{Ch}}(a, b)$$

celle des chemins de a vers b, i.e. de source a, but b. L'intuition géométrique (qu'on explicitera), c'est qu'un tel chemin c définit un chemin 'direct' de a vers b (i.e. un chemin de type τ' 'direct', i.e. toutes les flèches de transition sont directes, i.e. τ' de la forme Δ_+^n), de même longueur que le chemin initial c, obtenu en inversant toutes les flèches rétrogrades dans le chemin c. Cette opération est effectivement possible dans X lui-même si et seulement si lesdites flèches sont inversibles. On obtient alors une suite composable de flèches, dont le composé total (qu'on peut appeler 'l'effet utile' du chemin) est une [page 60] flèche de a vers b. Dans le cas général, les chemins de a vers b peuvent être vus comme une sorte de 'flèches généralisées' allant de a vers b, dont la composition serait la composition évidente, et les identités les 'chemins vides' relatifs aux $a \in \mathrm{Ob}\, X$. On trouve d'ailleurs bien ainsi une catégorie, ayant mêmes objets que X, mais où les

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Ch}}(a,b) = \mathrm{Ch}(a,b) = \mathrm{Ob}\,\underline{\mathrm{Ch}}(a,b)$$

sont prohibitivement gros. Cela s'exprime notamment par le fait que les seules flèches inversibles dans X_{Ch} sont les identités ! On n'a pas de foncteur naturel entre X_{Ch} et X qui soit l'identité sur les objets. Car à un chemin $a \xrightarrow{c} b$ on ne peut associer de X-morphismes $a \longrightarrow b$ (sauf si c `[est]` de type Δ_+), et à un X-morphisme $a \xrightarrow{u} b$ on peut associer un chemin $c(u)$ de type Δ_+, mais si $a \xrightarrow{u} b \xrightarrow{v} c$, $c(vu)$ est encore de type Δ_+ alors que $c(v)c(u)$ est de type Δ_+^2, ils ne sont pas égaux. Par contre, il y a une flèche naturelle entre ces deux éléments de $\underline{\mathrm{Ch}}(a,c)$, flèche au dessus de l'unique homomorphisme

$$\Delta_+ \xrightarrow{\mathrm{f}_{+,2}} \Delta_+^2.$$

On a alors [page 61]

$$\mathrm{f}_{+,2}^*(\underbrace{a \xrightarrow{u} b \xrightarrow{v} c}_{c(v)c(u)}) = (\underbrace{a \xrightarrow{vu} c}_{c(vu)}),$$

d'où une flèche canonique

$$c(vu) \longrightarrow c(v)c(u) \qquad \text{dans } \underline{\mathrm{Ch}}(a,c).$$

Cela montre que $c(vu)$ et $c(v)c(u)$ sont tout au moins dans une même composante connexe de $\underline{\mathrm{Ch}}(a,c)$, ou (comme on dit encore) qu'ils sont 'homotopes'. Cela suggère ici de modifier la définition de $\mathrm{Hom}_{\mathrm{Ch}}(a,b)$ en

$$\pi(a,b) = \pi_0(\underline{\mathrm{Ch}}(a,b)).$$

Le foncteur de composition des chemins p. 41

$$\begin{array}{ccccc} \underline{\mathrm{Ch}}(a,b) & \times & \underline{\mathrm{Ch}}(b,c) & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Ch}}(a,c) \\ (c & , & c') & \longmapsto & c' \circ c \end{array}$$

`[il y a trop de c]` ([17]) induit une application sur les π_0, ce qui donne une loi de composition

$$\pi(a,b) \times \pi(b,c) \longrightarrow \pi(a,c)$$

sur les flèches. Il est immédiat qu'elle est associative (la composition des chemins l'étant), et unitaire. Elle admet comme flèche identique en x soit le 'lacet vide en x', lequel est (directement) homotope dans $\underline{\mathrm{Ch}}(x,x)$ au chemin 'dégénéré' $x \xrightarrow{\mathrm{id}} x$ de type Δ_+, ou aussi [page 62]

17. Ce foncteur est déduit des foncteurs

$$\underline{\mathrm{Ch}}_\tau(a,b) \times \underline{\mathrm{Ch}}_{\tau'}(b,c) \longrightarrow \underline{\mathrm{Ch}}_{\tau\tau'}(a,c)$$

évidents, cf. page 77.

au chemin dégénéré de n'importe quel type τ, disons

$$x \overset{\mathrm{id}}{\longleftarrow} x \overset{\mathrm{id}}{\longrightarrow} x \overset{\mathrm{id}}{\longrightarrow} x \overset{\mathrm{id}}{\longleftarrow} x \overset{\mathrm{id}}{\longleftarrow} x,$$

un tel chemin n'étant autre que $p_\tau^*(x)$, où

$$p_\tau : \tau \longrightarrow 1$$

est le morphisme de dégénérescence (l'unique morphisme dans $\underline{\mathrm{Ty}}$ vers 1, qui est objet final), d'où

$$p_\tau^* : \underline{\mathrm{Ch}}_1(x,x) = \{x\} \longrightarrow \underline{\mathrm{Ch}}_\tau(x,x) \subseteq \underline{\mathrm{Ch}}(x,x).$$

La catégorie $\Pi(X)$ ainsi obtenu doit s'appeler le *groupoïde fondamental* de X. En effet,

a) toutes les flèches de $\Pi(X)$ sont inversibles, i.e. $\Pi(X)$ est bien un groupoïde, et

b) le foncteur canonique

$$X \longrightarrow \Pi(X)$$

qui est l'identité sur les objets, et qui est défini sur les flèches par $u \longmapsto c(u)$ comme ci-dessus, est *universel* (dans Cat) pour les foncteurs (i.e. les Cat-morphismes) de X vers des *groupoïdes.* (Plus généralement encore, il est universel pour les foncteurs $X \overset{F}{\longrightarrow} Y$ tels que F transforme toute flèche de X en `[une]` flèche inversible.)

Pour prouver que toute flèche dans $\Pi(X)$ est inversible, comme tout chemin non vide est composé de chemins 'élémentaires' de type Δ_+ ou Δ_-, il suffit de prouver que ces chemins sont inversibles. En fait, ils se correspondent biunivoquement, p. 42 [page 63]

$$\underline{\mathrm{Ch}}_{\Delta_+}(a,b) \simeq \underline{\mathrm{Ch}}_{\Delta_-}(b,a),$$

en associant au chemin de a vers b

$$c(u) : a \overset{u}{\longrightarrow} b \qquad \text{de type } \Delta_+$$

le chemin

$$c(u)^o : b \overset{u}{\longleftarrow} a \qquad \text{de type } \Delta_-$$

de b vers a. Je dis que

$$\begin{aligned} c(u)^o c(u) &\sim 1_a \\ c(u) c(u)^o &\sim 1_b \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ccccc} a & \xrightarrow{u} & b & \xleftarrow{u} & a \\ \uparrow{\scriptstyle \mathrm{id}} & & \uparrow{\scriptstyle u} & & \uparrow{\scriptstyle \mathrm{id}} \\ a & \xrightarrow{\mathrm{id}} & a & \xleftarrow{\mathrm{id}} & a \end{array}$$

on a un homomorphisme dans $\underline{\mathrm{Ch}}_{\Delta_+\Delta_-}(a,a)$ de 1_a dans $c(u)^o c(u)$.

$$\begin{array}{ccccc} b & \xleftarrow{u} & a & \xrightarrow{u} & b \\ \uparrow{\scriptstyle u} & & \uparrow{\scriptstyle \mathrm{id}} & & \uparrow{\scriptstyle u} \\ a & \xleftarrow{\mathrm{id}} & a & \xrightarrow{\mathrm{id}} & a \end{array}$$

itou dans $\underline{\mathrm{Ch}}_{\Delta_-\Delta_+}(b,b)$, de $1_b \longrightarrow c(u)c(u)^0$

p. 43 [page 64]

`[plutôt` $1_b \longleftarrow c(u)c(u)^0$`, viz.`

$$\begin{array}{ccccc} b & \xleftarrow{u} & a & \xrightarrow{u} & b \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} & & \downarrow{\scriptstyle u} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} \\ b & \xleftarrow{\mathrm{id}} & b & \xrightarrow{\mathrm{id}} & b \end{array} \texttt{].}$$

Notons que, plus généralement, pour tout chemin

$$c : a \longrightarrow b, \qquad \text{de type } \tau,$$

on définit un *chemin opposé*

$$c^o : b \longrightarrow a \qquad \text{de type } \tau^o,$$

où

$$\tau \longmapsto \tau^o : \mathrm{Ty} \longrightarrow \mathrm{Ty}$$

est l'antiïnvolution du monoide libre Ty qui échange les deux générateurs Δ_-, Δ_+, et qui est donc donné sur l'élément général par

$$(\Delta_{\varepsilon_1}\Delta_{\varepsilon_2}\cdots\Delta_{\varepsilon_n})^o = \Delta_{-\varepsilon_n}\Delta_{-\varepsilon_{n-1}}\cdots\Delta_{-\varepsilon_1}.$$

Par récurrence sur la longueur de c ([18]), en utilisant le résultat précédent, que $c(u)$, $c(u)^o$ sont inverses l'un de l'autre dans $\Pi(X)$, on trouve

$$\left.\begin{array}{rcl} c^o c & = & \mathrm{id}_a \\ c c^o & = & \mathrm{id}_b \end{array}\right\} \text{dans } \Pi(X).$$

Exemple. Si

$$\begin{array}{rcl} \tau & = & \Delta_+\Delta_-\Delta_+^2\Delta_- \\ \tau^o & = & \Delta_+\Delta_-^2\Delta_+\Delta_-, \end{array}$$

et si on a un chemin

$$c : a_0 \xrightarrow{u_1} a_1 \xleftarrow{u_2} a_2 \xrightarrow{u_3} a_3 \xrightarrow{u_4} a_4 \xleftarrow{u_5} a_5$$

de type τ, on en déduit le chemin

$$c^o : a_5 \xrightarrow{u_5} a_4 \xleftarrow{u_4} a_3 \xleftarrow{u_3} a_2 \xrightarrow{u_2} a_1 \xleftarrow{u_1} a_0$$

de type τ^o. L'opération $c \longmapsto c^o$ satisfait en effet `[pour]` `[page 65]`

$$\begin{array}{ccccc} a & \xrightarrow{\gamma} & b & \xrightarrow{\gamma'} & c \\ c & \xrightarrow{\gamma'^o} & b & \xrightarrow{\gamma^o} & a \end{array}$$

la relation

$$(\gamma'\gamma)^o = \gamma^o\gamma'^o, \qquad (*)$$

ce qui est en accord avec l'intuition que l'opération $\gamma \longmapsto \gamma^o$ joue le rôle d'un passage à l'inverse ('à homotopie près'), et on a la formule p. 44

$$(\gamma'\gamma)^{-1} = \gamma^{-1}\gamma'^{-1}$$

18. inutile, résulte directement de la formule $(*)$ `[de la]` page suivante, en décomposant c en composés de chemins 'élémentaires' de type Δ_+ ou Δ_-.

pour deux flèches inversibles γ, γ' composables (dans l'ordre γ', γ).

Pour la propriété universelle de

$$X \longrightarrow \Pi(X)$$

(qui permettra d'écrire

$$\Pi(X) \simeq X\Sigma^{-1}, \qquad \text{avec } \Sigma = \mathrm{Fl}(X) \ \ ),$$

autant l'établir tout de suite dans le cadre général où on se donne une partie

$$\Sigma \subseteq \mathrm{Fl}(X),$$

et on définit, pour $\tau \in \mathrm{Ty}$,

$$\underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,\tau}(X) \subseteq \underline{\mathrm{Ch}}_{\tau}(X)$$

comme la sous-catégorie pleine de $\underline{\mathrm{Ch}}_{\tau}(X)$ formée des chemins dans X dont *toutes les flèches rétrogrades*

sont dans X [plutôt dans Σ]. On notera que pour qu'un chemin c et son opposé c^o [page 66]
soient tous les deux des Σ-*chemins,* il faut et il suffit que *toutes* les flèches du chemin c soient dans Σ (on dira alors que c est un Σ-*chemin stricte*), puisque les flèches rétrogrades de c^o sont les flèches directes de c.

Pour que les sous-catégories pleines $\underline{\mathrm{Ch}}_{\tau,\Sigma}(X)$ soient stables par les foncteurs images inverses

$$f^* : \underline{\mathrm{Ch}}_{\tau'}(X) \longrightarrow \underline{\mathrm{Ch}}_{\tau}(X)$$

associés aux flèches

$$f : \tau \longrightarrow \tau'$$

dans $\underline{\mathrm{Ty}}$, ou simplement pour qu'y ait stabilité pour les deux foncteurs f^* associés à un $f : \Delta_- \longrightarrow 1$ et $\Delta_- \longrightarrow \Delta_-^2$, il faut et il suffit que Σ soit stable par composition et contienne toutes les flèches identiques

$$\begin{cases} x \in \mathrm{Ob}\, X \implies \mathrm{id}_x \in \Sigma \\ u, v \in \Sigma, \ \ u,\, v \text{ composables} \Longrightarrow uv \in \Sigma. \end{cases}$$

En effet, les flèches dans un chemin $f^*(c') \in \underline{\mathrm{Ch}}_{\tau}(X)$ sont soit des flèches identiques (qui correspondent aux flèches de transition de I_τ dégénérées pour f), soit des flèches parmi celles de τ, ou des composés d'une suite de flèches consécutives composables de τ' (qui correspondent aux flèches de transition dans $I_{\tau'}$ incluses dans la partie d'une flèche de transition de I_τ), avec conservation des signatures.

On suppose ces conditions satisfaites, de sorte que les $\underline{\mathrm{Ch}}_{\tau,\Sigma}(X)$ forment les fibres p. 45
d'une sous-catégorie fibrée pleine de $\underline{\mathrm{Ch}}(X)$ sur $\underline{\mathrm{Ty}}$, qu'on dénotera par [page 67]

$$\underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma}(X) \hookrightarrow \underline{\mathrm{Ch}}(X).$$

Il est évident que cette sous-catégorie est stable par l'opération de composition des chemins (mais non pas, en général, on l'a dit, par passage de c à c^o (il faudrait pour cela que Σ contienne *toutes* les flèches de X, puisque pour toute $u : a \longrightarrow b$, qui est donc dans $\underline{\mathrm{Ch}}_{\Delta_+,\Sigma}(X)$, u^o donné par $b \overset{u}{\longleftarrow} a$ dans $\underline{\mathrm{Ch}}_{\Delta_-}(X)$ devrait être un Σ-chemin, d'où $u \in \Sigma$)).

On va définir une catégorie canonique

$$\Pi_{\Sigma}(X),$$

ayant même objets que X, et un foncteur canonique

$$X \longrightarrow \Pi_\Sigma(X)$$

qui est l'identité sur les objets, et qui transforme les $u \in \Sigma$ en flèches inversibles. Pour cela on calque la description du groupoïde fondamental (mais $\Pi_\Sigma(X)$ ne sera pas en général un groupoïde), en posant

$$\mathrm{Hom}_\Sigma(x,y) = \pi_0(\underline{\mathrm{Ch}}_\Sigma(x,y)),$$

et en définissant la composition des 'Σ-flèches' en termes de la composition des chemins. L'argument qui prouvait, dans le cas de $\Pi(X)$, que *toute* flèche de X, vue comme chemin c de type Δ_+, était inversible dans $\Pi(X)$, ayant comme inverse c^o de type Δ_-, est encore valable, pourvu que c^o soit encore bien un Σ-chemin, ce qui exige que $u \in \Sigma$. [page 68]

On va l'interpréter en termes d'un foncteur canonique

$$\kappa : X \longrightarrow \Pi_\Sigma(X) \qquad ([19]) \qquad (*)$$

qui se décrit encore comme dans le cas du groupoïde fondamental, en associant à toute flèche u de X la classe d'homotopie du chemin $c(u)$ qu'elle définit. On voit donc que ce foncteur canonique transforme les $u \in \Sigma$ en flèches inversibles.

Quand les flèches de Σ sont déjà inversibles dans X, je dis que le foncteur $(*)$ est un isomorphisme, i.e. que pour tout $a, b \in \mathrm{Ob}\, X$,

$$\alpha : \mathrm{Hom}_X(a,b) \longrightarrow \pi_0 \underline{\mathrm{Ch}}_\Sigma(a,b), \qquad u \longmapsto \underbrace{\mathrm{ch}_\Sigma(u)}_{=\mathrm{ch}(u)}$$

est bijectif. Pour le voir, on va définir

$$\beta : \pi_0(\underline{\mathrm{Ch}}_\Sigma(a,b)) \longrightarrow \mathrm{Hom}_X(a,b),$$

qui sera inverse de β. On définit

$\beta(c)$, pour une Σ-flèche de type τ, le longueur n, en inversant toutes les flèches rétrogrades (ce qui est possibles, puisqu'elles sont dans Σ), de façon à obtenir un chemin $c^\natural$ de type Δ_+^n, et en prenant le composé (dans X) des flèches de ce chemin $c^\natural$. Il est évident alors que $\beta\alpha = \mathrm{id}$, il faut prouver que l'on a aussi $\alpha\beta = \mathrm{id}$, i.e. que dans $\Pi_\Sigma(X)$, les flèches $u = \int c^\natural$ et c sont égales, i.e. u et c sont homotopes dans $\underline{\mathrm{Ch}}_\Sigma(a,b)$. Considérons le chemin $c^\natural$, de type Δ_+^n : p. 46 [page 69]

$$a = a_0 \xrightarrow{u_1} a_1 \xrightarrow{u_2} a_2 \longrightarrow \cdots \longrightarrow a_{n-1} \xrightarrow{u_n} a_n = b,$$

et soit u_i ($i \in [1,n]$) une flèche de ce chemin, correspondant à une flèche de transition $\underline{u}_i$ *rétrograde* de τ, donc par construction

$$u_i = v_i^{-1} \qquad \text{dans } X, \text{ avec } v_i \in \Sigma$$

la flèche d'indice i dans le chemin initial c de type τ. Si $\underline{u}_i$ par contre est directe, on aura

$$u_i = v_i.$$

(NB On désigne par v_i la i-flèche dans le chemin c.) Or on a

$$c = c_n * c_{n-1} * \cdots * c_1 \qquad \text{dans } \Pi_\Sigma(X) \qquad (*)$$

19. Sur les flèches, κ est défini, pour $u : a \longrightarrow b$, par $\kappa(u)$ = classe d'homotopie de $\mathrm{ch}(u)$ dans $\underline{\mathrm{Ch}}_\Sigma(a,b)$, où $\mathrm{ch}(u)$ est le chemin de type Δ_+ de a vers b défini par u.

et le facteur c_i est soit la classe d'homotopie de $\mathrm{ch}(v_i) = \mathrm{ch}(u_i)$ (cas où la flèche de transition $\underline{u}_i$ de τ est directe), soit celle du chemin *opposé* au chemin $\mathrm{ch}(v_i) : a_i \xrightarrow{v_i} a_{i-1}$ de type Δ_+, donc le chemin $\mathrm{ch}(v_i)^o : a_{i-1} \xleftarrow{v_i} a_i$ de type Δ_-. Je dis que

$$\boxed{\mathrm{ch}(v_i)^o = \mathrm{ch}(u_i) \qquad \textit{dans } \Pi(X),} \tag{1}$$

ce qui prouve que dans $\Pi_\Sigma(X)$, c est égal au composé des $\mathrm{ch}(u_i)$ ($i \in [1, n]$), donc à $c^\natural$. Il faut prouver de plus que

$$c^\natural = \mathrm{ch}(u) \qquad (u = u_n u_{n-1} \cdots u_1) \qquad \text{dans } \Pi(X). \tag{2}$$

Donc il y a deux vérifications à faire (où je suppose à nouveau Σ quelconque) : [page 70]

1°) Soit $u \in \Sigma$, $u : a \longrightarrow b$, supposons Σ inversible dans X. Alors

$$\mathrm{ch}(u)^o = \mathrm{ch}(u^{-1}) \qquad \text{dans } \Pi_\Sigma(X),$$

i.e. les deux chemins de b vers

$$\begin{array}{lll} b & \xleftarrow{u} & a \quad \text{de type } \Delta_- \\ b & \xrightarrow{u^{-1}} & a \quad \text{de type } \Delta_+ \end{array}$$

sont homotopes dans $\underline{\mathrm{Ch}}_\Sigma(b, a)$. Or on sait déjà, comme $\kappa : X \longrightarrow \Pi_\Sigma(X)$ est un foncteur, que p. 47

$$\mathrm{hot}\,\mathrm{ch}(u^{-1}) = (\mathrm{hot}\,\mathrm{ch}(u))^{-1} \qquad \text{dans } \Pi_\Sigma(X)$$

où $\mathrm{hot}(\bullet)$ désigne la classe d'homotopie d'une chaine (ici classe dans $\underline{\mathrm{Ch}}_\Sigma(b, a)$ et dans $\underline{\mathrm{Ch}}_\Sigma(a, b)$ respectivement). Donc l'énoncé à prouver c'est que $\mathrm{hot}(\mathrm{ch}(u)^o)$ est égal à l'*inverse* de $\mathrm{hot}(\mathrm{ch}(u))$ dans $\Pi_\Sigma(X)$. C'est donc ce qu'on a prouvé pour *tout* $u \in \mathrm{Fl}(X)$, dans le cas de $\Pi(X)$. L'argument doit marcher, du moment qu'il a un sens, i.e. que $\mathrm{ch}(u)^o$ est bel et bien un Σ-chemin, i.e. $u \in \Sigma$.

2°) La formule (2) signifie que pour tout chemin c de type Δ_+^n (donc tautologiquement un Σ-chemin), allant de a vers b, sa classe dans $\mathrm{Hom}_\Sigma(a, b)$ n'est autre que celle de [page 71] $\mathrm{ch}(u)$, où u est le composé $u_n u_{n-1} \cdots u_1$. Mais on a

$$c = c_1 * c_2 * \cdots * c_n,$$

d'où dans $\Pi_\Sigma(X)$

$$\mathrm{hot}(c) = \mathrm{hot}(c_n)\mathrm{hot}(c_{n-1}) \cdots \mathrm{hot}(c_1),$$

or $\mathrm{hot}(c_i) = \mathrm{hot}\,\mathrm{ch}(u_i) = \kappa(u_i)$, donc

$$\begin{aligned} \mathrm{hot}(c) &= \kappa(u_n)\kappa(u_{n-1}) \cdots \kappa(u_1) \\ &= \kappa(\underbrace{u_n u_{n-1} \cdots u_1}_{u}), \end{aligned}$$

puisque κ est un foncteur, donc

$$\mathrm{hot}(c) = \mathrm{hot}\,\mathrm{ch}(u),$$

c.q.f.d.

p. 48

[page 72]

Notons maintenant que si (X', Σ') est un deuxième couple d'une catégorie X' et d'un ensemble *'admissible'* de flèches de X', et si

$$f : X \longrightarrow X'$$

est un foncteur tel que

$$f(\Sigma) \subseteq \Sigma',$$

alors il existe un *unique* foncteur

$$\bar{f} = \Pi_\Sigma(f) : \Pi_\Sigma(X) \longrightarrow \Pi_{\Sigma'}(X')$$

qui 'prolonge' f, i.e. tel que le carré

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\kappa_X} & \Pi_\Sigma(X) \\ \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle \bar{f}=\Pi_\Sigma(f)} \\ X' & \xrightarrow{\kappa_{X'}} & \Pi_{\Sigma'}(X') \end{array}$$

soit commutatif. L'unicité résulte du fait que sur les objets $\bar{f}$ doit être donné par f, et que sur les flèche la commutativité du carré implique que $\bar{f}$ est connu sur les flèches de la forme $\kappa_X(u)$, ainsi donc que sur les inverses de telles flèches, quand ces inverses sont inversibles, donc en particulier sur les $\kappa_X(u)^{-1}$ pour $u \in \Sigma$. Or toute flèche de $\Pi_\Sigma(X)$, provenant d'un chemin, est composé d'une suite de flèches de cette forme. Pour l'existence de $\bar{f}$, on note que f induit des foncteurs

$$\underline{\mathrm{Ch}}_\tau(X; a, b) \longrightarrow \underline{\mathrm{Ch}}_\tau(X'; f(a), f(b))$$

qui commutent aux opérations φ^* sur les chemins associées aux foncteurs

$$\varphi : \tau \longrightarrow \tau',$$

d'où un homomorphisme de catégories fibrées sur $\underline{\mathrm{Ty}}$

$$f_{a,b} : \underline{\mathrm{Ch}}(X; a, b) \longrightarrow \underline{\mathrm{Ch}}(X'; f(a), f(b)).$$

D'où une application sur les π_0, i.e.

$$\bar{f}_{a,b} : \mathrm{Hom}_\Sigma(a, b) \longrightarrow \mathrm{Hom}_\Sigma(f(a), f(b)),$$

[page 73]

donnée par

$$\bar{f}_{a,b}(\mathrm{hot}(c)) = \mathrm{hot}(f_{a,b}(c)).$$

On a évidemment, pour deux chemins $\gamma : a \longrightarrow b$ et $\gamma' : b \longrightarrow c$,

$$f_{a,c}(\gamma\gamma') = f_{b,c}(\gamma') f_{a,b}(\gamma),$$

ce qui prouve que $\bar{f}$ est compatible avec la composition. Il est trivial qu'il est compatible avec les identités (car $f_{a,a}$ transforme le chemin vide en a en le chemin vide en $f(a)$), donc on a un foncteur $\bar{f}$, et il rend bel et bien le carré commutatif.

On peut maintenant prouver la propriété universelle de $\Pi_\Sigma(X)$ et de

$$X \xrightarrow{\kappa} \Pi_\Sigma(X),$$

savoir que tout foncteur $f : X \longrightarrow X'$ tel que $u \in \Sigma \Longrightarrow f(u)$ inversible, se factorise *de façon unique* par $\Pi_\Sigma(X)$. L'unicité se voit comme tantôt ([20]). Pour l'existence, on note que f applique Σ dans l'ensemble Σ'

p. 49

[page 74]

des flèches inversibles de X' (lequel ensemble satisfait bien aux deux conditions d'admissibilité). Donc par ce qui précède on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\kappa} & \Pi_\Sigma(X) \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \overset{\bar f}{\nearrow} & \downarrow{\scriptstyle \bar f = \Pi_\Sigma(f)} \\ X' & \xrightarrow[\sim]{\kappa'} & \Pi_{\Sigma'}(X'), \end{array}$$

où $\bar f$ est uniquement déterminé. Comme κ' est un isomorphisme (comme on a vu tantôt, puisque Σ' `[est]` formé des flèches inversibles), l'existence et l'unicité de $\bar f$ équivaut à la conclusion annoncée,

c.q.f.d.

Encore un sorite sur les classes d'homotopie d'éléments d'une catégorie X. De façon générale, on voit que X et $\Pi_\Sigma(X) = X\Sigma^{-1}$ ont mêmes composantes connexes, car si a et b dans X sont reliés par une flèche de $X\Sigma^{-1}$, i.e. par un Σ-chemin, alors ils sont dans une même composante connexe de X. Mais l'inverse est également vrai, comme on voit p. ex. en prenant $\Sigma = \mathrm{Fl}(X)$, et en disant que dans le *groupoïde* $\Pi(X)$, où deux sommets sont dans une même composante `[connexe]` si et seulement si $\exists\ x \longrightarrow y$ (relation qui est non seulement transitive et reflexive, mais aussi symétrique dans un groupoïde). Un chemin [page 75]

$$a \xrightarrow{c} b$$

sera appelé aussi une *homotopie* de a vers b. On dit que a et b sont *homotopes* s'il existe une homotopie c de a vers b, auquel cas il existe aussi une homotopie 'inverse' c^o de b vers a. Cela signifie aussi que a et b sont dans la même composante connexe de X, i.e. définissent le même élément de $\pi_0(X)$.

L'homotopie sera dite *simple* si c est de type Δ_+ ou Δ_-, i.e. si elle est donnée par une flèche $u : a \longrightarrow b$ ou $v : b \longrightarrow a$. Si on cherche une homotopie entre a et b, on essaiera de la trouver la plus 'courte' possible. Si on a une homotopie c de longueur l de a vers b, alors en remplaçant τ par $\tau_{\text{réd}}$, donc I_τ par $I_{\tau\,\text{réd}}$, le sous-intervalle réduit correspondant, on trouve une homotopie de a à b de type $\tau_{\text{réd}}$, dont la longueur est égale à la *'longueur utile'* du type τ de c (ce qui justifie la terminologie). Notons que si [page 76]

$$\tau = \Delta_\varepsilon^{l_1}\Delta_{-\varepsilon}^{l_2}\Delta_\varepsilon^{l_3}\cdots\Delta_{(-1)^r\varepsilon}^{l_r},$$

alors

$$\tau_{\text{réd}} = \Delta_\varepsilon\Delta_{-\varepsilon}\Delta_\varepsilon\cdots\Delta_{(-1)^r\varepsilon},$$

`[plutôt deux fois` $(-1)^{r-1}$`]` où r est la longueur utile de τ (la longueur pas utile étant $n = \sum_{i\in[1,r]} l_i$). p. 50

Quand on part d'une homotopie entre *foncteurs*

$$X \longrightarrow Y,$$

il est entendu qu'il s'agit d'homotopies dans la catégorie $\underline{\mathrm{Hom}}(X, Y)$. (Ou, suivant le contexte, dans une sous-catégorie précisée de $\underline{\mathrm{Hom}}(X, Y)$.)

À la page 61, j'ai invoqué l'existence d'un *foncteur* de *'composition des chemins'* [page 77]


$$\underline{\mathrm{Ch}}_\Sigma(X; a, b) \times \underline{\mathrm{Ch}}_\Sigma(X; b, c) \longrightarrow \underline{\mathrm{Ch}}_\Sigma(X; a, c),$$

qui sur la fibre du premier membre au dessus de $(\tau, \tau') \in \mathrm{Ob}(\underline{\mathrm{Ty}} \times \underline{\mathrm{Ty}})$, serait donné par


$$\underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,\tau}(X; a, b) \times \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,\tau'}(X; b, c) \longrightarrow \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,\tau\tau'}(X; a, c), \qquad (*)$$

20. C'est inutile, cf. ci-dessous.

la composition des chemins de types précisés τ, τ'. Qu'on ait là un *foncteur,* pas seulement une application sur les ensembles d'objets, est assez évident, et peut s'exprimer par exemple à l'aide du diagramme d'amalga[ma]tion



en le transformant par $\underline{\mathrm{Hom}}(\cdot, X)$ (au lieu de le transformer par $\mathrm{Hom}_{\mathrm{Cat}}(\cdot, X)$ seulement), du moins dans le cas particulier où $\Sigma = \mathrm{Fl}(X)$ (qui était celui de la page 61). Mais le passage aux flèches est assez évident - pour deux composés $c_1' \circ c_1$ et $c_2' \circ c_2$, de




[on] voit que les homomorphismes w'' du premier dans le second, dans $\underline{\mathrm{Ch}}_\Sigma(X; a, c)$, qui sont l'identité sur le sommet d'indice $n+1$ des deux chemins (où $n = \log \tau$), correspondant à 1_τ et à $0_{\tau'}$, 'sont' exactement les couples formés d'un homomorphisme $w : c_1 \longrightarrow c_2$ et $w' : c_1' \longrightarrow c_2'$ dans $\underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,\tau}(a, b)$ et $\underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,\tau'}(b, c)$ respectivement, et si w'', w, w' se correspondent ainsi, on posera

p. 51
[page 78]

$$w'' = w * w'.$$

Il y a une transitivité évidente à vérifier pour voir que ça définit un *foncteur* $(*)$. On peut exprimer la situation à l'aide du diagramme



où p_1, p_2 sont les deux projections. On considère sur $\underline{\mathrm{Ty}} \times \underline{\mathrm{Ty}}$ les trois catégories fibrés

$$p_1^*(\underline{\mathrm{CH}}_{\Sigma,\tau}(a,b)), \quad p_2^*(\underline{\mathrm{CH}}_{\Sigma,\tau'}(b,c)), \quad \pi^*(\underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,\tau\tau'}(a,c))$$

[plutôt $\pi^*(\underline{\mathrm{CH}}_{\Sigma,\tau\tau'}(a,c))$], dont les fibres en (τ, τ') sont respectivement

$$\underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,\tau}(a,b), \quad \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,\tau'}(b,c), \quad \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,\tau\tau'}(a,c).$$

(On écrit $\underline{\mathrm{CH}}$ au lieu de $\underline{\mathrm{Ch}}$, pour indiquer que l'on considère les catégories envisagées comme des catégories (fibrées) *au dessus de* $(\underline{\mathrm{Ty}})$ ([21]).) Au dessus de $\underline{\mathrm{Ty}} \times \underline{\mathrm{Ty}}$, on a un homomorphisme (cartésien) de catégories fibrées

$$p_1^*(\underline{\mathrm{CH}}_\tau(a,b)) \times_{\underline{\mathrm{Ty}}\times\underline{\mathrm{Ty}}} p_2^*(\underline{\mathrm{CH}}_\tau(b,c)) \longrightarrow \pi^*(\underline{\mathrm{CH}}_\tau(a,c)) \qquad (**)$$

[plutôt $p_1^*(\underline{\mathrm{CH}}_\tau(a,b)) \times_{\underline{\mathrm{Ty}}\times\underline{\mathrm{Ty}}} p_2^*(\underline{\mathrm{CH}}_{\tau'}(b,c)) \longrightarrow \pi^*(\underline{\mathrm{CH}}_{\tau\tau'}(a,c))$], car c'est OK sur les

21. Mais il s'agit pour p_1^*, p_2^* et π^* de produits cartésiens ordinaires dans Cat, il n'y a pas à avoir peur et à écrire des $\underline{\mathrm{CH}}$ …

[page 79]

fibres ((∗) page 77), et si

$$(\varphi,\varphi') : (\tau_1,\tau_1') \longrightarrow (\tau,\tau') \qquad (\varphi : \tau_1 \longrightarrow \tau,\ \varphi' : \tau_1' \longrightarrow \tau')$$

est une flèche dans $\underline{\mathrm{Ty}} \times \underline{\mathrm{Ty}}$, on en déduit un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,\tau}(a,b) \times \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,\tau'}(b,c) & \xrightarrow{\text{comp.}} & \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,\tau}(a,c) \\ \downarrow{\scriptstyle \varphi^*_{a,b}\times(\varphi'_{b,c})^*} & & \downarrow{\scriptstyle (\varphi*\varphi')^*_{a,c}} \\ \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,\tau_1}(a,b) \times \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,\tau_1'}(b,c) & \xrightarrow{\text{comp.}} & \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,\tau_1\tau_1'}(a,c) \end{array}$$

`[plutôt` $\underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,\tau\tau'}(a,c)$`]`, i.e. la composition des chemins d'extrémités fixés est compatible avec les images inverses de chemins par flèches entre les types de chemins. p. 52

Mais l'homomorphisme cartésien (∗∗) de catégories fibrées sur $\underline{\mathrm{Ty}} \times \underline{\mathrm{Ty}}$ n'est pas tout à fait la même chose qu'un anodin foncteur

$$\underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma}(a,b) \times \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma}(b,c) \ \longrightarrow\ \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma}(a,c). \qquad (*)$$

La formule (∗) définit en tout cas une application sur les ensembles d'objets, puisque les ensembles d'objets de chacune des trois catégories envisagées se décompose en somme d'ensembles $\underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,\tau}(\bullet,\bullet)$, où τ parcourt $\mathrm{Ty} = \mathrm{Ob}\,\underline{\mathrm{Ty}}$. Mais cela se prolonge-t-il de façon naturelle aux morphismes ?

Mais voilà que je me rappelle que ce fameux produit cartésien $p_1^*(\text{fourbi}) \times p_2^*(\text{machin})$ n'est autre que le produit cartésien tout bête `[page 80]`

$$\underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma}(a,b) \times \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma}(b,c),$$

envoyé sur $\underline{\mathrm{Ty}} \times \underline{\mathrm{Ty}}$ par le produit cartésien des deux foncteurs de projection

$$\begin{aligned} p_{a,b} : \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma}(a,b) &\longrightarrow \underline{\mathrm{Ty}} \\ p_{b,c} : \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma}(b,c) &\longrightarrow \underline{\mathrm{Ty}}, \end{aligned}$$

d'où

$$\begin{array}{c} \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma}(a,b) \times \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma}(b,c) \\ \downarrow{\scriptstyle p_{a,b}\times p_{b,c}} \\ \underline{\mathrm{Ty}} \times \underline{\mathrm{Ty}} \end{array}$$

qui est bel et bien fibrant (comme produit cartésien de deux foncteurs fibrants) et a les fibres qu'il faut ! On trouve donc bien, par le sorite général sur les foncteurs fibrants (ici sur $\underline{\mathrm{Ty}} \times \underline{\mathrm{Ty}}$) un foncteur de catégories fibrées sur $\underline{\mathrm{Ty}} \times \underline{\mathrm{Ty}}$ `[page 81]`

$$\underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma}(a,b) \times \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma}(b,c) \ \longrightarrow\ \underbrace{\pi^*(\underline{\mathrm{CH}}_{\Sigma}(a,c))}_{=(\underline{\mathrm{Ty}}\times\underline{\mathrm{Ty}})\times_{\underline{\mathrm{Ty}}}\underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma}(a,c)\ \ (22)} .$$

Comme on a d'autre part un foncteur du dernier membre (produit fibré) vers le facteur $\underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma}(a,c)$, on gagne. (On l'aurait retrouvé par le raisonnement direct que je m'apprêtais de faire, et que j'ai biffé - mais je suis plus heureux comme ça !)

Pour bien faire, il faudrait prouver l'*associativité* des foncteurs de composition, pas seulement au niveau des objets, par des arguments comme ceci, mais ça revient simplement à une relation du type p. 53

$$(w'' * w') * w = w'' * (w' * w)$$

22. produit fibré par $\pi : \underline{\mathrm{Ty}} \times \underline{\mathrm{Ty}} \longrightarrow \underline{\mathrm{Ty}}$.

pour un système de trois flèches dans

$$\underline{\mathrm{Ch}}_\Sigma(a,b),\ \underline{\mathrm{Ch}}_\Sigma(b,c)\ \text{ et }\ \underline{\mathrm{Ch}}_\Sigma(c,d)$$

respectivement. Ça ne peut être que trivialement vrai, mais fastidieux à expliciter. [page 82]

Les sueurs froides sont terminées !

En résumé, le formalisme des $\underline{\mathrm{Ch}}_\Sigma(X)$ et des $\underline{\mathrm{Ch}}_\Sigma(X;a,b)$ développé jusqu'à présent donne satisfaction complète sur les points suivants :

a) Bon formalisme de composition des chemins (qui était dégueulasse avant).

b) Traitement élégant de la construction des catégories de fractions $\mathcal{M}\Sigma^{-1}$. Mais je m'attends que ce sera moins joli qu'avant, quand il s'agira de remplacer un $(\mathcal{M},\Sigma)$ par des $(\underbrace{\mathcal{M}(X)}_{=\underline{\mathrm{Hom}}(X,\mathcal{M})},\Sigma_X)$ (X une catégorie d'indices) `[plutôt` $\underline{\mathrm{Hom}}(X^o,\mathcal{M})$`]`.
C'est pour y pallier qu'il me faudra développer des énoncés de comparaison, entre la catégorie $\underline{\mathrm{Ch}}_\Sigma$ construite ici, et d'autres dont le type dans Hot se prête aux calculs de façon plus directe, comme dans l'état premier de la question. De plus, on sera sûrement obligé d'en venir à des Ind-catégories, pour pouvoir suivre la variance de $\mathcal{M}(X)\Sigma_X^{-1}$ pour X variable.

c) Bon formalisme des 'homotopies' et des compositions des homotopies (ce qui est une autre façon de parler des chemins et de leur composition).

p. 54

[page 83]

8 Le lemme d'homotopie pour les morphismes d'intervalles

C'est le suivant :

Lemme 1. *Soient $\tau,\tau'\in\mathrm{Ty}$, et $f,g:\tau\rightrightarrows\tau'$ deux morphismes dans $\underline{\mathrm{Ty}}$. Alors f, g sont homotopes dans la catégorie $\underline{\mathrm{Hom}}\,\underline{\mathrm{int}}(I_\tau,I_{\tau'})$ des morphismes croissants d'intervalles orientés de I_τ dans $I_{\tau'}$.*

Cette catégorie pourrait licitement se désigner par $\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{\mathrm{Ty}}}(\tau,\tau')$, ou $\underline{\mathrm{Hom}}(\tau,\tau')$. C'est une sous-catégorie de la catégorie $\underline{\mathrm{Hom}}(I_\tau,I_{\tau'})$ de *tous* les foncteurs de I_τ dans $I_{\tau'}$, et une sous-catégorie pleine de la catégorie $\underline{\mathrm{Hom}}^\varepsilon(I_\tau,I_{\tau'})$ des foncteurs f qui sont compatibles avec la donnée des sources et des buts, i.e. qui rendent commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc} & \varepsilon=\{0,1\} & \\ {\scriptstyle(\sigma_\tau,\beta_\tau)}\swarrow & & \searrow{\scriptstyle(\sigma_{\tau'},\beta_{\tau'})} \\ I_\tau & \xrightarrow{\quad f\quad} & I_{\tau'}. \end{array}$$

Si f, g sont dans cette catégorie (pas forcément morphismes croissants d'ailleurs), une flèche de f dans g est donc la donnée, pour tout $i\in I_\tau$, d'une flèche $f(i)\xrightarrow{w_i}g(i)$ dans $I_{\tau'}$, avec les deux conditions :

a) Si $i\in\{0_\tau,1_\tau\}$, $w_i=\mathrm{id}$, et

b) le carré commutatif habituel pour une flèche $i\longrightarrow j$ dans I_τ. (Il suffit d'avoir cette compatibilité pour les flèches de transition $\underline{u}_i:i-1\longrightarrow i$ dans I_τ ($i\in[1,\log\tau]$).)

Une autre façon de décrire cette catégorie $\underline{\mathrm{Hom}}^\varepsilon$, c'est de dire que c'est la catégorie [page 84]

$$\underline{\mathrm{Ch}}_\tau(I_{\tau'};0_{\tau'},1_{\tau'})\qquad(\simeq\underline{\mathrm{Hom}}^\varepsilon(I_\tau,I_{\tau'})),$$

mais $\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{\mathrm{Ty}}}(\tau,\tau')$ est la sous-catégorie pleine de cette catégorie formée des *chemins croissants* dans $I_{\tau'}$. Le lemme d'homotopie signifie aussi que cette catégorie $\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{\mathrm{Ty}}}(\tau,\tau')$

est toujours *connexe.* Elle n'est d'ailleurs pas forcément 0-connexe, car elle peut être vide. Notons ici, pour plus tard, la

Proposition 1 : *Soient $\tau, \tau' \in \mathrm{Ty}$, soient r, r' leurs longueurs utiles. Pour que $\mathrm{Hom}_{\underline{\mathrm{Ty}}}(\tau, \tau')$ soit non vide, il faut et il suffit que l'une ou l'autre des deux conditions suivantes soit satisfaite :*

a) $r \geq r' + 1$

b) $r = r'$, *et (si* $r \neq 0$*)* τ *et* τ' *ont même direction initiale (de sorte que* $\tau_{\text{réd}} = \tau'_{\text{réd}}$*).*

p. 55

(Démonstration ± immédiate.)

Notons que si τ, τ' n'ont pas même direction initiale, alors tout morphisme $\tau \longrightarrow \tau'$ est forcément dégénéré sur le premier intervalle critique de I_τ. On aura donc $\tau = \Delta_\varepsilon^{l_0} \cdot \tau_0$ (où l_0 est la longueur du premier intervalle critique, et où τ_0 a `[la]` direction initiale opposée de celle de τ), et un isomorphisme

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\tau, \tau') \simeq \underline{\mathrm{Hom}}(\tau_0, \tau'),$$

où cette fois τ_0, τ' ont même direction initiale. On supposera donc désormais que *la direction initiale de τ, τ' est la même.* La condition $\underline{\mathrm{Hom}}(\tau, \tau') \neq \emptyset$ équivaut maintenant à $r \geq r'$, ce que nous pouvons supposer. Je vais alors décrire un élément canonique F_0 de $\underline{\mathrm{Hom}}(\tau, \tau')$, ainsi. Soient

[page 85]

$$I_1, I_2, \ldots, I_r$$

les intervalles critiques de I_τ, et

$$I'_1, I'_2, \ldots, I'_{r'} \qquad (r' \leq r)$$

ceux de $I_{\tau'}$. Le foncteur F_0 proviendra de morphismes d'intervalles orientés (comme

$$\left\{ \begin{array}{lcl} I_1 & \xrightarrow{f_1} & I'_1 \\ I_2 & \xrightarrow{f_2} & I'_2 \\ & \cdots & \\ I_{r'} & \xrightarrow{f_{r'}} & I'_{r'} \end{array} \right. \quad)$$

et sera donc forcément trivial sur les intervalles critiques I_α pour $r' < \alpha \leq r$ (il y en a si et seulement si $r > r'$). Comme I_τ, $I_{\tau'}$ ont même direction initiale, il s'ensuit que pour $\alpha \in [1, r']$, I_α et I'_α ont même signature (à savoir $\varepsilon_\alpha = (-1)^{\alpha+1}\varepsilon_1$, où ε_1 est la signature commune de I_1 et I'_1). Donc

$$I_\alpha = \Delta_{\varepsilon_\alpha}^{l_\alpha}, \qquad I'_\alpha = \Delta_{\varepsilon_\alpha}^{l'_\alpha},$$

et on définit f_α comme

$$f_\alpha = \mathfrak{f}_{\varepsilon_\alpha, l'_\alpha} * \mathrm{triv}_\alpha,$$

où

$$\mathfrak{f}_{\varepsilon_\alpha, l'_\alpha} : \Delta_{\varepsilon_\alpha} \longrightarrow \Delta_{\varepsilon_\alpha}^{l'_\alpha}$$

et où

$$\mathrm{triv}_\alpha : \Delta_{\varepsilon_\alpha}^{l_{\alpha-1}} \longrightarrow 1.$$

En d'autres termes, pour $\varepsilon = +1$ (p. ex.) on doit définir un morphisme des intervalles type $\underbrace{\mathbf{\Delta}_{l_\alpha}^+}_{=[0,l_\alpha]} \longrightarrow \underbrace{\mathbf{\Delta}_{l'_\alpha}^+}_{=[0,l'_\alpha]}$, et on pose (avec les numérotations internes à $\mathbf{\Delta}_{l_\alpha}$, $\mathbf{\Delta}_{l'_\alpha}$)

p. 56

$$f_\alpha(0) = 0, \qquad f_\alpha(i) = l'_\alpha \ \text{ pour } i \in [1, l_\alpha].$$

[page 86]

L'idée donc, c'est d'être dans les dispositions d'un voyageur qui, tenu à un plan de voyage par étapes décrit par τ, voudrait arriver aussi vite que possible à $1_{\tau'}$, en partant de $0_{\tau'}$. Il va dès la première étape $\Delta_\varepsilon \subseteq I_1$, se porter jusqu'au bout de I'_1, regrettant ne pas pouvoir aller plus loin (à cause du plan de voyage). Il doit rester inactif jusqu'à ce qu'il soit arrivé au moment marqué par l'extrémité finale de I_1 (si celle-ci est au delà de celle de sa première flèche de transition, i.e. si $l_1 > 1$), puis il fait son deuxième grand pas jusqu'à l'extrémité terminale de I'_2 etc. Il peut espérer, à chaque moment de son voyage, être en avance (ou du moins pas en retard) sur les autres voyageurs, qui auraient suivi de tactiques de progression différentes. Si cet espoir était justifié, cela signifierait que F_0 serait un plus grand élément de $\underline{\mathrm{Hom}}(\tau, \tau')$ (**NB** toutes ces catégories $\underline{\mathrm{Hom}}$ entre intervalles sont 'ordonnées', i.e. il y a au plus une flèche entre deux objets), i.e. un objet final. Cela impliquerait que $\underline{\mathrm{Hom}}(\tau, \tau')$ serait même contractile - chose peut-être vraie, mais sûrement pas de façon si simpliste je crains. Je me suis d'ailleurs canulé : F_0 est sans doute bien un 'plus grand' élément, mais pour l'ordre défini par la numérotation des sommets de $I_{\tau'}$ (donc $F \leq G$ si et seulement si $F(i) \leq G(i)\ \forall i \in I_\tau$), et nullement pour l'ordre défini par la structure de catégorie de $\underline{\mathrm{Hom}}(\tau, \tau')$.

L'idée pour prouver la connexité de $\underline{\mathrm{Hom}}(\tau, \tau')$, c'est de ramener tout $F \in \mathrm{Hom}(\tau, \tau')$, par une suite d'homotopies simples, à la forme normale. Rappelons que F est donné par une suite croissante de flèches de transition [page 87]

$$\underline{u}_{i_1},\ \underline{u}_{i_2},\ \ldots\ ,\ \underline{u}_{i_s}, \qquad i_1 < i_2 < \cdots < i_s,$$

et une suite d'entiers ≥ 1

$$\lambda_1,\ \lambda_2,\ \ldots\ ,\ \lambda_s$$

avec la condition que

$$\Delta^{\lambda_1}_{\varepsilon_{i_1}} \Delta^{\lambda_2}_{\varepsilon_{i_2}} \cdots \Delta^{\lambda_s}_{\varepsilon_{i_s}} = \tau'. \qquad (*)$$

Les $\underline{u}_{i_\alpha}$ sont les flèches de transition de I_τ *critiques* pour F, i.e. non dégénérées pour F, et λ_α est la *partie* de $\underline{u}_{i_\alpha}$ pour F. Le foncteur normalisé ('pressé') F_0 est distingué par les conditions suivantes a) et b) `[et c)]`. Tout d'abord :

a) La suite des signes $\varepsilon_{i_1}, \varepsilon_{i_2}, \ldots, \varepsilon_{i_s}$ est 'alternée', i.e. $\varepsilon_{i_\alpha} \neq \varepsilon_{i_{\alpha+1}}$ ($\alpha \in [1, s-1]$). (Cela traduit le fait que le voyageur pressé ne fait pas en plusieurs pas ce qu'il pourrait faire en un seul.)
Comme le premier de ces signes est forcément $\varepsilon'_1 = \varepsilon_1$, cela signifie que la suite des signes est la même que celle des ε_1, ε_2, ..., $\varepsilon_{r'}$ (à la longueur près). Mais mieux, que l'expression $(*)$ de τ' est son unique expression réduite, donc que $s = r'$ (longueur utile de τ'), et que les λ_i sont les longueurs l'_i des intervalles critiques de $I_{\tau'}$.
Soit donc $\alpha \in [1, s = r']$, et considérons la flèche de transition F-critique $\underline{u}_{i_\alpha}$, soit j_α l'indice marquant l'intervalle critique de I_τ contenant la partie de $\underline{u}_{i_\alpha}$ dans I_τ, p. 57 [page 88]

$$\underline{u}_{i_\alpha} \in \mathrm{Fl}(I_{j_\alpha}),$$

alors F induit des morphismes (croissants) d'intervalles orientés

$$F_\alpha = F|I_{j_\alpha} : I_{j_\alpha} \longrightarrow I'_\alpha$$

et est trivial sur les autres intervalles critiques (ceux pas de la forme I_{j_α}). La donnée des F_α détermine donc F sur les I_{j_α}, donc sur *tous* les I_j, donc partout (par l'opération $*$ de composition par recollement). De plus la condition a) assure que chaque F_α est de nature assez particulière : une seule flèche de transition critique $\underline{u}_{i_\alpha}$. De plus, pour qu'on ait $F = F_0$, il faudra :

b) $\forall \alpha \in [1, r']$, $\underline{u}_{i_\alpha}$ est la *première* flèche de transition de l'intervalle critique I_{j_α} qui la contient.

Et enfin :

c) La suite des intervalles critiques de I_τ

$$I_{j_1},\ I_{j_2},\ \ldots\ ,\ I_{j_{r'}} \qquad \text{(de signes alternés } \varepsilon_1,\ -\varepsilon_1,\ \varepsilon_1,\ \ldots)$$

associés aux flèches F-critiques, n'est autre que celle

$$I_1,\ I_2,\ \ldots\ ,\ I_{r'}$$

des r' premiers intervalles critiques de I_τ, i.e.

$$(j_1, j_2, \ldots, j_{r'}) = (1, 2, \ldots, r').$$

[page 89] Ceci vu, l'idée naturelle pour 'déformer' F en F_0, c'est de trouver une suite d'homotopies qui transforment F de façon à lui faire acquérir successivement les caractéristiques a), b), c) du voyageur pressé. Au besoin, pour aller plus vite au but, on utilisera l'hypothèse de récurrence sur $n = \log \tau$, que le théorème de connexité est déjà prouvé quand I est de longueur $\leq n-1$. (NB Ce théorème est trivial pour $n \leq 1$, car alors les catégories $\underline{\mathrm{Hom}}(\tau, \tau')$ sont toutes ou bien vides, ou bien ponctuelles.)

[page 90] 1) On veut assurer a). Pour ceci, on utilise l'hypothèse de récurrence, pour remplacer un groupe de `[mot illisible]` flèches critiques consécutives de même signe, par une seule flèche critique. Cette méthode ne foire que si les flèches critiques sont toutes de même signe ε et incluent $\underline{u}_1$ et $\underline{u}_n$. Mais l'hypothèse de récurrence appliquée à $I = [1, n-1] \subseteq I_\tau$ nous ramène au cas où il n'y a que deux flèches critiques $\underline{u}_1$ et $\underline{u}_n$. Si le premier intervalle critique n'est pas réduit à Δ_ε, i.e. soit de longueur 2, alors l'hypothèse de récurrence appliquée à $I = [1, n] \subseteq I_\tau$ nous ramène au cas où les deux flèches critiques sont $\underline{u}_1$ et $\underline{u}_2$, et on est alors ramené au cas où $\boxed{I = \Delta_\varepsilon^2,\ \tau' = \Delta_\varepsilon^2.}$ Sinon, au cas où p. 58 [page 91] $\boxed{\tau = \Delta_\varepsilon \Delta_{-\varepsilon}^{l_2} \Delta_\varepsilon,\ \tau' = \Delta_\varepsilon^2,}$ et où les deux flèches critiques sont encore la première et la dernière, et $\tau' = \Delta_\varepsilon^2$. Ce sont là les deux cas irréductibles, qu'il faudra traiter à part.

Ces cas admis, on a donc moyen pour définir F de façon à satisfaire a). Ensuite on veut :

2) Assurer que la suite des intervalles critiques I_{j_1}, I_{j_2}, ..., $I_{j_{r'}}$ qui contient les flèches critiques $\underline{u}_{i_1}$, ..., $\underline{u}_{i_{r'}}$, soit la suite I_1, ..., $I_{r'}$. C'est encore immédiat par l'hypothèse de récurrence, le seul cas irréductible étant celui où $r' = 1$ (une seule flèche critique), et où il s'agit de faire descendre cette flèche critique jusqu'à $\underline{u}_1$. Si I_1 est de longueur > 1, alors on fait descendre en $\underline{u}_2$ par hypothèse de récurrence, et le cas irréductible est celui où $\boxed{\tau = \Delta_\varepsilon^2,\ \tau' = \Delta_\varepsilon,}$ une flèche critique $\underline{u}_2$, la faire descendre en $\underline{u}_1$. Si par contre I_1 `[est]` de longueur 1, le cas irréductible est $\boxed{\tau = \Delta_\varepsilon \Delta_{-\varepsilon}^{l_2} \Delta_\varepsilon,\ \tau' = \Delta_\varepsilon,}$ une flèche critique $\underline{u}_{l_2+2}$, la faire descendre en $\underline{u}_1$.

Sous réserve de traiter les deux nouveaux cas irréductibles, on peut déformer F en un foncteur qui satisfait à a) et à c). Reste à normaliser chacun des $F_\alpha : I_\alpha \longrightarrow I'_\alpha$ ($\alpha \in [1, r']$). Donc on est ramené à $\Delta_\varepsilon^n \longrightarrow \Delta_\varepsilon$: une seule flèche critique $\underline{u}_\alpha$, $\alpha \in [1, n]$, à faire descendre en $\underline{u}_1$. Si $n \geq 2$, par hypothèse de récurrence elle descend en $\underline{u}_2$, cas supposé traité en 2°). Donc on gagne, sous réserve de traiter les 4 cas irréductibles. [page 92]

A) Cas $\tau = \Delta_\varepsilon^2$, $\tau' = \Delta_\varepsilon^2$ ou Δ_ε.

La catégorie $\underline{\mathrm{Hom}}(\Delta_\varepsilon^2, \Delta_\varepsilon)$ a deux éléments, les morphismes $\Delta_\varepsilon^2 \longrightarrow \Delta_\varepsilon$ correspondent aux flèches de transition de Δ_ε^2 ($= \mathbf{\Delta}_2^+$ ou $\mathbf{\Delta}_2^-$). Dans le cas $\varepsilon = +1$, ce sont les deux

applications de $\{0,1,2\}$ dans $\{0,1\}$, qui appliquent 0 en 0, 2 en 1, et 1 soit en 1 (F_0), soit en 1 `[plutôt en 0]` (F_1).

$$0 \longrightarrow 1 \longrightarrow 2$$

$$0 \longrightarrow 1$$

On a évidemment une flèche $F_1 \longrightarrow F_0$ (le voyageur pressé arrive plus vite …). Similaire pour $\varepsilon = -1$,

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\Delta^2_\varepsilon, \Delta_\varepsilon) \simeq \mathbf{\Delta}^1, \qquad \text{catégorie 0-connexe.}$$

La catégorie $\underline{\mathrm{Hom}}(\Delta^2_\varepsilon, \Delta^2_\varepsilon)$ a trois éléments, s'identifiant à l'ensemble des parties non vide de l'ensemble $\mathrm{Tr}(\tau)$ à deux éléments des flèches de transition $\underline{u}_1$, $\underline{u}_2$ de τ : il y a $F_{\underline{u}_1} = F_0$, $F_{\underline{u}_2}$, $F_{\underline{u}_1,\underline{u}_2}$. Si $\varepsilon = +1$, il s'agit des applications croissantes (sans plus) de $\{0,1,2\}$ dans $\{0,1,2\}$, appliquant 0 en 0, 2 en 2, et 1 en ce qu'elle voudra.

p. 59

Donc $1 \longmapsto 2$ correspond à F_0

$1 \longmapsto 1$ correspond à F_1

$1 \longmapsto 0$ correspond à F_2

et on a bien sur $F_2 \longrightarrow F_1 \longrightarrow F_0$,

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\Delta^2_\varepsilon, \Delta^2_\varepsilon) \simeq \mathbf{\Delta}^2, \qquad \text{catégorie 0-connexe.}$$

Dans ces deux cas, deux éléments de $\mathrm{Hom}(\tau, \tau')$ sont reliés par une homotopie *simple.*

[page 93]

B) Cas $\tau = \Delta_\varepsilon \Delta^l_{-\varepsilon} \Delta_\varepsilon$, $\tau' = \Delta^2_\varepsilon$ ou Δ_ε.

Notons que l'on a, pour $\tau, \tau' \in \underline{\mathrm{Ty}}$ quelconque, un isomorphisme de catégories

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\tau, \tau') \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(\tau'^o, \tau^o),$$

exprimant simplement que

$$\tau \longmapsto \tau^o$$

est un `[2]`-foncteur de $\underline{\mathrm{Ty}}$ dans $\underline{\mathrm{Ty}}$, et même un automorphisme de cette `[2]`-catégorie. Donc dire que $\underline{\mathrm{Hom}}(\tau, \tau')$ est connexe revient à dire que $\underline{\mathrm{Hom}}(\tau^o, \tau'^o)$ l'est. Donc on peut supposer ci-dessus que $\varepsilon = +1$ (et pareil dans A !).

$$\tau : \quad \longrightarrow \underbrace{\longleftarrow \longleftarrow \cdots \longleftarrow}_{l} \longrightarrow$$

$$\tau' : \quad \longrightarrow \longrightarrow \quad \text{ou} \quad \longrightarrow .$$

Mais tous les morphismes $\tau \longrightarrow \tau'$ sont triviaux sur l'intervalle critique I_2 (rétrograde), ce qui implique que

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\tau, \tau') \xleftarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}(\Delta^2_\varepsilon, \tau'),$$

via le foncteur de contraction canonique

$$I_\tau \longrightarrow I_{\Delta^2_\varepsilon} = \mathbf{\Delta}^2.$$

Or dans A on a vu que $\underline{\mathrm{Hom}}(\Delta^2_\varepsilon, \tau')$ est connexe (pour τ' de la forme Δ_ε ou Δ^2_ε).

On a gagné !

p. 60

[page 94]

9 Théorème d'homotopie pour les catégories de chemins

Soient X une catégorie, $\Sigma \subseteq \mathrm{Fl}(X)$ [un] ensemble admissible de flèches dans X, $a, b \in \mathrm{Ob}\, X$. Considérons pour $\tau \in \mathrm{Ty}$ variable, les catégories

$$\underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,\tau}(X), \qquad \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,\tau}(X; a, b),$$

qui forment les fibres des catégories Cat-fibrées

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma}(X) & \xleftarrow{\text{incl.}} & \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma}(X; a, b) \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & \underline{\mathrm{Ty}} & \end{array}$$

sur la catégorie $\underline{\mathrm{Ty}}$. Ainsi, pour $\tau, \tau' \in \mathrm{Ty}$, et pour toute

$$\varphi : \tau \longrightarrow \tau',$$

on a un carré commutatif d'homomorphismes

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,\tau'}(X) & \xleftarrow{\text{incl.}} & \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,\tau'}(X; a, b) \\ {\scriptstyle \varphi_X^*}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \varphi_{a,b}^*} \\ \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,\tau}(X) & \xleftarrow{\text{incl.}} & \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,\tau}(X; a, b), \end{array}$$

avec transitivité pour φ variable (composition $\psi \circ \varphi$ de flèches dans $\underline{\mathrm{Ty}}$).

En fait, pour φ variable dans $\underline{\mathrm{Hom}}(\tau, \tau')$, les foncteurs images inverses φ_X^*, $\varphi_{a,b}^*$ dépendent *fonctoriellement* de φ ; i.e. on a des *foncteurs*

$$\begin{array}{ccc} & & \underline{\mathrm{Hom}}(\underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,\tau'}(X), \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,\tau}(X)) \\ & \nearrow & \\ \underline{\mathrm{Hom}}(\tau, \tau') & & \\ & \searrow & \\ & & \underline{\mathrm{Hom}}(\underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,\tau'}(X; a, b), \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,\tau}(X; a, b)) \end{array} \qquad (*)$$

Cela provient de l'inclusion

p. 61
[page 95]

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\tau, \tau') \hookrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}^{\varepsilon}(I_\tau, I_{\tau'})$$

et de la description des catégories $\underline{\mathrm{Ch}}_\tau$, $\underline{\mathrm{Ch}}_{\tau'}$ comme catégories de foncteurs, telle

$$\underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,\tau}(X) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{\Sigma_\tau,\Sigma}(I_\tau, X),$$

où Σ_τ désigne l'ensemble des flèches dans I_τ qui sont soit inversibles, soit *rétrogrades.* (Cet ensemble de flèches est admissible, car stable par composition.) On désigne par $\underline{\mathrm{Hom}}_{\Sigma_\tau,\Sigma}$ la sous-catégorie pleine de $\underline{\mathrm{Hom}}$ formée des foncteurs qui appliquent Σ_τ dans Σ. Or de façon générale, si

$$(I, \Sigma_I), \quad (I', \Sigma_{I'}), \quad (X, \Sigma)$$

sont trois catégories, munies d'ensembles admissibles de flèches, considérant les foncteurs $\varphi : I \longrightarrow I'$ avec $\varphi(\Sigma_I) \subseteq \Sigma_{I'}$, alors le foncteur familier

$$\underline{\mathrm{Hom}}(I, I') \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(\underline{\mathrm{Hom}}(I', X), \underline{\mathrm{Hom}}(I, X))$$

(transposé du foncteur de composition

$$\begin{array}{ccccc} \underline{\mathrm{Hom}}(I,I') & \times & \underline{\mathrm{Hom}}(I',X) & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Hom}}(I,X) \\ (\varphi & , & F') & \longmapsto & F'\circ\varphi \quad), \end{array}$$

se généralise en un foncteur

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\Sigma_I,\Sigma_{I'}}(I,I') \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(\underline{\mathrm{Hom}}_{\Sigma_{I'},\Sigma}(I',X),\underline{\mathrm{Hom}}_{\Sigma_I,\Sigma}(I,X)), \qquad (*)$$

transposé du foncteur de composition

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\Sigma_I,\Sigma_{I'}}(I,I') \times \underline{\mathrm{Hom}}_{\Sigma_{I'},\Sigma}(I',X) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{\Sigma_I,\Sigma}(I,X)$$

induit par $(*)$.

Comme toute [page 96]

$$\varphi : \tau \longrightarrow \tau'$$

induit

$$\varphi : I_\tau \longrightarrow I_{\tau'},$$

transformant flèches rétrogrades en flèches identiques ou rétrogrades, i.e.

$$\varphi(\Sigma_\tau) \subseteq \Sigma_{\tau'},$$

on trouve le premier des deux foncteurs $(*)$ annoncés page 94, qui est associé par transposition au foncteur γ p. 62

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{Hom}}(\tau,\tau') \times \underbrace{\underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,\tau'}(X)}_{\simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{\Sigma_{\tau'},\Sigma}(I_{\tau'},X)} & \xrightarrow{\quad\gamma\quad} & \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,\tau}(X) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \mathrm{can.}} & & \Big\| \\ \underline{\mathrm{Hom}}_{\Sigma_\tau,\Sigma_{\tau'}}(I_\tau,I_{\tau'}) \times \underline{\mathrm{Hom}}_{\Sigma_{\tau'},\Sigma}(I_{\tau'},X) & \overset{\gamma_0}{\cdots\cdots\rightarrow} & \underline{\mathrm{Hom}}_{\Sigma_\tau,\Sigma}(I_\tau,X) \end{array} \qquad (*)$$

déduit du foncteur composition γ_0 dans ce diagramme : $\gamma = \gamma_0 \circ \mathrm{can}$. D'autre part, ce foncteur de composition γ induit visiblement un foncteur sur les sous-catégories de chemins à source et but fixés

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\tau,\tau') \times \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,\tau'}(X;a,b) \longrightarrow \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,\tau}(X;a,b),$$

d'où la deuxième des deux flèches annoncées dans $(*)$ p. 94.

Cela montre donc que si

$$\varphi_1,\varphi_2 : \tau \rightrightarrows \tau'$$

sont deux morphismes de τ dans τ' homotopes dans $\underline{\mathrm{Hom}}(\tau,\tau')$, alors les foncteurs induits entre catégories de Σ-chemins ou entre catégories de Σ-chemins à extrémités précisés : [page 97]

$$\begin{array}{rccc} \varphi_{1\,X}^*, \varphi_{2\,X}^* : & \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,\tau'}(X) & \rightrightarrows & \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,\tau}(X), \\ (\varphi_1)_{a,b}^*, (\varphi_2)_{a,b}^* : & \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,\tau'}(X;a,b) & \rightrightarrows & \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,\tau}(X;a,b) \end{array}$$

sont également homotopes.

Or le lemme d'homotopie nous assure que l'hypothèse $\varphi_1 \sim \varphi_2$ est *toujours* satisfaite. Donc :

Théorème d'homotopie sur les opérations universelles sur les chemins. *Soient X, Σ, a, b comme dessus, et $\tau, \tau' \in \mathrm{Ty}$ telles que* $\mathrm{Hom}(\tau, \tau') \neq \emptyset$. *Alors les foncteurs φ_X^*, $\varphi_{X;a,b}^*$ induits par un $\varphi \in \mathrm{Hom}(\tau, \tau')$*

$$\begin{cases} \varphi_X^* : & \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,\tau'}(X) & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,\tau}(X) \\ \varphi_{X;a,b}^* : & \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,\tau'}(X;a,b) & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,\tau}(X;a,b) \end{cases}$$

ne dépendent pas de φ, à homotopie près.

On peut préciser cet énoncé, de telle façon que l'énoncé pour les $\varphi_{X;a,b}^*$ apparaisse, comme il devrait, comme corollaire pour celui sur φ_X^*. Pour ceci, on va regarder les catégories de chemins dans X comme catégories *au dessus de X,* par les foncteurs 'source et but' :

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,\tau}(X) & & \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,\tau'}(X) \\ & {\scriptstyle (\sigma_\tau,\beta_\tau)} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle (\sigma_{\tau'},\beta_{\tau'})} & \\ & X \times X & \end{array}$$

Alors le foncteur $(*)$ (p. 94) se factorise par la sous-catégorie $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Cat}/X\times X}(\cdot,\cdot)$ de $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Cat}}(\cdot,\cdot)$ formée des foncteurs qui commutent aux foncteurs de projection dans $X \times X$, et les homomorphismes entre tels foncteurs qui s'effectuent par des flèches 'verticales' de la catégorie but (i.e. par des flèches au dessus de flèches identiques de la catégorie base $X \times X$) : p. 63 [page 98]

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\tau, \tau') \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Cat}/X\times X}(\underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,\tau'}(X), \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,\tau}(X)).$$

Donc dans l'énoncé du théorème d'homotopie, on peut préciser que l'homotopie se fait dans cette sous-catégorie, i.e. s'effectue par une suite d'homotopies simples qui sont des morphismes de foncteurs entre catégories au dessus de $X \times X$. Cela implique alors l'énoncé d'homotopie sur les $\varphi_{X;a,b}^*$.

p. 64 [page 99]

10 Question de comparaison pour les catégories Cat-fibrées satisfaisant au 'théorème d'homotopie' (base filtrante)

Nous allons généraliser maintenant au cas d'une catégorie (Cat)-fibrée sur une autre

$$\begin{array}{c} C \\ {\scriptstyle \pi}\downarrow \\ T, \end{array}$$

en pensant surtout au cas $T = \underline{\mathrm{Ty}}$, $C = \underline{\mathrm{Ch}}_\Sigma(X;a,b)$. L'hypothèse essentielle est la suivante :

(Hypothèse d'homotopie) Si $t, t' \in \mathrm{Ob}\, T$ sont tels que $\mathrm{Hom}(t,t') \neq \emptyset$, alors les foncteurs $\varphi^* : C_{t'} \longrightarrow C_t$ associés aux $\varphi \in \mathrm{Hom}(t,t')$ sont homotopes.

Ils définissent donc une seule et même flèche dans Cat hot. Je désigne par T_{ord} ou T_{o} l'ensemble $\mathrm{Ob}\,(T)$, avec comme relation d'ordre celle déduite de la structure de catégorie :

$$t \leq t' \qquad \Longleftrightarrow \qquad \mathrm{Hom}_T(t,t') \neq \emptyset,$$

de sorte qu'on a un foncteur

$$T \longrightarrow T_{\mathrm{o}}$$

qui est *universel* pour les foncteurs de T dans des catégories 'ordonnées' (i.e. où toute flèche est monomorphique [non, cf. $\bullet \rightrightarrows \bullet$; plutôt, où toujours $\#\mathrm{Hom}(a,b) \leq 1$ (admettant des isomorphismes non identiques)]) ou pour les foncteurs F sur T tels que F soit constant sur tout $\mathrm{Hom}(t,t')$. L'hypothèse d'homotopie peut s'exprimer en disant que le foncteur composé

$$T^o \longrightarrow \mathrm{Cat} \longrightarrow \mathrm{Cat\,hot}$$

$$t \longmapsto C_t$$

se factorise (évidemment de façon unique) en un foncteur [page 100]

$$H_C : T_{\mathrm{o}}^o \longrightarrow \mathrm{Cat\,hot},$$

i.e. qu'on a un diagramme commutatif p. 65

$$\begin{array}{ccc} T^o & \xrightarrow{t \longmapsto C_t} & \mathrm{Cat} \\ \downarrow & & \downarrow \\ T_{\mathrm{o}}^o & \xrightarrow{H_C} & \mathrm{Cat\,hot}. \end{array}$$

Nous allons supposer de plus :

(Hypothèse de filtration) L'ensemble ordonné T_{o} associé à T est *filtrant* décroissant (filtrant à gauche), i.e. si $t, t' \in \mathrm{Ob}\, T$, il existe $t'' \in \mathrm{Ob}\, T$ et des flèches $t'' \longrightarrow t$, $t'' \longrightarrow t'$.

Cette hypothèse est bien satisfaite dans $\underline{\mathrm{Ty}}$, car pour $\tau, \tau' \in \mathrm{Ob}\,\underline{\mathrm{Ty}} = \mathrm{Ty}$, il suffit de prendre $\tau\tau'$, qui s'envoie dans τ par $\mathrm{id}_\tau * p_{\tau'}$, dans τ' par $p_\tau * \mathrm{id}_{\tau'}$, où $p_\tau : \tau \longrightarrow 1$ est le morphisme de τ dans l'objet final.

Ainsi, H_C définit un ind-objet de Cat hot, que nous allons désigner par $\underline{\underline{C}}$. Si on suppose de plus :

(Hypothèse de dénombrabilité, toujours satisfaite si $\mathrm{card}\, T_{\mathrm{o}} \leq \aleph_0$) T_{o} admet un sous-ensemble *dénombrable* cofinal à gauche.

alors cet ind-objet de Cat hot peut être défini, de beaucoup de façons, en termes d'un système inductif dans Cat (pas seulement dans Cat hot) [page 101]

$$(C_n)_{n \in \mathbf{N}},$$

d'où on récupère l'ind-objet $\underline{\underline{C}}$ dans Cat hot en passant au système inductif correspondant dans Cat hot, puis à l'ind-objet associé.

Pour construire le système inductif C_n, il suffit de prendre une chaîne infinie

$$t_0 \longleftarrow t_1 \longleftarrow t_2 \longleftarrow \cdots \longleftarrow t_n \longleftarrow t_{n+1} \longleftarrow \cdots$$

de morphismes dans T, telle que l'ensemble des t_i soit cofinal à gauche dans T_{o}. On va supposer de plus C *strictement fibrée* sur T (i.e. provenant d'un véritable foncteur $T^o \longrightarrow \mathrm{Cat}$, i.e. on peut choisir les foncteurs images inverses

$$\varphi^* : C_{t'} \longrightarrow C_t$$

de façon transitive stricte, pas seulement transitive à isomorphisme près) - cas auquel on peut toujours se ramener d'ailleurs par l'astuce de Giraud. Cette hypothèse est d'ailleurs vérifiée dans le cas $\underline{\mathrm{Ch}}_\Sigma(X; a, b)$ sur $\underline{\mathrm{Ty}}$. Ainsi, les

$$(C_{t_i})_{i \in \mathbf{N}}$$

forment un système inductif de catégories indexées par $\mathbf{N}$, le morphisme de transition

$$C_n \longrightarrow C_{n'} \qquad \text{i.e. } C_{t_n} \longrightarrow C_{t_{n'}}$$

étant le foncteur image inverse $\varphi^*_{n,n'}$, où

p. 66
[page 102]

$$\varphi_{n,n'} : t_{n'} \longrightarrow t_n$$

est le composé des $t_{n'} \longrightarrow t_{n'-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow t_n$. (Si on n'avait pas transitivité stricte, on définirait $\varphi^*_{n,n'}$ comme le composé des foncteurs image inverse par des flèches de transition successives $t_{n'} \longrightarrow t_{n'-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow t_{n+1} \longrightarrow t_n$, ce ne serait $\varphi^*_{n,n'}$ qu'à isomorphisme canonique près.)

Soit

$$C_\infty = \varinjlim_n C_n = \varinjlim_n C_{t_n}$$

la catégorie $\varinjlim$. (Elle sera surtout sympathique si on a pu choisir le système $(t_n)_{n\in\mathbf{N}}$ de telle façon que les foncteurs de transition

$$C_{t_n} \longrightarrow C_{t_{n-1}}$$

soient pleinement fidèles, et peut-être même [des] monomorphismes, de telle façon que les C_n s'identifient à des sous-catégories pleines de leur limite inductive C_∞.) Je voudrais comprendre les relations précises entre les trois genres d'objets suivants :

ⓐ C elle-même (comme objet dans Cat, pas de Cat/T), et surtout les objets de Cat hot et de Hot qui lui correspondent.

[page 103]

ⓑ C_∞, et les objets de Cat hot et de Hot qui lui correspondent. Dans quelle mesure ces deniers sont-ils indépendant du choix du système projectif cofinal à gauche $(t_n)_{n\in\mathbf{N}}$ dans T? Quel est le rôle de C_∞? Est-elle canoniquement isomorphe à C dans Cat hot, ou dans Hot? (Auquel cas la question de son 'rôle' me semblerait résolue!)

ⓒ Le ind-objet H_C dans Cat hot, et l'ind-objet de Hot qu'il définit.

Je note que l'ind-objet H_C, et aussi les catégories C_∞ construites comme dessus, ne changent pas quand on remplace T par une sous-catégorie T' cofinale à gauche, ou aussi par une catégorie de la forme T/t_0 ($t_0 \in \mathrm{Ob}\, T$), qui donne lieu à l'ensemble ordonnée associé

$$(T/t)_\mathrm{o} = T_\mathrm{o}/t = \{t \in T_\mathrm{o} \mid t \leq t_0\}$$

[plutôt $(T/t_0)_\mathrm{o} = T_\mathrm{o}/t_0 = \{t \in T_\mathrm{o} \mid t \leq t_0\}$]. Si la relation entre les objets dans a), et ceux dans b) et dans c), est très étroite, on en concluerait que le 'type' de C dans Cat hot, ou dans Hot suivant le cas, ne change pas en remplaçant C par $C \times_T T'$ ou par $C/t_0 \simeq C \times_T T/t_0$. Bien mieux, elle ne changerait pas en remplaçant T par $(\mathbf{N})^o$, la catégorie (ordonnée) opposée à $\mathbf{N}$ (ayant donc un unique objet final), et la catégorie fibrée C sur T par la catégorie $C_{\underline{t}}$ induite par C sur $(\mathbf{N})^o$, via le foncteur

p. 67
[page 104]

$$\underline{t} : (\mathbf{N})^o \longrightarrow T$$

défini par le système projectif $\underline{t} = (t_n)_{n\in\mathbf{N}}$ dans T. Cela signifierait donc que pour comprendre le type homotopique (au sens strict, i.e. dans Cat hot, ou large, i.e. dans Hot) de C, on peut le 'nettoyer' de façon draconienne, la base T étant vue comme une sorte de gangue un peu vaseuse, ou du moins pléthorique.

ⓓ De toutes façons, si T' est une autre catégorie filtrante à gauche, et

$$\alpha : T' \longrightarrow T$$

un foncteur cofinal à gauche, de sorte que C sur T, et $C' = C \times_T T'$ sur T', définissent essentiellement le 'même' objet de Ind Cat hot, et que la catégorie C'_∞ pour C' sur T' fait partie des catégories C_∞ pour C sur T - on peut se demander si le foncteur canonique [page 105]

$$C' \longrightarrow C$$

est également toujours un isomorphisme dans Cat hot, ou sinon, du moins dans Hot.

Un intérêt particulier s'attache à $\pi_0(C)$, et de plus à sa variance pour C sur T variable de la façon suivante. Si S est dans Cat, on regarde les catégories

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Cat}}(S, C_t) \qquad (t \in T),$$

on trouve un foncteur

$$t \longmapsto \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Cat}}(S, C_t), \qquad T^o \longrightarrow (\mathrm{Cat}),$$

d'où une catégorie fibrée sur T, que je vais désigner par

$$\underline{\mathcal{H}om}_T(S_T, C)$$

(Sauf erreur, elle s'interprète comme la catégorie fibrée sur T correspondante au champ sur $\mathrm{Top}(T) = T^\wedge$ du morphisme de T-champs de S_T dans C, où $S_T = S \times T$ (considérée comme catégorie fibrée sur T à fibre essentiellement constante S) dans C. Ici j'identifie catégorie fibrée sur T, et champs sur le topos $T^\wedge$.) Il est immédiat que la propriété d'homotopie (p. 99) est stable par passage de C à $\underline{\mathcal{H}om}_T(S_T, C)$. On s'intéresse à la variation de

$$\pi_0(\underline{\mathcal{H}om}_T(S_T, C))$$

comme contrafoncteur en S,

$$H : S \longmapsto \pi_0 \underline{\mathcal{H}om}_T(S_T, C) \qquad (\mathrm{Cat})^o \longrightarrow (\mathrm{Ens}), \qquad \text{p. 68} \quad \text{[page 106]}$$

et à une éventuelle expression de ce contrafoncteur H en termes de l'ind-objet H_C de Cat hot, par la formule hypothétique

$$H(S) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{Ind}(\mathrm{Cat\,hot})}(\gamma(S), H_C),$$

où

$$\gamma : \mathrm{Cat} \longrightarrow \mathrm{Cat\,hot}$$

est le foncteur canonique. Si on avait un tel isomorphisme canonique fonctoriel en S, cela donnerait une description (à isomorphisme unique près) de l'ind-objet H_C en termes du foncteur précédent H sur Cat.

Il me vient un doute ici, en vue de l'exemple $T = \underline{\mathrm{Ty}}$, $C = \underline{\mathrm{Ch}}_\Sigma(X; a, b)$. Les trois types d'objets a) b) c) ont le même π_0, et il est sûr que 'c'est le bon'. D'autre part, pour une catégorie paramètre variable S, il est sûr aussi que le bon foncteur en S est

$$S \longmapsto \pi_0(\underline{\mathrm{Hom}}_T(S_T, C)) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{Ind\,Cat\,hot}}(S, H_C),$$

isomorphe aussi, *si S est finie,* à

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Cat\,hot}}(S, C_\infty), \qquad \text{[page 107]}$$

ce qui montre que, du moins pour des arguments $S \in (\mathrm{Cat})$ qui sont des catégories *finies*, les objets C_∞ et H_C sont 'bons', il nous permettent de décrire un foncteur important qui domine la situation envisagée. Moyennant une hypothèse très forte, mais satisfaite dans les cas importants, on peut dans ces deux formules remplacer Cat hot par Hot.

Par contre, sauf pour le cas où S est réduit à un point et où $\mathrm{Hom}_{\mathrm{Cat\,hot}}$ ou $\mathrm{Hom}_{\mathrm{Hot}}$ de S dans C n'est autre que $\pi_0(C)$ ($\simeq \pi_0(C_\infty) \simeq \pi_0(H_C)$), donc effectivement 'bon', je ne sais pas si

$$\underbrace{\mathrm{Hom}_{\mathrm{Cat\,hot}}(S,C)}_{=\pi_0\underline{\mathrm{Hom}}(S,C)} \qquad \text{ou} \qquad \mathrm{Hom}_{\mathrm{Hot}}(S,C)$$

est lié de façon raisonnable aux ensembles précédents (déterminés par H_C, resp. par C_∞), p. ex. s'ils lui sont isomorphes de façon naturelle, et s'ils ont une signification géométrico-topologique raisonnable. Je commence à suspecter que *non* - donc qu'on aurait ici un cas où une relation de type très général concernant un π_0, ici donc

$$\pi_0(C) \simeq \pi_0(C_\infty) \simeq \pi_0(H_C),$$

ne se prolonge pas en un isomorphisme sur les π_i supérieurs, et en une propriété de Hot-équivalence.

Je ne trouve d'ailleurs aucune flèche directe entre C et l'un des objets C_∞, H_C ; tout ce que je vois dans ce sens, c'est

p. 69
[page 108]

$$\begin{array}{ccc} C_{\mathbf{N}^o} & \xrightarrow{\substack{\text{foncteur de}\\ \text{localisation}}} & C_\infty \\ \downarrow & & \\ C, & & \end{array}$$

où la flèche verticale est la flèche de projection de $C_{\mathbf{N}^o} = C \times_T \mathbf{N}^o$ (avec $\mathbf{N}^o \xrightarrow{t} T$). Ceci n'établit une relation topologique étroite entre C (en tant qu'objet de Cat hot ou de Hot simplement) et C_∞, que si les deux flèches précédentes sont tout au moins des Hot-équivalences. Et le cas-type (problématique) où la question de la relation entre C et C_∞ se pose, est donc celui où $T = \mathbf{N}^o$, i.e. celui d'un système inductif quelconque de (petites) catégories, indexé par $\mathbf{N}$, et interprété comme défini par une catégorie fibrée $C = C_{\mathbf{N}^o}$ sur $\mathbf{N}^o$. Dans ce cas particulier, on a du moins une flèche canonique

$$C \longrightarrow C_\infty$$

sur laquelle on peut se poser la question si c'est une Hot-équivalence. Sinon, cela prouvera que dans le cas général, le Hot-type de C (et a fortiori sa classe d'isomorphie dans Cat hot) n'a pas de sens géométrique intéressant. C'est à dire que C est intéressante uniquement *en tant que catégorie fibrée sur* T, permettant notamment de construire l'ind-objet H_T de Cat hot ou de Hot, mais pas en tant que 'catégorie nue'.

[page 109]

Mais je viens de me convaincre que $C_{\mathbf{N}^o} \longrightarrow C_\infty$ est bien une Hot-équivalence. Donc la flèche $C_{\mathbf{N}^o} \longrightarrow C$ définit une flèche *dans* Hot

$$C_\infty \longrightarrow C$$

(en composant avec l'inverse dans Hot de la précédente). Est-ce un isomorphisme ? Donc pour cette question, on est ramené à la question pour $C_{\mathbf{N}^o} \longrightarrow C$. Mais si on prend $C = T$, cela pose déjà la même question pour $\mathbf{N}^o \longrightarrow T$, donc la question si T est asphérique, sous

p. 70
[page 110]

la seule hypothèse que T_o soit filtrante à gauche et dénombrable à l'infini (à gauche). Mais bien sûr c'est faux (p. ex. si T n'a qu'un seul objet, il n'est pas pour autant asphérique !).

Cela me convainc donc qu'à défaut d'hypothèse supplémentaire draconienne sur T, la catégorie C 'nue' n'offre pas d'intérêt particulier, à part son π_0 (qui est donné aussi par C_∞, et par H_C). Il n'est pas dit, certes, que $\underline{\mathrm{Ty}}$ ne satisfasse pas à ces 'conditions draconiennes'. Mais comme C 'nue' ne s'insère pas dans un formalisme sympathique (p.ex. on n'a pas d'interprétation géométrique de $\mathrm{Hom}_{\mathrm{Cat\,hot}}(S,C)$, ou de $\mathrm{Hom}_{\mathrm{Hot}}(S,C)$), je crois que par la suite je peux en faire abstraction. Exit a) !

5.11.90

J'ai quand même passé la journée entière hier à essayer de comprendre la relation de C et de son type dans Hot, à celui de C_∞. En effet, comme on a finalement une flèche dans Hot

$$C_\infty \longrightarrow C,$$

déduite du diagramme dans (Hot)

$$\begin{array}{ccc} C_{\mathbf{N}^o} & \xrightarrow{\sim} & C_\infty \\ \downarrow & & \\ C, & & \end{array}$$

de prouver que $C_\infty \longrightarrow C$ est un isomorphisme dans Hot semble la façon la plus simple, et peut-être unique, de prouver que l'image de C_∞ dans Hot ne dépend pas, à isomorphisme unique près, des choix faits pour construire C_∞. Sans compter que dans le cas motivant, $C = \underline{\mathrm{Ch}}_\Sigma(X)$ ou $\underline{\mathrm{Ch}}_\Sigma(X;a,b)$, $T = \underline{\mathrm{Ty}}$, c'est la catégorie des chemins C qui donne lieu à une loi de composition des chemins impeccable, fonctorielle, associative et tout, alors qu'il n'en est rien pour C_∞. On ne trouve pas une loi de composition [page 111]

$$C_\infty \times C_\infty \longrightarrow C_\infty$$

dans Cat, ni même dans Cat hot ou dans Hot - ou plutôt, si on arrive pourtant à construire une flèche $C_\infty \times C_\infty \longrightarrow C_\infty$ dans Cat, c'est encore laborieusement à coups de choix $\pm$ arbitraires, cran par cran, et sans savoir si ce qu'on obtient a une propriété d'unicité, ne serait ce que dans Hot ; on ne trouve une interprétation géométrique tangible de cette composition que dans $\mathrm{Hot}_0^\wedge$ (où on a une véritable loi de groupoïde), ou dans H_T en tant qu'objet de Ind Cat hot ou de Ind Hot. (Donc la limite inductive dans $\mathrm{Hot}_0^\wedge$ n'est autre que l'élément de $\mathrm{Hot}_0^\wedge$ défini par C_∞.) p. 71

Mes efforts pour prouver que [page 112]

$$C_\infty \longrightarrow C$$

était un isomorphisme dans Hot, ou ne serait-ce qu'un 1-isomorphisme (i.e. un isomorphisme non seulement pour les π_0, ce qui est toujours vrai, mais aussi pour les π_1 de toutes les composantes), ont échoués. J'ai trouvé qu'il suffisait que le foncteur


$$T \longrightarrow T_o$$

soit ou bien lisse et coasphérique, ou bien propre et asphérique - donc tout est OK si $T = T_o$, i.e. si T est ordonnée. Mais dans le cas $T = \underline{\mathrm{Ty}}$, le foncteur $T \longrightarrow T_o$ n'est ni propre, ni lisse (pas même 0-propre ou 0-lisse).

Finalement j'en suis arrivé à la conviction que dans le cas qui nous occupe ($T = \underline{\mathrm{Ty}}$, $C = \underline{\mathrm{Ch}}_\Sigma(X;a,b)$), la flèche $C_\infty \longrightarrow C$ n'est en général *pas* un isomorphisme dans Hot. [page 113]

En effet, dans le cas $a = b$, si cela [était vrai], on aurait une description du Hot-groupe $\Omega(X, a) = \underline{\mathrm{Ch}}(X, a)$ ([23]) en termes d'une catégorie C munie d'une loi de composition *associative* (et unitaire) *dans* Cat, redonnant la loi de groupe de Ω en passant de (Cat) à Hot. Prenant le nerf de C, on trouverait un monoïde semi-simplicial qui, dans Hot, donnerait la loi de groupe de $\Omega(X, a)$. Or je me rappelle ([24]) qu'on m'a expliqué qu'en général, la loi de groupe de $\Omega(X, a)$ ne pourrait pas être obtenue par une loi *associative* sur un ensemble semi-simplicial. Ainsi, l'insuccès de mes efforts semble tenir, non à ma maladresse, mais à la nature des choses.

Je vais résumer les faits positifs auxquels je suis arrivé dans le diagramme suivant, qui a lieu dans la situation générale $C \longrightarrow T$ envisagée au début du présent paragraphe : [page 114] p. 72



$$= \varinjlim H_T \text{ dans } \mathrm{Hot}_0^\wedge$$

[Les annotations dans ce diagramme concernent les flèches en traits pleins.]

Les objets importants sont H_T et C_∞, alors que C (sur T) et les C_t prennent un rôle technique intermédiaire, pour construire H_T et C_∞. On peut considérer C_∞ comme une catégorie (objet de (Cat)), mais dont la construction dépend de nombreux arbitraires, à l'inverse de H_T dans Ind Cat hot. C'est l'objet de $\mathrm{Hot}_0^\wedge$ déduit de C_∞ qui a un sens canonique, et peut être décrit comme la limite inductive de H_T comme objet de Ind $\mathrm{Hot}_0^\wedge$, i.e. comme représentant le même foncteur sur Hot_0 que H_T.

Dans le cas géométrique $T = \underline{\mathrm{Ty}}$, et C de la forme $\underline{\mathrm{Ch}}_\Sigma(X; a, b)$, donnant lieu à $C_\infty(a, b)$, on *n'a pas* de définition naturelle d'un bifoncteur de composition des chemins [page 115]

$$C_\infty(a, b) \times C_\infty(b, c) \longrightarrow C_\infty(a, c).$$

23. On fait ici $\Sigma = \mathrm{Fl}(X)$.

24. C'est un erreur - ça doit être pour d'*autres* objets groupe de Hot que les groupes de lacets. J'ai vu dans Quillen que $\Omega(X, x)$ doit se décrire par un groupe semi-simplicial (quand X est un ensemble semi-simplicial, x un sommet). Donc le problème si $C_\infty \simeq C$ dans Hot reste entier.

On peut définir, certes, des accouplements

$$\underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,\tau}(a,b) \times \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,\tau'}(b,c) \longrightarrow \underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,\tau\tau'}(a,c),$$

ou, avec les notations relatives à la donnée de

$$\underline{t} : \mathbf{N}^o \longrightarrow \underline{\mathrm{Ty}},$$
$$\underline{\mathrm{Ch}}_n(a,b) \times \underline{\mathrm{Ch}}_m(b,c) \longrightarrow \underline{\mathrm{Ch}}_{n+m}(a,c),$$

mais ces accouplements *ne sont pas* compatibles avec les morphismes de transition des trois systèmes inductifs de catégories $(\underline{\mathrm{Ch}}_n)_{n\in\mathbf{N}}$, ils ne le sont *qu'à homotopie près.* Cela suffit cependant pour avoir des accouplements parfaits p. 73

$$H_T(a,b) \times H_T(b,c) \longrightarrow H_T(a,c),$$

avec associativité, et (si $\Sigma = \mathrm{Fl}(X)$ tout entier) existence de *vrais* inverses, i.e. de flèches (dans Ind Cat hot) de 'passage au chemin opposé'

[page 116]

$$H_T(a,b) \longrightarrow H_T(b,a), \qquad c \longmapsto c^o, \tag{$*$}$$

donnant lieu au diagramme commutatif exprimant que c'est bien un inverse pour la composition. Une autre façon de le dire, c'est que pour tout objet Y de Cat hot (ou de Ind Cat hot), les ensembles

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Cat\,hot}}(Y, H_T(a,b)) \overset{\text{déf}}{=} H_T^Y(a,b)$$

forment, pour $a, b \in X$ variables, les flèches d'un *groupoïde* ([25]) $\mathrm{Ch}_\Sigma^Y(X)$ ayant pour ensemble de sommets $\mathrm{Ob}\,X$, et $H_T^Y(a,b)$ étant formé des flèches de a vers b. L'application

$$H_T^Y(a,b) \longrightarrow H_T^Y(b,a), \qquad c \longmapsto c^o,$$

déduite du foncteur $(*)$ plus haut n'est autre que l'application de passage à l'inverse. Cette catégorie n'est d'ailleurs autre que celle déduit de

$$X(Y)\Sigma_Y^{-1}, \qquad \text{où} \begin{cases} X(Y) = \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Cat}}(Y, X) \\ \Sigma_Y \subseteq \mathrm{Fl}(X(Y)), \\ \text{défini en termes de } \Sigma \text{ 'argument par argument'}, \end{cases}$$

à l'aide du foncteur

$$X \longrightarrow X(Y), \qquad a \longmapsto a_Y,$$

associant à tout $a \in X$ le foncteur *constant* sur Y de valeur a, en prenant [page 117]

$$H_T(a,b) \simeq \mathrm{Hom}_{X(Y)\Sigma_Y^{-1}}(a_Y, b_Y)\ .$$

Dans le même cas géométrique, je me suis convaincu d'ailleurs que C_∞ était, en tant qu'objet de Hot (pas seulement de $\mathrm{Hot}_0^\wedge$) *unique à* Hot-*isomorphisme près,* mais (chose étrange) peut-être pas à Hot-isomorphisme *unique* près. De façon générale, revenant aux conditions du début du paragraphe, C_∞ doit s'écrire $C_\infty(\underline{t})$, elle dépend du choix du foncteur cofinal p. 74

$$\underline{t} : \mathbf{N}^o \longrightarrow T.$$

25. Si $\Sigma = \mathrm{Fl}(X)$. Si Σ est plus petit, au lieu d'un groupoïde, on trouve une *catégorie* sans plus.

Quand $\underline{t}$ varie dans la catégorie

$$\underline{\mathrm{Hom\,cof}}(\mathbf{N}^o, T),$$

les $C_\infty(\underline{t})$ varient de façon contravariante en $\underline{t}$ (donc définissent une catégorie fibrée sur $\underline{\mathrm{Hom\,cof}}(\mathbf{N}^o, T)$). De plus, le foncteur

$$C_\infty(\underline{t'}) \longrightarrow C_\infty(\underline{t})$$

associé à un morphisme de systèmes projectifs

$$\underline{t} \longrightarrow \underline{t'}$$

est un *isomorphisme* dans Hot. Donc le foncteur [page 118]


$$\underline{t} \longmapsto C_\infty(\underline{t}), \qquad \underline{\mathrm{Hom\,cof}}(\mathbf{N}^o, T) \longrightarrow (\mathrm{Hot})$$

se factorise par le groupoïde fondamental


$$\Pi(\underline{\mathrm{Hom\,cof}}(\mathbf{N}^o, T)) \longrightarrow (\mathrm{Hot}).$$

Quand ce groupoïde, i.e. quand la catégorie $\underline{\mathrm{Hom\,cof}}$ elle-même est connexe, on peut donc conclure que tous les $C_\infty(\underline{t})$ sont isomorphes entre eux dans Hot. Pour conclure même à un système *transitif* d'isomorphismes entre les $C_\infty(\underline{t})$, i.e. que $C_\infty(\underline{t})$ est 'unique à isomorphisme *unique* près', il faudrait savoir de plus que le groupoïde fondamental est équivalent à la catégorie ponctuelle (groupe fondamental trivial), ou, comme on dit, que $\underline{\mathrm{Hom\,cof}}$ soit *simplement connexe,* ou 1-connexe.

La connexité de $\underline{\mathrm{Hom\,cof}}$ est assurée quand la catégorie T a (comme c'est le cas pour $\underline{\mathrm{Ty}}$) une loi de composition $(t, t') \longmapsto t * t'$, avec des morphismes fonctoriels en t, t'



(cette dernière condition étant automatique si la loi de composition admet l'objet final de T, supposé existant, comme unité bilatère). Dans ce cas, $\underline{t} = (t_n)_n$ et $\underline{t'} = (t'_n)_n$ sont reliés entre eux par $\underline{t} * \underline{t'} = (t_n * t'_n)_n$, puisqu'on a un morphisme de systèmes projectifs p. 75 [page 119]



Je ne sais d'ailleurs pas si la flèche dans Hot


$$C_\infty(\underline{t}) \longrightarrow C_\infty(\underline{t'})$$

associée à $\underline{t'} \longrightarrow \underline{t}$ dans $\underline{\mathrm{Hom\,cof}}$ ne dépend que de $\underline{t}$, $\underline{t'}$, et pas du choix de $\underline{t'} \longrightarrow \underline{t}$. Ce qui est clair, c'est que son image dans $\mathrm{Hot}_0^\wedge$ est unique, c'est l'identité quand on identifie $C_\infty(\underline{t})$ et $C_\infty(\underline{t'})$ au seul et même élément de $\mathrm{Hot}_0^\wedge$ défini par $\varinjlim H_T$.

Et pourtant, je m'aperçois à l'instant que, sous l'hypothèse de l'existence de la loi de composition et de son unité bilatère, et admettant de plus que la loi en question est [page 120]

associative à isomorphisme près, *on a transitivité* dans les isomorphismes (canoniques!) entre les $C_\infty(\underline{t})$ qu'on vient d'indiquer !

(Sans avoir pour autant à calculer le groupe fondamental de $\underline{\mathrm{Hom\,cof}}(\mathbf{N}^o, T)$!) Si on a trois éléments $\underline{t}$, $\underline{t'}$, $\underline{t''}$ de $\underline{\mathrm{Hom\,cof}}$, il suffit de regarder le diagramme déduit du diagramme commutatif suivant



en lui appliquant le contrafoncteur $\underline{s} \longrightarrow C_\infty(\underline{s})$ de $\underline{\mathrm{Hom\,cof}}$ dans Hot.

Donc dans le cas des $C(a,b) = \underline{\mathrm{Ch}}_\Sigma(X; a, b)$, je n'ai plus aucun scrupule à considérer la catégorie $C_\infty(a,b)$ comme un objet *canonique* de Hot, relié à l'ind-objet canonique $H_T(a,b)$ dans Hot par un homomorphisme canonique

$$C_\infty(a,b) \longleftarrow H_T(a,b), \qquad (*)$$

qui dans $\mathrm{Hot}_0^\wedge$ donne un isomorphisme

$$C_\infty(a,b) \simeq \varinjlim H_T(a,b), \qquad (**)$$

i.e. la flèche $(*)$ induit, pour $\xi \in \mathrm{Ob\,Hot}$, une application ensembliste

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Hot}}(\xi, C_\infty(a,b)) \longleftarrow \underbrace{\mathrm{Hom}_{\mathrm{Ind\,Hot}}(\xi, H_T(a,b))}_{\varinjlim_n \mathrm{Hom}_{\mathrm{Hot}}(\xi, C_n(a,b))},$$


qui est *bijective* si ξ est dans Hot.

Bien entendu, les flèches

p. 76
[page 121]

$$C_\infty(\underline{t'}) \longrightarrow C_\infty(\underline{t}) \qquad (*)$$

dans Hot, associés aux flèches $\underline{t} \longrightarrow \underline{t'}$ dans $\underline{\mathrm{Hom\,cof}}(\mathbf{N}^o, T)$, sont en fait des flèches dans (Cat) elle-même - et même des foncteurs pleinement fidèles, dans le cas 'géométrique' et pour les deux flèches canoniques



Elles sont isomorphiques *dans* Hot, parce qu'elles définissent un homomorphisme sur les ind-objets associés de Cat hot, donc aussi pour les ind-objets associés dans Hot et dans $\mathrm{Hot}_0^\wedge$, d'où résulte que

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Hot}}(Y, C_\infty(\underline{t'})) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathrm{Hot}}(Y, C_\infty(\underline{t}))$$

associé à $(*)$ est une bijection si Y *est finie* ([26]), cette flèche s'identifie alors à

$$\varinjlim_n \mathrm{Hom}_{\mathrm{Hot}}(Y, C_{t'_n}) \longrightarrow \varinjlim_n \mathrm{Hom}_{\mathrm{Hot}}(Y, C_{t_n}).$$

26. Ce qui suffit à assurer que $(*)$ est [un] isomorphisme dans Hot : Hot $\longrightarrow \mathrm{Hot}_0^\wedge$ est conservatif!

(Car $Z \longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathrm{Hot}}(Y, Z)$ commute aux limites inductives filtrantes, si Y est une catégorie *finie*. Cela provient du fait qu'une $\varinjlim$ filtrante de catégories de Thomason-Kan est itou …) Mais j'ignore par contre si $(*)$ est [un] isomorphisme dans Cat hot. Seulement que pour une catégorie *finie* Y, elle induit

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Cat\,hot}}(Y, C_\infty(\underline{t}')) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathrm{Cat\,hot}}(Y, C_\infty(\underline{t})),$$

les deux membres s'identifiant alors à [page 122]

$$H_T(Y)_{\mathrm{Cat\,hot}} = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Ind\,Cat\,hot}}(Y, H_T).$$

Pour résumer ces lumières et perplexités sur les $C_\infty(\underline{t})$:

a) À tout $\underline{t} = (t_n)_{n\in\mathbf{N}^o} \in \underline{\mathrm{Hom\,cof}}(\mathbf{N}^o, T)$ est associé un système inductif, indexé par $\mathbf{N}$, de catégories $C_n(\underline{t})$ $(= C_{t_n})$, et leur limite inductive

$$C_\infty(\underline{t}).$$

b) Ce système inductif, et aussi sa limite est [un] foncteur contravariant en $\underline{t}$. Si $\underline{t}, \underline{t}' \in \mathrm{Ob}\,\underline{\mathrm{Hom\,cof}}$, alors on peut comparer $C_\infty(\underline{t})$, $C_\infty(\underline{t}')$ et les systèmes inductifs correspondants, grâce à p. 77

$$\begin{array}{ccc} & \underline{t} * \underline{t}' & \\ \swarrow & & \searrow \\ \underline{t} & & \underline{t}'. \end{array}$$

c) L'objet

$$(C_n(\underline{t}))_{n\in\mathbf{N}} \in \mathrm{Ob\,Ind\,Cat\,hot}$$

défini par le système inductif $(C_n(\underline{t}))_{n\in\mathbf{N}}$ de Cat est (à isomorphisme unique près) indépendant du choix de $\underline{t}$, soit H_C ou H. Les homomorphismes

$$C_\infty(\underline{t}') \xrightarrow{u^*} C_\infty(\underline{t}) \qquad \text{associé à } u : \underline{t} \longrightarrow \underline{t}' \qquad (*)$$

sont compatibles avec cette donnée, i.e. on a commutativité dans

$$\begin{array}{ccc} \varinjlim_{\mathrm{Ind\,Cat\,hot}} C_*(\underline{t}') & \longrightarrow & \varinjlim_{\mathrm{Ind\,Cat\,hot}} C_*(\underline{t}) \\ & \nwarrow^{\sim} \quad \nearrow_{\sim} & \\ & H & \end{array}$$

d) Il s'ensuit que les homomorphismes $(*)$ sont des *isomorphismes* dans Hot, donc tous les $C_\infty(\underline{t})$ sont isomorphes *dans* Hot. L'astuce des $t * t'$ (dans le cas où on a une loi $t * t'$ associative et admettant l'objet final comme objet unité) donne même des isomorphismes *canoniques* [page 123]

$$C_\infty(\underline{t}') \longrightarrow C_\infty(\underline{t}) \qquad \text{dans Hot},$$

et c'est là un système transitif d'isomorphismes. Donc on a dans Hot un objet canonique

$$C_\infty \in \mathrm{Ob\,Hot},$$

dont la relation à $H \in \mathrm{Ob\,Ind\,Hot}$ est déduite de c), c'est une flèche canonique

$$H \longrightarrow C_\infty \qquad \text{dans Ind Hot } ([27]).$$

Cette flèche induit un isomorphisme pour les objets correspondants de $\mathrm{Hot}_0^\wedge$; mais en regardant H non comme ind-objet de $\mathrm{Hot}_0^\wedge$, mais prenant le foncteur H_0 induit sur Hot_0 par le foncteur ind-représentable H sur Hot. Ce foncteur induit est 'représentable' par l'objet C_∞ de la catégorie plus grande

$$H_0 \simeq C_\infty \qquad \text{dans } \mathrm{Hot}_0^\wedge.$$

(Si le foncteur canonique $\mathrm{Hot} \longrightarrow \mathrm{Hot}_0^\wedge$ est pleinement fidèle, alors cette formule décrit C_∞ comme objet de Hot, à isomorphisme unique près, en termes de H_0, donc aussi en termes de $H \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{Ind}\,\mathrm{Cat}\,\mathrm{hot}$.)

e) J'ignore par contre si les flèches

p. 78
[page 124]

$$C_\infty(\underline{t}') \longrightarrow C_\infty(\underline{t})$$

sont des isomorphismes dans Cat hot, bien qu'elles soient définies en termes d'homomorphismes de systèmes inductifs de catégories, qui sont des isomorphismes dans Ind Cat hot. Il en est ainsi, même pour les flèches $C_\infty(\underline{t}), C_\infty(\underline{t}') \rightrightarrows C_\infty(\underline{t} * \underline{t}')$ utilisées pour comparer $C_\infty(\underline{t})$ et $C_\infty(\underline{t}')$ canoniquement. Ainsi, je ne vois pas comment définir des flèches en sens inverse dans Cat, qui seraient candidats à être des isomorphismes inverses dans Cat hot.

f) Dans le cas géométrique ($T = \underline{\mathrm{Ty}}$, situation décrite en termes de X, Σ, et $a, b \in \mathrm{Ob}\,X$, d'où des $C_\infty(\underline{t}; a, b)$, $C_\infty(\underline{\overline{a, b}})$, $H(a, b)$ etc.), on *n'a pas* d'opération de composition de chemins au niveau des *catégories* $C_\infty(\underline{t}; a, b)$ et $C_\infty(\underline{t}; b, c)$, mais seulement au niveau des objets $H(a, b)$, $H(b, c)$ de Ind Cat hot ou de Ind Hot. Suis-je seulement sûr de savoir définir *dans* Hot

$$C_\infty(a, b) \times C_\infty(b, c) \longrightarrow C_\infty(a, c) \quad ?$$

Sûrement, il n'y a pas de problèmes pour les images dans $\mathrm{Hot}_0^\wedge$, puisque là ce sont les mêmes que celles de $H(a, b)$, $H(b, c)$, $H(a, c)$ respectivement, et on a des accouplements parfaits, associatifs, avec unité, et avec inverses là ou il doit y en avoir. Mais pas pour les $C_\infty(a, b)$ eux-mêmes?

[page 125]

C'est un peu vexant qu'avec tout ce travail il semblerait qu'on n'ait pas même été foutu de définir l'analogue dans Cat du classique espace des lacets $\Omega(X, x)$ comme un groupe *dans* Hot. (Que fait Thomason?) Mais voilà une idée pensable [?]. Pour définir *quand-même*

$$C_\infty(a, b) \times C_\infty(b, c) \longrightarrow C_\infty(a, c)$$

dans Hot, on va décrire les deux foncteurs $C_\infty(a, b)$ et $C_\infty(b, c)$ par des systèmes projectifs différents $\underline{t}$, $\underline{t}'$. On peut l'expliciter en partant d'un τ_0 de longueur utile ≥ 2, et en prenant dans les deux cas

$$t_n = t'_n = \tau_0^n,$$

mais des morphismes de transition différents

$$(t_{n+p} \longrightarrow t_n) = \pi_p * \mathrm{id}_{\tau_0^n}$$
$$(t'_{n+p} \longrightarrow t'_n) = \mathrm{id}_{\tau_0^n} * \pi_p,$$

où $\pi_p : \tau_0^p \longrightarrow 1$ est la dégénérescence totale. On définira $C_\infty(a, c)$ en termes de $\underline{t''} = \underline{t} * \underline{t}'$, donc

$$\begin{cases} t''_n = \tau_0^{2n} \\ (t''_{n+p} \longrightarrow t''_n) = \pi_p * \mathrm{id}_{\tau_0^{2n}} * \pi_p. \end{cases}$$

p. 79

Cette fois, les foncteurs de composition

$$C_n(\underline{t};a,b)\times C_n(\underline{t'};b,c)\longrightarrow C_n(\underline{t''};a,c),$$

sont compatibles avec les foncteurs transition pour n variable, et on trouve [page 126]

$$C_\infty(\underline{t};a,b)\times C_\infty(\underline{t'};b,c)\longrightarrow C_\infty(\underline{t''};a,c),$$

donc une flèche dans Hot

$$\mathrm{comp}_{\tau_0}: C_\infty\times C_\infty\longrightarrow C_\infty.$$

Il faut voir qu'elle ne dépend pas du choix de τ_0, mais si on a τ_0 et τ_0', on les compare par $\tau_0\times\tau_0'\begin{array}{l}\longrightarrow\tau_0\\ \longrightarrow\tau_0'\end{array}$, il suffit donc de voir que s'il existe une flèche $\tau_0\longrightarrow\tau_0'$, alors $\mathrm{comp}_{\tau_0}=\mathrm{comp}_{\tau_0'}$. Mais une telle flèche induit des flèches $\underline{t}_{\tau_0}\longrightarrow\underline{t}_{\tau_0'}$, $\underline{t'}_{\tau_0}\longrightarrow\underline{t'}_{\tau_0'}$, $\underline{t''}_{\tau_0}\longrightarrow\underline{t''}_{\tau_0'}$, d'où un diagramme dans Cat

$$\begin{array}{ccc} C_\infty(\underline{t}_{\tau_0'};a,b)\times C_\infty(\underline{t'}_{\tau_0'};b,c) & \xrightarrow{\mathrm{comp}_{\tau_0'}} & C_\infty(\underline{t''}_{\tau_0'};a,c)\\ \downarrow & & \downarrow\\ C_\infty(\underline{t}_{\tau_0};a,b)\times C_\infty(\underline{t'}_{\tau_0};b,c) & \xrightarrow{\mathrm{comp}_{\tau_0}} & C_\infty(\underline{t''}_{\tau_0};a,c),\end{array}$$

dont on vérifie tout de suite qu'il est commutatif. Or ce diagramme peut se réécrire dans Hot comme

$$\begin{array}{ccc} C_\infty(a,b)\times C_\infty(b,c) & \xrightarrow{\mathrm{comp}_{\tau_0'}} & C_\infty(a,c)\\ \downarrow\mathrm{id} & & \downarrow\mathrm{id}\\ C_\infty(a,b)\times C_\infty(b,c) & \xrightarrow{\mathrm{comp}_{\tau_0}} & C_\infty(a,c),\end{array}$$

d'où $\mathrm{comp}_{\tau_0}=\mathrm{comp}_{\tau_0'}$.

Je recule devant la vraie difficulté - celle de prouver l'associativité de cette loi de [page 127] composition. Elle devient associative dans $\mathrm{Hot}_0^\wedge$ - mais pour que deux flèches dans Hot soient égales (ici donc

$$C_\infty(a,b)\times C_\infty(b,c)\times C_\infty(c,d)\rightrightarrows C_\infty(a,d)\quad),$$

suffit-il qu'il en soit ainsi de leurs images dans $\mathrm{Hot}_0^\wedge$ - en d'autres termes, le foncteur

$$\mathrm{Hot}\longrightarrow\mathrm{Hot}_0^\wedge,$$

est-il (en plus d'être conservatif) au moins fidèle (sinon pleinement fidèle) ?

Il y a aussi que cette loi de composition est compatible avec celle des $H(a,b)$ dans Ind Hot, pour les flèches canoniques p. 80

$$H(a,b)\longrightarrow C_\infty(a,b)\qquad\text{dans Ind Hot},$$

si on saurait que ce sont des épimorphismes, et le restent par produits cartésiens, on aurait gagné.

Bien sûr, on saura que c'est associatif, une fois qu'on saura que la composititon définie ici est compatible avec la composition des chemins dans le cadre semi-simplicial. Mais comment fait-on dans ce cadre, pour composer les chemins de longueur non bornée ? N'y a-t-il pas là exactement la même difficulté ? À moins de s'en tirer en se ramenant tout de

27. **NB** H n'est pratiquement jamais essentiellement constant, donc la flèche ci-contre `[n'est]` pas un isomorphisme dans Ind Hot. [page 128]

suite, pour la théorie des opérations Ω, aux complexes de Kan, et aux chemins de type Δ_+. Mais pour les composer *fonctoriellement,* il me semble y avoir toujours le même problème - on trouvera des chemins de type $\Delta_+\Delta_+ = \mathbf{\Delta}_2^+$, et non pas Δ_+, mais on peut alors composer les homotopies directes (revient à s'induire sur $\Delta_+ \simeq \{0,2\} \subseteq \mathbf{\Delta}_2^+$). Or j'ai fait le formalisme des catégories de chemins sans me soucier de conditions du type Kan. Je présume que dans le cadre semi-simplicial, les $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{\Delta}_1, X)$ ne donnent *pas* le bon objet des chemins, pour X pas de Kan. (Car sinon, il semblerait que pour $X = X_0$ à composantes *finies,* le calcul des π_i devrait être fini, ce qui n'est pourtant pas le cas, m'a-t-on toujours assuré …)

Je présume pourtant, quand on prend $\Sigma = \mathrm{Fl}(X)$, que les objets $\underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X; a, b)$ et $\underline{\mathrm{Ch}}_\infty(\bar{X}; a, b)$ sont isomorphes dans Hot, quand on immerge X dans une enveloppe de Thomason-Kan $\bar{X}$.

p. 81
[page 129]

11 Rapide retour sur les $(\mathcal{M}, \Sigma)$, dans l'optique des dérivateurs

Quand on s'intéresse au formalisme des $\underline{\mathrm{Ch}}_\Sigma(X; a, b)$ en vue d'un *dérivateur* $\mathbf{D}_{X,\Sigma}$ qu'on voudrait définir en termes de X, Σ, il semblerait que le prédérivateur qu'on obtient bel et bien ne mérite le nom de dérivateur que lorsqu'on suppose que pour toute flèche

$$Y \longrightarrow Y'$$

dans Cat qui est une Hot-équivalence, les flèches correspondantes

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Ind\,Cat\,hot}}(Y', H(a,b)) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathrm{Ind\,Cat\,hot}}(Y, H(a,b)),$$

ou encore

$$\varinjlim_n \mathrm{Hom}_{\mathrm{Cat\,hot}}(Y', \underline{\mathrm{Ch}}_{n,\Sigma}(a,b)) \longrightarrow \varinjlim_n \mathrm{Hom}_{\mathrm{Cat\,hot}}(Y, \underline{\mathrm{Ch}}_{n,\Sigma}(a,b))$$

sont des bijections. J'ai regardé dans V ce que ça signifie pour l'objet $H(a,b) = (\underline{\mathrm{Ch}}_{n,\Sigma}(a,b))_n$ de $\mathrm{Ind\,Cat\,hot}$. C'est cette condition seulement qui assure, du point de vue des dérivateurs, une interprétation convaincante de $\underline{\mathrm{Ch}}_{\infty,\Sigma}(a,b)$,

$$\underline{\mathrm{Ch}}_{\infty,\Sigma}(a,b) \;=\; \varinjlim_n \underline{\mathrm{Ch}}_{n,\Sigma}(a,b)$$

en tant qu'objet de Hot, ou plus exactement de $\mathrm{Hot}_0^\wedge$, car on a alors pour Y une catégorie *finie*

$$\underbrace{\mathrm{Hom}_{\mathrm{Cat\,hot}}(Y, H(a,b))}_{\simeq \mathrm{Hom}_{X(Y)\Sigma_Y^{-1}}(a_X, b_X)} \;\simeq\; \mathrm{Hom}_{\mathrm{Hot}}(Y, \underline{\mathrm{Ch}}_{\infty,\Sigma}(a,b)),$$

car je veux quand-même que le type dans Hot soit le bon, qu'il correspond bien à l'homotopie des espaces de chemins. Donc on voudrait qu'un morphisme [page 130]

$$X \xrightarrow{f} X'$$

dans (Cat), qui est une Hot-équivalence, définisse

$$\underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X; a, b) \longrightarrow \underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X'; f(a), f(b)),$$

qui soient eux aussi des Hot-équivalences. D'autre part, c'est évidemment compatible avec la brillante composition des chemins, que j'ai réussi à définir entre ces objets de Hot.

Donc (sous réserve d'avoir vérifié ce que je viens de dire) la vérification de l'associativité se ramenerait au cas où X est de Thomason-Kan. Mais dans ce cas, il y a des chances que, tout comme dans le cas semi-simplicial, les $\underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X;a,b)$ peuvent se définir (comme objets de (Hot)) comme étant simplement les chemins de type Δ_+ de a à b, qu'on compose alors de la façon triviale. Mais non, ces catégories sont discrètes !

Je renonce pour l'instant à poursuivre plus la question d'associativité. Demander à Thomason pour les propriétés du foncteur $\mathrm{Hot} \longrightarrow \mathrm{Hot}_0^\wedge$.

Cela signifie, à très peu de choses près, qu'on a une interprétation de $\underline{\mathrm{Ch}}_{\infty,\Sigma}(a,b)$, en tant qu'objet de Hot, comme un 'Hom externe' $\mathrm{Hom\,ext}(a,b)$ à valeurs dans Hot, défini sur la catégorie $\mathcal{M} = X$ à l'aide du seul ensemble admissible de flèches $\Sigma \subseteq \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$, opération satisfaisant la condition

p. 82
[page 131]

$$\boxed{\mathrm{Hom}_{\mathrm{Hot}}(Y, \mathrm{Hom\,ext}(a,b)) \;\simeq\; \mathrm{Hom}_{\mathcal{M}(Y)\Sigma_Y^{-1}}(a_X, b_X)} \qquad (*)$$

(qui peut s'interpréter aussi, soit comme

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(p_!(a_Y), b)$$

si $p_! : \underbrace{\mathcal{M}(Y)\Sigma_Y^{-1}}_{\mathbf{D}(Y)} \longrightarrow \mathcal{M}$ existe, soit comme

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(a, p_*(b_Y))$$

si $p_* : \underbrace{\mathcal{M}(Y)\Sigma_Y^{-1}}_{\mathbf{D}(Y)} \longrightarrow \underbrace{\mathcal{M}}_{=\mathbf{D}(*)}$ existe) ; avec le seul petit ennui que cette formule n'est valable que pour Y *finie.* Si on veut exprimer le second membre pour Y variable quelconque dans Cat, il ne suffit pas d'un objet de Hot ($\mathrm{Hom\,ext}(a,b)$) dans le premier membre, mais il faut l'ind-objet $H(a,b) = (\underline{\mathrm{Ch}}_n(a,b))_{n\in\mathbf{N}}$ dans Hot. Si donc on tient à travailler dans un 'domaine' Diag du dérivateur $\mathbf{D} = \mathbf{D}_{\mathcal{M},\Sigma}$ aussi grand que possible, en se bornant à des catégories finies, et qu'on veut qu'une formule $(*)$ reste valable pour toute Y dans le domaine, il faut 'en toute rigueur' définir le $\mathrm{Hom\,ext}(a,b)$ non comme objet de Hot, mais de Ind Hot. Il se décrirait donc alors comme


[page 132]

$$\mathrm{Hom\,ext}(a,b) = (\underline{\mathrm{Ch}}_{n,\Sigma}(a,b))_n \qquad \text{(ind-objet dans Hot)}\ ,$$

et l'objet $\underline{\mathrm{Ch}}_{\infty,\Sigma}$ dans Hot en est une sorte de limite inductive.

Je me suis demandé si la condition préalable, savoir que les foncteurs $H(a,b)$ sur Cat transforment Hot-équivalences $Y' \longrightarrow Y$ en bijections, était bel et bien une (forte) restriction. Je me suis convaincu que c'est bien le cas, déjà dans le cas particulier où $\Sigma = \mathrm{Fl}(X)$. Il me semble que lorsque les composantes connexes de $\Omega(X,a)$ ne sont pas contractiles, ladite condition n'est pratiquement jamais satisfaite. J'ai pensé p. ex. au cas où X a le type d'homotopie (dans Hot) d'une 2-sphère, de sorte que son $\Omega(X,a) = \underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X,a,a)$ doit avoir un $\pi_1 \simeq \mathbf{Z}$. Prenons Y ayant le type dans Hot d'un cercle, disons

Y :



,

p. 83
[page 133]

donc les foncteurs

$$f : Y \longrightarrow \underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X; \bullet, \bullet) \stackrel{\text{déf}}{=} \Omega(X, \bullet)$$

correspondent à *certains* 'lacets' de $\Omega(X, \bullet)$ (mais lacets à origine non précisée), ils ont un type d'homotopie au sens topologique ('nombre de tours' autour de la sphère X) donné par un entier $n \in \mathbf{Z}$ (le 'degré' du lacet λ). L'intuition évidente, c'est que l'ensemble des degrés δ qu'on peut obtenir ainsi, avec une catégorie *finie* donnée Y qui représente le cercle $S^1 \in$ (Hot), est fini - $|\delta|$ majoré sûrement par le nombre de ces flèches (donc au moins par 4 dans le cas envisagé, chaque flèche de Y faisant faire *au plus* un tour autour du pseudo-cercle $\Omega(S^2, \bullet)$) ([28]). D'autre part, quand on représente S^1 par des catégories Y_n arbitrairement grandes (disons déduites des intervalles $\Phi_n = (\Delta_+\Delta_-)^n$ en identifiant la source et le but), on doit trouver des degrés arbitrairement élevés. Or toute Y_n s'envoie dans $Y(= Y_2)$ par une flèche

$$Y_n = Y' \longrightarrow Y = Y_2$$

qui est de degré 1, donc qui est une Hot-équivalence. Mais l'application correspondante [page 134]

$$\pi_0\underline{\mathrm{Hom}}(Y, \Omega(X, \bullet)) \longrightarrow \pi_0\underline{\mathrm{Hom}}(Y', \Omega(X, \bullet))$$

n'est pas bijective. Ce genre d'argument me semble devoir marcher chaque fois que l'ensemble des groupes d'homotopie $\pi_j(X, x)$, pour $j \geq 2$ (donc l'ensemble des groupes d'homotopie π_i de $\Omega(X, x)$, pour $i \geq 1$) est *infini,* en prenant pour Y, Y' différents représentants Y_n de la sphère S^i, disons les Y_n déduites de Φ_n ($n \geq 2$) en prenant $\Phi_n^i = \Phi_n \times \Phi_n \times \cdots \times \Phi_n$ (qui est une sorte de i-cube combinatoire), et en identifiant son 'bord' à un seul point. Je présume que le nombre d'élements dans $\pi_i(\Omega(X, x))$ qu'on peut obtenir à partir de flèches $Y_n \longrightarrow \Omega(X, x)$ est limité par la taille de Y_n, mais on peut sûrement les obtenir chacun, en prenant n assez grand. Si donc $\xi \in \pi_i(\Omega)$ échappe à Y_{n_0} ($n_0 = 0$, disons), on prend un n' assez grand pour que ξ n'échappe pas à $Y_{n'}$, et on choisit

$$Y_{n'} \longrightarrow Y_n \ ,$$

[$n = n_0$?]

qui soit une Hot-équivalence (p. ex. à l'aide d'une rétraction de $\Phi_{n'}$ sur Φ_n, compatible [page 135] avec sources et buts).

Ceci attire fortement l'attention sur le fait que si Y, C sont deux catégories, la catégorie $\underline{\mathrm{Hom}}(Y, C)$ *n'est pas* un représentant de $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Hot}}(\mathrm{hot}(Y), \mathrm{hot}(C))$, on a seulement une flèche canonique

$$\mathrm{hot}(\underline{\mathrm{Hom}}(Y, C)) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Hot}}(\mathrm{hot}(Y), \mathrm{hot}(C)), \qquad (*)$$

i.e. p. 84

$$\underbrace{\mathrm{hot}(\underline{\mathrm{Hom}}(Y, C)) \times \mathrm{hot}(Y)}_{\mathrm{hot}(\underline{\mathrm{Hom}}(Y,C)\times Y)} \longrightarrow \mathrm{hot}(C),$$

laquelle flèche est simplement déduite de

$$\underline{\mathrm{Hom}}(Y, C) \times Y \longrightarrow C.$$

Mais la flèche $(*)$ n'a aucune envie d'être [un] isomorphisme. C'est parce qu'elle ne l'est déjà pas dans le cas particulier $Y = \mathbf{\Delta}^1$, essentiellement, qui nous oblige, pour faire une théorie des chemins dans les catégories qui soit topologiquement raisonnable, de ne pas nous borner à $\mathbf{\Delta}^1$ comme type de chemins, mais à prendre des intervalles composés $\tau \in \mathrm{Ty}$.

28. probablement on ne trouve tout au plus que les degrés δ entre -2 et $+2$. [page 136]

Par contre, $(*)$ est [un] isomorphisme quand C est une catégorie de Thomason-Kan. Il suffit de voir que pour tout Z dans (Cat), le Hom de $\mathrm{hot}(Z)$ dans les deux membres est isomorphe par la flèche déduite de $(*)$. Or si C est de Thomason-Kan, de même $\underline{\mathrm{Hom}}(Y,C)$ (immédiat sur la définition de Thomason-Kan en termes de prolongements de $A_0 \xhookrightarrow{i} A$ $\ldots$([29])), donc

$$\begin{array}{ccc} A_0 & \xhookrightarrow{i} & A \\ & \searrow & \vdots \\ & & C \end{array}$$

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Hot}}(\mathrm{hot}(Z), \mathrm{hot}(\underline{\mathrm{Hom}}(Y,C))) \xleftarrow{\sim} \pi_0(\underbrace{\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Cat}}(Z, \underline{\mathrm{Hom}}(Y,C))}_{\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Cat}}(Z\times Y, C)}) \simeq \pi_0 \underline{\mathrm{Hom}}(Z\times Y, C),$$

et

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Hot}}(\mathrm{hot}(Z), \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Hot}}(\mathrm{hot}(Y), \mathrm{hot}(C))) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{Hot}}(\underbrace{\mathrm{hot}(Z)\times \mathrm{hot}(Y)}_{\mathrm{hot}(Z\times Y)}, \mathrm{hot}(C))$$

$$\underbrace{\xleftarrow{\sim}}_{\text{car } C \text{ est de Thomason-Kan}} \qquad \pi_0(\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Cat}}(Z\times Y, C)),$$

O.K.

On voit donc que les catégories $\underline{\mathrm{Ch}}_{\infty,\Sigma}(X; a, b)$ n'ont aucune tendance à être des catégories de Thomason-Kan. Pourtant, son type dans Hot doit être 'le bon', sans avoir d'abord à remplacer X par une enveloppe de Thomason-Kan $\bar{X}$.

p. 85
[page 137]

12 Retour sur les 'catégories de chemins' dans Cat, comme catégorie de modèles pour Hot

Je vois exactement deux applications intéressantes du formalisme des chemins dans les catégories. L'une, qui m'a surtout forcé la main, est pour pouvoir construire des Hom ext, Hom *externes* à valeurs dans Hot, pour tout prédérivateur **D** défini par un couple $(\mathcal{M}, \Sigma)$ (et je ne connais pas de prédérivateur qui ne soit défini ainsi).

L'autre application est pour avoir dans (Cat) une *construction fonctorielle,* en termes d'un objet X quelconque ou d'une flèche $X \longrightarrow Y$, de l'analogue du formalisme de Cartan-Serre sur les espaces de chemins. Dans ce cadre, il est entendu qu'on prend toujours $\Sigma_X = \mathrm{Fl}(X)$, ensemble de *toutes* les flèches de X. Pour construire fonctoriellement en X dans (Cat)

$$\begin{array}{c} \underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X) \\ \big\downarrow \\ X\times X, \end{array}$$

il faut avoir fixé un système projectif


$$\underline{t} = (t_n)_{n\in\mathbf{N}}$$

dans $\underline{\mathrm{Ty}}$ qui soit cofinal dans $\underline{\mathrm{Ty}}$, ce qui signifie simplement que parmi les t_n il y en a de longueur utile arbitrairement grande (et comme [page 138]

$$n \longmapsto \text{long.ut.}(t_n)$$

29. un peu vif ! Il faut savoir que les applications cofibrantes i de Thomason le restent après multiplication cartésienne par Y …

est croissante, cela implique que long.ut.(t_n) tend vers $+\infty$ pour $n \longrightarrow +\infty$). Les faits principaux à vérifier ensuite (si faire se peut) sont les propriétés essentielles des flèches dans le diagramme p. 86




$$\left|\begin{array}{l}\sigma\tau = \beta\tau = \mathrm{id}_X \\ p\tau = \mathrm{diag}_X\end{array}\right.$$

et plus généralement, pour une flèche

$$X' \xrightarrow{f} X$$

dans Cat, des flèches dans le diagramme correspondant



$$\bar{f}\alpha = (\beta g)\alpha = f,$$

et plus particulièrement de βg. La flèche en pointillés α est la section de $\overline{X'}$ sur X' déduite de la section τ de $\underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X)$ sur X qui réalise la décomposition de f en [page 139]

$$X' \xrightarrow{\alpha} \overline{X'} \xrightarrow{\bar{f}} X,$$

où $\bar{f}$ devrait être une flèche *'fibrante'* et une Hot-équivalence, α une flèche *'cofibrante'* au sens de Thomason. (Mais s'il en est ainsi, est à voir !) Voici pour le moment les propriétés essentielles que je voudrais vérifier.

1°) p est lisse et propre, et est une HOT-fibration.

2°) Donc il en est de même de $\sigma = \mathrm{pr}_1 p$ et $\beta = \mathrm{pr}_2 p$. De plus, ce sont des HOT-fibrations *triviales,* i.e. à fibres asphériques.

p. 87

3°) Plus généralement (pour ce qui concerne β), $\overline{X'} \xrightarrow{\bar{f}} X$ devrait encore être propre et lisse et une HOT-fibration, mais bien sûr en général pas triviale. (Elle devrait être triviale si et seulement si f est une Hot-équivalence.) ([30]).

Un mot sur la 'dualité'. Les énoncés sur σ (resp. β) se traduisent en énoncés sur β (resp. σ) par passage de $\underline{t}$ à $\underline{t}^o = (t_n^o)$, où $\tau \longmapsto \tau^o$ est le foncteur dans $\underline{\mathrm{Ty}}$ 'passage à l'intervalle opposé'. On a en effet [page 140]

30. résulte formellement de 1° et 2°, cf. page 170.

un isomorphisme fonctoriel en X (passage au chemin opposé)

$$\boxed{\begin{array}{ccc} c & \longmapsto & c^o \\ \underline{\mathrm{Ch}}^{\underline{t}}_{\infty}(X) & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Ch}}^{\underline{t}^o}_{\infty}(X) \end{array}} \qquad ([31])$$

qui 'échange source et but'. Bien sûr, on a intérêt à prendre $\underline{t}$ tel qu'on ait $\underline{t} = \underline{t}^o$ (c'est ce que j'avais fait, par un sain instinct, dès le début dans V), de sorte qu'on a un foncteur involutif canonique

$$\begin{array}{ccc} c & \longmapsto & c^o \\ \underline{\mathrm{Ch}}_{\infty}(X) & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Ch}}_{\infty}(X) \end{array}$$

(je laisse tomber à nouveau l'exposant $\underline{t}$), qui 'échange source et but'. Donc on trouve, à isomorphisme canonique près, la 'même' factorisation de $f : X' \longrightarrow X$ en $\overline{f} \circ \alpha$, si on fait comme dans page 38 pour définir $\overline{X'}$ et α, ou si dans ce diagramme on intervertit les rôles de σ et de β.

Enfin :

4°) Si

$$c : a \longrightarrow b$$

est un chemin quelconque dans X, on voudrait en conclure un isommorphisme dans Hot (de 'transport par c')

$$\overline{X'}_a \xrightarrow[\sim]{\bar{c}} \overline{X'}_b,$$

avec bien sûr transitivité pour la composition,

[page 141]

ce qui donnera aussi

$$\overline{c^{\mathrm{opp}}} = \bar{c}^{-1}$$

(en admettant que les chemins triviaux $a \xrightarrow{\mathrm{id}} a$ donnent l'identité $\overline{X'}_a \xrightarrow[\sim]{\mathrm{id}} \overline{X'}_a$!) ([32, 33]). Bien sûr, $\bar{c}$ ne doit dépendre que de la *classe d'homotopie* de $\bar{c}$ (dans $\underline{\mathrm{Ch}}_{\tau}(X; a, b)$, ou même dans $C = \underline{\mathrm{Ch}}(X; a, b)$, catégorie de tous les chemins dans X, de a vers b, de type non précisé). En d'autres termes, on doit avoir un foncteur

p. 88

$$\begin{array}{ccc} \Pi(X) & \longrightarrow & \mathrm{Hot} \\ a & \longmapsto & \mathrm{hot}(\overline{X'}_a) \end{array}$$

du groupoïde fondamental de X dans Hot. À vrai dire, ceci n'a rien à voir avec la situation particulière étudiée ici - ça doit marcher chaque fois qu'on a une HOT-fibration, ici $\overline{X'} \longrightarrow X$, mais aussi $\underline{\mathrm{Ch}}_{\infty}(X) \longrightarrow X \times X$ ([34]). Et pour une $\mathbf{D}$-fibration $X' \longrightarrow X$ ($\mathbf{D}$ un dérivateur quelconque), et $a \in \mathbf{D}(e)$, on doit avoir de même deux foncteurs

$$\Pi(X) \rightrightarrows \mathbf{D}(e)$$

correspondant à

$$\begin{cases} x & \longmapsto & H^{\bullet}_{\mathbf{D}}(X'_x, \bullet) \\ x & \longmapsto & H^{\mathbf{D}}_{\bullet}(X'_x, \bullet). \end{cases}$$

Le cas qui nous occupe ici serait celui où $\mathbf{D} = \mathrm{HOT}$, où on prend $H^{\mathbf{D}}_{\bullet}$, et $a =$ objet final de $\mathbf{D}(e) = \mathrm{Hot}$.)

[page 142]

31. cf. page 143 pour le passage de $\underline{t}$ à $\underline{t}^-$.
32. Surtout pas se borner au cas où c serait un des t_n !
33. décrire quand-même l'effet sur les π_0 !
34. Ici aussi, il faudrait décrire l'effet du transport $\bar{c}$ sur les π_0 des fibres.

5°) Si 1°, 2°, 3° sont vérifiés, on est moralement sûr que la construction des $\underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X)$ est bel et bien l'équivalent exact du formalisme de Cartan-Serre. Pour en avoir le cœur totalement net, i.e. raccrocher explicitement cette théorie aux constructions classiques, il faudrait prouver un *énoncé de comparaison* avec la théorie semi-simpliciale, qui dirait essentiellement ceci : Si on désigne, pour X dans Cat, par $\tilde{X}$ l'objet associé dans $\mathbf{\Delta}^\wedge$ (le 'nerf' de X), alors la flèche

$$\underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X)\tilde{} \longrightarrow \underbrace{(X\times X)\tilde{}}_{\simeq \tilde{X}\times\tilde{X}}$$

dans $\mathbf{\Delta}^\wedge/(X\times X)\tilde{}$, est W-équivalente sur $(X\times X)\tilde{}$ à la flèche

$$\underline{\mathrm{Ch}}(\tilde{X}) \longrightarrow \tilde{X}\times\tilde{X}$$

de la théorie semi-simpliciale des chemins (à supposer qu'il y ait une telle flèche classique définie pour *tout* objet X de $\mathbf{\Delta}^\wedge$). Ou qu'on ait tout au moins des isomorphismes canoniques dans Hot

$$\mathrm{hot}_{\mathrm{Cat}}(\underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X;a,b)) \;\simeq\; \mathrm{hot}_{\mathbf{\Delta}^\wedge}(\underline{\mathrm{Ch}}(\tilde{X};\tilde{a},\tilde{b})).$$

Dans 1° et 3°, on veut prouver que certaines flèches (p et $\bar{f}$) sont à la fois *propre* et *lisse* - ce qui est vraiment idéal ! Je dis qu'il suffit à chaque fois de prouver l'un des deux, que l'autre s'en déduit (comme 'cas particulier') par dualité. Pour ceci, notons p. 89 [page 143]

$$\tau \longmapsto \tau^-$$

l'automorphisme (*pas anti*-automorphisme) de $\underline{\mathrm{Ty}}$ qui consiste à changer de signe toutes les flèches de transition - c'est donc, au niveau des objets, l'unique automorphisme du monoïde libre Ty, qui échange Δ_+ et Δ_-. Au système projectif $\underline{t}$ dans $\underline{\mathrm{Ty}}$ correspond le système projectif $\underline{t}^-$. Ceci dit, on a un isomorphisme de catégories

$$\boxed{\underline{\mathrm{Ch}}^{\underline{t}}_\infty(X^o) \;\simeq\; (\underline{\mathrm{Ch}}^{\underline{t}^-}_\infty(X))^o} \qquad (^{35})$$

et le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{Ch}}^{\underline{t}}_\infty(X^o) & \xrightarrow{\sim} & \underline{\mathrm{Ch}}^{\underline{t}^-}_\infty(X)^o \\ \big\downarrow{\scriptstyle p^{\underline{t}}_{X^o}} & & \big\downarrow{\scriptstyle (p^{\underline{t}^-}_X)^o} \\ X^o\times X^o & = & (X\times X)^o. \end{array}$$

Ainsi, dire que $p^{\underline{t}}_X$ `[plutôt` $p^{\underline{t}^-}_X$`]` est lisse, i.e. que $(p^{\underline{t}}_X)^o$ `[plutôt` $(p^{\underline{t}^-}_X)^o$`]` est propre, équivaut à dire que $p^{\underline{t}}_{X^o}$ est propre.

Il nous reste donc, à ce sujet, que deux faits à vérifier : la lissité de $p : \underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X) \longrightarrow X\times X$, et celle de $\bar{f} : \overline{X'} \longrightarrow X$. [page 144]

a) Lissité de $p : \underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X) \longrightarrow X\times X$. On se donne une flèche

$$w : (a,b) \longrightarrow (a',b'), \qquad \text{i.e.} \quad \begin{cases} u : & a & \longrightarrow & a' \\ v : & b & \longrightarrow & b', \end{cases}$$

sur la base, un objet c' au dessus du but, i.e.

$$c' \in \underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X;a',b'),$$


35. cf. page 140 pour le passage de $\underline{t}$ à $\underline{t}^o$.

et on regarde la catégorie des flèches dans $\underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X)$, de but c', qui relèvent w,

$$\begin{array}{ccc} \underset{\text{variable}}{c} & \xrightarrow{\varphi} & \underset{\text{fixe}}{c'} \\ \big| & & \big| \\ (a,b) & \xrightarrow{w} & (a',b'), \end{array}$$

i.e. la catégorie des couples (c,φ), où p. 90


$$\begin{cases} c \in \underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X;a,b) \\ \varphi : c \longrightarrow c' \quad (\in \underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X;a',b')) \\ \text{une flèche induisant} \quad \begin{array}{l} u \ \text{ sur les sources} \\ v \ \text{ sur les buts,} \end{array} \end{cases}$$



[page 145]

9.11.90

Pour la question précédente, relative aux flèches dans le diagramme



il faut préciser absolument la déscription de $\underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X)$ *dans* Cat, donc il faut préciser le système projectif $\underline{t} = (t_n)_{n\in\mathbf{N}}$. Nous allons prendre en effet

$$t_n = (\underbrace{\Delta_+\Delta_-}_{\tau_0})^{2n},$$

avec les morphismes de transition décrits par ailleurs

$$\underbrace{t_{n+p}}_{=\tau_0^{2n+2p}} \longrightarrow \underbrace{t_n}_{\tau_0^n},$$

étant donnés par $\delta_p * \mathrm{id}_{\tau_o^{2n}} * \delta_p$, où $\delta_p : \tau_0^p \longrightarrow 1$ est la dégénérescence de τ_0^p. Ainsi on peut considérer $\underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X)$ comme étant la catégorie des chemins biïnfinis dans X p. 91

$$\cdots \longrightarrow a_{-5} \longleftarrow a_{-4} \longrightarrow a_{-3} \xleftarrow{u_{-2}} a_{-2} \xrightarrow{u_{-1}} a_{-1} \xleftarrow{u_0} \overbrace{a_0}^{\underline{\mathrm{Ch}}_0} \xrightarrow{u_1} a_1 \xleftarrow{u_2} a_2 \xrightarrow{u_3} a_3 \longleftarrow a_4 \longrightarrow a_5 \longleftarrow \cdots,$$

($\underline{\mathrm{Ch}}_1$: $a_{-2} \xrightarrow{u_{-1}} a_{-1} \xleftarrow{u_0} a_0 \xrightarrow{u_1} a_1 \xleftarrow{u_2} a_2$; $\underline{\mathrm{Ch}}_2$: $a_{-2} \xrightarrow{u_{-2}} \cdots \xrightarrow{u_3} a_3$)

avec les u_i des identités pour $|i|$ assez grand.

La sous-catégorie (pleine)

$$\underline{\mathrm{Ch}}^W_{t_n}(X) \;=\; \underline{\mathrm{Ch}}^W_{(\Delta_+\Delta_-)^{2n}}$$

s'identifie à celle pour laquelle on a

> u_i une identité pour $i \notin [-2i+1, 2i]$, i.e. les seuls u_i 'significatifs' sont les $4i$ flèches u_{-2i+1}, u_{-2i+2}, …, u_{2i}.

Mais il sera plus commode de regarder $\underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X)$ comme la limite inductive d'une famille à deux indices de sous-catégories pleines [page 146]

$$\underline{\mathrm{Ch}}_{n,m}(X), \qquad n, m \in \mathbf{Z},$$

en définissant cette catégorie comme *vide* si $n > m$, et pour $n \le m$ comme formée des objets

$$\left\{ \begin{array}{l} (a_i, u_i)_{i\in\mathbf{Z}} \in \underline{\mathrm{Ch}}^W_{n,m}(X) \iff u_i \text{ une identité pour } i \notin [n, m-1] \\ \overset{\mathrm{id}}{\cdots} a_{n-1} \xrightarrow{\mathrm{id}} \underbrace{a_n \xrightarrow{u_n} a_{n+1} \cdots \longrightarrow a_{m-1} \xrightarrow{u_{m-1}} a_m}_{\text{'partie utile' du chemin}} \xrightarrow{\mathrm{id}} a_{m+1} \overset{\mathrm{id}}{\cdots}. \end{array} \right.$$

Donc pour $n = m$, on trouve la sous-catégorie pleine isomorphe à X, formée des chemins infinis 'totalement dégénérés', i.e. tels que *toutes* les u_i soient des identités. (Cette sous-catégorie de $\underline{\mathrm{Ch}}_\infty$ ne dépend donc pas du choix de $n = m$.)

$$\xrightarrow{\mathrm{id}} \underbrace{a_{-1}}_{=a} \xleftarrow{\mathrm{id}} \underbrace{a_0}_{=a} \xrightarrow{\mathrm{id}} \underbrace{a_1}_{=a} \xleftarrow{\mathrm{id}}$$

Tous les sommets d'un tel chemin sont égaux à un même objet de X, et les flèches de transition entre eux sont identiques.

La structure de $\underline{\mathrm{Ch}}^W_{n,m}(X) \;\simeq\; \underline{\mathrm{Ch}}^W_{\tau_{n,m}}(X)$ ne dépend que de la longueur $m-n$ de $\tau_{n,m}$ et de la *parité* de n. Si n est pair, la direction initiale de $\tau_{n,m}$ est positive, et

$$\tau_{n,m} = \underbrace{\Delta_+\Delta_-\cdots}_{m-n \text{ facteurs en alternance}} = \left\{ \begin{array}{ll} (\Delta_+\Delta_-)^{\frac{m-n}{2}} & \text{si } m \text{ pair} \\ (\Delta_+\Delta_-)^{\frac{m-n}{2}-1}\Delta_+ & \text{si } m \text{ impair} \end{array} \right.$$

[plutôt $\frac{m-n-1}{2}$ au lieu de $\frac{m-n}{2}-1$], tandis que pour n impair c'est juste l'inverse p. 92

[page 147]

$$\tau_{n,m} = \underbrace{\Delta_-\Delta_+\cdots}_{m-n \text{ facteurs alternés}} = \left\{ \begin{array}{ll} (\Delta_-\Delta_+)^{\frac{m-n}{2}} & \text{si } m \text{ impair} \\ (\Delta_-\Delta_+)^{\frac{m-n}{2}-1}\Delta_- & \text{si } m \text{ pair} \end{array} \right.$$

[plutôt $\frac{m-n-1}{2}$ au lieu de $\frac{m-n}{2}-1$]. La direction initiale est conforme à la parité de n, i.e. égale à $(-1)^n$, tandis que la direction terminale est opposée à la parité de m, i.e. égale à $(-1)^m$ [plutôt $(-1)^{m+1}$].

Je note que l'on a $\tau_0 = (\tau_0)^o$, d'où

$$\underline{t} = \underline{t}^o, \qquad \text{mais } \underline{t} \neq \underline{t}^-,$$

et pourtant on a des isomorphismes fonctoriels en X

$$\underline{\mathrm{Ch}}_{\underline{t}}(X) \;\simeq\; \underline{\mathrm{Ch}}_{\underline{t}^-}(X)$$

respectant source et but, à cause d'un isomorphisme

$$\underline{t} \simeq \underline{t}^- \qquad \text{dans Pro}(\underline{\text{Ty}}).$$

On peut dire p. ex. que le *foncteur translation* T^p d'amplitude p (pour $p \in \mathbf{Z}$) est défini sur $\underline{\text{Ch}}^W_{\underline{t}}(X)$, par

$$\left\{ \begin{array}{l} T^p(((a_i),(u_i))_{i\in\mathbf{Z}}) = ((b_j),(v_j))_{j\in\mathbf{Z}} \\ \text{avec} \left\{ \begin{array}{lcl} b_j & = & a_{j-p} \\ v_j & = & u_{j-p} \end{array} \right. \end{array} \right.$$

et que

$$T^p : \left\{ \begin{array}{lcl} \underline{\text{Ch}}_t(X) & \xrightarrow{\sim} & \underline{\text{Ch}}_{-t}(X) \\ \underline{\text{Ch}}_{-t}(X) & \xrightarrow{\sim} & \underline{\text{Ch}}_t(X) \end{array} \right\} \text{ si } p \text{ impair}$$

$$T^p : \left\{ \begin{array}{lcl} \underline{\text{Ch}}_t(X) & \xrightarrow{\sim} & \underline{\text{Ch}}_t(X) \\ \underline{\text{Ch}}_{-t}(X) & \xrightarrow{\sim} & \underline{\text{Ch}}_{-t}(X) \end{array} \right\} \text{ si } p \text{ pair.}$$

En d'autres termes, on peut formellement regarder la catégorie somme [page 148]

$$\underline{\text{Ch}}_{\pm}(X) = \underline{\text{Ch}}_{+}(X) \amalg \underline{\text{Ch}}_{-}(X)$$

et l'opération translation T comme un automorphisme qui échange les deux morceaux, et T^p n'est autre que son itéré p-ème, qui échange les morceaux $+$ et $-$ si p impair, qui les stabilise si p pair.

Il y a aussi l'automorphisme involutif de passage au chemin opposé, qui échange source et but, et que je définis (conformément à l'isomorphisme canonique identique p. 93

$$\underline{t} \xrightarrow{\sim} \underline{t}^o \quad)$$

comme la symétrie S

$$\left\{ \begin{array}{l} S((a_i),(u_i)) = ((b_j),(u_j)) \ \text{ avec} \\ \left\{ \begin{array}{lcl} b_j & = & a_{-j} \\ u_j & = & u_{-j+1}. \end{array} \right. \end{array} \right.$$

Si je le regarde comme opérant sur $\underline{\text{Ch}}^W_{\pm}(X)$, il est lié au foncteur T par

$$\left\{ \begin{array}{rcl} S^2 & = & \text{id} \\ STS^{-1} & = & T^{-1}, \end{array} \right.$$

de sorte que c'est le groupe semidirect de $\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$ par $\mathbf{Z}$ (groupe affine de dimension 1 de l'anneau $\mathbf{Z}$) qui opère sur $\underline{\text{Ch}}_{\pm}$.

On est embarassé de trouver un automorphisme T^2 de la situation $\underline{\text{Ch}}_{\infty}(X) \longrightarrow X \times X$, sans qu'il soit évident que dans Hot, ce foncteur induise l'identité ! Je ne vois aucun moyen de relier un chemin c et T^2c par une flèche dans $\underline{\text{Ch}}_{\infty}$, ni même pas un chemin 'canonique'. Mais je me dis que cet automorphisme est décrit par un automorphisme, non pas du système projectif [page 149]

$$(\tau_{n,m})_{n,m\in\mathbf{Z}^o\times\mathbf{Z},\ n\le m}$$

(où $\mathbf{Z}^o$ désigne l'ensemble ordonné *opposé* de $\mathbf{Z}$), mais du *pro-objet* de $\underline{\text{Ty}}$ qu'il définit (qui est bien sûr 'le même' pour tous les systèmes projectifs cofinaux à gauche dans $\underline{\text{Ty}}$). Il en résulte déjà que T^2 induit l'identité sur l'ind-objet de Cat hot, $\underline{\underline{\text{Ch}}}_{\infty}(X)$, et a fortiori sur l'ind-objet correspondant de Hot, ou de $\text{Hot}^{\wedge}_0$, ou enfin pour l'objet de $\text{Hot}^{\wedge}_0$ lui-même. De même pour les $\underline{\text{Ch}}_{\infty}(X;a,b)$. Il s'ensuit, revenant à $\underline{\text{Ch}}_{\infty}(X)$ lui-même et aux [page 150]

$\underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X;a,b)$, que l'automorphisme induit par T^2 est l'identité dans $\mathrm{Hot}_0^\wedge$. J'espère que $\mathrm{Hot} \longrightarrow \mathrm{Hot}_0^\wedge$ est tout au moins fidèle, de sorte que ça prouvera que T^2 induit l'identité dans Hot également.

Je reviens aux questions 1° à 4° d'il y a quelques jours.

Pour 1°), il faut prouver que

$$p : \underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X) \longrightarrow X \times X$$

est lisse et propre et une Hot-fibration. Par dualité, p propre résultera de p lisse. Mais $\underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X)$ est $\varinjlim$ des $\underline{\mathrm{Ch}}_{n,m}(X)$, avec $n \longrightarrow -\infty$, $m \longrightarrow +\infty$, et où on peut se borner à n et m *pairs.* Or on voit que pour n, m pairs, i.e. $\tau_{n,m}$ à flèche initiale directe, à flèche finale

rétrograde, $\underline{\mathrm{Ch}}_{n,m}(X) \simeq \underline{\mathrm{Ch}}_{\tau_{n,m}}(X)$ est Cat-*fibrée* sur $X \times X$, donc lisse (i.e. HOT-lisse), et cela passe aux $\varinjlim$ ([36]). p. 94

Ainsi $\underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X) \xrightarrow{p} X \times X$ est à la fois propre et lisse ([37]). Dire que c'est une HOT-fibration, revient p. ex. à dire que pour

$$(a,b) \xrightarrow{(u,v)} (a',b')$$

dans $X \times X$, la flèche correspondante

$$\underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X)/(a,b) \longrightarrow \underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X)/(a',b')$$

est une Hot-équivalence. Or, comme p est propre, les inclusions des fibres en (a,b) et en (a',b') dans l'un et l'autre membre sont des Hot-équivalences : [page 151]

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X)/(a,b) & \xrightarrow{\rho} & \underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X)/(a',b') \\ \wr\uparrow & & \wr\uparrow \\ \underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X;a,b) & \xrightarrow{\varphi} & \underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X;a',b') \end{array} \qquad (*)$$

Ainsi on trouve une flèche en pointillés dans Hot, dont il faut prouver que c'est une Hot-équivalence. Mais en considérant

$$u : a \longrightarrow a' \qquad v : b \longrightarrow b'$$

comme des *chemins* dans X, et

$$u^o : a' \longleftarrow a$$

comme un chemin rétrograde de a' à a, la théorie de variance générale (dans IX) nous donne bel et bien un isomorphisme dans (Hot) :

$$\underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X;a,b) \longrightarrow \underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X;a',b'),$$

on a envie de dire que c'est φ, i.e. qu'en l'insérant à la place de φ, le carré ci-dessus devient commutatif (ce qui prouverait ce qu'on veut). Je pense que si on travaille avec les ind-objets $\underline{\underline{\mathrm{Ch}}}_\infty(X)/(a,b)$, $\underline{\underline{\mathrm{Ch}}}_\infty(X;a,b)$ etc., pour lesquels on a des accouplements qui s'explicitent agréablement aux crans finis, et donnent naissance aux φ, cela devrait être facile (quoiqu'un peu fastidieux). Cela ne prouverait pas pour autant la commutativité de $(*)$ dans Hot, mais seulement dans $\mathrm{Hot}_0^\wedge$, ce qui n'est peut-être pas suffisant. Mais p. 95

36. **NB** $\underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X)$ n'est ni fibrée ni cofibrée sur $X \times X$ - car les foncteurs d'inclusion entre les $\underline{\mathrm{Ch}}_{n,m}$ ne sont pas cartésiens resp. cocartésiens. [page 152]

37. 12.11. Mais ça implique déjà que c'est une fibration !

cela suffit pour prouver que la flèche ρ dans $(*)$ devient [un] isomorphisme dans $\mathrm{Hot}_0^\wedge$, donc elle est [un] isomorphisme.

2°) Il faut montrer que les HOT-fibrations

$$\underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X) \underset{\beta}{\overset{\sigma}{\rightrightarrows}} X$$

sont triviales, ou ce qui revient au même, qu'elles sont à fibres asphériques. Il suffit de le voir pour σ, donc que


$$\underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X; a, ?)$$

est asphérique. Mais cette catégorie est la limite inductive des $\underline{\mathrm{Ch}}_n(X; a, ?)$, i.e. des

$$\underline{\mathrm{Hom}}^{\text{source fixée}}(\tau^n, X).$$

Mais comme l'intervalle I_{τ^n} se rétracte par déformation sur son origine, il est immédiat que cette catégorie $\underline{\mathrm{Hom}}$ est même contractile.

3°) Considérons



je voudrais prouver que $\bar{f}$ est une **D**-fibration propre et lisse ([38]). [page 153]

$\overline{X'}$ est la catégorie des couples

$$(x', c) \ \in \ \mathrm{Ob}\, X' \times \mathrm{Ch}_\infty(X)$$

tels que

$$\sigma(c) = f(x')$$

et

$$\bar{f}(x', c) = \beta(c), \qquad \text{but de } c.$$

La fibre de $\overline{X'}$, $\bar{f}$ en $x_0 \in X$ est donc la catégorie des couples $(x', c) \in \mathrm{Ob}\, X' \times \mathrm{Ch}_\infty(X)$, tels que

$$\sigma(c) = f(x'), \qquad \beta(c) = x_0.$$

On peut regarder encore $\overline{X'}$ comme limite inductive des sous-catégories $\overline{X'}_{n,m}$, correspondante aux couples (x', c) avec $c \in \mathrm{Ch}_{n,m}(X)$. On trouve que pour m pair (direction terminale de $\tau_{n,m}$ rétrograde) les $\overline{X'}_{n,m}$ sont Cat-fibrées sur X, pour m impair (direction terminale de $\tau_{n,m}$ directe) elles sont Cat-cofibrées. Donc on conclut encore comme tantôt, $\overline{X'}$ étant (au choix) limite inductive filtrante de sous-catégories lisses sur X, ou propres sur X. p. 96

Il faut prouver enfin que $\overline{X'} \xrightarrow{\bar{f}} X$ est une **D**-fibration ([39]), ce qui revient p. ex. à dire que pour une flèche [page 154]

$$a \xrightarrow{v} b$$

38. Ça résulte formellement de ce qui a été déjà vu, cf. pages 170-171.
39. Cela résulte déjà du fait que c'est propre et lisse !

dans X, la flèche induite

$$\overline{X'}/a \xrightarrow{\bar{v}} \overline{X'}/b$$

est une Hot-équivalence. On sait déjà comme tantôt que l'on a un diagramme à flèches verticales des Hot-équivalences

$$\begin{array}{ccc} \overline{X'}/a & \longrightarrow & \overline{X'}/b \\ \uparrow\wr & & \uparrow\wr \\ \overline{X'}_a & \cdots\cdots\rightarrow & \overline{X'}_b, \end{array}$$

et tout revient à montrer qu'une certaine flèche entre $\overline{X'}_a$ et $\overline{X'}_b$ dans Hot est [un] isomorphisme. J'ai envie de définir directement une telle flèche dans Hot, voire dans Cat. Or pour les m impairs, les $\overline{X'}_{n,m}$ sont Cat-cofibrées sur X. Pour $\overline{X'}_{-m,m}$ (m impair) on trouve donc

$$(\overline{X'}_{-m,m})_a \xrightarrow{v_*} (\overline{X'}_{-m,m})_b,$$

l'ennui est qu'elles ne sont pas compatibles avec les morphismes de transition pour m variable. Elles le sont cependant *à homotopie près* sûrement, donc on trouvera au moins une flèche d'ind-objets dans Cat hot [page 155]

$$\overline{\overline{X'}}_a \xrightarrow{v_*} \overline{\overline{X'}}_b,$$

ce qui par passage à $\mathrm{Hot}_0^\wedge$ donne quand-même une flèche

$$\overline{X'}_a \xrightarrow{v_*} \overline{X'}_b.$$

En travaillant avec les m impairs, on trouve de même des foncteurs en sens inverses

$$(\overline{X'}_{-m,m})_a \xleftarrow{v^*} (\overline{X'}_{-m,m})_b,$$

qui ne se recollent pas pour m variable, mais qui se recollent à homotopie près, pour donner une flèche dans Ind Cat hot p. 97

$$\overline{\overline{X'}}_a \xleftarrow{v^*} \overline{\overline{X'}}_b,$$

d'où aussi

$$\overline{X'}_a \xleftarrow{v^*} \overline{X'}_b \qquad \text{dans } \mathrm{Hot}_0^\wedge.$$

D'autre part, on doit pouvoir montrer soritalement, cran par cran, que v_*v^* et v^*v_* dans Ind Cat hot sont égales à l'identité, donc v_* et v^* sont des isomorphismes inverses l'un de l'autre. On doit vérifier d'autre part soritalement que [page 156]

$$\begin{array}{ccc} \overline{\overline{X'}}/a & \xrightarrow{\bar{v}} & \overline{\overline{X'}}/b \\ \uparrow & & \uparrow \\ \overline{\overline{X'}}_a & \xrightarrow{v_*} & \overline{\overline{X'}}_b, \end{array}$$

dans Ind Cat hot est commutatif. Passant au diagramme correspondant dans $\mathrm{Hot}_0^\wedge$, en prenant les limites inductives, on trouve un carré commutatif dans $\mathrm{Hot}_0^\wedge$

$$\begin{array}{ccc} \overline{X'}/a & \xrightarrow{\bar{v}} & \overline{X'}/b \\ \uparrow\wr & & \uparrow\wr \\ \overline{X'}_a & \xrightarrow[\sim]{v_*} & \overline{X'}_b, \end{array}$$

d'où résulte que $\bar{v}$ est [un] isomorphisme dans $\mathrm{Hot}_0^{\wedge}$, donc aussi dans Hot.

Pour vérifier que la HOT-fibration $\bar{f}$ est triviale si et seulement si f est une HOT-équivalence, il faudrait avoir développé dans Cat le formalisme de la suite exacte des lacets - on est tout près visiblement !

p. 98

13.11.90 [page 157]

13 Où on prouve enfin que $\underline{\mathrm{Ch}}(X;-,-)$ est aussi bon (voire meilleur) que $\underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X;-,-)$.

Je crois finalement que les catégories $\underline{\mathrm{Ch}}(X)$, $\underline{\mathrm{Ch}}(X;a,b)$ (sans indice ∞ !) sont 'bonnes', que les flèches canoniques dans Hot

$$\begin{cases} \underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X) & \xrightarrow{\sim} & \underline{\mathrm{Ch}}(X) \\ \underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X;a,b) & \xrightarrow{\sim} & \underline{\mathrm{Ch}}(X;a,b) \end{cases}$$

sont des isomorphismes. (La première est même [un] isomorphisme dans $\mathrm{HOT}(X \times X)$, ce qui implique la deuxième relation, en passant aux fibres …) Je crois que je suis à présent (après XI) en mesure de le prouver. Cela résultera des deux résultats-clef suivants :

1) Le foncteur canonique
$$X \longrightarrow \underline{\mathrm{Ch}}(X)$$
(associant à tout $x \in \mathrm{Ob}\, X$ le chemin vide de source et but X) est une Hot-équivalence, et :

2) Le foncteur source-but
$$\underline{\mathrm{Ch}}(X) \longrightarrow X \times X$$
est *lisse* et *propre* (donc une 'Hot-fibration parfaite').

Cela doit donner ce qu'on cherche. Comme la $X \times X$-flèche $\underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X) \longrightarrow \underline{\mathrm{Ch}}(X)$ (et les flèches déduites $\underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X;a,b) \longrightarrow \underline{\mathrm{Ch}}(X;a,b)$) a été définie par l'intermédiaire de la catégorie

$$\mathcal{C}_{\mathbf{N}^o} = \mathbf{N}^o \times_{\underline{\mathrm{Ty}}} \mathcal{C}$$

(où $\mathcal{C} = \underline{\mathrm{Ch}}(X)$ [est] considérée comme catégorie fibrée sur $\underline{\mathrm{Ty}}$, et $\mathbf{N}^o \longrightarrow \underline{\mathrm{Ty}}$ est le système projectif des $\underbrace{(\Delta_+\Delta_-)^{2n}}_{t_n}\dots$)

à l'aide des deux flèches canoniques

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C}_{\mathbf{N}^o} & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X) \\ \downarrow & & \\ \underline{\mathrm{Ch}}(X), & & \end{array}$$

[page 158]

on sera obligé de prouver aussi les résultats qui correspondent à 1) 2) pour $\mathcal{C}_{\mathbf{N}^o}$, i.e.


1′)
$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & \mathcal{C}_{\mathbf{N}^o} \\ \wr\downarrow & & \\ \mathcal{C}_{t_0} = \mathcal{C}_0 & & \end{array}$$

p. 99

(l'inclusion canonique de $\mathcal{C}_0$, fibre de $\mathcal{C}_{\mathbf{N}^o}$ (fibrée sur $\mathbf{N}^o$) en $0 \in \mathbf{N}^o$) est une Hot-équivalence, et :

2′) $\mathcal{C}_{\mathbf{N}^o} \longrightarrow X \times X$ est propre et lisse.

Moyennant ces quatre résultats techniques, que je vais prouver tantôt (et 1′ et 2′ ne font aucune surprise pour moi), on gagne. Considérons en effet le diagramme



Par 1) et 1′) (concernant α_1 et α_0) et le résultat similaire déjà connu pour α_2, ces trois foncteurs sont des Hot-équivalences. Donc il en est de même de π_1, π_2. Comme p_1, p_0, p_2 sont des Hot-fibrations (étant propres et lisses), il s'ensuit que π_1 et π_2 induisent des Hot-équivalences sur les fibres [page 159]

$$\underline{\mathrm{Ch}}(X;a,b) \quad \xleftarrow{\pi_1(a,b)} \quad \mathcal{C}_{\mathbf{N}^o}(a,b) \quad \xrightarrow{\pi_2(a,b)} \quad \underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X;a,b).$$

Je l'avais vérifié (sans mal) déjà pour π_2 et les $\pi_2(a,b)$, ce qui avait permis, en inversant π_2 dans Hot, de définir *dans* Hot


$$\begin{cases} \underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X) & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Ch}}(X) \\ \underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X;a,b) & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Ch}}(X;a,b), \end{cases}$$

et dire que ce sont des isomorphismes signifie justement que π_1 et les $\pi_1(a,b)$ sont des isomorphismes.

Je ne crois pas que $\mathcal{C}_{\mathbf{N}^o}$ ait en lui-même d'autre interêt, que de permettre de comparer les $X \times X$-catégories $\underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X)$ et $\underline{\mathrm{Ch}}(X)$, à l'aide du diagramme précédent. Par contre, $\underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X)$ et $\underline{\mathrm{Ch}}(X)$ m'aparaissent comme les deux ingrédients essentiels du formalisme des chemins dans Cat.

Je vais prouver 1, 2, 1′, 2′. p. 100 [page 160]

1) Considérons le diagramme



où $X_{\underline{\mathrm{Ty}}}$ et $\underline{\mathrm{Ch}}(X)$ sont considérées comme catégories Cat-fibrées sur $\underline{\mathrm{Ty}}$, et le foncteur j est déduit des foncteurs canoniques

$$X \longrightarrow \underline{\mathrm{Ch}}(X)_\tau \overset{\text{déf}}{=} \underline{\mathrm{Ch}}_\tau(X),$$

associant à $x \in \mathrm{Ob}\, X$ le chemin $p_\tau^*(x)$, où $p_\tau : \tau \longrightarrow e$ est la projection de τ vers l'élément unité (et élément final) $e = 1_{\underline{\mathrm{Ty}}}$ de $\underline{\mathrm{Ty}}$, et $\underline{\mathrm{Ch}}_e(X)$ est identifiée à X. Il faut vérifier le

Lemme. *Pour tout $\tau \in \underline{\mathrm{Ty}}$, le foncteur précédent est une* Hot*-équivalence (et même un homotopisme).*

Mais on sait que pour deux catégories $\mathcal{X}$, $\mathcal{C}$ lisses sur une autre, T, tout T-morphisme de $\mathcal{X}$ dans $\mathcal{C}$ qui induit des Hot-équivalences sur les fibres, est une Hot-équivalence. Ainsi j est est une Hot-équivalence. D'autre part, $\underline{\mathrm{Ty}}$, ayant un objet final, est asphérique, [page 161]

donc $X \times \underline{\mathrm{Ty}} \xrightarrow{\mathrm{pr}_1} X$ est une Hot-équivalence, d'où résulte aussitôt que i est une Hot-équivalence. Donc de même ji, or $ji = \alpha_1$, q.e.d.

2) Prouvons p. ex. la lissité de $\underline{\mathrm{Ch}}(X) \longrightarrow X \times X$, la propriété s'en déduira en appliquant ce résultat à X^{opp}. Soit donc

$$(a', b') \longrightarrow (a, b), \qquad \text{i.e. } a' \xrightarrow{u} a, \quad b' \xrightarrow{v} b,$$

une flèche dans $X \times X$, et c un objet de $\underline{\mathrm{Ch}}(X)$ au dessus de (a, b) :

$$\begin{array}{ccc} a' & \overset{c'}{\underset{\rightarrow}{\cdots\cdots\cdots}} & b' \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle v} \\ a & \underset{\rightarrow}{\xrightarrow{c}} & b. \end{array}$$

On regarde la catégorie $\mathcal{C}(c; u, v)$ des couples (c', w) qui relèvent $(c, (u, v))$, où donc c' est un chemin (de type non précisé) de a' vers b', et

$$w : c' \longrightarrow c$$

une flèche dans $\underline{\mathrm{Ch}}(X)$ qui sur les objets source induise u, et sur les objets buts induise v (ainsi c' est un chemin de a' vers b'). Il faut prouver que cette catégorie $\mathcal{C}(c; u, v)$ est asphérique. Pour cela, on regarde le chemin composé p. 101 [page 162]


$$\tilde{c} = \mathrm{ch}(u)\ c\ \mathrm{ch}(v)^o,$$

où $\mathrm{ch}(u)$ est le chemin (direct) de a' vers a défini par $u : a' \longrightarrow a$, et $\mathrm{ch}(v)^o$ désigne donc le chemin (rétrograde) de b à b' défini par $v : b' \longrightarrow b$. Si c est de type τ, $\tilde{c}$ est donc de type $\Delta_+ \tau \Delta_-$. On va comparer $\mathcal{C}(c; u, v)$ et la catégorie $\underline{\mathrm{Ch}}(X)/\tilde{c}$, à l'aide de deux foncteurs

$$\mathcal{C}(c; u, v) \underset{\psi}{\overset{\varphi}{\rightleftarrows}} \underline{\mathrm{Ch}}(X; a', b')/\tilde{c}\ ,$$

dont on prouvera qu'ils définissent des flèches inverses l'une de l'autre dans Hot. Comme $\underline{\mathrm{Ch}}(X)/\tilde{c}$ est contractile (ayant un objet final), donc asphérique, il en est de même de $\mathcal{C}(c; u, v)$, et on gagnera.

On définit φ par $\boxed{\varphi(c', w') = (\tilde{c}', \tilde{w}')}$, où ($c'$ étant du type τ') $\tilde{c}'$ est le chemin de type $\Delta_+ \tau' \Delta_-$ déduit de c' comme image inverse par la dégénérescence $\Delta_+ \tau' \Delta_- \longrightarrow \tau'$, i.e. on prolonge c' d'un 'cran Δ_+' $a' \xrightarrow{\mathrm{id}} a'$ à gauche et d'un 'cran Δ_-' $b' \xleftarrow{\mathrm{id}} b'$ à droite, cf. figure.



On peut dire que [page 163]

$$\tilde{c}' = a'_{\Delta_+} \circ c' \circ b'_{\Delta_-},$$

où de façon générale, si $x \in X$ et $\tau \in \mathrm{Ty}$, x_τ désigne le 'chemin constant' de valeur x, type τ. On a d'autre part des morphismes évidents

$$a'_{\Delta_+} \longrightarrow \mathrm{ch}(u), \qquad b'_{\Delta_-} \longrightarrow \mathrm{ch}(v)^{\mathrm{opp}},$$

comme montré [?] par les flèches verticales $(\mathrm{id}_{a'}, u)$ et $(v, \mathrm{id}_{b'})$ dans les deux carrés marqués $*$ du diagramme, flèches qui sont l'une dans $\underline{\mathrm{Ch}}_{\Delta_+}(X)$, l'autre dans $\underline{\mathrm{Ch}}_{\Delta_-}(X)$. Ceci dit, on pose

$$\tilde{w}' : \tilde{c}' \longrightarrow \tilde{c}, \qquad \tilde{w} = \lambda(u) * w' * \mu(v),$$

où

$$\begin{cases} \lambda(u) : & a'_{\Delta_+} & \longrightarrow & \mathrm{ch}(u) \\ \mu(v) : & b'_{\Delta_-} & \longrightarrow & \mathrm{ch}(v)^{\mathrm{opp}} \end{cases}$$


(cf. figure). Le couple p. 102

$$(\tilde{c}', \tilde{w}') \in \mathrm{Ob}\, \underline{\mathrm{Ch}}(X)/\tilde{c}$$

ainsi défini dépend fonctoriellement de (c', w') variable dans $\mathcal{C}(c; u, v)$: Si (c'_1, w'_1) est un deuxième objet de cette catégorie, une flèche du premier dans le second est une flèche

$$c' \xrightarrow{\alpha} c'_1$$

dans $\underline{\mathrm{Ch}}(X; a', b')$, telle qu'on ait commutativité dans




$$w' = w'_1 \alpha.$$

Une telle flèche α définit

$$\tilde{\alpha} = a'_{\Delta_+} * \alpha * b'_{\Delta_-} : \tilde{c}' \longrightarrow \tilde{c}'_1$$

dans $\underline{\mathrm{Ch}}(X; a', b')$, et on vérifie aussitôt que l'on a commutativité dans [page 164]



$$\text{i.e. } \tilde{w}' = \tilde{w}'_1 \tilde{\alpha},$$


i.e. que $\tilde{\alpha}$ est bien une flèche dans $\underline{\mathrm{Ch}}(X; a', b')/\tilde{c}$. De même, que $\alpha \longmapsto \tilde{\alpha}$ définit une dépendance fonctorielle, i.e. $(\beta\alpha)\tilde{} = \tilde{\beta}\tilde{\alpha}$, est évident sur la définition de $\tilde{\alpha}$. Donc, on a bien défini

$$\mathcal{C}(c; u, v) \xrightarrow{\varphi} \underline{\mathrm{Ch}}(X; a', b')/\tilde{c},$$

définissons maintenant

$$\mathcal{C}(c; u, v) \xleftarrow{\psi} \underline{\mathrm{Ch}}(X; a', b')/\tilde{c}.$$

Soit (c'', w'') un objet de $\underline{\mathrm{Ch}}(X; a', b')/\tilde{c}$,



donc p. 103

$$w'' : c'' \longrightarrow \tilde{c}, \qquad \text{flèche dans } \underline{\mathrm{Ch}}(X; a', b'),$$

notons qu'on a une flèche de rétraction évidente

$$\tilde{c} \xrightarrow{\rho_c} c \qquad \text{associée à } \Delta_+\tau\Delta_- \longrightarrow \tau \text{ (rétraction)},$$

induisant u et v sur la source et le but :

$$\begin{array}{ccccccc} a' & \xrightarrow{u} & a & \xrightarrow{\quad c \quad} & b & \xleftarrow{v} & b' \\ \downarrow{\scriptstyle u} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} & & \downarrow{\scriptstyle v} \\ a & \xrightarrow{\mathrm{id}} & a & \xrightarrow{\quad c \quad} & b & \xleftarrow{v} & b' \end{array} \qquad \left.\begin{array}{l} \\ \\ \end{array}\right\} \tilde{c} \qquad \in \underline{\mathrm{Ch}}_{\Delta_+\tau\Delta_-}(a', b')$$

$$\left.\begin{array}{l} \\ \\ \end{array}\right\} \delta^*_\tau(c) \qquad \in \underline{\mathrm{Ch}}_{\Delta_+\tau\Delta_-}(a, b)$$

$$a \xrightarrow{\quad c \quad} b \qquad \left.\begin{array}{l} \\ \end{array}\right\} c \qquad \in \underline{\mathrm{Ch}}_{\tau}(a, b).$$

Donc on définit un objet [page 165]

$$(c', w') = \psi(c'', w'') \ \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}(c; u, v)$$

par

$$c' = c'', \qquad w' = \rho_c w'',$$

et c'est fonctoriel en (c'', w'').

Le composé $\varphi\psi$ étant un endomorphisme de la catégorie contractile $\underline{\mathrm{Ch}}(X; a', b')/\tilde{c}$, est homotope à l'identité. Il faut vérifier qu'il en est de même de $\psi\varphi$, endomorphisme de $\mathcal{C}(c; u, v)$. Ce foncteur associe à (c', w'), $(\tilde{c}', \overline{w'})$, où $\tilde{c}'$ est défini comme plus haut, $\tilde{c}' = a'_{\Delta_+} \circ c' \circ b'_{\Delta_-}$, et où $\overline{w'}$ est le composé

$$\underbrace{\tilde{c}'}_{=\delta'^*_{\tau'}(c')} \quad \underbrace{\xrightarrow{\quad}}_{\substack{\text{flèche} \\ \text{canonique}}} \quad c' \xrightarrow{w'} c.$$

On a donc

$$(\psi\varphi)(c', w') = (\tilde{c}', \overline{w'}) \xrightarrow{\rho_{c'}} (c', w'),$$

c'est bien un morphisme dans $\mathcal{C}(c; u, v)$, i.e. on a commutativité dans

$$\begin{array}{ccc} \tilde{c}' & \xrightarrow{\quad \rho_{c'} \quad} & c' \\ & {\scriptstyle \overline{w'}} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle w'} & \\ & c & \end{array} \qquad \text{(flèche de } \underline{\mathrm{Ch}}(X; a', b')\text{)}.$$

Ainsi, le foncteur $\psi\varphi$ est bien homotope au foncteur identique. On a gagné !

Passons à $1', 2'$) pour $\mathcal{C}_{\mathbf{N}^o}$. L'assertion $1'$) se démontre exactement de la même manière que 1) pour $\underline{\mathrm{Ch}}(X)$, en regardant $\mathcal{C}_{\mathbf{N}^o}$ comme fibrée sur $\mathbf{N}^o$ (qui a un objet final 0), et en utilisant le diagramme [p. 104] [page 166]

$$X = (X_{\mathbf{N}^o})_e \xrightarrow{\quad i' \quad} X_{\mathbf{N}^o} = X \times \mathbf{N}^o \xrightarrow{\quad j' \quad} \mathcal{C}_{\mathbf{N}^o}$$
$$\searrow \qquad \swarrow$$
$$\mathbf{N}^o\ ,$$

où j' est (cartésien et) une Hot-équivalence sur chaque fibre d'après le lemme, donc une Hot-équivalence globalement, et i' est une Hot-équivalence car $\mathbf{N}^o$ est asphérique (ayant un objet final). Donc $j'i'$ est asphérique, q.e.d. [page 167]

Il reste à prouver que

$$\mathcal{C}_{\mathbf{N}^o} \longrightarrow X \times X$$

est propre et lisse. Ici encore, c'est exactement le même argument que tantôt, je présume. Il y a cependant une complication technique. Nous avions pris, pour définir

$$\underline{t} : \mathbf{N}^o \longrightarrow \underline{\mathrm{Ty}}, \qquad \underline{t} = (t_n)_n,$$

le choix


$$t_n = (\Delta_+\Delta_-)^{2n},$$

ou si on préfère

$$t_n = (\Delta_+\Delta_-)^{n},$$

en tous cas les t_n sont à direction initiale $+$, terminale $-$, et ce sont des types réduits. Si on prend $\Delta_+ t_n \Delta_-$, on trouve un type non réduit, qui n'est pas parmi les t_n. Il ne servirait à rien de changer la définition de t_n en $t_n = (\Delta_-\Delta_+)^{\text{quelque chose}}$, car cette fois $\Delta_+ t_n \Delta_-$ sera bien réduit, mais n'aura pas les bons signes initial et terminal. Donc pour définir $\tilde{c}$ en termes de c, comme objet de $\mathcal{C}_{\mathbf{N}^o}$, il faudra, si c est de type $\tau = t_n$, prendre $\tilde{c}$ de type $\Delta_+\Delta_-\tau\Delta_+\Delta_- = t_{n+1}$ (en prenant $t_{n+1} = (\Delta_+\Delta_-)^{2n}$), et de même pour définir $\tilde{c}'$ en termes de c'. Les définitions pertinentes du passage de (c', w') à $(\tilde{c}', \tilde{w}')$ sont décrites dans la figure :

[page 168]
p. 105



Ainsi

$$\begin{cases} \tilde{c} = \xi_u \circ c \circ \eta_v & \text{où} \quad \left\{ \begin{array}{llllll} \xi_u : & a' & \xrightarrow{u} & a & \xleftarrow{\mathrm{id}} & a \\ \eta_v : & b & \xrightarrow{\mathrm{id}} & b & \xleftarrow{v} & b' \end{array} \right\} \text{ type } \Delta_+\Delta_- \\ \tilde{c}' = a'_{\Delta_+\Delta_-} \circ c' \circ b'_{\Delta_+\Delta_-} \\ \tilde{w}' = \lambda(u) * w * \mu(v) & \text{avec} \quad \left\{ \begin{array}{lll} \lambda(u) : & a'_{\Delta_+\Delta_-} & \longrightarrow \xi_u \\ \lambda(v) : & b'_{\Delta_+\Delta_-} & \longrightarrow \eta_v \end{array} \right\} \text{ comme dans [la] figure.} \end{cases}$$

On trouve ainsi, mutatis mutandis,

$$\mathcal{C}_{\mathbf{N}^o}(c; u, v) \xrightarrow{\varphi} \mathcal{C}_{\mathbf{N}^o}(a', b')/\tilde{c}, \qquad \varphi(c', w') = (\tilde{c}', \tilde{w}'),$$

et on définit le foncteur

$$\mathcal{C}_{\mathbf{N}^o}(c; u, v) \xleftarrow{\psi} \mathcal{C}_{\mathbf{N}^o}(a', b')/\tilde{c}$$

ainsi : à (c'', w'') dans $\mathcal{C}_{\mathbf{N}^o}(a', b')/\tilde{c}$, donc un chemin c'' de type $t_n = (\Delta_+\Delta_-)^{2n}$ de a' à b' et un homomorphisme $w'' : c'' \longrightarrow \tilde{c}$ à extrémités fixes, on associe (c', w') dans $\mathcal{C}_{\mathbf{N}^o}(c; u, v)$, avec

$$c' = c'', \qquad w' = \rho_c w'',$$

où

$$\rho_c : \tilde{c} \longrightarrow c$$

[page 169]

est défini de façon similaire que tantôt, par

$$\begin{array}{ccccccccccc} a' & \xrightarrow{u} & a & \xleftarrow{\mathrm{id}} & a & \rightarrow\!\!\!

$p_{X,f}$, l'est aussi ; d'autre part $\mathrm{pr}_2^X \circ f'$ est la projection pr_2 de $X' \times X$ sur X, donc c'est aussi un morphisme parfait (puisque $X' \longrightarrow e$ est parfait, donc il en est de même du composé

$$(\mathrm{pr}_2^X \underbrace{f') \circ p_{X,f}} = \underbrace{\mathrm{pr}_2^X(p_X} \ \mathrm{pr}_2') = \beta_X \mathrm{pr}_2' \overset{\text{déf}}{=} \bar{f} \ \ ).$$

Je rappelle que la section i_f de $C(f)$ sur X' est définie à partir de la section i_X de $(\mathcal{C}_X, \sigma_X)$ sur X. C'est une Hot-équivalence, car $\sigma_X = \mathrm{pr}_1^X p_X$ est parfait à fibres asphériques, donc universellement une Hot-équivalence, donc $\mathrm{pr}_1 p_{X,f} : C(f) \longrightarrow X'$ est aussi une Hot-équivalence, et toute section en est donc une aussi.

40. NB $C(f)$ est défini comme l'image inverse sur X' du fibré C_X sur X (par $\sigma_X = \mathrm{pr}_1^X \circ p_X$) par $f : X' \longrightarrow X$.

p.

LES DÉRIVATEURS

ALEXANDRE GROTHENDIECK

Chapitre VIII

1-types d'homotopie relatifs : leur intégration ...

p.

Note des éditeurs de l'édition transcrite.

Ce texte a été déchiffré et transcrit en LaTeX 2ε par M. Künzer. Il a été édité par M. Künzer, J. Malgoire, et G. Maltsiniotis. La transcription est aussi fidèle que possible au manuscrit. Pour les quelques corrections évidentes, ou rares commentaires des éditeurs, ainsi que pour la numérotation originale des pages du manuscrit, les caractères de machine à écrire `[typewriter]` entre crochets sont utilisés. Un point d'interrogation entre crochets signifie que l'on n'est pas sûr du mot qui précède.

Cette édition est provisoire. Les remarques, commentaires et corrections sont bienvenus. Envoyer un message à :

[e-mail address removed]

G. Maltsiniotis

p. 1

[page 1]

1 Intégration des 1-types d'homotopie relatifs sur une catégorie.

Les types d'homotopie relatifs sur une (petite) catégorie S sont définis par les *champs* (en catégories) sur $S^\wedge$, qui correspondent essentiellement aux contrafoncteurs $S^o \longrightarrow$ (Cat), ou encore aux catégories X sur S qui sont Cat-fibrées sur S. (Dans $(\mathrm{Cat}/S)_{\mathrm{fib}}$, on inverse les flèches qui sont des Hot-équivalences sur les fibres.) D'autre part, les 1-types d'homotopie relatifs sur S doivent se décrire par des *champs en groupoïdes* sur S. Si on a un type d'homotopie relatif, défini par

$$X \longrightarrow S, \qquad \text{catégorie Cat-fibrée sur } S,$$

ou par

$$\begin{array}{rcl} S^o & \longrightarrow & \mathrm{Cat} \\ s & \longmapsto & X_s\ , \end{array}$$

le 1-type d'homotopie associé est défini par

$$s \longmapsto \Pi(X_s), \qquad S^o \longrightarrow (\mathrm{Grp}), \qquad \text{catégorie des groupoïdes,}$$

où $\Pi(X_s)$ est le groupoïde fondamental de X_s. On note la catégorie fibrée correspondante sur S par $\boxed{\Pi(X/S)}$. Il est vrai que si

$$X \longrightarrow X'$$

est un homomorphisme de catégories fibrées sur S qui induise une Hot-équivalence sur les fibres, elle induit une équivalence fibrée

$$\Pi(X/S) \longrightarrow \Pi(X'/S),$$

mais non un isomorphisme. Il y aurait donc du travail à faire pour définir un foncteur

$$\underbrace{\underline{\mathrm{Hot}}(S)}_{\substack{\text{catégorie des}\\ \text{types d'homotopie}\\ \text{relatifs sur } S}} \xrightarrow{\xi \longmapsto \Pi(\xi/S)} \underbrace{\underline{\mathrm{Grp}}(S)}_{\substack{\text{catégorie des}\\ \text{groupoïdes}\\ \text{fibrés sur } S\\ \text{(ou catégories}\\ \text{des champs en}\\ \text{groupoïdes}\\ \text{sur } S^\wedge)}} .$$

Mais ce n'est pas pour l'instant mon propos. Plutôt, de donner une formule de transitivité en homologie non commutative, analogue à $R(gf)_* \simeq Rg_*Rf_*$ en cohomologie.

Si

p. 2
[page 2]

$$f : S \longrightarrow T$$

est un foncteur, on va définir un foncteur

$$f_! : \ \underline{\mathrm{Grp}}(S) \ \longrightarrow \ \underline{\mathrm{Grp}}(T)$$

(image directe de 1-types d'homotopie relatifs). Mais notons d'abord que si

$$p : \ X \ \longrightarrow \ S$$

est une S-catégorie *quelconque* (pas nécessairement Cat-fibrée), on lui associe néanmoins un type d'homotopie relatif, via la catégorie fibrée $\tilde{X}^{(S)}$, ou $\tilde{X}$, ayant comme fibres les $s\backslash X$ (en notant que $s' \longrightarrow s$ dans S définit bien $s\backslash X \longrightarrow s'\backslash X$) ([1]). On a un S-foncteur canonique

$$X \xrightarrow{i} \tilde{X}, \qquad x \longmapsto (x, p(x), \underbrace{p(x)}_{=\text{`}s\text{'}} \xrightarrow{\mathrm{id}} p(x)).$$

C'est une S-Hot-équivalence si X était déjà fibrée. En fait, sur chaque fibre c'est un homotopisme car on définit alors $\tilde{X}_{s_0} \xrightarrow{j} X_{s_0}$ de façon évidente, de façon que

$$X_{s_0} \underset{j}{\overset{i}{\rightleftarrows}} \tilde{X}_{s_0}, \qquad ji \simeq \mathrm{id}, \qquad ij \underbrace{\xrightarrow{\text{homotopie simple}}}_{\substack{\text{NB cette flèche}\\ \text{n'est pas [un]}\\ \text{isomorphisme}\\ \text{en général.}}} \mathrm{id}.$$

Revenons alors à $f : S \longrightarrow T$, et considérons un groupoïde fibré sur S,

$$G \ \longrightarrow \ S,$$

ce n'est pas une catégorie fibrée sur T, mais on peut lui associer

$$t \longmapsto t\backslash G, \qquad T^o \longrightarrow (\mathrm{Cat}),$$

d'où une catégorie fibrée sur T, dont on prend le Π relatif. Mais il est plus simple de prendre directement

$$t \ \longmapsto \ \Pi(t\backslash G),$$

qui définit une catégorie fibrée en groupoïdes sur T.

p. 3
[page 3]

1. Ayant $\tilde{X}$, on définit $\Pi(X/S) \overset{\text{déf}}{=} \Pi(\tilde{X}/S)$.

Ainsi on trouve bien un foncteur (en fait, même un 2-foncteur de 2-catégories)

$$f_! : \underline{\mathrm{Grp}}(S) \longrightarrow \underline{\mathrm{Grp}}(T).$$

Si

$$u : G \longrightarrow G'$$

est un homomorphisme de groupoïdes fibrés sur S, qui induise des Cat-équivalences sur les fibres, alors

$$f_!(u) : f_!(G) \longrightarrow f_!(G')$$

est aussi une Cat-équivalence sur les fibres. (Cela est formel, à partir du fait que $f_!$ est un 2-foncteur, compte tenu que si on a une équivalence sur les fibres, alors il y a un quasi-inverse – c'est une histoire générale de catégories fibrées …)

Soit maintenant

$$p : X \longrightarrow S,$$

et prenons le cas $G = \Pi(X/S)$. Je dis qu'on a alors une T-équivalence

$$\boxed{f_!(\Pi(X/S)) \simeq \Pi(X/T),} \qquad (*)$$

en d'autres termes, pour connaître $\Pi(X/T)$ (à T-équivalence près), il suffit de connaître $\Pi(X/S)$, et de lui appliquer le foncteur $f_!$ d'intégration des 1-types d'homotopie relatifs, pour $f : S \longrightarrow T$.

Notons que l'on a trivialement

$$\Pi(X/S) = p_!(e_X),$$

où e_X désigne le X-groupoïde fibré trivial (toutes les fibres ponctuelles). Donc la formule précédente s'écrit comme une formule de transitivité

$$f_!(p_!(\Gamma)) \simeq (fp)_!(\Gamma),$$

où Γ est le groupoïde fibré trivial sur X. Cela suggère de généraliser la formule $(*)$ en [page 4]

$$\boxed{(fp)_!(\Gamma) \simeq f_!(p_!(\Gamma))}$$

pour *tout* groupoïde fibré sur X, dans une situation

$$X \xrightarrow{p} S \xrightarrow{f} T.$$

Ce sera formel, si on établit une propriété de 2-adjonction pour le foncteur $f_!$:

Théorème. *Soit $f : S \longrightarrow T$ une flèche dans* (Cat)*, G un champ en groupoïdes sur S, H un champ en groupoïdes sur T. On a alors une équivalence de catégories canonique* p. 4

$$\boxed{\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{\mathrm{Grp}}(S)}(G, f^*H) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{\mathrm{Grp}}(T)}(f_!G, H).}$$

Les flèches d'adjonction

$$\begin{cases} f_!f^*H \longrightarrow H & H \in \mathrm{Ob}\,\underline{\mathrm{Grp}}(T) \\ f^*f_!G \longleftarrow G & G \in \mathrm{Ob}\,\underline{\mathrm{Grp}}(S) \end{cases}$$

devraient se définir sans problème. Pour la deuxième, il faut définir pour $s \in S$

$$G_s \longrightarrow (f^*(f_!(G)))_s = (f_!(G))_{f(s)} \overset{\text{déf}}{=} \Pi(s\backslash G),$$

or on a

$$G_s \longrightarrow s\backslash G,$$

d'où

$$\underbrace{\Pi(G_s)}_{\substack{= G_s \\ \text{car } G_s \\ \text{est un} \\ \text{groupoïde}}} \longrightarrow \Pi(s\backslash G),$$

O.K. C'est fonctoriel en s …

[page 5]

Pour la flèche $f_! f^* H \longrightarrow H$ sur T, il faut trouver pour tout $t \in \mathrm{Ob}\, T$, et fonctoriellement en t,

$$\underbrace{(f_! f^* H)_t}_{\stackrel{\text{déf}}{=} \Pi(t\backslash f^*(H))} \longrightarrow \underbrace{H_t}_{= \Pi(H_t)},$$

il suffirait donc de définir

$$t\backslash f^*(H) \longrightarrow H_t,$$

mais on a le diagramme cartésien

$$\begin{array}{ccc} f^*H = H \times_S T & \longrightarrow & H \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \xrightarrow{\quad f \quad} & T \ni t \end{array}$$

[plutôt $H \times_T S$] induisant

$$f^* H \longrightarrow H,$$

d'où

p. 5

$$t\backslash f^* H \longrightarrow t\backslash H \qquad \text{(au lieu de s'envoyer dans } H_t),$$

mais d'autre part, comme H est fibrée sur T, donc lisse sur T, l'inclusion

$$H_t \longrightarrow t\backslash H$$

est une Hot-équivalence. Ou disons plutôt : $f^* H \longrightarrow H$ est un morphisme de catégories sur T, induisant

$$\underbrace{\Pi(f^* H/T)}_{\stackrel{\text{déf}}{=} f_!(f^* H)} \longrightarrow \Pi(H/T),$$

[page 6]

or le T-foncteur canonique

$$H \longrightarrow \Pi(H/T) \qquad (= \text{catégorie sur } T \text{ définie par } t \longmapsto \Pi(t\backslash H))$$

est une équivalence, parce que H est un fibré en groupoïdes sur T. Donc on peut trouver un T-quasi-inverse

$$\Pi(H/T) \longrightarrow H$$

et en composant on trouve


$$f_!(f^* H) \longrightarrow \Pi(H/T) \longrightarrow H$$

la flèche cherchée.

Ayant les 2-flèches d'adjonction, je m'arrête là dans les vérifications !


p. 6

2 Questions de changement de base



$$p^* f_!(G) \longleftarrow f'_! q^*(G) \qquad (*)$$

La flèche est définie, pourvu qu'on ait commutativité ou une flèche de commutativité $\gamma : pf' \longrightarrow fq$ (pas nécessairement `[un]` isomorphisme). Par adjonction, il revient au même de donner



On se demande quand la flèche est `[un]` isomorphisme.

Le théorème suivant doit être vrai, et résulte de mes fourbis généraux. [page 7]

Théorème. *Si le carré* $(*)$ *est* cartésien *dans* (Cat)*,* γ *un isomorphisme, et si on suppose que* f *soit* 1*-lisse, ou* p 1*-propre, alors le* T'*-foncteur de changement de base est une équivalence de* T'*-catégories.*

Les 'fourbis' généraux seraient en termes d'un dérivateur **D** ad hoc, celui des 1-types d'homotopie relatifs. J'y reviendrai par la suite.

On se pose la question quand le 2-foncteur associé à $f : S \longrightarrow T$

$$f^* : \underline{\underline{\mathrm{Grp}}}(T) \longrightarrow \underline{\underline{\mathrm{Grp}}}(S)$$

est 0-fidèle, 1-fidèle, 2-fidèle ([2]). Si G, H sont des fibrés en groupoïdes sur T, on considère p. 7

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{\underline{\mathrm{Grp}}}(T)}(G, H) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{\underline{\mathrm{Grp}}}(S)}(f^*G, f^*H),$$

et suivant que ce foncteur est toujours fidèle, ou pleinement fidèle, ou une équivalence de catégories, on dit que f^* est 0-, 1-, ou 2-fidèle. Dans le cas 2-fidèle, cela implique que si K est un fibré en groupoïdes sur S, s'il est équivalent à un f^*G, alors G est déterminé à T-équivalence près, elle même déterminée à isomorphisme unique près.

Soit $i \in \mathbf{N}$. On dit que f est i-asphérique si $\forall t \in T$, $Z = S/t$ est i-asphérique, i.e. [page 8]

$$\pi_0(Z),\ \ldots,\ \pi_i(Z) \qquad \text{triviaux.} \qquad (*)$$

On définit aussi (-1)-asphérique : les S/t sont non-vides. De même pour la notion de i-coasphérique.

2. La i-fidélité de f^* ($i \in \{0, 1, 2\}$) équivaut à celle des foncteurs (obtenus en prenant $G = e_T$)

$$\underline{\Gamma}(H/T) \longrightarrow \underline{\Gamma}(f^*H/S).$$

En fait, pour $i \in [-1, +\infty[\subseteq \mathbf{Z}$, on définit un dérivateur $\mathbf{D}_i$ des i-types d'homotopie relatifs (cf. plus bas). D'où les notions d'objet $\mathbf{D}_i$-asphérique (= i-asphérique), de $\mathbf{D}_i$-équivalence, de foncteur $\mathbf{D}_i$-asphérique et $\mathbf{D}_i$-coasphérique, de foncteur $\mathbf{D}_i$-lisse et $\mathbf{D}_i$-propre, de $\mathbf{D}_i$-fibration et de $\mathbf{D}_i$-fibration *triviale* (i.e. à fibres $\mathbf{D}_i$-asphériques). On doit avoir le

Théorème 3. *Soit $f : S \longrightarrow T$ dans* (Cat)*, $i \in \{0, 1, 2\}$. Supposons l'une des conditions suivantes satisfaite :*

a) f est $(i-1)$-propre, et $(i-1)$-asphérique (s'exprime par la condition que certaines catégories, telles les S/t, soient $(i-1)$-asphériques).

b) f est $(i-1)$-lisse, et $(i-1)$-coasphérique.

Alors :

1°) Le foncteur f^* image inverse

$$f^* : \underline{\mathrm{Grp}}(T) \longrightarrow \underline{\mathrm{Grp}}(S)$$

est i-fidèle.

*2°) Dans le cas $i = 2$ (f pleinement fidèle), on a de plus ceci : si $G \in \mathrm{Ob}\,\underline{\mathrm{Grp}}(S)$ est un fibré en groupoïdes sur S, alors G est équivalent à un fibré en groupoïdes de la forme $f^*(H)$ si et seulement si pour tout $t \in T$, la restriction G_t de G à S_t est équivalente à un fibré en groupoïdes constant sur S_t. (***NB** La condition a) ou b) implique déjà que S_t est 1-connexe, i.e. que son groupoïde fondamental est équivalent à e.)*

p. 8
[page 9]

3°) Soit Z un objet 1-connexe dans (Cat)*, G un fibré en groupoïdes sur Z. Pour que G soit Z-équivalent à un groupoïde constant sur Z, il faut et il suffit que pour toute flèche u dans Z, le morphisme de groupoïdes u^* induit sur les fibres de G soit une Z-équivalence* ([3]).

Corollaire. *La condition nécessaire et suffisante de 2°) s'écrit aussi ainsi : pour toute flèche u de S 'verticale' sur T, i.e. telle que $f(u)$ soit une flèche identique, le foncteur u^* induit par u sur les fibres de G soit une équivalence de groupoïdes.*

3. On dit alors que G est *essentiellement localement constant* sur Z.

LES DÉRIVATEURS

p. [non numérotée]

ALEXANDRE GROTHENDIECK

Chapitre IX
Retour sur les catégories de fractions $\mathcal{M}W^{-1}$, comparaison avec Quillen

p. [non numérotée]

Note des éditeurs de l'édition transcrite.

Ce texte a été déchiffré et transcrit en LaTeX 2_ε par M. Künzer. Il a été édité par M. Künzer, J. Malgoire, et G. Maltsiniotis. La transcription est aussi fidèle que possible au manuscrit. Pour les quelques corrections évidentes, ou rares commentaires des éditeurs, ainsi que pour la numérotation originale des pages du manuscrit, les caractères de machine à écrire `[typewriter]` entre crochets sont utilisés. Un point d'interrogation entre crochets signifie que l'on n'est pas sûr du mot qui précède.

Cette édition est provisoire. Les remarques, commentaires et corrections sont bienvenus. Envoyer un message à :

[**e-mail address removed**]

G. Maltsiniotis

p. 1 [page 1]

1 Fonctorialité de $\mathrm{Ch}_\infty^\Sigma(a,b)$ en a, b dans $\mathcal{M}\Sigma^{-1}$

On se donne une catégorie $\mathcal{M}$ avec `[un]` ensemble admissible de flèches $\Sigma \subseteq \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$, d'où (en prenant p. ex. $\underline{t} = (t_n)$, avec $t_n = (\underbrace{\Delta_+\Delta_-}_{\tau_0})^{2n}$, et $\underbrace{t_{n+1}}_{=\tau_0^{2n+2}} \longrightarrow \underbrace{t_n}_{=\tau_0^{2n}}$ défini comme $p * \mathrm{id}_{\tau_0^{2n}} * p$, où $p : \tau_0 \longrightarrow 1$ la dégénérescence.) On a alors une théorie des $\underline{\mathrm{Ch}}_{\Sigma,\infty}(\mathcal{M},a,b)$, que je note simplement $\mathrm{Ch}_\infty(a,b)$ en tant qu'objet de Hot. Des accouplements

$$\mathrm{Ch}_\infty(a,b) \times \mathrm{Ch}_\infty(b,c) \longrightarrow \mathrm{Ch}_\infty(a,c) \qquad \text{dans Hot}$$

avec (nous allons l'admettre) *associativité* dans Hot. Cela définit donc des accouplements sur les $\pi_0(\mathrm{Ch}_\infty(a,b)) \overset{\text{déf}}{=} \pi_0(a,b)$, qui n'est autre que la composition des flèches dans $\mathcal{M}\Sigma^{-1}$. D'autre part, on a pour $a, b \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(a,b) \longrightarrow \pi_0(\mathrm{Ch}_\infty(a,b)) = \pi_0(a,b),$$

compatible avec les compositions. Mais on peut l'ignorer pour l'instant, et regarder $\mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$, ou simplement $\mathcal{M}_0$, avec la seule structure

$$\begin{cases} \mathcal{M}_0 \times \mathcal{M}_0 & \longrightarrow & \mathrm{Hot} & (a,b) & \longmapsto & \mathrm{Ch}_\infty(a,b) \\ \mathcal{M}_0 \times \mathcal{M}_0 \times \mathcal{M}_0 & \longrightarrow & \mathrm{Fl}\,\mathrm{Hot} & (a,b,c) & \longmapsto & (\mathrm{Ch}_\infty(a,b) \times \mathrm{Ch}_\infty(b,c) \underbrace{\longrightarrow}_{\substack{\text{flèche} \\ \text{dans Hot}}} \mathrm{Ch}_\infty(a,c)) \end{cases}$$

avec condition `[d']`associativité, et aussi une condition d'unités :

$$\mathrm{Ch}_\infty(a,b) \text{ est muni d'un } 1_a \in \pi_0\mathrm{Ch}_\infty(a,a) = \pi_0(a,a),$$

jouant le rôle d'une 'identité bilatère', dans le sens suivant. Notons que les accouplements

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Ch}_\infty(a,b) & \times & \mathrm{Ch}_\infty(b,c) & \longrightarrow & \mathrm{Ch}_\infty(a,c) \\ P & \times & Q & \longrightarrow & R \end{array}$$

[page 2]

définissent

$$\begin{aligned} P &\longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Hot}}(Q,R) \\ Q &\longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Hot}}(P,R), \end{aligned}$$

d'où en passant aux π_0

$$\begin{aligned} \pi_0(P) &\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathrm{Hot}}(Q,R) \\ \pi_0(Q) &\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathrm{Hot}}(P,R), \end{aligned}$$

en d'autres termes, p. 2

$$\begin{aligned} \pi_0(a,b) &\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathrm{Hot}}(\mathrm{Ch}_\infty(b,c),\mathrm{Ch}_\infty(a,c)) \\ \pi_0(b,c) &\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathrm{Hot}}(\mathrm{Ch}_\infty(a,b),\mathrm{Ch}_\infty(a,c)). \end{aligned}$$

On en déduit en particulier pour $a, b \in \mathcal{M}_0$

$$\left\{ \begin{array}{lll} 1) & \pi_0(a,a) & \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathrm{Hot}}(\mathrm{Ch}_\infty(a,b),\mathrm{Ch}_\infty(a,b)) \\ 2) & \pi_0(a,a) & \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathrm{Hot}}(\mathrm{Ch}_\infty(b,a),\mathrm{Ch}_\infty(b,a)), \end{array} \right. \qquad (*)$$

et un objet α_a de $\pi_0(a,a)$ est unité bilatère si ses deux images sont les homomorphismes identiques dans $\mathrm{Ch}_\infty(a,b)$ resp. $\mathrm{Ch}_\infty(b,a)$. Passant aux π_0 de ceux-ci, cela implique que α_a est unité bilatère pour la composition des $\pi_0(x,y)$, relativement à b. Si on veut que ce soit le cas pour *tout* b, cela signifie (prenant $b = a$) que α_a est un objet unité bilatère pour la structure de composition associative (donc de monoïde) dans $\pi_0(a,a)$, donc que $\pi_0(a,a)$ est un monoïde *unitaire,* ayant α_a pour objet unité. L'élément α_a est donc déterminé de façon unique. Et on veut que α_a existe pour tout $a \in \mathcal{M}_0$, donc $\mathcal{M}_0$, muni des $\pi_0(a,b)$ [page 3] et de leur composition, devient une *catégorie,* soit $\mathcal{M}_\Pi$; et les flèches identiques de celle-ci doivent jouer le rôle d'unité bilatère également pour les 'Hom externes' $\mathrm{Ch}_\infty(a,b)$, à valeurs dans Hot.

On peut dire que pour $a = a_0$ fixé, les $\mathrm{Ch}_\infty(a_0,b)$ (b variable) forment les valeurs d'un *foncteur* covariant

$$\mathcal{M}_\Pi \longrightarrow \mathrm{Hot} \qquad b \longmapsto \mathrm{Ch}_\infty(a_0,b),$$

en associant à

$$b \xrightarrow{u} b', \qquad u \in \pi_0(b,b'),$$

la flèche

$$\mathrm{Ch}_\infty(a,b) \longrightarrow \mathrm{Ch}_\infty(b')$$

[plutôt $\mathrm{Ch}_\infty(a_0,b) \longrightarrow \mathrm{Ch}_\infty(a_0,b')$] correspondante $*_1$ [?]. Que ce soit bien là une loi fonctorielle doit résulter formellement de l'associativité des accouplements sur les Ch_∞. De même, on a une loi fonctorielle, pour b fixé,

$$\mathcal{M}_\Pi^o \longrightarrow \mathrm{Hot}, \qquad a \longmapsto \mathrm{Ch}_\infty(a,b),$$

grâce à l'associativité. En fait, l'associativité impliquera aussi qu'on a un *bifoncteur*

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_\Pi^o \times \mathcal{M}_\Pi &\longrightarrow \mathrm{Hot} \\ (a\,,\,b) &\longmapsto \mathrm{Ch}_\infty(a,b), \end{aligned}$$

car si p. 3

$$a' \xrightarrow{u} a, \qquad b \xrightarrow{v} b', \qquad \text{[page 4]}$$

on a le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Ch}_\infty(a,b) & \xrightarrow[v]{\text{comp. avec}} & \mathrm{Ch}_\infty(a,b') \\ {\scriptstyle \text{comp. avec } u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \text{comp. avec } u} \\ \mathrm{Ch}_\infty(a',b) & \xrightarrow[v]{\text{comp. avec}} & \mathrm{Ch}_\infty(a',b'), \end{array}$$

qui est commutatif grâce à l'associativité pour

$$\mathrm{Ch}_\infty(a',a),\ \mathrm{Ch}_\infty(a,b),\ \mathrm{Ch}_\infty(b,b').$$

Corollaire de cette dépendance bifonctorielle : *Si* $u : a' \longrightarrow a$, $v : b \longrightarrow b'$ *sont dans* $\mathcal{M}_\Pi$, *alors la flèche correspondante*

$$\mathrm{Ch}_\infty(a,b) \longrightarrow \mathrm{Ch}_\infty(a',b') \qquad \textit{dans } \mathrm{Hot}$$

est un isomorphisme.

Les mêmes arguments devraient marcher si au lieu des Hom ext à valeurs dans Hot, on les prenait dans Ind Hot, ou dans Cat hot, ou dans Ind Cat hot – je pense bien sûr aux $\mathrm{CH}_\infty(a,b)$ (dans la théorie de la localisation) dans Ind Cat hot, qui peuvent être regardés comme provenant d'un bifoncteur (où $\mathcal{M}_\Pi = \mathcal{M}\Sigma^{-1}$)

$$\mathcal{M}_\Pi \times \mathcal{M}_\Pi \longrightarrow \mathrm{Ind}\,\mathrm{Cat}\,\mathrm{hot}.$$

[page 5]

Voici l'axiomatisation définitive (?). On remplace Hot par une catégorie

$\mathcal{H}$, catégorie avec produit $*$ associatif, commutatif (?) ([1]), unitaire, et toutes les compatibilités habituelles au besoin,

l'objet unité pour $*$ sera noté 1, et on notera

$$\begin{cases} \pi_0(\xi) & \overset{\text{déf}}{=} & \mathrm{Hom}_{\mathcal{H}}(1,\xi) \\ \pi_0 : \mathcal{H} & \longrightarrow & \mathrm{Ens}. \end{cases}$$

Si on a

$$P * Q \xrightarrow{u} R,$$

on en déduit

p. 4

$$\begin{cases} \pi_0(P) & \xrightarrow{c^{\mathrm{l}}_u} & \mathrm{Hom}_{\mathcal{H}}(Q,R) \\ \pi_0(Q) & \xrightarrow{c^{\mathrm{r}}_u} & \mathrm{Hom}_{\mathcal{H}}(P,R) \end{cases}$$


ainsi :

$$\begin{array}{rrcl} \text{Si } \alpha \in \pi_0(P),\ \text{i.e. } 1 \xrightarrow{\alpha} P,\ \text{alors} & \alpha * \mathrm{id}_Q : Q \longrightarrow P * Q & & \\ \text{et} & c^{\mathrm{l}}_u(\alpha) & = & u \circ (\alpha * \mathrm{id}_Q) \\ \text{et dualement} & c^{\mathrm{r}}_u(\beta) & = & u \circ (\mathrm{id}_P * \beta). \end{array}$$

Si on a trois objets P_0, P_1, P_2 dans $\mathcal{H}$, des accouplements

$$\begin{cases} P_0 * P_1 & \xrightarrow{u_1} & Q_0 \\ P_1 * P_2 & \xrightarrow{u_2} & Q_1 \\ P_0 * Q_1 & \xrightarrow{u_3} & R \\ Q_0 * P_2 & \xrightarrow{u_4} & R \end{cases}$$

[page 6]



avec une relation d'associativité, disant que

$$\begin{array}{ccc} P_0 * P_1 * P_2 & \longrightarrow & Q_0 * P_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ P_0 * Q_1 & \longrightarrow & R \end{array}$$

est commutatif, alors on en déduit deux relations de transitivité et une de commutation, pour les opérations associées aux éléments de $\pi_0(P_0)$, $\pi_0(P_1)$, $\pi_0(P_2)$, qu'on n'explicitera pas, sauf l'une :

$$\begin{array}{rrcl} \text{Soit } \beta \in P_1,\ \gamma \in P_2, & & & \\ \text{d'où par } \beta : & c_{u_1}(\beta) : & P_0 & \longrightarrow & Q_0, \\ \text{et par } \gamma : & c_{u_4}(\gamma) : & Q_0 & \longrightarrow & R, \\ \text{et par } \beta *_{u_2} \gamma \in \pi_0(Q_1) : & c_{u_3}(\beta \texttt{[}*_{u_2}\texttt{]}\gamma) : & P_0 & \longrightarrow & R, \end{array}$$

`[plutôt` $\beta \in \pi_0(P_1)$`,` $\gamma \in \pi_0(P_2)$`]`, et bien on a p. 5

$$\boxed{c(\beta *_{u_2} \gamma) \ = \ c(\gamma)c(\beta).}$$

Il faut encore définir $\beta *_{u_2} \gamma$, via l'accouplement $P_1 * P_2 \xrightarrow{u_2} Q_1$, on a en effet

$$\begin{array}{ccc} \pi_0(P_1) \times \pi_0(P_2) & \longrightarrow & \pi_0(P_1 * P_2) \\ (\beta\,,\,\gamma) & \longmapsto & \beta * \gamma, \end{array}$$

et on compose avec

$$\pi_0(u_2) : P_1 * P_2 \longrightarrow Q_1$$

`[plutôt` $\pi_0(u_2) : \pi_0(P_1 * P_2) \longrightarrow \pi_0(Q_1)$`]`.

On se donne un ensemble $\mathcal{M}_0$, et [page 7]

$$\begin{cases} \mathcal{M}_0 \times \mathcal{M}_0 & \xrightarrow{\text{Ch}} & \mathcal{H} & \text{noté} & (a,b) & \longmapsto & \text{Ch}(a,b) \text{ ou } \operatorname{Hom}\operatorname{ext}_{\mathcal{H}}(a,b) \\ \mathcal{M}_0 \times \mathcal{M}_0 \times \mathcal{M}_0 & \xrightarrow{\text{comp.}} & \text{Fl}\,\mathcal{H} & & (a,b,c) & \longmapsto & (\text{Ch}(a,b) \times \text{Ch}(b,c) \longrightarrow \text{Ch}(a,c)) \end{cases}$$

avec deux axiomes

a) Associativité pour les compositions, pour $(a,b,c,d) \in \mathcal{M}_0^4$

$$\begin{array}{ccc} \text{Ch}(a,b) \times \text{Ch}(b,c) \times \text{Ch}(c,d) & \longrightarrow & \text{Ch}(a,c) \times \text{Ch}(c,d) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Ch}(a,b) \times \text{Ch}(b,d) & \longrightarrow & \text{Ch}(a,d). \end{array}$$

b) Existence d'objets unité bilatères

$$1_a \in \pi_0(\text{Ch}(a,a)) \qquad \text{pour tout } a \in \mathcal{M}_0$$

1. On ne doit pas avoir besoin de la commutativité.

Alors les $\pi_0(\mathrm{Ch}(a,b))$ et leur composition définissent sur $\mathcal{M}_0$ comme ensemble d'objets une structure de *catégorie* $\mathcal{M}_{0\,\Pi}$, ayant les 1_a comme identités, et on trouve que

$$(a,b) \longmapsto \mathrm{Ch}(a,b)$$

peut s'interpréter à partir d'un *bifoncteur* canonique

$$\mathcal{M}_{0\,\Pi}^{o} \times \mathcal{M}_{0\,\Pi} \longrightarrow \mathcal{H},$$

dont le composé avec

$$\mathcal{H} \xrightarrow{\pi_0} \mathrm{Ens}$$

n'est autre que le bifoncteur $(a,b) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{M}_{0\,\Pi}}(a,b)$, p. 6

[page 8]

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{M}_{0\,\Pi}}(a,b) \;\simeq\; \pi_0(\mathrm{Ch}(a,b)).$$

Cette relation est la *définition* de $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{M}_{0\,\Pi}}$, mais ici la relation est entendue comme une bijection *fonctorielle* en a, b.

On trouve notamment que si

$$u : a' \longrightarrow a, \qquad v : b \longrightarrow b'$$

sont des flèches *inversibles* dans $\mathcal{M}_{0\,\Pi}$, alors

$$\mathrm{Ch}(a,b) \longrightarrow \mathrm{Ch}(a',b')$$

correspondant dans $\mathcal{H}$ est [un] *isomorphisme.*

On appliquera tout ceci surtout aux deux situations déduites d'une situation $(\mathcal{M},\Sigma)$, avec

$$\begin{array}{llllll} 1^o) & \mathcal{H} & = & \mathrm{Hot}, & \mathrm{Ch}(a,b) & = & \mathrm{Ch}^{\Sigma}_{\infty}(\mathcal{M};a,b) \\ 2^o) & \mathcal{H} & = & \mathrm{Ind}\,\mathrm{Cat}\,\mathrm{hot}, & \mathrm{Ch}(a,b) & = & \mathrm{CH}^{\Sigma}_{\infty}(\mathcal{M};a,b)\ (^2). \end{array}$$

Dans les deux cas, on a donc un foncteur sur $(\mathcal{M}\Sigma^{-1})^o \times (\mathcal{M}\Sigma^{-1})$, à valeurs soit dans Hot, soit dans $\mathrm{Ind}\,\mathrm{Cat}\,\mathrm{hot}$. (**NB** Les deux structures de catégorie sur $\mathcal{M}_0$ déduites des ces deux foncteurs sont canoniquement isomorphes.)

$$\begin{array}{ccc} & \nearrow & \mathrm{Hot} \qquad (a,b) \longmapsto \mathrm{Ch}^{\Sigma}_{\infty}(a,b) \\ (\mathcal{M}\Sigma^{-1})^o \times (\mathcal{M}\Sigma^{-1}) & & \\ & \searrow & \mathrm{Ind}\,\mathrm{Cat}\,\mathrm{hot} \qquad (a,b) \longmapsto \mathrm{CH}^{\Sigma}_{\infty}(a,b) \end{array}$$

Comme les foncteurs canoniques [page 9]

$$\begin{array}{ccccccc} \mathrm{Ind}\,\mathrm{Cat}\,\mathrm{hot} & \xrightarrow{\mathrm{Ind}\,\varphi} & \mathrm{Ind}\,\mathrm{Hot} & \xrightarrow{\mathrm{Ind}\,\psi} & \mathrm{Ind}\,\mathrm{Hot}^{\wedge}_0 & \xrightarrow{\varinjlim} & \mathrm{Hot}^{\wedge}_0, \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & \nearrow_{\mathrm{id}} & \\ \mathrm{Cat}\,\mathrm{hot} & \xrightarrow{\varphi} & \mathrm{Hot} & \xrightarrow{\psi} & \mathrm{Hot}^{\wedge}_0 & & \end{array}$$

commutant aux produits finis, toute théorie de 'Hom externes' à valeurs dans une de ces catégories, en définit une à valeurs dans chacune de celles dans laquelle elle s'envoie. p. 7

D'ailleurs, ces foncteurs ne sont pas tous pleinement fidèles (c'est en tous cas faux pour φ et $\mathrm{Ind}\,\varphi$, et j'ignore ce qui en est de ψ et $\mathrm{Ind}\,\psi$ – les flèches verticales par contre sont pleinement fidèles ([3]).) Mais ils induisent des bijections pour les π_0. Donc la catégorie $\mathcal{M}_{0\,\Pi}$ déduite d'une théorie de Hom externes à valeurs dans une de ces catégoires, et celle déduite dans une autre où elle s'envoie, est la même à isomorphisme canonique près. Pour ce qui est de cette définition de $\mathcal{M}_{0\,\Pi}$, rien n'est changé donc quand on regarde les CH_∞ comme des objets de $\mathrm{Ind}\,\mathrm{Hot}$, ou seulement de $\mathrm{Ind}\,\mathrm{Hot}_0^\wedge$, ou même seulement de $\mathrm{Hot}_0^\wedge$, ou quand on regarde les Ch_∞ comme des objets dans $\mathrm{Hot}_0^\wedge$. Mais bien sûr, la [page 10]
donnée des accouplements de composition perd chaque fois en précision (sauf peut-être en passant de Hot à $\mathrm{Hot}_0^\wedge$, si ψ est pleinement fidèle …). Quand on prend les images des $\mathrm{CH}_\infty^\Sigma(a,b)$ et $\mathrm{Ch}_\infty^\Sigma(a,b)$ dans $\mathrm{Hot}_0^\wedge$ (la dernière catégorie du diagramme), on trouve des objets canoniquement isomorphes (fonctoriellement en a, b dans $\mathcal{M}_{0\,\Pi} \simeq \mathcal{M}\Sigma^{-1}$). Quand on les regarde comme étant respectivement dans $\mathrm{Ind}\,\mathrm{Hot}$ et dans $\mathrm{Hot} \hookrightarrow \mathrm{Ind}\,\mathrm{Hot}$, on trouve un homomorphisme fonctoriel

$$\mathrm{CH}_\infty^\Sigma(a,b) \longrightarrow \mathrm{Ch}_\infty^\Sigma(a,b) \qquad \text{dans } \mathrm{Ind}\,\mathrm{Hot} \text{ ou dans } \mathrm{Ind}\,\mathrm{Hot}_0^\wedge \text{ au choix.} \qquad (*)$$

La $\varinjlim$ de $\mathrm{CH}_\infty^\Sigma(a,b)$ dans Hot n'existe pas en général (sauf si l'ind-objet est essentiellement constant), mais elle existe dans $\mathrm{Hot}_0^\wedge$, et l'isomorphisme canonique

$$\varinjlim_{\mathrm{Hot}_0^\wedge} \mathrm{CH}_\infty^\Sigma(a,b) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ch}_\infty^\Sigma(a,b) \qquad \text{dans } \mathrm{Hot}_0^\wedge \qquad (**)$$

est la flèche déduite de $(*)$ dans $\mathrm{Ind}\,\mathrm{Hot}_0^\wedge$.

Dans les deux cas CH et Ch (qu'on va désigner par le symbole commun $C_\infty(a,b)$), la [page 11]
fonctorialité de cet objet $C_\infty(a,b)$ (même au sens le plus faible, comme objet de $\mathrm{Hot}_0^\wedge$) par rapport à a et b (même au sens le plus faible, comme foncteur $\mathcal{M}^o \times \mathcal{M} \longrightarrow \mathrm{Hot}_0^\wedge$ et pas même $(\mathcal{M}\Sigma^{-1})^o \times (\mathcal{M}\Sigma^{-1}) \longrightarrow \mathrm{Hot}_0^\wedge$) n'est pas évidente du tout sur la définition directe en termes du système inductif explicite dans Cat

$$C_\infty(a,b) \;=\; (\mathrm{Ch}_{\tau_0^{2n}}(a,b))_{n\in\mathbf{N}},$$

car une flèche $a' \longrightarrow a$ ou $b \longrightarrow b'$ dans $\mathcal{M}$, et même qu'elle serait dans Σ, ne définit aucunement une flèche dans Cat

$$\begin{array}{rcl} C_\infty(a,b) & \longrightarrow & C_\infty(a',b) \\ \text{ou } C_\infty(a,b) & \longrightarrow & C_\infty(a,b'). \end{array}$$

Cette difficulté rappelle celle qu'avait à surmonter Quillen, dans Homotopical Algebra, pour affronter la différence entre 'left homotopies' et 'right homotopies'. Je me rappelle comment on peut néanmoins définir de telles flèches, comme résultant d'une flèche (beaucoup plus riche) de 'composition' de chemins entre a' et a, et a et b, ou entre a et b, et b p. 8
et b', soit en général donc l'accouplement [page 12]

$$C_\infty(a,b) \times C_\infty(b,c) \longrightarrow C_\infty(a,c),$$

dont la définition directe n'est pas moins problématique, et ne peut en tous cas *pas* se donner comme une flèche dans Cat lui-même, ou dans Ind Cat. Interprétant p. ex. $\mathrm{Ch}_\infty(a,b)$ en termes de chemins *infinis* (des deux cotés) de a à b, en un sens évident (mais 'essentiellement finis' des deux cotés), on peut définir aussi

$$\mathrm{Ch}_\infty^-(a,b), \qquad \mathrm{Ch}_\infty^+(a,b)$$

2. $*$ dans Hot et Ind Cat hot est le produit cartésien sans plus.

3. et également, $\mathrm{Ind}\,\mathrm{Hot}_0^\wedge \xrightarrow{\varinjlim} \mathrm{Hot}_0^\wedge$ n'est *pas* pleinement fidèle.

comme les sous-catégories pleines formées respectivement de chemins qui sont totalement dégénérés en degrés ≥ 0 (i.e. $a_0 \longleftarrow a_1 \longrightarrow a_2 \longleftarrow a_3 \cdots$ sont tous des identités), ce qui revient aux chemins infinis seulement à gauche, i.e. s'arrêtant à a_0, et symétriquement pour $\mathrm{Ch}^+_\infty(a,b)$. Même tabac pour les CH^+, CH^-.

Ceci dit, on a ceci (revenant à la notion C_∞ ambivalente) : [page 13]

a) les inclusions pleinement fidèles

$$C^-_\infty(a,b) \hookrightarrow C_\infty(a,b) \hookleftarrow C^+_\infty(a,b)$$

sont des isomorphismes dans $\mathrm{Ind}\,\mathrm{Cat}\,\mathrm{hot}$ resp. dans Hot, et

b) On a bel et bien une composition des chemins

$$C^-_\infty(a,b) \times C^+_\infty(b,c) \longrightarrow C_\infty(a,c).$$

L'*associativité* dans le cas du CH n'offre d'ailleurs pas de difficulté, à cause de la possibilité de se ramener aux

$$C_m(a,b) \times C_n(b,c) \times C_p(c,d) \rightrightarrows C_N(a,d)$$

pour N grand, et prouver l'egalité comme flèches dans $\mathrm{Cat}\,\mathrm{hot}$ – ce qui résultera du lemme d'homotopie sur les intervalles dans Cat. Dans le cas du Ch_∞ par contre je n'ai pas trouvé de démonstration. (Faute seulement d'avoir essayé sérieusement de m'y mettre? Je n'ai pas trop envie, vu qu'il se pourrait que $\mathrm{Hot} \longrightarrow \mathrm{Hot}^\wedge_0$ soit pleinement fidèle, auquel cas le travail devient inutile …)

p. 9

2 Comparaison avec Quillen [page 14]

Il se pose un certain nombre de questions sur ce foncteur $(\mathcal{M}\Sigma^{-1})^o \times (\mathcal{M}\Sigma^{-1}) \longrightarrow \mathrm{Hot}$, et sa relation aux constructions classiques, notamment à la théorie de Quillen. Je vais maintenant noter

$$\mathrm{Ch}^\Sigma_\infty(a,b) \;=\; \mathrm{Hom}\,\mathrm{ext}_{\mathrm{Hot}}(a,b) \quad \text{ou simplement} \quad \mathrm{Hom}\,\mathrm{ext}(a,b).$$

1°). Soient $f, g : a \rightrightarrows b$ dans $\mathcal{M}$, alors (si $\mathcal{M}$ est une 'model category') Quilllen définit un ensemble

$$\pi_1(a,b;f,g) \qquad \text{ou} \qquad \pi_1(f,g)$$

des classes d'homotopie de f à g, de telle façon que $\mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(a,b)$ devient l'ensemble des objets d'un groupoïde, dont les flèches sont les éléments de $\pi_1(f,g)$, pour une notion de composition naturelle. Je suspecte que l'on a

$$\pi_1(f,g) \;=\; \mathrm{Hom}_{\underbrace{\Pi(\underline{\mathrm{Ch}}^\Sigma_\infty(a,b))}_{\substack{\text{groupoïde}\\ \text{fodamental}\\ \text{de } \underline{\mathrm{Ch}}^\Sigma_\infty(a,b)}}}(f,g),$$

quand f et g sont considérés comme des 'chemins infinis' (en insérant chaque $f : a \longrightarrow b$ dans

$$\cdots \underbrace{a_{-2}}_{=a} \xleftarrow{\mathrm{id}} \underbrace{a_{-1}}_{=a} \xrightarrow{f} \underbrace{a_0}_{=b} \xleftarrow{\mathrm{id}} \underbrace{a_1}_{=b} \longrightarrow \cdots \;)$$

Donc la définition des $\pi_1(f,g)$ (si c'est bien ça) se prolonge de façon naturelle aux chemins infinis (essentiellement finis) arbitraires. [page 15]

2°) Supposons que $\mathcal{M}$ admette un objet à la fois initial et final $0_{\mathcal{M}}$ ($\mathcal{M}$ 'ponctuée'). Je dis qu'alors toutes les catégories $\underline{\mathrm{Ch}}^{\Sigma}_{\infty}(a,b)$ sont ponctuées de façon naturelle : à savoir, par le chemin infini de a à b défini (comme plus haut) à partir de $f = 0_{a,b} : a \longrightarrow b$, l'application nulle de a à b. On a envie alors de regarder les $\underline{\mathrm{Ch}}^{\Sigma}_{\infty}(a,b)$ comme définissant des éléments dans le $\mathrm{Hot}_\bullet$ ('Hot ponctué'). C'est plus fin que de dire qu'on se donne une classe neutre

$$e \longrightarrow \mathrm{Ch}(a,b) \qquad \text{dans Hot},$$

car le foncteur de $\mathrm{Hot}_\bullet$ dans Hot (ou dans $e\backslash\mathrm{Hot}$) n'est pas fidèle. Le problème, c'est de définir les flèches

$$\mathrm{Ch}(a,b) \times \mathrm{Ch}(b,c) \longrightarrow \mathrm{Ch}(a,c)$$

dans $\mathrm{Hot}_\bullet$, et pas seulement dans Hot, et avec associativité (et les unités) dans $\mathrm{Hot}_\bullet$ également. Si on applique la définition avec $\mathrm{Ch}^-(a,b)$ et $\mathrm{Ch}^+(b,c)$, le composé des éléments nuls $a \xrightarrow{0} b$ de $\mathrm{Ch}^-(a,b)$ et $b \xleftarrow{\mathrm{id}} b \xrightarrow{0} c$ de $\mathrm{Ch}^+(b,c)$ est l'élément de $\mathrm{Ch}_\infty(a,c)$ que voici p. 10 [page 16]

$$\begin{array}{ccccccccccccc}
 & & a_{-2} & \longleftarrow & a_{-1} & \longrightarrow & a_0 & \longleftarrow & a_1 & \longrightarrow & a_2 & & \cdots \\
 & & & & & & \| & & & & & & \\
\mathrm{id} & \cdots & a & \xleftarrow{\mathrm{id}} & a & \xrightarrow[0]{} & b & \xleftarrow{\mathrm{id}} & b & \xrightarrow[0]{} & c & \xleftarrow{\mathrm{id}} & \cdots_{\mathrm{id}}
\end{array}$$

ce n'est *pas* l'élément nul de $\mathrm{Ch}_\infty(a,c)$! Mais on a des flèches canoniques

$$e^-_{a,b} \circ e^+_{b,c} \rightleftarrows e_{a,c} \qquad \text{dans } \mathrm{Ch}_\infty(a,c)$$

qui sont l'identité sur tous les sommets sauf celui d'indice 0. Il y a un sorite à développer, comme quoi une paire

$$(f : K_\bullet \longrightarrow L_\bullet, c)$$

d'un foncteur entre catégories ponctuées, et d'un chemin $c : f(e_{K_\bullet}) \longrightarrow e_{L_\bullet}$, définit dans Hot une flèche canonique

$$\mathrm{hot}_\bullet(K_\bullet) \longrightarrow \mathrm{hot}_\bullet(L_\bullet)$$

avec transitivité si on a

$$(f' : L_\bullet \longrightarrow M_\bullet, c' : f'(e_{L_\bullet}) \longrightarrow e_{M_\bullet}),$$

d'où

$$f'' = f' \circ f : K_\bullet \longrightarrow M_\bullet, \qquad \text{et} \quad c'' : f''(e_{K_\bullet}) \longrightarrow e_{M_\bullet}), \qquad \text{[page 17]}$$

définit ainsi

$$f'(f(e_{K_\bullet})) \xrightarrow{f'(c)} f'(e_{L_\bullet}) \xrightarrow{c'} e_{M_\bullet}$$
$$\overbrace{\qquad\qquad\qquad}^{c'' \text{ par définition}}$$

? Cela nous donne donc bel et bien des accouplements dans $\mathrm{Hot}_\bullet$ (et aussi dans $\mathrm{Cat}\,\mathrm{hot}_\bullet$?). Il est difficile de croire qu'ils pourraient ne pas être associatifs! D'ailleurs $\mathrm{Hot}_\bullet$, avec le produit cartésien ordinaire ([4]), satisfait à l'axiomatique de tantôt pour $\mathcal{H}$, et $\mathrm{Hot}_\bullet \longrightarrow \mathrm{Hot}$ est compatible avec ce produit ([5]), et avec π_0.

Si tout ceci marche, on aurait donc une théorie des $\mathrm{Hom}\,\mathrm{ext}_\bullet$ à valeurs dans $\mathrm{Hot}_\bullet$; et sans doute aussi pour les CH_∞ comme objets de $\mathrm{Ind}\,\mathrm{Hot}_\bullet$, et non seulement de $\mathrm{Ind}\,\mathrm{Hot}$. Mais de toutes façons on ne peut en général laisser tomber Cat hot, qui reste importante p. 11

4. Non, il faut prendre le produit $\xi_\bullet \divideontimes \eta_\bullet$ ($\xi_\bullet \times \eta_\bullet$, avec $\xi_\bullet \vee \eta_\bullet$ contracté en e).
5. Non, mais on s'en tire quand même …

– donc il faudrait avoir des objets $\mathrm{CH}_\infty(a,b)$ dans $\mathrm{Ind}\,\mathrm{Cat}\,\mathrm{hot}_\bullet$, pour avoir une côte bien taillée.

Les $\pi_0(C(a,b))$ seront à présent des ensembles ponctués, et ce sera par l'image de l'application nulle $a \xrightarrow{0} b$, i.e. le composé

$$a \longrightarrow 0 \longrightarrow b$$

[page 18]

qu'il faut composer avec l'elément déduit du chemin tronqué

$$a \longrightarrow \underbrace{0}_{=a_0} \longleftarrow b \qquad \dots$$

Il faudrait montrer que 0 est aussi un objet neutre de $\mathcal{M}\Sigma^{-1}$, i.e. que

$$\pi_0(a,0) = \pi_0(0,a) = \{0\} \qquad \text{pour tout } a \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$$

et interpréter l'élément nul dans $\pi_0(a,b)$ comme l'application nulle dans $\mathcal{M}\Sigma^{-1}$. De façon générale, il faut des conditions qui assurent (sans que $\mathcal{M}$ soit forcément ponctuée) que

$$\mathcal{M} \xrightarrow{\gamma} \mathcal{M}\Sigma^{-1}$$

commute aux sommes finies, aux produits finis (donc $\gamma(\varphi_{\mathcal{M}}) = \varphi_{\mathcal{M}\Sigma^{-1}}$, resp. $\gamma(e_{\mathcal{M}}) = e_{\mathcal{M}\Sigma^{-1}}$) ([6]).

Supposons enfin que $\mathcal{M}$ soit *additive,* et même k-linéaire (k un anneau fixé), i.e. on a de plus un homomorphisme d'anneaux

$$k \longrightarrow \mathrm{End}(\mathrm{id}_{\mathcal{M}}).$$

On doit supposer quelque compatibilité de Σ à la structure additive, p. ex. que la somme directe de deux flèches dans Σ est dans Σ, et sans doute quelque chose de plus fort, du genre 'lemme des cinq' pour Σ. (Mais on ne suppose pas forcément $\mathcal{M}$ abélienne, donc on aurait dû mal à formuler un lemme des cinq?)

Mais peut-être ici faut-il un axiome plus subtil, p.ex. (si $\underbrace{\Sigma}_{\text{suspension}}$ et Ω existent ([7])) que l'ensemble des morphismes d'adjonction $\Sigma\Omega \longrightarrow \mathrm{id}$, $\mathrm{id} \longrightarrow \Omega\Sigma$ soit [formé d']isomorphismes, ce qui implique que Ω resp. Σ est pleinement fidèle. En tous cas, l'attente naturelle ici, c'est que $\mathrm{Ch}^{\Sigma}_{\infty}(a,b)$ soit non seulement dans $\mathrm{Hot}_\bullet$, mais même dans la catégorie $D^{\leq 0}(k\text{-Mod})$, sous-catégorie pleine de la catégorie dérivée $D^{-}(k\text{-Mod})$ formée des K tels que $H^i(K) = 0$ si $i > 0$. On peut aussi la noter $D_{\geq 0}(k\text{-Mod})$, l'interprétant en termes de complexes de 'chaînes' plutôt que de cochaînes. Ici les accouplements doivent correspondre à l'opération $* = \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_k$ dans $D_{\geq 0}(k\text{-Mod})$, admettant k comme objet unité, et

[page 19]

p. 12

$$\pi_0(K_\bullet) \simeq H_0(K_\bullet).$$

Donc on doit avoir

$$\mathrm{Hom\,ext}(a,b) \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_k \mathrm{Hom\,ext}(b,c) \longrightarrow \mathrm{Hom\,ext}(a,c),$$

où cette fois Hom ext désigne l'objet de $D_{\geq 0}(k\text{-Mod})$, au lieu d'un objet de Hot seulement, ou de $\mathrm{Hot}_\bullet$. On utilise les foncteurs

$$D_{\geq 0}(k\text{-Mod}) \longrightarrow \mathrm{Hot}_\bullet \longrightarrow \mathrm{Hot}$$

[page 20]

pour faire le lien avec la théorie ponctuée dans $\mathrm{Hot}_\bullet$, ou `[la]` théorie générale dans Hot. Si on désigne par

$$\gamma : \ D_{\geq 0}(k\text{-Mod}) \ \longrightarrow \ \mathrm{Hot}_\bullet$$

le premier de ces foncteurs, il ne commute pas aux produits $*$ ($\overset{\mathbf{L}}{\otimes}_k$ et $\times$ respectivement), mais on a, pour $P_\bullet$, $Q_\bullet$ variable dans $D_{\geq 0}(k\text{-Mod})$, une flèche fonctorielle canonique

$$\gamma(P_\bullet \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_k Q_\bullet) \xleftarrow{can.} \gamma(P_\bullet) \times \gamma(Q_\bullet)$$

'k-bilinéaire', ce qui montre que de donner des accouplements

$$P_\bullet * Q_\bullet \xrightarrow{c_k} R_\bullet,$$

d'où

$$\gamma(P_\bullet * Q_\bullet) \xrightarrow{\gamma(c_k)} \gamma(R_\bullet), \qquad (*)$$

est l'un et l'autre plus fin que de se donner seulement

$$\gamma(P_\bullet) * \gamma(Q_\bullet) \xrightarrow{c_\bullet} \gamma(R_\bullet), \qquad (*')$$

vu qu'une donnée $(*)$ impliquera une donne $(*')$ par

$$\begin{array}{ccccc} & & \gamma(P_\bullet * Q_\bullet) & & \\ & \overset{\text{can.}}{\nearrow} & & \overset{\gamma(c)}{\searrow} & \\ \gamma(P_\bullet) * \gamma(Q_\bullet) & & \xrightarrow{\qquad c_\bullet \qquad} & & \gamma(R_\bullet). \end{array}$$

Ceci vu, on s'attend bien à avoir une théorie *forte* des accouplements p. 13

[page 21]

$$\mathrm{Hom}\,\mathrm{ext}_k(a,b) \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_k \mathrm{Hom}\,\mathrm{ext}_k(b,c) \ \longrightarrow \ \mathrm{Hom}\,\mathrm{ext}_k(a,c),$$

d'où on déduira les accouplements plus faibles dans $\mathrm{Hot}_\bullet$ (au lieu de $D_{\geq 0}(k\text{-Mod})$)

$$\mathrm{Hom}\,\mathrm{ext}_{\mathrm{Hot}_\bullet}(a,b) \times \mathrm{Hom}\,\mathrm{ext}_{\mathrm{Hot}_\bullet}(b,c) \ \longrightarrow \ \mathrm{Hom}\,\mathrm{ext}_{\mathrm{Hot}_\bullet}(a,c).$$

3°) Revenant au cas $\mathcal{M}$ ponctuée sans plus, Quillen définit, pour a, b dans $\mathcal{M}$,

$$\pi_1(a,b) \ = \ \pi_1(a,b\,;0_a,0_b)$$

comme bifoncteur sur $(\mathcal{M}\Sigma^{-1})^o \times (\mathcal{M}\Sigma^{-1})$ (avec les notations de 1°)). Si ce que j'avance sans preuve dans 1°) est vrai, il doit s'ensuivre qu'on a un isomorphisme canonique

$$\pi_1(a,b) \ \simeq \ \pi_1(\mathrm{Ch}^\Sigma_\infty(a,b)),$$

où $\mathrm{Ch}^\Sigma_\infty(a,b)$ est vu comme objet de $\mathrm{Hot}_\bullet$, donc son π_1 est défini. On a en tous cas, sans aucune référence à des cofibrations et des fibrations, un bifoncteur à valeurs dans Groupes, composé dans

$$(\mathcal{M}\Sigma^{-1})^o \times (\mathcal{M}\Sigma^{-1}) \xrightarrow{(a,b)\longmapsto \mathrm{Ch}^\Sigma_\infty(a,b)} \mathrm{Hot}_\bullet \xrightarrow{\pi_1} (\text{Groupes}).$$

Si pour a fixé, b variable,

$$b \ \longmapsto \ \pi_1(a,b)$$

[page 22]

est représentable, on note l'objet qui le représente par $\Sigma(a)$ (*suspension* – ne pas confondre ce Σ avec $\Sigma \subseteq \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$, qu'il vaut mieux maintenant noter W, comme 'weak equivalence'). Donc

$$\mathrm{Hom}(\Sigma a, b) \;\simeq\; \pi_1(a, b),$$

et Σa dépend fonctoriellement de a, sous réserve d'existence. S'il existe toujours, on a

$$\Sigma : \; \mathcal{M}W^{-1} \;\longrightarrow\; \mathcal{M}W^{-1}.$$

On définit de même, sous réserve d'existence,

$$\Omega : \; \mathcal{M}W^{-1} \;\longrightarrow\; \mathcal{M}W^{-1}$$

par

$$\mathrm{Hom}(a, \Omega b) \;\simeq\; \pi_1(a, b),$$

et si tous les deux existent, on a la formule d'adjonction

$$\mathrm{Hom}(\Sigma a, b) \;\simeq\; \mathrm{Hom}(a, \Omega b) \qquad (\simeq \pi_1 \mathrm{Hom}\,\mathrm{ext}_{\mathrm{Hot}_\bullet}(a, b)).$$

L'existence de

$$\Omega : \mathcal{M}W^{-1} \;\longrightarrow\; \mathcal{M}W^{-1}, \quad \text{ou de}$$
$$\Sigma : \mathcal{M}W^{-1} \;\longrightarrow\; \mathcal{M}W^{-1},$$

p. 14

voire même des deux à la fois, apparaît comme une hypothèse ⓐ extrêmement forte sur $(\mathcal{M}, W)$. Cette condition *plus* celle ⓑ que les $\underline{\mathrm{Ch}}_\infty(a, b)$ soient homotopes à des catégories de Thomason-Kan, ou (ce qui revient au même, à peu de choses près ?) que $Y \longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{M}(Y)W_Y^{-1}}(a_Y, b_Y)$ transforme Hot-équivalences de Cat en bijections (ne serait-ce que pour Y fixé …), semble le test crucial pour savoir si '$(\mathcal{M}, \Sigma)$ `[plutôt` $(\mathcal{M}, W)$`]` se prête à une théorie homotopique 'dans $\mathcal{M}$' '. Je doute que

ces conditions puissent être satisfaites pour $\mathcal{M}$ finie, sauf dans le cas trivial où $\mathcal{M} = \emptyset$, où $\mathcal{M}\Sigma^{-1}$ `[plutôt` $\mathcal{M}W^{-1}$`]` est équivalente à la catégorie ponctuelle. [page 23]

Un troisième test ⓒ qui me paraît important (mais peut-être ça résulte du reste), c'est les formules dans $\mathrm{Hot}_\bullet$

$$\begin{cases} \mathrm{Hom}\,\mathrm{ext}_\bullet(\Sigma a, b) \;\simeq\; \mathrm{Hom}\,\mathrm{ext}_\bullet(a, \Omega b) \\ \qquad\qquad\qquad\;\; \simeq\; \Omega \mathrm{Hom}\,\mathrm{ext}_\bullet(a, b), \end{cases} \qquad (*)$$

où le $\mathrm{Hom}\,\mathrm{ext}_\bullet$ désigne le Hom externe à valeurs dans $\mathrm{Hot}_\bullet$. Il faut le voir séparément (sous condition d'existence soit de Ω, soit de Σ) comme deux formules 'duales' l'une de l'autre,

$$\begin{cases} \mathrm{Hom}\,\mathrm{ext}_\bullet(a, \Omega b) \;\simeq\; \Omega \mathrm{Hom}\,\mathrm{ext}_\bullet(a, b) \\ \mathrm{Hom}\,\mathrm{ext}_\bullet(\Sigma a, b) \;\simeq\; \Omega \mathrm{Hom}\,\mathrm{ext}_\bullet(a, b), \end{cases} \qquad (**)$$

isomorphismes de *groupes* dans $\mathrm{Hot}_\bullet$. (**NB** Ωb est un objet groupe de $\mathcal{M}W^{-1}$, car il représente un contrafoncteur à valeurs dans Gr, et de même Σa est un cogroupe de $\mathcal{M}W^{-1}$. Le foncteur $y \longmapsto \mathrm{Hom}\,\mathrm{ext}(a, y)$ doit commuter aux produits finis, et donc transformer objets groupes en itou. Et de même $x \longmapsto \mathrm{Hom}\,\mathrm{ext}(x, b)$ doit transformer sommes finies en produits finis, donc cogroupes en groupes ([8]).)

Je me suis convaincu que les isomorphismes $(**)$ n'ont de chance d'exister que si on a la condition préalable ⓑ.

6. à faire.

7. cf. plus bas ce que ça signifie.

8. Le foncteur Ω doit provenir d'un endomorphisme du dérivateur $\mathbf{D} = \mathbf{D}_{\mathcal{M},W}$, et celui-ci doit être exact à gauche, et dualement pour Σ.

p. 15

[page 24]

3 Essai de construction du foncteur Ω

Il n'y a sans doute guère de chance de prouver quelque chose sur le foncteur

$$\Omega : \mathcal{M}W^{-1} \longrightarrow \mathcal{M}W^{-1},$$

sans tenir en mains une *construction* plus ou moins explicite de celui-ci. Je vais essayer, en m'inspirant de Quillen, de dégager des conditions générales sur $(\mathcal{M}, W)$ (plus générales que celles de Quillen) qui assurent l'existence de Ω, et permettent de le construire. L'idée géométrique remonte à Serre-Cartan. Il s'agit, pour un objet S de $\mathcal{M}$, de construire un objet $\mathrm{Ch}(S)$ *dans* $\mathcal{M}$, jouant le rôle d'un 'espace de chemins', et qui doit s'inclure dans un diagramme de factorisation de $\mathrm{diag}_S : S \longrightarrow S \times S$ (on suppose que dans $\mathcal{M}$ les $\varprojlim$ finies, donc les produits finis, existent)

$$\begin{array}{ccc} & & S \\ & \overset{\mathrm{diag}_S}{\nearrow} & \downarrow i_S \\ & & \mathrm{Ch}(S) \\ & \underset{\mathrm{diag}_S}{\searrow} & \downarrow p_S \\ S \times S & \longleftarrow & e. \end{array}$$

La propriété essentielle, c'est que p soit une *'fibration'* (dans un sens convenable, à dégager).

À titre accessoire il peut être utile (peut-être) que i soit une 'cofibration' ([9]). On définit $\Omega(S)$ comme la fibre de $\mathrm{Ch}(S)$ sur $S \times S$ (par rapport à l'unique morphisme $e = e_{\mathcal{M}} \longrightarrow S \times S$, où $e_{\mathcal{M}}$ est l'objet nul de $\mathcal{M}$). [page 25]

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Ch}(S) & \longleftarrow & \Omega S \\ \downarrow & & \downarrow \\ S \times S & \longleftarrow & e. \end{array}$$

C'est un objet de $\mathcal{M}$, qu'on regardera surtout comme un objet de $\mathcal{M}W^{-1}$. Il faut s'assurer qu'on a une bijection fonctorielle en T dans $\mathcal{M}W^{-1}$ p. 16

$$\underbrace{\pi_1 \underline{\mathrm{Ch}}^W_\infty(T,S)}_{\overset{\text{déf}}{=} \pi_1(T,S)} \simeq \underbrace{\mathrm{Hom}_{\mathcal{M}W^{-1}}(T, \Omega S)}_{\overset{\text{déf}}{=} \pi_0 \underline{\mathrm{Ch}}^W_\infty(T, \Omega S)}.$$

Pour cela, il s'impose de comparer

$$\underline{\mathrm{Ch}}^W_\infty(T, \Omega S) \qquad \text{et} \qquad \underbrace{\Omega_{\mathrm{Hot}_\bullet}(\underline{\mathrm{Ch}}^W_\infty(T,S))}_{\substack{\text{'par définition'} \\ \text{pour } \Omega \text{ de } \mathrm{Hot}_\bullet \\ = \\ \underline{\mathrm{Ch}}_\infty(\mathrm{Ch}^W_\infty(T,S);0,0)}} ,$$

puisqu'il s'agit de construire une bijection entre leurs π_0.

9. et peut-être que $S \longrightarrow e$ soit également une fibration ?

LES DÉRIVATEURS

ALEXANDRE GROTHENDIECK

Chapitre X

Comparaison de Cat avec $\mathbf{\Delta}^\wedge$

p.

p.

Note des éditeurs de l'édition transcrite.

Ce texte a été déchiffré et transcrit en LaTeX 2_ε par M. Künzer. Il a été édité par M. Künzer, J. Malgoire, et G. Maltsiniotis. La transcription est aussi fidèle que possible au manuscrit. Pour les quelques corrections évidentes, ou rares commentaires des éditeurs, ainsi que pour la numérotation originale des pages du manuscrit, les caractères de machine à écrire `[typewriter]` entre crochets sont utilisés. Un point d'interrogation entre crochets signifie que l'on n'est pas sûr du mot qui précède.

Cette édition est provisoire. Les remarques, commentaires et corrections sont bienvenus. Envoyer un message à :

[**e-mail address removed**]

G. Maltsiniotis

p. 1

`[page 1]`

1 Rappel des notions de D-asphéricité, et lien avec le 'localisateur fondamental $W_{\mathbf{D}}$'

Pour un dérivateur **D**, il s'agit des notions suivantes (cf. I) :

(i) *Objet* **D**-*asphérique* de Cat (i.e. $Z \longrightarrow e$ est une **D**-équivalence). NB Je préfère dire '**D**-asphérique' au lieu de '**D**-contractile', qui prête parfois à confusion.

(ii) **D**-équivalence pour une flèche $f : X \longrightarrow Y$ dans Cat.

(iii) *Foncteur* $f : X \longrightarrow Y$ **D**-*asphérique* (i.e. les X/y sont **D**-asphériques) et **D**-*coasphérique* (les $y\backslash X$ sont **D**-asphériques). C'est ce que j'avais appelé '**D**-équivalence stricte' (ou 'costricte'), ou foncteur homologiquement **D**-cofinal (ou cohomologiquement **D**-cofinal), mais la terminologie 'asphérique' me semble la plus simple et la meilleure. (Pêchée dans PS, Pursuing Stacks.)

(iv) *Foncteur* $f : X \longrightarrow Y$ **D**-*lisse,* **D**-*propre* (i.e. tel que les fibres des foncteurs induits $X/x \longrightarrow Y/f(x)$, respectivement $x\backslash X \longrightarrow f(x)\backslash Y$, soient **D**-asphériques).

(v) **D**-*fibration* $f : X \longrightarrow Y$ (notion autoduale), i.e. telle que pour $Y'' \xrightarrow{u} Y'$ au dessus de Y, si Y'', Y' `[sont]` Hot-asphériques, alors $u_X : X'' \longrightarrow X'$ dans

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & X' & \longleftarrow & X'' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longleftarrow & Y' & \longleftarrow & Y'' \end{array}$$

est une **D**-équivalence ([1]). La **D**-*fibration* est dite *triviale* (ou *asphérique*) si et seulement si ses fibres sont asphériques, ou encore si et seulement si f est asphérique, ou si et seulement si f est coaspérique. Cela signifie aussi que f est une **D**-équivalence *universelle,* i.e. que pour tout $Y' \longrightarrow Y$, $X' = X \times_Y Y' \longrightarrow Y'$ est une **D**-équivalence.

`[page 2]`

1. On dira aussi que f est **D**-*fibrant.* (**NB** Il n'y a pas de notion '**D**-cofibrant' à ma connaissance.)

(vi) On a aussi des variantes affaiblies de la notion de **D**-fibrations, savoir les '**D**-*fibrations à gauche',* ou les f '*cohomologiquement* **D**-*fibrants',* et de même les '**D**-*fibrations à droite',* i.e. les f '*homologiquement* **D**-*fibrants'* ([2]). La notion 'gauche' ou cohomologique pour $f : X \longrightarrow Y$ signifie que les foncteurs $X_y \hookrightarrow X/y$ p. 2
$(y \in \mathrm{Ob}\, Y)$ et $X/y \longrightarrow X/y'$ (pour $(u : y \longrightarrow y') \in \mathrm{Fl}\, Y$) sont des **D**-équivalences. Et dualement avec les $X_y \hookrightarrow y\backslash X$, $y'\backslash X \longrightarrow y\backslash X$ pour la notion 'droite' ou 'homologique'. Les **D**-fibrations ne sont autres que les **D**-fibrations gauches (cohomologiques) universelles ou les **D**-fibrations droites (homologiques) universelles.

Finalement, toute cette kyrielle de notions se déduit de la seule notion de **D**-équivalence (ii). Si je désigne par

$$W_{\mathbf{D}} \subseteq \mathrm{Fl}(\mathrm{Cat})$$

l'ensemble de ces **D**-équivalences, on trouve ce que dans Pursuing Stacks j'ai appelé un 'localisateur' (localiseur) dans Cat ([3]). Dans Pursuing Stacks c'était une telle partie

$$W \subseteq \mathrm{Fl}(\mathrm{Cat}),$$

et non la donnée d'un dérivateur, qui était pris comme la donnée de départ fondamental [page 3]
pour faire de l'algèbre homotopique en tous genres. J'avais d'ailleurs développé une kyrielle de notions du même genre (i) à (vi), en partant de cette donnée W. Il se pourrait que les énoncés pour les notions que j'ai développé dans I, en termes d'un dérivateur, soient valables plus généralement en termes d'un localisateur W, dans la mesure du moins où ils gardent un sens. (Donc pour l'instant je mets à part les énoncés proprement cohomologiques ou homologiques, qui font directement appel à **D**.) Encore qu'il se pourrait que moyennant des conditions à expliciter sur W, qui impliquent que (Cat, W) définissent bel et bien un dérivateur $\mathbf{D}_{\mathrm{Cat},W} = \mathbf{D}$, on arrive encore à interpréter W comme un $W_{\mathbf{D}}$, de sorte que les énoncés cohomologiques et homologiques gardent un sens.

J'ai envie d'abord de regarder dans Pursuing Stacks les axiomes que j'ai dégagé pour les localisateurs, et vérifier s'ils sont tous vérifiés pour $W_{\mathbf{D}}$. Ces conditions L 1 à L 5 sont [page 4]
énoncées dans Pursuing Stacks, §64 (page 164).

L 1 Saturation de W_D. O.K.

Cela résulte formellement du fait qu'on a un foncteur

$$\mathrm{Cat} \xrightarrow{\varphi} C \qquad (= \mathrm{Cat}^o)$$

tel que pour $u \in \mathrm{Fl}(\mathrm{Cat})$, $u \in W_{\mathbf{D}} \iff \varphi(u)$ isomorphisme. (Prendre pour $\varphi(X)$ la sous-catégorie de $\mathbf{D}(X)$ formée des **D**-coefficients *constants* sur X).

L 2 "$\mathbf{\Delta}^1$ est W-asphérique sur e", i.e. pour tout X dans Cat, $X \times \mathbf{\Delta}^1 \longrightarrow X$ est dans W.

Cela signifie aussi que $\mathbf{\Delta}^1 \longrightarrow e$ est une **D**-fibration triviale, ce qui est bien le cas.

L 3 Si $X \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{Cat}$ a un objet final, alors $X \longrightarrow e$ est dans W. p. 3

En fait, nous exigeons pour les dérivateurs que ceci soit vrai en supposant seulement X asphérique (au sens absolu), et on en conclut même que $X \longrightarrow e$ est W-asphérique, i.e. $X \times Y \xrightarrow{\mathrm{pr}_2} Y$ est dans W pour tout Y dans Cat ([4]).

L 4 Si $f : X \longrightarrow Y$ est tel que $X/y \longrightarrow Y/y$ sont dans W, alors f est dans W.

C'est OK.

[page 5]

2. Nouvelle terminologie : fibrations cohomologiques (resp. homologiques) *faibles,* cf. I, pages 111-126 pour une révision corrigée des diverses notions de '**D**-fibrations'.

3. Mais attention, je suppose ici que le domaine Diag de **D** est Cat tout entier !

4. En fait L 2 $\Longrightarrow$ L 3.

L 5 Si X, Y sont Cat-fibrées sur S, et $X \longrightarrow Y$ est un S-morphisme *cartésien,* induisant sur les fibres des $X_s \longrightarrow Y_s$ qui sont dans W, alors f est dans W.

Pour $W_{\mathbf{D}}$, c'est la proposition 6, page 71 de I.

Ces axiomes L 1 à L 5 (équivalent à L 1, L 3′ ($\mathbf{\Delta}^1 \longrightarrow e$ est dans W) et L 5) sont dans la nature d'axiomes de stabilité, assurant que W est assez grand. Il y a une autre condition qui limite W à ne pas être trop grand :

L a) Si $f \in W$, alors $\pi_0(f)$ est bijectif.

Ceci n'est pas satisfait pour tous les $W_{\mathbf{D}}$ – p. ex. si $\mathbf{D}$ est le dérivateur *nul,* alors $W_{\mathbf{D}} = \mathrm{Fl}\,\mathrm{Cat}$! Mais pour les dérivateurs utiles en pratique, cela semble toujours satisfait.

L b), c) Le foncteur

$$\mathrm{Cat} \longrightarrow \mathrm{Cat}\, W^{-1}$$

commute aux sommes finies et aux produits finis ([5]).

À examiner ce que ça signifie en termes concrets sur W – je n'ai pas vérifié que c'est O.K. pour les $W_{\mathbf{D}}$.

L d) Si $f : X \longrightarrow Y$ dans W, alors $f^o : X^o \longrightarrow Y^o$ aussi.

C'est le corollaire 2, page 75 de I.

5. Ça marche si (Cat, W) provient d'un triple de Quillen (avec des Q-fibrations, Q-cofibrations, Q-équivalences faibles).

p. –

LES DÉRIVATEURS

ALEXANDRE GROTHENDIECK

Chapitre XI

Hot-fibrations, foncteurs propres et foncteurs lisses etc. (dans Cat)

p. –

Note des éditeurs de l'édition transcrite.

Ce texte a été déchiffré et transcrit en LaTeX 2_ε par M. Künzer. Il a été édité par M. Künzer, J. Malgoire, et G. Maltsiniotis. La transcription est aussi fidèle que possible au manuscrit. Pour les quelques corrections évidentes, ou rares commentaires des éditeurs, ainsi que pour la numérotation originale des pages du manuscrit, les caractères de machine à écrire `[typewriter]` entre crochets sont utilisés. Un point d'interrogation entre crochets signifie que l'on n'est pas sûr du mot qui précède.
Cette édition est provisoire. Les remarques, commentaires et corrections sont bienvenus. Envoyer un message à :
[**e-mail address removed**]

G. Maltsiniotis

`[Il n'y a pas de pages 1-126]`

p. 1

`[page 127]`

1 Hot-fibrations dans Cat

Théorème 1. *Soit* $f : X \longrightarrow Y$ *dans* Cat. *Conditions équivalentes :*

a) Pour tout $Y'' \xrightarrow{p} Y'$ *sur* Y*, d'où* $X'' = X \times_Y Y'' \xrightarrow{q} X' = X \times_Y Y'$*, si* p *est une* Hot*-équivalence,* q *l'est aussi.*

a′) Comme a), avec $Y'' = e$*,* Y' *ayant un objet final.*

a″) Comme a), avec $Y'' = e$*,* Y' *ayant un objet initial* ([1])*.*

b′) Pour tout $y \in \mathrm{Ob}\, Y$*,* $X_y \longrightarrow X/y$ *est une* Hot*-équivalence, pour tout* $y \longrightarrow y'$ *dans* Y*,* $X/y \longrightarrow X/y'$ *est une* Hot*-équivalence ; enfin ces conditions sont encore vérifiées pour* $f' : X' \longrightarrow Y'$*, pour tout changement de base* $Y' \longrightarrow Y$ *dans* Cat*. (En fait, il suffit de le demander pour la première des deux conditions, concernant* $X_y \longrightarrow X/y$*.)*

b″) Dual de b′), avec $X_y \longrightarrow y\backslash X$ *et* $y'\backslash X \longrightarrow y\backslash X$*.*

c) Pour tout faisceau d'ensembles localement constant F *sur* X*,* $f_*(F)$ *est localement constant et se calcule 'fibre par fibre', de même pour* $R^1 f_*(F)$ *si* F *est un faisceau en groupes, et pour les* $R^i f_*(F)$ *si* F *est un faisceau abélien. De plus, on veut que ces conditions restent satisfaites après tout changement de base.* ([2])

Démonstration. On a les implications ± tautologiques

$$\mathrm{a} \implies \mathrm{a}' \implies \mathrm{b}' \implies \mathrm{c},$$

et il reste à prouver que c $\implies$ a. Comme a est autoduale, étant équivalente à a′, b′, elle est aussi équivalente aux conditions duales de celles-ci, a″ et b″ (cf. cor. 2, page 75). On est ramené à prouver que si c) est satisfait, et si on a

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{\ q\ } & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ Y & \xleftarrow[\ p\ ]{} & Y' \end{array}$$

cartésien dans Cat, si p est une Hot-équivalence, q aussi. On utilise le critère d'Artin-Mazur. p. 2

1°) Si F est un faisceau d'ensembles localement constant sur X, il faut prouver que $H^0(X, F) \xrightarrow{\sim} H^0(X', q^*F)$.

Mais [page 128]

$$H^0(X, F) \simeq H^0(Y, \underbrace{f_*(F)}_{\substack{\text{localement constant} \\ \text{par hypothèse c)}}}) \xrightarrow[\substack{\text{car } p \\ \text{Hot-équivalence}}]{\sim} H^0(Y', p^* f_*(F)),$$

mais

$$p^* f_*(F) \xrightarrow{\sim} f'_*(q^*(F)),$$

car $f_*(F)$ et $f'_*(q^*F)$ se calculent 'fibre par fibre' par hypothèse. Donc

$$H^0(X, F) \simeq H^0(Y', f'_*(q^*(F))) \simeq H^0(X', q^*(F)),$$

q.e.d.

2°) Si F est un faiscau en groupes localement constant sur X, il faut prouver

$$H^1(X, F) \xrightarrow{\sim} H^1(X', q^*F).$$

1. garder a″) et b″), conditions duales de a′), b′) [a″) et b″) étaient barrés].

2. *c′) (version homologique). 1°) en termes d'images directes de groupoïdes localement constants, et 2°) en termes des* $R^i f_!(L)$ [plutôt $L_i f_!(L)$]*, pour* L *faisceau abélien localement constant.*

Le fait que c'est injectif résulte déjà de 1°), qui implique que le foncteur

$$\begin{array}{ccc} F\text{-torseurs sur } X & \longrightarrow & q^*(F)\text{-torseurs sur } X' \\ P & \longmapsto & f^*P \end{array}$$

est pleinement fidèle, par l'argument bien connu utilisant les faisceaux $\mathcal{H}om$. Il faut voir que ce foncteur est essentiellement surjectif.
On a un homomorphisme de suites exactes d'ensembles ponctués [page 129]

$$\begin{array}{ccccccccc} H^1(Y,f_*F) & \xrightarrow{u} & H^1(X,F) & \xrightarrow{v} & \overbrace{H^0(Y,R^1f_*(F))}^{\ni\eta} & \xrightarrow{w} & H^2(Y,f_*F) \\ \downarrow{\scriptstyle\alpha} & & \downarrow{\scriptstyle\beta} & & \downarrow{\scriptstyle\gamma} & & \downarrow{\scriptstyle\delta} \\ H^1(Y',f'_*F) & \xrightarrow{u'} & \underbrace{H^1(X',F')}_{\ni\xi'} & \xrightarrow{v'} & \underbrace{H^0(Y',R^1f'_*(F'))}_{\ni\eta'} & \xrightarrow{w'} & H^2(Y',f'_*F') \end{array}$$

([3]), où les faisceaux f_*F, $R^1f_*(F)$ sont localement constants par hypothèse et se calculent fibre par fibre, les faisceaux $f'_*(F')$ et $R^1f'_*(F')$ aussi, qui implique que ces derniers sont canoniquement isomorphes (par les flèches de changement de base) aux images inverses de leurs homologues $f_*(F)$, $R^1f_*(F)$. Comme p est une Hot-équivalence, cela implique que les flèches α, γ sont [des] isomorphismes. Donc si $\xi' \in H^1(X',F')$, son image η' dans $H^0(Y',R^1f'_*(F'))$ provient d'un $\eta \in H^0(Y,R^1f_*(F))$ bien déterminé. Il faut voir que cet η provient d'un $\xi \in H^1(X,F)$. Ceci (si je me rappelle bien) est possible si et seulement si une certaine obstruction $w(\eta)$ dans $H^2(Y,f_*(F))$ est dans le sous-ensemble neutre du H^2. **NB** Le champ sur $Y^\wedge$ des F-torseurs sur les $X^\wedge/U$ qui remontent η est une $\mathcal{F}=f_*F$-gerbe $\mathcal{G}_\eta$, et il faut voir qu'elle est neutre. Mais il y a mieux à faire : p. 3
On note que cette gerbe $\mathcal{G}$ est localement constante (puisqu'elle correspond à un lien $f_*(G)$ localement constant) et que $\mathcal{G}'$ est son image inverse. Mais comme p est une Hot-équivalence, il s'ensuit que le foncteur [page 130]

$$\underline{\Gamma}(Y,\mathcal{G}) \longrightarrow \underline{\Gamma}(Y',\mathcal{G}')$$

est une équivalence de catégories, donc ξ' provient (à isomorphisme près) d'un unique ξ de $\underline{\Gamma}(Y,\mathcal{G})$, q.e.d.
3°) Soit F faisceau abélien localement constant sur X, il faut voir [que]

$$H^i(X,F) \xrightarrow{\sim} H^i(X',F') \qquad (F'=q^*F), \tag{$*$}$$

pour tout $i \in \mathbf{N}$. Mais les deux termes sont l'aboutissement des suites spectrales de Leray, de termes initiaux

$$E_2^{pq} \simeq H^p(Y,R^qf_*(F))$$
$$E_2'^{pq} \simeq H^p(Y',R^qf'_*(F')),$$

et $(*)$ est associé à un homomorphisme de suites spectrales, qui pour les termes initiaux est

$$H^p(Y,R^qf_*(F)) \xrightarrow{\sim} H^p(Y',R^qf'_*(F)), \tag{$**$}$$

associé à

$$p^*(R^qf_*(F)) \longrightarrow R^qf'_*(F'). \tag{$***$}$$

Mais par hypothèse les $R^qf_*(F)$, $R^qf'_*(F')$ sont localement constants et se calculent fibre par fibre,

3. où on a posé $F'=q^*(F)$. [page 131]

d'où il résulte que les homomorphismes de changement de base (∗∗∗) sont [des] isomorphismes, et comme il s'agit de faisceaux localement constants et que p est une Hot-équivalence, il s'ensuit que (∗∗) est [un] isomorphisme, donc aussi (∗) sur les aboutissements, q.e.d.

Définition 1. Sous les conditions équivalentes du théorème 1, on dit que f est une Hot-*fibration.*

Proposition 1. *Cette notion est stable par changement de base (trivial), par composition (formel sur a)). Pour que f soit une* Hot-*fibration, il faut et il suffit que f* [plutôt f^o] *le soit.* p. 4

Proposition 2. *Soit $f : X \longrightarrow S$ une* Hot-*fibration. Alors $s \longmapsto \mathrm{hot}(X_s)$ est un système local sur S, à valeurs dans* Hot. *Donc les X_s pour s dans une même composante connexe de S sont* Hot-*isomorphes entre eux (mais pas canoniquement, si cette composante n'est pas* 1-*connexe).*

Théorème 2. *Soit* $\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f} & X \\ & {\scriptstyle p'}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle p} & \\ & S & \end{array}$ *un diagramme commutatif dans* Cat, *avec p, p' des* Hot-*fibrations, et soit $S_0 \subseteq S$ une partie de S telle que $S_0 \longrightarrow \pi_0(S)$ soit surjectif. Pour que f soit une* Hot-*équivalence, il faut et il suffit que les $f_s : X_s \longrightarrow Y_s$ ($s \in S_0$) le soient.*

a) La suffisance se prouve comme tantôt, avec le critère de Artin-Mazur.

Notons que l'hypothèse sur S_0 assure que si F, F' sont deux faisceaux d'ensembles localement constants sur S, et $u : F \longrightarrow F'$ un homomorphisme tel que $u_s : F_s \xrightarrow{\sim} F'_s$ pour $s \in S$, alors u est [un] isomorphisme. [page 132]

1°) Soit F un faisceau d'ensembles localement constant sur X, F' son image inverse sur X', il faut prouver

$$H^0(X, F) \xrightarrow{\sim} H^0(X', F').$$

Or

$$H^0(X, F) \simeq H^0(Y, \underbrace{f_*(F)}_{\substack{\text{localement} \\ \text{constant sur } S}}) \longrightarrow H^0(Y, f'_*(F')) \simeq H^0(X', F'),$$

il faut prouver que

$$p_*(F) \xrightarrow{\sim} p'_*(F') \qquad (*)$$

est [un] isomorphisme. Or par hypothèse sur p, p', les deux faisceaux sont localement constants et se calculent fibre par fibre, d'où résulte que (∗) est un isomorphisme pour les fibres en $s \in S_0$, donc un isomorphisme partout. OK.

2°) Il en résulte déjà, si F est un faisceau en *groupes,* que le foncteur

$$(F\text{-torseurs sur } X) \longrightarrow (F\text{-torseurs sur } X')$$

est pleinement fidèle, donc $H^1(X, F) \longrightarrow H^1(X', F')$ [est] injectif ; il reste à prouver que ce foncteur est essentiellement surjectif. À cause de la pleine fidélité, c'est *local sur S* (**NB** On voit directement que l'hypothèse fait sur les $s \in S_0$ implique la même hypothèse pour tout $s \in S$, en utilisant le fait que p, p' sont des fibrations) ([4]). Donc on est ramené au cas où $S = S/s_0$ a un objet final s_0.

On a alors

$$H^1(X, F) \simeq H^0(S, R^1p_*(F))$$
$$H^1(X', F') \simeq H^0(S, R^1p'_*(F')),$$

p. 5 [page 133]

et on voit encore que

$$R^1p_*(F) \longrightarrow R^1p'_*(F')$$

4. Les hypothèses faites sont bel et bien locales sur S (du moins si $S_0 = S$).

est [un] isomorphisme (car il se calcule fibre par fibre, et on utilise l'hypothèse sur les f_s), donc induit un isomorphisme

$$H^1(X,F) \longrightarrow H^1(X',F').$$

3°) Si F est même abélien, on doit prouver

$$H^i(X,F) \xrightarrow{\sim} H^i(X',F')$$


pour tout i, et cela résulte encore de la suite spectrale de Leray pour (p,F) et pour (p',F').

b) Inversement, supposons que f soit une Hot-équivalence, et prouvons que les $f_s : X'_s \longrightarrow X_s$ sont des Hot-équivalences. Je vais utiliser le

Lemme. *Soit $S \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{Cat}$, S 0-connexe. Alors il existe un $\overline{S} \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{Cat}$, $\overline{S}$ Hot-asphérique, et $\overline{S} \longrightarrow S$ une* Hot-*fibration.*

Voyons comment ceci implique le théorème 2 (partie réciproque). On peut supposer S 0-connexe, et on fait le changement de base par $\overline{S} \longrightarrow S$

comme dans le lemme : [page 134]



Alors $\overline{p'}$ et $\overline{p}$ sont des Hot-fibrations, et comme φ est une Hot-fibration, le changement de base par φ transforme la Hot-équivalence f en une Hot-équivalence $\overline{f}$. Considérons alors $\overline{s} \in \mathrm{Ob}\,\overline{S}$, et le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \overline{X'} & \xrightarrow{\overline{f}} & \overline{X} \\ {\scriptstyle i'}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle i} \\ \overline{X'}_{\overline{s}} & \xrightarrow{\overline{f}_{\overline{s}}} & \overline{X}_{\overline{s}} \end{array} \quad .$$

Comme $\{\overline{s}\} \longrightarrow \overline{S}$ est une Hot-équivalence, la flèche i qui s'en déduit par le changement de base $\overline{p} : \overline{X} \longrightarrow \overline{S}$ l'est aussi, puisque $\overline{p}$ est une Hot-fibration, et de même pour i'. Ainsi dans le carré commutatif précédent, $\overline{f}$, i et i' sont des Hot-équivalences, donc aussi $\overline{f}_{\overline{s}}$. Mais si $s = \varphi(\overline{s})$, $\overline{f}_{\overline{s}}$ s'identifie à $f_s : X'_s \longrightarrow X_s$. D'ailleurs, il est immédiat que φ, étant une Hot-fibration p. 6

à source non-vide, et à but connexe, est surjective. (**NB** toutes les fibres d'une même composante connexe de S sont Hot-équivalentes, donc si l'une est non-vide, toutes le sont.) Cela achève la démonstration, modulo le lemme. [page 135]

Il reste à prouver celui-ci. Comme $S = \emptyset$ [plutôt $S \neq \emptyset$], je peux choisir une 'origine'

$$s_0 \in S,$$

et regarder la catégorie

$$\underline{\mathrm{Ch}}_\infty(S; s_0, -)$$

des chemins infinis dans S, d'origine s_0, fibre de $\underline{\mathrm{Ch}}_\infty(S)$ par le foncteur-source

$$\sigma : \underline{\mathrm{Ch}}_\infty(S) \longrightarrow S.$$

On sait que les fibres de σ sont Hot-asphériques (VII), et la catégorie construite ici n'est autre que (avec les notations de VII, p. 152) que la catégorie $\overline{S'}$ qui entre dans la factorisation canonique de

$$f : \{s_0\} = S' \longrightarrow S$$

en

$$\{s_0\} = S' \underbrace{\longrightarrow}_{\text{Hot-équivalence}} \overline{S'} \xrightarrow{\overline{f}} S,$$

où ici $\overline{f}$ s'interprète simplement comme le foncteur but (i.e. le foncteur induit sur $\underline{\mathrm{Ch}}_\infty(S; s_0, -)$ par le foncteur but [page 136]

$$\beta : \underline{\mathrm{Ch}}_\infty(S) \longrightarrow S \ ).$$

On a prouvé dans loc. cit. que $\overline{f}$ est une Hot-fibration ('propre' et 'lisse'), mais dans un contexte qui semblait faire appel tacitement à la théorie du dérivateur HOT. Donc pour mettre les résultats 'topologiques' de loc. cit. sur une base solide, il faut développer les notions pertinentes de foncteur propre, foncteur lisse, sans référence à une théorie HOT. C'est ce que j'avais d'ailleurs fait déjà en 1983, du temps de Pursuing Stacks, mais sans rédaction en forme à ce sujet. Il me faut donc à présent revenir sur ces notions, de façon un peu systématique. D'ailleurs, j'aurais dû mal à construire un seul foncteur Hot-fibrant (sauf les exemples triviaux, tels les isomorphismes, ou les produits $Y \times Z \xrightarrow{\mathrm{pr}_1} Y$), si je ne disposais d'une théorie des foncteurs lisses et des foncteurs propres ([5]).

5. J'exagère un peu quand même – après tout il doit être assez évident que les foncteurs de Thomason-Kan sont des Hot-fibrations (mais il y en a encore un peu trop peu !).

p. –

LES DÉRIVATEURS

ALEXANDRE GROTHENDIECK

Chapitre XII

Caractérisation de W_∞. Foncteurs W-propres, W-lisses etc. Sommes amalgamées et carrés W-cocartésiens dans Cat**.**

p. –

Note des éditeurs de l'édition transcrite.

Ce texte a été déchiffré et transcrit en LaTeX 2$_\varepsilon$ par M. Künzer. Il a été édité par M. Künzer, J. Malgoire, et G. Maltsiniotis. La transcription est aussi fidèle que possible au manuscrit. Pour les quelques corrections évidentes, ou rares commentaires des éditeurs, ainsi que pour la numérotation originale des pages du manuscrit, les caractères de machine à écrire `[typewriter]` entre crochets sont utilisés. Un point d'interrogation entre crochets signifie que l'on n'est pas sûr du mot qui précède.

Cette édition est provisoire. Les remarques, commentaires et corrections sont bienvenus. Envoyer un message à :

[e-mail address removed]

G. Maltsiniotis

19.11.90

p. 1

`[page 1]`

I Caractérisation de W_∞.

Je voudrais caractériser W_∞ en tant que partie de Fl(Cat), par ses propriétés comme localiseur, et sans faire appel à la connaissance de notions utilisant déjà W_∞, comme la propreté etc. Je voudrais tout au moins des propriétés sur un localiseur W, familières pour W_∞, qui soient si fortes qu'elles impliquent $W \subseteq W_\infty$. Bien sûr, dans les démonstrations je me permets d'utiliser tout ce que je sais sur W_∞.

Bien sûr, il faudra au moins une forme de saturation, peut-être très faible, je présume le suivant suffira ([1]).

W(1) (Axiome de saturation.) a) Les identités sont dans W, b) si f, g `[sont]` composables et deux parmi f, g, gf sont dans W, le troisième aussi, c) si $fg \in W$, $gf \in W$, alors $f, g \in W$.

Une propriété particulièrement cruciale, qui déjà distingue W_∞ de l'ensemble des homotopismes (notion trop stricte à beaucoup d'égards), est l'axiome que j'ai appelé L4 bis :

W(2) (Axiome de localisation.) Soit $f : X \longrightarrow Y$ une flèche dans Cat$/S$, telle que $\forall\ s \in \mathrm{Ob}\, S$, $f_s : X/s \longrightarrow Y/s$ soit dans W (on dira que f est dans W 'localement sur S'). Alors $f \in W$.

`[Les axiomes W(1) etc. sont appelés aussi ① etc. dans l'original.]`

Dans le cas $Y = S$, cela donne

Corollaire : *Si $f : X \longrightarrow Y$ est W-asphérique, i.e. $y\backslash X \longrightarrow y\backslash Y$* `[plutôt` *$X/y \longrightarrow Y/y$]* *dans W pour tout $y \in \mathrm{Ob}\, Y$, alors $f \in W$* ([2]).

Proposition 1. *Si W satisfait* W(1) *et* W(2)*, les propriétés suivantes sur W sont équivalentes :*

1. (non, j'ai dû le renforcer en 2 [?]).
2. On peut considérer la validité du corollaire comme une variante affaiblie W(2 bis) de W(2) ci-dessus. Dans la proposition 1, on n'utilise que W(2 bis), forme faible de W(2).

a) Pour tout X dans Cat*, $X \times \mathbf{\Delta}^1 \xrightarrow{\mathrm{pr}_1^X} X$ est dans W (i.e. $\mathbf{\Delta}^1 \longrightarrow e$ est 'universellement dans W ').*

b) Si X dans Cat *a un objet final, alors X est W-asphérique, i.e. $X \longrightarrow e$ est dans W.*

c) Tout homotopisme est dans W.

DÉMONSTRATION. b) $\Longrightarrow$ a) ([3]), car pour voir que $\mathrm{pr}_1 \in W$, en appliquant le corollaire ci-dessus, il faut prouver que $\forall\ x \in X$ p. 2

$$(X \times \mathbf{\Delta}^1)/x \longrightarrow X/x \qquad (*)$$

est dans W. Or

$$(X \times \mathbf{\Delta}^1)/x \simeq X/x \times \mathbf{\Delta}^1,$$

$$\begin{array}{ccccc} \mathbf{\Delta}^1 & \longleftarrow & X \times \mathbf{\Delta}^1 & \longleftarrow & X/x \times \mathbf{\Delta}^1 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ e & \longleftarrow & X & \longleftarrow & X/x \end{array}$$

`[la flèche verticale à droite est ajoutée]` et les deux catégories X/x, $X/x \times \mathbf{\Delta}^1$ sont W-asphériques car elles ont un objet final, donc $(*)$ est dans W par saturation faible W(1).

a) $\Longrightarrow$ c). Je rappelle que

$$f : X \longrightarrow Y$$

est un homotopisme s'il existe [page 2]

$$g : Y \longrightarrow X$$

telle que

$$gf \sim \mathrm{id}_X, \quad fg \sim \mathrm{id}_Y, \qquad (*)$$

où la relation $(\sim)$ désigne l'homotopie dans $\underline{\mathrm{Hom}}(X, X)$ et $\underline{\mathrm{Hom}}(Y, Y)$ respectivement (définie par chemins allant d'un élément à l'autre). Prouvons le

Lemme. *Supposons que W satisfait* W(1) *et le* a) *de la proposition, i.e. $X \times \mathbf{\Delta}^1 \longrightarrow X$ dans W pour tout X dans* Cat*. Alors si X, Y* `[sont]` *dans* Cat *et f, g dans $\underline{\mathrm{Hom}}(X, Y)$ sont homotopes, on a*

$$\mathrm{hot}_W(f) = \mathrm{hot}_W(g).$$

De plus, $f \in W$ si et seulement si $g \in W$.

Il suffit de le prouver quand il existe un homomorphisme $f \longrightarrow g$. Cela peut s'interpréter par l'existence d'une flèche

$$X \times \mathbf{\Delta}^1 \xrightarrow{F} Y$$

dont les restrictions à $X \times \{0\}$ et $X \times \{1\}$ respectivement soient f, g. Pour prouver que $\mathrm{hot}_W(f) = \mathrm{hot}_W(g)$, il suffit de prouver que

$$i_0, i_1 : X \longrightarrow X \times \mathbf{\Delta}^1 \qquad x \longmapsto (x, 0),\ x \longmapsto (x, 1)$$

sont égales dans Hot_W, puisque p. 3

$$f = F \circ i_0, \quad g = F \circ i_1.$$

3. n'utilise W(1) que sous forme faible, sans la condition de saturation c). NB Seul b) $\Longrightarrow$ c) utilise W(2 bis), les implications a) $\Longrightarrow$ c) $\Longrightarrow$ b) sont valables sous la seule hypothèse W(1).

Or cela résulte du fait que ce sont des sections de $X \times \mathbf{\Delta}^1$ sur X, et que dans Hot_W la projection $X \times \mathbf{\Delta}^1 \xrightarrow{p} X$ est [un] isomorphisme (donc $i_0 = i_1 = p^{-1}$ dans Hot_W). De plus, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{i_0} & X \times \mathbf{\Delta}^1 \\ & \searrow^{f} & \downarrow{\scriptstyle F} \\ & & Y, \end{array}$$

où $i_0 \in W$, montre que $f \in W$ si et seulement si $F \in W$, et de même $g \in W$ si et seulement si $F \in W$, donc $f \in W \iff g \in W$.

Revenons à $(*)$, on voit que dans Hot_W $g \circ f = \mathrm{id}_X$, $f \circ g = \mathrm{id}_Y$, donc f et g sont des Hot_W-isomorphismes inverses l'un de l'autre. D'autre part, $gf \in W$, $fg \in W$, puisque $\mathrm{id}_X, \mathrm{id}_Y \in W$. Donc on gagne, si on a formulé W(1) de façon assez forte. On a prouvé donc a) $\Longrightarrow$ c).

c) $\Longrightarrow$ b) est trivial, puisque si X a un objet final, $X \longrightarrow e$ est un homotopisme.

On doit bien sûr par la suite supposer que W satisfait aux conditions équivalentes de la proposition. On prendra p. ex. la forme [page 3]

W(3) (Axiome de l'élément final.) Si X a un objet final, alors X est W-asphérique.

Corollaire 1. *Pour que $f : X \longrightarrow Y$ soit W-asphérique, il faut et il suffit que les X/y soient W-asphériques* ($y \in \mathrm{Ob}\, Y$).

Car pour que $X/y \longrightarrow Y/y$ soit dans W, comme Y/y est W-asphérique (objet

$$\begin{array}{ccc} X/y & \longrightarrow & Y/y \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & e & \end{array}$$

final), il faut et il suffit que X/y le soit aussi.

Corollaire 2. *Si X dans* Cat *a un objet initial, il est W-asphérique.* (En effet, $X \longrightarrow e$ est un homotopisme, et on applique prop. 1.) ([4])

Je mettrai pour mémoire

Corollaire 3. *Tout homotopisme dans* Cat *est dans W. Si $f, g : X \rightrightarrows Y$ dans* Cat *sont homotopes, alors elles sont égales dans Hot_W, et f est dans W si et seulement si g l'est.*

Proposition 2. Soit $f : X \longrightarrow Y$ dans Cat. Si $f \in W$, $f^\circ \in W^\circ$ [plutôt $f^\circ \in W$]. p. 4

On utilise la démonstration de I, p. 75, à l'aide de la catégorie nommée $\Phi(X)$ ($\mathrm{Ob}\, \Phi(X) = \mathrm{Fl}(X)$, mais avec une notion de flèche dans $\Phi(X)$ un peu particulière). On trouve que $f \in W \iff \Phi(f) \in W$, et de même $f^\circ \in W \iff \Phi(f) \in W$.

NB. Dans la démonstration de la proposition 2, comme dans celle de la proposition 1 (pour l'implication b) $\Longrightarrow$ a)), on n'a utilisé la propriété de localisation W(2) que sous la forme faible du corollaire, i.e. sous la forme f W-asphérique $\Longrightarrow f \in W$.

Corollaire (de la prop. 2) : *Soit $W \subseteq \mathrm{Fl}(\mathrm{Cat})$ satisfaisant l'axiome* W(1) (saturation). *Alors la conjonction des axiomes* W(2), W(3) *équivaut à celle des axiomes duaux* W(2′), W(3′) ([5]).

Il suffit de prouver que 1,2,3 $\Longrightarrow$ 2′,3′.

Pour 2′ [plutôt 3′], c'est le corollaire 2 ci-dessus. Pour 3′ [plutôt 2′], cela résulte aussitôt de la proposition 2. (NB Cet énoncé resterait valable, si on aurait pris W(2) sous la forme faible seulement, cf. le NB page précédente.) [page 4]

Je dois encore mettre un axiome de la forme L5, L6 (cf. VI, p. 43-44). Mais l'énoncé de ces axiomes utilise la notion de Hot-fibrés, ou de foncteurs parfaits, i.e. fait appel à la connaissance de W_∞, ce que j'aimerais éviter (si je peux). Je dois donc introduire la notion de W-fibration, sur le modèle de ce que j'ai fait dans le contexte des dérivateurs,

4. C'est donc l'énoncé dual de l'axiome W(3) de l'objet final.

5. Itou si on remplace dans cet énoncé W(2) par W(2 bis).

dans I (cf. p. 111-126). On introduit la notion de **D**-fibration à la page 117 (prop. 5), par `[des]` conditions équivalentes, dont certaines ont un sens en termes de la donnée de W sans plus. Soit donc

$$f : X \longrightarrow Y$$

dans Cat et considérons les conditions


a) Si $Y'' \longrightarrow Y'$ dans Cat/Y est dans W, alors $X'' \longrightarrow X'$ aussi (le changement de base par $X \longrightarrow Y$ transforme W dans W).

a′) Comme a), mais avec Y'', Y' W-asphériques.

a_1) Comme a), dans le cas particulier où Y' a un objet final et Y'' est la catégorie ponctuelle.

a_2) Dual de a_1), avec objet initial de Y'.

On a donc



et dans le cas $W = W_\infty$ toutes ces conditions sont équivalentes. J'ai envie `[de]` prendre la plus forte de ces conditions, mais je dois me donner des moyens pour trouver des W-fibrations en un sens aussi fort. Par exemple j'aurais envie de savoir que si X est dans Cat, alors $\underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X) \longrightarrow X \times X$ ou $\underline{\mathrm{Ch}}(X) \longrightarrow X \times X$ est une W-fibration. Dans les deux cas, et (disons) pour W_∞, je le prouve en prouvant que p est à la fois lisse, et propre. Il faudrait donc revoir les notions de lissité et de propreté dans le contexte de la donnée d'un W. p. 5 [page 5]

Si je me rappelle bien, la propriété a′) `[plutôt a1)]` était quelque chose d'assez aisément vérifiable, il suffisait de supposer que les

$$X_y \longrightarrow X/y \qquad \text{et} \qquad X/y \longrightarrow X/y'$$

(pour $y \in \mathrm{Ob}\, Y$ resp. $u : y \longrightarrow y'$ dans $\mathrm{Fl}\, Y$) sont dans W, et que ça reste vrai par tout changement de base - ce qui revient à la condition a_1) sur f. On pourrait donc formuler une condition sur W ainsi :

W(4) (Axiome des W-fibrations ([6]).) Soit $f : X \longrightarrow Y$ dans Cat satisfaisant la condition de W-fibration a_1) ci-dessus (p. 4), alors elle satisfait même à a), i.e. le changement de base par f transforme flèches dans W en flèches dans W ([7]).

Grâce à la proposition 2, il s'ensuit que la condition duale a_2) sur f implique la condition de W-fibration forte, donc l'axiome W(4), en apparence asymétrique, signifie aussi que les quatre conditions de fibration sur f sont équivalentes, il est donc en fait symétrique.

NB Je ne vois pas, sans axiomes supplémentaires sur W, comment passer de a_1 à a′ seulement. La difficulté, c'est de montrer, moyennant a_1 seulement, que si Y est

6. Voir variante affaiblie suffisante, dans le NB p. 10. Voir encore [?] de variantes pages 13, 14 ci-dessous.

7. i.e. une W-fibration à gauche est une fibration ultraforte.

W-asphérique, l'inclusion $X_y \longrightarrow X$ (où $y \in \mathrm{Ob}\, Y$) est dans W. Dans le contexte des dérivateurs **D**, cela se voyait par voie **D**-cohomologique.

Cet axiome très fort suffit à impliquer que si X, Y sont W-fibrés sur S, et si $f : X \longrightarrow Y$ est un S-morphisme qui est dans W, alors $f_s : X_s \longrightarrow Y_s$ est dans W ($\forall\ s \in S$). Montrons déjà au moins l'inverse.

[page 6]

Proposition 3. *Soient X, Y dans* Cat/S, *$f : X \longrightarrow Y$ une S-flèche. Supposons (X, Y W-fibrés) que $\forall\ s \in S$, $f_s : X_s \longrightarrow Y_s$ soit dans W, alors $f \in W$* ([8]).

Il s'impose d'utiliser l'axiome de localisation, donc de regarder les f/s induits par f p. 6

$$\begin{array}{ccc} X/s & \xrightarrow[f/s]{} & Y/s \\ {\scriptstyle i_s^X}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle i_s^Y} \\ X_s & \xrightarrow{f_s} & Y_s \end{array} .$$

La condition a_1 suffit à impliquer que i_s^X et i_s^Y sont dans W, donc f/s est dans W si et seulement si f_s l'est. On n'a pas eu à utiliser l'axiome W(4), et il suffisait de supposer que X, Y soient fibrés 'W-cohomologiques' (ou W-fibrés à gauche) sur S, ou dualement, des W-fibrés à droite.

De plus :

Corollaire ([9]). *Soit $S_0 \subseteq \mathrm{Ob}\, S$ une partie de S telle que $S_0 \longrightarrow \pi_0(S)$ surjectif. Alors dans la proposition 3 il suffit de supposer $f_s \in W$ pour $s \in S_0$.*

Il suffit de voir que si $u : s \longrightarrow s'$ est une flèche dans S, alors $f_s \in W \iff f_{s'} \in W$. On utilise le fait que $f_s \in W \iff f/s \in W$, et de même pour $f_{s'}$. Donc à voir que $f/s \in W \iff f/s' \in W$. Or on a

$$\begin{array}{ccc} X/s & \xrightarrow{f/s} & Y/s \\ {\scriptstyle X/u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle Y/u} \\ X/s' & \xrightarrow{f/s'} & Y/s' \end{array} ,$$

où X/u et Y/u sont dans W, d'où le résultat.

Mais revenons à la réciproque : si $f \in W$, alors a-t-on $f_s \in W_S$? `[plutôt` $f_s \in W$`?]` Il y a un argument dans ce sens dans VI, p. 23, que je vais reprendre. L'idée est celle-ci. On considère la composante connexe Y_0 de Y `[plutôt` S_0 `de` S`]` contenant s, et on construit un W-fibré (au *sens fort* a))

[page 7]

$$S' \longrightarrow S_0 \subseteq S$$

avec S' *W-asphérique*. Comme $X \longrightarrow Y$ sur S est dans W, il en sera donc de même de $X' \longrightarrow Y'$ sur S'. Comme les fibres de X', Y' en s' s'identifient à celles de X, Y en l'image de s' dans S, on est ramené au cas où S est W-asphérique. Mais alors on a

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ {\scriptstyle i_s^X}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle i_s^Y} \\ X_s & \xrightarrow{f_s} & Y_s \end{array} ,$$

où i_s^X, i_s^Y sont dans W, car déduites de $\{s\} \longrightarrow S$ (qui est dans W, S étant W-asphérique) p. 7

8. *Sans* axiome W(4). C'est la première fois qu'on a besoin de W(2) sous sa forme forte, à l'exclusion de W(2 bis).

9. Sans axiome W(4).

par les changements de base W-fibrants $X \longrightarrow S$, $Y \longrightarrow S$. Donc $f \in W \implies f_s \in W$.

NB On n'a utilisé la propriété de fibration pour X, Y qu'au sens a′) ([10]).

Il faut donc prouver, si on peut, le

Lemme (?) ([11]). *Soit S un objet* 0*-connexe de* Cat*. Alors il existe un objet W-asphérique S' de* Cat*, et une W-fibration (au sens* fort *de a), page 4) $S' \longrightarrow S$.*

L'idée naturelle, c'est de prendre, pour $s_0 \in \mathrm{Ob}\, S$ fixé,

$$S' = \underline{\mathrm{Ch}}(S; s_0, -) \qquad \text{ou} \qquad S' = \underline{\mathrm{Ch}}_\infty(S; s_0, -),$$

et la flèche

$$\beta : c \longmapsto \text{but } c : S' \longrightarrow S.$$

On sait que S' est W_∞-aphérique et que β est W_∞-fibrante (et même parfaite). Il faut voir que S' est aussi W-asphérique, et β W-fibrante. Il faut donc revoir la démonstration dans le cas de W_∞, et prouver qu'elle se transforme à W, moyennant les axiomes qu'il faut sur W. J'ai envie de regarder d'abord le choix $S' = \underline{\mathrm{Ch}}(S; s_0, -)$, sans passage à une limite inductive qui m'obligerait à mettre un axiome de limites sur W. Les propriétés homotopiques délicates et essentielles de $\underline{\mathrm{Ch}}(S)$ sont établies dans VII, p. 157-169, savoir que dans le diagramme [page 8]

$$S \xrightarrow{i_S} \underline{\mathrm{Ch}}(S) \xrightarrow{p_S} S \times S,$$

$i_S \in W_\infty$ et p_S est une W_∞-fibration (en fait, *propre* et *lisse* pour W_∞) ([12]). Le fait que $i_S \in W$ `[plutôt` $i_S \in W_\infty$`]` implique que les foncteurs source et but

$$\underline{\mathrm{Ch}}(S) \underset{\beta}{\overset{\sigma}{\rightrightarrows}} S \qquad \sigma = \mathrm{pr}_1 \circ p_S,\ \beta = \mathrm{pr}_2 \circ p_S$$

sont dans W_∞ (puisque $\sigma i_S = \beta i_S = \mathrm{id}_S$). Comme ce sont des Hot-fibrations, il en résulte que les fibres $\underline{\mathrm{Ch}}(S; s, -)$ resp. $\underline{\mathrm{Ch}}(S; -, s)$ sont Hot-asphériques. Mais même en admettant que σ, β sont dans W et sont des W-fibrations, je ne peux en conclure tout de suite que les fibres sont W-asphériques - il y aurait cercle vicieux ! Il me faut donc une démonstration directe.

Considérons le foncteur

$$\begin{array}{c} \underline{\mathrm{Ch}}(S; s, -) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle p} \\ \underline{Ty} \end{array},$$

c'est un foncteur Cat-fibrant, donc W-lisse (je devrai développer la notion de W-lissité ([13]) avec soin, j'admettrai pour le moment les propriétés formelles familières, et les justifierai par la suite). À cause de la W-lissité, pour prouver $p \in W$, il suffit de prouver que les fibres de p sont W-asphériques ([14]). Or les fibres sont les $Z_\tau = \underline{\mathrm{Ch}}_\tau(S; s, -)$, qui sont des catégories *contractiles* (i.e. $Z_\tau \longrightarrow e$ est un homotopisme), donc W-asphériques par W(3) (cf. cor. 3, page 3). p. 8 [page 9]

D'autre part, si on admet que $\underline{\mathrm{Ch}}(S) \xrightarrow{p_S} S \times S$ est W-lisse (et W-propre), donc $\underline{\mathrm{Ch}}(S) \xrightarrow{\sigma_S} S$ aussi, étant à fibres W-asphériques comme on vient de voir, il s'ensuit que

10. Et même, dans a′) on pourrait exiger que $Y'' = e$, Y' W_ω-asphérique, où W_ω `[est]` défini page 14, $W_\omega \subseteq W \cap W_\infty \ldots$

11. Est prouvé moyennant l'axiome W(4) (+ des petites vérifications ultérieures).

12. Dans l'énoncé des 'propriétés essentielles' de $\underline{\mathrm{Ch}}(S)$, on peut travailler avec W_ω, la plus petite partie de Fl(Cat) satisfaisant les axiomes W(1), W(2 bis), W(3) (cf. page 14), donc $W_\omega \subseteq W \cap W_\infty$.

13. $f : X \longrightarrow Y$ est W-lisse si les $X_y \longrightarrow y\backslash X$ sont W-asphériques.

14. On utilise ici W(2 bis), pas $W(2)$.

$\sigma_S \in W$, d'où $S \xrightarrow{i_S} \underline{\mathrm{Ch}}(S)$ aussi dans W (puisque $\sigma_S \circ i_S = \mathrm{id}_S$). Donc il reste à prouver seulement que

$$\underline{\mathrm{Ch}}(S) \xrightarrow{p_S} S \times S \qquad (*)$$

est W-propre et W-lisse. Il en résultera que

$$\underline{\mathrm{Ch}}(S; s_0, -) \xrightarrow{\beta} S$$

est lui aussi W-propre et W-lisse, car déduit de p_S par le changement de base

$$S \longrightarrow S \times S \qquad s \longmapsto (s_0, s).$$

Il faut ensuite voir que W-lisse et W-propre implique la propriété de W-fibration *sous sa forme la plus forte* a) (alors que je prévois qu'a priori on ne l'aura que sous les formes faibles a_1, a_2 - pas même sous la forme a′). C'est ici donc que l'axiome W(4) des W-fibrations sera essentiel ([15])!

Voici l'argument pour la lissité de $(*)$, dans loc. cit. p. 161 ff. Il faut prouver que pour $c \in \mathrm{Ob}\,\underline{\mathrm{Ch}}(S)$, et une flèche $u \in \mathrm{Fl}(S \times S)$ `[plutôt` $(u, v) \in$ `Fl(`$S \times S$`)]`, une certaine catégorie de 'relèvements de u de source c ' `[plutôt 'relèvements de` (u, v) `de but` c `']`, $\mathcal{C} = \mathcal{C}(c, u, v)$, est W-asphérique ([16]). Pour ceci, on la compare à une catégorie $\mathcal{C}'$ à objet final, donc contractile et a fortiori W-asphérique, à l'aide de deux foncteurs

$$\mathcal{C} \underset{\psi}{\overset{\varphi}{\rightleftarrows}} \mathcal{C}',$$

et des homotopies $\varphi\psi \sim \mathrm{id}_{\mathcal{C}'}$ (sans mérite, $\mathcal{C}'$ étant contractile) et $\psi\varphi \sim \mathrm{Id}_{\mathcal{C}}$ (on trouve même une flèche $\psi\varphi \longrightarrow \mathrm{id}_{\mathcal{C}}$). Ainsi φ est un homotopisme, donc une W-équivalence (cor. 3, p. 3), donc $\mathcal{C}$ est W-asphérique, $\mathcal{C}'$ l'étant. La propreté de p_S équivaut à la lissité de $p_{(S^\circ)}$, elle est donc prouvée du même coup. [page 10]

Ainsi, le lemme de la page 7 est prouvé, moyennant l'axiome W(4) qui assure qu'une flèche qui est à la fois W-lisse et W-propre, satisfait à la condition très forte a) des W-fibrations. p. 9

NB En fait, il suffirait, au lieu de l'axiome W(4) sous sa forme forte, de supposer qu'une $f : X \longrightarrow Y$ qui est à la fois 'homotopiquement lisse' et 'homotopiquement propre', i.e. les fibres des $X/x \longrightarrow Y/y$ et des $x\backslash X \longrightarrow y\backslash Y$ sont contractiles (donc W-asphériques pour tout W satisfaisant W(1,2,3)), soit W-fibration forte. Énonçons quand même ce que nous avons prouvé.

Proposition 4. *Si W satisfait* W(1,2,3) ([17]) (nous le supposons toujours par la suite) *plus* W(4) (sous une forme un peu affaiblie suffisante, cf. remarque précédente), *on a ceci: Soit $f : X \longrightarrow Y$ une flèche dans* Cat/S*, avec X, Y des W-fibrés sur S. Si $f \in W$, alors $f_s : X_s \longrightarrow Y_s$ est dans W pour tout $s \in S$.*

Je me demande si j'en sais assez pour pouvoir prouver

$$W \subseteq W_\infty.$$

Il faut quand même éliminer des cas canularesques, comme $W = \mathrm{Fl}(\mathrm{Cat})$, donc mettre l'axiome

W(5) (Axiome de connexité ([18]).) Si $f : X \longrightarrow Y$ est dans W, $\pi_0(f) : \pi_0(X) \longrightarrow \pi_0(Y)$ `[est]` bijectif.

15. sous la forme affaiblie W(4a″) (p. 13).
16. En fait, on prouve que $\mathcal{C}(c, u, v)$ est *contractile*, donc elle est W_ω-asphérique. [page 11]
17. Pour W(2), il le suffit sous la forme W(2 bis).
18. Voir à ce sujet le corollaire page 22.

Je factorise alors f en ([19])

$$X \xrightarrow{i} \bar{X} \xrightarrow{\bar{f}} Y,$$

avec $\bar{f}$ une W_∞-fibration et une W-fibration ([20]), $i \in W \cap W_\infty$ - cela marche finallement, par la construction de VII, p. 170-171 (de Cartan-Serre), à partir des propiétés de $Y \longrightarrow \underline{\mathrm{Ch}}(Y) \longrightarrow Y \times Y$ sans plus. Comme $\bar{f}i = f \in W$ et $i \in W$, on en déduit $\bar{f} \in W$. Comme $i \in W_\infty$, on en conclut $f \in W_\infty \iff \bar{f} \in W_\infty$. Donc pour prouver que f est dans W_∞, on est ramené au cas où f est une W-fibration et une W_∞-fibration. Mais alors la proposition 4 nous montre que les fibres de f sont W-asphériques ([21]), et il suffit de voir qu'elles sont W_∞-asphériques (proposition 3 ([22]) appliquée à W_∞). Ainsi on est ramené au cas où $Y = e$, i.e. à prouver que si X dans Cat est W-asphérique, il est W_∞-asphérique.

Soit $x_0 \in \mathrm{Ob}\, X$, considérons comme tantôt

$$E = \underline{\mathrm{Ch}}(X, x_0, -) \xrightarrow{p} X,$$

on sait que E est $W \cap W_\infty$-asphérique, et que c'est une fibration pour W et pour W_∞. Comme X est W-asphérique (comme E), $p \in W$, donc à nouveau par la proposition 4 ([23]), les fibres de p sont W-asphériques, en particulier (par W(5)) 0-connexes. On a donc prouvé le

p. 10

Lemme. ([24]) *Soit* (X, x_0) *dans* $\mathrm{Cat}_\bullet$. *Si* X *est* W*-asphérique, alors* $\Omega(X, x_0) \overset{déf}{=} \underline{\mathrm{Ch}}(X; x_0, x_0)$ *l'est aussi* (moyennant les axiomes W(1,2,3,4) sur W). *Donc (par itération) les* $\Omega^n(X, x_0)$ *sont* W*-asphériques* ($\forall\, n \in \mathbf{N}$).

[page 12]

Corollaire. *Si de plus* W *satisfait l'axiome* W(5) *de connexité, alors* X *est* W_∞*-asphérique.*

En effet, 'on sait' que cela signifie que tous les $\Omega^n(X, x_0)$ sont 0-connexes. Or l'axiome de connexité W(5) assure que W-asphérique implique 0-connexe.

Mais le 'on sait' est un tout petit peu léger ([25]). Pour le justifier, il faudrait, ou bien que je fasse le lien avec la théorie 1/2-simpliciale classique, et prouver que les Ω^n que je construis sont 'les bons', i.e. que leur nerf redonne bien (à isomorphisme près dans Hot) les Ω^n classiques (??). En particulier, que le $\pi_0(\Omega^n(X, x_0))$ est bien le $\pi_n(X, x_0)$ 'de tout le monde'. Ou bien que je prouve directement que la 0-connexité des $\Omega^n(X, x_0)$ équivaut à la W_∞-asphéricité de X, définie cohomologiquement à la Artin-Mazur. C'est donc un travail qu'il me faudra faire absolument. Mais ce n'est plus qu'un simple travail de routine, et je peux énoncer dès maintenant le

Théorème 1. ([26], [27], [28]) *Soit* $W \subseteq \mathrm{Fl(Cat)}$ *satisfaisant les conditions* W(1,2,3,4,5) (axiome de saturation, de localisation, de l'objet final, de fibration, de connexité). *Alors*

$$W \subseteq W_\infty.$$

Corollaire. *On peut caractériser* W_∞ *comme la plus grande partie de* Fl(Cat) *satisfaisant aux conditions* W(1) *à* W(5) *précédentes.*

[page 13]

19. À nouveau, dans ces arguments on a intérêt à travailler avec W_ω.
20. en fait, $\bar{f}$ est à la fois W_∞-parfait (i.e. W_∞-lisse et propre) et W-parfait (en fait, W_ω-parfait).
21. on n'a utilisé ici que cette propriété sur les fibres, comme consequence de W(4). (On utilise W(4) sous sa forme la plus faible W(4b″), cf. pages 13, 14).
22. on n'utilise la proposition 3 que dans le cas $Y = S$, pour lequel W(2 bis) suffit.
23. en fait, la condition W(4b″) sur W.
24. Utilise W(1, 2 bis, 3, 4b″) sur W.
25. C'est prouvé fort simplement dans le corollaire du 'theorème 1', page 190.
26. Il suffit même de W(4) sous une forme affaiblie, avec des foncteurs 'fibrants' dans un sens 'absolu'. Cf. le NB p. 10 - et surtout, cf. pages 13, 14.
27. NB Au lieu de W(5), il suffit de supposer $W \neq \mathrm{Fl(Cat)}$, cf. th. 2, p. 20.
28. Les hypothèses utiles sur W sont finalement W(1), W(2 bis), W(3), W(4b″), et $W \neq \mathrm{Fl(Cat)}$.

Bien sûr, on aimerait un axiome 6 plus intéressant, qui joint aux précédents assure que $W = W_\infty$ ([29]). Ou est-ce que ces propriétés assurent déjà que $W = W_\infty$? Pour le voir, il faudrait peut-être que j'en sache plus sur la structure des objets W_∞-asphériques? Si c'était faux, je songe à un axiome de 'descente homotopique', qui impliquerait qu'un objet W_∞-asphérique est aussi W-asphérique.

Je note dès maintenant que si des W_i ($i \in I$) satisfont aux axiomes W(1) à W(5), il en est de même de $\bigcap_i W_i$ ([30]). Donc il y a un plus petit ensemble de flèches W_ω satisfaisant à ces conditions. S'il n'est égal à W_∞, i.e. si les axiomes W(1) à W(5) ne caractérisent déjà W_∞, ce serait un localiseur vraiment très intéressant. p. 11

Je me rends compte que je n'ai utilisé qu'une forme assez faible de l'axiome W(4) - essentiellement, la validité de la proposition 4. Je vais résumer différentes variantes de l'axiome de fibration.

W(4)

a$_1$) Si $f : X \longrightarrow Y$ dans Cat est une W-fibration gauche, c'est une W-fibration ultraforte.

a$_2$) Si $f : X \longrightarrow Y$ est une W-fibration droite, c'est une W-fibration ultraforte.

a$'$) Si $f : X \longrightarrow Y$ est W-parfait, i.e. à la fois W-propre et W-lisse ([31]), alors f est une W-fibration ultraforte.

a$''$) Si $f : X \longrightarrow Y$ est à la fois homotopiquement propre et homotopiquement lisse (cf. NB page 10), f est une W-fibration ultraforte. (Il vaut mieux dire : Si f est W_ω-parfait, c'est une W-fibration ultraforte.)


b) Soit $f : X \longrightarrow Y$ une flèche dans Cat/S, avec X et Y des W-fibrés sur S. Si $f \in W$, alors $\forall\, s \in S$, $f_s : X_s \longrightarrow Y_s$ est `[dans]` W.

b$'$) Soit $f : X \longrightarrow Y$ une flèche de Cat/S qui soit W-parfaite et W_∞-parfaite, alors $f \in W$ implique que les fibres de f sont W-asphériques. (Il vaut mieux dire : Si f est W_ω-parfait, il est une W-fibration ultraforte.) `[Plutôt : Soit` $f : X \longrightarrow Y$ `une flèche dans` Cat/S `telle que` $X \longrightarrow S$ `et` $Y \longrightarrow S$ `soient` W_ω`-parfaites. Si` $f \in W$`, alors` $\forall\, s \in S$, $f_s : X_s \longrightarrow Y_s$ `est dans` W`.]`

b$''$) Soit $W_\omega \subseteq W \cap W_\infty$ la plus petite partie de Fl(Cat) satisfaisant les conditions W(1,2,3) ([32]) (axiomes de saturation, de localisation, de l'objet final). Soit $f : X \longrightarrow Y$ une flèche dans Cat qui soit W_ω-parfaite. Si $f \in W$, alors les fibres de f sont W_ω-asphériques `[plutôt` W`-asphériques]`. [page 14]

Entre ces propriétés de W, on a les implications tautologiques (sauf a$''$) $\Longrightarrow$ b), qui est essentiellement la proposition 4) p. 12

29. Cf. axiome W(6) page suivante.
30. C'est vrai pour tout ensemble d'axiomes dans la nature d'axiomes de stabilité.
31. ce qui implique que c'est une W-fibration gauche *et* droite.
32. Il vaut mieux prendre W(2 bis) au lieu de W(2), pour trouver W_ω la plus petite possible!



([33]).

Eh bien, dans le lemme page 12, il suffisait de supposer que W satisfait à la version la plus faible b″) de l'axiome des fibrations (sept versions!). En effet, les fibrations $\bar{X} \longrightarrow Y$ et $E \longrightarrow X$ utilisées dans la démonstration du lemme sont W_ω-parfaites, et il suffisait de savoir que si elles sont dans W, alors les fibres sont W-asphériques.

Mais je ne pense pas que même la version la plus forte W(4a) de l'axiome des fibrations, jointe aux trois axiomes précédents et à W(5) (connexité), implique $W = W_\infty$. Il faudrait tout au moins y joindre l'axiome

W(6) (Axiome des limites filtrantes.) Soit $X = \varinjlim_i X_i$ une limite inductive filtrante dans Cat. Si les X_i sont W-asphériques, X aussi.

Ceci devrait être équivalent à la propriété, en apparence plus forte, en termes de flèches de W :

Proposition 5. *Supposons qu'on ait* W(6) (en plus de W(1) à W(4) ([34])), *et soit* [page 15]

$$(f_i)_{i\in I} : (X_i)_{i\in I} \longrightarrow (Y_i)_{i\in I}$$

un homomorphisme de systèmes inductifs dans Cat*, indexé par un ensemble ordonné filtrant, soient* $X = \varinjlim X_i$, $Y = \varinjlim Y_i$, $f = \varinjlim f_i$, $f : X \longrightarrow Y$. *Si* f_i *est dans* W *pour tout* i*, alors* $f \in W$. p. 13

On factorise chaque f_i en

$$X_i \xrightarrow{\alpha_i} \bar{X}_i \xrightarrow{\bar{f}_i} Y_i, \qquad \alpha_i \in W_\omega,\ \bar{f}_i \in \operatorname{Parf} W_\omega$$

([35]) suivant le système breveté. La construction étant fonctorielle, les $\bar{X}_i$ forment eux aussi un système inductif. De plus, comme le foncteur $S \longrightarrow \underline{\mathrm{Ch}}(S)$ qui donne naissance

33. Je reviens sur les diverses variantes de W(4) plus bas, p. 53-56.
34. W(4) sous la forme la plus faible W(4b″) .
35. W_ω introduit dans la condition W(4b″), page 14.

à la factorisation canonique des morphismes, commute aux $\varinjlim$ filtrantes (immédiat), il s'ensuit que, si on pose

$$\bar{X} = \varinjlim_i \bar{X}_i$$

et qu'on regarde les flèches

$$X \xrightarrow{\alpha} \bar{X} \xrightarrow{\bar{f}} Y, \qquad \alpha = \varinjlim \alpha_i,\ \bar{f} = \varinjlim \bar{f}_i,$$

avec $\bar{f}\alpha = \bar{f}$, cette factorisation de f est bien sa factorisation canonique. Donc $\alpha \in W$, $\bar{f} \in \mathrm{Parf}\, W_\omega$. Ceci vu, en vertu de prop. 3, $f \in W$, i.e. $\bar{f} \in W$, est vrai si les fibres de $\bar{f}$ sont W-asphériques. Mais les fibres de $\bar{f}$ s'interprètent comme limites inductives filtrantes de fibres des $\bar{f}_i$, lesquelles sont W-asphériques par la condition W(4b″) des fibrations. Donc l'axiome W(6) donne ce qu'il faut.

Conjecture (hardie? sotte?). *Si* $W \subseteq \mathrm{Fl(Cat)}$ *satisfait les axiomes* W(1) *à* W(6) *(avec* W(4) *sous sa forme la plus faible* W(4b″) ([36])*, alors* $W = W_\infty$.

Mais il est bien possible qu'il faille renforcer un peu W(1) (saturation), en exigeant que tout rétracte d'un $f \in W$ soit dans W. [page 16]

Remarque. Considérons, pour $n \in \mathbf{N}$, l'ensemble $W_n \subseteq \mathrm{Fl(Cat)}$ des 'n-équivalences d'homotopie' dans Cat :

$$f \in W_n \iff \pi_0(f) \text{ bijectif, et } \pi_i(f,x) : \pi_i(X,x) \longrightarrow \pi_i(Y, f(x)) \text{ bijectif pour } 0 < i \leq n.$$

Je croyais que ça satisfaisait à tout ce qu'on peut demander à un localiseur, sans avoir pris la peine de l'écrire avec soin. Ma ça ne peut satisfaire à W(1) jusqu'à W(4b″), puisqu'on n'a pas $W_n \subseteq W_\infty$!

W(1) est trivial sur la définition (et on a sans larmes même la *saturation forte* de W_i, i.e. si f dans Cat est [un] isomorphisme dans $\mathrm{Hot}_{W_i} = (\mathrm{Cat})W_i^{-1}$, alors $f \in W_i$). Je crois me rappeler avoir vérifié W(2), par la même méthode que pour W_∞, en utilisant un critère cohomologique à la Artin-Mazur, pour exprimer $f \in W_i$, et en utilisant les suites spectrales de Leray pour $X \longrightarrow S$ et $Y \longrightarrow S$. La condition W(3) est trivialement satisfaite puisque $W_n \supseteq W_\infty$ et qu'elle l'est pour W_∞. Donc ça canule là où je m'y attendais le moins : l'axiome des fibrations. Prenons la forme faible : Soit $f : X \longrightarrow Y$ une W_ω-fibration et $f \in W_i$, les fibres X_s sont elles W_i-asphériques ([37])? On peut supposer X et Y 0-connexes, soit $x \in X_s$, la suite exacte d'homotopie donne p. 14

$$\pi_{i+1}(X) \xrightarrow[\text{si } i \leq n-1]{\text{iso}} \pi_{i+1}(Y) \longrightarrow \pi_i(X_s) \longrightarrow \pi_i(X) \xrightarrow[\text{si } i \leq n]{\text{iso}} \pi_i(Y),$$

donc

$$\pi_i(X_s) = 1 \qquad \text{si } 0 \leq i \leq n-1,$$

mais pour $i = n$ on trouve

$$\pi_n(X_s) = \mathrm{Coker}\,(\pi_{n+1}(X) \longrightarrow \pi_{n+1}(Y))\,, \qquad \text{[page 17]}$$

il n'y a aucune raison que ce soit nul, comme ça devrait si $X_s \longrightarrow e$ était dans W_n.

Il est vrai que parfois on renforce justement la condition pour W_n, disons qu'on définit $W'_n \subseteq W_n$ par

$$f \in W'_n \iff \begin{cases} \text{a)} & \pi_0(f) \text{ bijectif,} \\ \text{b)} & \pi_i(f,x) : \pi_i(X,x) \longrightarrow \pi_i(Y,f(x)) \text{ bijectif pour } 0 < i \leq n \text{ et } x \in X, \\ \text{c)} & \pi_{n+1}(f,x) : \pi_{n+1}(X,x) \longrightarrow \pi_{n+1}(Y,f(x)) \textit{ surjectif,} \end{cases}$$

36. et peut-être W(2) sous la forme plus faible W(2 bis).
37. $\omega > \infty$, $W_\omega \subset W_\infty \subset W_n$

c'est à dire aussi

$$f \in W'_n \iff \begin{cases} \text{les 'fibres homotopiques' } Z \text{ de } X \longrightarrow Y \text{ (i.e. les fibres de } \bar{X} \xrightarrow{\bar{f}} Y) \\ \text{sont } n\text{-connexes, i.e. 0-connexe et } \pi_i(Z_y, z) = 0 \text{ pour } 1 \leq i \leq n. \end{cases}$$

Alors X dans Cat sera W'_n-asphérique si et seulement s'il est W_n-asphérique, i.e. n-connexe. Donc par la forme 2 de la définition de W'_n, l'axiome W(4b″) est satisfait. Il faut croire que ça pèche ailleurs! Peut-être déjà la saturation.

Si gf et g sont dans W'_i, il n'est pas forcément de même de f,

car si $\bar{g}\bar{f}$ (et donc $\bar{g}$) est surjectif, il n'en est par forcément de même pour $\bar{f}$! Donc W'_n ne mérite pas le nom de 'localiseur'.

Par contre, W_n me paraît excellent, si on ne lui demande pas l'impossible - de satisfaire à un 'axiome de fibration' qui semble bien (à peu de choses près) caractériser le seul W_∞ parmi les 'bons' localiseurs. En tous cas l'axiome de connexité W(5) est satisfait, et l'axiome des limites filtrantes W(6) aussi. Par ailleurs W(1) (et même la saturation forte), W(2), W(3) sont satisfaits par tout $W_{\mathbf{D}}$ associé à un dérivateur - ce qui confirme à nouveau leur importance. Les axiomes W(4) (l'axiome 'draconien' des fibrations, ± spécial à W_∞), W(5) (connéxité) et W(6) (limites) m'apparaissent comme de nature plus spéciale, je ne songerais à imposer aucun d'eux pour l'usage terminologique de 'localiseur fondamental'.

p. 15 [page 18] p. 16

II Perplexités sur les axiomes et la terminologie.


Dans I et la plupart du temps, en travaillant avec les dérivateurs, j'ai supposé $W_{\mathbf{D}} \supseteq W_\infty$, hypothèse qui m'a parue essentielle (à tort ([38]) ou à raison). On voit donc que si $W_{\mathbf{D}}$ satisfait à l'axiome de fibrations W(4), même sous sa forme la plus faible W(4b″), il est *égal* à W_∞. Cela montre bien que cet axiome doit être vu comme pratiquement une *caractérisation* de W_∞ (parmi les localiseurs fondamentaux qui contiennent W_∞ – et ces localisateurs me paraissent les plus importants, et peut-être les seuls vraiment utiles).

La théorie des **D**-fibrations dans I, p. 111-126, a été faite dans l'esprit qu'on vient de dire, en supposant $W_{\mathbf{D}} \supseteq W_\infty$. La notion de **D**-fibrations à laquelle je m'étais finalement arreté était par suite différente des notions envisagées ici dans un esprit différent (page 4). Elle revient à tester la condition a) (trop forte presque toujours, sauf pour $W = W_\infty$), caractérisant les W-fibrations ultrafortes, par des $Y'' \longrightarrow Y'$, où Y'', Y' sont tous deux W_∞-asphériques (ce qui est plus exigeant que W-asphérique). C'est seulement quand Y'' et Y' sont W_∞-asphériques (au lieu de W-asphériques), qu'on demande que $X'' \longrightarrow X'$ soit dans W. On trouve donc une notion moins exigeante que celle de W-fibration forte. Si on dénote ici cette condition par b), on trouve (sous réserve que $W_\infty \subseteq W$), avec les

[page 19]

38. à *tort* il s'avère maintenant.

notations de la page 4 ([39])



a_1), a_2) étaient aussi appelées **D**-fibrations cohomologique resp. **D**-fibrations homologiques ([40]). Quand **D** satisfait Der 3a′ (I, p. 111) sur les **D**-coefficients localement constants sur les X W_∞-asphériques, alors les notions b), a_1), a_2) sont équivalentes. (Je présume que c'est le cas pour tous les **D** et tous les W vraiment intéressants.) Par contre, j'ai l'impression que la notion de W-fibration forte, voire ultraforte, n'est guère utilisable que dans le cas $W = W_\infty$, où elle coïncide avec les précédentes. C'est dire qu'on peut probablement oublier la terminologie, et se rappeler par contre que dans le cas $W = W_\infty$, les W-fibrations ont des propriétés d'une force extrême, s'exprimant par les deux propriétés dégagées dans W(4a) et W(4b). p. 17

Dans la théorie de HOT_W, influencé par la réflexion générale sur les dérivateurs et l'axiome Der 3b, j'ai travaillé sous l'hypothèse $W \supseteq W_\infty$, mais en utilisant un axiome de fibration L5 = W(4b) qui, il s'avère, implique finalement $W = W_\infty$. J'ai l'impression que je n'ai jusqu'à présent (propriétés de $f_!$ pour HOT) pas utilisé $W \supseteq W_\infty$, donc ça peut être utile, comme 'ça ne coûte pas plus cher' (et oblige d'être plus attentif à ce qu'on utilise), de laisser tomber $W \supseteq W_\infty$ (impliquant $W = W_\infty$), et de mettre par contre sur W des axiomes aussi forts (notamment de fibration) que les propriétés de W_∞, 'sans se priver en rien'. Je supposerai donc W(1), W(2), W(3), W(4a) (la forme la plus forte de l'axiome de fibration, cf. pages 13, 14) - c'est tout ce qui a été utile jusqu'à présent. Si on y joint W(5) (axiome de connexité) ça implique $W \subseteq W_\infty$. Mais pour l'instant je ne crois pas en avoir un besoin. [page 20]

Mais méditant sur la question, je crois avoir trouvé le

Théorème 2 (!) ([41]) : *Soit* $W \subseteq \mathrm{Fl(Cat)}$ *satisfaisant* W(1,2,3,4b″)*. Si* W *ne satisfait pas à* W(5)*, alors* $W = \mathrm{Fl(Cat)}$.

Démonstration. Soit $f : X \longrightarrow Y$ dans Cat, tel que $\pi_0(f)$ ne soit pas bijectif. Soit I la catégorie discrète ayant pour ensemble d'objets l'ensemble $\pi_0(Y)$, on a donc un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\ f\ } & Y \\ & {\scriptstyle p}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle q} & \\ & I, & \end{array}$$

39. Cf. la bonne notion de W-fibration dans un contexte où on ne suppose pas $W_\infty \subseteq W$, dans th. 3 et déf. 3, p. 51, 52.

40. Non, c'est une notion encore plus forte, à coups de coefficients localement constants, cf. I, p. 121.

41. Cf. pour un résultat plus fort XV 9.12, p. 133 bis. **NB** Le résultat est plus général, mais pas vraiment plus fort, car il ne donne pas $W = \mathrm{Fl(Cat)}$.

d'autre part un foncteur d'une catégorie dans une catégorie discrète est toujours W_ω-parfait, donc p, q sont des W-fibrations. Comme $f \in W$, il s'ensuit $f_i \in W$ pour tout $i \in I$ ([42]). [page 21]

Si $\pi_0(f)$ n'était pas surjective, prenant i qui n'est pas dans l'image, on aurait $X_i = \emptyset \longrightarrow Y_i \neq \emptyset$, qui serait dans W. Soit donc

$$f : X = \emptyset \longrightarrow Y$$

dans W. Alors $\forall$ Z dans Cat, $f \times \mathrm{id}_Z : \underbrace{X \times Z}_{=\emptyset} \longrightarrow Y \times Z$ est dans W (car Z est W-fibrée sur e), donc $\emptyset \longrightarrow Y \times Z$ est dans W. Donc aussi la projection $Y \times Z \longrightarrow Y$. p. 18

$$\begin{array}{ccc} Y \times Z & \longrightarrow & Y. \\ & \nwarrow \quad \nearrow & \\ & \emptyset & \end{array}$$

Comme cette projection est une W-fibration, il s'ensuit par W(4b″) que ses fibres sont W-asphériques. Comme $Y \neq \emptyset$, il y a une telle fibre, elle est $\simeq Z$. Donc Z est W-asphérique. Donc on trouve que *toute* catégorie Z dans Cat est W-asphérique. Donc toute flèche $Z \longrightarrow Z'$ dans Cat est dans W, q.e.d.

Supposons maintenant $\pi_0(f)$ surjective, mais non injective. Il y aurait une fibre de $\pi_0(X) \longrightarrow \pi_0(Y) = I$ qui serait de cardinal > 1. En prenant le f_i correspondant, on trouve $X_i \longrightarrow Y_i$ avec Y_i 0-connexe et $\operatorname{card} \pi_0(X_i) \geq 2$. Donc on est ramené au cas

$$f : X \longrightarrow Y \qquad \begin{cases} f \in W \\ Y \text{ 0-connexe} \\ \operatorname{card} \pi_0(X) \geq 2. \end{cases}$$

Considérons la factorisation canonique

$$X \xrightarrow{i_f} \bar{X} \xrightarrow{\bar{f}} Y,$$

avec $i_f \in W$, donc $\bar{f} \in W$. Donc par W(4b″) les fibres de $\bar{f}$ sont W-asphériques. Mais on voit tout de suite, en décomposant $\bar{X}$ suivant les composantes connexes X_i de X, que ces fibres ont un π_0 de cardinalité $\geq \operatorname{card} \pi_0(X) \geq 2$. Donc on est ramené au cas où $Y = e$, i.e.

$$X \text{ } W\text{-asphérique}, \qquad \operatorname{card} \pi_0(X) \geq 2.$$

Considérons $X \times X$, qui est aussi W-asphérique, et l'application diagonale [page 22]

$$d : X \longrightarrow X \times X = Y,$$

qui est donc dans W. Mais $\pi_0(d)$ s'identifie à l'application diagonale $\pi_0(X) \longrightarrow \pi_0(X) \times \pi_0(X)$, qui n'est pas surjective puisque $\operatorname{card} \pi_0(X) \geq 2$. Donc pour la première partie, $W = \mathrm{Fl}(\mathrm{Cat})$.

Donc sous forme plus positive :

Corollaire. *Soit* $W \subseteq \mathrm{Fl}(\mathrm{Cat})$ *qui satisfait à* W(1,2,3,4b″)*, et telle que* $W \neq \mathrm{Fl}(\mathrm{Cat})$. *Alors* W *satisfait l'axiome de connexité* W(5)*, et par suite (th. 1, page 12)* $W \subseteq W_\infty$. p. 19

III Classes remarquables de foncteurs liés à W.

Finalement, j'appelerai *'localiseur fondamental'* une partie W de Fl(Cat) satisfaisant les trois conditions suivantes :

42. On utilise W(4) sous forme plus forte que W(4b″)!

(i) Saturation W(1) (cf. rappel p. 1).

(ii) Axiome de l'élément final W(3) (page 3).

(iii) La variante affaiblie W(2 bis) de l'axiome de localisation W(2) donnée dans le corollaire page 1 (anciennement c'était L4′ dans Pursuing Stacks).

Quand j'aurai besoin de plus sur W, je le dirai explicitement. Ces trois axiomes ont suffi pour pratiquement tout ce que j'ai fait avec W dans Pursuing Stacks, la seule exception étant un usage (si je me rappelle) unique, quelque part, d'une variante affaiblie de W(2) (pour les S-foncteurs *cartésiens* entre S-catégories *fibrées* - si sur toute fibre il est dans W, il est lui-même dans W).

On suppose donc par la suite donné un localiseur fondamental

$$W \subseteq \mathrm{Fl}(\mathrm{Cat}).$$

Proposition 1. *Soit $f : X \longrightarrow Y$ dans* Cat. *Conditions équivalentes :*


a) Pour tout isomorphisme local $Y' \longrightarrow Y$, $f' : X' \longrightarrow Y'$ est $\in W$.

b) Même condition, dans le cas particulier $Y' = Y/y \longrightarrow Y$, donc $\forall\ y \in Y$, $X/y \simeq X \times_Y (Y/y)$ est W-asphérique.

[page 23]

Définition 1. Sous ces conditions équivalentes a), b) de la proposition 1, on dit que f est *W-asphérique.* On dit [que] f est *W-coasphérique* si f° est W-asphérique, i.e. si les $y\backslash X$ sont W-asphériques (pour $y \in \mathrm{Ob}\, Y$).

Démonstration. Il suffit de prouver b) $\Longrightarrow$ a). Par définition d'un isomorphisme local, on voit que la condition b) est stable par changement de base $Y' \longrightarrow Y$, avec Y' un isomorphisme local (puisque les $Y'/y' \xrightarrow{\sim} Y/y$, donc $X'/y' \xrightarrow{\sim} X/y$). Il suffit donc de voir que si f satisfait à b), alors $f \in W$. Mais c'est l'axiome W(2 bis).



Remarque. Si f a un adjoint à droite g, alors pour tout $y \in Y$, $X/y \simeq X/g(y)$, donc X/y a un objet final et est donc W-asphérique. Donc si f a un adjoint à droite (à gauche), alors f est W-asphérique (W-coasphérique). p. 20

Mais même si f n'a pas d'adjoint à droite, il y a quand même un adjoint généralisé

$$g : Y \longrightarrow X^\wedge$$

et on a

$$X/y \simeq X/g(y) \qquad \text{(pour l'inclusion pleinement fidèle } X \hookrightarrow X^\wedge\text{)},$$

donc $\mathrm{Top}(X/y)$ s'identifie au topos induit $\mathrm{Top}(X)/g(y)$. La condition f W-asphérique signifie donc que les faisceaux $g(y)$ dans $\mathrm{Top}(X)$ sont W-asphériques. Pour de nombreuses autres formulations équivalentes, je renvoie à Pursuing Stacks. [page 24]

Proposition 2. *Soit $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$ dans* Cat. *Si f et g sont W-asphériques (W-coasphériques), de même gf. Si gf et f sont W-asphériques (W-coasphériques), g aussi.*

Rappel. Un morphisme $p : S' \longrightarrow S$ dans Cat est un *isomorphisme local* si $\forall\ s' \in \mathrm{Ob}\, S'$, le morphisme induit

$$p_{s'} : S'/s' \xrightarrow{\sim} S/s \qquad (s = p(s'))$$

est un isomorphisme : p induit un isomorphisme sur les 'localisées' de S' et S en s' et $s = p(s')$ respectivement. Il est immédiat que cette notion est stable par composition, que si gf et g sont des isomorphismes locaux, alors f l'est aussi, que tout isomorphisme est un isomorphisme local. De plus, les isomorphismes locaux sont *stables par changement de base,* ce qui résulte du fait (trivial et important) que si on a un carré cartésien dans Cat

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{q} & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ S & \xleftarrow{p} & S', \end{array}$$

et si $x' \in \mathrm{Ob}\, X'$ a pour image x, s', s dans X, S', S, alors le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X/x & \xleftarrow{q/x'} & X'/x' \\ {\scriptstyle f/x}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'/x'} \\ S/s & \xleftarrow{p/s'} & S'/s' \end{array}$$

est également cartésien. (Donc si p/s' est [un] isomorphisme, q/x' aussi.)

Revenons à la proposition 2. La stabilité de la notion de morphisme asphérique par composition résulte aussitôt de la forme a) de la condition. De même pour la condition que si gf et f sont W-asphériques, g aussi - il faut montrer que si $Z' \longrightarrow Z$ est [un] isomorphisme local, alors g' est dans W, or l'hypothèse implique que $g'f'$ et f' le sont.

p. 21
[page 25]

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{r} & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ Y & \xleftarrow{q} & Y' \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g'} \\ Z & \xleftarrow{p} & Z' \end{array}$$

Corollaire 1. *L'image inverse d'un $f : X \longrightarrow Y$ qui est W-asphérique (resp. W-coasphérique) par un isomorphisme local (resp. par un coïsomorphisme local) est W-asphérique (W-coasphérique).*

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & X' & \longleftarrow & X'' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ Y & \underset{\text{iso local}}{\longleftarrow} & Y' & \underset{\text{iso local}}{\longleftarrow} & Y'' \end{array}$$

Résulte formellement de la définition par a) et du fait qu'un composé de deux isomorphismes locaux (resp. coïsomorphismes locaux) est itou.

NB Bien sûr, la notion de foncteur W-asphérique n'est pas stable par changement de base quelconque. Par exemple, l'inclusion $X = \{y_0\} \longrightarrow Y$ est W-asphérique si et seulement si les catégories discrètes $\mathrm{Hom}(y_0, y)$ sont W-asphériques, i.e. (sous réserve que l'on ait W(5), axiome de connexité) si et seulement si les $\mathrm{Hom}(y_0, y)$ sont de cardinal 1, i.e. y_0 *objet initial* de Y. Mais si $Y \neq \{y_0\}$, prenant y dans Y, $y \neq y_0$, et posant $Y' = \{y\} \longrightarrow Y$, on a $X' = X \times_Y Y' = \emptyset$ et $\emptyset \longrightarrow e$ n'est pas asphérique !

[page 26]

Par contre, on s'attend que les morphismes W-asphériques soient stables par changements de base W-*lisses* (qui généralisent les isomorphismes locaux), et les morphismes W-coasphériques par changements de base W-propres. Cf. plus bas.

Corollaire 2. *Soit $f : X \longrightarrow Y$ dans* Cat *une* équivalence *de catégories. Alors f est W-asphérique et W-coasphérique.*

En effet, f a un adjoint à gauche et un adjoint à droite, et on utilise la remarque page 23.

Proposition 3. *Soit $f : X \longrightarrow Y$ dans* Cat. *Conditions équivalentes :*

p. 22

a) Pour tout $y \in \mathrm{Ob}\, Y$, le foncteur d'inclusion

$$X_y \longrightarrow X/y \qquad (*)$$

*est W-co**asphérique.***

b) Pour tout $x_0 \in X$, le morphisme induit pour les colocalisées

$$x_0\backslash X \longrightarrow y_0\backslash Y \qquad (\text{où } y_0 = f(x_0))$$

est à fibres W-asphériques.

c) Pour tout morphisme $\mathbf{\Delta}^1 = Y' \longrightarrow Y$, considérons $X' = X \times_Y Y'$ sur $\mathbf{\Delta}^1$, l'inclusion $X'_1 \longrightarrow X'$ de la fibre fermée de X' (fibre sur le point fermé de Y') est W-coasphérique.


d) Pour toute flèche $u_0 : y_0 \longrightarrow y_1$ dans Y, et tout x_0 dans X_{y_0}, la catégorie $X(x_0; u_0)$ formée des flèches $u' : x_0 \longrightarrow x$ dans X de source x_0, et qui relèvent u `[plutôt` u_0`]`*, est W-asphérique.*

[page 27]

Démonstration. Pour expliciter la condition a), il faut expliciter la catégorie $\xi_0\backslash(X_y)$, pour un objet quelconque $\xi_0 = (x_0, u_0)$ de X/y, $x_0 \in \mathrm{Ob}\, X$,

$$u_0 : y_0 \longrightarrow y_1 = y \quad \text{dans } Y, \text{ avec } y_0 = f(x_0).$$

Cette catégorie $\xi_0\backslash X_{y_1}$ s'explicite alors comme la catégorie des x_1 dans X_{y_1}, *munis* d'une flèche de ξ_0 dans l'image $\xi_1 = (x_1, \mathrm{id}_{f(x_1)} = \mathrm{id}_{y_1})$ de x_1 dans X/y_1 dans ξ_0 `['dans` ξ_0`' à effacer]`, i.e. d'une flèche u de x_0 dans x_1, telle que $f(u)$ donne lieu au triangle commutatif dans Y, i.e. $f(u) = u_0$.



Donc c'est la catégorie notée $X(x_0; u_0)$ dans d). On voit tout de suite qu'elle est aussi isomorphe à la fibre de $x_0\backslash X \longrightarrow y_0\backslash Y$ en l'élément u_0 de $y_0\backslash Y$, dont il est question dans b). D'où l'équivalence de a) b) c). D'autre part, la donnée de u_0 dans Y équivaut à celle d'un foncteur $\mathbf{\Delta}^1 \longrightarrow Y$, comme dans c), et pour exprimer alors que $\underbrace{X'_1}_{\simeq X_{y_1}} \longrightarrow X'$ est coasphérique, il suffit d'exprimer que les $x'\backslash X'_1$ ($x' \in \mathrm{Ob}\, X'$) sont W-asphériques. Or c'est trivial si $x' \in \mathrm{Ob}\, X'_1$ (objet initial), donc il suffit de le vérifier pour x' dans $X'\backslash X'_1 = X'_0 \simeq X_{y_0}$. Alors x' s'identifie à un élément x_0 de X_{y_0}, et on vérifie tout de suite que $x_0\backslash X'_1$ est isomorphe à la catégorie $X(x_0; u_0)$ de d). Cela achève la démonstration.

Définition 2. Sous les conditions de la proposition 3, on dit que f est *W-propre.* On dit que f est *W-lisse* si f° est W-propre, i.e. si les morphismes d'inclusion $(*)$ [plutôt $X_y \longrightarrow y\backslash X$] sont W-asphériques etc. (conditions duales de celles de la proposition 3).

p. 23

[page 28]


Remarque. La condition a) de la proposition 3 est satisfaite en particulier si l'inclusion $(*)$ a un adjoint à gauche (cf. remarque page 23). Cela signifie que les catégories $X(x_0; u)$ ont un objet initial. Cela signifie aussi que la catégorie X sur Y est Cat-cofibrée sur Y au sens faible, i.e. qu'il existe, pour $u_0 : y_0 \longrightarrow y_1$ flèche dans Y, et x_0 dans X_{y_0}, un objet $u_{0*}(x_0)$ dans X_{y_1} qui représente le foncteur covariant $X_{y_1} \longrightarrow$ (Ens), $x_1 \longmapsto \mathrm{Hom}_u(x_0, x_1)$. Ainsi, si X est Cat-cofibrée au sens faible sur Y, et a fortiori si elle est Cat-cofibrée, alors $f : X \longrightarrow Y$ est W-propre. Dualement, si f est faiblement Cat-fibrée, f est [W-]lisse.

Proposition 4. ([43]) *La notion de morphisme W-propre est stable par composition, par changement de base. Les coisomorphismes locaux sont propres (trivial sur b)), a fortiori les isomorphismes sont propres, les immersions fermées sont propres.*

Énoncé dual pour les morphismes lisses : stabilité par changement de base, par composition, les isomorphismes locaux sont lisses, notamment les immersions ouvertes.

[page 29]

La stabilité par changement de base est immédiate sur la forme c). La stabilité par composition [est] moins triviale :



Dans le diagramme à carrés cartésiens ci-contre [plutôt dont les deux carrés de droite sont cartésiens] (déduit de $x \in \mathrm{Ob}\, X$, d'où $y = f(x)$, $z = g(y) = gf(x)$, et de $u \in \mathrm{Ob}\, z\backslash Z$), il faut prouver que $\bar{X}$ est W-asphérique. On sait que $\bar{Y}$ l'est (g propre) et que $\bar{X} \longrightarrow \bar{Y}$ est à fibres W-asphériques. Il suffit donc d'utiliser la proposition 5 ci-dessous, et la remarque immédiate

Lemme. *Si f est propre, il en est de même de $x\backslash f : x\backslash X \longrightarrow y\backslash Y$, pour tout x dans X, $y = f(x)$.*

En effet, si u' est dans $x\backslash X$ et v' dans $y\backslash Y$, et si x', y' sont leurs images dans X, Y respectivement, alors

p. 24

$$u'\backslash(x\backslash X) \simeq x'\backslash X, \qquad v'\backslash(y\backslash Y) \simeq y'\backslash Y,$$

43. Dire aussi : Si $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$, si gf et f W-lisses, alors g est lisse en les points de $\mathrm{Im}\, f$, idem pour propre.

et la flèche entre les deux s'identifie à la flèche de localisation

$$x'\backslash X \longrightarrow y'\backslash Y.$$

Proposition 5. *Soit $f : X \longrightarrow Y$ dans* Cat*, supposons f W-propre ou W-lisse, et à fibres W-asphériques, alors $f \in W$ (et même f est* universellement *dans W, i.e. il est dans W et le reste par tout changement de base).*

Comme les hypothèses sont stables par changement de base, il suffit de prouver $f \in W$. [page 30] Supposons p. ex. f propre, prouvons que f est W-*asphérique*, i.e. que les X/y ($y \in \mathrm{Ob}\, Y$) sont W-asphériques. Mais $X_y \longrightarrow X/y$, étant W-coasphérique par hypothèse de propreté, est dans W (par W(2 bis)), et comme X_y est W-asphérique par hypothèse, X/y aussi. Mais par W(2 bis), f W-asphérique $\Longrightarrow f \in W$. Le cas f lisse est dual.

Remarque. Ainsi, si f est propre, s'il est à fibres W-asphériques il est 'universellement W-asphérique', i.e. est et reste W-asphérique par tout changement de base. Inversement, si f est universellement dans W (pas forcément propre), alors en particulier ses fibres sont W-asphériques. Mais ça n'implique bien sûr pas que f soit propre, ou lisse ([44]).

Corollaire. *Si W satisfait* W(2) (pas seulement W(2 bis))*, alors pour un S-morphisme $X \longrightarrow Y$ de catégories qui sont toutes deux W-propres sur S, ou toutes deux W-lisses, si $f_s : X_s \longrightarrow Y_s$ est dans W pour tout $s \in S$, alors $f \in W$.*

Supposons p. ex. f propre, considérons, pour $s \in \mathrm{Ob}\, S$ [page 31]

$$\begin{array}{ccc} X_s & \xrightarrow{f_s} & Y_s \\ {\scriptstyle i_s^X}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i_s^Y} \\ X/s & \xrightarrow{f/s} & Y/s, \end{array}$$

comme X, Y [sont] propres, les flèches verticales sont dans W (il suffirait de beaucoup moins que la propreté …), donc $f_s \in W \Longrightarrow f/s \in W$. Ainsi, '$f$ est dans W localement sur S', ce qui implique $f \in W$ par W(2).

Proposition 6. *Soit* p. 25

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{q} & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ S & \xleftarrow[p]{} & S', \end{array}$$

cartésien dans Cat*. Si f* [est] *W-asphérique, p W-lisse, alors f' est W-asphérique.*

Il faut prouver [que] $X' \times_{S'} S'/s'$ est W-asphérique ($s' \in \mathrm{Ob}\, S'$). Soit $s = p(s')$, on a

$$\begin{array}{ccccc} S & & \xleftarrow{p} & & S' \\ & \nwarrow & & \nwarrow & \\ & & S/s & \xleftarrow[p_0]{} & S'/s', \end{array}$$

avec p_0 W-lisse (lemme p. 28 [plutôt 29]) et à fibres W-asphériques, donc une W-équivalence universelle (prop. 5). Comme l'image inverse de X sur S/s est W-asphérique (hypothèse pour f), il [s'ensuit]

que dans le carré cartésien ci-contre [ci-dessous] [page 32]

44. Mais 'universellement dans W' implique déjà 'universellement W-asphérique', puisque la notion de W-asphéricité est définie par [la] proposition 1 a).

$$(*) \qquad \begin{array}{ccc} X/s & \xleftarrow{W} & X'/s' \\ \downarrow & & \downarrow \\ S/s & \xleftarrow{W} & S'/s' \end{array}$$

les flèches horizontales sont dans W, et la première flèche verticale l'est par hypothèse sur f, donc la seconde aussi, donc X'/s' [est] W-asphérique.

Corollaire (généralise [la] prop. 6, obtenue en faisant $Y = S$). *Soit $p : S' \longrightarrow S$* [un] *morphisme W-lisse dans* Cat. *Alors le foncteur changement de base*

$$\mathrm{Cat}/S \longrightarrow \mathrm{Cat}/S'$$

est compatible avec les localiseurs W^{g}_S, $W^{\mathrm{g}}_{S'}$, i.e. transforme $f : X \longrightarrow Y$ qui est dans W localement *sur S, dans $f' : X' \longrightarrow Y'$ dans W localement sur S'.*

Cette fois, on regarde le diagramme similaire à $(*)$

$$\begin{array}{ccccc} X/s & \xleftarrow{W} & X'/s' & & \\ & \searrow^{f/s} & \downarrow & \searrow^{f'/s'} & \\ & & Y/s & \xleftarrow{W} & Y'/s' \\ \downarrow & \swarrow & & \swarrow & \downarrow \\ S/s & \xleftarrow{W} & S'/s', & & \end{array}$$

où les flèches horizontales sont dans W, donc $f/s \in W$ (hypothèse) implique $f'/s' \in W$. p. 26

Dualement, si p est W-propre, le foncteur image inverse est compatible avec les localiseurs W^{d}_S, $W^{\mathrm{d}}_{S'}$. [page 33]

Si $f : X \longrightarrow S$ est W-propre, on va définir un foncteur canonique

$$\begin{array}{rccc} & \mathrm{hot}^{X/S,W}_* : S & \longrightarrow & \mathrm{Hot}_W \overset{\text{déf}}{=} (\mathrm{Cat})W^{-1} \\ \text{donné sur les objets par} & s & \longmapsto & \mathrm{hot}_W(X_s). \end{array}$$

Il faut définir, pour une flèche u dans S, $u : s \longrightarrow s'$, une flèche

$$\mathrm{hot}_W(X_s) \longrightarrow \mathrm{hot}_W(X_{s'})$$

dans Hot_W - flèche que nous pouvons noter $\mathrm{hot}^{X/S,W}_*(u)$. On la définit par le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X_s & \dashrightarrow & X_{s'} \\ \downarrow{\scriptstyle i^X_s} & & \downarrow{\scriptstyle i^X_{s'}} \\ X/s & \xrightarrow{X/u} & X/s', \end{array}$$

où les flèches verticales sont W-coasphériques, donc dans W. Ce sont donc des isomorphismes dans Hot_W, d'où l'unique flèche en pointillés dans Hot_W, rendant le carré commutatif. Sur cette définition il est immédiat que

$$u \longmapsto \mathrm{hot}_W(u)$$

est compatible avec composition, et unités. [page 34]

Ce foncteur est donc défini en supposant
seulement que les

$$X_y \longrightarrow X/y$$

sont dans W, ce qui est nettement moins fort que propre. Si on suppose que cette hypothèse est satisfaite 'universellement' (i.e. reste satisfaite après tout changement de base $S' \longrightarrow S$) ([45]), alors on a donc, pour tout S' dans Cat/S, un foncteur

$$\mathrm{hot}_*^{X'/S',W} : S' \longrightarrow \mathrm{Hot}_W,$$

et on vérifie tout de suite que ce n'est autre que le composé dans

p. 27

$$(*) \qquad \begin{array}{ccc} S' & \xrightarrow{\quad p \quad} & S \\ & {\scriptstyle \mathrm{hot}_W^{X'/S'}} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle \mathrm{hot}_W^{X/S}} & \\ & \mathrm{Hot}_W & \end{array}$$

[plutôt $\mathrm{hot}_*^{X'/S',W}$ resp. $\mathrm{hot}_*^{X/S,W}$]. On a des observations duales si X est lisse sur S, plus généralement si les inclusions

$$X_s \longrightarrow s\backslash X$$

sont dans W. On trouve alors un contrafoncteur

$$\begin{cases} S^\circ & \longrightarrow & \mathrm{Hot}_W \\ s & \longmapsto & \mathrm{hot}_W(X_s) \\ u & \longmapsto & \mathrm{hot}^*_{X/S,W}(u) \text{ ou } \mathrm{hot}^*_{X/S}(u) \end{cases}$$

et une compatibilité similaire à $(*)$, si l'hypothèse est satisfaite *universellement* sur S, p. ex. f W-lisse. [page 35]

Proposition 7. *Supposons $f : X \longrightarrow S$ à la fois W-propre et W-lisse, plus généralement que les morphismes*

$$X_s \longrightarrow X/s, \qquad X_s \longrightarrow s\backslash X \qquad (s \in S)$$

soient dans W, et que cette hypothèse reste verifiée après tout changement de base. Alors les foncteurs correspondants

$$\begin{array}{rcl} \lambda = \mathrm{hot}_*^{X/S,W} : & S & \longrightarrow \mathrm{Hot}_W \\ \lambda^\circ = \mathrm{hot}^*_{X/S,W} : & S^\circ & \longrightarrow \mathrm{Hot}_W \end{array}$$

transforment toute flèche u de S en [un] *isomorphisme de* Hot_W*, et on a*

$$\lambda^\circ(u) = \lambda(u)^{-1} \qquad \textit{dans} \quad \mathrm{Hot}_W,$$

i.e. $\lambda(u)$ et $\lambda^c irc(u)$ sont inverses l'un de l'autre.

Démonstration. La donnée de $u : s_0 \longrightarrow s_1$ équivaut à celle de

$$S' = \mathbf{\Delta}^1 \longrightarrow S,$$

d'où

$$X' = X \times_S S' \qquad \text{sur } S' = \mathbf{\Delta}^1,$$

avec les deux fibres

p. 28

$$X'_0 \simeq X_{s_0}, \qquad X'_1 \simeq X_{s_1}.$$

[page 36]

L'hypothèse assurant l'existence de λ s'exprime par la condition que

$$X'_1 \longrightarrow X'/1 \simeq X'$$

est dans W, de sorte que le diagramme

$$X'_0 \xrightarrow{i_0} X' \xleftarrow[W]{i_1} X'_1$$

définit une flèche $\lambda(u) : X'_0 \longrightarrow X'_1$ dans Hot_W, savoir $\lambda(u) = i_1^{-1} i_0$. L'hypothèse qui assure l'existence de λ° s'exprime par la condition symétrique $i_0 \in W$, qui permet de définir la flèche $\lambda^\circ(u) : X'_1 \longrightarrow X'_0$ par $\lambda^\circ(u) = i_0^{-1} i_1$. Quand les deux conditions sont satisfaites simultanément, on voit donc que $\lambda(u)$, $\lambda^\circ(u)$ sont inverses l'un de l'autre.

Remarques. Pour définir λ 'universellement', il n'était pas indispensable de considérer les X/s et les inclusions $X_s \longrightarrow X/s$, au lieu de cela il suffisait de regarder les changements de base $S' = \mathbf{\Delta}^1 \xrightarrow{u} S$, et de faire l'hypothèse que pour tout tel changement de base, l'inclusion $X'_1 \xrightarrow{i_1} X' = X_{(\mathbf{\Delta}^1, u)}$ est dans W. Cette hypothèse est automatiquement stable par changement de base arbitraire. (La W-propreté de $f : X \longrightarrow S$ signifie que $X'_1 \longrightarrow X'$ est non seulement dans W, mais même W-coasphérique.) Dualement, pour la définition 'universelle' de λ°, il suffirait que pour tout changement de base $\mathbf{\Delta}^1 \longrightarrow S$ comme dessus, l'inclusion $X'_0 \xrightarrow{i_0} X'$ est dans W.

La notion la plus faible raisonnable de W-fibré, me semble être celle où on suppose [page 37]
les deux choses à la fois. Les hypothèses qu'on a faites jusqu'à présent, à l'exclusion de la forme forte de W-propreté ou de W-lissité, reviennent toujours à supposer que le *changement de base par* $f : X \longrightarrow S$ transforme certaines flèches dans Cat/S en `[élément de]` W : Pour définir λ, ces flèches sont

$$\text{soit } \{s\} \longrightarrow S/s, \qquad \text{soit } \{1\} \longrightarrow \mathbf{\Delta}^1 (\longrightarrow S),$$

pour définir λ°, ce sont

$$\text{soit } \{s\} \longrightarrow s\backslash S, \qquad \text{soit } \{0\} \longrightarrow \mathbf{\Delta}^1 (\longrightarrow S),$$

le 'soit' suivant la définition qu'on a adoptée. Dans ces exemples, il s'agit toujours de l'inclusion de l'objet final d'une catégorie S', dans ladite, ou inversement de l'objet initial. Cela montre d'ailleurs (si on exige l'universalité), que la première hypothèse (assurant λ) est *exactement* cela (cas de l'inclusion d'un objet final s' - puisque pour un tel objet, on a $S'/s' \simeq S'$), tandis que la deuxième hypothèse exige moins, seulement pour le cas de $\mathbf{\Delta}^1$. Et dualement pour λ' `[plutôt` λ°`]`. Mais il convient de noter que pratiquement, la façon la plus commode, et de loin,

pour vérifier de telles propriétés, c'est soit par la W-propreté de f, soit par la W-lissité [page 38]
- ce qui ramène à vérifier que certaines catégories bien précisées sont W-asphériques, sans avoir à se soucier de changements de base et de vérifier que les flèches construites en termes de changements de base arbitraires sont dans W. Et l'emploi de la W-propreté et de la W-lissité est d'autant plus sympathique, que ces notions sont stables par composition,

alors que toutes les notions dérivées, ainsi que les notions de fibrations à la clef, ont p. 29
une fâcheuse tendance à ne *pas* être stable par composition.

On pourrait appeler pseudo-W-propre resp. quasi-W-propre (un peu mieux que pseudo) ce qu'on vient de dégager - j'entends des ricanements ! Et si on veut les deux à la fois - λ et λ° associés comme on a dit ? Je vois le même principe de description avec des $S'' \longrightarrow S'$ sur S, d'exiger que $X'' \longrightarrow X'$ soit transformé en des `[éléments de]` W. Avec les choix suivants qui ont l'air sympathique [page 39]

a$_1$) Y' a un objet final, $Y'' = e$. La définition revient donc à la condition que les

$$X_s \longrightarrow X/s, \qquad X/s' \longrightarrow X/s$$

(pour $s \in \mathrm{Ob}\, S$ où $u : s' \longrightarrow s$ dans S) soient dans W, et que ça reste comme ça après tout changement de base $S' \longrightarrow S$.

a$_2$) Y' a un objet initial, $Y'' = e$, c'est la condition duale à coups de

$$X_s \longrightarrow s\backslash X, \qquad s\backslash X \longrightarrow s'\backslash X.$$

a$_0$) $Y' = \mathbf{\Delta}^1$, $Y'' = e$ ([46]).

b) Y' est contractile, Y'' aussi (ou au choix, Y' contractile, $Y'' = e$)

donc la condition revient à ceci : pour toute Y' sur Y *contractile* (notion indépendante de W, c'est ça son principal avantage) les inclusions des fibres de $X' = X \times_Y Y'$ sur Y' dans X' sont `[dans]` W.

Je sens que même pour des W générales, b) reste du domaine du vérifiable, tandis qu'on mollit si on passe à l'extrême en généralité dans ce sens :

b′) Comme b), mais en supposant seulement Y' W-asphérique ([47]).

Enfin (la condition a) de la page 4)

c) Si $Y'' \longrightarrow Y'$ est `[dans]` W sans plus, $X'' \longrightarrow X'$ aussi.


p. 30
[page 40]

La seule de ces notions qui ait la moindre envie d'être stable par composition, c'est la plus forte c). Par contre, la notion de flèche W-parfaite (cf. déf. 3) est stable spontanément par composition :

Définition 3. On dit que $f : X \longrightarrow S$ est *W-parfaite* si elle est à la fois W-propre et W-lisse.

Dans le cas $W = W_\infty$, toutes les variantes de la page précédente, à l'exclusion seulement de a$_0$), sont équivalentes. Ce serait intéressant de dégager des conditions minimales sur W pour assurer qu'il en soit ainsi. (Et il se pose la question si dans le cas de W_∞, a$_0$) suffit pour impliquer le reste - je ne m'y attends guère …)

Dans le cas général, on a le diagramme d'implications (et encore je me suis limité)



[page 41]

[‘W-parfait $\Longrightarrow$ b’ encerclé].

Proposition 8. *Soit $f : X \longrightarrow S$ dans* Cat. *Les conditions suivantes sont équivalentes.*

a) f est une W-fibration gauche, i.e. la condition a_1 *de la page 39 est vérifiée.*

b) f est W-prépropre, et $\forall\ s_0 \longrightarrow s_1$ dans S, $X/s_0 \longrightarrow X/s_1$ est dans W.


c) f est W-prépropre, et une W-pseudofibration, i.e. la condition a_0 de la page 39 est vérifiée.

([49]).

NB Ces conditions sont satisfaites si f est en même temps W-prélisse, cf. prop. 7. p. 31

Démonstration. On a a) $\Longrightarrow$ b) trivialement (faire $Y'' = Y/s$, $Y'' = Y/s'$ [lien avec l'assertion? Cf. p. 4.]).


b) $\Longleftrightarrow$ c) par le raisonnement de la proposition 7, car en termes de $X' = X_u = X \times_S (\mathbf{\Delta}^1, u)$, la condition b) pour $u : s_0 \longrightarrow s_1$ donné s'interprète dans le diagramme commutatif



[il y a quelques W redondants dans le diagramme original] où i_0, i_1, i'_0, i'_1 sont dans W à cause de l'hypothèse de W-prépropreté (stable par changement de base).

Donc p_0, p_1 sont [dans] W, donc $\varphi \in W$ si et seulement si $\varphi' \in W$, or $\varphi' \in W$ est la condition a_0.

Prouvons enfin que b), c) impliquent a). Comme c) (donc aussi b)) est stable par changement de base, il suffit de montrer ceci : Si S a un objet final e, alors pour tout $s \in \mathrm{Ob}\, S$, l'inclusion $X_s \xrightarrow{i} X$ est dans W. Or on a le diagramme commutatif [page 42]



qui montre bien $i = ui_s \in W$.

Dualement, si f est W-prélisse, alors la condition a_0 (f une W-pseudofibration) est équivalente à a_2 (f une W-fibration droite), et signifie aussi que les

$$s_1\backslash X \longrightarrow s_0\backslash X$$

sont dans W. Mais la notion de ‘W-fibration’ sur laquelle on tombe (si on ne se contente du minable a_0 !) est différente dans les deux cas duaux l'un de l'autre. On aimerait dans

45. On dira que f est *W-prépropre.*

46. NB a_1), a_2) sont notés pareil p. 4, mais a_0) a été oublié.

47. C'est essentiellement le a′) de p. 4

48. Il semblerait que ce soit ça, finalement, la ‘bonne notion’ de W-fibration, *équivalente* à a_1 et a_2, lesquelles seraient équivalentes entre elles. Cf. prop. 9, p. 48.

49. **Corollaire.** *Quand f est* Cat*-cofibrant, alors ces conditions équivalent aussi à ceci : $\forall\ u : s_0 \longrightarrow s_1$ dans S, $u_* : X_{s_0} \longrightarrow X_{s_1}$ est dans W.*

les deux cas trouver des W-fibrations 'hot-fortes' (condition b), tout au moins en mettant le paquet (s'il le faut) - i.e. pour f W-parfait. Ça revient donc à ceci.

Question : *Soient* $X \xrightarrow{f} S$, *avec* f W*-parfait,* S *contractile,* $s \in \mathrm{Ob}\, S$. *L'inclusion* $X_s \longrightarrow X$, *est-elle dans* W *?*

p. 32

On va supposer seulement que f est W-lisse et une W-fibration gauche `[plutôt que` f `est simplement une` W`-fibration à droite, i.e que` f `est` W`-prélisse et une` W`-pseudofibration]` (cf. prop. 8). On va se ramener au cas où X est même fibrant sur S, en introduisant $\Phi_S(X)$ `[catégorie fibrée définie par le foncteur` $S^\circ \longrightarrow \mathrm{Cat}$`,` $s \longmapsto s\backslash X$`]` et

[page 43]

$$X \xrightarrow{i_X} \Phi_S(X).$$

L'ennui, c'est que j'ai fait la théorie de HOT_W jusqu'à maintenant avec l'hypothèse (qui s'avère idiote) que $W \supseteq W_\infty$ - je serai donc obligé de revoir rapidement sous quelles hypothèses plus raisonnables sur W les résultats familiers sont valables. Par exemple j'aimerais que $i_X \in W$ ([50]), de sorte qu'on ait

$$\begin{array}{ccc} X_s & \xrightarrow[\text{car } X \text{ } W\text{-lisse}]{i_s \in W} & \Phi_S(X)_s = s\backslash X \\ {\scriptstyle j_s^X}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j_s^{\Phi_S(X)}} \\ X & \xrightarrow{i_X \in W} & \Phi_S(X), \end{array}$$

on voit donc que pour prouver que l'inclusion j_s^X est `[dans]` W, il suffit de prouver la même chose pour $\Phi_S(X)$, qui est fibrant (pas seulement W-lisse). De plus, l'hypothèse pseudo-fibration sur X passe sûrement à $\Phi_S(X)$ (je réserve les deux vérifications à plus tard ([51])). On est donc ramené au cas de

$$X \in \mathrm{Ob}\, \underline{\mathrm{Fib}}_0 S, \qquad S \text{ contractile},$$

à prouver que l'inclusion

$$X_s \longrightarrow X$$

est dans W. Je vais prouver ceci :

[page 44]

Lemme. *Soient* S *dans* Cat, $X \in \mathrm{Ob}\, \underline{\mathrm{Fib}}_0 S$, *et considérons, pour un* S' *dans* Cat,

$$\begin{array}{rcl} f & \longmapsto & f^*(X/S) = X \times_S (S', f) \\ \underline{\mathrm{Hom}}(S', S)^\circ & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Fib}}_0 S'. \end{array}$$

(Ce foncteur est défini grâce au fait que X *est fibrant sur* S, *et peut s'interpréter donc, à* S*-équivalence près, en termes d'un foncteur* $S^\circ \longrightarrow \mathrm{Cat}$ *… ([52])). Les flèches de* $\underline{\mathrm{Hom}}(S', S)$ *sont transformées en flèches* $\in W_{S'}^{\mathrm{d}}$.

En effet, en termes de foncteurs

p. 33

$$S'^\circ \longrightarrow \mathrm{Cat},$$

si X est définie par

$$S^\circ \xrightarrow{\mathscr{X}} \mathrm{Cat},$$

alors $f^*(X)$ est définie par $\mathscr{X} \circ f$, et la flèche

$$\mathscr{X} \circ f \longrightarrow \mathscr{X} \circ g$$

50. en fait, $i_X \in (W_\omega)_S^{\mathrm{d}} \subseteq W_S^{\mathrm{d}} \subseteq W_S$.
51. O.K.
52. **NB** $\Phi_S(X)$ était même déjà scindée, définie par le foncteur $s \longmapsto s\backslash X$.

définie par $u : f \longrightarrow g$ n'est autre que $\mathscr{X} * u$. Sa valeur en $s' \in \mathrm{Ob}\, S'$ est obtenue en prenant

$$u(s') : f(s') \longrightarrow g(s'),$$

d'où par $\mathscr{X}$

$$\mathscr{X}(u(s')) : \underbrace{\mathscr{X}(g(s'))}_{(\mathscr{X}\circ g)(s')} \longrightarrow \underbrace{\mathscr{X}(f(s'))}_{(\mathscr{X}\circ f)(s')}$$

([53]). Mais l'hypothèse $X \in \underline{\mathrm{Fib}}_0 S$ signifie que les $\mathscr{X}(v)$, $v \in \mathrm{Fl}(S)$, sont tous dans W. Donc $\mathscr{X}$ est dans W fibre par fibre, donc dans $W^{\mathrm{d}}_{S'}$. [page 45]

Corollaire 1. *Le foncteur du lemme, composé avec*

$$\underline{\mathrm{Fib}}_0 S' \longrightarrow \mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S') \overset{\text{déf}}{=} (\underline{\mathrm{Fib}}_0 S')(W^{\mathrm{d}}_{S'})^{-1}$$

se factorise par le groupoïde fondamental de $\underline{\mathrm{Hom}}$ *:*

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{Hom}}(S', S)^\circ & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Fib}}_0 S' \\ \downarrow & & \downarrow \\ \prod(\underline{\mathrm{Hom}}(S', S))^\circ & \longrightarrow & \mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S'). \end{array}$$

Si f, g sont dans une même composante connexe de $\underline{\mathrm{Hom}}(S', S)$*, alors f^*X et g^*X sont isomorphes (non canoniquement, en général) dans* $\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S')$.

Il est plus astucieux de ne pas fixer X et de considérer

$$\underline{\mathrm{Hom}}(S', S) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S), \mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S')) \qquad (*)$$

correspondant à

$$\begin{array}{ccccc} \underline{\mathrm{Hom}}(S', S) & \times & \mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S) & \longrightarrow & \mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S') \\ (f & , & \xi) & \longmapsto & f^*(\xi). \end{array}$$

Le lemme dira que les flèches de $S' \longrightarrow S$ sont transformées par $(*)$ en isomorphismes, d'où

$$\prod \underline{\mathrm{Hom}}(S', S) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S), \mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S')),$$

donc si $f, g : S' \rightrightarrows S$ sont deux foncteurs homotopes, alors p. 34 [page 46]

$$f^* \simeq g^* : \mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S) \rightrightarrows \mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S').$$

Il s'ensuit aussitôt ceci

Corollaire 2. *Si f est un homotopisme, $f^* : \mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S) \longrightarrow \mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S')$ est une équivalence de catégories.*

En effet, prenant $g : S \longrightarrow S'$ telle que

$$fg \sim \mathrm{id}_S, \qquad gf \sim \mathrm{id}_{S'},$$

on trouve que

$$g^* f^* \simeq (\mathrm{id}_S)^* = \mathrm{id}_{\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S)}$$
$$f^* g^* \simeq (\mathrm{id}_{S'})^* = \mathrm{id}_{\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S')},$$

53. à dégager un énoncé à part.


donc on trouve que (quitte à ajuster ces isomorphismes fonctoriels) f^* et g^* sont des équivalences quasi-inverses l'une de l'autre.

J'ai l'impression ([54]) que tout ça ne doit pas utiliser plus que les axiomes standard sur W comme localiseur fondamental, tout au plus W(2) au lieu de la forme faible W(2 bis).

Revenons à X lisse sur S contractile. Le corollaire 2 implique que

$$\begin{aligned} \mathrm{Hot}_W &\longrightarrow \mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S) \\ \xi &\longmapsto p_S^*(\xi), \end{aligned}$$

où $p_S : S \longrightarrow e$, est une équivalence. Donc dans la catégorie $\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S)$, X est isomorphe à un Cat-fibré de la forme $Z \times S \xrightarrow{\mathrm{pr}_2} S$, avec Z dans Cat. Or pour $X_1 = Z \times S \longrightarrow S$, [page 47]
il est immédiat que $X_{1\,s} \longrightarrow X_1$ est dans W, car un produit cartésien de flèches [dans] W (savoir id_Z et $s \longrightarrow S$) est dans W. (En fait, l'inclusion est même un homotopisme !) Notons maintenant que si X_0, X_1 sont deux objets dans $\underline{\mathrm{Liss}}_0 S$, tels qu'il existe une S-flèche $X_0 \longrightarrow X_1$ qui soit dans W^{d}_S, alors $X_{0\,s} \longrightarrow X_0$ est dans W si et seulement si $X_{1\,s} \longrightarrow X_1$ l'est. En effet, on a



qui prouve le résultat. p. 35

Il est vrai que le fait que $X = X_0$ et $X_1 = Z \times S$ soient isomorphes dans $\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S)$ n'implique pas, par lui-même, l'existence d'une chaîne d'isomorphismes provenant de [page 48]
flèches dans W^{d}_S. Mais en fait, si dans l'énoncé du corollaire 2 ci-dessus on compare X dans $\underline{\mathrm{Fib}}_0 S$ à $g^* f^*(X)$, grâce à une homotopie $\mathrm{id}_S \sim fg$, on trouve bel et bien une suite de foncteurs $\varphi_i : S \longrightarrow S$, avec $\varphi_0 = \mathrm{id}_S$, $\varphi_N = fg$, et φ_i et φ_{i+1} reliés par une flèche dans $\underline{\mathrm{Hom}}(S, S)$, donc on a une suite d'objets $X_i = \varphi_i^*(X)$ de $\underline{\mathrm{Fib}}_0 S$ (avec $X_0 = X$, $X_N = g^* f^* X$), et X_i et X_{i+1} reliés par une flèche *dans* $\underline{\mathrm{Fib}}_0 S$ (pas seulement dans $\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S)$), laquelle flèche est dans $W^{\mathrm{d}}_S = W^{\mathrm{f}}_S$. Donc on gagne, sous réserve de vérifications de routine diverses ([55]). Donc modulo celles-ci, on aura

Proposition 9 ([56], [57]). *Supposons que X dans* Cat$/S$ *soit une W-fibration à gauche (cf. prop. 8). Alors c'est même une W-fibration (au sens de b), page 40, où c'est appelé 'W-fibration* hot*-forte'), en d'autres termes, si $S'' \longrightarrow S'$ est sur S avec S'', S' contractiles, alors $X'' \longrightarrow X'$ est dans W ([58]). On a sans doute mieux : si $S'' \longrightarrow S'$ est un homotopisme, alors $X'' \longrightarrow X'$ est dans W.*

[page 49]

Prouvons (si nous pouvons) ce complément sympathique. Je précise que j'ai eu à faire l'hypothèse de W-prélissité (où de W-prépropreté) pour être sûr que l'image inverse $X \times_S S'$, par $f' : S' \longrightarrow S$, coïncide bien avec f^* sur les $\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W$ - autrement je n'ai aucune chance. 'On sait' (tout est à revoir !) que c'est O.K. dans les trois cas X W-lisse,

54. O.K.
55. O.K.
56. C'est ok en supposant que W est *fortement* saturé, i.e. $\mathrm{hot}_W(f)$ isomorphisme $\Longrightarrow f \in W$.
57. Donc W-fibration à gauche $\Longleftrightarrow$ W-fibration à droite $\Longleftrightarrow$ W-fibration.
58. on trouve seulement que $\mathrm{hot}_W(X'') \longrightarrow \mathrm{hot}_W(X')$ [est un] isomorphisme.


X W-propre, X une W-fibration (mais en quel sens ???). La vérification à faire (quand on travaille avec les W_S^{d}) est celle-ci :

$$\begin{aligned} &X \xrightarrow{i_X} \Phi_S(X) = Y \text{ est dans } W_S^{\mathrm{d}} \text{ (sans mérite), et} \\ &\text{le reste par tout changement de base.} \end{aligned} \tag{$*$}$$

Mais pour des $X, Y \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{Cat}/S$ qui sont W-prélisse, la W_S^{d}-équivalence coïncide avec W_S^{f}, laquelle est préservée par changement de base, ainsi que l'hypothèse sur X, Y. Donc on est tranquille.

On est ramené à prouver que si X est W-prélisse sur S et une W-pseudofibration, et si $S' \longrightarrow S$ est un homotopisme, alors $X' \longrightarrow X$ est dans W. Par l'argument de tantôt utilisant $X \longrightarrow \Phi_S(X)$, on se ramène au cas où X est fibrée scindée.

p. 36
[page 50]



La flèche $X' = f^*(X) \longrightarrow X$ s'interprète dans Hot_W comme

$$p'_!(f^*(\xi)) \longrightarrow p_!(\xi)\ , \qquad \text{où } \xi = \mathrm{hot}_{S,W}(X). \tag{$*$}$$

Je dis que cette flèche est [un] isomorphisme, i.e. que pour tout $\eta \in \mathrm{Hot}_W$, la flèche transposée

$$\mathrm{Hom}_W(p_!(\xi), \eta) \longrightarrow \mathrm{Hom}_W(p'_!(f^*(\xi)), \eta) \tag{$**$}$$

est [une] bijection. Admettant la formule d'adjonction, la flèche $(**)$ s'interprète comme

$$\mathrm{Hom}_W(\xi, \underbrace{p^*(\eta)}_{\eta_S}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_W(f^*(\xi), \underbrace{p'^*(\eta)}_{f^*(\eta_S)}),$$

i.e.

$$\mathrm{Hom}_W(\xi, \eta_S) \longrightarrow \mathrm{Hom}_W(f^*(\xi), f^*(\eta_S)),$$

que ce soit [un] isomorphisme résulte donc de f^* pleinement fidèle sur les $\mathrm{HOT}_W^{\mathrm{lc}}$. Or on a vu que f^* est une équivalence (cor. 2, page 46).

Je vais reprendre les propositions 9 et 8, un peu mal foutues.

[page 51]

Théorème 3. *On suppose que W satisfait à* W(1,2,3). *Soit $f : X \longrightarrow S$. Considérons les conditions suivantes.*

a) $\forall\ S'' \longrightarrow S'$ *sur S, avec S'', S'* contractiles, *$X'' \longrightarrow X'$ est dans W.*

a′) $\forall\ S'$ *sur S, avec S' contractile, et $s' \in S'$, l'inclusion*

$$X_{s'} \hookrightarrow X' = X \times_S S'$$

est dans W.

a_1) Comme a′), mais en supposant que S' a un objet final (au lieu de S' contractile).

a_2) Comme a′), mais en supposant que S' a un objet initial.

*b_1) f est W-*prépropre *(i.e. a′) est satisfait quand s' est un objet final de S', sans autre condition sur S' dans* Cat$/S$*), et de plus pour toute flèche $s_0 \longrightarrow s_1$ dans S, la flèche induite $X/s_0 \longrightarrow X/s_1$ est dans W (i.e. a′* [plutôt a]*) est satisfait pour $Y/s_0 \longrightarrow Y/s_1$* [plutôt $S/s_0 \longrightarrow S/s_1$]*).*

p. 37

b_2) *f est W-*prélisse *(i.e. a') est satisfait quand s' est un objet initial de S', sans autre condition sur S'), et de plus les flèches $s_0\backslash X \longrightarrow s_1\backslash X$* `[plutôt` *$s_1\backslash X \longrightarrow s_0\backslash X$* `]` *(pour $s_0 \longrightarrow s_1$ dans S) sont dans W, (i.e. a'* `[plutôt a]`*) satisfait pour $s_1\backslash Y \longrightarrow s_0\backslash Y$* `[plutôt` *$s_1\backslash S \longrightarrow s_0\backslash S$* `]`*).*

c_1) *f est W-prépropre et une W-pseudofibration, i.e. la condition a') est satisfaite dans les deux cas suivants : 1°) s' est un objet final de S', 2°) $S' = \mathbf{\Delta}^1$.*

c_2) *f est W-prélisse et une W-pseudofibration, i.e. a') dans les deux cas : 1°) s' est objet initial de S', 2°) $S' = \mathbf{\Delta}^1$.*

Toutes ces 8 conditions sont équivalentes. Elles impliquent la suivante :

d) Soit $S'' \xrightarrow{u} S'$ un homotopisme dans Cat$/S$*, et considérons $u_X : X'' \longrightarrow X'$. Alors* $\mathrm{hot}_W(u_X)$ *est* `[un]` *isomorphisme. (Donc si W est fortement saturé, $u_X \in W$. Donc sous cette condition sur W, d) équivaut aux conditions précédentes.)*

Définition 4. On dit que $f : X \longrightarrow Y$ dans Cat est une *W-fibration*, si elle satisfait les conditions équivalentes a) à c_2) de la proposition 9. [page 52]

Corollaire 1. *Si f est W-propre ou W-lisse, pour que f soit une W-fibration, il faut et il suffit que f soit une W-pseudofibration, i.e. que pour $S' = \mathbf{\Delta}^1 \longrightarrow S$, les inclusions des deux fibres*

$$X'_0 \xrightarrow{i_0} X' \xleftarrow{i_1} X'_1$$

de $X' = X \times_S S'$ soient dans W.

Corollaire 2. *Supposons f* Cat*-fibrant. Alors f est une W-fibration si et seulement si pout toute flèche $u : s \longrightarrow s'$ dans S, $u^* : X_{s'} \longrightarrow X_s$ est dans W. Énoncé dual si f est* Cat*-cofibrant.*

Corollaire 3. *Supposons f W-prépropre et W-prélisse (par exemple f W-parfait). Alors f est une W-fibration.*

Proposition 10. *Soit $f : X \longrightarrow Y$ une flèche dans $\underline{\mathrm{Fib}}_W S$ ([59]) (sous-catégorie pleine de* Cat$/S$ *formée des W-fibrés sur S). Si $\forall\ s \in S$, $f_s : X_s \longrightarrow Y_s$ est dans W, alors $f \in W$.*

Considérons p. 38

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad f \quad} & Y \\ & {\scriptstyle i_X}\searrow \qquad \swarrow{\scriptstyle i_Y} & \\ & \Phi_S(X) \xrightarrow[\Phi_S(f)]{} \Phi_S(Y), & \end{array}$$

où $i_X, i_Y \in W$, donc $\Phi_S(f) \in W \Rightarrow f \in W$. Or le fait que X `[est]` W-fibrée sur S implique que $i_X \in W_S^{\mathrm{f}}$ (il suffit même que X soit prépropre `[plutôt prélisse]` sur S), itou pour Y, i_Y. Donc l'hypothèse $f \in W_S^{\mathrm{f}}$ implique $\Phi_S(f) \in W_S^{\mathrm{f}}$, donc $\Phi_S(f) \in W$ par `[la]` proposition 5 (page 29).

p. 39

[page 53]

IV Sur l'axiome W(4) et ses variantes.

([60]). J'ai passé des jours à essayer de prouver que toutes ces variantes sont équivalentes. Je vais donner une liste de celles, parmi ces variantes, qui avec le recul me paraissent encore avoir une utilité. (Avec des notations différentes de celles des pages 13-14.)

59. X et Y tous deux prépropres ou tous deux prélisses suffit.

60. Cf. aussi partie VI (HOT_W), p. 186-196

W(4a) Toute W-fibration (cf. th. 3, p. 51, déf. 3, p. 52) est ultraforte, ce qui revient à ceci: pour

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{q} & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ Y & \xleftarrow{p} & Y' \end{array}$$

cartésien dans Cat, si $f \in \underline{\mathrm{Fib}}_W$, $p \in W$, alors $q \in W$.

W(4a′) Comme a), en supposant $f \in \mathrm{Parf}_\omega$, i.e. f W_ω-parfait (donc une W_ω-fibration), où $W_\omega \subseteq W$ est la plus petits partie Σ de Fl(Cat) satisfaisant W(1, 2 bis, 3).

W(4b) Soit un diagramme commutatif $\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & {\scriptstyle p}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle q} & \\ & S & \end{array}$ dans Cat, avec $p, q \in \mathrm{Fib}_W$, $f \in W$. Alors $\forall s \in S$, $f_s : X_s \longrightarrow Y_s$ `[est dans` W`]`.

W(4b′) Comme b), en supposant `[de plus]` X et Y fibrés scindés sur S, f compatible avec `[les]` scindages (donc foncteur cartésien).


W(4b″) Comme b), en supposant p, q *W-parfaits.*

W(4c) Soit $f : X \longrightarrow Y$, avec $f \in \mathrm{Fib}_W \cap W$, alors les fibres de f sont W-asphériques.

W(4c′) Comme c), en supposant $f \in \mathrm{Parf}_\omega \cap W$. (C'est l'ancien W(4b″), dépouillé du W_∞-parasite.)

J'ai cerclé les notions `[encadrées ici]` qui ont été vraiment utiles. Pratiquement, on peut parier que c'est la notion la plus forte, W(4a), qui est la seule importante. Voici les implications tautologiques (à l'exception de W(4a′) $\Longrightarrow$ W(4b), qui est démontré dans la démonstration de la proposition 4 (pages 6-10) ([61])). `[page 54]`

p. 40



J'ai surtout sué pour montrer que c′) $\Longrightarrow$ c), ou c) $\Longrightarrow$ b), sans y arriver. L'effort m'a permis de me débarrasser de diverses idées fausses, et de les remplacer par des justes, cf. plus bas. Il y a quand même un résultat positif qui surnage :

Proposition 1. *La condition b) (et sans doute même b′) et b″) ([62]), mais je ne vais pas le prouver ici …) implique sans doute a) pour $\bar{W}$, le saturé fort de W. En tous cas,*

61. Cette démonstration utilise une notion plus forte de W-fibration que celle du théorème 3, p. 51.

62. et en supposant dans le cas de b″, que W satisfait la condition des limites inductives W(6 bis), cf. prop. 5 du 'corollaire' de la, page 14.

si W est fortement saturé, les conditions a), a′), b) (et sûrement aussi b′) et b″)) sont équivalentes.

Démonstration de b) $\Longrightarrow$ a), quand W est fortement saturé. En fait, moyennant b) (et sans même supposer W fortement saturé), nous allons prouver que si on a

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{q} & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ Y & \xleftarrow{p} & Y' \end{array}$$

cartésien dans Cat, avec f une W-fibration, et $p \in W$, alors $q \in \bar{W}$, i.e. $\mathrm{hot}_W(q)$ `[est un]` [page 55]
isomorphisme. Pour ceci, nous interprétons la flèche q dans Hot_W de la façon suivante. Soit

$$\xi = \mathrm{hot}_{Y,W}(X/Y), \qquad \xi' = p^*(\xi),$$

qui dit que q s'identifie à la flèche canonique p. 41

$$H_\bullet^{\mathrm{HOT}_W}(Y', \xi') \longrightarrow H_\bullet^{\mathrm{HOT}_W}(Y, \xi) \qquad \text{dans } \mathrm{Hot}_W = \mathrm{HOT}_W(e), \tag{$*$}$$

où on note de plus que $\xi \in \mathrm{HOT}_W(Y)$ est un coefficient *localement constant* sur Y.

Établissons d'abord cette interprétation de q. Notons que comme $X \in \underline{\mathrm{Fib}}_W Y$, l'image inverse $\xi' = p^*(\xi)$ n'est autre que $\mathrm{hot}_{Y',W}(X' = X \times_Y Y')$. D'autre part, si $g : Y \longrightarrow e$, $g' : Y' \longrightarrow e$ sont les flèches structurales, les deux membres de $(*)$ s'interprètent resp. comme $g'_!(\xi')$ et $g_!(\xi)$ (les $g'_!$ et $g_!$ au sens du prédérivateur HOT_W). Or le calcul de $g'_!$, $g_!$ nous donne que les deux membres s'identifient resp. à

$$\mathrm{hot}_W(X'), \qquad \mathrm{hot}_W(X),$$

et nous admettons que la flèche

$$\mathrm{hot}_W(X') \longrightarrow \mathrm{hot}_W(X)$$

n'est autre que $\mathrm{hot}_W(q)$. D'ailleurs, comme X est W-fibrée sur S, par définition pratiquement, ξ est dans $\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S)$. Donc il nous suffira de prouver le

Corollaire. *Supposons que W satisfait à W(4b), et soit $p : S' \longrightarrow S$ dans W, $\xi \in \mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S)$, $\xi' = p^*(\xi)$. Alors* [page 56]

$$H_\bullet(S', \xi') \xrightarrow{\sim} H_\bullet(S, \xi)$$

est un isomorphisme dans Hot_W.

Démonstration. Il suffit de prouver que pour tout $\eta \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{Hot}_W$ on a une bijection pour les $\mathrm{Hom}(-, \eta)$. Par la formule d'adjonction sur S, S', cette application entre les Hom dans Hot_W s'identifie `[à]`

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{HOT}_W(S)}(\xi, \eta_S) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathrm{HOT}_W(S')}(\xi', \eta_{S'}),$$

où $\eta_S = p^*(\eta)$, $\eta_{S'} = p'^*(\eta)$ `[plutôt` $\eta_S = g^*(\eta)$`,` $\eta_{S'} = g'^*(\eta)$`, où` $g : S \longrightarrow e$`,` $g' : S' \longrightarrow e$ `sont les flèches structurales]`, donc $\eta_{S'} = p^*(\eta_S)$, et la flèche $(*)$ est la flèche sur les Hom induite par le foncteur

$$p^*_{\mathrm{lc}} : \mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S) \longrightarrow \mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S').$$

Or moyennant l'axiome W(4b) (que nous n'avons pas utilisé jusqu'à présent), ledit foncteur est une *équivalence de catégories* si $p \in W$ (cf. VI, p. 204).

q.e.d.

De peur de les oublier, je vais maintenant faire une liste des petites questions que j'ai p. 42
élucidées chemin faisant en gribouillant. [page 57]

1°) Si X, Y sont W-lisses sur S, et $f : X \longrightarrow Y$ un S-morphisme tel que $f_s : X_s \longrightarrow Y_s$ soit W-lisse pour tout $s \in \mathrm{Ob}\, S$, il ne s'ensuit *pas* que f soit W-lisse. Mais c'est pourtant vrai quand X et Y sont fibrées scindées sur S (ce qui implique déjà leur W-lissité sur S), et f compatible avec les scindages et a fortiori cartésien. Énoncé dual pour les catégories cofibrées scindées et les foncteurs strictement cartésiens entre elles qui sont W-propres fibre par fibre : ils sont W-propres.

2°) J'étais intéressé, dans un cas de catégories fibrées scindées X, Y sur S et d'un foncteur strictement cartésien $f : X \longrightarrow Y$, supposé W-parfait fibre par fibre, de conclure que f soit aussi W-parfait. (C'était un cas où de plus on sait que X, Y sont aussi des W-fibrés sur S, i.e. les fonteurs changement de base $X_{s'} \longrightarrow X_s$, $Y_{s'} \longrightarrow Y_s$ sont dans W. Mais ça n'a pas beaucoup servi …) La question qui restait, en 1°), était celle de la *W-propreté* de f. Mais c'est sans espoir (même pour $Y = S$), en vertu de la brillante

Proposition 2. *Supposons que* $S = 0 \begin{array}{c} \nearrow a \\ \\ \searrow b \end{array}$ *, et soit Z une catégorie sur S. Alors $\Phi(Z)$ est propre sur S si et seulement si $Z = \emptyset$.*

Prenons alors dans 2°) ci-dessus $X = \Phi(Z)$, $Y = S$, $f : \Phi(Y) \longrightarrow S$ [plutôt $f : \Phi(Z) \longrightarrow S$] le morphisme structural (donc les f_s sont W-parfaits), alors f n'est propre que si $X = \emptyset$. Pourtant, si on prend Z W-fibrée sur S, $\Phi(Z)$ l'est aussi, et on a un contre-exemple à 2°).

Mais on s'est quand même convaincu du résultat suivant :

Proposition 3. *Soient X, Y catégories fibrées scindées sur S, $f : X \longrightarrow Y$ S-foncteur strictement cartésien, tel que pour tout $s \in S$, $f_s : X_s \longrightarrow Y_s$ soit* W-fibrant. [page 58] *Alors,* si W satisfait W(4a), *f est W-fibrant.*

(J'espérais avoir que f est W-fibrant 'à l'œil', pour prouver que W(4c) implique W(4b). Mais j'étais obligé de supposer W(4a) …)

V Sommes amalgamées et carrés W-cocartésiens dans Cat

p. 43
[page 59]

1 Généralités sur $U \overset{i}{\hookrightarrow} X \overset{j}{\hookleftarrow} T$, et les sommes amalgamées.

1.1 Données de recollement entre un ouvert et un fermé.

Soit X dans Cat, U un ouvert dans X, T le complémentaire fermé. (**NB** Les ouverts correspondent bien aux ouverts de $\mathrm{Ob}\, X$, topologisé par sa relation de préordre naturelle $x \leq y \iff \mathrm{Hom}_X(x,y) \neq \emptyset$, de même pour les fermés. Les topologies associées aux relations de préordre sont celles où toute intersection d'ouverts est encore ouverte, i.e. toute réunion de fermés est encore fermée. Donc les ouverts d'une telle topologie sont les fermés d'une topologie duale, correspondant à la relation de préordre opposée. La relation de préordre associée à la topologie est

$$x \leq y \qquad \iff \qquad x \in \overline{\{y\}},$$

la topologie associée au préordre sur I est celle pour laquelle les ouverts sont les réunions d'ensembles de la forme I/x (lesquels forment une base d'ouverts), ou encore les *'cribles'* ($x \in U$, $y \leq x \Longrightarrow y \in U$), les fermés sont les réunions d'ensembles $x\backslash I$, c'est-à-dire les cocribles. Pour toute partie A de I, il y a un plus petit ouvert contenant A, qui est aussi son plus petit voisinage, c'est la réunion des I/x pour $x \in A$. Et dualement il y a un plus grand fermé contenu dans A, dont le complémentaire est le plus petit ouvert contenant $B = I\backslash A$, donc $\bigcup_{x\in B} I/x$. L'adhérence de A est la réunion des adhérences $x\backslash I$ de ses points.)

[page 60]

La situation (X,U,T) se reconstitue, à isomorphisme unique près, par la connaissance de

1°) Les deux catégories U, T.

2°) Le bifoncteur $\begin{cases} H : U^\circ \times T \longrightarrow \mathrm{Ens} \\ H(u,t) = \mathrm{Hom}_X(u,t). \end{cases}$

De plus, ces données 1°) 2°) en sont soumises à aucune restriction. On a, plus exactement

Proposition 1. *Un isomorphisme* [plutôt une équivalence de catégories] *entre la catégorie $\mathcal{T}$ dont les objets sont les triples (X,U,T), avec $X \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{Cat}$, $U \in \mathrm{Ouv}(X)$, $T \in \mathrm{Ferm}(X)$, U et T complémentaires l'un de l'autre, les morphismes de (X,U,T) dans (X',U',T') étant les foncteurs $f : X \longrightarrow X'$ qui induisent $U \longrightarrow U'$, $T \longrightarrow T'$ (d'où $U = f^{-1}(U')$, $T = f^{-1}(T')$), avec la catégorie $\mathcal{T}'$ des triples (U,T,H),* p. 44 *de deux catégories U, T et d'un bifoncteur*

$$H : U^\circ \times T \longrightarrow \mathrm{Ens}$$

(ou encore un préfaiscau $U^\circ \longrightarrow T^\vee$ sur U, donc un objet de $\underline{\mathrm{Hom}}(U^\circ, T^\vee)$)), un morphisme de (U,T,H) dans (U',T',H') étant un triple

$$(f_U, f_T, u) \qquad \begin{cases} \left.\begin{array}{rcl} f_U : & U & \longrightarrow & U' \\ f_T : & T & \longrightarrow & T' \end{array}\right\} \text{des foncteurs} \\ u : H \longrightarrow H' \circ (f_U^\circ \times f_T), \\ \text{i.e. } H(u,t) \longrightarrow H'(f_U(u), f_T(t)) \\ \text{un homomorphisme fonctoriel} \\ \text{(flèche dans } (U \times T^\circ)^\wedge \simeq \underline{\mathrm{Hom}}(U^\circ, T^\vee))), \end{cases}$$

composition des flèches évidente.

Si $U \hookrightarrow X \hookleftarrow T$ est un triple, et

$$f_{U'} : U' \longrightarrow U,\ f_{T'} : T' \longrightarrow T$$

des flèches dans Cat, il y a une façon privilégiée de 'recoller' U' et T', de façon à ce que l'objet (X', U', T') s'envoie dans (X, U, T) en induisant

$f_{U'}$, $f_{T'}$: [page 61]

$$\begin{array}{ccccc} U' & \xhookrightarrow{i'} & X' & \xhookleftarrow{j'} & T' \\ {\scriptstyle f_{U'}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle f_{T'}} \\ U & \xhookrightarrow{i} & X & \xhookleftarrow{j} & T, \end{array}$$

elle s'obtient à l'aide des bifoncteurs

$$\begin{cases} H'(u', t') \overset{\text{déf}}{=} H(f_{U'}(u'), f_{T'}(t')) \\ \text{i.e. } H' = H \circ (f_{U'}^{\circ} \times f_{T'}). \end{cases}$$

Ce triple, i.e. cet objet de $\mathcal{T}$, représente le foncteur suivant sur $\mathcal{T}$:

$$(X'', U'', T'') \longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathrm{Cat}}(U'', U) \times \mathrm{Hom}_{\mathrm{Cat}}(T'', T),$$

i.e. on a pour tout objet (X'', U'', T'') de $\mathcal{T}$ une bijection canonique, fonctorielle en cet objet

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{T}}((X'', U'', T''), (X', U', T')) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{Cat}}(U'', U) \times \mathrm{Hom}_{\mathrm{Cat}}(T'', T). \qquad (*)$$

Nul doute qu'on a même

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{T}}((X'', U'', T''), (X', U', T')) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Cat}}(U'', U) \times \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Cat}}(T'', T), \qquad (**)$$ p. 45

tout aussi fonctoriel, dont $(*)$ se déduit en passant aux ensembles d'objets. On dit que le triple (X', U', T') est le triple *induit* par le triple (X, U, T), via les foncteurs $f_{U'}$, $f_{T'}$.

NB Si $f_{U'}$, $f_{T'}$ sont pleinement fidèles, alors il en est de même de $f : X' \longrightarrow X$. Nous utiliserons cette opération de recollement privilégié surtout quand $U' = U$, $f_{U'} = \mathrm{id}_U$, ou inversement $T' = T$, $f_{T'} = \mathrm{id}_T$.

1.2 Relation avec le recollement des topos.

La situation d'un triple

$$(\mathcal{X}, \mathcal{U}, \mathcal{T})$$

d'un topos $\mathcal{X}$, d'un ouvert $\mathcal{U}$ de $\mathcal{X}$, et d'un

sous-topos fermé complémentaire, est toute similaire (**NB** Si $\mathcal{X} = \mathrm{Top}(X)$, avec X dans Cat, alors $\mathrm{Ouv}(\mathcal{X}) \simeq \mathrm{Ouv}(X)$, puisque les ouverts correspondent aux sous-faisceaux du faisceau final sur $\mathcal{X}$, i.e. du préfaisceau final sur X. Cette bijection est compatible avec le passage aux complémentaires.) La théorie des topos dit que les couples $(\mathcal{X}, \mathcal{U}, \mathcal{T})$ [page 62] [plutôt triples] se reconstituent, à équivalence définie à isomorphisme unique près, à l'aide d'un triple

$$\begin{cases} \mathcal{U},\ \mathcal{T} \text{ deux topos} \\ \varphi : \mathrm{Fais}\,(\mathcal{U}) \longrightarrow \mathcal{T} \text{ un foncteur exact à gauche ('accessible')}, \end{cases}$$

ce foncteur φ étant obtenu, quand on part de

$$\mathcal{U} \xrightarrow{i} \mathcal{X} \xleftarrow{j} \mathcal{T},$$

comme

$$\varphi = j^* i_*.$$

De plus, le triple $(\mathcal{U}, \mathcal{T}, \varphi)$ peut être choisi arbitrairement, avec la seule restriction (pratiquement anodine, car toujours satisfaite pour tous les foncteurs naturels qu'on rencontre) que φ soit (en plus d'être exact à gauche) 'accessible'.

Dans le cas actuel $\mathcal{X} = \mathrm{Top}(X)$, $\mathcal{U} = \mathrm{Top}(U)$, $\mathcal{T} = \mathrm{Top}(T)$, le foncteur $\varphi = j^* i_*$ est non seulement exact à gauche, mais même il commute aux $\varprojlim$ quelconques, puisqu'il en est ainsi (toujours) de i_*, et aussi (parce que le j topossique est induit par le $j : T \longrightarrow X$ catégorique) de j^*. En fait, on trouve ceci : p. 46

Proposition 2 : *Considérons une situation de recollement de deux topos $\mathcal{U}$, $\mathcal{T}$ par $\varphi : \mathrm{Fais}\,\mathcal{U} \longrightarrow \mathrm{Fais}\,\mathcal{T}$, foncteur exact à gauche. Supposons que $\mathcal{U} = \mathrm{Top}(U)$, $\mathcal{T} = \mathrm{Top}(T)$, avec U et T dans* Cat*. Pour que le topos recollé $\mathcal{X}$ soit équivalent à un topos $\mathrm{Top}(X)$, avec X dans* Cat*, il faut et il suffit que le foncteur de recollement φ commute aux $\varprojlim$ quelconques, ou ce qui revient au même, qu'il ait un adjoint à gauche :* [page 63]

$$\psi : \underbrace{\mathrm{Fais}\,\mathcal{T}}_{=T^\wedge} \longrightarrow \underbrace{\mathrm{Fais}\,\mathcal{U}}_{=U^\wedge}.$$

On s'attend dès lors que la donnée de recollement φ, ou ce qui revient au même le foncteur ψ ayant un adjoint à droite, i.e. commutant aux $\varinjlim$ quelconques, revient à celle d'une donnée de recollement H

$$H : U^\circ \times T \longrightarrow \mathrm{Ens}$$

pour U et T. Mais on sait bien que les foncteurs $\psi : T^\wedge \longrightarrow \mathcal{C}$ dans une catégorie $\mathcal{C}$ avec $\varinjlim$ quelconques, qui commutent auxdites $\varinjlim$, forment une catégorie équivalente (par le foncteur $\psi \longmapsto \psi | T(\subseteq T^\wedge)$) à celle des foncteurs

$$\psi_0 : T \longrightarrow \mathcal{C} \quad (= \underbrace{U^\wedge}_{\underline{\mathrm{Hom}}(U^\circ, \mathrm{Ens})} \text{ en l'occurrence}),$$

et la donnée d'un tel foncteur ψ_0 revient bien à celle d'un H. Donc [page 64]

Corollaire. *La catégorie des données de recollement topossique $\varphi : U^\wedge \longrightarrow T^\wedge$ entre* $\mathrm{Top}(U)$, $\mathrm{Top}(T)$*, telles que le topos recollé soit un 'topos* paradisiaque*', i.e. équivalent à un topos de la forme $X^\wedge$ (avec X dans* Cat*), est équivalente à celle des données de recollement $H : U^\circ \times T \longrightarrow$ Ens entre U et T. La donnée topossique φ associée à H est le foncteur adjoint à droite de $T^\wedge \longrightarrow U^\wedge$ déduit de $T \xrightarrow{H} U^\wedge$ par prolongement commutant aux $\varinjlim$, ou encore elle est donnée par*

$$\varphi(\underbrace{F}_{\in U^\wedge})(t) \simeq \mathrm{Hom}_{U^\wedge}(H(t), F),$$

où dans le second membre H est interprété comme un foncteur $T \longrightarrow U^\wedge$. Le topos recollé par φ est canoniquement équivalent à $\mathrm{Top}(X)$*, où X est l'objet de* Cat *obtenu par recollement à l'aide de H.*

Du point de vue de la théorie des faisceaux, cela donne l'interprétation de H, comme exprimant le foncteur

$$\varphi = j^* i_* : U^\wedge \longrightarrow T^\wedge$$

par la formule précédente.

p. 47
[page 65]

1.3 Flèches dans Cat, de source ou but un objet recollé (X, U, T).

Quand (X, U, T) est donné par une donnée de recollement

$$U,\ T,\ H : U^\circ \times T \longrightarrow \mathrm{Ens},$$

les flèches

$$f : X' \longrightarrow X$$

dans Cat se décrivent immédiatement ainsi : la donnée de f définit d'abord

$$U' = f^{-1}(U), \qquad T' = f^{-1}(T),$$

couple d'un ouvert de X' et du fermé complémentaire, de sorte que cette donnée équivaut à celle de

1°) un couple (U', T') dans X'

2°) un morphisme (dans $\mathcal{T}$) de (X', U', T') dans (X, U, T), ce qui équivaut par 1.1 à un triple

$$\begin{cases} f_{U'} : & U' & \longrightarrow & U \\ f_{T'} : & T' & \longrightarrow & T \\ u : & H_{U',T'} & \longrightarrow & H \circ (f_{U'}^\circ \times f_{T'}), \end{cases}$$

où on a posé

$$\begin{cases} H_{U',T'} : U'^\circ \times T' \longrightarrow \mathrm{Ens} \\ H_{U',T'}(u', t') = \mathrm{Hom}_{X'}(u', t'), \end{cases}$$

i.e. $H_{U',T'}$ est la donnée de recollement qui conrrespond au triple (X', U', T') dans $\mathcal{T}$.

[page 66]

Nous serons plus intéressés par la situation inverse, i.e. par la question de déterminer les foncteurs

$$\underbrace{X}_{=X_{U,T,H}} \longrightarrow X'$$

de X, obtenu par (U, T, H), dans un objet quelconque de Cat. On trouve tautologiquement

Proposition 3. $\mathrm{Hom}_{\mathrm{Cat}}(X, X')$ *est en correspondance bijective canonique, fonctorielle en* X' *dans* Cat*, avec l'ensemble des triples*

p. 48

$$\begin{cases} \left.\begin{array}{l} f_U : U \longrightarrow X' \\ f_T : T \longrightarrow X' \end{array}\right\} \text{flèches dans Cat} \\ u : H \longrightarrow H_{X'}(f_U^\circ \times f_T),\ \text{flèche dans } \underline{\mathrm{Hom}}(U^\circ \times T, \mathrm{Ens}), \end{cases} \qquad [(*)]$$

où pour tout X' *dans* Cat*, on a posé*

$$H_{X'} = ((x, y) \longmapsto \mathrm{Hom}_{X'}(x, y)) : X'^\circ \times X' \longrightarrow \mathrm{Ens}.$$

Sûrement on aura même un isomorphisme de catégories

$$\underline{\mathrm{Hom}}(X, X') \simeq \text{catégorie des triples } (f_U, f_T, u) \text{ comme dans } (*).$$

[page 67]

1.4 Construction de sommes amalgamées à partir d'une immersion ouverte où fermée.

Pour une construction d'une sorte de somme amalgamée, en termes d'un triple $(X, U, T) + \ldots$, qui soit symétrique en U, T, j'ai envie de regarder d'abord la situation 'mixte', d'un diagramme en traits pleins

$$\begin{array}{ccccc} U & \xhookrightarrow{i} & X & \xhookleftarrow{j} & T \\ {\scriptstyle f_U}\downarrow & & \vdots\,{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle f_T} \\ U' & \xhookrightarrow{i'} & X' & \xhookleftarrow{j'} & T', \end{array} \qquad (*)$$

qu'on aimerait compléter 'canoniquement', si faire se peut, en un morphisme de triples (i.e. en une flèche dans $\mathcal{T}$). L'idée naturelle, c'est que le X' qui s'y insère serait la limite inductive, dans Cat, du diagramme initial. Si $T' = T$, $f_T = \mathrm{id}_T$, cela signifie donc que X' s'identifie à la somme amalgamée $X \amalg_U U'$, et inversement si $U' = U$, $f_U = \mathrm{id}_U$.

Désignons par X' la somme amalgamée `[plutôt la limite inductive]`, et explicitons, pour X'' quelconque dans Cat, l'ensemble des flèches g de X' dans X'', comme foncteur en X''. C'est l'ensemble des triples

$$(g_X, g_{U'}, g_{T'}) \qquad \begin{cases} g_X : X \longrightarrow X'' \\ g_{U'} : U' \longrightarrow X'' \\ g_{T'} : T' \longrightarrow X'' \end{cases} \quad \text{avec} \quad \begin{array}{l} g_X \circ i = g_{U'} f_U \\ g_X \circ j = g_{T'} f_T. \end{array} \qquad (*)$$

p. 49

$$\begin{array}{ccccc} U & \xhookrightarrow{i} & X & \xhookleftarrow{j} & T \\ {\scriptstyle f_U}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g_X} & & \downarrow{\scriptstyle f_T} \\ U' & & & & T' \\ & {\scriptstyle g_{U'}}\searrow & \downarrow & \swarrow{\scriptstyle g_{T'}} & \\ & & X'' & & \end{array}$$

Notons que pour un tel triple, g_X est partiellement connu déjà en termes de $g_{U'}$, $g_{T'}$, par ses restrictions $g_X \circ i$ et $g_X \circ j$ à U et T respectivement, par les formules

$$g_U = g_{U'} f_U, \qquad g_T = g_{T'} f_T.$$

Donc la donnée d'un triple $(*)$ équivaut à celle d'un triple [page 68]

$$(g_{U'}, g_{T'}, g_X) \qquad \begin{cases} g_X \text{ une flèche } X \longrightarrow X'' \text{ correspondant à} \\ g_U = g_{U'} \circ f_U \text{ et } g_T = g_{T'} \circ f_T \text{ déjà donnés (via } g_{U'},\, g_{T'}), \end{cases}$$

donc en vertu de 1.3. cela correspond à

$$(g_{U'}, g_{T'}, u) \qquad \begin{cases} g_{U'} : U' \longrightarrow X'' \\ g_{T'} : T' \longrightarrow X'' \\ u : H \longrightarrow \underbrace{H_{X''}\left((g_{U'} \circ f_U)^\circ \times (g_{T'} \circ f_T)\right)}_{(u,t) \longmapsto \mathrm{Hom}_{X''}(g_{U'} f_U(u), g_{T'} f_T(t))}. \end{cases} \qquad (*)$$

On va interpréter la donnée de u, en termes d'un foncteur

$$F^* = (H' \longmapsto H' \circ F) : \underline{\mathrm{Hom}}(U'^\circ \times T', \mathrm{Ens}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(U^\circ \times T, \mathrm{Ens}) \qquad (**)$$

où

$$F : U^\circ \times T \longrightarrow U'^\circ \times T' \qquad \text{est donné par } F = f_U^\circ \times f_T.$$

On a un objet $H'' = H''_{g_{U'}, g_{T'}}$ de la catégorie source de $(**)$ déterminé en termes du couple $(g_{U'}, g_{T'})$, par

$$H''(u', t') = \mathrm{Hom}_{X''}(g_{U'}(u'), g_{T'}(t')),$$

et le bifoncteur but de la flèche u dans $(*)$ s'interprète comme

$$F^*(H'') = H'' \circ F : (u, t) \longmapsto \underbrace{H''(f_U(u), f_T(t))}_{=\mathrm{Hom}(g_{U'} f_U(u), g_{T'} f_T(t))} .$$

Ainsi, u s'interprète comme une flèche

$$u : H \longrightarrow F^*(H'').$$

Or le foncteur F^* a un adjoint à gauche $F_!$, i.e. on a

$$\mathrm{Hom}(H, F^*(H'')) \simeq \mathrm{Hom}(F_!(H), H''). \qquad (***)$$

avec p. 50

$$F_! : \underline{\mathrm{Hom}}(U^\circ \times T, \mathrm{Ens}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(U'^\circ \times T', \mathrm{Ens}). \qquad \texttt{[page 69]}$$

Posons

$$H' = F_!(H) : U'^\circ \times T' \longrightarrow \mathrm{Ens},$$

c'est un bifoncteur bien déterminée par la seule donnée du diagramme initial $(*)$ p. 67, ou ce qui revient au même, en termes de

$$(U, T, H, f_U : U \longrightarrow U', f_T : T \longrightarrow T').$$

Et on voit que la donnée d'une flèche $X' \longrightarrow X''$, X'' objet variable de Cat, équivaut à celle de

$$g_{U'} : U' \longrightarrow X'', \ g_{T'} : T' \longrightarrow X'', \ u : H' \longrightarrow H'' = H_{X''}(g_{U'}^\circ \times g_{T'}),$$

c'est à dire, en vertu de 1.3., à celle d'une flèche

$$X'_0 \longrightarrow X'',$$

où X'_0 désigne l'objet de Cat déduit de U', T' par recollement au moyen de H'. Cela montre donc que la limite inductive cherchée n'est autre que X'_0. On a ainsi trouvé le

Théorème 1. *La limite inductive X' dans* Cat *du diagramme $(*)$ page 67, défini en termes d'un triple (X, U, T) dans $\mathcal{T}$ et de flèches $f_U : U \longrightarrow U'$, $f_T : T \longrightarrow T'$ dans* Cat*, existe (sans mérite) et les flèches canoniques* [page 70]

$$U' \overset{i'}{\hookrightarrow} X' \overset{j'}{\hookleftarrow} T'$$

sont des immersions ouvertes et fermées complémentaires l'une de l'autre. La donnée de recollement qui définit X' via U', T' est donnée par

$$H' = (\underbrace{f_U^\circ \times f_T}_{F})_!(H) : U'^\circ \times T' \longrightarrow \mathrm{Ens},$$

où H est la donnée de recollement qui définit X, i.e. $H : U^\circ \times T \longrightarrow$ Ens est le bifoncteur $(u, t) \longmapsto \mathrm{Hom}_X(u, t)$.

Ainsi on a, pour u' dans U' et t' dans T'

$$\mathrm{Hom}_{X'}(u',t') = F_!(H)(u',t'),$$

et il reste à expliciter $F_!(H)$. Ici $F = f_U^\circ \times f_T$ est un foncteur covariant sur $U^\circ \times T$, on peut l'interpréter comme un préfaisceau sur $U \times T^\circ$, et écrire dès lors

$$\underbrace{F_!(H)(u',t')}_{\mathrm{Hom}_{X'}(u',t')} = \varinjlim_{(u',t')\backslash U\times T^\circ} \underbrace{\mathrm{Hom}_X(u,t)}_{H(u,t)} \ . \qquad (*)$$

La catégorie $(u',t')\backslash U \times T^\circ$ sur laquelle on prend la $\varinjlim$ s'explicite comme un produit p. 51

$$(u',t')\backslash U \times T^\circ \simeq (u'\backslash U) \times (T/t')^\circ.$$

Les applications

$$\mathrm{Hom}_X(u,t) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{X'}(u',t') \qquad (= F_!(H)(u',t'))$$

déduites de cette formule ne sont autres que les suivantes : u, t sont données comme objets de $u'\backslash U$, T/t', i.e. avec des flèches [page 71]

$$u' \xrightarrow{\alpha} f_U(u), \qquad f_T(t) \xrightarrow{\beta} t',$$

d'où

$$\mathrm{Hom}_X(u,t) \xrightarrow{\text{via } f=f_X:X\to X'} \mathrm{Hom}_{X'}(\underbrace{f(u)}_{f_U(u)}, \underbrace{f(t)}_{f_T(t)}) \xrightarrow{\text{via } \alpha,\ \beta} \mathrm{Hom}_{X'}(u',t').$$

Notons pour mémoire que pour tout objet Z de Cat, et tout préfaisceau G sur Z, on a la formule

$$\varinjlim_Z G \simeq \pi_0(Z/G),$$

où Z/G s'interprète en termes de l'immersion canonique $Z \longrightarrow Z^\wedge$ ($G \in \mathrm{Ob}\, Z^\wedge$). C'est donc une catégorie fibrée sur Z à fibres discrètes, et on a en fait un isomorphisme entre la sous-catégorie pleine de Cat/Z formée de telles catégories fibrées à fibres discrètes, avec $Z^\wedge$. Dans ce dictionnaire parfait entre préfaisceaux d'ensembles et catégories fibrées à fibres discrètes, le foncteur $\varinjlim$ sur $Z^\wedge$ correspond simplement au foncteur π_0 sur la catégorie des objets au dessus de Z dans Cat, lui-même induit par le foncteur (indépendant de Z)

$$\mathrm{Cat} \xrightarrow{\pi_0} \mathrm{Ens}.$$

On peut donc réécrire la formule fondamentale ($*$) p. 70, en termes du foncteur H définissant le recollement X de U et de T, par [page 72]

$$\boxed{\underbrace{\mathrm{Hom}_{X'}(u',t')}_{H'(u',t')} \simeq \pi_0(\underbrace{(u',t')\backslash U \times T^\circ/H}_{((u'\backslash U)\times(T/t')^\circ)/H}).} \qquad (*)$$

Par la suite, nous n'aurons sans doute qu'à utiliser le cas où on a soit $T' = T$, $f_T = \mathrm{id}_T$, soit l'inverse. Nous travaillerons surtout dans le premier cas, en déduisant ce dont nous aurons besoin pour le cas dual, par principe de dualité (automorphisme $X \longmapsto X^\circ$ de la catégorie Cat). Dans ce cas, dans la formule fondamentale ($*$) l'élément t' de T' s'écrit p. 52

comme un élément t de T, et la formule se retranscrit comme

$$\boxed{\mathrm{Hom}_{X'}(u',t) \simeq \pi_0\Big(\underbrace{u'\backslash U/t}_{\substack{\text{catégorie des triples } (u,\alpha,\beta'),\\ \begin{cases} u \in \mathrm{Ob}\, U \\ \alpha : u \longrightarrow t \\ \beta' : u' \longrightarrow f_U(u) \end{cases}}}\Big).} \qquad (**)$$

C'est la formule que j'avais trouvée directement dans ce cas, sans me soucier encore de faire varier T en même temps que U. Je voudrais faire le lien entre les deux formules $(*)$ et $(**)$, par voie topologique, donc établir une bijection canonique, fonctorielle etc.

$$\pi_0(u'\backslash U/t) \xrightarrow{\sim} \pi_0(((u'\backslash U) \times (T/t)^\circ)/H).$$

On a sûrement un foncteur [page 73]

$$u'\backslash U/t \longrightarrow ((u'\backslash U) \times (T/t)^\circ)/H$$

qui associe à un triple

$$(u, \alpha, \beta') : u \in \mathrm{Ob}\, U,\ \alpha : u \longrightarrow t,\ \beta' : u' \longrightarrow f_U(u)$$

le triple $(\bar{u}, \bar{t}, \xi)$ $(\xi \in H(\bar{u}, \bar{t}))$ dans le second membre, avec $\bar{u}$ dans $u'\backslash U$, $\bar{t}$ dans T/t, défini ainsi :

$$\bar{u} = (u, \beta'),\ \bar{t} = (t, \mathrm{id}_t), \underbrace{\xi}_{=\alpha} \in H(\bar{u}, \bar{t}) = \mathrm{Hom}(u, t).$$

En somme

$$u'\backslash U/t = \text{fibre de } ((u'\backslash U) \times (T/t)^\circ)/H \text{ en l'objet initial } \bar{t} \text{ de } (T/t)^\circ$$

par la projection naturelle, flèche composée

$$\begin{array}{c} ((u'\backslash U) \times (T/t)^\circ)/H \\ \big\downarrow \\ (u'\backslash U) \times (T/t)^\circ \\ \big\downarrow \pi \\ (T/t)^\circ. \end{array}$$

Il faut voir que l'inclusion de la fibre donne une bijection sur les π_0, ou ce qui revient au même, que l'inclusion de la fibre $u'\backslash U$ *de* π en l'objet initial (t, id_t) de $(T/t)^\circ$ donne une bijection sur les $\varinjlim$ du foncteur H. Donc l'inclusion a intérêt à être asphérique, ou du moins co-cofinalle.

Mais l'inclusion d'un objet initial est toujours asphérique, et le reste par produit avec un objet quelconque (i.e. $u'\backslash U$) de Cat (et même par tout changement de base lisse …), d'où la conclusion. p. 53 [page 74]

Dans la suite, nous nous intéressons surtout à la situation de sommes amalgamées (où on change de notation un peu, à présent)

$$\begin{array}{ccccc} U & \xhookrightarrow{i} & X & \xleftarrow{j} & T \\ {\scriptstyle p}\big\downarrow & & {\scriptstyle q}\big\downarrow & & \vdots \\ U' & \xhookrightarrow{i'} & X' & \longleftarrow & T' \simeq T. \end{array} \qquad (*)$$

Le fermé T' complémentaire de U' dans X' est alors canoniquement isomorphe au fermé T complémentaire de U dans X, l'isomorphisme étant induit par q. Souvent nous identifierons T' et T, ce qui est licite en regardant X' comme déduit du recollement de U' et de t [plutôt T], par le bifoncteur $U'^{\circ} \times T \longrightarrow$ Ens explicité dans la formule (∗∗) p. 72. Nous nous intéressons surtout à dégager des conditions qui assurent les deux implications suivantes

a) $i \in W \Longrightarrow i' \in W$ (et même $\Longleftrightarrow$).

b) $p \in W \Longrightarrow q \in W$ (et même $\Longleftrightarrow$).

[page 75]

Proposition 4. *Soit $t \in \mathrm{Ob}\, T$. Pour que $t \in \mathrm{Ob}\, \bar{U}$, il faut et il suffit que $q(t) \in \mathrm{Ob}\, \overline{U'}$. En d'autres termes, le 'bord' $\dot{T} = T \cap \bar{U}$ de T dans X est 'le même' que son bord dans X'.*

Démonstration. Dire que $t \in \mathrm{Ob}\, \bar{U}$ signifie aussi

$$U/t \neq \emptyset$$

et implique, par continuité, que $q(t) \in \overline{q(U)} \subseteq \overline{U'}$. Inversement, si $q(t) \in \overline{U'}$, i.e. s'il existe $u' \in U'$ tel que

$$\mathrm{Hom}(u', q(t))(= \pi_0(u'\backslash U/t)) \neq \emptyset,$$

il en résulte que $u'\backslash U/t \neq \emptyset$, a fortiori U/t (qui reçoit $u'\backslash U/t) \neq \emptyset$, q.e.d.

Proposition 5. *Soit*

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{i} & X \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ Y' & \xrightarrow{i'} & X' \end{array}$$

un carré cocartésien dans Cat. *Si i est une immersion ouverte (resp. fermée), alors i'* p. 54
aussi, et le carré est aussi cartésien. Idem pour p et q. Si i et p sont des immersions ouvertes ([1]) (resp. …), alors la situation est isomorphe à celle d'un objet X' de Cat*, de deux ouverts (resp. fermés) X, Y' de X ayant pour réunion X', pour intersection Y. Inversement, dans une telle situationm le carré correspondant est cocartésien, i.e. X* [plutôt X'] *s'identifie à la somme amalgamée*

$$X' \simeq X \amalg_Y Y'.$$

Donc aussi on a la proposition 15, page 158, et ses corollaires.

p. 55

2 Sommes amalgamées et W-équivalences.

2.1 Axiome du carré cocartésien et axiome du cube (ou 'Lemme des cinq').

Nous supposons à présent donné un localiseur fondamental

$$W \subseteq \mathrm{Fl}(\mathrm{Cat}),$$

donc W satisfait à W(1, 2 bis, 3). Nous ne supposons pas pour le moment pour les autres axiomes standard W(4) (axiome de fibration), W(5) (axiome de connexité), W(6) (axiome des limites inductives). Mais nous allons introduire à présent deux axiomes de stabilité supplémentaire, de nature différente, concernant les sommes amalgamées.

[page 76]

W(7 bis) (Axiome du carré cocartésien.) Soient X un objet de Cat, U, U' deux ouverts de X tels que $U \cup U' = X$, considérons le diagramme cocartésien correspondant (cf. prop. 5 en marge de la page `[ci-dessus]`) :

$$\begin{array}{ccccc} & & U \cap U' & & \\ & \swarrow^{i'_0} & & \searrow^{i_0} & \\ U & & & & U' \\ & \searrow_{i} & & \swarrow_{i'} & \\ & & X & & \end{array} \qquad (*)$$

Alors

$$i_0 \in W \qquad \Longleftrightarrow \qquad i \in W$$

(et symétriquement

$$i'_0 \in W \qquad \Longleftrightarrow \qquad i' \in W).$$

NB Par dualité, cet axiome est équivalent à l'axiome similaire, avec des *fermés* T, T' de X de réunion X.

Corollaire. *Supposons* W(7 bis). *Considérons les conditions suivantes sur le carré précédent.*

a) $U \cap U'$ W-asphérique.

b) U, U' W-asphériques.


c) X W-asphérique.

Alors (a et b) implique c, et (b et c) implique a.

NB Moralement, il faudrait aussi que (c et a) implique b, i.e. si $U \cap U'$ et X sont W-asphériques, il en est de même de U et de U'. Mais il ne semble pas que l'axiome du carré cocartésien permette de le prouver. Par contre, l'axiome qui suit impliquera le corollaire précédent sous sa forme complète.

p. 56

W(7) ('Axiome du cube', ou 'Lemme des cinq'.) Soit un diagramme commutatif cubique



représentant un morphisme (flèches verticales) d'un

[page 77]

carré cocartésien $\begin{array}{ccc} U_1 \cap U'_1 & \longrightarrow & U_1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ U'_1 & \longrightarrow & X_1 \end{array}$ du type envisagé dans W(7 bis) (X_1 réunion de deux ouverts U_1, U'_1) dans un autre (à indices 2). Considérons les conditions suivantes.

1. **NB** Nous utilisons *'immersion ouverte'*, *'immersion fermée'* au *sens strict* : c'est un *monomorphisme* pleinement fidèle dont l'image est une sous-catégorie *pleine,* soit ouverte, soit fermée.


a) $f_{U_1 \cap U'_1} \in W$.
b) f_{U_1} et $f_{U'_1}$ sont [dans] W.
c) $f \in W$.

Alors deux parmi ces conditions impliquent la troisième. En d'autres termes, quand l'une de ces conditions est satisfaite, les deux autres sont équivalentes entre elles.

NB Cet axiome est équivalent à l'axiome dual, en termes d'objets X_1, X_2 représentés chacun comme réunion de deux fermés.

Corollaire. *Supposons* W(7) *satisfait. Alors le corollaire à* W(7 bis) *(axiome qu'on n'a pas à utiliser ici), sous sa forme complétée (cf. le NB qui le suit) est valable : deux parmi les conditions a), b), c) impliquent la troisième.*

Il suffit de regarder l'unique morphisme du diagramme (∗), p. 76, dans le diagramme trivial



correspondant au cas où X est la catégorie finale e, et U, U' égaux à X. Alors le corollaire n'est autre que W(7) appliqué à ce cas particulier.

Cet argument fait sentir que W(7) est sans doute plus fort que W(7 bis). Incité par ce sentiment, je m'aperçois avec plaisir qu'il est fondé :

Proposition 6. *L'axiome* W(7) *(lemme des cinq) implique* W(7 bis) *(axiome du carré cocartésien).* p. 57 [page 78]

On regarde le diagramme cubique suivant

$$\begin{array}{ccccc}
U \cap U' & \xrightarrow{i_0} & U' & & \\
\downarrow{\scriptstyle f_{U\cap U'}=i_0} & \searrow{\scriptstyle i'_0} & \downarrow{\scriptstyle f_{U'}=\mathrm{id}} & \searrow{\scriptstyle i'} & \\
 & U & \xrightarrow{i} & X & \\
 & \downarrow{\scriptstyle f_U=i} & & \downarrow{\scriptstyle f=\mathrm{id}_X} & \\
U' & \xrightarrow{\mathrm{id}} & U' & & \\
 & \searrow{\scriptstyle i'} & & \searrow{\scriptstyle i'} & \\
 & & X & \xrightarrow{\mathrm{id}} & X,
\end{array}$$

du carré cocartésien donné dans le carré cocartésien déduit de X et de ses deux ouverts X, U', d'intersection U'. Ici les deux flèches verticales f et $f_{U'}$ sont des isomorphismes, donc [dans] W. Avec les notations de W(7), on a donc c) ($f \in W$), donc a) et b) sont équivalentes, i.e. $i_0 \in W$ et $i \in W$ sont équivalentes.

q.e.d.

Théorème 2. *Le localiseur fondamental W_∞ satisfait à l'axiome* W(7).

C'est sûrement une conséquence du critère cohomologique d'Artin-Mazur, compte tenu de la suite exacte de Mayer-Vietoris pour l'un et l'autre des deux carrés cocartésiens, et les variantes non commutatives de Mayer-Vietoris. Je n'ai pas écrit la vérification en forme, et devrais sans doute réparer cette omission.

Remarque. La version duale (au sens de Quillen) de l'axiome W(7 bis) du carré cocartésien, i.e. l'axiome correspondant pour les carrés cartésiens, n'est pas valable pour W_∞. L'énoncé pertinent serait le suivant : soit [page 79]

$$\begin{array}{ccc}
X & \xleftarrow{q} & X' \\
{\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\
S & \xleftarrow{p} & S'
\end{array}$$

un carré cartésien, avec f une W-*fibration.* Alors $f \in W \iff f' \in W$. Si W satisfait à W(4c) (ce qui est le cas pour W_∞), alors $f \in W$ implique bien que ses fibres sont W-asphériques, donc que c'est une W-équivalence universelle, i.e. $f' \in W\ \forall\, p : S' \longrightarrow S$. Mais pour l'implication inverse $f' \in W \Longrightarrow f \in W$, il faut supposer visiblement que

$$\pi_0(p) : \pi_0(S') \longrightarrow \pi_0(S)$$

est *surjectif.* (P. ex. si $S' = \emptyset$, on a $X' = \emptyset$, donc $f' \in W$, sans que ça implique $f \in W$!) Le fait que dans le cas cocartésien de W(7 bis), $i_0 \in W \Longrightarrow i \in W$ doit être considéré comme 'allant de soi' - autrement le carré ne mérite pas, du point de vue W-homotopique, le nom de 'cocartésien'. Par contre, l'implication inverse $i \in W \Longrightarrow i_0 \in W$ m'apparaît comme un trait très particulier du dérivatuer HOT_W (quand il le possède), et notamment de $\mathrm{HOT} = \mathrm{HOT}_{W_\infty}$. Le début de la remarque signifie simplement que le dérivateur dual HOT° ne possède pas cette même propriété. Je dois renvoyer à ce sujet aux deux axiomes pour les dérivateurs correspondants à W(7 bis), W(7), ce que je ferai sans doute sous peu, de façon à donner un sens plus précis aux présents commentaires.

p. 58

[page 80]

2.2 Application aux carrés cocartésiens déduits d'une immersion ouverte ou fermée.

Les axiomes W(7), W(7 bis) (du cube, et du carré cocartésien) concernent des carrés cocartésiens de nature très particulière. Nous allons voir à présent comment en déduire des énoncés du même type pour des carrés cocartésiens beaucoup plus généraux, y compris pour des carrés qui n'ont rien de cocartésien (dans Cat) - et que nous appelerons 'homotopiquement cocartésiens' (relativement à W), ou simplement W-cocartésiens. (Il y aura également des carrés W-cartésiens un jour …) Dans le cas où $W = W_\infty$, je les appelerai aussi Hot-cocartésiens.

Je commencerai par le cas particulier d'un carré cocartésien associé à une immersion ouverte (diagramme (∗), p. 74) :

$$(*) \qquad \begin{array}{ccccc} U & \xhookrightarrow{i} & X & \xleftarrow{j} & T \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & {\scriptstyle q}\downarrow & & \vdots \\ U' & \xhookrightarrow{i'} & X' & \xleftarrow{j'} & T' \simeq T. \end{array}$$

[page 81]

Le grand traquenard ici qu'il faut arriver à exorciser, c'est qu'il peut arriver que $i \in W$, sans qu'on ait $i' \in W$, et aussi $p \in W$ sans qu'on ait $q \in W$. Je m'en étais convaincu en 1983 en écrivant Pursuing Stacks (durant les semaines de 'scratchwork'), et n'ai pas envie de rechercher un contre-exemple ici, s'il ne se présente de lui-même (ce qu'il fera sans doute).

Je vais donner un cas important où ces ennuis disparaissent :

Proposition 6 : *Considérons les adhérences $\bar{U}$ et $\overline{U'}$ de U et U' dans X, X' respectivement, et supposons que les inclusions*

$$U \xrightarrow{i_0} \bar{U}, \qquad U' \xrightarrow{i'_0} \overline{U'}$$

soient dans W ([64]). *Alors*

p. 59

$$\begin{cases} \text{ⓐ}\ i \in W & \iff \quad i' \in W \quad \textit{si on a}\ \mathrm{W}(7\ \text{bis}) \\ \text{ⓑ}\ p \in W & \iff \quad q \in W \quad \textit{si on a}\ \mathrm{W}(7). \end{cases}$$

64. cf. th. 3 p. 107 pour des conditions générales assurant que cette hypothèse est satisfaite.

Démonstration. Considérons d'abord le cas ⓐ de i, i'. Soit

$$k : \bar{U} \hookrightarrow X$$

l'inclusion. Le triangle $U \xrightarrow{i_0} \bar{U} \xrightarrow{k} X$ (de composée i), où $i_0 \in W$, montre que

$$i \in W \iff k \in W.$$

D'autre part, X est la réunion des fermés $\bar{U}$, T, donc on a un carré cocartésien dans Cat

$$(*) \qquad \begin{array}{ccc} \bar{U} \cap T = \dot{T} & \xrightarrow{k_0} & T \\ {\scriptstyle j_0}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j} \\ \bar{U} & \xrightarrow{k} & X. \end{array}$$

L'axiome W(7 bis) (sous sa forme duale (i.e. appliqué au carré formé par les catégories opposées …)) implique que [page 82]

$$k \in W \iff k_0 \in W,$$

d'où

$$i \in W \iff (k_0 : \dot{T} \longrightarrow T) \in W.$$

De même on trouve, en appliqunt ceci à (X', U') au lieu de (X, U)

$$i' \in W \iff (k'_0 : \dot{T}' \longrightarrow T') \in W.$$

Or on a $T \xrightarrow{\sim} T'$ (isomorphisme), et par la proposition 4 cet isomorphisme transforme $\dot{T}$ en $\dot{T}'$. Donc

$$k_0 \in W \iff k'_0 \in W \qquad \text{(trivialement)},$$

d'où a).

Prouvons b). Le carré commutatif induit par $(*)$, p. 80, p. 60

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{i_0} & \bar{U} \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \bar{p}} \\ U' & \xrightarrow{i'_0} & \overline{U'}, \end{array}$$

où $i_0, i'_0 \in W$ par hypothèse, montre que

$$p \in W \iff \bar{p} \in W,$$

donc tout revient à prouver que

$$\bar{p} \in W \overset{?}{\iff} q \in W.$$

Mais q induit un homomorphisme du carré $(*)$ déduit de $(X, \bar{U}, T)$ (avec $X = \bar{U} \cup T$), dans le carré similaire pour X'

$$\begin{array}{ccc} \overline{U'} \cap T' = \dot{T}' & \xrightarrow{k'_0} & T \\ {\scriptstyle j'_0}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j'} \\ \overline{U'} & \xrightarrow{k'} & X', \end{array}$$

les flèches verticales étant notées $q_{\dot{T}}$, q_T, $\bar{p}$, q. On sait que $q_{\dot{T}}$, q_T sont des isomorphismes, [page 83]

donc dans W, donc le 'lemme des cinq' W(7) nous assure que $\bar{p} \in W \iff q \in W$, q.e.d.

Commentaire. Cette proposition nous amène à chercher des conditions sur un ouvert U d'un X, qui assurent que l'inclusion $i_0 : U \longrightarrow \bar{U}$ soit `[dans]` W, et *que cette propriété soit conservée par tout cochangement de base* $U \longrightarrow U'$. De plus, nous recherchons des conditions qui soient de nature locale sur $\bar{U}$, plus exactement sur $\bar{U} \cap T = \dot{U} = \dot{T}$. Nous pouvons motiver ce souci (a posteriori) en disant que nous voudrions que la propriété $i_0 \in W$ soit conservée, non seulement par cochangement de base quelconque $U \longrightarrow U'$, mais aussi, de plus, par passage de X à toute sous-catégorie pleine X_1 contenant U, donnant donc naissance à une situation

$$U \overset{i_Y}{\hookrightarrow} X_1, \qquad U \xrightarrow{(i_Y)_0} \bar{U}^{X_1} = \bar{U} \cap X_1$$

`[`$Y = X_1$`?]`, similaire à la situation de départ. Plus généralement encore, nous voudrions qu'elle soit conservée en passant du triple (X, U, T) à un triple "induit" (X_1, U, T_1), par une flèche quelconque $g : T_1 \longrightarrow T$ de but T dans Cat, donnant naissance au couple de flèches

$$U \overset{\mathrm{id}}{\longrightarrow} U, \ g : T_1 \longrightarrow T$$

(cf. pages 60, 61). Le cas précédent est celui où T_1 est une sous-catégorie pleine de T, g la flèche d'inclusion, Notons à ce sujet la proposition soritale p. 61 [page 84]

Proposition 7. *Conditions équivalentes sur l'ouvert U d'un objet X de* Cat (moyennant W(7 bis)) :

a) L'inclusion $i_0 : U \longrightarrow \bar{U}$ est W-asphérique, i.e. pour tout $t \in \dot{U} = \bar{U} \backslash U$, la catégorie U/t est W-asphérique.

b) L'inclusion $i_0 : U \longrightarrow \bar{U}$ est dans W, et cette condition reste satisfaite, quand on remplace (X, U) par (X_1, U), où (X_1, U) est déduit de (X, U) au moyen d'une flèche $T_1 \longrightarrow T(= X \backslash U)$ dans Cat*, comme rappelé ci-dessus.*

b′) Comme b), dans le cas où T_1 est la catégorie ponctuelle e, et où de plus son image est dans $\dot{U}$.

Démonstration. Il est évident que si dans b), b′) on remplace la condition "$i_0 \in W$" par la condition plus forte 'i_0 est W-asphérique', les quatre `[plutôt trois]` conditions a) à b′) sont équivalentes. Il reste à prouver que la condition que les U/t soient W-asphériques ($t \in \bar{U}$ - mais c'est trivial pour $t \in U$, donc il suffit de l'exprimer pour $t \in \bar{U} \backslash U = \dot{U}$) est déjà impliquée par la plus faible b′ et on devine qu'on a ceci :

Corollaire. (Moyennant W(7 bis).) *Soit X dans* Cat*, U un ouvert de X tel que $X \backslash U = \overline{\{t\}}$ soit la catégorie finale. Alors l'inclusion $U \overset{i}{\to} X$ est dans W si et seulement si elle est W-asphérique, i.e. si et seulement si U/t est W-asphérique (où t est l'unique élément de T).* [page 85]

Nous démontrons ultérieurement ce corollaire ([65]). La proposition 7 ne nous servira pas d'ici là - elle n'aura qu'un rôle purement esthétique à jouer, pour justifier notre propos délibéré de chercher des conditions sur $i : U \longrightarrow X$ (pour assurer que $U \longrightarrow \bar{U}$ est dans W et le reste, quand on remplace (X, U) par d'autres couples (X_1, U_1) qui s'en déduisent par certaines opérations …) qui soient de *nature locale* sur $\bar{U}$ (en fait, en les points de $\dot{U}$), et qui en tout état de cause entrainent la *W-asphéricité* de $U \longrightarrow \bar{U}$. [page 86]

J'avais espéré que cette condition d'asphéricité (suggérée par la notion 'd'immersion de Dwyer') serait stable par cochangement de base quelconque $U \longrightarrow U'$, ce qui aurait assuré en même temps qu'après une telle opération, l'immersion ouverte $i' : U' \longrightarrow X'$ obtenue satisfait encore à la condition que $i'_0 : U' \longrightarrow \overline{U'}$ est dans W. Nous verrons

65. cf. cor. 4 de la proposition 15, page 149.

que cette attente n'est pas fondée - la condition de W-asphéricité n'est *pas* stable par cochangement de base, et elle ne suffit *pas* même à assurer qu'après un cochangement de base, $i'_0 : U' \longrightarrow \overline{U'}$ soit dans W. Il faudra une notion plus forte, qui est suggérée par le cas où $T = \{t\}$ est la catégorie finale et contenue dans $\bar{U}$ (cas auquel nous avons essayé de nous ramener dans la proposition 7). Dans ce cas, on l'a dit (corollaire précédent), la condition que $i : U \longrightarrow \bar{U} = X$ soit dans W, équivaut à la W-asphéricité de i, i.e. à la W-asphéricité de U/t, et de même pour $i' : U' \longrightarrow \overline{U'} = X'$: elle est dans W si et seulement si U'/t' est W-asphérique, où t' est l'unique élément de $T'(\simeq T) = X' \backslash U'$. Donc il faut des conditions sur U/t qui assurent que non seulement U/t, mais aussi toutes les catégories similaires U'/t `[plutôt` U'/t'`]`, soient W-asphériques. Dans le cas général où T est quelconque, c'est cette condition-là que nous allons imposer aux U/t ($t \in \mathrm{Ob}\, T$), et il s'avérera que cette fois-ci, elles sont stables `[plutôt elle est stable]` par tout cochangement de base $U \xrightarrow{p} U'$, i.e. que les U'/t' ($t' \in \mathrm{Ob}\, T'$) satisferont alors à la même condition. C'est cette condition que nous allons à présent reformuler.

p. 62

[page 87]

2.3 Objets totalement W-asphériques de Cat, et morphismes totalement W-asphériques.

Reprenons la situation

$$U \overset{i}{\hookrightarrow} X \overset{j}{\hookleftarrow} T, \qquad \text{avec } T = \{t\}, \text{ catégorie finale, } t \in \bar{U}, \text{ i.e. } X = \bar{U},$$

et celle d'un cochangement de base $U \longrightarrow U'$, donnant naissance à un carré cocartésien dans Cat

$$(*) \qquad \begin{array}{ccccc} U & \xrightarrow{\ i\ } & X & \xleftarrow{\ j\ } & T = \{t\} \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & {\scriptstyle q}\downarrow & & \vdots\ \text{iso} \\ U' & \xrightarrow{\ i'\ } & X' & \xleftarrow{\ j'\ } & T' = \{t'\}. \end{array}$$

La donnée de recollement H entre U et T, $H : \underbrace{U^\circ \times T}_{\simeq U^\circ} \longrightarrow \mathrm{Ens}$, peut s'interpréter comme un préfaisceau sur U, $H \in \mathrm{Ob}\, U^\wedge : U^\circ \longrightarrow \mathrm{Ens}$, et on a

[page 88]

$$U/t \simeq U/H,$$

où U/H est interprété en termes du plongement canonique

$$U \hookrightarrow U^\wedge.$$

De même, le recollement entre U' et T' sera donné par un préfaisceau

$$H' \in \mathrm{Ob}\, U'^\wedge : U'^\circ \longrightarrow \mathrm{Ens},$$

et on aura

p. 63

$$U'/t' \simeq U/H'.$$

La relation entre H' et H a été explicitée au §1, comme

$$H' = p_! H, \qquad \text{où } p_! : U^\wedge \longrightarrow U'^\wedge$$

est l'adjoint à gauche de $p^* : U'^\wedge \longrightarrow U^\wedge$, donné par

$$p^* F' = F' \circ p.$$

On a

$$p_!(H)(u') \simeq \pi_0(u'\backslash U/H).$$

Définition 1. ⓐ Soit U un objet de Cat, $H \in \mathrm{Ob}\, U^\wedge$ un préfaisceau sur U. On dit que H est *totalement W-asphérique* si pour toute flèche $p : U \longrightarrow U'$ de Cat, $p_!(H)$ dans $U'^\wedge$ est un objet W-asphérique, i.e. $U'/p_!H$ est W-asphérique. ⓑ On dit qu'un objet V de Cat est *totalement W-asphérique,* si le foncteur final e_V sur V ($v \longmapsto \{\emptyset\}$) est totalement W-asphérique, i.e. si pour toute flèche $f : V \longrightarrow V'$ dans Cat, le préfaisceau [page 89]

$$\pi_0(f) \overset{\text{déf}}{=} f_!(e_V) \overset{\text{déf}}{=} (v' \longmapsto \pi_0(v'\backslash V))$$

sur V' est W-asphérique, i.e. si la catégorie

$$\underline{\pi}_0(f) \quad \text{ou} \quad \underline{\pi}_0(V/V') \overset{\text{déf}}{=} V'/\pi_0(f)$$

est W-asphérique. [Cette notion est différente de la notion de totale asphéricité de Pursuing Stacks.]

Notons que la définition des foncteurs $p_!$ (ou $f_!$) comme adjoints, et leur 'calcul' en termes de π_0 de certaines catégories, ne dépend pas du localiseur W. Donnons quelques précisions à ce sujet. On a un morphisme d'adjonction dans $V^\wedge$

$$f^* f_!(F) \longleftarrow F,$$

d'où

$$V/F \longrightarrow V/f^* f_!(F) \simeq V \times_{V'} (V'/f_!(F)), \qquad (*)$$

le dernier isomorphisme provenant du fait que l'on a commutativité, à isomorphisme canonique près, dans le diagramme de foncteurs

$$\begin{array}{ccc} V'^\wedge & \xrightarrow{f^*=(F' \longmapsto F' \circ f)} & V^\wedge \\ {\scriptstyle F' \longmapsto V'/F'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle F \longmapsto F/V} \\ \mathrm{Cat}/V' & \xrightarrow{f^*_{\mathrm{Cat}}=(W' \longmapsto W' \times_{V'} V)} & \mathrm{Cat}/V, \end{array}$$

en d'autres termes, l'opérateur f^* sur les préfaisceaux s'interprète, en termes géométriques, comme l'opération $W' \longmapsto W' \times_{V'} V$ de changement de base par $V \longrightarrow V'$, sur les catégories au dessus de V' qui sont fibrées à fibres discrètes (propriété qui se conserve par changement de base). p. 64 [page 90]


Ceci dit, la donnée d'une flèche $(*)$ équivaut, par la propriété universelle du changement de base, à celle d'une flèche (canonique en l'occurrence)

$$f/F : V/F \longrightarrow V'/f_!(F)$$

rendant commutatif le carré

$$\begin{array}{ccc} V/F & \xrightarrow[\text{ou foncteur source}]{\text{oubli de } F} & V \\ {\scriptstyle f/F}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ V'/(F' = f_!(F)) & \xrightarrow{\text{oubli de } F'} & V'. \end{array} \qquad (*)$$

Dans le cas qui nous intéresse surtout ici, $F = e_V$, $V/F \longrightarrow V$ est un isomorphisme, et on obtient une factorisation canonique de foncteurs [page 91]



(∗∗)

Explicitons le V'-morphisme $\tilde{f}$ sur les fibres,

$$\tilde{f}_{v'} : V_{v'} \longrightarrow \underline{\pi}_0(V/V')_{v'} \overset{\text{déf}}{=} \pi_0(v'\backslash V), \qquad (***)$$

où dans le dernier membre, on a identifié l'ensemble $\pi_0(v'\backslash V)$ à la catégorie discrète qu'il définit. Pour expliciter cette flèche $(***)$, notons qu'on a une inclusion canonique


$$V_{v'} \longrightarrow v'\backslash V$$

et pour toute catégorie W, un morphisme canonique (d'adjonction) $W \longrightarrow \pi_0(W)$, d'où un composé

$$V_{v'} \longrightarrow v'\backslash V \longrightarrow \pi_0(v'\backslash V),$$

qui n'est autre que $\tilde{f}_{v'}$ dans $(***)$.

Il doit être facile de montrer que la factorisation $(**)$ de f est caractérisée, à isomorphisme unique près, en tant que factorisation dans Cat/V' p. 65
[page 92]



par les propriétés suivantes :

a) π est fibrée à fibres discrètes, i.e. un isomorphisme local (i.e. $\tilde{V}$ est isomorphe dans Cat/V' à une catégorie V/F', avec F' dans $V'^{\wedge}$).

b) $\tilde{f}_!(e_V) = e_{\tilde{V}}$, i.e. pout tout $\tilde{v} \in \mathrm{Ob}\,\tilde{V}$, la catégorie $\tilde{v}\backslash V$ est 0-connexe : les colocalisés de V au dessus de $\tilde{V}$ sont 0-connexes.

Notons ici, en passant, que pour *tout* morphisme $\pi : W' \longrightarrow W$ dans Cat qui soit fibré à fibres discrètes, i.e. tel que W' soit isomorphe dans Cat/W à une catégorie de la forme W/F ($F \in \mathrm{Ob}\,W^{\wedge}$), on a

$$\pi_!(e_{W'}) = F, \qquad \text{i.e. } W' \underbrace{\simeq}_{\text{dans Cat}/W} W/\pi_!(e_{W'}). \qquad (*)$$

Il faut vérifier que le foncteur

$$w \longmapsto \pi_0(\underbrace{w\backslash(W/F)}_{\overset{\text{déf}}{=} w\backslash W/F})$$

est canoniquement isomorphe à F. Mais l'inclusion

$$\underbrace{W'_w}_{=F(w)\ \text{(catégorie discrète)}} \longrightarrow w\backslash W'$$

[page 93]

définit bien comme tantôt

$$F(w) = W'_w \longrightarrow \pi_0(w\backslash W'),$$

il faut prouver que c'est bijectif. Or, W' étant W_∞-lisse sur W, on sait que l'inclusion $W'_w \hookrightarrow w\backslash W'$ est dans W_∞, a fortiori induit un isomorphisme pour les π_0.

Ceci posé, si on a une factorisation de $f : V \longrightarrow V'$ en $f = \pi\tilde{f}$ ayant les propriétés a) b) de la page précédente, on voit déjà que l'on a

$$f_!(e_V) \simeq \pi_!(\underbrace{\tilde{f}_!(e_V)}_{\simeq e_{\tilde{V}} \text{ par b)}}) \simeq \pi_!(e_{\tilde{V}}),$$

ce qui déjà détermine $\tilde{V}$ à isomorphisme canonique près (grâce à a) comme

$$\tilde{V} \simeq V'/f_!(e_V) \overset{\text{déf}}{=} \underline{\pi}_0(V'/V),$$

et il ne doit pas être bien dur de se convaincre que $\tilde{f}$ n'est autre que la flèche canonique de la page 91. p. 66

Proposition 8. *Pour qu'un objet H de $U^\wedge$ soit totalement W-asphérique, il suffit que l'objet U/H de* Cat *soit totalement W-asphérique.*

Supposons en effet cette dernière condition satisfaite et prouvons que H est totalement W-asphérique, i.e. que pour tout $p : U \longrightarrow U'$, $U'/p_!(H)$ soit W-asphérique. [page 94]

$$\begin{array}{ccc} V \overset{\text{déf}}{=} U/H & \xrightarrow{\alpha} & U \\ & \searrow^{f} & \downarrow{\scriptstyle p} \\ & & U' \end{array}$$

Soit f le foncteur composé du diagramme ci-contre [ci-dessus], on a $H \simeq \alpha_!(e_V)$ (par $(*)$ p. 92), d'où

$$p_!(H) \simeq p_!\alpha_!(e_V) \simeq (p\alpha)_!(e_V) \simeq f_!(e_V),$$

qui est W-asphérique par hypothèse sur $V = U/H$.


La réciproque de [la] prop. 8 est-elle valable, i.e. si H est totalement W-asphérique, en est-il de même de $V = U/H$? La difficulté provient du fait que cela signifie que pour *toute* flèche $f : V \longrightarrow V'$ dans Cat de source V, on ait $f_!(e_V)$ W-asphérique, alors que l'hypothèse équivaut à le postuler seulement pour les flèches qui se factorisent par U. Notons que si on ne fait pas cette hypothèse sur f, mais qu'on suppose au lieu de cela que f s'insère dans un carré commutatif [page 95]

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\alpha} & U \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ V' & \xrightarrow{\alpha'} & U', \end{array}$$

avec α' lui aussi un isomorphisme local, alors on peut conclure que $\underline{\pi}_0(f) = \underline{\pi}_0(V/V')$ est bien asphérique. En effet, on a un isomorphisme canonique dans Cat/U',

$$\underline{\pi}_0(\alpha' f) \simeq \underline{\pi}_0(f), \qquad \text{i.e. } \underline{\pi}_0(V/V') \simeq \underline{\pi}_0(V/U'),$$

du fait p. ex. que la factorisation canonique de f p. 67



fournit une factorisation du même type pour $\alpha' f$, en

$$\alpha' f = (\alpha' \pi) \circ \tilde{f}.$$

Ceci dit, on peut appliquer l'hypothèse à p et on trouve bien la W-asphéricité de $\underline{\pi}_0(f) \simeq \underline{\pi}_0(\alpha' f) = \underline{\pi}_0(p\alpha)$.

L'idée naturelle, pour une réciproque à `[la]` prop. 8, serait de prendre pour U' la somme amalgamée de U et V' sur V, ce qui marchera pourvu qu'on sache que α' est bel et bien un isomorphisme local tout comme α. C'est bien le cas p. ex. si $V \longrightarrow U$ est une immersion ouverte, i.e. H un sous-préfaisceau du préfaisceau final. Mais je crains que ce ne soit pas vrai en général - ça a l'air un peu trop beau pour être vrai ! C'est en effet déjà faux dans le cas [page 96]

$$\begin{array}{ccc} V = E_G & \xrightarrow{\alpha \text{ can}} & B_G = U \\ \Big\downarrow{\scriptstyle f} & & \\ V' = B_{G'}, & & \end{array}$$

dans le cas p. ex. où $G = \{\pm 1\}$, groupe à deux éléments, et où l'élément α de G', image par f de l'une des deux flèches non identiques de E_G est $\neq 1$ `[plutôt de carré` $\neq 1$`]`. Si H' est le sous-groupe invariant engendré par α `[plutôt par` α^2`]` dans G', la somme amalgamée s'identifie à $B_{G'/H'}$, or $B_{G'} \longrightarrow B_{G'/H'}$ n'est *pas* un isomorphisme local (car $(B_{G'})/t_0 \longrightarrow (B_{G'/H'})/t'_0$ n'est pas bijectif sur les objets, s'identifiant à $G' \xrightarrow{q} G'/H'$ ...).

Mais d'autre part la condition de totale W-asphéricité sur un objet H de $U^\wedge$ paraît déjà à tel point exigeante, que je me vois mal construire un exemple où elle est satisfaite, sans que U/H elle-même ne soit totalement W-asphérique. [page 97]

L'existence d'objets totalement W-asphériques dans Cat n'est pas tellement évidente a priori. Qu'il y en ait un bon paquet est assuré par la


Proposition 9. p. 68

a) Tout objet V de Cat *ayant un objet final est totalement W-asphérique - donc tout préfaisceau d'ensembles H* représentable *sur une catégorie U (la représentabilité signifiant justement que U/H a un objet final) est totalement W-asphérique.*

b) ([66]) *(Supposons* W(7 bis) *satisfait.) Soient V dans* Cat, *V', V'' deux ouverts de réunion V. Si V', V'', $V' \cap V''$ sont totalement W-asphériques, il en est de même de V.*

66. !! Sans doute *faux* tel quel, cf. rectification page suivante.

Démonstration de a). Soit V avec objet final et $f : V \longrightarrow V'$, d'où la factorisation




de f. On démontre sans mal ([67]) (histoire de cofinalité) ceci :

Corollaire. *L'image par $\tilde{f}$ d'un objet final de V est un objet final de $\tilde{V} = \underline{\pi}_0(V/V')$.*

Comme un objet de Cat avec objet final est W-asphérique par W(3), cela établit a).

Prouvons b). J'ai envie de dire que si on a $f : V \longrightarrow W$ dans Cat, alors $\underline{\pi}_0(V/W)$ est réunion de deux ouverts isomorphes à $\underline{\pi}_0(V'/W)$, $\underline{\pi}_0(V''/W)$, dont l'intersection est isomorphe à $\underline{\pi}_0(V' \cap V''/W)$. Cela signifierait ni plus ni moins que ceci : $f_!$ transforme [page 98] les monomorphismes $V' \longrightarrow V$, $V'' \longrightarrow V$ (interprétés comme flèches dans $V^\wedge$, de but e_V) en monomorphismes, et le produit fibré $V' \cap V'' = V' \times_V V''$ en le produit fibré correspondant dans $W^\wedge$. Mais le foncteur $f_!$ commute aux $\varinjlim$ quelconques (étant un adjoint à gauche), et je ne vois aucune raison a priori pour qu'il commute (disons) aux produits fibrés (ce qui impliquerait aussi qu'il transforme monomorphismes en itou). Si je me rappelle bien, c'est ultrafaux en général. Donc je doute fort à présent que l'énoncé b) soit vrai, sans hypothèse supplémentaire. Pour assurer la monomorphie, on songe à imposer l'existence de *rétractions* de V sur V', V'' et de V' ou V'' sur $V' \cap V''$.

Je viens de vérifier la chose, et donne le **Corollaire 1** (rectification de [1a] prop. 9, p. 69 partie b) ([68]) : *L'énoncé est valable si on suppose qu'il existe une* rétraction r'_0 *de V'' sur $V' \cap V''$, et de même une rétraction r''_0 de V' sur $V' \cap V''$.* ([69])



(**NB** Nous verrons plus tard qu'il suffit de l'existence d'*une* de ces rétractions pour assurer la conclusion.)

Démonstration. Comme V est somme amalgamée de V' et V'', il existe une rétraction r' de V sur V' (donnée par $\mathrm{id}_{V'}$ sur V', par $i''_0 r'_0$ sur V'') qui induit r'_0 sur V'', et de même il existe une rétraction r'' de V sur V'', induisant r''_0 sur V'. L'existence de ces [page 99]

67. Voici une démonstration simple : On a pour toute V dans Cat $e_V = \varinjlim_{v \text{ dans } V} v$ (limite inductive du foncteur d'inclusion de V dans $V^\wedge$), car $\forall\, x$ dans V

$$\varinjlim_{v \text{ dans } V} \mathrm{Hom}(x, v) \simeq \pi_0(x\backslash V) = e.$$

Comme $f_!$ commute aux $\varinjlim$, on a donc $f_!(e_V) = \varinjlim_{v \text{ dans } V} f(v)$. Si v_0 est un objet final de V, cela montre que $f_!(e_V) = f(v_0)$, q.e.d.

68. NB Il y a un énoncé légèrement plus général, en partant d'une catégorie U et d'un diagramme $\begin{array}{ccc} V' \cap V'' & \longrightarrow & V' \\ \downarrow & & \downarrow \\ V'' & \longrightarrow & V \end{array}$ *dans $U^\wedge$* : si V', V'', $V' \cap V''$ sont totalement W-asphériques, il en est de même de V.

69. Corollaire rectifié faux également - les rétractions ne sont pas des flèches de $V^\wedge$, et ne passent dans $p_!$.

rétractions assure déjà que pour tout foncteur $f : V \longrightarrow W$, le diagramme transformé de

$$\begin{array}{ccc} V' \cap V'' & \longrightarrow & V' \\ \downarrow & & \downarrow \\ V'' & \longrightarrow & V \end{array}$$

(intérprété comme diagramme dans $V^\wedge$) est formé de monomorphismes ([70])

$$\begin{array}{ccc} f_!(V' \cap V'') & \hookrightarrow & f_!(V') \\ \downarrow & & \downarrow \\ f_!(V'') & \hookrightarrow & f_!(V), \end{array}$$

et de plus que $f_!(V') \cap f_!(V'')$ (qui contient $f_!(V' \cap V'')$) lui est en fait *égal.* Il en résulte que l'on a un diagramme à la fois cartésien et cocartésien d'immersions ouvertes dans Cat

p. 70

$$\begin{array}{ccc} W/f_!(V' \cap V'') & \hookrightarrow & W/f_!(V') \\ \downarrow & & \downarrow \\ W/f_!(V'') & \hookrightarrow & W/\Big(f_!(V) \overset{\text{déf}}{=} f_!(e_V)\Big), \end{array}$$

lequel s'identifie aussi à

$$\begin{array}{ccc} \underline{\pi}_0(V' \cap V''/W) & \hookrightarrow & \underline{\pi}_0(V'/W) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \underline{\pi}_0(V''/W) & \hookrightarrow & \underline{\pi}_0(V/W). \end{array}$$

L'hypothèse sur V', V'', $V' \cap V''$ implique que les trois sommets du carré autres que $\underline{\pi}_0(V/W)$ sont W-asphériques, donc par W(7 bis) il en est de même de ce dernier, q.e.d.

[page 100]

Corollaire 2 ([71]). *Moyennant* W(7 bis)*, la catégorie* $\Psi = \begin{array}{ccc} & & a \\ & \nearrow & \\ 0 & & \\ & \searrow & \\ & & b \end{array}$ *(ou* $0 \longleftarrow 1 \longrightarrow 2$*) est totalement W-asphérique* ([72]).

On applique le corollaire 1 à Ψ et à ses deux sous-catégories ouvertes, Ψ/a, Ψ/b (isomorphes à $\mathbf{\Delta}^1$), et à leur intersection $\{0\} \simeq \mathbf{\Delta}^0 = e$. Comme ces trois catégories ont un objet final (contrairement à Ψ elle-même, qui n'a qu'un objet initial …), elles sont totalement W-asphériques. Le corollaire s'applique, l'existence des rétractions r'_0, r''_0 étant ici évidente.

C'est surtout la partie b) (rectifiée) de la page 9 qui assure l'existence de catégories totalement W-asphériques autres que celles ayant un objet final ([73]). Il est vrai qu'en

70. **faux,** déjà dans le cas où $V = \Phi$, V', V'' ses deux ouverts canoniques isomorphes à $\mathbf{\Delta}^1$, et $V' \cap V'' = e$.

71. Plus généralement, si I est une catégorie *ordonnée finie,* ayant un objet initial, alors

72. **Faux,** Ψ n'est *pas* totalement W-asphérique.

73. Je conjecture à présent que ce sont les seules ! ([74])

74. Faux, il y a les catégories filtrantes (si W satisfait l'axiome des limites).

sens inverse il faudrait quand même s'assurer qu'un objet X W-asphérique de Cat n'est pas *toujours* totalement W-asphérique ! Le contre-exemple n'est pas tellement évident finalement - j'ai passé des heures avant d'en trouver un et d'y voir un peu clair ! Il suffit [page 101] en somme d'exhiber un exemple d'une flèche dans Cat

$$f : X \longrightarrow Y$$

telle que p. 71


a) $\underline{\pi_0}(f) \overset{\text{déf}}{=} \underline{\pi_0}(X/Y) \xrightarrow{\sim} Y$, i.e. les $\pi_0(y\backslash X)$ `[plutôt les` $y\backslash X$`]` sont 0-connexes (pour $y \in \mathrm{Ob}\, Y$),

et telle que de plus

b) X est W-asphérique, et Y non.

La difficulté est la suivante, quand on cherche des contre-exemples 'idiots' : c'est que l'hypothèse a) implique déjà, quand X est W_∞-asphérique (ou seulement 1-connexe) que Y est 1-connexe : le foncteur

$$Y' \longmapsto X' = X \times_Y Y'$$

de la catégorie des revêtements étales Y' de Y vers celle des revêtements étales X' de X est pleinement fidèle (vérification immédiate), d'où le résultat annoncé. Donc un contre-exemple doit faire appel à l'existence d'un $\pi_i(Y, y)$ non nul, avec $i \geq 2$. Cela implique qu'il n'y a pas de contre-exemple avec des catégories de la forme $Y = Z/F$ (déduites [page 102] d'un foncteur $q : X \longrightarrow Z$ en prenant $F = q_!(e_X) = \pi_0(X/Z)$), où Z est une catégorie telle que $\mathbf{\Delta}^1$ (?), Φ, Ψ, ou  (ayant le type d'homotopie du cercle) etc., car les composantes connexes de telles catégories Y sont des $K(\pi, 1)$ - les π_i supérieures ($i \geq 2$) sont nuls.

Cette difficulté vue, le contre-exemple devient évident. Je pars d'un objet 1-connexe *quelconque* Y de X `[plutôt de` Cat`]`, et je prends $y_0 \in \mathrm{Ob}\, Y$,

$$X = \underline{\mathrm{Ch}}(Y; y_0, -) \xrightarrow{f} Y.$$

On sait que X est W_∞-asphérique, et que f est W_∞-parfait, donc les inclusions


$$X_y \longrightarrow y\backslash X$$

sont des W_∞-équivalences. L'hypothèse a) que les $y\backslash X$ soient 0-connexes équivaut donc à la même hypothèse sur les fibres X_y, ou encore sur une seule fibre (f étant parfait, [page 103] donc une W_∞-fibration, et Y 0-connexe), soit

$$X_{y_0} \simeq \Omega(Y, y_0).$$

Sa 0-connexité équivaut à l'hypothèse de 1-connexité de Y (on n'a utilisé encore que celle de 0-connexité). Donc pour un contre-exemple, il suffit de prendre Y 1-connexe et non ∞-connexe. Le cas le plus simple est celui où Y a le type d'homotopie de la sphère S^2, réalisé p. ex. par la catégorie ordonnée ci-contre `[ci-dessous]` à 6 sommets.

p. 72



[de plus, $e_0^+ \leq e_1^+ \leq e_2^+$, $e_0^- \leq e_1^- \leq e_2^-$] ([75]). Je résume le résultat obtenu.

Proposition 10. *Soit Y une petite catégorie 1-connexe ($y_0 \in \mathrm{Ob}\, Y$). Alors $\underline{\mathrm{Ch}}(Y; y_0, -)$ est W_∞-asphérique, mais n'est pas totalement W_∞-asphérique si Y elle-même n'est ∞-connexe, i.e. W_∞-asphérique.* ([76]).

On peut se demander si Y W_∞-asphérique implique que $\underline{\mathrm{Ch}}(Y; y_0, -)$ est totalement W_∞-asphérique. J'en doute fort !

Revenons maintenant à la situation du début de la section, diagramme (∗), p. 87, [page 104]

$$\begin{array}{ccccc} U & \xrightarrow{\ i\ } & X & \xleftarrow{\ j\ } & T = \{t\} \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & {\scriptstyle q}\downarrow & & \vdots\ \text{iso} \\ U' & \xrightarrow{\ i'\ } & X' & \xleftarrow{\ j'\ } & T' = \{t'\}. \end{array} \qquad (*)$$

Nous pouvons donner maintenant un exemple où i est dans W (et même W-asphérique) sans que i' le soit :

$$i \in W, \qquad i' \notin W. \qquad (**)$$

On peut même supposer que t soit objet final de X (ce qui signifie que l'objet H de $U^\wedge$ est isomorphe à e_U, l'objet final), et t' objet final de X' (i.e. $p_!(e_U) = e_{U'}$, i.e. les $u'\backslash U$ sont 0-asphériques). Dans ce cas, comme X, X' sont W-asphériques, les relations (∗∗) équivalent à

$$U \text{ est } W\text{-asphérique, et } U' \text{ non}, \qquad (***)$$

ce qui est justement la situation que nous venons de construire (p. 101-103).

On aimerait aussi trouver un exemple où dans (∗) on ait $p \in W$, $q \notin W$.

Je prendrai encore $(X, U, \{t\})$ tel que t soit objet final de X, mais si on veut $q \notin W$, on ne peut supposer t' élément final de X'. Au lieu de cela, je vais supposer p. 73 [page 105]

a) U, U' (et aussi X, ayant objet final t) W-asphériques, donc $i \in W$ (et même i W-asphérique), $p \in W$, mais

b) X' non W-asphérique, donc $i', q \notin W$.

Pour ceci, notons que

$$U'/t' \simeq U'/p_!(e_U) \overset{\text{déf}}{=} \underline{\pi}_0(U/U').$$

Le corollaire de la proposition 7 (cf. p. 85), non encore démontré, nous dit que $i' \in W$ (i.e. ici, X' W-asphérique) si et seulement si i' est W-asphérique, i.e. U'/t' est W-asphérique. Nous allons l'admettre ici. Tout revient donc à trouver une flèche

$$p : U \longrightarrow U'$$

dans Cat avec les propriétés suivantes.

a) U et U' sont W-asphériques,

b) $\underline{\pi}_0(U/U')$ n'est pas W-asphérique.

Nous allons reprendre l'exemple précédent

$$f : X \longrightarrow Y$$

(p. 101-103), en prenant

$$U = X, \qquad \underline{\pi}_0(U/U') = Y,$$

[page 106]

donc tout revient, à partir de l'exemple donné $X \xrightarrow{f} Y$, à construire une flèche

$$\pi : Y \longrightarrow U' \qquad (*)$$

dans Cat qui satisfasse les conditions

a) π est un isomorphisme local,

b) U' est W-asphérique.

On prendra alors

$$p = \pi f.$$

Mais par la façon dont X a été construit à partir d'un Y 1-connexe et non ∞-connexe, par ailleurs quelconque, on est ramené finalement à trouver $(*)$ satisfaisant a), b), et de plus

p. 74

c) Y est 1-connexe, mais non ∞-connexe.

(NB On suppose maintenant $W = W_\infty$.) Il revient au même de trouver

U' objet *asphérique* de Cat, $F \in \mathrm{Ob}\, U'^{\wedge}$ tels que U'/F soit 1-connexe et non ∞-connexe.

On songe par exemple à prendre simplement une sous-catégorie ouverte U'_0 de U', qui soit 1-connexe et non ∞-connexe. Partons d'une telle catégorie U'_0 - par exemple une réalisation homotopique dans Cat, de la sphère S^2. On l'immerge comme ouvert dans un U' asphérique, en lui ajoutant un objet final. On a gagné.

[page 107]

Faisons un énoncé en forme.

Proposition 11. *On peut trouver une situation* $(*)$ (p. 124 [plutôt 104]) *avec*

a) t objet final de X.

b) U, U' (et X) W_∞-asphériques, donc $i, p \in W_\infty$ (et même i W_∞-asphérique).

c) X' non W_∞-asphérique, donc $i', q \notin W_\infty$.

Il suffit pour cela de partir d'un objet 1-connexe Y de Cat, de lui adjoindre un objet final u'_0, ce qui donne U', de prendre $U = \underline{\mathrm{Ch}}(Y; y_0, -)$, $p : U \longrightarrow U'$ le composé $U \xrightarrow{\text{but}} Y \xrightarrow[\text{can.}]{\text{incl.}} U'$, et X déduit de U en lui ajoutant un objet final t. On a alors $U'/t' \simeq Y$, d'où

$$X' \ W_\infty\text{-asphérique (i.e. } i' \in W_\infty) \Longleftrightarrow Y \ W_\infty\text{-asphérique.}$$

On a le contre-exemple cherché en prenant Y (1-connexe mais) non ∞-connexe.

2.4 Application aux immersions ouvertes dwyériennes.

Donnons quand même l'enoncé *positif* auquel nous en avions.

Théorème 3. *Soient (X, U, T) un triple $\in \mathcal{T}$ (U ouvert de X dans* Cat*, $T = X \backslash U$), et pour toute flèche $p : U \longrightarrow U'$ flèche de* Cat*, le carré cocartésien dans* Cat

$$\begin{array}{ccccc} U & \xrightarrow{\ i\ } & X & \dashleftarrow & T \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & {\scriptstyle q}\downarrow & & \vdots\ \text{iso} \\ U' & \xrightarrow{\ i'\ } & X' & \dashleftarrow & T'. \end{array}$$

p. 75

[page 108]

Supposons que pour tout $t \in \dot{T} = \dot{U}$, le préfaisceau d'ensembles

$$i^*(t) = (u \longmapsto \mathrm{Hom}(u,t)) \in U^\wedge$$

soit totalement W-asphérique (déf. 1, p. 88) ([77]) - p. ex. que la catégorie U/t soit totalement W-asphérique (prop. 8, page 93). (NB le cas où les U/t ont un objet final, cf. prop. 9 a), i.e. celui où l'inclusion $U \longrightarrow \bar{U}$ admet un adjoint à droite, est celui envisagé par Dwyer, celui des immersions ouvertes de Dwyer ([78]).) Alors pour toute $p : U \longrightarrow U'$, l'immersion ouverte

$$i'_0 : U' \longrightarrow \overline{U'}$$

est W-asphérique (et même, tout comme i_0, strictement W-asphérique), et a fortiori elle est [dans] *W. Par suite (prop. 6* [p. 81]*) on a ceci.*

ⓐ	$i \in W$	$\iff$	$i' \in W$	*moyennant* W(7 bis).
ⓑ	$p \in W$	$\iff$	$q \in W$	*moyennant* W(7). ([79])

Corollaire 1. *Supposons* W(7). *Si $i : U \hookrightarrow X$ est une immersion ouverte telle que $i_0 : U \hookrightarrow \bar{U}$ soit totalement* [il suffit strictement] *W-asphérique, alors $i : U \longrightarrow X$ est une W-cofibration ('ultraforte'), par quoi j'entends ceci : pour toute flèche $U' \xrightarrow{f} U''$ dans $U\backslash\mathrm{Cat}$,*

telle que $f \in W$, la flèche $g : X' \longrightarrow X''$ qui s'en déduit par cochangement de base à partir de l'objet X de $U\backslash\mathrm{Cat}$, est aussi dans W. [page 109]

Démonstration du corollaire : on applique le théorème 3 à l'immersion ouverte $U' \xhookrightarrow{i'} X'$ déduite de $U \xhookrightarrow{i} X$ par le cochangement de base $U \xrightarrow{f} U'$, en notant de plus que l'hypothèse du théorème 3 sur i est préservée en passant de i à i'.

Il faut quand même introduire une terminologie adéquate :

Définition 2 :

a) Une flèche $f : X \longrightarrow Y$ est dite *strictement W-asphérique* si pour toute $y \in \mathrm{Ob}\, Y$, $f^*(y) = (x \longmapsto \mathrm{Hom}_Y(f(x), y))$ est un objet totalement W-asphérique de $X^\wedge$ (cf. déf. 1, page 88). Elle est dite *totalement W-asphérique* si pour tout $y \in \mathrm{Ob}\, Y$, X/y ($\simeq X/f^*(y)$) est un objet totalement W-asphérique de Cat.

b) Une immersion ouverte $i : U \longrightarrow X$ est dite *W-dwyérienne* (resp. *totalement* [W-] *dwyérienne*) si l'immersion induite $i_0 : U \longrightarrow \bar{U}$ est strictement (resp. totalement) W-asphérique. Une immersion fermée $j : T \longrightarrow X$ est dite *W-dwyérienne* (resp. *totalement W-dwyérienne*) si et seulement si $j^\circ : T^\circ \longrightarrow X^\circ$ est une immersion ouverte W-dwyérienne (resp totalement W-dwyérienne). p. 76

c) Une flèche $i : U \longrightarrow X$ de Cat (pas nécessairement une immersion) [page 110]

75. C'est en somme cet exemple (à homotopie topologique près) que je réalise (sans d'abord m'en apercevoir dans l'Appendice p. 10-12, mais avec des catégories finies).

76. Mais un exemple plus percutant est $\Psi = \begin{array}{ccc} & & b \\ a & \nearrow & \\ & \searrow & \\ & & c \end{array}$, qui est W_∞-asphérique, mais pas totalement !

77. **NB** On dit sous ces conditions que $i_0 : U \longrightarrow \bar{U}$ est *strictement W-asphérique* (cf. déf. 2 page suivante).

78. Je ne connais pas d'autre cas où th. 3 s'applique - faute de connaître de catégorie totalement W-asphérique qui n'ait un objet final, ni d'objet F d'une catégorie $U^\wedge$ qui soit totalement W-asphérique sans être représentable, i.e. U/F a un objet final. À présent, je sais que les catégories *filtrantes* sont totalement W-asphériques si W satisfait l'axiome des limites inductives.

79. Démonstration page 112.

est appelée une *W-cofibration,* si pour toute flèche $f : U' \longrightarrow U''$ dans $U\backslash\mathrm{Cat}$, la flèche $g : X' \longrightarrow X''$ qui s'en déduit par le cochangement de base par X (objet de $U\backslash\mathrm{Cat}$) est dans W quand f l'est.

NB Cette notion de W-cofibration est stable par composition et par cochangement de base, et les isomorphismes de Cat sont des W-cofibrations. Si f est une W-cofibration, f° l'est et inversement.

(Le corollaire s'énonce en disant qu'une immersion ouverte ou fermée qui est W-dwyérienne est une W-cofibration.)

d) Une flèche $i : U \longrightarrow X$ dans Cat est appelée une *W-cofibration triviale*, ou une *W-équivalence couniverselle,* si pour toute U' dans $U\backslash\mathrm{Cat}$, i.e. toute flèche $p : U \longrightarrow U'$ dans Cat, la flèche déduite de i,

$$i' : U' \longrightarrow X' = U' \amalg_U X' \quad \texttt{[plutôt } U' \amalg_U X\texttt{]} \ ,$$

est dans W. (NB Il est immédiat que cela implique bien que i est une W-cofibration.)

(Cette notion de W-cofibration triviale est elle aussi stable par composition et par cochangement de base, et les isomorphismes dans Cat en sont.)

Corollaire 2. (Moyennant W(7).) *Soit $i : U \longrightarrow X$ une immersion ouverte W-dwyérienne. Pour que i soit une W-cofibration triviale, il faut et il suffit que $i \in W$, ou ce qui revient au même* (cf. page 82), *que $\dot{T} \hookrightarrow T$ soit dans W.* [page 111]

C'est évidemment nécessaire, et la suffisance résulte du théorème 3 a).

Questions ouvertes.

a) J'ignore si une immersion ouverte i qui est une W-cofibration, voire une W-cofibration triviale, est forcément W-dwyérienne ([80]). Mais par le corollaire de la proposition 7 (p. 85), je sais que c'est le cas si on suppose T isomorphe à la catégorie finale e. Il s'ensuit toute au moins ceci : Pour que non seulement $i : U \longrightarrow X$, mais aussi toutes les immersions ouvertes $i_1 : U \longrightarrow X_1$ qui s'en déduisent par le procédé de prop. 7 b) au moyen de flèches quelconques $T_1 \longrightarrow T$ de but T dans Cat, soient des W-cofibrations, il faut et il suffit que i soit dwyérienne.

b) Y-a-t-il une bonne notion d' immersion dwyérienne, applicable à toutes les immersions p. 77

et incluant le cas des immersions ouvertes et des immersions fermées ? [page 112]

Démonstration du théorème 3 (p. 107). Il suffit de prouver que si i est W-dwyérienne (i.e. i_0 strictement W-asphérique). alors i' l'est également - car il en résultera que i' est W-asphérique et a fortiori $\in W$. Il faut donc vérifier que pour tout $t' \in \dot{U}' = \dot{T}$, l'élément $i^*(t') = (u' \longmapsto \mathrm{Hom}_{X'}(u', t'))$ de $U'^\wedge$ est totalement W-asphérique. Or t' provient d'un unique élément t de $\dot{T}$, et on sait qu'on a

$$i'^*(t) = p_!(i^*(t)) \quad \texttt{[plutôt } i'^*(t') = p_!(i^*(t))\texttt{]}, \qquad \text{où } \ p_! : U^\wedge \longrightarrow U'^\wedge.$$

Par hypothèse, $F = i^*(t)$ est un élément totalement W-asphérique de $U^\wedge$, ce qui signifie que pour toute flèche $p : U \longrightarrow U'$ dans Cat de souce U, $p_!(F)$ est un élément W-asphérique de U'. En fait, on a le lemme immédiat (par transitivité $(p'p)_! \simeq p'_! p_!$).

Lemme. *Soit U dans* Cat*, et F dans $U^\wedge$. Si F est totalement W-asphérique (resp. si U/F est totalement W-asphérique), alors pour toute flèche $p : U \longrightarrow U'$ dans* Cat *de source U, $F' = p_!(F)$ est un objet totalement W-asphérique de $U'^\wedge$ (resp.*

U'/F' est un objet totalement W-asphérique de Cat*.)* [page 113]

80. et peut-être même une immersion de Dwyer ?

Corollaire 3 (du théorème 3). *Si $i : U \longrightarrow X$ est une immersion ouverte ou fermée W-dwyérienne (resp. totalement W-dwyérienne), alors pour toute flèche $p : U \longrightarrow U'$ dans* Cat*, $i' : U' \longrightarrow X' = U' \amalg_U X'$* `[plutôt` *$U' \amalg_U X$* `]` *l'est aussi.*

(NB Le cas non respé est essentiellement le théorème 3. Il ne dépend d'aucun axiome supplémentaire sur W, mais n'a d'intérêt qu'en vue des équivalences ⓐ et ⓑ (p. 108) qui en résultent, et qui sont valables moyennant W(7 bis) resp. W(7) seulement.)

Commentaire de motivation : les immersions ouvertes ou fermées W-dwyériennes, ou totalement W-dwyériennes, sont stables par cochangement de base (d'après le corollaire précédent), mais n'ont pas du tout l'air de l'être par composition. À cet égard, les 'immersions de Dwyer' (où on suppose l'existence de l'adjoint à droite de $i_0 : U \longrightarrow \bar{U}$, dans le cas d'une immersion ouverte) se comportent mieux, étant stables par composition. (**NB** Il ne semble pas

non plus clair que les flèches strictement W-asphériques, ou les totalement W-asphériques, soient stables par composition - sorry !) Ma motivation pour m'échiner sur la notion W-dwyérienne est double. [page 114]

a) J'aimerais avoir des conditions à la fois compréhensibles, et aussi générales que possible, sur une immersion (ouverte p. ex), pour que ce soit une W-cofibration, propriété visiblement importante (toute comme la notion duale de W-fibration).

p. 78

b) J'ai envie, pour des applications ultérieures, de disposer d'une classe d'immersions ouvertes ayant les propriétés suivantes :

   1°) Ce sont des W-cofibrations, et

   2°) Si $U \overset{i}{\hookrightarrow} X$ est dans la classe, et si $\varepsilon \overset{j}{\to} I$ est l'inclusion 'source-but' de la catégorie discrète $\{0, 1\}$ dans l'intervalle

$$\Phi_n = 0 \longrightarrow 1 \longleftarrow 2 \longrightarrow \dots 2n-1 \longleftarrow 2n$$

   ($j(0) = 0$, $j(1) = 2n$), $n \geq 2$, l'inclusion α de $(U \times I) \cup (X \times \varepsilon)$ dans $X \times I$ est dans la classe.

   Or cette dernière propriété de stabilité n'est *pas* vérifiée par les immersions de Dwyer. (Prendre $i : \{0\} \longrightarrow \mathbf{\Delta}^1 = \{0, 1\}$, l'inclusion α n'est pas immersion de Dwyer.)

[page 115]

2.5 Complément : critère d'asphéricité totale d'une catégorie W-propre sur une autre.

Soit

$$f : X \longrightarrow I$$

une catégorie propre sur une catégorie d'indices I. Si I a un objet final i_0, alors X/i_0 s'identifie à X, et par suite l'inclusion

$$X_{i_0} \longrightarrow X$$

de la fibre de X en i_0 est W-asphérique `[plutôt W-coasphérique]`, et a fortiori est dans W. Donc X est asphérique si et seulement si X_{i_0} l'est. Nous voulons étendre ce résultat en un critère de *totale* W-asphéricité, de façon précise prouver la

Proposition 11 : *Soit $f : X \longrightarrow I$ W-propre, et soit i_0 un objet final de I. Si X_{i_0} est totalement W-asphérique* (déf. 1, page 88)*, il en est de même de X.* (Sous réserve que W satisfasse l'axiome de connexité W(5).)

La démonstration sera donnée plus bas, après quelques préliminaires ayant un intérêt indépendant. Tout d'abord, rappelons que si X est W-propre sur I, alors il donne naissance à un foncteur

$$\begin{array}{ccc} I & \longrightarrow & \mathrm{Hot}_W \\ i & \longmapsto & \mathrm{hot}_W(X_i)(\simeq \mathrm{hot}_W(X/i)); \end{array}$$

en le composant avec le foncteur

$$\pi_0 : \mathrm{Hot}_W \longrightarrow \mathrm{Ens}$$

(sous réserve que l'axiome de connexité W(5) (p. 10) soit satisfait) on trouve un foncteur p. 79
[page 116]

$$i \longmapsto \underbrace{\pi_0(X_i)}_{\simeq \pi_0(X/i)} : I \longrightarrow \mathrm{Ens}.$$

Ceci posé, on a le résultat sorital

Proposition 12 : *Soit $f : X \longrightarrow I$ W-propre, et supposons que W satisfasse l'axiome de connexité* W(5) (sinon, la W-propreté ne nous sera d'aucune utilité …) ([81]). *On a alors une bijection canonique*

$$\pi_0(X) \xleftarrow{\sim} \varinjlim_I \pi_0(X_i), \qquad (*)$$

où la flèche est induite par les applications canoniques $\pi_0(X_i) \longrightarrow \pi_0(X)$.

Démonstration. Passant à $f^\circ : X^\circ \longrightarrow I^\circ$, on est ramené à prouver le même résultat pour X *W-lisse* sur I, avec la seule différence que le foncteur

$$i \longmapsto \pi_0(X_i)$$

sur I sera contravariant, i.e. un préfaisceau, ce qui offre l'avantage de l'intuition attachée au formalisme des préfaisceaux. Soit

$$g : I \longrightarrow e, \qquad \text{d'où } gf = p : X \longrightarrow e,$$

il est immédiat, par le calcul standard

$$p_!(F) = \pi_0(X/F) \qquad (F \in \mathrm{Ob}\, X^\wedge)$$

(où on a identifié $e^\wedge$ à (Ens)), qu'on a

$$\pi_0(X) = p_!(e_X) = g_!(f_!(e_X)).$$

Or le préfaisceau

$$i \longmapsto \pi_0(X_i) \qquad (\simeq \pi_0(i\backslash X), \text{ car } X \text{ } W\text{-lisse sur } I)$$

n'est autre que $f_!(e_X)$. D'autre part, pour un préfaisceau quelconque G sur I, on a [page 117]

$$g_!(G) \simeq \pi_0(I/G) \simeq \varinjlim_I G(i),$$

et appliquant ceci à $f_!(e_X)$, on trouve la formule $(*)$ de la proposition 12.

Revenons à la situation avec *f W-propre,* et considérons un foncteur

$$p : X \longrightarrow Y,$$

p. 80

nous sommes intéressés à 'calculer'

$$p_!(e_X) = (y \longmapsto \pi_0(y\backslash X)) \in \mathrm{Ob}\, Y^\wedge.$$

Considérons pour ceci le diagramme suivant

$$\begin{array}{ccccc} y\backslash X_i & \longrightarrow & y\backslash X & \longrightarrow & y\backslash Y \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X_i & \longrightarrow & X & \xrightarrow{p} & Y \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \\ \underset{\simeq e}{\{i\}} & \longrightarrow & I & , & \end{array}$$

où les trois carrés sont cartésiens. Comme $y\backslash Y \longrightarrow Y$ est W-propre, il en est de même de $y\backslash X \longrightarrow X$ par changement de base, donc du composé $y\backslash X \longrightarrow X \longrightarrow I$ par transitivité. Le diagramme montre d'autre part que la fibre de $y\backslash X$ en $i \in \mathrm{Ob}\, I$ s'identifie à $y\backslash X_i$.

La proposition 12 nous donne donc la formule [page 118]

$$\pi_0(y\backslash X) = \varinjlim_I \pi_0(y\backslash X_i),$$

laquelle formule ne peut s'empêcher d'être fonctorielle en y, tout comme celle de prop. 12 l'est dans $\underline{\mathrm{Prop}}_W I$. Or pour y variable dans Y, le préfaisceau sur Y

$$y \longmapsto \pi_0(y\backslash X_i)$$

n'est autre que $p_{i\,!}(e_{X_i})$, où

$$p_i : X_i \longrightarrow Y$$

est le composé $X_i \longrightarrow X \xrightarrow{p} Y$ (induit par p). On a ainsi prouvé

Corollaire 1 (de prop. 12). *Soit $f : X \longrightarrow I$ W-propre ([82]), et $p : X \longrightarrow Y$ un foncteur quelconque. Soit, pour tout $i \in \mathrm{Ob}\, I$, $p_i : X_i \longrightarrow Y$ le foncteur induit sur la fibre X_i de X en i. On a alors une loi* fonctorielle *naturelle*

$$i \longmapsto p_{i\,!}(e_{X_i}) : I \longrightarrow Y^\wedge,$$

et on a la formule

$$p_!(e_X) \xleftarrow{\sim} \varinjlim_I p_{i\,!}(e_{X_i}), \qquad (*)$$

où la flèche est induite par les morphismes canoniques

$$p_{i\,!}(e_{X_i}) \longrightarrow p_!(e_X)$$

induites par les inclusions $X_i \longrightarrow X$.

La loi fonctorielle de $p_{i\,!}(e_{X_i})$ en i a été explicitée en cours de démonstration. p. 81

Notons que lorsque X sur I est cofibrée et scindée, i.e. provient d'un foncteur [page 119]

$$i \longmapsto X_i, \quad I \longrightarrow \mathrm{Cat},$$

alors la loi fonctorielle de $p_{i\,!}(e_{X_i})$ en i s'explicite de façon particulièrement agréable : à une flèche

$$\alpha : i \longrightarrow j, \qquad \text{d'où } \alpha_* : X_i \longrightarrow X_j,$$


81. Il vaut mieux dire : Soit f W_0-propre, où W_0 est le localiseur de la 0-connexité …

82. dire W_0-propre …

est associé

$$p_!(\alpha) : p_{i\,!}(e_{X_i}) \longrightarrow p_{j\,!}(e_{X_j}),$$

en notant qu'on a un diagramme



avec une flèche de commutativité

$$\lambda_\alpha : p_i \longrightarrow p_j \alpha_*$$

(pas [un] isomorphisme en général), d'où

$$p_{i\,!}(e_{X_i}) \xrightarrow{(\lambda_\alpha)_!} p_{j\,!}\underbrace{\alpha_{*\,!}(e_{X_i})}_{\longrightarrow e_{X_j}} \longrightarrow p_{j\,!}(e_{X_j}),$$

plus de doute c'est lui! ([83]).

Corollaire 2 : *Sous les conditions du corollaire 1, supposons que I ait un objet final i_0. Alors* [page 120]

$$(p_{i_0})_!(e_{X_{i_0}}) \longrightarrow p_!(e_X)$$

est un isomorphisme dans $Y^\wedge$.


D'où aussitôt la proposition 11 : si X_{i_0} est totalement W-asphérique, alors X l'est, car pour tout $p : X \longrightarrow Y$, $p_!(e_X) \simeq p_{i_0\,!}(X_{i_0})$, et ce dernier élément de $Y^\wedge$ est W-asphérique par hypothèse sur X_{i_0}.

Notons le cas particulier :

Corollaire 3. *Soit Z un objet totalement W-asphérique dans* Cat. *Alors son produit $Z \times I$ par toute I dans* Cat *ayant un objet final est aussi totalement W-asphérique.* p. 82


[page 121]

3 Sommes amalgamées et intégration



3.1 Réduction canonique au cas d'un diagramme d'immersions fermées

Considérons un diagramme



(∗)

dans Cat. Nous pouvons le regarder comme un contrafoncteur

$$\Phi^\circ \longrightarrow \mathrm{Cat},$$

83. Cette flèche [la flèche $(\lambda_\alpha)_!$] devrait être explicitée avec soin!

où

$$\Phi = \begin{pmatrix} & & 1 \\ & \swarrow & \\ 0 & & \\ & \nwarrow & \\ & & 2 \end{pmatrix},$$

donc comme définissant une catégorie fibrée (scindée) $\mathscr{X}$ sur Φ. Il est parfois commode de représenter cette catégorie $\mathscr{X}$ par le 'signe d'integration'

$$\begin{array}{ccc} & & X_1 \\ & \nearrow & \\ \int X_0 & & \\ & \searrow & \\ & & X_2, \end{array}$$

et la regarder comme une sorte de 'somme amalgamée homotopique' de X_1 et X_2 sous X_0, ou comme une 'limite inductive homotopique' du diagramme de départ $(*)$.

Il faut entendre par là que (pour $W \subseteq \mathrm{Fl}(\mathrm{Cat})$ donné) l'image $\mathrm{hot}_W(\mathscr{X})$ de $\mathscr{X}$ [page 122] dans Hot_W a un 'sens homotopique' remarquable en termes de $(*)$, de façon précise, le diagramme $(*)$ définit un objet ξ de $\mathrm{HOT}_W(\Phi)$ (qui est une catégorie de fractions de la catégorie de tous les diagrammes du type $(*)$ …), et si

$$\pi : \Phi \longrightarrow e$$

désigne la projection absolue de Φ, on a

$$\pi_!(\xi) = \mathrm{hot}_W(\mathscr{X}),$$

d'après le calcul connu du foncteur $\pi_!$, adjoint à gauche du foncteur π^*

p. 83

$$\mathrm{HOT}_W(e) \overset{\text{déf}}{=} \mathrm{Hot}_W \longrightarrow \mathrm{HOT}_W(\Phi)$$

([84]). Or pour tout objet I dans Cat, de projection absolue $p_I : I \longrightarrow e$, le foncteur

$$p_{I\,!} : \mathrm{HOT}_W(I) \longrightarrow \mathrm{HOT}_W(e) = \mathrm{Hot}_W$$

doit être regardé comme l'équivalent 'homotopique' du foncteur limite inductive $\varinjlim_I$ des diagrammes de type I° dans la catégorie Hot_W - lesquelles limites inductives *n'existent pas* dans Hot_W (sauf pour des catégories très particulières - les seules que je connaisse sont les catégories discrètes (qu'il faut peut-être même supposer finies en plus)).

Notons qu'on a un diagramme de foncteurs canoniques [page 123]

$$\begin{array}{ccccc} & & X_0 & & \\ & \swarrow^{\alpha_1} & \text{non} & \searrow^{\alpha_2} & \\ X_1 & & \text{commuta-} & & X_2 \\ & \searrow_{i_1} & \text{tif!} & \swarrow_{i_2} & \\ & & \mathcal{X}, & & \end{array} \qquad (*)$$

lequel diagramme n'a rien de commutatif dans Cat. *Il est cependant commutatif dans* Hot_W (quel que soit le localiseur fondamental W), et même dans Cat hot, car si on désigne par

$$i_0 : X_0 \longrightarrow \mathcal{X}$$

84. Cela suppose qu'on a W(2), non seulement W(2 bis).

l'inclusion canonique, on a des homomorphismes canoniques

$$i_1\alpha_1 \longrightarrow i_0 \longleftarrow i_2\alpha_2,$$

ce qui montre que $i_1\alpha_1$ et $i_2\alpha_2$ sont homotopes, donc définissent la même flèche dans Hot_W.

Considérons dans Φ les deux fermés isomorphes à $\mathbf{\Delta}^1$ [page 124]

$$\begin{aligned} F_1 = 1\backslash\Phi \quad &= \{0,1\} \\ F_2 = 2\backslash\Phi \quad &= \{0,2\}, \end{aligned}$$

on a

$$F_1 \cap F_2 = 0\backslash\Phi = \{0\}, \qquad F_1 \cup F_2 = \Phi.$$

Soient p. 84

$$\begin{aligned} 1\backslash\mathcal{X} = \mathcal{X} \times_\Phi 1\backslash\Phi \quad &= \mathcal{X} \times_\Phi F_1 \\ 2\backslash\mathcal{X} = \mathcal{X} \times_\Phi 2\backslash\Phi \quad &= \mathcal{X} \times_\Phi F_2 \end{aligned}$$

les images inverses de F_1, F_2 dans $\mathcal{X}$, on a donc

$$1\backslash\mathcal{X} \cap 2\backslash\mathcal{X} = X_0, \qquad 1\backslash\mathcal{X} \cup 2\backslash\mathcal{X} = \mathcal{X},$$

donc le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} & & X_0 & & \\ & {\scriptstyle\alpha'_1}\swarrow & & \searrow{\scriptstyle\alpha'_2} & \\ 1\backslash\mathcal{X} & & & & 2\backslash\mathcal{X} \\ & {\scriptstyle i'_1}\searrow & & \swarrow{\scriptstyle i'_2} & \\ & & \mathcal{X}, & & \end{array} \qquad (**)$$

déduit du diagramme similaire

$$\begin{array}{ccccc} & & \{0\} & & \\ & \swarrow & & \searrow & \\ F_1 & & & & F_2 \\ & \searrow & & \swarrow & \\ & & \Phi, & & \end{array}$$


est (comme ce dernier) un carré d'immersions fermées à la fois cartésien et cocartésien. D'autre part, on a un homomorphisme canonique du diagramme $(*)$ dans $(**)$, qui est l'identité sur les sommets X_0 et $\mathcal{X}$, et qui sur X_1, X_2 est donné par les inclusions canoniques [page 125]

$$\underbrace{X_1}_{\mathcal{X}_1 \text{ fibre de } \mathcal{X} \text{ en } 1} \longrightarrow 1\backslash\mathcal{X}, \qquad \underbrace{X_2}_{\mathcal{X}_2 \text{ fibre de } \mathcal{X} \text{ en } 2} \longrightarrow 2\backslash\mathcal{X}.$$

Ces inclusions, on le sait, sont W-asphériques (elles ont même un adjoint à droite), a fortiori elles sont dans W. Donc le diagramme non commutatif $(*)$ est isomorphe, en tant que diagramme dans Hot_W, au diagramme commutatif cartésien et cocartésien $(**)$ formé d'immersions fermées. Comme $\mathcal{X}$ est bel et bien somme amalgamée de ses deux fermées $1\backslash\mathcal{X}$, $2\backslash\mathcal{X}$ sous leur intersection X_0, cela étaye l'intuition qui voit $\mathcal{X}$ comme une 'somme amalgamée homotopique'. Donnons tout de suite l'application suivante :

Proposition 13. *Soit un diagramme* $\begin{array}{ccc} & \overset{\alpha_1}{\nearrow} & X_1 \\ X_0 & & \\ & \underset{\alpha_2}{\searrow} & X_2 \end{array}$ *dans* Cat*, d'où le diagramme* $(*)$*,*

p. 123, p. 85



commutatif dans Hot_W *(mais non dans* Cat*, sauf si* $X_0 = \emptyset$*). Supposons que* W *satisfait* W(7 bis) (axiome du carré cocartésien, cf. p. 75). *Alors on a* [page 126]


$$\begin{cases} \alpha_1 \in W \iff i_2 \in W \\ \alpha_2 \in W \iff i_1 \in W. \end{cases} ({}^{85})$$

Démonstration. Utilisant l'homomorphisme précédent de $(*)$ dans $(**)$, on voit que chacune des flèches α_1, α_2, i_1, i_2 est dans W, si et seulement si la flèche correspondante α'_1, α'_2, i'_1 ou i'_2 l'est. Donc les équivalences ci-dessus équivalent à

$$\begin{aligned} \alpha'_1 \in W &\iff i'_2 \in W \\ \alpha'_2 \in W &\iff i'_1 \in W, \end{aligned}$$

lesquelles sont vraies en vertu de W(7 bis) (formulation duale) appliqué à $\mathcal{X}$ et aux deux fermés $1\backslash\mathcal{X}$, $2\backslash\mathcal{X}$ de $\mathcal{X}$.

Corollaire : *Considérons* deux *diagrammes de type* Φ°*, et un homomorphisme* $f = (f_0, f_1, f_2)$ *de l'un dans l'autre (cf. diagramme en traits pleins ci-contre* `[ci-dessous]`*) :*



d'où un homomorphisme [page 127]

$$f_{\mathcal{X}} = \int f : \quad \mathcal{X} = \int \begin{array}{ccc} & & X_1 \\ X_0 & \nearrow & \\ & \searrow & \\ & & X_2 \end{array} \qquad \longrightarrow \qquad \mathcal{X}' = \int \begin{array}{ccc} & & X'_1 \\ X'_0 & \nearrow & \\ & \searrow & \\ & & X'_2, \end{array}$$

s'insérant dans un diagramme cubique (cf. diagramme précédent complété par des pointillés). Considérons les conditions suivantes. p. 86

a) $f_0 \in W$.

b) f_1 *et* f_2 *sont* `[dans]` W.

c) $f_{\mathcal{X}} = \int (f_0, f_1, f_2) \in W$.

85. **NB** Pour l'implication $\Longrightarrow$ on n'a besoin que de la forme directe de W(7 bis), i.e. (avec les notations de XVI) de Loc(6′a).

Supposons l'axiome W(7) ('lemme des 5', cf. page 76) *satisfait. Alors deux parmi les conditions a), b), c) impliquent la troisième*

$$\begin{cases} a \,\&\, b & \Longrightarrow & c \\ b \,\&\, c & \Longrightarrow & a \\ c \,\&\, a & \Longrightarrow & b. \end{cases}$$

En effet, on a un homomorphisme du diagramme cubique ci-dessus dans le diagramme similaire, où X_1, X_2, X'_1, X'_2 sont remplacés respectivement pas les fermés $1\backslash\mathcal{X}$, $2\backslash\mathcal{X}$ de $\mathcal{X}$, et $1\backslash\mathcal{X}'$, $2\backslash\mathcal{X}'$ de $\mathcal{X}'$, les deux carrés supérieur et inférieur étant des inclusions d'ouverts `[plutôt de fermés]` de $\mathcal{X}$ resp. de $\mathcal{X}'$. Ainsi, les conditions a), b), c) sont équivalentes respectivement aux conditions similaires pour le nouveau diagramme cubique (a) et c) [page 128]
n'ayant d'ailleurs pas changé, et b) donnant

b′) $f'_1 : \mathcal{X}/1 \longrightarrow \mathcal{X}'/1$ et $f'_2 : \mathcal{X}/2 \longrightarrow \mathcal{X}'/2$ sont dans W.


`[plutôt` $f'_1 : 1\backslash\mathcal{X} \longrightarrow 1\backslash\mathcal{X}'$ `et` $f'_2 : 2\backslash\mathcal{X} \longrightarrow 2\backslash\mathcal{X}'$`]`). Alors la conclusion du corollaire est équivalente à W(7) (formulation duale) dans le cas du nouveau diagramme cubique, q.e.d.

3.2 Comparaison de $\int X_0 \begin{smallmatrix} \nearrow X_1 \\ \searrow X_2 \end{smallmatrix}$ avec une somme amalgamée ordinaire.

Carrés W-homotopiquement cocartésiens.

La catégorie intégrée $\mathcal{X} = \int X_0 \begin{smallmatrix} \nearrow X_1 \\ \searrow X_2 \end{smallmatrix}$ est solution du problème universel suivant,

variante 2-catégorique de celui qui définit la limite inductive des diagrammes. Il s'agit, pour Y objet variable dans Cat, de considérer les systèmes de trois foncteurs f_0, f_1, f_2 et des deux homomorphismes fonctoriels λ_1, λ_2 : p. 87



(∗)

$$\begin{aligned} \lambda_1 : \quad f_1\alpha_1 &\longrightarrow f_0 \\ \lambda_2 : \quad f_2\alpha_2 &\longrightarrow f_0. \end{aligned}$$

Se donner une flèche de Cat [page 129]

$$\mathcal{X} \longrightarrow Y$$

'revient au même' que de se donner un système $(f_0, f_1, f_2, \lambda_1, \lambda_2)$ comme dessus, et ceci 'fonctoriellement en Y'. C'est là le cas particulier de la détermination générale des foncteurs de la catégorie fibrée 'intégrée' d'un contrafoncteur

$$I^\circ \longrightarrow \mathrm{Cat}, \qquad \begin{array}{ccc} i & \longmapsto & X_i \\ u & \longmapsto & u^* \end{array}$$

vers une catégorie Y, en termes d'un système de foncteurs

$$X_i \xrightarrow{f_i} Y,$$

et d'homomorphismes fonctoriels

$$f_i \circ u^* \xrightarrow{\lambda_u} f_j$$

pour $u : i \longrightarrow j$, d'où $u^* : X_j \longrightarrow X_i$, avec des conditions de transitivité pour des flèches composées, dont on n'a pas à tenir compte dans le cas actuel, vu qu'il n'y a pas de flèches composées à regarder dans $I = \Phi$ (sauf des composées avec une flèche identique, qu'on peut se dispenser de regarder ici …).


Si en particulier on a un diagramme *commutatif* dans Cat [page 130] p. 88

$$Q \quad = \quad \begin{array}{ccccc} & & X_0 & & \\ & \overset{\alpha_1}{\swarrow} & & \overset{\alpha_2}{\searrow} & \\ X_1 & & & & X_2 \\ & \underset{f_1}{\searrow} & & \underset{f_2}{\swarrow} & \\ & & Y, & & \end{array}$$

on peut le compléter par

$$f_0 \overset{\text{déf}}{=} f_1\alpha_1 = f_2\alpha_2$$


en un diagramme



ce qui montre qu'on a une donnée du type $(*)$ ci-dessus, définissant donc une flèche

$$\varphi_Q : \quad \mathscr{X} = \int \begin{array}{c} X_1 \\ \nearrow \\ X_0 \\ \searrow \\ X_2 \end{array} \qquad \longrightarrow \qquad Y$$

qui donne lieu à un diagramme cubique [page 131]



commutatif sauf le carré supérieur, i.e. on a p. 89


$$\varphi i_1 = f_1, \qquad \varphi i_2 = f_2, \qquad \text{et de plus} \quad \varphi i_0 = f_0,$$

φ transformant de plus les homomorphismes fonctoriels

$$\lambda_1 : i_1\alpha_1 \longrightarrow i_0, \qquad \lambda_2 : i_2\alpha_2 \longrightarrow i_0$$

en les homomorphismes fonctoriels identiques pertinents.

Définition 3. On dit que le diagramme commutatif



(∗)

est *W-homotopiquement cocartésien* ([86]) si l'homomorphisme canonique

$$\mathscr{X} = \int \begin{array}{ccc} & X_1 & \\ \nearrow & & \\ X_0 & & \xrightarrow{\varphi} \quad Y \\ \searrow & & \\ & X_2 & \end{array}$$

qu'il définit est dans W. ([87])

On a alors le : [page 132]

Corollaire 1. *Supposons* W(7 bis). *Si le carré* (∗) *est W-homotopiquement cocartésien, alors*


$$\begin{cases} \alpha_1 \in W & \Longleftrightarrow \quad f_2 \in W \\ \alpha_2 \in W & \Longleftrightarrow \quad f_1 \in W. \end{cases}$$

Cela résulte aussitôt du diagramme cubique de la page précédente, où toutes les flèches verticales sont dans W, et de l'énoncé similaire concernant la face supérieure du cube, donné dans la proposition 13, p. 125.

Corollaire 2. *Supposons* W(7). *Considérons un diagramme cubique* p. 90

86. ou simplement W-cocartésien, ou qu'il définit Y comme somme amalgamée W-homotopique de etc.

87. Introduire φ dans une proposition en forme, et donner ses propriétés essentielles : flèches strictement cartésiennes sont transformées en flèches *identiques* + lemmes 1 et 2 des p. 152, 154.



où les deux faces inférieure et supérieure du cube sont des carrés W-homotopiquement cocartésiens. Considérons les conditions

[page 133]

a) $p_0 \in W$.

b) p_1 *et* $p_2 \in W$.

c) $p \in W$.

Alors deux de ces conditions impliquent la troisième.

Résulte aussitôt de la définition 3, et du résultat similaire (cor. page 126) pour le diagramme cubique similaire, avec Y, Y' remplacées par $\mathscr{X} = \int \begin{array}{ccc} & & X_1 \\ & \nearrow & \\ X_0 & & \\ & \searrow & \\ & & X_2 \end{array}$ et $\mathscr{X}' = \int \begin{array}{ccc} & & X'_1 \\ & \nearrow & \\ X'_0 & & \\ & \searrow & \\ & & X'_2 \end{array}$.

3.3 Intégration propre versus intégration lisse. Énoncé d'équivalence entre les deux points de vue. Commentaires sur le cas des limites W-homotopiques quelconques.

La définition 3, et les corollaires précédents, n'ont d'intérêt que dans la mesure où on dispose de critères maniables, permettant d'affirmer qu'un carré commutatif est bel et bien homotopiquement cocartésien. C'est ce qu'on va essayer de faire tantôt. Il y a aussi une perplexité, concernant le rôle privilégié joué, dans la théorie développée ici, par les immersions fermées, à l'exclusion des immersions ouvertes. Nous avons en somme ramené, du point de vue homotopique, les diagrammes quelconques $\begin{array}{ccc} & & X_1 \\ & \nearrow & \\ X_0 & & \\ & \searrow & \\ & & X_2 \end{array}$ dans

p. 91

Cat, au cas d'un diagramme d'immersions fermées, où la somme amalgamée prend des allures familières. Mais pourquoi pas aussi bien le ramener au cas d'immersions ouvertes ? On considérerait alors le diagramme de départ comme définissant une catégorie *cofibrée*

[page 134]

sur

$$\Phi^\circ = \Psi = \quad 0 \begin{array}{l} \nearrow 1 \\ \searrow 2, \end{array}$$

soit $\tilde{\mathscr{X}}$. On a dans Ψ les deux ouverts

$$\underbrace{\Psi/1}_{=\{0,1\}} = U_1, \qquad \underbrace{\Psi/2}_{=\{0,2\}} = U_2, \qquad U_1 \cap U_2 = \{0\},$$

d'où dans $\tilde{\mathscr{X}}$ deux ouverts images inverses

$$\tilde{\mathscr{X}}/1, \qquad \tilde{\mathscr{X}}/2, \qquad \text{avec } \tilde{\mathscr{X}}/1 \cap \tilde{\mathscr{X}}/2 = X_0,$$

d'où un diagramme commutatif d'inclusions ouvertes

$$\begin{array}{ccccc} & & X_0 & & \\ & \swarrow^{\alpha'_1} & & \searrow^{\alpha'_2} & \\ \tilde{\mathscr{X}}/1 & & & & \tilde{\mathscr{X}}/2 \\ & \searrow_{i'_1} & & \swarrow_{i'_2} & \\ & & \tilde{\mathscr{X}}, & & \end{array} \qquad (*)$$

lequel reçoit le diagramme non commutatif [page 135]

$$\begin{array}{ccccc} & & X_0 & & \\ & \swarrow^{\alpha_1} & & \searrow^{\alpha_2} & \\ X_1 & \overset{\tilde{\lambda}_1}{\curvearrowright} & i_0 & \overset{\tilde{\lambda}_2}{\curvearrowleft} & X_2 \\ & \searrow_{i_1} & & \swarrow_{i_2} & \\ & & \tilde{\mathscr{X}}, & & \end{array}$$

les flèches p. 92

$$X_1 \longrightarrow \tilde{\mathscr{X}}/1, \qquad X_2 \longrightarrow \tilde{\mathscr{X}}/2$$

étant dans W (et même W-coasphériques - elles ont même un adjoint à gauche).

Donc on trouve, comme précédemment

$$\begin{cases} \alpha_1 \in W & \Longleftrightarrow \quad i_2 \in W \\ \alpha_2 \in W & \Longleftrightarrow \quad i_1 \in W, \end{cases}$$

et de même on peut formuler un 'lemme des cinq' comme le corollaire page 125 [plutôt 126], mais avec $\tilde{\mathscr{X}}$, $\tilde{\mathscr{X}}'$ au lieu de $\mathscr{X}$, $\mathscr{X}'$.

De plus, $\tilde{\mathscr{X}}$ est la solution d'un problème universel dans Cat, en termes de données

$$\begin{array}{ccccc} & & X_0 & & \\ & \swarrow^{\alpha_1} & & \searrow^{\alpha_2} & \\ X_1 & \overset{\tilde{\lambda}_1}{\curvearrowright} & f_0 & \overset{\tilde{\lambda}_2}{\curvearrowleft} & X_2 \\ & \searrow_{f_1} & & \swarrow_{f_2} & \\ & & Y, & & \end{array}$$

[page 136]

la seule différence avec celui formulé à la page 128 étant la direction opposée des flèches λ_1, λ_2. Pour tout carré commutatif

$$\begin{array}{ccccc} & & X_0 & & \\ & \overset{\alpha_1}{\swarrow} & & \overset{\alpha_2}{\searrow} & \\ X_1 & & & & X_2 \\ & \underset{f_1}{\searrow} & & \underset{f_2}{\swarrow} & \\ & & Y, & & \end{array} \qquad (*)$$

on trouve encore une flèche canonique

$$\tilde{\varphi} : \tilde{\mathscr{X}} \longrightarrow Y.$$

Il serait tout aussi raisonnable de dire que le carré $(*)$ est W-homotopiquement cocartésien, lorsque $\tilde{\varphi}$ est `[dans]` W, que d'adopter la définition 3, page 131 - on trouverait exactement les mêmes corollaires. Les deux définitions seraient elles équivalentes ??

Je note que $\tilde{\mathscr{X}}$ étant cofibrée sur $\Psi = \Phi^\circ$, $\tilde{\mathscr{X}}^\circ$ est fibrée sur $\Psi^\circ = \Phi$. De façon précise, on aura p. 93

$$\tilde{\mathscr{X}}^\circ = \int \begin{array}{ccc} & \overset{\alpha_1^\circ}{\nearrow} & (X_1)^\circ \\ (X_0)^\circ & & \\ & \underset{\alpha_2^\circ}{\searrow} & (X_2)^\circ, \end{array}$$

et il s'agit donc de comparer les deux intégrales [page 137]

$$\mathscr{X} = \int \begin{array}{ccc} & \overset{\alpha_1}{\nearrow} & X_1 \\ X_0 & & \\ & \underset{\alpha_2}{\searrow} & X_2 \end{array}, \qquad \tilde{\mathscr{X}}^\circ = \int \begin{array}{ccc} & \overset{\alpha_1^\circ}{\nearrow} & (X_1)^\circ \\ (X_0)^\circ & & \\ & \underset{\alpha_2^\circ}{\searrow} & (X_2)^\circ \end{array},$$

notamment comme objets de $\mathrm{HOT}_W(\Phi)$. Pour cela, je reprends la construction du foncteur

$$X \longmapsto \Phi(X) : \mathrm{Cat} \longrightarrow \mathrm{Cat}$$

de I, p. 72-75, mais je préfère ici noter ce foncteur $\Sigma(X)$ (car Φ désigne déjà une petite catégorie $\begin{array}{ccc} & \swarrow & 1 \\ 0 & & \\ & \nwarrow & 2 \end{array}$). On utilisera les homomorphismes fonctoriels en X :

$$\begin{array}{ccccc} & & \Sigma(X) & & \\ & \overset{p_X}{\swarrow} & & \overset{q_X}{\searrow} & \\ X & & & & X^\circ, \end{array}$$

qui sont W-asphériques, donc $\in W$. De plus, $\Sigma(X^\circ) = \Sigma(X)$, $p_{X^\circ} = q_X$, $q_{X^\circ} = p_X$. Ainsi,

si

$$X_* \quad = \quad \begin{array}{ccc} & & X_1 \\ & \overset{\alpha_1}{\nearrow} & \\ X_0 & & \\ & \underset{\alpha_2}{\searrow} & \\ & & X_2 \end{array} \qquad \in \quad \mathrm{Hom}(\Phi^\circ, \mathrm{Cat})$$

$$X_*^\circ \quad = \quad \begin{array}{ccc} & & (X_1)^\circ \\ & \overset{\alpha_1^\circ}{\nearrow} & \\ (X_0)^\circ & & \\ & \underset{\alpha_2^\circ}{\searrow} & \\ & & (X_2)^\circ \end{array} \qquad \in \quad \mathrm{Hom}(\Phi^\circ, \mathrm{Cat}),$$

on trouve [page 138]

$$\Sigma(X_*) = \left(\begin{array}{ccc} & & \Sigma(X_1) \\ & \overset{\Sigma(\alpha_1)}{\nearrow} & \\ \Sigma(X_0) & & \\ & \underset{\Sigma(\alpha_2)}{\searrow} & \\ & & \Sigma(X_2) \end{array} \right)$$

et les flèches p. 94

$$\begin{array}{ccc} & \Sigma(X_*) & \\ {\scriptstyle p_{X_*}} \swarrow & & \searrow {\scriptstyle q_{X_*}} \\ X_* & & X_*^\circ, \end{array}$$

dans $\underline{\mathrm{Hom}}(\Phi^\circ, \mathrm{Cat})$. Ces flèches sont dans W terme à terme, donc les homomorphismes dans Cat

$$\begin{array}{ccc} & \int \Sigma(X_*) & \\ {\scriptstyle \int p_{X_*}} \swarrow & & \searrow {\scriptstyle \int q_{X_*}} \\ \mathscr{X} = \int X_* & & \int X_*^\circ = \tilde{\mathscr{X}}^\circ \end{array}$$

sont dans W.

Finalement, l'innocent carré commutatif


$$Q \quad = \quad \begin{array}{ccc} & X_0 & \\ \swarrow & & \searrow \\ X_1 & & X_2 \\ \searrow & & \swarrow \\ & Y & \end{array} \qquad (*)$$

(et le diagramme correspondant

$$\widehat{Q} \quad = \quad \begin{array}{ccc} & X_0 & \\ \swarrow & & \searrow \\ X_1 & & X_2 \\ \searrow & & \swarrow \\ & \mathscr{X} = \int X_* & \\ & {\scriptstyle \downarrow \varphi_Q} & \\ & Y & \end{array} \qquad) \qquad (**)$$

donne naissance, en le transformant par $X \longmapsto X^\circ$ et par $X \longmapsto \Sigma(X)$, et en tenant [page 139]

compte des homomorphismes fonctoriels en X $\begin{array}{ccc} & \Sigma(X) & \\ \swarrow & & \searrow \\ X & & X^\circ \end{array}$, à trois diagrammes du type $(**)$, i.e. modelés sur la catégorie opposée de

$\Gamma \quad =$ 

(i.e. $\mathbf{\Delta}^1 \times \mathbf{\Delta}^1$ ([88]), auquelle on a rajouté un objet initial)

([89]), savoir p. 95

$$\widehat{Q}, \qquad \widehat{\Sigma(Q)}, \qquad \widehat{Q^\circ},$$

et deux homomorphismes de diagrammes (`[dans]` $\underline{\mathrm{Hom}}(\Gamma^\circ, \mathrm{Cat})$)

$\begin{array}{ccc} & \widehat{\Sigma(Q)} & \\ \swarrow & & \searrow \\ \widehat{Q} & & \widehat{Q^\circ} \end{array}$ (déduit de $\begin{array}{ccc} & \Sigma(Q) & \\ \swarrow & & \searrow \\ Q & & Q^\circ \end{array}$), $(***)$

lesquels sont dans W terme à terme (i.e. sont dans $W_\Gamma \subseteq \mathrm{Fl}(\underline{\mathrm{Hom}}(\Gamma^\circ, \mathrm{Cat}))$). Explicitement, en les sommets $i = 0, 1, 2$, resp. 4 de Γ, $(***)$ n'est autre que

$$D_i = \left(\begin{array}{ccc} & \Sigma(X_i) & \\ {\scriptstyle p_{X_i}} \swarrow & & \searrow {\scriptstyle q_{X_i}} \\ X_i & & X_i^\circ \end{array} \right) \quad \text{resp.} \quad \begin{array}{ccc} & \Sigma(Y) & \\ {\scriptstyle p_Y} \swarrow & & \searrow {\scriptstyle q_Y} \\ Y & & Y^\circ, \end{array}$$

en le sommet 3 c'est

$$\begin{array}{ccc} & \int \Sigma(X_*) & \\ {\scriptstyle \int p_{X_*}} \swarrow & & \searrow {\scriptstyle \int q_{X_*}} \\ \mathscr{X} = \int X_* & & \int X_*^\circ = \tilde{\mathscr{X}}^\circ, \end{array}$$


obtenu par intégration des flèches

$$\begin{array}{ccc} & \Sigma(X_*) & \\ {\scriptstyle p_{X_*}} \swarrow & & \searrow {\scriptstyle q_{X_*}} \\ X_* & & X_*^\circ. \end{array}$$

Regardant la restriction des deux morphismes de diagrammes $(***)$ aux parties des trois diagrammes de type Γ° au dessus de la queue $\{3, 4\}$ de Γ on trouve le diagramme [page 140]

88. faux, car le carré n'est pas commutatif
89. On a $\alpha_1 i_1 \neq \alpha_2 i_2$, mais la relation $\alpha_1 i_1 \varphi = \alpha_2 i_2 \varphi$.

en traits pleins que voici



qu j'ai complété par un deuxième volet en pointillés. Dans ce diagramme de quatre carrés accolés, les côtés horizontaux des carrés représentent des flèches de Cat qui sont dans W. On trouve ainsi : p. 96

$$\varphi_Q \in W \iff \varphi_{\Sigma Q} \in W \iff (\varphi_{Q^\circ} = \tilde{\varphi}_Q^\circ) \in W \iff \Sigma\tilde{\varphi}_Q \in W \iff \tilde{\varphi}_Q \in W.$$

On trouve aussi que les cinq flèches verticales sont isomorphes, en tant que flèches de Hot_W. Pour résumer :

Proposition 14. *Considérons un diagramme (carré commutatif)*

$$Q \quad = \quad \begin{array}{ccc} & X_0 & \\ \swarrow & & \searrow \\ X_1 & & X_2 \\ \searrow & & \swarrow \\ & Y & \end{array}$$

dans Cat*, et le diagramme 'opposé' déduit par* $X \longmapsto X^\circ$

$$Q^\circ \quad = \quad \begin{array}{ccc} & X_0^\circ & \\ \swarrow & & \searrow \\ X_1^\circ & & X_2^\circ \\ \searrow & & \swarrow \\ & Y^\circ, & \end{array}$$

et les flèches correspondantes [page 141]

$$\begin{cases} \varphi_Q : \quad \mathscr{X}_Q \quad = \quad \left(\int_{X_0} \begin{array}{c} \nearrow X_1 \\ \\ \searrow X_2 \end{array} \right) \quad \longrightarrow \quad Y \\ \varphi_{Q^\circ} : \quad \mathscr{X}_{Q^\circ} \quad = \quad \left(\int_{X_0^\circ} \begin{array}{c} \nearrow X_1^\circ \\ \\ \searrow X_2^\circ \end{array} \right) \quad \longrightarrow \quad Y^\circ. \end{cases}$$

Enfin, considérons aussi les flèches $\tilde{\varphi}_Q$*,* $\tilde{\varphi}_{Q^\circ}$ *canoniques, relative à l'intégrale propre* $\int_{\mathrm{pr}}$ *(au lieu de l'intégrale lisse* $\int = \int_{\mathrm{lis}}$*)* p. 97

$$\left\{\begin{array}{lcll} \tilde{\varphi}_Q : \quad \tilde{\mathscr{X}}_Q & = & \left(\int_{\mathrm{pr}} X_0 \begin{array}{c}\nearrow X_1 \\ \searrow X_2\end{array}\right) & \longrightarrow \quad Y \\ \\ \tilde{\varphi}_{Q^\circ} : \quad \tilde{\mathscr{X}}_{Q^\circ} & = & \left(\int_{\mathrm{pr}} X_0^\circ \begin{array}{c}\nearrow X_1^\circ \\ \searrow X_2^\circ\end{array}\right) & \longrightarrow \quad Y^\circ. \end{array}\right.$$

On a alors ce qui suit :

ⓐ $\varphi_{Q^\circ} \simeq (\tilde{\varphi}_Q)^\circ$, $\varphi_Q \simeq (\tilde{\varphi}_{Q^\circ})^\circ$ *(d'où résulte déjà que* $\left\{\begin{array}{lcl} \varphi_Q \in W & \iff & \tilde{\varphi}_{Q^\circ} \in W \\ \varphi_{Q^\circ} \in W & \iff & \tilde{\varphi}_Q \in W \end{array}\right.$ *(*[90]*)).*

ⓑ *Les relations*

$$\varphi_Q \in W, \qquad \varphi_{Q^\circ} \in W, \qquad \tilde{\varphi}_Q \in W, \qquad \tilde{\varphi}_{Q^\circ} \in W$$

sont équivalentes, en d'autres termes : pour que le carré soit W-homotopiquement cocartésien (version intégrale lisse), il faut et il suffit que le carré opposé Q° le soit, et ces conditions équivalent aussi aux conditions correspondantes en termes des intégrales propres (au lieu des intégrales lisses).

ⓒ *Les quatre flèches φ_Q, φ_{Q°, $\tilde{\varphi}_Q$, $\tilde{\varphi}_{Q^\circ}$ de* Cat *en tant que flèches dans* Hot_W*, sont isomorphes dans* $\underline{\mathrm{Fl}}(\mathrm{Hot}_W)$*. Plus précisément, en tant que flèches de* Cat*, elles définissent des objets isomorphes de* $\mathrm{HOT}_W(\mathbf{\Delta}^1)$*.* [page 142]

ⓓ *Plus précisément encore, les quatre diagrammes dans* Cat *de type* Γ°*, où*

$$\Gamma = \begin{array}{ccccccc} & & & 1 & & & \\ & & {\scriptstyle\alpha_1}\swarrow & & \nwarrow{\scriptstyle i_1} & & \\ 0 & & & & & 3 & \xleftarrow{\varphi} 4, \\ & & {\scriptstyle\alpha_2}\nwarrow & & \swarrow{\scriptstyle i_2} & & \\ & & & 2 & & & \end{array}$$


$\alpha_1 i_1 \varphi = \alpha_2 i_2 \varphi$, dans lesquels s'insèrent les quatre flèches qu'on vient d'envisager, savoir

$$\widehat{Q} = \begin{array}{ccccc} & & X_1 & & \\ & {\scriptstyle\alpha_1}\nearrow & & \searrow{\scriptstyle i_1} & \\ X_0 & \cdots\cdots\cdots & & \cdots\cdots\cdots & \mathscr{X}_Q \xrightarrow{\varphi_Q} Y, \\ & {\scriptstyle\alpha_2}\searrow & & \nearrow{\scriptstyle i_2} & \\ & & X_2 & & \end{array}$$

p. 98

$$\widehat{Q^\circ} = \begin{array}{ccccc} & & X_1^\circ & & \\ & {\scriptstyle\alpha_1^\circ}\nearrow & & \searrow{\scriptstyle i'_1} & \\ X_0^\circ & \cdots\cdots\cdots & & \cdots\cdots\cdots & \mathscr{X}_{Q^\circ} \longrightarrow Y^\circ, \\ & {\scriptstyle\alpha_2^\circ}\searrow & & \nearrow{\scriptstyle i'_2} & \\ & & X_2^\circ & & \end{array}$$

90. et que les flèches φ_Q et $\tilde{\varphi}_{Q^\circ}$ d'une part, φ_{Q° et $\tilde{\varphi}_Q$ d'autre part, sont isomorphes comme flèches dans Hot_W.



([91]) *sont isomorphes dans* $\mathrm{Hot}_W(\Gamma)$. *De façon plus précise encore, on a les isomorphismes dans* $\underline{\mathrm{Hom}}(\Gamma^\circ, \mathrm{Cat})$

$$(\widehat{Q})^\circ \simeq \widehat{Q^\circ},$$

d'où en l'appliquant à Q° *au lieu de* Q,

$$(\widehat{\widetilde{Q^\circ}})^\circ \simeq \widehat{Q},$$

ce qui implique (via les isomorphismes canoniques valables dans $\mathrm{HOT}_W(S)$ *pour tout objet* S *dans* Cat *et tout* $X_* \in \mathrm{Ob}\,\underline{\mathrm{Hom}}(S, \mathrm{Cat})$, $X_* \simeq X_*^\circ$ ([92])*, qu'on a les isomorphismes canoniques*

$$\left.\begin{array}{c} \widehat{Q} \simeq \widehat{\widetilde{Q^\circ}} \\ \widehat{Q^\circ} \simeq \widehat{\widetilde{Q}} \end{array}\right\} \qquad \textit{dans } \mathrm{HOT}_W(\Gamma),$$

mais aussi directement

$$\widehat{Q} \simeq \widehat{Q^\circ}, \qquad \widehat{\widetilde{Q}} \simeq \widehat{\widetilde{Q^\circ}} \qquad \textit{dans } \mathrm{HOT}_W(\Gamma)$$

(et il reste à vérifier qu'on a ainsi un système transitif *d'isomorphismes canoniques dans* $\mathrm{HOT}_W(\Gamma)$*, entre les quatre objets envisagés, ce qui doit être essentiellement sorital …).* [page 143]

Remarques.

1) Ce qu'on vient de dire dans le cas des diagrammes dans Cat de type $\Phi^\circ = \Psi$, a l'air de garder un sens pour les diagrammes de type quelconque

$$X_* : S^\circ \longrightarrow \mathrm{Cat}, \qquad s \longmapsto X_s$$

(S un objet de Cat). On peut l'intégrer de façon lisse, $\int X_* = \int_{\mathrm{lis}} X_*$, obtenant une catégorie fibrée (scindée) sur S, ou de façon propre, $\int_{\mathrm{pr}} X_*$, obtenant une catégorie cofibrée scindée sur S°. On peut également considérer X_*°, composé de X_* avec l'automorphisme $Y \longmapsto Y^\circ$ dans Cat, et l'intégrer de façon soit propre, soit lisse. Dans tous ces cas, on trouve un diagramme de type $\widehat{S}^\circ$, où $\widehat{S}$ est déduit de S en ajoutant un élément qui s'envoie par une flèche 'canonique' (donnée) dans chacun des autres (*sans* relations de commutation !) Un *système inductif* de morphismes dans Cat [page 144]

p. 99

$$f \qquad X_s \xrightarrow{f_s} Y$$

91. **NB** On devrait encore compléter ces diagrammes (non commutatifs) par les flèches en pointillés …
92. via le foncteur Σ utilisé plus haut …

donne alors un morphisme

$$\int_{\text{lis}} X_* \xrightarrow{\varphi_Q} Y,$$

où Q désigne le diagramme, de type $\widehat{S}^\circ$, formé des X_s, de Y, des $u^* : X_t \longrightarrow X_s$ (pour $u : s \longrightarrow t$ dans S) et des f_s. De même on aura

$$\int_{\text{prop}} X_* \xrightarrow{\tilde{\varphi}_Q} Y,$$

et si

$$\Gamma = (\widehat{S} + \text{objet initial}),$$

on trouve des diagrammes $\widehat{Q}$, $\widetilde{Q}$ de type Γ° dans Cat. Sauf erreur, les relations entre $\widehat{Q}$, $\widetilde{Q}$, $\widehat{Q^\circ}$, $\widetilde{\widehat{Q^\circ}}$ sont les mêmes que celles explicitées dans la proposition 14 ci-dessus. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus avec le soin requis, sauf en cas de besoin. On dira qu'un diagramme Q définit Y comme $\varinjlim_I W$-homotopique [où $I = S^\circ$] si $\varphi_Q \in W$. Il revient au même de dire que $\varphi_{Q^\circ} \in W$, ou que $\tilde{\varphi}_Q \in W$ ou que $\tilde{\varphi}_{Q^\circ} \in W$ … [page 145]


2) Le cas 'universel', pour $\begin{array}{ccc} & & X_1 \\ & \nearrow & \\ X_0 & & \\ & \searrow & \\ & & X_2 \end{array}$ donné, d'un carré commutatif $Q = \begin{array}{ccccc} & & X_1 & & \\ & \nearrow & & \searrow & \\ X_0 & & & & Y \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & X_2 & & \end{array}$ dans Cat, donnant naissance à

$$\varphi_Q : \left(\begin{array}{ccc} & & X_1 \\ & \nearrow & \\ \int X_0 & & \\ & \searrow & \\ & & X_2 \end{array} \right) \longrightarrow Y,$$

est celui de $Y = X_1 \amalg_{X_0} X_2$, donnant naissace à p. 100

$$Q_0 = Q(X_*) = \begin{array}{ccccc} & & X_1 & & \\ & \nearrow & & \searrow & \\ X_0 & & & & X_1 \amalg_{X_0} X_2. \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & X_2 & & \end{array}$$

Le cas général s'y ramène, car on aura un diagramme commutatif



Mais il doit y avoir des cas intéressants où φ_{Q_0} n'est *pas* dans W, i.e. le carré Cat-cocartésien $\begin{array}{ccc} & X_1 & \\ \nearrow & & \searrow \\ X_0 & & X_1 \amalg_{X_0} X_2 \\ \searrow & & \nearrow \\ & X_2 & \end{array}$ n'est pas W-homotopiquement cocartésien, et où pourtant on peut trouver un carré commutatif Q complétant X_*, de telle façon que [page 146] ce carré soit W-homotopiquement commutatif [plutôt cocartésien], i.e. que $\varphi_Q = \alpha_Q \varphi_{Q_0}$ soit dans W. C'est d'autant plus plausible que dans Cat, les sommes amalgamées ont tendance à ne pas avoir des bonnes propriétés homotopiques, même si l'une des flèches α_1, α_2 est [un] monomorphisme (voire une immersion ouverte), contrairement à ce qui se passe dans $\mathbf{\Delta}^\wedge$, et plus généralement dans les catégories de la forme $Z^\wedge$ (Z dans Cat).

3.4 Critères pour les carrés homotopiquement cocartésiens.

Les critères que j'ai dégagé sont tous contenus dans l'énoncé suivant :

Théorème 4 ([93], [94]). *Considérons un diagramme carré commutatif dans* Cat

$$Q \quad = \quad \begin{array}{ccc} X_0 & \xrightarrow{\alpha_1} & X_1 \\ {\scriptstyle \alpha_2}\downarrow & \overset{f_0}{\searrow} & \downarrow{\scriptstyle f_1} \\ X_2 & \xrightarrow[f_2]{} & Y, \end{array} \qquad (*)$$

et considérons le morphisme canonique p. 101

$$\varphi_Q : \quad \mathcal{X} = \Big(\int \quad \begin{array}{ccc} & X_1 & \\ {\scriptstyle \alpha_1} \nearrow & & \\ X_0 & & \\ {\scriptstyle \alpha_2} \searrow & & \\ & X_2 & \end{array} \Big) \quad \longrightarrow \quad Y,$$

l'intégrale étant l'intégrale lisse. *(Il y a un énoncé dual concernant l'intégrale propre de* [page 147]

93. **NB** Dans ce théorème, et les corollaires 1, 2, 3, on n'a besoin que de la *forme faible* de W(7 bis), savoir $i_0 \in W \Longrightarrow i \in W$ (cf. p. 79) (Loc(6′a) avec les notations de XVI).

94. **NB** Au total, le théorème (partie directe) est valable sans hypothèse W(7 bis) ou W(7 bis faible) sur W, et il en est de même de ses corollaires 1 à 3 (à l'exclusion des corollaires 4, 5, qui eux utilisent W(7 bis) dans toute sa force).

$$\begin{array}{ccc} & & X_1 \\ & \nearrow & \\ X_0 & & .) \\ & \searrow & \\ & & X_2 \end{array}$$

a) Pour que φ_Q soit W-lisse, il faut et il suffit que f_1, f_2 et $f_0 = f_1\alpha_1 = f_2\alpha_2$ le soient. (Moyennant W(7 bis) ([95])).

b) La fibre de φ_Q en un élément y de Y est isomorphe à

$$\int \begin{array}{ccc} & & X_{1\,y} \\ & \nearrow & \\ X_{0\,y} & & (\simeq \mathcal{X}_y). \\ & \searrow & \\ & & X_{2\,y} \end{array} \qquad (**)$$

Corollaire 1. ([97]) *Supposons f_1, f_2 et $f_1\alpha_1 = f_2\alpha_2$ W-lisses, et les catégories intégrées $(**)$ W-asphériques pour tout $y \in \mathrm{Ob}\,Y$. (NB Il s'agit encore de l'intégrale lisse, mais peu importe au fond, car on a vu (cf. partie supérieure du diagramme p. 140, qui implique que $\mathcal{X}$* `[est]` *W-asphérique si et seulement si $\tilde{X}$ l'est) que l'une est W-asphérique si et seulement si l'autre l'est.) Alors $\varphi_Q \in W$, i.e. le carré $(*)$ est W-homotopiquement cartésien* `[plutôt cocartésien]`*. Par dualité, même conclusion si on suppose f_1, f_2, $f_1\alpha_1 = f_2\alpha_2$* propres *au lieu de lisses. (Car Q W-homotopiquement trivial* `[plutôt cocartésien]`*, si et seulement si Q° l'est, par* `[la]` *prop. 14.)*

En effet, un morphisme dans Cat qui est W-lisse et à fibres W-asphériques est dans W (et c'est même une W-équivalence universelle …). [page 148]

Corollaire 2. *On suppose que W satisfait* W(7 bis) (axiome du carré cocartésien) ([98]). *Supposons le carré Q cocartésien dans* Cat ([99])*, et que α_1 soit une immersion ouverte (resp. fermée) et f_1 lisse (resp. propre). Alors Q est W-homotopiquement cocartésien.* ([100]) p. 102

Il suffit d'établir le résultat non respé, l'autre en résultera par dualité (puisque Q est W-cocartésien si et seulement si Q° l'est). Par hypothèse f_1 est W-lisse, d'autre part α_1 et f_2 sont des immersions ouvertes, donc W-lisses, donc $f_1\alpha_1$ est W-lisse aussi. (D'ailleurs α_2 aussi, car le carré est aussi cartésien, donc α_2 déduit de f_1 (qui est W-lisse par hypothèse) par changement de base $X_2 \longrightarrow Y$.) Donc φ_Q est `[W-]`lisse, et il suffit de voir que ses fibres sont W-asphériques. Le calcul $(**)$ donne, pour y dans $Y\backslash X_2$,

$$\mathcal{X}_y \simeq \int \begin{array}{ccc} & & e \\ & \nearrow & \\ \emptyset & & \simeq e, \qquad \text{O.K.} \\ & \searrow & \\ & & \emptyset \end{array}$$

95. Pour la partie directe (f_0, f_1, f_2 lisses $\Longrightarrow$ φ_Q lisse), on n'a besoin que de W(7 bis) ([96]), forme faible. Ce n'est que pour la réciproque (qui ne m'a encore jamais servie) qu'on a besoin de W(7 bis), dans toute sa force.

96. On n'a pas même besoin de W(7 bis) faible, cf. annotation page 156. On utilise une hypothèse restrictive sur W dans la réciproque seulement (φ_Q lisse $\Longrightarrow$ f_0, f_1, f_2 lisses).

97. Valable sans hypothèse sur W (autre que Loc(1,2,3 bis)).

98. inutile.

99. NB On n'utilise pas vraiment que Q soit cocartésien, plutôt que Q est *cartésien,* et f_2 (donc aussi α_1) une immersion ouverte (resp. fermée), et que pour $y \in Y\backslash X_2$, $X_{1\,y}$ soit W-asphérique. (Dans le cas où Q est cocartésien, $X_{1\,y}$ est $\simeq e$.)

100. On a besoin ici de W(7 bis), forme directe, i.e. de Loc(6′a) (notation de XVI).

Et pour y dans X_2

$$\mathcal{X}_y \simeq \int \begin{array}{ccc} & \overset{\sim}{\nearrow} & X_{1\,y} \\ X_{0\,y} & & \\ & \searrow & \\ & & e \end{array} .$$

Comme $X_{0\,y} \longrightarrow X_{1\,y}$ est un isomorphisme, donc est dans W, il s'ensuit que $e \longrightarrow \mathcal{X}_y$ l'est aussi (prop. 13, p. 125), moyennant W(7 bis), donc $\mathcal{X}_y$ est W-asphérique, O.K. ([101]). [page 149]

Corollaire 3. (Moyennant W(7 bis) ([102]).) *Soit X dans* Cat*, U_1, U_2 deux ouverts de X tels que $X = U_1 \cup U_2$, $U_0 = U_1 \cap U_2$ l'ouvert intersection. Alors le carré d'immersions ouvertes*

$$\begin{array}{ccc} U_0 & \hookrightarrow & U_1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ U_2 & \hookrightarrow & X \end{array}$$

est W-cocartésien. (Énoncé dual pour deux fermés T_1, T_2 tels que $T_1 \cup T_2 = X$, avec $T_0 = T_1 \cap T_2$.)

On applique le corollaire 2. On sait que le carré est cocartésien dans Cat ([103]), de plus $U_1 \hookrightarrow X$ est bien W-lisse, étant une immersion ouverte.

p. 103

Corollaire 4. (Moyennant W(7 bis) ([104]).) *Soit $U \overset{i}{\hookrightarrow} X$ une immersion ouverte telle que $T = X \backslash U$ soit isomorphe à la catégorie ponctuelle e. Pour que $i \in W$, il faut et il suffit que i soit W-asphérique, i.e. que U/t (où t est l'unique objet de T) soit W-asphérique.*

Il suffit bien sûr de prouver que

$$i \in W \Longrightarrow U/t \text{ } W\text{-asphérique.}$$

[page 150]

Considérons le carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} U/t & \overset{i/t}{\hookrightarrow} & X/t \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ U & \overset{i}{\hookrightarrow} & X, \end{array}$$

nous allons prouver qu'il est W-cocartésien. Moyennant W(7 bis), il s'ensuivra que $i \in W$ implique $i/t \in W$, et comme X/t est W-asphérique (ayant un objet final), cela signifie que U/t est W-asphérique, ce qu'on veut prouver.

Il suffit, en vertu du corollaire 2, de prouver que le carré est cocartésien dans Cat, puisque i/t est une immersion ouverte (i l'étant), et $X/t \longrightarrow X$ est un isomorphisme local, donc W-lisse. On voit que $(X/t)\backslash(U/t) \simeq e$ (catégorie ponctuelle), d'ailleurs l'unique élément de $(X/t)\backslash(U/t)$ est l'élément final $t_0 : t \overset{\mathrm{id}_t}{\longrightarrow} t$ de X/t. Ainsi $H_{t_0} \simeq e_{U/t}$ (préfaisceau final), et $p_!(H_{t_0}) \simeq H'_t \overset{\text{déf}}{=} (u \longmapsto \mathrm{Hom}_X(u,t))$, ce qui caractérise la somme amalgamée dans Cat …

Le corollaire 4 n'est autre que le corollaire non démontré de la proposition 7 (p. 85).

Voici une variante du corollaire 4.

101. On n'a besoin que de la forme directe de W(7 bis), i.e. (notation de XVI) de Loc(6′a).
102. inutile.
103. On n'a pas même besoin de le savoir, cf. annotation marginale du corollaire 2.
104. Ici on a besoin de W(7 bis) forme forte, i.e. $i_0 \in W \iff i \in W$ (cf. annotation th. 4).

Corollaire 5. (Moyennant W(7 bis) ([105]).) *Soit $i : U \hookrightarrow X$ une immersion ouverte, soit $t_0 \in \mathrm{Ob}\, T$ un point* fermé *de $T = X\backslash U$, tel que $\{t_0\}$ soit isomorphe à la catégorie ponctuelle, i.e.* $\mathrm{Hom}_X(t_0, t_0) = \{\mathrm{id}\}$. *Supposons que pour tout $t \in T\backslash\{t_0\}$, U/t soit W-asphérique. Pour que l'on ait $i \in W$, il faut et il suffit que i soit asphérique, i.e. que U/t_0 soit également W-asphérique.* [page 151]

Il faut prouver que $i \in W$ implique que U/t_0 est W-asphérique. Considérons l'inclusion

$$i_0 : U \longrightarrow U' \overset{\text{déf}}{=} X\backslash\{t_0\},$$

l'hypothèse sur les U/t, pour $t \in T\backslash\{t_0\}$, signifie que i_0 est W-asphérique. Donc i_0 est dans W, et comme le composé $i : U \xrightarrow{i_0} U' \xrightarrow{i'} X$ est dans W, cela implique que $i' : U' \longrightarrow X$ est dans W. Nous sommes maintenant dans la situation du corollaire 4, qui implique que i' est W-asphérique. Donc $i = i'i_0$ est W-asphérique, comme composé de deux morphismes W-asphériques, q.e.d. p. 104

Démonstration de th. 4.

ⓐ Critère de lissité de $\varphi_Q : \mathcal{X} = \int X_0 \begin{array}{c} \nearrow X_1 \\ \\ \searrow X_2 \end{array} \longrightarrow Y.$

Comme $\{1\}$, $\{2\}$ sont des ouverts de $\Phi = \begin{array}{ccc} & & 1 \\ & \swarrow & \\ 0 & & \\ & \nwarrow & \\ & & 2 \end{array}$, $i_1 : X_1 \longrightarrow \mathcal{X}$ et $i_2 : X_2 \longrightarrow \mathcal{X}$ sont des immersions ouvertes. Comme $\varphi_Q \circ i_1 = f_1$, $\varphi_Q \circ i_2 = f_2$, on voit déjà que [page 152]

f_1 et f_2 lisses $\iff$ φ_Q lisse sur l'ouvert réunion de $i_1(X_1)$ et $i_2(X_2)$, i.e. sur $\mathcal{X}\backslash i_0(X_0)$.

Il reste à exprimer la lissité de φ_Q en les points x_0 de $i_0(X_0)$. Soient x_1, x_2, y les images de x_0 dans X_1, X_2, Y respectivement. Il faut exprimer que les fibres de

$$(\varphi_Q)/x_0 : \mathcal{X}/x_0 \longrightarrow Y/y \qquad (*)$$

sont asphériques. Nous allons pour cela expliciter $\mathcal{X}/x_0$ et la flèche $(*)$ en termes du carré commutatif

$$(**) \qquad \begin{array}{ccc} X_0/x_0 & \xrightarrow{\alpha_1/x_0} & X_1/x_1 \\ {\scriptstyle \alpha_2/x_0}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_1/x_1} \\ X_2/x_2 & \xrightarrow{f_2/x_2} & Y/y, \end{array}$$

induit par Q. Je dis

Lemme 1. *Soit un carré commutatif*

$$Q \quad = \quad \begin{array}{ccc} X_0 & \xrightarrow{\alpha_1} & X_1 \\ {\scriptstyle \alpha_2}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_1} \\ X_2 & \xrightarrow{f_2} & Y \end{array}$$

105. forme forte.

dans Cat, $x_0 \in \mathrm{Ob}\, X_0$, x_1, x_2, y *ses images dans* X_1, X_2, Y *respectivement,* Q/x_0 *le carré* $(**)$ *ci-dessus, induit par* Q *sur les localisées* X_0/x_0 *etc.,* $\mathcal{X} = \int X_0 \begin{array}{c} \nearrow X_1 \\ \searrow X_2 \end{array}$ *. On a alors un isomorphisme canonique*

p. 105

[page 153]

$$\mathcal{X}/x_0 \quad \simeq \quad \int X_0/x_0 \begin{array}{c} \nearrow X_1/x_1 \\ \searrow X_2/x_2 \end{array},$$

et la flèche $(\varphi_Q)/x_0$, *localisée de* $\varphi_Q : \mathcal{X} \longrightarrow Y$ *en* x_0, *s'identifie à la flèche* $\varphi_{(Q/x_0)}$ *:*

$$\varphi_{(Q/x_0)} : \quad \int X_0/x_0 \begin{array}{c} \nearrow X_1/x_1 \\ \searrow X_2/x_2 \end{array} \quad \longrightarrow \quad Y/y.$$

Démonstration du Lemme. On sait que

$$\mathcal{X}/x_0 \longrightarrow \mathcal{X}$$

est Cat-fibrée (scindée) (à fibres discrètes), et comme

$$\mathcal{X} \longrightarrow \Phi$$

est aussi Cat-fibrée (scindée), il s'ensuit qu'il en est de même de la flèche composée

$$\mathcal{X}/x_0 \longrightarrow \Phi.$$

Donc pour 'calculer' $\mathcal{X}/x_0$, en tant que catégorie sur Φ, il faut expliciter ses trois fibres, et les deux foncteurs de changement de base qui les relient. On trouve aussitôt que ces fibres sont canoniquement isomorphes à

$$X_0/x_0, \qquad X_1/x_1, \qquad X_2/x_2,$$

et on admettra (!) que les foncteurs changement de base

[page 154]

$$X_0/x_0 \longrightarrow X_1/x_1, \qquad X_0/x_0 \longrightarrow X_2/x_2$$

(définis à isomorphisme unique près) ne sont autres que les localisés α_1/x_0 et α_2/x_0 de $\alpha_1 : X_0 \longrightarrow X_1$ et $\alpha_2 : X_0 \longrightarrow X_2$. Cela montre donc qu'on a un isomorphisme

$$\mathcal{X}/x_0 \quad \simeq \quad \int X_0/x_0 \begin{array}{c} \nearrow X_1/x_1 \\ \searrow X_2/x_2 \end{array},$$

p. 106

et l'on admettra aussi que la flèche $(\varphi_Q)/x_0 : \mathcal{X}/x_0 \longrightarrow Y/y$ s'identifie à $\varphi_{(Q/x_0)}$.

Pour exprimer la W-lissité de φ_Q en $x_0 \in \operatorname{Ob} X_0 \subseteq \operatorname{Ob} \mathcal{X}$, on est donc ramené à exprimer la W-asphéricité des fibres de

$$\varphi_{(Q/x_0)} : \quad \int X_0/x_0 \quad \begin{array}{c} \nearrow X_1/x_1 \\ \\ \searrow X_2/x_2 \end{array} \quad \longrightarrow \quad Y/y.$$

Pour expliciter ces fibres, on a besoin d'un autre lemme auxiliaire

Lemme 2 ([106]). *Soit un carré commutatif dans* Cat

$$Q \quad = \quad \begin{pmatrix} X_0 & \xrightarrow{\alpha_1} & X_1 \\ {\scriptstyle \alpha_2}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_1} \\ X_2 & \xrightarrow{f_2} & Y \end{pmatrix},$$

d'où

$$\varphi_Q : \quad \begin{pmatrix} & & X_1 \\ & \nearrow & \\ \int X_0 & & \\ & \searrow & \\ & & X_2 \end{pmatrix} \quad \longrightarrow \quad Y,$$

et soit $y \in \operatorname{Ob} Y$. Alors la fibre de φ_Q en y [page 155]

$$\mathcal{X}_y = \varphi_Q^{-1}(\underbrace{\{y\}}_{\text{catégorie ponctuelle}})$$

est donnée par (comme catégorie au dessus de Φ)

$$\mathcal{X}_y \quad \simeq \quad \int X_{0\,y} \quad \begin{array}{c} \nearrow X_{1\,y} \\ \\ \searrow X_{2\,y} \end{array} .$$

Démonstration. Il est immédiat qu'on a

$$\mathcal{X}_y \cap \underbrace{\mathcal{X}_s}_{X_s} \simeq (X_s)_y \qquad \text{pour } s \in \operatorname{Ob} \Phi = \{0,1,2\},$$

et (le hasard fait bien les choses) les foncteurs changement de base p. 107

$$X_0 \longrightarrow X_1, \qquad X_0 \longrightarrow X_2$$

106. NB C'est le b) du th. 4.

envoient la sous-catégorie (non pleine) $X_{0\,y}$ de X_0 dans les sous-catégories (non pleines) $X_{1\,y}$ et $X_{2\,y}$ de X_1 et X_2 respectivement.

$$\begin{array}{ccccc} X_{s\,y} & \longrightarrow & \mathcal{X}_y & \longrightarrow & \{y\} \\ \downarrow & \text{cart.} & \downarrow & \text{cart.} & \downarrow \\ X_s & \longrightarrow & \mathcal{X} & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & \text{cart.} & \downarrow & & \\ \{s\} & \longrightarrow & \Phi & & \end{array}$$

On a donc une sous-catégorie fibrée de $\mathcal{X}$, sous réserve de vérifier que les flèches strictement cartésiennes

$$x_0 \longrightarrow \alpha_1(x_0), \qquad x_0 \longrightarrow \alpha_2(x_0)$$

dans $\mathcal{X}$, pour x_0 dans $X_{0\,y}$, sont dans $\mathcal{X}_y$, i.e. sont au-dessus de la flèche identique de y. Or c'est là la propriété essentielle du foncteur $\varphi_Q : \mathcal{X} \longrightarrow Y$, qu'on a oublié d'expliciter dans 3.2. Ça a vraiment l'air de marcher (comme sur des roulettes !) [page 156]

Appliquons le Lemme 2 au diagramme carré Q/x_0 et à $\varphi_{(Q/x_0)}$ (page 154), on voit donc que les fibres à examiner en les $u \in \mathrm{Ob}\, Y/y$ $(u : y' \longrightarrow y)$ peuvent s'écrire comme les intégrales

$$\mathcal{X}(x_0, u) \overset{\text{déf}}{=} \int (X_0/x_0)_u \begin{array}{c} \nearrow (X_1/x_1)_u \\ \searrow (X_2/x_2)_u \end{array} .$$

Utilisons maintenant le fait que f_1, f_2 sont W-lisses (exprimant que φ_Q est W-lisse dans $\mathcal{X}\backslash X_0$), donc que $(X_1/x_1)_u$ et $(X_2/x_2)_u$ sont W-asphériques. Dans le carré W-cocartésien

$$\begin{array}{ccc} & (X_1/x_1)_u & \\ {\scriptstyle \alpha_1(x_0,u)} \nearrow & & \searrow {\scriptstyle i_1(x_0,u)} \\ (X_0/x_0)_u & & (\mathcal{X}/x_0)_u \simeq \mathcal{X}(x_0,u) \\ {\scriptstyle \alpha_2(x_0,u)} \searrow & & \nearrow {\scriptstyle i_2(x_0,u)} \\ & (X_2/x_2)_u & \end{array}$$

([107]), il faut exprimer que $(\mathcal{X}/x_0)_u$ est W-asphérique, sachant que $(X_1/x_1)_u$ et $(X_2/x_2)_u$ le sont. Donc cela équivaut à [p. 108]

$$i_1(x_0, u) \in W \qquad (\text{ou } i_2(x_0, u) \in W),$$

donc aussi (moyennant W(7 bis)) à [page 157]

$$\alpha_1(x_0, u) \in W, \qquad \text{i.e. } (X_0/x_0)_u \text{ } W\text{-asphérique.}$$

107. attention, ce n'est pas un carré commutatif. Dire plutôt que $(\mathcal{X}/x_0)_u \simeq \int \begin{array}{c} \nearrow \\ \searrow \end{array}$ est lisse sur Φ à fibres W-asphériques (si f_0, f_1, f_2 sont lisses), donc W-asphérique puisque Φ l'est.

Dire que c'est vrai pour tout u dans Y/y, signifie que $f_0 : X_0 \longrightarrow Y$ est lisse en u [plutôt en x_0].

Donc on a prouvé a), sous la forme plus précise :

Corollaire 6. *Soit* $x \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{X}$ *(où* $\mathcal{X} = \int X_0 \begin{array}{c} \nearrow X_1 \\ \searrow X_2 \end{array}$ *.) On veut exprimer la W-lissité de*

$$\varphi_Q : \mathcal{X} \longrightarrow Y$$

en x.

a) Si $x \in \mathrm{Ob}\,X_i$ *(*$i \in \{1,2\}$*),* φ_Q *est W-lisse en* x *si et seulement si* $f_i : X_i \longrightarrow Y$ *l'est.*

b) Supposons W(7 bis) ([108]). *Soit* $x_0 \in \mathrm{Ob}\,X_0$*, et supposons* f_1*,* f_2 *lisses en* x_1*,* x_2*. Alors* φ_Q *est W-lisse en* x_0 *si et seulement si* $f_0 : X_0 \longrightarrow Y$ *l'est.*

Donc (moyennant W(7 bis)) *dans les trois cas* $x \in \mathrm{Ob}\,X_i$ *(*$i \in \{0,1,2\}$*) on trouve que* φ_Q *est W-lisse en* x *si et seulement si* $f_i : X_i \longrightarrow Y$ *l'est* [pas vraiment pour $i = 0$].

ⓑ Quant à b) du théorème 4, c'est le lemme 2 ci-dessus. Donc tout est prouvé !

[page 158]

3.5 Applications aux sommes amalgamées dans une catégorie $X^\wedge$ (avec $X \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{Cat}$).

D'abord une caractérisation des sommes amalgamées impliquant une immersion ouverte :

Proposition 15. *Soit* p. 109

$$Q : \quad \begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{i} & X \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ U' & \xrightarrow{i'} & X' \end{array}$$

un carré commutatif dans Cat*. Pour que ce carré soit cocartésien dans* Cat*, avec i (donc* i'*) une immersion ouverte, il faut et il suffit que les conditions suivantes soient satisfaites :*

a) Q *est cartésien.*

b) i' *est une immersion ouverte (donc i aussi).*

c) Si $T' = X'\backslash U'$*, et* $T = X \times_{X'} T' = X\backslash U$*,* $T \longrightarrow T'$ *est un isomorphisme.*

d) Pour tout $t \in T$*, si* t' *est son image dans* T'*, le foncteur induit par* p

$$p/t : \underbrace{U/t}_{=V_t} \longrightarrow \underbrace{U'/t'}_{=V'_{t'}}$$

satisfait à $(p/t)_!(e_{U/t}) \simeq e_{U'/t'}$*, ou ce qui revient au même, les 'fibres colocales' de* p/t*,* $v'\backslash V_t$*, avec* v' *dans* $V'_{t'}$*, sont* 0*-connexes.*

[page 159]

Démonstration immédiate - ça devrait plutôt remonter au §1.

Corollaire 1. *Soit* Q *un carré* cartésien (cf. page 158)*, avec* i' *une* immersion ouverte *(donc i aussi), et* q W-lisse *(donc p aussi). On suppose que* W *satisfait l'axiome* W(5) *de connexité* ([109])*. Soit* $T' = X'\backslash U'$*,* $T = X\backslash U$*, supposons que* $T' \longrightarrow T$ *soit un isomorphisme. Alors* Q *est cocartésien.*


108. Inutile pour la partie directe, en supposant [phrase incomplète].

109. Donc il suffit q W_0-lisse, où $W_0 = \{f \in \mathrm{Fl}\,\mathrm{Cat} \mid \pi_0(f) \text{ bijectif}\}$.

Il suffit de prouver la condition d) de prop. 15. Considérons le carré

$$\begin{array}{ccc} U/t & \xrightarrow{i/t} & X/t \\ {\scriptstyle p/t}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q/t} \\ U'/t' & \xrightarrow{i'/t'} & X'/t', \end{array} \qquad (*)$$

je dis qu'il est *cartésien.* Cela résulte de la seule hypothèse que Q soit cartésien, sans hypothèse de lissité sur q ni que i' soit une immersion ouverte, et se voit p. ex. en regardant le diagramme cubique : p. 110



([110]). Dans ce diagramme, la face antérieure et postérieure du cube est cartésienne, par définition de U/t et de U'/t' respectivement, et la base l'est par hypothèse. Il en résulte que la face supérieure du cube est également un carré cartésien. [page 160]

Ceci vu, commme q est lisse, il en est de même de q/t dans le carré cartésien $(*)$, donc aussi de p/t par changement de base. D'autre part, la lissité de q implique que q/t est à fibres W-asphériques, donc par changement de base il en est de même de p/t (qui est donc une W-équivalence universelle, i.e. une W-fibration triviale). De plus, à cause de la lissité de p/t, pour v' dans U'/t', l'inclusion

$$(U/t)_{v'} \longrightarrow v'\backslash(U/t)$$

est dans W, donc (par W(5)) définit une bijection sur les π_0. Comme $(U/t)_{v'}$ est W-asphérique par ce qui précède, il s'ensuit (par W(5)) que son π_0 est de cardinal 1, donc il en est de même de $v'\backslash(U/t)$, i.e. celui-ci est 0-connexe. Or c'est là la condition d) de la proposition 15, qu'il fallait établir.

Corollaire 2. *Soit Q un carré cartésien* (p. 158), *avec i' (donc aussi i) une immersion ouverte, et q (donc aussi p) un* isomorphisme local. *Soit $T = X\backslash U$, $T' = X'\backslash U'$ (donc $T \simeq X \times_{X'} T'$), et supposons $T' \longrightarrow T$ isomorphisme. Alors Q est cocartésien.* [page 161]

C'est un cas particulier du corollaire 1, mais sans référence explicite à un localiseur W. On peut pendre $W = W_\infty$, ou $W = W_0$, pour se ramener au corollaire 1. Mais il est plus raisonnable de dire que dans le carré cartésien $(*)$, l'hypothèse que q soit un isomorphisme local implique que q/t est un isomorphisme, donc p/t l'est aussi. Il en résulte bien que les $v'\backslash(U/t)$ sont 0-connexes, cette catégorie étant isomorphe à $v'\backslash(U'/t')$, donc a un objet initial.

Soit maintenant X un objet de Cat, et considérons un diagramme cocartésien dans $X^\wedge$:

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{i} & F \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ G' & \xrightarrow{i'} & F', \end{array} \qquad (*)$$

où i est un monomorphisme. On sait que le caractère cocartésien du carré se vérifie p. 111

110. NB Ici t est un élément quelconque de $\mathrm{Ob}\, X$, t' son image dans X'. [page 162]

'argument par argument' par le caractère cocartésien de

$$\begin{array}{ccc} G(x) & \xrightarrow{i(x)} & F(x) \\ {\scriptstyle p(x)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q(x)} \\ G'(x) & \xrightarrow{i'(x)} & F'(x), \end{array} \qquad (*)$$

dans Ens, $\forall\, x$ dans X. Or un tel carré cocartésien dans Ens, avec $i(x)$ [un] monomorphisme, est aussi cartésien. Cela implique que le carré Q dans $X^\wedge$ est également cartésien.

Considérons, d'autre part, le foncteur canonique

$$\varphi_X : F \longmapsto X/F : X^\wedge \longrightarrow \mathrm{Cat}.$$

Il vaut mieux, d'ailleurs, le regarder comme un foncteur

$$\varphi_X : X^\wedge \longrightarrow \mathrm{Cat}/X,$$

et je rappelle, pour mémoire, que ce foncteur est pleinement fidèle, et que son image essentielle est formée des catégories X' sur X telles que

$$X' \longrightarrow X$$

soit un isomorphisme local, ou ce qui revient au même, que X' soit *fibrée* sur X à fibres discrètes : [page 163]

$$\varphi_X : X^\wedge \xrightarrow{\sim} \underbrace{\underline{\text{Fib disc}}\, X}_{\substack{\text{catégories fibrées} \\ \text{à fibres discrètes}}} .$$

Notons que toute flèche $X' \longrightarrow X''$ dans $\underline{\text{Fib disc}}\, X$ est un isomorphisme local (tautologique sur $X'/x' \longrightarrow X''/x''$), ce qui montre que si on a un diagramme

$$\begin{array}{ccc} & X'/x' & \longrightarrow X''/x'' \\ {\scriptstyle \text{iso.}}\searrow & & \swarrow{\scriptstyle \text{iso.}} \\ & X/x & \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} X_1 & & X_2 \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & X_0 & \end{array}$$

dans $\underline{\text{Fib disc}}\, X$, le produit fibré $X_3 = X_1 \times_{X_0} X_2$ dans Cat est tel que $X_3 \longrightarrow X_2$ est un isomorphisme local, donc aussi $X_3 \longrightarrow X$. C'est-à-dire $\underline{\text{Fib disc}}(X)$ est stable par produits fibrés. Ceci implique que les produits fibrés existent dans $\underline{\text{Fib disc}}\, X$, et que ce sont les produits fibrés dans Cat, ou dans Cat/X.

De même pour les produits finis dans $\underline{\text{Fib disc}}\, X$, ce sont les produits finis dans Cat/X. Bref p. 112

Lemme 1. *La sous-catégorie pleine* $\underline{\text{Fib disc}}\, X$ *de* Cat/X *est stable par* $\varprojlim$ *finies, donc les* $\varprojlim$ *existent dans* $\underline{\text{Fib disc}}\, X$ *et le foncteur d'inclusion* [page 164]

$$\underline{\text{Fib disc}}\, X \longrightarrow \mathrm{Cat}/X$$

y commute, et en particulier transforme carrés cartésiens de $\underline{\text{Fib disc}}\, X$ *en carrés cartésiens de* Cat/X*, ou ce qui revient au même, de* Cat*. De plus, en vertu de l'équivalence*

$$\varphi_X : X^\wedge \xrightarrow{\sim} \underline{\text{Fib disc}}\, X \hookrightarrow \mathrm{Cat}/X,$$

le foncteur φ_X *de* $X^\wedge$ *dans* Cat/X *est exacte à gauche, en particulier il transforme carrés cartésiens de* $X^\wedge$ *en carrés cartésiens de* Cat/X*, ou encore de* Cat*.* [page 165]

Notons aussi qu'étant exact à gauche, le foncteur φ_X de $X^\wedge$ dans Cat/X transforme monomorphismes en monomorphismes. D'autre part :

Lemme 2. *Les monomorphismes qui sont des isomorphismes locaux sont exactement les immersions ouvertes. Donc dans* Fib disc X*, les monomorphismes sont les immersions ouvertes, et le foncteur* $\varphi_X : F \longmapsto X/F$ *transforme monomorphismes en immersions ouvertes.*

Revenons alors au diagramme cocartésien $(*)$ (p. 161), et au diagramme correspondant dans Cat (et même dans Fib disc X)

$$\begin{array}{ccccc} X/G & \xrightarrow{X/i} & X/F & \dashleftarrow & T \\ {\scriptstyle X/p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle X/q} & & \vdots \\ X/G' & \xrightarrow{X/i'} & X/F' & \dashleftarrow & T'. \end{array}$$

Comme $(*)$ est cartésien, le carré précédent est cartésien, par ce qui précède. Je veux prouver qu'il est également cocartésien (dans Cat/X, ou dans Cat, cela revient au même), et [page 166]
pour ceci j'applique le corollaire 2 de la proposition 15 (p. 161), compte tenu que X/q est un isomorphisme local, et X/i' (étant un isomorphisme local [et un] monomorphisme) une immersion ouverte. Il suffit de prouver que, T' et T étant les sous-catégories fermées complémentaires des ouverts X/G' de X/F' et de X/G de X/F, que $T \longrightarrow T'$ est [un] isomorphisme.

[Maintenant, F et G, et F' et G', mais pas p et q, échangent leur rôles.]

La vérification est immédiate : T est la catégorie des flèches $x \longrightarrow G$ dans $X^\wedge$ (de source x dans X) qui ne se factorisent pas par G [plutôt par F], T' celle des flèches $x \longrightarrow G'$

qui ne se factorisent pas par F', le foncteur $T \longrightarrow T'$ étant le foncteur composition p. 113
de $x \longrightarrow G$ avec $G \xrightarrow{q} G'$

$$\begin{array}{ccc} F & \longrightarrow & G \\ \downarrow & & \downarrow \\ F' & \longrightarrow & G' \end{array}$$

(NB Le composé ne se factorise pas par F', car autrement, à cause du caractère cartésien de Q, $x \longrightarrow G$ se factoriserait par F.) Mais pour x donné, la donnée de $x \longrightarrow G$ ne se factorisant pas par F est celle d'un élément de $G(x)\backslash F(x)$, et à cause du caractère [page 167]
cocartésien de Q,

$$(G(x)\backslash F(x)) \longrightarrow (G'(x)\backslash F'(x))$$

est bijectif, i.e. 'il revient au même' de se donner $x \longrightarrow G$ ne se factorisant pas par F, ou $x \longrightarrow G'$ ne se factorisant pas par F'.

Ainsi on a prouvé le

Théorème 5. *Soit* X *dans* Cat*, et*

$$Q : \qquad \begin{array}{ccc} F & \xrightarrow{i} & G \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ F' & \xrightarrow{i'} & G' \end{array}$$

un carré cocartésien dans $X^\wedge$*, avec* i [un] *monomorphisme. Alors* i' *est* [un] *monomorphisme, le carré* Q *est aussi cartésien, et le carré correspondant dans* Cat/X *ou dans*

Cat

$$\begin{array}{ccc} X/F & \xrightarrow{X/i} & X/G \\ {\scriptstyle X/p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle X/q} \\ X/F' & \xrightarrow{X/i'} & X/G' \end{array}$$

est à la fois cartésien et cocartésien. De plus, si W est un localiseur fondamental dans Cat*, satisfaisant* W(7 bis) (en plus de W(1,2,3))*, alors le carré X/Q dans* Cat *est W-cocartésien.* [page 168]

Ce dernier énoncé résulte de ce qui précédait et du corollaire 2 du théorème 4, compte tenu que X/q est un isomorphisme local, donc est W-lisse. p. 114

Corollaire : ([111]) *On a* (moyennant W(7 bis)) *les équivalences*

$$\begin{aligned} i \in W_X \quad &\Longleftrightarrow \quad i' \in W_X \\ p \in W_X \quad &\Longleftrightarrow \quad q \in W_X, \end{aligned}$$

où

$$W_X \subseteq Fl(X^\wedge)$$

est défini par (cf. Pursuing Stacks …)

$$u \in W_X \qquad \Longleftrightarrow \qquad X/u : X/F \longrightarrow X/G \quad \textit{est dans } W.$$

Ainsi, dans une catégorie $X^\wedge$, les sommes amalgamées impliquant un monomorphisme se comportent de façon parfaite du point de vue homotopique, plus exactement pour les localiseurs W_X, pourvu seulement que W satisfasse à W(7 bis). Notamment, les monomorphismes dans $X^\wedge$ sont des 'W_X-cofibrations', en un sens similaire de celui de la définition 2 c) (pages 99, 100 [plutôt 109, 110]). [page 169]

[page 170 n'existe pas.]

111. **NB** Si on veut seulement $i \in W_X \Longrightarrow i' \in W_X$, $p \in W_X \Longrightarrow q \in W_X$, il suffit que l'on ait W(7 bis) *faible*, i.e. $i_0 \in W \Longrightarrow i \in W$ dans l'énoncé de W(7 bis), p. 76 (Loc(6′a) avec les notations de XVI).

VI Critère de W_∞-asphéricité pour les $\Omega^n(X,x)$.

p. 115
[page 171]

1 Cogitations sur W_n.

On va définir, pour $n \in \mathbf{N}$,

$$W_n \subseteq \mathrm{Fl}(\mathrm{Cat})$$

par les conditions suivantes (où $f : X \longrightarrow Y$ est une flèche dans Cat).

$f \in W_0 \iff$ a) $\pi_0(f)$ bijectif.

$\iff$ b) Pour tout préfaisceau d'ensembles F *constant* sur Y, $H^0(Y,F) \longrightarrow H^0(X,f^*F)$ est bijectif.

$\iff$ c) Le foncteur $F \longmapsto f^*F$ des préfaisceaux d'ensembles *constants* sur Y vers les faisceaux d'ensembles constants sur X est pleinement fidèle.

`[Les termes de faisceau ou de préfaisceau sont utilisés ici indifféremment.]`

NB Si F_0 est un ensemble, $F_{0\,Y}$ le faisceau d'ensembles constant défini par F sur Y, on a

$$H^0(Y,F_{0\,Y}) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{Ens}}(\pi_0(Y),F_0) \qquad \text{(fonctoriel en } Y)$$
$$\mathrm{Hom}_{Y^\wedge}(F_{0\,Y},G_{0\,Y}) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{Ens}}(\pi_0(Y),\mathrm{Hom}_{\mathrm{Ens}}(F_0,G_0)) \qquad \text{(fonctoriel en } Y),$$

ce qui implique que a) $\Longrightarrow$ c) $\overset{\text{tautologiquement}}{\underset{\substack{\text{en prenant}\\ \mathrm{Hom}_{Y^\wedge}(e_Y,F)}}{\Longrightarrow}}$ b) $\Longrightarrow$ a).

$f \in W_1 \iff$ a) $\pi_0(f)$ bijectif, et pour tout $x \in \mathrm{Ob}\,X$, $\pi_1(f,x)$: $\pi_1(X,x) \longrightarrow \pi_1(Y,f(x))$ est bijectif. (NB Il suffit de le vérifier pour *un* x dans chaque composante connexe de X.)

$\iff$ a′) $\Pi(X) \xrightarrow{\Pi f} \Pi(Y)$ est une équivalence de catégories.

$\iff$ b) $H^0(Y,F) \longrightarrow H^0(X,f^*F)$ bijectif pour tout faisceau d'ensembles *localement constant* sur Y, et $H^1(Y,F) \longrightarrow H^1(X,f^*F)$ bijectif si de plus F est un faisceau en groupes.

$\iff$ b′) Comme b), mais pour le H^1 on se borne à F *constant*, et on exige $H^1(f)$ *surjectif* seulement.

$\iff$ c) Le foncteur $F \longmapsto f^*F$ de la catégorie des faisceaux d'ensembles localement constants sur Y vers celle des faisceaux localement constants sur X est une équivalence de catégories.

p. 116
[page 172]

NB Le groupe $\pi_1(X,x)$ est défini via la théorie du groupoïde fondamental. On sait qu'il est en bijection canonique avec $\pi_0(\Omega(X,x))$, où $\Omega(X,x) = \underline{\mathrm{Ch}}(X;x,x)$ (ce qui permet d'avoir une loi de composition monoïdale sur $\Omega(X,x)$, donnant la loi de groupe sur le π_0), ou au choix $\Omega(X,x) = \underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X;x,x)$ (plus commode dans certaines situations, mais ne donnant pas directement la loi de composition dans $\pi_0(\Omega(X,x))$).

Je vais poser, pour $n \in \mathbf{N}$,

$$\pi_n(X,x) = \pi_0(\Omega^n(X,x)),$$

Ω^n désignant l'itéré n-ième du foncteur $(X,x) \longmapsto \Omega(X,x)$ de la catégorie $\mathrm{Cat}_\bullet$ des objets ponctués de Cat dans elle-même. Je préfère ici travailler avec la théorie $\underline{\mathrm{Ch}}$ au lieu de $\underline{\mathrm{Ch}}_\infty$. Tôt ou tard il faudra donner un énoncé de comparaison …

Théorème 1 ([112]). *Soit $f : X \longrightarrow Y$ dans* Cat*, et soit $n \in \mathbf{N}$, $n \geq 2$, S une partie de* Ob X *telle que le composé $S \longrightarrow \mathrm{Ob}\, X \longrightarrow \pi_0(X)$ soit* [un] *épimorphisme. Les conditions suivantes sont équivalentes.*

a) $\pi_i(f, x)$ *isomorphe pour tout $x \in \mathrm{Ob}\, X$ et tout $i \in [0, n]$.*

a′) Comme a), mais avec $x \in S$.

b) On a

$$\begin{array}{lll} H^0(Y,F) & \xrightarrow{\sim} & H^0(X, f^*F) \quad \textit{pour } F \textit{ faisceau d'ensembles} \\ & & \textit{localement constant sur } Y. \\ H^1(Y,F) & \xrightarrow{\sim} & H^1(X, f^*F) \quad \textit{si de plus } F \textit{ faisceau en groupes.} \\ H^i(Y,F) & \xrightarrow{\sim} & H^i(X, f^*F) \quad \textit{si de plus } F \textit{ faisceau abélien, } i \in [2, n]. \end{array}$$

NB L'équivalence de a) et a′) devrait être triviale, mais pour cela il faut avoir défini [page 173] les $\pi_n(X, x)$, pour x variable dans Ob X, comme système local sur X, chose que je n'ai pas faite encore. Je vais essayer de le faire dans un courant d'air. Tout d'abord, les $\Omega(X, x)$ sont les fibres d'une W_ω-fibration parfaite ([113]), s'insérant dans le carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{Ch}}(X) & \longleftarrow & \Omega(X, -) \\ {\scriptstyle p_X=(\sigma_X,\beta_X)}\downarrow & \overset{i_X}{\nearrow} & \downarrow \\ X \times X & \xleftarrow{\mathrm{diag}_X} & X. \end{array}$$

On sait alors que l'on a un foncteur p. 117

$$\begin{array}{rl} \Pi X & \longrightarrow \mathrm{Hot}_{W_\omega} \\ x & \longmapsto \mathrm{hot}_{W_\omega}(\Omega(X, x)). \end{array} \qquad (*)$$

Or on a, pour $i \geq 1$,

$$\pi_i(X, x) = \pi_{i-1}(\underbrace{\Omega(X, x)}_{\text{objet ponctué}}).$$

Cela donne le système local cherché des π_i, si seulement on avait un foncteur un peu plus précis que $(*)$, savoir

$$\Pi X \longrightarrow \mathrm{Hot}_{\bullet\, W_\omega} \qquad (\text{catégorie } W_\omega\text{-homotopique } \textit{ponctuée})$$

([114]). Or la flèche $i_X : X \longrightarrow \underline{\mathrm{Ch}} X$ relevant p_X donne une section canonique de $\Omega(X, -)$ sur X - celle justement qui associe à tout $x \in X$ le point marqué 1_x de $\Omega(X; x, x)$ ('lacet [page 174] vide en x'). La question est donc celle-ci :

> On a une W-fibration $\Omega \longrightarrow X$, avec une section donné σ. Cela définit-il un foncteur canonique
>
> $$X \longrightarrow \mathrm{Hot}_{\bullet\, W},$$
>
> transformant toute flèche en [un] isomorphisme ?

L'idée naturelle est de prendre

$$x \longmapsto \mathrm{hot}_{\bullet\, W}(\Omega/x)$$

en ponctuant Ω/x par le point marqué $\sigma(x)$ de $\Omega_x \hookrightarrow \Omega/x$. L'ennui, c'est que les morphismes de transition $\Omega/x \longrightarrow \Omega/x'$ (pour $x \xrightarrow{u} x'$ dans X) ne sont pas compatibles avec

[page 175]

les points marqués. Mais on a une flèche (savoir $\sigma(u)$) allant de l'image $\sigma(x)/x'$ du point marqué de Ω/x vers le point marqué $\sigma(x')/x'$ de Ω/x'. Ceci doit suffire pour définir la flèche

$$(\Omega/x, \sigma(x)/x) \longrightarrow (\Omega/x', \sigma(x')/x')$$

comme flèche dans $\mathrm{Hot}_{\bullet W}$, avec transitivité pour une composée $x \overset{u}{\to} x' \overset{v}{\to} x''$ dans X. Je vais pour l'instant me borner à une indication, quitte à faire des vérifications circonstanciées par la suite. Au besoin, j'utiliserai dès maintenant que pour $i \in \mathbf{N}$, $i \geq 1$, [page 176]

$$\pi_i(f, x) : \pi_i(X, x) \longrightarrow \pi_i(Y, f(x))$$

peuvent s'interpréter comme provenant d'un homomorphisme de systèmes locaux

$$\underset{\sim i}{\pi}(X, -) \longrightarrow f^*(\underset{\sim i}{\pi}(Y, -))$$

sur X. La condition a) du théorème 1 s'interprète en disant que cet homomorphisme est un *isomorphisme* pour $i \in [1, n]$, et la condition a$'$) se borne alors à rappeler qu'il suffit de tester qu'il en est ainsi pour *un* point de chaque composante connexe de X.

L'énoncé du théorème 1 garde un sens pour $n = 1$, et dans ce cas a été 'rappelé' précédemment (et est ± tautologique). Cela va nous permettre de procéder par récurrence sur n, en supposant que le théorème est prouvé pour $n - 1$. Cela signifie que l'on peut supposer que les conditions a) *et* b) sont satisfaites par f pour $i \in [1, n-1]$, et se borner à prouver que, sous ces conditions, la condition a) (ou a$'$), pour $i = n$, équivaut à la condition b) pour $i = n$.

Donc il faut prouver simplement ceci :

Lemme ([115]). *Supposons que* $\pi_i(f, x)$ [est un] *isomorphisme pour* $i \in [0, n-1]$ *et* [page 177] *b) satisfait pour* $i \in [0, n-1]$*, où* $n \in \mathbf{N}$*,* $n \geq 2$*, est fixé. Alors les conditions suivantes sont équivalentes :*

a) $\pi_n(f, x) : \pi_n(X, x) \longrightarrow \pi_n(Y, f(x))$ [est un] *isomorphisme pour tout* $x \in \mathrm{Ob}\, X$*.*

b) $H^n(Y, F) \xrightarrow{\sim} H^n(X, f^*F)$ [est un] *isomorphisme pour tout faisceau abélien localement constant sur* Y*.*

Notons que f induit une flèche dans $\mathrm{Cat}_\bullet$,

$$\Omega(f, x) : \Omega(X, x) \longrightarrow \Omega(Y, f(x)),$$

d'où

$$\begin{array}{ccc} \pi_i(\Omega(X, x)) & \longrightarrow & \pi_i(\Omega(Y, f(x))) \\ \wr| & & \wr| \\ \pi_{i+1}(X, x) & \longrightarrow & \pi_{i+1}(Y, f(x)), \end{array}$$

s'identifiant à $\pi_{i+1}(f, x)$:

$$\pi_i(\Omega(f, x)) \simeq \pi_{i+1}(f, x).$$

L'hypothèse a) du lemme implique que $\pi_i(\Omega(X, x)) \xrightarrow{\sim} \pi_i(\Omega(Y, y))$ pour $i \in [0, n-1]$. Il s'agit ici des π_i basés en les points unités. On devra sans doute prouver que, du fait qu'il s'agit d'un morphisme de monoïdes dans Cat (satisfaisant certaines conditions ?) ça reste vrai pour les π_i en *tout* point ξ de $\Omega(X, n)$. Par l'hypothèse de récurrence, on saura donc que $\Omega(X, x) \longrightarrow \Omega(Y, y)$ induit un isomorphisme pour la cohomologie à coefficients

112. Sans doute *faux*. On doit avoir a) $\Longrightarrow$ b), mais b) $\Longrightarrow$ a) [est] sans doute faux déjà pour $n = 2$ (sauf le cas X, Y 1-connexes). Cf. énoncé rectifié [p. 178]. [page 178]

113. **NB** W_ω est le plus petit localiseur de Cat (satisfaisant W(1, 2 bis, 3)).

114. Mais il faut aussi vérifier que les $\pi_n(X, x)$ ($n \geq 1$) sont des foncteurs sur $\mathrm{Hot}_{\bullet\, W_\infty}$, i.e. transforment W_∞-équivalences en itou. Cela résulte de W(4a) pour W_∞, qui implique que $(X, x) \mapsto \Omega(X, x)$ se factorise par $\mathrm{Hot}_{\bullet\, W_\infty}$ (en tant que foncteur à valeurs dans $\mathrm{Hot}_{\bullet\, W_\infty}$).

115. Sans doute faux.

localement constants, jusqu'en dimension $n-1$ inclus.

Finalement, je me suis ± convaincu que l'énoncé du théorème 1 est faux tel quel. Voici un énoncé que j'espère vrai, et que je vais essayer de prouver dans un esprit 'utilitaire', en utilisant tout ce que je sais en homotopie et cohomologie (et pas seulement ce que j'ai développé 'from scratch' dans le modélisateur Cat).

Théorème 1 rectifié. *Considérons, pour un entier $n \geq 2$ donné, les conditions suivantes sur une flèche $f : X \longrightarrow Y$ dans* Cat *(ou une application continue d'espaces topologiques, ou un morphisme dans $\mathbf{\Delta}^\wedge$ etc. etc.) :*

- a_n) *Si Z est une 'fibre homotopique' de f (NB il y en a essentiellement une par composante connexe de Y), alors Z est n-connexe, i.e. (p. ex) $\pi_i(Z) = 0$ pour $i \in [0, n]$.* [page 179]
- b_n) *$\pi_0(f)$ est bijectif, et $\forall\ x \in X$, $\pi_i(f, x) : \pi_i(X, x) \longrightarrow \pi_i(Y, f(x))$ est* [un] *isomorphisme pour $i \in [1, n]$. (***NB** *Il suffit de le dire pour* un *point x de chaque composante connexe de X.)*
- c_n) *$H^i(Y, F) \longrightarrow H^i(X, f^*F)$* [est un] *isomorphisme pour F faisceau localement constant sur Y (avec F abélien si $i \geq 2$, F faisceau en groupes si $i = 1$).*

On a alors

$$a_n \implies b_n \implies (^{116})\ c_n \implies (^{117})\ a_{n-1}$$

(et je présume que chacune de ces implications est stricte).

Démonstration. $a_n \Longrightarrow b_n$ est conséquence immédiate de la suite exacte d'homotopie pour une Hot-fibration $\bar{X} \xrightarrow{\bar{f}} Y$ qui factorise $X \xrightarrow{f} Y$ en $f = \bar{f} \circ i$, $i \in W_\infty$. En fait, a_n *équivaut* à b_n + la surjectivité des $\pi_{n+1}(X, x) \longrightarrow \pi_{n+1}(Y, f(x))$, laquelle bien sûr ne résulte *pas* de b_n, i.e. de la bijectivité des $\pi_i(f, x)$ pour $i \leq n$ (prendre des $K(\pi, n+1)$). Donc l'implication est bien stricte.

$b_n \Longrightarrow c_n$. On peut supposer que f est une Hot-fibration (et même Hot-parfait si ça nous chante …). On sait déjà que pour [p. 120] [page 180]

$$H^i(Y, F) \longrightarrow H^i(X, f^*F) \qquad (*)$$

tout est O.K. si $i \in \{0, 1\}$. Donc on peut supposer F abélien. Si ça nous avance, on peut supposer, par récurrence, (que l'implication $b_{n-1} \Longrightarrow c_{n-1}$ est connue, donc) que $(*)$ est [un] isomorphisme pour $i < n$. Reste à le voir pour $i = n$. On est ramené bien sûr, comme $\pi_0(f)$ est bijectif, au cas où X, Y sont 0-connexes, donc il y a essentiellement une seule fibre Z. La suite exacte d'homotopie nous apprend que

$$\pi_i(Z, z) = 0 \qquad \text{pour } i \leq n-1 \ (Z \text{ est } (n-1)\text{-connexe})$$

et de plus

$$\pi_n(Z, z) \longrightarrow \pi_n(X, z) \qquad \text{est nul}$$

(car $\pi_n(X, z) \longrightarrow \pi_n(Y, y)$ [est un] isomorphisme donc [un] monomorphisme), donc

$$\pi_{n+1}(Y, y) \longrightarrow \pi_n(Z, z) \qquad \text{[est un] épimorphisme.}$$

Comme Z est $(n-1)$-connexe (donc aussi 1-connexe), on a

$$H^i(Z, G) = 0\ , \qquad \text{si } 0 < i < n\ , \qquad (*)$$

pour G localement constant (donc constant) sur Z.

116. si X, Y 1-connexes, c'est vraiment prouvé, sinon, il y a des vérifications à faire (qui ont l'air soritales …).


117. **NB** Même si X, Y 1-connexes, il n'est pas clair que $c_n \Longrightarrow b_n$, car il faut montrer que $\pi_n(Z) \longrightarrow \pi_n(X)$ est nul, et on trouve seulement que le composé avec $\pi_n(X) \longrightarrow H_n(X)$ est nul. Je présume qu'il y a des contre-exemples. [page 181]

Écrivons la suite spectrale de Leray pour $f : X \longrightarrow Y$ et $f^*F = F_X$:

$$H^*(X, f^*F) \Longleftarrow E_2^{pq} = H^p(Y, H^q(Z, f^*F)),$$

où '$H^q(Z)$' doit être vu comme un système local sur Y. Donc par $(*)$ on a

$E_2^{pq} = 0$ si $0 < q < n$,



donc on trouve la suite exacte

$$0 \longrightarrow H^n(Y, F) \longrightarrow H^n(X, F_X) \xrightarrow{\alpha} H^0(Y, \underbrace{H^n(Z, \overbrace{F_Z}^{M_Z})}_{= \mathrm{Hom}(\pi_n(Z,z),M) \text{ par [le] th. de Hurewicz}}) \longrightarrow H^{n+1}(Y, F).$$

Ici je fixe un point x de X, Z désigne la fibre de f en $y = f(x)$, et M celle de F en y, $M = F_y$. Le groupe $\pi_1(Y)$ y opère, d'ailleurs $\pi \overset{\text{déf}}{=} \pi_1(X, x) \simeq \pi_1(Y, y)$ aussi. Le $H^0(Y, H^n(Z, F_Z))$ peut s'interpréter, sauf erreur, comme p. 121

$$\mathrm{Hom}_\pi(\pi_n(Z, x), M),$$

en tenant compte de l'opération de $\pi = \pi_1(X, x)$ sur $\pi_n(Z, x)$ également. (À vérifier.) Il faut interpréter la flèche

$$H^n(X, F_X) \longrightarrow \mathrm{Hom}_\pi(\pi_n(Z, x), M),$$

via l'application composée [où $z = x$, vu comme point de Z]

$$\pi_n(Z, z) \longrightarrow \pi_n(X, x) \longrightarrow H_n(X, \mathbf{Z}). \qquad (*)$$

Si F est *constant* sur Y (p. ex. si Y [est] 1-connexe), donc de valeur M, on a les flèches canoniques

$$H^n(X, F_X) = H^n(X, M) \longrightarrow \mathrm{Hom}(H_n(X, \mathbf{Z}), M) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\pi_n(Z, z), M)(^{118}) \qquad (*')$$

[lire : Hom_π],

et sûrement (en dehors de toute hypothèse de type b_n ou autre) l'application canonique directe 'de localisation sur Y', suivi de …, [page 182]

$$H^n(X, F_X) \longrightarrow H^0(Y, H^n(Z, F_Z)) \longrightarrow \mathrm{Hom}_\pi(\pi_n(Z), M) \qquad (**)$$

n'est autre que la composée des applications canoniques ci-dessus. Dans le cas actuel où on suppose b_n, la deuxième flèche dans $(**)$ est [un] isomorphisme, donc la composée 'n'est autre' que la flèche de localisation elle-même. D'autre part $\pi_n(Z, z) \longrightarrow \pi_n(X, x)$ dans $(*)$ est nul, donc aussi $\pi_n(Z, z) \longrightarrow H_n(X, \mathbf{Z})$, donc aussi la flèche composée $(*')$ qui s'en déduit. Revenons alors à la suite exacte de Leray (page précédente), on trouve que $H^n(Y, F) \xrightarrow{\sim} H^n(X, F_X)$.

118. grâce à la composition avec $(*)$.

Comment récupérer le cas où F n'est *pas* constant? Dans le cas $n = 2$, cela marchait, en passant aux revêtements universels $\tilde{X}, \tilde{Y}$ de X, Y (par rapport aux points x, y choisis), et en écrivant les suites spectrales

$$\begin{array}{ccccc} H^*(Y,F) & \Longleftarrow & E_2^{pq} & = & H^p(\pi, H^q(\tilde{Y}, F_{\tilde{Y}})) \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ H^*(X,F_X) & \Longleftarrow & E_2'^{pq} & = & H^p(\pi, H^q(\tilde{X}, F_{\tilde{X}})). \end{array}$$

L'hypothèse b_n est conservée en passant de $f : X \longrightarrow Y$ à $\tilde{f} = \tilde{f}_x : \tilde{X} \longrightarrow \tilde{Y}$, donc on sait que


p. 122

$$E_2^{pq} \xrightarrow{\sim} E_2'^{pq} \qquad \texttt{[est un]} \text{ isomorphisme si } q \leq n. \tag{$*$}$$

[page 183]

Dans le cas $n = 2$, utilisant que

$$E_2^{p1} = E_2'^{p1} = 0 \qquad \text{car } H^1(\tilde{X}) = H^1(\tilde{Y}) = 0,$$



,

on trouve deux suites exactes

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & H^2(\pi, H^0(\tilde{Y})) & \longrightarrow & H^2(Y) & \longrightarrow & H^0(\pi, H^2(\tilde{Y})) & \longrightarrow & H^3(\pi, H^0(\tilde{Y})) \\ & & \downarrow \text{iso} & & \downarrow & & \downarrow \text{iso} & & \downarrow \text{iso} \\ 0 & \longrightarrow & H^2(\pi, H^0(\tilde{X})) & \longrightarrow & H^2(X) & \longrightarrow & H^0(\pi, H^2(\tilde{X})) & \longrightarrow & H^3(\pi, H^0(\tilde{X})), \end{array}$$

et un homomorphisme de l'une dans l'autre, qui permet de conclure par le lemme des 5 que $H^2(Y,F) \longrightarrow H^2(X,F_X)$ est `[un]` isomorphisme. Mais pour n quelconque, la relation $(*)$ sur les termes E_2 (pour $q \leq n$) ne me semble pas impliquer la relation similaire pour les E_n supérieures, et de là pour les termes E_∞, ce qui permettrait de conclure.

Je reviens donc à la suite exacte p. 181, avec F faisceau *tordu.* J'ai envie de trouver une application canonique

$$H^n(X,G) \longrightarrow \overbrace{\mathrm{Hom}_\pi(\pi_n(X,x), G_x)}^{\text{Homs } \textit{additifs} \text{ bien sûr, i.e. de } \mathbf{Z}[\pi]\text{-modules}} ,$$

où G est un faisceau abélien localement constant quelconque sur X, et $\pi = \pi_1(X,x)$. Si j'interprète $\pi_n(X,x)$ par des classes d'homotopie d'applications ponctuées

[page 184]

$$(S^n, x_0) \xrightarrow{\varphi} (X,x)$$

j'ai bien, pour une telle application φ,

$$\varphi^* : H^n(X,G) \longrightarrow H^n(S^n, \overbrace{\varphi^* G}^{\simeq (G_x)_{S^n}}) \simeq G_x$$

(tenant compte que S^n est 1-connexe, et que sa n-cohomologie à valeurs dans un faisceau constant M est M.) Sûrement l'application

$$H^n(X,G) \longrightarrow G_x$$

ainsi définie ne dépend que de la classe d'homotopie ponctuée de φ, d'où

p. 123

$$\pi_n(X,x) \times H^n(X,G) \longrightarrow G_x,$$

et il faut de plus prouver a) que c'est compatible avec les opérations de $\pi = \pi_1(X,x)$, et b) que c'est additif en $\pi_n(X,x)$, pour avoir l'application cherchée

$$H^n(X,G) \longrightarrow \mathrm{Hom}_\pi(\pi_n(X,x), G_x).$$

Si j'admets ceci, il n'y a qu'un pas pour admettre aussi que la flèche qui nous intéresse vraiment (dans la suite exacte p. 181) [page 185]

$$H^n(X,F_X) \longrightarrow \mathrm{Hom}_\pi(\pi_n(Z,z), \underbrace{M}_{=F_y})$$

n'est autre que la composée de la flèche précédente (page précédente) pour $G = F_X$, avec

$$\mathrm{Hom}_\pi(\pi_n(X,x), M) \longrightarrow \mathrm{Hom}_\pi(\pi_n(Z,x), M)$$

déduite de

$$\pi_n(Z,x) \longrightarrow \pi_n(X,x).$$

Or cette flèche est nulle, par l'hypothèse b_n. Donc la flèche α dans la suite exacte page 181 est nulle, donc $H^n(Y,F) \longrightarrow H^n(X,F_X)$ est `[un]` isomorphisme, q.e.d. (mais il y a pas mal de travail de vérification à faire …).

$\mathrm{c}_n \Longrightarrow \mathrm{a}_{n-1}$. On peut procéder par récurrence sur n. (NB L'enoncé a un sens même pour $n = 1$, où il est prouvé, et même $\mathrm{c}_1 \Longrightarrow \mathrm{b}_1$, et $\mathrm{b}_1 \Longrightarrow \mathrm{a}_0$, plus généralement $\mathrm{b}_n \Longrightarrow \mathrm{a}_{n-1}$, immédiat par `[la]` suite exacte d'homotopie.) Donc on sait déjà, en plus de l'hypothèse c_n, qu'on a a_{n-2}, i.e. Z est $(n-2)$-connexe. Il faut prouver qu'il est même $(n-1)$-connexe, i.e. $\pi_{n-1}(Z) = 0$. Le cas $n = 2$ demande peut-être une attention particulière, car on ne sait pas même encore que Z est 1-connexe. Mais on sait que c_2 implique c_1, qui équivaut `[?]` à b_1, donc on a [page 186]

$$\pi_1(X,x) \longrightarrow \pi_1(Y,y) \qquad \text{isomorphisme,}$$

donc

$$\pi_1(Z,x) \longrightarrow \pi_1(X,x) \qquad \texttt{[est]}\ \textit{nul,}$$


donc

$$\pi_2(Y,y) \longrightarrow \pi_1(Z,x) \qquad \texttt{[est un]}\ \text{épimorphisme,}$$

ce qui implique tout au moins que $\pi_1(Z,x)$ est *abélien.* Il faut le voir comme un π-module, et prouver sa nullité comme tel (moyennant c_2).

Passons au cas général. On a pour F localement constant abélien sur Y p. 124

$$H^*(X,F_X) \Longleftarrow \underbrace{E_2^{pq} = H^p(Y, H^q(Z,F_Z))}_{\substack{=0 \text{ si } 0<q<n-1 \\ \text{car } Z \text{ est } (n-2)\text{-connexe}}},$$



D'où

$$0 \longrightarrow H^{n-1}(Y,F) \longrightarrow H^{n-1}(X,F_X) \longrightarrow \underbrace{H^0(Y, H^{n-1}(Z,F_Z))}_{\substack{\mathrm{Hom}_\pi(\pi_{n-1}(Z,x),F_x) \\ \text{par Hurewicz}}} \longrightarrow H^n(Y,F) \longrightarrow H^n(X,F_X)$$ [page 187]

L'hypothèse c_n implique qu'on a

$$\mathrm{Hom}_\pi(\pi_{n-1}(Z,x), \underbrace{M}_{=F_x}) = 0$$

et ceci *quel que soit le π-module M,* puisque $\pi = \pi_1(X,x) \xrightarrow{\sim} \pi_1(Y,y)$. Cela implique (en prenant p. ex. $M = \pi_{n-1}(Z,x)$!) que $\pi_{n-1}(Z,x) = 0$. (Mais en faisant attention, dans le cas $n = 2$, qu'on sait déjà que $\pi_1(Z,x)$ est abélien).

Donc le théorème rectifie page 178 a bien l'air vrai. Il est un peu triste, puisque dans chacune des implications

$$a_n \implies b_n \implies c_n \implies a_{n-1}$$

on perd un chouia, et en fin de compte on sort avec la magnifique implication

$$a_n \implies a_{n-1}.$$

De toutes façons, il est ± clair que le "bon" localiseur W_n, celui qui doit définir les "n-types d'homotopie" comme objets de Hot_{W_n}, est défini par la condition a_n.

2 Critère de W_n-asphéricité.

Je vais essayer de faire mieux quand Y est réduit à un point. Cette fois, je veux être strict, et donner (si je peux) des démonstrations complètes dans le cadre où je me place à présent, celui du modéliseur Cat, et en n'utilisant que ce que je sais y démontrer directement à présent, sans me référer à la théorie semi-simpliciale ou topologique.

p. 125
[page 188]

Théorème 2 (?). *Soit X dans* Cat, $n \in \mathbf{N}$ *un entier* ≥ 1. *Alors les conditions suivantes sont équivalentes :*

a_n) X est 0-connexe, et si x est dans X, $\pi_i(X,x) = 0$ pour $i \in [1,n]$ (condition qui ne dépend pas du choix de x), i.e. les $\Omega^i(X,x)$ pour $i \in [1,n]$ sont 0-connexes.

b_n) Pour tout groupe G, $G \longrightarrow H^0(X,G_X)$ est un isomorphisme, et $H^1(X,G_X) = 0$. De plus, si G est abélien, on a aussi $H^i(X,G_X) = 0$, pour $i \in [1,n]$.

Démonstration. Pour $n = 1$ cette équivalence est ± tautologique et a été rappelée (sous une forme légèrement différente) au début (p. 71). On procède par récurrence. On peut donc supposer que $n \geq 2$, que X satisfait a_{n-1}, b_{n-1}, et prouver qu'alors a_n, b_n sont équivalentes, i.e. $\pi_n(X,x) = 0$ équivaut à $H^n(X,M) = 0$ pour tout groupe abélien M.

[page 189]

On utilise la W_∞-fibration (parfaite)

$$\begin{array}{ccc} E = \underline{\mathrm{Ch}}(X;x,-) & & E\ W_\infty\text{-asphérique} \\ \Big\downarrow & & \\ X & & \end{array}$$

de fibre Z en x égale à $\Omega(X,x)$.

Supposons a_n) pour X, donc a_{n-1}) pour $\Omega(X,x)$. Par hypothèse de récurrence, on a donc


$$H^i(Z,M) = 0 \qquad \text{pour } i \in [1,n-1],$$

M groupe abélien. Donc dans la suite spectrale de Leray,

$$H^*(E,M) \Longleftarrow E_2^{pq} = H^p(X, H^q(Z,M))$$

on a

$E_2^{pq} = 0$ si $q \in [1, n-1]$,



.

On a donc la suite exacte p. 126

$$0 \longrightarrow H^n(X,M) \longrightarrow H^n(E,M)$$

et comme E est W_∞-asphérique, on a $H^n(E,M) = 0$, donc $H^n(X,M) = 0$.

Inversement, supposons b_n), prouvons a_n). On sait déjà qu'on a a_{n-1}), donc a_{n-2} pour $\Omega(X,x)$, ce qui implique

$$H^i(Z,M) = 0 \qquad \text{pour } i \in [1, n-2],$$

donc

$$E_2^{pq} = 0 \qquad \text{si } q \in [1, n-2].$$

On a donc la suite exacte

[page 190]

$$0 \longrightarrow \underbrace{H^{n-1}(X,M)}_{=0} \longrightarrow \underbrace{H^{n-1}(E,M)}_{=0} \longrightarrow H^0(X, H^{n-1}(Z,M)) \longrightarrow \underbrace{H^n(X,M)}_{=0} \longrightarrow H^n(E,M),$$

donc

$$H^0(X, \underbrace{H^{n-1}(Z,M)}_{\substack{\text{système local} \\ \textit{constant} \text{ sur } X, \\ \text{car } X \text{ est 1-connexe}}}) = 0,$$

donc

$$H^{n-1}(Z,M) = 0,$$

ce qui, par hypothèse de récurrence, implique $\pi_{n-1}(Z,z) = 0$, donc $\pi_n(X,x) = 0$, q.e.d.

Corollaire. *Pour que X soit W_∞-asphérique, i.e. pour qu'on ait $G \xrightarrow{\sim} H^0(X,G)$, $H^1(X,G) = 0$* [pour] *tout groupe* [G]*, et $H^i(X,G) = 0$ si $i \geq 2$ pour G abélien, il faut et il suffit que* 1°) *X soit 0-connexe, et (x étant un point de X)* 2°) *les $\Omega^i(X,x)$* [soient] *0-connexes pour $i \geq 1$.*

[page 191]

3 Sur la philosophie des fibres homotopiques.

Le critère d'asphéricité (pour W_∞) que je viens d'obtenir, grâce aux foncteur $\underline{\mathrm{Ch}}(X)$ (ou au choix, $\underline{\mathrm{Ch}}_\infty(X)$) et ses dérivés $\Omega(X,x)$ et les itérés, enlève tout doute (s'il pouvait en rester encore) que les 'espaces de chemins' que j'ai construit (assez péniblement !) sont bel et bien 'les bons'. Je voudrais maintenant me rendre compte de façon la plus précise possible de leur 'canonicité', dans quelle mesure ces constructions sont indépendant d'un choix (p.ex. celui entre la théorie $\underline{\mathrm{Ch}}$, et $\underline{\mathrm{Ch}}_\infty$).

p. 127

Tout revient, finalement, à des questions de factorisation d'une flèche quelconque

$$f : X \longrightarrow Y$$

de Cat en

$$X \xrightarrow{i_f} \bar{X} \xrightarrow{\bar{f}} Y,$$

avec

$$i_f \in W, \qquad \bar{f} \in W\text{-fib}$$

(le fait que $\bar{f}$ puisse même être choisie W_ω-parfait, ne me paraissant pas essentiel ici).

C'est bien de cela qu'il s'agit pour construire
un objet 'chemins dans X' [page 192]

$$\underline{\mathrm{Ch}}(X),$$

en factorisant l'application diagonale

$$X \xrightarrow{\mathrm{diag}_X} X \times X,$$

et aussi quand on construit $\Omega(X, x)$ comme fibre en x d'une W-fibration

$$E(X, x) \longrightarrow (X, x)$$

qui factorise l'inclusion

$$\{x\} \longrightarrow X$$

(donc $E(X, x)$ étant W-asphérique).

On peut être plus ou moins exigeant, et regarder, soit pour un 'but' Y (ou plutôt un S) fixé dans Cat, une factorisation fonctorielle

$$C : \mathrm{Cat}/S \longrightarrow \underline{\mathrm{Fib}}_W S \hookrightarrow \mathrm{Cat}/S$$

du morphisme structural $X \longrightarrow S$ d'un objet, en

$$X \xrightarrow{i_X} C(X) \longrightarrow S,$$

i.e. on se donne le foncteur C, *plus*
le morphisme fonctoriel [page 193]

$$i_C : \mathrm{id}_{\mathrm{Cat}/S} \longrightarrow C$$

avec

$$(i_X : X \longrightarrow C(X)) \in W \qquad \forall\ X \text{ dans } \mathrm{Cat}/S,$$

soit être encore plus exigeant et faire varier en même temps la source et le but de $f : X \longrightarrow Y (= S)$, et demander un foncteur

$$\begin{array}{rcl} C : \underline{\mathrm{Fl}}(\mathrm{Cat}) & \longrightarrow & \mathrm{Cat} \\ f & \longmapsto & C(f), \end{array}$$

avec des morphismes fonctoriels en f p. 128

$$\underbrace{s(f)}_{=X} \xrightarrow{i_f} \underbrace{C(f)}_{=\bar{X}} \xrightarrow{p_f} \underbrace{b(f)}_{=Y}$$

(i, p des flèches dans $\underline{\mathrm{Hom}}(\underline{\mathrm{Fl}}(\mathrm{Cat}), \mathrm{Cat})$), avec

$$i_f \in W, \qquad p_f \in W\text{-fib}$$ [page 194]

pour toute flèche f dans Cat.

Dans les deux points de vue, dans quel sens a-t-on *unicité* d'une telle construction ?

Prenons d'abord le premier point de vue, factorisation des flèches à but fixé S, donc `[c'est une]` question dans Cat/S. J'ai oublié une propriété importante, mais elle résulte de ce qui a été dit : le foncteur

$$X \longmapsto C(X) : \qquad \begin{array}{ccc} \mathrm{Cat}/S & \longrightarrow & \mathrm{Cat}/S \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & \underline{\mathrm{Fib}}_W S & \end{array}$$

transforme `[les]` *flèches* `[de]` W *en itou*, comme on voit sur le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{i_X} & C(X) \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle C(f)} \\ Y & \xrightarrow{i_Y} & C(Y), \end{array}$$

où i_X, i_Y sont dans W, donc

$$f \in W \qquad \Longleftrightarrow \qquad C(f) \in W.$$

Soit

$$(C', i')$$

un deuxième foncteur, $\mathrm{Cat}/S \longrightarrow \mathrm{Cat}/S$,

muni d'un morphisme [page 195]

$$i' : \mathrm{id}_{\mathrm{Cat}/S} \longrightarrow C'$$

qui est dans W argument par argument, et tel que C' se factorise par $\underline{\mathrm{Fib}}_W S$. On peut comparer C et C' moyennant $C \circ C'$, car

$$\begin{array}{ccccc} & & C \circ C' & & \\ & {\scriptstyle C*i'}\nearrow & & \nwarrow{\scriptstyle i*C'} & \\ C = C \circ \mathrm{id} & & & & C' = \mathrm{id} \circ C', \end{array}$$

i.e. on a, pour tout X dans Cat/S, p. 129

$$\begin{array}{ccccc} & & C(C'(X)) & & \\ & {\scriptstyle C(i'_X)}\nearrow & & \nwarrow{\scriptstyle i_{C'(X)}} & \\ C(X) & & & & C'(X), \end{array}$$

le deux flèches étant dans W (celle de gauche parce que $C(W) \subseteq W$). Ce sont des flèches dans $\underline{\mathrm{Fib}}_W S$, et si on suppose que W satisfait W(4b), elles induisent des W-équivalences en chaque fibre. Cela montre donc déjà

qu'à isomorphisme (peut-être non-canonique) près, le foncteur composé défini par C, [page 196]

$$X \longmapsto C(X) \longmapsto (s \longmapsto \mathrm{hot}_W(C(X)_s))$$


$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Cat}/S & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Fib}}_W S & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Hom}}(S^\circ, \mathrm{Hot}_W), \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & {\scriptstyle \varphi_C} & & \end{array}$$

ne dépend pas du choix particulier de C, i.e. deux tels foncteurs 'fibres homotopiques' (correspondant à deux choix C, C') sont toujours isomorphes. Mais au lieu d'utiliser $C \circ C'$ pour définir un tel isomorphisme, on aurai pu utiliser $C' \circ C$, ou quelque autre procédé. On aimerait comprendre s'il y a unicité véritable, une caractérisation intrinsèque de ces isomorphismes $\varphi_C \xrightarrow{\sim} \varphi_{C'}$, indépendamment de telle construction ou de telle autre.

Je présume que $C \circ C'$ est lui aussi muni de


$$\mathrm{id}_{\mathrm{Cat}/S} \longrightarrow C \circ C',$$

et même a priori de deux façons possible [page 197]



soit par $C(i'_X) \circ i_X$, soit par $i_{C(X)} \circ i'_X$, heureusement elles sont égales, car pour toute flèche $X \xrightarrow{i'} X'$ dans Cat/S, le carré

p. 130



est commutatif (par fonctorialité de $i_X : X \longrightarrow C(X)$), et on applique ceci au cas de $X' = C'(X)$, $i' = i'_X$.

Cette remarque nous encourage à faire un saut dans l'abstraction, et d'introduire la catégorie [page 198]

$$\mathcal{C} = \mathcal{C}_S = \begin{cases} \text{catégorie des couples } (C, i), \text{ avec} \\ C : \mathrm{Cat}/S \longrightarrow \mathrm{Cat}/S \text{ se factorisant par } \underline{\mathrm{Fib}}_W S, \\ i : \mathrm{id}_{\mathrm{Cat}/S} \longrightarrow C \text{ tel que } i_X \in W \ \forall\ X \text{ dans } \mathrm{Cat}/S, \end{cases} \qquad (*)$$


une flèche

$$(C, i) \longrightarrow (C', i')$$

étant une flèche

$$C \xrightarrow{u} C' \qquad (\text{dans } \underline{\mathrm{Hom}}(\mathrm{Cat}/S, \mathrm{Cat}/S))$$

rendant commutatif le carré `[lire : le diagramme]`



En d'autres termes, $\mathcal{C}$ est défini comme une sous-catégiorie pleine de

$$\mathrm{id}_{\mathrm{Cat}/S} \backslash \underline{\mathrm{Hom}}(\mathrm{Cat}/S, \mathrm{Cat}/S), \qquad [\text{page 199}]$$

à savoir celle dont les objets (C, i) satisfont les deux conditions $(*)$ plus haut (impliquant l'une et l'autre le localiseur W).

Ces conditions impliquent ceci

a) $\forall\ X$ dans Cat/S, $(u_X : C(X) \longrightarrow C'(X)) \in W$, puisque

$$\begin{array}{ccc} & X & \\ {\scriptstyle i_X \in W}\swarrow & & \searrow{\scriptstyle i'_X \in W} \\ C(X) & \xrightarrow{u_X} & C'(X), \end{array}$$

et p. 131

b) si W satisfait W(4b), de sorte que $u_X \in W_S^{\mathrm{f}}$, alors ce définit un *isomorphisme* entre $\varphi_C(X)$ et $\varphi_{C'}(X)$

$$\begin{array}{ccc} s & \longmapsto & \mathrm{hot}_W(C(X)_s) \\ & & \downarrow\wr\, u_{X,s} \\ s & \longmapsto & \mathrm{hot}_W(C'(X)_s). \end{array}$$

Mieux encore, dans ce cas, le foncteur composé

$$\mathcal{C} \times \mathrm{Cat}/S \longrightarrow \underline{\mathrm{Fib}}_W S \longrightarrow \mathrm{HOT}_W^{\mathrm{lc}}(S)$$

donne naissance à

$$\mathcal{C} \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(\mathrm{Cat}/S, \mathrm{HOT}_W^{\mathrm{lc}}(S))$$

qui transforme toute flèche de $\mathcal{C}$ en `[un]` *isomorphisme,* donc se factorise par le groupoïde fondamental de $\mathcal{C}$,

$$\Pi\mathcal{C} \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(\mathrm{Cat}/S, \mathrm{HOT}_W^{\mathrm{lc}}(S)).$$

Quant au foncteur envisagé tantôt [page 200]

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \longrightarrow & \underbrace{\underline{\mathrm{Hom}}\,(\mathrm{Cat}/S, \underline{\mathrm{Hom}}(S^\circ, \mathrm{Hot}_W))}_{\simeq \underline{\mathrm{Hom}}((\mathrm{Cat}/S)\times S^\circ, \mathrm{Hot}_W)} \\ C & \longmapsto & ((X,s) \longmapsto \mathrm{hot}_W(C(X)_s)\,), \end{array}$$

il se déduit du précédent en composant avec

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{HOT}_W(S) & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Hom}}(S^\circ, \mathrm{Hot}_W), \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & \underline{\mathrm{Hom}}(\Pi S^\circ, \mathrm{Hot}_W) & \end{array}$$

plus exactement, avec le foncteur qui s'en déduit

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\mathrm{Cat}/S, \mathrm{HOT}_W(S)) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(\mathrm{Cat}/S, \underline{\mathrm{Hom}}(S^\circ, \mathrm{Hot}_W)).$$

On voit poindre ici un principe plausible de canonicité d'isomorphismes, en ce qui concerne les foncteurs

$$C_W : \mathrm{Cat}/S \longrightarrow \mathrm{HOT}_W^{\mathrm{lc}}(S)$$

définis par les $C \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$, par la relation

$$\Pi\mathcal{C} \approx \text{ catégorie ponctuelle, i.e. } \mathcal{C} \text{ est 1-connexe.}$$

De plus, les arguments utilisés jusqu'ici sont de nature à tel point formelle, que les aspects spécifiques du Modéliseur Cat semblent n'y jouer pratiquement aucun rôle, ou p. 132 [page 201]

un rôle très effacé.

Le carré de la page 197 montre surtout que la catégorie $\mathcal{C}$ est filtrante - (C,i), (C,i') s'envoient l'un et l'autre dans (C'',i''), avec $C''=C\circ C'$, et $i''=(C*i')\circ i=(i*C')\circ i'$. Il y a même une loi de composition dans $\mathcal{C}$, nullement commutative ni unitaire c'est sûr, mais sûrement associative, et (si cette composition est notée $*$) avec des morphismes fonctoriels

$$\xi \xrightarrow{\alpha_{\xi,\xi'}} \xi*\xi' \xleftarrow{\beta_{\xi,\xi'}} \xi'$$

qui assurent le caractère filtrant croissant de $\mathcal{C}$. Ces flèches semblent remplacer en quelque sorte l'unité bilatère absente, et on s'attend à ce qu'elles aient les mêmes excellentes propriétés que si on avait une telle unité, concernant les composés doubles $(\xi*\xi')*\xi''\simeq\xi*(\xi'*\xi'')$,

[page 202]

$$(\xi*\xi')*\xi''\xrightarrow{\sim}\xi*(\xi'*\xi'').$$

Il y a deux façons d'envoyer un produit binaire

$$\xi*\xi',\qquad \xi'*\xi'',\qquad \xi*\xi''$$

dans le produit ternaire, et bien elles doivent dans chacun des trois cas, être égales. Et de même il y a, ceci admis, encore deux façons d'envoyer ξ dans le produit ternaire, en factorisant soit par $\xi*\xi'$, soit par $\xi*\xi''$, et de même pour les deux autres foncteurs ξ', ξ'' ; et là encore, ces deux façons doivent être égales, dans chacun de ces trois cas - donc $3+3=6$ égalités en tout à écrire et à vérifier - on a vu pire !

La philosophie calculatoire devrait être celle-ci : Si on a un produit n-uple

$$\xi_1*\xi_2*\cdots*\xi_n$$

(où je me dispense de mettre des parenthèses ...), pour tout produit m-uple partiel ($m\in[1,n-1]$)

[page 203]

$$\xi_{i_1}*\xi_{i_2}*\cdots*\xi_{i_m}\qquad\qquad (i_1<i_2<\cdots<i_m),$$

en utilisant à tour de bras les isomorphismes d'associativité et les $\alpha_{\xi,\xi'}$, $\beta_{\xi,\xi'}$, il n'y a pourtant qu'une seule façon de l'envoyer dans le produit n-uple. J'ai bien l'impression que ça doit être vrai. (Est-ce que ça implique déjà que $\mathcal{C}$ est 1-connexe ?)

En fait, il y a bien une unité bilatère, mais elle n'est pas dans $\mathcal{C}$, mais dans la catégorie plus grande

$$\mathrm{id}_{\mathrm{Cat}/S}\backslash\underline{\mathrm{Hom}}(\mathrm{Cat}/S,\mathrm{Cat}/S),$$

qui elle, comme toute catégorie

$$\mathrm{id}_{\mathcal{X}}\backslash\underline{\mathrm{Hom}}(\mathcal{X},\mathcal{X}),$$

est une catégorie monoïdale, i.e. avec produit associatif *et* unitaire. Les flèches $\alpha_{\xi,\xi'}$, $\beta_{\xi,\xi'}$ sont les flèches qui résultent de la présence de cette unité (vu que $\mathcal{C}$ est une sous-catégorie pleine), et alors il doit devenir clair qu'on a les compatibilités dites.

p. 133

[page 204]

Mais même une catégorie monoïdale, est elle 1-connexe ? Par exemple B_G, pour G un groupe disons, est bien une catégorie monoïdale et même 'groupale', une G-catégorie (tout ce qu'il y a de strict), et pourtant elle n'est *pas* 1-connexe !

Bien sûr, on peut court-circuiter la question de la 1-connexité de $\mathcal{C}$, en notant qu'après tout on a déjà a priori un objet privilégié dans

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\mathrm{Cat}/S,\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S)),$$

i.e. un foncteur canonique

$$\mathrm{Cat}/S \longrightarrow \mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S),$$

savoir le foncteur composé

$$\mathrm{Cat}/S \underbrace{\longrightarrow}_{\substack{\text{localisation}\\ \text{par } W_S}} (\mathrm{Cat}/S)W_S^{-1} \longrightarrow \underbrace{\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S)}_{\overset{\text{déf}}{=}(\underline{\mathrm{Fib}}_W S)(W_S^{\mathrm{f}})^{-1}} \quad , \qquad (*)$$

où la deuxième flèche est définie comme le quasi-inverse de

$$(\underline{\mathrm{Fib}}_W S)(W_S^{\mathrm{f}})^{-1} \longrightarrow (\mathrm{Cat}/S)W_S^{-1} \qquad (**)$$

déduit de l'inclusion [page 205]

$$(\underline{\mathrm{Fib}}_W S, W_S^{\mathrm{f}}) \hookrightarrow (\mathrm{Cat}/S, W_S).$$

Le fait que $(*)$ soit une équivalence, se prouve justement par le fait de l'existence d'un foncteur $C : \mathrm{Cat}/S \longrightarrow \mathrm{Cat}/S$ et d'un $i : \mathrm{id}_{\mathrm{Cat}/S} \longrightarrow C$, ayant les propriétés qu'on sait, i.e. du fait que $C \neq \emptyset$. De plus, la donnée d'un objet C de $\mathcal{C}$ donne un moyen commode d'expliciter le quasi-inverse dudit foncteur. Mais ce quasi-inverse a une existence canonique et indépendante du choix d'un C, i.e. d'un mode de calcul. Le fait que le foncteur composé φ dans $(*)$ puisse se 'relever' (à isomorphisme près) en un foncteur

$$C : \mathrm{Cat}/S \longrightarrow \underline{\mathrm{Fib}}_W S$$

entre $\varphi(X) = \mathrm{hot}_{W,S}(X)$ et $\mathrm{hot}_{W,S}(C(X))$ et que l'isomorphisme puisse s'expliciter, lui aussi, par une flèche X-fonctorielle

$$i_X : X \longrightarrow C(X), \qquad i_X \in W,$$

dans Cat/S lui-même (et non seulement dans le localisé $(\mathrm{Cat}/S)W_S^{-1}$), est une vertu particulière du [mot illisible], qui ne doit pas pour autant faire oublier le caractère intrinsèque des flèches $(*)$, indépendamment de tout mode de calcul. p. 134 [page 206]

‖ La clef de la situation, et des questions de canonicité, me semble être dans le fait que $(**)$ est une équivalence de catégories - et il faut avouer que, tout familier et quasiment banal qu'il soit finalement devenu pour moi, c'est là un fait tout à fait remarquable et nullement évident a priori. (Mais sans doute peut-on l'avoir aussi par les fourbis généraux à la Quillen-Thomason, sans se battre avec un formalisme de chemins …) Les 'isomorphismes canoniques' qu'on peut établir entre une 'théorie C ' et une 'théorie C' ' (via deux constructions différentes, p. ex., de catégories de chemins, ou via l'approche de Quillen-Thomason, sans chemins) doivent toujours revenir à ceux

qu'on peu définir via la comparaison de la 'théorie C ' d'une part, la 'théorie C' ' de l'autre, avec ce que nous donne directement la flèche composée $(*)$ (p. 204). Finalement, il me semble que *l'existence* d'une théorie des 'fibres homotopiques' (ou 'W-homotopiques') d'une flèche $X \longrightarrow S$ dans Cat, résulte de l'équivalence $(**)$ (p. 204), et cette théorie pourrait sans doute dans une certaine mesure se développer à partir de là, sans choix d'un foncteur C ni d'une structure de catégorie de modèles au sens de Quillen. [page 207]

4 Axiomatisation des 'fibres W-homotopiques'.

La reflexion de hier me fait revenir sur l'axiomatique dans des 'catégories de modèles'

$$(\mathcal{M}, W)$$

([119]) plus générales que Cat, dans l'esprit de VI (cf. théorème-scholie 2, p. 108-113). Pour le moment, on va supposer seulement $\mathcal{M}$ stable par produits fibrés (on n'a pas besoin d'objet final). On introduit l'ensemble

$$\mathrm{Fib}_W \subseteq \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$$

des W-*fibrations* (sous-entendu 'ultrafortes'!) par la condition [page 208]

$f : X \longrightarrow Y$ est dans Fib_W si et seulement si le foncteur changement de base par X,

$$\begin{array}{ccc} Y' & \longmapsto & X' = X \times_Y Y' \\ \mathcal{M}/Y & \longrightarrow & \mathcal{M}/X \end{array}$$

p. 135

transforme W_X dans W_Y, où $W_X \subseteq \mathrm{Fl}(\mathcal{M}/X)$ [est] défini par $u \in W_X \iff \sigma(U) \in W$ ($\sigma : \mathcal{M}/X \longrightarrow \mathcal{M}$ le foncteur 'source', ou 'oubli de X').

([120]). Posons, pour tout S dans $\mathcal{M}$,

$$\mathrm{Ho}^!_W(S) = (\mathcal{M}/S)W_S^{-1},$$

qui joue le rôle d'une catégorie de W-types d'homotopie relatifs *localement constants* sur S. On aimerait décrire une loi contravariante en S pour $\mathrm{Ho}^!_W(S)$, i.e. pour

$$f : S' \longrightarrow S$$

flèche quelconque dans $\mathcal{M}$, définir

$$f^*_W : \mathrm{Ho}^!_W(S) \overset{?}{\to} \mathrm{Ho}^!_W(S'). \qquad (*)$$

La difficulté est, bien sûr, que le foncteur changement de base

$$f^* : \mathcal{M}/S \longrightarrow \mathcal{M}/S'$$

n'est *pas* en général compatible avec les localiseurs W_S, $W_{S'}$. La notion de W-fibration [page 209] sert donc en premier lieu à dégager la condition la plus évidente sur une flèche $f : S' \longrightarrow S$ dans $\mathcal{M}$, pour que le foncteur changement de base soit compatible avec les localiseurs W_S, $W_{S'}$ (c'est *ça* la définition), donc induit $(*)$ sur les localisées.

Le *'problème des fibres homotopiques'* est justement de définir $(*)$ pour *toute* flèche dans $\mathcal{M}$, pas seulement pour les W-fibrations, de tellle façon que les $\mathrm{Ho}^!_W(S)$ forment, pour S variable, les fibres d'une catégorie fibrée remarquable sur $\mathcal{M}$. Quand $\mathcal{M}$ admet un objet final, de sorte que l'on peut regarder les flèches

$$p : e \longrightarrow S \qquad (p \text{ comme 'point'})$$

dans $\mathcal{M}$ comme des 'points' de S, la 'fibre W-homotopique' d'un objet quelconque X/S de $\mathcal{M}/S$ en ledit point sera par définition l'élément de

$$\mathrm{Ho}_W = \mathrm{Ho}_W(\mathcal{M}) \simeq \mathrm{Ho}^!_W(e)$$

défini par

$$p^*(\mathrm{ho}^!_{W/S}(X/S)),$$

où

p. 136

[page 210]

$$\mathrm{ho}^{!}_{W/S} : \mathcal{M}/S \longrightarrow \mathrm{Ho}^{!}_{W}(S) \overset{\text{déf}}{=} (\mathcal{M}/S)(W_S)^{-1}$$

est le foncteur de localisation canonique.

Pour tout S dans $\mathcal{M}$, soit

$$\underline{\mathrm{Fib}}_W S \subseteq \mathcal{M}/S$$

la sous-catégorie pleine formée des objets X/S de $\mathcal{M}/S$ tels que $X \longrightarrow S$ soit W-fibrant. On va définir une variante

$$\mathrm{Ho}^{\mathrm{lc}}_{W}(S)$$

de $\mathrm{Ho}^{!}_{W}(S)$, comme

$$\mathrm{Ho}^{\mathrm{lc}}_{W}(S) \overset{\text{déf}}{=} (\underline{\mathrm{Fib}}_W S)(W^{\mathrm{u}}_S)^{-1},$$

où

> $W^{\mathrm{u}}_S \subseteq \mathrm{Fl}(\underline{\mathrm{Fib}}_W S)$ est le localiseur formé des flèches $u : X \longrightarrow Y$ qui sont 'universellement sur S dans W', i.e. telles que pour toute flèche $S' \longrightarrow S$ de $\mathcal{M}$ de but S, la flèche déduite par changement de base,
>
> $$u' : X' = X \times_S S' \longrightarrow Y' = Y \times_S S'$$
>
> est dans $W_{S'}$.

On a 'fait ce qu'il fallait' pour que $\mathrm{Ho}^{\mathrm{lc}}_{W}(S)$ soit contravariant en S pour des flèches *quelconques* $f : S' \longrightarrow S$ de $\mathcal{M}$, elles définissent

$$f^{*\,\mathrm{lc}}_{W} : \mathrm{Ho}^{\mathrm{lc}}_{W}(S) \longrightarrow \mathrm{Ho}^{\mathrm{lc}}_{W}(S'), \qquad (**)$$

puisque les W-fibrations sont stables par changement de base, et que par suite $f^* : \mathcal{M}/S \longrightarrow \mathcal{M}/S'$ induit [page 211]

$$f^{*}_{\underline{\mathrm{Fib}}_W} : \underline{\mathrm{Fib}}_W S \longrightarrow \underline{\mathrm{Fib}}_W S'$$

qui, par définition de W^{u}_S et $W^{\mathrm{u}}_{S'}$, est compatible avec les localiseurs

$$f^{*}_{\underline{\mathrm{Fib}}_W} : (\underline{\mathrm{Fib}}_W S, W^{\mathrm{u}}_S) \longrightarrow (\underline{\mathrm{Fib}}_W S', W^{\mathrm{u}}_{S'}),$$

et passe donc aux catégories des fractions en une flèche $(*)$.

On peut se demander pourquoi ne pas être plus généreux, et définir $\mathrm{Ho}^{\mathrm{lc}}_{W}(S)$ comme $(\mathcal{M}/S)(W^{\mathrm{u}}_S)^{-1}$, en définissant W^{u}_S dans $\mathcal{M}/S$ de la même façon que tantôt dans $\underline{\mathrm{Fib}}_W S$ - ce qui ne coûte pas plus cher. Une première réponse est d'expérience le localiseur W^{u}_S dans $\mathcal{M}/S$ tout entier s'avère pratiquement inutilisable, d'une part parce que l'appartenance à W^{u}_S (pour une flèche entre objets de $\mathcal{M}/S$ qui ne sont pas très particuliers, p.ex. W-fibrés sur S) est invérifiable (sauf pour des isomorphismes et des choses comme ça …), et que d'autre part la catégorie de fractions est prohibitivement grosse et ne peut servir (semble-t-il) à rien. Une autre réponse, c'est qu'on veut que la catégorie obtenue réponde bien à l'intuition de types d'homotopie relatifs *localement constants* sur S - et on veut donc que pour un changement de base quelconque $f : S' \longrightarrow S$ par un [p. 137] [page 212]

S' dans $\mathcal{M}/S$, d'où un foncteur composé

$$\mathcal{F}_S(W^{\mathrm{u}}_S)^{-1} \xrightarrow{f^{*\,\mathrm{lc}}_{W}} \mathcal{F}_{S'}(W^{\mathrm{u}}_{S'})^{-1} \overset{\varphi_{S'}}{\longrightarrow} \mathrm{Ho}_W$$

119. W satisfait l'axiome de saturation faible : les isomorphismes [sont] dans W, et si deux parmi f, g, gf [sont] dans W, le troisième aussi.

120. **NB** Donner ici la proposition: Fib_W *stable par composition et par changement de base, et contient les isomorphismes, stable par facteurs directs.*

([121]) déduit des foncteurs de catégories avec localiseurs

$$(\mathcal{F}_S, W_S^{\mathrm{u}}) \xrightarrow{f^*} (\mathcal{F}_{S'}, W_{S'}^{\mathrm{u}}) \xrightarrow{\text{oubli de } S'} (\mathcal{M}, W)$$

(foncteur composé $\varphi_{S'}$ qui peut être vu comme le foncteur *'fibre homotopique en l'objet S' sur S'*, cet objet étant visualisé comme un 'point' de S 'à valeurs dans S' ' suivant le yoga fonctoriel général …), le foncteur

$$\begin{aligned} S' &\longmapsto \varphi_{S'}(\xi) \qquad \text{pour } \xi \text{ dans } \mathcal{F}_S(W_S^{\mathrm{u}})^{-1} \\ \mathcal{M}/S &\longrightarrow \mathrm{Ho}_W \end{aligned}$$

transforme flèches dans W_S en isomorphismes : la 'fibre W-homotopique' en S'/S d'un objet de $\mathcal{F}_S(W_S^{\mathrm{u}})^{-1}$ (vu comme W-type d'homotopie *localement constant* sur S) doit être 'la même', si S' remplacé par S'' avec $S'' \longrightarrow S'$ donné et dans W_S. C'est pour cela qu'il est raisonnable de prendre $\mathcal{F}_S$ 'assez petit' (savoir $\underline{\mathrm{Fib}}_W S$, qui est exactement ajusté pour cela), plutôt que de prendre $\mathcal{M}/S$ tout entier. [page 213]

On peut donc dire que la catégorie $\underline{\mathrm{Fib}}_W S$, et le localiseur W_S^{u} ont été construits ad-hoc, le plus simplement possible, pour donner lieu à un localisé $\mathrm{Ho}_W^{\mathrm{lc}}(S)$ qui réponde à l'intuition de W-types d'homotopie relatifs localement constants des deux façons suivantes :

1°) Il y a spontanément une loi contravariante en S, pour des flèches quelconques $S' \longrightarrow S$ dans Cat (on a défini W_S^{u} juste exprès en conséquence).

2°) que la notion de 'fibre W-homotopique en S'/S' d'un objet ξ de $\mathrm{Ho}_W^{\mathrm{lc}}$ satisfasse à la condition précédente, i.e. une flèche $S'' \longrightarrow S'$ dans $\mathcal{M}/S$ qui est dans W_S définisse un *isomorphisme* (dans Ho_W) des fibres homotopiques

$$\underbrace{\xi_{S''}}_{\varphi_{S''}(\xi)} \longrightarrow \underbrace{\xi_{S'}}_{\varphi_{S'}(\xi)}$$

(et on a choisi $\mathcal{F}_S = \underline{\mathrm{Fib}}_W(S)$ juste exprès pour ça).

On a donc une excellente notion de fibres W-homotopiques pour des X W-fibrés sur S - cette fois excellente pour des changements de base *quelconque* - et il n'y a aucun mérite à ça puisqu'on a tout défini exprès pour ça! p. 138

Pour le dire autrement, on a défini *deux* notions de W-types d'homotopie relatifs sur S, l'une de façon à donner un tel type d'homotopie $\mathrm{ho}_{W,S}^{!}(X)$ pour *tout* objet de $\mathcal{M}/S$, mais il n'y a a priori une bonne notion de changement de base que pour les changements de base $S' \longrightarrow S$ qui sont W-fibrés, l'autre, qui correspond plus directement à l'intuition d'un W-type d'homotopie localement constant sur S, n'associe un tel type $\mathrm{ho}_{W,S}^{\mathrm{lc}}(X)$ qu'aux X de $\mathcal{M}/S$ qui sont W-fibrés sur S, en revanche cette notion admet une bonne notion d'image inverse et de 'fibre W-homotopique' pour des changements de base quelconques. [page 214]

Une 'bonne' théorie des fibres W-homotopiques doit réunir en une seule les deux notions précédentes, de sorte que les avantages des deux s'ajoutent, et les désavantages s'éliminent! Elle s'obtient à l'aide d'un axiome draconien sur la situation (alors que jusqu'à maintenant on n'a rien utilisé sur $W \subseteq \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$, si ce n'est tout au plus la saturation faible, en plus de l'existence des produits fibrés) :

ⓐ (*Axiome de la fibre homotopique.*) Pour tout objet S dans $\mathcal{M}$, le foncteur canonique [page 215]

$$\mathrm{Ho}_W^{\mathrm{lc}}(S) \longrightarrow \mathrm{Ho}_W^{!}(S)$$

121. $\mathcal{F}$ désigne ici une sous-catégorie fibrée de $\mathcal{M}/\mathcal{M} = \underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M})$ sur $\mathcal{M}$, substitut éventuel de celle formée de $\underline{\mathrm{Fib}}_W S$ ou de $\mathcal{M}/S$ tout entier.

déduit de l'inclusion

$$(\underline{\mathrm{Fib}}_W(S), W_S^{\mathrm{u}}) \longrightarrow (\mathcal{M}/S, W_S)$$

est une *équivalence de catégories.*

Cet axiome implique que dans $\underline{\mathrm{Fib}}_W S$, W_S^{u} et le localiseur induit par W_S (que je désigne encore par W_S par abus de notation) ont même saturé fort. En fait, il est naturel de compléter l'axiome précédent par le suivant.

ⓑ (Axiome adjoint de l'axiome de la fibre homotopique.) Sur $\underline{\mathrm{Fib}}_W S$, les localiseurs W_S^{u} et W_S coïncident, i.e. on a ceci :

> Soient X, Y dans $\underline{\mathrm{Fib}}_W S$, $X \xrightarrow{u} Y$ un S-morphisme tel que $u \in W_S$, alors $u \in W_S^{\mathrm{u}}$ (i.e. le morphisme $u' : X' \longrightarrow Y'$ déduit par tout changement de base $S' \longrightarrow S$ est encore dans W).

Je présume que a) sera rarement satisfait sans que b) le soit (et inversement d'ailleurs), et que la démonstration de a) et b) se fera pratiquement en une seule haleine. [page 216]

Si $\mathcal{M} = \mathrm{Cat}$, W un localiseur fondamental, alors la notion adaptée ici de W-fibration (lire : 'ultraforte', dans la terminologie spécifique développée dans Cat) est à tel point forte, qu'elle implique déjà pratiquement b) (moyennant W(4a′), il est vrai, cf. p. 53), et a) n'est guère vérifiable que si on a W(4a) ([122]) (loc. cit.). Donc ici c'est 'l'axiome des fibrations' sur W, sous sa forme forte W(4a), qui est la clef de voûte d'une bonne théorie des fibres homotopiques. p. 139

Une telle théorie (revenant au cas général) revient à dire, pour l'essentiel, qu'il y a 'assez' de W-fibrations ('ultrafortes') pour pouvoir décrire *tout* objet d'un $\mathcal{M}/S$, à W_S-équivalence près, comme un objet W-fibrant sur S. Dans les cas à ma connaissance, on a de plus ceci : on a pour tout S dans $\mathcal{M}$ une sous-catégorie $\mathcal{F}_{0\,S}$ de $\underline{\mathrm{Fib}}_W S$ (je pense par exemple à $\underline{\mathrm{Parf}}_W S$, voire $\underline{\mathrm{Parf}}_{W_\omega} S$, dans le cas où $\mathcal{M} = \mathrm{Cat}$), telle que pour toute sous-catégorie pleine $\mathcal{F}$ de $\mathcal{M}/S$ telle que [page 217]

$$\mathcal{F}_{0\,S} \subseteq \mathcal{F} \subseteq \mathcal{M}/S$$

(a fortiori, pour une $\mathcal{F}$ pleine telle que $\underline{\mathrm{Fib}}_W S \subseteq \mathcal{F} \subseteq \mathcal{M}/S$), les inclusions induisent des équivalences de catégories

$$\mathcal{F}_{0\,S}(W_S)^{-1} \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}(W_S)^{-1} \xrightarrow{\sim} \underbrace{(\mathcal{M}/S)(W_S)^{-1}}_{\overset{\text{déf}}{=}\mathrm{Hot}^{!}_W(S)}.$$

Le choix de $\mathcal{F}_{0\,S}$ ne semble pas pouvoir se fixer de façon 'la meilleure possible', une fois pour toutes dans le contexte axiomatique adopté ici. C'est un élément de structure supplémentaire dans $\mathcal{M}$ (en plus du localiseur W), au même titre que la donnée des classes de Q-fibrations et Q-cofibrations, à la Quillen. J'ignore si les axiomes a), b) ci-dessus (axiome de la fibre homotopique) impliquent déjà la variante de ⓐ :

ⓒ Pour toute sous-catégorie pleine $\mathcal{F}$ de $\mathcal{M}/S$ telle que [page 218]

$$\underline{\mathrm{Fib}}_W S \subseteq \mathcal{F} \subseteq \mathcal{M}/S$$

les inclusions induisent des équivalences

$$\underbrace{(\underline{\mathrm{Fib}}_W S)(W_S)^{-1}}_{\substack{=\,\mathrm{Ho}^{\mathrm{lc}}_W(S)\\ \text{moyennant a)}}} \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}(W_S)^{-1} \xrightarrow{\sim} \underbrace{(\mathcal{M}/S)(W_S)^{-1}}_{=\mathrm{Ho}^{!}_W(S)}.$$

Mais je présume que pratiquement, quand on pourra vérifier ⓐ, on pourra vérifier ⓒ également ([123]).

122. Non, il me semble que W(4b) doit suffire …

123. Cf. page 240 ff. Il faudrait ici développer un peu plus le formalisme de $\mathrm{Ho}^{\mathrm{lc}}_W(S)$ et les fibres homotopiques, sous l'hypothèse ⓐⓑ plus haut. p. 140

5 Axiomatique des W-types d'homotopie relatifs non localement constants $\mathrm{Ho}_W^{\mathcal{L}}(S)$.

On n'a rien dit jusqu'à ce point d'éventuels W-types d'homotopie relatifs (sur un objet S de $\mathcal{M}$) qui ne seraient *pas* "localement constants". Il en était question pourtant dans loc. cit. (VI, théorème-scholie 2, partie II du théorème pages 109-113.) Je profite de l'occasion pour revenir là dessus. Il faut introduire, dans chaque $\mathcal{M}/S$, un deuxième localiseur

$$W_S^0 \subseteq \mathrm{Fl}(\mathcal{M}/S), \qquad W_S^0 \subseteq W_S$$

(plus fin que W_S), ce qui permettra de définir [page 219]

$$\mathrm{Ho}_W(S) \overset{\text{déf}}{=} (\mathcal{M}/S)(W_S^0)^{-1}.$$

Qu'il n'y ait pas de choix *canonique* qui s'impose ici, déduit de la seule structure $(\mathcal{M}, W)$, est claire sur l'exemple de (Cat, W), auquel cas on trouve *deux* choix symétriques, transformés l'un en l'autre par l'involution

$$X \longmapsto X^\circ : (\mathrm{Cat}, W) \xrightarrow{\sim} (\mathrm{Cat}, W),$$

à savoir W_S^{g} et W_S^{d}. Le choix de l'un ou de l'autre, disons (pour fixer les idées) de W_S^{g}, est associé à une notion d'*isomorphisme local* (ou de 'coisomorphisme local' dans le cas de W_S^{d}) que je voudrais axiomatiser. Il semble bien que pour les principales catégories de modèles pour Hot (et pour ses variantes), on dispose de façon assez naturelle d'une telle notion d'isomorphisme local (sans l'embarras, le plus souvent, d'un automorphisme involutif fournissant une notion symétrique …).

On supposera donc, comme dans loc. cit. p. 94-96, donné une classe

$$\mathcal{L} \subseteq \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$$

de morphismes, jounant le rôle de 'flèches de localisation' ou 'd'isomorphismes locaux', satisfaisant les conditions suivantes. [page 220]

(∗) $\mathcal{L}$ contient les isomorphismes, est stable par composition, et par changement de base.

On pose, pour S dans $\mathcal{M}$,

$\mathcal{L}_S \subseteq \mathcal{M}/S$ sous-catégorie pleine des S'/S telle que $S' \longrightarrow S$ [soit] dans $\mathcal{L}$.

On définit alors pour tout S dans $\mathcal{M}$

$$W_S^{\mathcal{L}} \subseteq \mathrm{Fl}(\mathcal{M}/S)$$
$$(X \overset{u}{\to} Y) \in W_S^{\mathcal{L}} \iff \forall\, S' \in \mathcal{L}_S,\ (u_{S'} : X \times_S S' \longrightarrow Y \times_S S') \text{ est dans } W.$$

C'est donc une variante du localiseur W_S^{u}, où maintenant on ne prend comme changements de base que les flèches '$\mathcal{L}$-localisantes', i.e. $\in \mathcal{L}$. On a donc p. 141

$$W_S^{\mathrm{u}} \subseteq W_S^{\mathcal{L}} \subseteq W_S$$

en tant que parties de $\mathrm{Fl}(\mathcal{M}/S)$, et de même dans toute sous-catégorie pleine $\mathcal{F}$ de $\mathcal{M}/S$. Dans le cas de $\underline{\mathrm{Fib}}_W S$, moyennant l'axiome (b) ci-dessus ($W_S^{\mathrm{u}} = W_S$ dans $\underline{\mathrm{Fib}}_W S$), les trois localiseurs coïncident.

On pose

$$\mathrm{Ho}_W^{\mathcal{L}}(S) \text{ (ou } \mathrm{Ho}_W(S)) \overset{\text{déf}}{=} (\mathcal{M}/S)(W_S^{\mathcal{L}})^{-1}, \qquad \text{[page 221]}$$

et on a donné dans loc. cit. (partie II du théorème-scholie) un résultat intéressant sur cet invariant, pour S fixé. Mon propos présent est de voir ce qui se passe pour S variable. Visiblement, une notion de W-type d'homotopie relatif sur un objet quelconque S de $\mathcal{M}$ n'est satisfaisante, que si elle permet des images inverses par des flèches *quelconques*

$$f : S' \longrightarrow S$$

dans $\mathcal{M}$, qui doivent définir absolument

$$f_W^{*\mathcal{L}} \text{ ou } f_W^* : \mathrm{Ho}_W^{\mathcal{L}}(S) \longrightarrow \mathrm{Ho}_W^{\mathcal{L}}(S').$$

On est donc confronté à la même perplexité que tantôt - et ce n'est *pas,* cette fois, l'introduction de $\underline{\mathrm{Fib}}_W(S)$ qui va sauver la situation, car

$$(\underline{\mathrm{Fib}}_W S)(\underbrace{W_S^{\mathcal{L}}}_{\substack{=W_S \\ =W_S^{\mathrm{u}}}})^{-1} \longrightarrow (\mathcal{M}/S)(W_S^{\mathcal{L}})^{-1}$$

n'a aucune envie, cette fois, d'être une équivalence de catégories, mais bien plutôt une inclusion (pleinement fidèle) des W-types d'homotopie relatifs constants sur S, dans les W-types d'homotopie quelconques. Il faut visiblement un axiome qui remplace l'axiome 'de la fibre homotopique'.

Dans le cas de Cat, la classe $\mathcal{L}$ des isomorphismes locaux (disons) permet de définir, comme ci-dessus, le localiseur $W_S^{\mathcal{L}} = W_S^{\mathrm{g}}$ dans les Cat/S, comme formé des $u : X \longrightarrow Y$ sur S qui sont dans W et le restent par tout changement de base $S' \longrightarrow S$ qui est dans $\mathcal{L}$. Mais il y a lieu de *saturer* $\mathcal{L}$, en regardant la classe $\mathcal{L}^\wedge$ des flèches $f : S \longrightarrow S'$ de Cat telles que le changement de base [page 222]

$$f^* : \mathrm{Cat}/S \longrightarrow \mathrm{Cat}/S'$$

envoie W_S^{g} dans $W_{S'}^{\mathrm{g}}$. Ce $\mathcal{L}^\wedge$ est tautologiquement stable par composition, et contient les isomorphismes (mieux, contient $\mathcal{L}$ = ensemble des isomorphismes locaux). Il n'est pas clair, par la définition donnée ici, qu'il soit stable par changement de base - on va renforcer la définition en conséquence, en exigeant, pour que $f : S' \longrightarrow S$ soit dans $\mathcal{L}^\wedge$, que pour tout T sur S, considérons $f_T : T' = S' \times_S T \longrightarrow T$, $f_T^* : \mathrm{Cat}/T \longrightarrow \mathrm{Cat}/T'$ soit compatible avec les localiseurs W_T^{g}, $W_{T'}^{\mathrm{g}}$. Alors $\mathcal{L}^\wedge$ est (tout comme $\mathcal{L}$) stable par composition et par changement de base, et de plus il contient $\mathcal{L}$. De plus, pour tout S, on a $W_S^{\mathcal{L}} = W_S^{\mathcal{L}^\wedge}$. Ce petit sorite pourrait se faire bien sûr pour tout modéliseur $(\mathcal{M}, W)$. Mais la chose intéressante ici, c'est que $\mathcal{L}^\wedge$ contient l'ensemble Liss_W des flèches W-lisses. (J'ignore s'il est égal.) On aurait donc pu aussi bien partir de l'ensemble de flèches Liss_W, pour définir les localiseurs W_S^{g} comme [p. 142] [page 223]

$$W_S^{\mathrm{g}} = W_S^{\mathrm{Liss}_W} \qquad \text{au lieu de } W_S^{\mathrm{g}} = W_S^{\mathrm{Isoloc}},$$

ce qui est équivalent.

D'autre part, en travaillant avec les localisés $\mathrm{HOT}_W^\circ(S) = (\mathrm{Cat}/S)(W_S^{\mathrm{g}})^{-1}$, le rôle de $\underline{\mathrm{Fib}}_W S$ pour la théorie des $\mathrm{HOT}_W^{\mathrm{lc}}(S)$ est joué ici par $\underline{\mathrm{Prop}}_W(S)$. On voit donc que dans la théorie des W-types d'homotopie relatifs non localement constants, mode HOT_W°, les ensembles de flèches Liss_W et Prop_W jouent un rôle en quelque sorte complémentaire : les flèches $f : S' \longrightarrow S$ de Liss_W sont (pratiquement) celles qui permettent directement de définir

$$f_W^{*\circ} : \mathrm{HOT}_W^\circ(S) \longrightarrow \mathrm{HOT}_W^\circ(S')$$

comme induit par

$$f^* : (\mathrm{Cat}/S, W_S^{\mathrm{g}}) \longrightarrow (\mathrm{Cat}/S', W_{S'}^{\mathrm{g}}),$$

tandis que les flèches de Liss_W permettent de définir pour tout S dans Cat la sous-catégorie pleine

$$\underline{\mathrm{Prop}}_W S \subseteq \mathrm{Cat}/S,$$

donnant lieu à une équivalence de catégories

$$\begin{cases} (\underline{\mathrm{Prop}}_W S)(W_S^{\mathrm{u}})^{-1} \xrightarrow{\sim} \underbrace{(\mathrm{Cat}/S)(W_S^{\mathrm{g}})^{-1}}_{=\mathrm{HOT}^0_W(S)} \\ \text{avec} \\ W_S^{\mathrm{u}} = W_S^{\mathrm{g}} \text{ sur } \underline{\mathrm{Prop}}_W S \end{cases}$$

(ce qui visiblement est le substitut annoncé de "l'axiome de la fibre W-homotopique"). Cette équivalence, qui permet de décrire $\mathrm{Hot}^\circ_W(S)$ en termes de $\underline{\mathrm{Prop}}_W S \subseteq \mathrm{Cat}/S$ et d'un localiseur W_S^{u} *stable par* **tout** *changement de base,* permet d'autre part de définir la loi contravariante attendue pour $\mathrm{HOT}^\circ_W(S)$. [page 224]

D'autre part, quand on échange le rôle de Liss_W et Prop_W, on trouve la théorie complémentaire du $\mathrm{HOT}_W(S)$, p. 143

$$\begin{cases} \mathrm{HOT}_W(S) \overset{\text{déf}}{=} (\mathrm{Cat}/S)(W_S^{\mathrm{d}})^{-1} \xleftarrow{\sim} (\underline{\mathrm{Liss}}_W S)(W_S^{\mathrm{u}})^{-1}, \\ \text{sur } \underline{\mathrm{Liss}}_W S,\ W_S^{\mathrm{d}} = W_S^{\mathrm{u}}, \end{cases}$$

la description de $\mathrm{HOT}_W(S)$ en termes de $\underline{\mathrm{Liss}}_W S$ et de W_S^{u} permet d'en définir le caractère contravariant en S, pour *toute* flèche $f : S' \longrightarrow S$ dans Cat. Tandis que si on veut pouvoir passer aux catégories de fractions sur Cat/S et Cat/S' tout entier (via W_S^{d}, $W_{S'}^{\mathrm{d}}$), il faut se limiter aux changements de base W-propres.

Du coup, me vient la perplexité si cette complémentaire, voire cette dualité, entre deux ensembles de flèches, les 'lisses' et les 'propres', ne serait pas un fait général qui se retrouvait tout au moins dans les catégories de modèles proche de la description de HOT ou d'un Hot_W.

Il se pourrait bien que dans $\mathbf{\Delta}^\wedge$ on ait une dualité parfaite entre ces deux espèces de notions (il faudra que j'examine la chose), peut-être même dans toute catégorie $\mathcal{A}^\wedge$ (mais dans $\mathbf{\Delta}^\wedge$ il y a un automorphisme involutif $K \longmapsto K^\circ$, correspondant au $X \longmapsto X^\circ$ dans Cat …). Et après tout, même dans le contexte des espaces topologiques, les notions de propreté d'une part, d'asphéricité locale d'autre part, pour une flèche $X \longrightarrow Y$, sont bien définies, et pourraient bien s'ajuster comme le font les notions correspondantes dans Cat, et (qui sait) donner lieu à deux versions complémentaires, ou 'duales' l'une de l'autre, d'une notion de type d'homotopie relatif. [page 225]

N'en ayant pas le cœur net, je suis un peu indécis comment présenter une description axiomatique de la théorie des $\mathrm{Ho}^{\mathcal{L}}_W(S)$, pour une catégorie de modèles générale $(\mathcal{M}, W)$. Dois-je me donner d'emblée

$$\mathrm{Liss}, \mathrm{Prop} \subseteq \mathrm{Fl}(\mathcal{M}),$$

stables par composition, par changement de base, contenant les isomorphismes, et tels que (peut-être)

$$\mathrm{Liss} \cap \mathrm{Prop} \subseteq \mathrm{Fib}_W,$$

mais surtout ils permettent de définir, pour S de $\mathcal{M}$ [page 226]

$$\begin{cases} W_S^{\mathrm{g}} \overset{\text{déf}}{=} W_S^{\mathrm{Liss}} \subseteq \mathcal{F}(\mathcal{M}/S) \\ W_S^{\mathrm{d}} \overset{\text{déf}}{=} W_S^{\mathrm{Prop}} \subseteq \mathcal{F}(\mathcal{M}/S) \end{cases}$$

avec les propriétés suivantes : p. 144

ⓐ Si $f : S' \longrightarrow S$ est dans Prop (resp. Liss), alors $f^* : \mathcal{M}/S \longrightarrow \mathcal{M}/S'$ transforme W_S^{d} dans $W_{S'}^{\mathrm{d}}$ (resp. W_S^{g} dans $W_{S'}^{\mathrm{g}}$),

ce qui est une pure tautologie, et ne concerne pas encore les relations de Prop avec Liss, mais par contre :

ⓑ

$$\begin{cases} (\underline{\mathrm{Liss}}S)(W_S^{\mathrm{u}})^{-1} \xrightarrow{\sim} (\mathcal{M}/S)(W_S^{\mathrm{d}})^{-1} \texttt{[est]} \text{ une équivalence} \\ \text{et } W_S^{\mathrm{u}} = W_S^{\mathrm{d}} \text{ sur } \underline{\mathrm{Liss}}S, \end{cases}$$

et dualement

$$\begin{cases} (\underline{\mathrm{Prop}}S)(W_S^{\mathrm{u}})^{-1} \xrightarrow{\sim} (\mathcal{M}/S)(W_S^{\mathrm{g}})^{-1} \texttt{[est]} \text{ une équivalence} \\ \text{et } W_S^{\mathrm{u}} = W_S^{\mathrm{g}} \text{ sur } \underline{\mathrm{Prop}}S. \end{cases}$$

De plus, il y a lieu d'énoncer ⓒ deux propriétés d'adjonction (duales l'une de l'autre), pour lesquelles je renvoie à VI, théorème-scholie 2, p. 108-113. Il se pose ici la question subsidiaire de simplifier les conditions de validité de la formule d'adjonction, un peu hétéroclites dans loc. cit.

Il se pose d'autre part la question de faire la théorie des lois covariantes $f_!$ et f_* pour $\mathrm{Ho}_W^{\mathrm{lc}}(S)$ et pour $\mathrm{Ho}_W^{\mathrm{Prop}}(S)$, $\mathrm{Ho}_W^{\mathrm{Liss}}(S)$.

J'ai bon espoir que le foncteur $f_!$ peut être décrit, et son adjonction avec f^* établie, à aussi bon compte dans ce contexte général que dans Cat. Mais je n'ai pas envie de m'y arrêter à présent. [page 227]

6 Cofibre W-homotopique dans Cat.

Par contre, j'ai envie de regarder ici sous quelles conditions sur le localiseur fondamental W, il existe dans (Cat, W) une théorie duale de celle de la fibre W-homotopique.

La question-clef est, bien sûr, celle d'avoir une bonne prise sur les W-cofibrations. Or je ne connais jusqu'à présent *que* les immersions ouvertes de Dwyer, les immersions fermées de Dwyer, et ce qui s'en déduit par composition etc. Le travail de Thomason peut motiver l'espoir que la connaissance de ces immersions-là, qui semblent ici jouer un rôle similaire (dual) à celui des morphismes W-parfaits, suffira pour faire une bonne théorie des 'cofibres W-homotopiques'.

||| Je suppose dans toute cette section que W satisfait W(7 bis) (axiome des carrés cocartésiens), pour avoir des bonnes propriétés des immersions ouvertes de Dwyer ([124]), et plus généralement, pour les W-cofibrations.

Il se pose donc la question de la factorisation duale d'une flèche $f : X \longrightarrow Y$ de Cat en p. 145 [page 228]

$$X \xrightarrow[i_f]{W\text{-cofibration}} \tilde{Y} \xrightarrow[p_f]{\in W} Y.$$

Les résultats de Thomason assurent que ça existe, avec i une immersion ouverte de Dwyer, et p une W-fibration - du moins dans le cas $W = W_\infty$. Je vais essayer de le voir directement, en calquant dualement la construction de Cartan-Serre.

Il s'agit donc d'abord de factoriser

$$X \amalg X \xrightarrow{\mathrm{codiag}_X} X,$$

124.

a) Ce sont des W-cofibrations (résulte de b) et c)).

b) Si

et pour ceci je choisis un intervalle fixe

$$I \;=\; \Phi_n \;=\; (0 \longrightarrow 1 \longleftarrow 2 \longrightarrow \cdots \longrightarrow 2n-1 \longleftarrow 2n)$$

avec

$$n \geq 2$$

de sorte que l'inclusion

$$\varepsilon = \text{catégorie discrète } \{0,1\} \xrightarrow{\partial} I, \qquad \partial(0) = 0, \quad \partial(1) = 2n,$$

soit une immersion ouverte de Dwyer. Cette propriété est stable par changement de base Cat-fibrant, en particulier en prenant un produit

$$\underbrace{X \times \varepsilon}_{\simeq X \coprod X} \xrightarrow{i_X} X \times I,$$

d'autre part

$$X \times I \xrightarrow{\mathrm{pr}_1} X$$

est W_ω-parfait, d'où la factoriastion cherchée

p. 146
[page 229]

$$X \amalg X \xrightarrow{i_X} X \times I \xrightarrow{p_X = \mathrm{pr}_1^X} X$$

- il n'y a pas plus simple ! Comment l'utiliser pour construire la factorisation d'une flèche $f : X \longrightarrow Y$ quelconque, en dualisant les constructions relatives aux espaces de chemins ? On définit $Z(f)$ par le carré cocartésien dans Cat

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow[\mathrm{inj}_1^X]{} & X \times I & \xrightarrow{f'} & Z(f) \\ & & \uparrow{\scriptstyle \mathrm{inj}_0^X} & & \uparrow{\scriptstyle W} \quad {\scriptstyle p_f} \\ & & X & \xrightarrow{f} & Y, \end{array}$$

on a

$$Z(f) \xrightarrow{\alpha} Y \qquad \text{induit par } \mathrm{pr}_1 : X \times I \longrightarrow X,$$

et la factorisation cherchée de f est

$$X \xrightarrow{i_f = f' \circ \mathrm{inj}_1^X} Z(f) \xrightarrow{p_f} Y.$$

Je dis que

$$\begin{cases} i_f \text{ est immersion ouverte de Dwyer, donc une } W\text{-cofibration.} \\ p_f \in W. \end{cases}$$

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{i} & X \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ U' & \xrightarrow{i'} & X' \end{array}$$

[page 230]


avec i immersion ouverte de Dwyer, alors

$$\begin{aligned} i \in W \quad &\Longleftrightarrow \quad i' \in W \\ p \in W \quad &\Longleftrightarrow \quad q \in W, \end{aligned}$$

j'ai donc besoin de W(7 bis) *et* même de W(7) pour la deuxième implication.

c) Les immersions ouvertes de Dwyer [sont] stables par cochangement de base et par composition, contiennent les isomorphismes.

On voit sur le diagramme plus complet



$$i_f = f' \circ \mathrm{inj}_1^X = f' i_X i_1^X = j \underbrace{(f \amalg \mathrm{id}_X) i_1^X}_{\substack{\text{inclusion canonique} \\ \text{de } X \text{ dans} \\ Y \coprod X}} ,$$

p. 147

c'est [une] immersion ouverte de Dwyer, comme composé de $Y \longrightarrow Y \amalg X$ et $j : Y \amalg X \longrightarrow Z(f)$ qui le sont (j obtenu par cochangement de base à partir de i_X, qui est immersion ouverte de Dwyer).

D'autre part, $X \xrightarrow{\mathrm{inj}_0^X} X \times I$ est [une] immersion ouverte de Dwyer et dans W, donc coüniversellement dans W, donc $Y \longrightarrow Z(f)$ est elle aussi dans W, donc aussi la rétraction p_f.

D'autre part, la proposition duale de

$$\underline{\mathrm{Fib}}_W S \cap W_S = W_{S\,\mathrm{univ}}^{\mathrm{u}}$$

est valable pour les W-cofibrations :

Proposition 16 ([125]). *Sur la sous-catégorie pleine* $\underline{\mathrm{Cofib}}_W(S)$ *de* $S\backslash\mathrm{Cat}$*, le localiseur* ${}_SW$ *est égal au* $({}_SW)^{\mathrm{univ}}$ *(*W*-équivalences couniverselles), i.e. on a ceci : Soient* [page 231]

$$S \longrightarrow X, \qquad S \longrightarrow Y$$

des W*-cofibrations, et soit* $f : X \longrightarrow Y$ *un morphisme de* $S\backslash\mathrm{Cat}$ *tel que* $f \in W$*. Alors pour tout cochangement de base* $S \longrightarrow S'$*, la flèche correspondante*

$$f' : X' = X \amalg_S S' \longrightarrow Y' = Y \amalg_S S'$$

est dans W*.*

Démonstration. On factorise $S \longrightarrow S'$ en

$$S \xrightarrow{i} S'_0 \xrightarrow{j} S',$$

avec i immersion ouverte de Dwyer (donc W-cofibration), et $j \in W$. On a donc le diagramme à carrés cocartésiens

$$\begin{array}{ccccc}
S & \longrightarrow & X & \xrightarrow{f} & Y \\
{\scriptstyle i}\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
S'_0 & \longrightarrow & X'_0 & \xrightarrow[W]{f'_0} & Y'_0 \\
{\scriptstyle \in W}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle W} & & \downarrow{\scriptstyle W} \\
S' & \longrightarrow & X' & \xrightarrow{f'} & Y'.
\end{array}$$

125. N'a rien à voir avec Cat - une chose générale quand il y a assez de W-cofibrations.

Comme i est une W-cofibration et $f \in W$, on a $f'_0 \in W$. D'autre part, comme $S \longrightarrow X$, donc $S'_0 \longrightarrow X'_0$ est une W-cofibration, $X'_0 \longrightarrow X'$ est dans W, et pour la même raison, $Y'_0 \longrightarrow Y$ l'est aussi. Donc f' l'est aussi. p. 148 [page 232]

NB Ici, c'est un argument formel, valable (sous forme duale) dans tout $(\mathcal{M}, W)$ où on a un énoncé de factorisation pour une flèche quelconque $f : X \longrightarrow Y$ en $X \xrightarrow{i_f} \bar{X} \xrightarrow{\alpha} Y$, avec $i_f \in W$ et α une W-fibration. Alors, si X, Y sont W-fibrés sur S, toute S-flèche de X dans Y qui est dans W, est dans W_S^{u}. Et dualement, si toute flèche $X \longrightarrow Y$ se factorise en $X \longrightarrow \tilde{Y} \longrightarrow Y$, avec $X \longrightarrow \tilde{Y}$ une W-cofibration et $\tilde{Y} \longrightarrow Y$ dans W.

Il me vient ici une (petite) inquiétude : ai-je au moins prouvé que si

$$S \longrightarrow X$$

est une W-cofibration, alors pour toute flèche $S' \longrightarrow S$ dans Cat, le carré cocartésien dans Cat

$$\begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ S' & \longrightarrow & X' \end{array}$$

est aussi W-cocartésien ([126])? Autrement, à quoi ce carré-là serait-il bon?! Pour le prouver, factorisons encore $S \longrightarrow S'$ en [page 233]

$$\underset{\substack{\text{immersion}\\ \text{ouverte de}\\ \text{Dwyer}}}{S \hookrightarrow} \; S'_0 \underset{\in W}{\longrightarrow} S',$$

d'où le diagramme de 2 carrés cocartésiens

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{\mathrm{Cof}_W} & X \\ {\scriptstyle D_W}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle D_W} \\ S'_0 & \xrightarrow{\mathrm{Cof}_W} & X'_0 \\ {\scriptstyle \in W}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \in W} \\ S' & \xrightarrow{\mathrm{Cof}_W} & X', \end{array}$$

où $X'_0 \longrightarrow X'$ est $\in W$ d'après l'hypothèse sur X sous S. Il faut donc vérifier :

a) Un carré cocartésien construit sur une flèche qui est [une] immersion de Dwyer, est W-cocartésien. p. 149

b) Un carré commutatif dans lequel deux côtés opposés sont dans W, est W-cocartésien.

c) Le composé de deux carrés W-cocartésiens est W-cocartésien.

Admettons provisoirement b) et c), et prouvons a), pour un carré cocartésien

$$\begin{array}{ccc} U & \xhookrightarrow{i} & X \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ U' & \xhookrightarrow{i'} & X', \end{array}$$

où i est immersion ouverte de Dwyer. On procède encore comme tantôt, en factorisant p en $U \xhookrightarrow{j} U'_0 \xrightarrow{p'} U'$, où j est [une] immersion ouverte de Dwyer, $p' \in W$. On a donc un diagramme de deux carrés cocartésiens accolés

126. dans le sens ancien, spécial à Cat (déf. 3, p. 131). Pour le comparer avec la théorie générale, cf. prop. 20, p. 262. [page 234]

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{i\in D_W} & X \\ {\scriptstyle D_W}\downarrow & & \downarrow \\ U'_0 & \xrightarrow{D_W} & X'_0 \\ {\scriptstyle p'\in W}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q'\in W} \\ U' & \longrightarrow & X', \end{array}$$

où le premier carré est formé d'immersions ouverts. On sait alors qu'il est W-cocartésien. Dans le deuxième, on a $p' \in W$, donc $q' \in W$ puisque i est une immersion de Dwyer, donc une W-cofibration. Donc il est également W-cocartésien. On conclut alors grâce à c) ci-dessus.

Prouvons b), pour $\begin{array}{ccc} X_0 & \xrightarrow{i_1} & X_1, \\ {\scriptstyle i_2\in W}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_1\in W} \\ X_2 & \xrightarrow{f_2} & Y \end{array}$ en l'insérant dans $\begin{array}{ccc} X_0 & \xrightarrow{i_1} & X_1, \\ {\scriptstyle i_2\in W}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j_1} \\ X_2 & \xrightarrow{j_2} & \mathcal{X} \end{array}$ avec f_1, φ, f_2, Y

où $\mathcal{X} = \int X_0 \begin{array}{c} \nearrow X_1 \\ \\ \searrow X_2 \end{array}$.

Comme $i_2 \in W$, on sait qu'il en résulte $j_1 \in W$, et comme $f_1 \in W$, il en résulte que $\varphi \in W$, q.e.d.

Reste à prouver c). Je vais le déduire d'une p. 150

Proposition 17. *Soit un carré commutatif*

$$Q \quad = \quad \begin{array}{ccc} X_0 & \xrightarrow{i_1} & X_1 \\ {\scriptstyle i_2}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_1} \\ X_2 & \xrightarrow{f_2} & Y \end{array}$$

dans Cat, *et $\mathscr{X}_Q$ la catégorie fibrée sur*

$$\tilde{\Phi} \quad (\simeq \mathbf{\Delta}^1 \times \mathbf{\Delta}^1) \quad = \quad \begin{array}{ccc} 0 & \longleftarrow & 1 \\ \uparrow & & \uparrow \\ 2 & \longleftarrow & 3 \end{array}$$

qui l'intègre. Soit $\mathscr{X}$ l'image inverse du fermé

$$\begin{array}{ccc} 0 & \longleftarrow & 1 \\ \uparrow & & \\ 2 & & \end{array}$$

dans $\mathscr{X}_Q$, qui intègre le diagramme [page 235]

$$X_0 \begin{array}{c} \nearrow X_1 \\ \\ \searrow X_2 \end{array}$$

. Pour que Q soit W-cocartésien, il faut et il suffit que l'inclusion


$$i : \mathscr{X} \longrightarrow \mathscr{X}_Q$$

soit dans W.

Comme $\mathscr{X}_Q$ est lisse sur $\tilde{\Phi}$, et 3 est objet initial de $\tilde{\Phi}$, il s'ensuit que l'inclusion de la fibre de $\mathscr{X}_Q$ en le sommet 3 de $\tilde{\Phi}$ est dans W,

$$Y \xrightarrow{i_Y} \mathscr{X}_Q \qquad\qquad \in W.$$

Considérons alors le diagramme



Ce diagramme n'est pas commutatif, mais il y a une flèche de commutativité p. 151

$$\alpha : i_Y \varphi_Q \longrightarrow i.$$

On sait que ceci implique que

$$i \in W \qquad\qquad \Longleftrightarrow \qquad\qquad (i_Y \varphi_Q) \in W$$

(cf. lemme p. 2), et comme $i_Y \in W$,

$$(i_Y \varphi_Q) \in W \qquad\qquad \Longleftrightarrow \qquad\qquad \varphi_Q \in W,$$

d'où

$$i \in W \qquad\qquad \Longleftrightarrow \qquad\qquad \varphi_Q \in W,$$

q.e.d.

Nous pouvons maintenant prouver [page 236]

Proposition 18 ([127]). (Moyennant W(7 bis).) *Considérons un diagramme commutatif*

$$\begin{array}{ccccc} X_0 & \longrightarrow & X_1 & \longrightarrow & X_2 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ & 1 & & 2 & \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X'_0 & \longrightarrow & X'_1 & \longrightarrow & X'_2 \end{array} \qquad (*)$$

d'où un carré composé

$$\begin{array}{ccc} X_0 & \longrightarrow & X_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ & 3 & \\ \downarrow & & \downarrow \\ X'_0 & \longrightarrow & X'_2. \end{array}$$

Supposons que le carré 1 soit W-cocartésien. Alors le carré 2 est W-cocartésien si et seulement si le carré 3 l'est.

Démonstration.

`[Maintenant,` X_i `et` X'_i `échangent leurs rôles.]`

p. 152

127. devrait être vrai dans toute catégorie de modèles ayant assez de cofibrations.

Soit

$$I \quad = \quad \begin{pmatrix} 0 & \longleftarrow & 1 & \longleftarrow & 2 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0' & \longleftarrow & 1' & \longleftarrow & 2' \end{pmatrix}$$

et soit $\mathscr{X}$ l'intégrale du diagramme $(*)$, catégorie fibrée sur $\mathscr{X}$. On désigne par $\mathscr{X}_{010'}$ la sous-catégorie pleine de $\mathscr{X}$ image inverse de la sous-catégorie pleine

$$\underbrace{I_{010'}}_{=\{0,1,0'\}} \subseteq I,$$

et de même pour toute autre partie A de $\operatorname{Ob} I = \{0, 1, 2, 0', 1', 2'\}$, donnant une sous-catégorie pleine $\mathscr{X}_A$ de $\mathscr{X}$. On pose

$$U \quad = \quad \begin{matrix} 0 & \longleftarrow & 1 & \longleftarrow & 2 \\ \downarrow & & & & \\ 0' & & & & \end{matrix} \quad , \qquad V \quad = \quad \begin{matrix} 0 & \longleftarrow & 1 & \longleftarrow & 2 \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ 0' & \longleftarrow & 1' & & \end{matrix} \quad ,$$

d'où

$$\mathscr{X}_U = \mathscr{X}_{0120'}, \qquad \mathscr{X}_V = \mathscr{X}_{0120'1'}.$$

Les flèches entre les $\mathscr{X}_A$ sont les inclusions

déduites d'inclusions $A \hookrightarrow A'$ dans $\mathfrak{P}(\operatorname{Ob} I)$. Ainsi, le caractère W-cocartésien des carrés 1, 2, 3 s'exprime respectivement par la condition que les inclusions [page 237]

$$\begin{aligned} \mathscr{X}_{010'} &\xrightarrow{\varphi_1} \mathscr{X}_{010'1'} \\ \mathscr{X}_{121'} &\xrightarrow{\varphi_2} \mathscr{X}_{121'2'} \\ \mathscr{X}_{020'} &\xrightarrow{\varphi_1} \mathscr{X}_{020'2'} \end{aligned}$$

soient dans W. Considérons alors le diagramme de flèches d'inclusion p. 153

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{X}_{020'} & \xrightarrow{\varphi_3} & \mathscr{X}_{020'2'} \\ {\scriptstyle\alpha}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\beta} \\ \mathscr{X}_U & \xrightarrow{\psi_3} & \mathscr{X} \\ {\scriptstyle\psi_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\mathrm{id}} \\ \mathscr{X}_V & \xrightarrow{\psi_2} & \mathscr{X} \\ {\scriptstyle\alpha'}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle\beta'} \\ \mathscr{X}_{121'} & \xrightarrow{\varphi_2} & \mathscr{X}_{121'2'}. \end{array}$$

Je dis que dans ce diagramme on a

$$\alpha, \beta, \alpha', \beta' \in W \qquad (*)$$

et

$$\varphi_1 \in W \ \text{ (i.e. carré 1 } W\text{-cocartésien)} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \psi_1 \in W. \qquad (**)$$

Les relations $(*)$ impliquent déja que

$$\begin{aligned} \varphi_2 \in W \quad &\Longleftrightarrow \quad \psi_2 \in W \\ \varphi_3 \in W \quad &\Longleftrightarrow \quad \psi_3 \in W, \end{aligned}$$

[page 238]

et sous l'hypothèse W-cocartésienne $(**)$, impliquant $\psi_1 \in W$,

on trouve

$$\psi_2 \in W \qquad \Longleftrightarrow \qquad \psi_3 \in W,$$

d'où

$$\varphi_2 \in W \qquad \Longleftrightarrow \qquad \varphi_3 \in W,$$

ce qu'il fallait prouver.

Il reste à établir $(*)$ et $(**)$. Les relations $(*)$ proviennent de la remarque que si $i : A \longrightarrow A'$ est une inclusion de sous-catégories pleines de I, telle que i soit *W-asphérique* (i.e. A/j W-asphérique pour $j \in \mathrm{Ob}\, A' \setminus \mathrm{Ob}\, A$), alors $\mathscr{X}_A \longrightarrow \mathscr{X}_{A'}$ l'est aussi (changement de base lisse), donc est [dans] W. On doit vérifier la W-asphéricité pour les quatre inclusions

$$\begin{array}{rcll} \{0,2,0'\} & \longrightarrow & U = \{0,1,2,0'\} & \boldsymbol{\Delta}^0 \\ \{0,2,0',2'\} & \longrightarrow & I & \boldsymbol{\Delta}^0/\boldsymbol{\Delta}^1 \\ \{1,2,1'\} & \longrightarrow & V = \{0,1,2,0',1'\} & \boldsymbol{\Delta}^1,\ \Phi \\ \{1,2,1',2'\} & \longrightarrow & I & \boldsymbol{\Delta}^1,\ \boldsymbol{\Delta}^1 \times \boldsymbol{\Delta}^1. \end{array}$$

(NB J'ai marqué en marge les catégories qu'on obtient comme A/j, à isomorphisme près, dans les quatre cas envisagés - elles ont toutes un objet initial, donc sont W-asphériques.) p. 154

Reste à prouver $(**)$. Soit

$$U' = \{0,1,0',1'\}, \qquad \text{donc } V = U \cup U',\ \ U \cap U' = \{0,1,0'\},$$

où U, U' sont des *fermés* de V qui recouvrent V. Donc on aura de même

$$\mathscr{X}_V = \mathscr{X}_U \cup \mathscr{X}_{U'}, \qquad \mathscr{X}_U \cap \mathscr{X}_{U'} = \mathscr{X}_{010'},$$

[page 239]

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{X}_{U\cap U'} & \longrightarrow & \mathscr{X}_U \\ \downarrow{\scriptstyle \varphi_1} & & \downarrow{\scriptstyle \psi_1} \\ \mathscr{X}_{U'} & \longrightarrow & \mathscr{X}_V. \end{array}$$

Donc par W(7 bis) (cas dual des immersions fermées), on a

$$\varphi_1 \in W \qquad \Longleftrightarrow \qquad \psi_1 \in W,$$

q.e.d.

Notons pour mémoire le corollaire qui nous avait motivé.

Corollaire. *Supposons* W(7 bis) (comme dans toute cette section). *Soit un carré cocartésien dans* Cat

$$\begin{array}{ccc} X_0 & \xrightarrow{i_1} & X_1 \\ {\scriptstyle i_2}\downarrow & & \downarrow \\ X_2 & \longrightarrow & X_3, \end{array}$$

avec i_1 (ou i_2) une W-cofibration (p.ex. une immersion de Dwyer). Alors ce carré est W-cocartésien.

Cette digression (p. 232 ff.) n'est pas nécessaire d'ailleurs pour formuler dès maintenant la conclusion de nos cogitations sur les cofibres W-homotopiques : *Il y a une telle* p. 155

[page 240]

théorie dans Cat, pourvu seulement que W satisfasse à W(7 bis). En effet, tout résulte du fait que toute flèche $f : X \longrightarrow Y$ dans Cat se factorise en

$$X \xrightarrow{i_f} \tilde{Y} \xrightarrow{p_f} Y,$$

avec i_f une W-cofibration (et même une immersion ouverte de Dwyer), et $p_f \in W$.

7 Retour sur l'axiomatique de la fibre W-homotopique.

Je reviens sur la réflexion du n° 4. Finalement, pour

$$(\mathcal{M}, W \subseteq \mathrm{Fl}(\mathcal{M}))$$

donnés avec W faiblement saturé, il apparaît qu'une excellente théorie des fibres W-homotopiques, satisfaisant aux conditions ⓐⓑⓒ du n° 4 (pages 215-218), existe dès que l'axiome d'apparence anodine suivant est satisfait (en plus de l'existence de l'objet final et des produits fibrés ([128])).

Factorisation gauche : ([129], [130]). Toute flèche $f : X \longrightarrow Y$ de $\mathcal{M}$ se factorise en

$$X \xrightarrow{i_f} \bar{X} \xrightarrow{p_f} Y,$$

avec

$$i_f \in W, \qquad p_f \in \mathrm{Fib}_W.$$

L'axiome dual donne lieu à une bonne théorie des cofibres W-homotopiques.

Factorisation droite : Toute flèche $f : X \longrightarrow Y$ dans $\mathcal{M}$ se factorise en

$$X \xrightarrow{j_f} \tilde{Y} \xrightarrow{q_f} Y,$$

avec

$$q_f \in W, \qquad j_f \in \mathrm{Cofib}_W.$$

Je voudrais à présent développer quelque peu le formalisme des fibres W-homotopiques, sous l'hypothèse (disons) que W satisfait l'axiome de factorisation gauche. [page 241]

Considérons un diagramme cartésien

$$\begin{array}{ccc} X_1 & \xleftarrow{q_2} & Y \\ {\scriptstyle p_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q_1} \\ S & \xleftarrow[p_2]{} & X_2 \end{array}$$

dans $\mathcal{M}$. Si p_1 est dans Fib_W, alors Y sur X_2 peut s'interpréter comme la fibre W-homotopique de X_1/S en X_2/S. Plus précisément, il en est ainsi de la classe $\mathrm{ho}^{\mathrm{lc}}_{W,X_2}(Y)$, p. 156

$$\mathrm{ho}^{\mathrm{lc}}_{W,X_2}(Y) \simeq p_2^*(\mathrm{ho}^{\mathrm{lc}}_{W,S}(X_1/S)). \qquad (*)$$

128. et encore ! il me semble qu'il suffit de supposer que les $X \longrightarrow Y$ qui sont W-fibrants sont 'quarrables'.

129. Sous ces conditions, $\mathcal{M}$ muni de (W, F_W) est une catégorie à cofibrations de K.S. Brown-Anderson, et 'tout est O.K.', mais il faudrait vérifier a) b) c) ci-dessus (p. 215, 218), je ne suis pas sûr de l'avoir fait.

130. **NB** L'axiome de factorisation gauche n'est suffisant pour l'existence d'une bonne théorie des fibres homotopiques (semble-t-il) que dans le cas où tout X dans $\mathcal{M}$ est W-fibrant, i.e. est dans $\underline{\mathrm{Fib}}_W e$.

Mais en tant qu'objet sur X_1, Y peut s'interpréter également comme fibre W-homotopique de X_2/S en X_1/S :

$$\mathrm{ho}^{\mathrm{lc}}_{W,X_1}(Y/X_1) \simeq p_1^*(\mathrm{ho}^{\mathrm{lc}}_{W,S}(X_2/S)). \qquad (**)$$

À dire vrai, il faudrait le prouver. Pour ceci, considérons une factorisation

$$X_2 \xrightarrow{i_2} \bar{X}_2 \xrightarrow{\bar{p}_2} S \qquad i_2 \in W \; p_2 \in \mathrm{Fib}_W,$$

de sorte qu'on trouve un diagramme de carrés cartésiens

$$\begin{array}{ccccc} X_1 & \xleftarrow{\bar{q}_2} & \bar{Y} & \xleftarrow[W]{j_2} & Y \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ S & \xleftarrow{\bar{q}_2} & \bar{X}_2 & \xleftarrow[W]{i_2} & X_2. \end{array}$$

Par définition de p_1^*, on a [page 242]

$$p_1^*(\mathrm{ho}^{\mathrm{lc}}_{W,S}(X_2/S)) \simeq \mathrm{ho}^{\mathrm{lc}}_{W,X_1}(\bar{Y}/X_1),$$

d'autre part, comme $X_1 \longrightarrow S$ est dans Fib_W, et $i_2 \in W$, on a $j_2 \in W$, donc

$$\mathrm{ho}^{\mathrm{lc}}_{W,X_1}(Y/X_1) \xrightarrow{\sim} \mathrm{ho}^{\mathrm{lc}}_{W,X_1}(\bar{Y}/X_1),$$

d'où la formule $(**)$.

Ainsi, l'objet Y a deux interprétations homotopiques différentes, suivant qu'on le regarde comme étant sur X_1, ou sur X_2. On aimerait alors une interprétation qui englobe les deux à la fois. On va considérer le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X_1 & & \\ \downarrow & & \\ S & \longleftarrow & X_2 \end{array}$$

de type Ψ°, ou

$$\Psi \quad = \quad \begin{array}{ccc} 1 & & \\ \uparrow & & \\ 0 & \longrightarrow & 2 \end{array} \qquad \text{ou} \qquad \begin{array}{ccc} & & 1 \\ & \nearrow & \\ 0 & & \\ & \searrow & \\ & & 2 \end{array} \quad ,$$

dont Y se déduit par produit fibré, en complétant ce diagramme en un diagramme de type $\tilde{\Psi}^\circ$, où p. 157

$$\tilde{\Psi} = \begin{array}{ccccc} & & 1 & & \\ & \nearrow & & \searrow & \\ 0 & & & & 3 \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & 2 & & \end{array} \qquad (\simeq \mathbf{\Delta}^1 \times \mathbf{\Delta}^1).$$

Pour toute catégorie I, soit [page 243]

$$\mathrm{Ho}_{\mathcal{M},W}(I) \;\text{ ou }\; \mathrm{Ho}_W(I) \stackrel{\text{déf}}{=} \mathcal{M}(I)W(I)^{-1},$$

où

$$\begin{cases} \mathcal{M}(I) & = & \underline{\mathrm{Hom}}(I^\circ, \mathcal{M}) \\ W(I) & \subseteq & \mathrm{Fl}(\mathcal{M}(I)) \text{ est formé des } u : F \longrightarrow G \text{ telles que} \\ & & u_i : F(i) \longrightarrow G(i) \text{ dans } W \text{ pour tout } i \text{ dans } \mathrm{Ob}\, I. \end{cases}$$

Ainsi, le diagramme $\begin{array}{ccc} & X_1 & \\ \swarrow & & \\ S & & \\ \nwarrow & & \\ & X_2 & \end{array}$ définit un objet ξ de $\mathcal{M}(\Psi)$, donc de $\mathrm{Ho}_W(\Psi)$, et le diagramme $\begin{array}{ccccc} & & X_1 & & \\ & \swarrow & & \nwarrow & \\ S & & & & Y \\ & \nwarrow & & \swarrow & \\ & & X_2 & & \end{array}$ peut de même s'interpréter comme un objet $\tilde{\xi}$ de $\mathrm{Ho}_W(\tilde{\Psi})$, dont la restriction à Ψ est ξ.

Ceci posé, j'aimerais définir un foncteur

$$i_* : \mathrm{Ho}_W(\Psi) \longrightarrow \mathrm{Ho}_W(\tilde{\Psi})$$

(où

$$i : \Psi \longrightarrow \tilde{\Psi}$$

est l'inclusion, qui est une immersion ouverte), lequel doit correspondre, dans le cas d'un objet $\begin{array}{ccc} & X_1 & \\ \swarrow & & \\ S & & \\ \nwarrow & & \\ & X_2 & \end{array}$ de $\mathrm{Ho}_W(\Psi)$ avec $p_1 \in \mathrm{Fib}_W$ `[`$: X_1 \longrightarrow S$`]`, à l'opération de produit fibré ([131]).

La construction de ce foncteur i_* devrait être essentiellement sorital, avec ce dont nous disposons. Nous allons définir d'abord, pour S *fixé,* un foncteur canonique p. 158 [page 244]

$$\mathrm{Ho}_W^{\mathrm{lc}}(S) \times \mathrm{Ho}_W^{\mathrm{lc}}(S) \longrightarrow \mathrm{Ho}_{W,S}(\Psi), \qquad (*)$$

où le deuxième membre est défini, par analogie avec les $\mathrm{Ho}_W(I)$, par

$$\mathrm{Ho}_{W,S}(I) \overset{\text{déf}}{=} ((\mathcal{M}/S)(I))(W_S(I))^{-1}$$

- i.e. c'est la même définition, sauf que $(\mathcal{M}, W)$ est remplacé par $(\mathcal{M}/S, W_S)$. Quant à $\Phi = \begin{array}{ccc} 1 & & \\ & \searrow & \\ & & 3 \\ & \nearrow & \\ 2 & & \end{array}$, on le considère comme une sous-catégorie fermée de $\tilde{\Psi}$, qui s'en déduit en lui rajoutant un objet initial 0 (tout comme $\tilde{\Psi}$ se déduit de Ψ en lui rajoutant un objet final 3). D'autre part, on a un foncteur tautologique

$$\mathrm{Ho}_{W,S}(\Phi) \longrightarrow \mathrm{Ho}_W(\tilde{\Psi}), \qquad (*')$$

qui sur les objet consiste à compléter un diagramme $\begin{array}{ccc} & X_1 & \\ & \nwarrow & \\ & & Y \\ & \swarrow & \\ & X_2 & \end{array}$ de $\mathcal{M}/S$ en le diagramme

131. **NB** Cette construction, qui se fait ici assez lourdement, devient immédiate, et aussi ses principales propriétés, si on admet que la catégorie à fibrations $(\mathcal{M}, W, \mathrm{Fib}_W)$ définit un *dérivateur* sur le domaine des ensembles ordonnés finis, ce qui se prouve en effet assez simplement (avec pas plus de mal que je ne me donne ici).

carré $\begin{array}{ccccc} & & X_1 & & \\ & \swarrow & & \nwarrow & \\ S & & & & Y \\ & \nwarrow & & \swarrow & \\ & & X_2 & & \end{array}$ de $\mathcal{M}$.

Le composé de $(*)$ et de $(*')$ donnera donc un foncteur [page 245]

$$\mathrm{Ho}_W^{\mathrm{lc}}(S) \times \mathrm{Ho}_W^{\mathrm{lc}}(S) \longrightarrow \mathrm{Ho}_W(\tilde{\Psi}), \qquad (**)$$

très proche déjà du foncteur i_* à construire. Pour construire $(*)$, on interprète (à équivalence de catégories près) le premier membre comme

$$(\underline{\mathrm{Fib}}_W S \times \underline{\mathrm{Fib}}_W S)(W_S \times W_S)^{-1},$$

donc il faut construire un foncteur

$$\underline{\mathrm{Fib}}_W S \times \underline{\mathrm{Fib}}_W S \longrightarrow \mathrm{Ho}_{W,S}(\Phi),$$

qui transforme flèches dans $W_S \times W_S$ en isomorphismes. On prendra le foncteur

$$(X_1, X_2) \longmapsto \begin{pmatrix} X_1 & \longleftarrow & X_1 \times_S X_2 \\ & & \downarrow \\ & & X_2 \end{pmatrix},$$

et il faut seulement vérifier que si p. 159

$$X_1 \xrightarrow{\alpha_1} X_1', \qquad X_2 \xrightarrow{\alpha_2} X_2'$$

sont deux flèches dans $\underline{\mathrm{Fib}}_W S$, d'où

$$X_1 \times_S X_2 \xrightarrow{\alpha = \alpha_1 \times_S \alpha_2} X_1' \times_S X_2',$$

alors

$$\alpha_1 \in W,\ \alpha_2 \in W \qquad \Longrightarrow \qquad \alpha \in W,$$

ce qui est immédiat sur la factorisation

$$X_1 \times_S X_2 \underbrace{\longrightarrow}_{\substack{\in W \\ \text{car } X_2 \in \underline{\mathrm{Fib}}_W S}} X_1' \times_S X_2 \underbrace{\longrightarrow}_{\substack{\in W \\ \text{car } X_1' \in \underline{\mathrm{Fib}}_W S}} X_1' \times_S X_2'.$$

On a prouvé la [page 246]

Proposition 18. *Soit S dans $\mathcal{M}$. Il existe, à isomorphisme unique près, un foncteur et un seul*

$$\mathrm{Ho}_W^{\mathrm{lc}}(S) \times \mathrm{Ho}_W^{\mathrm{lc}}(S) \xrightarrow{\pi} \mathrm{Ho}_{W,S}(\Phi)$$

donnant lieu à un carré commutatif à isomorphisme près

$$\begin{array}{ccc} & X_1 & \\ (X_1, X_2) \longmapsto & \nwarrow & \\ & X_1 \times_S X_2 & \\ & \swarrow & \\ & X_2 & \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{Fib}}_W S \times \underline{\mathrm{Fib}}_W S & \longrightarrow & (\mathcal{M}/S)(\Phi) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Ho}_W^{\mathrm{lc}}(S) \times \mathrm{Ho}_W^{\mathrm{lc}}(S) & \longrightarrow & \mathrm{Ho}_{W,S}(\Phi) \\ (= (\mathcal{M}/S)(W_S)^{-1} \times (\mathcal{M}/S)(W_S)^{-1}) & & (= \mathcal{M}/S(\Phi)(W_S(\Phi))^{-1}). \end{array}$$

Pour X_1, X_2 dans $\mathcal{M}/S$, le diagramme

$$\pi(X_1, X_2) \overset{\text{déf}}{=} \pi(\mathrm{ho}^{\mathrm{lc}}_{W,S}(X_1), \mathrm{ho}^{\mathrm{lc}}_{W,S}(X_2))$$

se 'calcule' ainsi, à isomorphisme canonique près : on choisit

$$X_1 \xrightarrow{\alpha_1} \bar{X}_1, \qquad X_2 \xrightarrow{\alpha_2} \bar{X}_2 \qquad \textit{flèches dans } \mathcal{M}/S$$

avec

$$\alpha_1, \alpha_2 \in W_S, \qquad \bar{X}_1, \bar{X}_2 \in \mathrm{Ob}\,\underline{\mathrm{Fib}}_W S,$$

ce qui définit

$$\pi(\alpha_1, \alpha_2) : \pi(X_1, X_2) \xrightarrow{\sim} \pi(\bar{X}_1, \bar{X}_2) = \mathrm{ho}_{S,W,\Phi} \begin{pmatrix} \bar{X}_1 & \longleftarrow & \bar{X}_1 \times_S \bar{X}_2 \\ & & \downarrow \\ & & \bar{X}_2 \end{pmatrix}.$$

Corollaire. *Description du foncteur* p. 160 [page 247]

$$(\xi_1, \xi_2) \longmapsto \xi_1 \times_S \xi_2 : \mathrm{Ho}^{\mathrm{lc}}_W(S) \times \mathrm{Ho}^{\mathrm{lc}}_W(S) \longrightarrow \mathrm{Ho}^{\mathrm{lc}}_W(S).$$

Ce foncteur est bel et bien un produit cartésien dans $\mathrm{Ho}^{\mathrm{lc}}_W(S)$ ([132]), *où les produits finis existent* ([133]).

Pour prouver ce dernier point, posant

$$\mathcal{H} = \mathrm{Ho}^{\mathrm{lc}}_W(S),$$

il faut montrer que les foncteurs

$$\mathcal{H} \underset{\pi}{\overset{\delta}{\rightleftarrows}} \mathcal{H} \times \mathcal{H}$$

sont adjoints, avec

$$\begin{array}{rcccccc} \delta & = & \mathrm{diag}_{\mathcal{H}} & : & \xi & \longmapsto & (\xi, \xi) \\ \pi & = & \text{'produit'} & : & (\xi_1, \xi_2) & \longmapsto & \xi_1 \times_S \xi_2. \end{array}$$

On va définir les homomorphismes d'adjonction

$$\begin{array}{rcccccc} \mathrm{id}_{\mathcal{H}} & \xrightarrow{\alpha} & \pi\delta & \text{i.e.} & \xi & \xrightarrow{\alpha_\xi} & \xi \times_S \xi \\ \mathrm{id}_{\mathcal{H}\times\mathcal{H}} & \xleftarrow{\beta} & \delta\pi & \text{i.e.} & (\xi_1, \xi_2) & \xleftarrow{\beta_{\xi_1,\xi_2}} & (\xi_1 \times_S \xi_2, \xi_1 \times_S \xi_2). \end{array}$$

Pour ceci, on décrit $\mathcal{H}$ comme

$$\mathcal{H} = (\underline{\mathrm{Fib}}_W S)(W_S)^{-1}$$

et on note que δ, π proviennent de foncteurs adjoints au niveau de $\mathcal{H}_0 = \underline{\mathrm{Fib}}_W S$

$$\mathcal{H}_0 \underset{\pi_0}{\overset{\delta_0}{\rightleftarrows}} \mathcal{H}_0 \times \mathcal{H}_0 \ ,$$

lesquels donnent lieu à α_0, β_0

$$\begin{array}{rcl} \mathrm{id}_{\mathcal{H}_0} & \xrightarrow{\alpha_0} & \pi_0\delta_0 \\ \mathrm{id}_{\mathcal{H}_0\times\mathcal{H}_0} & \xleftarrow{\beta_0} & \delta_0\pi_0. \end{array}$$

p. 161 [page 248]

On définit α, β par passage aux catégories de fractions pour α_0, β_0. Les 2 compatibilités, étant vérifiées pour α_0, β_0, le sont aussi pour α, β. Q.e.d.

Je dégage ici le

Lemme. *Soit* $\mathcal{X} \underset{g}{\overset{f}{\rightleftarrows}} \mathcal{Y}$ *un couple de foncteurs adjoint, et soient* Σ, Σ' *des localiseurs dans* $\mathcal{X}$, $\mathcal{Y}$ *tels que* $f(\Sigma) \subseteq \Sigma'$, $g(\Sigma') \subseteq \Sigma$, *de sorte qu'on a un couple de foncteurs*

$$\mathcal{X}\Sigma^{-1} \underset{\bar{g}}{\overset{\bar{f}}{\rightleftarrows}} \mathcal{Y}\Sigma'^{-1} \ .$$

Alors $\bar{f}$, $\bar{g}$ *sont adjoints, les flèches d'adjonction étant déduites de celles pour* f, g.

Corollaire. *Soit* $(\mathcal{M}, W)$ *une catégorie de modèles, supposons que dans* $\mathcal{M}$ *les produits binaires (resp. les produits finis) existent, et que pour* $u_1 : X_1 \longrightarrow X_1'$ *et* $u_2 : X_2 \longrightarrow X_2'$, *si* $u_1, u_2 \in W$, *alors* $u_1 \times u_2 : X_1 \times X_2 \longrightarrow X_1' \times X_2'$ *est dans* W. *Alors dans* $\mathcal{M}W^{-1}$ *les produits binaires (resp. produits finis) existent, et le foncteur localisation* $\mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{M}W^{-1}$ *y commute.*

On applique le lemme à

$$\mathcal{M} \underset{\pi}{\overset{\delta}{\rightleftarrows}} \mathcal{M} \times \mathcal{M} \qquad \text{et } W,\ W \times W,$$

et pour l'objet final,

$$\mathcal{M} \underset{\bullet}{\overset{e}{\rightleftarrows}} e \qquad \text{et } W,\ W_0 = \{\mathrm{id}_e\}.$$

Je vais maintenant construire le foncteur

$$i_* : \mathrm{Ho}_W(\Psi) \longrightarrow \mathrm{Ho}_W(\tilde{\Psi}).$$

[page 249]

Il me faut d'abord prouver le

Lemme 1. *Soit* $\mathcal{F}$ *la sous-catégorie pleine de* $\mathcal{M}(\Psi)$, *catégorie des diagrammes*

$$\begin{array}{ccc} & & X_1 \\ & {\scriptstyle p_1}\swarrow & \\ S & & \\ & {\scriptstyle p_2}\nwarrow & \\ & & X_2 \end{array}$$

dans S *[plutôt dans* $\mathcal{M}$, *sur* S*]*, *formée de ceux pour lesquels* p_1, p_2 *sont dans* Fib_W. *Soit* $W_{\mathcal{F}}$ *le localiseur induit sur* $\mathcal{F}$ *par* $W(\Psi)$ *(*W*-équivalences terme à terme). Alors*

$$\mathcal{F}W_{\mathcal{F}}^{-1} \xrightarrow{\sim} \mathcal{M}(\Psi)W(\Psi)^{-1} \ (\overset{déf}{=} \mathrm{Ho}_W(\Psi)).$$

Nous allons prouver ce lemme plus bas. En l'admettant, pour construire i_*, il suffit de construire

$$\mathcal{F} \longrightarrow \mathrm{Ho}_W(\tilde{\Psi})$$

p. 162

qui applique $W_{\mathcal{F}}$ en des isomorphismes. Je prendrai, bien sûr,


$$\begin{array}{ccc} & & X_1 \\ & \swarrow & \\ S & & \\ & \nwarrow & \\ & & X_2 \end{array} \qquad \longmapsto \qquad \begin{array}{ccccc} & & X_1 & & \\ & \swarrow & & \nwarrow & \\ S & & & & X_1 \times_S X_2 \\ & \nwarrow & & \swarrow & \\ & & X_2 & & \end{array}$$

$$\mathcal{F} \quad \longrightarrow \quad \mathrm{Ho}_W(\Psi).$$

132. mais c'est un cas particulier des cas de Ho_W (si $\mathcal{M}$ a des produits binaires), en remplaçant $\mathcal{M}$ par $\mathcal{M}/S$.

133. Dire aussi que les foncteurs $f^* : \mathrm{Ho}_W^{\mathrm{lc}}(S) \longrightarrow \mathrm{Ho}_W^{\mathrm{lc}}(S')$ (pour $f : S' \longrightarrow S$) commutent aux produits finis.

Vérifions qu'il transforme flèches de $W_{\mathcal{F}}$ en isomorphismes. [page 250]



Il faut prouver que si $f_0, f_1, f_2 \in W$, alors $f_3 \in W$. Mais considérons l'image inverse du carré cartésien Q par $f_0 : S' \longrightarrow S$, d'où un carré cartésien $Q_{S'}$ et une factorisation

$$Q \xleftarrow{\tilde{f}} Q_{S'} \xleftarrow{g} Q', \qquad Q \xleftarrow{f} Q'$$

de $Q' \longrightarrow Q$. Comme $f_0 \in W$, et que X_1, X_2, $X_1 \times_S X_2$ sont dans $\underline{\mathrm{Fib}}_W S$, les flèches horizontales réalisant $Q_{S'} \longrightarrow Q$ sont toutes dans W. Ceci, plus le fait que $f_1, f_2 \in W$, impliquent que dans le morphisme g, les flèches g_1, g_2 sont dans W. Il en résulte que la flèche

$$g_3 : X_1' \times_{S'} X_2' \longrightarrow (X_1 \times_S X_2) \times_S S'$$

l'est aussi (théorie du produit dans $\underline{\mathrm{Fib}}_W S'$ et $\mathrm{Ho}_W^{\mathrm{lc}}(S)$), donc $f_3 = \tilde{f}_3 g_3 \in W$, q.e.d.

Notons qu'on a un isomorphisme canonique [page 251]

$$\alpha : i^* i_* \xrightarrow{\sim} \mathrm{id}_{\mathrm{Ho}_W(\Phi)}. \qquad (*)$$

J'ai envie de prouver que les foncteurs

$$\mathrm{Ho}_W(\Phi) \underset{i_*}{\overset{i^*}{\rightleftarrows}} \mathrm{Ho}_W(\tilde{\Phi})$$

sont adjoints, et que $(*)$ est une des flèches d'adjonction. Il faut définir l'autre flèche d'adjonction p. 163

$$\beta : i_* i^* \longleftarrow \mathrm{id}_{\mathrm{Ho}_W(\tilde{\Phi})}. \qquad (**)$$

Mais pour ceci, je dois utiliser le

Lemme 2. Soit $\mathcal{G}$ la sous-catégorie pleine de $\mathcal{M}(\tilde{\Phi})$, formée des $\begin{array}{ccc} X_1 & \xleftarrow{q_2} & X_3 \\ {\scriptstyle p_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q_1} \\ S & \xleftarrow[p_2]{} & X_2 \end{array}$ tels que $p_1, p_2 \in \mathrm{Fib}_W$ et soit $W_{\mathcal{G}}$ le localiseur induit par $W(\tilde{\Phi})$ (W-équivalences terme à terme). Alors l'inclusion $\mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{M}(\tilde{\Phi})$ induit une équivalence

$$\mathcal{G} W_{\mathcal{G}}^{-1} \xrightarrow{\sim} \mathcal{M}(\tilde{\Phi}) W(\tilde{\Phi})^{-1} \overset{\text{déf}}{=} \mathrm{Ho}_W(\tilde{\Phi}).$$

Je vais pour le moment admettre ce

lemme, tout comme le lemme 1 (p. 249). Je vais considérer i^*, i_* comme des flèches entre les categories $\mathcal{F} W_{\mathcal{F}}^{-1}$, $\mathcal{G} W_{\mathcal{G}}^{-1}$. Elles sont induites par les flèches [page 252]

$$\mathcal{F} \underset{i_{0*}}{\overset{i_0^*}{\rightleftarrows}} \mathcal{G}$$

entre $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ eux mêmes,

$$i_0^* : \quad \mathcal{G} \quad \longrightarrow \quad \mathcal{F} : \qquad \begin{array}{ccc} X_1 & \longleftarrow & X_3 \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \longleftarrow & X_2 \end{array} \qquad \longmapsto \qquad \begin{array}{c} X_1 \\ \downarrow \\ S \longleftarrow X_2 \end{array}$$

$$i_{0*} : \quad \mathcal{F} \quad \longrightarrow \quad \mathcal{G} : \qquad \begin{array}{c} X_1 \\ \downarrow \\ S \longleftarrow X_2 \end{array} \qquad \longmapsto \qquad \begin{array}{ccc} X_1 & \longleftarrow & X_1 \times_S X_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \longleftarrow & X_2. \end{array}$$

Ces deux foncteurs sont adjoints l'un de l'autre, et compatibles aux localiseurs $W_{\mathcal{F}}$, $W_{\mathcal{G}}$. Donc les foncteurs déduits de i_0^*, i_{0*} par passage aux catégories de fractions sont également adjoints (cf. lemme p. 248).

Ainsi, modulo la démonstration des lemmes 1 et 2, on a prouvé ceci :

Théorème. *Soit $(\mathcal{M}, W)$ une catégorie de modèles ($W \subseteq Fl\,\mathcal{M}$) satisfaisant l'axiome de factorisation gauche (p. 240), donnant donc lieu à une bonne théorie des fibres W-homotopiques. Soient* p. 164 [page 253]

$$\begin{array}{ccc} & 1 & \\ \Psi = 0 & \nearrow & \\ & \searrow & \\ & 2 & \end{array} \qquad \xrightarrow{i} \qquad \begin{array}{ccccc} & & 1 & & \\ & \nearrow & & \searrow & \\ \tilde{\Psi} = 0 & & & & 3 \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & 2 & & \end{array}$$

(immersions ouvertes dans Cat*), et considérons le foncteur restriction*

$$i^* : \mathrm{Ho}_W(\tilde{\Psi}) \longrightarrow \mathrm{Ho}_W(\Psi).$$

Ce foncteur admet un adjoint à droite

$$i_* : \mathrm{Ho}_W(\Psi) \longrightarrow \mathrm{Ho}_W(\tilde{\Psi}).$$

Ce foncteur i_* se 'calcule' ainsi : sa valeur en $\begin{array}{c} X_1 \\ {\scriptstyle p_1}\downarrow \\ S \end{array} \xleftarrow[p_2]{} X_2$ *est canoniquement isomorphe (dans* $\mathrm{Ho}_W(\tilde{\Psi})$*) à* $\begin{array}{ccc} X_1 & \longleftarrow & X_1 \times_S X_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \longleftarrow & X_2 \end{array}$*, si on suppose que p_1 ou p_2 est une W-fibration. Dans le cas général il se calcule en factorisant p_1 en*

$$X_1 \xrightarrow{i_1} \bar{X}_1 \xrightarrow{p_1'} S, \qquad i_1 \in W,\ p_1' \in Fib_W,$$

et en prenant $\begin{array}{ccc} \bar{X}_1 & \longleftarrow & \bar{X}_1 \times_S X_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \longleftarrow & X_2 \end{array}$*, ou en* [page 254]

procédant de façon symétrique, ou en factorisant simultanement p_1 et p_2, et prenant

$$\begin{array}{ccc} \bar{X}_1 & \longleftarrow & \bar{X}_1 \times_S \bar{X}_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \longleftarrow & \bar{X}_2. \end{array}$$

La loi fonctorielle s'obtient à l'aide du lemme 1 p. 249, qui permet de se borner aux p. 165
arguments $\begin{array}{c} X_1 \\ {\scriptstyle p_1}\downarrow \\ S \end{array}$ *tels que* $\begin{array}{ccc} & & X_1 \\ & & \downarrow \\ S & \xleftarrow[p_2]{} & X_2 \end{array}$ *$p_1, p_2 \in Fib_W$, de sorte que l'on trouve un foncteur*

$$\begin{array}{ccc} X_1 \\ \downarrow \\ S & \longleftarrow & X_2 \end{array} \quad \longmapsto \quad \begin{array}{ccc} X_1 & \longleftarrow & X_1 \times_S X_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \longleftarrow & X_2, \end{array}$$

compatible aux localiseurs, et passant aux catégories de fractions $\mathrm{Ho}_W(\Psi)$ *et* $\mathrm{Ho}_W(\tilde{\Psi})$ *respectivement.*

NB En procédant de façon similaire, plus simple (sans besoin d'un recours au lemme 1), on trouve l'existence d'un *adjoint à gauche* $i_!$ de $i^* : \mathrm{Ho}_W(\Psi) \longrightarrow \mathrm{Ho}_W(\tilde{\Psi})$, sous réserve de l'existence d'un objet initial φ dans $\mathcal{M}$. Cet foncteur $i_!$ est donné par [page 255]

$$i_! \left(\begin{array}{ccc} X_1 \\ \downarrow \\ S & \longleftarrow & X_2 \end{array} \right) \quad = \quad \left(\begin{array}{ccc} X_1 & \longleftarrow & \varphi \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \longleftarrow & X_2 \end{array} \right),$$

la loi fonctorielle étant évidente.

Ce n'est pas encore la fin du sorite! Il faut encore interpréter le foncteur composé

$$\mathrm{Ho}_W(\Psi) \xrightarrow{i_*} \mathrm{Ho}_W(\tilde{\Psi}) \xrightarrow{\varepsilon_3^*} \mathrm{Ho}_W(e) = \mathrm{Ho}_W,$$

où

$$\varepsilon_3 : e \xrightarrow{\sim} \{3\} \quad \longrightarrow \quad \begin{array}{ccccc} & & 1 & & \\ & \swarrow & & \nwarrow & \\ 3 & & & & 0 \\ & \nwarrow & & \swarrow & \\ & & 2 & & \end{array}$$

est l'inclusion du sommet 3 dans $\tilde{\Psi}$. Si $\mathrm{Ho}_W(\Psi)$ est interprété, conformément au lemme 1, comme $\mathcal{F}W_{\mathcal{F}}^{-1}$, ce foncteur composé n'est autre que

$$\begin{array}{ccc} X_1 \\ \downarrow \\ S & \longleftarrow & X_2 \end{array} \quad \longmapsto \quad X_1 \times_S X_2$$

(pour $\begin{array}{ccc} X_1 \\ {\scriptstyle p_1}\downarrow & & \\ S & \xleftarrow[p_2]{} & X_2 \end{array} \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{F}$, i.e. $p_1, p_2 \in \mathrm{Fib}_W$.) p. 166

[page 256]

On veut interpréter ce foncteur comme un $\varprojlim$ W-homotopique, i.e. vu comme un 'produit fibré W-homotopique'. De façon précise, on a ceci :

Corollaire 1. *Considérons* $p_\Psi : \Psi \longrightarrow e$*, et le foncteur*

$$p_\Psi^* : \mathrm{Ho}_W(e) = \mathrm{Ho}_W \longrightarrow \mathrm{Ho}_W(\Psi),$$

déduit par passage aux catégories de fractions du foncteur

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{M} & \longrightarrow & \mathcal{M}(\Psi) \\ X & \longrightarrow & \left(\begin{array}{ccc} X & & \\ \downarrow & & \\ X & \longleftarrow & X \end{array} \right). \end{array}$$

Ce foncteur admet le foncteur $\varepsilon_3^* i_*$ *précédent comme adjoint à droite, i.e.*

$$p_{\Psi\,*} = \varepsilon_3^* i_* : \mathrm{Ho}_W(\Psi) \longrightarrow \mathrm{Ho}_W.$$

Démonstration. On peut regarder p_ψ comme le composé

$$\Psi \xrightarrow{\ i\ } \tilde{\Psi} \xrightarrow{\ p_{\tilde{\Psi}}\ } e,$$

et on a donc

$$p_\Psi^* \simeq i^*(p_{\tilde{\Psi}})^*.$$

Donc l'existence et la détermination d'un adjoint à droite pour p_Ψ^* résultera de l'existence et de la détermination d'adjoints à droite i_*, $(p_{\tilde{\Psi}})_*$ de i^*, $(p_{\tilde{\Psi}})^*$, via

$$(p_\Psi)_* \simeq (p_{\tilde{\Psi}})_* i_*.$$

Donc le corollaire 1 résulte de la formule [page 257]

$$p_{\tilde{\Psi}\,*} = \varepsilon_3^*,$$

qui elle-même est un cas particulier du

Lemme. *Soit* I *dans* Cat*, avec objet final* e*, considérons l'inclusion* p. 167

$$\varepsilon : e \longrightarrow I, \qquad \text{et } p : I \longrightarrow e.$$

Soit $(\mathcal{M}, W)$ *une catégorie de modèles, et considérons*

$$\mathrm{Ho}_W(I) \xleftarrow{\ p^*\ } \mathrm{Ho}_W.$$

Ce foncteur admet un adjoint à gauche [plutôt à droite] p_**, lequel est isomorphe à* ε^*.

Démonstration. Considérons le couple de foncteurs adjoints

$$\mathcal{M}(I) \underset{p_* = \varprojlim_I}{\overset{p^*}{\rightleftarrows}} \mathcal{M} \quad ;$$

comme I admet l'objet final e, le foncteur p_* est isomorphe à ε^*. Ces foncteurs p^*, ε^* sont compatibles aux localiseurs $W(I)$, W, donc on conclut par le lemme page 248.

Il ne reste plus qu'à prouver les lemmes 1 et 2. Je le ferai demain.

Aujourd'hui, j'ai envie encore de donner les sorites des carrés W-cartésiens dans une [page 258]

Proposition 19 : *Soit* $\begin{array}{ccc} X_1 & \xleftarrow{f_1} & X_3 \\ {\scriptstyle p_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_2} \\ S & \xleftarrow[p_2]{} & X_2 \end{array}$ *un carré commutatif dans* $\mathcal{M}$*. Considérons des factorisations de* p_1*,* p_2 *en*

$$X_1 \xrightarrow{i_1} \bar{X}_1 \xrightarrow{\bar{p}_1} S, \qquad X_2 \xrightarrow{i_2} \bar{X}_2 \xrightarrow{\bar{p}_2} S,$$

$i_1, i_2 \in W$*,* $\bar{p}_1, \bar{p}_2 \in F_W$ [= $\mathtt{Fib}_W$]*, et considérons les flèches induites par* $X_3 \longrightarrow X_1 \times_S X_2$ *(déduite de* Q*) via* $X_1 \times_S X_2 \begin{array}{l} \nearrow \bar{X}_1 \times_S X_2 \\ \longrightarrow \bar{X}_1 \times_S \bar{X}_2 \\ \searrow X_1 \times_S \bar{X}_2 \end{array}$*, de sorte qu'on trouve un diagramme commutatif*

$$\begin{array}{ccc} & & \bar{X}_1 \times_S X_2 \\ & \overset{\pi_1}{\nearrow} & \downarrow{\scriptstyle j_2} \\ X_3 & \xrightarrow[\pi_2]{\pi_0} & \bar{X}_1 \times_S \bar{X}_2 \\ & \underset{\pi_2}{\searrow} & \uparrow{\scriptstyle j_1} \\ & & X_1 \times_S \bar{X}_2, \end{array}$$

où $j_1 = i_1 \times_S \mathrm{id}_{\bar{X}_2}$ *et* $j_2 = \mathrm{id}_{\bar{X}_1} \times i_2$ *sont dans* W *(car* i_1 *et* i_2 *le sont, et* $\bar{X}_1$ *et* $\bar{X}_2$ *sont dans* $\underline{\mathrm{Fib}}_W S$*). On a donc*

$$(\pi_1 \in W) \qquad \Longleftrightarrow \qquad (\pi_2 \in W) \qquad\qquad (\Longleftrightarrow \quad \pi_0 \in W),$$

ce qui prouve que la condition $\pi_1 \in W$*, qui semble dépendre du choix de la factorisation par* i_1*, n'en dépend pas, et idem pour* $\pi_2 \in W$*, et pour* $\pi_0 \in W$ *(qui semble dépendre à la fois de* i_1*, et de* i_2*).*

Définition. *Quand ces conditions sont satisfaites, on dit que le carré* Q *est* W*-cartésien.*

p. 168
[page 259]

Corollaire 1. *Si* Q *est* W*-cartésien, alors l'image de* Q *dans* $\mathrm{Ho}_W(\tilde{\Psi})$ *est dans l'image essentielle de*

$$i_* : \mathrm{Ho}_W(\Psi) \longrightarrow \mathrm{Ho}_W(\tilde{\Psi}),$$

i.e. la flèche canonique dans $\mathrm{Ho}_W(\tilde{\Psi})$

$$Q \longrightarrow i_* i^* Q$$

est [un] *isomorphisme. La réciproque est vraie si* W *est fortement saturé.*

Corollaire 2. *Considérons un diagramme commutatif dans* $\mathcal{M}$

$$\begin{array}{ccccc} X'_0 & \longleftarrow & X'_1 & \longleftarrow & X'_2 \\ \downarrow & 1 & \downarrow & 2 & \downarrow \\ X_0 & \longleftarrow & X_1 & \longleftarrow & X_2, \end{array} \tag{D}$$

d'où deux carrés commutatifs 1, 2, et un carré composé

$$\begin{array}{ccc} X'_0 & \longleftarrow & X'_2 \\ \downarrow & 3 & \downarrow \\ X_0 & \longleftarrow & X_2. \end{array}$$

Supposons le carré 1 W-cartésien. Alors le carré 2 est W-cartésien si et seulement si le carré 3 l'est.

DÉMONSTRATION. Considérons une factorisation de $\begin{array}{c} X_0' \\ \downarrow \\ X_0 \end{array}$ en

$$\begin{array}{ccc} \bar{X}_0' & \longleftarrow & X_0' \\ & \searrow & \downarrow \\ & & X_0 \end{array}$$

avec $(X_0' \longrightarrow \bar{X}_0') \in W$, et $(\bar{X}_0' \longrightarrow X_0) \in \mathrm{Fib}_W$. On peut alors remplacer dans (D) X_0' par $\bar{X}_0'$, obtenant un diagramme $(\bar{D})$, et on voit aussitôt que chacun des carrés 1(D), 2(D), 3(D) est W-cartésien si et seulement si le carré correspondant $1(\bar{D})$, $2(\bar{D})$ ou $3(\bar{D})$ l'est. Cela montre qu'on peut supposer $X_0 \longrightarrow S$ dans $\mathrm{Fib}_W S$. Considérons alors le diagramme commutatif déduit de (D) p. 169 [page 260]

$$\begin{array}{ccccccc} X_0' & \longleftarrow & \tilde{X}_1' \overset{\text{déf}}{=} X_0' \times_{X_0} X_1 & \overset{\alpha}{\longleftarrow} & X_1' & \longleftarrow & X_2' \\ \downarrow & & \downarrow & & & & \downarrow \\ X_0 & \longleftarrow & X_1 & & \longleftarrow & & X_2, \end{array}$$

où $\alpha \in W$ en vertu de l'hypothèse W-cartésienne sur le carré 1. On voit encore que le carré 2 est W-cartésien si et seulement si le carré correspondant avec X_1' remplacé par $\tilde{X}_1'$ l'est, quant aux carrés 1, 3, ils ne changent pas par cette modification. Cela montre qu'on peut supposer le carré 1 *cartésien.* Considérons alors le diagramme

$$\begin{array}{ccccccc} X_0' & \longleftarrow & X_1' & \longleftarrow & \tilde{X}_2' \overset{\text{déf}}{=} X_1' \times_{X_1} X_2 & \overset{\beta}{\longleftarrow} & X_2' \\ {\scriptstyle \mathrm{Fib}_W}\downarrow & \text{cart.} & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Fib}_W} & \text{cart.} & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Fib}_W} & & \\ X_0 & \longleftarrow & X_1 & & \longleftarrow & & X_2. \end{array}$$

Alors la proposition 19 et la définition montrent que le carré 2 est W-cartésien si et seulenment si $\beta \in W$, et de même pour le carré 3. Ce qui achève la démonstration.

Corollaire 2. *Soit* $\begin{array}{ccc} X_1 & \overset{f_2}{\longleftarrow} & X_3 \\ {\scriptstyle p_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_1} \\ S & \underset{p_2}{\longleftarrow} & X_2 \end{array}$ *un carré W-cartésien. Alors*

$$\begin{aligned} p_1 \in W \quad &\Longrightarrow \quad f_1 \in W \\ p_2 \in W \quad &\Longrightarrow \quad f_2 \in W, \end{aligned}$$

plus précisément, si $p_i \in W$, alors Q est W-cartésien si et seulement si $f_i \in W$.

Supposons $p_1 \in W$. Alors dans la factorisation de p_1 en $X_1 \longrightarrow \bar{X}_1 \longrightarrow S$, on peut prendre $\bar{X}_1 = S$. Donc le carré est W-cartésien si et seulement si [page 261]

$$(X_3 \longrightarrow \bar{X}_1 \times_S X_2 = X_2) \in W,$$

i.e. $f_1 \in W$, q.e.d.

Bien sûr, on ne peut en général affirmer les implications inverses : $f_i \in W$ n'implique nullement $p_i \in W$.

p. 170

Tous ces résultats, et la notion de carré W-cartésien, se dualisent (moyennant l'axiome idoine de factorisation à droite, cf. page 240) en une théorie des sommes amalgamées W-homotopiques, et des carrés W-cocartésiens. Cette fois on travaille avec la catégorie

$$\Phi = \left(\begin{array}{ccc} & & 1 \\ & \swarrow & \\ 0 & & \\ & \nwarrow & \\ & & 2 \end{array} \right) \qquad \overset{j}{\hookrightarrow} \qquad \tilde{\Phi} = \left(\begin{array}{ccccc} & & 1 & & \\ & \swarrow & & \nwarrow & \\ 0 & & & & 3 \\ & \nwarrow & & \swarrow & \\ & & 2 & & \end{array} \right),$$

j étant une immersion fermée. On a un foncteur restriction

$$j^* : \mathrm{Ho}_W(\tilde{\Phi}) \longrightarrow \mathrm{Ho}_W(\Phi),$$

dont on construit un adjoint à gauche

$$j_! : \mathrm{Ho}_W(\Phi) \longrightarrow \mathrm{Ho}_W(\tilde{\Phi}).$$

Et on trouve une notion naturelle de carré W-cocartésien, qui paraît irréprochable à tout points de vue, et d'une simplicité parfaite. [page 262]

Cela amène à revoir la notion en question dans Cat, où elle avait l'air très astucieuse, profonde et un peu obscure, avec des intégrales et tout ça. C'est le moment de se rendre compte que 'ce n'est que ça'. Donc de prouver la

Proposition 20. *Supposons $\mathcal{M} =$ Cat, W un localiseur fondamental satisfaisant W(7 bis). Considérons un carré commutatif dans* Cat

$$Q = \left(\begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & X_1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_2 & \longrightarrow & X_3 \end{array} \right).$$

Pour qu'il soit W-cartésien [plutôt W-cocartésien] *au sens de la théorie développée ici (pour des catégories de modèles générales), il faut et il suffit que*

$$\varphi_Q : \quad \mathcal{X}_Q = \left(\begin{array}{ccc} & & X_1 \\ & \swarrow & \\ \int S & & \\ & \nwarrow & \\ & & X_2 \end{array} \right) \qquad \longrightarrow \qquad X_3$$

[plutôt

$$\varphi_Q : \quad \mathcal{X}_Q = \left(\begin{array}{ccc} & & X_1 \\ & \nearrow & \\ \int S & & \\ & \searrow & \\ & & X_2 \end{array} \right) \qquad \longrightarrow \qquad X_3]$$

soit dans W. (NB L'intérêt de ce critère est qu'il est 'intrinsèque' à Q, ne faisant pas appel à une factorisation de β_1 ou de β_2 [où $\beta_i : S \longrightarrow X_i$] en $S \xrightarrow{\in \mathrm{Cof}_W} \tilde{X}_i \xrightarrow{\in W} X_i$. p. 171 Cf. application intéressante dans section V 3.4., p. 146 ff., th. 4 et corollaires.)

Démonstration. Considérons une factorisation de $S \longrightarrow X_1$ en [page 263]

$$S \xrightarrow{i_1} \tilde{X}_1 \xrightarrow{p_1} X,$$

avec i_1 immersion ouverte de Dwyer, $p_1 \in W$. Donc on a un carré commutatif

$$\tilde{Q} = \begin{pmatrix} S & \xrightarrow{\mathrm{Dw}} & \tilde{X}_1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_2 & \longrightarrow & X_3 \end{pmatrix}$$

et un homomorphisme $\tilde{Q} \xrightarrow{\alpha} Q$ qui est l'identité sur les trois sommets distincts de $\tilde{X}_1$, et qui est p_1 en $\tilde{X}_1$. On en déduit un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}_Q & \xrightarrow{\mathcal{X}_\alpha = \lambda} & \mathcal{X}_{\tilde{Q}} \\ & {\scriptstyle\varphi_Q}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle\varphi_{\tilde{Q}}} & \\ & X_3, & \end{array}$$

et on a $\lambda \in W$ (car c'est une Φ-flèche de catégories fibrées sur Φ, qui induit une W-équivalence sur chacune de trois fibres.) Donc $\varphi_Q \in W \iff \varphi_{\tilde{Q}} \in W$, d'autre part il est clair que Q est W-cocartésien si et seulement si $\tilde{Q}$ l'est. Donc on peut supposer que $S \hookrightarrow X_1$ est [une] immersion ouverte (de Dwyer) ([134]). Appliquant ceci en changeant les rôles de X_1 et X_2, on voit qu'on peut supposer de plus que $S \longrightarrow X_2$ est également [une] immersion ouverte de Dwyer. Considérons alors [page 264]

$$\begin{array}{ccccc} S & \hookrightarrow & X_1 & & \\ \downarrow & Q' & \downarrow & & \\ X_2 & \hookrightarrow & X_1 \amalg_S X_2 & \xrightarrow{\pi} & X_3 \\ & & {\scriptstyle\varphi_{Q'}}\uparrow & \nearrow{\scriptstyle\varphi_Q} & \\ & & \mathcal{X}_Q & & \end{array}$$

On a $\varphi_Q = \pi\varphi_{Q'}$, d'autre part on sait que $\varphi_{Q'} \in W$ (cor. 3, p. 149). Donc


$$\pi \in W \qquad \Longleftrightarrow \qquad \varphi_Q \in W,$$

où $\pi \in W$ signifie que Q est W-cocartésien, q.e.d. p. 172

8 Appendice : Retour sur les axiomes W(7), W(7 bis) (pages 75, 76). [page 265]

([135]). On a vu (prop. 6, p. 78) que W(7 bis) implique W(7). Montrons une réciproque partielle.

Proposition. *Supposons* W(7 bis) (axiome du carré cocartésien) *satisfait, et plaçons nous sous les conditions de l'énoncé de* W(7), *et plus généralement, dans le cas d'un diagramme cubique*



134. On utilise ici W(3) (forme forte), i.e. Loc(3 bis) avec les notations de XVI. Mais on peut s'en passer, cf. plus bas.

135. Reflexion provisoire, supplanté par XVI.

où les deux carrés X et Y (face supérieure et inférieure du cube) sont W-cocartésiens. Considérons les conditions suivantes sur ce diagramme

a) $f_0 \in W$.

b) f_1 *et* $f_2 \in W$.

c) $f_3 \in W$.

Alors on a les implications

$$a \ \& \ b \Longrightarrow c, \qquad b \ \& \ c \Longrightarrow a.$$

De plus, si W est stable par facteurs directs (p. ex. W fortement saturé), alors on a aussi

$$a \ \& \ c \Longrightarrow b,$$

donc la conjonction [de] *deux quelconques parmi les conditions a) b) c) implique la troisième.*

Démonstration. Utilisant la factorisation fonctorielle d'une flèche quelconque (ici les f_i) en pi, avec i immersion ouverte de Dwyer et $p \in W$ (p. 229), on est remené au cas où les f_i sont des immersions ouvertes de Dwyer. Mais pour toute flèche $g : S \longrightarrow T$ qui est dans Cof_W, soient $Z(g)$ son mapping-cone

p. 173 [page 266]

$$\begin{array}{ccccc} S & \xrightarrow{\ g\ } & T & & \\ & \searrow & & \overset{\alpha(g)}{\searrow} & \\ & & e & \xrightarrow{\ \bar{g}\ } & Z(g), \end{array}$$

et

$$\alpha(g) : T = \mathrm{but}(g) \longrightarrow Z(g)$$

la flèche canonique ([136]). Celle-ci est fonctorielle en g, de sorte que le diagramme cubique donné se prolonge en un double cube

$$\begin{array}{ccccc} & & X_2 & \longrightarrow & X_3 \\ & \nearrow & \downarrow & \nearrow & \downarrow{\scriptstyle f_3} \\ X_0 & \longrightarrow & X_1 & & \\ \downarrow{\scriptstyle f_0} & & \downarrow{\scriptstyle f_2} & & \\ & & Y_2 & \longrightarrow & Y_3 \\ & \nearrow & \downarrow & \nearrow{\scriptstyle f_1} & \downarrow{\scriptstyle \alpha_3} \\ Y_0 & \longrightarrow & Y_1 & & \\ \downarrow{\scriptstyle \alpha_0} & & \downarrow{\scriptstyle \alpha_2} & & \\ & & Z_2 & \longrightarrow & Z_3 \\ & \nearrow & \downarrow & \nearrow{\scriptstyle \alpha_1} & \\ Z_0 & \longrightarrow & Z_1 & & \end{array}$$

avec

$$Z_i = Z(f_i), \ \alpha_i = \alpha(f_i) \qquad \text{pour } i \in \{0,1,2,3\}.$$

Notons que W(7 bis) implique que si $g \in \mathrm{Cof}_W$, on a [page 267]

$$g \in W \qquad \Longleftrightarrow \qquad \bar{g} \in W, \qquad \text{i.e. } Z(g) \ W\text{-asphérique},$$

en particulier

$$f_i \in W \qquad \Longleftrightarrow \qquad Z_i \ W\text{-asphérique}.$$

p. 174

Ainsi, l'énoncé à prouver sur le cube initial se ramène à un énoncé sur le carré

$$\begin{array}{ccc} & Z_1 & \\ \nearrow & & \searrow \\ Z_0 & & Z_3, \\ \searrow & & \nearrow \\ & Z_2 & \end{array}$$

savoir que les trois conditions

a′) Z_0 W-asphérique.

b′) Z_1 et Z_2 W-asphériques.

c′) Z_3 W-asphérique.

donnant lieu aux implications

$$\text{a}' \ \& \ \text{b}' \Longrightarrow \text{c}', \qquad \text{b}' \ \& \ \text{c}' \Longrightarrow \text{a}',$$

et que si W est stable par facteurs directs, alors

$$\text{a}' \ \& \ \text{c}' \Longrightarrow \text{b}'.$$

C'est à peu de choses près le corollaire de la page 76, complété à la page 77 (corollaire), à cela près qu'on y suppose les flèches des immersions ouvertes, et le carré cartésien (donc aussi cocartésien) dans Cat, i.e. $Z_3 = Z_1 \cup Z_2$, $Z_0 = Z_1 \cap Z_2$. Mais ce qui importe pour [page 268] la validité de cet énoncé, c'est (on s'en doute) que Z_* soit W-cocartésien. Donc il faut d'abord prouver ceci.


Lemme. *Si le diagramme cubique p. 265 est tel que les faces X, Y soient W-cocartésiennes, et les f_i ($i \in \{0,1,2,3\}$) des W-cofibrations, alors le carré Z des cofibres des f_i est lui aussi W-cocartésien.*

Ce lemme résulte de la théorie du 'déploiement des diagrammes cubiques', relatif à une catégorie de modèles $(\mathcal{M}, W)$ admettant une théorie des cofibres W-homotopiques, qu'il me faudra bien écrire! (Mais l'existence pour (Cat, W) d'une telle théorie des cofibres W-homotopiques, et par suite de celle des déploiements des diagrammes dans $\mathcal{M}$ de type $(\mathbf{\Delta}^1)^I$, I ensemble d'indices fini, ne dépend que de W(7 bis) - on n'a pas à faire appel à W(7).)

Ce 'deploiement' est un diagramme infini dont toutes les suites infinies, dans les trois [page 269] directions des axes de coordonnées, sont des 'suites de suspension'. Je reproduis la partie utile du déploiement.

p. 175

136. C'est un peu vif, car il n'est pas clair que $X_1' \amalg_{X_0} X_2' \longrightarrow X_1 \amalg_{X_0} X_2$ soit [dans] W, sans utiliser déjà un des trois ingrédients de W(7) (savoir $f_0, f_1, f_2 \in W \implies f_3 \in W$). Il semble donc que notre argument ne marche que moyennant une hypothèse supplémentaire de cet ordre …Mais il y a le *lemme de Brown,* cf. XVI §3, notamment p. 20.



La condition que X soit W-cocartésien s'exprime par $\lambda \in W$, ou encore par $U \in \mathrm{Asph}_W$ (car U s'identifie à la cofibre homotopique $Z(\lambda)$ de λ …), de même Y W-cocartésien s'exprime par $U' \in \mathrm{Asph}_W$, et Z W-cocartésien par $U'' \in \mathrm{Asph}_W$. Or $U'' \sim Z(\mu)$, où $\mu : U \longrightarrow U'$ est dans W si U, U' sont W-asphériques, donc $U'' = Z(\mu)$ est alors W-asphérique. Cela prouve le lemme.

Cela montre que, moyennant W(7 bis) (en fait, on a utilisé seulement la partie 'universelle' de W(7 bis)), savoir que dans $\begin{array}{ccc} T_0 & \longrightarrow & T_2 \\ {\scriptstyle i}\searrow & & \searrow{\scriptstyle i'} \\ & T_1 & \longrightarrow & T_3 \end{array}$ diagramme cocartésien d'immersions ouvertes, $i \in W \Longrightarrow i' \in W$ (au lieu de $\Longleftrightarrow$),

[page 270]

la validité de W(7) se ramène au cas où le carré Y est le carré trivial $\begin{array}{ccc} & e & \\ \nearrow & & \searrow \\ e & & & e, \\ \searrow & & \nearrow \\ & e & \end{array}$

e l'objet final de Cat.

On peut maintenant conclure : On a (moyennant la partie directe de W(7 bis))

$$\mathrm{a}' \;\&\; \mathrm{b}' \Longrightarrow \mathrm{c}',$$

car si Z_0, Z_1 sont $\in \mathrm{Asph}_W$, alors $i_1 \in W$, donc $j_1 \in W$, et si de plus $Z_2 \in \mathrm{Asph}_W$, on a donc $Z_3 \in \mathrm{Asph}_W$.

$$\begin{array}{ccccc} & & Z_1 & & \\ & {\scriptstyle i_1}\nearrow & & \searrow{\scriptstyle j_2} & \\ Z_0 & & & & Z_3 \\ & {\scriptstyle i_2}\searrow & & \nearrow{\scriptstyle j_1} & \\ & & Z_2 & & \end{array}$$

Si on a aussi la partie inverse ('inhabituelle') de W(7 bis), alors

$$\mathrm{b}' \;\&\; \mathrm{c}' \Longrightarrow \mathrm{a}',$$

car si Z_1 et Z_3 sont W-asphériques, alors $j_2 \in W$, donc $i_2 \in W$, et si de plus Z_2 est W-asphérique, on conclut Z_0 W-asphérique.

Enfin, supposons que W soit *stable par facteurs directs,* et W(7 bis) satisfait sous forme directe. Je dis qu'alors p. 176

$$\mathrm{c}' \;\&\; \mathrm{a}' \Longrightarrow \mathrm{b}',$$

i.e.


$$Z_0 \text{ et } Z_3 \ \in \mathrm{Asph}_W \qquad \Longrightarrow \qquad Z_1 \text{ et } Z_2 \ \in \mathrm{Asph}_W.$$

Factorisant i_1 et i_2 en

$$Z_0 \xrightarrow{i'_1} Z'_1 \xrightarrow{\alpha_1} Z_1,$$
$$Z_0 \xrightarrow{i'_2} Z'_2 \xrightarrow{\alpha_2} Z_2,$$

avec i'_1, i'_2 des immersions ouvertes de Dwyer, et $\alpha_1, \alpha_2 \in W$, on est ramené au cas où

i_1, i_2 sont des *immersions ouvertes de Dwyer,* et où le carré est cocartésien (ce qui implique qu'il est W-cocartésien). Faisant alors le cochangement de base par $Z_0 \xrightarrow{p_0} Z'_0 = e$, on trouve un homomorphisme de carrés cocartésiens [page 271]




où toutes les faces du cube sont W-cocartésiennes, et comme $p_0 \in W$ (Z_0 étant W-asphérique), les autres flèches verticales p_1, p_2, p_3 sont `[dans]` W, donc le carré Z'_* satisfait aussi Z'_0 et Z'_3 `[`W`-]`asphériques (et de plus $Z'_0 = e$), et il faut prouver Z'_1, Z'_2 W-asphériques (d'où itou pour Z_1, Z_2). Donc, on est ramené au cas particulier où $Z_0 = e$.

Mais dans ce cas il existe une rétraction (triviale !) de Z_1 sur Z_0, donc aussi de Z_3 sur Z_2. Ainsi, Z_2 est un facteur

direct d'un objet W-asphérique, ce qui implique, par l'hypothèse sur W, que Z_2 est W-asphérique. Par symétrie, Z_1 l'est aussi. On a gagné ! [page 272]

NB En fait, ces arguments sont généraux, et donnent ceci :

Théorème. *Soit $(\mathcal{M}, W)$ une catégorie des modèles, admettant une théorie de la cofibre W-homotopique* ([137]) *(i.e. on a une factorisation de toute flèche $f : X \longrightarrow Y$ en pi, avec $i \in \mathrm{Cof}_W$, $p \in W$.) On a donc une notion de carré W-cocartésien dans $\mathcal{M}$* ([138]). *Soit alors $f : X \longrightarrow Y$ un homomorphisme d'un carré W-cocartésien X dans un autre* p. 177 *Y, $f = (f_0, f_1, f_2, f_3)$.*



Considérons les conditions sur f

a) $f_0 \in W$.

b) f_1 *et* $f_2 \in W$.

137. Mais on ne sait vérifier l'existence d'une telle théorie dans (Cat, W) que si on admet la forme faible de W(7), i.e. $f_0, f_1, f_2 \in W \implies f_3 \in W$, ou quelque cas particulier de celle-ci. Mais le *lemme de Brown* sauve la situation, cf. XV §3.

138. à vérifier que la factorisation suffit, même si tous les objets ne sont pas fibrants sur e. Mais on peut alors remplacer $\mathcal{M}$ par $\mathcal{M}_f$, et développer ce formalisme des fibres homotopiques en conséquence …

c) $f_3 \in W$.

Alors

1°) a *&* $b \Longrightarrow c$.

2°) Supposons que $\mathcal{M}$ *ait un objet final* e. *Alors l'implication*

[page 273]

$$b \ \& \ c \Longrightarrow a$$

pour tout *homomorphisme* $f : X \longrightarrow Y$ *de carrés* W*-cocartésiens équivaut à l'axiome suivant sur* W *:*

Axiome des carrés W-cocartésiens conservatifs ([139]) : *Si*

$$\begin{array}{ccccc} & & Z_1 & & \\ & {\scriptstyle i_1}\nearrow & & \searrow{\scriptstyle j_2} & \\ Z_0 & & & & Z_3 \\ & {\scriptstyle i_2}\searrow & & \nearrow{\scriptstyle j_1} & \\ & & Z_2 & & \end{array}$$

est W*-cocartésien, alors* $j_1 \in W \Longrightarrow i_1 \in W$ *(donc en fait* $i_1 \in W \Longleftrightarrow j_1 \in W$ *et* $i_2 \in W \Longleftrightarrow j_2 \in W$*).*

Cet axiome est équivalent à la conjonction des deux axiomes suivants.

Cons 1. *Si on a un carré cocartésien*

p. 178

$$\begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & T \\ & \searrow \quad \searrow & \\ & e \longrightarrow & U, \end{array}$$

avec $f \in \mathrm{Cof}_W$*, alors* $U \in \mathrm{Asph}_W \Longrightarrow f \in W$ *(donc* $U \in \mathrm{Asph}_W \Longleftrightarrow f \in W$*).*

Cons 2. *Si on a un carré cartésien,*

$$\begin{array}{ccccc} & & Z_1 & & \\ & {\scriptstyle i_1}\nearrow & & \searrow & \\ Z_0 & & & & Z_3, \\ & {\scriptstyle i_2}\searrow & & \nearrow & \\ & & Z_2 & & \end{array}$$

avec $i_1, i_2 \in \mathrm{Cof}_W$*, alors : Si* Z_1*,* Z_2*,* Z_3 *sont* W*-asphériques,* Z_0 *l'est aussi.*

[page 274]

3°) Supposons que tout facteur direct d'un objet W*-asphérique soit* W*-asphérique, ce qui est le cas notamment si* W *est lui-même stable par facteurs directs, a fortiori si* W *est fortement saturé. Supposons de plus que* $\mathcal{M}$ *ait* [un] *objet final. Alors on a (sous les conditions générales du début)*

$$c \ \& \ a \Longrightarrow b,$$


i.e. si f_0*,* f_3 *sont* [dans] W*, de même* f_1*,* f_2*.*

Cette dernière partie peut se déployer ainsi :

Corollaire 1. *Sous l'hypothèse supplémentaire* 3 °) *sur* W*, la validité de* c *&* $a \Longrightarrow b$ *(pour toute flèche* f *entre carrés* W*-cocartésiens) équivaut à chacun des deux autres axiomes suivants sur* W *(qui sont donc équivalents) :*

139. cf. argument page 78 qui montre que l'implication b & c $\Longrightarrow$ a entraine l'axiome conservatif.

1) Si on a un carré W-cocartésien



alors Z_0 et Z_3 W-asphériques $\Longrightarrow$ Z_1 et Z_2 W-asphériques.

1′) Comme 1), avec $Z_0 = e$ (dans le cas où on suppose que $\mathcal{M}$ admet `[un]` *objet final e).*

[page 275]

Corollaire 2. *Supposons que W satisfasse l'axiome des carrés W-cocartésiens conservatifs, que tout facteur direct d'un objet W-asphérique soit W-asphérique (p. ex. W stable par facteurs directs), enfin que $\mathcal{M}$ admette un objet final. Alors pout tout homomorphisme $f : X \longrightarrow Y$ de carrés W-cocartésiens, la conjonction de deux parmi les conditions a) b) c) de p. 272 entraîne la troisième.*

p.

LES DÉRIVATEURS

ALEXANDRE GROTHENDIECK

Appendice au Chapitre XII

Proposition (?) ([1]). *Soit X dans* Cat*, avec b, c dans X tels que*

a) $b \times c$ est dans X.

p. 1
[page 1]

b) $\forall$ x dans X, $b(x)$ ($\overset{déf}{=} \mathrm{Hom}_X(x,b)$) et $c(x)$ sont $\neq \emptyset$, i.e. $X/b \longrightarrow X$ et $X/c \longrightarrow X$ sont surjectifs sur les objets.

Alors X est $\mathbf{W}_\infty$-asphérique. ([2])

Le fait que b soit un plus grand élément de ObX assure déjà la 0-connexité.

Pour la 1-connexité, prouvons que dans le groupoïde fondamental $\Pi(X)$, $a \overset{\text{déf}}{=} b \times c$ devient un élément final.

$$\begin{array}{ccc} b \times c & \longrightarrow & b \\ \downarrow & & \\ c & & \end{array}$$

Pour ceci, prouvons d'abord que $\forall$ x dans X, tous les éléments de $a(x) = b(x) \times c(x)$ sont égaux dans Fl$\Pi(X)$. En effet, comme $b \times c \longrightarrow b$ est `[un]` isomorphisme, donc `[un]` monomorphisme dans $\Pi(X)$, cela montre déjà que si $\beta, \beta' \in b(x)$, $\gamma, \gamma' \in c(x)$, d'où (β,γ), (β,γ'), $(\beta',\gamma') \in b(x) \times c(x)$, on a $(\beta,\gamma) = (\beta,\gamma')$ dans $\Pi(X)$ (puisque $\mathrm{pr}_1(\beta,\gamma) = \mathrm{pr}_1(\beta,\gamma')$, et de même (en utilisant que pr_2 est `[un]` isomorphisme, donc `[un]` monomorphisme) $(\beta,\gamma') = (\beta',\gamma')$). Donc tous les $(\beta,\gamma) \in b(x) \times c(x) = a(x)$ sont égaux dans Fl$\Pi(X)$. Pour achever de prouver que a est objet final de $\Pi(X)$, il suffit de voir que toute flèche *dans* $\Pi(X)$ d'un $x \in \mathrm{Ob}X$ dans a, provient d'une flèche $x \longrightarrow a$ dans X. Mais une flèche dans $\Pi(X)$ est obtenue par un chemin dans X

$$\begin{array}{ccccccccccc} x = x_0 & \xrightarrow{u_1} & x_1 & \xleftarrow{u_2} & x_2 & \longrightarrow & \cdots & \xleftarrow{u_{2N}} & x_{2N} = a \\ & \searrow^{\alpha_0} & \downarrow{\scriptstyle \alpha_1} & \swarrow_{\alpha_2} & & & & & \\ & & a. & & & & & & \end{array}$$

Prenons une flèche $\alpha_0 : x \longrightarrow a_0$ dans X, je dis que la classe d'homotopie du chemin c (i.e. son image dans Fl$(\Pi(X))$ est égale à celle de u_0. Pour le voir, choisissons pour tout $i \in [0, 2N]$ une flèche $\alpha_i : x_i \longrightarrow a$. (Ça existe grâce à l'hypothèse b)). Je dis que pour chaque $i \in [0, 2N]$, le triangle

[page 2]

$$\begin{array}{ccc} x_0 & \xrightarrow{c_i} & x_i \\ & \searrow^{\alpha_0} \quad \swarrow_{\alpha_i} & \\ & a & \end{array}$$


p. 2

dans $\Pi(X)$ est commutatif, où c_i désigne la classe d'homotopie du chemin de x_0 à x_i définie par les u_i ($i \in [1,i]$) `[plutôt` ($i \in [1,2N]$)`]`. Nous le faisons par récurrence sur i, l'assertion est triviale si $i = 0$ (c_0 représente l'application identitique). Le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} & & c_{i+1} & & \\ & \overset{\frown}{} & & \overset{\frown}{} & \\ x_0 & \xrightarrow{c_i} & x_i & \xrightarrow{u_{i+1}} & x_{i+1} \\ & \searrow^{\alpha_0} \quad \swarrow_{\alpha_i} & & \swarrow_{\alpha_{i+1}} & \\ & & a & & \end{array}$$

1. Cf. pages 11 ff. pour les contrexemples-clef.
2. Faux, cf. plus bas. X est 1-connexe, mais pas nécessairement 2-connexe.

montre qu'il suffit de prouver que pour $i \in [0, 2N-1]$ le triangle



est commutatif dans $\Pi(X)$. (**NB** u_{i+1} est en sens directe ou rétrograde, suivant que i est paire ou impaire.) Mais cela résulte du fait que l'image de $\mathrm{Hom}_X(x_i, a)$ (resp. $\mathrm{Hom}_X(x_{i+1}, a)$) dans $\mathrm{Fl}\Pi(X)$ est réduite à un seul élément.

[page 3]

Ainsi on trouve que X *est* 1-*connexe.* Il y a donc de l'espoir ! Il reste à prouver

$$H^i(X, M) = 0, \qquad i \geq 2, \quad M \text{ coefficient constant.}$$

J'ai regardé le cas lorsqu'on a ceci : $b = c$, $\mathrm{Ob}X = \{b, b \times b\}$, $\mathrm{Hom}_X(b \times b)$ [plutôt $\mathrm{Hom}(b \times b, b)$] = { réunion disjointe des ensembles $u \circ \mathrm{pr}_1$ et $u \circ \mathrm{pr}_2$, avec $u \in \mathrm{Hom}_X(b, b) = G$ un monoïde quelconque }. Alors X° est fibrée, via $I \longmapsto b^I$, sur la sous-catégorie pleine S de Ens formée de $\{0\}$ et $\{0, 1\}$, et donc X est cofibrée (en particulier propre) sur $S^\circ \overset{\text{déf}}{=} T$. (NB $S^\circ = T$ a un objet initial, mais non un objet final. Sa cohomologie à valeurs dans un préfaisceau quelconque n'est pas toujours triviale, cf. ci-dessous.)

On trouve [`On trouve' barré]

$$H^n(X, M) \Longleftarrow H^p(T, \underbrace{R^q f_*(M_X)}_{=\mathcal{H}^q}), \qquad \text{où } f : X \longrightarrow S^\circ$$

[$n = p + q$]. J'admet ici (provisoirement) ceci :

$$H^p(T, F) = 0 \ , \qquad \text{pour } p \geq 2, \text{ tout } F \in T^\wedge \ ,$$
$$H^0(T, F) = \mathrm{Ker}\delta \ ,$$
$$H^2(T, F) = \mathrm{Coker}\delta \ ,$$

où $\delta : F_0 \longrightarrow F_1$ est défini comme la différence $\delta = p_1^* - p_2^*$, où p_1, p_2 sont les deux projections de $\{0, 1\} \simeq \{0\}^2$ dans $T = S^\circ$. On a de plus

$$(\mathcal{H}^q)_0 = H^q(G, M), \qquad (\mathcal{H}^q)_1 = H^q(G \times G, M), \qquad \text{p. 3}$$

et

$$p_1^*, \ p_2^* \ : \ H^q(G, M) \rightrightarrows H^q(G \times G, M) \qquad \text{sont les transposés de } \mathrm{pr}_1, \ \mathrm{pr}_2 : G \times G \longrightarrow G.$$

On vérifie aisément que

$$H^0(T, \mathcal{H}^q) = 0 \qquad \text{si } q \geq 1,$$

et il reste

[page 4]

$$H^n(X, M) \simeq H^1(S, \mathcal{H}^{n-1}) = \mathrm{Coker}(\delta : H^{n-1}(G) \longrightarrow H^{n-1}(G \times G)).$$

Cela donne, pour $n = 2$,

$$H^2(X, M) \simeq \mathrm{Coker}\Big(\delta : \mathrm{Hom}_{\mathrm{mon}}(G, M) \longrightarrow \underbrace{Hom_{\mathrm{mon}}(G \times G, M)}_{\mathrm{Hom}_{\mathrm{mon}}(G,M) \times \mathrm{Hom}_{\mathrm{mon}}(G,M)} \Big)$$
$$\simeq \mathrm{Coker}\Big(u \longmapsto (u, -u) : H \longrightarrow H \times H\Big),$$

où H est le groupe abélien $\mathrm{Hom}_{\mathrm{mon}}(G, M)$.

D'où

$$H^2(X, M) \ \simeq \ H = \mathrm{Hom}_{\mathrm{mon}}(G, M).$$

Donc

X est 2-connexe si et seulement si le groupe *abélien* enveloppant du monoïde G est nul.

Ainsi, si G est un groupe abélien $\neq 0$, X *n'est pas* 2-connexe.

Corollaire. $\Psi = \begin{array}{ccc} & \nearrow & b_0 \\ a_0 & & \\ & \searrow & c_0 \end{array}$ *n'est* pas *totalement* $\mathbf{W}_\infty$*-asphérique ; i.e. si on a un diagramme* $\begin{array}{ccc} & \nearrow & b \\ a & & \\ & \searrow & c \end{array}$ *dans une catégorie* $X \in \mathrm{ObCat}$*, tel que sa somme amalgamée dans* $X^\wedge$ *soit égale à* e_X*, il ne s'ensuit pas que* X *soit* $\mathbf{W}_\infty$*-asphérique.* (Mais peut-être voudra bien être 1-connexe ?)

Question. *Y-a-t-il d'autres objets totalement* $\mathbf{W}_\infty$*-asphériques de* Cat*, que les catégories ayant un objet final ?* Je suspecte à présent que non – donc que l'on ne peut améliorer substantiellement sur la notion déjà connue d'immersion ouverte de Dwyer. p. 4 [page 5]

Dans le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} U & \xrightarrow{i} & X & \xleftarrow{j} & T \\ {\scriptstyle p}\downarrow & \text{cocart. et cart.} & {\scriptstyle q}\downarrow & & \vdots\,\text{iso} \\ U' & \xrightarrow{i'} & X' & \xleftarrow{j'} & T', \end{array} \qquad (*)$$

prenons

$$\begin{aligned} U = \Psi, \quad & T = \{t\} = e \text{ catégorie finale,} \\ & t \text{ objet final de } X, \\ & \text{i.e. } H_t = (u \longmapsto \mathrm{Hom}_X(u,t)) = e_U \in \mathrm{Ob}U^\wedge \ ([3]). \end{aligned}$$

Prenons pour U' la catégorie dont il est question dans la 'proposition' hypothétique (et fausse) p. 1 avec $b = c$, plus précisément une catégorie avec deux objets b et $b \times b$, un groupe (voire un monoïde) G d'automorphismes `[(voire d'endomorphismes)]` de b, et les autres flèches celles qui s'en déduisent, en exigeant que $b \times b$ soit bel et bien le carré cartésien de b. On trouve une catégorie cofibrée (donc propre) sur la catégorie T opposée de celle des ensembles finis de la forme $\{0\} \cup \{0,1\}$ (deux objets) avec comme fibres B_G et $B_{G\times G}$ respectivement (B_π = catégorie avec un seul objet, et monoïde d'endomorphismes π). Le foncteur


$$U = \Psi \longrightarrow U'$$

est celui donné par le diagramme [page 6]

$$\begin{array}{ccccc} & & & \xrightarrow{\mathrm{pr}_1} & b \\ b \times b & & & & \\ & & & \xrightarrow{\mathrm{pr}_2} & b \end{array}$$

p. 5

3. i.e. X déduit de $U = \Psi$ en lui rajoutant un objet final t – donc $X \simeq \mathbf{\Delta}^1 \times \mathbf{\Delta}^1$,



.

dans U', et les hypothèses a), b) de la page 1 assurent que la somme amalgamée $\varinjlim$ de ce diagramme dans $U'^{\wedge}$ est $e_{U'}$, i.e. que

$$p_!(e_U) = e_{U'}.$$

Il s'ensuit que dans la somme amalgamée, X' envisagée dans $(*)$, l'unique élément t' de T' est objet final de X'. On a vu que U' est 1-connexe, mais non 2-connexe si le groupe abélien enveloppant de G (i.e. $G/$(groupe des commutateurs) dans le cas où G est un groupe) n'est pas réduit à 1. L'exemple le plus économique s'obtient en prenant $G = \{\pm 1\}$ le groupe à deux éléments. C'est donc un cas où dans $(*)$ on a

$$i \in W \quad \text{(et même } i \text{ asphérique)}, \qquad \text{mais } i' \notin W,$$

et qui a l'avantage sur l'exemple plus sophistiqué de la page 103 (prop. 10) de ne mettre en jeu que des catégories finies – et même fort petites !

Procédons maintenant comme dans la proposition 11, en désignant par U'' la catégorie déduite de U' en lui ajoutant un objet final, et soit [page 7]

$$p' : U' \longrightarrow U''$$

l'inclusion, de sorte que


$$p'_!(e_{U'}) \quad = \quad (p'p)_!(e_U) = U' \qquad \text{en tant qu'objet dans } U''^{\wedge}$$
$$\text{(sous-préfaisceau du préfaisceau final } e_{U''}).$$

Considérons

$$\begin{array}{ccccc} U & \xhookrightarrow{i} & X & \xleftarrow{j} & T \\ {\scriptstyle p''=p'p}\downarrow & \text{cocart. et cart.} & {\scriptstyle q''}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \text{iso}} \\ U'' & \xhookrightarrow{i''} & X'' & \xleftarrow{j''} & T''. \end{array}$$

Cette fois U, X *et* U'' sont $\mathbf{W}_\infty$-asphériques (et même contractiles toutes trois), donc i, p'' sont dans W, pourtant X'' n'est pas $\mathbf{W}_\infty$-asphérique (donc $i'', q'' \notin \mathbf{W}_\infty$), car pour qu'elle le soit, i.e. pour que $i'' \in \mathbf{W}_\infty$, il faudrait (prop. 7, cor. page 85 ([4])) que i'' soit $\mathbf{W}_\infty$-asphérique, i.e. que U''/t'' soit $\mathbf{W}_\infty$-asphérique. Mais par construction $U''/t'' \simeq U'$, qui n'est *pas* $\mathbf{W}_\infty$-asphérique.

Voilà un exemple encore plus simple d'un foncteur $f : \Psi \longrightarrow X$ tel que $f_!(e_\Psi)$ ne soit pas $\mathbf{W}_\infty$-asphérique, i.e. d'un diagramme



dans une catégorie V, telle que la limite inductive $L = b \amalg_a c$ *dans* $V^{\wedge}$ soit un objet non asphérique de $V^{\wedge}$, i.e. V/L soit non asphérique. Je sais qu'il faut, pour un tel contre-exemple, que $a \longrightarrow b$ et $a \longrightarrow c$ ne soient pas des monomorphismes. L'idée, c'est de prendre un exemple universel où ces flèches ne soient pas [des] monomorphismes, en prenant [page 9]

p. 6 [page 8]

4. pas encore démontré !

$$V = \left(\begin{array}{ccccc} & & & & b \\ & & & \overset{\beta}{\nearrow} & \\ 0 & \underset{\mu}{\overset{\lambda}{\rightrightarrows}} & a & & \\ & & & \underset{\gamma}{\searrow} & \\ & & & & c \end{array} \right)$$

avec

$$\beta\lambda = \beta\mu \qquad \text{et} \qquad \gamma\lambda = \gamma\mu$$

les deux seules flèches non identiques, en plus des quatre flèches marquées β, γ, λ, μ.

On trouve que

$$b \amalg_a c \xrightarrow{\sim} e_X \qquad \text{(somme amalgamée dans } V^\wedge\text{)}.$$

Pourtant V n'est pas asphérique, ni même 1-connexe : il est homotope à la sous-catégorie ouverte $V_0 = (0 \underset{\mu}{\overset{\lambda}{\rightrightarrows}} a)$, car on a une rétraction $V \xrightarrow{r} V_0$ (envoyant b et c sur a), et une flèche $ir \longrightarrow \mathrm{id}_V$ (où $i : X_0 \hookrightarrow X$ est l'inclusion). Donc V a le même type d'homotopie *que* V_0, qui est un cercle. Donc on a intérêt à prendre ce V, où $\tilde{V}$ déduit de V en rajoutant un élément final e,

$$\tilde{V} = \left(\begin{array}{ccccc} & & & b & \\ & \nearrow & & & \searrow \\ 0 & \rightrightarrows & a & & e \\ & \searrow & & & \nearrow \\ & & & c & \end{array} \right),$$

comme U', pour les contre-exemples pages 6 et 7.

2.6. Contre-exemples pour la totale asphéricité.

[page 10]

Je me suis finalement convaincu que

$$\Psi = \left\{ \begin{array}{ccccc} & & & & b_0 \\ & & & \nearrow & \\ a_0 & & & & \\ & & & \searrow & \\ & & & & c_0 \end{array} \right\}$$

n'est *pas* totalement asphérique (pour le localiseur $\mathbf{W}_\infty$ – dans le présent numéro, on supposera $W = \mathbf{W}_\infty$), ou ce qui revient au même, qu'on peut avoir un diagramme de type Ψ p. 7

$$\begin{array}{ccccc} & & & & b \\ & & & \overset{\beta}{\nearrow} & \\ a & & & & \\ & & & \underset{\gamma}{\searrow} & \\ & & & & c \end{array} \qquad (*)$$

dans une catégorie $Z \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{Cat}$, dont la limite inductive $b \amalg_a c$ dans $Z^\wedge$ soit le préfaisceau final e_Z, i.e. tel que l'on ait

$$b(z) \amalg_{a(z)} c(z) \xrightarrow{\sim} \text{ensemble ponctuel}$$


pour tout objet z de Z (où $a(z) = \mathrm{Hom}_Z(a, z)$ `[plutôt` $\mathrm{Hom}_Z(z, a)$`]`) sans que pour autant Z soit asphérique, ni même 1-connexe ([5]). L'exemple le plus simple que j'ai trouvé, est l'exemple 'universel' d'un diagramme $(*)$ où ni l'une ni l'autre des deux flèches $a \longrightarrow b$, $a \longrightarrow c$ n'est `[un]` monomorphisme (car si elle l'est, alors on peut prouver que Z est bel et bien asphérique, comme nous verrons par la suite). C'est la catégorie

$$Z = \left\{ \begin{array}{ccc} & & b_0 \\ & \overset{\lambda_0}{\underset{\mu_0}{\rightrightarrows}} & \nearrow^{\beta_0} \\ 0_0 & & a_0 \\ & & \searrow_{\gamma_0} \\ & & c_0 \end{array} \right\}$$


déduite de Ψ en lui rajoutant un objet 0_0, relié à a_0 par deux flèches distinctes λ_0, μ_0, telles que [page 11]

$$\beta_0\lambda_0 = \beta_0\mu_0 \qquad \text{et} \qquad \gamma_0\lambda_0 = \gamma_0\mu_0,$$

ces deux flèches composées étant, avec les quatre flèches β_0, γ_0, λ_0, μ_0 marquées sur le diagramme, les seules (six) flèches non identiques de Z. Ψ immergée dans Z comme un fermé, de complémentaire la catégorie ponctuelle réduite à 0_0. (NB L'immersion fermée $\Psi \longrightarrow Z$ n'est pas immersion de Dwyer, i.e. (comme Z est le plus petit ouvert de Z contenant Ψ) n'est pas coasphérique, car la catégorie $0\backslash\Psi$, cofibrée sur Ψ avec fibres discrètes, de cardinal 2 en a_0 et 1 en b_0 et c_0, est la catégorie



i.e. p. 8



,

qui a le type d'homotopie du cercle.) Ni l'immersion ouverte $\{0_0\} \longrightarrow Z$, car $\{0_0\}/a_0$ est la catégorie discrète de cardinalité 2.

L'inclusion $i : Z_0 \longrightarrow Z$ de

$$Z_0 \;=\; (\; 0_0 \overset{\lambda_0}{\underset{\mu_0}{\rightrightarrows}} a_0 \;)$$

dans Z est un homotopisme ([7]) (car il existe une rétraction évidente r de Z sur Z_0 ([7]), et une flèche $ir \longrightarrow \mathrm{id}_Z$), donc Z est homotope à Z_0, qui a le type d'homotopie du cercle, donc n'est pas 1-connexe.

5. faux – il est 1-connexe forcément ([6]), mais non 2-connexe. [page 12]

6. cf. commentaire XII, p. 101.

7. faux, il n'y a pas de rétraction du tout ! En fait, Z est la *suspension* de la $\rightrightarrows$, qui a le type d'homotopie (topologique) du cercle, et il a donc le type d'homotopie de la 2-sphère.

D'autre part, la vérification de

$$b_0 \amalg_{a_0} c_0 \;=\; e_Z \qquad \text{dans } Z^\wedge$$

est immédiate.

On va utiliser cette flèche

$$\Psi \longrightarrow Z$$

pour construire des exemples intéressants (et déchirants) de sommes amalgamées

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\;i\;} & X \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ U' & \xrightarrow{\;i'\;} & X', \end{array}$$

avec i immersion ouverte, telle qu'on ait même

$$i :\ U \longrightarrow \overline{U} \qquad \text{est asphérique, donc dans } W,$$

alors que pourtant on aura

$$i' :\ U' \longrightarrow \overline{U'} \qquad \notin W,$$

et ce qui mieux (ou pis) est,

$$p \in W \qquad \text{mais} \qquad q \notin W$$


(et éventuellement, en même temps, $i \in W$ mais $i' \notin W$). De plus (contrairement aux constructions des propositions 10, 11 (p. 101-107)), les catégories envisagées pourront toutes être finies. Je suis particulièrement intéressé par le cas où X est un 'carré' p. 9

$$X = \Phi_n \times \Phi_m \qquad (n, m \geq 2),$$

et où U est son 'bord'

$$U = \dot{X} \overset{\text{déf}}{=} (\dot{\Phi}_n \times \Phi_m) \cup (\Phi_n \times \dot{\Phi}_m).$$

[page 13]



Proposition. *Soient $n, m \geq 2$, et considérons l'inclusion $U = \partial X \overset{i}{\hookrightarrow} X$ du bord du 'carré' $X = \Phi_n \times \Phi_m$ dans X. C'est une immersion ouverte W-asphérique, de façon précise, les U/t ($t \in \dot{U} = \bar{U} \backslash U$) sont isomorphes à e (catégorie ponctuelle) ou à $\Phi =$*



(catégorie avec élément final), sauf pour les quatre éléments t_i des quatre 'coins'

de $\dot{U}$, où c'est la catégorie

$$\tilde{\Psi} = \left(\begin{array}{ccccc} & & & & a' \\ & & & \nearrow & \\ & & a & & \\ & \nearrow & & & \\ 0 & & & & \\ & \searrow & & & \\ & & b & & \\ & & & \nwarrow & \\ & & & & b' \end{array} \right)$$

n'ayant pas d'élément final. Donc $U \xrightarrow{i} X$ n'est pas immersion ouverte de Dwyer (mais $U \longrightarrow X\backslash\{t_1, t_2, t_3, t_4\}$ l'est …). Ceci posé, je dis que $i : U \longrightarrow X$ n'est pas une W-cofibration.

Démonstration. Soit p. 10

$$F \hookrightarrow U$$

l'inclusion dans $U = \partial X$ de la catégorie-coin $[V =] \begin{array}{ccc} & & 0 \longrightarrow a \\ & & \downarrow \\ & & b \end{array}$ (cf. figure), isomorphe à Ψ. On voit aussitôt que c'est une immersion fermée de Dwyer (le plus petit ouvert de U contenant Ψ est justement la catégorie $\tilde{\Psi} = U/t_1$ de tantôt), donc une W-cofibration. Si $U \longrightarrow X$ était une W-cofibration, il en serait de même du composé $V \longrightarrow X$. On va voir que ce n'est pas le cas.

Soit $\overline{V} = \begin{array}{ccc} 0 & \longrightarrow & a \\ \downarrow & & \downarrow \\ b & \longrightarrow & t_1 \end{array}$ l'adhérence de V dans X, et considérons l'inclusion

[page 14]

$$\overline{V} \longrightarrow X,$$

je dis que [c]'est une immersion fermée de Dwyer, i.e. que pour tout $s \in W\backslash\overline{V}$, où W est le plus petit ouvert de X contenant $\overline{V}$, i.e.

$$W = \begin{array}{ccccc} 0 & \longrightarrow & a & \longleftarrow & a' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ b & \longrightarrow & \downarrow & \longleftarrow & a'' \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ b' & \longrightarrow & b'' & \longleftarrow & c, \end{array}$$

la catégorie $s\backslash\overline{V}$ a un objet initial. (Les catégories $s\backslash\overline{V}$ qu'on obtient, à partir des cinq choix possibles pour s, sont $\mathbf{\Delta}^1$ (si $s = a'$ ou b') ou e (pour $s = a''$, b'' ou c)). Donc $\overline{V} \longrightarrow X$ est une W-cofibration.

Ceci posé, on sait qu'il existe, pour [?] l'inclusion (immersion ouverte)

$$V \hookrightarrow \overline{V} \qquad \text{i.e. } \Psi \hookrightarrow \mathbf{\Delta}^1 \times \mathbf{\Delta}^1,$$

un foncteur $V \longrightarrow V'$, donnant lieu à un carré cocartésien

$$\begin{array}{ccc} V & \xhookrightarrow{i} & \overline{V} \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \overline{p}} \\ V' & \xhookrightarrow{i'} & \overline{V'} \end{array} \qquad (*)$$

avec

$i, p \in W$ (car V, V', $\overline{V}$ W-asphérique), mais $i', \overline{p} \notin W$ (i.e. $\overline{V'}$ *pas* W-asphérique).

Je rappelle qu'on prend d'abord

p. 11

$$V_0' = \left(0' \underset{\mu}{\overset{\lambda}{\rightrightarrows}} 0 \begin{array}{l} \overset{\alpha}{\nearrow} a \\ \underset{\beta}{\searrow} b \end{array} \right) \qquad \text{avec} \quad \begin{cases} \alpha\lambda = \alpha\mu \\ \beta\lambda = \beta\mu \end{cases}$$

et l'immersion fermée 'identique' de V dans V' [plutôt V_0']

$$p_0 : V \longrightarrow V_0'$$

(qui est telle que

$$p_{0!}(e_V) = e_{V_0'} \quad), \qquad \texttt{[page 15]}$$

puis on prend pour V' la catégorie obtenue en ajoutant un objet final à V_0'

$$V' = \left(0' \underset{\mu}{\overset{\lambda}{\rightrightarrows}} 0 \begin{array}{ccc} & \overset{\alpha}{\nearrow} a \overset{\rho}{\searrow} & \\ & & e \\ & \underset{\beta}{\searrow} b \underset{\sigma}{\nearrow} & \end{array} \right) \qquad \text{avec} \quad \begin{cases} \alpha\lambda = \alpha\mu \\ \beta\lambda = \beta\mu \\ \rho\alpha = \sigma\beta \end{cases}$$

et pour p le foncteur composé

$$V \xrightarrow{p_0} V_0' \xrightarrow{p_1} V', \qquad V \xrightarrow[p]{} V'$$

où p_1 est l'inclusion (ouverte). On trouve alors le carré $(*)$, avec $\overline{V'}$ non W-asphérique, ou ce qui revient au même, $i' \notin W$. Car comme $\overline{V'}\backslash V' \simeq \overline{V}\backslash V$ est la catégorie ponctuelle, $i' \in W$ équivaut à V'/t W-asphérique ([8]) (cf. cor. 4, p. 149 dans XII). Or par construction $V'/t \simeq V_0'$, qui n'est pas W-asphérique (dans le cas, disons, où $W \subseteq W_1$, car $\pi_1(V_0') \simeq \mathbf{Z}$).

Considérons alors le diagramme de carrés cocartésiens

$$\begin{array}{ccccc} V & \xhookrightarrow{i} & \overline{V} & \hookrightarrow & X \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \overline{p}} & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ V' & \xhookrightarrow{i'} & \overline{V'} & \hookrightarrow & X' \end{array} \quad . \qquad \texttt{[page 16]}$$

Comme $\overline{V} \hookrightarrow X$ est [une] immersion fermée de Dwyer, le carré de droite est W-cocartésien, donc $(\overline{p} \in W) \iff (q \in W)$, donc (comme $\overline{p} \notin W$) on a

p. 12

$$p \in W, \qquad \text{mais} \qquad q \notin W,$$

ce qui montre bien que $V \longrightarrow X$ n'est pas une W-cofibration. Factorisant $V \longrightarrow X$ par U (au lieu de $\overline{V}$), on trouve

$$\begin{array}{ccccc} V & \longrightarrow & U & \longrightarrow & X \\ {\scriptstyle p\in W}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q_U \in W} & & \downarrow{\scriptstyle q \notin W} \\ V' & \longrightarrow & U' & \longrightarrow & X' \end{array} \quad ,$$

8. moyennant (W 7 bis).

où $q_U \in W$ puisque $p \in W$ et $V \longrightarrow U$ est [une] immersion de Dwyer. Cela rend explicite que $U \longrightarrow X$ n'est pas une W-cofibration, puisque

$$q_U \in W, \qquad \text{mais} \qquad q \notin W,$$

q.e.d.

Recollement dans Cat **d'un ouvert et d'un fermé complémentaire.** [page 17]
[Supposons donné]


$$X_0 \underbrace{\hookrightarrow}_{\text{ouvert}} X \underbrace{\hookleftarrow}_{\substack{\text{fermé}\\ \text{complé-}\\ \text{mentaire}}} X_1$$

dans Cat, [et soit]

$$\tilde{X}_{01} \subseteq \mathrm{Fl}(X)$$

[la] sous-catégorie pleine des flèches de source dans X_0, but dans X_1.

Question. *Ce diagramme*



(∗)

est-il W-cocartésien ? p. 13

OK si i W-asphérique ou j W-coasphérique, i.e. $X \longrightarrow \mathbf{\Delta}^1$ lisse ou propre – c'est un cas où on a soit $X_0 \xrightarrow{W} X$, soit $X_1 \xrightarrow{W} X$. Mais même en supposant i ou j dans W, et de plus X asphérique (donc X_0 et X asphériques, ou X_1 et X asphériques), et $W = \mathbf{W}_\infty$, je n'ai pu prouver que le diagramme est cocartésien, i.e. $q \in W$ resp. $p \in W$ ([9]). (Pas non plus si $X_0 \simeq e$, X, X_1 W-asphérique $\Longrightarrow e\backslash X$ W-asphérique, i.e. $X_1 \longrightarrow X$ W-coasphérique ...) Mais j'ai prouvé du moins, dans tous les cas, que

$$\mathcal{X} \overset{\text{déf}}{=} \int \tilde{X}_{01} \longrightarrow X_0, X_1 \xrightarrow{\varphi} X \qquad (**)$$

est dans $\mathbf{W}_1$.

Chose *fausse* (sauf si i ou j dans $W = \mathbf{W}_\infty$) si on remplace $\tilde{X}_{01}$ par $\tilde{X}'_{01}$, formée des triples (x_0, x_1, c), avec $x_0 \in \mathrm{Ob}\, X_0$, $x_1 \in \mathrm{Ob}\, X_1$, $c : x_0 \dashrightarrow x_1$ un *chemin* de x_0 à x_1 dans X ! On a donc une situation 'topologique' tout à fait spéciale à la catégorie de modèles [page 18]
Cat, qui ne semble pas avoir d'analogue dans des catégories telles que Esp ou $\mathbf{\Delta}^\wedge$, où pourtant les notions d'ouvert et de fermé complémentaire (avec grain de sel dans $\mathbf{\Delta}^\wedge$) ont un sens.

9. Je suppose que W satisfait Loc (6).

L'argument catégorique quasi-trivial qui établit que $(**)$ est dans $\mathbf{W}_1$, i.e. induit une équivalence de catégories entre $\mathrm{Rev}(X)$ et

$$\mathrm{Rev}(\mathcal{X}) \;\simeq\; \mathrm{Rev}(X_0) \overset{2}{\times}_{\mathrm{Rev}(\tilde{X}_{01})} \mathrm{Rev}(X_1),$$

me semble devoir s'étendre aux dimensions supérieures, à coups de n-gerbes sur X – mais les fondements sur la théorie des n-gerbes manquent. (Et je n'ai pas eu le courage d'expliciter l'argument même pour $n = 2$ (où pourtant GIRAUD fournit ce qu'il faut) ([10]).) Aussi je conjecture que φ est tout au moins dans $\mathbf{W}_\infty$, i.e. que le diagramme $(*)$ est W-cocartésien si $W \supseteq \mathbf{W}_\infty$ (et satisfait Loc (6 a′)).

10. Mais j'ai fait quand même une esquisse de vérification pour $n = 2$, qui me convainc qu'on a bien $\varphi \in \mathbf{W}_2$. Et je n'ai pas guère de doute qu'on a même $\varphi \in \mathbf{W}_\infty$.

p. –

LES DÉRIVATEURS

ALEXANDRE GROTHENDIECK

Chapitre XIII

Catégories de modèles (1)

p. –

Note des éditeurs de l'édition transcrite.

Ce texte a été déchiffré et transcrit en LaTeX 2$_\varepsilon$ par M. Künzer. Il a été édité par M. Künzer, J. Malgoire, et G. Maltsiniotis. La transcription est aussi fidèle que possible au manuscrit. Pour les quelques corrections évidentes, ou rares commentaires des éditeurs, ainsi que pour la numérotation originale des pages du manuscrit, les caractères de machine à écrire `[typewriter]` entre crochets sont utilisés. Un point d'interrogation entre crochets signifie que l'on n'est pas sûr du mot qui précède. Les index, la liste des axiomes, le glossaire, et les références bibliographiques à la fin du chapitre ont été compilés par les éditeurs. Les numéros des pages dans les index sont ceux de l'original.
Cette édition est provisoire. Les remarques, commentaires et corrections sont bienvenus. Envoyer un message à :
[e-mail address removed]

G. Maltsiniotis

p. 1

[page 1]

1 Couples de Quillen (Φ, Ψ)

Je veux d'abord donner une variante affaiblie de la notion de triple de Quillen ("model category" de Quillen). Ce ne sera pas une notion tout-à-fait autoduale – ainsi il y aura *deux* variantes affaiblies, duales l'une de l'autre.

Mais avant encore, un sorite sur les LLP (left lifting property) et RLP (right lifting property) ([1]). Soit $\mathcal{M}$ une catégorie quelconque (le plus souvent, $\mathcal{M}$ sera grande). On considère des parties

$$\Phi,\ \Psi\ \subset\ \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$$

et on définit des applications

$$\boxed{\begin{array}{ccc}\Phi & \longmapsto & \Phi_* \\ \Psi & \longmapsto & \Psi^*\end{array}} \qquad \mathrm{Fl}(\mathcal{M}) \longrightarrow \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$$

[plutôt $\mathfrak{P}(\mathrm{Fl}(\mathcal{M}) \longrightarrow \mathfrak{P}(\mathrm{Fl}(\mathcal{M}))$, où pour tout ensemble E, $\mathfrak{P}(E)$ désigne l'ensemble des parties de E] par

$$\begin{aligned}\Phi_* &= \{\text{ensemble des } p \in \mathrm{Fl}(\mathcal{M}) \text{ qui ont la RLP par rapport à } \Phi\} \\ \Psi^* &= \{\text{ensemble des } i \in \mathrm{Fl}(\mathcal{M}) \text{ qui ont la LLP par rapport à } \Psi\},\end{aligned}$$

et ensuite

$$\boxed{\begin{array}{ccc}\Phi & \longmapsto & \widetilde{\Phi} \\ \Psi & \longmapsto & \overline{\Psi}\end{array}} \qquad \mathrm{Fl}(\mathcal{M}) \longrightarrow \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$$

[plutôt $\mathfrak{P}(\mathrm{Fl}(\mathcal{M}) \longrightarrow \mathfrak{P}(\mathrm{Fl}(\mathcal{M}))$] par

$$\begin{aligned}\widetilde{\Phi} &= (\Phi_*)^* \\ \overline{\Psi} &= (\Psi^*)_* \ .\end{aligned}$$

Je résume les propriétés les plus immédiates de ces opérations dans une [page 2]

Proposition 1.

a) $\Phi \longmapsto \Phi_*$, $\Psi \longmapsto \Psi^*$ *sont des applications décroissantes de* $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ [plutôt $\mathfrak{P}(\mathrm{Fl}(\mathcal{M}))$] *dans lui-même, pour la relation d'ordre* $\subset$*, et* $\Phi \longmapsto \widetilde{\Phi}$, $\Psi \longmapsto \overline{\Psi}$ *des applications croissantes.*

b) *On a*

p. 2

$$\Phi\ \subset\ \widetilde{\Phi},$$

et pour qu'on ait $\Phi = \widetilde{\Phi}$*, il faut et il suffit que* Φ *soit de la forme* Ψ^**. On dit alors que* Φ *est* clos à gauche ([2])*. L'ensemble des parties de* $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ *closes à gauche est stable par intersections quelconques* ([3])*, et* $\widetilde{\Phi}$ *est la plus petite partie close de* $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ *qui contienne* Φ *et la plus grande partie* Φ' *de* $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ *telle que* $\Phi'_* = \Phi_*$ *(ou telle que* $\Phi'_* \supset \Phi_*$*).*

Énoncés symétriques pour Ψ *: on a*

$$\Psi\ \subset\ \overline{\Psi},$$

1. donner définition en forme, avec renvoi à Quillen.
2. Donner définition en forme.
3. de façon précise, $\bigcap_i (\Psi_i^*) = (\bigcup_i \Psi_i)^*$

on a $\Psi = \overline{\Psi}$ *si et seulement si* Ψ [est] *de la forme* Φ_**, on dit alors que* Ψ *est* clos à droite. *L'ensemble des parties de* $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ *closes à droite est stable par intersections quelconques* ([4]), *et* $\overline{\Psi}$ *est la plus petite partie close à droite contenant* Ψ*, et aussi la plus grande partie* Ψ' *de* $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ *telle que* $\Psi'^* = \Psi^*$ *(ou telle que* $\Psi'^* \supset \Psi^*$*).*

[page 3]

c) *Les applications*

$$\Phi \longmapsto \Phi_*, \qquad \Psi \longmapsto \Psi^*$$

établissent des bijections inverses l'une de l'autre entre l'ensemble des parties Φ *closes à gauche de* $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$*, et l'ensemble des parties* Ψ *closes à droite. C'est un anti-isomorphisme d'ensembles ordonnés. On a alors*

$$(\Phi \cap \Phi')_* = \begin{array}{l} \textit{partie close à droite de } \mathrm{Fl}(\mathcal{M}) \textit{ "engendrée par } \Phi_*,\ \Phi'_*\textit{"},\\ \text{i.e. [la] } \textit{plus petite partie close à droite contenant } \Phi_*,\\ \Phi'_*, \text{ i.e. } \overline{\Phi_* \cup \Phi'_*} \end{array}$$

[pour Φ, Φ' parties closes à gauche], *plus généralement*

$$(\bigcap_i \Phi_i)_* = \overline{\bigcup_i (\Phi_{i*})}$$

pour toute famille $(\Phi_i)_{i\in I}$ *de parties closes à gauche de* $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$*. Formules duales* [pour des parties closes à droite]

$$\begin{cases} (\Psi \cap \Psi')^* = \widetilde{\Psi^* \cup \Psi'^*} \\ (\bigcap_j \Psi_j)^* = \widetilde{\bigcup_j (\Psi_j^*)}\ . \end{cases}$$

d) *Si* $\Phi, \Psi \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$*, alors on a*

$$\Phi \subset \Psi^* \iff \Psi \subset \Phi_*, \qquad \textit{on écrit alors } \Phi \longleftrightarrow \Psi,$$

cela signifie que Φ *a la LLP pour* Ψ*, ou que* Ψ *a la RLP pour* Φ*.*

Proposition 2. *Soit* Φ *une partie close à gauche de* $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$*. Alors* Φ *satisfait les conditions* a) b) c) *ci-dessous :*

p. 3

[page 4]

a) Φ *contient les isomorphismes, et est stable par composition, et par cochangement de base (*i.e. *si on a* $\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{i} & B \\ \downarrow & & \downarrow \\ A' & \xrightarrow{i'} & B' \end{array}$ *carré cocartésien dans* $\mathcal{M}$*, avec* $i \in \Phi$*, on a* $i' \in \Phi$*).*

b) Φ *stable par facteurs directs (en tant que partie de l'ensemble des objets de* $\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M})$*).*

c) Φ *"stable par limites inductives ordinales", dans le sens suivant : Soit* I *un ensemble bien ordonné,* $(A_i)_{i\in I}$ *un système inductif dans* $\mathcal{M}$*, tel que les* $u_{ji} : A_i \longrightarrow A_j$ *soient dans* Φ*, et* $A_{i_0} \xleftarrow{\sim} \varinjlim_{i<i_0} A_i$ *si* $i_0 \in I$ *est un élément limite. Supposons que* $A = \varinjlim_I A_i$ *existe. Alors* $\forall\ i_0 \in I$*, la flèche canonique* $A_{i_0} \longrightarrow A$ *est dans* Φ*.*

Il y a un énoncé dual pour une partie Ψ close à droite ; elle contient les isomorphismes, est stable par composition et par changement de base, par facteurs directs, et enfin stable par limites projectives ordinales.

4. de façon précise, on a $\bigcap_i (\Phi_{i*}) = (\bigcup_i \Phi_i)_*$

[page 5]

On aura une réciproque partielle dans les catégories accessibles. C'est pour l'énoncé de cette réciproque que j'ai mis à part la condition *b*) de stabilité par facteurs directs, au lieu de la bloquer avec *a*).

Définition 1.

a) (Pour mémoire.) RLP, LLP, la relation $\Phi \longleftrightarrow \Psi$ entre parties de $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ (relation non symétrique !).

b) (Pour mémoire.) Partie de $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ close à gauche, close à droite.

c) Soit $\Phi \longleftrightarrow \Psi$. On dit que le couple (Φ, Ψ) a la *propriété de factorisation de Quillen*, si *toute* flèche f de $\mathcal{M}$ se factorise en

$$f = pi, \qquad i \in \Phi,\ p \in \Psi.$$

On dit que (Φ, Ψ) est un *couple de Quillen* si c'est un couple associé par `[les]` propriétés LLP et RLP ($\Phi \longleftrightarrow \Psi$), et `[si]` elles `[les parties` Φ `et` Ψ`]` sont closes (*i.e.* $\Phi = \Psi^*$, $\Psi = \Phi_*$), et si elles ont la propriété de factorisation de Quillen.

J'énonce dès maintenant le résultat technique essentiel, assurant l'existence de beaucoup de couples de Quillen :

p. 4
[page 6]

Théorème 1. *Supposons que* $\mathcal{M}$ *soit* accessible, *et stable par (petites) limites inductives. (Il doit suffire stabilité par sommes amalgamées, et par* $\varinjlim$ *filtrantes, voire ordinales …). Soit* Φ_0 *une* petite *partie de* $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$, $\Psi = (\Phi_0)_*$, *et* Φ *une partie de* $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ *telle que*

$$\Phi_0 \ \subset\ \Phi \ \subset \Psi^* \ (= \widetilde{\Phi}_0).$$

Alors :

a) *Pour que* Φ *soit close à gauche,* i.e. $\Phi = \widetilde{\Phi}_0$, *il faut et il suffit qu'elle satisfasse les conditions* a) b) c) *de la proposition 2. Quand il en est ainsi, le couple* (Φ, Ψ) *est un couple de Quillen.*

b) *Supposons seulement que* Φ *satisfasse aux conditions* a), c) *de la proposition 2 (à l'exclusion de la condition* b) *des facteurs directs) – donc on ne peut affirmer que* Φ *soit close à gauche. Néanmoins,* $(\Phi, \underbrace{\Psi}_{=\Phi_*})$ *satisfait à la propriété de factorisation de Quillen.*

Remarque. Dans la démonstration, l'existence de $\Phi_0 \subset \Phi$, qui joue le rôle d'un petit ensemble de "générateurs" (à gauche) pour Φ, joue un rôle essentiel. Il y aurait lieu de développer la notion de *parties accessibles* de $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$, qui impliquerait l'existence d'un petit ensemble $\Phi_0 \subset \Phi$ tel que $\Phi \subset \widetilde{\Phi}_0$, et qui aurait la propriété que

[page 7]

$$\begin{aligned} \Phi \text{ accessible} \quad &\Longrightarrow \quad \Phi_* \text{ accessible} \\ \Psi \text{ accessible} \quad &\Longrightarrow \quad \Psi^* \text{ accessible.} \end{aligned}$$

Tout couple (Φ, Ψ) de parties closes associées ($\Phi = \Psi^*$, $\Psi = \Phi_*$) et accessible, serait donc un couple de Quillen.

2 Catégories de Quillen faibles, et construction d'icelles (Théorème-scholie conjectural)

Dans toute la suite, on se donne une *catégorie de modèles*

$$\begin{cases} (\mathcal{M}, W), \text{ où } W \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M}) \\ \\ W \textit{ faiblement saturée } ({}^5): \begin{array}{ll} a) & W \text{ contient les isomorphismes.} \\ b) & \text{Si deux parmi } f, g, gf \texttt{ [sont] dans } W, \\ & \text{le troisième aussi.} \end{array} \end{cases}$$

On veut décrire des données supplémentaires un peu plus faibles que celles d'une catégorie de modèles de Quillen. On suppose données des parties p. 5

$$C,\ F,\ TC,\ TF\ \subset\ \mathrm{Fl}(\mathcal{M}),$$

avec les propriétés suivantes. Comme axiome préliminaire, je pose

M 0 Stabilité de $\mathcal{M}$ par $\varprojlim$ finies et $\varprojlim$ `[plutôt` $\varinjlim$`]` finies.

M 1 Propriété de relèvement-prolongement [page 8]

$$C \longleftrightarrow TF, \qquad TC \longleftrightarrow F.$$

M 2 Propriété de factorisation pour (C, TF), (TC, F).

M 3 Stabilité de F par composition et par changement de base, de C par composition et cochangement de base, F et C contiennent les isomorphismes.

M 4 Stabilité de TF par composition et changement de base, de TC par composition et cochangement de base, et TF et TC contiennent les isomorphismes.

M′ $TC \subset C \cap W$, $TF \subset F \cap W$.

M″ $C \subset \underbrace{\mathrm{Cof}_W}_{W\text{-cofibrations}}$, $F \subset \underbrace{\mathrm{Fib}_W}_{W\text{-fibrations}}$.

`[Un morphisme` $p : X \longrightarrow Y$ `de` $\mathcal{M}$ `est une` W`-fibration si pour tout diagramme de carrés cartésiens de la forme :`

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & X' & \xleftarrow{t} & X'' \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longleftarrow & Y' & \xleftarrow[s]{} & Y'' \end{array},$$

`si` $s \in W$`, alors` $t \in W$`. La notion de` W`-cofibration est la notion duale.]`

Dans le cas de Quillen (Q-*catégories de modèles*), M′ est renforcé en

$$TC = C \cap W, \qquad TF = F \cap W,$$

et il n'y a pas d'axiome M″. L'axiome M″ équivaut à la propriété de "propriety", correspondant aux Q-catégories de modèles *propres.*

Proposition 3. *Supposons les conditions* M 0 *(pour mémoire),* M 1, M 2, M′, M″ *satisfaites. Alors en remplaçant* C, TC *par les saturés pour les propriétés de stabilité de contenir les isomorphismes, d'être stable par composition et par cochangement de base, et* F, TF *par celles de contenir les isomorphismes et d'être stable par composition et par changement de base, on trouve* C', TC', F', TF' *satisfaisant à tous les axiomes* M 1 à p. 6 [page 9]

M 4, M′, *M″*.

Démonstration. La proposition 2 nous assure que M 1 continue à être satisfait, et pour M 2 c'est trivial. M 3 et M 4 seront valables par construction. D'autre part, M″ reste valable, car Cof_W a les stabilités requises pour C', et Fib_W celles requises pour F'. Reste à prouver M′, *i.e.*

$$TC' \ \subset \ C' \cap W, \qquad TF' \subset F' \cap W,$$

et pour ceci il suffit de voir que $C' \cap W$ resp. $F' \cap W$ a les stabilités requises pour TC' resp. TF'. Cela résulte du

Lemme. *Soit C une partie de Cof_W. Si C contient les isomorphismes, il en est de même de $C \cap W$. Si de plus C est stable par composition resp. par cochangement de base, il en est de même* [de] *$C \cap W$. Énoncé dual pour une partie F de Fib_W.*

Cela provient du fait que

$$\boxed{\mathrm{Cof}_W \cap W = W^{\mathrm{univ}} \ (^6)} \overset{\text{déf}}{=} \begin{array}{l}\text{ensemble des flèches } A \longrightarrow B \text{ telles que pour tout} \\ A \longrightarrow A', \ A' \longrightarrow B' = A' \vee_A B \ \text{ est dans } W.\end{array}$$

est lui-même stable par composition et par cochangement de base, et que l'on a bien sûr, si $C \subset \mathrm{Cof}_W$,

$$C \cap W \ = \ C \cap (\mathrm{Cof}_W \cap W) \ = \ C \cap W^{\mathrm{univ}}.$$

Donc il reste à prouver le

Corollaire 1. *Supposons qu'il existe des parties C, F, TC, $TF \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ satisfaisant* M 2, M′ (7), M″. *Alors* [page 10]

$$\begin{aligned} \mathrm{Cof}_W \cap W \ &= \ W^{\mathrm{univ}} \\ \mathrm{Fib}_W \cap W \ &= \ W_{\mathrm{univ}} \ \ (^8). \end{aligned}$$

Pour voir ceci, montrons p. ex. le deuxième (le premier s'en déduira par dualité).

$$\begin{array}{ccc} X & \longleftarrow & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ Y & \longleftarrow & Y' \end{array} \qquad\qquad f \in \mathrm{Fib}_W, \ f \in W \Longrightarrow f' \in W.$$

On a mieux :

Proposition 4. *Supposons que toute flèche de $\mathcal{M}$ se factorise en pi, avec $i \in W$ et $p \in \mathrm{Fib}_W$. Alors, si X, Y sont dans $\underline{\mathrm{Fib}}_W S \subset \mathcal{M}/S$* [sous-catégorie pleine de $\mathcal{M}/S$ formée des $r : Z \longrightarrow S$, où $r \in \mathrm{Fib}_W$], *alors toute $f : X \longrightarrow Y$ dans $\mathcal{M}/S$* p. 7 *qui est dans W_S* [formé des flèches au-dessus de S qui sont dans W] *est dans W_S^{u},* i.e. *elle reste dans W après tout changement de base $S' \longrightarrow S$.*

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\ f\ } & Y \\ & {\scriptstyle p}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle q} & \\ & S & \end{array} \qquad\qquad p, q \in \mathrm{Fib}_W$$

Énoncé dual pour les flèches de $S\backslash\underline{\mathrm{Cof}}_W \subset S\backslash\mathcal{M}$ [sous-catégorie pleine de $S\backslash\mathcal{M}$ formée des $i : S \longrightarrow Z$, où $i \in \mathrm{Cof}_W$], *une telle flèche qui est dans W est S-coüniversellement dans W, si toute flèche de $\mathcal{M}$ se factorise en qj, avec $j \in \mathrm{Cof}_W$ et $q \in W$.*


5. C'est l'axiome M 5 de Quillen.

6. flèches *coüniversellement* dans W, ou *W-équivalences coüniverselles*.

7. On n'a pas besoin de tout M′, seulement de $TC \subset W$, $TF \subset W$.

8. Flèches $f : X \longrightarrow Y$ *universellement* dans W, *i.e.* telles que pour tout $Y' \longrightarrow Y$, $f' : X' = X \times_Y Y' \longrightarrow Y'$ soit dans W. [page 11]

Démonstration.



On factorise $S' \longrightarrow S$ en $S' \xrightarrow{i} \overline{S'} \xrightarrow{p} S$, avec $i \in W$, $p \in \mathrm{Fib}_W$, par M 2. Donc $f \in W \Longrightarrow \overline{f'} \in W$. Comme $X, Y \in \mathrm{Ob}\,\underline{\mathrm{Fib}}_W S$, on a $\overline{X'}, \overline{Y'} \in \mathrm{Ob}\,\underline{\mathrm{Fib}}_W \overline{S'}$, et comme $i : S' \longrightarrow \overline{S'}$ est dans W, donc aussi i_X, i_Y, on a $f' \in W$ par M 5 (saturation faible de W).

Commentaire sur Proposition 3. On peut être encore plus exigeant, en demandant dans M 3, M 4 également la stabilité par facteurs directs, et (quand seuls M 1, M2, M′, M″ sont satisfaits) en saturant C, TC, F, TF également pour cette stabilité supplémentaire. La proposition 2 assure encore que M 1 continue à être vérifié (et M 2, M 3, M 4 trivialement), on voit qu'il en est ainsi encore de M′, M″ à condition qu'on renforce l'axiome de saturation faible M 5 sur W par

stabilité de W par facteurs directs,

ce qui implique en effet que Cof_W, Fib_W sont stables par facteurs directs, ainsi que W^{univ} et W_{univ}.

Il ne semble pas que les axiomes M 0 à M 4, plus M′ et M″ suffisent à développer les suites exactes de suspension et de cosuspension. Il faut un petit chouia de plus : [page 12]

Définition 2. J'appelle *pré-Q-catégorie de modèles à gauche,* la donnée de $\mathcal{M}$ et de W, C, F, TC, $TF \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$, satisfaisant les axiomes M 0 à M 5, M′, M″, plus la forme renforcée de la première inclusion dans M′ p. 8

$$\mathrm{M}'_0\ (\mathrm{g}) \qquad\qquad TC = C \cap W \qquad\qquad (\text{non seulement } TC \subset C \cap W).$$

De même, on définit la *pré-Q-catégorie de modèles à droite,* par la condition

$$\mathrm{M}'_0\ (\mathrm{d}) \qquad\qquad TF = F \cap W.$$

NB Quand les deux conditions sont satisfaites à la fois, alors la donnée de TC, TF résulte déjà de celle de W, C, F, et on a simplement une Q-catégorie de modèles "propre" (au sens de Quillen).

Scholie. Pour moi, l'introduction de C, TC, F, TF est purement auxiliaire – ce qui m'importe, ce sont les propriétés de W. Ainsi, l'existence de C, TC, F, TF satisfaisant aux axiomes faibles M 0 à M 4, M′, M″, du fait qu'elle donne les factorisations dont il est question dans `[la]` proposition 3, entraîne la propriété remarquable de W énoncée dans cette proposition, et dans le corollaire qui la précède. De même, ces propriétés de factorisation ([9]) assurent l'existence d'une bonne théorie des fibres et cofibres W-homotopiques sans besoin de référence dans cette théorie à C, TC, F, TF (dont l'introduction donne tout au plus des petits compléments …). Mais je ne vois pas comment, à partir des seules hypothèses de factorisation, prouver la propriété cruciale d'exactitude pour les carrés W-cartésiens, et W-cocartésiens, nécessaire pour pouvoir développer la suite *exacte* de cosuspension et de suspension. C'est pour avoir cette exactitude que l'introduction [page 13]

9. sous une forme légèrement renforcée il est vrai – il faut une factorisation *fonctorielle* pour f …

auxiliaire, et transitoire, de l'attirail (C, TC, F, TF) est utile, l'axiome supplémentaire à gauche $TC = C \cap W$ assurant (sauf erreur) l'exactitude des carrés W-cartésiens, et l'axiome à droite $TF = F \cap W$ celle des carrés W-cocartésiens. (Chose à vérifier avec plus de soin que je ne l'ai fait à présent.) Une fois ceci obtenu, et éventuellement itou pour les $(\mathcal{M}(I), W(I))$ pour toute catégorie-diagramme I, on peut totalement oublier ces [page 14] ensembles auxiliaires – j'ai envie en tous cas de les oublier.

Mon espoir, c'est que pour une W donnée, même si on n'arrive pas à trouver une structure de triple de Quillen (W, C, F) associée (p. ex. parce qu'il n'y en aurait pas), on peut trouver à la fois des quintuplets (W, C, F, TC, TF) qui soient des pré-Quillen à gauche, et des quintuplets (d'*autres* quintuplets !) qui soient des pré-Quillen à droite.

Voici le genre d'énoncé en forme, pour le moment conjectural voire totalement heuristique, auquel je songe :

Théorème-scholie conjectural : *On suppose que $\mathcal{M}$ est stable par $\varinjlim$ "quelconques", et par $\varprojlim$ finies, et que W est stable par $\varinjlim$ filtrantes (en plus de la saturation faible).*

p. 9

① *Alors* Cof_W *et* W^{univ} *ont les propriétés de stabilité* a) *et* c) *de la proposition* 2 (p. 4), *et aussi la propriété de stabilité* b) *par facteurs directs, pourvu que W lui-même l'a.*

② *Supposons* $\mathcal{M}$ accessible, *de sorte qu'on dispose du théorème* 1. *Conditions équivalentes sur W :* [page 15]

a) *Il existe une partie petite C_0 de* Cof_W, *et TC_0 de* W^{univ}, *telles que*

$$TF \overset{\text{déf}}{=} C_{0*} \subset W, \qquad (TC_0)_* \overset{\text{déf}}{=} F \subset \mathrm{Fib}_W.$$

a′) *Il existe un quadruplet (C, TC, F, TF) de parties de* $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$, *satisfaisant les conditions* M 1 *à* M 4, M′, M″ *de la page* 6 ([10]).

a″) *Comme* a′), *en supposant* M′ *sous forme renforcée avec* M'_0 (g), i.e. *on a une structure de pré-Q-catégorie de modèles à gauche ($TC = C \cap W$).*

b) *On a*

$$(\mathrm{Cof}_W)_* \subset W, \qquad (W^{\mathrm{univ}})_* \subset \mathrm{Fib}_W$$

(donc $(\mathrm{Cof}_W)_* \subset \mathrm{Fib}_W \cap W$ *puisque* $(\mathrm{Cof}_W)_* \subset (W^{\mathrm{univ}})_*$ ([11])*).*

b′) *On a*

$$(\mathrm{Cof}_W)_* \subset W_{\mathrm{univ}}, \qquad (W^{\mathrm{univ}})_* \subset \mathrm{Fib}_W.$$

③ *Pour qu'il existe un quadruplet qui, avec W, définisse une pré-Q-catégorie de modèles à droite ($TF = F \cap W$)* ([12]), *il faut et il suffit qu'on ait* b′) *ci-dessus, ainsi que*

$$(W^{\mathrm{univ}})_* \cap W_{\mathrm{univ}} \quad \textit{est clos à droite.}$$

④ *Les hypothèses préliminaires sur $(\mathcal{M}, W)$, y inclus l'accessibilité, ainsi que les conditions équivalentes dans* ②, *sont stables par passage de $(\mathcal{M}, W)$ à $(\mathcal{M}(I), W(I))$. Mais qu'en est-il de la condition dans* ③ *? Est-elle conséquence des conditions dans* ② *(*i.e. *leurs est-elle équivalente) ?* [page 16]

Je vais esquisser la démonstration du théorème-scholie, pour cerner le travail technique qui reste à faire.

1°) Est de la vérification de routine.

10. avec C, TC clos à gauche, F, TF clos à droite.

11. $W^{\mathrm{univ}} \subset \mathrm{Cof}_W$.

12. On suppose toujours $\mathcal{M}$ accessible dans 3° et 4°, avec en plus F, TF (et C, TC) closes à droite (resp. à gauche).

2°) Voici les implication ± tautologiques entre les conditions envisagées :

$$a'' \Longrightarrow a' \overset{?}{\Longrightarrow} a \Longrightarrow b \Longleftarrow b', \qquad (*)$$

mais je vois que $a' \Longrightarrow a$ n'est nullement tautologique, et peut-être même faux après tout ! ([13]). Il faudrait supposer que dans `[le]` quadruplet (C, F, TC, TF), F et TF sont clos à droite, et plus précisément, que $F = (TC)_*$, $TF = C_*$, ce qui sera le cas p. ex. si on a une structure de Q-catégorie de modèles "close" ("closed model category"), au sens de Quillen. Les autres trois implications dans $(*)$ sont bel et bien tautologiques. p. 10

$a \Longrightarrow a'$. On peut dans a) supposer

$$TC_0 \ \subset \ C_0$$

(quitte à remplacer C_0 par $C_0 \cup TC_0$), puis, grâce à 1°) (W^{univ} et Cof_W sont clos à gauche), posant [page 17]

$$\overline{TC_0} = TC, \qquad \overline{C_0} = C, \qquad \texttt{[plutôt } \widetilde{TC_0} = TC, \qquad \widetilde{C_0} = C, \texttt{]}$$

on aura $TC \subset W^{\text{univ}}$, $C \subset \text{Cof}_W$. Passant de TC_0 à TC, de C_0 à C, on a perdu seulement que ces parties de $\text{Fl}(\mathcal{M})$ soient petites. Mais par le théorème 1, posant

$$F \ = \ (TC)_*, \qquad TF \ = \ C_*,$$

les couples de parties closes (à gauche – à droite)

$$(C,\, TF), \qquad (TC,\, F)$$

satisfont à la condition de factorisation de Quillen. On aura alors les propriétés M 1 à M 4, plus les inclusions $TC \ \subset \ C \cap W$ (car $TC \ \subset \ W^{\text{univ}} \ \subset \ W$, et $TC \ \subset \ C$ par construction), et $C \subset \text{Cof}_W$ de M′ et M″. Il reste à vérifier $TF \subset F \cap W$, $F \subset \text{Fib}_W$, mais $F \ (= (TC)_*) \ \subset \text{Fib}_W$ par hypothèse, et $TF \ (= C_*) \ \subset W$ aussi ; d'autre part $TF \subset F$ résulte de $TC \subset C$.

$a' \Longrightarrow a''$. On veut donc, en plus des conditions M 1 à M 4 et M′, M″, la condition

$$TC \ = \ C \cap W \ (= C \cap W^{\text{univ}}).$$

L'idée, c'est de remplacer le couple [page 18]

$$C,\ TC \qquad (C \subset \text{Cof}_W,\ TC \subset C \cap W),$$

donnant naissance à

$$F = (TC)_*, \qquad TF = C_*,$$

par

$$C,\ C \cap W \ (\supset TC),$$

ce qui ne change pas le couple (C, TF), mais bien le couple (TC, F), remplacé par p. 11

$$\underbrace{(TC)'}_{\supset TC} \ = \ \underbrace{C \cap W}_{= C \cap W^{\text{univ}}}, \qquad F' \ = \ \underbrace{(TC')_*}_{\subset F}$$

(on a remplacé F par un F' plus petit) ([14]). Le seul problème, c'est si (TC', F') satisfait encore à la condition de factorisation de Quillen. Ce sont des parties closes (à gauche pour TC', à droite pour F') "duales" l'une de l'autre,

$$TC' = F'^*, \qquad F' = TC'_*\ , \qquad \texttt{[page 19]}$$

mais comme on ne sait pas si TC' est de la forme $\widetilde{TC'_0}$, avec TC'_0 petite, on n'est pas sûr que la conclusion du théorème 1 s'applique. Mais si on suppose dans a') que C est une partie *accessible* de $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ (*i.e.*, étant déjà close à gauche, que $C = \widetilde{C_0}$, C_0 petit), alors je présume qu'on pourra prouver qu'il en est de même de $C \cap W$ (W elle-même étant accessible, grâce à la condition de stabilité par petites $\varinjlim$ filtrantes), donc le théorème 1 s'applique bel et bien à $TC' = C \cap W$. Mais si on garde $\overrightarrow{a'}$) telle quelle, alors il faudrait sans doute prouver que a') *implique* a') sous la forme plus forte, avec C *accessible.* Mais comme on a $a' \Longrightarrow a$, et qu'on vient d'établir que $a \Longrightarrow a'$ sous cette forme plus forte, on gagne (modulo le fait conjectural admis sur les parties admissibles `[plutôt accessibles]` de $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$).

Il reste donc à prouver

$$b \implies a, \qquad b \implies b',$$

et il suffit de prouver la première implication, car on sait que $a) \Longrightarrow a')$, et que a') implique que

$$\mathrm{Fib}_W \cap W \;=\; W_{\mathrm{univ}}$$

(cor. 1, page 10), donc $(\mathrm{Cof}_W)_* \subset W$ et $(W^{\mathrm{univ}})_* \subset \mathrm{Fib}_W$ (*i.e.* b)) impliquent, comme $(\mathrm{Cof}_W)_* \subset (W^{\mathrm{univ}})_*$ (car $W^{\mathrm{univ}} \subset \mathrm{Cof}_W$), $(\mathrm{Cof}_W)_* \subset W \cap \mathrm{Fib}_W = W_{\mathrm{univ}}$, ce qui est la partie à établir de b') (l'autre $(W^{\mathrm{univ}})_* \subset \mathrm{Fib}_W$ étant tautologiquement contenue dans b).

Notons maintenant que b) n'est autre que la variante affaiblie de a), quand on omet de spécifier que C_0, TC_0 doivent être petits. Donc le seul problème, pour $b \Longrightarrow a$, c'est de voir ceci : [page 20]

Lemme conjectural ([15]).

① *Si on a une partie close à gauche* Φ *de* $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$*, telle que* $\Phi_* \subset \mathrm{Fib}_W$ *(resp.* $\Phi_* \subset W$*), alors il existe une partie* petite $\Phi_0 \subset \Phi$*, telle que* $\Phi_{0*} \subset \mathrm{Fib}_W$ *(resp.* $\Phi_0 \subset W$*).*

② *Si* C*,* C' *sont deux parties closes à gauche de* $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$*, si* C *et* C' *sont accessibles, il en est de même de* $C \cap C'$*.*

Je crois que c'est bel et bien vrai sous les hypothèses faites sur $\mathcal{M}$, W – qui doivent impliquer que dans un sens convenable, W est une partie accessible de l'ensemble $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ des flèches de la catégorie accessible $\mathcal{M}$. Il doit en résulter qu'une partie de $\mathcal{M}$ construite explicitement en termes de W, telle Fib_W, est elle-même accessible, et le lemme doit sortir de là. p. 12

Ainsi, 2° est prouvé, modulo ce lemme d'accessibilité, qu'il me faudra prouver ± en même temps que le théorème 1 (que je n'ai fait ici qu'énoncer).

Prouvons 3°. Supposons d'abord qu'il existe un quadruplet "clos" (C, TC, F, TF), s'insérant dans un "pré-quintuplet de Quillen clos" qui soit une Q-catégorie de modèles à droite, *i.e.* [page 21]

$$TF \;=\; F \cap W \;=\; F \cap W_{\mathrm{univ}}.$$

Prouvons alors `[que]`

$$\underbrace{(W^{\mathrm{univ}})_* \cap W_{\mathrm{univ}}}_{A_W} \qquad \text{est clos à droite.} \qquad (*)$$

En effet, on a

$$TC \;\subset\; W^{\mathrm{univ}},$$

13. C'est pourquoi je l'ai modifié, en renforçant a') par `[la condition de la note 10]`.
14. NB TC' sera encore clos à gauche comme intersection de deux parties closes à gauche.
15. Ce lemme a l'air un peu faux, mais ça doit pouvoir s'arranger …

d'où

$$(W^{\mathrm{univ}})_* \ \subset \ (TC)_* \ = \ F,$$

donc

$$A = (W^{\mathrm{univ}})_* \cap W_{\mathrm{univ}} \ \subset \ F \cap W_{\mathrm{univ}} \ \overset{(\text{par hyp.})}{=} \ TF,$$

or TF est clos à droite et contenu dans W_{univ}, d'où

$$\overline{A} \ \subset \ TF \ \subset \ W_{\mathrm{univ}},$$

et comme $(W^{\mathrm{univ}})_*$ est clos à droite, on a aussi

$$\overline{A} \ \subset \ (W^{\mathrm{univ}})_*,$$

d'où $\overline{A} \subset W_{\mathrm{univ}} \cap (W^{\mathrm{univ}})_* = A$, donc A est clos à droite, q.e.d.


Prouvons la réciproque, *i.e.* supposons satisfaites les conditions de 2°, *plus* la condition $(*)$ ci-dessus. On doit construire le quadruplet.

Notons d'abord, pour nous y reconnaître, que les relations b') de 2°), et les relations transposées (compte tenu que Cof_W et W^{univ} sont clos à gauche, par 1°), savoir [page 22]

$$\left\{ \begin{array}{llllll} (\mathrm{Cof}_W)_* & \subset & W_{\mathrm{univ}} & , & (W^{\mathrm{univ}})_* & \subset & \mathrm{Fib}_W \\ (W_{\mathrm{univ}})^* & \subset & \mathrm{Cof}_W & , & (\mathrm{Fib}_W)^* & \subset & W^{\mathrm{univ}}, \end{array} \right.$$


donnant ([16]) les deux diagrammes carrés d'inclusions

p. 13



([17]) (I)


et



(II)


dont le premier est transposé (par $\Phi \longmapsto \Phi^*$) du second, et où les 8 ensembles de flèches envisagés, à l'exception de Fib_W et W_{univ} (reliés par α dans le carré II) sont clos (les quatre ensembles de I clos à gauche, et les deux ensembles de II non intéressés par α, clos à droite).

Les "pré-quintuplets de Quillen clos", associés à W, correspondent au choix de parties closes à gauche TC et C, s'insérant dans le diagramme (I) comme montré dans I′ ci-dessous, et donnent lieu par transposition à F et TF comme dans II′ ci-dessous, [page 23]



(I′)

16. compte tenu de $W^{\mathrm{univ}} \subset \mathrm{Cof}_W$, $W_{\mathrm{univ}} \subset \mathrm{Fib}_W$ et des inclusions transposées.
17. **NB** On a ces carrés d'inclusions, chaque fois qu'on a un système de Quillen (W, C, F, TC, TF) *clos.*



(II′)

le "hic" étant donc de choisir TC et C assez grandes pour qu'on ait

$$\underbrace{(TC)_*}_{=F} \subset \mathrm{Fib}_W, \qquad \underbrace{C_*}_{=TF} \subset W_{\mathrm{univ}} \quad -$$

et les inclusions stipulées dans 2°, b') assurent qu'on peut bel et bien trouver TC et C, quitte à les prendre les plus grandes possibles, $TC = W^{\mathrm{univ}}$, $C = \mathrm{Cof}_W$ – auquel cas, d'ailleurs, on aura p. 14 [page 24]

$$TC \;=\; C \cap W^{\mathrm{univ}},$$

i.e. on a une pré-Q-catégorie de modèles à gauche. Mais il s'agit d'assurer maintenant, par contre, que

$$TF \;=\; F \cap W_{\mathrm{univ}},$$

ce qui implique, on vient de le voir, (en notant $(W^{\mathrm{univ}})_* \subset F$) que

$$\overline{(W^{\mathrm{univ}})_* \cap W_{\mathrm{univ}}} \;\subset\; \overline{F \cap W_{\mathrm{univ}}} = \overline{TF} = TF \subset W_{\mathrm{univ}}. \qquad (*)$$

Inversement, si $(*)$ est satisfait, prenons

$$F = (W^{\mathrm{univ}})_*$$

le plus petit possible, *i.e.* $C = W^{\mathrm{univ}}$ [plutôt $TC = W^{\mathrm{univ}}$] le plus grand possible. On doit donc prendre

$$TF \;=\; F \cap W_{\mathrm{univ}} \;=\; (W^{\mathrm{univ}})_* \cap W_{\mathrm{univ}},$$

et cet ensemble est bien clos à droite par hypothèse.

Corollaire. *Supposons la condition* b′) *du théorème-scholie satisfaite. Les conditions suivantes* a), b) *sur W sont équivalentes (et impliquent la condition de* 3° *du théorème-scholie).*

ⓐ $(W^{\mathrm{univ}})_* \cap \overline{W_{\mathrm{univ}}} = (\mathrm{Cof}_W)_*$.

ⓑ $\widetilde{W^{\mathrm{univ}} \cup (W_{\mathrm{univ}})}^{\,*} = \mathrm{Cof}_W$, i.e. Cof_W *est la partie close à gauche engendrée par* W^{univ} *et* $(W_{\mathrm{univ}})^*$, [page 25]

et ces conditions impliquent

ⓒ *qu'il existe une structure de* triple clos de Quillen (W, C, F) *incluant W (donc avec $TC = W \cap C$, $TF = W \cap F$) (lequel sera clos au sens de Quillen si et seulement si W* [est] *stable par facteurs directs – car C et F sont déjà stables spontanément).*

Il suffit en effet de prendre alors

$$TC \;=\; W^{\mathrm{univ}}, \qquad C \;=\; \mathrm{Cof}_W.$$

Mais je doute que l'existence d'un triple clos de Quillen (W, C, F) suffise à impliquer les conditions *a*), *b*) ci-dessus, ni même la condition plus faible

$$(W^{\mathrm{univ}})_* \cap W_{\mathrm{univ}} \;=\; (\mathrm{Cof}_W)_*$$

qui signifie *exactement* que $C = \mathrm{Cof}_W$, $TC = W^{\mathrm{univ}}$, et leurs transposés $TF = (\mathrm{Cof}_W)_*$, $F = (W^{\mathrm{univ}})_*$ forment une catégorie de Quillen close. p. 15 [page 26]

Conditions sur $(\mathcal{M}, W)$ avec

a) $\mathcal{M}$ stable par $\varprojlim$ finies et $\varinjlim$ (petites),
b) W stable par $\varinjlim$ filtrantes,
c) $\mathcal{M}$ accessible.

$$\text{I}\begin{cases}\text{ⓐ} & \text{existence d'un système de Quillen faible } (W,C,TC,F,TF) \text{ (clos si on y tient)}\\ \Updownarrow & \\ \text{ⓑ} & \text{existence d'un système de Quillen faible exact à gauche } (TC = C\cap W).\\ \Updownarrow & \\ \text{ⓒ} & \underbrace{(\mathrm{Cof}_W)_*\subset W,\ (W^{\mathrm{univ}})_*\subset \mathrm{Fib}_W}_{(*)} \quad (\Longleftrightarrow \quad (\mathrm{Cof}_W)_* \quad\subset\quad W_{\mathrm{univ}},\\ & (W^{\mathrm{univ}})_*\subset \mathrm{Fib}_W).\end{cases}$$

$\Uparrow$

$$\text{II}\begin{cases}\text{ⓐ} & \text{existence d'un système de Quillen faible exact à droite } (TF = F\cap W)\\ \Updownarrow & \\ \text{ⓓ} & \text{On a } (*), \text{ et de plus } (W^{\mathrm{univ}})_*\cap W_{\mathrm{univ}} \text{ clos à droite.}\\ \Updownarrow & \\ \text{ⓑ} & \text{existence d'un système de Quillen clos (closed model category), } TC = C\cap W,\ TF = F\cap W,\ F = (TC)_*,\ TF = C_*,\ TC = F^*,\ C = (TF)^*.\\ \Updownarrow & \\ \text{ⓒ} & \text{Posant } TC = W^{\mathrm{univ}},\ F = (TC)_*,\ TF = F\cap W_{\mathrm{univ}},\ C = (TF)_*, \text{ on trouve avec } W \text{ un système de Quillen clos.}\end{cases}$$

$\Uparrow$

$$\text{III}\begin{cases} C = \mathrm{Cof}_W \text{ et } TC = W^{\mathrm{univ}} \text{ font partie (avec } W) \text{ d'un système de Quillen clos (donc } F = (W^{\mathrm{univ}})_*,\ TF = (\mathrm{Cof}_W)_*,\ W = TF\circ TC).\\ \Updownarrow \\ \texttt{[On a]}\ (*), \text{ et de plus } (W^{\mathrm{univ}})_*\cap W_{\mathrm{univ}} = (\mathrm{Cof}_W)_*.\end{cases}$$

$\Uparrow$

$$\text{IV}\begin{cases} \text{On a } (*) \text{ et } \mathrm{Cof}_W = \widetilde{(W_{\mathrm{univ}})^*\cup W^{\mathrm{univ}}}\ .\\ \Updownarrow \\ \text{On a } (*) \text{ et } (W^{\mathrm{univ}})_*\cap \overline{W_{\mathrm{univ}}} = (\mathrm{Cof}_W)_*.\end{cases}$$

Cas $\mathcal{M} = \mathrm{Cat}$, $W = \mathbf{W}_\infty$. On sait que II est satisfait, par Thomason. Donc on a p. 16

$$(\mathrm{Cof}_W)_*\subset W_{\mathrm{univ}}, \qquad (W^{\mathrm{univ}})_*\subset \mathrm{Fib}_W, \qquad (W^{\mathrm{univ}})_*\cap W_{\mathrm{univ}} \text{ clos à droite.}$$

J'ai pu prouver directement les deux premières inclusions (*i.e.* I), mais pas que $(W^{\mathrm{univ}})_*\cap W_{\mathrm{univ}}$ soit clos à droite. (Je devrais au moins essayer !) ([18]). On n'a pas IV, *i.e.* on a

$$(W^{\mathrm{univ}})_*\cap \overline{W_{\mathrm{univ}}} \ \neq\ (\mathrm{Cof}_W)_*$$

18. Il suffirait de savoir que $\overline{W_{\mathrm{univ}}}\cap \mathrm{Fib}_W = W_{\mathrm{univ}}$, ce qui impliquerait que III et IV sont équivalents ([19]).
19. Mais c'est faux, p. ex. si X `[est une]` catégorie discrète non vide, $X\longrightarrow e$ est dans $\overline{W_{\mathrm{univ}}}\cap \mathrm{Fib}_W$.

car

$$(W^{\mathrm{univ}})_* \cap \overline{W_{\mathrm{univ}}} \not\subset W_{\mathrm{univ}}$$

(contient les $X \longrightarrow e$ avec X discrète), donc on a

$$(W^{\mathrm{univ}})_* \cap \overline{W_{\mathrm{univ}}} \supsetneq \underbrace{(W^{\mathrm{univ}})_* \cap W_{\mathrm{univ}}}_{\text{n'est } \textit{pas} \text{ l'orthogonal de } W^{\mathrm{univ}} \cup (W_{\mathrm{univ}})^*} .$$

[page 27]

3 Catégorie de Quillen (deuxième mouture)

On se donne toujours un couple

$$(\mathcal{M}, W), \qquad W \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M}), \qquad W \text{ faiblement saturé},$$

$\mathcal{M}$ satisfait M 0 (stabilité par $\varprojlim$ finies et $\varinjlim$ finies).
Définition 1 : Une *structure de Quillen faible* associée à la catégorie de modèles $(\mathcal{M}, W)$ est la donnée de quatre parties (C, TC, F, TF) de $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$, satisfaisant les conditions suivantes.

- **M 1** $C \longleftrightarrow TF$, $TC \longleftrightarrow F$ (*i.e.* $TF \subset C_*$, $F \subset (TC)_*$).
- **M 2** Propriété de factorisation de Quillen pour (C, TF) et (TC, F).
- **M 3** Stabilité de C par composition et par cochangement de base, de F par composition et changement de base – C et F contiennent les isomorphismes.
- **M 4** Stabilité similaire pour TC et TF.
- **M′** $TC \subset C \cap W$, $TF \subset F \cap W$.
- **M″** $C \subset \mathrm{Cof}_W$, $F \subset \mathrm{Fib}_W$.

On dit que la structure de Quillen est *exacte* si elle satisfait à l'axiome supplémentaire
M 2 bis $W = TF \circ TC$. p. 17
On dit qu'elle est *exacte à gauche* si elle satisfait l'axiome supplémentaire
M′$_0$ (g) $TC = C \cap W$ (au lieu de $TC \subset C \cap W$ seulement),
exacte à droite si elle satisfait
M′$_0$ (d) $TF = F \cap W$ (au lieu de $TF \subset F \cap W$ seulement) ([20]).
Remarque. [page 28]

a) Une structure de Quillen exacte à gauche ou exacte à droite est exacte.

b) Si on a une donnée (C, TC, F, TF) satisfaisant M 1, M 2, M′, M″, quand on sature C, TC à gauche et F, TF à droite, pour les stabilités précisées dans M 2, M 3, on trouve une structure de Quillen. (Tous les axiomes sont évidents, sauf M′, pour lequel je renvoie à p. 9, 10, notamment prop. 4.) Si on avait M 2 bis, cela sera encore vérifié (a fortiori) après saturation, *i.e.* on a une structure de Quillen exacte.

Définition 1 bis. La structure de Quillen faible est dite *structure de Quillen* (tout court) si elle est exacte à gauche et à droite, ou (comme on dit) "biexacte", alors (C, F) determine déjà (C, TC, F, TF). (Ça correspond exactement aux "model categories" de Quillen [propres].) On dit que la structure de Quillen faible est *close* si on a

$$C \leftarrow + \rightarrow TF , \qquad TC \leftarrow + \rightarrow F ,$$

20. **NB** Si C, F, W [sont] stables par facteurs directs (donc aussi $C \cap W$ et $F \cap W$), alors l'exactitude à gauche $TC = C \cap W$ *équivaut* à l'exactitude à droite $TF = F \cap W$, et implique que C, TC, F, TF sont *clos* (à gauche pour C, TC, à droite pour F, TF).

i.e. $TF = C_*$, $C = (TF)^*$ et $F = (TC)_*$, $TC = F^*$ ([21]). Une structure de Quillen faible à la fois biexacte (*i.e.* pas faible du tout !) et close est appelée structure de Quillen *parfaite*. (Ça correspond exactement à la "closed model category" [propre] de QUILLEN.)

[page 29]

Remarque. Pour qu'une structure de Quillen faible soit parfaite, il suffit qu'elle soit biexacte et qu'on ait

$$C = (TF)^*, \qquad F = (TC)_*$$

(ce qui implique déjà que $TC = F^*$, $TF = C_*$, *i.e.* que TC est clos à gauche et TF clos à droite). C'est prouvé dans Quillen. Ça implique aussi que W est fortement saturé – c'est le pays de cocagne !

p. 18

Scholie : Le couple $TC \longleftrightarrow F$, satisfaisant à la condition de factorisation de Quillen, et satisfaisant $TC \subset W$, $F \subset \mathrm{Fib}_W$, permet déjà de développer une théorie satisfaisante des fibres W-homotopiques dans $\mathcal{M}$ – mais sans propriété d'exactitude pour les carrés W-cartésiens. Dualement, la donnée de $C \longleftrightarrow TF$, avec factorisation, et $TF \subset W$, $C \subset \mathrm{Cofib}_W$, donne une bonne théorie des cofibres W-homotopiques, mais sans propriété d'exactitude pour les carrés W-cocartésiens. La structure de Quillen faible réunit ces deux données duales l'une de l'autre, avec en plus le lien supplémentaire entre ces deux donnés, par $TC \subset C$, $TF \subset F$ (stipulé dans M'). Cette donnée assure déjà que

$$\underbrace{\mathcal{M}_{\mathrm{cf}}}_{\substack{\text{sous-catégorie pleine de } \mathcal{M} \text{ formée des objets fibrants et cofibrants à la fois}}} \qquad W_{\mathrm{cf}}^{-1} \xrightarrow{\sim} \mathcal{M}W^{-1} = \mathrm{Ho}_W$$

est une équivalence, mais non pas que le foncteur localisation

[page 30]

$$\mathcal{M}_{\mathrm{cf}} \longrightarrow \mathcal{M}_{\mathrm{cf}} W_{\mathrm{cf}}^{-1}$$

est un simple passage au quotient sur les flèches, *i.e.* que si X, Y sont dans $\mathcal{M}_{\mathrm{cf}}$, alors

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(X,Y) \longrightarrow \underbrace{\mathrm{Hom}_W(X,Y)}_{\overset{\text{déf}}{=} \mathrm{Hom}_{\mathrm{Ho}_W}(X,Y)} \qquad (*)$$

soit surjectif. Ceci est assuré par l'axiome d'exactitude M 2 bis,

$$W \;=\; TF \circ TC.$$

Avec ce seul axiome, on n'a pas de caractérisation sympathique de la relation d'équivalence dans $\mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(X,Y)$ définie par la flèche $(*)$ (pour X, Y dans $\mathcal{M}_{\mathrm{cf}}$).

Si on a exactitude à gauche,

$$TC = C \cap W \qquad (\Longleftrightarrow\; TC = C \cap W^{\mathrm{univ}}),$$

alors cette relation d'équivalence est celle engendrée par la relation de *Q-homotopie à droite* ([22], [23]) (impliquée par la Q-homotopie à gauche), et la catégorie quotient ainsi définie

$$\pi_{\mathrm{d}}\mathcal{M}_{\mathrm{cf}} \;=\; \pi\mathcal{M}_{\mathrm{cf}} \;\simeq\; \mathrm{Ho}_W,$$

s'envoie dans $\pi_{\mathrm{d}}\mathcal{M}_{\mathrm{c}}$,

$$\pi\mathcal{M}_{\mathrm{cf}} \longrightarrow \pi_{\mathrm{d}}\mathcal{M}_{\mathrm{c}},$$

et ce foncteur peut être interprété (sauf erreur)

p. 19

[page 31]

comme un *adjoint à droite* (pleinement fidèle) du foncteur de localisation

$$\pi_{\mathrm{d}}\mathcal{M}_{\mathrm{c}} \longrightarrow (\pi_{\mathrm{d}}\mathcal{M}_{\mathrm{c}})W_{\mathrm{c}}^{-1} \;\simeq\; \mathrm{Ho}_W,$$

et Ho_W se déduit de $\pi_{\mathrm{d}}\mathcal{M}_{\mathrm{c}}$ par un *calcul de fractions à gauche.* Dualement, si on a exactitude à droite, *i.e.* $TF = F \cap W$ ($\Longleftrightarrow TF = F \cap W_{\mathrm{univ}}$), alors la relation d'équivalence pertinente sur $\mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(X, Y)$, pour X, Y dans $\mathcal{M}_{\mathrm{cf}}$, est la Q-homotopie à gauche (impliquée par la Q-homotopie à droite), et cette fois la flèche naturelle de $\pi_{\mathrm{g}}\mathcal{M}_{\mathrm{cf}} = \pi\mathcal{M}_{\mathrm{cf}} \simeq \mathrm{Ho}_W$ dans $\pi_{\mathrm{d}}\mathcal{M}_{\mathrm{f}}$ `[plutôt` $\pi_{\mathtt{g}}\mathcal{M}_{\mathtt{f}}$`]`,

$$\underbrace{\pi\mathcal{M}_{\mathrm{cf}}}_{\simeq \mathrm{Ho}_W} \longrightarrow \pi_{\mathrm{d}}\mathcal{M}_{\mathrm{f}} \qquad \texttt{[plutôt } \pi_{\mathtt{g}}\mathcal{M}_{\mathtt{f}}\texttt{]}$$

est un *adjoint à gauche* (pleinement fidèle) du foncteur de localisation

$$\pi_{\mathrm{d}}\mathcal{M}_f \longrightarrow \mathcal{M}_{\mathrm{f}}W_{\mathrm{f}}^{-1} \;\simeq\; \mathrm{Ho}_W \qquad \texttt{[plutôt } \pi_{\mathtt{g}}\mathcal{M}_f \longrightarrow \mathcal{M}_{\mathtt{f}}W_{\mathtt{f}}^{-1} \;\simeq\; \mathrm{Ho}_W\texttt{]},$$

et la localisée s'explicite par un calcul de fractions à droite.

Dans le cas biexacte (*i.e.* celui des véritables structures de Quillen), les deux relations de Q-homotopie dans $\mathcal{M}_{\mathrm{cf}}$ (plus généralement dans $\mathrm{Hom}(X, Y)$, si X dans $\mathcal{M}_{\mathrm{c}}$ et Y dans $\mathcal{M}_{\mathrm{f}}$) coïncident, et deviennent même particulièrement simples. (Car si $f, g : X \rightrightarrows Y$, avec [page 32]
X cofibrant et Y fibrant, alors $f \sim g$ peut se tester sur *n'importe quel* "objet cylindre" pour X, ou sur *n'importe quel* "objet chemins" pour Y.)

Dans le cas où la structure de Quillen faible est exacte à gauche, *i.e.* où la relation d'équivalence pertinente dans $\mathrm{Fl}\,\mathcal{M}_{\mathrm{cf}}$ est la Q-homotopie à droite, alors l'axiome d'exactitude est vérifié pour les carrés W-cartésiens, mais je doute qu'il en soit de même pour les carrés W-cocartésiens ([24]). (Si on ne fait une hypothèse supplémentaire, p. ex. l'exactitude à droite de la structure de Quillen.) Si on n'a que l'exactitude (mais ni à gauche ni à droite), il semble qu'on ne peut en conclure l'exactitude ni des carrés W-cartésiens, ni des carrés W-cocartésiens, donc pas celle des suites de cosuspension (loop sequences), ni des suites de suspension. On pourrait donc penser que la condition d'exactitude, à elle seule, ne sert pas à grand chose pour le formalisme homotopique [page 33]
dans les catégories de fractions Ho_W etc. Mais on a pourtant ceci : soit $\Psi = \begin{array}{ccc} & & 1 \\ & \nearrow & \\ 0 & & \\ & \searrow & \\ & & 2 \end{array}$,
et supposons que $(\mathcal{M}, W)$ *et* $(\mathcal{M}(\Psi), W(\Psi))$ `[où pour toute petite catégorie` I`,` $\mathcal{M}(I)$ `désigne la catégorie des préfaisceaux sur` I `à valeurs dans` $\mathcal{M}$`, et` $W(I)$ `est la partie de` $\mathtt{Fl}(\mathcal{M}(I))$ `formée des morphismes de préfaisceaux qui` p. 20
`sont dans` W `"argument par argument"]` admettent une structure de Quillen faible exacte. Alors dans $\mathcal{M}$ les carrés W-cartésiens sont W-exactes, donc on a dans $\mathcal{M}$ des suites exactes longues de cosuspension (exact loop sequences) ([25]). (L'hypothèse sur $(\mathcal{M}(\Psi), W(\Psi))$ sert uniquement à assurer que toute flèche de $\mathrm{Ho}_{W(\Psi)} = \mathcal{M}(\Psi)W(\Psi)^{-1}$

21. Cela signifie aussi que C, TF, TC, F sont stables par facteurs directs. On dit que la structure de Quillen faible est *close à gauche* (resp. *à droite*) si C, TC (resp. F, TF) sont clos à gauche (resp. à droite).

22. Il semblerait que la relation de Q-homotopie à droite est une relation d'équivalence, dès que Y `[est]` dans $\mathcal{M}_{\mathrm{f}}$ et sans supposer la structure de Quillen faible exacte à droite ou à gauche.

23. **NB** D'après Baues, il semblerait que sur $\mathcal{M}_{\mathrm{cf}}$, cette relation d'homotopie à droite équivaut à la relation d'homotopie à gauche, et que celle-ci ne dépend pas du cylindre choisi …

24. Il semble pourtant que c'est le cas, d'après Baues, cf. annotation marginale correspondante page 30.

25. il semble que je me suis canulé ici, et je doute que le résultat évoqué soit exact.

est isomorphe à une flèche provenant d'une flèche de $\mathcal{M}(\Psi)$ lui-même. Mais c'est là une propriété apparemment très délicate, et je ne connais d'autre façon de l'obtenir que via l'existence d'une structure de Quillen faible exacte.) Dualement, si $(\mathcal{M}, W)$ et $(\mathcal{M}(\Phi), W(\Phi))$ admettent des structures de Quillen faibles exactes, alors les carrés W-cocartésiens dans $\mathcal{M}$ sont W-exacts, et on trouve (si $\mathcal{M}$ est ponctué) des suites exactes longues de suspension.

[page 34]

Ceci montre que si, pour une catégorie de modèles $(\mathcal{M}, W)$ donnée, on s'intéresse à "faire de l'algèbre homotopique" pour tous les couples $(\mathcal{M}(I), W(I))$ à la fois, avec I dans Cat, il suffit (si on veut avoir une bonne théorie des fibres et cofibres W-homotopiques dans ces catégories, y inclus la propriété de W-exactitude pour les carrés W-cartésiens et pour les carrés W-cocartésiens) de disposer pour chaque $(\mathcal{M}(I), W(I))$ d'une structure de Quillen faible exacte sans plus.

Ceci nous montre donc l'intérêt de développer des critères, pour une $(\mathcal{M}, W)$, assurant qu'il en est bien ainsi. À ce sujet, je note que je ne sais comment vérifier l'exactitude d'une structure de Quillen *que si* je dispose de l'exactitude à gauche, ou à droite. C'est dire que je dois dégager en fait des conditions sur $(\mathcal{M}, W)$ qui assurent (disons) que les $(\mathcal{M}(I), W(I))$ admettent des structures de Quillen faibles exactes à gauche.

[page 35]

Les structures de Quillen faibles pour les $(\mathcal{M}(I), W(I))$ seront déduites d'une structure de Quillen faible pour $(\mathcal{M}, W)$, de la façon suivante : elles seront toutes *"closes à droite", i.e.*

$$F(I) \;=\; (TC(I))_*, \qquad TF(I) \;=\; (C(I))_*, \tag{1}$$

en particulier (pour $I = e$)

$$F \;=\; (TC)_*, \qquad TF \;=\; C_*,$$

ce qui implique déjà (puisque $C \subset \mathrm{Cof}_W$, $TC \subset W^{\mathrm{univ}}$)

$$(\mathrm{Cof}_W)_* \;\subset\; W, \qquad (W^{\mathrm{univ}})_* \;\subset\; \mathrm{Fib}_W \tag{2}$$

(d'où $(\mathrm{Cof}_W)_* \subset W_{\mathrm{univ}}$). En vertu de (1), pour définir les structures de Quillen faibles pour les $(\mathcal{M}(I), W(I))$, il suffit de définir $C(I)$, $TC(I)$, et même, comme on veut l'exactitude à gauche, *i.e.*

$$TC(I) \;=\; C(I) \cap W(I) \tag{3}$$

(en particulier

$$TC \;=\; C \cap W \quad), \tag{4}$$

p. 21

il reste à définir C. On définira $C(I)$ "argument par argument", *i.e.* pour $f \in \mathrm{Fl}(\mathcal{M}(I))$

$$f \in C(I) \qquad \Longleftrightarrow \qquad \alpha_s^*(f) \in C \;\text{ pour tout } s \in \mathrm{Ob}\, I, \tag{5}$$

où

$$\alpha_s : e \longrightarrow I \qquad \texttt{[est]} \text{ défini par } \alpha_s(e) = s.$$

Il en résulte d'ailleurs aussitôt, par (3),

$$f \in TC(I) \qquad \Longleftrightarrow \qquad \alpha_s^*(f) \in TC \;\text{ pour tout } s \in \mathrm{Ob}\, I. \tag{6}$$

On suppose donc que $(\mathcal{M}, W)$ admet une structure de Quillen faible exacte à gauche et close à droite (C, TC, F, TF), définie en termes de

$$C \;\subset\; \mathrm{Fl}(\mathcal{M}),$$

[page 36]

par

$$TC \;=\; C \cap W, \qquad F \;=\; (TC)_*, \qquad TF = C_*.$$

Pour que cela donne bel et bien une structure de Quillen faible (forcément exacte à gauche et close à droite), il faut simplement vérifier les conditions suivantes.

ⓘ Factorisation pour $(C, TF = C_*)$ et $(TC = C \cap W, F = (TC)_*)$ – on reviendra sur ce point.

ⓘⓘ Stabilité de C par composition et cochangement de base, et C contient les isomorphismes (d'où résultera la stabilité similaire de $TC = C \cap W$, compte tenu que $C \subset \mathrm{Cof}_W$) (NB Les stabilités idoines pour F, TF sont triviales par définition $F = (TC)_*$, $TF = C_*$.)

ⓘⓘⓘ $C \subset \mathrm{Cof}_W$, $\underbrace{C_*}_{=TF} \subset W$, $(C \cap W)_* \subset \mathrm{Fib}_W$.

Pour vérifier, de même, que $(C(I), TC(I), F(I), TF(I))$ soit une structure de Quillen faible pour $W(I)$, il faut vérifier les conditions similaires à ⓘⓘⓘ . Or (*ii*) pour $C(I)$ résulte aussitôt de la condition (*ii*) pour C. Il reste à examiner (*iii*) et (*i*).

Les inclusions de (*iii*). p. 22

L'inclusion [page 37]

$$C \ \subset \ \mathrm{Cof}_W$$

implique que toute $f \in C(I)$ est dans Cof_W argument par argument. Cela implique que f est dans $\mathrm{Cof}_{W(I)}$, comme on voit aussitôt sur la définition – je l'explicite en le

Lemme 1 : *Soit $f : X_\bullet \longrightarrow Y_\bullet$ une flèche de $\mathcal{M}(I)$. Pour que f soit dans* $\mathrm{Cof}_{W(I)}$ (resp. *dans* $\mathrm{Fib}_{W(I)}$), *il* suffit *que pour tout s dans* $\mathrm{Ob}\, I$, $\alpha_s^*(f)$ *soit dans* Cof_W (resp. *dans* Fib_W). *Itou (pour mémoire) pour une condition pour que $f \in W(I)$ – là il faut et il suffit que $\alpha_s^*(f) \in W \ \forall\, s \in \mathrm{Ob}\, I$.*

Nous allons appliquer ce même lemme pour établir les inclusions

$$C(I)_* \ \subset \ W(I), \qquad (C(I) \cap W(I))_* \ \subset \ \mathrm{Fib}_{W(I)}.$$

Donc il suffit de voir que

$$\begin{aligned} \alpha_s^*(C(I)_*) \ &\subset \ C_* && (\subset \ W) \\ \alpha_s^*((\underbrace{C(I) \cap W(I)}_{(C \cap W)(I)})_*) \ &\subset \ (C \cap W)_* && (\subset \ \mathrm{Fib}_W), \end{aligned}$$

et plus généralement

$$\alpha_s^*(\Phi(I)_*) \ \subset \ \Phi_* \tag{7}$$

pour toute (?) partie Φ de $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$, définissant donc $\Phi(I) \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M}(I))$ terme à terme.

En explicitant la chose, on trouve la condition [page 38]

$$\alpha_{s\,!}(\Phi) \subset \Phi(I) \qquad \text{pour tout } s \in \mathrm{Ob}\, I,$$

pour que ça marche, *i.e.* on veut que

$$i \in \Phi \qquad \Longrightarrow \qquad \alpha_{s\,!}(i) \in \Phi(I), \quad \textit{i.e.} \ \ \alpha_t^*(\alpha_{s\,!}(i)) \in \Phi \ \ \forall\, t \in \mathrm{Ob}\, I.$$

Or le foncteur $\alpha_t^* \alpha_{s\,!}$ s'explicite comme

$$A \longmapsto \underbrace{\mathrm{Hom}_I(t,s) \times A}_{\substack{\text{somme de } \mathrm{Hom}_I(t,s) \\ \text{copies de } A \text{ dans } \mathcal{M}}},$$

donc il faut supposer Φ *stable par sommes directes* (du type envisagé $\mathrm{Hom}_I(t,s) \times A$). C'est bien le cas pour $\Phi = C$ et $\Phi = C \cap W$ et pour des sommes directes *finies,* grâce à (*ii*). On trouve donc le

Lemme 2. p. 23

a) *Soit I dans* Cat *telle que les sommes directes de type* $\mathrm{Hom}_I(t,s)$ *existent dans* $\mathcal{M}$. *(P. ex. on suppose que I est* finie, *plus généralement que les* $\mathrm{Hom}_I(t,s)$ *sont des ensembles finis ; ou que les "petites" sommes directes existent dans* $\mathcal{M}$.*) Soit* Φ *une partie de* $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$, *stable par ce type de sommes directes, et soit* $\Phi(I) \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M}(I))$ *la partie correspondante. Alors pour tout* $s \in \mathrm{Ob}\, I$, *on a*

[page 39]

$$\alpha_s^*(\Phi(I)_*) \ \subset \ \Phi_*.$$

b) *Supposons que les* $\mathrm{Hom}_I(t,s)$ *soient finis (p. ex. I finie). Alors l'hypothèse de* a) *s'applique pour* $\Phi = C$ *et pour* $\Phi = C \cap W$, *donc la condition* (iii) *p.* 36 *est satisfaite pour la structure* $(W(I), C(I), TC(I), F(I), TF(I))$ *dans* $\mathcal{M}(I)$. *Même conclusion sans hypothèse de finitude sur les* $\mathrm{Hom}_I(t,s)$, *quand on suppose* $\mathcal{M}$ *stable par "petites" sommes directes, et C et W stables également par de telles sommes directes.*

NB Vu le scholie plus haut, il est parfaitement raisonnable de se borner au besoin aux catégories I *finies* – vu que la catégorie de ces I est stable par les produits $I \longmapsto I \times \Psi$, $I \longmapsto I \times \Phi$.

Il reste, pour être heureux, à vérifier la condition de factorisation ⓘ pour (C, TF), (TC, F), mais aussi et surtout pour les $(C(I), TF(I), TC(I), F(I))$. C'est dire que de partir même d'une structure de Quillen close (pays de cocagne) ne nous avance guère [page 40] à lui tout seul, faute de savoir que l'axiome de factorisation se conserve, en passant de $(\mathcal{M}, W, \ldots)$ à $(\mathcal{M}(I), W(I), \ldots)$.

C'est ici que le théorème de factorisation du no. 1 doit s'avérer providentiel. Mais pour pouvoir l'appliquer aux couples $(C(I), C(I)_*)$, $(TC(I), TC(I)_*)$, il faut (en plus de l'accessibilité de $\mathcal{M}$, ce qui est une condition fort anodine) des conditions de stabilité très fortes pour $C(I)$, $TC(I)$ ([26]). À vrai dire, il reste la stabilité de C et de $C \cap W$ par limites inductives ordinales (ce qui impliquera la même stabilité pour les $C(I)$, $(C \cap W)(I) = C(I) \cap W(I)$).

À dire vrai, je vois peu de chances de trouver une structure de Quillen faible (C, TC, F, TF) associé à W, et satisfaisant toutes les conditions dites, y compris celle de stabilité de C et de $C \cap W$ par $\varinjlim$ ordinales, sans supposer que W elle-même ne soit déjà stable par (petites) limites inductives filtrantes.

On peut songer à utiliser une factorisation *fonctorielle* des flèches dans $\mathcal{M}$ en [page 41]

$$\begin{aligned} f = pi \quad \text{avec} \quad & i \in TC, \quad p \in F \\ \text{ou} \quad & i \in C, \quad p \in TF, \end{aligned}$$

pour déduire une factorisation similaire pour les flèches f de $\mathcal{M}(I)$, en p. 24

$$\begin{aligned} f = pi \quad \text{avec} \quad & i \in TC(I), \quad p \in F(I) \\ \text{ou} \quad & i \in C(I), \quad p \in TF(I), \end{aligned}$$

où $C(I), TC(I), F(I), TF(I)$ sont ici définis via C, TC, F, TF "argument par argument". Mais l'ennui, c'est que en procédant de cette façon naïve, on n'aura plus nécessairement $C(I) \longleftrightarrow TF(I)$, $TC(I) \longleftrightarrow F(I)$. Il faut considérablement rapetisser $TF(I)$ et $F(I)$, pour avoir une propriété RLP par rapport à $C(I)$ resp. $TC(I)$.

Donc je ne vois guère d'autre moyen de s'en tirer, dans ce contexte général, qu'en supposant la stabilité de W par $\varinjlim$ filtrantes (ce qui n'est après tout pas très méchant). [page 42]

26. Plus les *petits* systèmes de générateurs pour C, TC.

Bon gré, mal gré, on revient à la situation envisagée dans le paragraphe 2. On va réénoncer l'essentiel de ce qui a été pressenti alors :

Théorème 2 (encore un peu conjectural). *Soit $(\mathcal{M}, W)$ une catégorie de modèles, avec W (comme toujours) faiblement saturée, mais de plus on suppose $\mathcal{M}$ stable par petites $\varinjlim$ et par $\varprojlim$ finies, et W stable par $\varinjlim$ filtrantes, enfin $\mathcal{M}$ accessible. Considérons les conditions suivantes :*

a) *Il existe une structure de Quillen faible pour W, exacte à gauche, close à droite, (C, TC, F, TF).*

a′) *Comme* a), *mais avec de plus C, TC clos à gauche (*i.e. *on a une structure de Quillen faible close), et C, TC de la forme $\widetilde{C_0}$, $\widetilde{TC_0}$, où C_0 et TC_0 sont petits.*

a″) *Il existe $C_0 \subset \mathrm{Cof}_W$, $TC_0 \subset W^{\mathrm{univ}}$, parties petites, telles que $C_{0*} \subset W$, $(TC_0)_* \subset \mathrm{Fib}_W$.*

b) *On a*

$$(\mathrm{Cof}_W)_* \subset W_{\mathrm{univ}}, \qquad (W^{\mathrm{univ}})_* \subset \mathrm{Fib}_W$$

(d'où résulte, Cof_W et W^{univ} étant clos à gauche, que

$$(W_{\mathrm{univ}})^* \subset \mathrm{Cof}_W, \qquad (\mathrm{Fib}_W)^* \subset W^{\mathrm{univ}} \qquad).$$

[page 43]

Ces conditions impliquent que pour toute I dans Cat*, il existe une structure de Quillen faible exacte à gauche et close pour $W(I)$ dans $\mathcal{M}(I)$. Une telle structure se définit, en termes d'une structure similaire C, $TC = C \cap W$, $F = (TC)_*$, $TF = C_*$ pour W, par*

$$C(I) = \Big\{ f \in \mathrm{Fl}(\mathcal{M}(I)) \;\Big|\; \alpha_s^*(f) \in C \;\; \forall\, s \in \mathrm{Ob}I \Big\},$$

puis

p. 25

$$\begin{aligned} TC(I) &= C(I) \cap W(I) = \Big\{ f \in \mathrm{Fl}(\mathcal{M}(I)) \;\Big|\; \alpha_s^*(f) \in TC \;\; \forall\, s \in \mathrm{Ob}I \Big\} \\ F(I) &= (TC(I))_* \\ TF(I) &= C(I)_* \,. \end{aligned}$$

Corollaire-Scholie. *Ces conditions impliquent que pour tout I dans* Cat*, $(\mathcal{M}(I), W(I))$ donne lieu à une bonne théorie des fibres et cofibres $W(I)$-homotopiques, avec carrés $W(I)$-cartésiens $W(I)$-exacts, et carrés $W(I)$-cocartésiens $W(I)$-exacts – donc avec des suites* exactes *longues de cosuspension et de suspension, dans le cas où $\mathcal{M}$, donc aussi $\mathcal{M}(I)$, est une catégorie avec objet neutre.*

[page 44]

Je m'occuperai de la démonstration du théorème précédent, ainsi que du théorème de factorisation du paragraphe 1, quand j'aurai mes notes sur les catégories et foncteurs accessibles et filtrations cardinales. En attendant, j'ai envie déjà d'expliciter un peu plus le formalisme auquel on parvient moyennant les hypothèses faites ci-dessus. (Je suis à peu près sûr tout au moins que la condition a'') suffit à impliquer toutes les autres. Et c'est bien sous la forme a'') que ces conditions vont se vérifier en pratique, je présume, notamment dans le cas où $\mathcal{M} = \mathrm{Cat}$.)

4 Les variances u^*, u_*, $u_!$ pour $(\mathcal{M}(I), W(I))$ (I variable)

Je suppose les conditions du paragraphe précédent vérifiées pour $(\mathcal{M}, W)$ (cf. théorème p. 42), et choisis une structure de Quillen faible close et exacte à gauche (C, TC, F, TF) pour W, d'où pour tout I dans Cat [page 45]

une structure de Quillen faible close et exacte à gauche $(C(I), TC(I), F(I), TF(I))$ pour $W(I)$, dans $\mathcal{M}(I)$, décrite page 43. Soit maintenant

$$u \ : \ I' \longrightarrow I$$

une flèche dans Cat, d'où une flèche

$$u^* \ : \ (\mathcal{M}(I), W(I)) \ \longrightarrow \ (\mathcal{M}(I'), W(I')).$$

On sait, vu que $\mathcal{M}$ est stable par $\varinjlim$ quelconques et aussi (étant de plus accessible) par $\varprojlim$ quelconques, que u^* admet des foncteurs adjoints à gauche et à droite,

$$u_!, \ u_* \ : \ \mathcal{M}(I') \ \longrightarrow \ \mathcal{M}(I),$$

et je me propose ici de résumer les propriétés les plus immédiates de u^* et de $u_!$, u_* par rapport aux structures de Quillen faibles envisagées. p. 26

Proposition 1 : *Avec les notations précédentes, on a les relations :*

$$u^*(C(I)) \subset C(I'), \qquad u^*(TC(I)) \subset TC(I'). \tag{1}$$

$$u_*(F(I')) \subset F(I), \qquad u_*(TF(I')) \subset TF(I). \tag{2}$$

$$\begin{aligned} u^*(F(I)) \subset F(I') &\iff u_!(TC(I')) \subset TC(I) \\ u^*(TF(I)) \subset TF(I') &\iff u_!(C(I')) \subset C(I). \end{aligned} \tag{3}$$

D'autre part, je ne sais rien dire de positif pour les inclusions

$$\begin{aligned} u_*(C(I')) \ \subset \ C(I), \ \ u_*(TC(I')) \ \subset \ TC(I) \\ u_!(F(I')) \ \subset \ F(I), \ \ u_!(TF(I')) \ \subset \ TF(I). \end{aligned}$$

Si ce n'est que pour un u tant soit peu général (u pas un isomorphisme, disons), u_* n'a aucune envie

[page 46]

d'être compatible avec les structures C, TC (propriété d'exactitude homotopique à droite, moralement, vu que u_* est exact à gauche et en général pas du tout à droite), ni $u_!$ avec les structures F, TF (commentaire dual à donner, $u_!$ est exacte à *droite*, et n'a pas envie d'être "homotopiquement exact à gauche").

Démonstration de (1), (2), (3). Les relations (1) sont évidentes par définition. Les relations (2), (3) le sont à peine moins, vu la propriété soritale générale suivante, dont la place serait au paragraphe 1 :

Proposition 2. *Soit*

$$C' \underset{u^*}{\overset{u_!}{\rightleftarrows}} C$$

un couple de foncteurs adjoints $(u_!, u^*)$*, et soit* $\Phi' \subset \mathrm{Fl}(C')$, $\Psi \subset \mathrm{Fl}(C)$*. Alors*

$$(u_!(\Phi') \longleftrightarrow \Psi) \qquad \Longleftrightarrow \qquad (\Phi' \longleftrightarrow u^*(\Psi)).$$

Corollaire. (C'est le même énoncé, avec seulement des notations changées.) *Supposons que* $u^* : C \longrightarrow C'$ *admette un adjoint à* droite u_* *(pas forcément un adjoint à gauche)*

$$C' \underset{u_*}{\overset{u^*}{\rightleftarrows}} C,$$

p. 27

soit $\Phi \subset \mathrm{Fl}(C)$, $\Psi' \subset \mathrm{Fl}(C')$, *alors*

$$(u^*(\Phi) \longleftrightarrow \Psi') \qquad \Longleftrightarrow \qquad (\Phi \longleftrightarrow u_*(\Psi')).$$

C'est la proposition 2 pour $C'_0 \underset{u_0^*}{\overset{u_{0!}}{\rightleftarrows}} C_0$, avec $C'_0 = C$, $C_0 = C'$, $(u_{0!} : C \longrightarrow C') = u^*$, et $(u_0^* : C' \longrightarrow C) = u_*$.

[page 47]

Pour les inclusions (2), on utilise le corollaire de la proposition 2 pour les couples $\Phi = TC(I)$, $\Psi' = F(I')$, resp. $\Phi = C(I)$, $\Psi' = F(I')$ [plutôt $\Psi' = TF(I')$], et on applique (1) qui donne $u^*(\Phi) \longleftrightarrow \Psi'$, d'où $\Phi \longleftrightarrow u_*(\Psi')$, ce qui n'est autre que (2). Pour les équivalences (3), on utilise la proposition 2, en faisant $\Psi = F(I)$, $\Phi' = TC(I')$ resp. $\Psi = TF(I)$, $\Phi' = C(I')$.

Corollaire 1 (de la proposition 1) : *Supposons* $u : I' \longrightarrow I$ *telle que pour tout* $i \in \mathrm{Ob}I$, *la catégorie* $i\backslash I'$ *soit discrète* ([27]) *(p. ex.* I' *discrète). Alors on a*

$$\begin{cases} u_!(C(I')) \ \subset \ C(I), \ \ u_!(TC(I')) \ \subset \ TC(I) \\ u^*(F(I)) \ \subset \ F(I'), \ \ u^*(TF(I)) \ \subset \ TF(I'). \end{cases}$$

En effet, les relations de la deuxième ligne équivalent (à cause de (3)) à celles de la première. Il faut prouver que si f dans $\mathrm{Fl}\mathcal{M}(I')$ est dans $C(I')$ resp. $TC(I')$, $u_!(f)$ est dans $C(I)$ resp. $TC(I)$, ce qui signifie aussi que $\alpha_s^*(u_!(f))$ est dans C resp. TC, pour tout $s \in \mathrm{Ob}I$. Or le foncteur

$$\alpha_s^* u_! \ : \ \mathcal{M}(I') \ \longrightarrow \ \mathcal{M}$$

s'explicite par la formule bien connue

$$\alpha_s^*(u_!(X')) \overset{\text{déf}}{=} u_!(X')(s) \ \simeq \ \varinjlim_{i' \in s\backslash I'} X'(i').$$

Comme

[page 48]

$s\backslash I'$ est discrète, on a donc l'isomorphisme fonctoriel en X' dans $\mathcal{M}(I')$

$$\alpha_s^*(u_!(X')) \ \simeq \coprod_{(s',\, x : s \longrightarrow u(s')) \text{ dans } \mathrm{Ob}\,(s\backslash I')} X'(s'),$$

donc si $f \ : \ X' \longrightarrow Y'$, $\alpha_s^*(u_!(f))$ s'explicite comme une somme directe dans $\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M})$ de flèches de la forme

$$f_{s'} \ : \ X'(s') \ \longrightarrow \ Y'(s'),$$

lesquelles sont dans C resp. TC puisque f est dans $C(I')$ resp. $TC(I')$. Comme C, TC sont stables par sommes directes quelconques (C, TC étant clos à gauche), on gagne. p. 28

Corollaire 2. *Soit* I *dans* Cat, *et* $f \in \mathrm{Fl}(\mathcal{M}(I))$. *Pour que* f *soit dans* $F(I)$ (resp. *dans* $TF(I)$), *il* faut *que* $\forall\, s \in \mathrm{Ob}I$, $f_s : X(s) \longrightarrow Y(s)$ *le soit.* (Mais cette condition n'a pas du tout l'air d'être suffisante !) *En particulier, soit* $X \in \mathrm{Ob}\mathcal{M}(I)$, *alors* $X \in \mathrm{Ob}\mathcal{M}(I)_f \Longrightarrow X(s) \in \mathrm{Ob}\mathcal{M}_f \ \ \forall\, s \in \mathrm{Ob}I$.

On applique le corollaire 1 à $\alpha_s : e \longrightarrow I$.

Scholie. La proposition 1 (relation (1)) montre que le foncteur u^* transforme carrés W-cocartésiens en itou, suites exactes longues de suspension en itou – c'est "l'exactitude à droite homotopique" de u^*. On s'attend à ce qu'il en soit de même pour les carrés cartésiens et les suites exactes

[page 49]

longues de cosuspension, mais pour le prouver il faudra un travail, qu'on fera dans la suite.

Les relations (2) montrent que le foncteur u_* transforme carrés W-cartésiens en itou, donc suites exactes longues de cosuspension en itou. Je ne m'attends *pas* à ce qu'il en soit de même en général pour les carrés W-cocartésiens – *i.e.* que u_* soit "homotopiquement exact à droite", et non seulement à gauche. Mais il faudrait au moins que je fasse des exemples (avec I', I des catégories finies ordonnées).

Quant à $u_!$, la proposition ne dit rien de bien palpable à son sujet. Néanmoins on s'attend à ce que $u_!$ transforme carrés W-cocartésiens en itou – c'est la moindre des choses ! Ou peut-être je fais erreur, en confondant les foncteurs u_*, $u_!$ envisagés ici, avec les foncteurs similaires

$$\mathrm{HO}_W(I') \underset{u_*^W}{\overset{u_!^W}{\rightrightarrows}} \mathrm{HO}_W(I),$$

adjoints à gauche resp. à droite de

$$\mathrm{HO}_W(I') \xleftarrow{u_W^*} \mathrm{HO}_W(I),$$

induit par

$$u^* \ : \ (\mathcal{M}(I), W(I)) \ \longrightarrow \ (\mathcal{M}(I'), W(I')).$$

Mais en général u_*, $u_!$ ne sont pas compatibles

[page 50]

avec les localiseurs $W(I')$, $W(I)$, donc ils ne doivent pas être confondus avec les foncteurs $u_!^W$, u_*^W. Donc j'ai été peut-être hâtif, dans ce que j'ai dit au sujet de u_* et de $u_!$. Je serai obligé d'étudier la situation de très près, quand j'essayerai de construire les foncteurs u_*^W et $u_!^W$. Pour le moment, je n'ai encore aucune assurance que les conditions envisagées pour $(\mathcal{M}, W)$ suffisent à assurer l'existence de u_*^W, $u_!^W$ – pas même pour I, I' des ensembles ordonnés finis !

Corollaire 1. *Soit $X \in \mathcal{M}(I)_{\mathrm{f}}$, alors pour toute $\alpha : s \longrightarrow t$ dans I qui est* [un] monomorphisme, *$X(\alpha) : X(t) \longrightarrow X(s)$ est dans F.*

(On applique [le] corollaire 1 (p. 47) à $\tilde{\alpha} : \mathbf{\Delta}_1 \longrightarrow I$.) p. 29

Proposition 3. ([28]) *Soit X dans $\mathcal{M}(\mathbf{\Delta}_1)$, $X = (X_0 \xleftarrow{\alpha} X_1)$. Alors X est dans $\mathcal{M}(\mathbf{\Delta}_1)_{\mathrm{f}}$ si et seulement si X_0, X_1* [sont] *dans $\mathcal{M}_{\mathrm{f}}$ et $\alpha \in F$.*

Corollaire 2. *Soit $I' \overset{u}{\hookrightarrow} I$* [une] immersion ouverte. *Alors pour $X \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}(I)_{\mathrm{f}}$, $\varprojlim_I X(i) \longrightarrow \varprojlim_{I'} X(i)$ est dans F.*

5 Catégories de modèles quillénisables

Je reviens au cas général d'une catégorie de modèles $(\mathcal{M}, W)$.

Définition 1. On dit que $(\mathcal{M}, W)$ est *quillénisable* s'il existe une structure de Quillen faible *exacte* (C, TC, F, TF) pour $\mathcal{M}$.

C'est là une condition autoduale, mais que je ne sais vérifier en pratique que moyennant l'exactitude soit à gauche, soit à droite – donc par une condition plus forte qui

27. Plus généralement, il suffit que toute composante connexe Z_α de $i\backslash I'$ ait un objet initial e_α, de sorte que $\varinjlim_{i\backslash I'} X'(i') \simeq \coprod_{\alpha\in\pi_0(i\backslash I')} X'(e_\alpha)$. C'est le cas notamment si $I' \longrightarrow I$ est un isomorphisme local, p. ex. une immersion ouverte.

28. Comparer avec le lemme p. 63 et sa démonstration (plus exactement, le corollaire du lemme).

détruit la symétrie. C'est pour la sauvegarder dans la mesure du possible que j'introduis la définition précédente, ainsi que la

Définition 2. Soit, en plus de $(\mathcal{M}, W)$, Diag $\subset$ Cat une sous-catégorie pleine de Cat. On dit que W est *quillénisable sur* Diag, si pour tout I dans Diag, $(\mathcal{M}(I), W(I))$ est quillénisable. [page 51]

En pratique, j'utiliserai cette définition dans le cas où Diag = Cat, ou alors, qu'il satisfasse au moins les propriétés de stabilité utiles pour le domaine d'un dérivateur : stable par $\varprojlim$ finies, par sommes finies – eventuellement par $\varinjlim$ finies, etc ([29]).

Exemple 1 : Celui des paragraphes 3, 4, où on a dégagé des conditions sur $(\mathcal{M}, W)$, avec $\mathcal{M}$ une "grosse" catégorie et $\mathcal{M}$ accessible, pour que W soit quillénisable sur Cat tout entier. C'est le cas qui me paraît à présent le plus intéressant.

Exemple 2 : Soient $\mathcal{A}$ une catégorie abélienne, et $\mathcal{M} = K^\bullet(A)$ la catégorie des complexes de cochaînes à valeurs dans $\mathcal{A}$, $W = W_\mathcal{A}$ l'ensemble des quasi-isomorphismes, donc

$$\mathcal{M}W^{-1} \;=\; K^\bullet(\mathcal{A})W_\mathcal{A}^{-1} \;\simeq\; D^\bullet(\mathcal{A}), \qquad \text{catégorie dérivée de } \mathcal{A}.$$

On définit aussi $\mathcal{M}^+, \mathcal{M}^-, \mathcal{M}^\mathrm{b}$, avec les localiseurs induits $W_\mathcal{A}^+, W_\mathcal{A}^-, W_\mathcal{A}^\mathrm{b}$, et les catégories de fractions $D^+(\mathcal{A})$, $D^-(\mathcal{A})$, $D^\mathrm{b}(\mathcal{A})$. Ou encore, pour I dans Cat, [page 52]

$$\mathcal{M}(I) \;=\; K^\bullet(\mathcal{A}(I))$$

p. 30

$$W(I) \;=\; \underbrace{W_{\mathcal{A}(I)}}_{\text{quasi-isomorphismes}} \;\subset\; \mathrm{Fl}(K^\bullet(\mathcal{A}(I))),$$

et de même pour $\mathcal{M}^\alpha(I)$, $W^\alpha(I)$ ($\alpha \in \{+, -, \mathrm{b}\}$), du moins *si I est finie.* Il y a aussi les sous-catégories $K^{\geq 0}(\mathcal{A})$ et $K^{\leq 0}(\mathcal{A})$ des complexes de cochaînes resp. de chaînes au sens strict (avec $K^i = 0$ si $i \geq 0$, resp. si $i \leq 0$ [plutôt si $i < 0$, resp. si $i > 0$]). On aura pour I quelconque

$$\begin{cases} K^{\geq 0}(\mathcal{A})(I) \;\simeq\; K^{\geq 0}(\mathcal{A}(I)) \\ \quad W_\mathcal{A}^{\geq 0}(I) \;=\; W_{\mathcal{A}(I)}^{\geq 0}, \end{cases}$$

et de même pour $K^{\leq 0}$, $W^{\leq 0}$.

D'après Quillen page 1.2, $(K^+(\mathcal{A}), W_\mathcal{A}^+)$ est quillénisable si $\mathcal{A}$ a assez d'injectifs, $(K^-(\mathcal{A}), W_\mathcal{A}^-)$ l'est si $\mathcal{A}$ a assez de projectifs. Il ne dit rien pour $(K^\bullet(\mathcal{A}), W_\mathcal{A})$ sans plus – pourtant on fait de l'algèbre cohomologique avec $D^\bullet(\mathcal{A})$ sans plus, et même sans faire d'hypothèse d'existence d'injectifs ou de projectifs. J'ai un peu oublié ce que Verdier a fait à ce sujet – je devrais quand même regarder sa thèse (!), ou bien l'exposé de Hartshorne.

Toujours est-il qu'on a là des exemples de type tout différent de ceux envisagés dans 1°. Ainsi, il n'y a pas à supposer que $\mathcal{M}$ soit stable par petites $\varinjlim$ – $\mathcal{M}$ peut même être une petite catégorie, elle l'est si et seulement si $\mathcal{A}$ elle même l'est. Si $\mathcal{A}$ est stable par (petites) $\varinjlim$ filtrantes, et est accessible (p. ex. a une petite famille génératrice, et les $\varinjlim$ filtrantes sont exactes), alors $K^\bullet(\mathcal{A})$ etc. ([30]) ont les mêmes propriétés, et $(K^+(\mathcal{A}), W_\mathcal{A}^+)$ est quillénisable sur Cat tout entier ([31]). (C'est le cas où on sait que $\mathcal{A}$ a assez d'injectifs, et l'algèbre cohomologique se fait surtout à coups de résolutions injectives …) Dans ce cas on sait que les [page 53]

$$u_* \;:\; D^+(I', \mathcal{A}) \longrightarrow D^+(I, \mathcal{A})$$

29. Je supposerai que Diag contient tout au moins les catégories provenant d'ensembles ordonnés finis.

30. !!

31. attention, $K^+(\mathcal{A})$ n'est *pas* stable par $\varinjlim$ filtrantes infinies – donc on ne peut appliquer le tapis des paragraphes 2, 3 directement à K^+.

existent comme adjoints à droite des

$$u^* \ : \ D^+(I,\mathcal{A}) \longrightarrow D^+(I',\mathcal{A}),$$

mais je ne suis plus trop sûr si on sait définir u_* aussi sur $D(I',\mathcal{A})$ tout entier, et je doute que $u_!$ existe sans hypothèse sur u (genre : dimension cohomologique finie). Sans doute on doit toujours avoir

$$u_! \ : \ D^-(I',\mathcal{A}) \longrightarrow D^-(I,\mathcal{A}),$$

adjoint à gauche de [page 54]

$$u^* \ : \ D^-(I,\mathcal{A}) \longrightarrow D^-(I',\mathcal{A}).$$

Mais je ne sais plus trop s'il faut s'attendre à pouvoir définir $u_!$ sur $D(I',\mathcal{A})$ tout entier, en dehors d'hypothèses genre dimension cohomologique finie. La triste vérité, c'est que j'ai ± oublié la théorie des foncteurs dérivés ! (Il faudrait que je demande encore à Jean Malgoire de m'envoyer des textes canoniques.) p. 31

Scholie. Si $(\mathcal{M},W)$ est quillénisable sur Diag $\subset$ Cat (et même sans qu'il soit quillénisable), il définit un prédérivateur $\mathbf{D}_{\mathcal{M},W}$ sur Diag. On posera parfois

$$\mathrm{HO}_{\mathcal{M},W}(I) \ \text{ ou } \ \mathrm{HO}_W(I) \ = \ \mathbf{D}_{\mathcal{M},W}(I).$$

L'hypothèse quillénisable implique, sur chacune de ces catégories homotopiques, la structure (relativement faible) "triangulée", provenant des suites *exactes* de suspension et de cosuspension ([32]). (Le caractère quillénisable assure l'exactitude de ces suites …) Les foncteurs $u^* : \mathrm{HO}_W(I) \longrightarrow \mathrm{HO}_W(I')$ sont "homotopiquement exacts" dans le sens des ces structures "triangulées" (non commutatives), *i.e.* transforment suites exactes de suspension resp. de cosuspension en itou. [page 55]

Quels sont les axiomes des dérivateurs qui sont vérifiés sous la seule hypothèse quillénisable ? **Der** 1 `[voir chapitre I, p. 43]` l'est sans hypothèse aucune sur la catégorie de modèles $(\mathcal{M},W)$:

$$\mathrm{HO}_W(\coprod_\alpha I_\alpha) \ \simeq \ \prod_\alpha \mathrm{HO}_W(I_\alpha)$$

pour une famille *finie* d'objets I_α dans Diag. L'axiome de localisation **Der** 2 `[voir chapitre I, p. 43]` l'est sous l'hypothèse que W soit *fortement saturé,* et quillénisable. On utilise le fait que toute flèche de $\mathrm{HO}_W(I)$ provient, à isomorphisme près, d'une flèche dans $\mathcal{M}(I)$. (C'était là un des points qui restait en suspens dans VI, dans la théorie de HOT_W, $W \subset \mathrm{Fl}(\mathrm{Cat})$ un localiseur fondamental …)

L'axiome **Der** 3, nouvelle mouture `[voir chapitre I, pp. 111-112]`, implique un localiseur fondamental $\mathbf{W} \subset \mathrm{Fl}(\mathrm{Cat})$ (pas forcément $\mathbf{W}_\infty$) ([33]). La forme la plus forte serait celle-ci : si

$$u \ : \ I' \longrightarrow I$$

est dans $\mathbf{W}$, on veut que le foncteur u^* induise une *équivalence* [page 56]

$$u^*_{\mathrm{lc}} \ : \ \mathrm{HO}^{\mathrm{lc}}_W(I) \xrightarrow{\sim} \mathrm{HO}^{\mathrm{lc}}_W(I').$$

Mais je doute qu'on soit armé pour vérifier un axiome aussi fort, sans avoir au moins une théorie des opérations $u_!$ ou u_*. On pourrait à tout hasard poser cet axiome en prenant $\mathbf{W} = \mathbf{W}_\alpha \overset{\text{déf}}{=}$ le plus petit localiseur fondamental satisfaisant W (1 à 7) (le plus grand de ces localiseurs étant $\mathbf{W}_\infty$). Pour l'instant, la façon de vérifier cet axiome (en termes de la p. 32

32. Dans le cas où $\mathcal{M}$ est ponctuée par `[un]` objet neutre. Sinon, il y a la structure associée aux carrés cartésiens et cocartésiens. Il serait assez intéressant d'axiomatiser une telle espèce de structure.

33. Il est naturel ici de supposer que $\mathbf{W}$ satisfait à tous les "bons axiomes" sur les localiseurs fondamentaux W (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) `[voir chapitre XII]`.

donnée $(\mathcal{M}, W)$) est pour moi un mystère ± total. (Mais je sais le vérifier pour HOT_W, quand $W \subset \mathrm{Fl}(\mathrm{Cat})$ satisfait W (1, 2, 3, 4, 5, …).)

Je vais m'en occuper, une fois que j'aurai une maîtrise raisonnable sur le formalisme de u_*, $u_!$ relatif aux $u : I' \longrightarrow I$ dans Diag. L'hypothèse quillénisable seule semble trop grossière pour assurer l'existence de $u_!$ ou de $u_\star$ dans des cas intéressants.

[page 57]

6 Catégorie de modèles quillénisables, et foncteurs $u_!$, u_*

Définition 1 :

ⓐ On dit que $(\mathcal{M}, W)$ est *quillénisable uniformément à gauche* sur Diag, si on peut trouver une structure de Quillen faible (C, TC, F, TF) pour $\mathcal{M}$ qui soit *close,* et qui de plus ait la propriété suivante : pour I dans Cat, soient $C(I)$, $TC(I) \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M}(I))$ définis par

$$(u : X \longrightarrow Y) \in C(I) \text{ (resp. } TC(I)) \text{ si et seulement si } \forall\, s \in \mathrm{Ob}\, I,$$
$$u_s : X_s \longrightarrow Y_s \text{ est dans } C(I) \text{ (resp. } TC(I)).$$

Soit de plus

$$F(I) \;=\; TC(I)_*, \qquad TF(I) \;=\; C(I)_*.$$

La condition envisagée, c'est que pour tout I *dans* Diag, $(C(I), TC(I), F(I), TF(I))$ est une structure de Quillen faible *close exacte* pour $W(I)$ ([34]).

ⓑ On dit que $(\mathcal{M}, W)$ est *quillénisable sur Diag uniformément et exactement* [à] *gauche*, si on a de plus $TC = C \cap W$, *i.e.* si (C, TC, F, TF) est exacte à gauche, donc défini par C seul, via

$$TC = C \cap W, \qquad F = (TC)_*, \qquad TF = C_* \qquad ([35])$$

On a vu au paragraphe 3 que si $\mathcal{M}$ est stable par petites $\varinjlim$ et accessible, et W stable par petites $\varinjlim$ filtrantes, enfin si W admet une structure de Quillen faible (C, TC, F, TF) qui soit close et exacte à gauche – alors les conditions de la définition 1 sont satisfaites. p. 33

[page 58]

D'autre part, notons que la proposition 1 page 45 et ses corollaires, y inclus la proposition 3 (page 50) et ses corollaires, sont valables dès lors que les quillénisations des $(\mathcal{M}(I), W(I))$ envisagés sont définies "uniformément à gauche" par une quillénisation uniforme à gauche (pas nécessairement exacte à gauche) de $(\mathcal{M}, W)$ sur Diag.

La quillénisation uniforme gauche nous servira à établir l'existence des images directes homotopiques u_*, pour certains u. La quillénisation uniforme droite, dualement, aura comme conséquence principale l'existence des $u_!$ homotopiques pour certains $u : I' \longrightarrow I$ dans Diag.

Je vais résumer ce que j'ai pu établir jusqu'à présent dans ce sens, dans le

Théorème-scholie : *Soit* (C, TC, F, TF) *une quillénisation uniforme gauche de* W *sur* Diag $\subset$ Cat. [page 59]

1) *Soit* $u : I' \longrightarrow I$ *une flèche dans* Diag. *On suppose* Diag *accordé à* $\mathcal{M}$ *de façon que pour* u*, flèche dans* Diag, *les* $\varprojlim$ *dans* $\mathcal{M}$ *(de type* I'/i*) requises pour assurer l'existence de*

$$u_* \;:\; \mathcal{M}(I') \longrightarrow \mathcal{M}(I)$$

34. (C, TC, F, TF) est appelé alors une *quillénisation uniforme à gauche* de $(\mathcal{M}, W)$ sur Diag.

35. On dit que $(C, \ldots)$, ou simplement C, définit une *quillénisation uniforme et exacte à gauche* de $(\mathcal{M}, W)$ sur Diag.

existent dans $\mathcal{M}$. (C'est O.K. si I, I' [sont] *finies, $\mathcal{M}$ étant supposée stable par $\varinjlim$ finies de toutes façons.) On sait* (prop. 1, page 45) *que u_* induit*

$$u_*^{\mathrm{f}} \ : \ \mathcal{M}(I')_{\mathrm{f}} \longrightarrow \mathcal{M}(I)_{\mathrm{f}}\,. \qquad (*)$$

On dit que u est admissible (à gauche) pour la quillénisation uniforme gauche donnée de W sur Diag, *si u_*^{f} est compatible avec les localiseurs $W(I')_{\mathrm{f}}$, $W(I)_{\mathrm{f}}$,* i.e. *si $f' : X' \longrightarrow Y'$ dans $\mathcal{M}(I')$, X', Y' fibrants, $f' \in W(I')$ implique $u_*(f') \in W(I)$. On dit que Z dans* Diag *est* admissible (pour la quillénisation uniforme gauche donnée de W sur Diag …) *si le foncteur $Z \longrightarrow e$ est admissible. Ceci posé :*

a) *Pour que u soit admissible, il suffit que les I'/s pour $s \in \mathrm{Ob}\, I$, le soient. NB il y a une réciproque, quand I est ordonné, donc les $I'/s \longrightarrow I'$ des immersions ouvertes.*

b) *Tout ensemble ordonné fini est admissible. Plus généralement (sauf erreur) tout ensemble ordonné I tel que l'espace topologique associé à I° soit noethérien (*i.e. *toute suite croissante d'ouverts de I° est stationnaire, ou encore toute suite croissante de fermées de I est stationnaire), et si de plus toute partie fermée irréductible de I° admet un point générique,* i.e. *I° est (non seulement un espace noethérien, mais aussi) un espace topologique* sobre. *(Pour I, cela signifie que toute partie ouverte filtrante croissante de I admet un plus grand élément.)* [page 60]

c) *En particulier, si I', I sont des ensembles ordonnés finis, alors tout $u : I' \longrightarrow I$ est admissible. Il en est de même, plus généralement, si I, I' sont des ensembles ordonnés et I'° est un espace noethérien sobre.* p. 34

2) *Supposons $u : I' \longrightarrow I$ admissible. Considérons*

$$u_*^W \ : \ \underbrace{\mathcal{M}(I')_{\mathrm{f}} W(I')_{\mathrm{f}}^{-1}}_{\simeq \mathrm{HO}_W(I')} \longrightarrow \underbrace{\mathcal{M}(I)_{\mathrm{f}} W(I)_{\mathrm{f}}^{-1}}_{\mathrm{HO}_W(I)},$$

induit par u_*. Ce foncteur est adjoint à droite de $u_W^* : \mathrm{HO}_W(I) \longrightarrow \mathrm{HO}_W(I')$. De plus, l'homomorphisme canonique (pour $s \in \mathrm{Ob} I$, $X' \in \mathrm{Ob}\mathrm{HO}_W(I')$) [page 61]

$$u_*^W(X')(s) \ \simeq \ p_{s*}(X'|I'/s) \ \overset{\text{déf}}{=} \ \underbrace{\mathrm{holim}}_{I'/s} {}_W(X'|I'/s)$$

(où $p_s : I'/s \longrightarrow e$) est un isomorphisme, si on suppose que les I'/s sont admissibles (on dira alors que u est strictement *admissible).*

Corollaire. *Sur le domaine formé des ensembles ordonnés finis, le prédérivateur HO_W satisfait (en plus des axiomes* **Der** 1, **Der** 2*) aux axiomes* **Der** 4 *et* **Der** 5 *(existence des images directes u_*, adjoints à droite des foncteurs u^*, et calcul standard des fibres d'une image directe).*

Démonstration du théorème-scholie.

1°) *a*) est immédiat. Pour *b*), on procède par récurrence sur le cardinal n de l'ensemble ordonné fini I, les cas $n \in \{0, 1\}$ étant triviaux. Supposons donc $n \geq 2$, et le théorème prouvé pour les $n' < n$. Je distingue deux cas : si I admet un plus grand élément a, alors, désignant par $\alpha : e \longrightarrow I$ le foncteur de valeur a, par $p : I \longrightarrow e$ la projection, on sait que l'on a

$$p_* \ \simeq \ \alpha^*, \qquad \textit{i.e.} \ \varprojlim_I X_i \simeq X_a,$$


d'où le fait que sur $\mathcal{M}(I)$ tout entier (pas seulement sur $\mathcal{M}(I)_{\mathrm{f}}$), p_* est compatible aux [page 62]

localiseurs $W(I)$, W.


Si I n'a pas de plus grand élément, alors l'ensemble M des ses éléments maximaux est de cardinal ≥ 2, on peut donc l'écrire $M = M_1 \amalg M_2$, et on aura

$$I \;=\; I_1 \cup I_2, \qquad \text{où } I_1 = I/M_1,\ I_2 = I/M_2$$

sont deux ouverts de I, différents de I, donc de cardinaux n_1, $n_2 \;<\; n$. Considérons aussi $I_0 = I_1 \cap I_2$, c'est un ouvert de cardinal $< n$. Le diagramme



correspond à une flèche




,

p. 35

avec


$$I_1 \;=\; I/1, \qquad I_2 \;=\; I/2, \qquad I_0 \;=\; I/0.$$

L'hypothèse de récurrence et *a*) impliquent que u est admissible. Comme un composé de foncteurs admissibles est admissible (tautologiquement, via $(vu)_* \simeq v_* u_*$), on est réduit finalement au

Lemme. *La catégorie*  *est admissible.*

[page 63]

Ceci va résulter du


Corollaire ([36]). *Soit*  *dans* $\mathcal{M}(\Psi)$. *Pour que* $X_\bullet$ *soit fibrant, il*

faut et il suffit que l'on ait

a) X_0, X_1, X_2 *sont fibrants, et*

b) α_1, $\alpha_2 \in F$.

La nécessité de *a*) est cas particulier du corollaire 2, page 48, celle de *b*) est cas particulier du corollaire 1 page 50. Pour la suffisance (dont on n'aura pas besoin pour le théorème), on sait montrer que dans le diagramme commutatif à traits pleins




,

36. **NB** Il y a une variante évidente, caractérisant les X tels que $X \longrightarrow e$ soit dans $TF(\Psi)$ comme ceux pour lesquels X_0, X_1, X_2 sont fibrants *triviaux,* et α_1, $\alpha_2 \in TF$.

avec trois flèches marquées TC, on peut trouver h_1, h_0, h_2 laissant le diagramme commutatif (trois triangles et deux carrés commutatifs à respecter). Pour ceci, on commence par choisir h_0 de façon à rendre le triangle vertical médian commutatif – c'est possible car X_0 est fibrant, $A_0 \longrightarrow B_0$ dans TC.


Ensuite, on voit séparément pour h_1, h_2, qu'on peut les trouver en satisfaisant chacune aux deux contraintes de commutativité (1 triangle vertical et un carré penché). Pour h_1 p. ex. l'existence se voit sur le diagramme carré auxiliaire (traits pleins)

p. 36
[page 64]



NB C'est la démonstration de la proposition 3, page 50.

Le corollaire (partie "il faut") étant vu, le lemme en résulte, car on sait que si on a un homomorphisme f de carrés cartésiens X, Y



avec

$p_1^X,\ p_2^X,\ p_1^Y,\ p_2^Y$ fibrants `[appartenant à F]` (il suffit même p_1^X et p_1^Y fibrant),

et

$$f_0,\ f_1,\ f_2\ \in\ W,$$

alors $f_3 \in W$. (Ça a été vu dans la théorie des produits fibrés W-homotopiques `[voir chapitre XII, p. 253]`, et la vérification directe est immédiate.) De l'hypothèse initiale

[page 65]

pertinente que $\begin{matrix} & X_1 & \\ X_0 & & \\ & X_2 & \end{matrix}$ et $\begin{matrix} & Y_1 & \\ Y_0 & & \\ & Y_2 & \end{matrix}$ sont fibrants, on n'a besoin d'utiliser qu'un petit bout, p. ex. que p_1^X et p_1^Y sont fibrants, qui assure que les deux carrés X, Y sont W-homotopiquement cartésiens, ce qui suffit à impliquer alors que $f_0,\ f_1,\ f_2 \in W \Longrightarrow f_3 \in W$.

Je vais essayer de généraliser ce raisonnement, pour traiter le cas d'un ensemble ordonné I qui peut être infini, mais tel que I° soit noethérien et sobre, donc toute suite croissante de parties fermées de I, et toute suite décroissante de parties ouvertes, est stationnaire, et de plus toute partie ouverte filtrante croissante a un plus grand élément.

On veut prouver que I est admissible, et par "récurrence noethérienne" on est ramené à prouver ceci : $(*)$ Si I est tel que pour tout ouvert $I' \subset I$, avec $I' \neq I$, I' soit admissible, alors I aussi.

p. 37
[page 66]

$(*)$ admis, prouvons que $I = I_0$ est admissible.

S'il ne l'était, par $(*)$ il existerait $I_1 \subset I_0$, $I_1 \neq I_0$, tel que I_1 non admissible. De même, il y aurait $I_2 \subset I_1$, $I_2 \neq I_1$, non admissible etc. – on aurait construit une suite strictement décroissante d'ouverts I_n de I, contrairement au caractère noethérien de I°.

Prouvons $(*)$, et distinguons encore deux cas.

a) I° est irréductible, donc admet un point générique, *i.e.* un plus petit élément, *i.e.* I admet un plus grand élément. Ce cas a déjà été traité tantôt – toute catégorie avec objet final est admissible.

b) I° est réductible, donc réunion de deux fermés I_1°, I_2° distincts de I°, donc I est réunion de deux ouverts I_1, I_2 distincts de I. Alors par l'hypothèse dans $(*)$, I_1, I_2 et $I_0 = I_1 \cap I_2$ sont admissibles. On termine alors comme tantôt, étant ramené à

l'admissibilité de $\Psi = 0 \begin{array}{l} \nearrow 1 \\ \searrow 2 \end{array}$!

Prouvons la partie *c*) du théorème-scholie, partie 1°). Cela résulte de *a*), une fois vu que pour $s \in I$, I'/s satisfait aux mêmes hypothèses que I'. Or I étant ordonné, I/s est une sous-catégorie ouverte de I, donc I'/s une sous-catégorie ouverte de I', dont $(I'/s)^\circ$ un sous-ensemble ordonné fermé de I'°. Ce dernier étant noethérien et sobre, il en est de même de tout fermé, d'où la conclusion. [page 67]

Prouvons la partie 2°) du théorème-scholie. Considérons

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{M}(I')_{\mathrm{c}} & \hookleftarrow & \mathcal{M}(I') & \hookrightarrow & \mathcal{M}(I')_{\mathrm{f}} \\ \uparrow{\scriptstyle u_{\mathrm{c}}^*} & & \uparrow{\scriptstyle u^*} & & \downarrow{\scriptstyle u_*^{\mathrm{f}}} \\ \mathcal{M}(I)_{\mathrm{c}} & \hookleftarrow & \mathcal{M}(I) & \hookrightarrow & \mathcal{M}(I)_{\mathrm{f}} \end{array},$$

où u^* et a fortiori u_{c}^* sont compatibles avec $W(I)$, $W(I')$, et par hypothèse u_* est compatible avec $W(I')_{\mathrm{f}}$, $W(I)_{\mathrm{f}}$. En passant aux catégories de fractions, on trouve

p. 38 [page 68]

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{M}(I')_{\mathrm{c}}W(I')_{\mathrm{c}}^{-1} & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{HO}_W(I') & \xleftarrow{\sim} & \mathcal{M}(I')_{\mathrm{f}} \\ \uparrow{\scriptstyle u_W^*} & & & & \downarrow{\scriptstyle u_*^W} \\ \mathcal{M}(I)_{\mathrm{c}}W(I)_{\mathrm{c}}^{-1} & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{HO}_W(I) & \xleftarrow{\sim} & \mathcal{M}(I)_{\mathrm{f}} \end{array}$$

[plutôt $\mathcal{M}(I')_{\mathrm{f}}W(I')_{\mathrm{f}}^{-1}$ (resp. $\mathcal{M}(I)_{\mathrm{f}}W(I)_{\mathrm{f}}^{-1}$) au lieu de $\mathcal{M}(I')_{\mathrm{f}}$ (resp. $\mathcal{M}(I)_{\mathrm{f}}$)] et on veut montrer que u_W^* et u_*^W sont adjoints, de façon précise trouver un isomorphisme bifonctoriel, pour F *dans* $\mathcal{M}(I)_{\mathrm{c}}$ et G' *dans* $\mathcal{M}(I')_{\mathrm{f}}$

$$\mathrm{Hom}_W(u^*F, G') \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_W(F, u_*G') \qquad (*)$$

(où Hom_W désigne le Hom dans $\mathrm{HO}_W(I')$ resp. $\mathrm{HO}_W(I)$). Comme F est dans $\mathcal{M}(I)_{\mathrm{c}}$, u^*F est dans $\mathcal{M}(I')_{\mathrm{c}}$, et comme G' est dans $\mathcal{M}(I')_{\mathrm{f}}$, u_*G' est dans $\mathcal{M}(I)_{\mathrm{f}}$. Il s'ensuit que les deux membres de $(*)$ sont des quotients des deux membres dans la bijection canonique

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{M}(I')}(u^*F, G') \xrightarrow[\sim]{\alpha} \mathrm{Hom}_{\mathcal{M}(I)}(F, u_*G'). \qquad (**)$$

Il faut simplement montrer que cette dernière transforme la relation d'équivalence pertinente R' du premier membre, en celle R du second. [page 69]

Je dis que l'on a de toute façon

$$R \;\leq\; \alpha(R')$$

sans hypothèse d'admissibilité sur u, *i.e.* que la bijection invese de $(**)$ donne par passage aux quotients un homomorphisme

$$\mathrm{Hom}_W(u^*F, G') \longleftarrow \mathrm{Hom}_W(F, u_*G'), \qquad (***)$$

forcément surjectif, et de plus fonctoriel en F `[, $G'$ barré]`, variables dans $\mathrm{HO}_W(I)$ et $\mathrm{HO}_W(I')$ respectivement. En effet, on définit la flèche $(*$ bis$)$ `[plutôt` $(***)$`]` comme composé

$$\mathrm{Hom}_W(F, u_*G') \longrightarrow \mathrm{Hom}_W(u^*F, u^*u_*G') \longrightarrow \mathrm{Hom}_W(u^*F, G').$$

- $\mathrm{Hom}_W(F, u_*G') \longrightarrow \mathrm{Hom}_W(u^*F, u^*u_*G')$: car u^* est compatible avec $W(I)$, $W(I')$ sur $\mathcal{M}(I)$ tout entier, et on interprète les deux membres comme des Hom dans $\mathcal{M}(I)W(I)^{-1}$ et $\mathcal{M}(I')W(I')^{-1}$.
- $\mathrm{Hom}_W(u^*F, u^*u_*G') \longrightarrow \mathrm{Hom}_W(u^*F, G')$: composition avec l'homomorphisme d'adjonction $u^*u_*G' \longrightarrow G'$.

Cela implique donc que le foncteur sur $\mathrm{HO}_W(I)$ $F \longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathrm{HO}_W(I')}(u^*F, G')$ est, sinon représentable, du moins quotient terme à terme du foncteur représenté par u_*G' ([37]). p. 39

Mais supposons maintenant que u soit admissible. Alors je vais définir la flèche en sens initial $(*)$ (p. 68) de la façon suivante : Je choisis une flèche [page 70]

$$i' \;:\; u^*F \longrightarrow F' \qquad \text{avec } i' \in TC \subset C \cap W,\; F' \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}(I')_{\mathrm{f}}$$

(donc en fait $F' \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}(I')_{\mathrm{cf}}$, car u^*F est cofibrant), et par adjonction la flèche i' correspond à

$$i \;:\; F \longrightarrow u_*F'.$$

Je considère le diagramme (commutatif !)

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(F', G') & \xrightarrow{\alpha} & \mathrm{Hom}(u_*F', u_*G') \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \lambda : f' \longmapsto f' \circ i'} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \mu : f \longmapsto f \circ i} \\ \mathrm{Hom}(u^*F, G') & \xrightarrow{\text{adj.}} & \mathrm{Hom}(F, u_*G') \end{array}.$$

On note que l'on a encore F' cofibrant (car u^*F l'est et $i' \in TC \subset C$), donc $\mathrm{Hom}_W(F', G')$ est un quotient de $\mathrm{Hom}(F', G')$, et λ induit un isomorphisme

$$\mathrm{Hom}_W(F', G') \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_W(u^*F', G')$$

(car $i' \in TC \subset W$). Comme F', $G' \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}(I')_{\mathrm{f}}$ et que u_*^{f} est compatible avec $W(I')_{\mathrm{f}}$, $W(I)_{\mathrm{f}}$, il s'ensuit que la flèche horizontale α est compatible avec les relations d'équivalence [page 71]

37. Mais il n'est pas clair, sans hypothèse supplémentaire sur la situation, que ce foncteur représentable puisse être choisi en dépendance fonctorielle de G', envisagé dans $\mathrm{HO}_W(I')$.

définies par

$$\mathrm{Hom}(F',G') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{W(I')}(F',G') \quad \text{resp.} \quad \mathrm{Hom}(u_*F',u_*G') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{W(I)}(u_*F',u_*G') \ .$$

Et il en est de même de la flèche $\mu : f \longmapsto f \circ i$, trivialement. Donc la flèche d'adjonction $\mathrm{Hom}(u^*F,G') \longrightarrow \mathrm{Hom}(F,u_*G')$ est compatible avec les relations R, R', ce qui achève de prouver que $(**)$, page 68, induit une bijection $(*)$, page 68.

Ceci montre donc

1°) que pour un objet fixé G' dans $\mathrm{HO}_W(I')$ (qu'on peut toujours supposer, à isomorphisme près, provenir de $\mathcal{M}(I')_{\mathrm{f}}$), le foncteur

$$F \longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathrm{HO}_W(I')}(u_W^*F,G')$$

est représentable – *i.e.* le foncteur u_W^* admet un adjoint à gauche, et

2°) que cet adjoint à gauche se calcule comme $u_*(G')$ (quand l'argument G' est pris fibrant) – vu que l'homomorphisme $(***)$, page 69, est *fonctoriel en* F. (A posteriori il s'ensuit qu'il est aussi fonctoriel en G' …)

Le dernier énoncé dans 2° du théorème-scholie résulte du calcul de u_*^W, compte tenu p. 40 que $I'/s \longrightarrow I'$ est un isomorphisme local, donc le foncteur image inverse envoie [page 72]

$$\mathcal{M}(I')_{\mathrm{f}} \longrightarrow \mathcal{M}(I'/s)_{\mathrm{f}},$$

donc si G' est dans $\mathcal{M}(I')_{\mathrm{f}}$,

$$u_*(G')(s) \ \simeq \ p_{s\,*}(G'|I'/s)$$

est un calcul de $p_{s\,*}^W(G'|I'/s)$.

Cela achève la démonstration du théorème-scholie sur les images directes.

Commentaires.

1) Ce théorème me paraît loin d'être satisfaisant, c'est un pis-aller. J'avais espéré, avec les hypothèses du paragraphe 3, qu'on aurait l'existence des u_*^W pour *toute* flèche $u : I' \longrightarrow I$ dans Cat. Je doute à présent que ce soit le cas, mais n'ai pas encore réussi de faire un contre-exemple. Les cas test les plus importants pour la question d'admissibilité d'une catégorie I me paraissent les suivants :

a) I catégorie discrète infinie (disons dénombrable). La question revient ici à celle-ci : soient $f_i : X_i \longrightarrow Y_i$ dans W, avec X_i, Y_i fibrants, *i.e.* dans F `[i.e.` $X_i \longrightarrow e$`,` $Y_i \longrightarrow e$ `dans` F`]`. Alors $f = \prod f_i : \prod X_i \longrightarrow \prod Y_i$ est-il dans W ?

b) I catégorie [page 73]

$$0 \longrightarrow 1 \longrightarrow 2 \longrightarrow 3 \longrightarrow \cdots ,$$

i.e. la catégorie ordonnée associée à l'ensemble ordonné $\mathbf{N}$, pour la relation d'ordre ordinaire $m \leq n$. Donc $\mathcal{M}(I)$ est formée des systèmes *projectifs* dans $\mathcal{M}$, indexés par $\mathbf{N}$. On prouve facilement (en procédant comme dans le corollaire du lemme p. 63) que $\mathcal{M}(I)_{\mathrm{f}}$ est formée des systèmes projectifs

$$X_0 \longleftarrow X_1 \longleftarrow X_2 \longleftarrow \cdots \longleftarrow X_n \xleftarrow{p_n} X_{n+1} \longleftarrow \cdots$$

tels que les X_i soient dans $\mathcal{M}_{\mathrm{f}}$, et les p_n dans F. La question est donc : si $X_\bullet$, $Y_\bullet$ sont fibrants et $f_\bullet : X_\bullet \longrightarrow Y_\bullet$ est telle que $f_i \in W$ pour $i \in \mathbf{N}$, alors a-t-on $\varprojlim f_i : X_\infty \longrightarrow Y_\infty$ dans W ?

Si la reponse est affirmative pour $\mathbf{N}$ (pour un W et une quillénisation donnée), elle p. 41 l'est aussi pour toute catégorie discrète dénombrable, comme on le voit aussitôt. [page 74]

Mais je ne vois pas comment déduire même *a*) des axiomes, disons pour un triplet de Quillen clos (closed model category) tel que $\mathcal{M}$ soit de plus stable par $\varinjlim$ filtrantes, que celles-ci soient exactes, et qu'il y ait un petit ensemble de générateurs dans $\mathcal{M}$ (donc $\mathcal{M}$ est accessible), que W soit stable par $\varinjlim$ filtrantes. Je devrais demander à THOMASON s'il connait un contre-exemple.

c) Les deux exemples précédents étaient des catégories ordonnées. Comme exemple typique de catégorie non-ordonnée, où je ne vois pas ce qui se passe, je signale $I = B_G$, G un groupe (donc un seul objet, avec un groupe d'automorphismes G). Aussi le cas de $\mathbf{\Delta}[1] = \{\mathbf{\Delta}_0, \mathbf{\Delta}_1\}$ (sous-catégorie pleine de $\mathbf{\Delta}$) n'est pas clair pour moi.

2) On aimerait pouvoir traiter de façon duale l'existence des $u_!^W$, à défaut de mieux. Dans l'hypothèse de départ du paragraphe 4 sur $(\mathcal{M}, W)$, cela amène donc à changer de tactique. Cette fois, on devra supposer l'existence d'une quillénisation close *exacte à droite* pour W (ce qui est plus exigeant, semble-t-il, qu'une telle structure exacte à gauche, dans le cas envisagé), donc

$$TF \;=\; F \cap C,$$

et de plus encore C, TC tels qu'on ait [page 75]

$$C \;=\; \widetilde{C_0}, \qquad TC \;=\; \widetilde{TC_0}$$

avec C_0, TC_0 petits ([38]). On posera maintenant

$$\begin{aligned} F(I) \;&=\; \{f \in \mathrm{Fl}\,\mathcal{M}(I) \;\mid\; f_s \in F \quad \forall\, s \in \mathrm{Ob}\, I\} \\ TF(I) \;&=\; \{f \in \mathrm{Fl}\,\mathcal{M}(I) \;\mid\; f_s \in TF \;\; \forall\, s \in \mathrm{Ob}\, I\}, \end{aligned}$$

puis

$$\begin{aligned} C(I) \;&=\; TF(I)^* \\ TC(I) \;&=\; F(I)^* \;. \end{aligned}$$

L'espoir (que je devrai vérifier ultérieurement), c'est qu'on obtient ainsi une quillénisation uniforme à droite de W, sur Cat tout entier. Le seul problème, c'est la validité des axiomes de factorisation de $f \in \mathrm{Fl}\,\mathcal{M}(I)$ en $f = pi$, avec $i \in TC$, $f \in F$, et aussi avec $i \in C$, $f \in TF$. J'ai bon espoir que c'est vrai – cela se réduit essentiellement à voir que $(C(I), TF(I))$ et $(TC(I), F(I))$, soit $(\Phi(I), \Psi(I))$, satisfont en plus de $\Phi(I) = \Psi(I)^*$, à $\Psi(I) = \Phi(I)_*$ (*i.e.* $\Psi(I)$ est clos à droite), et que $\Phi(I)$ est accessible (tout comme $\Phi = \Phi(e)$). Si ça marche, on aura donc l'existence de $u_!$ pour u un foncteur entre catégories ordonnées finies, et sous des conditions légèrement plus générales. (P. ex. $u : I' \longrightarrow I$ avec I ordonnée, I' ordonnée et à espace sous-jacent noethérien et sobre.) Peut-être que cette fois, l'hypothèse que W est stable par $\varinjlim$ filtrantes va quand même servir ! Ainsi, le cas des catégories discrètes, et des catégories filtrantes à gauche comme $\mathbf{N}^\circ$, ne va plus poser de problèmes à cause de cela. Il y a donc de l'espoir ! Tout ensemble ordonné qui est $\varinjlim$ filtrante de sous-ensembles ordonnés *fermés* noethériens et sobres, est alors W-admissible à droite. Mais qu'en est-il de catégories de type $\Gamma = B_G$ p. ex. ? ? ? p. 42 [page 76]

7 Filtrations cardinales et parties accessibles d'une grosse catégorie [page 77]

Je me réfère à la théorie des foncteurs et catégories accessibles de SGA 4, I, §9 (p. 138-178). Je me donne une grosse catégorie (toujours une $\mathfrak{U}$-catégorie) E avec une *filtration*

38. On dit alors que C, TC (en tant que parties closes à droite [plutôt à gauche]) sont "accessibles".

cardinale (croissante)

$$\Big(\mathrm{Filt}^{\pi}(E)\Big)_{\pi\geq\pi_0}, \qquad \pi_0 \text{ un cardinal infini fixé,}$$

par les sous-catégories strictement pleines $\mathrm{Filt}^{\pi}(E)$. On a [SGA 4, I, 9.12]

a) $\mathrm{Filt}^{\pi}(E)$ essentiellement petite, *i.e.* équivalente à une petite catégorie (*i.e.* à une catégorie appartenant à $\mathfrak{U}$).

b) E satisfait L_{π_0} (*i.e.* E est stable par $\varinjlim$ de type I, quand I est un ensemble ordonné grand devant π_0), et $\mathrm{Filt}^{\pi}(E)$ est stable par les limites inductives filtrantes indexées par I grand devant π_0, et tel que $\mathrm{card}\, I \leq \pi$.

c) Pour tout $\pi \geq \pi_0$, et pour tout $X \in \mathrm{Ob}\, E$, on a

$$X \;\simeq\; \varinjlim_{i\in I} X_i,$$

où les X_i [sont] dans $\mathrm{Filt}^{\pi}(E)$, et où I est un ensemble ordonné grand devant π. De plus, si $X \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{Filt}^{\pi'}(E)$, avec $\pi' > \pi$, on peut prendre I tel que $\mathrm{card}\, I \leq \pi'^{\pi}$ (donc si $\pi' = 2^{c'}$ avec $c' \geq \pi$, d'où $(\pi')^{\pi} = (2^{c'})^{\pi} = 2^{c'\pi} = 2^{c'} = \pi'$, on aura $\mathrm{card}\, I \leq \pi'$). (**NB** Si on admet l'hypothèse du continu généralisée, on aura toujours $\pi'^{\pi} = \pi'$, donc $\mathrm{card}\, I \leq \pi'$.) ([39])

Considérons la représentation de *c*), p. 43 [page 78 barrée] [page 79]

$$X \;=\; \varinjlim_{I} X_i \qquad \begin{cases} X_i \in \mathrm{Filt}^{\pi}, \\ I \text{ grand devant } \pi. \end{cases}$$

Soit

$$\tilde{I} \;=\; \{I' \subset I \mid \mathrm{card}\, I' \leq \pi, \quad I' \text{ grand devant } \pi_0\},$$

muni de la relation d'ordre d'inclusion. Pour

$$I' \;\in\; \tilde{I}, \qquad \text{soit} \quad X_{I'} = \varinjlim_{I'} X_i \;,$$

cette limite existe par L_{π_0} (hypothèse *b*), elle est dans Filt^{π} par *b*), donc on a un système inductif

$$(X_{I'})_{I'\in\tilde{I}}, \qquad X_{I'} \in \mathrm{Filt}^{\pi},$$

avec

$$\mathrm{card}\,\tilde{I} \;\leq\; (\mathrm{card}\, I)^{\pi},$$

et si $X \in \mathrm{Filt}^{\pi'}$ $(\pi' > \pi)$, prenant

$$\mathrm{card}\, I \;\leq\; \pi'^{\pi},$$

on aura $\mathrm{card}\,\tilde{I} \leq (\pi'^{\pi})^{\pi} = \pi'^{\pi^2} = \pi'^{\pi}$, donc

$$\mathrm{card}\,\tilde{I} \;\leq\; \pi'^{\pi}.$$

Je dis que $\tilde{I}$ est lui aussi *grand devant* π, tout comme I. En effet, soit [page 80]

$$(I_\alpha)_{\alpha\in A}, \qquad I_\alpha \in \tilde{I}, \qquad \mathrm{card}\, A \;\leq\; \pi,$$

39. NB *b*) et *c*) impliquent que $E = \bigcup_{\pi\geq\pi_0} \mathrm{Filt}^{\pi}(E)$.

prouvons qu'il existe $I' \in \tilde{I}$ qui majore les I_α, *i.e.* qui contient $I'_0 = \bigcup_{\alpha\in A} I_\alpha$. On aura $\operatorname{card} I'_0 \leq \pi^2 = \pi$ (car $\operatorname{card} A \leq \pi$ et $\operatorname{card} I_\alpha \leq \pi$ pour tout α), et il suffit de voir ceci :

[En fait, l'assertion est évidente : comme $\operatorname{card} I'_0 \leq \pi$, et comme I est grand devant π, I'_0 admet un majorant i'_0 dans I, et on peut prendre $I' = I'_0 \cup \{i'_0\}$.]

Lemme 1 : *Soient π_0, π deux cardinaux, avec $\pi \geq \pi_0$, I un ensemble ordonné grand devant π, et I'_0 une partie de I de cardinal $\leq \pi$. Alors il existe une partie I' de I satisfaisant les conditions :* ([40])

a) $I' \supset I'_0$.

b) $\operatorname{card} I' \leq \pi$.

p. 44

c) I' *grand devant* π_0.

[Le lemme tel qu'il est énoncé est évident pour les mêmes raisons que ci-dessus (même sans l'hypothèse de la note de bas de page). La démonstration qui suit prouve en fait un résultat plus fin :

LEMME 1′ : *Soient π_0, π deux cardinaux, avec $\pi_0 < \pi$ et $\pi^{\pi_0} = \pi$, I un ensemble ordonné grand devant π_0, et I'_0 une partie de I de cardinal $\leq \pi$. Alors il existe une partie I' de I satisfaisant les conditions :*

a) $I' \supset I'_0$.

b) $\operatorname{card} I' \leq \pi$.

c) I' *grand devant* π_0.]

On va essayer de construire I' par récurrence transfinie, en définissant les $I'_\alpha \subset I$ ainsi :

$$I'_0 = I'_0\,,$$
$$I'_\alpha = \textstyle\bigcup_{\beta<\alpha} I'_\beta \quad \text{si } \alpha \text{ est un ordinal limite,}$$
$$I'_{\alpha+1} = \begin{cases} \text{déduit de } I'_\alpha \text{ ainsi : pour toute partie } J \text{ de } I'_\alpha \text{ telle que} \\ \operatorname{card} J \leq \pi_0, \text{ qui n'est pas majorée dans } I'_\alpha, \text{ on choisit} \\ \text{un majorant } i_J \text{ dans } I \text{ ([qui] existe, car } I \text{ [est]} \\ \text{grand devant } \pi, \text{ donc devant } \pi_0) \text{ et } I'_{\alpha+1} \text{ s'obtient en} \\ \text{adjoignant ces } i_J \text{ à } I'_\alpha. \end{cases}$$

Soit alors α_0 le premier ordinal qui soit de cardinal $> \pi_0$, et considérons [page 81]

$$I' \;=\; I'_{\alpha_0} \;=\; \bigcup_{\substack{\alpha<\alpha_0 \\ \textit{i.e. } \operatorname{card}\alpha\leq\pi_0}} I'_\alpha.$$

Alors I' contient I'_0, il est grand devant π_0, mais quel est son cardinal ? Prouvons par récurrence transfinie que

$$\operatorname{card} I'_\alpha \;\leq \pi \qquad \text{si } \alpha < \alpha_0, \quad \textit{i.e.} \quad \operatorname{card}\alpha \leq \pi_0.$$

C'est O.K. pour $\alpha = 0$ par hypothèse sur I'_0. Si c'est vrai pour I'_α, est-ce vrai pour $I'_{\alpha+1}$? On adjoint à I'_α un ensemble d'éléments i_J qui est de cardinal $\leq \operatorname{card} \mathfrak{P}_{\leq\pi_0}(I'_\alpha)$, donc de cardinal $\leq \operatorname{card}(I'_\alpha)^{\pi_0} \leq \pi^{\pi_0}$, et si on suppose

$$\pi^{\pi_0} \;=\; \pi,$$

on gagne. Supposons enfin que α soit un ordinal limite (de cardinal $\leq \pi_0$). Donc on a

p. 45

$$I'_\alpha \;=\; \bigcup_{\beta<\alpha} I'_\beta, \qquad \text{[page 82]}$$

donc

$$\operatorname{card} I'_\alpha \ \leq \ \underbrace{(\operatorname{card}\alpha)\pi}_{\leq \pi\pi = \pi^2 = \pi} \qquad \text{puisque les } \operatorname{card} I'_\beta \leq \pi,$$

on gagne encore.

On trouve enfin, par le même argument,

$$\operatorname{card} I'_{\alpha_0} \ \leq \ \underbrace{(\operatorname{card}\alpha_0)\pi \leq \pi^2}_{\substack{\text{si } \operatorname{card}\alpha_0 \leq \pi, \\ \textit{i.e.} \text{ si } \pi_0 < \pi}} = \pi,$$

donc on gagne encore.

Ainsi, on a trouvé un deuxième système inductif

$$(X_{\tilde{\imath}})_{\tilde{\imath}\in\tilde{I}}$$

du même type que le système initial, ayant comme limite inductive X (qu'il ait même limite inductive est immédiat). Mais qu'a-t-on gagné ? Ceci : dans $\tilde{I}$ toute partie de cardinal $\leq \pi$ et grande devant π_0 est non seulement *majorée* dans $\tilde{I}$, mais même y admet une borne supérieure. Cela résulte du

Lemme 2 : *Soit I grand devant $\pi > \pi_0$, avec $\pi^{\pi_0} = \pi$* `[il suffit` $\pi \geq \pi_0$`]` *(cf. lemme 1). Soit $(I'_\alpha)_{\alpha\in A}$ un ensemble de parties de I qui sont dans $\tilde{I}$,* i.e. [page 83]

a) *de cardinal $\leq \pi$, et*

b) *grandes devant π_0,*

et supposons que $\operatorname{card} A \leq \pi$ *et que A, ordonné par inclusion, soit grand devant π_0. Alors $I' = \bigcup_{\alpha\in A} I'_\alpha$ est encore dans $\tilde{I}$,* i.e. *I' est de cardinal $\leq \pi$ (car de cardinal $\leq \pi^2 = \pi$), et de plus, grande devant π_0.* (Vérification immédiate.)

Ainsi, on a prouvé ceci :

Proposition 1. *Soit E* `[une]` *grosse catégorie, avec filtration cardinale* $(\mathrm{Filt}^\pi)_{\pi\geq\pi_0}$. *Soit π un cardinal avec*

$$\pi > \pi_0, \qquad \pi^{\pi_0} = \pi \qquad \textit{(p. ex. } \pi = 2^c\textit{, avec } c \geq \pi_0\textit{)} \quad \texttt{[}\pi \geq \pi_0 \texttt{ suffit].}$$

Alors pour tout X dans E, on peut trouver un système inductif $(X_i)_{i\in I}$, de limite X, avec

a)
$$\begin{cases} X_i \in \mathrm{Filt}^\pi \ \textit{ pour tout } i \in I, \\ I \textit{ grand devant } \pi, \end{cases}$$

satisfaisant aux conditions supplémentaires suivantes :

b) *Toute partie J de I de cardinal $\leq \pi$, et grande devant π_0, admet une borne supérieure i_J dans I.*

c) *On a, sous ces conditions*

p. 46

$$X_{i_J} \xleftarrow{\sim} \varinjlim_{i\in J} X_i. \qquad \text{[page 84]}$$

De plus, si $X \in \mathrm{Filt}^{\pi'}$ avec $\pi' > \pi$, on peut prendre I de cardinal $\leq \pi'^\pi$ (donc de cardinal $\leq \pi'$ si $\pi'^\pi = \pi'$, p. ex. si $\pi' = 2^{c'}$, avec $c' \geq \pi$).

40. Pourvu qu'on suppose $\pi > \pi_0$, et de plus $\pi^{\pi_0} = \pi$ (p. ex. $\pi = 2^c$ avec $c \geq \pi_0$).

Définition. On appelle un système inductif $(X_i)_{i\in I}$, satisfaisant les conditions *a*), *b*), *c*) ci-dessus, un *système inductif bien adapté* (à la filtration cardinale donnée, pour les cardinaux π_0, π donnés), et la représentation correspondante

$$X \xleftarrow{\sim} \varinjlim X_i$$

une *représentation bien adaptée* de X en termes d'objets de Filt^π.

NB Quand E est stable par petites $\varinjlim$ filtrantes, la situation se simplifie considérablement. On peut alors prendre

$$\tilde{I} \;=\; \{I' \subset I \mid \operatorname{card} I' \leq \pi,\ I' \text{ filtrant}\}$$

(sans s'encombrer de la condition I' grand devant π_0) et définir encore le système inductif $(X_{I'})_{I'\in\tilde{I}}$ par

$$X_{I'} \;=\; \varinjlim_{i\in I'} X_i\ .$$

On a encore

$$\operatorname{card}\tilde{I} \;\leq\; (\operatorname{card} I)^\pi \;\leq\; \pi'^\pi \qquad \text{si} \quad \operatorname{card} I \leq \pi'^\pi$$

[page 85]

(notamment, si $X \in \mathrm{Filt}^{\pi'}$, et qu'on prenne I comme indiqué dans la condition *c* des filtrations cardinales). De plus, cette fois, le fait que $\tilde{I}$ soit grand devant π est trivial, on a même mieux, à part que I soit filtrante :

(∗) *Toute* partie $(I'_\alpha)_{\alpha\in A}$ de $\tilde{I}$ filtrante et de cardinal $\leq \pi$ admet une borne supérieure $\tilde{\imath}_A$,

savoir la réunion (qui est bien filtrante). De plus, le système inductif $(X_{\tilde{\imath}})_{\tilde{\imath}\in\tilde{I}}$ a la propriété plus forte que

$$X_{\tilde{\imath}_A} \xleftarrow{\sim} \varinjlim_{\tilde{\imath}\in A} X_{\tilde{\imath}}\ .$$

Ainsi on a la

Proposition 1 bis. *Supposons E stable par petites $\varinjlim$ filtrantes, et Filt^π stable par celles-ci, où $\pi \geq \pi_0$ est donné. Alors pour tout X dans E, on peut trouver un système inductif $(X_i)_{i\in I}$ de limite inductive X, avec*

a) *$X_i \in \mathrm{Filt}^\pi$ pour tout $i \in I$, I ensemble ordonné grand devant π.*

b) *Toute partie J de I filtrante de cardinal $\leq \pi$ admet une borne supérieure i_J dans I.*

c) *Sous ces conditions*

$$X_{i_J} \;=\; \varinjlim_{i\in J} X_i\ .$$

p. 47

[page 86]

De tels systèmes inductifs seront dits *"parfaitement adaptés"* (à la filtration cardinale donnée, pour le cardinal π donné – π_0 n'y figure plus, si ce n'est comme début de la filtration cardinale sans plus).

Comme pratiquement, on aura à manier surtout des E stables par petites $\varinjlim$ filtrantes, et des filtrations cardinales stables en conséquence (renforcement de la condition *b*) des filtrations cardinales), c'est le cas, et la notion de *représentation parfaitement adaptée* de X comme $\varinjlim_I X_i$ ($X_i \in \mathrm{Filt}^\pi$), que je mettrai en avant. Le cas "général", où on suppose seulement [que] E satisfait L_{π_0}, est plus alambiqué et se traite moins joliment ([41]).

41. On parlera de filtration cardinale *stricte,* si les $\underline{\mathrm{Filt}}^\pi$ sont stables par $\varinjlim$ filtrantes de cardinal $\leq \pi$ (et que ces limites filtrantes petites existent dans E).

Définition 2. Soit E munie d'une filtration cardinale stricte $(\underline{\mathrm{Filt}}^\pi)_{\pi\geq\pi_0}$. Soit M une partie de $\mathrm{Ob}\,E$, $\underline{M}$ la sous-catégorie pleine de E qu'elle définit, et soit π un cardinal $\geq\pi_0$. On dit que M est π-*accessible,* où que $\underline{M}$ est π-*accessible*, si les conditions suivantes sont [page 87] satisfaites. Pour tout système inductif

$$(X_i)_{i\in I}$$

parfaitement adapté à la filtration cardinale pour π (donc I ensemble ordonné filtrant tel que toute partie filtrante J de cardinal $\leq\pi$ ait une borne supérieure i_J, et $X_{i_J}\xleftarrow{\sim}\varinjlim_{j\in J}X_j$) ; soit I_M l'ensemble des $i\in I$ tels que $X_i\in M$. Ceci posé, on veut ceci : pour que X $(=\varinjlim X_i)$ soit dans M, il faut et il suffit que I_M soit cofinal dans I (de sorte que X apparaît comme $\varinjlim$ filtrante, avec ensemble d'indices I_M grand devant π, d'éléments de $M\cap\underline{\mathrm{Filt}}^\pi\overset{\text{déf}}{=}M^\pi$).

J'ai envie de reprendre la définition de la π-accessibilité de M, pour une filtration [page 88] cardinale donnée, à coups de conditions équivalentes. Pour tout système inductif $(X_i)_{i\in I}$ dans M `[plutôt dans E]`, je garde la notation

$$I_M\ =\ \{i\in I\mid X_i\in M\}.$$

Je pose, pour tout cardinal $\pi\geq\pi_0$,

$$M^\pi\ =\ M\cap\mathrm{Filt}^\pi.$$

(a$_\pi$) M est l'ensemble des objets de la forme

$$\varinjlim_{i\in I}X_i\ ,$$

où les X_i sont dans M^π, et I est grand devant π.

(b$_\pi$) Soit $(X_i)_{i\in I}$ un système inductif dans M `[plutôt dans E]` parfaitement adapté à la filtration cardinale pour π, *i.e.* I filtrante et toute partie filtrante J de I de cardinal $\leq\pi$ admet une borne supérieure i_J, et $X_{i_J}\xleftarrow{\sim}\varinjlim_{J}X_i$, et enfin $X_i\in\mathrm{Filt}^\pi$ pour tout $i\in I$. Soit $X=\varinjlim X_i$. Pour que l'on ait $X\in M$, il faut et il suffit que I_M soit cofinal dans I. p. 48

(c$_\pi$) $\underline{M}^\pi=\underline{M}\cap\underline{\mathrm{Filt}}^\pi$ est une sous-catégorie de $\underline{M}$ génératrice par épimorphismes stricts, $\underline{M}$ est stable par $\varinjlim$ grandes devant π, enfin pour tout $X\in M$, $\underline{M}^\pi/X$ est une catégorie filtrante.

Je présume que ces conditions sont équivalentes. [page 89]

$b_\pi\Longrightarrow a_\pi$. On suppose b) vérifié, on veut prouver a). D'abord que tout $X\in M$ est de la forme dite $\varinjlim_I X_i$, avec les $X_i\in M^\pi$ et I grand devant π. Par `[la]` proposition 1, on sait qu'on a une présentation parfaite adaptée pour π, $X=\varinjlim_{i\in I}X_i$. Par b) "il faut", la partie I_M de I est cofinale dans I, donc comme I est grand devant π, I_M aussi, et on aura (posant $J=I_M$)

$$X\ =\ \varinjlim_{i\in J}X_i,\qquad\qquad X_i\in M^\pi,\quad J\text{ grand devant }\pi,$$

O.K. Inversement, prouvons que si X se met sous la forme dite dans a), il est dans M. Cela va résulter du [page 90]

Lemme 1 : *Si la condition* b) (*ou* a)) *est satisfaite, M est stable par limites inductives grandes devant π.*

Il faut prouver que si

$$X \;=\; \varinjlim_{i\in I} X_i \;,$$

avec I grand devant π, les X_i dans M, alors $X \in M$. La condition b) "il suffit" l'assure quand on suppose de plus les X_i dans Filt^π (donc dans M^π), de sorte que l'on aura $I_M = I$, donc I_M cofinal, donc $X \in M$ ([42]). Si on ne suppose pas les X_i dans Filt^π, il faut travailler un peu plus.

Passer tout de suite à la partie de la démonstration ci-dessous, page 96, qui prouve $b) \Longrightarrow a)$. Le reste de la démonstration va prouver le

Lemme 2. *Si tout élément de Filt^π est π-accessible, alors* b_π) *(et même* a_π*) implique que M est stable par $\varinjlim$ grandes devant π.*

Soit p. 49

$$\mathcal{C} \;=\; \underline{M}^\pi/\mathcal{X} \qquad \texttt{[page 91]}$$

la catégorie suivante. Ses objets sont les triples

$$(Z, i, \alpha) \quad \text{tels que} \quad Z \in M^\pi,\ i \in I,\ \alpha : Z \longrightarrow X_i \;,$$

les flèches

$$(Z, i, \alpha) \;\longrightarrow\; (Z', i', \alpha')$$

sont les couples (u, λ) avec

$$u : Z \longrightarrow Z', \qquad \lambda : i \longrightarrow i', \qquad (\textit{i.e.}\ \text{on a } i \le i' \text{ et } \lambda \text{ est l'unique flèche de } i \text{ dans } i'),$$

tels que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow{\ \alpha\ } & X_i \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \text{transition } \lambda_{i',i}} \\ Z' & \xrightarrow{\ \alpha'\ } & X_{i'} \end{array}$$

commute. On peut donc définir $\mathcal{C}$ comme le produit fibré dans le carré cartésien

$$\begin{array}{ccccc} & & \mathcal{C} & \xrightarrow{\text{cofibré}} & I \\ & \overset{\mathcal{Z}}{\swarrow} & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathcal{X}:X\longmapsto X_i} \\ \underline{M}^\pi & \xleftarrow{\text{source}} & \underline{M}^\pi/E & \xrightarrow[\text{cofibré}]{\text{but}} & E. \end{array}$$

La fibre $\mathcal{C}_i$ de $\mathcal{C}$ en $i \in I$ est Filt^π/X_i [plutôt M^π/X_i]. On a, comme $b) \Longrightarrow$ première moitié de a), que $\underline{M}^\pi$ est un système de générateurs stricts de $\underline{M}$ [cela n'est pas clair sans autres hypothèses sur $\underline{M}$], et $X_i \in \mathrm{Ob}\,\underline{M}$ par hypothèse, [page 92]

$$X_i \;=\; \varinjlim_{Z\in \mathrm{Ob}\,\underline{M}^\pi/X_i} Z \;=\; \varinjlim_{\mathcal{C}_i} \mathcal{Z}|\mathcal{C}_i,$$

donc le système inductif donné $(X_i)_{i\in I}$ sur I à valeurs dans X, se déduit du système inductif (non ordonné en général) sur $\mathcal{C}$, à valeurs dans $\underline{M}^\pi$, en "intégrant sur les fibres" de $\mathcal{C} \longrightarrow I$. D'ailleurs, comme $\underline{M}^\pi/E \longrightarrow E$ est cofibrée, donc propre, il en est de même de $\mathcal{C} \longrightarrow I$, donc les $\varinjlim$ de $\mathcal{Z}$ sur les fibres $\mathcal{C}_i$ $(= \underline{M}^\pi/X_i)$ forment bien un foncteur covariant $I \longrightarrow E$, dont la limite inductive est celle de $\mathcal{Z}$ ([43]). p. 50 [page 93]

Soit, pour tout $i \in I$, $\tilde{\mathcal{C}}_i$ l'ensemble ordonné

$$\tilde{\mathcal{C}}_i = \{\text{sous-catégories } \mathcal{C}'_i \text{ de } \mathcal{C}_i = \underline{M}^\pi/X_i \mid \operatorname{card} \mathcal{Z}(\mathcal{C}'_i) \leq \pi, \ \ \mathcal{C}'_i \text{ filtrante}\}.$$

J'admets pour l'instant le

Lemme ([44]). *Pour tout $X \in M$, la catégorie $\underline{M}^\pi/X$ est filtrante. (Sous l'hypothèse* b), *ou que tout objet de M est de la forme dite dans* a).*)*

Il en résulte, comme $X_i \in M$, que $\mathcal{C}_i$ est filtrante, donc la réunion des $\mathcal{C}'_i \in \tilde{\mathcal{C}}_i$ est $\mathcal{C}_i$; l'ensemble ordonné $\tilde{\mathcal{C}}_i$ est filtrant, et toute partie $(\mathcal{C}'_{i_\alpha})_{\alpha \in A}$ filtrante et de cardinal $\leq \pi$ de $\tilde{\mathcal{C}}_i$ y admet une borne supérieure $\mathcal{C}'_{i_A}$, savoir la réunion des $\mathcal{C}'_{i_\alpha}$. $\tilde{\mathcal{C}}_i$ est donc un ensemble ordonné π-adapté.

On peut considérer les ensembles ordonnés $\tilde{\mathcal{C}}_i$, pour $i \in I$ variable, comme les fibres d'une application croissante d'ensembles ordonnés

$$p \ : \ \tilde{\mathcal{C}} \ \longrightarrow \ \mathcal{C},$$

en écrivant

$$\begin{cases} (\mathcal{C}'_i \subset \mathcal{C}_i) \ \leq \ (\mathcal{C}'_j \subset \mathcal{C}_j) \\ \text{si et seulement si } i \leq j, \\ \text{et le foncteur canonique de transition } \mathcal{C}_i \longrightarrow \mathcal{C}_j \text{ applique } \mathcal{C}'_i \text{ dans } \mathcal{C}'_j. \end{cases}$$

On voit donc que $\tilde{\mathcal{C}}$ est lui aussi filtrant et grand devant π.

On définit un système inductif sur $\tilde{\mathcal{C}}$, à valeurs dans $\underline{\mathrm{Filt}}^\pi$, en posant [page 94]

$$Z_{\mathcal{C}'_i} \ = \ \varinjlim_{\alpha \in \mathcal{C}'_i \ (\subset \mathcal{C}_i = \underline{M}^\pi/X_i)} Z_\alpha$$

(où un $\alpha \in \mathcal{C}_i$ est formé, je le rappelle, de $Z_\alpha \xrightarrow{u_\alpha} X_i$, avec $Z_\alpha \in M^\pi \subset \underline{\mathrm{Filt}}^\pi$). Ces $Z_{\mathcal{C}'_i}$ ne sont plus forcément dans M^π, mais seulement dans Filt^π. (Alors à quoi ça a servi de définir les $\mathcal{C}_i$ eux-mêmes comme $\underline{M}^\pi/X_i$, au lieu de $\underline{\mathrm{Filt}}^\pi/X_i$?)

Le système inductif

$$(Z_{\mathcal{C}'_i})_{\mathcal{C}'_i \in \tilde{\mathcal{C}}_i}$$

est parfaitement bien adapté à la filtration cardinale pour le cardinal π, et il est immédiat que sa $\varinjlim$ est isomorphe à $\varinjlim_{\alpha \in \mathrm{Ob}\, \mathcal{C}_i = \underline{M}^\pi/X_i} Z_\alpha = X_i \in M$. Donc par b), l'ensemble $\tilde{\mathcal{C}}_M$ des $\mathcal{C}'_i \in \tilde{\mathcal{C}}_i$ tels que $Z_{\mathcal{C}'_i} \in M$ (donc $Z_{\mathcal{C}'_i} \in M^\pi$) est cofinal dans $\tilde{\mathcal{C}}_i$. Il s'ensuit donc que l'ensemble $\tilde{\mathcal{C}}_M$ est lui aussi cofinal dans $\tilde{\mathcal{C}}$.

On vérifie aussi immédiatement que [p. 51] [page 95]

$$\varinjlim_{\alpha \in \tilde{\mathcal{C}}} Z_\alpha \ = \ \varinjlim X_i \ = \ X,$$

donc, $\tilde{\mathcal{C}}_M$ étant cofinal,

$$\varinjlim_{\alpha \in \tilde{\mathcal{C}}_M} Z_\alpha \ = \ X.$$

---

42. Pas tout à fait – on y suppose plus, sur le système inductif. On ne peut se dispenser, même dans le cas $X_i \in M^\pi \ \forall\, i \in I$, faire le raisonnement des pages suivantes.

43. **NB** Si on admet la validité de a), alors il en résulte déjà que $\varinjlim_{i \in I} X_i \simeq \varinjlim_{\alpha \in C} Z_\alpha$ est dans M. (Stabilité de M par $\varinjlim$ grandes devant π).

44. Utilise l'hypothèse tacite que les éléments de Filt^π sont π-accessibles.

Au total, on est arrivé à représenter X sous la forme

$$X \;=\; \varinjlim_{\alpha\in A} X_\alpha,$$

où cette fois les X_α sont *dans* M^π (pas seulement dans M), et A est grand devant π. Mais on ne sait pas que toute partie filtrante B de cardinal $\leq \pi$ de A admet une borne supérieure α_B dans A, et encore moins que $X_{\alpha_B} = \varinjlim_{\alpha\in B} X_\alpha$ ([45]). Donc on ne peut encore appliquer directement b). S'il ne s'agissait que de prouver la deuxième moitié de a), où on suppose déjà les $X_i \in M^\pi$ et I grand devant π, on n'a rien gagné du tout par nos labeurs !

Mais revenons à ce cas [page 96]

$$X \;=\; \varinjlim X_i \;\Bigg|\; \begin{array}{l} X_i \in M^\pi \\ \\ I \text{ grand devant } \pi, \end{array}$$

et introduisons à nouveau

$$\tilde{I} \;=\; \{I' \subset I \mid I' \text{ filtrant, de cardinal } \leq \pi\},$$

donc cette fois $\tilde{I}$ est bien adapté à π (filtrant, et toute partie filtrante de cardinal $\leq \pi$ a une borne supérieure), et si on pose

$$X_{\tilde{\imath}} \;=\; \varinjlim_{i\in I'_{\tilde{\imath}}} X_i,$$

on voit que le système inductif

$$(X_{\tilde{\imath}})_{\tilde{\imath}\in\tilde{I}}$$

est parfaitement adapté à π et la filtration cardinale. De plus, je dis que l'ensemble $\tilde{I}_M$ est *cofinal* dans $\tilde{I}$. En effet, $\tilde{I}_M$ contient le sous-ensemble $\tilde{I}_0$ formé des $I' \in \tilde{I}$ qui ont un plus grand élément – et $\tilde{I}_0$ est bien cofinal ! Maintenant, on peut appliquer le "il suffit" dans b), qui conclue que $X = \varinjlim X_i \in M$, q.e.d.

On a prouvé $b \Longrightarrow a$, sans utiliser l'hypothèse que tout objet de Filt^π est π-accessible. Mais on a utilisé cette hypothèse pour prouver que b (ou a) implique que M est stable par $\varinjlim$ grandes devant π (lemme 2, p. 90). p. 52

[page 97]

$a \overset{?}{\Longrightarrow} b$. Le "il suffit" dans b) est conséquence immédiate de a). Il reste à prouver que si, dans le système inductif π-adapté $(X_i)_{i\in I}$ de limite X, on a $X \in M$, alors I_M est cofinal dans I. Mais par hypothèse a), on aura $X = \varinjlim_J Y_j$, avec J grand devant π, les Y_j dans M^π. Admettons que $\mathrm{Filt}^\pi \subset E_\pi$, *i.e.* tout élément de Filt^π, en particulier les X_i, sont π-accessibles.

Je pense que je n'arriverai pas à prouver $a_\pi \Longrightarrow b_\pi$, mais seulement ceci : Si π' est un cardinal $> \pi$ (disons le successeur de π dans la suite ordinale des cardinaux), alors $a_\pi \Longrightarrow b_\pi$.

Ceci va résulter du

Lemme 3. *Soient* $X \simeq \varinjlim_I X_i$, $X \simeq \varinjlim_J Y_j$ *deux représentations de* X *sous forme des* $\varinjlim$ *filtrantes, avec* I *grand devant* π', J *grand devant* π, *avec* π, π' *deux cardinaux tels que* $\pi' > \pi$. *On suppose* $(X_i)_{i\in I}$ π'*-adapté,* i.e. *pour toute partie filtrante* I' *de* I *de cardinal* $\leq \pi'$, I' *a une borne supérieure* $i_{I'}$, *et* $X_{i_{I'}} = \varinjlim_{i\in I'} X_i$. *Alors pour tout* $i \in I$, *on peut trouver une partie* I' *de* I, *contenant* i, grande devant π, *de cardinal* $\leq \pi'$, *et une partie* J' *de* J, *enfin un isomorphisme* $I' \xrightarrow[\sim]{\lambda} J'$ *et une application strictement croissante* $\mu : J' \longrightarrow I'$ *et des homomorphismes* `[fin du chapitre]` [page 98]

45. Si on suppose (a_π), cet argument prouve du moins que M est stable par $\varinjlim$ grandes devant π. p. 53

Index des notations

LLP, RLP . . . 1
Φ_*, Ψ^* . . . 1
$\widetilde{\Phi}$, $\overline{\Psi}$ . . . 1
$\Phi \longleftrightarrow \Psi$ . . . 3
Cof_W, Fib_W . . . 8
W^{univ} . . . 9
W_{univ} . . . 10
$\underline{\mathrm{Fib}}_W S \subset \mathcal{M}/S$ . . . 10
W_S . . . 10
W_S^{u} . . . 10
$S\backslash\underline{\mathrm{Cof}}_W$ . . . 10
$\Phi \longleftrightarrow \Psi$ . . . 28
$\mathcal{M}_{\mathrm{cf}}$, W_{cf} . . . 29
Ho_W . . . 29
Hom_W . . . 30
π_{d}, π . . . 30
$\mathcal{M}_{\mathrm{c}}$ . . . 30
W_{c} . . . 31
π_{g} . . . 31
$\mathcal{M}_{\mathrm{f}}$ . . . 31
$f \sim g$ . . . 32
Ψ, Φ, $\mathcal{M}(\Psi)$, $W(\Psi)$, $\mathcal{M}(\Phi)$, $W(\Phi)$ . . . 33
$\mathcal{M}(I)$, $W(I)$ . . . 34
$F(I)$, $TF(I)$, $C(I)$, $TC(I)$ . . . 35
α_s . . . 35
u^*, u_*, $u_!$ . . . 45
u_W^*, u_*^W, $u_!^W$ . . . 49
$\mathrm{HO}_W(I)$ . . . 49
Diag . . . 50
$\mathrm{HO}_{\mathcal{M},W}(I)$, $\mathbf{D}_{\mathcal{M},W}(I)$ . . . 54
$\mathrm{HO}_W^{\mathrm{lc}}(I)$, u_{lc}^* . . . 56
u_*^{f} . . . 59
u_{c}^* . . . 67
$\mathfrak{U}$ . . . 77
$\mathrm{Filt}^\pi(E)$ . . . 77
L_π . . . 77 p. 54
$\tilde{I}$ . . . 79
$\underline{M}$ . . . 86
I_M . . . 87
M^π . . . 87 p. 55

Index terminologique

accessible (partie close à gauche) . . . 75
admissible (à gauche) . . . 59
catégorie de modèles . . . 7
catégorie de Quillen close . . . 25
clos à gauche, à droite . . . 2

couple de Quillen 5
faiblement saturée 7
filtration cardinale 77
filtration cardinale stricte 86
flèche coüniversellement dans W 9
flèche universellement dans W 10
grand devant π 77
objet chemin 32
objet cylindre 32
π-accessible (partie d'une catégorie munie d'une filtration cardinale stricte) 86
pré-Q-catégorie de modèles à gauche, à droite 12
pré-Quillen à gauche, à droite 14
pré-quintuplet de Quillen clos 21
propre 8
propriété de factorisation de Quillen 5
Q-catégorie de modèles 8
Q-catégorie de modèles à droite 21
Q-catégorie de modèles "close" 16
Q-homotopie à gauche, à droite 30
quillénisable 50
quillénisable sur Diag 51
quillénisable sur Diag uniformément et exactement à gauche 57
quillénisable uniformément à gauche sur Diag 57
quillénisation uniforme à droite sur Diag 58
quillénisation uniforme à gauche sur Diag 57
quillénisation uniforme et exacte à gauche sur Diag 57
représentation bien adaptée 84
représentation parfaitement adaptée 86
strictement admissible 61
structure de Quillen 28
structure de Quillen exacte . . . . . 27 p. 56
structure de Quillen exacte à gauche, à droite 27
structure de Quillen faible 27
structure de Quillen faible biexacte 28
structure de Quillen faible close, close à gauche, à droite 28
structure de Quillen parfaite 28
système de Quillen clos 26
système de Quillen faible 26
système de Quillen faible exact à gauche, à droite 26
système inductif bien adapté 84
système inductif parfaitement adapté 86
triple clos de Quillen 25
triple de Quillen 14
W-cofibration 8
W-équivalence coüniverselle 9
W-fibration . . . . . 8 p. 57

Liste des axiomes

$\mathcal{M}$ catégorie

$W \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$, $\quad C, F, TC, TF \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$

M 0 La catégorie $\mathcal{M}$ admet des limites projectives finies et des limites inductives finies.

M 1 Les flèches appartenant à C ont la propriété de relèvement à gauche relativement à celles appartenant à TF, et les flèches appartenant à F ont la propriété de relèvement à droite relativement à celles appartenant à TC.

M 2 Toute flèche de $\mathcal{M}$ se décompose en une flèche de C suivie d'une flèche de TF, et en une flèche de TC suivie d'une flèche de F.

M 3 La partie F de $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ est stable par composition et changement de base, C est stable par composition et cochangement de base, F et C contiennent les isomorphismes.

M 4 La partie TF de $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ est stable par composition et changement de base, TC est stable par composition et cochangement de base, TF et TC contiennent les isomorphismes.

M 5 Si dans un triangle commutatif de $\mathcal{M}$ deux des trois flèches sont dans W, il en est de même de la troisième ; W contient les isomorphismes.

M′ $TC \subset C \cap W$, $TF \subset F \cap W$.

M″ Les flèches appartenant à C sont des W-cofibrations, et les flèches appartenant à F sont des W-fibrations.

M′$_0$(g) $TC = C \cap W$.

M′$_0$(d) $TF = F \cap W$.

M 2 bis $W = TF \circ TC$.

p. 58

Glossaire

Section 1

— $\Phi \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$

Φ est *clos à gauche* : il existe $\Psi \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ tel que Φ soit formé des flèches ayant la propriété de relèvement à gauche relativement aux flèches de Ψ.

— $\Psi \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$

Ψ est *clos à droite* : il existe $\Phi \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ tel que Ψ soit formé des flèches ayant la propriété de relèvement à droite relativement aux flèches de Φ.

— $\Phi, \Psi \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$

(Φ, Ψ) a la *propriété de factorisation de Quillen* :

a) les flèches de Φ ont la propriété de relèvement à gauche relativement aux flèches de Ψ ;

b) toute flèche f de $\mathcal{M}$ se factorise en

$$f = pi \quad , \qquad i \in \Phi \ , \quad p \in \Psi \ .$$

— (Φ, Ψ) *couple de Quillen* :

a) (Φ, Ψ) a la propriété de factorisation de Quillen ;

b) Φ est clos à gauche et Ψ clos à droite.

Section 2

— $W \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$
W faiblement saturé :

a) W contient les isomorphismes ;

b) si deux parmi les trois flèches d'un triangle commutatif sont dans W, la troisième aussi.

— $W \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$
Un morphisme $p : X \longrightarrow Y$ de $\mathcal{M}$ est une *W-fibration* ($p \in \mathrm{Fib}_W$) si pour tout diagramme de carrés cartésiens

p. 59

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & X' & \xleftarrow{t} & X'' \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longleftarrow & Y' & \xleftarrow[s]{} & Y'' \end{array} \quad ,$$

si $s \in W$, alors $t \in W$.

- $W \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$
Un morphisme $i : A \longrightarrow B$ de $\mathcal{M}$ est une *W-cofibration* ($i \in \mathrm{Cof}_W$) si pour tout diagramme de carrés cocartésiens

$$\begin{array}{ccccc} A'' & \xleftarrow{s} & A' & \longleftarrow & A \\ \downarrow & & \downarrow & & {\scriptstyle i}\downarrow \\ B'' & \xleftarrow[t]{} & B' & \longleftarrow & B \end{array} \quad ,$$

si $s \in W$, alors $t \in W$.

- $W \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$
Un morphisme $p : X \longrightarrow Y$ de $\mathcal{M}$ est *universellement dans W*, ou une *W-équivalence universelle* ($p \in W_{\mathrm{univ}}$) si pour tout carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} X & \longleftarrow & X' \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & {\scriptstyle p'}\downarrow \\ Y & \longleftarrow & Y' \end{array} \quad ,$$

la flèche p' appartient à W.

- $W \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$
Un morphisme $i : A \longrightarrow B$ de $\mathcal{M}$ est *coüniversellement dans W*, ou une *W-équivalence coüniverselle* ($i \in W^{\mathrm{univ}}$) si pour tout carré cocartésien

$$\begin{array}{ccc} A' & \longleftarrow & A \\ {\scriptstyle i'}\downarrow & & {\scriptstyle i}\downarrow \\ B' & \longleftarrow & B \end{array} \quad ,$$

la flèche i' appartient à W.

p. 60

- *Pré-Q-catégorie de modèles à gauche* (resp. *à droite*) :
$\mathcal{M}$ et W, C, F, TC, $TF \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ satisfaisant aux axiomes **M 0** à **M 5**, $\mathbf{M}'$, $\mathbf{M}''$ et $\mathbf{M}'_{\mathbf{0}}(\mathbf{g})$ (resp. $\mathbf{M}'_{\mathbf{0}}(\mathbf{d})$).

- *Q-catégorie de modèles*, *triple de Quillen* :
  catégorie de modèles au sens de Quillen.
- *Q-catégorie de modèles "close"*, *triple clos de Quillen*, *catégorie de Quillen close*, *système de Quillen clos* :
  catégorie de modèles fermée au sens de Quillen.
- *Pré-Quillen à gauche* (resp. *à droite*) :
  pré-Q-catégorie de modèles à gauche (resp. à droite).
- *Pré-quintuplet de Quillen clos* :
  W, C, F, TC, $TF \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ satisfaisant aux axiomes **M 0** à **M 5**, $\mathbf{M}'$, $\mathbf{M}''$, C, TC étant clos à gauche et F, TF clos à droite.
- *Système de Quillen faible* :
  W, C, F, TC, $TF \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ satisfaisant aux axiomes **M 0** à **M 5**, $\mathbf{M}'$, $\mathbf{M}''$.
- *Système de Quillen faible exact à gauche* (resp. *à droite*) :
  W, C, F, TC, $TF \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ satisfaisant aux axiomes **M 0** à **M 5**, $\mathbf{M}'$, $\mathbf{M}''$ et $\mathbf{M}'_{\mathbf{0}}(\mathbf{g})$ (resp. $\mathbf{M}'_{\mathbf{0}}(\mathbf{d})$).

Section 3

- $(\mathcal{M}, W)$ *catégorie de modèles* :
  $\mathcal{M}$ catégorie satisfaisant à l'axiome **M 0** ;
  $W \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ faiblement saturé.
- *Structure de Quillen faible associée à la catégorie de modèles* $(\mathcal{M}, W)$:
  quadruplet (C, F, TC, TF) de parties de $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ satisfaisant aux axiomes **M 1** à **M 5**, $\mathbf{M}'$, $\mathbf{M}''$.
- *Structure de Quillen faible exacte* :
  structure de Quillen faible satisfaisant en outre à l'axiome **M 2 bis**.
- *Structure de Quillen faible exacte à gauche* (resp. *à droite*) :
  structure de Quillen faible satisfaisant en outre à l'axiome $\mathbf{M}'_{\mathbf{0}}(\mathbf{g})$ (resp. $\mathbf{M}'_{\mathbf{0}}(\mathbf{d})$).

p. 61

- *Structure de Quillen faible close à gauche* (resp. *à droite*) :
  structure de Quillen faible (C, F, TC, TF) telle que C, TC (resp. F, TF) soient clos à gauche (resp. à droite).
- *Structure de Quillen faible close* :
  structure de Quillen faible à la fois close à gauche et à droite.
- *Structure de Quillen* :
  structure de Quillen faible "biexacte" :
  structure de Quillen faible à la fois exacte à gauche et à droite
  = catégorie de modèles de Quillen propre.
- *Structure de Quillen parfaite* :
  structure de Quillen faible "biexacte" et close
  = catégorie de modèles fermée de Quillen propre.

Section 5

- Catégorie de modèles $(\mathcal{M}, W)$ *quillénisable* :
  il existe une structure de Quillen faible *exacte* (C, F, TC, TF) associée à $(\mathcal{M}, W)$.
- $(\mathcal{M}, W)$ *quillénisable sur* Diag $\subset$ Cat :
  pour tout I dans Diag, la catégorie des modèles $(\mathcal{M}(I),\ W(I))$ est quillénisable.

Section 6

- Catégorie de modèles $(\mathcal{M}, W)$ *quillénisable uniformément à gauche sur* Diag :
  il existe une structure de Quillen faible *close* (C, F, TC, TF) pour $(\mathcal{M},\ W)$ telle que pour tout I dans Diag, si l'on définit $C(I)$ et $TC(I)$ "argument par argument" (*), et $F(I)$ et $TF(I)$ par la propriété de relèvement à droite relativement à $TC(I)$ et $C(I)$ respectivement (†), le quadruplet $(C(I), TC(I), F(I), TF(I))$ soit une structure de Quillen faible *close exacte* pour $(\mathcal{M}(I),\ W(I))$. On dit alors que (C, F, TC, TF) est une *quillénisation uniforme à gauche* de $(\mathcal{M},\ W)$ sur Diag).

p. 62

- Catégorie de modèles $(\mathcal{M}, W)$ *quillénisable sur* Diag *uniformément et exactement à gauche* :
  $(\mathcal{M}, W)$ admet une quillénisation uniforme à gauche sur Diag (C, F, TC, TF) telle que $TC = C \cap W$ (autrement dit, telle que (C, F, TC, TF) soit une strucure de Quillen faible *exacte à gauche*). On dit alors que (C, F, TC, TF) est une *quillénisation uniforme et exacte à gauche* de $(\mathcal{M},\ W)$ sur Diag.

Section 7

- I ensemble ordonné filtrant, π cardinal
  I grand devant π :
  toute partie de I de cardinal inférieur ou égal à π admet un majorant dans I.
- E catégorie
  Une *filtration cardinale* de E est une filtration croissante

$$\Big(\mathrm{Filt}^{\pi}(E)\Big)_{\pi \geq \pi_0} \quad , \qquad \pi_0 \text{ un cardinal infini fixé,}$$

  de E par des sous-catégories strictement pleines $\mathrm{Filt}^{\pi}(E)$, indexée par les cardinaux $\pi \geq \pi_0$ appartenant à un univers donné, et satisfaisant aux conditions suivantes :
  a) pour tout $\pi \geq \pi_0$, $\mathrm{Filt}^{\pi}(E)$ est équivalente à une petite catégorie ;
  b) la catégorie E admet des limites inductives filtrantes indexées par des ensembles ordonnés I grands devant π_0, et pour tout $\pi \geq \pi_0$, $\mathrm{Filt}^{\pi}(E)$ est stable par les dites limites si $\mathrm{card}\, I \leq \pi$;
  c) Pour tout $\pi \geq \pi_0$, et pour tout $X \in \mathrm{Ob}\, E$, il existe un isomorphisme

$$X \ \simeq \ \varinjlim_{i \in I} X_i \ ,$$

$*$. Un morphisme de foncteurs $u : X \longrightarrow Y$ de I° vers $\mathcal{M}$ étant dans $C(I)$ (resp. $TC(I)$) si et seulement si pour tout objet i de I, u_i est dans C (resp. TC).

†. Un morphisme de $\mathcal{M}(I)$ étant dans $F(I)$ (resp. $TF(I)$) si et seulement si il a la propriété de relèvement à droite relativement aux flèches appartenant à $TC(I)$ (resp. $C(I)$).

où $(X_i)_{i\in I}$ est un système inductif filtrant dans E, indexé par un ensemble ordonné I grand devant π, et où les X_i sont des objets de $\mathrm{Filt}^{\pi}(E)$. De plus, si $X \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{Filt}^{\pi'}(E)$, $\pi' \geq \pi$, on peut prendre I tel que $\mathrm{card}\, I \leq \pi'^{\pi}$.

- E catégorie, $(\mathrm{Filt}^{\pi}(E))_{\pi\geq\pi_0}$ filtration cardinale de E, $\pi \geq \pi_0$ cardinal
  Un *système inductif bien adapté* (à la filtration cardinale donnée, pour les cardinaux π_0, π donnés) est un système inductif filtrant $(X_i)_{i\in I}$ satisfaisant aux conditions suivantes :
  a) I est grand devant π, et pour tout $i \in I$, $X_i \in \mathrm{Filt}^{\pi}(E)$;
  b) Toute partie J de I de cardinal $\leq \pi$, et grande devant π_0, admet une borne supérieure i_J, et on a
  $$X_{i_J} \xleftarrow{\sim} \varinjlim_{i\in J} X_i \ .$$
  Si X est un objet de E, une *représentation bien adaptée* de X, en termes d'objets de $\mathrm{Filt}^{\pi}(E)$, est la donnée d'un système inductif bien adapté $(X_i)_{i\in I}$, à la filtration cardinale donnée, pour les cardinaux π_0, π, et d'un isomorphisme
  $$X \xleftarrow{\sim} \varinjlim_{i\in I} X_i \ .$$

p. 63

- E catégorie admettant des petites limites inductives filtrantes
  Une *filtration cardinale stricte* de E est une filtration cardinale $(\mathrm{Filt}^{\pi}(E))_{\pi\geq\pi_0}$ telle que pour tout cardinal $\pi \geq \pi_0$, $\mathrm{Filt}^{\pi}(E)$ soit stable par limites inductives filtrantes.
- E catégorie admettant des petites limites inductives filtrantes
  $(\mathrm{Filt}^{\pi}(E))_{\pi\geq\pi_0}$ filtration cardinale stricte de E, $\pi \geq \pi_0$ cardinal
  Un *système inductif parfaitement adapté* (à la filtration cardinale donnée, pour le cardinal π) est un système inductif filtrant $(X_i)_{i\in I}$ satisfaisant aux conditions suivantes :
  a) I est grand devant π, et pour tout $i \in I$, $X_i \in \mathrm{Filt}^{\pi}(E)$;
  b) Toute partie J de I filtrante de cardinal $\leq \pi$, admet une borne supérieure i_J, et on a
  $$X_{i_J} \xleftarrow{\sim} \varinjlim_{i\in J} X_i \ .$$
  Si X est un objet de E, une *représentation parfaitement adaptée* de X, en termes d'objets de $\mathrm{Filt}^{\pi}(E)$, est la donnée d'un système inductif bien adapté $(X_i)_{i\in I}$, à la filtration cardinale donnée, pour le cardinal π, et d'un isomorphisme
  $$X \xleftarrow{\sim} \varinjlim_{i\in I} X_i \ .$$

p. 64

Références

H. J. Baues, “Algebraic Homotopy”, Cambridge studies in advanced mathematics, vol. 15 (1989).
R. Hartshorne, “Residues and Duality”, Lecture Notes in Mathematics, vol. 20, Springer-Verlag (1966).
D. G. Quillen, “Homotopical Algebra”, Lecture Notes in Mathematics, vol. 43, Springer-Verlag (1967).
R. W. Thomason, *Cat as a Closed Model Category*, Cahiers de Topologie et Géométrie Différentielle, Vol. XXI-3, pp. 305-324 (1980).

J.-L. Verdier, “Des catégories dérivées des catégories abéliennes”, Astérisque, vol. 239 (1996).
SGA 4, I, “Théorie des Topos et Cohomologie Étale des Schémas”, Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie, dirigé par M. Artin, A. Grothendieck, J.-L. Verdier, Lecture Notes in Mathematics, vol. 269, Springer-Verlag (1972).

p.

LES DÉRIVATEURS

ALEXANDRE GROTHENDIECK

Chapitre XIV

Carrés h-cartésiens et h-cocartésiens

p.

Note des éditeurs de l'édition transcrite.

Ce texte a été déchiffré et transcrit en LaTeX 2$_\varepsilon$ par M. Künzer. Il a été édité par M. Künzer, J. Malgoire, et G. Maltsiniotis. La transcription est aussi fidèle que possible au manuscrit. Pour les quelques corrections évidentes, ou rares commentaires des éditeurs, ainsi que pour la numérotation originale des pages du manuscrit, les caractères de machine à écrire `[typewriter]` entre crochets sont utilisés. Un point d'interrogation entre crochets signifie que l'on n'est pas sûr du mot qui précède.

Ce chapitre est inachevé. Dans la première section, Grothendieck introduit une notion de "catégorie quadrangulée" à gauche (resp. à droite). Le texte s'interrompt brutalement au début de la deuxième section, consacrée aux exemples, quand Grothendieck réalise, sans doute, que l'exemple principal qu'il a en vue (la catégorie homotopique d'une catégorie de modèles munie des carrés homotopiquement cartésiens (resp. cocartésiens)) ne satisfait

pas à l'axiomatique des catégories quadrangulées. Cela est brièvement expliqué dans une postface des éditeurs.
Cette édition est provisoire. Les remarques, commentaires et corrections sont bienvenus. Envoyer un message à :
[e-mail address removed]

G. Maltsiniotis

p. 1
[page 1]

1 Axiomes de structures quadrangulées (une tentative avortée)

Soit $(\mathcal{M}, W)$ une catégorie de modèles admettant une théorie de la fibre homotopique. Alors on a dans $\mathrm{Ho}_W = \mathcal{M}W^{-1}$ une notion de *carré W-cartésien* (ou W-homotopiquement cartésien), par quoi on entend un diagramme carré

$$\begin{array}{ccc} X_1 & \longleftarrow & X_3 \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_0 & \longleftarrow & X_2 \end{array}$$

dans Ho_W provenant, à isomorphisme près, d'un carré W-cartésien dans $\mathcal{M}$ – donc isomorphe, dans $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{\Delta}_1 \times \mathbf{\Delta}_1, \mathrm{Ho}_W)$, a un carré *cartésien* `[dans` $\mathcal{M}$`]`

$$\begin{array}{ccc} Y_1 & \longleftarrow & Y_3 \ (\simeq Y_1 \times_{Y_0} Y_2) \\ {\scriptstyle p_1}\downarrow & & \downarrow \\ Y_0 & \underset{p_2}{\longleftarrow} & Y_2 \end{array} \quad ,$$

avec $p_1,\ p_2 \in \mathrm{Fib}_W$. (En fait, il suffit de p_1 ou p_2 dans Fib_W pour assurer le caractère W-cartésien du carré cartésien envisagé.) Je voudrais axiomatiser cette situation, histoire surtout de faire la liste des propriétés serviables essentielles de cette notion, et de la notion duale de carré W-cocartésien (ou W-homotopiquement cocartésien), dans le cas où $(\mathcal{M}, W)$ admet une théorie de la cofibre homotopique. L'espèce de structure, savoir celle des "catégories quadrangulées" (à gauche, à droite, bilatères) est une variante, dans un cas non additif, de la notion de catégorie triangulée dégagée par Verdier. Comme celle-ci, cette notion est en fait trop faible – ce n'est *pas* "la bonne" – mais elle a un intérêt pratique provisoire. La "bonne" notion (s'il en est une à part celle de dérivateur) devrait travailler avec une notion plus fine de carré et de carré W-cartésien, en travaillant systématiquement dans $\mathrm{HO}_W(\mathbf{\Delta}_1 \times \mathbf{\Delta}_1) = \mathcal{M}(\mathbf{\Delta}_1 \times \mathbf{\Delta}_1)W(\mathbf{\Delta}_1 \times \mathbf{\Delta}_1)^{-1}$ (où vivent les "vrais" carrés W-cartésiens !), et catégories similaires, telles que $\mathrm{HO}_W(\Psi)$, $\mathrm{HO}_W(\Phi)$. Mais les inclure dans une axiomatique ne faisant pas mention d'une catégorie de modèles $(\mathcal{M}, W)$, revient manifestement à mettre le doigt dans l'engrenage de la notion de dérivateur, et ce n'est pas mon propos pour l'instant.

[page 2]

Définition 1. J'appelle *"catégorie à carrés h-cartésiens",* ou *"catégorie quadrangulée à gauche",* une catégorie $\mathcal{H}$, munie d'un sous-ensemble Cart de l'ensemble $\mathrm{Hom}(\mathbf{\Delta}_1 \times \mathbf{\Delta}_1, \mathcal{H})$ des diagrammes carrés `[par carré on entend carré commutatif]`

p. 2

$$\begin{array}{ccc} X_1 & \longleftarrow & X_3 \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_0 & \longleftarrow & X_2 \end{array}$$

dans $\mathcal{H}$, carrés appelés *"h-cartésiens"* (h comme "homotopiquement"), cette donnée étant

[page 3]

soumise aux axiomes qui suivent, Cart (1) à Cart (…).
Comme je ne suis pas sûr de connaître d'avance toutes les propriétés essentielles, le nombre de ces axiomes reste pour le moment ouvert.
Cart (1) (Symétrie). Si un carré

$$\begin{array}{ccc} X_1 & \longleftarrow & X_3 \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_0 & \longleftarrow & X_2 \end{array}$$

est h-cartésien, de même le carré symétrique (obtenu en échangeant le rôle de X_1 et de X_2).
Cart (2) (Carrés triviaux). Soit

$$\begin{array}{ccc} X_1 & \xleftarrow{q_2} & X_3 \\ {\scriptstyle p_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q_1} \\ X_0 & \xleftarrow[p_2]{} & X_2 \end{array}$$


un carré dans $\mathcal{H}$, avec p_1 un isomorphisme. Alors le carré est h-cartésien si et seulement si q_1 est un isomorphisme.
Cart (3) (Carrés composés). Soit un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} X'_0 & \longleftarrow & X'_1 & \longleftarrow & X'_2 \\ \downarrow & \text{I} & \downarrow & \text{II} & \downarrow \\ X_0 & \longleftarrow & X_1 & \longleftarrow & X_2 \end{array} \quad ,$$

d'où les carrés I, II et III :

$$\begin{array}{ccc} X'_0 & \longleftarrow & X'_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_0 & \longleftarrow & X_2 \end{array}$$

(qu'on appelle *carré composé* ("horizontal") des carrés I et II). Supposons I h-cartésien. p. 3
Alors II est h-cartésien si et seulement si III l'est `[voir postface des éditeurs]`.
Corollaire. *Soit un diagramme commutatif cubique, qu'on peut considérer comme homomorphisme d'un carré* (*face supérieure du cube*) *dans un autre* (*face inférieure*) :



.

Si toutes les faces du cube[1] *sauf la face supérieure sont des carrés h-cartésiens (savoir la face inférieure et les quatre faces latérales), il en est de même de la face supérieure.*[2] [page 4]

[1] En fait, il suffit de la face inférieure, et des deux faces parallèles latérales (p. ex. celle de devant et celle de derrière).

[2] **Corollaire** (de Cart (3) et Cart (2)) : *tout carré isomorphe à un carré h-cartésien est h-cartésien.*

Ces axiomes sont dans la nature d'axiomes de stabilité, nous donnant des critères affirmant que certains carrés sont h-cartésiens, si telles conditions sont remplies (p. ex. que certains autres carrés sont déjà h-cartésiens). J'ai l'impression d'avoir épuisé ici les propriétés pertinentes de ce type (*i.e.* que les autres devraient pouvoir s'en déduire). À présent, je m'occupe de propriétés d'existence et d'unicité de carrés h-cartésien.

Cart (4) (Axiome du produit fibré). Tout diagramme

$$\begin{array}{ccc} & & X_1 \\ & & \downarrow \\ X_0 & \longleftarrow & X_2 \end{array}$$

dans $\mathcal{H}$ peut se compléter en un carré h-cartésien

$$\begin{array}{ccc} X_1 & \longleftarrow & X_3 \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_0 & \longleftarrow & X_2 \end{array} \quad .$$

L'axiome suivant (*cf.* son corollaire) assurera entre autres que le carré h-cartésien en question est *unique à isomorphisme près* – mais on fera attention qu'il n'est en général pas unique "à isomorphisme unique près".


Cart (5) (Axiome d'exactitude) Considérons deux carrés h-cartésiens p. 4

$$X = \begin{pmatrix} X_1 & \longleftarrow & X_3 \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_0 & \longleftarrow & X_2 \end{pmatrix} \qquad \text{et} \qquad Y = \begin{pmatrix} Y_1 & \longleftarrow & Y_3 \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y_0 & \longleftarrow & Y_2 \end{pmatrix}$$

et un homomorphisme $p = (p_0, p_1, p_2)$ entre les diagrammes de type

$$\Phi \;=\; \begin{array}{ccc} & & 1 \\ & & \downarrow \\ 0 & \longleftarrow & 2 \end{array}$$

associés (*cf.* diagramme en traits pleins ci-dessous) : [page 5]



Alors :

a) Il existe un homomorphisme $\bar{p} : X \longrightarrow Y$ induisant p, *i.e.* il existe une flèche p_3 de façon à compléter le diagramme cubique commutatif (en respectant donc la contrainte de commutativité pour les deux carrés adjacents à l'arête p_3).

b) Si de plus p_0, p_1, p_2 sont des isomorphismes, il en est de même de p_3 `[voir postface des éditeurs]`.

Prenant le cas où p_0, p_1, p_2 sont des identités, on trouve :

Corollaire 1. *Sous les conditions de* Cart (4)*, si on a* deux *carrés h-cartésiens X, X' qui complètent*

$$\begin{array}{ccc} & & X_1 \\ & \swarrow & \\ X_0 & & \\ & \nwarrow & \\ & & X_2 \end{array} \quad ,$$

il existe un homomorphisme de X dans X' qui induise l'identité sur les sommets d'indices 0, 1, 2*, et un tel homomorphisme est toujours un isomorphisme.*

Mais cet isomorphisme n'est pas forcément unique, en d'autres termes, un automorphisme d'un carré h-cartésien peut induire l'identité sur les sommets X_0, X_1, X_2, sans être l'identité.

Corollaire 2. *Considérons un carré commutatif* p. 5 [page 6]

$$Y = \begin{pmatrix} Y_1 & \longleftarrow & Y_3 \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y_0 & \longleftarrow & Y_2 \end{pmatrix} \quad ,$$

et un objet T de $\mathcal{H}$, d'où (posant $\mathrm{Hom}(T, X) = X(T)$*) un carré commutatif dans* (Ens)

$$\begin{array}{ccc} Y_1(T) & \longleftarrow & Y_3(T) \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y_0(T) & \longleftarrow & Y_2(T) \end{array} \quad ,$$

et par suite

$$Y_3(T) \longrightarrow Y_1(T) \times_{Y_0(T)} Y_2(T) \quad . \qquad (*)$$

Si Y est h-cartésien, cette application $(*)$ *est* surjective *quel que soit T.*

On applique Cart (5) à Y et au carré constant X de valeur T

$$X = \begin{array}{ccc} T & \xleftarrow{\mathrm{id}} & T \\ {\scriptstyle \mathrm{id}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} \\ T & \xleftarrow{\mathrm{id}} & T \end{array} \quad ,$$

en notant que la donnée de $p = (p_0, p_1, p_2)$ de

$$\begin{array}{ccc} T & & Y_1 \\ \downarrow & \text{dans} & \downarrow \\ T & \longleftarrow T & Y_0 \longleftarrow Y_2 \end{array}$$

revient à la donnée d'un élément du deuxième membre de $(*)$,

$$\begin{array}{ccc} Y_1 & \xleftarrow{p_1} & T \\ \downarrow & \swarrow^{p_0} & \downarrow{\scriptstyle p_2} \\ Y_0 & \longleftarrow & Y_2 \end{array} \quad ,$$

et que les éléments de $Y_3(T)$ qui s'envoient (par $(*)$) dans cet élément ne sont autres que les p_3 dont l'axiome Cart (5) affirme l'existence. p. 6 [page 7]

N.B. On notera que l'application surjective $(*)$ n'est en général *pas* bijective, *i.e.* le carré h-cartésien n'est en général pas cartésien.

N.B. Il y a une notion duale de *catégorie à carrés h-cocartésiens,* ou *catégorie quadrangulée à droite.* Le plus souvent, les deux structures sont présentes simultanément. Il y a lieu de dégager des propriétés qui relient les deux structures duales sur une même catégorie. Ainsi, sauf erreur, dans le cas $\mathcal{H}$ additive, les deux espèces de carrés, les h-cartésiens et les h-cocartésiens, devraient *coïncider.* (Il me faudra revenir là-dessus par la suite.) Dans le cas $\mathcal{H}$ "ponctuée", il y a l'adjonction des foncteurs Σ, Ω liés l'un à la structure quadrangulée droite, l'autre à la structure quadrangulée gauche. Et il y a, quand il y a des $\underline{\mathrm{Hom}}$ internes ou externes, des propriétés éventuelles de $\underline{\mathrm{Hom}}(X, Y)$ par rapport aux quadrangles h-cocartésiens en X, h-cartésiens en Y – mais c'est à peine un lien entre les deux structures …

2 Exemples

Un premier exemple trivial, est celui où $\mathcal{H}$ est stable par produits fibrés, et où les carrés h-cartésiens sont définis comme les carrés cartésiens. Les axiomes Cart (1) à Cart (5) sont alors des propriétés bien connues, ± tautologiques de la notion de carré cartésien. Et en un sens, le cas général doit se ramener à ce cas particulier banal. [page 8]

Le seul type d'autre cas que je connaisse, est celui où $\mathcal{H} = \mathcal{M}W^{-1}$, où W est un localiseur admettant une théorie de la fibre W-homotopique (*cf.* chapitre XII). Dans ce cas, on l'a dit, on prend comme carrés h-cartésiens dans $\mathcal{H}$ ceux qui sont isomorphes, dans $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{\Delta}_1 \times \mathbf{\Delta}_1, \mathcal{H})$, à un carré W-cartésien dans $\mathcal{M}$. Encore faut-il vérifier les axiomes Cart (1) à Cart (5). Je pense que je n'ai guère de chance d'y arriver que moyennant une

Proposition 1. *Moyennant des hypothèses sur* $(\mathcal{M}, W)$ *qui vont être dégagées ci-dessous, vérifiées en tous cas si* $(\mathcal{M}, W)$ *est quillénisable, sur la catégorie des ensembles ordonnés finis* (*cf.* XIII, p. 51)*, on a ceci : soit*

$$X = \begin{pmatrix} X_1 & \longleftarrow & X_3 \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_0 & \longleftarrow & X_2 \end{pmatrix}$$

un carré dans $\mathcal{M}$*, et soit* $\mathrm{ho}_W(X)$ *son image dans* $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{\Delta}_1 \times \mathbf{\Delta}_1, \mathcal{H})$*. Pour que* $\mathrm{ho}_W(X)$ *soit h-cartésien, il* faut (*et il suffit, bien sûr*) *que* X *soit* W*-cartésien* `[voir postface des éditeurs]`.

p. 7

Postface des éditeurs


La proposition ci-dessus est fausse. On rappelle que si $\mathcal{M}$ est une catégorie de modèles fermée de Quillen de classe d'équivalences faibles W, un carré commutatif

$$X = \begin{pmatrix} X_1 & \longleftarrow & X_3 \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_0 & \longleftarrow & X_2 \end{pmatrix}$$

de $\mathcal{M}$ est W-cartésien si et seulement si il existe un carré *cartésien*

$$Y = \begin{pmatrix} Y_1 & \longleftarrow & Y_3 \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y_0 & \longleftarrow & Y_2 \end{pmatrix}$$

avec $Y_1 \longrightarrow Y_0$ une fibration, et Y_0 et Y_2 fibrants (cette dernière condition étant superflue si la catégorie de modèles $\mathcal{M}$ est propre à droite), et un morphisme de carrés $s : X \longrightarrow Y$, $s = (s_0, s_1, s_2, s_3)$, *i.e.* un cube commutatif



,

tel que s soit une équivalence faible argument par argument, *i.e.* $s_0, s_1, s_2, s_3 \in W$. Il est équivalent de demander que pour *tout* diagramme commutatif à flèches verticales des équivalences faibles

$$\begin{array}{ccccc} X_1 & \longrightarrow & X_0 & \longleftarrow & X_2 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ Y_1 & \longrightarrow & Y_0 & \longleftarrow & Y_2 \end{array}$$

tel que $Y_1 \longrightarrow Y_0$ soit une fibration, et Y_0, Y_2 des objets fibrants, la flèche canonique $X_3 \longrightarrow Y_1 \times_{Y_0} Y_2$ soit une équivalence faible.

Supposons maintenant que la catégorie de modèles $\mathcal{M}$ soit ponctuée, autrement dit qu'elle admette un objet $*$ à la fois initial et final, et soit X un objet fibrant de $\mathcal{M}$. Choisissons une décomposition de la flèche $* \longrightarrow X$, en une équivalence faible suivie d'une fibration

$$* \longrightarrow C \longrightarrow X \quad ,$$

et formons le carré cartésien p. 8


$$\begin{array}{ccc} C & \longleftarrow & \Omega X \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longleftarrow & * \end{array} \quad ,$$

où par définition $\Omega X = C \times_X *$ est l'*espace des lacets* de X. Ce carré est W-cartésien. Par ailleurs, il est isomorphe dans $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{\Delta}_1 \times \mathbf{\Delta}_1,\ \mathcal{M}W^{-1})$ au carré trivial

$$\begin{array}{ccc} * & \longleftarrow & \Omega X \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longleftarrow & * \end{array} \quad .$$


Néanmoins, ce dernier n'est *pas* en général W-cartésien. En effet, s'il l'était, l'unique

flèche $s_3 : \Omega X \longrightarrow \Omega X$ de $\mathcal{M}$ rendant commutatif le cube



serait une équivalence faible. Or, comme la flèche s_3 se factorise par $* \times_X * \simeq *$, cela impliquerait que $\Omega X \to *$ est une équivalence faible. Cette condition est très restrictive. Si, par exemple, $\mathcal{M}$ est la catégorie de modèles des espaces topologiques pointés, et X un CW-complexe pointé, elle équivaut à la contractibilité de la composante connexe de X contenant le point base. De même, si $\mathcal{M}$ est la catégorie de modèles des complexes d'une catégorie abélienne de Grothendieck et X un complexe, elle signifie que X est acyclique.


Des considérations analogues montrent que les carrés h-cartésiens de $\mathcal{M}W^{-1}$, définis dans la section 2 comme étant les carrés commutatifs de $\mathcal{M}W^{-1}$ qui sont isomorphes dans $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{\Delta}_1 \times \mathbf{\Delta}_1,\ \mathcal{M}W^{-1})$ à un carré W-cartésien, ne satisfont pas à toutes les conditions de Cart (3) et Cart (5) de la section 1. En effet, supposons toujours que $\mathcal{M}$ soit ponctuée, et gardons les notations ci-dessus. Considérons le diagramme commutatif dans $\mathcal{M}W^{-1}$



où $*_{\Omega X}$ désigne l'unique endomorphisme de ΩX se factorisant par $*$. Il résulte de ce qui précède que le carré de gauche et le carré composé sont h-cartésiens. En revanche, le carré de droite ne l'est pas en général. En effet, si ce carré était isomorphe dans $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{\Delta}_1 \times \mathbf{\Delta}_1,\ \mathcal{M}W^{-1})$ à un carré W-cartésien, la flèche $*_{\Omega X}$ serait un isomorphisme

de $\mathcal{M}W^{-1}$, donc une équivalence faible de $\mathcal{M}$, ce qui impliquerait les mêmes conditions très restrictives que ci-dessus. Ainsi l'une des implications de l'axiome Cart 3 n'est pas satisfaite. p. 9

De même le cube commutatif dans $\mathcal{M}W^{-1}$



dont les faces horizontales sont h-cartésiennes, montre que la condition (b) de l'axiome Cart (5) n'est pas satisfaite en général.

p. —

LES DÉRIVATEURS

ALEXANDRE GROTHENDIECK

Chapitre XV

Théorèmes de factorisation (Modèles (2))

p. —

Note des éditeurs de l'édition transcrite.

Ce texte a été déchiffré et transcrit en LaTeX 2_ε par M. Künzer. Il a été édité par M. Künzer, J. Malgoire, et G. Maltsiniotis. La transcription est aussi fidèle que possible au manuscrit. Seules quelques corrections mineures évidentes ont été effectuées. Pour les rares ajouts ou commentaires des éditeurs, ainsi que pour la numérotation originale des pages du manuscrit, les caractères de machine à écrire `[typewriter]` entre crochets sont utilisés.

Cette édition est provisoire. Les remarques, commentaires et corrections sont bienvenus. Envoyer un message à :

[**e-mail address removed**]

G. Maltsiniotis

p. 1
[page 1]

1 Construction fondamentale : la suite transfinie de factorisation d'une flèche f.

Soit $\mathcal{M}$ une $\mathfrak{U}$-catégorie, stable par "petites" (*i.e.* $\mathfrak{U}$-petites) $\varinjlim$ filtrantes. Soit

$$C_0 \ \subset \ \mathrm{Fl}(\mathcal{M}) \tag{1.1}$$

un *petit* ensemble de flèches, on se propose de construire pour toute flèche f de $\mathcal{M}$, une factorisation

$$f \ = \ p\,i\,, \qquad i \ \in \ \widetilde{C_0} = ((C_0)_*)^* \ , \ \ p \ \in \ (C_0)_* \ . \tag{1.2}$$

Pour ceci, on va construire une suite ordinale de foncteurs

$$\left\{ \begin{array}{rcl} f & \longmapsto & X_\alpha(f) \ = \ X_\alpha(C_0, f) \\ X_\alpha : \underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M}) & \longrightarrow & \mathcal{M} \end{array} \right. \tag{1.3}$$

et des homomorphismes fonctoriels

$$i_\alpha(f) : \mathrm{source}\, f \ \longrightarrow \ X_\alpha(f) \ , \tag{1.4}$$

$$p_\alpha(f) : X_\alpha(f) \ \longrightarrow \ \mathrm{but}\, f \ , \tag{1.5}$$

de sorte qu'on aura le diagramme (où $X = \mathrm{source}\, f$, $Y = \mathrm{but}\, f$)

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad f \quad} & Y \\ & {\scriptstyle i_\alpha(f)} \searrow \quad \nearrow {\scriptstyle p_\alpha(f)} & \\ & X_\alpha(f) & \end{array} \ , \tag{1.6}$$

ce diagramme étant commutatif

$$f \;=\; p_\alpha(f) i_\alpha(f)\;. \tag{1.7}$$

On peut dire aussi qu'on a une section du foncteur canonique de "composition", transposé de $\mathbf{\Delta}_1 \longrightarrow \mathbf{\Delta}_2$, donné par $0 \longmapsto 0$, $1 \longmapsto 2$:

$$\left\{\begin{array}{l} \underline{\mathrm{Nerf}}_2(\mathcal{M}) \underset{\Phi_\alpha}{\overset{\gamma}{\rightleftarrows}} \underline{\mathrm{Nerf}}_1(\mathcal{M}) \;=\; \underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M})\;, \\ \\ \end{array}\right. \tag{1.8}$$

Φ comme "factorisation", où

p. 2
[page 2]

$$\Phi_\alpha(f) \;=\; \{\; X \xrightarrow{i_\alpha(f)} X_\alpha(f) \xrightarrow{p_\alpha(f)} Y \;\} \tag{1.9}$$

avec $p_\alpha(f) i_\alpha(f) = f$. La fonctorialité de 1.4 et 1.5, ou celle de Φ_α, *i.e.* de 1.9, s'exprime par le fait que tout carré commutatif

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ {\scriptstyle u_X}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u_Y} \\ X' & \xrightarrow{f'} & Y' \end{array} \tag{1.10}$$

dans $\mathcal{M}$, interprété comme flèche $u = (u_X, u_Y)$ de f dans f' dans $\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M})$, donne naissance au double carré commutatif

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{i_\alpha(f)} & X_\alpha(f) & \xrightarrow{p_\alpha(f)} & Y \\ \downarrow{\scriptstyle u_X} & & \downarrow{\scriptstyle X_\alpha(u)} & & \downarrow{\scriptstyle u_Y} \\ X' & \xrightarrow{i_\alpha(f')} & X_\alpha(f') & \xrightarrow{p_\alpha(f')} & Y'\;. \end{array} \tag{1.11}$$

N.B. Quand on voudra expliciter la dépendance de ces constructions par rapport à C_0, on écrira

$$X_\alpha(C_0, f)\;, \qquad i_\alpha(C_0, f)\;, \qquad p_\alpha(C_0, f)\;, \qquad \Phi_\alpha(C_0, f)\;,$$

ou

$$X_\alpha(C_0, -) \;\text{ ou }\; X_\alpha^{C_0}\;, \qquad i_\alpha(C_0, -) \;\text{ ou }\; i_\alpha^{C_0} \qquad \textit{etc.}\;,$$

au lieu de $X_\alpha(f)$, $i_\alpha(f)$, …


Voici les propriétés essentielles du système inductif ordinal des $X_\alpha(f)$ ou $\Phi_\alpha(f)$.

1. $X_0(f) = X$, $i_0(f) = \mathrm{id}_X$, $p_0(f) = f$ (*i.e.* la factorisation $\Phi_0(f)$ de f est la factorisation triviale $X \xrightarrow{\mathrm{id}_X} X \xrightarrow{f} Y$).

[page 3]

2.

$$\begin{aligned} X_{\alpha+1}(f) \;&=\; X_1(p_\alpha(f)) \\ i_{\alpha+1}(f) \;&=\; i_1(p_\alpha(f)) \circ i_\alpha(f) \\ p_{\alpha+1}(f) \;&=\; p_1(p_\alpha(f)) \end{aligned}$$



ou mieux p. 3

$$\begin{array}{ccccccc}
X & & \xrightarrow{\qquad\qquad f\qquad\qquad} & & & & Y \\
\downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} & & & & & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} \\
X & \xrightarrow{i_\alpha(f)} & X_\alpha(f) & & \xrightarrow{\qquad p_\alpha(f)\qquad} & & Y \\
\downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} & & & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} \\
X & \longrightarrow & X_\alpha(f) & \xrightarrow{i_1(p_\alpha(f))} & \underbrace{X_1(p_\alpha(f))}_{=X_{\alpha+1}(f)} & \xrightarrow{p_1(p_\alpha(f))} & Y\,.
\end{array} \tag{1.12}$$

Le morphisme de transition $X_\alpha(f) \longrightarrow X_{\alpha+1}(f)$ est

$$X_\alpha(f) \xrightarrow{i_1(p_\alpha(f))} X_1(p_\alpha(f)) = X_{\alpha+1}(f)\,.$$

3. Si α est un ordinal limite, on a

$$\begin{cases}
X_\alpha(f) = \varinjlim_{\alpha'<\alpha} X_{\alpha'}(f). \\
i_\alpha(f) = \text{morphisme canonique de } X = X_0(f) \text{ dans la limite inductive.} \\
p_\alpha(f) = \text{limite projective des } p_{\alpha'}(f) : X_{\alpha'}(f) \longrightarrow Y.
\end{cases}$$

(On peut considérer la limite inductive définissant $X_\alpha(f)$ comme une limite dans $X\backslash\mathcal{M}/Y\ldots$)

Les morphismes de transition

$$X_{\alpha'}(f) \longrightarrow X_\alpha(f) \qquad (\,\alpha' < \alpha\,)$$

sont les morphismes canoniques relatifs au système inductif des $X_{\alpha'}(f)$.

On peut donc dire que la suite ordinale des factorisations fonctorielles $\Phi_\alpha(f)$ de f variable, se déduit de la factorisation fonctorielle $\Phi_1(f)$ de f en [page 4]

$$X \xrightarrow{i_1(f)} X_1(f) \xrightarrow{p_1(f)} Y \qquad (f : X \to Y)$$

par "itération transfinie à droite", *i.e.* en regardant les opérations Φ_α comme des foncteurs

$$\begin{cases}
p_\alpha : \underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M}) \\
\qquad\quad f \longmapsto p_\alpha(f)\,,
\end{cases}$$ [1]

munis d'homomorphismes fonctoriels (au-dessus de $\mathcal{M}$)

$$\mathrm{id}_{\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M})} \longrightarrow p_\alpha\,.$$

Ainsi, si on considère p. 4

$$\begin{cases}
\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M}) & \text{comme objet de CAT}/\mathcal{M} \text{ par le foncteur } f \longmapsto \text{but } f \\
\text{où} & \text{CAT est la catégorie des catégories } \textit{éléments de } \mathfrak{V}\text{, univers} \\
& \text{tel que } \mathfrak{U} \in \mathfrak{V}\text{, d'où Cat} \overset{(\text{déf})}{=} \mathrm{Cat}^{\mathfrak{U}},\ \mathcal{M},\ \underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M}) \in \mathrm{CAT},
\end{cases}$$

1. **N.B.** p_α respecte les structures de catégories *sur* $\mathcal{M}$, via les foncteurs but : $\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M}) \longrightarrow \mathcal{M}$, *i.e.* $\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M})$ est considérée comme objet de CAT/$\mathcal{M}$.

on a un endofoncteur p_1 de $\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M})$ sur $\mathcal{M}$, et un homomorphisme fonctoriel

$$i_1 \ : \ \mathrm{id}_{\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M})/\mathcal{M}} \longrightarrow p_1 \ , \qquad \textit{i.e.} \qquad \begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad f \quad} & Y \\ & {\scriptstyle i_1(f)} \searrow \quad \nearrow {\scriptstyle p_1(f)} & \\ & \underbrace{X_1(f)}_{=\,\mathrm{source}\, p_1(f)} & \end{array} \ , \qquad (1.13)$$

et la description de la suite ordinale des endofoncteurs p_α de $\underline{\mathrm{Fl}}\,\mathcal{M}/\mathcal{M}$ résulte de cette seule donnée, compte tenu que les petites limites filtrantes existent dans les fibres de $\underline{\mathrm{Fl}}\,\mathcal{M} \xrightarrow{\text{but}} \mathcal{M}$.

[page 5]

$$\begin{array}{ccccccccccc} X & \xrightarrow{i_1(f)} & X_1(f) & \xrightarrow{i_1(p_1(f))} & X_2(f) & \longrightarrow \cdots \longrightarrow & X_\alpha(f) & \xrightarrow{i_1(p_\alpha(f))} & X_{\alpha+1}(f) & \longrightarrow \cdots \\ & \searrow^{f} & \downarrow{\scriptstyle p_1(f)} & \nearrow{\scriptstyle p_2(f)} & & & \nearrow{\scriptstyle p_\alpha(f)} & \nearrow{\scriptstyle p_{\alpha+1}(f)=p_1(p_\alpha(f))} & & \\ & & Y & & & & & & & \end{array} \qquad (1.14)$$

Donc, pour achever de définir la suite ordinale des $X_\alpha(f)$ (munie des $i_\alpha(f)$, $p_\alpha(f)$), ou des $p_\alpha(f)$ (munie des $i_\alpha(f)$), il reste à décrire $X_1(f)$, $i_1(f)$, $p_1(f)$.

La propriété essentielle de ce triple dont nous aurons besoin est la suivante :

(1.15) **Fact**(C_0) (propriété de factorisation par rapport à C_0).
Pour tout diagramme commutatif

$$D : \qquad \begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & X \\ {\scriptstyle i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ B & \longrightarrow & Y \end{array} \qquad \text{avec } i \in C_0 \ ,$$

d'où un diagramme traits pleins

$$\begin{array}{ccccc} A & \longrightarrow & X & & \\ {\scriptstyle i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i_D} & \searrow^{i_1(f)} & \\ B & \longrightarrow & X_D \overset{\text{déf}}{=} X \amalg_A B & \xrightarrow{u_D} & X_1(f) \\ & & \downarrow{\scriptstyle p_D} & \searrow_{p_1(f)} & \\ & & Y\ , & & \end{array}$$

il existe un homomorphisme de la factorisation $f = p_D i_D$ de f dans la factorisation $f = p_1(f) i_1(f)$. p. 5

Pour formuler cette condition, j'ai utilisé l'existence des sommes amalgamées X_D, *i.e.* la condition sur C_0 :

[page 6]

(1.16) Les flèches $i \in C_0$ sont coquarrables, *i.e.* pour un diagramme

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{u} & X \\ {\scriptstyle i}\downarrow & & \\ B & & \end{array}$$

avec $i \in C_0$, la somme amalgamée existe.

Mais on peut formuler 1.15 aussi ainsi, indépendamment de l'hypothèse (1.16) :

(1.17) Pour tout carré commutatif

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{u} & X \\ {\scriptstyle i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ B & \xrightarrow{v} & Y \end{array} \quad ,$$

avec $i \in C_0$, il existe un carré commutatif traits pleins

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{u} & X \\ {\scriptstyle i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i_1(f)} \\ B & \xrightarrow{v_1} & X_1(f) \\ & \searrow^{v} & \downarrow{\scriptstyle p_1(f)} \\ & & Y \end{array}$$

tel que $v = p_1(f)v_1$.

Ceci a pour conséquence le

Corollaire 1 (de 1.17). *Soit $f \in \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$, et α un ordinal ($\in \mathfrak{U}$). Pour tout carré commutatif*

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{u_\alpha} & X_\alpha(f) \\ {\scriptstyle i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p_\alpha(f)} \\ B & \xrightarrow{v} & Y \end{array}$$

il existe un carré commutatif p. 6

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{u_\alpha} & X_\alpha(f) \\ {\scriptstyle i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \text{trans.}} \\ B & \xrightarrow{v_1} & X_{\alpha+1}(f) \\ & \searrow^{v} & \downarrow{\scriptstyle p_{\alpha+1}(f)} \\ & & Y \end{array} \qquad p_\alpha(f)$$

tel que

$$v \;=\; p_{\alpha+1}(f)\; v_1 \;.$$

[page 7]

Corollaire 2. *Soit π un cardinal ($\in \mathfrak{U}$) tel que pour toute flèche $i : A \longrightarrow B$ dans C_0, la source A soit π-accessible. Soit α un ordinal grand devant π* (i.e. *tel que l'ensemble ordonné I_α des ordinaux $\alpha' < \alpha$ soit grand devant π*) *– p. ex. α le premier ordinal dont le cardinal soit $> \pi$. Alors pour toute flèche $f \in \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$, on a $p_\alpha(f) \in (C_0)_*$.*


Démonstration. Cela signifie que pour tout carré commutatif

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{u} & X_\alpha(f) \\ {\scriptstyle i}\downarrow & \overset{w}{\nearrow} & \downarrow{\scriptstyle p_\alpha(f)} \\ B & \xrightarrow{v} & Y \;, \end{array} \qquad (*)$$


avec $i \in C_0$, la flèche pointillée w (avec $wi = u$, $p_\alpha(f)w = v$) existe. Or

$$X_\alpha(f) = \varinjlim_{\alpha' \in I_\alpha} X_{\alpha'}(f) \;,$$

donc A étant π-accessible et I_α grand devant π, u provient d'une flèche $u_{\alpha'} : A \longrightarrow X_{\alpha'}(f)$, et (quitte à remplacer α' par $\alpha'' > \alpha'$ et $u_{\alpha'}$ par le composé $u_{\alpha''} : A \longrightarrow X_{\alpha'}(f) \longrightarrow X_{\alpha''}(f)$) on peut supposer $p_{\alpha'}(f)u_{\alpha'} = vi$, *i.e.* que $(*)$ provient d'un carré commutatif



et appliquant le corollaire 1, on trouve p. 7



avec $v = p_{\alpha+1}(f)v_1$, et on prendra

$$w \;=\; \mathrm{trans}_{\alpha,\alpha'+1} \circ v_1 \ .$$

Mais on veut une factorisation de f, flèche quelconque dans $\mathcal{M}$, en [page 8]

$$f \;=\; p\ i \ , \qquad \text{avec} \;\; p \in (C_0)_* \;\; \textit{et} \;\; i \in \widetilde{C_0} \ ,$$

donc il faut encore énoncer une propriété, assurant que les $i_\alpha(f)$ sont dans $\widetilde{C_0}$. On aura même quelque chose de plus précis. Introduisons

(1.18) $C_0' =$ plus petit sous-ensemble de $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ contenant C_0, stable par cochangement de base (chaque fois qu'il existe).

$C_0'' =$ ensemble des flèches qui sont soit dans C_0', soit des sommes amalgamées d'une famille *non vide* de telles flèches $A \xrightarrow{i_\alpha} B_\alpha$ de même source A, $i_\alpha \in C_0'$; la flèche $A \longrightarrow B = \coprod_\alpha {}_{(A)}B_\alpha$ est dans C_0''.

(La condition 1.16 implique que les éléments de C_0' sont coquarrables, et cela suffit, avec la condition de stabilité de $\mathcal{M}$ par $\varinjlim$ filtrantes, à assurer que les sommes amalgamées infinies envisagées existent dans $\mathcal{M}$.)

N.B. C_0'' est *égal* au plus petit ensemble de flèches contenant C_0 et stable par cochangement de base et par petites sommes amalgamées. `[Si les petites sommes existent dans` $\mathcal{M}$`, alors` C_0'' `est aussi l'ensemble des flèches obtenues par cochangement de base à partir de sommes de flèches de` C_0`.]`

(1.19) $C_0''' =$ plus petit sous-ensemble de $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ contenant C_0'', et stable de plus par limites inductives ordinales strictes, *i.e.* pour un système inductif ordinal $(A_\alpha)_{\alpha<\alpha_0}$, tel que pour α ordinal limite on ait $A_\alpha \xleftarrow{\sim} \varinjlim_{\alpha' \in I_\alpha} A_{\alpha'}$, si les morphismes de transition $i_{\beta,\alpha} : A_\alpha \longrightarrow A_\beta$ sont dans C_0''', de même les morphismes canoniques

$$A_\alpha \xrightarrow{i_\alpha} \varinjlim_{\beta \in I_{\alpha_0}} A_\beta \ .^{2}$$

p. 8 [page 9]

La proposition 2, p. 4 de XIII assure que l'on a

$$C_0''' \ \subset \ \widetilde{C_0}\ .$$

Ceci posé, voici la deuxième propriété essentielle de la factorisation $f = p_1(f)i_1(f)$ (la première étant 1.17) :

(1.20) Pour toute flèche $f \in \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$, on a $i_1(f) \in C_0''$.

Il en résulte aussitôt, par récurrence ordinale :

(1.21) Pour toute flèche $f \in \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ et tout ordinal $\alpha \in \mathfrak{U}$, on a $i_\alpha(f) \in C_0'''$, a fortiori $i_\alpha(f) \in \widetilde{C_0}$.

Donc si α est grand devant π (*cf.* cor. 2, page 7), la factorisation $f = p_\alpha(f)i_\alpha(f)$ satisfait

$$\left\{\begin{array}{l} f = p_\alpha(f)i_\alpha(f), \text{ avec } i_\alpha(f) \in C_0''' \subset \widetilde{C_0} = \Phi \texttt{ [à ne pas} \\ \texttt{confondre avec } \Phi_\alpha\texttt{]}, \ p_\alpha(f) \in C_{0*} = \Psi, \text{ lorsque } \alpha \text{ est} \\ \text{grand devant } \pi, \text{ les sources des } i \in C_0 \ \pi\text{-accessibles.} \end{array}\right. \tag{1.22}$$

Il reste à construire le foncteur $f \longmapsto X_1(f)$, avec $i_1(f)$, $p_1(f)$, satisfaisant les conditions (1.17) et (1.20), sous l'hypothèse (1.16) que les $i \in C_0$ sont coquarrables. On considère alors, pour $f \in \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ fixé, l'ensemble $\Delta(f)$ (ou $\Delta(C_0, f)$) de *tous* les diagrammes D de la forme (1.15), avec $i \in C_0$, et on pose

$$X_1(f) \ = \ \coprod_{D \in \Delta(f)} {}_{(X)}X_D \tag{1.23}$$

(somme amalgamée sous X, *i.e.* somme indexée par $\Delta(f)$ dans $X\backslash\mathcal{M}$), le morphisme $X \xrightarrow{i_1(f)} X_1(f)$ étant le morphisme costructural, et le morphisme $X_1(f) \xrightarrow{p_1(f)} Y$ étant celui ayant pour composantes les p_D. En somme, on fait "au plus économique" (et au plus naturel) pour assurer la validité de (1.17), sous la forme équivalente (1.15). D'autre part, par définition de C_0', C_0'', les i_D sont dans C_0', et $i_1(f)$ est dans C_0'', ce qui est (1.20)[3]. [page 10]

Pour résumer :

Théorème 1. *Soient $\mathcal{M}$ une $\mathfrak{U}$-catégorie stable par $\mathfrak{U}$-limites inductives filtrantes, $C_0 \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ un petit ensemble de flèches de $\mathcal{M}$. On suppose les flèches $i \in C_0$ coquarrables. Cela assure la définition d'un endofoncteur $f \longmapsto p_1(f)$ de $\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M})$, et d'un homomorphisme fonctoriel $i_1 : \mathrm{id}_{\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M})} \longrightarrow p_1$,* i.e. *$i_1(f) : f \longrightarrow p_1(f)$, induisant l'identité sur les objets buts de f et de $p_1(f)$,*

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\ i_1(f)\ } & X_1(f) \\ & {\scriptstyle f}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle p_1(f)} & \\ & Y\ , & \end{array}$$

d'où par itération un système inductif ordinal d'endofoncteurs $f \longmapsto p_\alpha(f)$ de $\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M})$, et d'homomorphismes $i_\alpha : \mathrm{id}_{\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M})} \longrightarrow p_\alpha$, i.e. p. 9

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\ i_\alpha(f)\ } & X_\alpha(f) \\ & {\scriptstyle f}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle p_\alpha(f)} & \\ & Y\ , & \end{array}$$

formant un système inductif ordinal de factorisations de f fonctorielles en f.

Ceci posé, on a :

2. $C_0 \subset C_0' \subset C_0'' \subset C_0'''$
3. Il faudrait quand même expliciter la dépendance fonctorielle de $X_1(f)$ par rapport à f !!! [page 11]

a) *Pour tout ordinal α, on a $i_\alpha(f) \in \Phi$.*

b) *Supposons que les sources des $i \in C_0$ soient accessibles et soit alors π un cardinal dans $\mathfrak{U}$ tel qu'elles soient π-accessibles. Alors pour tout nombre ordinal α grand devant π, on a $p_\alpha(f) \in C_{0*}$, donc*

$$f \;=\; p_\alpha(f)\, i_\alpha(f) \qquad \textit{avec} \qquad i_\alpha(f) \in \Phi\,, \qquad p_\alpha(f) \in \Psi\,.$$

On a un résultat légèrement plus précis, que voici :

Corollaire 1. *Soit Φ_0 une partie de $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ telle que*

$$C_0''' \;\subset\; \Phi_0 \;\subset\; \Phi \qquad (\textit{d'où}\;\; C_0 \subset \Phi_0 \subset \Phi)\,, \tag{1.24}$$

où $C_0''' \subset \Phi$ est définie dans 1.19, *p.* 8. *Par exemple, si Φ_0 est une partie de $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ satisfaisant*

$$C_0 \;\subset\; \Phi_0 \;\subset\; \Phi\,,$$

et stable par cochangement de base, par petites sommes amalgamées (*cf.* (1.18), p. 8), *par $\varinjlim$ ordinales strictes* (*cf.* (1.19), p. 8), *elle satisfait* (1.24). (**N.B.** *Si $\mathcal{M}$ admet des sommes amalgamées simples, de tels Φ_0 existent trivialement, il suffit de prendre $\Phi_0 = \Phi$.*)

Ceci posé, pour toute flèche f dans $\mathcal{M}$, et tout ordinal α, on a [page 12]

$$i_\alpha(f) \;\in\; \Phi_0\,.$$

Corollaire 2. *Supposons que les sources des flèches $i \in C_0$ soient accessibles, et soit Φ_0 comme dans le corollaire* 1 (p. ex. $\Phi_0 = C_0'''$). *Alors le couple (Φ_0, Ψ) est un précouple de Quillen,* i.e.

a) $\Phi_0 \longleftrightarrow \Psi$, i.e. $\Psi \subset \Phi_{0*}$ (*ou ce qui revient au même,* $\Phi_0 \subset \Psi^*$), *et*

b) *on a la propriété de factorisation de Quillen.*

Cela implique donc que Φ $(= \widetilde{C_0} = \widetilde{\Phi_0})$ est formé des flèches qui sont facteurs directs de flèches de Φ_0. Donc si Φ_0 est stable par facteurs directs, on a $\Phi_0 = \Phi$, i.e. *Φ_0 est clos à gauche.*

p. 10

2 Variation des factorisations $f = p_\alpha i_\alpha$ avec la partie C_0 génératrice

Je dis que le système inductif ordinal de foncteurs $p_\alpha = p_\alpha^{C_0} : \underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M})$, muni des flèches [page 13]

$$i_\alpha^{C_0} \;:\; \mathrm{id}_{\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M})} \longrightarrow p_\alpha^{C_0}\,,$$

dépend fonctoriellement de C_0, quand on considère C_0 comme un élément de l'ensemble ordonné des *petites* parties de $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$, formées de flèches coquarrables (donc de l'ensemble ordonné

$$\mathfrak{P}_{\mathfrak{U}\text{-petites}}(\mathrm{Fl}_{\mathrm{coquar.}}(\mathcal{M}))\quad).$$

Si on a une inclusion

$$C_0 \;\hookrightarrow\; C_1\,, \tag{2.1}$$

on en déduit pour tout ordinal α un homomorphisme fonctoriel

$$u_\alpha \;=\; u_\alpha^{C_1,C_0} \;:\; X_\alpha^{C_0} \;\longrightarrow\; X_\alpha^{C_1}\,, \tag{2.2}$$

rendant commutatifs les carrés déduits de $f : X \longrightarrow Y$ dans $\mathcal{M}$,

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{i_\alpha^{C_0}(f)} & X_\alpha^{C_0}(f) & \xrightarrow{p_\alpha^{C_0}(f)} & Y \\ {\scriptstyle \mathrm{id}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u_\alpha(f)} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} \\ X & \xrightarrow{i_\alpha^{C_1}(f)} & X_\alpha^{C_1}(f) & \xrightarrow{p_\alpha^{C_1}(f)} & Y\,, \end{array} \tag{2.3}$$

et compatible avec les morphismes de transition pour α variable,

$$\begin{array}{ccc} X_\alpha^{C_0} & \xrightarrow{\mathrm{trans}_{\beta,\alpha}^{C_0}} & X_\beta^{C_0} \\ {\scriptstyle u_\alpha}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u_\beta} \\ X_\alpha^{C_1} & \xrightarrow{\mathrm{trans}_{\beta,\alpha}^{C_1}} & X_\beta^{C_1}\,. \end{array} \tag{2.4}$$

Pour définir les u_α, satisfaisant aux conditions précédentes, il suffit de les définir pour $\alpha = 1$ "et d'itérer" : [page 14]

$$\begin{array}{ccccc} & & X_1^{C_0}(f) & & \\ & {\scriptstyle i_1^{C_0}(f)}\nearrow & \downarrow{\scriptstyle u_1(f)} & \searrow{\scriptstyle p_1^{C_0}(f)} & \\ X & & & & Y \\ & {\scriptstyle i_1^{C_1}(f)}\searrow & & \nearrow{\scriptstyle p_1^{C_1}(f)} & \\ & & X_1^{C_1}(f) & & . \end{array} \tag{2.5}$$

Or $X_1^{C_0}(f)$ est défini comme une somme directe dans $X\backslash\mathcal{M}/Y$, relative à un ensemble d'indices $\Delta(C_0, f)$ *contenu* dans $\Delta(C_1, f)$ – et la famille d'objets dont on prend la somme directe étant induite d'une famille (non petite) dont l'ensemble d'indices serait $\Delta(\mathrm{Fl}_{\mathrm{coquar.}}(\mathcal{M}), f)$, savoir formé de *tous* les diagrammes carrés p. 11

$$D : \quad \begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{u} & X \\ {\scriptstyle i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ B & \xrightarrow{v} & Y \end{array} \qquad \text{avec } i \text{ coquarrable sans plus ,}$$

la définition des X_D, i_D, p_D associés à D ne dépendant que de D, et non de l'ensemble C_0 ou C_1 de flèches coquarrables qui contient i. Ceci dit, la flèche $u_1(f)$ dans (2.5) n'est autre que l'inclusion canonique d'une somme amalgamée partielle, indexée par $\Delta(C_0, f)$, dans la somme amalgamée correspondante à l'ensemble d'indices plus grand. La fonctorialité de cette flèche $u_1(f)$, pour f variable, "est immédiate", elle résulte de la commutativité du carré, associé à un morphisme $v = (v_X, v_Y)$ de flèches [page 15]

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ {\scriptstyle v_X}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle v_Y} \\ X' & \xrightarrow{f'} & Y'\,, \end{array} \tag{2.6}$$

savoir le diagramme d'applications entre ensembles d'indices

$$\begin{array}{ccc} \Delta(C_0, f) & \xrightarrow{u_1(f)} & \Delta(C_1, f) \\ {\scriptstyle \text{dépendance fonctorielle en } f \text{ de } \Delta(C_0,f)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \text{dépendance fonctorielle en } f \text{ de } \Delta(C_1,f)} \\ \Delta(C_0, f') & \xrightarrow{u_1(f')} & \Delta(C_1, f') \end{array} \tag{2.7}$$

(commutativité qui revient à dire que $\Delta(C_0, f)$ peut être considéré comme un foncteur en le couple (C_0, f) comme objet de la catégorie produit $\mathfrak{P}_{\text{pet.}}(\text{Fl}_{\text{coquar.}}(\mathcal{M})) \times \underline{\text{Fl}}(\mathcal{M})$ …). Le carré commutatif (2.7) est la partie "indices" d'un carré commutatif entre familles d'objets $\mathscr{X}(C_0, f)$, $\mathscr{X}(C_0, f')$, $\mathscr{X}(C_1, f)$, $\mathscr{X}(C_1, f')$, indexés par ces ensembles, savoir [page 16] les $X_D^{C_0}$ et les $X_D^{C_1}$ relatifs aux diagrammes D impliquant, soit la flèche f, soit la flèche f' …

Or la construction canonique du système inductif ordinal p_α, avec les $i_\alpha : \text{id}_{\underline{\text{Fl}}(\mathcal{M})} \longrightarrow p_\alpha$, est fonctorielle par rapport à la donnée initiale p_1, i_1 – je n'explicite pas le détail de la fonctorialité, bien que je devrais …

3 Majoration des cardinaux

Je suppose à présent que $\mathcal{M}$ est muni d'une *filtration cardinale*

$$(\text{Filt}^\pi)_{\pi \geq \pi_0} \qquad (\pi_0,\ \pi \text{ cardinaux dans } \mathfrak{U}) \tag{3.1}$$

(SGA 4 I 9.12, p. 149), les Filt^π stables par sommes amalgamées simples (chaque fois qu'elles existent), donc aussi par sommes amalgamées infinies indexées par des ensembles d'indices de cardinal $\leq \pi$. On suppose de plus que tout objet de Filt^{π_0} soit accessible, et p. 12 on désigne par π_1 le plus petit cardinal tel que $\pi_1 \geq \pi_0$ et que les objets de Filt^{π_0} soient π_1-accessibles. Désignant, pour tout cardinal, par $\mathcal{M}_\pi$ le sous-ensemble de $\text{Ob}\,\mathcal{M}$ formé des objets π-accessibles, on aura alors pour tout $\pi \geq \pi_1$ (*loc. cit.* 9.16)

$$\mathcal{M}_\pi \ \subset\ \text{Filt}^\pi \ \subset\ \mathcal{M}_{(\pi^{\pi_0})} \qquad (\text{si } \pi \geq \pi_1)\,, \tag{3.2}$$

donc si $\pi^{\pi_0} = \pi$, p. ex. si $\pi = 2^c$ avec $c \geq \pi_0$, on aura [page 17]

$$\text{Filt}^\pi \ =\ \mathcal{M}_\pi\,. \tag{3.2 bis}$$

(Si on admet l'hypothèse du continu généralisée, on a $\pi^{\pi_0} = \pi$ pour tout $\pi > \pi_0$, donc $\text{Filt}^\pi = \mathcal{M}_\pi$ si $\pi \geq \pi_1$ et $\pi > \pi_0$.)

Je pose, pour tout cardinal $\pi \geq \pi_0$,

$$\text{Fl}^\pi(\mathcal{M}) \ =\ \{\ f \in \text{Fl}(\mathcal{M}) \mid \text{source et but de } f \text{ sont dans } \text{Filt}^\pi\ \} \tag{3.3}$$

– ce qui sans doute donne une filtration cardinale sur $\underline{\text{Fl}}(\mathcal{M})$ (mais ce n'est pas là notre souci …). Mon but à présent, c'est de dégager des conditions sur $C_0 \subset \text{Fl}_{\text{coquar.}}(\mathcal{M})$ (petite partie de $\text{Fl}(\mathcal{M})$) et sur le cardinal π, et l'ordinal α, pour que l'on ait

$$\begin{aligned} f \in \text{Fl}^\pi(\mathcal{M}) \ &\overset{?}{\Longrightarrow}\ X_\alpha(f) \in \text{Filt}^\pi \\ &\quad (\textit{i.e. } p_\alpha(f) \in \text{Fl}^\pi(\mathcal{M}),\ \text{ou encore } i_\alpha(f) \in \text{Fl}^\pi(\mathcal{M}))\,. \end{aligned} \tag{3.4}$$

Plus généralement, je me propose de donner une estimation de la "cardinalité" de $X_\alpha(f)$, pour C_0 fixé, en fonction de C_0, de f, de α, plus exactement, en fonction des trois cardinaux $\pi(C_0)$, $\pi(f)$, $\pi(\alpha)$ définis comme

$$\left\{\begin{array}{rcl} \pi(C_0) & = & \text{plus petit cardinal tel que } C_0 \subset \text{Fl}^\pi(\mathcal{M}) \\ \pi(f) & = & \pi(\{f\}) \ =\ \text{plus petit cardinal tel que } f \in \text{Fl}^\pi(\mathcal{M}) \\ \pi(\alpha) & = & \text{card}\,\alpha\,. \end{array}\right. \tag{3.5}$$

Donc je cherche une fonction cardinale de variables cardinales φ, telle que l'on ait [page 18]

$$X_\alpha(f) \in \mathrm{Filt}^\pi \qquad \text{si} \qquad \pi = \varphi(\underbrace{\pi(C_0)}_{r}, \underbrace{\pi(f)}_{s}, \underbrace{\pi(\alpha)}_{t}). \tag{3.6}$$

L'estimation cruciale concernera sûrement le cas $\alpha = 1$. Notons que $X_1^{C_0}(f) = X_1(f)$ est défini comme une somme amalgamée (en général infinie) d'objets X_D, pour un ensemble $\Delta(C_0, f) = \Delta(f)$ de diagrammes, savoir les diagrammes commutatifs

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & X \\ {\scriptstyle i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ B & \longrightarrow & Y \end{array}$$

avec $i \in C_0$. Pour un i fixé, et un f fixé, le cardinal de l'ensemble des diagrammes de ce type est majoré par celui de $\mathrm{Hom}(A, X) \times \mathrm{Hom}(B, Y)$. On a $A, B \in \mathrm{Filt}^r$, $X, Y \in \mathrm{Filt}^s$, donc il nous faut une majoration de p. 13

$$\mathrm{card}\,\mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(A, X), \qquad A \in \mathrm{Filt}^r, \qquad X \in \mathrm{Filt}^s.$$

Voici les majorations essentielles dans ce sens : [page 19]

Proposition 3.1. *Soit π_0 le cardinal initial de la filtration cardinale $(\mathrm{Filt}^\pi)_{\pi \geq \pi_0}$ envisagé, π_1 le plus petit cardinal $\geq \pi_0$ tel que les objets de Filt^{π_0} soient π_1-accessibles, $C_1 = \mathrm{card}\,\underbrace{\underline{\mathrm{Fl}}^{\pi_1}(\widetilde{\mathcal{M}})}_{=\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M}^{\pi_1})}$[4]. Pour tout cardinal $\pi \geq \pi_0$, je désigne par $\mathcal{M}^\pi$ la sous-catégorie strictement pleine de $\mathcal{M}$ dont l'ensemble des objets est Filt^π. Enfin, si $\mathcal{C}$ est une catégorie, je désigne par $\widetilde{\mathcal{C}}$ l'ensemble des classes d'isomorphie d'objets de $\mathcal{C}$.*[5]

1°) *Si $r \geq \sup(\pi_1, C_1)$, on a*

$$\mathrm{card}\,(\underbrace{\widetilde{\underline{\mathrm{Fl}}^r(\mathcal{M})}}_{=\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M}^r)}) \leq 2^{(r^{\pi_0})} \quad (= 2^r, \text{ si } r = 2^c, \text{ avec } c \geq \pi_0). \tag{3.7}$$

2°) *Si $r, s \geq \sup(\pi_1, C_1)$, et si $A \in \mathrm{Filt}^r$, $X \in \mathrm{Filt}^s$, on a*

$$\mathrm{card}\,\mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(A, X) \leq s^{(r^{\pi_0})} \qquad \begin{cases} = s^r & \text{si } r = 2^c, \text{ avec } c \geq \pi_0, \\ = s & \text{si } s = 2^{c'}, \text{ avec } c' \geq r^{\pi_0}. \end{cases} \tag{3.8}$$

$$\mathrm{card}\,\widetilde{\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M}^r/X)} \leq s^{(r^{\pi_0})} \tag{3.9}$$

N.B. Si on admet l'hypothèse du continu généralisée, qui implique que $\pi^{\pi'} = \pi$ si $\pi > \pi'$ (π cardinal infini, $\pi' \geq 1$), alors prenant r tel que $r > \pi_0$, les formules précédentes donnent (avec de plus $r \geq \sup(\pi_1, C_1)$) :

$$\mathrm{card}\,\widetilde{\underline{\mathrm{Fl}}^r(\mathcal{M})} \leq 2^r, \tag{3.7 bis}$$

$$\mathrm{card}\,\mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(A, X) \leq s^r \qquad (\text{si } A \in \mathrm{Filt}^r, X \in \mathrm{Filt}^s), \tag{3.8 bis}$$

$$\mathrm{card}\,\widetilde{\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M}^r/X)} \leq s^r \qquad (\text{si } X \in \mathrm{Filt}^s). \tag{3.9 bis}$$

Sans hypothèse du continu, ces formules sont aussi valables pour r de la forme 2^c, avec $c \geq \pi_0$. Ce sont ces dernières formules qui on l'air les plus naturelles. Pour (3.8 bis) et (3.9 bis), je signale que le deuxième membre s^r est le cardinal de l'ensemble $\mathrm{Hom}_{\mathrm{Ens}}(A, X)$, où A, X sont deux ensembles tels que $\mathrm{card}\,A = r$, $\mathrm{card}\,X = s$. On ne peut donc espérer améliorer (3.8 bis) ! Pour la

4. *cf.* plus bas la notation $\widetilde{\mathcal{C}}$. p. 14

5. Signalons qu'on a toujours $\mathrm{card}\,\widetilde{\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{C})} \geq \mathrm{card}\,\widetilde{\mathcal{C}}$ car $\widetilde{\mathcal{C}} \hookrightarrow \widetilde{\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{C})}$ via $\mathrm{cl}(X) \longmapsto \mathrm{cl}(\mathrm{id}_X)$. [page 20]

première formule (3.7 bis), notons que l'on a égalité lorsque $\mathcal{M}$ est la catégorie des couples (A, B), A un ensemble et B une partie de A, avec les flèches évidentes, et qu'on définit $\mathcal{M}^\pi$ (pour $\pi \geq \pi_0$) comme la sous-catégorie strictement pleine formée des (A, B) tels que $\operatorname{card} A \geq \pi$.

Démonstration de 3.1. Prouvons d'abord la formule (3.8),

$$\operatorname{card}\operatorname{Hom}(A, X) \;\leq\; s^{(r^{\pi_0})} \qquad \begin{cases} \text{si } A \in \operatorname{Filt}^r,\ X \in \operatorname{Filt}^s, \\ r \geq \pi_1,\ s \geq \sup(\pi_1, C_1). \end{cases}$$

(**N.B.** Je n'utiliserai pas $r \geq C_1$, postulé dans 3.1 1°.) J'écris `[<<J'écris>> rayé]`

$$A \;=\; \varinjlim_{I} A_i\ , \quad \operatorname{card} I \;\leq\; r^{\pi_0}\ , \quad A_i \;\in\; \operatorname{Filt}^{\pi_0}\ ,$$
$$X \;=\; \varinjlim_{J} X_j\ , \quad \operatorname{card} J \;\leq\; s^{\pi_1}\ , \quad X_j \;\in\; \operatorname{Filt}^{\pi_1}\ , \qquad\qquad J \text{ grand devant } \pi_1\ .$$

On aura

$$\operatorname{Hom}(A, X) \;\simeq\; \varprojlim_{i \in I} \underbrace{\operatorname{Hom}(A_i, \varinjlim_{J} X_j)}_{\overset{(6)}{\simeq} \varinjlim_{j \in J} \underbrace{\operatorname{Hom}(A_i, X_j)}_{\text{de cardinal } \leq C_1}}\ ,$$

donc pour tout $i \in I$

$$\operatorname{Hom}(A_i, X) \;\leq\; \operatorname{card}(J) \times C_1 \;\leq\; s^{\pi_1} \times C_1 \;=\; s^{\pi_1}\ ,$$

car $s \geq C_1$, donc $s^{\pi_1} \geq C_1$, d'où

$$\operatorname{card}(\varprojlim_{j \in I} \operatorname{Hom}(A_i, X)) \;\leq\; (s^{\pi_1})^{\operatorname{card} I} \;\leq\; \underbrace{(s^{\pi_1})^{(r^{\pi_0})}}_{s^{\pi_1 r^{\pi_0}}}\ .$$

Comme $r \geq \pi_1$, on a $r^{\pi_0} \geq \pi_1$, donc $r^{\pi_0}\pi_1 = r^{\pi_0}$, d'où

$$\operatorname{card}\operatorname{Hom}(A, X) \;\leq\; s^{(r^{\pi_0})}\ ,$$

c'est bien la formule (3.8). Pour en tirer une estimation pour $\mathcal{M}^r/X$ (avec $X \in \operatorname{Filt}^s$), je vais d'abord majorer le cardinal des classes d'isomorphie d'objets de $\mathcal{M}^r/X$, *i.e.* des flèches à isomorphisme près (dans $\mathcal{M}^r$) `[page 21]`

$$A \;\longrightarrow\; X\ , \qquad\qquad X \text{ fixé dans } \operatorname{Filt}^s,\ A \text{ variable dans } \mathcal{M}^r\ .$$

On aura

$$A \;=\; \varinjlim_{i \in I} A_i \qquad\qquad \text{avec } A_i \in \operatorname{Filt}^{\pi_0},\ I \text{ ensemble ordonné de cardinal} \leq r^{\pi_0}\ .$$

Pour I fixé, le cardinal de l'ensemble des systèmes inductifs indexés par I, dans $\mathcal{M}^{\pi_0}/X$, à isomorphisme près, peut se majorer ainsi : pour tout $i \in I$, il faut choisir A_i dans $\mathcal{M}^{\pi_0}$ (mais seule sa classe dans $\widetilde{\mathcal{M}^{\pi_0}}$ importe), donc c'est majoré par card $\widetilde{\mathcal{M}^{\pi_0}} \;\leq C_0$ [7], et pour tous les i, par $\operatorname{card} I \times C_0 \leq r^{\pi_0} \times C_0$, et si $r \geq C_0$, donc $r^{\pi_0} \geq C_0$, on trouve une majoration des choix possibles du système des *objets* A_i dans p. 15

6. car les $A \in \operatorname{Filt}^{\pi_0}$ sont π_1-accessibles.

7. On a posé ici $C_0 = \operatorname{card} \widetilde{\underline{\mathrm{Fl}}^{\pi_0}}$, donc $C_0 \leq C_1$.

$\mathcal{M}^\pi$, à isomorphisme près, par r^{π_0}. Si on se donne de plus les morphismes de transition $A_i \longrightarrow A_j$ pour $i < j$, cela fait pour chaque paire comparable, élément de $I \times I$, un choix majoré par C_0, donc encore une majoration par $\underbrace{\operatorname{card}(I \times I)}_{=(\operatorname{card} I)^2 = \operatorname{card} I} \cdot C_0 \leq r^{\pi_0} \cdot C_0 = r^{\pi_0}$. Donc l'ensemble des systèmes inductifs en question, à isomorphisme près, pour I fixé, est de cardinal $\leq r^{\pi_0} \cdot r^{\pi_0} = r^{\pi_0}$. Enfin, les *homomorphismes* d'un système inductif donné dans X sont majorés par $\operatorname{card} I \times s^{(r^{\pi_0})}$ (par (3.8) déjà prouvé), donc par

$$r^{\pi_0} \cdot s^{(r^{\pi_0})} \;=\; s^{(r^{\pi_0})} \qquad (\text{puisque } r^{\pi_0} \leq s^{(r^{\pi_0})}) \;.$$

Au total, pour I fixé, l'ensemble des systèmes inductifs à isomorphisme près, indexés par I, à valeurs dans $\mathcal{M}^r/X$, est de cardinal majoré par $\underbrace{r^{\pi_0}}_{\substack{\text{nombre des} \\ \text{systèmes inductifs} \\ \text{dans } \mathcal{M}^\pi, \text{ à} \\ \text{isomorphisme près}}} \cdot \underbrace{s^{(r^{\pi_0})}}_{\substack{\text{nombre des} \\ \text{flèches d'un} \\ \text{tel système inductif} \\ \text{dans } X}} =$ [page 22]

$s^{(r^{\pi_0})}$.

Mais il faut maintenant faire varier I, à isomorphisme près, dans la catégorie des ensembles ordonnés (filtrants *etc.*) de cardinal $\leq \lambda = r^{\pi_0}$. On voit de suite que cet ensemble de classes d'isomorphie (qui peut s'interpréter comme un ensemble quotient d'un certain ensemble de parties d'un ensemble fixe I_0 de cardinal λ) est de cardinal $\leq 2^\lambda$. On trouve donc finalement

$$\operatorname{card} \widetilde{\mathcal{M}^r/X} \;\leq\; s^{(r^{\pi_0})} \cdot 2^{(r^{\pi_0})} \;=\; s^{(r^{\pi_0})} \;,$$

sous condition que

$$r \;\geq\; \sup(\pi_1, C_0) \;, \qquad s \;\geq\; \sup(\pi_1, C_1) \;.$$

Il faut prouver l'inégalité similaire pour card $\widetilde{\underline{\mathrm{Fl}}^r \mathcal{M}}$ (3.9). Or, comme pour A, B dans $\mathcal{M}^r$, on a, si $r \geq \sup(\pi_1, C_1)$,

$$\operatorname{card} \operatorname{Hom}_{\mathcal{M}}(A, B) \;\leq\; r^{(r^{\pi_0})}$$

en vertu de (3.8) où on fait $s = r$, on trouve que

$$\begin{aligned} \operatorname{card} \underline{\mathrm{Fl}}(\widetilde{\mathcal{M}^r/X}) \;&\leq\; \left(\operatorname{card} \widetilde{\mathcal{M}^r/X}\right)^2 \cdot r^{(r^{\pi_0})} \\ &\leq\; s^{(r^{\pi_0})} \cdot r^{(r^{\pi_0})} \\ &=\; s^{(r^{\pi_0})} \qquad \text{si } s \geq r \;. \end{aligned}$$

(On va regarder plus bas les cas $s \leq r$ [8]). C'est bien la formule (3.9).

Venons-en à la catégorie $\mathcal{M}^r$ elle-même. L'argument de la page 21 montre que l'ensemble des classes d'isomorphie d'objets de $\mathcal{M}^r$ indexés par un I fixé, de cardinal $\leq r^{\pi_0}$, comme $A = \varinjlim_i A_i$ avec $A_i \in \mathrm{Filt}^{\pi_0}$, est de cardinal majoré par r^{π_0} (si $r \geq C_0$). Si on fait varier I, on trouve une majoration par $r^{\pi_0} \cdot 2^{(r^{\pi_0})} = 2^{(r^{\pi_0})}$. On en conclut comme tantôt que l'ensemble $\widetilde{\mathrm{Fl}\,\mathcal{M}^r}$ est de cardinal majoré par

p. 16
[page 23]

$$(2^{(r^{\pi_0})})^2 \times r^{(r^{\pi_0})} \qquad (\text{si } r \geq \sup(\pi_1, C_1)) \;,$$

donc par $r^{(r^{\pi_0})}$. Je dis qu'on a

$$r^{(r^{\pi_0})} \;=\; 2^{(r^{\pi_0})} \;,$$

8. *cf.* cor. 2, page 23.

en effet, on a $\geq$, et pour prouver $\leq$, on note que $r < 2^r$, donc $r^{(r^{\pi_0})} \leq (2^r)^{(r^{\pi_0})} = 2^{r\cdot r^{\pi_0}} = 2^{(r^{\pi_0})}$, O.K. ! Cela établit donc 3.7. Cet argument prouve en fait le

Lemme 3.2. *Soient r un cardinal, r' un cardinal $\geq r$. Alors on a*

$$r^{r'} \;=\; 2^{r'} \qquad (= s^{r'} \text{ pour tout } 2 \leq s \leq r) \ .$$

Corollaire 1. *Soient $r \geq \sup(\pi_1, C_1)$, et $A, X \in \mathrm{Filt}^\pi$. Alors*

$$\operatorname{card} \mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(A, X) \;\leq\; 2^{(r^{\pi_0})} \qquad (= 2^r \text{ si } r = 2^c, \text{ avec } c \geq \pi_0) \ . \tag{3.10}$$

On applique (3.8), qui donne la majoration $r^{(r^{\pi_0})}$, et le lemme 3.2.

On notera qu'on trouve la même majoration pour le cardinal de $\widetilde{\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M}^r)}$ tout entier (3.7) ! De même, (3.9) donne :

Corollaire 2. *Soit $r \geq \sup(\pi_1, C_1)$, et $X \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}^r$. Alors*

$$\operatorname{card} \widetilde{\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M}^r/X)} \;\leq\; 2^{(r^{\pi_0})} \qquad (= 2^r \text{ si } r = 2^c, \text{ avec } c \geq \pi_0) \ . \tag{3.11}$$

c'est donc la formule (3.9) pour $s \leq r$, laissée en suspens.

Revenons à la majoration cardinale des $X_\alpha(f)$, où $f : X \longrightarrow Y$ est dans $\mathrm{Fl}^s(\mathcal{M})$, *i.e.* [page 24]
$X, Y \in \mathrm{Filt}^s$. On suppose de plus $C_0 \subset \mathrm{Fl}^r(\mathcal{M})$,

$$C_0 \;\subset\; \mathrm{Fl}^r(\mathcal{M}) \;=\; \mathrm{Fl}(\mathcal{M}^r) \ , \qquad (f : X \longrightarrow Y) \in \mathrm{Fl}^s(\mathcal{M}) \ , \quad \textit{i.e. } X, Y \in \mathrm{Filt}^s \ ,$$
$$\text{avec } s \geq r \ . \tag{3.10}$$

`[Deux fois (3.10).]` Il y a une difficulté idiote, c'est que $\mathcal{M}^r$ est équivalente à une petite catégorie, mais n'est pas elle-même petite. Même si C_0 ne contenait qu'une seule classe d'isomorphie de flèches de $\mathcal{M}^r$, son cardinal pourrait être (pour r fixé) arbitrairement élevé. Aussi, dans ce qui suit, je dois supposer la condition de "non pléthoricité cardinale" pour C_0 :

$$\begin{array}{|l} \forall\, i \in C_0, \text{ désignant par } C_0(i) \text{ l'ensemble des } i' \in C_0 \text{ telles que} \\ i \simeq i' \text{ dans } \mathrm{Fl}(\mathcal{M}), \text{ j'impose que } \operatorname{card} C_0(i) \leq 2^{(r^{\pi_0})} \text{ (ce qui est} \\ \text{aussi la valeur de la majoration pour le cardinal de } \widetilde{\underline{\mathrm{Fl}}^r(\mathcal{M})} = \\ \widetilde{\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M}^r)}\,). \end{array} \tag{3.11}$$

`[Deux fois (3.11).]` Cela implique donc que l'on a $\operatorname{card} C_0 \leq (2^{(r^{\pi_0})})^2 = 2^{(r^{\pi_0})}$, p. 17

$$\operatorname{card} C_0 \;\leq\; 2^{(r^{\pi_0})} \ , \tag{3.12}$$

qui est équivalente à (3.11) (moyennant $C_0 \subset \mathrm{Fl}^r(\mathcal{M})$, postulé dans (3.10)).

Il s'ensuit par (3.8) que l'on a

$$\operatorname{card} \Delta(C_0, f) \;\leq\; \underbrace{\operatorname{card}(C_0)}_{\leq 2^{(r^{\pi_0})}} \cdot s^{(r^{\pi_0})} \cdot s^{(r^{\pi_0})} \;\leq\; s^{(r^{\pi_0})} \ .$$

D'autre part, les X_D dont on prend la somme amalgamée sous X, pour obtenir $X_1(f)$, sont dans $\mathcal{M}^s$, si on fait l'hypothèse suivante.

[page 25]

$$\begin{array}{|l} \text{Les } \mathcal{M}^\pi = \underline{\mathrm{Filt}}^\pi \text{ sont stables par sommes amalgamées simples,} \\ \text{et par } \varinjlim \text{ filtrantes de cardinal} \leq \pi \text{ (pas nécessairement grandes} \\ \text{devant } \pi_0) \ , \end{array} \tag{3.13}$$

compte tenu que $r \leq s$, donc $\mathcal{M}^r \subset \mathcal{M}^s$, donc A, B, X dans $X_D = B \amalg_A X$ sont dans $\mathcal{M}^s$. Les sommes amalgamées partielles *finies* des X_D sont donc aussi dans $\mathcal{M}^s$, par récurrence

sur le cardinal de l'ensemble d'indices. La somme amalgamée infinie apparaît ainsi comme $\varinjlim$ filtrante d'objets de $\mathcal{M}^s$, l'ensemble d'indices étant l'ensemble $\mathfrak{P}^*_f\Delta(C_0,f)$ des parties finies non vides de $\Delta(C_0,f)$. Cet ensemble est de cardinal majoré par s', si s' est un cardinal *infini* tel que $\operatorname{card}\Delta(C_0,f)\leq s'$. On peut donc prendre $s'=s^{(r^{\pi_0})}$. On a donc prouvé, compte tenu de (3.13) appliqué à $\mathcal{M}^{s'}$, le

Lemme 3.3. *On suppose* (3.10), i.e. $C_0\subset \mathrm{Fl}^r(\mathcal{M})$, $f\in\mathrm{Fl}^s(\mathcal{M})$, *avec* $s\geq r\geq \sup(\pi_1,C_1)$, *et de plus que* C_0 *satisfait la condition de non-pléthoricité* (3.11) (*ce qu'on peut toujours supposer, quitte à réduire* C_0 *sans changer* $\widetilde{C_0}=\Phi$ *et* $C_{0*}=\Psi$), *et que la filtration cardinale satisfait la condition de stabilité (anodine !)* (3.13). *Posons*

$$s' \;=\; s^{(r^{\pi_0})}\;. \tag{3.14}$$

Alors $X_1(C_0,f)$ *est dans* $\mathcal{M}^{s'}$. *Plus généralement et plus joliment, pour* C_0 *et* r *fixés* (*avec* $C_0\subset\mathrm{Fl}^r(\mathcal{M})$ *et satisfaisant la condition de non-pléthoricité* (3.11) *relativement à* r), *pour tout cardinal de la forme* [page 26]

$$s' \;=\; s^t\;,\qquad\qquad \textit{avec } t\geq r^{\pi_0},\ s\geq 2 \tag{3.15}$$

(d'où $s'\geq 2^{(r^{\pi_0})}>r^{\pi_0}\geq r$), $\underline{\mathrm{Fl}}^{s'}(\mathcal{M})$ *est stable sous le foncteur* $p_1^{C_0}:\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M})\longrightarrow\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M})$.

En effet, si on applique la première partie du lemme au couple (r,s'), on trouve que $X_1(f)$ est dans $\mathcal{M}^{s''}$, avec $s''=s'^{(r^{\pi_0})}$. Mais

$$s''\;=\;s'^{(r^{\pi_0})}\;=\;(s^t)^{(r^{\pi_0})}\;=\;s^{tr^{\pi_0}}\underset{\substack{|\\ \text{car } t\geq r^{\pi_0},\\ \text{donc } tr^{\pi_0}=t}}{=}s^t\;=\;s'\;,$$

donc on voit que $f\in\mathrm{Fl}^{s'}$ implique $X_1(f)\in\mathcal{M}^{s'}$, ou ce qui revient au même, $p_1(f)\in\mathrm{Fl}^{s'}$. p. 18

Corollaire. *Soient* C_0, r, $s'=s^t$ ($t\geq r^{\pi_0}$, $s\geq 2$) *comme dessus, et soit* α *un nombre ordinal tel que*

$$\operatorname{card}\alpha\;\leq\;s'\;=\;s^t\;.$$

Alors $\underline{\mathrm{Fl}}^{s'}(\mathcal{M})$ *est stable par le foncteur* $p_\alpha=p_\alpha^{C_0}$.

On le voit aussitôt par récurrence transfinie, compte tenu du lemme 3.3, et de l'hypothèse de stabilité (3.13).

Pour résumer :

Théorème 2. *Soit* $\mathcal{M}$ *une catégorie stable par petites* $\varinjlim$ *filtrantes, et munie d'une filtration cardinale* $(\mathrm{Filt}^\pi)_{\pi\geq\pi_0}$, *telle que les* Filt^π *soient stables par* $\varinjlim$ *filtrantes de cardinal* $\leq\pi$ *(pas forcément grandes devant* π_0), *et par les sommes amalgamées simples qui existent dans* $\mathcal{M}$. *On suppose que les éléments de* Filt^{π_0} *soient accessibles, et on désigne par* π_1 *le plus petit cardinal* $\geq\pi_0$, *tel que les objets de* Filt^{π_0} *soient* π_1*-accessibles. On pose* [page 27]

$$c_1\;=\;\operatorname{card}\mathrm{Fl}(\mathcal{M}^{\pi_1})\;=\;\operatorname{card}\mathrm{Fl}^{\pi_1}(\mathcal{M})$$

(où pour tout $\pi\geq\pi_0$, $\mathcal{M}^\pi$ *désigne la sous-catégorie strictement pleine de* $\mathcal{M}$ *définie par* Filt^π, *et* $\mathrm{Fl}^\pi(\mathcal{M})=\mathrm{Fl}(\mathcal{M}^\pi)$).

Soit C_0 *une petite partie de* $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$, *formée de flèches coquarrables, et posons*

$$\Phi\;=\;\widetilde{C_0}\;=\;\Psi^*\;,\qquad\qquad \textit{où}\ \ \Psi=C_{0*}=\Phi_*\;.$$

Soit r *un cardinal* $\geq\sup(\pi_1,c_1)$, *et tel que l'on ait* $C_0\subset\mathrm{Fl}^r(\mathcal{M})$. *On suppose que* C_0 *est irrédondant (*i.e. *deux objets de* C_0 *isomorphes sont égaux), ou plus généralement, que* C_0 *satisfait la très anodine condition de non-pléthoricité* (3.11) *relativement à* r. *On*

considère la suite transfinie des foncteurs $p_\alpha = p_\alpha^{C_0}$ *sur* $\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M})$ (*cf.* th. 1)*, donnant lieu aux factorisations fonctorielles d'une* $f \in \underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M})$*,* $f : X \longrightarrow Y$*, en*

$$X \xrightarrow{i_\alpha(f)} X_\alpha(f) \xrightarrow{p_\alpha(f)} Y \ . \tag{3.16}$$

On a alors ce qui suit :

1°) *On a (pour mémoire)* $i_\alpha(f) \in \Phi$ *pour tout* α*, et de plus,* si α est grand devant r^{π_0}*, on a aussi* $p_\alpha(f) \in \Psi$*. Si* r' *est un cardinal* $> r^{\pi_0}$ *(p. ex. le cardinal successeur de* r^{π_0}*), on peut prendre pour* α *le premier ordinal dont le cardinal soit égal à* r'*.*

2°) *Pour tout cardinal* s *de la forme*

$$s \ = \ c^t \qquad \textit{avec} \ \ t \geq r^{\pi_0}, \ c \geq 2$$

(donc $s = 2^t$ *si on prend* $c \leq t$*,* cf. *lemme 3.2),* $\underline{\mathrm{Fl}}^s(\mathcal{M})$ *est stable sous les* p_α *tels que* $\operatorname{card}\alpha \leq s$*. Si on prend p. ex. pour* α *le premier ordinal dont le cardinal soit* $> r^{\pi_0}$*, alors* $\underline{\mathrm{Fl}}^s(\mathcal{M})$ *est stable par* p_α*, qui par* 1°*) réalise donc une factorisation fonctorielle* (3.16) *avec* $i_\alpha(f) \in \Phi$*,* $p_\alpha(f) \in \Psi$*.*

Démonstration. Tout a été prouvé, si on se rappelle que les objets de $\mathcal{M}^r$ sont r^{π_0}-accessibles (*cf.* (3.2)). p. 19 [page 28]

4 Compléments sur les structures de Quillen

Définition 4.1. Soit $\mathcal{M}$ une catégorie. On appelle *précouple de Quillen* dans $\mathcal{M}$ un couple (Φ, Ψ) de parties de $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$, satisfaisant les deux conditions suivantes.

a) On a $\Phi \longleftrightarrow \Psi$, *i.e.* $\Psi \subset \Phi_*$, ou ce qui revient au même, $\Phi \subset \Psi^*$ – soit encore : pour tout carré commutatif dans $\mathcal{M}$

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{u} & X \\ {\scriptstyle i}\downarrow & \overset{w}{\nearrow} & \downarrow{\scriptstyle p} \\ B & \xrightarrow{v} & Y \ , \end{array} \tag{4.1.1}$$

avec $i \in \Phi$, $p \in \Psi$, il existe w telle que $wi = u$, $pw = v$.

b) Toute $f \in \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ se factorise en

$$f \ = \ p\,i \ , \qquad \text{avec } i \in \Phi,\ p \in \Psi \ .$$

On écrit

$$\Phi \ \leftrightarrows \ \Psi \tag{4.1.2}$$

pour indiquer que (Φ, Ψ) est un précouple de Quillen.

On dit que le précouple de Quillen est *clos*, si Φ est clos à gauche, Ψ clos à droit. On va voir plus bas (cor. 2, page 31) que cela implique (donc équivaut à)

$$\Phi \ = \ \Psi^* \ , \qquad \Psi \ = \ \Phi_* \ . \tag{4.1.3}$$

Un précouple de Quillen clos est aussi appelé un couple de Quillen. [page 29]

Proposition 4.2. *Soit* (Φ, Ψ) *un précouple de Quillen dans* $\mathcal{M}$*, et soit* $j \in \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ [9]*. On a alors les conditions équivalentes sur* j *:*

9. **N.B.** On utilise seulement que $\Phi \longleftrightarrow \Psi$, et que j peut se mettre sous la forme pi, avec $i \in \Phi$, $p \in \Psi$.

a) $j \in \widetilde{\Phi}$.

b) $j \in \Psi^*$.

c) *j est facteur direct d'un $i \in \Phi$.*

c′) *j est facteur direct d'un $i \in \Phi$ ayant même source que j, plus précisément, il existe un diagramme*

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\ j\ } & B \\ {\scriptstyle \mathrm{id}_A}\downarrow\uparrow{\scriptstyle \mathrm{id}_A} & & {\scriptstyle q}\downarrow\uparrow{\scriptstyle p} \\ A & \xrightarrow{\ i\ } & B' \end{array}, \tag{4.2.1}$$

avec $i \in \Phi$, et

$$qj \;=\; i\,, \qquad pi \;=\; j\,, \qquad pq \;=\; \mathrm{id}_B\,, \tag{4.2.2}$$

p. 20

de sorte que j est un facteur direct de $i \in \Phi$, par (id_A, q), admettant la rétraction (id_A, p).

d) *Pour tout diagramme commutatif traits pleins*

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\ j\ } & B \\ & {\scriptstyle i}\searrow \quad \nearrow{\scriptstyle p} \ \swarrow{\scriptstyle q} & \\ & B' & \end{array}\,, \tag{4.2.3}$$

i.e. *toute factorisation de j en pi, si on a $p \in \Psi$, il existe une section q de B' sur B dans $A\backslash\mathcal{M}$,* i.e. *une flèche $q : B \longrightarrow B'$ telle que*

$$pq \;=\; \mathrm{id}_B \qquad et \qquad qj \;=\; i\,.$$

Démonstration de la proposition. Elle se fait par la suite d'implications suivante, toutes (±) tautologiques :

$$(c') \implies (c) \implies (a) \implies (b) \implies (d) \implies (c')\,,$$

dont les quatre premières utilisent seulement l'hypothèse $\Phi \longleftrightarrow \Psi$ (de (a) de la définition 4.1), et la dernière seulement, $(d) \implies (c')$, fait appel à l'hypothèse de factorisation de Quillen ((b) dans 4.1) ; et encore il suffit de la supposer pour j seulement ! [page 30]

$(c') \implies (c)$ tautologie pure, $(c) \implies (a)$ car on sait que $\widetilde{\Phi}$ est stable par facteurs directs (et contient Φ), $(a) \implies (b)$ car $\widetilde{\Phi} \subset \Psi^*$ ($\widetilde{\Phi}$ étant par définition la plus petite partie close à gauche de $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ contenant Φ, et Ψ^* étant close à gauche), $(b) \implies (d)$ car on écrit le diagramme donné (4.2.2) (traits pleins) comme

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\ u\ } & X \\ {\scriptstyle j\in\Psi^*}\downarrow & \nearrow{\scriptstyle q} & \downarrow{\scriptstyle p\in\Psi} \\ B & \xrightarrow{\ v\ } & Y \end{array}\,, \tag{$*$}$$

en y faisant $Y = B$, $v = \mathrm{id}_B$, et en rebaptisant X par B', et u par i : l'hypothèse (b), $j \in \Psi^*$, signifie que dans un diagramme traits pleins $(*)$, il existe toujours q telle que $qj = u$, $pq = v$, et en l'exprimant dans le cas particulier où $v = \mathrm{id}_B$, on trouve (d).

Reste à prouver $(d) \implies (c')$, en utilisant cette fois l'hypothèse de factorisation sur j, *i.e.* qu'on peut écrire j sous la forme pi :

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\ j\ } & B \\ & {\scriptstyle i}\searrow \quad \nearrow{\scriptstyle p} \ \swarrow{\scriptstyle q} & \\ & B' & \end{array}\,,$$

avec $i \in \Phi$, $p \in \Psi$. En vertu de (d), comme $p \in \Psi$, il existe donc $q : B \longrightarrow B'$ satisfaisant

p. 21

$$pq \;=\; \mathrm{id}_B\;, \qquad qj \;=\; i\;, \tag{}$$

[page 31]

ce qui prouve (c'), puisque $i \in \Phi$.

Corollaire 1. *Soit (Φ, Ψ) un précouple de Quillen. Alors on a*

$$\widetilde{\Phi} \;=\; \Psi^* \;=\; \text{ensemble des objets de } \underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M}) \text{ qui sont facteurs directs d'éléments de } \Phi\;, \tag{4.3}$$

et dualement

$$\overline{\Psi} \;=\; \Phi_* \;=\; \text{ensemble des objets de } \underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M}) \text{ qui sont facteurs directs d'éléments de } \Psi\;. \tag{4.4}$$

Corollaire 2. *Les conditions suivantes sur le précouple de Quillen (Φ, Ψ) sont équivalentes.*

a) *Le précouple est* clos, i.e. $\Phi = \widetilde{\Phi}$, $\Psi = \overline{\Psi}$.

b) $\Phi = \Psi^*$, $\Psi = \Phi_*$.

c) *Φ et Ψ sont stables par facteurs directs.*

Soit maintenant

$$W \;\subset\; \mathrm{Fl}(\mathcal{M}) \tag{4.5}$$

un localiseur, satisfaisant les conditions habituelles

$$\begin{cases} a) & W \text{ contient les isomorphismes.} \\ b) & \text{Si } X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \text{ dans } \mathcal{M}, \text{ si deux parmi } f,\ g,\ gf \text{ sont dans } W, \text{ alors le troisième aussi.} \end{cases} \tag{4.6}$$

(W modérément saturé). Supposons de plus données quatre autres parties

$$C\;,\; TC\;, \qquad F\;,\; TF \tag{4.7}$$

de $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$, satisfaisant les conditions suivantes.

$$\begin{cases} a) & (C, TF) \text{ et } (TC, F) \text{ sont des précouples de Quillen.} \\ b) & TC \subset C \cap W,\ TF \subset F \cap W. \end{cases} \tag{4.8}$$

Ces propriétés s'explicitent ainsi : [page 32]

M 1 Propriétés de relèvement-prolongement, $C \longleftrightarrow TF$ et $TC \longleftrightarrow F$.

M 2 Propriété de factorisation de toute flèche f de $\mathcal{M}$ en $f = pi$, avec, au choix, $i \in C$, $p \in TF$, ou $i \in TC$, $p \in F$.

M′ $TC \subset C \cap W$, $TF \subset F \cap W$.

C'est donc une partie des axiomes d'une structure de Quillen faible pour W (XIII, p. 27, déf. 1) – il manque les axiomes de stabilité M 3, M 4, et les axiomes de "propreté" (propriety) M″, savoir $F \subset \mathrm{Fib}_W$, $C \subset \mathrm{Cof}_W$. p. 22

Proposition 4.3. *Soient $\mathcal{M}$ une catégorie, (C, TF) et (TC, F) deux précouples de Quillen dans $\mathcal{M}$, satisfaisant*

$$TC \;\subset\; C\;, \qquad TF \;\subset\; F\;, \tag{4.3.1}$$

et soit W une partie de $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ *dont on ne suppose pour l'instant que* 4.6, (b) [10]*, et*

$$W \supset TC\ ,\ TF\ , \tag{4.3.2}$$

donc on a

$$TC \subset C \cap W\ , \qquad TF \subset F \cap W\ . \tag{4.3.3}$$

Considérons les conditions de prolongement-relèvement suivantes (a), (a′)*, et les conditions de factorisation* (b), (b′), (c), (d) (*en se rappelant que* $\widetilde{TC} = F^*$, $\overline{TF} = C_*$*, en vertu de la proposition* 4.2 (*cor.* 1) *appliquée aux précouples de Quillen* (TC, F), (C, TF)) :

a) $C \cap W \subset \widetilde{TC}$ (*donc* $TC \subset C \cap W \subset \widetilde{TC}$).

a′) $F \cap W \subset \overline{TF}$ (*donc* $TF \subset F \cap W \subset \overline{TF}$).

b) $W \subset TF \circ \widetilde{TC}$.


b′) $W \subset \overline{TF} \circ TC$.

c) $W \subset \overline{TF} \circ \widetilde{TC}$.

d) $W \subset TF \circ TC$ (*donc, par* (4.3.2), $W = TF \circ TC$ *si* W *est stable par composition*). [11]

Alors toutes les conditions sauf la dernière sont équivalentes (*et elles sont donc impliquées par cette dernière*)*. Donc lorsque* TC *ou* TF *sont stables par facteurs directs* (*p. ex. si* TC *est clos à gauche, ou* TF *clos à droite*)*, toutes les conditions envisagées sont équivalentes* (*puisque par le corollaire* 2 *à la proposition* 4.2*, on a alors* $TC = \widetilde{TC}$ *resp.* $TF = \overline{TF}$*, donc* (b′) *resp.* (b) *équivaut alors à* (d)). [page 33]

Démonstration. Elle se fait par le diagramme d'implications



,

où les quatre implications du carré supérieur Q sont tautologiques. Il suffit donc d'établir les implications p. 23

$$(c) \implies (a) \implies (b)\ ,$$

les implications $(c) \Longrightarrow (a') \Longrightarrow (b')$ en résultent par dualité.

Supposons donc (c), *i.e.*

$$W \subset \overline{TF} \circ \widetilde{TC}\ , \tag{$*$}$$


et prouvons (a), *i.e.* que

$$C \cap W \subset \widetilde{TC}\ .$$

Mais si $j \in C \cap W$, pour prouver que $j \in \widetilde{TC}$, écrivons $j = pi$, $i \in \widetilde{TC}$, $p \in \overline{TF}$, ce qui est possible par l'hypothèse $(*)$ et $j \in W$. [page 34]

10. On utilise seulement que si $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$, et si $gf \in W$, alors $f \in W \iff g \in W$. On n'a pas besoin que W contienne les isomorphismes, ni qu'il soit stable par composition.

11. **N.B.** La condition (a) signifie aussi que $(C \cap W, F)$ est encore un précouple de Quillen, resp. (b) signifie que $(C, F \cap W)$ en est un – et alors cette paire de précouples de Quillen satisfait cette fois à (d), *i.e.* $W = TF' \circ TC'$.



Utilisons maintenant l'hypothèse $j \in C$ et $C \longleftrightarrow \overline{TF}$, on trouve donc (prop. 3.2, $(a) \Longrightarrow (d)$) une flèche $q : B \longrightarrow B'$ telle que $pq = \mathrm{id}_B$, $qj = i$, donc j apparaît comme facteur direct de i. Comme $i \in \widetilde{TC}$ et que $\widetilde{TC}$ est stable par facteurs directs, on en conclut $j \in \widetilde{TC}$, *q.e.d.*

$(a) \Longrightarrow (b)$. On suppose donc

$$C \cap W \ \subset \ \widetilde{TC}\,, \tag{$*$}$$

et on veut prouver (b), *i.e.*

$$W \ \subset \ TF \circ \widetilde{TC}\,.$$

Soit donc $f \in W$, et factorisons f en pi, avec $i \in C$, $p \in TF$. (O.K. à cause du précouple de Quillen (C, TF)). Comme $TF \subset W$, on a $p \in W$, et comme $pi \in W$, on en conclut $i \in W$ (saturation modérée de W – on doit quand même l'utiliser !). On a donc $i \in C \cap W$, donc $i \in \widetilde{TC}$ par $(*)$, d'où $f \in TF \circ \widetilde{TC}$, *q.e.d.*

Corollaire 1. *Supposons TC stable par facteurs directs. Alors toutes les conditions de la proposition* 4.3 *sont équivalentes, et équivalent à la relation*

$$C \cap W \ = \ TC\,. \tag{4.3.4}$$

Dualement, si TF est stable par facteurs directs, les conditions de la proposition 4.3 *sont toutes équivalentes et équivalent à*

$$F \cap W \ = \ TF\,. \tag{4.3.4$'$}$$

En effet, par le corollaire 2 de la proposition 4.2, l'hypothèse sur TC implique que $TC = \widetilde{TC}$, donc comme $TC \subset C \cap W$, l'hypothèse $C \cap W \subset \widetilde{TC}$ $(= TC)$ équivaut à $C \cap W = TC$. p. 24 [page 35]

Corollaire 2. *Supposons C et W stables par facteurs directs. Alors les conditions équivalentes de la proposition* 4.3 *équivalent à*

$$C \cap W \ = \ \widetilde{TC}\,. \tag{4.3.5}$$

Dualement, si F, W sont stables par facteurs directs, les conditions équivalentes de la proposition 4.3 *équivalent à*

$$F \cap W \ = \ \overline{TF}\,. \tag{4.3.5$'$}$$

En effet, si C et W sont stables par facteurs directs, il en est de même de $C \cap W$, et dès lors si $C \cap W \subset \widetilde{TC}$, comme $C \cap W$ contient TC, on en conclut $\widetilde{C \cap W} = \widetilde{TC}$. Mais comme $C \cap W \longleftrightarrow TC$ et $C \cap W$ est stable par facteurs directs, $C \cap W$ est clos à gauche par corollaire 2 de la proposition 4.2, *i.e.* $C \cap W = \widetilde{C \cap W}$, d'où $C \cap W = \widetilde{TC}$, *q.e.d.*

Corollaire 3. *Supposons les conditions équivalentes* (a) *à* (c) *de* 4.3 *satisfaites, et de plus W* stable par facteurs directs[12]. *Alors les conditions préliminaires* (4.3.1) *et* (4.3.2) *restent satisfaites quand on remplace (C, TF) et (TC, F) par leurs clôtures $(C', TF') =$*

12. En fait, il suffit de supposer que l'on a $W \supset \widetilde{TC}, \overline{TF}$, *i.e.* que tout facteur direct d'un élément de W qui est soit dans C, soit dans F, est encore dans W. Alors $(\widetilde{C}, \widetilde{TC}, \bar{F}, \overline{TF})$ définissent une structure de Quillen close, et on sait que cela implique qu'en fait, W lui aussi est stable par facteurs directs.

$(\widetilde{C}, \overline{TF})$ et $(TC', F') = (\widetilde{TC}, \bar{F})$, et les conditions équivalentes de la proposition 4.3 *sont encore satisfaites pour ces couples, sous les formes fortes*

$$\begin{cases} C' \cap W &= TC' & (= \widetilde{TC'}) \\ F' \cap W &= TF' & (= \overline{TF'}) \\ W &= TF' \circ TC' \ . \end{cases} \tag{4.3.6}$$

Le triple (W, C', F') est un triple de Quillen clos (*correspondant à une "closed model category" de Quillen, du moins si on suppose $\mathcal{M}$ stable par $\varinjlim$ finies et $\varprojlim$ finies, et que W est modérément saturé*). [13] [page 36]

Démonstration. Les relations (4.3.1) impliquent

$$\widetilde{TC} \ \subset \ \widetilde{C} \qquad \text{et} \qquad \overline{TF} \ \subset \ \bar{F} \ ,$$

i.e. p. 25

$$TC' \ \subset \ C' \ , \qquad TF' \ \subset \ F' \ ,$$

i.e. (4.3.1) pour les nouveaux couples de Quillen. La relation 4.3.2, $W \supset TC, TF$, implique

$$W \ \supset \ \widetilde{TC} \ , \ \overline{TF} \ , \qquad \textit{i.e.} \qquad W \ \supset \ TC' \ , \ TF' \ ,$$

en vertu du corollaire 2 à la proposition 4.2 et du fait que W est stable par facteurs directs ; donc on a (4.3.2) pour les nouveaux couples. Comme par hypothèse on a

$$W \ = \ \overline{TF} \circ \widetilde{TC} \ ,$$

ceci s'écrit

$$W \ = \ TF' \circ TC' \ ,$$

donc les nouveaux couples satisfont aux mêmes conditions, qui cette fois, les couples étant clos, prennent la forme forte (4.3.6).

Prouvons que le triple (W, C', F') satisfait aux axiomes de Quillen d'un triple de Quillen clos. On a bien, par (4.3.6),

$$\begin{cases} C' \ = \ (TF')^* \ = \ (F' \cap W)^* \ , & F' \ = \ (TC')_* \ = \ (C' \cap W)_* \ , \\ W \ = \ TF' \circ TC' \ = \ C'_* \circ F'^* \ , \end{cases}$$

qui correspond à la définition des catégories de modèles de Quillen *clos* : les axiomes M 1, M 2, M 3, M 4 de Quillen sont réalisés de façon triviale (M 3 et M 4 parce que C et F, TC et TF sont clos à gauche resp. à droite). L'axiome M 5 est la saturation modérée de W. [page 37]

4.4. Voici l'idée pour construire plus ou moins "toutes" les structures de Quillen closes (C, TC, F, TF) associées à un localiseur donné $W \subset \mathcal{M}$. On suppose que $\mathcal{M}$ satisfait aux conditions du paragraphe précédent, concernant l'existence de $\varinjlim$ filtrantes, d'une filtration cardinale, l'accessibilité dans $\mathcal{M}$ (celle des éléments de $\mathrm{Filt}^{\overrightarrow{\pi 0}}$). On part d'une partie petite

$$C_0 \ \subset \ \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$$

13. Il en résulte

Corollaire 4. *Soient W un localiseur modérément saturé, et (C, TF), (TC, F) deux précouples de Quillen tels que $TC \subset C \cap W$, $TF \subset F \cap W$. Alors les conditions suivantes sont équivalentes.*

a) $TC = C \cap W$.

b) $TF = F \cap W$.

c) $W = TF \circ TC$.

d) *(W, C, F) est un triple de Quillen clos.*

telle que

$$C_{0*} \subset W \ , \tag{4.4.1}$$

et on pose

$$\begin{cases} C = \widetilde{C_0} \ , & TC = C \cap W \ , \\ TF = C_* = C_{0*} \ , & F = (TC)_* \ . \end{cases} \tag{4.4.2}$$

Il y a un problème seulement, vu que l'on sait déjà que (C, TF) est un couple de Quillen par le théorème de factorisation dans §1 (p. 10) : il faut la factorisation pour le couple $(TC, F = (TC)_*)$. À ce moment là, les conditions préliminaires (4.3.1), (4.3.2) de la proposition 4.3 sont satisfaites :

$$TC \subset C \ , \qquad TF \subset F \ , \qquad W \supset TC \ , TF \ ,$$

ainsi que la condition (a), $C \cap W \subset \widetilde{TC}$, puisque $C \cap W = TC$. Donc on trouve, par l'équivalence des conditions (a), (a'), (c), et vu que TC et TF sont clos,

$$TF = F \cap W \ , \qquad W = TF \circ TC \ ,$$

d'autre part l'hypothèse sur W implique que W est stable par facteurs directs, C l'est aussi, étant close à gauche, donc $TC = C \cap W$ aussi, donc par proposition 4.1, corollaire 2, on a $TC = \widetilde{TC}$, TC est close à gauche. On gagne donc, par la dernière assertion du corollaire 3, proposition 4.3 (p. 35). p. 26 [page 38]

En fait, indépendamment des conditions particulières sur $\mathcal{M}$, W, on vient de prouver ceci :

Lemme 4.4.1 (corollaire de la proposition 4.3.). *Soient $\mathcal{M}$ une catégorie, W un localiseur dans $\mathcal{M}$ modérément saturé et stable par facteurs directs. Alors les structures de Quillen closes (C, F) associées à W s'obtiennent ainsi : on prend une partie C_0 de* $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ *telle que*

$$TF \overset{\text{déf}}{=} C_{0*} \subset W \ ,$$

on pose

$$C = \widetilde{C_0} = TF^* \ , \qquad TC = C \cap W \ , \qquad F = (TC)_* \ ,$$

et on doit se débrouiller pour que (C, TF) et (TC, F) satisfassent à la condition de factorisation de Quillen, i.e. *soient des précouples de Quillen.* (En fait, C, TF et F étant clos par construction, et $TC = C \cap W$ étant stable par facteurs directs (C et W l'étant), ce seront même des *couples* de Quillen.)

Les hypothèses supplémentaires faites tantôt sur $\mathcal{M}$ servaient à assurer que si je prends C_0 petite, alors la factorisation marche pour (C, TF) automatiquement. Il reste le problème pour TC, F. [page 39]

Notons que si elle marche, alors $TC = \widetilde{TC} = F^*$, donc TC est clos à gauche, et *a fortiori* satisfait les conditions de stabilité correspondantes :

$$\begin{cases} a) & \text{Stable par cochangement de base, par composition,} \\ & \text{par facteurs directs (ces deux dernières sont assurées} \\ & \text{automatiquement, car } C, W \text{ sont stables).} \\ b) & \text{Stable par } \varinjlim \text{ ordinales strictes.} \end{cases} \tag{4.4.3}$$

L'hypothèse de stabilité sur W sert (entre autres) à garantir la stabilité (b) pour TC (en fait, il suffirait pour cela seulement que W soit stable par $\varinjlim$ ordinales strictes). Il reste la stabilité de $TC = C \cap W$ par cochangement de base, qui est problématique car W

n'est en général *pas* stable par cochangement de base. C'est pour assurer cette stabilité que je me vois pratiquement contraint ici à imposer

$$C_0 \subset \mathrm{Cof}_W \ , \tag{4.4.4}$$

je dis qu'avec l'hypothèse de stabilité faite sur W, cela implique

$$C \overset{\text{déf}}{=} \widetilde{C_0} \subset \mathrm{Cof}_W \ . \tag{4.4.5}$$

En effet, on a :

p. 27

Proposition 4.4.2. *Soit $\mathcal{M}$ stable par petites $\varinjlim$ inductives filtrantes, et $W \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ un localiseur (modérément saturé)* stable par lesdites limites. *Alors* Cof_W *satisfait les conditions de stabilité* (4.4.3) ("*stabilité de Quillen gauche*"), *et est stable aussi par $\varinjlim$ filtrantes quelconques.*

[page 40]

En effet, la condition (a) est satisfaite sans condition supplémentaire sur W. D'autre part, il est immédiat que cette condition par rapport aux $\varinjlim$ filtrantes implique que Cof_W *est stable par limites inductives filtrantes* dans $\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M})$.

Corollaire 4.4.3. *Sous les conditions de la proposition* 4.4.2, $\mathrm{Cof}_W \cap W = W^{\mathrm{univ}}$ (*ensemble des W-équivalences co-universelles dans $\mathcal{M}$*) *est stable par limites inductives filtrantes, et donc "stable à gauche" en sens de* (4.4.3).

Corollaire 4.4.4. *Sous les conditions de la proposition* 4.4.2, *supposons de plus que les sommes amalgamées simples existent dans $\mathcal{M}$, et soit C_0 une petite partie de* Cof_W *dont les éléments soient accessibles, et considérons*

$$C = \widetilde{C_0} \ , \qquad TC \overset{\text{déf}}{=} C \cap W \ .$$

Alors on a

$$C = \mathrm{Cof}_W \ , \qquad TC = C \cap W^{\mathrm{univ}} \subset W^{\mathrm{univ}} \ ,$$

et C et TC sont Q-stables à gauche.

[page 41]

En effet, par le théorème 1 du paragraphe 1 (p. 10) et son corollaire, $\widetilde{C_0}$ est la plus petite partie de $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ contenant C_0 et Q-stable à gauche. Comme Cof_W est Q-stable à gauche et contient C_0, on a donc $C = \widetilde{C_0} \subset \mathrm{Cof}_W$. Donc $TC \overset{\text{déf}}{=} C \cap W \subset \mathrm{Cof}_W \cap W \overset{\text{déf}}{=} W^{\mathrm{univ}}$, donc $TC = C \cap W^{\mathrm{univ}}$. Comme W^{univ} est lui aussi Q-stable à gauche (corollaire précédent), il en est de même de $C \cap W$, *q.e.d.*

Corollaire 4.4.5. *Supposons que tout objet de $\mathcal{M}$ soit accessible. Sous les conditions du corollaire précédent, posant*

$$TF = C_{0*} = C_* \ , \qquad F = (TC)_* \ ,$$

le couple (C, TF) est un couple de Quillen. Pour qu'il en soit de même du couple (TC, F), il suffit qu'il existe une petite *partie TC_0 de $C \cap W$, telle que $\widetilde{TC_0} = TC$ ($\overset{déf}{=} C \cap W$).*

La première assertion est, on l'a vu tantôt, le théorème 1 du paragraphe 1. La deuxième résulte de ce même théorème. On peut préciser dans ce sens :

Proposition 4.4.6. *Soit $\mathcal{M}$ une catégorie stable par petites $\varinjlim$ filtrantes, par sommes amalgamées, et dont tous les objets sont accessibles, W un localiseur modérément saturé dans $\mathcal{M}$, stable par $\varinjlim$ filtrantes, C_0 une* petite *partie de* $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$, *telle que*

[page 42]

$$C_0 \subset \mathrm{Cof}_W \ , \qquad \underbrace{C_{0*}}_{(=TF)} \subset W \ ,$$

posons

p. 28

$$C = \widetilde{C_0} \qquad TC = C \cap W \ , \qquad TF = C_* \ , \qquad F = (TC)_* \ ,$$

et soit TC_0 une petite partie de $TC = C \cap W$. On a alors

$$\begin{cases} C \subset \mathrm{Cof}_W , & TC = C \cap W^{\mathrm{univ}} \quad (\textit{pour mémoire}) \\ \widetilde{TC_0} \subset TC , & F_0 \supset F \quad (\textit{ce dernier trivial}) , \end{cases} \tag{4.4.6}$$

et les conditions suivantes sont équivalentes :

a) $\widetilde{TC_0} = TC$ (*on a* $\subset$) ;

a′) $F_0 = F$ (*on a* $\supset$) ;

b) $TF = F_0 \cap W$ (*on a* $\subset$) [14] ;

c) $W = TF \circ \widetilde{TC_0}$ (*on a* $\supset$) [15] ;

et impliquent que (W, C, F) est un triple de Quillen clos.

Démonstration. L'inclusion $\widetilde{TC_0} \subset TC$ résulte de la Q-stabilité à gauche de TC (cor. 4.4.4) et du fait que $TC_0 \subset TC$ est petite (on applique alors le théorème 1 tout comme pour $C \subset \mathrm{Cof}_W \ldots$). L'équivalence de (a), (b), (c) n'est autre que la proposition 4.3 appliquée à W et aux deux couples de Quillen (C, TF), $(\widetilde{TC_0}, F_0)$ (compte tenu du théorème 1 du paragraphe 1). Qu'on a alors un triple de Quillen clos a été vu dans le corollaire 3 de la proposition 4.3 (p. 35). Il reste à prouver l'équivalence de (a) et de (a'). On a $(a) \Longrightarrow (a')$, puisque $(TC_0)_* = (\widetilde{TC_0})_* = F_0$. Inversement, (a') implique $\widetilde{TC_0} = \widetilde{TC}$, donc le théorème de factorisation pour (TC, F) en vertu du théorème de factorisation, corollaire 1 (p. 11) appliqué à $TC_0 \subset TC \subset \widetilde{TC_0}$ et à $F_0 = F = (TC_0)_*$.

Ainsi, le seul problème, une fois trouvé C_0 (petite) satisfaisant $C_0 \subset \mathrm{Cof}_W$, $C_{0*} \subset W$, [page 43]
c'est de trouver une *petite* partie $TC_0 \subset TC$ qui "engendre $TC = C \cap W$ ", *i.e.* qui satisfasse aux conditions équivalentes (a), (a'), (b), (c) de la proposition précédente. J'ai passé des jours à essayer de prouver l'existence de TC_0, en supposant $\mathcal{M}$ munie d'une filtration cardinale, et W une partie accessible de $\mathcal{M}$, sans y être arrivé. Bien sûr, tout ce qui nous importe vraiment, c'est que (TC, F) satisfasse à la condition de factorisation. Mais je ne vois aucun moyen de le prouver, si ce n'est en "engendrant" à gauche TC par un *petit* sous-ensemble TC_0.

5 Résultats techniques préliminaires sur les parties accessibles de $\mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$, stables par limites inductives filtrantes

Je crois pourtant que je peux arriver à quelque chose d'utilisable, en travaillant systématiquement avec des C ($\subset \mathrm{Cof}_W$, Q-closes à gauche, Q-engendrées à gauche par une *petite* partie C_0 de C) qui sont stables par toutes limites inductives filtrantes.

Je suppose à nouveau sur $\mathcal{M}$ les conditions suivantes : p. 29 [page 44]

a) $\mathcal{M}$ stable par petites limites inductives (et pas seulement filtrantes).

b) $\mathcal{M}$ muni d'une filtration cardinale $(\mathrm{Filt}^{\pi})_{\pi \geq \pi_0}$.

c) Les objets de $\mathcal{M}$ sont accessibles (**N.B.** Il suffit de le supposer pour les objets de Filt^{π_0}).

La condition (b) implique que $\mathcal{M}$ contient une petite famille génératrice par épimorphismes stricts (p. ex. une sous-catégorie $\mathcal{C}$ petite de $\underline{\mathrm{Filt}}^{\pi_0} = \mathcal{M}^{\pi_0}$ telle que l'inclusion $\mathcal{C} \longrightarrow \underline{\mathrm{Filt}}^{\pi_0}$ soit une équivalence de catégories). Par SGA 4 I 8.12.7, il en résulte que $\mathcal{M}$ est stable par petites limites projectives. Il s'ensuit le

14. **N.B.** On voit facilement que $\boxed{TF = F \cap W,}$ mais ça ne suffit pas pour avoir $TF = F_0 \cap W$ pour TC_0 convenable.

15. **N.B.** On sait que $\boxed{W = TF \circ TC,}$ ce qui n'est nullement suffisant pour impliquer (c) !

Lemme 5.1 (sous les conditions (a), (b)). *Pour tout objet X de $\mathcal{M}$, l'ensemble* $\mathrm{Ss}(X)$ *des sous-objets de X, muni de la relation d'ordre naturelle "d'inclusion", admet des* inf *et des* sup *quelconques.*

Des inf, car ceux-ci s'expriment comme des limites projectives dans $\mathcal{M}$. Or l'existence des inf implique celle des sup, puisque $\sup_J = \inf_{J'}$, où J' est l'ensemble des majorants de J dans $\mathrm{Ss}(X)$.

Corollaire 5.2. *Pour toute flèche $f : Z \longrightarrow X$ dans $\mathcal{M}$, il existe, parmi les sous-objets X' de X par lesquelles f se factorise, un plus petit (qu'on notera* $\mathrm{Im}\, f$*). Le morphisme* [page 45]
$Z \longrightarrow \mathrm{Im}\, f$ *est un épimorphisme.*

Cette dernière assertion provient de celle-ci :

Lemme 5.3. *Soient $\mathcal{M}$ une catégorie où les noyaux des doubles flèches existent. Soit $f : Z \longrightarrow Y$ une flèche de $\mathcal{M}$. Alors g est un épimorphisme si et seulement si g ne se factorise pas par un sous-objet* strict Y_0 *de Y différent de Y.*

On va faire une hypothèse supplémentaire (pratiquement anodine) sur les Filt^π :

d) Filt^π est stable par limites inductives indexées par des catégories d'indices I telles que $\mathrm{card}\,\mathrm{Fl}(I) \leq \pi$ [16]. (Il suffit de supposer la stabilité par objet initial, sommes amalgamées simples, et $\varinjlim$ filtrantes indexées par un ensemble ordonné I de cardinal $\leq \pi$.) De plus, si $f : Z \longrightarrow X$ est une flèche de $\mathcal{M}$ telle que Z ou X est dans Filt^π, alors $\mathrm{Im}\, f \in \mathrm{Filt}^\pi$.

Cette dernière condition sur $\mathrm{Im}\, f$ se décompose en deux : [page 46]

d_1) Tout sous-objet d'un objet de Filt^π est dans Filt^π.

d_2) Si Z est dans Filt^π, alors tout quotient Z' de Z tel que $\mathrm{Im}\, p = Z'$ (où $p : Z \longrightarrow Z'$ est le morphisme canonique) est dans Filt^π. [17]

Bien sûr, pratiquement il sera toujours vrai que Filt^π est stable par passage aux sous-objets et aux quotients d'un objet (pas seulement les quotients particuliers dont il est question dans (d_2). D'ailleurs, lorsque tout bimorphisme (*i.e.* monomorphisme *et* épimorphisme) de $\mathcal{M}$ est un isomorphisme, alors (d_2) équivaut bien à la stabilité de Filt^π par quotients d'objets. p. 30

Proposition 5.3. [Deux fois 5.3.] *Supposons les conditions* (a), (b), (d) *vérifiées pour $\mathcal{M}$. Soient π un cardinal $\geq \pi_0$, et X un objet de $\mathcal{M}$. Soit* $\mathrm{Ss}_\pi(X)$ *l'ensemble des sous-objets de X qui sont dans* Filt^π*. Cet ensemble, ordonné par la relation d'ordre induite par* $\mathrm{Ss}(X)$*, est grand devant π (et en particulier filtrant). Si de plus, les limites inductives filtrantes de monomorphismes dans $\mathcal{M}$ sont des monomorphismes* [18] *(p. ex. si les limites inductives filtrantes sont exactes à gauche), ou si les objets de* Filt^π *sont π-accessibles, on a* $\varinjlim_{\alpha \in \mathrm{Ss}_\pi(X)} Z_\alpha \xrightarrow{\sim} X$ [19].

Démonstration. Soit $(Z_\alpha)_{\alpha \in A}$ une famille de sous-objets de X tels que $Z_\alpha \in \mathrm{Filt}^\pi$, [page 47]
et $\mathrm{card}\, A \leq \pi$. Soit $Z = \coprod_{\alpha \in A} Z_\alpha$, on a $Z \in \mathrm{Filt}^\pi$ par (c). Le plus petit sous-objet de X majorant les Z_α n'est autre que $\mathrm{Im}\,(Z \longrightarrow X)$, qui est dans Filt^π par (d_1). Prouvons que $\varinjlim_{\alpha \in \mathrm{Ss}_\pi(X)} Z_\alpha \xrightarrow{\sim} X$ est un isomorphisme, quand on sait que c'est un monomorphisme. Or

$$X \;=\; \varinjlim_{I} X_i \;,$$

[16] Cette condition sera nommée (d_0) par la suite.

[17] Il semblerait qu'on n'aura pas besoin de (d_1), seulement de (d_2). Mais en fait, (d_1) doit être conséquence de (d_2), et (d_2) est conséquence de la première partie de (d) (stabilité par $\varinjlim$ finies) si tout épimorphisme dans $\mathcal{M}$ est strict, donc effectif (si les Filt^π sont stables par $\varprojlim$ finies aussi …).

[18] C'est une *condition d'exactitude* de $\mathcal{M}$, que je vais noter comme :

ⓔ Les monomorphismes dans $\mathcal{M}$ sont stables par $\varinjlim$ filtrantes dans $\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M})$.

[19] Dire aussi que $\mathrm{Ss}_\pi(X)$ est π-adapté, et le système inductif $(Z_\alpha)_\alpha$ aussi.

où $(X_i)_{i\in I}$ est un système inductif filtrant, I ensemble ordonné grand devant π, les X_i dans Filt^π. Soit, pour tout $i \in I$, X'_i l'image de X_i dans X. On a donc $X'_i \in \mathrm{Filt}^\pi$ par (d_2). Utilisant le fait que les $X_i \longrightarrow X'_i$ sont des épimorphismes, on voit de suite que $X = \varinjlim_I X'_i$. Considérons l'application

$$\begin{array}{ccc} I & \longrightarrow & \mathrm{Ss}_\pi(X) \\ i & \longmapsto & X'_i\ . \end{array}$$

C'est une application croissante, soit J son image, partie filtrante grande devant π de $\mathrm{Ss}_\pi(X)$, telle que

$$\varinjlim_{\alpha\in J} Z_\alpha \xrightarrow{\sim} X\ .$$

On a donc [page 48]

$$\underbrace{\varinjlim_{\alpha\in J} Z_\alpha}_{\simeq X} \longrightarrow \varinjlim_{\alpha\in \mathrm{Ss}_\pi X} Z_\alpha \xrightarrow{\varphi} X\ ,$$

le composé étant l'identité. Si on sait que φ est un monomorphisme, il en résulte que c'est un isomorphisme (monomorphisme ayant une section). Or φ sera un monomorphisme si toute $\varinjlim$ filtrante de monomorphismes est un monomorphisme, et alors on gagne.

Si on suppose que les éléments de Filt^π sont π-accessibles, on gagne aussi, car on trouve : p. 31

Corollaire 5.4. *Si les objets de* Filt^π *sont* π*-accessibles (p. ex. si* $\pi \geq \pi_1$ *et* $\pi = \pi^{\pi_0}$*, p. ex.* $\pi \geq \pi_1$ *et* $\pi = 2^c$*, avec* $c \geq \pi_0$*,* cf. (3.2) *p. 16), alors pour toute partie filtrante* J *de* $\mathrm{Ss}(X)$ *grande devant* π*, telle que* $\varinjlim_{\alpha\in J} Z_\alpha \xrightarrow{\sim} X$*,* J *est cofinale dans* $\mathrm{Ss}_\pi(X)$ *(donc* $\varinjlim_{\alpha\in J} Z_\alpha \xrightarrow{\sim} \varinjlim_{\alpha\in \mathrm{Ss}(X)} Z_\alpha$*).*

C'est immédiat.

Scholie 5.5. Quand on fait sur $\mathcal{M}$ l'hypothèse d'exactitude assez anodine que les $\varinjlim$ filtrantes de monomorphismes sont des monomorphismes, *ou* qu'on se borne aux cardinaux π tels que les objets de Filt^π soient π-accessibles, on peut *canoniser* la représentation d'un objet X comme $\varinjlim_{i\in I} X_i$, avec $X_i \in \mathrm{Filt}^\pi$ et I grand devant π, en prenant $I = \mathrm{Ss}_\pi(X)$, et le système inductif correspondant. On a de plus l'agréable propriété supplémentaire que voici : toute partie filtrante J de I, de cardinal $\leq \pi$, admet une borne supérieure i_J, et (si on suppose que $\mathcal{M}$ satisfait la condition (e), page 46, note 18), on aura [page 49]

$$X_{i_J} = \varinjlim_{i\in J} X_i\ ;$$

en d'autres termes, on a une représentation de X par un système inductif (parfaitement) π-*adapté* (*cf.* XIII, p. 85, 86).

Soit maintenant [page 50]

$$M \subset \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$$

une partie de $\mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$, stable par la relation d'isomorphie. Si M est π-accessible (suivant la condition b_π de XIII, p. 88), alors en posant

$$M^\pi = M \cap \mathrm{Filt}^\pi\ ,$$

M^π détermine M par la condition suivante sur $X \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$.

$$\begin{array}{l} X \in M \iff \text{le sous-ensemble } \mathrm{Ss}_\pi^M(X) \text{ de } \mathrm{Ss}_\pi(X) \text{ formé des } X_\alpha \in \mathrm{Ss}_\pi(X) \\ \text{tels que } X_\alpha \in M \ (\iff X_\alpha \in M^\pi) \text{ est cofinal dans } \mathrm{Ss}_\pi(X). \end{array} \qquad (5.1)$$

Notons que lorsque $X \in \mathrm{Filt}^\pi$, ce critère est trivialement valable, puisque alors $\mathrm{Ss}_\pi(X)$ admet X comme plus grand élément, et les sous-ensembles cofinaux sont ceux qui contiennent cet objet final. Donc (5.1) est intéressant seulement pour les $X \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M} \backslash \mathrm{Filt}^\pi$. Notons que pour *toute* partie M^π de Filt^π, on peut définir une partie M de $\mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$ par la condition (5.1), et on aura trivialement

$$M^\pi \;=\; M \cap \mathrm{Filt}^\pi \;. \tag{5.2}$$

Mais sans doute, bien que M satisfasse (5.1), il n'est pas pour autant nécessairement π-accessible. En effet, pour qu'il le soit, il faut qu'il soit stable par $\varinjlim$ grandes devant π d'éléments de M^π, ce qui implique que tout facteur direct d'un élément de M^π est dans M, donc aussi dans M^π, d'après la condition de stabilité (d) sur Filt^π. C'est là une condition particulière sur la partie M^π de Filt^π. Aussi, on devra avoir une condition sur $\mathcal{M}$ plus forte que la validité de (5.1), savoir : p. 32 [page 51]

> Pour tout $X \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$ et pour toute partie J de $\mathrm{Ss}_\pi(X)$, telle que
> *a*) J est cofinale dans $\mathrm{Ss}_\pi(X)$ et
> *b*) Si $J' \subset J$ est une partie filtrante de J, de cardinal $\leq \pi$, alors sa borne supérieure $\alpha_{J'}$ dans $\mathrm{Ss}_\pi(X)$ appartient à J,
>
> on a $X \in M$ si et seulement si $J^M \overset{\text{déf}}{=} J \cap \mathrm{Ss}_\pi^M(X)$ est cofinal dans J (ou ce qui revient au même, dans $\mathrm{Ss}_\pi(X)$) [(20)]. (5.3)

Si on admet déjà le "il suffit" de (5.1), alors il suffit dans (5.3) de supposer $X \in M$ et exiger qu'alors J^M soit cofinal dans J.

Mais notons la

Proposition 5.6. [(21)] *Supposons π choisi de telle façon que les objets de* Filt^π *soient π-accessibles (p. ex. $\pi = 2^c$, avec $c \geq \pi_1$,* cf. (3.2), *p. 16). Alors, pour une partie M de* $\mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$*, M est π-accessible si et seulement si elle satisfait au critère* (5.3). [page 52]

On a vu que c'est nécessaire (tautologiquement, compte tenu de la proposition 5.3 et du scholie 5.5, bas de la page 49). Prouvons que c'est suffisant, en établissant d'abord le

Lemme 5.7. *Sous les conditions de* 5.6 *sur π, et la condition* (e) *sur $\mathcal{M}$* (p. 46)*, pour toute représentation π-adaptée $X = \varinjlim_{i \in I} X_i$ d'un objet X de $\mathcal{M}$, le sous-ensemble I' des $i \in I$ tels que $X_i \longrightarrow X$ soit un monomorphisme, est cofinal dans I. De plus, I' est stable par bornes supérieures dans I de parties filtrantes J de I' de cardinal $\leq \pi$.*

Montrons comment ce lemme 5.7 implique le "il suffit" de la proposition 5.6. Soit donc $X = \varinjlim_{i \in I} X_i$ une représentation π-adaptée de X ($X_i \in \mathrm{Filt}^\pi$, I grand devant π, *etc.*). Il faut prouver que, si 5.3 est valable, alors $X \in M$ si et seulement si l'ensemble I_M est cofinal dans I.

Supposons $X \in M$. Considérons le sous-ensemble $I' \subset I$ décrit dans le lemme. On a une application $I' \longrightarrow \mathrm{Ss}_\pi(X)$, soit $i \longmapsto X'_i = \mathrm{Im}\,(X_i \hookrightarrow X)$, et on a [page 53]

$$X \simeq \varinjlim_{i \in I} X_i \;\simeq\; \varinjlim_{i \in I'} X_i \;\simeq\; \varinjlim_{i \in I'} X'_i \;\simeq\; \varinjlim_{\alpha \in J} Z_\alpha \;,$$

où J est l'image de I' dans $\mathrm{Ss}_\pi(X)$. Comme les objets de Filt^π sont π-accessibles, on en conclut que J est cofinal dans $\mathrm{Ss}_\pi(X)$. Par 5.3, il s'ensuit que l'ensemble J_M des $\alpha \in J$ tels que $Z_\alpha \in M$ est cofinal dans J, donc $\neq \emptyset$. Donc I'_M, qui est l'image inverse de J_M

[20] Au lieu de J cofinale dans $\mathrm{Ss}_\pi(X)$, il suffit même que l'on ait $\varinjlim_{\alpha \in J} X_\alpha \xrightarrow{\sim} X$ – la condition correspondante sur M devient donc plus exigeante. Mais si les objets de Filt^π sont π-accessibles, cette condition est en fait équivalente à la condition plus faible. p. 33

[21] Faux tel quel, vrai si on suppose que M^π est stable par $\varinjlim$ filtrantes.

dans I', est en tous cas non vide. Appliquant le même résultat en remplaçant I' par le sous-ensemble $I'_{\geq i'_0}$, on voit que I'_M est cofinal dans I', donc aussi dans I, puisque I' est cofinal dans I ; donc $I_M \supset I'_M$ est cofinal dans I, *q.e.d.*

Inversement, supposons que I_M soit cofinal dans I, et prouvons $X \in M$. La difficulté ici provient du fait que la représentation $X = \varinjlim_{i \in I_M} X_i$ n'est plus adaptée à π – I_M n'est pas nécessairement stable dans I par bornes supérieures (dans I) de parties filtrantes dans I_M, I' de cardinal $\leq \pi$. En somme, il faut prouver que M est stable par $\varinjlim$ grandes devant π sans plus, et je doute maintenant que ça résulte des seules hypothèses faites ici, qui ne concernent que les systèmes inductifs où les morphismes de transition sont des monomorphismes. [page 54]

Voici, je crois, un contre-exemple. Prenons

$$M \quad = \quad \begin{array}{l}\text{ensemble des objets de } \mathcal{M} \text{ isomorphes à un objet fixe} \\ X_0 \in \mathrm{Filt}^\pi, \text{ tel que } X_0 \text{ n'ait pas d'endomorphisme qui} \\ \text{soit un monomorphisme autre que l'identité.}\end{array} \tag{5.4}$$

Alors la condition 5.3 est satisfaite. Car :

a) Si $X \in M$, *i.e.* $X \simeq X_0$, alors $X \in \mathrm{Filt}^\pi$, donc $\mathrm{Ss}_\pi(X)$ admet X comme objet final, et J, étant cofinal, contient cet élément, donc J_M (qui le contient aussi) est cofinal.

Et :

b) Si J_M est cofinal, l'hypothèse (5.4) implique que l'ensemble des morphismes de transition entre les Z_α ($\alpha \in J_M$) est formé d'isomorphismes, donc la limite inductive X des Z_α en question est isomorphe à chacun d'eux, donc $X \simeq X_0$, *i.e.* $X \in M$.

Pourtant, M n'est π-accessible que s'il est stable par $\varinjlim$ grandes devant π, ce qui implique qu'il est stable par *facteurs directs.* Mais l'hypothèse (5.4) n'exclut nullement que X_0 admette un projecteur p ($p^2 = p$) non trivial. Celui-ci aura une image X' dans $\mathcal{M}$, qui sera facteur direct de X_0 non isomorphe à X_0, *i.e.* non dans M. [page 55]

Ces difficultés disparaissent si on suppose que M^π est stable par $\varinjlim$ filtrantes indexées par des ensembles ordonnés I de cardinal $\leq \pi$. En effet, dans ce cas, dans la démonstration précédente, le sous-ensemble I_M est stable par bornes supérieures (dans I) de parties J de I_M filtrantes et de cardinal $\leq \pi$. Donc le système inductif $(X_i)_{i \in I_M}$ est encore π-adapté, et on peut lui appliquer le lemme 5.7, pour trouver un sous-ensemble cofinal $I'_M \subset I_M$, tel que les $X_i \longrightarrow X$ pour $i \in I'_M$ soient des monomorphismes. L'image J de I'_M dans $\mathrm{Ss}_\pi(X)$ est alors une partie de $\mathrm{Ss}_\pi(X)$ telle que $\varinjlim_{\alpha \in J} Z_\alpha = X$, donc (par l'hypothèse faite sur π) cofinale dans $\mathrm{Ss}_\pi(X)$ (5.4), avec $Z_\alpha \in M^\pi$ pour tout $\alpha \in J$. Donc par 5.3 on a $X \in M$, *q.e.d.*


Il reste à prouver le lemme 5.7. Avec les hypothèses et notations du lemme, soit donc $i_0 \in I$, il faut trouver $i' \in I'$ tel que $i' \geq i_0$. Considérons l'image X'_i de X_i dans X, et l'inclusion [page 56] p. 34

$$\underbrace{X'_{i_0}}_{\in \mathrm{Filt}^\pi} \longrightarrow X \simeq \varinjlim X_i \, .$$

Comme $X'_{i_0} \in \mathrm{Filt}^\pi$, donc est π-accessible, il existe un $i_1 > i_0$ tel que $X'_{i_0} \longrightarrow X$ se factorise par

$$X'_{i_0} \longrightarrow X_{i_1} \, .$$

Appliquant ce même résultat à X_{i_1}, X'_{i_1} *etc.*, on trouve une suite infinie de morphismes



telle que les morphismes composés de deux en deux soient, sur la ligne supérieure, les transitions

$$X_{i_m} \longrightarrow X_{i_n} \qquad (\, i_m \,<\, i_n \,)\,,$$

et sur la ligne inférieure, les inclusions

$$X'_{i_m} \hookrightarrow X'_{i_n} \qquad (\hookrightarrow X)\,.$$

Soit $i_\omega = \sup_n i_n$ dans I, donc

$$X_{i_\omega} \;=\; \varinjlim_n X_{i_n} \;\simeq\; \varinjlim_n X'_{i_n} \;\simeq\; X'_{i_\omega}\,,$$

donc $X_{i_\omega} \longrightarrow X$ est un monomorphisme.

La dernière assertion de 5.7 résulte aussitôt du fait qu'une limite inductive filtrante de monomorphismes dans $\mathcal{M}$ est un monomorphisme (condition (e), p. 46). [page 57]

On peut préciser la proposition 5.6 obtenue ainsi :

Proposition 5.7. [Deux fois 5.7.] *Soient $\mathcal{M}$ une catégorie satisfaisant les conditions* (a), (b), (c), (d) (p. 44, 45) et (e) (p. 46). *Soit $\mathcal{M}$ une partie de* Ob$\mathcal{M}$*, stable par isomorphie, π un cardinal tel que les objets de* Filt$^\pi$ *soient π-accessibles. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

a) *M est π-accessible, et stable par $\varinjlim$ filtrantes.*

b) *M est π-accessible, et $M \cap$ Filt$^\pi$ est stable par $\varinjlim$ filtrante de cardinal $\leq \pi$.*

c) *Il existe une partie M^π de* Filt$^\pi$*, stable par $\varinjlim$ filtrantes de cardinal $\leq \pi$ et telle que pour tout $X \in$ Ob$\mathcal{M}$, on ait $X \in M$ si et seulement si l'ensemble J_M des $Z_\alpha \in J$ tels que $Z_\alpha \in M^\pi$ est cofinal dans J.*

(*De plus, sous la condition* (c)*, on a* $M^\pi = M \cap$ Filt$^\pi$.)

c′) *Il existe une partie M_0 de* Filt$^\pi$ *telle que M soit la plus petite partie de $\mathcal{M}$ stable par limites inductives filtrantes.* (*De plus, on peut alors prendre M_0* petite.)[22]. p. 35 [page 58]

Corollaire 5.8. *Les applications*

$$M \;\longmapsto\; M^\pi = M \cap \mathrm{Filt}^\pi\,,$$

$$M^\pi \;\longmapsto\; \begin{array}{l} \textit{l'ensemble des } X \in \mathrm{Ob}\mathcal{M} \textit{ tels que l'ensemble} \\ \mathrm{Ss}_\pi^{M^\pi}(X) \textit{ des } Z_\alpha \in \mathrm{Ss}_\pi(X) \textit{ qui sont dans } M^\pi \\ \textit{soit cofinal (= plus petit sous-ensemble de} \\ \mathrm{Ob}\mathcal{M} \textit{ stable par } \varinjlim \textit{ filtrantes)} \end{array}$$

établissent des bijections, inverses l'une de l'autre, entre l'ensemble des $M \subset$ Ob$\mathcal{M}$ satisfaisant les conditions équivalentes de la proposition 5.7*, et l'ensemble des parties M^π de* Filt$^\pi$ *stables par $\varinjlim$ filtrantes de cardinal $\leq \pi$.*

Démonstration de 5.7. L'implication $(b) \Longrightarrow (c)$ est tautologique, compte tenu de la définition de la π-accessibilité de M, et de la proposition 5.3. Et $(a) \Longrightarrow (b)$ provient de la stabilité de Filt$^\pi$ par $\varinjlim$ filtrantes de cardinal $\leq \pi$ (condition (d)).

Il reste donc à prouver $(c) \Longrightarrow (a)$. (C'est ici qu'on doit utiliser l'hypothèse particulière sur π.) Une fois ceci vu, on saura l'équivalence de (a), (b), (c), et d'autre part, il est immédiat que $(a) \Longrightarrow (c')$, en prenant $M_0 = M \cap$ Filt$^\pi$. D'autre part, $(c') \Longrightarrow (c)$ (sans

22. **N.B.** On a [page 59]

$$\begin{array}{ccc} (a) & \Longleftrightarrow & (b) \\ \Downarrow & & \Downarrow \\ (c') & \overset{?}{\Longrightarrow} & (c) \end{array}\,,$$

sans conditions sur π (sauf $\pi \geq \pi_0$).


hypothèses sur π ?), car on peut supposer que la partie M_0 de Filt^π est stable par $\varinjlim$ filtrantes de cardinal $\leq \pi$. Mais alors, connaissant l'équivalence de (a), (b) (c), d'où aussitôt le corollaire, il s'ensuit que l'enveloppe stable par $\varinjlim$ filtrantes de M_0 dans $\mathcal{M}$ n'est autre que la partie accessible déduite de M_0 dont il est question dans (c), et on gagne.

Donc tout revient à prouver que, si tous les objets de Filt^π sont accessibles, alors (c) implique (a). Montrons d'abord que (c) implique le critère d'appartenance (5.3) (p. 51), donc par la proposition 5.6 "revue et corrigée" dans la note 21, il s'ensuit déjà que $(c) \Longrightarrow (b)$, et il restera à établir $(b) \Longrightarrow (a)$, *i.e.* que (b) implique la stabilité de M par $\varinjlim$ filtrantes quelconques (pas seulement grandes devant π).

Que (c) implique (5.3) va résulter du lemme suivant, appliqué à $I = \mathrm{Ss}_\pi(X)$:

Lemme 5.8. `[Deux fois 5.8.]` *Soit I un ensemble ordonné* π-adapté, i.e. *filtrant et tel que toute partie filtrante K de I, de cardinal $\leq \pi$, ait une borne supérieure i_K dans I. Je dis qu'une partie J de I est* π-cofinale, *si elle est cofinale, et si pour toute partie filtrante K de J de cardinal $\leq \pi$, sa borne supérieure i_K dans I est dans J. (Il* p. 36
s'ensuit donc que J est lui aussi π-adapté, pour la structure d'ordre induite.) Ceci dit, `[page 60]`
l'intersection de deux parties π-cofinales de I est encore π-cofinale.

Il suffit de voir qu'elle est cofinale, car sa stabilité par bornes supérieures dans I de parties filtrantes de cardinal $\leq \pi$ est tautologique (si elle est vraie pour des J_α, elle est vraie pour $\bigcap_\alpha J_\alpha$). Soit $i_0 \in I$, et construisons un élément de $J \cap J'$ qui majore i_0. On construit de proche en proche une double suite



avec les i_α dans J, les i'_α dans J', et $i_1 \geq i_0$. On a donc

$$\sup i_\alpha \;=\; \sup i'_\alpha \,,$$

et si i est la valeur commune des deux membres, on a $i \in J \cap J'$.

Ceci vu, pour prouver la validité de (5.3), on note que la partie $J' = \mathrm{Ss}_\pi^{(M^\pi)}(X)$ de $I = \mathrm{Ss}_\pi(X)$, formée des $Z_\alpha \subset X$ tels que $Z_\alpha \in M^\pi$, est stable par bornes supérieures de parties filtrantes de cardinal $\leq \pi$, vu que M^π est stable par $\varinjlim$ de cardinal $\leq \pi$. Donc `[page 61]`
si J est une partie π-cofinale de $\mathrm{Ss}_\pi(X)$, $J \cap J'$ est cofinale dans J, *i.e.* dans I, si et seulement si J' est cofinale dans I (*i.e.* si et seulement si $X \in M$, par la condition (c)). Car $J \cap J'$ cofinale $\Longrightarrow$ J' cofinale tautologiquement, et J' cofinale implique J' π-cofinale, donc $J \cap J'$ π-cofinale par le lemme 5.8, donc cofinale.


Reste à prouver seulement que $(b) \Longrightarrow (a)$, *i.e.* la stabilité de M par limites inductives filtrantes quelconques, moyennant (b). Ici à nouveau, cela ne doit pas utiliser l'hypothèse particulière sur π, ni même l'hypothèse d'exactitude (e) sur $\mathcal{M}$, mais être une histoire générale d'accessibilité :

Proposition 5.9. *Soit $\mathcal{M}$ une catégorie satisfaisant* (a), (b), (c), (d_0) (pages 44, 45), *$\pi \geq \pi_0$ un cardinal, M une partie π-accessible de* $\mathrm{Ob}\mathcal{M}$, i.e. *satisfaisant la condition b_π de* XIII, p. 88. *Alors M est stable par $\varinjlim$ filtrantes si et seulement si $M^\pi \overset{déf}{=} M \cap \mathrm{Filt}^\pi$ est stable par $\varinjlim$ filtrantes de cardinal $\leq \pi$.*

Je n'ai pas envie d'expliciter ici la démonstration, ayant l'impression pénible de refaire à perpette la même démonstration (ici et dans XIII). Je devrai revenir là-dessus dans une situation plus décantée.

`[page 62]`

Je vais quand même esquisser la démonstration. Soit $X = \varinjlim_I X_i$, I filtrant, les X_i dans M, il faut prouver que $X \in M$ (moyennant l'hypothèse de stabilité sur $M^\pi = M \cap \mathrm{Filt}^\pi$). p. 37



$\mathcal{C}$ est une catégorie cofibrée sur I, dont les fibres sont

$$\mathcal{C}_i \simeq M^\pi/X_i \,,$$

or comme $X_i \in M$, on voit, à cause de la condition de π-accessibilité, que M^π/X_i est *filtrante*. On va le dégager en

Lemme 5.10. *Soit M une partie π-accessible de $\mathcal{M}$. Alors pour tout $Y \in M$, M^π/Y est une catégorie* filtrante, *et $\mathrm{Ss}_\pi(Y)$ y est cofinale.*

Considérons le foncteur canonique [page 63]

$$I \;=\; \mathrm{Ss}_\pi(Y) \xrightarrow{\varphi} \underline{M}^\pi/Y \;=\; I' \,,$$

où la catégorie source I est filtrante. Par SGA 4 I 8.1.3, ce foncteur est cofinal si et seulement s'il satisfait deux conditions F 1, F 2, et alors I' est également filtrante. La condition F 1 est la condition habituelle que tout $i' \in \mathrm{Ob}I'$ est "majoré" par un $\varphi(i)$, *i.e.* tout $Z \longrightarrow Y$, avec $Z \in M^\pi$, est "majoré" par un *monomorphisme* $Z_\alpha \hookrightarrow Y$, avec $Z_\alpha \in M^\pi$, ce qui résulte du fait que c'est majoré par $Z_\alpha \hookrightarrow Y$ avec $Z_\alpha \in \mathrm{Filt}^\pi$, *i.e.* $Z_\alpha \in \mathrm{Ss}_\pi(Y)$, et que parmi ces Z_α ceux qui sont dans M^π sont cofinaux (vu que $Y \in M$). L'autre condition [23] est qu'une double flèche $i' \overset{f'}{\underset{g'}{\rightrightarrows}} \varphi(i)$ peut s'égaliser par une flèche $\varphi(h)$, avec $h : i \longrightarrow j$. Mais en fait, pour un $i' \in \mathrm{Ob}I'$, *i.e.* un $Z \longrightarrow Y$ donné ($Z \in M^\pi$), et un $i \in \mathrm{Ob}I$, *i.e.* un $Z_\alpha \hookrightarrow Y$ donné ($Z_\alpha \in M^\pi$), il existe au plus *une* flèche dans $I' = \underline{M}^\pi/Y$ de $Z \longrightarrow Y$ dans $Z_\alpha \hookrightarrow Y$. Donc la condition F 2 est trivialement satisfaite (on prend $h = \mathrm{id}_i$). [page 64]

Corollaire 5.11. *Si $(X_i)_{i\in I}$ est un système inductif filtrant, avec les X_i dans M^π, alors la catégorie $\mathcal{C} = \underline{M}^\pi/\underline{M} \times_{\underline{M}} (I, \varphi)$, construite page* 62, *est filtrante, et le foncteur canonique (fibrant) $\mathcal{C} \longrightarrow I$ est cofinal.*

Que $\mathcal{C}$ soit filtrante et $\mathcal{C} \longrightarrow I$ cofinal résulte formellement du fait que I l'est, que les fibres de $\mathcal{C}$ le sont, et que $\mathcal{C}$ est cofibrée sur I. (Mérite un lemme, à toutes fins utiles.)

N.B. On peut remplacer $\mathcal{C}$ par $\mathcal{C}_0$ dont les fibres sont les

$$\mathrm{Ss}_\pi^{M^\pi}(X_i) \;\subset\; \underline{M}^\pi \,; \qquad \text{cofinale dans } \mathcal{C}_i = \underline{M}^\pi/X_i \,,$$

on trouve une sous-catégorie de $\mathcal{C}$ cofinale dans $\mathcal{C}$, et qui est cette fois ordonnée tout comme I. [page 65]

On a p. 38

$$X_i \;=\; \varinjlim_{Z_\alpha \in \mathcal{C}_i} Z_\alpha \,,$$

donc

$$X \;=\; \varinjlim_{\alpha \in \mathcal{C}} Z_\alpha \,,$$

au total on est arrivé à représenter X comme $\varinjlim$ filtrante d'éléments Z_α qui sont (non seulement dans M, mais même) dans M^π.

23. Comme I est filtrante.

Changeons la notation, en prenant

$$X = \varinjlim_{i\in I} X_i\ , \qquad I \text{ ensemble ordonné filtrant, } X_i \in M^\pi\ \ \forall\, i \in I\ ,$$

soit I' l'ensemble des parties *filtrantes* $J \subset I$ telles que $\operatorname{card} J \leq \pi$, I' ordonné par inclusion. Alors I' est grand devant π, et on a un système inductif

$$(X_J)_{J\in I'}\ , \qquad X_J = \varinjlim_{i\in J} X_i\ .$$

Par l'hypothèse de stabilité de M^π (qui n'a pas encore servi), les X_J sont dans M^π. On a donc

$$X = \varinjlim_{J\in I'} X_J\ , \qquad \text{les } X_J \text{ dans } M^\pi,\ I' \text{ grande devant } \pi\ ,$$

donc $X \in M$ puisque M est π-admissible, *q.e.d.*

[page 66]

Définition 5.12.

1) Soit $\mathcal{M}$ une catégorie satisfaisant les conditions (a), (b), (c), (d) (p. 44-46). Soit $\pi \geq \pi_0$ un cardinal. Une partie M de $\mathrm{Ob}\mathcal{M}$ est dite *L-π-accessible,* si elle est π-accessible et stable par petites $\varinjlim$ filtrantes [24], ou ce qui revient au même (5.9), si elle est π-accessible et si $M^\pi = M \cap \mathrm{Filt}^\pi$ est stable par $\varinjlim$ filtrantes de cardinal $\leq \pi$. (**N.B.** Si les objets de Filt^π sont π-accessibles, 5.8 nous dit que cela signifie aussi qu'il suffit pour cela qu'il existe une partie M_0 de Filt^π telle que M soit la L-enveloppe (enveloppe stable par $\varinjlim$ filtrantes) de M_0 – condition qui est de toutes façons toujours nécessaire, en prenant $M_0 = M^\pi$.)
2) Soit M une partie de $\mathrm{Ob}\mathcal{M}$. On dit qu'elle est *L-accessible,* si elle satisfait à l'une des quatre conditions équivalentes suivantes :
   - a) Il existe un cardinal π tel que M soit L-π-accessible.
   - a') M est accessible et L-stable.
   - b) Il existe une petite partie M_0 de $\mathrm{Ob}\mathcal{M}$, telle que M soit la L-enveloppe de M_0 [25].
   - b') Il existe une partie M_0 de $\mathcal{M}$ contenue dans une partie Filt^π (ou ce qui revient au même, telle que la sous-catégorie pleine $\underline{M}_0$ de $\mathcal{M}$ soit essentiellement petite, *i.e.* équivalente à une petite catégorie, telle que M soit la L-enveloppe de M_0).

L'équivalence de (a) et (a'), ou de (b) et (b') est plus ou moins tautologique. L'équivalence de (a) et (b) résulte aussitôt du N.B. inclus dans 1°, compte tenu que les cardinaux π tels que les objets de Filt^π soient π-accessibles sont cofinaux dans l'ensemble des cardinaux dans $\mathfrak{U}$. (*Cf.* 3.2, page 16).

p. 39

[page 67]

Proposition 5.13. *Toute réunion finie de parties L-π-accessibles de* $\mathrm{Ob}\mathcal{M}$ *est L-π-accessible. L'intersection d'une famille* $(M_\alpha)_{\alpha\in A}$ *de parties L-π-accessibles, avec* $\operatorname{card} A \leq \pi$*, est L-$\pi$-accessible.*

Démonstration. La première assertion provient du fait qu'une réunion *finie* de parties L-stables de M est L-stable, et qu'on a itou pour la notion de π-accessibilité. Les deux choses se prouvent d'ailleurs pratiquement de la même façon, en utilisant le

Lemme 5.14. *Soit I un ensemble ordonné filtrant, $(I_\alpha)_{\alpha\in A}$ une famille* finie *non vide de parties de I, telle que $\bigcup I_\alpha = I$. Alors il existe $\alpha \in A$ tel que I_α soit cofinal.*

[page 68]

24. On dit alors que M est *L-stable.*
25. Cette condition ne dépend pas de la filtration cardinale choisie de $\mathcal{M}$.

Démonstration par l'absurde. Si pour aucun α, I_α n'était cofinal, on en conclurait que pour tout α il existe un i_α tel que $I/i_\alpha \cap I_\alpha = \emptyset$. Soit i majorant les i_α, on aura donc $I/i \cap I_\alpha = \emptyset \ \ \forall\, \alpha \in A$, contrairement à l'hypothèse que $\bigcup I_\alpha = I$.

Le cas d'une *intersection* de parties L-π-accessibles : elle est bien sûr L-stable, donc il reste à prouver qu'elle est π-accessible, *i.e.* satisfait la condition b_π de *loc. cit.*

[page 69]

Soit donc

$$X \ = \ \varinjlim_{i\in I} X_i \ , \qquad\qquad X_i \in \mathrm{Filt}^\pi \ ,$$

une représentation π-adaptée de X, avec I un ensemble ordonné π-adapté. Donc on a

$$X \in M_\alpha \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{array}{c}\text{l'ensemble } I_{M_\alpha} \text{ des } i \in I \text{ tels que } X_i \in M_\alpha \\ \text{est cofinal dans } I.\end{array} \qquad (*)$$

D'ailleurs, comme $M_\alpha^\pi = M_\alpha \cap \mathrm{Filt}^\pi$ est stable par $\varinjlim$ filtrante de cardinal $\leq \pi$, on voit tout de suite que la partie I_{M_α} de I est stable par bornes supérieures dans I de parties J de I_{M_α} filtrantes et de cardinal $\leq \pi$. Donc I_{M_α} cofinal équivaut à I_{M_α} π-*cofinal* (*cf.* 5.8, page 59). Soit $M = \bigcap_{\alpha\in A} M_\alpha$, je veux prouver que

$$X \in M \quad \Longleftrightarrow \quad \text{l'ensemble } I_M \ (= \bigcap I_{M_\alpha}) \text{ est cofinal dans } I. \qquad (**)$$

Or $(*)$ implique que $X \in M$ $(= \bigcap M_\alpha)$ équivaut à I_{M_α} π-cofinal pour tout α. Donc au total on veut prouver

$$I_{M_\alpha} \text{ cofinal dans } I \text{ pour tout } \alpha \quad \Longleftrightarrow \quad \bigcap I_{M_\alpha} \text{ est cofinal dans } I. \qquad (***)$$

[page 70]

On a bien sûr $\Longleftarrow$, donc il reste à prouver $\Longrightarrow$. Si l'ensemble d'indices A est fini, cela résulte du lemme 5.8, compte tenu que la cofinalité des I_{M_α} implique leur π-cofinalité. On doit donc simplement améliorer 5.8, par le

p. 40

Lemme 5.15. *Soient π un cardinal, I un ensemble ordonné filtrant π-adapté, et soit $(I_\alpha)_{\alpha\in A}$ une famille de parties I_α π-cofinales* (cf. 5.8)*, telle que* $\operatorname{card} A \leq \pi$*. Alors $\bigcap I_\alpha$ est π-cofinale.*

Il suffit de prouver qu'elle est cofinale, car la propriété de stabilité par bornes supérieures de parties filtrantes de cardinal $\leq \pi$ est évidente. Quitte à remplacer I par I/i_0, et les I_α par leurs traces sur I/i_0, la question est simplement de prouver que $\bigcap_\alpha I_\alpha \neq \emptyset$. On va construire un élément s de $\bigcap I_\alpha$ par induction transfinie. Prenons un bon ordre sur A, et prouvons par récurrence transfinie que pour tout $\alpha \in A$, l'ensemble

[page 71]

$$J_\alpha \ = \ \bigcap_{\beta<\alpha} I_\beta$$

est cofinal. Si on sait que J_α est cofinal, il en est de même de $J_{\alpha+1} = J_\alpha \cap I_\alpha$, par 5.8. Donc on est ramené à prouver que J_α est cofinal si α est un ordinal limite, donc à prouver le lemme 5.15 pour une suite transfinie *décroissante* de parties π-cofinales J_β $(\beta < \alpha)$ quand $\operatorname{card}\alpha \leq \pi$, telle que $J_\beta = \bigcap_{\beta'<\beta} J_{\beta'}$ quand β est limite. À prouver que l'intersection est π-cofinale – et on est réduit à prouver qu'elle est non vide. On va construire par récurrence transfinie une suite *croissante* d'éléments

$$i_\beta \ \in \ J_\beta \qquad\qquad (\,\beta \ \leq \ \alpha\,)\,.$$

Si i_β est construit, comme $J_{\beta+1}$ est cofinal, il existe $i_{\beta+1} \geq i_\beta$ dans $J_{\beta+1}$, O.K. Si β est un ordinal limite, on prend

$$i_\beta \ = \ \sup_{\beta'<\beta} i_{\beta'} \ ,$$

[page 72]

i_β est dans chaque I_{β_0} pour $\beta_0 < \beta$, puisque les $i_{\beta'}$ pour $\beta_0 \leq \beta' < \beta$ sont tous dans $J_{\beta_0} \supset J_{\beta'}$, donc aussi leur limite, donc

$$i_\beta \in \bigcap_{\beta_0<\beta} J_{\beta_0} = J_\beta .$$

Donc la récurrence transfinie marche, et nous donne donc un élément s_α de J_α !

Je vais prouver aussi en forme l'assertion pour $\bigcup_{\alpha\in A} M_\alpha$, quand A est fini. Posant cette fois $M = \bigcup_\alpha M_\alpha$, il faut prouver, moyennant les relations $(*)$ (p. 68), qu'on a

$$\begin{array}{lcl} X \in M & \iff & \text{l'ensemble } I_M \ (= \bigcup_\alpha I_{M_\alpha}) \\ (\textit{i.e.}\ \exists\ \alpha \text{ avec } X \in M_\alpha) & & \text{est cofinal dans } I\ , \end{array} \qquad (**)$$

et moyennant $(*)$ le premier terme de cette équivalence à établir signifie qu'il existe α avec I_{M_α} cofinal dans I. Bien sûr, si un des I_{M_α} est cofinal dans I, a fortiori leur réunion. Mais inversement, si la réunion est cofinale, elle est filtrante et réunion des parties (filtrantes) I_{M_α}, dont l'une doit donc être cofinale dans elle par le lemme 5.14, donc aussi dans I, *q.e.d.*

Corollaire 5.16 (de la proposition 5.13). *Toute réunion finie de parties L-accessibles de $\mathcal{M}$ est L-accessible. Toute intersection $\bigcap M_\alpha$ d'une famille petite de parties L-accessibles de $\mathcal{M}$, est L-accessible.* [page 73]

p. 41

6 Essai avorté pour un critère d'engendrement des parties L-accessibles de $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$.

Soit $\mathcal{M}$ une catégorie munie d'une filtration cardinale $(\mathrm{Filt}^\pi)_{\pi\geq\pi_0}$, et soit S un objet de Cat, considérons

$$\mathcal{M}(S) = \underline{\mathrm{Hom}}(S, \mathcal{M}) ,$$

et munissons $\mathcal{M}(S)$ de la filtration par les

$$\mathcal{M}^\pi(S) = \underline{\mathrm{Hom}}(S, \mathcal{M}^\pi = \underline{\mathrm{Filt}}^\pi(\mathcal{M})) .$$

Je dis que c'est là une filtration cardinale de $\mathcal{M}(S)$. Il faut vérifier les conditions (a), (b), (c) de SGA 4 I 9.12. Les conditions (a) (Filt^π essentiellement petite) et (b) (condition L_{π_0}, et stabilité de Filt^π par $\varinjlim_I$, I filtrante grande devant π_0 et de cardinal $\leq \pi$) passent aussitôt de $\mathcal{M}$ à $\mathcal{M}(S)$. La condition (c) est plus délicate (représentation d'un objet comme $\varinjlim$ filtrante grande devant π d'objets de Filt^π). Je ne vais pas refaire le travail, [page 74] fait dans un cas beaucoup plus général et plus délicat dans SGA 4 I §9, savoir dans le corollaire 9.24 du théorème 9.22 (p. 177). La seule restriction, c'est qu'on y suppose les objets de $\mathcal{M}$ accessibles, et désignant par π_1 le plus petit cardinal tel que $\pi_1 \geq \pi_0$ et que les objets de Filt^{π_0} soient π_1-accessibles, on se borne pour la filtration cardinale de $\underline{\mathrm{Hom}}(S, \mathcal{M})$ aux cardinaux $\boxed{\pi \geq c = 2^{c_0},}$ où

$$c_0 = \sup(\pi_1, \operatorname{card} \mathrm{Fl}(S)) .$$

C'est une restriction raisonnable et anodine.

Pour l'instant, je suis intéressé surtout au cas où $S = \mathbf{\Delta}_1$, donc à

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{\Delta}_1, \mathcal{M}) = \underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M}) ,$$

auquel cas on a $c_0 = \pi_1$, donc il suffit de se borner aux cardinaux $\pi \geq 2^{\pi_1}$ pour avoir une bonne filtration cardinale sur $\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M})$. [page 75]

C'est donc l'ensemble des deux conditions (b), (c) sur $\mathcal{M}$ (p. 44) qui est stable par passage aux $\underline{\mathrm{Hom}}(S, \mathcal{M}) = \mathcal{M}(S)$. Il en est de même de la condition (a) (stabilité par petites limites inductives), et aussi de la condition (d) (p. 45). De même la condition d'exactitude (e) (p. 46) sur les $\varinjlim$ filtrantes (elles doivent transformer les monomorphismes en monomorphismes).

Pour être tranquille, je vais faire sur $\mathcal{M}$ les hypothèses (a) à (e) inclus (bien que (e) me semble un peu artificielle, on devrait pouvoir l'éliminer, dans un second souffle !). Ces conditions ont donc la propriété de stabilité souhaitable par passage aux $\mathcal{M}(S)$, et en particulier par passage à $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$. Quitte à augmenter π_0, on peut donc supposer que les $\mathrm{Fl}^\pi(\mathcal{M}) = \mathrm{Hom}(\mathbf{\Delta}_1, \mathcal{M}^\pi)$ ($\pi \geq \pi_0$) forment aussi une filtration cardinale de $\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M})$.

On dispose donc des notions de parties π-accessibles, accessibles, L-π-accessibles, L-accessibles de $\mathrm{Fl}(\mathcal{M}) = \mathrm{Ob}\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M})$. Ces notions sont stables par réunions et intersections finies, et les notions absolues (sans π) stables par intersections "quelconques" (*i.e.* pour des *petites* familles de parties). Ce sera là une chose particulièrement cruciale, le cas d'une intersection $C \cap W$! p. 42 [page 76]

Le résultat principal, pour lequel j'ai fait les gammes du paragraphe précédent, est le suivant :

Théorème 6.1 [26]. *Soit $\mathcal{M}$ une catégorie satisfaisant les conditions dites :*

a) *Stabilité par petites $\varinjlim$ (pas nécessairement filtrantes).*

b) *$\mathcal{M}$ munie d'une filtration cardinale* $(\mathrm{Filt}^\pi)_{\pi \geq \pi_0}$.

c) *Les objets de $\mathcal{M}$ sont accessibles.*

d) *Les* Filt^π *sont stables par $\varinjlim$ indexées par des catégories I telles que* $\operatorname{card} \mathrm{Fl}(I) \leq \pi$, *et si $Z \in \mathrm{Filt}^\pi$, tout quotient Z' de Z (tel que $Z \longrightarrow Z'$ ne se factorise pas par un sous-objet Z'_0 de Z', différent de Z') est dans* Filt^π.

e) *Les limites inductives filtrantes dans $\mathcal{M}$ transforment les monomorphismes en monomorphismes.*

Soit C une partie L-accessible de $\mathrm{Fl}(\mathcal{M}) = \mathrm{Ob}\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M})$, i.e. (5.12) *une partie stable par $\varinjlim$ filtrantes, et accessible. Supposons de plus C formée de monomorphismes* [27], *et que C contient les* isomorphismes. *Alors il existe une partie petite $C_0 \subset C$, telle que $C \subset \widetilde{C_0}$. Plus précisément, si π est un cardinal tel que C soit π-accessible, et si on pose $C^\pi = C \cap \mathrm{Fl}^\pi(\mathcal{M})$, alors on a* [page 77]

$$C \subset \widetilde{C^\pi} = \widetilde{C_0}\,, \tag{6.1.1}$$

où C_0 est n'importe quelle petite partie de C^π telle que tout objet de C^π soit isomorphe à un objet de C_0.

Corollaire 6.2. *On a $C_* = C_{0\,*}$, $\widetilde{C} = \widetilde{C_0}$.*

Corollaire 6.3. *Conditions équivalentes sur la partie L-accessible C de* $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})_{\mathrm{mono}}$, *contenant les isomorphismes :*

a) *$C = \widetilde{C}$.*

b) *C est stable par cochangement de base et par composition.*

b′) *C est stable par cochangement de base, et par sommes amalgamées simples,* i.e. *si $A \longrightarrow B_1$, $A \longrightarrow B_2$ sont dans C, alors $A \longrightarrow B_1 \amalg_A B_2$ aussi.*

c) *C^π est stable dans* $\mathrm{Fl}^\pi(\mathcal{M}) = \mathrm{Fl}(\mathcal{M}^\pi)$ *par cochangement de base et par composition.*

c′) *C^π est stable dans* $\mathrm{Fl}(\mathcal{M}^\pi)$ *par cochangement de base et par sommes amalgamées* (cf. b′).

26. Démonstration canulée, énoncé peut-être *faux* !!

27. Finalement, on se débarrasse de cette hypothèse.

Quand ces conditions sont satisfaites, alors (C, C_*) *est un couple de Quillen, justiciable du théorème* 1 *du paragraphe* 1 (p. 10).

La dernière assertion résulte du théorème 6.1 et du corollaire au théorème 1 du paragraphe 1. On a d'autre part tautologiquement

p. 43
[page 78]

$$\begin{array}{ccccc} (a) & \Longrightarrow & (b) & \Longrightarrow & (b') \\ & & \Downarrow & & \Downarrow \\ & & (c) & \Longrightarrow & (c') \ , \end{array}$$

et il reste à prouver $(c') \Longrightarrow (a)$, ce qu'on fera plus bas.

Prouvons donc 6.1. Dans (6.1.1) l'égalité $\widetilde{C_0} = \widetilde{C^\pi}$ est tautologique. Donc tout revient à prouver

$$C \ \subset \ \widetilde{C^\pi} \ .$$

Une difficulté ici, c'est qu'on ne sait *pas* que $\widetilde{C^\pi}$ soit stable par $\varinjlim$ filtrantes – on le sait seulement pour C. Soit donc

$$A \ \hookrightarrow \ B$$

une flèche dans C, prouvons qu'elle est dans $\widetilde{C^\pi}$. Pour ceci, on va construire, par induction transfinie, une suite transfinie *strictement* croissante de sous-objets A_α de B contenant $A = A_0$,

$$\underbrace{A}_{=A_0} \ \overset{i_\alpha}{\hookrightarrow} \ A_\alpha \ \overset{i_{\beta,\alpha}}{\hookrightarrow} \ A_\beta \overset{j_\beta}{\longrightarrow} B \ ,$$

telle que l'on ait

$$i_\alpha \ \in \ \widetilde{C^\pi} \ , \qquad \text{plus généralement les } i_{\beta,\alpha} \ \in \ \widetilde{C^\pi} \ , \qquad j_\alpha \ \in \ C \ ,$$

et que l'on ait

$$A_\alpha \ = \ \varinjlim_{\beta<\alpha} A_\beta \qquad \text{si } \alpha \text{ ordinal limite .}$$

[page 79]

Cela précise déjà la définition récurrente pour $\alpha = \alpha_0$ ordinal limite. Notons que le A_{α_0} construit en termes des A_β $(\beta < \alpha_0)$ satisfait bien aux conditions que

a) les $i_{\alpha_0,\beta} : A_\beta \longrightarrow A_{\alpha_0}$ sont dans $\widetilde{C^\pi}$, car $\widetilde{C^\pi}$ est stable par "limites inductives ordinales strictes" (*cf.* 1.19, p. 8),

b) $j_{\alpha_0} : A_{\alpha_0} \longrightarrow B$ est dans C, car c'est la limite inductive filtrante du système des $A_\beta \longrightarrow B$ $(\beta < \alpha_0)$ qui sont dans C, et C est stable par ces limites.

Il reste donc à préciser comment on passe de A_α à $A_{\alpha+1}$. Cela revient à prouver le

Lemme 6.4. *Soit* $f : A \hookrightarrow B$ *dans* C*, telle que* f *ne soit pas un isomorphisme. Alors il existe un sous-objet* A_1 *de* B*,* distinct de A*, tel que* $A \longrightarrow A_1$ *soit dans* $\widetilde{C^\pi}$*, et* $A_1 \longrightarrow B$ *dans* C*.*

Si ce lemme est admis, cela signifie que la construction transfinie se continue aussi longtemps que l'on trouve des A_α tels que $A_\alpha \neq B$, *i.e.* $A_\alpha \hookrightarrow B$ ne soit pas un isomorphisme. Mais comme les A_α sont tous différents, si π est l'ensemble des sous-objets de B (on sait que c'est un

p. 44

ensemble petit, à cause des hypothèses faites sur $\mathcal{M}$), les ordinaux α pour lesquels A_α existe satisfont $\operatorname{card} A_\alpha \leq \pi$. Donc il doit exister un α tel que $A_\alpha = B$. Mais alors $i_\alpha : A \longrightarrow A_\alpha$ est égal à f, donc $f \in \widetilde{C^\pi}$, *q.e.d.*

[page 80]

Il reste donc à prouver 6.4. Pour ceci, soit I l'ensemble des sous-objets de B qui sont dans Filt^π, ordonné par inclusion. (Si B est dans Filt^π, A aussi, donc f est déjà dans

$C^\pi \subset \widetilde{C^\pi}$, et il n'y a rien à prouver.) C'est un ensemble filtrant grand devant π (et même π-*adapté*), dont la $\varinjlim$ est B (5.3, p. 46). Considérons les

$$A_i \;=\; B_i \cap A\;,$$

ils sont dans Filt^π, comme sous-objets d'objets de Filt^π (condition (d) sur la filtration cardinale). Ainsi, la flèche f apparaît comme limite inductive filtrante des flèches

$$f_i \;:\; A_i \longrightarrow B_i\;.$$

Il est trivial que le système des A_i est cofinal dans $\mathrm{Ss}_\pi(A)$, donc $A = \varinjlim A_i$, d'où $f = \varinjlim f_i$.

D'autre part, je dis que le système inductif des f_i dans $\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M})$ est *bien adapté à* π. [page 81] On sait déjà que I est bien adapté à π, le sup dans I d'une partie filtrante J de cardinal $\leq \pi$ étant le sup dans l'ensemble ordonné $\mathrm{Ss}(B)$ (lequel sup se trouve dans $\mathrm{Ss}_\pi(B)$). Il est essentiel, pour notre argument, de savoir que si $i_J = \sup J$, alors non seulement $B_{i_J} = \varinjlim_{i\in J} B_i$, mais aussi $A_{i_J} = \varinjlim_{i\in J} A_i$, de sorte que le système inductif des f_i est π-adapté dans $\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M})$. Il semble qu'il faille donc une condition d'exactitude sur $\mathcal{M}$ voisine de (e), savoir :

(e′) Les foncteurs $\varinjlim$ filtrantes commutent au changement de base.

(Il le suffit ici dans le cas très particulier d'un changement de base par un monomorphisme $A \longrightarrow B$, et d'une limite inductive filtrante de sous-objets de B pour des morphismes d'inclusion comme transitions.) Notons que (e), (e′) se trouvent généralement comme conséquence de la condition

(e_0) Les $\varinjlim$ filtrantes dans I sont exactes à gauche.

Ceci posé, on voit donc, C étant π-accessible et I grand devant π, que l'ensemble I_C [page 82] des $i \in I$ tels que $f_i \in C$ est *cofinal* dans I. Mais comme $f_i \in \mathrm{Filt}^\pi$, $f_i \in C$ équivaut à $f_i \in C^\pi$. Comme $A \longrightarrow B$ n'est pas un isomorphisme, il existe un i_0 tel que $B_{i_0} \not\subset A$, puis un $i \geq i_0$ tel que $f_i \in C^\pi$, et aussi $B_i \not\subset A$ (puisque $B_i \supset B_{i_0}$). Ainsi on a prouvé ceci :

($*$) Sous les hypothèses de (6.4) et moyennant l'hypothèse (e′) sur $\mathcal{M}$, il existe un sous-objet B' de B satisfaisant les conditions suivantes.

a) $B' \in \mathrm{Filt}^\pi$.

b) $B' \not\subset A$.

c) Posant $A' = B' \cap A$, l'inclusion

$$i' \;:\; A' \longrightarrow B'$$

est dans C^π.

De plus, l'ensemble des $J \subset \mathrm{Ss}_\pi(B)$ formé des B' en question est cofinal dans $\mathrm{Ss}_\pi(B)$, et même π-cofinal. p. 45

Il faut prouver encore ce dernier point – que J (dont on sait qu'il est cofinal) est même π-cofinal, *i.e.* stable par sup (dans $\mathrm{Ss}_\pi(B)$) des parties filtrantes $J' \subset J$ telles que $\mathrm{card}\, J' \leq \pi$. Mais cela résulte aussitôt du fait que C étant stable par

limites inductives filtrantes, $C^\pi = C \cap \mathrm{Filt}^\pi$ est stable par $\varinjlim$ filtrantes de cardinal [page 83] $\leq \pi$, en vertu de la condition (d) sur Filt^π. Considérons maintenant le carré cocartésien

$$\begin{array}{ccc} A' & \xrightarrow{\;i'\;} & B' \\ \downarrow & & \downarrow \\ A & \xrightarrow{\;i\;} & C' = A \amalg_{A'} B' \end{array} \xrightarrow{\;j\;} B\;.$$

Comme $i' \in C^\pi$, on a $i \in \widetilde{C^\pi}$ (car $\widetilde{C^\pi}$ stable par cochangement de base). D'autre part, j'ai besoin du fait que j soit dans C, et je ne sais pas même qu'il est un monomorphisme ! Aussi il faut repasser aux notations indicielles

$$\begin{array}{ccccc} A_i & \xrightarrow{\alpha_i} & B_i & & \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ A & \xrightarrow{\beta_i} & C_i & \xrightarrow{\gamma_i} & B\,. \end{array}$$

Comme la formation des sommes amalgamées commute aux limites inductives filtrantes, on voit que $\varinjlim C_i \simeq A \amalg_{\varinjlim A_i} \varinjlim B_i = A \amalg_A B = B$, donc la limite inductive des γ_i est un isomorphisme (essentiellement id_B). D'autre part, le même argument montre que le système inductif des C_i ($i \in J$) dans $\mathcal{M}$ est π-adapté, donc aussi celui des γ_i [28] dans $\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M})$. Comme $\varinjlim \gamma_i$ est un isomorphisme, il est dans C. Comme C est π-accessible, il s'ensuit que l'ensemble J' formé des $i \in J$ tels que $\gamma_i \in C$ est lui aussi cofinal [29]. Donc on trouve i avec $\alpha_i \in C^\pi$, $\gamma_i \in C$, ce qui établit le lemme 6.4, et achève la démonstration du théorème 6.1. [page 84]

7 Construction de triples de Quillen clos avec $C = \mathrm{Mon} \subset \mathrm{Cof}_W$

Finalement, tous les beaux développements des paragraphes 5, 6 ne me donnent pas le "sweeping result" souhaité. Peut-être est-il faux – peut-être la propriété d'engendrement "~" par une petite partie (pour les ensembles accessibles, ou L-accessibles) est-elle beaucoup plus rarement satisfaite, que je ne l'aurais imaginé. Pour bien faire, il faudrait que je traite jusqu'au bout quelques exemples, p. ex. celui de Cof_W, et de W^{univ} dans Cat, pour un localiseur fondamental plus ou moins général, et surtout dans le cas $W = \mathbf{W}_\infty$. Sûrement Cof_W et W^{univ} sont accessibles (il faudrait que je le vérifie pourtant), et si le "théorème" hypothétique du paragraphe 6 est faux pour eux, du moins en aurai-je le cœur net. Mais il reste pourtant la question : si $C = \widetilde{C}$ est stable par $\varinjlim$ filtrantes, et de la forme $\widetilde{C_0}$, C_0 petit, et si W est L-accessible également, alors $C \cap W$ est-il aussi de la forme $\widetilde{TC_0}$, avec TC_0 petit ? Je viens encore d'essayer de le prouver, en supposant de plus $C \subset$ mono, et ne vois aucun moyen d'y parvenir. Il faudrait donc un contre-exemple pour dissiper ces perplexités ! Et le mieux serait dans Cat, tant qu'à faire. [page 85] p. 46

Il surnage pourtant un résultat tangible positif, que je vais maintenant essayer de bien cerner et prouver :

Théorème 7.1. *Soit $\mathcal{M}$ une catégorie stable par petites $\varinjlim$ filtrantes, $M_0 \subset \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$ un sous-ensemble de $\mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$ générateur par monomorphismes stricts, plus précisément on suppose ceci :* [page 86]

Pour tout monomorphisme $i : A \hookrightarrow B$ dans $\mathcal{M}$ qui n'est pas un isomorphisme, il existe un monomorphisme $B' \overset{j}{\hookrightarrow} B$ ayant les propriétés suivantes :

a) *$B' \in M_0$.*

b) *j ne se factorise pas par i.*

c) *$A' = A \times_B B'$ existe dans $\mathcal{M}$, ainsi que $C = A \amalg_{A'} B'$, A' est dans M_0,*

28. *Sauf* qu'on ne sait pas que les C_i soient dans Filt^π – en fait, ils ne seront pas en général, puisqu'on ne suppose pas que $A, B \in \mathrm{Filt}^\pi$.

29. *Canulé, cf.* annotation précédente.

et dans le diagramme canonique

$$\begin{array}{ccccc} A' & \xhookrightarrow{i'} & B' & & \\ \downarrow & & \downarrow & \overset{j}{\searrow} & \\ A & \xrightarrow{\alpha} & C & \xrightarrow{\beta} & B \\ & \underset{i}{\searrow} & & & \end{array} \qquad (7.1.1)$$

la flèche β est un monomorphisme.

(**N.B.** Ces conditions sont satisfaites si on suppose, en plus de la condition que M_0 soit générateur pour les monomorphismes, que M_0 contient, avec tout objet B', et pour tout objet A' qui est soit un quotient, soit un sous-objet de B', un objet A'_0 isomorphe à A' ; et si de plus $\mathcal{M}$ satisfait aux conditions d'exactitude suivantes :

1°) Toute flèche f de $\mathcal{M}$ se factorise en ip, avec i monomorphisme, p épimorphisme, et :

2°) Si A_1, A_2 sont deux sous-objets d'un objet B de $\mathcal{M}$, alors l'intersection $A_0 = A_1 \times_B A_2$ existe, ainsi que la somme amalgamée $C = A_1 \amalg_{A_0} A_2$, et le morphisme canonique $C \longrightarrow B$ est un monomorphisme.)

p. 47
[page 87]

Supposons de plus que $\mathcal{M}$ satisfait la condition ©, p. 76, i.e. *que toute* $\varinjlim$ *filtrante de monomorphismes est un monomorphisme.*

1°) *Soit* $\mathrm{Mon} \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ *l'ensemble des monomorphismes, et* Mon_0 *le sous-ensemble de* Mon *formé des $i \in$ Mon tels que source et but appartiennent à M_0. On a alors*

$$\mathrm{Mon} \subset \widetilde{\mathrm{Mon}_0} \quad , \qquad d'où \quad \begin{cases} \widetilde{\mathrm{Mon}} & = & \widetilde{\mathrm{Mon}_0} \\ (\mathrm{Mon})_* & = & (\mathrm{Mon}_0)_* \end{cases}.^{30} \qquad (7.1.2)$$

2°) *Si M_0 est* petit *et si les objets de M_0 sont accessibles* (p. ex. $\mathcal{M}$ satisfait ©, p. 76), *et si* Mon *est stable par cochangement de base, alors il existe une factorisation fonctorielle de toute flèche f de $\mathcal{M}$ en*

$$f = p\,i\,,$$

avec $i \in$ Mon, $p \in (\mathrm{Mon})_*$. (**N.B.** Une flèche $p : X \longrightarrow Y$ de $\mathcal{M}$ est dans $(\mathrm{Mon})_*$ si et seulement si elle fait de X un objet *injectif* de $\mathcal{M}/Y$ – donc l'assertion de factorisation assure que dans les catégories induites $\mathcal{M}/Y$ "il y a assez d'injectifs".) *De plus, on a*

$$\mathrm{Mon} = \widetilde{\mathrm{Mon}_0} \quad . \qquad (7.1.3)$$

3°) *Soit W une partie de* $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ *qui est* L-accessible (i.e. *accessible, et stable par limites inductives filtrantes*). (*On suppose à présent que $\mathcal{M}$ satisfait les conditions* (a), (b), (c), (d), (e) *de la page 76, d'où une bonne théorie des parties L-accessibles de* $\mathrm{Ob}\,(\mathcal{M})$ *ou de* $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$.) *On suppose, plus précisément, que W satisfait les conditions :*

$$\begin{cases} \text{a)} & W \text{ est L-accessible (i.e. stable par } \varinjlim \text{ filtrantes, et accessible).} \\ \text{b)} & \text{Soient } \alpha, \beta \text{ composables, avec } \beta\alpha \text{ et } \alpha \text{ dans } W, \text{ alors } \beta \in W. \text{ (\textbf{N.B.} Cette condition sera satisfaite si } W \text{ est un localiseur modérément saturé, et c'est à cette situation que nous allons appliquer notre énoncé.)} \\ \text{c)} & \mathrm{Mon} \cap W \text{ est stable par cochangement de base.} \end{cases} \qquad (7.1.4)$$

[page 88]

30. **N.B.** On a là un critère d'injectivité d'objets dans les catégories $\mathcal{M}/Y$ – il suffit de tester la condition d'injectivité par des monomorphismes i qui sont dans Mon_0.

et que $\mathcal{M}$ satisfait les conditions supplémentaires

$$\begin{cases} \text{e}') & \textit{Les } \varinjlim \textit{ filtrantes commutent au changement de base.} \\ \text{f}) & \textit{La condition d'exactitude } (7.2.1) \textit{ ci-dessous.} \end{cases} \tag{7.1.5}$$

Soit π un cardinal tel que W soit π-accessible, et $M_0 \subset \mathrm{Filt}^\pi$ (donc M_0 essentiellement petite). Alors on a

$$W \cap \mathrm{Mon} \ \subset \ \widetilde{(W \cap \mathrm{Mon})^\pi} \tag{7.1.6}$$

(où pour toute partie C de $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$, on pose $C^\pi = C \cap \mathrm{Fl}^\pi(\mathcal{M})$), donc p. 48

$$\widetilde{W \cap \mathrm{Mon}} \ = \ \widetilde{(W \cap \mathrm{Mon})^\pi} \ , \tag{7.1.7}$$

donc $\widetilde{W \cap \mathrm{Mon}}$ est Q-engendré par une petite *partie de $W \cap \mathrm{Mon}$.*

Corollaire 7.2. *Soit $\mathcal{M}$ satisfaisant* (a), (b), (c), (d), (e) *et aux conditions supplémentaires :*

$$\begin{cases} \text{e}') & \textit{Les } \varinjlim \textit{ filtrantes commutent au changement de base.} \\ \text{f}) & \textit{Si } A_1, A_2 \textit{ sont deux sous-objets d'un objet } B \textit{ de } \mathcal{M}, \\ & \textit{et } A_0 = A_1 \cap A_2, \textit{ alors } A_1 \amalg_{A_0} A_2 \hookrightarrow B \textit{ est un monomorphisme}\,[31]. \end{cases} \tag{7.2.1}$$

Soit W une partie de $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ satisfaisant les conditions suivantes.

$$\begin{cases} \text{a}) & W \textit{ est un localiseur modérément saturé.} \\ \text{b}) & W \textit{ est L-accessible,} \text{ i.e. } \textit{il est stable par } \varinjlim \textit{ filtrantes,} \\ & \textit{et est accessible.} \\ \text{c}) & \mathrm{Mon} \cap W \textit{ est stable par cochangement de base,} \text{ i.e. } \textit{si} \\ & \textit{on a un diagramme} \text{ cocartésien} \\ & \qquad \begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\ i\ } & B \\ {\scriptstyle\alpha}\downarrow & \text{cocart.} & \downarrow{\scriptstyle\beta} \\ A' & \xrightarrow{\ i'\ } & B' \end{array} \\ & \textit{avec } i \textit{ monomorphisme appartenant à } W, \textit{ alors } i' \textit{ est} \\ & \textit{un monomorphisme appartenant à } W.\,[32] \end{cases} \tag{7.2.3}$$

Sous ces conditions, on a [page 89]

$$\underbrace{\mathrm{Mon}}_{C} \cap W \ = \ \widetilde{W \cap \mathrm{Mon}} \quad , \qquad \text{i.e. } \mathrm{Mon} \cap W \textit{ est Q-clos à gauche} \, , \tag{7.2.4}$$

p. 49

31. Une autre façon de le dire : si $C = \sup_{\mathrm{Ss}(B)}(A_1, A_2)$, le carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} A_0 & \longrightarrow & A_1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ A_2 & \longrightarrow & C \end{array}$$

est aussi cocartésien.

32. *Cf.* plus bas pour une quatrième condition (d) sur W, qui assure que W s'insère dans un triple de Quillen.

et

$$\text{il existe une petite partie } TC_0 \subset \mathrm{Mon}, \text{ telle que } \mathrm{Mon} \cap W = \widetilde{TC_0}\ . \tag{7.2.5}$$

(De façon plus précise, si $\pi \geq \pi_0$ est un cardinal tel que W soit π-accessible, on peut prendre $TC_0 = (\mathrm{Mon} \cap W)^\pi$ (ou une partie petite *de $(\mathrm{Mon} \cap W)^\pi$ ayant les mêmes classes d'isomorphie).) Donc* (th. 1 de §1) *le couple $(TC = \mathrm{Mon} \cap W,\ F = (TC)_*)$ est un couple de Quillen clos, et il y a même une factorisation* fonctorielle *de toute flèche f en*

$$f \ = \ pi\ ; \qquad i \ \in \ TC\ , \qquad p \ \in \ F\ . \tag{7.2.4}$$

Si on pose

$$C \ = \ \mathrm{Mon}\ , \qquad TC \ = \ \mathrm{Mon} \cap W\ , \qquad F \ = \ (TC)_*\ , \qquad TF \ = \ C_*\ , \tag{7.2.5}$$

le triple (W, C, F) est un triple de Quillen clos, si et seulement si on a les conditions supplémentaires suivantes.

$$\begin{cases} (7.2.6) \quad \text{(g) } \textit{(sur } \mathcal{M} \textit{ seulement)} & \mathrm{Mon} \textit{ stable par cochangement de base.} \\ (7.2.7) \quad \underbrace{TF}_{\overset{\text{déf}}{=} (\mathrm{Mon})_*} \ \subset \ W & \text{i.e. } \textit{si } \text{d) } \textit{toute } f : X \longrightarrow Y \textit{ qui fait de } X \textit{ un objet injectif de } \mathcal{M}/Y\textit{, est dans } W \textit{ (donc aussi dans } W_{\mathrm{univ}}\textit{).} \end{cases}$$

Démonstration de 7.1. On peut donner un énoncé un peu plus délicat, en supposant d'emblée donnée, non une partie M_0 de $\mathrm{Ob}\mathcal{M}$, mais une partie [page 90]

$$\mathrm{Mon}_0 \ \subset \ \mathrm{Mon}\ , \tag{7.1}$$

satisfaisant la condition suivante

> Pour tout monomorphisme $i : A \longrightarrow B$ dans $\mathcal{M}$, il existe $i' \in \mathrm{Mon}_0$, $i' : A' \longrightarrow B'$, et une flèche $i' \longrightarrow i$ dans $\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M})$,
>
> $$\begin{array}{ccc} A' & \xrightarrow{\ i'\ } & B' \\ \downarrow & & \downarrow \\ A & \xrightarrow{\ i\ } & B\ , \end{array} \tag{7.2}$$
>
> telle que la flèche correspondante
>
> $$C \ = \ A \amalg_{A'} B' \ \longrightarrow \ B$$
>
> soit un monomorphisme, et que $B' \longrightarrow B$ ne se factorise pas par A.

C'est cela qui était visé par la condition (7.1.1) sur M_0, qui implique (7.2) sur Mon_0 défini en termes de M_0 comme dit dans 1°.

Dans ce qui suit, on suppose donnée une partie $\mathrm{Mon}_0 \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ satisfaisant (7.2). En pratique, elle sera souvent déduite d'une partie M_0 de $\mathrm{Ob}\mathcal{M}$, génératrice pour les monomorphismes, comme explicité dans 1°, mais on n'a pas besoin du fait que $i' \longrightarrow i$ soit un monomorphisme (*i.e.* (7.1.1) est plus forte que ce qu'il nous faut). P. ex. si $B' \in M_0$ et $B' \longrightarrow B$ est donné, ne se factorisant pas par A, on pourra prendre $A' = B' \times_B A$ et $i' : A' \longrightarrow B'$ (pour assurer $i' \in \mathrm{Mon}_0$, il faudra donc supposer M_0 stable par passage aux sous-objets), et il y a des chances [page 91]

p. 50

que $C \longrightarrow B$ sera alors bel et bien un monomorphisme …

1°) Il faut prouver

$$\mathrm{Mon} \ \subset \ \widetilde{\mathrm{Mon}_0}$$

moyennant (7.2) (et la stabilité de $\mathcal{M}$ par $\varinjlim$ filtrantes). Cela va résulter directement du

Lemme 7.3. *Soient $\mathcal{M}$ une catégorie stable par limites inductives filtrantes, et C_0, C des parties de* $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$*. On supposera*

ⓐ *C formée de monomorphismes, et*

ⓑ *que la condition suivante (généralisant* (7.2) *ci-dessus) soit vérifiée.*

Pour toute flèche $i : A \hookrightarrow B$ dans C telle que i ne soit pas un isomorphisme, il existe $i' : A' \longrightarrow B'$ dans $\widetilde{C_0}$, et une flèche $i' \longrightarrow i$ dans $\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M})$, telle que dans le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} A' & \xrightarrow{\quad i' \quad} & B' & & \\ \downarrow & & \downarrow & \searrow & \\ A & \xrightarrow{\ \alpha\ } & D \ = \ A \amalg_{A'} B' & \xrightarrow{\ \beta\ } & B \ , \\ & \searrow^{i} & & & \end{array} \tag{7.3.1}$$

la flèche β soit dans C, et que $B' \longrightarrow B$ ne se factorise pas par A (ou, ce qui revient au même, que le sous-objet de B défini par D et β ne soit pas égal à celui défini par A et i).

On suppose de plus

ⓒ *C stable par $\varinjlim$ filtrantes, et*

ⓓ *que pour tout $B \in \mathrm{Ob}\mathcal{M}$, l'ensemble des sous-objets de B est petit.* (Condition des plus anodines ! C'est une condition *sur* $\mathcal{M}$, n'impliquant pas C).

Alors on a

$$C \ \subset \ \widetilde{C_0} \ , \qquad \textit{donc } \widetilde{C} \ \subset \ \widetilde{C_0} \ , \tag{7.3.2}$$

donc, si $C_0 \subset C$, on conclut

$$\widetilde{C} \ = \ \widetilde{C_0} \ . \tag{7.3.3}$$

[page 92]

(Ce lemme implique aussitôt la première assertion de 7.1, 1°.) Prouvons ce lemme, *i.e.* que toute $i \in C$ est dans $\widetilde{C_0}$, en construisant par récurrence transfinie une suite strictement croissante de sous-objets de B,

p. 51

$$A_\alpha \ \overset{j_\alpha}{\hookrightarrow} \ B \ , \qquad \text{avec les } j_\alpha \in C \ ,$$

et avec :

① $A_0 = A$. On prouvera que $A \xrightarrow{\ i_\alpha = i_{\alpha,0}\ } A_\alpha$ dans $\widetilde{C_0}$, et il y aura un ordinal final α tel que $A_\alpha = B$; on en conclura donc que $i = i_\alpha$ est dans $\widetilde{C_0}$.

Si i est un isomorphisme, on sait que $i \in \widetilde{C_0}$, il n'y a rien à prouver (la construction transfinie s'arrête au cran 0). Les deux pas de la construction, après le pas initial 1°, sont :

② Soit A_α construit. Si $A_\alpha = B$, la construction est arrêtée. Si $A_\alpha \xrightarrow{\ j_\alpha\ } B$ n'est pas un isomorphisme, on applique (7.3.1) à $j_\alpha \in C$, pour trouver un $D \overset{j}{\hookrightarrow} B$, donc $j \in C$ et $D \supsetneqq A_\alpha$. De plus,

$$i_{\alpha+1,\alpha} \ : \ A_\alpha \ \longrightarrow \ A_{\alpha+1} \ \overset{\text{déf}}{=} \ D \qquad \text{est dans } \widetilde{C_0} \ , \tag{7.3.4}$$

car déduit de $i' \in \widetilde{C_0}$ par cochangement de base.

(3°) Si α est ordinal limite, on pose

$$A_\alpha \;=\; \varinjlim_{\beta<\alpha} A_\beta \;, \tag{7.3.5}$$

et la flèche canonique [page 93]

$$A_\alpha \xrightarrow{j_\alpha} B$$

est dans C, car les j_β le sont et C est stable par limites inductives filtrantes.

On a ainsi achevé la description des systèmes transfinis. Pour tout α, on a

$$\mathrm{card}\alpha \;\leq\; \mathrm{cardSs}(B) \;,$$

puisque l'application $\beta \longmapsto A_\beta$ de l'ensemble $I_\alpha = \{\beta \mid \beta < \alpha\}$ dans $\mathrm{Ss}(B)$ est *strictement* croissante. Donc il existe un cardinal α tel que $\mathrm{card}\alpha \leq \mathrm{cardSs}(B)$, tel que $A_\alpha = B$. Mais alors $i \in \widetilde{C_0}$, comme limite inductive (ou composé) transfinie de flèches appartenant à $\widetilde{C_0}$. (Il suffit de la condition $\forall\ \beta$, $i_{\beta+1,\beta} \in \widetilde{C_0}$ pour impliquer que tous les morphismes de transition $i_{\beta',\beta}$ sont dans $\widetilde{C_0}$.)

Revenons à 7.1, 2°. Il reste à prouver que si Mon est stable par cochangement de base, alors on a

$$\mathrm{Mon} \;=\; \widetilde{\mathrm{Mon}_0} \quad .$$

Mais comme Mon est déjà stable par composition, et par limites inductives filtrantes quelconques (donc aussi par facteurs directs), il s'ensuit par le corollaire 2 du théorème 1, §1 (p. 11), que $\mathrm{Mon} = \widetilde{\mathrm{Mon}_0}$. L'énoncé de factorisation est le théorème 1 du §1.

Prouvons 7.1, 3°, *i.e.* la formule (7.1.6), p. 52 [page 94]

$$W \cap \mathrm{Mon} \;\subset\; (W \cap \widetilde{\mathrm{Mon}})^\pi \;.$$

Pour ceci, on applique encore le lemme 7.3 à

$$C_0 \;=\; (W \cap \mathrm{Mon})^\pi \;, \qquad C \;=\; W \cap \mathrm{Mon} \;.$$

Les conditions (a), (b), (c), (d) du lemme sont vérifiées. C'est clair pour toutes, sauf pour (b), qui demande une vérification non tautologique. Soit donc

$$f \;:\; A \hookrightarrow B \;, \qquad f \in \mathrm{Mon} \cap W,\ f \text{ non isomorphisme} \;.$$

On considère B comme limite inductive[33]

$$B \;=\; \varinjlim_{I} B_i \;, \qquad I \;=\; \mathrm{Ss}_\pi(B) \;.$$

Pour tout i, on pose

$$A_i \;=\; A \cap B_i \;=\; A \times_B B_i \;,$$

et

$$f_i \;:\; A_i \;\hookrightarrow\; B_i \;,$$

donc

$$f \;=\; \varinjlim_{i \in I} f_i \;.$$


On a besoin de savoir que le système inductif des flèches f_i est π-adapté, ce qui nous amène à postuler la condition d'exactitude supplémentaire suivante sur $\mathcal{M}$:

33. *D'un système inductif π-adapté.* [page 95]

e') les $\varinjlim$ filtrantes dans $\mathcal{M}$ commutent au changement de base , (7.4)

il suffit même de le supposer dans le cas très particulier qu'on a envisagé ici.

Comme W est π-accessible, et $(f_i)_{i\in I}$ est π-adapté, comme $\varinjlim f_i \in W$, il s'ensuit que l'ensemble I_W des $i \in I$ tels que $f_i \in W$ est cofinal. Comme $A \overset{f}{\hookrightarrow} B$ n'est pas un isomorphisme, il existe donc un $i \in I_W$ tel que $B_i \hookrightarrow B$ ne se factorise pas par A. On a alors le diagramme



avec $f_i \in (C \cap W)^\pi = C_0$, donc $\alpha_i \in \widetilde{C_0}$. On a besoin de savoir que $\alpha_i \in W$, donc une condition supplémentaire sur W : p. 53

Si on a un carré cocartésien

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\ i\ } & B \\ \downarrow & & \downarrow \\ A' & \xrightarrow{\ i'\ } & B' , \end{array} \qquad (7.5)$$

avec $i \in \mathrm{Mon} \cap W$, alors $i' \in W$ [34].

(j'ai renforcé (7.1.4) en conséquence).

Comme par hypothèse $f = \beta_i\alpha_i$ est dans W, et $\alpha_i \in W$, il s'ensuit par (7.1.4), (a) que $\beta_i \in W$. Il faudra que nous sachions de plus que β_i est un monomorphisme, donc $\beta_i \in \mathrm{Mon} \cap W = C$, ce qui achèvera d'établir la condition manquante (b) de 7.3. C'est la condition d'exactitude (7.2.1), qu'il me faut visiblement rajouter aux hypothèses dans 7.1, 3°. Ayant fait cela, le lemme 7.3 s'applique et établit 7.1, 3°. [page 96]

Démonstration de 7.2. Posons

$$C \ = \ \mathrm{Mon} \ , \qquad TC \ = \ C \cap W \ , \qquad TC_0 \ = \ TC^\pi \ ,$$

donc par 7.1, 3°, on a

$$\underbrace{TC_0}_{\substack{\text{essentiellement}\\ \text{petite}}} \ \subset \ TC \ \subset \ \widetilde{TC_0} \ = \ \widetilde{TC} \ ,$$

et par le théorème 1, §1 (p. 10-12), cor. 2, pour vérifier que $TC = \widetilde{TC_0}$ (*i.e.* TC est Q-clos à gauche), il revient au même de voir qu'il est Q-stable à gauche, *i.e.* stable par composition, par cochangement de base, par $\varinjlim$ ordinales strictes, par facteurs directs. Or les deux derniers sont impliqués par le fait que $TC = C \cap W$ est stable par $\varinjlim$ filtrantes, vu que W l'est, et C aussi par la condition ⓔ (p. 76) sur $\mathcal{M}$. D'autre part, $C = \mathrm{Mon}$ et W étant stables par composition, itou pour $C \cap W$. Donc il reste le cochangement de base, et c'est assuré par 7.2.3, (c) (dont on avait déjà besoin dans 7.1, 3°, pour établir $C \cap W \subset \widetilde{TC_0}$). (**N.B.** les hypothèses de 7.2 sont pratiquement celles de 7.1, 3°, sauf [page 97]

34. **N.B.** Cette condition est vérifiée.

qu'on suppose que W est un localiseur (sous-entendu : modérément saturé), de façon précise on n'a utilisé, jusqu'à présent, comme hypothèse supplémentaire, que la stabilité de W par composition.)

Il reste à établir que $(W, C = \mathrm{Mon}, F = (TC)_*)$ est un triple de Quillen clos, si et seulement si les conditions (7.2.6) et (7.2.7), *i.e.*

$$\begin{cases} C = \mathrm{Mon} \ \text{ stable par cochangement de base,} \\ TF = C_* = (\mathrm{Mon})_* \subset W, \end{cases}$$

sont satisfaites. La nécessité est évidente, par définition des triples de Quillen clos, et pour la suffisance, on note qu'il résulte du théorème 7.1, 2°, et de la partie déjà prouvée de 7.2, que (C, TF), (TC, F) sont des couples de Quillen clos, et on a de plus p. 54

$$TC \ = \ C \cap W \ , \qquad TF \ \subset \ F \cap W$$

(puisque $TF \subset W$ par (7.2.7), et $TF \subset F$ puisque $TC \subset C$). On sait (paragraphe 4.3, corollaire 4, page 36) qu'il en résulte que (W, C, F) est un triple de Quillen clos. Cela achève la démonstration de 7.1 et 7.2. [page 98]

Résumons l'essentiel :

Corollaire 7.4.[35] *Soit $\mathcal{M}$ une catégorie satisfaisant les conditions* (a), (b), (c), (d), (e) (p. 76) *et* (e′), (f) ((7.2.1), p. 88), *enfin* (g) (7.2.6), i.e. *stabilité de l'ensemble* Mon *des monomorphismes de $\mathcal{M}$ par cochangement de base. Soit $W \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ un localiseur dans $\mathcal{M}$, qui est* stable par $\varinjlim$ filtrantes *et de plus* (*condition plus subtile, mais pratiquement anodine*) accessible. *On pose*

$$C \ = \ \mathrm{Mon} \ , \qquad TC \ = \ C \cap W \ , \qquad TF \ = \ C_* \ , \qquad F \ = \ (TC)_* \ .$$

Alors :

1°) (C, TF) *est un couple de Quillen* (*énoncé indépendant de la donnée de W*), *et même un couple de Quillen à factorisation fonctorielle.*

2°) *Pour que (TC, F) soit un couple de Quillen, il faut et il suffit que TC soit stable par cochangement de base.* (*Et alors il y a factorisation fonctorielle.*)[36].

3°) *Pour que (W, C, F) soit un triple de Quillen clos, il faut et il suffit que les conditions suivantes soient satisfaites.*

$$\begin{cases} \text{a)} \quad TC \overset{\text{déf}}{=} W \cap \mathrm{Mon} \ \textit{stable par cochangement de base.} \\ \text{b)} \quad TF \overset{\text{déf}}{=} (\mathrm{Mon})_* = \textit{applications de type injectif} \subset W. \end{cases} \tag{7.4.1}$$

4°) *Pour que (W, C, F) soit un triple de Quillen clos et propre à gauche* (i.e. $C \subset \mathrm{Cof}_W$), *il faut et il suffit qu'on ait la condition* (7.4.1), (b) (i.e. *W contient les morphismes de type injectif*), *et de plus* [page 99]

$$C \subset \mathrm{Cof}_W, \ \textit{ou encore : pour tout carré cocartésien}$$

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\ i\ } & B \\ {\scriptstyle\alpha}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\beta} \\ A' & \xrightarrow{\ i'\ } & B' \ , \end{array} \tag{7.4.2}$$

avec i un monomorphisme, alors $\alpha \in W \Longrightarrow \beta \in W$.

p. 55

5°) *Pour que* (W, C, F) *soit un triple de Quillen clos et* propre, *il faut et il suffit que les deux conditions de 4° soient satisfaites, ainsi que l'on ait :*

$$F \subset \mathrm{Fib}_W, \text{ ou encore : pour tout carré cartésien}$$
$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{q} & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ Y & \xrightarrow[p]{} & Y' \end{array} \qquad (7.4.3)$$
$$\text{si } f \in F \text{ (i.e. } f \in (C \cap W)_*) \text{ et } p \in W, \text{ on a } q \in W.$$

Démonstration de 7.4. Les parties 1°, 2°, 3° ne sont qu'un résumé de ce qui a été établi. Pour 4°, il faut voir que les conditions dites impliquent (7.4.1), (a), or on a $C \subset \mathrm{Cof}_W$, donc $C \cap W \subset \mathrm{Cof}_W \cap W = W^{\mathrm{univ}}$ donc $C \cap W = C \cap W^{\mathrm{univ}}$, qui est stable par cochangement de base, puisque C et W^{univ} le sont. Quant à 5°, c'est une tautologie, compte tenu de 4°. [page 100]

8 Application aux catégories de modèles $(A^\wedge, W_A)$

Soit A dans Cat, et considérons dans $A^\wedge$ le localiseur W_A, image inverse par

$$\begin{cases} i_A : A^\wedge & \longrightarrow & \mathrm{Cat} \\ F & \longmapsto & A/F \end{cases} \qquad (8.1)$$

d'un localiseur fondamental donné W, satisfaisant les conditions

$$\mathrm{W}(\underbrace{1}_{\text{sat.}}, \underbrace{2}_{\text{loc.}}, \underbrace{3}_{\text{objet fin.}}, \underbrace{5}_{\text{conn. } \pi_0}, \underbrace{6}_{\varinjlim}, \underbrace{7\text{ bis}}_{\substack{\text{carrés coc.} \\ \text{ou "M.V."}}}, \underbrace{8}_{\text{acc.}}), \quad \text{où W(8) est l'accessibilité de } W \text{ (donc } W \text{ est L-accessible s'il satisfait aussi W(6)).} \qquad (8.2)$$

Pour pouvoir cependant appliquer les développements sur les parties accessibles d'une grosse catégorie du §5, il faut vérifier les conditions (a), (b), (c), (d), (e) du §5, tant dans Cat, que (surtout) dans $A^\wedge$.

a) Stabilité par petites $\varinjlim$ filtrantes, O.K.

b) Filtration cardinale. Bien connu pour $A^\wedge = \underline{\mathrm{Hom}}(A, \mathrm{Ens})$, à partir de celle de Ens par les cardinaux (*cf.* SGA 4 I, 9.24, p. 177). Pour Cat, on définit une filtration cardinale

$$(\mathrm{Cat}^\pi)_{\pi \geq \pi_0}\ , \qquad \text{où } \pi_0 = \text{cardinal des ensembles dénombrables}\ , \qquad (8.3)$$

par la condition, pour A dans Cat, p. 56 [page 101]

$$A \in \mathrm{Filt}^\pi(\mathrm{Cat}) \ = \ \mathrm{Cat}^\pi \qquad \Longleftrightarrow \qquad \mathrm{card}\,\mathrm{Fl}(A) \ \leq \ \pi\ . \qquad (8.4)$$

Il faut vérifier les conditions (a), (b), (c) de *loc. cit.* 9.12. La condition (a) est évidente, (b) est contenue dans la condition plus forte de stabilité de Cat^π par $\varinjlim_I$, pour I une catégorie telle que $\mathrm{card}\,\mathrm{Fl}(I) \leq \pi$ (c'est la condition (d_0) de ces notes, p. 45-46). Notons que Cat^π est également stable par $\varprojlim$ finies (et si π est de la forme 2^c, il est stable même

35. **N.B.** C'est finalement ce corollaire qui est le résultat principal de la présente section.
36. **N.B.** Dans les cas 1° et 2°, C, $TC = C \cap W$ sont Q-engendrés à gauche par des *petites* parties.

par limites projectives $\varprojlim_I$, avec $\operatorname{card}\mathrm{Fl}(I) \leq c$ ...). La condition (c) se vérifie aisément par la méthode du §5, en notant que pour X dans Cat, l'ensemble

$$\mathrm{Ss}_\pi(X)$$

des sous-catégories de X qui sont dans Cat^π est filtrant croissant et grand devant π, et que X en est la limite inductive. D'autre part, il est clair aussi que si $X \in \mathrm{Cat}^{\pi'}$ avec $\pi' > \pi$, alors

$$\operatorname{card}\mathrm{Ss}_\pi(X) \ \leq \ \pi'^{\pi} \ ,$$

ce qui achève d'établir la condition (c).

De plus, la condition (d) de p. 45 se vérifie immédiatement pour les Cat^π, et aussi pour les $A^{\wedge\pi}$ (pour $\pi \geq \operatorname{card}\mathrm{Fl}(A)$).

Aussi que les monomorphismes sont stables par $\varinjlim$ filtrantes (condition (e), page 46).

Passons aux conditions supplémentaires (e'), (f), (g) exigées dans le corollaire 7.4. [page 102]
La condition (e') (commutativité des $\varinjlim$ filtrantes au changement de base) est satisfaite dans $A^\wedge$ et dans Cat. La condition (f) dit que pour deux sous-objets A_1, A_2 d'un objet B, si $A_0 = A_1 \cap A_2$, alors

$$A_1 \amalg_{A_0} A_2 \longrightarrow B$$

est un monomorphisme. Je doute que c'est vrai dans Cat, et ce n'est pas grave, car c'est à $A^\wedge$, non à Cat, qu'on voudra appliquer 7.4 – et c'est évidemment vrai dans $A^\wedge$, et dans tout topos, l'étant dans (Ens). Enfin, la stabilité des monomorphismes par cochangement de base est sûrement fausse dans Cat, mais vraie dans $A^\wedge$ – donc c'est O.K.

Comme W est stable par $\varinjlim$ filtrantes (W (6)), et que i_A y commute, W_A est également stable. De même, W_A est L-accessible, en vertu du

Lemme 8.1. *Soient $\mathcal{M}$, $\mathcal{M}'$ deux catégories satisfaisant* (a), (b), (c), (d), (e), *et $\varphi : \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{M}'$ un foncteur commutant aux $\varinjlim$ filtrantes. Alors pour toute partie L-accessible M' de $\mathcal{M}'$, $\varphi^{-1}(M')$ est L-accessible.*

De façon précise, soit π un cardinal tel que M' soit π-accessible et que φ applique [page 103]
$\mathcal{M}^\pi$ dans $\mathcal{M}'^\pi$ (par exemple, pour cette dernière condition, il suffit $\pi = 2^c$ pour c assez grand, cf. loc. cit. 9.14, p. 153). *Alors $M = \varphi^{-1}(M')$ est π-accessible.*

Vérification immédiate.

On a donc le

Lemme 8.2. *Soit A dans* Cat. *Alors $(A^\wedge, W_A)$ satisfait aux conditions préliminaires* p. 57
du corollaire 7.4, *ainsi qu'aux conditions suivantes.*

$$\underbrace{\mathrm{Mon}(A^\wedge)}_{\substack{\text{ensemble des}\\ \text{monomorphismes}\\ \text{dans } A^\wedge}} \quad \subset \ \mathrm{Cof}_{W_A} \ , \tag{8.2.1}$$

$$\mathrm{Mon} \cap W_A \qquad \text{stable par cochangement de base} \ , \tag{8.2.2}$$

en d'autres termes (*compte tenu que* Mon *est stable par cochangement de base*), *pour un carré cocartésien*

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\ i\ } & B \\ & {\scriptstyle\alpha}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle\beta} & \\ & A' \xrightarrow{\ i'\ } B' \ , & \end{array} \tag{8.2.3}$$

avec i un monomorphisme, si $\alpha \in W_A$ (resp. $i \in W_A$), on a $\beta \in W_A$ (resp. $i' \in W_A$). En fait, on a mieux :

$$i \ \in \ W_A \iff i' \ \in \ W_A \ , \qquad \alpha \ \in \ W_A \iff \beta \ \in \ W_A \ . \tag{8.2.4}$$ [page 104]

Il reste à vérifier (8.2.4), qui a été vu dans XII …
On conclut donc de 7.4 1°, 2°, 3° :

Corollaire 8.3. *Posons*

$$\begin{cases} C \;=\; \mathrm{Mon}(A^\wedge)\;, & TC \;=\; C \cap W\;, \\ F \;=\; (TC)_*\;, & TF \;=\; C_*\;. \end{cases} \tag{8.3.1}$$

Alors (C, TF) *et* (TC, F) *sont des couples de Quillen à factorisation fonctorielle.* (**N.B.** C *et* TC *étant de plus Q-engendrés à gauche par des petites parties de* $\mathrm{Fl}(A^\wedge)$.) *Pour que* (W_A, C, F) *soit un triple de Quillen clos, il faut et il suffit qu'on ait*

$$\underbrace{TF}_{\overset{\text{déf}}{=}(\mathrm{Mon})_*} \;\subset\; W_A\;, \tag{8.3.2}$$

i.e. *que toute flèche* $f : X \longrightarrow Y$ *de type injectif dans* $A^\wedge$ (i.e. *qui fait de* X *un objet injectif de* $A^\wedge/Y$) *soit dans* W_A.

Quand cette condition est satisfaite, le triple de Quillen (W_A, C, F) *est propre à gauche, par* 8.2.1.

Il n'est pas clair qu'il soit forcément propre-tout-court, *i.e.* qu'on ait

$$F \;\subset \mathrm{Fib}_W \qquad (?)\;. \tag{8.3.3}$$

Nous y reviendrons par la suite. Pour l'instant, la chose essentielle, c'est d'examiner la condition (8.3.2) sur A.

Théorème 8.4. *Soit* W *un localiseur fondamental dans* Cat *satisfaisant* W (1, 2, 3, 6, 7, 8), *notations de* XII, (i.e. *tous les axiomes envisagés jusqu'à présent, sauf peut-être celui* W (4) *des fibrations* [et celui W (5) de connexité]), *supposons de plus* W *stable par facteurs directs* (*renforcement* W (1 bis) *de l'axiome de saturation modérée* W (1)).[37] *Soit* A *un objet de* Cat, *et* $W_A = i_A^{-1}(W)$ *le localiseur de* $A^\wedge$ *déduit de* W. *Avec les notations de* 8.3 : p. 58 [page 105]

1°) *Les conditions suivantes sont équivalentes.*

a) *On a* (8.3.2),

$$TF \;\subset\; W_A\;,$$

i.e. *toute flèche de type injectif dans* $A^\wedge$ *est dans* W_A.

b) *Soit*

$$L \;=\; L_A \tag{8.4.1}$$

l'élément de Lawvere dans $A^\wedge$, *donc le préfaisceau*

$$a \;\longmapsto\; \begin{array}{l} \textit{ensemble des sous-préfaisceaux de } a \\ (\text{i.e. } \textit{ensemble des ouverts de } A/a, \\ \text{i.e. } \textit{des cribles de } A/a)\;, \end{array}$$

et considérons la flèche $L \longrightarrow e_A$ *(objet final de* $A^\wedge$*). On veut que cette flèche soit* W_A*-asphérique,* i.e. *soit universellement dans* W_A *– ou ce qui revient au même, que pour tout* $a \in A$, $L_A \times a$ $(= L_{A/a})$ *soit un objet* W_A*-asphérique de* $A^\wedge$ *(ou, ce qui revient au même, de* $(A/a)^\wedge$*).* [page 106]

37. **N.B.** Pour la validité de 1°, 3° on n'a pas besoin de W (6) ($\varinjlim$) ni de W (8) (accessibilité), ni même de W (7) (axiome du carré cocartésien). Ce dernier est nécessaire déjà pour assurer la partie (a) du corollaire 8.5. Mais pour la partie 2° du théorème 8.4, on a besoin de *tous* les axiomes du localiseur fondamental W, sauf seulement W (4) [et W (5)].

c) *Il existe un objet I de $A^\wedge$ tel que $I \longrightarrow e_A$ soit W_A-asphérique, avec deux sections δ_0, δ_1 de I sur e_A, avec* $\mathrm{Ker}(\delta_0, \delta_1) = \emptyset_A$ *(préfaisceau vide).*

d) *Les catégories localisées $A/a = B$ sont des* catégories-test *pour W* (cf. *Pursuing Stacks, §65, notamment pages 172-173), ce qui revient à dire que l'on a ceci, pour chacune des catégories $B = A/a$:*

$$\text{Les foncteurs} \quad \begin{cases} i_B : \ B^\wedge \longrightarrow \mathrm{Cat} \ \ (\ F \longmapsto B/F \ ) \\ j_B : \ \mathrm{Cat} \longrightarrow B^\wedge \ \ (\ C \longmapsto (b \longmapsto \mathrm{Hom}(B/b, C)) \ ) \end{cases} \tag{8.4.2}$$

(où j_B est l'adjoint à droite de i_B) sont tous les deux "model preserving", i.e.

$$\begin{cases} W_B \ = \ i_B^{-1}(W) \qquad \textit{(par définition de } W_B\textit{, en fait)} \\ W \ = \ j_B^{-1}(W_B) \ , \end{cases} \tag{8.4.3}$$

et les foncteurs localisés p. 59

$$\mathrm{Hot}_{B,W} \underset{\overline{j_B}}{\overset{\overline{i_B}}{\rightleftarrows}} \mathrm{Hot}_W$$

sont des équivalences de catégories. De plus, ces équivalences de catégories sont quasi-inverses l'une de l'autre, les morphismes d'adjonction étant déduits des morphismes d'adjonction pour le couple de foncteurs adjoints (i_B, j_B), ces morphismes d'adjonction étant de plus dans W resp. dans W_B.[38]

[page 107]

2°) *Si les conditions équivalentes de* 1° *sont satisfaites, alors le triple*

$$(W_A \, , \ C = \mathrm{Mon}_{A^\wedge} \, , \ F = (C \cap W_A)_*)$$

est un triple de Quillen (clos) propre à gauche.

3°) *Si les conditions équivalentes de* 1° *sont satisfaites, et si de plus A est W-asphérique, alors (et alors seulement) A elle-même est une* catégorie-test *pour W, ce qui revient à dire que les conditions sur la catégorie B dans* (d) *sont satisfaites quand B est* soit *A, soit une catégorie localisée A/a.*

Corollaire 8.5. *Les conditions équivalentes de* 1° *et de* 3° *sont satisfaites dans chacun des cas suivants (et ceci quel que soit W, satisfaisant aux hypothèses dites).*

a) *$A = \mathbf{\Delta}$, $\mathbf{\Delta}^\sim$, $\square$, $\square^\sim$ (catégories des simplexes combinatoires standard, ordonnés ou non, et des cubes combinatoires standard, ordonnés ou non …)*[39].

b) *A est stable par produits finis*[40]*, et contient un objet I tel que I ait deux sections δ_0, δ_1 sur l'objet final, avec δ_0, δ_1 disjointes,* i.e. $\mathrm{Ker}(\delta_0, \delta_1) = \emptyset_{A^\wedge}$ *(sous-préfaisceau vide du préfaisceau final).*

[page 108]

38. **N.B.** La condition (d), d'apparence très forte, est équivalente à la condition d'apparence plus anodine :

(d') le foncteur $j_A : \mathrm{Cat} \longrightarrow A^\wedge$ transforme éléments de W en flèches W_A-asphériques ;

et il suffit même de l'exiger pour $C \longrightarrow e$ dans Cat, où C est un objet de Cat ayant objet final.

[La condition (d') ci-dessus est trop forte et n'est pas équivalente à la condition (d) ; en revanche la condition plus faible envisagée ensuite est bien équivalente à (d)].

39. $\square^\sim$ est essentiellement la catégorie A "universelle", stable par produits finis, et contenant un "intervalle séparant" (I, δ_0, δ_1) comme dans (b).

40. En fait, il suffit que $I \longrightarrow e$ soit quarrable, *i.e.* que A ait un objet final, et que les produits $I \times a$ ($a \in \mathrm{Ob}\, A$) existent dans A.

Le cas (b) du corollaire est justiciable de la condition (c) dans 1°. (De plus, A ayant un objet final, est W-asphérique, donc on est dans les conditions de 3°.) Les cas $\mathbf{\Delta}$, $\mathbf{\Delta}^{\sim}$, $\square$ (et $\square^{\sim}$, qui tombe en fait dans le cas (b)) sont traités dans Pursuing Stacks §34 (p. 47-50) `[voir aussi §36]`.

Démonstration du théorème 8.4. La partie essentielle, techniquement, est bien sûr 1° [41]. On a les implications ± tautologiques

$$(a) \implies (b) \implies (c)\ ,$$

où $(a) \Longrightarrow (b)$ provient du fait que L est évidemment un objet injectif de $A^{\wedge}$. (L'objet de Lawvere d'un topos quelconque est un objet injectif.) Il reste à établir

$$(c) \implies (d) \implies (a)\ .$$

Que l'on ait $(c) \Longrightarrow (d)$ (et $(c) \Longrightarrow (b)$) est établi dans Pursuing Stacks, voir le résumé des notions W-test dans Pursuing Stacks, §65, p. 168-179 ; l'énoncé pertinent ici est la proposition 3, page 173. p. 60

Il reste à établir $(d) \Longrightarrow (a)$ – mais à présent on joue sur du velours ! Je note ici le lemme suivant, dont la place serait plutôt à la fin du §4 des généralités sur les triples de Quillen :

Lemme 8.6. *Soit $\mathcal{M}$ une catégorie, (C, TF) un précouple de Quillen dans $\mathcal{M}$, et $W \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ une partie de $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ stable par facteurs directs. Conditions équivalentes :* `[page 109]`

a) $TF \subset W$.

b) *Toute flèche f dans $\mathcal{M}$ se factorise en $f = pi$, avec $i \in C$, $p \in W$.*

b′) *Comme* (b), *avec f dans TF.*

Démonstration. Les implications $(a) \Longrightarrow (b) \Longrightarrow (b')$ sont tautologiques et ne font pas appel à l'hypothèse de stabilité sur W. Mais pour un $f \in TF$ donné, pour voir qu'il est dans W, si W est stable par facteurs directs, il suffit que cet-f-là se factorise en pi, avec $i \in C$, $p \in W$. En effet, on voit aussitôt qu'alors f est facteur direct de p (car $i \in C$), et comme $p \in W$, on a $i \in W$, *q.e.d.*

Revenons à 8.4, démonstration de $(d) \Longrightarrow (a)$.

`[Suit un passage rayé, en bas de la page 109 et en haut de la page 110.]`

Finalement, mon projet de démonstration se modifie, car bien que (d) ait l'air très, très fort comme condition, telle quelle je ne vois pas, finalement, comment en déduire `[page 110]` (a). Mais en fait on peut considérer que l'équivalence de (b), (c), (d) est mise ici pour mémoire, elle est établie dans *loc. cit.*, donc je n'ai à me préoccuper que de l'implication $(c) \Longrightarrow (a)$, qui va résulter du lemme 8.6, qui nous ramène à prouver que toute flèche $f : X \longrightarrow Y$ dans $A^{\wedge}$ se factorise en pi, avec i monomorphisme et $p \in W_A$. On fait l'argument du mapping-cone `[plutôt mapping-cylinder]`, en partant de `[page 111]`


$$\begin{array}{ccc} e_A \amalg e_A & \xrightarrow[\text{mono}]{(\delta_0,\delta_1)} & I \\ & \searrow \quad \swarrow_{(W_A)_{\mathrm{univ}}} & \\ & e_A\ , & \end{array}$$

d'où pour tout X dans $A^{\wedge}$, en prenant le produit par X,

$$\begin{array}{ccc} X \amalg X & \xrightarrow[\text{mono}]{(\delta_0^X,\delta_1^X)} & X \times I \\ & \searrow^{(\mathrm{id},\mathrm{id})} \quad \swarrow_{\mathrm{pr}_1^X \in W_A} & \\ & X\ , & \end{array}$$

41. La partie 2° en résulte, grâce au corollaire 8.3.

et on construit le mapping-cone [plutôt mapping-cylinder] de f par le diagramme cocartésien p. 61



p_f déduit de $\mathrm{pr}_1^X : X \times I \to X$ (8.6.1)


la factorisation cherchée de f est

$$f \;=\; p_f\, i_f \;, \qquad \text{où} \quad i_f = f'\delta_1^X \;.$$

Ici, comme $\mathrm{pr}_1^X \in W_A$, on en conclut que δ_0^X, δ_1^X (qui en sont des sections) sont dans W_A, comme δ_0^X est un monomorphisme, on a donc $\delta_0^X \in TC$, donc (TC étant stable par cochangement de base) $\beta \in W_A$, donc enfin p_f (qui est une rétraction de $Z(f)$ sur Y) est aussi dans W_A. Il reste à voir que i_f est un monomorphisme, ce qui se voit sur le diagramme plus complet (*cf.* XII, p. 230) que j'ai sous les yeux : i_f apparaît comme composé de deux monomorphismes $X \longrightarrow Y \amalg X$ et $Y \amalg X \longrightarrow Z(f)$ … Le théorème 8.4 est démontré. [page 112]

Je vais quand même isoler l'argument formel sempiternel (que j'ai utilisé surtout sous forme duale) dans un


Lemme 8.7. *Soit $\mathcal{M}$ une catégorie, W un localiseur modérément saturé dans $\mathcal{M}$, C une partie stable par composition et par cochangement de base. On se propose, pour X fixé dans $\mathcal{M}$, de trouver une factorisation fonctorielle de toute flèche $f : X \longrightarrow Y$* (i.e. *du morphisme costructural d'un Y dans $X\backslash\mathcal{M}$) en $p_f i_f$, avec $i_f \in C$, $p_f \in W$. On suppose pour ceci qu'on a une factorisation de ce type pour $X \amalg X \xrightarrow{(\mathrm{id},\mathrm{id})} X$,* i.e. *un objet I_X et une factorisation* [page 113]



avec $i_X \in C$, $p_X \in W$. On associe alors à toute f le mapping cone [plutôt cylinder] *$Z(f)$ comme dans le diagramme* (8.6.1) *(où il faut lire I_X au lieu de $X \times I$), et on a alors $p_f \in W$, $i_f \in C$ comme voulu. Mais il faut supposer, pour savoir que $i_f \in C$, que $X \in \mathcal{M}_C$ (objets C-cofibrants),* i.e. *que pour tout Y, $X \longrightarrow Y \amalg X$ est dans C. (De plus, on a supposé tacitement $\mathcal{M}$ stable par $\varinjlim$ finies.)*

p. 62

Le diagramme complet est



(8.7.1)

On a $i_X \in C$ par hypothèse, donc $j \in C$ (stabilité de C par cochangement de base), on a $\lambda : X \longrightarrow Y \amalg X$ dans C car X dans $\mathcal{M}_C$, donc le composé $i_f = j \circ \lambda$ est dans C (stabilité de C par composition) – on gagne ! [page 114]

Commentaires. Pour l'équivalence de (a), (b), (c) dans le théorème 8.4, 1°, on n'a donc pas eu à faire appel aux développements de Pursuing Stacks, qui servent seulement à établir l'équivalence des trois conditions en question avec la condition "modélisante" (d). Pour résumer :

1°) Les implications

$$(a) \implies ((b) \iff (c) \iff (d))$$

sont valables sous les seules conditions

$$\mathrm{W}(1,\ 2\,\mathrm{bis},\ 3)\ ,$$

et pour l'équivalence de (a) aux autres conditions, il suffit de

$$\mathrm{W}(1\,\mathrm{bis},\ 2\,\mathrm{bis},\ 3)$$

(où W (1 bis) renforce W (1) par la condition des facteurs directs, tandis que W (2 bis) affaiblit W (2), en exigeant seulement que les morphismes W-asphériques soient dans W). Les conclusions de 8.4, 3°, relatives au cas où A est W-asphérique, sont valables également sous les conditions W (1, 2 bis, 3) sans plus.

2°) Le corollaire 8.5, se référant aux conditions (b), (c), (d) de 1° (à l'exclusion de (a), qui suppose W stable par facteurs directs), est valable pour un W satisfaisant [page 115]

$$\mathrm{W}(1,\ 2\,\mathrm{bis},\ 3,\quad \underbrace{7\,\mathrm{bis}}_{\substack{\text{carré}\\ \text{cocartésien}}}\quad)\ .$$

3°) Pour la validité de 8.4, 2°, *i.e.* pour avoir un triple de Quillen (W_A, C, F), il nous faut (presque) tout l'éventail des conditions sur W, p. 63

$$\mathrm{W}(1\,\mathrm{bis},\ 2\,\mathrm{bis},\ 3,\ \underbrace{6}_{\text{limites}}\ ,\ \underbrace{7\,\mathrm{bis}}_{\substack{\text{carré}\\ \text{cocartésien}}}\ ,\ \underbrace{8}_{\text{accessibilité}}\ )^{42}\ ,$$

à l'exclusion de W (4), et en se contentant pour W (2) de la forme affaiblie W (2 bis) sans plus. (Même l'axiome de connexité W (5) n'a pas servi, mais je l'avais d'abord

42. **N.B.** On devrait renuméroter les axiomes W (…).

inclus, car il y a peu de chances qu'on aura jamais à travailler avec des W qui n'y satisfont pas ! Il se pourrait d'ailleurs, en présence des autres axiomes, ou seulement de W (1 bis, 2 bis, 3, 7 bis), que si W (5) n'est *pas* satisfait, on ait $W = \mathrm{Fl}\,\mathrm{Cat}$ tout entier, donc $W_A = \mathrm{Fl}\,A^\wedge$!)

[page 116]

9 Révision des notations, pour les axiomes d'un localiseur fondamental [43]

Loc (1) (Saturation).

a) Les isomorphismes sont dans W.

b) Si f, g sont composables, et deux parmi f, g, gf sont dans W, le troisième aussi.

c) Si $X \underset{g}{\overset{f}{\rightleftarrows}} Y$, si gf et fg sont dans W, alors f et g aussi.

Variante renforcée :

Loc (1 bis) Loc (1) plus

d) W est stable par facteurs directs.

Loc (2) (Axiome de l'objet final). Si X dans Cat a un objet final, alors X est W-asphérique, *i.e.* $X \longrightarrow e$ est dans W.

Loc (3) (Axiome de localisation, forme faible). Soit $f : X \longrightarrow Y$ tel que pour tout $y \in Y$, X/y soit W-asphérique (*i.e.* le morphisme $f/y : X/y \longrightarrow Y/y$ déduit de f par changement de base $Y/y \longrightarrow Y$ est dans W). Alors $f \in W$.

Variante renforcée de Loc (3) :

Loc (3 bis) (Axiome de localisation, forme forte). Soit $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme dans Cat/S, tel que $\forall\ s \in S$, $f/s : X/s \longrightarrow Y/s$ (déduit de f par changement de base $S/s \longrightarrow S$) soit dans W. Alors $f \in W$. (**N.B.** Sauf erreur, il suffit le l'exiger si X, Y sont Cat-fibrés scindés sur S, et f S-cartésien compatible avec le scindage – en supposant Loc (1, 2)).

Loc (4) (Axiome du carré cocartésien). Soit X dans Cat, X_1, X_2 deux ouverts de réunion X, $X_0 = X_1 \cap X_2$, d'où un diagramme cocartésien dans Cat, p. 64 [page 117]

$$\begin{array}{ccc} X_0 & \xrightarrow{i_1} & X_1 \\ {\scriptstyle i_2}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j_2} \\ X_2 & \xrightarrow{j_1} & X\ . \end{array}$$

On a alors $i_1 \in W \iff j_1 \in W$ (et symétriquement $i_2 \in W \iff j_2 \in W$).

Loc (6) [44] (Axiome des W-fibrations). Il y a des variantes ⓐ, (a′), ⓑ, (b′), (b″), (c), (c′), *cf.* XII, p. 53-59. La forme la plus forte ⓐ est celle-ci :
Soit $f : X \longrightarrow Y$ dans Cat une W-fibration au sens ancien, *i.e.* telle que pour toute $Y'' \longrightarrow Y'$ dans Cat/Y, avec Y', Y'' contractiles, la flèche $X'' \longrightarrow X'$ déduite par le changement de base $X \longrightarrow Y$ soit dans W. Alors f est dans Fib_W, *i.e.* le foncteur de changement de base par f, $\mathrm{Cat}/Y \longrightarrow \mathrm{Cat}/X$, transforme flèches dans W en flèches dans W.

43. *Cf.* XVII [plutôt XVI] pour une version définitive (?).
44. Il y aura un Loc (5) plus "basique" plus bas.

Loc (7) (Axiome des limites inductives). W est stable par limites inductives filtrantes.

Forme renforcée de Loc (7) :

Loc (7 bis) (L-accessibilité). W est stable par $\varinjlim$ filtrantes *et* accessible, *i.e.* il existe une petite partie W_π de Fl(Cat), telle que W soit la plus petite partie de Fl(Cat) stable par $\varinjlim$ filtrantes, contenant W_π.

Loc (8) [45] (Axiome de connexité). $f \in W \Longrightarrow \pi_0(f)$ bijectif. [page 118]

N.B. Tous les axiomes, sauf le dernier (et un chouïa de l'avant dernier) sont des axiomes de stabilité – ils disent tous que W est "grand" : il contient certaines flèches, et s'il contient telles flèches, il contient telles autres. Loc (8), et dans une certaine mesure Loc (7 bis), sont des axiomes "limitatifs" sur la taille de W : Loc (7) nous dit que $W \subset \mathbf{W}_0$ (= ensemble des $f \in \mathrm{Fl}\,\mathrm{Cat}$ telles que $\pi_0(f)$ soit bijectif), Loc (7 bis) nous dit l'existence d'un cardinal tel que W soit égal à la L-enveloppe de W^π (donc $W \subset \text{L-env}(W^\pi)$).

J'ai essayé de ranger les axiomes par ordre d'importance pratique. J'ai fini par rajouter l'axiome de connexité à la fin, car dans les développements théorique sur les localiseurs généraux, il n'intervient pratiquement jamais. Mais je rappelle (XII, p. 20, th. 2) que si W satisfait Loc (1, 2, 3, 6), et si Loc (8) n'est *pas* satisfait, alors $W = \mathrm{Fl}(\mathrm{Cat})$; donc en présence de Loc (1, 2, 3, 6), Loc (8) *équivaut* à $W \neq \mathrm{Fl}(\mathrm{Cat})$ tout entier.

Les axiomes qui ont servi pour 8.4, 1°, 3° et 8.5, (b) sont [page 119]

$$\text{Loc (1 bis, 2, 3)} .$$

Ceux qui sont nécessaires pour 8.5, (a) sont

p. 65

$$\text{Loc (1 bis, 2, 3, 4)} .$$

Enfin, ceux nécessaires pour 8.4, 2° sont

$$\text{Loc (1 bis, 2, 3, 4, 7 bis)} ,$$

et ils impliquent la *saturation forte de W* (*cf.* paragraphe suivant).

Il me faut réparer un oubli, ayant traité un peu par le mépris (!) les questions de composantes connexes, jusqu'à présent.

Proposition 9.1. *Supposons que W satisfait* Loc (1, 2, 3, 4) *sans plus. Soit $f_i : X_i \longrightarrow Y_i$ ($i \in I$) une famille* finie *de flèches de* Cat. *Pour que $f = \coprod f_i : \coprod X_i \longrightarrow \coprod Y_i$ soit dans W, il suffit que $\forall\, i \in I$, on ait $f_i \in W$. Si W satisfait de plus à* Loc (7) (*axiome des limites inductives*), *alors cette conclusion reste valable sans condition de finitude sur I.*

Démonstration. Le cas I fini se traite par récurrence sur $n = \operatorname{card} I$, on est ramené aussitôt au cas où $n = 2$ [46]. On voit d'abord le

Corollaire 9.2. *Sous l'hypothèse* Loc (1, 4), *soit $f : X \longrightarrow Y$ une flèche de* Cat, *et Z un objet de* Cat. *Alors $f \in W$ si et seulement si $f \amalg \mathrm{id}_Z : X \amalg Z \longrightarrow Y \amalg Z$ est dans W.* [page 120]

Immédiat sur le carré cocartésien, où inj_0^X est une immersion ouverte de Dwyer,

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad f \quad} & Y \\ {\scriptstyle \mathrm{inj}_0^X}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{inj}_0^Y} \\ X \amalg Z & \xrightarrow[f' = f \amalg \mathrm{id}_Z]{} & Y \amalg Z \end{array} ,$$

45. J'ai changé la numérotation, pour tenir compte d'un Loc (5) plus bas, qui est encore un axiome de stabilité [initialement les axiomes Loc (6) à Loc (8) étaient notés Loc (5) à Loc (7)].

46. Le cas infini s'y ramène sous l'hypothèse Loc (7), par passage à la limite.

qui montre que $f \in W \iff f' \in W$.

En itérant ce résultat, on trouve, si

$$f_1 \ : \ X_1 \longrightarrow Y_1 \ , \qquad f_2 \ : \ X_2 \longrightarrow Y_2$$

sont donnés, que

$$f_1 \ \in \ W \ , \ f_2 \ \in \ W \quad \Longrightarrow \quad f_1 \amalg f_2 \ \in \ W \ ,$$

en regardant le diagramme de deux carrés cocartésiens :

$$\begin{array}{ccc} X_1 & \xrightarrow{\quad f \quad} & Y_1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_1 \amalg X_2 & \xrightarrow[f_1'=f_1 \amalg \mathrm{id}_{X_2}]{} & Y_1 \amalg X_2 \\ {\scriptstyle f_2'=\mathrm{id}_{X_1} \amalg f_2}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g_2=\mathrm{id}_{Y_1} \amalg f_2} \\ X_1 \amalg Y_2 & \xrightarrow[g_1=f_1 \amalg \mathrm{id}_{Y_2}]{} & Y_1 \amalg Y_2 \ . \end{array}$$

Si f_1 et f_2 sont dans W, il en est de même de f_1', f_2', g_1, g_2, par 9.2, donc aussi de $f_1 \amalg f_2 = g_2 f_1'$. p. 66

Mais je ne vois aucun moyen de prouver la réciproque, que $f_1 \amalg f_2 \in W \Longrightarrow f_1, f_2 \in W$. Grâce à ce qui a été prouvé, on est ramené au cas où f_1, f_2 sont des immersions ouvertes de Dwyer, mais il ne semble pas que cela nous avance d'un cheveu ! En somme, il faut savoir que les applications canoniques $Y_i \hookrightarrow \coprod Y_i$ sont dans Fib_W. Comme Y_i est un sommand direct, on est ramené au cas d'une immersion canonique $Y_1 \hookrightarrow Y_1 \amalg Y_2 = Y$: si $f : X \longrightarrow Y$ est dans W, en est-il de même de $X_1 = X \times_Y Y_1 \longrightarrow Y_1$? C'est une propriété qui, bien sûr, serait conséquence de l'ancien W (4 a) (XII, p. 53), ou seulement W (4 a′), donc de l'actuel Loc (6 a′). Il suffit même de la forme W (4 c′) = Loc (6 c′) la plus faible de toutes, comme on voit en décomposant $X_1 \longrightarrow Y$ en $X \xrightarrow{i} X' \xrightarrow{p} Y$, avec $i \in W$ (plus précisément, $i_1 \ : \ X_1 \longrightarrow X_1'$ et $i_2 \ : \ X_2 \longrightarrow X_2'$ dans W !), et $p \ \in \ \mathrm{Parf}_W$. Par Loc (6 c′), $f \in W$, donc $p \in W$ implique que les fibres de p sont W-asphériques, ce qui implique que p est dans W_{univ}, donc $p_1 : X_1' \longrightarrow Y_1$ est dans W. [page 121]

Donc notons par acquis de conscience : [page 122]

Corollaire 9.3. *Si W satisfait* Loc (1, 2, 3, 6 c′) (*où* Loc (6 c′) *est la variante la plus faible de toutes de l'axiome des fibrations*), *alors pour toute famille $(f_i : X_i \longrightarrow Y_i)_{i \in I}$ de flèches dans* Cat, $f = \coprod f_i \in W \Longrightarrow$ *les f_i sont dans W $\forall$ $i \in I$* [47]. *Et si $i : Y_0 \hookrightarrow Y$ est une flèche qui est à la fois immersion ouverte et immersion fermée* (i.e. *un isomorphisme avec un sommand direct de Y*), *alors i est dans* Fib_W, i.e. *si $f : X \longrightarrow X'$ est une flèche dans* Cat$/Y$, *alors $f \in W$ implique $(f_0 : X_0 \longrightarrow Y_0) \in W$, où $X_0 = X|Y_0$, $X_0' = X'|Y_0$.*

Mais il est assez scandaleux d'avoir à utiliser un axiome aussi fort, pour en conclure un résultat aussi anodin ! Je note ceci :

Proposition 9.4. *Soit $W \subset \mathrm{Fl}(\mathrm{Cat})$, satisfaisant* Loc (1) *sans plus. Les conditions suivantes sont équivalentes* (*et impliquées par* Loc (1, 2, 3, 4, 6 c′)).

a) *Si $f_1 : X_1 \longrightarrow Y_1$, $f_2 : X_2 \longrightarrow Y_2$ sont deux flèches de* Cat, *alors*

$$f_1 \amalg f_2 \in W \iff f_1 \in W, \ f_2 \in W \, .$$

b) *Les deux conditions suivantes sur W sont satisfaites :* [page 123]

47. En fait, je ne sais prouver l'implication en sens inverse, moyennant seulement Loc (1, 2, 3, 6 c′).

1°) *Si* $f : X \longrightarrow Y$ *est dans* W*, alors il l'est coüniversellement sous* $\emptyset$, i.e. *pour tout* Z *dans* Cat, $f \amalg \mathrm{id}_Z : X \amalg Z \longrightarrow Y \amalg Z$ *est dans* W. (**N.B.** *Ceci équivaut à : toute somme finie de flèches* $f_i \in W$ *est dans* W *– et itou même pour sommes infinies, si* Loc (7)*, axiome des limites, est satisfait.*)

2°) *Soit* $Y_0 \hookrightarrow Y$ *une inclusion d'un sommand direct d'un objet de* Cat. *Alors si* $X \xrightarrow{f} Y$ *est dans* W*, de même* $X_0 = X|Y_0 \longrightarrow Y_0$. (**N.B.** *Ceci équivaut à la condition que l'inclusion d'un sommand direct est toujours une* W*-fibration.*)

De plus, si $\pi_0(Y)$ *est fini, ou si* W *satisfait l'axiome des limites* Loc (7)*, il suffit d'exiger 2° pour* Y_0 *une composante connexe de* Y.

p. 67

c) *Pour toute famille* finie $(f_i)_{i\in I}$ *de flèches* $f_i : X_i \longrightarrow Y_i$ *dans* Cat,

$$\coprod f_i \in W \iff f_i \in W \text{ pour tout } i \in I.$$

De plus, si W *satisfait* Loc (7)*, alors il est inutile dans* (c) *de se borner à* I *fini.* (*Et en tous cas, les conditions équivalentes* (a), (b), (c) *impliquent pour* toute *famille de flèches* $(f_i)_{i\in I}$, $\coprod f_i \in W \Longrightarrow f_i \in W \ \forall\ i \in I$.)

[page 124]

D'après 9.3, ces conditions sont satisfaites moyennant Loc (1, 2, 3, 4, 6 c′), mais Loc (6 c′) est un marteau-pilon pour une mouche ! On aurait envie plutôt d'ajouter un axiome aux axiomes Loc (1) à Loc (4) et Loc (6) à Loc (8), qui avec Loc (8) serait l'axiome le plus anodin de tous.

Loc (5) (Axiome de décomposition, forme faible). Si $(f_i)_{i\in I}$ est une famille finie de flèches de Cat, alors $f = \coprod f_i$ est dans W si et seulement si les f_i le sont. (Ce sont les conditions équivalentes de 9.4.) [48]

Loc (5 bis) (Axiome de décomposition, forme forte). Comme Loc (5), mais sans supposer I finie. [49]

Ainsi, moyennant l'axiome des limites Loc (7), les deux axiomes précédents sont équivalents. De plus, notons ceci :

Corollaire 9.5 (de la proposition 9.4). *L'axiome* Loc (5 bis) *équivaut à chacune des propriétés suivantes :*

ⓐ *Pour tout* Y *de* Cat*, décomposé en ses composantes connexes* Y_i $(i \in I = \pi_0(Y))$*, et pour toute flèche* $f : X \longrightarrow Y$ *dans* Cat*, on a* $f \in W$ *si et seulement si les* $f_i : X_i = X|Y_i \longrightarrow Y_i$ *sont dans* W.

ⓑ *Pour* Y, Y_i *comme dans* ⓐ*, pour toute flèche* $f : X \longrightarrow X'$ *dans* Cat$/Y$*, on a* $f \in W$ *si et seulement si* $\forall\ i \in I$*, le morphisme* $f_i : X_i \longrightarrow X'_i$ *au-dessus de* Y_i *est dans* W.

[page 125]

Corollaire 9.6. *Si l'axiome* Loc (5) *est satisfait, alors l'axiome de connexité* Loc (8) *équivaut à ceci : pour toute flèche* $f : X \longrightarrow Y$ *dans* W*, avec* Y 0*-connexe,* X *est* 0*-connexe.*

p. 68

48. Il peut être commode aussi d'introduire la condition encore plus faible :

Loc (5 a) Si f_1, f_2 sont dans W, alors $f_1 \amalg f_2 \in W$.
C'est aussi la condition (b), 1° de la proposition 9.4.

Loc (5 b) Si $f_1 \amalg f_2$ est dans W, alors f_1 et f_2 aussi.
$\iff$ Si $Y_0 \subset Y$ est un sommand direct, alors $Y_0 \hookrightarrow Y$ est dans Fib_W.

49. [Réécrivons :]

Loc (5) *a*) Si $f_1, f_2 \in W$, alors $f_1 \amalg f_2 \in W$.
b) Si $f_1 \amalg f_2 \in W$, alors $f_1, f_2 \in W$
($\iff$ *b*′) tout $Y_0 \hookrightarrow Y$ sommand direct est dans Fib_W).

Loc (5 bis) Comme Loc (5), mais (*a*) remplacé par (*a* bis) une famille (pas nécessairement finie).

N.B. Les axiomes Loc (8) (connexité) et Loc (5 bis) (de décomposition) ont l'air de nature voisine, étant liés l'un et l'autre à la décomposition des objets de Cat en composantes connexes. (Néanmoins, je pense qu'ils sont indépendants.) Je présume qu'on n'aura jamais à travailler vraiment avec des W qui ne satisfont à ces deux axiomes ! (En plus de Loc (1, 2, 3), qui eux constituent le "minimum vital".) Mais apparemment il n'y en a pas besoin dans les développements théoriques généraux jusqu'ici. (Mais l'axiome de connexité Loc (8) pourrait jouer un rôle, quand on parle de la détermination réciproque des structures de contractibilité, et de W-asphéricité, *cf.* Pursuing Stacks.

[page 126]

Notons ceci :

Proposition 9.7. [50] *Supposons que W satisfait* Loc (1, 2, 3, 5), i.e. *c'est un localiseur fondamental satisfaisant la condition de décomposition* (*forme faible*). *Si l'axiome* Loc (8) *de connexité n'est* pas *satisfait, alors la sous-catégorie* Hot_W^* *des* $X \in \mathrm{Cat}$ *non vides est équivalente à la catégorie ponctuelle* (*donc* Hot_W *est équivalente soit à la catégorie ponctuelle, si* $\emptyset \longrightarrow e$ *est un isomorphisme dans* Hot_W, *soit à* $\mathbf{\Delta}_1$ *dans le cas contraire*[51].)

Ceci est une variante du th. 2 de XII (p. 20), où on faisait l'hypothèse Loc (6 c′), plus forte que Loc (5) et même que Loc (5 bis), mais avec la conclusion plus forte que $W = \mathrm{Fl}(\mathrm{Cat})$.

Démonstration. Soit

$$f \ : \ X \longrightarrow Y \ , \qquad f \ \in \ W \ ,$$

telle que $\pi_0(f)$ ne soit pas *surjective.* Si Y_0 est une composante connexe qui n'est pas dans $\mathrm{Im}\pi_0(f)$, alors $X_0 = X|Y_0$ est vide, et par Loc (7), $\emptyset \longrightarrow Y_0$ est dans W. Donc $\forall\ Z$ dans Cat, $\underbrace{\emptyset \times Z}_{=\emptyset} \longrightarrow Y_0 \times Z$ est dans W, et pour toute flèche $g : Z \longrightarrow Z'$, $\mathrm{id}_{Y_0} \times g : Y_0 \times Z \longrightarrow Y_0 \times Z'$ est dans W. Prenant g telle que $\pi_0(g)$ ne soit pas injective, p. ex. $e \amalg e \longrightarrow e$, on trouve une flèche $\varphi = \mathrm{id}_{Y_0} \times g$ dans W telle que $\pi_0(\varphi)$ ne soit pas injective.

[page 127]

Soit donc $\varphi \ : \ I \longrightarrow J$ dans W, avec $\pi_0(\varphi)$ non injective. Procédant comme tantôt en utilisant Loc (5), on est ramené au cas où de plus J est 0-connexe. (**N.B.** Dans les deux cas, on aurait pu aussi invoquer 9.6.) Choisissons deux éléments i_0, i_1 dans I dans deux composantes connexes distinctes, soient j_0, j_1 leurs images dans J. On va traiter (I, i_0, i_1) et (J, j_0, j_1) comme des "intervalles homotopiques". Le fait que i_0, i_1 appartiennent à des composantes distinctes de I implique que deux flèches $f_0, f_1 : X \rightrightarrows Y$ sont "homotopes par rapport à (I, i_0, i_1)", *i.e.* il existe $h \ : \ X \times I \longrightarrow Y$ dans Cat telle que $f_0 \ = \ h\partial_0^X$, $f_1 = h\partial_1^X$, où

$$\partial_0^X \ , \ \partial_1^X \ : \ X \ \longrightarrow \ I \times X$$

sont données par $x \longmapsto (i_\alpha, x)$ $(\alpha \in \{0, 1\})$. Pour trouver h, on décompose I en

$$I \ = \ I_0 \amalg I_1 \ , \qquad \text{avec} \quad i_0 \in I_0, \ i_1 \in I_1 \ ,$$

d'où $I \times X \ \simeq \ (I_0 \times X) \amalg (I_1 \times X)$, et on définit h par ses restrictions h_0, h_1 aux deux morceaux $I_0 \times X$, $I_1 \times X$, savoir

$$h_0 \ = \ f_0 \circ \mathrm{pr}_2^{I_0} \ , \qquad h_1 \ = \ f_1 \circ \mathrm{pr}_2^{I_1} \ ,$$

où

p. 69


$$\mathrm{pr}_2^{I_\alpha} \ : \ I_\alpha \times X \longrightarrow X \ .$$

[page 128]

50. *Cf.* version plus forte dans 9.9 plus bas (débarrassée de l'hypothèse Loc (5).)

51. Le premier cas est aussi celui où $\exists\ f \in W$ avec $\pi_0(f)$ *non surjectif,* ou encore $\emptyset \longrightarrow X$ dans W, avec X non vide.

Considérons maintenant le diagramme (traits pleins)



où $\partial_0'^X, \partial_1'^X$ sont définis comme $\partial_0^X, \partial_1^X$, mais utilisant $j_0, j_1 \in \mathrm{Ob}J$ au lieu de $i_0, i_1 \in \mathrm{Ob}I$. S'il existait dans Cat une flèche h' (pointillée) telle que $h' \circ \varphi_X = h$, il s'ensuivrait que h' est une homotopie de f_0 et f_1 suivant (J, j_0, j_1). Comme J est 0-connexe, il s'ensuivrait aussitôt que f_0, f_1 sont homotopes au sens habituel dans Cat, donc que f_0 et f_1 ont même image dans Hot_W. Mais si on ne peut trouver une flèche h' dans Cat, du moins peut-on la trouver dans Hot_W, puisque $\varphi_X \in W$, donc un isomorphisme dans Hot_W (et h' dans $\mathrm{Hom}_W(J \times X, Y)$ sera même uniquement déterminé). Donc dans Hot_W, on a

$$f_0 \;=\; h'\partial_0'^X\ , \qquad\qquad f_1 \;=\; h'\partial_1'^X\ .$$

Pour prouver que [page 129]

$$f_0 \;=\; f_1 \qquad \text{dans} \quad \mathrm{Hom}_W(X, Y)\ ,$$

il suffit de voir que

$$\partial_0'^X \;=\; \partial_1'^X \qquad \text{dans} \quad \mathrm{Hom}_W(X, J \times X)\ .$$

Or en fait $\partial_0'^X$ et $\partial_1'^X$ sont homotopes, car $e \overset{j_0}{\underset{j_1}{\rightrightarrows}} J$ sont homotopes (j_0 et j_1 appartenant à la même composante connexe de J), donc aussi leur produit par id_X.

On voit donc que pour deux objets quelconques X, Y de Cat, toutes les flèches de X dans Y sont égales dans Hot. L'argument fait prouve même que toutes les flèches *dans* Hot_W de X dans Y sont égales. Cela signifie que la catégorie Hot_W^* (où pour deux objets quelconques X, Y, $\mathrm{Hom}_{\mathrm{Cat}}(X, Y)$, et a fortiori $\mathrm{Hom}_W(X, Y)$ est $\neq \emptyset$) est équivalente à la catégorie ponctuelle. Quant à Hot_W elle-même, dont l'ensemble des objets est $\{\emptyset\} \amalg \mathrm{Ob}\mathrm{Hot}_W^*$, avec $\emptyset$ objet initial, elle sera donc équivalente à la catégorie ponctuelle, ou bien à $\mathbf{\Delta}_1$, selon que $\emptyset \longrightarrow e$ est un isomorphisme dans Hot_W, ou non.

Commentaire 9.8. Si les axiomes Loc (1, 2, 3, 5) [52] sont satisfaits, alors l'axiome de connexité Loc (8) *équivaut* à chacun des suivants : [page 130]

p. 70

a) Hot_W n'est équivalente ni à e, ni à $\mathbf{\Delta}_1$.

b) Hot_W a une infinité de classes d'isomorphie.

c) $f_0 : X_0 \longrightarrow Y_0$ (flèche donnée d'avance dans Cat, telle que $\pi_0(f_0)$ n'est pas un isomorphisme, et $X_0 \neq \emptyset$) n'est *pas* un isomorphisme de Hot_W.

d) X_0 et Y_0 ne sont pas isomorphes dans Hot_W (où X_0, Y_0 sont deux objets donnés d'avance dans Cat, avec X_0, Y_0 non vides et $\mathrm{card}\,\pi_0(X_0) \neq \mathrm{card}\,\pi_0(Y_0)$).

On peut donc dire que l'axiome de connexité joue le rôle d'un *axiome de non trivialité* pour la catégorie Hot_W localisée de Cat. Il sera satisfait automatiquement pour tous les localiseurs fondamentaux W qu'on sera amené à construire ou à introduire. Mais on n'aura pratiquement jamais à l'invoquer comme une hypothèse, en vue de certaines conclusions. ‖

[52] En fait, ce commentaire vaut même en l'absence de l'hypothèse Loc (5), *cf.* 9.9 ci-dessous.

Je m'aperçois finalement que dans la proposition 9.7 l'hypothèse Loc (5) est inutile :

Proposition 9.9. [53] *Soit W un localiseur fondamental dans* Cat (i.e. *on a* Loc (1, 2, 3) *sans plus*), *plus la condition que la* somme *de $f_1, f_2 \in W$ est dans W* [54]. *Si l'axiome de connexité n'est pas satisfait, alors* Hot_W *est équivalente à la catégorie ponctuelle* (*si $\emptyset \longrightarrow e$ est un isomorphisme dans* Hot_W [55]) *ou à* $\mathbf{\Delta}_1$ (*dans le cas contraire*), *et* Hot_W^* ($\overset{\text{déf}}{=} \mathrm{Hot}_W \backslash \{\emptyset\}$) *est équivalente à la catégorie ponctuelle.*

La condition sur les sommes assure que dans Hot_W la somme de deux objets existe, et que $\mathrm{Cat} \longrightarrow \mathrm{Hot}_W$ commute aux sommes de deux objets. Ceci dit, soit [page 131]

$$f \ : \ X \longrightarrow Y \qquad (*)$$

une flèche telle que $f \in W$, mais $\pi_0(f)$ non surjectif. Supposons d'abord $X \neq \emptyset$ (cas le moins évident). Si Y_0 est un sommand non vide de Y tel que f se factorise par $Y_1 = Y \backslash Y_0$, alors f est somme de

$$f_1 \ : \ X \ = \ X_1 \longrightarrow Y_1 \qquad \text{et} \qquad f_0 \ : \ X_0 \ = \ \emptyset \longrightarrow Y_0$$

dans Cat, donc aussi dans Hot_W. Donc on a une somme $f \ = \ f_0 \amalg f_1$ dans Hot_W qui est un isomorphisme, donc pour tout Z dans Hot_W,

$$\mathrm{Hom}_W(Y_0, Z) \times \mathrm{Hom}_W(Y_1, Z) \ \xrightarrow{\sim} \ \underbrace{\mathrm{Hom}_W(X_0, Z)}_{=e} \times \mathrm{Hom}_W(X_1, Z)$$

(**N.B.** $\emptyset$ est objet initial de Hot_W, l'étant de Cat), *i.e.* le composé

$$Z(Y_0) \times Z(Y_1) \ \xrightarrow{\mathrm{pr}_2} \ Z(Y_1) \ \xrightarrow{Z(f_1)} \ Z(X_1)$$

est bijectif. Comme $X \ = \ X_1 \neq \emptyset$, donc aussi $Y_1 \neq \emptyset$, et $Y_0 \neq \emptyset$, les ensembles $Z(Y_0)$, $Z(Y_1)$, $Z(X_1)$ sont $\neq \emptyset$ si $Z \neq \emptyset_{\mathrm{Cat}}$. Le composé étant bijectif, la première flèche pr_2 est injective, ce qui implique que $Z(Y_0)$ est réduit à un point (les deux facteurs $Z(Y_0)$, $Z(Y_1)$ étant $\neq \emptyset$). Cela signifie que Y_0 est un objet initial dans Hot_W^*. Il s'ensuit notamment que $Y_0 \amalg Y_0$ est aussi un objet initial, et l'application canonique $Y_0 \amalg Y_0 \longrightarrow Y_0$ est donc un isomorphisme dans Hot_W, alors que l'application induite sur les π_0 n'est pas injective. (C'est $\pi_0(Y_0) \amalg \pi_0(Y_0) \longrightarrow \pi_0(Y_0)$, avec $\pi_0(Y_0)$ non vide.) Ce cas va être traité ci-dessous. p. 71 [page 132]

Si dans $(*)$ X est vide, Y non vide (puisque $\pi_0(f)$ non surjectif), alors Y est objet initial de Hot_W, et on voit encore que $Y \amalg Y \longrightarrow Y$ est un isomorphisme dans Hot_W, bien que n'induisant pas un isomorphisme des π_0. La proposition 9.9 va donc résulter du

Lemme 9.10. *Soit W localiseur fondamental sans plus* (*axiomes* Loc (1, 2, 3)). *Supposons qu'il existe $f : I \longrightarrow J$ dans* Cat *tel que* $\mathrm{hot}_W(f)$ *soit un isomorphisme, mais que* $\pi_0(f)$ ne soit pas injectif [56]. *Alors* Hot_W^* *est équivalente à la catégorie ponctuelle e, et* Hot_W *est équivalente à e* (*si $\emptyset \longrightarrow e$ est un isomorphisme dans* Hot_W) *ou à* $\mathbf{\Delta}_1$ (*dans le cas contraire*).

La démonstration est celle donnée pour 9.7 : on prouve que si X, Y sont deux objets de Cat, *non vides*, alors deux flèches $f_0, f_1 : X \rightrightarrows Y$ sont égales dans Hot_W, par un argument d'homotopie, en choisissant deux points i_0, i_1 de I qui sont dans deux composantes connexes distinctes, et tels que leurs images j_0, j_1 dans J soient dans la même composante. [page 133]

Proposition 9.11. *Soit W un localiseur fondamental* (i.e. *on a* Loc (1, 2, 3)). *Alors les conditions suivantes sont équivalentes.*

---

[53] *Cf.* meilleur énoncé 9.12 (p. 133 bis).

[54] Cette condition Loc (5 a) est vérifiée notamment si W satisfait de plus l'un des deux axiomes Loc (4) (*cf.* 9.1), ou Loc (6 c′) (*cf.* 9.3).

[55] Cela signifie aussi qu'il existe $Z \neq \emptyset$ dans Cat, tel que $\emptyset \longrightarrow Z$ soit un isomorphisme dans Hot_W.

[56] Ou bien tel que I soit 0-connexe, et J non 0-connexe (*i.e.* $\mathrm{card}\,\pi_0(I) \ = \ 1$, $\mathrm{card}\,\pi_0(J) \ \geq \ 2$). Ce deuxième cas se traite par la même méthode essentiellement.

a) *On a* Loc (5 bis) (*axiome de décomposition, forme forte*) *et* Loc (8) (*axiome de connexité*).

b) *On a* Loc (5 bis), *et* Hot_W *n'est pas équivalente à e ou à* $\mathbf{\Delta}_1$ (cf. *commentaire* 9.8).

c) *Pour toute* $f : X \longrightarrow Y$, *on a* $f \in W$ *si et seulement si* $\pi_0(f)$ *est un isomorphisme, et pour toute composante connexe* X_i *de* X, *si* Y_i *désigne la composante connexe correspondante de* Y, *la flèche induite* $f_i : X_i \longrightarrow Y_i$ *est dans* W.

La raison pour laquelle je n'isole pas cette propriété en un des axiomes Loc (…), c'est que ce n'est *pas* un axiome de stabilité, mais un axiome de nature mixte.

[page 133 bis]

Proposition 9.12. *Soit* W *un localiseur fondamental* (*sans plus*), i.e. *satisfaisant* Loc (1, 2, 3). *Les conditions suivantes sont équivalentes.*

a) W *satisfait l'axiome de connexité* Loc (8), i.e. $f \in W \Longrightarrow \pi_0(f)$ *bijectif.*

b) *Si* $f, g : X \rightrightarrows Y$ *dans* Cat *sont telles que* $\mathrm{hot}_W(f) = \mathrm{hot}_W(g)$, *alors* $\pi_0(f) = \pi_0(g)$.

c) *Il existe* X, Y *dans* Cat *tel que l'application* $\mathrm{hot}_W^{X,Y} : \mathrm{Hom}_{\mathrm{Cat}}(X, Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}_W(X, Y)$ *ne soit pas constante.*

c′) *La sous-catégorie* Hot_W^* *de* Hot_W, *formée des objets non vides, n'est pas équivalente à la catégorie ponctuelle.*

c″) *La catégorie* Hot_W *n'est pas équivalente à la catégorie e ni à la catégorie* $\mathbf{\Delta}_1$.

d) *L'ensemble des classes d'isomorphie d'objets de* Hot_W *est infini.*

Démonstration. On a $(a) \Longrightarrow (b)$, puisque (a) équivaut à dire que le foncteur $\pi_0 : \mathrm{Cat} \longrightarrow \mathrm{Ens}$ se factorise par Hot_W. D'ailleurs le foncteur correspondant

p. 72

$$\mathrm{Hot}_W \longrightarrow (\mathrm{Ens})$$

est essentiellement surjectif – il y a un inverse à isomorphisme près, $I \longmapsto \mathrm{hot}_W(I)$. Cela prouve que (a) implique (d), et on a $(d) \Longrightarrow (c')$, $(d) \Longrightarrow (c'')$ tautologiquement. Un argument plus ou moins tautologique montre d'ailleurs que si Hot_W^* est équivalente à e, alors Hot_W est équivalente à e ou à $\mathbf{\Delta}_1$ (car $\emptyset$ est objet initial de Hot_W) – donc $(c'') \Longrightarrow (c')$. Donc on a plus ou moins tautologiquement

$$\begin{array}{ccccccc} (\mathrm{a}) & \Longrightarrow & (\mathrm{d}) & \Longrightarrow & (\mathrm{c}'') & \Longrightarrow & (\mathrm{c}') \\ \Downarrow & & & & & \nearrow\!\!\nearrow & \\ (\mathrm{b}) & & \Longrightarrow & & (\mathrm{c}) & & \end{array}$$

où les implications $(b) \Longrightarrow (c) \Longrightarrow (c')$ sont elles aussi triviales [c'est plutôt l'implication (c′) ⟹ (c) qui est triviale ; l'implication (c) ⟹ (c′) est démontrée après l'énoncé du corollaire 9.13, avant la preuve de ce dernier]. Donc tout revient à prouver que $(c) \Longrightarrow (a)$, ou encore :

[page 133 ter]

Corollaire 9.13. *Si l'axiome de connexité n'est pas satisfait, alors si* X, Y *sont deux objets de* Cat, *toutes les flèches* $X \longrightarrow Y$ *dans* Cat *sont égales dans* Hot_W, i.e. *l'application* $\mathrm{Hom}_{\mathrm{Cat}}(X, Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}_W(X, Y)$ *est constante.*

Cela implique donc que tous les objets de Cat^*, *i.e.* tous les objets non vides de Cat, sont isomorphes dans Hot_W, et on trouve un isomorphisme canonique entre elles, avec transitivité. Soit alors $\mathcal{H}$ la catégorie quotient de Cat, ayant mêmes objets que Cat, et ayant exactement une flèche entre deux objets non vides de Cat et exactement une flèche de $\emptyset$ dans tout autre objet de Cat (et pas de flèche d'un objet non vide de Cat dans $\emptyset$). C'est donc une catégorie équivalente à $\mathbf{\Delta}_1$. On a vu que $\mathrm{Cat} \longrightarrow \mathrm{Hot}_W$ se factorise en

$$\mathrm{Cat} \xrightarrow{\text{can.}} \mathcal{H} \longrightarrow \mathrm{Hot}_W \ .$$

Si Cat $\longrightarrow \mathcal{H}$ transforme toute flèche appartenant à W en isomorphisme, alors il est immédiat que $\mathcal{H}$ est solution au problème universel définissant Hot_W, donc que $\mathcal{H} \longrightarrow \mathrm{Hot}_W$ est un isomorphisme. Cela signifie aussi que W ne contient pas de flèche $\emptyset \longrightarrow X$ avec X non vide (auquel cas W contient toutes les flèches). Donc dans ce cas $\mathrm{Hot}_W \simeq \mathbf{\Delta}_1$. Dans le cas contraire, soit $\mathcal{H}'$ la catégorie déduite de $\mathcal{H}$ en inversant les flèches $\emptyset \longrightarrow X$, *i.e.* le groupoïde 1-connexe sur l'ensemble d'objets ObCat. Ce n'est plus une catégorie quotient de Cat, mais on a encore une factorisation

$$\mathrm{Cat} \xrightarrow{\text{épi}} \mathcal{H} \xrightarrow{\text{loc.}} \mathcal{H}' \longrightarrow \mathrm{Hot}_W \ ,$$

et cette fois c'est $\mathcal{H}'$ qui est solution du problème universel (Cat $\longrightarrow \mathcal{H}'$ transformant flèches de W en isomorphismes). Donc dans ce cas, $\mathcal{H}' \longrightarrow \mathrm{Hot}_W$ est un isomorphisme, et Hot_W est équivalente à e. Dans les deux cas, Hot_W^* est équivalente à e. p. 73 [page 133 quater]

Donc, la proposition 9.12 résulte du corollaire 9.13, qu'il s'agit à présent de démontrer.

Soit $f : I \longrightarrow J$ dans Cat telle que $\pi_0(f)$ ne soit pas injective. On a vu dans la démonstration de 9.7 comment on en déduit (en choisissant deux éléments i_0, i_1 dans deux composantes connexes distinctes de I, telles que $j_0 = f(i_0)$ et $j_1 = f(i_1)$ soient dans une même composante connexe de J) que pour X, Y dans Cat, deux flèches $f_0, f_1 : X \rightrightarrows Y$ sont toujours égales dans Hot_W (*cf.* lemme 9.10).

Soit maintenant

$$f \ : \ I \longrightarrow J$$

dans Cat telle que $\pi_0(f)$ ne soit pas surjective, donc $J = J_0 \amalg J_1$, avec f se factorisant par J_0, et $J_1 \neq \emptyset$. Considérons alors la catégorie discrète à deux objets,

$$\varepsilon \ = \ \{0, 1\} \ ,$$

et deux flèches

$$g_0, \ g_1 \ : \ J \ \rightrightarrows \ \varepsilon \ ,$$

g_0 étant constante de valeur 0, et g_1 étant égale à 0 sur J_0, à 1 sur J_1. On a

$$g_0 f \ = \ g_1 f \ ,$$

donc, comme $f \in W$,

$$g_0 \ = \ g_1 \qquad \text{dans} \quad \mathrm{Hot}_W \ .$$

On en conclut, en prenant un point j_1 dans J_1, et l'inclusion $\alpha_{j_1} : e \longrightarrow J$ correspondante, que [page 133 quinquies]

$$g_0 \alpha_{j_1} \ = \ g_1 \alpha_{j_1} \ ,$$

i.e. les deux sections de ε sur e sont égales dans Hot_W. Comme le foncteur Cat $\longrightarrow \mathrm{Hot}_W$ commute aux produits finis [cette propriété n'est pas établie sous les seules conditions Loc(1,2,3) ; elle est démontrée dans Pursuing Stacks, section 64, en remplaçant Loc(3) par l'axiome plus fort Loc(3bis)], il s'ensuit que pour X dans Cat, les deux flèches

$$X \ \overset{\partial_0^X}{\underset{\partial_1^X}{\rightrightarrows}} \ X \times \varepsilon \ = \ X \amalg X$$

sont égales dans Hot_W. Si alors

$$f_0, \ f_1 \ : \ X \ \rightrightarrows \ Y$$

sont deux flèches dans Cat, elles sont de la forme

$$f_0 \;=\; h\partial_0^X\;, \qquad\qquad f_1 \;=\; h\partial_1^X\;,$$

avec

$$h \;=\; (f_0, f_1) \;:\; X \amalg X \;\longrightarrow\; X\;,$$

et comme $\partial_0^X = \partial_1^X$ dans Hot_W, on en conclut $f_0 = f_1$ dans Hot_W, *q.e.d.*

p. 74

[page 134]

10 Application au dérivateur HOT_W

Théorème 10.1. *Soit W un localiseur dans* Cat *satisfaisant les conditions* Loc (1, 2, 3, 4, 7 bis) (*axiomes de saturation forme forte* (*facteurs directs*), *de l'objet final, de localisation forme faible, du carré cocartésien, de la L-accessibilité* [57]). *Soit* HOT_W *le prédérivateur sur* (Cat) *associé à* (Cat, W) *de la façon habituelle,*

$$I \longmapsto \mathrm{Cat}(I)\, W(I)^{-1} \;=\; \underline{\mathrm{Hom}}(I^\circ, \mathrm{Cat})\, W(I)^{-1}\,. \tag{10.1.1}$$

On a alors ce qui suit.

1 °) *Pour toute flèche $u : I \longrightarrow J$ dans* Cat, *le foncteur $u_!$* (*adjoint à gauche de u^**) *existe* (**N.B.** On n'a pas besoin pour ceci de Loc (4) ni de Loc (7 bis), il suffit que W soit un localiseur fondamental `[on a néanmoins besoin de l'axiome de localisation forme forte Loc (3 bis)]`), *et il se calcule de la façon standard* (*axiomes* Der 4 bis *et* Der 5 bis). *Le foncteur u_*, adjoint à droite de u^*, existe* [58] [*si u est de la forme $v \times \mathrm{id}_S$, où $v : I_0 \longrightarrow J_0$ est une flèche entre catégories ordonnées finies, et S un objet quelconque de* Cat], *et ce foncteur u_* se calcule de façon standard* (*axiomes* Der 4 *et* Der 5). *Donc on a une théorie des carrés W-cartésiens et des carrés W-cocartésiens dans les catégories* $\mathrm{HOT}_W(S)$, *et des suites longues de suspension et de cosuspension dans les* [page 135] *catégories* $\mathrm{HOT}^\bullet_W(S)$. (*Plus exactement, ce sont des théories relatives aux dérivateurs induits* $\mathrm{HOT}_{W,S}$, $\mathrm{HOT}^\bullet_{W,S}$ *sur S, $I \longmapsto \mathrm{HOT}_W(S \times I)$ resp. $I \longmapsto \mathrm{HOT}^\bullet_W(S \times I)$ …*). *De plus, les carrés cocartésiens et les carrés cartésiens relatifs aux dérivateurs induits* $\mathrm{HOT}_{W,S}$ *sont* exacts, i.e. *les suites longues de suspension et de cosuspension sont exactes* (*axiomes d'exactitude à droite et à gauche* Der 6 bis *et* Der 6).

2 °) *Le prédérivateur* HOT_W *satisfait aussi l'axiome* Der 1 *de décomposition finie* [59] (*pour $I = \coprod_\alpha I_\alpha$*), *et l'axiome* Der 2 *de localisation. De plus, W est fortement saturé,* i.e. *$f \in W \iff \mathrm{hot}_W(f)$ isomorphisme.*

3 °) *Concernant l'axiome* Der 3 *et ses variantes* (*cf.* I, pages 111-112, 125), *on a ceci :*

a) [60]. *Soit $f : S' \longrightarrow S$ une flèche dans* Cat. *Pour que ce soit une* HOT_W*-équivalence,* i.e. *pour que le foncteur $f^* : \mathrm{HOT}_W(S) \longrightarrow \mathrm{HOT}_W(S')$ induise une* équivalence *entre les sous-catégories pleines formées des objets* constants *sur S, S', il faut et il suffit que f soit dans W. L'énoncé correspondant dans les dérivateurs induits* $\mathrm{HOT}_{W,I}$ *est également valable, pour $I \neq \emptyset$. Donc a fortiori,* HOT_W *et* $\mathrm{HOT}_{W,I}$ *satisfont l'axiome de l'objet* [page 136] *final,* i.e. *si S dans* Cat *a un objet final, alors $S \longrightarrow e$ est une* HOT_W*-équivalence, et* p. 75 *même une* $\mathrm{HOT}_{W,I}$*-équivalence pour toute I dans* Cat.

b) *Supposons que W satisfasse* Loc (1 ter, 2, 3, 5 b) (*donc l'axiome* Loc (5 b) *des W-fibrations, variante* b). *Alors pour toute $f : S' \longrightarrow S$ dans W,* $\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S) \longrightarrow \mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S')$

57. **N.B.** Loc (1 bis), *i.e.* $W = W^{\natural}$, est déjà impliqué par la condition que W soit stable par $\varinjlim$ filtrantes.

58. *Toujours ! Cf.* XIX, p. 29.

59. Sans aucun axiome sur W ! `[On a besoin simplement que les identités soient dans W.]`

60. On n'a besoin ici que de Loc (1 ter, 2, 3) (Loc (1 ter) est la saturation forte, *i.e.* $f \in W \iff \mathrm{hot}_W(f)$ isomorphisme).

est une équivalence de catégories (*la réciproque étant clair par* (a)). *Itou pour*

$$\mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_{W,I}(S) \longrightarrow \mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_{W,I}(S') \qquad (\text{i.e. } \textit{pour } \ \mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}/I}_{W}(S \times I) \longrightarrow \mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}/I}_{W}(S' \times I)\ ).$$

En d'autres termes, pour le dérivateur HOT_W *et pour tous les* $\mathrm{HOT}_{W,I}$ (**D** *étant un des ces dérivateurs*) [61], *toute* **D***-équivalence est une* **D***-équivalence* 2*-complète,* i.e. *pour* $f : S' \longrightarrow S$, *pour que* $f^* : \mathbf{D}(S) \longrightarrow \mathbf{D}(S')$ *induise une équivalence entre les sous-catégories* $\mathbf{D}^{\mathrm{lc}}(S) \longrightarrow \mathbf{D}^{\mathrm{lc}}(S')$, *il suffit déjà qu'elle induise un foncteur pleinement fidèle sur les sous-catégories pleines formées des objets constants, et ceci équivaut* (*si* $I \neq \emptyset$) *à la condition que* $f \in W$.

[page 137]

Commentaire. Dans cet énoncé récapitulatif de ce que je sais prouver à présent pour HOT_W, j'ai un peu mélangé les provenances diverses – ce qui est mis "pour mémoire" de VI (et qui ne dépend pas de Loc (4, 7 ou 7 bis)), *i.e.* ce qui dépend pour l'essentiel de la construction de $u_!$ donnée dans VI (donc ce qui concerne $u_!$ dans 1°, *moins* l'exactitude à droite, et tout ce qui concerne 3°, (*a*), (*b*)).

La démonstration de 10.1 résultera des développements du paragraphe suivant `[qui n'existe pas]`, compte tenu du résultat principal du paragraphe 8 (th. 8.4), et du paragraphe 7 (cor. 7.4), qui sont les ingrédients "durs" du théorème 10.1.

61. À vérifier avec soin dans le cas $\mathbf{D} = \mathrm{HOT}_{W,I}$.

LES DÉRIVATEURS

p. [non numérotée]

ALEXANDRE GROTHENDIECK

Chapitre XVI

Les localiseurs fondamentaux

p. [non numérotée]

Note des éditeurs de l'édition transcrite.

Ce texte a été déchiffré et transcrit en LaTeX 2$_\varepsilon$ par M. Künzer. Il a été édité par M. Künzer, J. Malgoire, et G. Maltsiniotis. La transcription est aussi fidèle que possible au manuscrit. Seules quelques corrections mineures évidentes ont été effectuées. Pour les rares ajouts ou commentaires des éditeurs, ainsi que pour la numérotation originale des pages du manuscrit, les caractères de machine à écrire `[typewriter]` entre crochets sont utilisés.

Cette édition est provisoire. Les remarques, commentaires et corrections sont bienvenus. Envoyer un message à :

[**e-mail address removed**]

G. Maltsiniotis

p. 1

[page 1]

1 Axiomes Loc(1) à Loc(3) (et variantes) : localiseurs fondamentaux

J'ai envie de reprendre l'exposé des axiomes utiles pour un localiseur fondamental

$$W \subset \mathrm{Fl}(\mathrm{Cat}),$$

en me guidant cette fois plus sur la signification géométrique des axiomes, que sur les alias ± techniques qu'on rencontre (ou ne rencontre pas) pour les vérifier. Je révise donc dans cet esprit la présentation de XV §9.

Loc (1) (*saturation*).

a) Iso $\subset W$.

b) Si deux parmi f, g, gf sont dans W, aussi le troisième.

c) Si gf et fg sont dans W, f et g aussi.

Les conditions (*a*) et (*b*) toutes seules, je vais les appeler (pour un $W \subset \mathrm{Fl}\,\mathcal{M}$ général) *saturation faible* du localiseur. Les conditions (*a*), (*b*), (*c*), *saturation modérée* ("mild saturation"). Autres variantes :

Loc (1 bis) Les conditions (*a*), (*b*), (*c*) du haut, plus

d) W stable par facteurs directs.

C'est bien sûr impliqué par :

Loc (1 ter) W est *fortement saturé, i.e.* si $f \in \mathrm{Cat}$ est telle que $\mathrm{hot}_W(f)$ est un isomorphisme, alors $f \in W$.

Loc (2) (*Objet final*). Si X dans Cat a un objet final, alors X est W-asphérique, *i.e.* $X \longrightarrow e$ est dans W.

Parfois, cet axiome est conséquence de la variante affaiblie suivante.

Loc ($\mathbf{2}_0$) (Axiome du segment). $\mathbf{\Delta}^1$ est W-asphérique.

[page 2]

Loc (3) (*localisation,* forme faible). Soit $f : X \longrightarrow S$ une flèche dans Cat *W-asphérique, i.e.* telle que $\forall\ s \in \mathrm{Ob}\, S$, la catégorie localisée X/s sur S en s, $X/s = X \times_S S/s$, soit W-asphérique. Alors $f \in W$. [1]

Rappel 1. Loc (1, 2, 3) impliquent que l'on a

$$W = W^\circ \qquad \textit{i.e. } f \in W \iff f^\circ \in W,$$

où on dénote par $X \longmapsto X^\circ$, $f \longmapsto f^\circ$ le foncteur de passage à la catégorie opposée, p. 2
foncteur

$$X \longmapsto X^\circ : \mathrm{Cat} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Cat}$$

qui est un *automorphisme* de Cat (donc commute à toutes $\varinjlim$ et $\varprojlim$). Il s'ensuit que l'ensemble d'axiomes Loc (1, 2, 3) équivaut à Loc (1, 2^{opp}, 3^{opp}), où Loc (2^{opp}) est l'axiome "dual" de Loc (2), savoir que tout objet de Cat ayant un objet initial est W-asphérique, et de même Loc (3^{opp}) l'axiome que toute $f : X \longrightarrow S$ *W-coasphérique, i.e.* telle que les catégories colocalisées $s\backslash X$ de X sur S soient W-asphériques, est dans W.

Définition 1.1. On appelle *localiseur fondamental* une partie W de Fl(Cat) satisfaisant les axiomes Loc (1, 2, 3) (*i.e.* saturation modérée, axiome de l'objet final, axiome de localisation).

Rappel 1.2. Si W est un localiseur fondamental, alors tout *homotopisme* $f : X \longrightarrow Y$ [page 3]
de Cat est dans W (c'est pour cela essentiellement que l'on a imposé (c) dans la saturation modérée Loc (1)). Si $f, g : X \rightrightarrows Y$ sont homotopes (*i.e.* appartiennent à une même composante connexe de $\underline{\mathrm{Hom}}(X, Y)$), alors $\mathrm{hot}_W(f) = \mathrm{hot}_W(g)$ et $f \in W \iff g \in W$.

Voici la forme forte de Loc (3).

Loc (3 bis) (*Localisation,* forme forte). Soit S dans Cat et $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme dans Cat$/S$ tel que "f soit une W-équivalence localement sur S", *i.e.* pour tout $s \in \mathrm{Ob}\, S$, le morphisme induit

$$f/s : X/s \longrightarrow Y/s$$

pour les catégories localisées de X, Y sur S en s, soit dans W. Alors $f \in W$.

L'axiome Loc (3) n'est autre que le cas particulier de Loc (3 bis) relatif au cas où $Y = S$.

Proposition 1.3. *Soit $W \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$. Alors on a les équivalences suivantes*

$$\begin{aligned} \text{Loc (1, 2, 3)} &\iff \text{Loc (1, } 2_0\text{, } 3')\\ \text{Loc (1, 2, 3 bis)} &\iff \text{Loc (1, } 2_0\text{, } 3' \text{ bis)}, \end{aligned}$$

où les axiomes Loc ($3'$) *et* Loc ($3'$ bis) *se formulent ainsi :*

[page 4]

Loc ($3'$) ⓐ (Axiome des Cat-fibrations, forme directe faible). Soient S dans Cat, X une catégorie fibrée scindée sur S, telle que les fibres X_s ($s \in \mathrm{Ob}\, S$) soient W-asphériques. Alors $X \longrightarrow S$ est dans W.

ⓑ Soit X dans Cat$/S$, alors $i_X : X \longrightarrow \Phi_S(X)$ est dans W [2].

p. 3

1. Dans une version finale, il faudrait intervertir les notations pour Loc (3) et pour Loc (3 bis), car ce dernier m'apparaît comme le plus important des deux - il est satisfait pour tous les localiseurs qui ont été utilisées (à ma connaissance), et est valable pour tout localiseur de la forme $W_{\mathbf{D}}$, où $\mathbf{D}$ est un dérivateur (ou seulement un prédérivateur satisfaisant Der (4,5) `[il faut aussi Der (2) ; la numérotation des axiomes est celle du chapitre I, p. 68]`).

2. (b) concerne la *comparaison* d'une X quelconque sur S, avec la catégorie fibrée scindée $\Phi_S(X)$ sur S.

Loc (3′ bis) ⓐ (Axiome des Cat-fibrations, forme directe forte). Soient S dans Cat, X, Y deux catégories fibrées scindées sur S, $f : X \longrightarrow Y$ un S-foncteur cartésien compatible aux scindages, tel que $\forall\ s \in \mathrm{Ob}\, S$, le foncteur induit sur les fibres

$$f_s : X_s \longrightarrow Y_s$$

soit dans W. Alors $f \in W$.
ⓑ Comme Loc (3′) (b).

N.B. En fait, moyennant Loc (1, 2), les énoncés Loc (3′), Loc (3′ bis) impliquent les énoncés similaires sans scindages, et sans même supposer f cartésien dans Loc (3′ bis), *cf.* démonstration ci-dessous.

Démonstration. a) Loc (1, 2, 3) $\Longrightarrow$ Loc (1, 2_0, 3′). Il suffit de prouver Loc (3′). Prouvons Loc (3′ a). Pour ceci, sous les conditions de Loc (3′ a), prouvons que $X \longrightarrow S$ est W-coasphérique, *i.e.* que les catégories

$$s\backslash X = X \times_S s\backslash S$$

sont W-asphériques. Il en résultera bien que $f \in W$ en vertu de Loc (3) appliqué à f° et de $W = W^\circ$. Mais considérons l'inclusion canonique [page 5]

$$i_s : X_s \hookrightarrow s\backslash X,$$

il résulte du fait que $p : X \longrightarrow S$ est Cat-fibrant que ce foncteur est W-asphérique (il a même un adjoint à droite, *i.e.* les catégories X_s/u, où $u \in \mathrm{Ob}\,(s\backslash X)$, ont un objet final). Donc par Loc (3) on a $i_s \in W$, et comme X_s est W-asphérique par hypothèse, de même $s\backslash X$, q.e.d.

Prouvons Loc (3′ b) : On note que $i_X : X \longrightarrow \Phi_S(X)$ est *W-coasphérique* (il a même un adjoint à gauche), donc i_X° est W-asphérique, donc dans W, donc $i_X^\circ \in W^\circ$ car $W = W^\circ$.

a bis) Loc (1, 2, 3 bis) $\Longrightarrow$ Loc (1, 2_0, 3′ bis). Cette fois il faut prouver seulement Loc (3′ bis). Pour (b), c'est déjà fait. Reste à prouver (a). Si f est comme dans l'énoncé Loc (3′ bis a), prouvons que pour tout s dans S, le morphisme induit

$$s\backslash f : s\backslash X \longrightarrow s\backslash Y$$

est dans W. Comme $W = W^\circ$, on aura donc $(s\backslash f)^\circ \in W$, et appliquant Loc (3 bis) à f°, on trouve $f^\circ \in W$, donc $f \in W$, et on aura fini. Mais $s\backslash f$ s'insère dans le carré commutatif [page 6]

$$\begin{array}{ccc} X_s & \xrightarrow{f_s} & Y_s \\ {\scriptstyle i_s^X}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i_s^Y} \\ s\backslash X & \xrightarrow{s\backslash f} & s\backslash Y, \end{array}$$

où, on l'a vu dans (a), i_s^X et i_s^Y sont dans W. Par hypothèse on a $f_s \in W$, donc p. 4
$s\backslash f \in W$, q.e.d.

b) Loc (1, 2_0, 3′) $\Longrightarrow$ Loc (1, 2, 3). Prouvons d'abord Loc (2). Appliquant Loc (3′ a) à la projection

$$\mathbf{\Delta}^1 \times X \longrightarrow X \qquad (\text{où } X \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{Cat}),$$

qui est fibrée scindée à fibres isomorphes à $\mathbf{\Delta}^1$, donc W-asphériques par Loc (2_0), on voit que cette projection est dans W. Cela permet d'appliquer les arguments standard d'homotopie (*cf.* XII, p. 1 …) pour conclure qu'un homotopisme est dans W, donc une

catégorie contractile est W-asphérique, a fortiori une catégorie avec objet final (ou avec objet initial) est W-asphérique, *i.e.* on a Loc (2).

Prouvons Loc (3). Comme Loc (1, 2, 3) $\iff$ Loc (1, 2°, 3°), il suffit de prouver Loc (3°), vu qu'on a prouvé Loc (2°). Soit

$$f : X \longrightarrow S \qquad W\text{-}co\text{asphérique},$$

prouvons $f \in W$. Introduisons la catégorie *fibrée* sur S dont les fibres sont les $s\backslash X$, soit $\Phi_S(X)$, et considérons l'inclusion canonique

$$i_X : X \longrightarrow \Phi_S(X).$$

Par Loc ($3'$ b) elle est dans W. D'autre part, les fibres $s\backslash X$ de $\Phi_S(X)$ sont W-coasphériques par hypothèse, donc par Loc ($3'$ a) $\Phi_S(X) \longrightarrow S$ est dans W. Comme $i_X \in W$, il s'ensuit $(f : X \longrightarrow S) \in W$, q.e.d. [page 7]

b bis) Loc (1, 2_0, $3'$ bis) $\Longrightarrow$ Loc (1, 2, 3 bis). On a déjà prouvé Loc (1, 2, 3) (vu que Loc ($3'$ bis) contient Loc ($3'$) comme cas particulier). Prouvons donc Loc (3 bis) en admettant déjà tout ça. Il suffira encore de le prouver sous forme duale, puisque

$$\text{Loc (1, 2, 3 bis)} \iff \text{Loc(1, 2°, 3 bis°)},$$

et que Loc (2°) est connu par Loc (1, 2, 3) $\iff$ Loc (1, 2°, 3°). Il reste donc à prouver que si [page 8]

$$f : X \longrightarrow Y \qquad \text{dans Cat}/S$$

est telle que

$$s\backslash f : s\backslash X \longrightarrow s\backslash Y$$

est dans W pour tout $s \in \mathrm{Ob}\, S$, alors $f \in W$. Considérons alors le carré commutatif

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{i_X} & \Phi_S(X) \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \Phi_S(f)} \\ Y & \xrightarrow{i_Y} & \Phi_S(Y), \end{array}$$

où $i_X, i_Y \in W$ par Loc ($3'$ bis b). L'hypothèse sur f signifie que $\Phi_S(f)$ induit des W-équivalences sur les fibres, donc par Loc ($3'$ bis) $\Phi_S(f) \in W$, donc $f \in W$ par Loc (1), q.e.d.

p. 5

2 Axiomes Loc (4) et Loc (5) (des sommes directes, de connexité) [3]

Loc (4) (Axiome des *sommes directes*). Pour une famille $(f_i)_{i\in I}$ de flèches dans Cat, si $f = \coprod f_i$, on a $f \in W$ si et seulement si $f_i \in W$ pour tout $i \in I$.

Cet axiome se décompose en deux, en le "si" et le "seulement si", que je vais formuler sous la forme la plus économique :

Proposition 2.1. *L'axiome* Loc (4) *des sommes équivaut à la conjonction des deux axiomes suivants :*

Loc (4 a) Soit $(f_i)_{i\in I}$ une famille de flèches dans Cat, si les $f_i \in W$, alors $f = \coprod f_i \in W$. [page 9]

[3] Il s'agit ici d'axiomes qu'on peut considérer comme étant de nature plus ou moins "triviale". Dans tous les cas à ma connaissance, ils sont bel et bien trivialement vérifiés.

Loc (4 b) Soit S dans Cat, et $S_0 \hookrightarrow S$ un sommand direct (sous-catégorie à la fois ouverte et fermée). Soit X dans Cat$/S$. Si $X \longrightarrow S$ est dans W, alors $X_0 = X|S_0 \longrightarrow S_0$ aussi. (En d'autres termes, l'inclusion $S_0 \hookrightarrow S$ est une "W-fibration", *i.e.* est dans Fib$_W$.)

Corollaire 2.2. *Considérons la variante de* Loc (4 a) *obtenue en se bornant aux familles finies. (Elle équivaut à* Loc (4) *lorsque W est stable par $\varinjlim$ filtrantes,* cf. *axiome* Loc (8) *plus bas). Cette variante équivaut à*

Loc (4 a$_0$) Tout objet X de Cat est "W-cofibrant", *i.e.* $\emptyset \longrightarrow X$ est dans Cof$_W$, *i.e.* pour toute $f : Y \longrightarrow Y'$ qui est dans W, le morphisme correspondant $\mathrm{id}_X \amalg f : X \amalg Y \longrightarrow X \amalg Y'$ est dans W.

Rappel 2.3. De toutes façons, si W est un localiseur fondamental (ce que nous supposerons désormais, sauf mention du contraire), l'analogue *fini* de Loc (4 a) pour les produits est vrai, *i.e.* si on a une famille *finie* de flèches $(f_i)_{i\in I}$ dans Cat, si les f_i sont dans W, alors $f = \prod f_i \in W$. `[Pour cela, il faut supposer que` W `satisfait à l'axiome de localisation, forme` *`forte`*`, Loc 3 bis.]` L'analogue pour une famille infinie n'est vérifié pratiquement pour aucun localiseur fondamental.

`[page 10]`

Proposition 2.4. *Soit W un localiseur fondamental. Alors les produits finis existent dans* Hot$_W$*, et le foncteur* hot$_W$: Cat $\longrightarrow$ Hot$_W \overset{déf}{=}$ (Cat)W^{-1} *y commute. Si W satisfait à* Loc (4 a) (resp. Loc (4 a$_0$)), *alors les sommes quelconques* (resp. *finies*) *existent dans* Hot$_W$*, et le foncteur* hot$_W$ *y commute. De plus, dans ce cas les sommes sont distributives par rapport aux produits (vu qu'il en est ainsi dans* Cat).

La démonstration résulte simplement du résultat général :

Lemme 2.5. *Soit $(\mathcal{M}, W)$ une catégorie de modèles (W partie quelconque de* Fl$\,\mathcal{M}$). *Supposons que les produits* (resp. *les produits finis,* resp. *les produits binaires*) *existent dans $\mathcal{M}$, et que de plus pour toute famille $(f_i)_{i\in I}$ de flèches de $\mathcal{M}$* (resp. *toute famille finie,* resp. *famille binaire*) *$f_i \in W$ pour tout $i \in I$ implique $f = \prod f_i \in W$. Alors les produits* p. 6
du type envisagé existent dans Ho$_W = \mathcal{M}W^{-1}$*, et le foncteur* ho$_W : \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{M}W^{-1}$ *y commute. Enfin, si $\mathcal{M}$ admet un objet final e, alors e est aussi objet final de* Ho$_W$.

`[Il n'est pas clair que l'assertion soit vraie dans cette généralité pour les produits` *`infinis`* `; elle est vraie si` W `est la classe des équivalences faibles d'une` *`catégorie de modèles de Quillen.`*`]`

`[page 11]`

On en conclut les énoncés duaux concernant les sommes directes et les objets initiaux.

La démonstration est un cas particulier du résultat bien utile suivant, appliqué au couple de foncteurs adjoints

$$\mathcal{M} \underset{\substack{\text{produits}\\ \text{dans } \mathcal{M}\\ \text{indexés par } I}}{\overset{\text{diag}}{\underset{\longleftarrow}{\longrightarrow}}} \mathcal{M}^I \qquad :$$

Lemme 2.6 [4]. *Soient $(\mathcal{M}, W)$, $(\mathcal{M}', W')$ deux catégories de modèles, et*

$$\mathcal{M} \underset{\psi}{\overset{\varphi}{\rightleftarrows}} \mathcal{M}'$$

un couple de foncteurs adjoints compatibles aux localiseurs, i.e. *tels que*

$$\varphi(W) \subset W', \qquad \psi(W') \subset W.$$

[4] *cf.* XII, lemme page 248.

Alors les foncteurs localisés

$$\mathcal{M}W^{-1} \underset{\bar{\psi}}{\overset{\bar{\varphi}}{\rightleftarrows}} \mathcal{M}'W'^{-1}$$

sont également adjoints, les flèches d'adjonction pour $\bar{\varphi}\bar{\psi}$ et $\bar{\psi}\bar{\varphi}$ étant déduites de celles pour $\varphi\psi$ et $\psi\varphi$ par composition avec les foncteurs de localisation $\mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{M}W^{-1}$, $\mathcal{M}' \longrightarrow \mathcal{M}'W'^{-1}$.

[page 12]

Loc (5) (Axiome de *connexité* ou de *non-trivialité*).
Soit $f \in W$, alors $\pi_0(f)$ est bijectif.

Cette propriété de W est d'une utilisation constante en pratique, quand on travaille avec W au lieu de se borner à construire des W et faire joujou avec les axiomes et leur stabilité par passage à des $\underline{\mathrm{Hom}}(I, M)$ (où ici $\mathcal{M} = \mathrm{Cat}$). D'autre part, on peut aussi le regarder comme un axiome de *non-trivialité* pour Hot_W. Je rappelle à ce sujet :

Proposition 2.7. *Soit W un localiseur fondamental. Conditions équivalentes :*

a) *W satisfait l'axiome de connexité* Loc (5).

b) *Le foncteur $\pi_0 : \mathrm{Cat} \longrightarrow \mathrm{Ens}$ se factorise par un foncteur* p. 7

$$\mathrm{Cat} \dashrightarrow \mathrm{Hot}_W \xrightarrow{\pi_0} \mathrm{Ens}.$$
$$\pi_0 \searrow \quad \nearrow$$

c) *La catégorie $\mathrm{Hot}_W^* = \mathrm{Hot}_W \backslash \{\emptyset\}$ n'est pas équivalente à la catégorie ponctuelle.*

c′) *La catégorie Hot_W n'est pas équivalente à e ni à $\mathbf{\Delta}^1$.*[5]

Pour la démonstration, et pour d'autres formes équivalentes de l'axiome de connexité, je renvoie à XV 9.12 (p. 133 bis). Pour le nom "axiome de connexité", je peux offrir [page 13] l'explication suivante 2.8 et 2.9.

Corollaire 2.8. *Si l'axiome de connexité* Loc (5) *est satisfait, alors les objets W-asphériques sont* 0*-connexes* (*tautologie*), *et la réciproque est vraie si W est fortement saturé.* (*Ou aussi, si W satisfait l'axiome des fibrations* Loc (7) *ci-dessous, puisque par* XII, th. 2, p. 20, *dans ce cas,* Loc (5) *équivaut à $W \neq \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ …*).

Car si l'axiome de connexité n'est pas satisfait, alors pour toute X non vide dans Cat, $X \longrightarrow e$ est un isomorphisme, donc (W étant fortement saturé) $X \longrightarrow e$ est dans W, *i.e.* X est W-asphérique, donc il y a des objets W-asphériques non 0-connexe. Notons aussi :

Corollaire 2.9. *Supposons que W satisfait à l'axiome* Loc (4) *des sommes directes* (*ou seulement à* Loc (4 b)). *Pour que W satisfasse l'axiome de connexité, il faut et il suffit que pour toute flèche $f : X \longrightarrow Y$ avec Y 0-connexe, si f est dans W, alors X est* 0*-connexe.* (*C'est nécessaire bien sûr sans supposer* Loc (4 b) *ni rien du tout.*)

[page 14]

[Les numéros 2.7, 2.8 et 2.9 apparaissent deux fois.]

2.7. Considérons maintenant le foncteur composé

$$\mathrm{Ens} \xrightarrow{I \longmapsto I_{\mathrm{Cat}}} \mathrm{Cat} \xrightarrow{\mathrm{hot}_W} \mathrm{Hot}_W, \qquad I \longmapsto I_{\mathrm{Hot}_W} \text{ ou } I_W, \tag{2.7.1}$$

[5] **NB** Si W est fortement saturée (condition Loc (1 ter), alors les conditions ci-contre (*i.e.* Loc (5)) équivalent à ceci :

d) *W n'est égal ni à Fl*(Cat) *tout entier, ni à Fl*(Cat^*) $\cup \{\mathrm{id}_\emptyset\}$ (i.e. *Fl*(Cat)$\backslash W$ *n'est ni vide, ni égal à l'ensemble des flèches $\emptyset \longrightarrow X$ avec $X \neq \emptyset$*).

Si W satisfait Loc (7 D_{W_ω}), alors W satisfait Loc (5) si et seulement si $W \neq \mathrm{Fl}(\mathrm{Cat})$ (*cf.* XII, th. 2, p. 20).

où le premier foncteur est celui qui associe à l'ensemble I la catégorie discrète I_{Cat} ayant I comme ensemble d'objets. (Le plus souvent, on identifiera I_{Cat} avec I dans les notations, tout comme pour un ensemble ordonné J, on identifie J et la "catégorie ordonné" définie par J. Ici I peut être considéré comme muni de l'ordre discret.) On a d'ailleurs

$$I_{\mathrm{Cat}} \simeq I \times e \quad (\overset{\text{déf}}{=} \text{somme de } I \text{ copies de } e), \tag{2.7.2}$$

donc quand Loc (4 a) est satisfait, donc hot_W commute aux sommes directes, on aura un isomorphisme canonique

$$I_W \simeq I \times e_W \quad \begin{array}{l}(\text{où } e_W \text{ est l'objet final de } \mathrm{Hot}_W,\\ \textit{i.e. } e \text{ considéré comme objet de } \mathrm{Hot}_W).\end{array} \tag{2.7.3}$$

Proposition 2.8. *Supposons l'axiome de connexité* Loc (5) *satisfait, d'où un foncteur* p. 8

$$\pi_0 : \mathrm{Hot}_W \longrightarrow \mathrm{Ens}. \tag{2.8.1}$$

Ce foncteur est adjoint à gauche *du foncteur* $I \longmapsto I_W$ (2.7.1), i.e. *on a une bijection fonctorielle en* (X, I) *dans* $\mathrm{Hot}_W \times \mathrm{Ens}$: [page 15]

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Ens}}(\pi_0(X), I) \simeq \mathrm{Hom}_W(X, I_W). \tag{2.8.2}$$

Le foncteur π_0 *est également* adjoint à droite *du* même *foncteur* $I \longmapsto I_W$, i.e. *on a un bijection fonctorielle*

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Ens}}(I, \pi_0(X)) \simeq \mathrm{Hom}_W(I_W, X). \tag{2.8.3}$$

Prenant $I = e$ (ensemble ponctuel), on trouve le :

Corollaire 2.9. *On a l'isomorphisme fonctoriel en* X *dans* Hot_W

$$\boxed{\mathrm{Hom}_W(e_W, X) \simeq \pi_0(X).} \tag{2.8.4}$$

Commentaire 2.10. La formule d'adjonction (2.8.2) est d'ailleurs familière, chaque fois qu'on a une catégorie $\mathcal{H}$ (telle Cat, où Hot_W *etc.*) munie d'un foncteur π_0, $\pi_0(X)$ correspondant à l'intuition d'une décomposition d'un objet en "composantes connexes". (Je ne vais pas expliciter ici les conditions générales sous lesquelles on définit un tel foncteur.) Par contre, l'adjonction en sens inverse de ces deux mêmes foncteurs est un phénomène tout à fait spécial à des catégories du type Hot_W. Si on tient compte de la [page 16] description de I_W comme $I \times e_W$, la formule d'adjonction inhabituelle (2.8.3) équivaut, bien sûr, à la formule (2.8.4) - elle s'en déduit en "élevant à la puissance I". On peut renverser la vapeur, et dans une catégorie générale $\mathcal{H}$, *définir* un foncteur $\pi_0 : \mathcal{H} \longrightarrow \mathrm{Ens}$ par le formule (2.8.4),

$$\pi_0(X) \overset{\text{déf}}{=} \mathrm{Hom}(e_{\mathcal{H}}, X) \qquad (= \Gamma_{\mathcal{H}}(X), \text{ avec une notation familière}),$$

où $e_{\mathcal{H}}$ est un objet final de $\mathcal{H}$. On aura donc, en posant $I_{\mathcal{H}} = I \times e_{\mathcal{H}}$, la formule

$$\mathrm{Hom}(I_{\mathcal{H}}, X) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(I, \pi_0(X))$$

(*i.e.* la formule (2.8.3)), disant que l'on a un couple $(I_{\mathcal{H}}, \pi_0)$ de foncteurs adjoints. Supposons d'autre part que pour tout ensemble I, l'application canonique d'adjonction

$$I \longrightarrow \pi_0(I_{\mathcal{H}}) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{H}}(e_{\mathcal{H}}, e_{\mathcal{H}} \times I)$$

p. 9

soit *bijective*[6], *i.e.* que $I \longmapsto I_{\mathcal{H}}$ soit *pleinement fidèle.* On définit alors, pour tout I, une application canonique

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(X, I_{\mathcal{H}}) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(\pi_0(X), I) \\ & {\scriptstyle \pi_0^{X,I_{\mathcal{H}}}} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle \sim} & \\ & \mathrm{Hom}(\pi_0(X), \pi_0(I_{\mathcal{H}})). & \end{array}$$

La "bi-adjonction" des foncteurs π_0 et $I \longmapsto I_{\mathcal{H}}$ revient à dire que cette flèche est bijective, ou encore, que la flèche $\pi_0^{X,I_{\mathcal{H}}}$: [17]

$$\mathrm{Hom}(X, I_{\mathcal{H}}) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\Gamma_{\mathcal{H}}(X), \Gamma_{\mathcal{H}}(I_{\mathcal{H}}) \simeq I)$$

soit bijective.

Corollaire 2.11. *Le foncteur $I \longmapsto I_W$ de* Ens *dans* Hot_W *est pleinement fidèle,* i.e. *l'homomorphisme d'adjonction*

$$\pi_0(I_W) \longrightarrow I$$

est bijectif. (*Où encore, π_0 est un foncteur le localisation.*)

En effet, cette bijectivité est évidente quand on travaille dans Cat, et s'en déduit aussitôt dans Hot_W.

Démonstration de 2.8. La formule d'adjonction (2.8.2) résulte de la formule correspondante pour Cat, évidente, et du lemme 2.6 sur les foncteurs adjoints entre catégories de modèles. L'adjonction dans l'autre sens se réduit à la formule (2.8.4). On a des flèches canoniques

$$\mathrm{Hom}_W(e_W, X) \underset{\beta}{\overset{\alpha}{\rightleftarrows}} \pi_0(X),$$

où α est $\pi_0^{e_W,X}$, compte tenu que $\pi_0(e_W) = \pi_0(e_{\mathrm{Cat}}) = e_{\mathrm{Ens}}$, et $\mathrm{Hom}(e_{\mathrm{Ens}}, \pi_0(X)) \simeq \pi_0(X)$. La flèche β est la flèche composée

$$\mathrm{Ob}\, X \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathrm{Cat}}(e_{\mathrm{Cat}}, X) \xrightarrow{\mathrm{hot}_W} \mathrm{Hom}_W(e_W, X)$$

en notant que cette flèche passe au quotient en $\pi_0(X) \longrightarrow \mathrm{Hom}_W(e_W, X)$, vu que deux applications homotopes de e_{Cat} dans X sont égales dans Hot_W. Je dis que [18]

$$\beta\alpha = \mathrm{id}\ , \qquad \alpha\beta = \mathrm{id}\ .$$

La relation $\alpha\beta = \mathrm{id}$ revient à dire que la flèche $i_x : e_{\mathrm{Cat}} \longrightarrow X$ définie par $x \in \mathrm{Ob}\, X$, donne $\pi_0(i_x) : e_{\mathrm{Ens}} \longrightarrow \pi_0(X)$ dont la valeur est la classe de x dans $\pi_0(X)$, c'est tautologique. Pour prouver que $\beta\alpha = \mathrm{id}$, il suffit alors de prouver que β est surjective, *i.e.* le

Corollaire 2.12. *Pour tout X dans* Cat, *l'application*

$$\underbrace{\mathrm{Hom}_{\mathrm{Cat}}(e_{\mathrm{Cat}}, X)}_{\simeq \mathrm{Ob}\, X} \longrightarrow \mathrm{Hom}_W(e_W, X)$$

est surjective (*moyennant l'axiome de connexité* Loc (5)).

Démonstration de 2.12. Si $X = \emptyset$, l'assertion revient à dire que $\mathrm{Hom}_W(e_W, \emptyset) = \emptyset$, mais plus généralement, on a le p. 10

Corollaire 2.13. (Moyennant Loc (5).) *Soit X non vide dans* Cat, *alors* $\mathrm{Hom}_W(X, \emptyset) = \emptyset$. (*Donc $\emptyset$ est un objet initial* strict *de* Hot_W.)

En effet, si on avait $X \longrightarrow \emptyset$ dans Hot_W, `[il y a un décalage dans la`

[6] ça a tendance à être ultrafaux si $\mathcal{H}$ est additive. Par contre, vrai si $\mathcal{H}$ est une catégorie à sommes distributives par rapport aux produits (voire universelles), dont l'objet final est *connexe* … `[page 13']`


numérotation] on en déduirait $\pi_0(X) \longrightarrow \emptyset$, ou $\pi_0(X) = \emptyset$, absurde !

Reste le cas où X est non vide. Cela résulte du fait général :

Lemme 2.14. *Soit $\mathcal{M}$ une catégorie ayant un objet initial* strict (*si* $\mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(X, \emptyset_{\mathcal{M}}) \neq \emptyset$, *on a* $X = \emptyset_{\mathcal{M}}$), *un objet final e, et telle que pour tout $X \neq \emptyset_{\mathcal{M}}$, $X \longrightarrow e$ ait une section,* i.e. $\mathrm{Hom}(e, X) \neq \emptyset$. *Soit $W \subset \mathrm{Fl}\,\mathcal{M}$*

1°) *ne contenant pas de flèches $\emptyset_{\mathcal{M}} \longrightarrow X$ avec $X \neq \emptyset_{\mathcal{M}}$, et*

2°) *tel que pour tout diagramme* $X_1 \xleftarrow{u_2} X_2$ *avec* $u_2 \in W$ $\exists$ s dans $\mathcal{M}$ *tel que*



$u_2 s = u_1$
dans $\mathcal{M}W^{-1}$.

Alors

a) $\emptyset_{\mathcal{M}}$ *est un objet initial* strict *de* $\mathcal{M}W^{-1}$.

b) *Pour tout* $X \neq \emptyset_{\mathcal{M}}$, $\mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(e, X) \longrightarrow \mathrm{Hom}_W(e, X)$ *est surjectif.*

Démonstration. Que $\emptyset_{\mathcal{M}}$ soit objet initial de $\mathcal{M}W^{-1}$ a été vu (dernière assertion du lemme 2.5, forme duale), prouvons qu'il est strict, *i.e.* que si $\mathrm{Hom}_W(X, \emptyset_{\mathcal{M}}) \neq \emptyset$, on a $X = \emptyset_{\mathcal{M}}$. En effet, si on avait $u : X \longrightarrow \emptyset_{\mathcal{M}}$ dans $\mathcal{M}W^{-1}$, u serait représenté par

$$X = X_0 \xleftarrow{W} X_1 \longrightarrow X_2 \xleftarrow{W} \cdots X_{2n-2} \longrightarrow X_{2n-1} \xleftarrow{W} X_{2n} = \emptyset_{\mathcal{M}}.$$

On procède par récurrence sur la demi-longueur de cette chaîne pour voir que $X = \emptyset_{\mathcal{M}}$. En effet, l'hypothèse sur W implique que $X_{2n-1} = \emptyset_{\mathcal{M}}$, puis celle que $\emptyset_{\mathcal{M}}$ est strict implique $X_{2n-1} = \emptyset_{\mathcal{M}}$, d'où la conclusion.

Prouvons la surjectivité de $\mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(e, X) \longrightarrow \mathrm{Hom}_W(e, X)$ pour $X \neq \emptyset_{\mathcal{M}}$, en mon- [page 14']
trant que tout chemin réduit de longueur 2n+1 est "homotope" à un chemin réduit de longueur $2n - 1$:

$$e = X_0 \longrightarrow X_1 \xleftarrow{W} X_2 \longrightarrow X_3 \longleftarrow \cdots \longleftarrow X_{2n} \longrightarrow X_{2n+1} = X.$$

En effet, on peut remplacer la section

$$e = X_0 \xrightarrow[u_1]{} X_1 \xleftarrow[u_2]{W} X_2 \xrightarrow[u_3]{} X_3 \xleftarrow{W} X_4$$

(s : $X_0 \longrightarrow X_2$)

par


$$e \xrightarrow[u_3 s]{} X_3 \xleftarrow{W} \cdots, \qquad \text{p. 11}$$

où s est une section de X_2 sur e telle que

$$u_2 s = u_1 \qquad \textit{dans} \qquad \mathcal{M}W^{-1}\ .$$

Cela prouve donc par récurrence sur n que le chemin est homotope à un chemin de longueur 1, $e \longrightarrow X$, q.e.d.

Il faut donc, dans le cas actuel, vérifier 1°) (c'est essentiellement le corollaire 2.12.), et 2°)



.

Mais comme $u_2 \in W$, on a $\pi_0(u_2)$ isomorphisme, donc surjectif, donc $\exists$ s tel que $u_2 s$ soit [page 15']

homotope à u_1 dans Cat, ce qui implique $u_2 s = u_1$ dans Hot_W, q.e.d.

Commentaire final. L'axiome de connexité Loc (5) diffère de tous les autres axiomes Loc (1) à Loc (8) (mais à l'exception de Loc (8 bis) d'accessibilité) par le fait que ce n'est pas un axiome de stabilité. Les autres axiomes Loc (1) à Loc (8) (et aussi Loc (8 bis) d'accessibilité et même les axiomes ultérieures d'exactitude [7]) sont satisfaits si $W = \mathrm{Fl}\,\mathcal{M}$ - l'axiome de connexité est donc le seul qui s'oppose à la *trivialité* de la théorie homotopique définie par W. C'est dire qu'il ne peut être conséquence de l'un des autres. Par contre, l'axiome Loc (4) des sommes directes n'est pas indépendant des autres. Signalons à ce propos (rappel) :


Loc (4 a_0)	est conséquence de l'axiome Loc (6 a) du carré cocartésien (forme directe).
Loc (4 a)	est conséquence de Loc (6 a) précédent + l'axiome des limites inductives filtrantes Loc (8).
Loc (4 b)	est conséquence de l'axiome Loc (7) des fibrations. Donc
Loc (4)	est conséquence de Loc (6 a, 7, 8).

p. 12
[page 16']

3 Axiome Loc (6) du carré cocartésien (ou de "Mayer-Vietoris", ou des W-cofibrations) [8]

Je vois plusieurs variantes, et n'ai pas encore l'esprit totalement net sur les implications mutuelles. Je commence par la variante plus compliquée, mais dont on aura besoin en tous cas :

Loc 6 (Axiome des W-cofibrations, ou lemme des 5, ou axiome des homomorphismes de carrés cocartésiens). Considérons dans Cat un diagramme commutatif cubique



homomorphisme $f = (f_0, f_1, f_2, f_3)$ d'un diagramme carré X dans un autre Y. On suppose que X provient d'un objet X_3 de Cat de deux ouverts X_1, X_2 de X_3 *recouvrant* X_3, et de leur intersection $X_0 = X_1 \cap X_2$, et de même pour Y. (Appelons ces diagrammes dans Cat des diagrammes MV ("*ouverts*") - "*Mayer-Vietoris*".) On a alors ce qui suit [9] :

[7] il n'y en aura en fait pas besoin, grâce à la providentielle théorie de K. S. Brown !

[8] C'est le nom "*axiome des W-cofibrations*" qui m'apparaît à présent comme le meilleur, – c'est ce nom qui me paraît le mieux saisir la signification conceptuelle et non technique de l'axiome.

[9] Il est bon d'introduire des propriétés du diagramme

1°) $f_0 \in W$.

2°) f_1 et f_2 dans W.

3°) f_3 dans W.

et de formuler les parties a) b) c) de Loc (6) ainsi

a) $1° + 2° \Longrightarrow 3°$.

b) $2° + 3° \Longrightarrow 1°$.

c) $1° + 3° \Longrightarrow 2°$.

a) $f_0, f_1, f_2 \in W \Longrightarrow f_3 \in W$ [10].

b) $f_1, f_2, f_3 \in W \Longrightarrow f_0 \in W$.

c) $f_0, f_3 \in W \Longrightarrow f_1, f_2 \in W$ [11].

[12].

[13].

p. 13

[page 17']

N.B. Je distingue ces conditions comme Loc (6 a), Loc (6 b), Loc (6 c). Je présume qu'on n'aura jamais à faire usage à Loc (6 b), sans supposer également Loc (6 a), mais l'inverse n'est sûrement pas le cas. Ainsi, $W_0 = \{f \in \mathrm{Fl}\,\mathrm{Cat} \mid \pi_0(f) \text{ bijectif}\}$ satisfait a), mais non b). Je présume (sans avoir vérifié) que c'est pareil pour les W_n, $n \in \mathbf{N}$, de la "*n-équivalence homotopique*".

Il se pourrait que Loc (6 a) et Loc (6 a, b) soient équivalentes à la forme plus faible, et plus simple, suivante. (Si oui, c'est sous la forme la plus simple, bien sûr, qu'il convient de les énoncer.)

Loc 6′ (Axiome des carrés cocartésiens, ou de Mayer-Vietoris). Soit

$$\begin{array}{ccc} X_0 & \xrightarrow{i_2} & X_2 \\ {\scriptstyle i_1}\searrow & & \searrow{\scriptstyle j_1} \\ & X_1 & \xrightarrow{j_2} X_3 \end{array}$$

un diagramme MV dans Cat. Alors

a) Si $i_1 \in W$, $j_1 \in W$.

b) Si $j_1 \in W$, $i_1 \in W$.

[page 18']

Proposition 3.1.

$$\begin{array}{lcl} \text{Loc (6 a)} & \Longrightarrow & \text{Loc (6′ a)}, \\ \text{Loc (6 b)} & \Longrightarrow & \text{Loc (6′ b)}, \\ \text{Loc (6 c)} & \Longrightarrow & \text{Loc (6′ a, b)}\ [14]. \end{array}$$

Ça se voit sur le diagramme cubique

(Q)

$$\begin{array}{ccccc} X_0 & \xrightarrow{i_2} & X_2 & & \\ {\scriptstyle i_1}\searrow & & \uparrow{\scriptstyle j_2} & \searrow{\scriptstyle j_1} & \\ {\scriptstyle f_0=\mathrm{id}}\uparrow & X_1 & \xrightarrow{j_2} & X_3 & \\ & {\scriptstyle f_1=i_1}\uparrow & & \downarrow{\scriptstyle f_2=\mathrm{id}} & \uparrow{\scriptstyle f_3=j_1} \\ X_0 & \xrightarrow[\mathrm{id}]{} & X_2 & \searrow{\scriptstyle \mathrm{id}} & \\ {\scriptstyle \mathrm{id}}\searrow & & & & \\ & X_0 & \xrightarrow{i_2} & X_2, & \end{array}$$

où les f_0, f_1, f_2, f_3 de l'énoncé de Loc (6) deviennent id_{X_0}, i_1, id_{X_2}, j_1. Loc (6 a) donne donc $i_1 \in W \Longrightarrow j_1 \in W$, *i.e.* Loc (6′ a), et Loc (6 c) $j_1 \in W \Longrightarrow i_1 \in W$, *i.e.* Loc (6′ b). Pour Loc (6 b) $\Longrightarrow$ Loc (6′ b), on utilise (*cf.* XII, p. 78) le cube

p. 14

[10] N.B. il semble que dans Loc (6 a), il suffit de l'énoncé en supposant f_0, f_2 des *isomorphismes, cf.* p. 22.

[11] Il ne faudrait pas inclure c dans Loc 6 *cf.* p. 26.

[12] N.B. On verra plus bas (3.3) que Loc 6 c implique déjà Loc (6 a, b), *i.e.* Loc (6) tout entier. Et si W satisfait Loc (1 bis), *i.e.* stable par facteurs directs, alors Loc (6 a, b) $\Longrightarrow$ Loc (6 c).

[13] Je vais désigner par Loc (6) l'axiome Loc (6 a, b), sans y inclure c.

[14] N.B. on a même Loc (6 c) $\Longrightarrow \underbrace{\text{Loc 6 (a, b)}}_{\text{Loc (6)}}$.

$$\begin{array}{ccccc}
X_0 & \xrightarrow{i_2} & X_2 & & \\
\downarrow{\scriptstyle i_1} & \searrow^{i_1} & \downarrow{\scriptstyle j_1} & \searrow^{j_1} & \\
X_1 & & \xrightarrow{j_2} & & X_3 \\
\downarrow{\scriptstyle i_1} & & \downarrow & & \\
X_1 & \xrightarrow{\mathrm{id}} & X_1 & \xrightarrow{j_2} & X_3 \\
 & \searrow^{\mathrm{id}} & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} \\
 & & X_1 & \xrightarrow[j_2]{\mathrm{id}} & X_3,
\end{array} \tag{Q$'$}$$

où $f_0 = i_1$, $f_1 = \mathrm{id}_{X_1}$, $f_1 = j_1$, $f_3 = \mathrm{id}_{X_3}$, donc

$$j_1 \in W \Longrightarrow i_1 \in W, \quad \textit{i.e.}\ \mathrm{Loc}\ (6\ \mathrm{b}) \Longrightarrow \mathrm{Loc}\ (6'\ \mathrm{b}),$$

et si on a Loc (6 c), on voit que $i_1 \in W \Longrightarrow j_1 \in W$, *i.e.* Loc (6′ a).

Commentaire 3.2. Loc (6 a) m'apparaît comme le "minimum vital" pour établir l'existence d'une théorie des cofibres W-homotopique dans Cat. Pour cela, il faut en effet disposer d'un critère serviable assurant qu'une flèche $i : A \longrightarrow B$ dans Cat est dans Cof_W.

On trouve, quand on dispose de Loc (6 a) (sous forme duale, *i.e.* pour les *fermés,* c'est kif-kif), que les *immersions ouvertes de Dwyer* sont dans Cof_W, ce qui suffit pour avoir *une bonne théorie des cofibres W-homotopiques, dans laquelle les carrés MV sont W-cocartésiens* (chose a laquelle on tient absolument). [page 19]

Quant à Loc (6 b), si je dispose à la place de Loc (6′ b) + Loc (6 a), je dois m'en tirer pour prouver Loc (6). Dans XII Appendice (pages 265 ff.) je prouve, paraît-il, que (avec les notations actuelles) Loc (6′) implique Loc (6), et même Loc (6 c) si W est stable par facteurs directs (condition Loc (1 bis)). Mais la démonstration est incomplète, puisque j'admets tacitement que les immersions de Dwyer sont dans Cof_W, chose que je n'avais établie que moyennant l'axiome W (7), en fait moyennant Loc (6 a) (ce qui est une partie de W (7)).

Mais ici me vient l'idée du lemme de K. S. Brown, cité par Baues, que je vais redonner ici : [page 20]

Lemme 3.2.1. (K. S. Brown) *Soit $(\mathcal{M}, W)$ un localiseur (W modérément saturé), muni d'un ensemble $C \subset \mathrm{Fl}\,\mathcal{M}$ satisfaisant les conditions :*

1) *C stable par composition et par cochangement de base* (N.B. *on n'a à supposer l'existence des sommes amalgamées* $\begin{array}{ccc} X_0 & \xrightarrow{i_1} & X_1 \\ {\scriptstyle i_2}\downarrow & & \downarrow \\ X_2 & \longrightarrow & X_3 \end{array}$ *que si $i_1 \in C$*), *contient les isomorphismes.*
2) *$\mathcal{M}$ contient un objet initial, $\emptyset_{\mathcal{M}}$, et pour tout objet X de $\mathcal{M}$, $\emptyset_{\mathcal{M}} \longrightarrow X$ est dans C.* (N.B. (1) *et* (2) *impliquent que $\mathcal{M}$ est stable par sommes finies.*)
3) *Toute flèche f de $\mathcal{M}$ se factorise en pi, avec $i \in C$, $p \in W$.*
4) *$C \cap W$ est stable par cochangement de base,* i.e. *si*

$$\begin{array}{ccc} X_0 & \xrightarrow{i_1} & X_1 \\ {\scriptstyle i_2}\downarrow & & \downarrow \\ X_2 & \xrightarrow[j_1]{} & X_3 \end{array} \tag{$*$}$$

est cocartésien et $i_1 \in C \cap W$, alors $j_1 \in C \cap W$. (N.B. *$j_1 \in C$ est déjà contenu dans* (1), *il reste à exiger $j_1 \in W$.*) p. 15

Sous ces conditions, on a $C \subset \mathrm{Cof}_W$.

On peut aussi énoncer le lemme ainsi [page 21]

Corollaire 3.2.2. *Supposons que C satisfait* (1), (2), (3). *Alors les conditions suivantes sur C sont équivalentes.*

a) *Condition* (4) *ci-dessus,* i.e. *stabilité de $C \cap W$ par cochangement de base.*

a′) $C \cap W \subset W^{\mathrm{univ}}$.

b) $C \subset \mathrm{Cof}_W$.

b′) *Pour tout carré cocartésien*

$$\begin{array}{ccc} X_0 & \xrightarrow{\ i\ } & X_1 \\ {\scriptstyle p}\searrow & \textit{coc.} & \searrow{\scriptstyle q} \\ & X_0' & \xrightarrow{\ j\ } X_1' \end{array}$$

avec $i \in C$, $p \in W$, on a $q \in W$.

Démonstration. On a

$$\begin{aligned} \mathrm{b} &\iff \mathrm{b}' \\ \mathrm{a} &\iff \mathrm{a}' \end{aligned}$$

car C est stable par cochangement de base. On a $\mathrm{b} \Longrightarrow \mathrm{a}'$ car $\mathrm{Cof}_W \cap W = W^{\mathrm{univ}}$ grâce à l'hypothèse 3°). On a $\mathrm{a} \Longrightarrow \mathrm{b}'$ par le lemme de Brown.

On va appliquer ceci au cas $\mathcal{M} = \mathrm{Cat}$, $C =$ immersions ouvertes de Dwyer. Les conditions 1), 2) ne dépendent pas de W, elles sont vérifiées, et 3) aussi dès que W est un localiseur fondamental. Quant à 4), c'est une conséquence de l'ancien W (7 bis), *i.e.* Loc (6′) (on a besoin apparemment de Loc (6′ a *et* b).) On en conclut $C \subset \mathrm{Cof}_W$ - c'est merveilleux ! (Mais je ne sais pas prouver le lemme …) [page 22]

Cela légitime la démonstration faite dans XII *loc. cit.*, et on trouve la

Proposition 3.3. *La condition* Loc (6′) (*axiome du carré cocartésien, forme forte* (a) *et* (b)) équivaut *à* Loc (6 a, b) (*axiome des homomorphismes des carrés cocartésiens*) *et est* impliqué *par* Loc (6 c). *Si W satisfait à* Loc (1 bis), i.e. *est stable par facteurs directs, alors* Loc (6′) équivaut *à* Loc (6 c) *et à* Loc (6 a b c).

Commentaire 3.4. Ainsi, on trouve une théorie des cofibres W-homotopiques *soit* sous l'hypothèse Loc (6′) (équivalente à Loc (6) plus compliquée), soit sous l'hypothèse plus faible (et plus compliquée) Loc (6 a).

Dans le premier cas, c'est une théorie de nature très particulière, puisque les carrés W-cocartésiens sont "réversibles" (*i.e.* on a non seulement $i_1 \in W \Longrightarrow j_1 \in W$, mais aussi l'implication inverse).

Il reste donc la question si Loc (6′ a) suffit pour une théorie des cofibres W-homotopiques, ou ce qui revient sûrement au même, si ça implique déjà Loc (6 a) (donc lui est équivalent). C'est entièrement suspendu à la *question* :

l'axiome Loc (6′ a) (axiome du carré cocartésien, forme directe) implique-t-il que l'ensemble des immersions ouvertes de Dwyer qui sont dans W (immersions de Dwyer W-triviales) est stable par cochangement de base ? En fait, on voit qu'il suffirait pour cela de vérifier l'axiome du cube (ou des homomorphismes de carrés cocartésiens), forme directe Loc (6 a), dans le cas où f_0 et f_2 sont des identités, donc à prouver qu'alors $f_1 \in W \Longrightarrow f_3 \in W$ (ce qui donnerait directement $\mathrm{Dw} \subset \mathrm{Cof}_W$). Mais je ne vois aucun moyen de le prouver … p. 16 [page 23] ? ‖

Supposons maintenant que la condition Loc (6 a) est vérifiée, donc qu'on dispose d'une "bonne théorie des cofibres W-homotopiques", donc aussi d'une théorie des carrés W-cocartésiens (*cf.* XII, p. 258-262). Il y a deux questions qui se posent, concernant la validité, avec ces hypothèses plus faibles, des développements de XII :

1°) Soit un carré commutatif

$$\begin{array}{ccc} X_0 & \longrightarrow & X_2 \\ & \searrow & \downarrow \\ & X_1 & \longrightarrow X_3 \end{array}$$

dans Cat, est-il vrai que ce carré est W-cocartésien si et seulement si la flèche

$$\text{canonique } \int \begin{array}{c} X_1 \\ \nearrow \\ X_0 \\ \searrow \\ X_2 \end{array} \longrightarrow X_3 \text{ est dans } W\,?\ ^{(15)}$$

2°) Est-il encore vrai que si A est dans Cat, et $u : F \hookrightarrow G$ un homomorphisme dans $A^\wedge$, alors $u \in \mathrm{Cof}_{W_A}$, et si $u \in W$, $u \in W_A^{\mathrm{univ}}$, donc a-t-on [page 24]

$$\mathrm{Mono}_{A^\wedge} \subset \mathrm{Cof}_{W_A}, \qquad \mathrm{Mono}_{A^\wedge} \cap W_A \subset W_A^{\mathrm{univ}}\,?\ ^{(16)}$$

Mais 1°) est prouvé dans XII, prop. 20, p. 262 - je viens de vérifier que la démonstration est valable dans les hypothèses actuelles [(17)], pourvu que je vérifie que le corollaire 3, p. 149 dans XII est valable, *i.e.*

1° bis) Si $\begin{array}{ccc} X_0 & \longrightarrow & X_1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_2 & \longrightarrow & X \end{array}$ est un carré MV dans Cat, alors $\int \begin{array}{c} X_1 \\ \nearrow \\ X_0 \\ \searrow \\ X_2 \end{array} \longrightarrow X$ est dans W (donc, moyennant 1°), le carré est W-cocartésien).

Pour le vérifier, je suis amené à vérifier que le théorème 4 dans loc. cit. (p. 146) est encore valable. p. 17

Je viens de le faire, et ai annoté en conséquence le théorème 4 et ses corollaires (certains résultats (cor. 4 et cor. 5) utilisant W (7 bis) dans toute sa force, *i.e.* Loc (6′), *i.e.* Loc (6 a *et* b). Mais le corollaire 3 du théorème 4 est O.K.

Je viens aussi de vérifier la validité de 2°), en vérifiant la démonstration du corollaire du théorème 5 (XII, p. 168) et en l'annotant en conséquence.

3.5. Résumons : on a [page 25]

$$\text{Loc (6 c)} \implies \text{Loc (6)} \iff \text{Loc (6}') \tag{3.5.1}$$

et

$$\text{Si } W = W^{\natural}, \text{ on a Loc (6 c)} \iff \text{Loc (6)} \iff \text{Loc (6}'). \tag{3.5.2}$$

---

[15] Mieux, dans tous les cas, quand on a un diagramme $\begin{array}{c} X_1 \\ \nearrow \\ X_0 \\ \searrow \\ X_2 \end{array}$, son intégrale $\int$ est une somme amalgamée W-homotopique dudit diagramme (moyennant Loc (6 a) sans plus, et même seulement Loc (6′ a)).

[16] N.B. Loc (6′ a) suffit au lieu de (Loc (6 a)).

[17] Mais elle utilise de plus Loc (3 bis). Mais avec une autre démonstration plus simple que je viens de rajouter (p 264), on peut s'en passer (et on obtient une vison plus complète de la situation).

D'autre part

$$\text{Loc (6 a)} \implies \text{Loc (6' a)}\,, \tag{3.5.3}$$

et j'ignore si l'implication inverse

$$\text{Loc (6' a)} \overset{?}{\implies} \text{Loc (6 a)}$$

est valable [18]. Pour établir Loc (6 a), il suffit de le faire en tous cas quand f_0 et f_2 sont des isomorphismes.

L'axiome Loc (6 a) semble le "minimum vital" pour que W donne lieu à une "bonne théorie des cofibres W-homotopiques", donc aussi des carrés W-cocartésiens. De façon plus précise, j'ai envie de prouver ceci :

Proposition 3.6. *L'axiome* Loc (6 a) *équivaut à la conjonction des deux propriétés suivantes.*

p. 18

Loc (6 A) Cat a "assez de W-cofibrations", *i.e.* toute flèche f de Cat se factorise en $f = pi$, avec $i \in \mathrm{Cof}_W$ et $p \in W$. (Cela signifie aussi que Cat muni de (W, Cof_W) est une catégorie à cofibrations de K. S. Brown - Anderson, et tous les résultats de la théorie de Brown-Quillen sont applicables. En particulier, on a une bonne théorie des carrés W-cocartésiens.) [page 26]

Loc (6 B) Si X dans Cat est réunion de deux ouverts U, V, d'intersection S, alors le carré

$$\begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ V & \longrightarrow & X \end{array}$$

est W-cocartésien [19].

D'autre part, la condition Loc (6 A) peut être remplacée par la condition (en apparence plus faible)

Loc (6 A') Tout morphisme de Dwyer est dans Cof_W.

Corollaire 3.7. *La condition* Loc (6), i.e. Loc (6 a, b) (*ou encore la condition équivalente* Loc (6')) *équivaut à la conjonction des conditions* Loc (6 A) (*ou* Loc (6 A')) *et* Loc (6 B) *ci-dessus*), *et de la condition*

Loc (6 C) Pour tout carré W-cocartésien

$$\begin{array}{ccc} X_0 & \xrightarrow{i} & X_1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_2 & \xrightarrow{j} & X \end{array}$$

dans Cat, $j \in W \implies i \in W$.

D'autre part, je soupçonne que Loc (6 c) n'est guère vérifiée que si $W = W^\natural$ (cas qui est le plus commun bien sûr), auquel cas Loc (6 c) *équivaut* à Loc (6). Il n'y a sans doute pas lieu de l'inclure dans Loc (6), pas plus que $W = W^\natural$ dans Loc (1). [page 27]

p. 19

[18] C'est le cas en présence de Loc (8, 9).

[19] En fait, Loc (6 B) est conséquence de Loc (6 A), laquelle donc est *équivalente* à Loc (6 a). (*Cf.* esquisse de démonstration dans 4.4.15, pages 66-68.)

4 Axiome Loc (7) des W-fibrations

4.1. Rappelons la notion de *W-fibration faible* (XII p. 51, 52) : la version la plus forte des 8 conditions équivalentes pour que $f : X \longrightarrow S$ soit une fibration faible est celle-ci.

(Ff) $\forall\, S'' \longrightarrow S'$ dans Cat/S, avec S', S'' *contractiles,* le morphisme correspondant $X'' = X \times_S S'' \longrightarrow X' = X \times_S S'$ est dans W.

Quand W est fortement saturé, alors ceci implique la condition, en apparence plus forte :

(Ff′) $\forall\, S'' \longrightarrow S'$ dans Cat/S, telle que $S'' \longrightarrow S'$ soit un homotopisme, $X'' \longrightarrow X'$ est dans W.

Je désigne par Fibf_W l'ensemble des fibrations faibles. Je résume dans un diagramme d'inclusions les principales classes de flèches dans Cat que nous avons rencontrées, s'apparentant à des classes de "fibrations" (pour W, dans un sens convenable) :

[page 28]

$$\begin{array}{ccccccccc} & & & & \mathrm{Fib}_W & & & & \\ & & & & \downarrow & & & & \\ \mathrm{Parf}_\omega & \longrightarrow & \mathrm{Parf}_W & \longrightarrow & \mathrm{Fibf}_W & \longleftarrow & \underbrace{\mathrm{Catfib}^W}_{\mathcal{F}_W} & \longleftarrow & \underbrace{\mathrm{Catfib}^\omega}_{\mathcal{F}_\omega}, \end{array}$$

où Fib_W désigne les W-fibrations ($f : S' \longrightarrow S$ est dans Fib_W si et seulement si le foncteur changement de base $X \longmapsto X' = X \times_S S'$ de Cat/S dans Cat/S' est compatible avec les localiseurs W_S et $W_{S'}$), Catfib les Cat-fibrations, Catfib^W (resp. Catfib^ω) les Cat-fibrations telles que les foncteurs changement de base soient dans W (resp. soient dans W_ω, *cf.* déf. plus bas) [20], Parf_W les morphismes W-parfaits, *i.e.* W-lisses et W-propres, enfin Parf_ω les morphismes W_ω-parfaits, où W_ω est le plus petit localiseur satisfaisant Loc (1, 2, 3). Parmi les espèces de "fibrations" envisagées, c'est cette dernière seulement, avec Catfib^ω, qui est indépendante de W.

À ce titre, elle me paraît jouer un rôle similaire, dual, à celui des morphismes de Dwyer, et je présume qu'on peut leur faire jouer un rôle similaire. En tous cas, on sait [page 29] que toute flèche f de Cat se factorise en pi, avec $i \in W_\omega$ et $p \in \mathrm{Parf}_\omega$, donc $i \in W$ pour tout W satisfaisant Loc (1, 2, 3). On sait aussi que Catfib^ω satisfait l'énoncé de factorisation forte, f se factorise en $f = pi$, $i \in W_\omega$, $p \in \mathrm{Catfib}^\omega_0$. [21]

Notons aussi que Parf_ω et Parf_W, ainsi que Fib_W, sont stables non seulement par changement de base (c'est le cas des 5 classes envisagées, qui de plus contiennent tous les isomorphismes), mais aussi par composition. (De plus, Fib_W est stable par facteurs directs, et je présume qu'il en est de même de Liss_W et de Prop_W, donc de Parf_W, en particulier de Parf_{W_ω}, mais je n'ai pas pris la peine de le vérifier.) Par contre, a priori Fibf_W n'est pas en général stable par composition, et Catfib^W, Catfib^ω n'ont pas de raison non plus d'être stables par composition [22]. p. 20

4.2. Finalement, il paraît plus "éclairant" d'introduire, au lieu du localiseur fondamental W_ω bien déterminée, un localiseur fondamental

$$W_0 \subset \mathrm{Fl}(\mathrm{Cat}),$$

qui jouera le rôle d'une sorte de "localiseur de référence" pour formuler certaines propriétés de W. On supposera toujours que

$$W \supset W_0.$$

[page 30]

Suivant les cas, W_0 pourra être W_ω, ou quelque autre localiseur fondamental défini comme le "plus petit" satisfaisant à des axiomes de stabilité donnés. Ou ça pourra être $\mathbf{W}_\infty$ (les équivalences faibles habituelles), quand on s'intéresse aux localiseurs qui contiennent $\mathbf{W}_\infty$ (les seuls, apparemment, avec lesquels on ait travaillé jusqu'à présent en homotopie). Ça pourra être aussi W, et les énoncés obtenus en spécialisant les résultats obtenus au cas où $W = W_0$ ne sont nullement tautologiques. Le diagramme de la page 28 se remplace alors par le diagramme d'inclusions suivant, plus éclairant pour notre propos :

$$\begin{array}{ccccc} & & \mathrm{Fib}_W & & \\ & & \downarrow & & \\ \mathrm{Parf}_W & \longrightarrow & \mathrm{Fibf}_W & \longleftarrow & \mathcal{F}_W \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ \mathrm{Parf}_{W_0} & \longrightarrow & \mathrm{Fibf}_{W_0} & \longleftarrow & \mathcal{F}_{W_0} \\ & & \uparrow & & \\ & & \mathrm{Fib}_{W_0}, & & \end{array} \tag{4.2.1}$$

où pour tout localiseur fondamental W, je pose pour abréger

$$\mathcal{F}_W = \mathrm{Catfib}^W,$$

ce qui définit donc également $\mathcal{F}_{W_0}$. La classe Fib_W doit être regardée comme le point de mire de notre attention ; la plupart des propriétés de W que nous allons passer en revue ici, s'exprimeront par une inclusion de la forme [page 31]

$$\mathcal{F} \subset \mathrm{Fib}_W,$$

où $\mathcal{F}$ est une des sept autres classes du diagramme (4.2.1) ; à l'exception tout au plus du cas $\mathcal{F} = \mathrm{Fib}_{W_0}$, *i.e.* de l'inclusion $\mathrm{Fib}_{W_0} \subset \mathrm{Fib}_W$. Comme propriété sur W, cette inclusion paraît très faible et pour cela pas utile à grand chose, sauf bien sûr dans le cas où $\mathrm{Fib}_{W_0} \longrightarrow \mathrm{Fibf}_{W_0}$ est une égalité, de sorte que l'inclusion envisagée équivaut à $\mathrm{Fibf}_{W_0} \subset \mathrm{Fib}_W$ (et implique que Parf_{W_0} et $\mathcal{F}_{W_0}$ sont eux aussi contenus dans Fib_W). C'est là par contre, comme nous allons voir, une propriété assez forte et fort utile de W, impliquant notamment le fait que $(\mathrm{Cat}, W, \mathrm{Fib}_W)$ est une catégorie à fibrations.

Aux fins de référence ultérieure, je vais formuler maintenant les divers aspects principaux de *l'axiome des W-fibrations* Loc (7). La formulation à laquelle j'étais parvenu (*cf.* I, VI, XII) utilisait la notion que j'appelle à présent "W-fibrations *faible*" (l'ex W-fibration, désormais détrônée !), et sous sa forme la plus forte s'écrivait comme l'inclusion p. 21 [page 32]

$$\mathrm{Fibf}_W \subset \mathrm{Fib}_W.$$

Cette notion de W-fibration faible, tout comme celle de morphisme W-parfait, si utiles soient-elles, m'apparaît cependant un peu technique, et je préfère donner une formulation qui ne fasse appel qu'à des notions plus familières et d'apparence plus élémentaires. C'est pourquoi je vais remplacer Fibf_W par la sous-classe $\mathcal{F}_W = \mathrm{Catfib}^W$, ce qui (on le verra) revient en fait au même.

Cette classe $\mathcal{F}_W$ est extrêmement naturelle, et s'impose même dans le yoga des dérivateurs. En effet, dans la construction de $\mathrm{HOT}_W(S)$ pour S dans Cat, on passe à une [page 33]

20. N.B. $\mathrm{Catfib}_0^W = \mathrm{Catfib} \cap \mathrm{Fibf}_W$, $\mathrm{Catfib}_0^\omega = \mathrm{Catfib} \cap \mathrm{Fibf}_{W_\omega}$
21. Donc la propriété de factorisation est valable pour toutes ces classes, sauf peut-être Fib_W.
22. il faudrait expliciter par des exemples.

catégorie de fractions de la catégorie

$$\mathrm{Cat}(S) = \underline{\mathrm{Hom}}(S, \mathrm{Cat}),$$

par un localiseur $W(S)$ (que nous avions généralement noté W_S^{g} ou W_S^{u} …). Cette catégorie $\mathrm{Cat}(S)$ est d'autre part isomorphe à la catégorie

$$\mathrm{Fibsc}\, S$$

des catégories fibrées et scindées sur S, avec comme flèches les S-foncteurs qui respectent le scindage (et en particulier cartésiens) (*cf.* VI, et notamment le diagramme p. 175). On a vu (*loc. cit.*) que la catégorie localisée $\mathrm{HOT}_W(S)$ est équivalente à la catégorie localisée de la catégorie très voisine

$$\mathrm{Fib}\, S \qquad \text{(que je préférerais maintenant noter } \mathrm{Catfib}\, S \text{ ou } \mathrm{Catfib}_S\text{)},$$

formé des catégories *fibrées* sur S, avec comme flèches les seuls foncteurs cartésiens. (On fera attention cependant que le foncteur canonique $\mathrm{Fibsc}\, S \longrightarrow \mathrm{Fib}\, S$ est fidèle mais non pleinement, néanmoins il induit une équivalence sur les catégories localisées, en définissant de façon évidente, par la W-équivalence fibre par fibre, *i.e.* comme W_S^{u}, le localiseur pertinent sur $\mathrm{Fib}\, S$.) Donc pour cette raison de principe, et d'ailleurs tout au long du développement de la théorie de HOT_W, la catégorie $\mathrm{Fib}\, S$ et par là, les foncteurs fibrants, ont joué un rôle essentiel. La classe de flèches que nous notons ici $\mathcal{F}_W$ ou Catfib^W (on pourrait aussi la noter Fib^W, si ce n'était pour le risque de confusion avec Fib_W) s'interprète alors très naturellement à partir de là. Une flèche $f : X \longrightarrow S$ est dans $\mathcal{F}_W$ si et seulement si elle est a) fibrante, et par là définit de façon particulièrement directe un objet de $\mathrm{HOT}_W(S)$, puisque à S-équivalence près, X/S provient d'un objet de $\mathrm{Fibsc}\, S$ ou encore de $\mathrm{Cat}(S)$, et b) l'objet dans $\mathrm{HOT}_W(S)$ défini par f est dans $\mathrm{HOT}_W^{\mathrm{lc}}(S)$, *i.e.* dans l'image essentielle de la sous-catégorie strictement pleine $\mathrm{Fibsc}_0^W S$ de $\mathrm{Fibsc}\, S$ (par le foncteur canonique $\mathrm{Fibsc} \longrightarrow \mathrm{HOT}_W(S)$), ou ce qui revient au même (du moins si W est fortement saturée) que le foncteur [page 34] [page 35]

p. 22

$$\begin{array}{ccc} S^\circ & \longrightarrow & \mathrm{Hot}_W \\ s & \longmapsto & \mathrm{hot}_W(X_s) \end{array}$$

soit un foncteur "localement constant". Ainsi, on considérera les $f \in \mathcal{F}_W$ comme les flèches les plus économiques et les plus naturelles dans Cat, qui définissent des W-types d'homotopie relative localement constants.

Notons aussi que toutes les classes de flèches (4.2.1) sont stables par changement de base (et elles contiennent les isomorphismes). Les catégories Fib_W, Parf_W et leurs variantes W_0 sont aussi stables par composition, par contre, ce n'est pas le cas pour Fibf_W et $\mathcal{F}_W$ et leurs variantes W_0, sauf axiomes particuliers sur W ou sur W_0). Il en résulte aussitôt que si $\mathcal{F}$ est une de ces classes, la condition

$$\mathcal{F} \subset \mathrm{Fib}_W$$

[page 36]

équivaut à celle ci :

Pour tout diagramme cartésien

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{q} & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ S & \xleftarrow[p]{} & S', \end{array} \tag{4.2.2}$$

avec $f \in \mathcal{F}$ et $p \in W$, on a $q \in W$.
(N.B. On a aussi $f' \in \mathcal{F}$, par la stabilité rappelée plus haut.)

4.3. Voici donc (*cf.* plus bas) l'axiome pertinent, Loc (7) avec ses trois aspects a, b, c [23]. On a vu (et on reverra) que l'on a les implications

$$\text{a} \quad \Longrightarrow \quad \text{b} \quad \Longrightarrow \quad \text{c} \quad (\Longrightarrow \quad \text{F}).$$

Quand on référera à Loc (7) sans autre précision, il sera entendu qu'il s'agit de la forme la plus forte Loc (7 a), qui implique donc les deux autres. Il n'en faut pas moins pour être totalement à l'aise. Mais je rappelle que la variante affaiblie Loc (7b) est suffisante pour faire la théorie des foncteurs $f_!$ pour les catégories $\mathrm{HOT}_W(S)$ [24] (*cf.* VI).

C'est d'ailleurs une chose surprenante, puisque via le yoga général des dérivateurs associés aux catégories de modèles, on s'attendrait plutôt que pour avoir des adjoints à gauche $f_!$ des foncteurs f^* d'image inverse, il faut faire sur W des hypothèses du type *W-cofibration* (essentiellement, Loc (6 a)). Il me semble peu probable que Loc (7 b), ni même Loc (7), implique Loc (6 a), ni même sa variante plus faible Loc (6′ a) (axiome du carré cocartésien, ou de Mayer-Vietoris, forme faible). Si d'autre part ces axiomes ne sont pas *vérifiés,* alors que Loc (7) l'est, il y a des chances que cela donnera un exemple où il y a un formalisme des $f_!$, sans que l'axiome d'exactitude à gauche soit vérifié.

[page 37]

p. 23

Quant à la forme Loc (7 c), plus faible encore, elle suffit pourtant (comme nous le verrons plus bas) à assurer que Cat admet suffisamment de W-fibrations (résultat qui n'a rien d'évident, et ne pouvait m'apparaître qu'après avoir pris connaissance du substantiel lemme de K. S. Brown, dans son beau travail où il introduit les catégories à fibrations et à cofibrations).

[page 38]

Nous donnerons aussi plus bas des cas fort simples, où la condition Loc (7 b) entraîne déjà Loc (7) (W fortement saturé, *i.e.* Loc (1 bis)), voire même où Loc (7 c) entraîne Loc (7) (cas où W satisfait à l'axiome Loc (8) des limites inductives). Je signale en passant que je ne connais pas de localiseur fondamental satisfaisant l'axiome Loc (8) (qui implique déjà $W = W^{\natural}$, *i.e.* Loc (1 bis)), sans que W soit fortement saturé (*i.e.* en satisfasse même Loc (1 ter)).

Loc (7)

a) On a $\mathcal{F}_W \subset \mathrm{Fib}_W$, *i.e.* pour tout diagramme cartésien (4.2.2) dans Cat, avec $f \in \mathcal{F}_W$ (*i.e.* f Cat-fibrant et faiblement W-fibrant) et $p \in W$, on a $q \in W$.

b) Pour tout diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\ f\ } & Y \\ & {\scriptstyle p}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle q} & \\ & S & \end{array}$$

avec $p, q \in \mathcal{F}_W$ et $f \in W$, on a $f \in W_S^{\mathrm{u}}$ (ou, ce qui revient au même comme X, Y sont W-lisses sur S, $f_s \in W$ pour tout $s \in \mathrm{Ob}\, S$) [25].

[page 39]

c) On a

$$\mathcal{F}_W \cap W \subset W^{\mathrm{u}},$$

en d'autres termes, pour toute flèche $f : X \longrightarrow S$ dans Cat telle que $f \in \mathcal{F}_W$ (on pourrait appeler ces flèches des Cat-W-fibrations, étant entendu qu'elles sont aussi des Cat-fibrations, mais non nécessairement des W-fibrations), si

23. J'y ai rajouté finalement un quatrième F (comme "fibration").

24. Ici ma mémoire me joue un tour - on n'a nullement besoin pour cela de l'axiome déjà très fort Loc (7b), mais seulement de Loc (3 bis), dont il semble bien qu'il soit vérifiée pour tous les localiseurs fondamentaux "raisonnables".

25. **N.B.** La démonstration de $B(\mathcal{F}_W) \Longrightarrow B(\mathrm{Fibf}_W)$ montre en fait qu'il suffit de postuler b) lorsque f est cartésien, et même lorsque X, Y sont scindées sur S et f compatible avec le scindage.

$f \in W$, alors $f \in W_S^{\mathrm{u}}$ (ou, ce qui revient au même, les fibres X_s de f ($s \in \mathrm{Ob}\, S$) sont W-asphériques).

F) [26] Cat a suffisamment de W-fibrations, *i.e.* Cat muni de (W, Fib_W) est une catégorie à cofibrations (propre, et même de Brown, *i.e.* $X \longrightarrow e$ est dans Fib_W pour tout X dans Cat. p. 24

Il est clair que c est le cas particulier de b obtenu en prenant $Y = S$, $q = \mathrm{id}_S$, donc b $\Longrightarrow$ c. L'implication a $\Longrightarrow$ b est moins évidente, elle est établie d'abord dans XII, et nous y reviendrons ci-dessous (4.4.2 ci-dessous). Le reste du présent paragraphe est consacré à étudier diverses variantes des conditions a) b) c) précédentes et les implications entre celles-ci.

4.4. Soit, plus généralement, [page 40]

$$\mathcal{F} \subset \mathrm{Fl}(\mathrm{Cat})$$

un ensemble de flèches dans Cat, en pensant plus particulièrement au cas où $\mathcal{F}$ est un des sept ensembles du diagramme (4.2.1) (p. 30) autres que Fib_W. Nous pouvons formuler trois propriétés similaires pour $\mathcal{F}$ à celles formulées dans Loc (7 a b c) dans le cas de $\mathcal{F}_W$, notons ces propriétés

$$\mathrm{A}(\mathcal{F})\,,\ \mathrm{B}(\mathcal{F})\,,\ \mathrm{C}(\mathcal{F})\,,\ ^{[27]}$$

donc

$$\begin{cases} \mathrm{A}(\mathcal{F}) & : \quad \mathcal{F} \subset \mathrm{Fib}_W. \\ \mathrm{B}(\mathcal{F}) & : \quad \mathrm{Fl}(\mathcal{F}_S) \cap W_S \subset W_S^{\mathrm{u}} \\ & \quad\ (\text{où } \mathcal{F}_S \text{ désigne la sous-catégorie pleine de } \mathrm{Cat}/S \\ & \quad\ \text{formée des } f : X \longrightarrow S \text{ avec } f \in \mathcal{F}). \\ \mathrm{C}(\mathcal{F}) & : \quad \mathcal{F} \cap W \subset W^{\mathrm{u}}. \end{cases} \tag{4.4.1}$$

Il est clair qu'on a $\mathrm{B}(\mathcal{F}) \Longrightarrow \mathrm{C}(\mathcal{F})$, et je vais donner une condition sur $\mathcal{F}$ qui implique qu'on a aussi $\mathrm{A}(\mathcal{F}) \Longrightarrow \mathrm{B}(\mathcal{F})$.

(Nous l'appliquerons dans les cas suivants : [page 41]

$$\mathcal{F} \ =\ \mathcal{F}_W,\ \mathrm{Fibf}_W,\ \mathrm{Parf}_W,\ \mathcal{F}_{W_0},\ \mathrm{Fibf}_{W_0}. \tag{4.4.2}$$

Je signale d'ailleurs que l'on verra plus bas (cor. 4.4.10) que

$$\mathrm{A}(\mathcal{F}_W) \iff \mathrm{A}(\mathrm{Fibf}_W), \qquad \mathrm{A}(\mathcal{F}_{W_0}) \iff \mathrm{A}(\mathrm{Fibf}_{W_0}), \tag{4.4.3}$$

et de même pour les variantes B, C, de sorte que pour l'implication que nous voulons établir, il n'y a pas lieu de distinguer les cas de $\mathcal{F}_W$ et Fibf_W, de $\mathcal{F}_{W_0}$ et Fibf_{W_0}. D'ailleurs il suffira de regarder les ensembles $\mathcal{F}_{W_0}$, Fibf_{W_0}, Parf_{W_0}, puisque le cas des ensembles relatifs à W en sont un cas particulier (en prenant $W_0 = W$). [28]

Lemme 4.4.1. [29] *Supposons que $\mathcal{F}$ satisfasse la condition suivante : toute flèche f de* Cat *se factorise en $f = pi$, avec $i \in W$, $f \in \mathcal{F}$. Alors la condition* $\mathrm{A}(\mathcal{F})$ *sur $\mathcal{F}$ implique que dans* Cat *il y a "assez de W-fibrations", et par suite* (*par un argument formel bien connu*), *que l'on a* $\mathrm{B}(\mathrm{Fib}_W)$, *et a fortiori* (*comme par hypothèse $\mathcal{F} \subset \mathrm{Fib}_W$*) $\mathrm{B}(\mathcal{F})$. p. 25

26. rajouté après coup. [page 42]

27. **N.B.** Ces conditions ont un sens si $\mathcal{F} \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$, si $(\mathcal{M}, W)$ est une catégorie de modèles quelconque.

28. Cela fera donc a priori $3 \times 6 = 18$ conditions différentes, mais à cause de (4.4.3) il n'y en a (à équivalence près) que $4 \times 3 = 12$, et en fait deux parmi ces quatre triples de conditions se réduisent à une seule (pour $\mathcal{F} = \mathcal{F}_W$ et $\mathcal{F} = \mathcal{F}_{W_0}$), de sorte qu'il ne reste au total que *huit* conditions différentes, que nous résumons dans le diagramme récapitulatif (4.4.7.1) de la page 48. Il y en a même seulement *quatre,* A_{W_0}, B_{W_0}, C_{W_0}, D_{W_0}, comme fonctions de W_0, les quatre autres A, B, C, D s'obtiennent en spécialisant au cas où $W_0 = W$.

29. Vaut dans une catégorie de modèles quelconque.

N.B. Il est clair en effet que si on a $\mathcal{F} \subset \mathcal{F}'$, alors

$$\mathrm{A}(\mathcal{F}') \Longrightarrow \mathrm{A}(\mathcal{F}) \qquad \text{et de même pour B, C.} \qquad (*)$$

Or la condition préliminaire sur $\mathcal{F}$ est bien satisfaite dans le cas d'un ensemble de l'une des formes $\mathcal{F} = \mathcal{F}_W$, Fibf_W, Parf_W. Il suffit de le voir dans le cas des sous-ensembles $\mathcal{F}_W$, Parf_W de Fibf_W, *i.e.* que toute flèche f de Cat se factorise en

$$f = pi,$$

avec $i \in W$, et p étant, au choix, dans Parf_W, ou dans $\mathcal{F}_W$. Or dans le cas de Parf_W, c'est ce qui est établie dans VII (Catégories de chemins (2)) grâce au formalisme des ‖
$\underline{\mathrm{Ch}}(S) \longrightarrow S \times S$. Pour trouver une factorisation avec $f = qj$, $j \in W$, $q \in \mathcal{F}_W$, il suffit de voir que p se factorise ainsi en $p = q_0 j_0$, on aura

$$f = \underbrace{q_0}_{\in \mathcal{F}_{W_0}} \underbrace{(j_0 i)}_{\in W},$$

donc on peut supposer $f \in \mathrm{Parf}_W$. Mais si X est W-parfait sur S, donc un W-fibré faible [page 43]
sur S, alors dans la factorisation

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\ i\ } & \Phi_S(X) \\ & {\scriptstyle f}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle p} & \\ & S & \end{array}$$

avec $i \in W$ et $p \in \mathrm{Catfib}$ (*cf.* VI), on sait que p est aussi une W-fibration faible, *i.e.* $p \in \mathcal{F}_W$, d'où la conclusion. Ainsi on trouve le

Corollaire 4.4.2. *Supposons que $\mathcal{F}$ soit l'un des six ensembles* (4.4.2) (i.e. *l'un des ensembles du diagramme* (4.2.1), *à l'exclusion de Fib_W et Fib_{W_0}*). *Alors on a*

$$\mathrm{A}(\mathcal{F}) \implies \mathrm{B}(\mathcal{F}) \implies \mathrm{C}(\mathcal{F}).$$

Lemme 4.4.3. *Soit $(\mathcal{M}, W)$ une catégorie de modèles, et soit $\mathcal{F} \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ satisfaisant les conditions suivantes*

1) *$\mathcal{F}$ stable par changement de base, composition, contient les isomorphismes.*
2) *$\mathcal{M}$ a un objet final, et pour tout $X \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$, $X \longrightarrow e$ est dans $\mathcal{F}$.*
3) *Toute flèche f de $\mathcal{M}$ se factorise en $f = pi$, avec $i \in W$, $p \in \mathcal{F}$ (c'est la condition du lemme* 4.4.1).

Alors les conditions $\mathrm{A}(\mathcal{F})$, $\mathrm{B}(\mathcal{F})$, $\mathrm{C}(\mathcal{F})$ *sur $\mathcal{F}$ sont équivalentes.* p. 26

En effet, en vertu de 4.4.1, il reste à prouver l'implication

$$\mathrm{C}(\mathcal{F}) \implies \mathrm{A}(\mathcal{F}),$$

i.e. ceci : si $\mathcal{F}$ satisfait aussi la condition [page 44]

4) $\mathcal{F} \cap W \subset W^{\mathrm{u}}$ (ou ce qui revient au même, comme $\mathcal{F}$ est stable par changement de base, que $\mathcal{F} \cap W$ est stable par changement de base),

alors on en conclut

$$\mathcal{F} \subset \mathrm{Fib}_W.$$

Or ceci n'est autre que le lemme de K. S. Brown, sous la forme duale de celle donnée plus haut (3.2.1, page 20).

Parmi les six ensembles de flèches envisagés dans (4.4.2), les hypothèses 1) 2) 3) sont satisfaites pour Parf_W et Parf_{W_0}, à l'exclusion des quatre autres. (Les autres satisfont à toutes les conditions, à la seule exception de la stabilité par composition [30]). On trouve donc :

Corollaire 4.4.4. *Les conditions* $\mathrm{A}(\mathrm{Parf}_W)$, $\mathrm{B}(\mathrm{Parf}_W)$, $\mathrm{C}(\mathrm{Parf}_W)$ *sont équivalentes* (nous désignons cette condition sur W par D). *De même les conditions* $\mathrm{A}(\mathrm{Parf}_{W_0})$, $\mathrm{B}(\mathrm{Parf}_{W_0})$, $\mathrm{C}(\mathrm{Parf}_{W_0})$ *sont équivalentes.*

(On désignera la condition obtenue sur le couple $W \supset W_0$ de localiseurs fondamentaux par D_{W_0}.) [page 45]

Ainsi on a (comme $\mathrm{Parf}_{W_0} \subset \mathrm{Parf}_W$)

$$\mathrm{D} = \mathrm{D}_W \implies \mathrm{D}_{W_0}\,, \tag{4.4.4}$$

et si $W_0' \subset W_0$, on aura

$$\mathrm{D}_{W_0} \implies \mathrm{D}_{W_0'}\,. \tag{4.4.5}$$

Corollaire 4.4.5. *Désignons par* A, B, C *respectivement les conditions* Loc (7 a), Loc (7 b), Loc (7 c). *On a alors les implications*

$$\mathrm{A} \implies \mathrm{B} \implies \mathrm{C}\,. \tag{4.4.5.1}$$

De plus, si on désigne (*pour un ensemble* $\mathcal{F}$ *de flèches de* Cat) *par* $\mathrm{Comp}(\mathcal{F})$ *la condition sur* $\mathcal{F}$ *que* $\mathcal{F}$ *soit stable par composition, on a les équivalences*

$$\mathrm{A} \iff (\mathrm{C} + \mathrm{Comp}(\mathcal{F}_W)) \iff (\mathrm{C} + \mathrm{Comp}(\mathrm{Fibf}_W)). \tag{4.4.5.2}$$

Démonstration. La première assertion est contenue dans le corollaire 4.4.2, appliqué au cas $\mathcal{F} = \mathcal{F}_W$. D'autre part, si $\mathcal{F}_W$ satisfait à $\mathrm{Comp}(\mathcal{F}_W)$, il satisfait aux conditions 1) 2) 3) du lemme de Brown 4.4.3, donc joint à C, il implique A. Il reste, pour la première équivalence, à prouver que p. 27

$$A \implies \mathrm{Comp}(\mathcal{F}_W).$$

Mais on a par définition [page 46]

$$\mathcal{F}_W = \mathrm{Catfib} \cap \mathrm{Fibf}_W \tag{$*$}$$

et on sait que Catfib est stable par composition. Donc $\mathcal{F}_W$ l'est aussi, pourvu que le composé gf de deux flèches dans $\mathcal{F}_W$ soit dans Fibf_W. Or par hypothèse A, qui signifie $\mathcal{F}_W \subset \mathrm{Fib}_W$, on a $f, g \in \mathrm{Fib}_W$, donc $gf \in \mathrm{Fib}_W$, puisque Fib_W est stable par composition, a fortiori $gf \in \mathrm{Fibf}_W$.

D'autre part, la formule précédente $(*)$ montre que $\mathrm{Comp}(\mathrm{Fibf}_W) \implies \mathrm{Comp}(\mathcal{F}_W)$, donc on a gratis l'implication $\Longleftarrow$ dans la deuxième équivalence (4.4.5.2). L'implication en sens inverse revient alors à

$$\mathrm{A} \implies \mathrm{Comp}(\mathrm{Fibf}_W),$$

ce qui sera évident grâce au résultat (donné plus bas) [page 47]

$$\mathrm{A} = \mathrm{A}(\mathcal{F}_W) \iff \mathrm{A}(\mathrm{Fibf}_W) \qquad \text{et de même pour B, C,}$$

qui signifie donc que

$$\mathcal{F}_W \subset \mathrm{Fib}_W \qquad \text{implique} \qquad \mathrm{Fibf}_W \subset \mathrm{Fib}_W \qquad (\text{donc } \mathrm{Fibf}_W = \mathrm{Fib}_W),$$


30. **N.B.** Pour Fib_{W_0}, ce sont les conditions 1) 2) qui sont vérifiées, et par contre, la condition 3) qui fait problème. Notons là $\mathrm{F}(W_0)$. Si elle est satisfaite (*i.e.* si Cat a assez de W_0-fibrations), alors on a aussi équivalence des conditions $\mathrm{A}(\mathrm{Fib}_{W_0})$, $\mathrm{B}(\mathrm{Fib}_{W_0})$, $\mathrm{C}(\mathrm{Fib}_{W_0})$.

or Fib_W étant stable par composition, il en est de même pour Fibf_W, q.e.d.

Corollaire 4.4.6. *Supposons que $\mathcal{F}_{W_0}$ soit stable par composition, ce qui est le cas notamment (par* 4.4.5.2 *appliqué à W_0 au lieu de W) si W_0 satisfait* Loc (7). *Alors les conditions* $\mathrm{A}(\mathcal{F}_{W_0})$, $\mathrm{B}(\mathcal{F}_{W_0})$, $\mathrm{C}(\mathcal{F}_{W_0})$ *(que nous notons aussi simplement* A_{W_0}, B_{W_0}, C_{W_0}*) sont équivalentes. (**N.B.** Si on ne fait pas l'hypothèse précédente sur W_0, on aura seulement* $\mathrm{A}_{W_0} \Longrightarrow \mathrm{B}_{W_0} \Longrightarrow \mathrm{C}_{W_0}$*, en vertu de* 4.4.2.)

4.4.7. On a fait le tour à présent de toutes les conditions de type "fibration" sur W, ou sur le couple (W, W_0), qui m'ont parues utiles. Je vais les déployer ici dans un diagramme (plus ou moins) récapitulatif :

[page 48]
p. 28



$\Longrightarrow$ F : $(\mathrm{Cat}, W, \mathrm{Fib}_W)$ une catégorie à fibrations.




diagramme que je vais commenter. Toutes les implications en traits pleins du diagramme ont été déjà obtenues ou sont tautologiques, à l'exception des trois $\overset{\bullet}{\Longrightarrow}$ sur lesquels je vais revenir. L'implication en pointillés $\mathrm{C}_{W_0} \dashrightarrow \mathrm{A}_{W_0}$ est une implication conditionnelle, soumise à la condition marquée sur le diagramme comme W_0 (7), ce qui signifie : W_0 satisfait à Loc (7). Cette implication, *i.e.* l'équivalence de A_{W_0}, B_{W_0}, C_{W_0} sous la condition W_0 (7), a été vue dans 4.4.6. J'ai marqué, au dessus des deux groupes (A, B, C) et (A_{W_0}, B_{W_0}, C_{W_0}) ainsi qu'au dessus de D et de D′ (qui correspondent chacun

à un tel groupe de conditions A($\mathcal{F}$), B($\mathcal{F}$), C($\mathcal{F}$) toutes équivalentes, avec $\mathcal{F} = \mathrm{Parf}_W$ ou $\mathcal{F} = \mathrm{Parf}_{W_0}$) les ensembles de flèches qui leur donnent naissance respectivement : on notera qu'il y en a deux pour les pour les deux triplets nommés en premier, A, B, C pouvant se définir via $\mathcal{F}_W$ ou Fib_W indifféremment, et de même A_{W_0}, B_{W_0}, C_{W_0} via $\mathcal{F}_{W_0}$ ou Fib_{W_0}, comme déjà énoncé (4.4.3) et comme nous le verrons plus bas (cor. 4.4.10, pages 54-55). Par contre, les triplets réduits D et D_{W_0} sont définis chacun par un $\mathcal{F}$ seulement, savoir par Parf_W et [page 49]

Parf_{W_0} respectivement. (En tout, cela fait intervenir six ensembles $\mathcal{F}$ distincts, à savoir les six ensembles du diagramme (4.2.1) autres que Fib_W et Fib_{W_0}.) p. 29

L'implication non tautologique C $\overset{\bullet}{\Longrightarrow}$ D est un cas particulier de l'implication $\mathrm{C}_{W_0} \overset{\bullet}{\Longrightarrow} \mathrm{D}_{W_0}$, laquelle est contenue dans ce qui a été annoncé à l'instant, à savoir $\mathrm{C}_{W_0}(\mathcal{F}_{W_0}) \Longrightarrow \mathrm{C}_{W_0}(\mathrm{Fib}_{W_0})$, compte tenu que $\mathrm{Parf}_{W_0} \subset \mathrm{Fibf}_{W_0}$ (*cf.* (∗), p. 42). Faisant $W_0 = W$, on trouve donc l'implication A $\Longrightarrow$ D, qui est cependant contenue dans les autres implications du diagramme, comme composée dans la chaîne d'implications [page 50]

$$\mathrm{A} \Longrightarrow \mathrm{B} \Longrightarrow \mathrm{C} \Longrightarrow \mathrm{D} \Longrightarrow \mathrm{D}_{W_0} \overset{\bullet}{\Longrightarrow} \mathrm{F}.$$

Il reste, dans ces commentaires généraux, à dire un mot de cette dernière implication

$$\mathrm{D}_{W_0} \overset{\bullet}{\Longrightarrow} \mathrm{F},$$

i.e. du fait que la plus faible de toutes les conditions A à D_{W_0} envisagées ici implique déjà que Cat a assez de W-fibrations, *i.e.* est une catégorie à cofibrations pour (W, Fib_W). C'est clair quand on prend D_{W_0} sous la forme A(Parf_{W_0}), *i.e.*

$$\mathrm{Parf}_{W_0} \subset W.$$

Comme toute flèche f de Cat se factorise en $f = pi$, avec

$$i \in W_0 \subset W \quad \text{et} \quad f \in \mathrm{Parf}_{W_0} \subset \mathrm{Fib}_W\,,$$

on trouve la factorisation avec $i \in W$, $f \in \mathrm{Fib}_W$.

4.4.8. Pour terminer d'établir les implications du diagramme p. 48, il reste seulement à établir les équivalences [page 51]

$$\begin{cases} \mathrm{A}(\mathcal{F}_{W_0}) & \Longleftrightarrow & \mathrm{A}(\mathrm{Fibf}_{W_0}) \\ \mathrm{B}(\mathcal{F}_{W_0}) & \Longleftrightarrow & \mathrm{B}(\mathrm{Fibf}_{W_0}) \\ \mathrm{C}(\mathcal{F}_{W_0}) & \Longleftrightarrow & \mathrm{C}(\mathrm{Fibf}_{W_0}), \end{cases} \tag{4.4.8.1}$$

qui donneront les équivalences similaires pour W, en prenant $W_0 = W$.

La première équivalence (4.4.8.1) sera conséquence du lemme (± tautologique) suivant :

Lemme 4.4.9. *Soient* $(\mathcal{M}, W)$ *une catégorie de modèles,* $\mathcal{F}, \mathcal{G} \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$, *tels que tout* $f \in \mathcal{F}$, $f : X \longrightarrow S$, *s'écrive* $f = pi$, *avec* $i \in W_S^u$, $p \in \mathcal{G}$. *Alors* $\mathrm{A}(\mathcal{G}) \Longrightarrow \mathrm{A}(\mathcal{F})$, i.e.

$$\mathcal{G} \subset \mathrm{Fib}_W \implies \mathcal{F} \subset \mathrm{Fib}_W, \tag{4.4.9.1}$$

et de même $\mathrm{C}(\mathcal{G}) \Longrightarrow \mathrm{C}(\mathcal{F})$, i.e.

$$\mathcal{G} \cap W \subset W^u \implies \mathcal{F} \cap W \subset W^u. \tag{4.4.9.2}$$

Démonstration. A) En effet, si $\mathcal{G} \subset \mathrm{Fib}_W$, la factorisation $f = pi$ de f est telle que $p \in \mathrm{Fib}_W$. Or un composé pi, avec $p \in \mathrm{Fib}_W$ et $i \in W_S^{\mathrm{u}}$, est dans Fib_W, comme on vérifie aussitôt sur le diagramme de carrés cartésiens p. 30

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & X' & \longleftarrow & X'' \\ {\scriptstyle W_S^{\mathrm{u}}}\downarrow & & {\scriptstyle (W)}\downarrow & & {\scriptstyle (W)}\downarrow \\ \overline{X} & \longleftarrow & \overline{X'} & \xleftarrow{(W)} & \overline{X''} \\ {\scriptstyle \mathrm{Fib}_W}\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ S & \longleftarrow & S' & \xleftarrow{W} & S'' \end{array}$$

sur lequel on lit que $X'' \longrightarrow X'$ est dans W, q.e.d.

Ce lemme s'applique notamment au cas où $\mathcal{F} = \mathrm{Fibf}_{W_0}$, $\mathcal{G} = \mathcal{F}_{W_0}$, car f se factorise [page 52] en

$$\begin{array}{ccc} X & & \\ & \searrow^{i} & \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \Phi_S(X) \\ & \swarrow_{p} & \\ S, & & \end{array}$$

et on sait que $i \in W_{0S}^{\mathrm{u}} \subset W_S^{\mathrm{u}}$, et $p \in \mathcal{F}_{W_0} \subset \mathcal{F}_W$, ce qui sont les conditions voulues.

C) Démonstration similaire : Soit $f \in \mathcal{F} \cap W$, factorisant en $f = pi$, avec $i \in W_S^{\mathrm{u}}$, $g \in \mathcal{G}$, on aura alors $g \in W$, donc $g \in \mathcal{G} \cap W \subset W^{\mathrm{u}}$ (par hypothèse C($\mathcal{G}$)), a fortiori on a $g \in W_S^{\mathrm{u}}$, donc $f \in W_S^{\mathrm{u}}$ comme composé de deux flèches de W_S^{u}, et comme le but de f est S lui-même, cela signifie $f \in W^{\mathrm{u}}$, q.e.d.

$$\begin{array}{ccc} X & & \\ & \searrow^{i \in W_S^{\mathrm{u}}} & \\ {\scriptstyle \mathcal{F}\cap W}\downarrow & & \bar{X} \\ & \swarrow_{g} & \\ S & & \end{array}$$

Je ne vois pas de façon pour prouver également

$$\mathrm{B}(\mathcal{G}) \qquad \Longrightarrow \qquad \mathrm{B}(\mathcal{F}),$$

avec les seules hypothèses du lemme précédent sur le couple $\mathcal{F}$, $\mathcal{G}$. Il faudrait que pour tout S dans $\mathcal{M}$, et toute flèche $u : X \longrightarrow Y$ dans $\mathcal{M}/S$, on puisse insérer le diagramme [page 53] obtenu dans $\mathcal{M}$

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{u} & Y \\ & {\scriptstyle f}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle g} & \\ & S & \end{array}$$

dans un diagramme commutatif ci-dessous p. 31

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{u} & Y \\ {\scriptstyle i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j} \\ \bar{X} & \xrightarrow{\bar{u}} & \bar{Y} \\ & {\scriptstyle p}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle q} & \\ & S & \end{array} \qquad (4.4.9.3)$$

avec

$$f = pi, \qquad g = qj, \qquad i, j \in W_S^{\mathrm{u}}, \qquad p, q \in \mathcal{G}.$$

Ce sera le cas en tous cas si pour tout S, et un objet variable X de $\mathcal{M}/S$, on peut trouver une factorisation *fonctorielle en* X de son morphisme structural f_X en $p_X i_X$, avec $i_X \in W_S^{\mathrm{u}}$ et $p_X \in \mathcal{G}$, *i.e.* si i, p se déduisent d'un foncteur

$$\varphi : \mathcal{F}_S \longrightarrow \mathcal{M}/S \ ^{31},$$

et d'un morphisme de foncteurs

$$i : \underbrace{\mathrm{inc}_{\mathcal{F}_S}}_{\substack{\text{foncteur}\\ \text{d'inclusion}}} \longrightarrow \varphi.$$

Admettant l'existence d'un diagramme ayant les propriétés dites, pour toute flèche u dans $\mathcal{F}_S$, ou seulement toute flèche u qui soit aussi dans W_S, nous pouvons prouver maintenant que $u \in W_S \Longrightarrow u \in W_S^{\mathrm{u}}$, pourvu que la propriété similaire soit vrai pour $\mathcal{G}$ à la place de $\mathcal{F}$.

En effet, l'hypothèse sur $u \in W$ implique $\bar{u} \in W$, et l'hypothèse sur $\mathcal{G}$ implique dès lors $\bar{u} \in W_S^{\mathrm{u}}$. Comme W_S^{u} est un localiseur dans $\mathcal{M}/S$, on en conclut bien $u \in W_S^{\mathrm{u}}$, q.e.d. [page 54]

Ainsi on a obtenu

Corollaire 4.4.10. *Supposons, sous les conditions du lemme* 4.4.9, *que tout diagramme commutatif triangulaire* $\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{u} & Y \\ & {\scriptstyle f}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle g} & \\ & S & \end{array}$ *s'insère dans un diagramme du type* (4.4.9.3) *comme ci-dessus* (*avec les relations explicites sur les flèches qui y figurent*). *Alors*

$$\mathrm{B}(\mathcal{G}) \implies \mathrm{B}(\mathcal{F}).$$

Donc si de plus $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$, *de sorte que* $\mathrm{A}(\mathcal{F}) \Longrightarrow \mathrm{A}(\mathcal{G})$ *tautologiquement, et de même pour* B *et pour* C, *on trouve*

$$\begin{aligned} \mathrm{A}(\mathcal{F}) &\iff \mathrm{A}(\mathcal{G}) \\ \mathrm{B}(\mathcal{F}) &\iff \mathrm{B}(\mathcal{G}) \\ \mathrm{C}(\mathcal{F}) &\iff \mathrm{C}(\mathcal{G}). \end{aligned}$$

Nous pouvons appliquer ce corollaire dans le cas qui nous occupe ici, avec

$$\mathcal{G} \overset{\text{déf}}{=} \mathcal{F}_{W_0} \subset \mathcal{F} \overset{\text{déf}}{=} \mathrm{Fibf}_{W_0},$$

vu que dans ce cas on a bien une factorisation *fonctorielle* d'un $f \in \mathrm{Fibf}_{W_0}$, $f : X \longrightarrow S$, p. 32
en $f = pi$, $i \in W_{0S}^{\mathrm{u}} \subset W_S^{\mathrm{u}}$, $p \in \mathcal{F}_{W_0} = \mathcal{G}$, savoir celle rappelée page 43 : [page 55]

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{i_X} & \bar{X} = \Phi_S(X) \\ & {\scriptstyle f=f_X}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle p_X} & \\ & S. & \end{array}$$

Cela prouve donc les équivalences annoncées (4.4.8.1) et achève d'établir la validité des implications du diagramme de la page 48.

Ces implications, à la seule exception de l'implication en pointillés $\mathrm{C}_{W_0} \dashrightarrow \mathrm{A}_{W_0}$ (qui suppose qu'on ait W_0 (7)), ne font appel à aucune hypothèse particulière sur les localiseurs fondamentaux W et W_0 (à part l'inclusion $W \supset W_0$). Mais nous pouvons, en utilisant le lemme 4.4.10, donner des implications conditionnelles remarquables, sous la seule condition que W, ou W_0, satisfassent à l'anodin *axiome des limites* Loc (8), [page 56]

31. $\mathcal{F}_S$ est la sous-catégorie pleine de $\mathcal{M}/S$ formée des X tels que $f_X \in \mathcal{F}$.

et même seulement sous la forme faible de stabilité des localiseurs par $\varinjlim$ de *suites*. Donnons-les d'abord sous forme technique, avant de déployer les conséquences dans un théorème scholie :

Corollaire 4.4.11. *Supposons que W_0 satisfasse à l'axiome* Loc (8), *ou seulement* Loc (8 bis) (*stabilité par $\varinjlim$ de suites*). *Alors* $\mathrm{D}_{W_0} \Longrightarrow \mathrm{A}_{W_0}$ (*donc les conditions* A_{W_0}, B_{W_0}, C_{W_0}, D_{W_0} *sont équivalentes*). *En particulier* (*faisant $W_0 = W$*), *si W satisfait à* Loc (8 bis), *alors on a* $\mathrm{D}_W \Longrightarrow \mathrm{A}_W$ (*donc les conditions* A_W, B_W, C_W, D_W *sont équivalentes*).

En effet, l'implication à prouver s'écrit aussi

$$\mathrm{A}(\mathrm{Parf}_{W_0}) \iff \mathrm{A}(\mathrm{Fibf}_{W_0}).$$

L'implication non tautologique $\Longrightarrow$ est justiciable du lemme 4.4.9. Il faut vérifier que moyennant Loc (8 bis) pour W_0, tout $f \in \mathrm{Fib}_{W_0}$, $f : X \longrightarrow S$, se factorise en $f = pi$, avec $i \in W_0^{\mathrm{u}}$, $p \in \mathrm{Parf}_{W_0}$. Or on sait [32] (VI, p. 193 ff.) que l'axiome Loc (8 bis) implique [page 57] que $f \in \mathrm{Fibf}_{W_0}$ se factorise en

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\ i_\infty\ } & \bar{X} = \Phi_\infty(X) \\ & {\scriptstyle f}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle p_\infty} & \\ & S, & \end{array}$$

(catégorie de chemins infinis d'un côté, relativisée sur S, *i.e.* des couples (x, c), avec $x \in \mathrm{Ob}X$ et $c : f(x) \longrightarrow s$ un chemin infini dans S, de source $f(x)$.)

avec $p_\infty \in \mathrm{Parf}_{W_0}$ (comme on veut), et $i_\infty \in W_{0S}^{\mathrm{u}}$, et comme $W_{0S}^{\mathrm{u}} \subset W_S^{\mathrm{u}}$, on a bien $i_\infty \in W_S^{\mathrm{u}}$.

Corollaire 4.4.12. *Supposons que W* et *W_0 satisfassent à* Loc (8 bis). *Alors on a* $\mathrm{D}_{W_0} \Longrightarrow \mathrm{A}$ (*donc les huit conditions* A, B, C, D, A_{W_0}, B_{W_0}, C_{W_0}, D_{W_0} *sont équivalentes*).

Cela signifie en effet que [p. 33]

$$\mathrm{A}(\mathrm{Parf}_{W_0}) \Longrightarrow \mathrm{A}(\mathrm{Fibf}_W),$$

et c'est encore justiciable du lemme 4.4.9. En effet, la factorisation ci-dessus d'une flèche f ne dépend pas du choix d'un localiseur, et p_∞ est W-parfait pour *tout* localiseur satisfaisant Loc (8 bis), donc en particulier pour W_0. Et la flèche i_∞ est dans W_S^{u}, pour tout localiseur satisfaisant Loc (8 bis), donc pour W_0.

Je vais récapituler les résultats obtenus dans cette section dans un théorème, qui [page 58] constituera le résultat principal du présent paragraphe sur les axiomes de W-fibrations.

Théorème 4.4.13. *Soit W un localiseur fondamental dans* Cat. *Pour tout localiseur W_0 contenu dans W, on a explicité un ensemble de quatre conditions sur la paire W_0, W, qui pour W fixé, dépendent de W_0 seul, notées*

$$\mathrm{A}_{W_0},\ \mathrm{B}_{W_0},\ \mathrm{C}_{W_0},\ \mathrm{D}_{W_0}, \tag{4.4.13.1}$$

et définies respectivement comme

$$\mathrm{A}(\mathcal{F}_{W_0}),\ \mathrm{B}(\mathcal{F}_{W_0}),\ \mathrm{C}(\mathcal{F}_{W_0}), \qquad \textit{et}$$

$$\mathrm{A}(\mathrm{Parf}_{W_0})\Big(\iff \mathrm{B}(\mathrm{Parf}_{W_0}) \iff \mathrm{C}(\mathrm{Parf}_{W_0})\Big),$$

avec les notations $\mathrm{A}(\cdot)$, $\mathrm{B}(\cdot)$, $\mathrm{C}(\cdot)$ *introduites dans* (4.4.1). *Faisant $W_0 = W$, on trouve les conditions sur W*

$$\mathrm{A},\ \mathrm{B},\ \mathrm{C},\ \mathrm{D} \tag{4.4.13.2}$$

32. et c'est là une trouvaille tout à fait inattendue, un peu comme le lemme de K. S. Brown …

avec $\mathrm{A} = \mathrm{A}_W$, $\mathrm{B} = \mathrm{B}_W$, $\mathrm{C} = \mathrm{C}_W$, $\mathrm{D} = \mathrm{D}_W$, *dont les trois premières ne sont autres que* Loc (7 a), Loc (7 b), Loc (7 c) (cf. 4.3, *page* 38).

① *On a pour ces conditions les implications suivantes.*

a) *On a les implications*

$$\mathrm{A}_{W_0} \implies \mathrm{B}_{W_0} \implies \mathrm{C}_{W_0} \implies \mathrm{D}_{W_0}, \tag{4.4.13.3}$$

(*d'où en particulier*

[page 59]

$$\mathrm{A}_W \implies \mathrm{B}_W \implies \mathrm{C}_W \implies \mathrm{D}_W\ ). \tag{4.4.13.4}$$

b) *Si* $W'_0 \subset W_0$ *est un localiseur fondamental contenu dans* W_0, *on a* (*tautologiquement*)

$$\mathrm{A}_{W_0} \implies \mathrm{A}_{W'_0}, \qquad \mathrm{B}_{W_0} \implies \mathrm{B}_{W'_0}, \qquad \mathrm{C}_{W_0} \implies \mathrm{C}_{W'_0}.$$

On trouve donc, par (a) *et* (b) (*y faisant pour le couple* (W, W_0) *comme* (W_0, W'_0)), *le rectangle d'implications*

p. 34

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{A} & \Longrightarrow & \mathrm{A}_{W_0} \\ \Downarrow & & \Downarrow \\ \mathrm{B} & \Longrightarrow & \mathrm{B}_{W_0} \\ \Downarrow & & \Downarrow \\ \mathrm{C} & \Longrightarrow & \mathrm{C}_{W_0} \\ \Downarrow & & \Downarrow \\ \underbrace{\mathrm{D}}_{\mathrm{Parf}_W} & \Longrightarrow & \underbrace{\mathrm{D}_{W_0}}_{\mathrm{Parf}_{W_0}} \end{array} \quad \begin{array}{l} \left.\begin{array}{l} \\ \\ \\ \end{array}\right\} \mathcal{F}_{W_0}, \mathrm{Fibf}_{W_0} \\ \\ \\ \\ \end{array} \quad \mathcal{F}_W, \mathrm{Fibf}_W \left\{ \right. \tag{4.4.13.5}$$

où on a rappelé, à côté des accolades, quels sont l'ensemble, ou les ensembles $\mathcal{F} \subset \mathrm{Fl}(\mathrm{Cat})$ *qui définissent les conditions envisagées (comme l'une des conditions* $\mathrm{A}(\mathcal{F})$, $\mathrm{B}(\mathcal{F})$, $\mathrm{C}(\mathcal{F})$ *ou* $\mathrm{D}(\mathcal{F}) = \mathrm{A}(\mathcal{F})$ *dans le cas où les trois conditions sont équivalentes). La plus faible des huit conditions envisagées est* D_{W_0}, *la plus forte* A. (*Et pour* W_0 *variable, on trouve la condition la plus faible de toutes en prenant* D_{W_ω}, *où* W_ω *est le plus petit des localiseurs fondamentaux dans* Cat.)

c) *On a de plus, pour la condition la plus faible* D_{W_0}, *l'implication*

$$\mathrm{D}_{W_0} \implies \mathrm{F},$$

où $\mathrm{F} =$ Loc (7 F) *est la condition que* Cat *possède suffisamment de* W*-fibrations,* i.e. *que c'est une catégorie de fibrations pour* (W, Fib_W).

[page 60]

② *Si* W *et* W_0 *satisfont à* Loc (8 bis) *(axiome des limites dénombrables), alors* $\mathrm{D}_{W_0} \implies$ A, i.e. *les 8 conditions envisagées sont équivalentes. Donc si* W *satisfait* Loc (8 bis), *considérant le plus petit localiseur fondamental* W_L *satisfaisant à* Loc (8 bis) *(de sorte que* $W \supset W_L$*), on voit que les huit conditions*

$$\mathrm{A},\ \mathrm{B},\ \mathrm{C},\ \mathrm{D},\ \mathrm{A}_{W_L},\ \mathrm{B}_{W_L},\ \mathrm{C}_{W_L},\ \mathrm{D}_{W_L}$$

sont équivalentes[33]*. En particulier, sous la même hypothèse (fort anodine) sur* W*, les conditions* Loc (7) = Loc (7 a), Loc (7 b) *et* Loc (7 c) *sont équivalentes, et elles équivalent aussi à la condition* $\mathrm{D} = \mathrm{A}(\mathrm{Parf}_W)$, i.e. *à*

$$\mathrm{Parf}_W \subset \mathrm{Fib}_W \qquad (\textit{cas particulier de Loc (7 a)}),$$

et à ses deux variantes d'apparence plus faible $\mathrm{B}(\mathrm{Parf}_W)$, $\mathrm{C}(\mathrm{Parf}_W)$ *(cas particulier de* Loc (7 b) et de Loc (7 c) *respectivement).*

③ *Supposons que* W_0 *satisfasse à* Loc (8 bis) *(sans hypothèse particulière sur* W*). Alors les quatre conditions* A_{W_0}, B_{W_0}, C_{W_0}, D_{W_0} *sont équivalentes, et le diagramme d'implications de* 1°) *(p.* 59*) se réduit donc au diagramme linéaire* p. 35 [page 61]

$$\mathrm{A} \implies \mathrm{B} \implies \mathrm{C} \implies \mathrm{D} \implies \mathrm{D}_{W_0} \ (\iff \mathrm{A}_{W_0} \ldots),$$

dont le premier terme est Loc (7 a) = Loc (7)*, et le dernier équivaut à l'inclusion*

$$\mathcal{F}_{W_0} \subset \mathrm{Fib}_W,$$

cas particulier de A = Loc (7 a)*, ou encore à l'inclusion (en apparence plus forte)*

$$\mathrm{Fibf}_{W_0} \subset \mathrm{Fib}_W,$$

(cas particulier de la forme équivalente

$$\mathrm{Fibf}_W \subset \mathrm{Fib}_W,$$

de l'axiome Loc (6 a)).

④ *Enfin, on a les implications plus techniques conditionnelles suivantes.*

a) *Si* W_0 *satisfait à Loc (7 F), alors les conditions* A_{W_0}, B_{W_0}, C_{W_0} *sont équivalentes, donc le diagramme (4.4.13.5) se réduit au diagramme*

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{A} & & \\ \Downarrow & & \\ \mathrm{B} & & \\ \Downarrow & & \\ \mathrm{C} & \Longrightarrow & \mathrm{C}_{W_0} \\ \Downarrow & & \Downarrow \\ \mathrm{D} & \Longrightarrow & \mathrm{D}_{W_0} \ . \end{array}$$

b) *Si* W *est fortement saturé* (*axiome* Loc (1 ter)*, qui est satisfait dans la grande majorité des cas, et est même impératif pour construire un prédérivateur satisfaisant à l'axiome de localisation* Der 2) *et satisfait à* Loc (3 bis) (*axiome de localisation fort,* cf. §1)*, alors on a* $\mathrm{B} \implies \mathrm{A}$*, donc* [page 62]

$$\mathrm{A} \iff \mathrm{B},$$

i.e. Loc (7 a) = Loc (7) *équivaut à* Loc (7 b).


p. 36

DÉMONSTRATION. Tout ce qui est énoncé a été vu dans les pages précédentes, à la seule exception de 4°, b. Mais cette implication B $\Longrightarrow$ A pour W fortement saturé est prouvé dans XII (prop. 1, p. 54). Je rappelle que la démonstration utilise de façon essentielle le formalisme du prédérivateur HOT_W (construit et étudié surtout dans VI), et la théorie des foncteurs $f_!$, et notamment le résultat (valable si W satisfait à Loc (3 bis, 7 b)) que pour une flèche $f : S' \longrightarrow S$ dans W, la flèche correspondante

$$f^*_{\mathrm{lc}} : \mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S) \longrightarrow \mathrm{HOT}^{\mathrm{lc}}_W(S')$$

est une équivalence de catégories. Donc l'implication B $\Longrightarrow$ A, elle aussi, est un résultat qui n'a rien d'évident.

4.4.14. Je résume les implications obtenues jusqu'à présent, y compris les implications conditionnelles, dans le diagramme récapitulatif suivant : [page 63]



où j'ai cerclé la condition la plus forte et la plus importante de toutes, A = Loc (7), qui apparaît en deux extrémités opposées du diagramme.

Je voudrais encore faire un commentaire sur les ingrédients des résultats prouvés ici, et notamment de l'équivalence des huit conditions A à D_{W_0}, quand W et W_0 satisfont Loc (8 bis) : [page 64]

1) La théorie des *catégories de chemins* $\underline{\mathrm{Ch}}(X)$ (VII), s'appuyant sur celle des *morphismes lisses, propres, parfaits.*
2) Le lemme de K. S. BROWN (3.2.1, page 20).
3) Pour l'implication B $\Longrightarrow$ A, *i.e.* Loc (7 b) $\Longrightarrow$ Loc (7) (sous l'hypothèse W (1 ter, 3 bis)), j'utilise la théorie du prédérivateur Hot_W (VI), et plus particulièrement celle des foncteurs $f_!$ (définis sous la seule hypothèse W (3 bis), renforçant la condition automatique W (3) (faisant partie de la définition d'un localiseur fondamental)).

Il est clair que je ne serais pas arrivé à y voir clair, sans le travail fondamental de K. S. BROWN. Il reste pourtant encore des questions ouvertes. Ainsi, si on ne suppose pas que W satisfasse à Loc (8 bis), mais au besoin à Loc (3 ter) (et je n'ai pas eu l'occasion encore de travailler avec un localiseur qui n'y satisfasse …), est-il vrai néanmoins que l'on a encore l'implication p. 37

$$\mathrm{D} \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{A},$$

de façon que les conditions A, B, C, D soient équivalentes (et en particulier Loc (7 c) implique déjà Loc (7) dans toute sa force) ? Il est clair dans tout cela que je ne me suis pas suffisamment attaché à développer des exemples et des contre-exemples. Sans compter qu'il me semble que tous les localiseurs fondamentaux sur Cat qu'on rencontre [page 65]

[33] N.B. La forme la plus faible, $\mathrm{D}_{W_{\mathrm{L}}}$, de ces conditions, est la relation $\boxed{\mathrm{Parf}_{W_{\mathrm{L}}} \cap W \subset W^{\mathrm{u}}.}$

"en pratique" satisfont déjà à Loc (8) et a fortiori à Loc (8 bis), donc pour eux on a bien l'implication escomptée. La même remarque s'applique à l'implication hypothétique

$$\mathrm{D}_{W_0} \overset{?}{\Longrightarrow} \mathrm{A},$$

sous hypothèse Loc (8 bis) sur W_0 et sur W. Un candidat évident pour un contre-exemple déjà à la première question serait W_ω = plus petit localiseur fondamental sur Cat, un qu'il est presque évident qu'il ne satisfait *pas* à Loc (8) ni même Loc (8 bis). Mais il n'y a aucune raison qu'il satisfasse non plus à F, de telle façon que (s'il n'y satisfait pas, donc non plus à D) l'implication D $\Longrightarrow$ A est bel et bien valable. Cela nous amène à la question, plus substantielle, si on n'aurait pas l'implication [page 66]

$$\mathrm{F} \overset{?}{\Longrightarrow} \mathrm{A} \ {}^{(34)},$$

du moins sous des conditions convenables assez anodines sur W, genre Loc (1 ter, 3 bis, 8 bis).

C'est sans doute là la question la plus substantielle et la plus intéressante qui est soulevée par le diagramme de la page 63, et qui ne fait plus appel à l'introduction d'un localiseur fondamental W_0 auxiliaire. Vu le lemme de Brown, il ne me semble pas absolument exclu qu'un tel miracle ait bel et bien lieu !

4.4.15 (Digression sur l'axiome Loc (6) des cofibrations.) Cela attire mon attention sur la question en quelque sorte duale : Si Cat a assez de W-*co*fibrations, *i.e.* si muni de (W, Cof_W) c'est une catégorie à cofibrations, cela implique-t-il déjà l'axiome Loc (6 a) (qui avait été dégagé, essentiellement, pour assurer qu'il en soit bien ainsi). La proposition 3.6. (p. 25) nous dit qu'il revient au même de prouver que, si W satisfait Cof, alors les carrés de M. V. ouverts sont W-cocartésien. Mais il me semble à présent que nous pouvons le [page 67] prouver, sous la seule condition supplémentaire Loc (3 bis) [(35)], laquelle assure l'existence des foncteurs $f_!$, et en particulier la construction de Holim d'un diagramme $\begin{array}{ccc} & & X_1 \\ X_0 & \nearrow & \\ & \searrow & \\ & & X_2 \end{array}$ p. 38

comme $\int \begin{array}{ccc} & & X_1 \\ X_0 & \nearrow & \\ & \searrow & \\ & & X_2 \end{array}$. Donc dire qu'un diagramme de $\mathcal{M}$ ouvert $\begin{array}{ccccc} & & X_1 & & \\ X_0 & \nearrow & & \searrow & \\ & & & & X \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & X_2 & & \end{array}$ est W-cocartésien, doit revenir à dire que la flèche canonique

$$\int \begin{array}{ccc} & & X_1 \\ X_0 & \nearrow & \\ & \searrow & \\ & & X_2 \end{array} \longrightarrow X$$

est dans W ; du moins si W est supposé fortement saturé. Or cela a été bel et bien vu dans XII 3.4 (théorème 4 et son *corollaire* 3, p. 149). Dans loc. cit. j'énonce les conclusions sous l'hypothèse que j'appelais W (7 bis) (l'actuel Loc (6)), mais je viens de vérifier que pour sa partie *directe,* donc aussi pour ses corollaires 1 à 3, on n'a pas besoin de cette [page 68] hypothèse (comme je l'indique en annotations marginales).

[34] C'est faux, *cf.* plus bas, l'implication Loc (7 D_{W_ω}) $\Longrightarrow$ Loc (7 F) est *stricte.*

[35] et peut-être, de plus, Loc (1 ter), *i.e.* W fortement saturée.

4.16. Le résultat que je viens de prouver (sans vérifier avec soin la démonstration) me paraît aussi délicat, qu'il est satisfaisant. Cela rend la "conjecture" hésitante de 4.4.14, savoir que

$$\mathrm{F} \overset{?}{\Longrightarrow} \mathrm{A} \qquad \text{donc} \qquad \mathrm{F} \Longleftrightarrow \mathrm{A}$$

en supposant que W satisfait Loc (1 ter, 3 bis, 8 bis), nettement plus engageante. Car on commence à s'habituer aux miracles les plus époustouflants …

Pourtant, je viens de vérifier que cette conjecture est fausse, sur l'exemple de

$$\mathbf{W}_0 = \{f \in \mathrm{Fl}(\mathrm{Cat}) \mid \pi_0(f) \text{ iso}\},$$

qui satisfait à F, mais pas à A, ni même à D_{W_ω}. Ainsi l'implication

$$\mathrm{D}_{W_\omega} \implies \mathrm{F}$$

et a fortiori les implications

$$\begin{cases} \text{Loc (7 a)} \implies \mathrm{F},\ \text{Loc (7 b)} \implies \mathrm{F},\ \text{Loc (7 c)} \implies \mathrm{F} \\ \mathrm{D}_{W_0} \implies \mathrm{F} \end{cases}$$

sont *strictes,* même en se limitant à des localiseurs fondamentaux W satisfaisant (comme $\mathbf{W}_0$) à

$$\text{Loc (1 ter, 2, 3 bis, 4, 5, 6 a, 8, 9)} \ {}^{(36)}.$$

p. 39
[page 69]

Que $\mathbf{W}_0$ satisfasse à cet ensemble d'axiomes se vérifie par AQT `[âne qui trotte]`. (**N.B.** Qu'il satisfasse à Loc (1 ter, 2, 3 bis) est déjà conséquence du fait que $\mathbf{W}_0$ est de la forme $W_{\mathbf{D}}$, où $\mathbf{D}$ ($= \mathbf{D}_{\mathbf{W}_0}$ en l'occurrence) est un prédérivateur satisfaisant Der (3, 4, 5), ce qui est bien le cas pour $\mathbf{D}_{\mathbf{W}_0}$, qui est un vrai *dérivateur.*) Il faut vérifier que tout f dans Cat se factorise en $f = pi$, avec $i \in \mathbf{W}_0$, p une $\mathbf{W}_0$-fibration. Or si $f : X \longrightarrow Y$, $I = \pi_0(X)$, on prend $\bar{X} = \coprod_{\alpha \in I} Y_{f(\alpha)}$, d'où une factorisation $f = pi$, où $\pi_0(i)$ est un isomorphisme, *i.e.* $i \in \mathbf{W}_0$, et où $p : \bar{X} \longrightarrow Y$ est, au dessus de la composante connexe Y_j de Y, donné par le produit $\bar{X}|Y_j \simeq Y_j \times \underbrace{\pi_0(f)^{-1}(j)}_{\text{catégorie discrète}}$. Le morphisme p est bien une $\mathbf{W}_0$-fibration, car grâce à Loc (4), il suffit de le vérifier sur chaque Y_j, et là c'est déduit d'une flèche $I_j \longrightarrow e$ (une $\mathbf{W}_0$-fibration) par changement de base $Y_j \longrightarrow e$.

D'autre part, que $\mathbf{W}_0$ ne satisfait *pas* même à D_{W_ω} a déjà été vu (I, p. 87), en réalisant [page 70]
l'application du n-revêtement $f : S^1 \longrightarrow S^1$ dans Cat par un morphisme W_ω-parfait (en fait, par une Cat-fibration localement triviale), chose très facile [37].

Je pense qu'à présent l'ensemble des différentes variantes de l'axiome des W-fibrations est à peu près compris, à cela près qu'il n'est toujours pas clair, en dehors de l'axiome

[36] **N.B.** $\mathbf{W}_0$ ne satisfait *pas* Loc (6 b), ni Loc (7 D_{W_ω}) (*cf.* plus bas), par contre Loc (7 F).

37. Autre façon de le voir : on *sait* (XII) que W (5, 7 D_W) $\implies W \subset \mathbf{W}_\infty$, or on a $\mathbf{W}_\infty \subset \mathbf{W}_0$, et l'inclusion est *stricte !*

Loc (8 bis), si les implications du diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{A} & \Longrightarrow & \mathrm{A}_{W_0} \\ \Downarrow & & \Downarrow \\ \mathrm{B} & \Longrightarrow & \mathrm{B}_{W_0} \\ \Downarrow & & \Downarrow \\ \mathrm{C} & \Longrightarrow & \mathrm{C}_{W_0} \\ \Downarrow & & \Downarrow \\ \mathrm{D} & \Longrightarrow & \mathrm{D}_{W_0} \end{array}$$

sont strictes ou non. Mais il me semble que tous les localiseurs fondamentaux intéressants rencontrés jusqu'à présent satisfont Loc (8), et même Loc (1 ter, 2, 3 bis, 4, 5, 6 a, 8, 9) (peut-être même Loc (7 F) - il faudrait que je teste sur les $\mathbf{W}_n$), donc la perplexité non résolu me paraît sans grande conséquence. ?

[page 71]

p. 40

5 Axiome des limites Loc (8), et l'axiome Loc (9) d'accessibilité

C'est l'axiome :

Loc (8) W est stable par $\varinjlim$ filtrantes.

Une variante affaiblie utile est la suivante :

Loc (8 bis) W est stable par $\varinjlim$ dénombrables.

Explicitement, si on a deux systèmes inductifs filtrants dans Cat

$$\underline{X} = (X_i)_{i\in I}$$
$$\underline{Y} = (Y_i)_{i\in I},$$

et une flèche

$$\underline{f} = (f_i)_{i\in I} : \underline{X} \longrightarrow \underline{Y},$$

donnée par des $f_i : X_i \longrightarrow Y_i$, posant $X = \varinjlim X_i$, $Y = \varinjlim Y_i$, $f = \varinjlim f_i : X \longrightarrow Y$, Loc (8) nous dit que si les $f_i \in W$, alors $f \in W$. Ici I est une (petite) catégorie filtrante quelconque, et quitte à la remplacer par une catégorie cofinale, on peut supposer I un ensemble ordonné. L'axiome Loc (8 bis) correspond au cas où $I = \mathbf{N}$.

[page 72]

Notons que grâce à la construction de la catégorie des chemins, nous avons une factorisation, fonctorielle en f, de toute flèche $f : X \longrightarrow Y$ de Cat en $f = pi$:

$$X \xrightarrow{i=i_f} \bar{X}(f) = \bar{X} \xrightarrow{p=p_f} Y,$$

avec $i \in W_\omega$, $p \in \mathrm{Parf}_{W_\omega}$, a fortiori $i \in W$, $p \in \mathrm{Parf}_W$. Ce foncteur $f \longmapsto (\bar{X}(f), p_f)$ commute aux limites inductives. Ainsi, si on applique ceci à chacun des $f_\alpha : X_\alpha \longrightarrow Y_\alpha$, le factorisant en

$$X_\alpha \xrightarrow{i_\alpha} \bar{X}_\alpha \xrightarrow{p_\alpha} Y_\alpha,$$

on trouve un système inductif de diagrammes de type $\mathbf{\Delta}^2$ (factorisant les f_i), et en passant à la $\varinjlim$ on trouve

$$X \xrightarrow{i} \bar{X} \xrightarrow{p} Y,$$

[page 73]

qui n'est autre que la factorisation canonique de $f = \varinjlim f_i$ en pi, avec $i \in W_\omega$, $p \in \mathrm{Parf}_{W_\omega}$ (N.B. Alors que ni W_ω, ni Parf_{W_ω} ne sont stables par $\varinjlim$ filtrantes, à coup sûr !). On a donc $i \in W$, et la condition $f \in W$, *i.e.* $pi \in W$, équivaut donc à $p \in W$. Cela nous ramène, pour vérifier l'axiome Loc (8) (resp. Loc (8 bis)) au cas où les f_i sont dans Parf_{W_ω}.

Supposons maintenant que W satisfasse à D_{W_ω} (la plus faible de toutes les variantes envisagées ici de l'axiome des W-fibrations Loc (7), à la seule exception de F). Alors on a

$$p \in W \qquad \Longleftrightarrow \qquad \text{les fibres de } p \text{ sont } W\text{-asphériques},$$

l'implication $\Longrightarrow$ résultant de l'hypothèse D_{W_ω} $\mathrm{Parf}_{W_\omega} \cap W \subset W^{\mathrm{u}}$, et $\Longleftarrow$ résultant du p. 41
sorite des morphismes W-lisses *etc.*, via Loc (3). De même, l'hypothèse que les $f_i \in W$ équivaut à celle que les fibres des p_i sont W-asphériques. D'autre part, il est immédiat que toute fibre de p est isomorphe à la $\varinjlim_I$ des fibres correspondantes des p_α. De cette [page 74]
façon, on trouve :

Proposition 5.1. *Supposons que W satisfasse l'axiome des W-fibrations* Loc (7 D_{W_ω}) (*ce qui est donc le cas s'il satisfait un des axiomes plus forts* Loc (7 a *ou* b *ou* c)). *Pour que W satisfasse à* Loc (8) (resp. *à* Loc (8 bis)), *il faut et il suffit que l'ensemble des objets dans* Cat *qui sont W-asphériques soit stable par $\varinjlim$ filtrante* (resp. *par $\varinjlim$ de suites dénombrables*).

5.2. Notons que la catégorie Cat est un paratopos, a fortiori elle est *accessible* (*cf.* XVIII, §8), et il en est donc de même de $\underline{\mathrm{Fl}}(\mathrm{Cat})$. Ainsi on a dans $\mathrm{Fl}(\mathrm{Cat}) = \mathrm{Ob}\,\underline{\mathrm{Fl}}(\mathrm{Cat})$ la notion de *partie accessible.* On dira donc qu'une partie W de $\mathrm{Fl}\,\mathrm{Cat}$ (plus généralement d'une catégorie $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$, où $\mathcal{M}$ est une catégorie accessible) est *accessible,* si elle l'est par rapport à la catégorie ambiante $\underline{\mathrm{Fl}}\,\mathrm{Cat}$. Ceci posé, l'axiome Loc (9) est le suivant. [page 75]

Loc (9) W est une partie *accessible* de $\mathrm{Fl}(\mathrm{Cat}) = \mathrm{Ob}\,\underline{\mathrm{Fl}}(\mathrm{Cat})$.

5.3. Rappelons que cette notion un peu technique se simplifie considérablement, si on suppose que W satisfait l'axiome de limites Loc (8). Alors W est accessible si et seulement si il existe une *petite* partie W_0 de $\mathrm{Fl}(\mathrm{Cat})$, telle que W soit la "L_1-enveloppe" de W_0, *i.e.* la plus petite partie de $\mathrm{Fl}(\mathrm{Cat})$ contenant W_0 et L_1-stable (*i.e.* stable par $\varinjlim$ filtrantes). S'il en est ainsi, il est clair qu'on peut prendre W_0 de la forme

$$W_\pi = W \cap \mathrm{Fl}_\pi(\mathrm{Cat}),$$

où π est un cardinal infini convenable, et où $\mathrm{Fl}_\pi(\mathrm{Cat}) \overset{\text{déf}}{=} \mathrm{Fl}(\underline{\mathrm{Cat}}_\pi)$, $\underline{\mathrm{Cat}}_\pi$ désignant la sous-catégorie strictement pleine de Cat formée des objets X tels que $\mathrm{card}\,X \leq \pi$ (où par définition, $\mathrm{card}\,X = \mathrm{card}\,\mathrm{Fl}\,X$).

Notons que la filtration qu'on vient de décrire sur Cat (indexée par les petits cardinaux [page 76]
infinis) n'est autre que sa filtration canonique, *i.e.* $\underline{\mathrm{Cat}}_\pi$ est la sous-catégorie pleine de Cat formée des objets π-accessibles de Cat, et de même dans $\underline{\mathrm{Fl}}(\mathrm{Cat})$. On trouve ainsi, grâce aux développements de XVIII, §13, la caractérisation suivante, que je rappelle ici pour mémoire (en me bornant pour simplifier au cas où W satisfait à Loc (8)) :

Proposition 5.3.1.[38] *Soit W une partie de* $\mathrm{Fl}(\mathrm{Cat})$ *stable par $\varinjlim$ filtrantes, et soient pour tout cardinal infini π, $W_\pi = W \cap \mathrm{Fl}_\pi(\mathrm{Cat})$, et $\underline{W}$, $\underline{W}_\pi$ les sous-catégories pleines correspondantes de* $\underline{\mathrm{Fl}}(\mathrm{Cat})$. *On dit que W est* π-accessible *si W est la L-enveloppe de W_π (donc W est accessible si et seulement s'il existe un cardinal infini π tel que W soit π-accessible). Ceci posé, les conditions suivantes sont équivalentes :*

a) *W est π-accessible.* p. 42

b) *Pour tout système inductif $(f_i)_{i\in I}$, L_1-π-adapté dans* $\underline{\mathrm{Fl}}\,\mathrm{Cat}$ (cf. *ci-dessous*), *de* [page 77]

38. *cf. loc. cit.* 13.36.

limite inductive f, on a $f \in W$ si et seulement si la sous-catégorie pleine I_W des $i \in ObI$ tels que $f_i \in W$ est cofinale dans I.

b′) (*Quand on a choisi, pour tout $f \in \mathrm{Fl}(\mathrm{Cat})$, une représentation L_1-π-adaptée de f comme* $\varinjlim$) : *Si $f \in W$, alors la sous-catégorie pleine I_W définie dans* b) *est cofinale dans I.*

Rappelons ici la notion de système inductif L_1-π-adapté. Il s'agit des conditions :

1°) I est grand devant π, et stable par $\varinjlim$ filtrantes de cardinal $\leq \pi$.

2°) Le foncteur $i \longmapsto x_i : I \longrightarrow \underline{\mathrm{Fl}}(\mathrm{Cat})$ commute aux $\varinjlim$ en question.

3°) Les x_i sont dans $\underline{\mathrm{Fl}}(\mathrm{Cat})_\pi \overset{\text{déf}}{=} \underline{\mathrm{Fl}}_\pi(\mathrm{Cat})$.

Notons que dans le cas d'un "paratopos parabélien" tel que Cat ou $\underline{\mathrm{Fl}}\,\mathrm{Cat}$, il y a une façon canonique, π étant donné, de représenter un objet f comme $\varinjlim$ d'un système inductif L_1-π-adapté. Ici,

$$f : X \longrightarrow Y$$

étant donné, on considère l'ensemble I des couples $(X_i \subset X, Y_i \subset Y)$ de sous-catégories [page 78]
de X et de Y, telles que l'on ait $X_i, Y_i \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{Cat}_\pi$ (*i.e.* $\mathrm{card}\,(X_i), \mathrm{card}\,(Y_i) \leq \pi$) et que $f(X_i) \subset Y_i$. Il est immédiat que I est filtrant, pour la relation d'ordre évidente

$$(X_i, Y_i) \subset (X_j, Y_j) \qquad \Longleftrightarrow \qquad X_i \subset Y_i \ \text{ et } \ X_j \subset Y_j,$$

et même grand devant π, que I est stable par $\varinjlim$ filtrantes de cardinal $\leq \pi$, et que le foncteur

$$i \longmapsto (f_i : X_i \longrightarrow Y_i) : I \longrightarrow \underline{\mathrm{Fl}}\,\mathrm{Cat}$$

commute auxdites $\varinjlim$, enfin les f_i sont dans $\underline{\mathrm{Fl}}(\mathrm{Cat})_\pi$ par construction. Ainsi on a un système inductif L_1-π-adapté, et il est clair que sa limite inductive est canoniquement isomorphe à f. Ceci vu :

Corollaire 5.3.2. *La condition que W soit π-accessible signifie donc que pour tout $f : X \longrightarrow Y \in W$, et pour toute sous-catégorie X_i de X et Y_i de Y, de cardinal $\leq \pi$ (avec $f(X_i) \subset Y_i$), mais en fait c'est inutile, quitte à agrandir Y_i), il existe des sous-catégories $X_j \supset X_i$ et $Y_j \supset Y_i$ de cardinal $\leq \pi$, telles que f induise $f_j : X_j \longrightarrow Y_j$ et que l'on ait* [page 79]
$f_j \in W$.

La notion d'accessibilité de W me semble aussi bien comprise que celle de limites, je n'y vois plus aucun mystère. D'autre part, il me semble que tous les localiseurs fondamentaux utilisés à ce jour y satisfont (tout comme à l'axiome Loc (8)). Ici, je vais me borner à établir :

Théorème 5.4. [39] *Le localiseur fondamental $\mathbf{W}_\infty$ (équivalences faibles "habituelles") satisfait à l'axiome* Loc (9) (*en fait, il satisfait à* tous *les axiomes vu jusqu'à présent, savoir* Loc (1 ter, 2, 3 bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9)). *Plus précisément, $\mathbf{W}_\infty$ est $\aleph_0$-accessible (où $\aleph_0$, ou π_0, est le premier cardinal infini).* p. 43

Je ne reviens pas ici sur la vérification des autres axiomes, et me borne à prouver Loc (9), l'accessibilité, en utilisant ce qui peut m'être utile. Je me borne à indiquer [page 80]
la démonstration (assez technique) dans ses grandes lignes. Pour le moment, W est à nouveau un localiseur fondamental quelconque, sauf qu'il satisfait à Loc (8).

Lemme 5.5. [40]

39. Mérite bien le nom de *théorème,* surtout si on y inclut toute la liste des axiomes Loc mentionnés ci-contre ! Ce théorème n'a rien d'évident, à partir de la définition cohomologique de $\mathbf{W}_\infty$ - c'est un résultat ("bien connu") qui me paraît profond.

40. On suppose que W satisfasse à Loc (8).

a) *Pour que le critère* 5.3.1 b) *de π-accessibilité de W soit satisfait, il faut et il suffit qu'il le soit lorsque les f_i sont W_ω-parfaits.*

b) *Supposons que $Parf_{W_\omega} \cap W \subset W^u$,* i.e. *que W satisfait à* Loc (7 D_{W_ω}) (*la plus faible des variantes de l'axiome des W-fibrations, à l'exception seulement de* Loc (7 F)). *Supposons de plus (pour être tranquille) que W satisfait* `[phrase non terminée]`. `[?Alors]` *W est π-accessible si et seulement si l'ensemble* $\mathrm{Asph}_W \subset \mathrm{Ob}\,\mathrm{Cat}$ *des objets W-asphériques de* Cat *est π-accessible. Ou encore, que la partie* $\mathrm{Asph}_W \subset \mathrm{Ob}\,\mathrm{Cat}_{0\text{-connexe}}$ *soit π-accessible, où* $\mathrm{Cat}_{0\text{-connexe}}$ *désigne la sous-catégorie pleine de* Cat *formée des objets* 0*-connexes.*

Pour l'essentiel, la démonstration est la même que celle de 5.1, en un peu plus technique. L'outil essentiel est toujours la factorisation fonctorielle $f = pi$ d'une flèche de Cat, avec $i \in W_\omega$, $p \in \mathrm{Parf}_{W_\omega}$, et la propriété de commutation aux $\varinjlim$ filtrantes de ladite factorisation. [page 81]

Revenons maintenant au cas de $W = \mathbf{W}_\infty$. On doit prouver que $\mathrm{Asph}_{\mathbf{W}_\infty} \subset \mathrm{Ob}\,\mathrm{Cat}_{0\text{-connexe}}$ est π_0-accessible. Donc à prouver le critère correspondant à 5.3.1 b), en se plaçant maintenant dans $\mathrm{Cat}_{0\text{-connexe}}$ au lieu de Fl Cat. On a donc

$$X = \varinjlim_{i \in I} X_i,$$

représentation L_1-π-admissible de X $\mathbf{W}_\infty$-asphérique, à prouver que pour tout i dans I, $\exists j$ dans I et $i \longrightarrow j$, avec X_j $\mathbf{W}_\infty$-asphérique.

J'admets ici le lemme AQT `[âne qui trotte]` :

Lemme 5.6. *Soit* $\mathbf{W}_0 = \{f \in \mathrm{Fl}\,\mathrm{Cat} \mid \pi_0(f) \ \ \textit{isomorphisme}\}$. *Alors* $\mathbf{W}_0$ *est π_0-accessible (et L_1-stable). A fortiori, l'ensemble des objets* 0*-connexes de* Cat *est π_0-accessible.*

Ceci nous ramène, quitte à remplacer I par une catégorie cofinale, à supposer que les X_i sont 0-connexes. (Mais j'ai oublié que cette réduction est déjà faite ! Donc il faut voir 5.6 comme ingrédient

de la démonstration de 5.5 b).) p. 44

Soit x un objet (point) de X, x_i son image dans X_i. Considérons (via ma construction standard des catégories de chemins) les $\Omega^1(X, x)$, $\Omega^1(X_i, x_i)$. On trouve [page 82]

$$\Omega^1(X, x) \simeq \varinjlim_{I} \Omega^1(X_i, x_i),$$

et on vérifie que c'est là encore un système inductif L_1-π_0-adapté. En itérant, on trouve pour $n \in \mathbf{N}^*$

$$\Omega^n(X, x) \simeq \varinjlim_{I} \Omega^n(X_i, x_i),$$

limite inductive L_1-π_0-adaptée. Utilisant 5.6, on en conclut que pour tout n, le sous-ensemble (supposons I un ensemble ordonné, que diable ça suffit !)

$$I_n = \{i \in I \mid \Omega^n(X_i, x_i) \ \text{ est 0-connexe}\}$$

est cofinal dans I, de plus il est stable par $\varinjlim$ filtrantes de cardinal $\leq \pi_0$. Donc

$$I_\infty \overset{\text{déf}}{=} \bigcap I_n$$

est aussi cofinal dans I (*cf.* XVIII, 13.10.2, p. 302).

Or $i \in I_\infty$ signifie que tous les $\Omega^n(X_i, x_i)$ sont 0-connexes, ce qui signifie aussi que X_i est $\mathbf{W}_\infty$-asphérique (puisqu'il est déjà 0-connexe) (*cf.* XII, cor. p. 190). Cela achève la démonstration du théorème 5.4. [page 83]

6 La condition Loc (5, 7 D_{W_ω}) implique $W \subset \mathbf{W}_\infty$

Je vais redonner ici, pour mémoire, la démonstration du théorème 1 de XII :

Théorème 6.1. *Soit W un localiseur fondamental satisfaisant à* D_{W_ω} *(où W_ω est le plus petit de tous les localiseurs fondamentaux). Alors on a $W = \mathrm{Fl}\,\mathrm{Cat}$,* ou *$W \subset \mathbf{W}_\infty$ (suivant que W ne satisfait pas à l'axiome de connexité* Loc (5)*, ou qu'il y satisfait.)*

Je vais faire la démonstration en supposant que W satisfait à Loc (5). Pour la démonstration du fait que dans le cas contraire, on a $W = \mathrm{Fl}(\mathrm{Cat})$, je renvoie à XII, th. 2, p. 20. (Voir aussi le résultat très voisin, plus général et plus faible, rappelé dans prop. 2.7, page 12.)

Lemme 6.2. *Soient W, W' deux localiseurs fondamentaux, W satisfaisant à* Loc (7 D_{W_ω})*. Pour qu'on ait $W \subset W'$, il faut et il suffit qu'on ait* $\mathrm{Asph}_W \subset \mathrm{Asph}_{W'}$.

[page 84]

Il suffit bien sûr de prouver "il suffit", donc supposons que tout objet W-asphérique est W'-asphérique, et prouvons que $W \subset W'$. Soit donc $f : X \longrightarrow Y$ dans W, prouvons $f \in W'$. Pour ceci, j'utilise la factorisation canonique $f = pi$,

$$X \xrightarrow{i \in W_\omega} \bar{X} \xrightarrow{p \in \mathrm{Parf}_{W_\omega}} Y.$$

On a donc aussi $i \in W$, et comme $f = pi \in W$, on a $p \in W$, donc $p \in \mathrm{Parf}_{W_\omega} \cap W$. Or D_{W_ω} signifie que cet ensemble est contenu dans W^{u}, donc on a $p \in W^{\mathrm{u}}$, et en particulier les fibres de p sont W-asphériques. Elles sont donc W'-asphériques, et comme p est W_ω-parfait et a fortiori W'-parfait, il s'ensuit que $p \in W'$. On a aussi $i \in W_\omega \subset W'$, donc $i \in W'$, donc aussi $f = pi \in W'$, q.e.d.

p. 45

Revenons alors à la démonstration de 6.1. En vertu du lemme, il suffit de prouver que si X dans Cat est W-asphérique, il est $\mathbf{W}_\infty$-asphérique. Mais par hypothèse Loc (5) on sait déjà que X est 0-connexe, et choisissant un point x dans X, qu'il soit $\mathbf{W}_\infty$-asphérique s'exprime par la condition que les $\Omega^n(X, x)$ (pour $n \geq 1$) sont 0-connexes (*cf.* XII, cor. p. 190 déjà cité). Pour ceci, à cause de Loc (5) il suffit de prouver qu'ils sont W-asphériques, et par induction il suffit de prouver que $\Omega^1(X, x)$ l'est. Or par définition de $\Omega^1(X, x)$, c'est là la fibre en x d'une flèche dans Cat

[page 85]

$$E = \underline{\mathrm{Ch}}(X, x, -) \xrightarrow{p \in \mathrm{Parf}_{W_\omega}} X,$$

où la source E est W_ω-asphérique, a fortiori W-asphérique. Comme X l'est également, on a donc $p \in W$, donc $p \in \mathrm{Parf}_{W_\omega} \cap W \subset W^{\mathrm{u}}$, donc p est à fibres W-asphériques, et en particulier $\Omega^1(X, x)$ est W-asphérique, q.e.d.

Corollaire 6.3. (Caractérisation de $\mathbf{W}_\infty$.) $\mathbf{W}_\infty$ *est le plus grand localiseur fondamental satisfaisant à* Loc (5, 7 D_{W_ω}) *- donc aussi le plus grand localiseur fondamental satisfaisant à* Loc (5, 7).

Je pense que nous trouverons plus bas une caractérisation "interne" de $\mathbf{W}_\infty$, via un "axiome de descente" (très fort) Loc (10), comme l'unique localiseur fondamental satisfaisant Loc (5, 7 D_{W_ω}, 10) (ou encore Loc (5, 7, 10)).

[page 86]

6.4. *Commentaire sur les axiomes des W-fibrations du types* Loc (7 …)*, et notamment sur* Loc (7 D_{W_ω})*. Relation conjecturale avec les* "types d'homotopie simples" *de* Whitehead.

a) Il me semble que *tous* les localiseurs fondamentaux avec lesquels on a travaillé tacitement jusqu'à présent (les $\mathbf{W}_n$ ($n \in \mathbf{N}^*$), équivalence homologique et cohomologique, équivalence rationnelle …) correspondent à des localiseurs $W \supset \mathbf{W}_\infty$. Par le théorème 6.1, il s'ensuit donc qu'*aucun* d'eux, à part $\mathbf{W}_\infty$ lui-même, ne satisfait à la plus faible version D_{W_ω} de toutes de l'axiome Loc (7 …), à la seule exception de Loc (7 F). Ainsi, les localiseurs W qui y satisfont sont à l'exception de D_{W_ω} lui-même, d'un type tout nouveau - des localiseurs qui sont strictement contenus dans $\mathbf{W}_\infty$.

b) Ceci soulève, bien sûr, la question de l'existence de localiseurs fondamentaux contenus dans $\mathbf{W}_\infty$ et distincts de $\mathbf{W}_\infty$. Je n'ai pas même prouvé que $W_\omega \neq \mathbf{W}_\infty$, alors [page 87] que je n'ai pas le moindre doute que tel est bien le cas. `[Cisinski a démontré que` $W_\omega = \mathbf{W}_\infty$`.]` A fortiori, j'ignore si le plus petit localiseur fondamental satisfaisant Loc (7 D_{W_ω}) est différent de $\mathbf{W}_\infty$. Je serais tout particulièrement intéressé par le plus petit localiseur $\tilde{\mathbf{W}}_\infty \subset \mathbf{W}_\infty$ satisfaisant tous les axiomes de stabilité Loc (1 ter, 2, 3 bis, 4, 6, 7, 8) (**N.B.** il satisfait nécessairement Loc (5) car $\tilde{\mathbf{W}}_\infty \subset \mathbf{W}_\infty \subset \mathbf{W}_0$, de plus Loc (7) p. 46 équivaut, en présence de Loc (8), à la forme très faible Loc (7 D_{W_ω}) : $\mathrm{Parf}_{W_\omega} \cap W \subset W^{\mathrm{u}}$. Enfin, on montre que Loc (4) est conséquence des autres axiomes, *cf.* plus bas.) Je conjecture à présent que $\tilde{\mathbf{W}}_\infty$ (qui donne lieu à un formalisme homotopique tout aussi complet que la sempiternelle "équivalence faible") est bel et bien différent de $\mathbf{W}_\infty$ `[non par Cisinski]`. Et je suspecte que la catégorie $\mathrm{Hot}_{\tilde{\mathbf{W}}_\infty}$ mérite d'être appelée catégorie [page 88] des *"types d'homotopie simples"* (à la Whitehead) [41]. Un premier test décisif, c'est de vérifier que l'invariant cohomologique principal de Whitehead d'un type d'homotopie simple, savoir un élément dans un $K(\mathbf{Z}[\pi_1])$ (si je me rappelle bien [42]) - ou quelque chose d'approchant, peut se définir déjà en termes des objets dans $\mathrm{Hot}_{\bullet\,\tilde{\mathbf{W}}_\infty}$ (le Hot pointé). Et deuxio, si on associe à une "maquette simpliciale" finie (décrivant combinatoirement une triangulation finie) l'ensemble ordonné de ses simplexes, vu comme un objet de Cat, et l'objet correspondant dans $\mathrm{Hot}_{\tilde{\mathbf{W}}_\infty}$, celui-ci ne change pas [43], à isomorphisme canonique près, quand on effectue sur ce "polyèdre" envisagé une opération élémentaire à la [page 89] Whitehead. Cela suggère d'ailleurs d'essayer de définir de telles opérations élémentaires dans Cat tout entier, ou tout au moins dans la sous-catégorie des (petits) ensembles ordonnés, dans l'espoir de parvenir (peut-être) à une construction plus directe du localiseur pertinent pour le type d'homotopie simple.

c) Je termine par un commentaire sur le sens de l'axiome Loc (7 D_{W_ω}), par opposition avec l'axiome plus faible Loc (7 F) qui assure seulement l'existence d'une "structure à fibrations" (W, Fib_W) sur Cat. Je signale aussi en passant que Loc (7 F), tout comme Loc (5) et comme Loc (9), et à la différence de tous les autres axiomes passés en revue jusqu'à présent, n'est *pas* un axiome de stabilité : il affirme, non que certaines flèches (sous des hypothèses convenables) sont dans W, mais l'existence d'une factorisation. Aussi il n'est nullement clair que l'intersection de deux localiseurs fondamentaux satisfaisant à Loc (7 [page 90] F) y satisfasse.

Loc (7 D_{W_ω}) est exactement ce qu'il faut pour assurer que la factorisation canonique d'une flèche $f : X \longrightarrow Y$ de Cat en $f = pi$, avec $i \in W_\omega$, $p \in \mathrm{Parf}_{W_\omega}$, est aussi une factorisation du type stipulé par l'axiome de factorisation Loc (7 F) : on a (bien sûr) $i \in W$, mais aussi $p \in \mathrm{Fib}_W$ (car D_{W_ω} équivaut à sa forme forte $\mathrm{Parf}_{W_\omega} \subset \mathrm{Fib}_W$). Cela signifie aussi que la factorisation canonique de f peut être utilisée pour "calculer" ses fibres homotopiques, non seulement en les points de Y, mais aussi par rapport à un morphisme de changement de base $Y' \longrightarrow Y$.

En l'absence de cet axiome, admettant seulement Loc (7 F), on sait qu'il existe [page 91] une théorie des fibres W-homotopiques, mais on n'a a priori aucun moyen pratique pour p. 47 "calculer" lesdites fibres, faute de disposer d'un critère maniable suffisant pour assurer $p \in \mathrm{Fib}_W$. J'ai donc l'impression que l'axiome Loc (7 F) va être d'un maigre usage. (Il est vrai que l'exemple de $\mathbf{W}_0$ devrait me rendre prudent ! Il me faudrait regarder le cas des $\mathbf{W}_n$, s'ils satisfont Loc (7 F) …). À mon sens, l'axiome Loc (7 D_{W_ω}) est l'exact "minimum vital" pour être à l'aise dans le maniement des fibres W-homotopiques. Il est remarquable

[41] Canulé (?), *cf.* commentaire page 92.

[42] non, c'est un invariant plus fin …

[43] C'est évident même pour W_ω, puisque le type d'homotopie *stricte ne change pas !* - Non, il y a ici confusion entre homotopie topologique et homotopie combinatoire, *cf.* p. 92 …

que ceci implique qu'on doive avoir $W \subset \mathbf{W}_\infty$, et que cela exclut du même coup *toutes* les variantes considérées à ce jour de la notion de type d'homotopie !

[page 92]

6.5. Finalement, la relation entrevue avec les "types d'homotopie simples" de WHITEHEAD s'évanouit [44] : en effet, ces derniers sont strictement plus fin que les types d'homotopie (*stricts*) ordinaires, et l'invariant de Whitehead n'est *pas* un invariant du type d'homotopie ordinaire. Il est vrai que lorsqu'on considère le squelette simplicial d'un polyèdre triangulé comme objet de Cat, l'homotopie (continue) ordinaire entre deux tels polyèdres s'interprète, dans Cat, non pas (me semble-t-il) par l'existence d'un homotopisme entre les objets correspondants de Cat, mais par leur isomorphie dans $\mathrm{Hot}_{\mathbf{W}_\infty} \overset{\text{déf}}{=} \mathrm{Cat}(\mathbf{W}_\infty)^{-1}$. Mais le procédé d'approximations simpliciales de BROUWER montre que si les polyèdres X et Y sont homotopes, alors il existe des subdivisions simpliciales X' et Y' de X et de Y qui sont "combinatoirement homotopes" (dans un sens convenable). Donc je présume que les maquettes simpliciales de X' et de Y' sont alors homotopes dans Cat. Il s'ensuivrait que X et Y, j'entends leurs maquettes, sont bien homotopes dans Cat, s'il est vrai qu'une subdivision simpliciale (il suffirait la subdivision barycentrique, en itérant …) X' de X a une maquette dans Cat qui lui est homotope. La question soulevée ici me paraît intéressante, il faut visiblement en trouver la réponse. Elle se pose déjà pour tout ensemble ordonnée I, qu'on va supposer fini pour simplifier, en prenant l'ensemble (ordonné par inclusion) $I' = \mathrm{sd}(I)$ des parties totalement ordonnées de I. On sait que les réalisations topologiques de I et de $\mathrm{sd}(I)$ sont canoniquement isomorphes, mais I et $\mathrm{sd}(I)$ sont-ils homotopes dans Cat ? On a bien une application croissante canonique

[page 93]

$$f : \mathrm{sd}(I) \longrightarrow I,$$


qui associe à toute partie totalement ordonnée de I son plus grand élément. Mais existe-t-il une application croissante en sens inverse, qui soit un homotopisme inverse du précédent à homotopie près ? Je viens de vérifier dans le cas

[page 94]

manque

[page 95]

du bord du 2-simplexe




ou



,

subdivision barycentrique

p. 48



ou



(hexagone), que pour toute application croissante $g : I \longrightarrow \mathrm{sd}(I)$, sa réalisation topologique est homotope à une application constante, donc g ne peut être un homotopisme dans Cat (car cela impliquerait que sa réalisation topologique est un homotopisme).

Ceci montre donc que la notion d'homotopisme dans Cat est *strictement plus fine* que celle pour les réalisations topologiques, ce qui redonne à nouveau substance à l'espoir que l'invariant de Whitehead pourrait se définir comme invariant d'homotopie sur Cat, ou du moins sur une sous-catégorie pleine convenable, telle celle des ensembles ordonnés (éventuellement restreints à être finis), ou des maquettes simpliciales. Et même, que l'ensemble des Wh-types d'homotopie (types d'homotopie simples) peut se plonger canoniquement dans un Hot_W convenable, où W serait un localiseur fondamental strictement plus fin que $\mathbf{W}_\infty$, p.ex. (qui sait ?) $\tilde{\mathbf{W}}_\infty$. Le premier travail qu'on aurait envie de faire, c'est de

[page 96]

[44] Mais peut-être quand même pas - la question reste ouverte.

construire un tel W *ad hoc*, pour que l'invariant de Whitehead puisse s'écrire comme un foncteur sur $\mathrm{Hot}_{\bullet W}$. Pour commencer, il faudrait déjà s'assurer que cet invariant peut être vu comme un invariant du type d'homotopie, *i.e.* qu'il s'interprète comme un foncteur sur $\mathrm{Hot}_\bullet\mathrm{Cat} \simeq \mathrm{Cat}(\underbrace{\text{homotop}}_{\substack{\text{ensemble des}\\ \text{homotopismes}}})^{-1}$. Ce travail suggérera peut-être aussi la définition des "invariants de Whitehead supérieurs" (impliquant les π_i, non seulement le π_1), lesquels pourraient peut-être servir (avec celui de dimension 1) à décrire le localiseur hypothétique W ("de Whitehead").

[page 97]

7 Commentaires sur les axiomes

7.1. La principale raison d'être d'un localiseur fondamental W, c'est de définir une théorie d'homotopie', et plus précisément un prédérivateur HOT_W, dont on espère que ce sera même un dérivateur, ou qu'il satisfasse du moins à certains des axiomes des dérivateurs. Les axiomes Loc (1) à Loc (9) sont en majeure partie orientés vers cet objectif, à cela près que Loc (1, 2, 3) constitue un "minimum vital" absolu, pour pouvoir commencer à travailler avec W. Les principales questions qui se posent me paraissent les suivantes :

1) Quand Cat munie de (W, Cof_W), resp. de (W, Fib_W), est-elle une catégorie à cofibrations resp. à fibrations, de façon que les résultats de K. S. Brown soient applicables ?

2) Sous quelles conditions, sur W et sur f, $f_!$ et f_* existent-ils ? Et quand a-t-on, de plus, exactitude des carrés cocartésiens resp. cartésiens ?

[page 98]

3) Plus généralement, en termes des axiomes imposés à W, quelles sont les axiomes Der (…) que sont vérifiés pour le prédérivateur HOT_W ? (Ce qui pourrait aussi dépendre du choix du domaine Diag $\subset$ Cat. Le prédérivateur est défini a priori sur Cat tout entier). En particulier,

p. 49

4) quand HOT_W est-il bel et bien un dérivateur sur Cat tout entier, *i.e.* quand satisfait-il à tous les axiomes ?

Une question qui me paraît moins importante (notamment que 1°) est la suivante :

1 bis) Quand W s'insère-t-il dans un triple de Quillen clos (W, C, F) (propre de préférence).

Je vais passer en revue ces questions une à une.

7.2. On a vu (mais sans que j'aie fait une vérification soigneuse pour la réciproque) que (W, Cof_W) définit une structure à cofibrations si l'axiome *Loc (6 a)* est satisfait, et que cette condition est aussi nécessaire si Loc (3 bis) est satisfait [45].

[page 99]

Alors les immersions ouvertes de Dwyer (ou au choix les immersions fermées de Dwyer) sont dans Cof_W, et la construction standard du mapping-cone définit, pour toute flèche f dans Cat, une factorisation *fonctorielle*

$$f = pi \quad \begin{array}{l} i \text{ immersion ouverte de Dwyer (donc dans } \mathrm{Cof}_W), \\ p \in W. \end{array}$$

[45] Vérifier quand même si Loc (3 bis) n'est pas déjà utilisé dans la partie directe ! **O.K.**

Cela, plus la construction du foncteur $f_!$, et en particulier des W-sommes amalgamées $\int X_0 \begin{smallmatrix} \nearrow X_1 \\ \searrow X_2 \end{smallmatrix}$, données dans VI (théorie de HOT_W) et XII, nous donne une maîtrise parfaite (il me semble) sur la "structure homotopique gauche" définie par W, sous le seul axiome Loc (6 a) (Axiome du cube, forme directe). Je rappelle que les foncteurs $f_!$ sont construits dans VI sous la seule hypothèse *Loc (3 bis)* (f flèche quelconque de Cat), mais sauf erreur, la construction et l'interprétation W-homotopique de $\int X_0 \begin{smallmatrix} \nearrow X_1 \\ \searrow X_2 \end{smallmatrix}$ donnée [page 100] dans XII ne dépend pas même de cette hypothèse[46] - mais je ne peux le garantir. Il me semble que XII (et notamment le long §5 sur les sommes amalgamées) est écrit sous l'hypothèse que W (1, 2, 3), *i.e.* Loc (1, 2, 3bis), sont satisfaits.

7.3. C'est une chose assez extraordinaire que les foncteurs $f_!$ pour HOT_W existent, sous la seule hypothèse *Loc (3 bis)* (axiome de localisation, forme forte) - et ils se "calculent" d'une façon féeriquement simple ! Je suis à peu près sûr que sous cette seule hypothèse, *l'axiome d'exactitude pour les carrés cocartésiens* n'est *pas* satisfait[47]. Je ne vois aucun moyen de le vérifier, sauf via la théorie de Brown, sous l'hypothèse *Loc (6 a)* (*cf.* 7.2).

Mais sous la seule condition Loc (3 bis) le calcul standard des fibres d'un $f_!(\xi)$ est p. 50 valable, en d'autre termes le prédérivateur HOT_W satisfait Der (4*, 5*) - et de plus Der [page 101] (6*) (exactitude "à gauche") si W satisfait Loc (6 a).

7.4. Venons-en à la question si Cat muni de (W, Fib_W) est une catégorie à fibrations. C'est l'axiome *Loc (7 F),* mais je ne connais guère de moyen de le vérifier (en dehors du cas très, très particulier $W = \mathbf{W}_0$) que moyennant tout au moins l'axiome *Loc (7 D_{W_ω}),* ou l'une ou l'autre des variantes plus fortes de Loc (7). De Loc (7 D_{W_ω}) il a été abondamment question précédemment, *cf.* notamment 6.4 (pages 89-91). En mon sens, cet axiome assure une maîtrise comparable sur la structure W-homotopique droite (fibres W-homotopiques, suites exactes de cosuspension) que Loc (6 a) pour la structure gauche. [page 102] En particulier, on a la factorisation *fonctorielle* de toute flèche f de Cat en

$$f = pi, \qquad i \in W_\omega \subset W,\ p \in \mathrm{Parf}_{W_\omega} \subset \mathrm{Fib}_W.$$

Mais *l'axiome Loc (7 D_{W_ω}) me paraît de nature considérablement plus forte que Loc (6 a),* lequel (si je ne m'abuse) est vérifié pour tous les localiseurs qui ont été envisagés jusqu'à présent. (Mais j'avoue n'avoir pas regardé le cas des $\mathbf{W}_n$, $n \in \mathbf{N}$, sauf $\mathbf{W}_0$.) Par contre, l'axiome Loc (7 D_{W_ω}) implique $W \subset \mathbf{W}_\infty$ (théorème 6.1), relation vraiment draconienne (*cf.* commentaire 6.4 a).

Par ailleurs, le seul axiome Loc (7 D_{W_ω}), pour autant que je sache, n'implique pas l'existence de f_* pour *toute* flèche dans Cat, mais seulement pour des flèches de la forme [page 103] $f \times \mathrm{id}_X : S \times X \longrightarrow T \times X$, où $f : S \longrightarrow T$ est un morphisme entre ensembles ordonnés finis. Ou plus généralement, entre ensembles ordonnés S, T tels que S° soit artinien, *i.e.* S noethérien, et que $\mathrm{Esp}(S^\circ)$ soit noethérien (cette dernière hypothèse étant inutile sous l'axiome Loc (8) des limites, *cf.* XVII, th. 3.1, p. 50). Donc ce n'est pas le résultat rêvé.

[46] *cf.* XII, page 264

[47] Il faudrait un exemple !

7.5. Le seul cas que je connaisse où f_* existe pour *toute* flèche dans Cat, est le cas où W satisfait à

$$\textit{Loc (6 a, 8, 9)} \quad {}^{(48)}\,{}^{(49)}, \tag{$*$}$$

c'est à dire l'axiome des W-cofibrations faibles, déjà abondamment mentionné et enfin ceux des limites et d'accessibilité, *i.e.* W est L_1-accessible dans $\underline{\mathrm{Fl}}(\mathrm{Cat})$. Le résultat-clef pertinent est donné dans XV 8.4 (p. 105-107), qu'il faut joindre à XV 7.4 (p. 98-99) pour en faire bon usage, et en déduire le théorème 10.1 (XV, p. 134-135). Mieux que l'existence [page 104] des f_*, l'ensemble d'axiomes étonnamment faible que je viens d'expliciter suffit à assurer que HOT_W est un *dérivateur* sur Cat tout entier, en plein sens du terme, *i.e.* qu'il satisfait à Der (1, 2, 3, 4, 5, 6, 4*, 5*, 6*). Ceci est obtenu en remplaçant (grâce à XV 8.4) Cat par $A^\wedge$, où A est une catégorie-test convenable, W par $W_A \subset \mathrm{Fl}\, A^\wedge$, et en prouvant que W_A p. 51 s'insère dans un triple de Quillen clos (W, C, F), avec $C = \mathrm{Mono}(A^\wedge)$, ce qui détermine F comme $(C \cap W_A)_*$. On applique alors XV 7.4 à cette situation (résultats résumés dans XIX, th. 2.3 (p. 19), 2.6 (p. 25), 2.9 (p. 28). On retrouve l'existence des $f_!$ (avec un mode de calcul bien différent de celui dans Cat !), et en plus on trouve l'existence de f_* (plus l'exactitude dans cor. [?] 5 des carrés W-cartésiens) - ce qui pour moi, pendant un bon [page 105] moment, était *le* gros problème pour la théorie de HOT_W !).

Je trouve époustouflant qu'on parvienne à un résultat aussi fort avec des axiomes aussi ridiculement faibles. Plus particulièrement, qu'on ait toutes les propriétés désirables de la structure homotopique droite, sans avoir à faire sur W aucune hypothèse du type W-fibration ! Ces axiomes n'impliquent *pas* l'axiome Loc (7) (équivalent à Loc (7 D_{W_ω}) en présence de Loc (8)), comme on a vu sur l'exemple de $\mathbf{W}_0$. Impliquent-ils tout au moins Loc (7 F), *i.e.* l'existence d'assez de W-fibrations ? Je ne hasarderais aucune conjecture à ce sujet ! Mais il faut bien se dire qu'en l'absence de Loc (7) (et même en admettant Loc (7 [page 106] F)), tout en sachant que la structure homotopique droite associée à W est parfaite à tous égards, on n'a a priori aucune maîtrise sur celle-ci, notamment pour le calcul des fibres W-homotopiques et la construction des carrés W-cartésiens. Même en ramenant toutes ces constructions à $A^\wedge$ (prenant, si on y tient, $A = \mathbf{\Delta}$, *i.e.* se ramenant au contexte semisimplicial), quoi qu'on sache qu'il y a une factorisation *fonctorielle* $f = pi$ avec $i \in \mathrm{TC} \subset W_A$, $p \in F \subset \mathrm{Fib}_{W_A}$, je ne vois aucune façon concrète de l'expliciter. À moins que la considération des chemins infinis, qui (en l'absence de Loc (7)) s'avère inopérante dans Cat sauve la mise dans $\mathbf{\Delta}^\wedge$? ?

[page 107]

Question qui devrait être facile à élucider, mais sur laquelle je ne veux pas m'attarder à présent.

Notons en passant que le résultat de saturation forte de Quillen, pour les triples de Quillen clos, montre que l'ensemble d'axiomes $(*)$ implique l'axiome Loc (1 ter), *i.e.* que W est *fortement saturé.*

Notons aussi que contrairement à ce qui a lieu pour les $f_!$, je ne sais prouver l'existence de f_*, et notamment des suites de cosuspension, que sous des conditions (soit Loc (7 D_{W_ω}), soit Loc (6a, 8, 9)) qui assurent déjà que les carrés W-cartésiens sont exacts, et par suite les suites de cosuspension exactes.

Je pense que dans les pages précédentes, j'ai dit tout ce que je sais dire de pertinent, concernant les questions 1, 2, 4 soulevées dans 7.1. Ces réponses me paraissent satisfai- [page 108] santes - plus satisfaisantes que je ne l'aurais osé espérer pendant les premiers deux mois de mes cogitations ! Il reste les questions 3 et 1 bis, que je vais à présent examiner.

7.6. Sur les différents axiomes des dérivateurs : sous quelles conditions sur W un de p. 52

[49] Vérifier s'il ne faut pas aussi la condition Loc (3 bis) en plus de Loc (6 a, 8, 9). Vérification faite, c'est O.K. (sans Loc (3 bis)).

[50] **N.B.** Après nouvelle réflexion, il apparaît qu'il suffit même Loc (6′ a, 8, 9).

ces axiomes est-il satisfait pour HOT_W [51] ? Pour ce qui est des axiomes Der (4, 5, 6, 4^*, 5^*, 6^*), je crois avoir dit tout ce que je sais en dire, et avoir des critères ce validité parfaitement maniables, dans les pages précédentes. Résumons pourtant :

$$\begin{cases} \text{structure à cofibrations} & : \text{Loc (6) (+ Loc (3 bis) ?)} \\ \text{structure à fibrations} & : \text{Loc (7 D}_{W_\omega}\text{)} \\ \text{Der (}4^*, 5^*\text{)} & : \text{Loc (3 bis)} \\ \text{Der (}4^*, 5^*, 6^*\text{)} & : \text{Loc (3 bis, 6a) ou Loc (6}'\text{ a, 8, 9)} \\ \text{Der (4, 5, 6) (sur Cat) (et tout le reste !)} & : \text{Loc (6}'\text{ a, 8, 9)} \\ \text{Der (4, 5, 6) (sur Diag = ens. ordonnés finis)} & : \text{Loc (7 D}_{W_\omega}\text{) (ou seulement Loc (7 F)).} \end{cases}$$

Il reste les axiomes Der (1) (décomposition), Der (2) (localisation), Der (3) (objet unité), que je vais passer à présent en revue. On vérifie de façon quasi-tautologique que [page 109] l'axiome Der 1 est satisfait sans condition sur W (pas même Loc (2, 3) !) - en fait, il est satisfait pour tout prédérivateur $\mathbf{D}_{(\mathcal{M},W)}$ défini par une catégorie de modèles.

L'axiome de localisation Der (2) est par contre de nature délicate. Il est valable, plus généralement, pour une catégorie de modèles $(\mathcal{M}, W)$ (définissant un prédérivateur $\mathbf{D} = \mathbf{D}_{(\mathcal{M},W)}$) et un objet S de Cat, lorsque $(\mathcal{M}(S), W(S))$ est associé à une structure à fibrations ou à cofibrations, ce qui par K. S. Brown implique que toute flèche de $\mathrm{HO}_W(S) = \mathcal{M}(S)W(S)^{-1}$ se "réalise" par une flèche de $\mathcal{M}(S)$ - et alors le résultat est évident. La condition que je viens de dire est satisfaite lorsque $(\mathcal{M}, W)$ lui-même est associé à une structure de cofibrations ou de fibrations, et si de plus on suppose que l'on [page 110] est dans l'un de deux cas suivants :

a) S est un ensemble ordonné fini (ce qui nous amène à nous restreindre, à défaut de mieux, à Diag = sous-catégorie de Cat formée des ensembles ordonnés finis).

b) La factorisation stipulée dans l'axiome de factorisation $f = pi$ (avec $i \in \mathrm{Cof}$, $p \in W$ (cas de cofibrations) ou $i \in W$, $p \in \mathrm{Fib}$ (cas de fibrations)) peut être choisie fonctorielle en f.

Or, dans le cas de Cat, dans les cas où on sait prouver que W est associé à une structure à cofibrations (axiome *Loc (6 a)*) où à fibrations (axiome *Loc (7 D_{W_ω})*), on trouve bel et bien une factorisation fonctorielle. Donc chacun de ces axiomes implique Der (2).

Reste l'axiome de contractibilité : si S dans Cat est contractile, est-il HOT_W-asphérique, *i.e.* le foncteur [page 111]

$$\mathrm{HOT}_W(e) = \mathrm{Hot}_W \longrightarrow \mathrm{HOT}_W(S)$$

est-il pleinement fidèle ? Quand on dispose de la théorie de $f_!$ "version Cat" (donc sous [p. 53] le seul axiome *Loc (3 bis)*), on trouve ceci (noté dans VI, p. 202) [52] :

> Soit $f : S \longrightarrow T$ une flèche dans Cat. Pour que ce soit une HOT_W-équivalence, *i.e.* pour que $f^* : \mathrm{HOT}_W(T) \longrightarrow \mathrm{HOT}_W(S)$ induise un foncteur *pleinement fidèle* sur la sous-catégorie des objets constants de $\mathrm{HOT}_W(T)$, il faut et il suffit que $\mathrm{hot}_W(f) : \mathrm{hot}_W(S) \longrightarrow \mathrm{hot}_W(T)$ soit un isomorphisme. Donc il *suffit* que $f \in W$, et cette condition est aussi nécessaire si W est fortement saturé (axiome Loc (1 ter)).

Par acquit de conscience, j'explicite ici la démonstration. L'existence des foncteurs $f_!$, en [page 112]

[51] Pour les axiomes Der (1) à Der (5^*), *cf.* I, p. 67-68. Les axiomes Der (6, 6^*) sont les axiomes d'exactitude, dont la nécessité m'est apparue seulement ultérieurement.

[52] moyennant Loc (3 bis).

particulier des objets d'homologie $H_\bullet^{\mathrm{HOT}_W}(S,\xi)$ (où simplement $H_\bullet^W(S,\xi)$) pour $\xi \in \mathrm{HOT}_W(e) = \mathrm{Hot}_W$, permet d'interpréter homologiquement la condition de HOT_W-équivalence, comme signifiant que pour tout $\xi = \mathrm{hot}_W(X)$ dans Hot_W, la flèche canonique dans Hot_W

$$H_\bullet^W(S,\xi) \longrightarrow H_\bullet^W(T,\xi) \qquad (*)$$

est un isomorphisme. Or le calcul des $f_!$ (dans le cas de $p : S \longrightarrow e$ et de $T \longrightarrow e$) nous montre que les deux membres de $(*)$ ne sont autres (à isomorphisme près) que $\mathrm{hot}_W(X \times S)$ et $\mathrm{hot}_W(X \times T)$, la flèche étant induite par

$$\mathrm{id}_X \times f : X \times S \longrightarrow X \times T. \qquad (*)$$

Donc la condition envisagée signifie que cette flèche est un isomorphisme dans Hot_W pour tout X dans Cat. Prenant $X = e$, on voit que cela implique que $\mathrm{hot}_W(f)$ est un isomorphisme, et cela suffit, vu que le foncteur $\mathrm{hot}_W : \mathrm{Cat} \longrightarrow \mathrm{Hot}_W$ commute aux produits finis (il suffit de Loc (1, 2, 3)) `[plutôt Loc (1, 2, 3 bis)]` et que la flèche $(*)$ dans Hot_W s'identifie à [page 113]

$$\mathrm{id}_{\mathrm{hot}_W(X)} \times \mathrm{hot}_W(f)\,.$$

Cela montre donc que si S est un objet W-asphérique, *i.e.* tel que $S \longrightarrow e$ soit dans W (et a fortiori, si S est contractile), alors $S \longrightarrow e$ est HOT_W-asphérique.

Pour résumer, on trouve le tableau

$$\begin{cases} \text{Der (1)} & : & \text{sans hypothèse sur } W \\ \text{Der (2)} & : & \text{Loc (6 a) } \textit{ou} \text{ Loc (7 D}_{W_\omega}\text{)} \\ \text{Der (3)} & : & \text{Loc (3 bis) } \textit{ou} \text{ Loc (6}' \text{ a, 8, 9)} \end{cases} \overset{(53)}{.}$$

7.7. Il faut seulement justifier encore que Loc (6′ a, 8, 9) implique Der (3). Mais alors, on l'a vu, HOT_W peut être défini par un triple de Quillen très spécial. Mais même pour un triple de Quillen spécial sans plus $(\mathcal{M}, W)$, le prédérivateur $\mathbf{D}$ qu'il définit satisfait (en plus de Der (4*, 5*, 6*)) aux conditions Der (1) (trivialement), Der (2)

(*cf.* p. 110, cas b)) et *de plus* Der (3). (Donc dans le cas d'un triple de Quillen *très* spécial, le prédérivateur obtenu est bel et bien un dérivateur.) Je vais expliciter ici la démonstration. p. 54 [page 114]

Je vais désigner par $(\mathcal{M}, \Sigma)$ la catégorie de modèles donnée ($\Sigma \subset \mathrm{Fl}\,\mathcal{M}$), par $\mathbf{D} = \mathbf{D}_{\mathcal{M},W}$ le prédérivateur correspondant, et par

$$W = W_D$$

le localiseur dans Cat associé, formé des "$\mathbf{D}$-équivalences". On voit tout de suite que W est fortement saturé (vrai pour tout $W_{\mathbf{D}}$, $\mathbf{D}$ un prédérivateur), *i.e.* satisfait Loc (1 ter), a fortiori Loc (1), d'autre part il satisfait à Loc (3 bis*), comme conséquence du fait que $\mathbf{D}$ satisfait à Loc (4*, 5*). A fortiori il satisfait à Loc (3*), et pour voir que tout X contractile dans Cat est W-asphérique, *i.e.* $X \longrightarrow e$ dans W, on sait (*cf.* §1) qu'il suffit de prouver qu'il en est ainsi si X a un objet initial (axiome Loc (2*) dual de l'axiome Loc (2)). À ce moment, on saura que W est un localiseur fondamental, et de plus il satisfait Loc (3* bis), donc aussi Loc (3 bis) (forme forte de l'axiome de localisation). [page 115]

Donc *on peut supposer* que si S a un objet initial, alors S est W-asphérique, *i.e.* $S \longrightarrow e$ est dans W, *i.e.* $p^* : \mathbf{D}(e) \longrightarrow \mathbf{D}(S)$ est pleinement fidèle. Il revient au même de dire que la flèche d'adjonction

$$p_! p^* \xi \longrightarrow \xi$$

[53] **N.B.** On verra plus bas que Loc (6 a, 8, 9) implique déjà Loc (3 bis).

est un isomorphisme, pour tout ξ dans $\mathbf{D}(e)$. Or le calcul de $p_!(\eta)$ (pour $\eta \in \mathrm{Ob}\,\mathbf{D}(S)$, *i.e.* $\eta \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}(S)$) se fait ainsi : on choisit une flèche

$$\eta' \xrightarrow{\Sigma_S} \eta$$

avec η' "cofibrant" (pour la structure à cofibrations pertinente sur $\mathcal{M}(S)$), et on pose[54] [page 116]

$$p_!(\mathrm{ho}_{W,S}(\eta)) = \mathrm{ho}_W(p_!(\eta')).$$

Quand $\eta = p^*(\xi)$, la flèche d'adjonction pertinente dans $\mathrm{Ho}_\Sigma = \mathbf{D}(e)$ s'obtient par composition

$$p_!(\eta') \longrightarrow p_!(p^*(\xi)) \xrightarrow{\text{adj.}} \xi, \qquad (*)$$

où ici $p_!$ est encore pris dans le sens ordinaire ($\mathcal{M}(S) \longrightarrow \mathcal{M}(e) = \mathcal{M}$). Or S ayant un objet initial 0, on a

$$\begin{aligned} p_!(\eta') &\simeq \eta'(0) \\ p_!(p^*(\xi)) &\simeq p^*(\xi)(0) \simeq \xi, \end{aligned}$$

et la flèche d'adjonction dans $(*)$ est l'identité, la première flèche est la flèche $\eta'(0) \longrightarrow \eta(0)$ induite par $\eta' \longrightarrow \eta$, elle est dans Σ, donc $(*)$ est dans Σ, donc c'est un isomorphisme dans $\mathrm{Ho}_\Sigma = \mathbf{D}(e)$, q.e.d.

Le même argument marche d'ailleurs si $\mathcal{M}$ est seulement une catégorie à cofibrations ou à fibrations, mais en se bornant alors au cas où S est un ensemble ordonné fini.

Je vais dégager à part ce qu'on vient d'obtenir : p. 55 [page 117]

Proposition 7.7.1. *Soit* $(\mathcal{M}, W)$ *une catégorie de modèles, associée à un triple de Quillen clos* spécial (W, C, F). *Alors le prédérivateur* $\mathbf{D} = \mathbf{D}_{\mathcal{M},W}$ *sur* Cat *satisfait aux axiomes* Der (1, 2, 3, 4*, 5*, 6*). *Si de plus le triple de Quillen est* très *spécial* (*donc en particulier* $C = \mathrm{Mono}(\mathcal{M})$), *alors il satisfait de plus à* Der (4, 5, 6), i.e. *c'est un dérivateur au plein sens du terme. D'autre part, le localiseur* $W = W_{\mathbf{D}}$ *dans* Cat *associé à* $\mathbf{D}$ (*dans le cas d'un triple de Quillen spécial sans plus*) *est un* localiseur fondamental, *satisfaisant de plus* Loc (1 ter, 3 bis).

N.B. Ce qui est dit ici pour le cas d'un triple de Quillen très spécial (qui ne fait pas appel à la théorie des localiseurs fondamentaux dans Cat) montre à nouveau que si [page 118] W localiseur fondamental dans Cat satisfait à Loc (6′ a, 8, 9), alors HOT_W est un vrai dérivateur. On a vu de plus dans 7.6 (page 111) que l'on a alors $W = W_{\mathrm{HOT}_W}$[55], donc il s'ensuit :

Corollaire 7.7.2 : *On a l'implication*

$$\text{Loc (6′ a, 8, 9)} \implies \text{Loc(1 ter, 3 bis)}\ ^{56}.$$

Notons aussi, pour mémoire :

Corollaire 7.7.3. *Soit* $(\mathcal{M}, W)$ *une catégorie de modèles, associée à une catégorie à cofibrations. Alors sur le domaine* Diag *formé des ensembles ordonnés finis, le prédérivateur* $\mathbf{D} = \mathbf{D}_{\mathcal{M},W}$ *satisfait aux axiomes* Der (1, 2, 3, 4*, 5*, 6*), *et dualement. Donc si* W *est associé à la fois à une structure de cofibrations et de fibrations,* $\mathbf{D}$ *est un dérivateur sur* Diag.

`[Les six lignes qui suivent semblent hors contexte.]` [page 119]

54. opération $p_!$ au niveau de $\mathcal{M}(S)$.
55. Mais c'était sous l'hypothèse Loc (3 bis) ! Gare au cercle vicieux.
56. Loc (3 bis) pas prouvé, probablement faux.

alors la flèche de changement de base

$$p^* f_! \longrightarrow f'_! q^*$$

entre foncteurs $\mathrm{HOT}_W(X) \longrightarrow \mathrm{HOT}_W(S')$ *est un isomorphisme.*

C'est pratiquement trivial, compte tenu, dans le cas f W-lisse, que si Z sur X est W-lisse sur X, il l'est sur S ; et dans le cas p W-propre, en utilisant le dernier énoncé ("oubli") dans ⑥, p. 199.

7.8. Je termine en mettant en vedette ce qui, à présent, me paraît la substance principale de tous ces "rappels" et comme la quintessence de la théorie des localiseurs fondamentaux développée jusqu'à présent : p. 56

$$\begin{cases} \text{Loc (3 bis)} & \Longrightarrow & \text{Der (4}^*\text{, 5}^*\text{)} \\ \text{Loc (3 bis, 6 a)} & \Longrightarrow & \text{Der (1, 2, 3, 4}^*\text{, 5}^*\text{, 6}^*\text{)} \\ \text{Loc (6}'\text{ a, 8, 9)} & \Longrightarrow & \text{tous les axiomes des dérivateurs (+ Loc (1 ter)).} \end{cases}$$

Je considère les axiomes Loc (3 bis), Loc (8), Loc (9) comme des axiomes "anodins" - tous les localiseurs qu'on définit par voie cohomologique ou homotopique ordinaire, y satisfont. Il reste l'axiome Loc (6 a) ou Loc (6′ a) des W-cofibrations (forme faible), qui [page 120] visiblement joue un rôle crucial dans la théorie de HOT_W. Par contre, les axiomes Loc (4) (décomposition), Loc (5) (connexité) et Loc (7) et ses variantes (et bien sûr aussi Loc (6 b)) n'interviennent absolument pas ! C'est particulièrement impressionnant, en ce qui concerne l'axiome des W-fibrations Loc (7) et ses variantes (toutes équivalentes à Loc (7) en présence de Loc (8), à la seule exception de Loc (7 F)). Comme on a vu, Loc (7) n'est nullement impliqué par Loc (6 a, 8, 9) ($\mathbf{W}_0$ n'y satisfait pas), tout au plus se pourrait-il que Loc (7 F) le soit. Il en est de même de l'axiome de connexité Loc (5), comme on voit sur l'exemple de $W = \mathrm{Fl}(\mathrm{Cat})$, qui satisfait à tous les axiomes vus jusqu'à présent, à la seule exception de Loc (5). Quant à la question de l'indépendance de l'axiome Loc (4) [page 121] par rapport à Loc (6 a, 8, 9), nous allons examiner ce genre de questions au paragraphe suivant.

L'ensemble d'axiomes Loc (6′ a, 8, 9) me paraît à présent si important, que j'ai envie de lui donner un nom, et d'appeler *localiseur* (fondamental) *spécial* dans Cat [57], un localiseur fondamental qui y satisfait. Ce sont donc aussi ceux pour lesquels nous savons que HOT_W est un vrai *dérivateur*. Si on ne peut écarter comme "pathologique" une structure aussi riche et délicate qu'un dérivateur, il s'ensuit aussitôt que l'on ne peut non plus écarter les localiseurs spéciaux dans Cat (même si on affecte de regarder de haut les localiseurs fondamentaux généraux !). En effet, W se récupère de façon unique à [page 122] l'aide de $\mathbf{D} = \mathrm{HOT}_W$, ou de tout dérivateur équivalent à celui-ci, comme l'ensemble des $\mathbf{D}$-équivalences dans Cat [58] : c'est le localiseur fondamental (correspondant à une notion d'équivalence "universelle", *i.e.* dans la catégorie Cat de tous les "espaces" élémentaires) canoniquement associé au dérivateur. Ce n'est donc nullement un localiseur de référence fixe assez fin, tel $\mathbf{W}_\infty$, qui est apte à jouer un rôle !

Cela nous amène à nouveau à une question du genre déjà soulevé : si $W \subset \mathbf{W}_\infty$ est le plus petit localiseur qui satisfait à Loc (6′ a, 8) (ou Loc (3 bis, 6′ a, 8)), peut-on dire a) que W est même *spécial*, *i.e.* satisfait également Loc (9) (accessibilité) ?, et de plus b) [page 123] a-t-on $W \neq \mathbf{W}_\infty$? Je suis persuadé que c'est le cas (il y a moins de mérite pour ce W-là d'être différent de $\mathbf{W}_\infty$, que pour le $\tilde{\mathbf{W}}_\infty$ envisagé dans 6.4 (p. 87)). p. 57

7.9. Oubli : la question 1 bis (p. 98), sur l'existence d'une structure de Quillen close sur Cat, correspondant à W. Le seul résultat que je connaisse dans ce sens est celui de

57. J'hésite si je ne dois pas rajouter l'axiome Loc (3 bis), qui assure que $W = W_{\mathbf{D}}$, $\mathbf{D} = \mathrm{HOT}_W$.
58. Mais ceci n'est prouvé que moyennant Loc (3 bis).

THOMASON, construisant explicitement une telle structure de Quillen (de plus propre), dans le cas où $W = \mathbf{W}_\infty$. Je n'ai pas vraiment regardé la démonstration de THOMASON, et ignore si celle-ci peut s'étendre à des localiseurs fondamentaux plus généraux, par exemple à ceux satisfaisant Loc ($6'$ a, 8, 9). S'il en était ainsi, cela prouverait d'ailleurs que ces localiseurs ont assez de cofibrations et assez de fibrations, donc qu'ils satisfont [page 124]
Loc (6 a) et Loc (7 F). (Pour ce qui est de Loc (6 a), il semble qu'on puisse le prouver directement très simplement, *cf.* le paragraphe suivant. Mais ici encore, il faudrait regarder quelques exemples (équivalences homologiques ou cohomologiques, $\mathbf{W}_n$, *i.e.* les n-équivalences d'homotopie), et regarder déjà si Loc (7 F) est satisfait.)

Il ne me semble pas que la théorie de THOMASON ait été jusqu'à présent [mots illisibles] être très utile, techniquement parlant. Psychologiquement, je crois qu'il a été important, pour donner confiance que Cat est vraiment une excellente catégorie de modèles pour Hot. J'ai été vraiment enchanté et stimulé d'apprendre ce théorème. Mais la notion d'application de Dwyer (que j'ai apprise en 1983 dans l'article de THOMASON) a été, techniquement, beaucoup plus importante pour moi : c'était exactement ce qui manquait à ma panoplie de notions et d'intuitions "homotopiques" dans Cat …

p. –

LES DÉRIVATEURS

ALEXANDRE GROTHENDIECK

Chapitre XVII

Catégories à fibrations et à cofibrations (Modèles (3))

p. –

Note des éditeurs de l'édition transcrite.

Ce texte a été déchiffré et transcrit en LaTeX 2_ε par M. Künzer. Il a été édité par M. Künzer, J. Malgoire, et G. Maltsiniotis. La transcription est aussi fidèle que possible au manuscrit. Seules quelques corrections mineures évidentes ont été effectuées. Pour les rares ajouts ou commentaires des éditeurs, ainsi que pour la numérotation originale des pages du manuscrit, les caractères de machine à écrire `[typewriter]` entre crochets sont utilisés.

Cette édition est provisoire. Les remarques, commentaires et corrections sont bienvenus. Envoyer un message à :

[**e-mail address removed**]

G. Maltsiniotis

p. 1

`[page 1]`

1 Préliminaires [1]

Proposition 1. *Soit $\mathcal{M}$ une catégorie stable par $\varinjlim$ quelconques, $C \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ contenant les isomorphismes, stable par cochangement de base et par composition* transfi-

1. **N.B.** Ces préliminaires seront complètement repris et dépassés dans le paragraphe 2. À ne pas lire !

nie. *Soit, pour tout petit ensemble ordonné I, $C_I \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M}(I^\circ))$ l'ensemble des flèches $u_\bullet : X_\bullet \longrightarrow Y_\bullet$ telles que $\forall\ i_0 \in I$, dans le diagramme*

$$\begin{array}{rcl} X'_{i_0} = \varinjlim_{i<i_0} X_i & \longrightarrow & X_{i_0} \\ {\scriptstyle \alpha_{i_0} = \varinjlim_{i<i_0} u_i}\downarrow & \text{cocart.} & {\scriptstyle \beta_{i_0}}\downarrow \\ Y'_{i_0} = \varinjlim_{i<i_0} Y_i & \longrightarrow & \tilde{Y}_{i_0} \quad {\scriptstyle u_{i_0}}\vdots \\ & & {\scriptstyle \tilde{u}_{i_0}}\downarrow \\ & & Y_{i_0}\ , \end{array} \qquad \text{(défini comme somme amalgamée)} \qquad (*)$$

la flèche $\tilde{u}_{i_0}$ soit dans C[2]*. Je dis que si I est* bien ordonné, *alors $u_\bullet \in C_I$ implique*

a) *que $\varinjlim u_i : \varinjlim X_i \longrightarrow \varinjlim Y_i$ est dans C, et*

b) $\forall\ i \in I$, $(u_i : X_i \longrightarrow Y_i) \in C$[3].

.

Corollaire. *Soit $W \subset \mathcal{M}$ localiseur modérément saturé, tel que $TC \overset{déf}{=} C \cap W$ soit stable par cochangement de base, et par composition* transfinie. *Soit $u_\bullet : X_\bullet \longrightarrow Y_\bullet$ dans C_I. Alors $u_\bullet \in W_{I^\circ}$ (i.e. $\forall\ i \in I$, on a $u_i \in W$) si et seulement si $u_\bullet \in (TC)_I$, i.e. si et seulement si pour tout $i \in I$, la flèche $\tilde{u}_i$ dans $(*)$ est dans TC, ou ce qui revient au même, dans W (puisque par hypothèse elle est déjà dans C). Si cette condition est satisfaite, alors $\varinjlim u_i : \varinjlim X_i \longrightarrow \varinjlim Y_i$ est dans W.* [page 2 n'existe pas] p. 2

Démonstration du corollaire. Supposons $u_\bullet \in (TC)_I$, alors par la proposition, [page 3] $\varinjlim_{i\in I} u_i$ est dans TC, ou ce qui revient au même, dans W. D'autre part, appliquant ce même résultat aux systèmes inductifs induits sur $I_{<i_0}$, on trouve que dans $(*)$, la flèche α_{i_0} est dans TC, donc aussi β_{i_0} par cochangement de base, donc aussi $u_{i_0} = \tilde{u}_{i_0}\beta_{i_0}$. Donc il reste à prouver qu'inversement, si on suppose les $u_{i_0} \in W$, alors les $\tilde{u}_{i_0}$ sont eux aussi dans W (i.e. dans $TC = C \cap W$), ou ce qui revient au même, que les β_{i_0} sont dans W, ou encore dans TC. Mais comme TC est stable par cochangement de base, il suffit pour cela de prouver que $\alpha_{i_0} \in TC$, ou encore $\alpha_{i_0} \in C$. Donc on est ramené à prouver que

c) $u \in W_{I^\circ} \cap C_I \Longrightarrow (\varinjlim_{i<i_0} u_i) \in W$ pour tout $i_0 \in I$,

donc, changeant de notation, à prouver `[phrase incomplète]`. Nous prouverons ensemble a) b) c) par induction transfinie sur le nombre ordinal α tel que $I \simeq I_\alpha = \{\text{ensemble des ordinaux } i < \alpha\}$.

1°) Cas $\alpha = 0$, i.e. $I = \emptyset$: il est trivial. [page 4]

2°) Si c'est ok pour I_α, aussi pour $I_{\alpha+1} = \{\beta \mid \beta \leq \alpha\}$. Ici, $I_{\alpha+1}$ ayant un plus grand élément α, a) est contenu dans b) (pour $i = \alpha$, plus grand élément de $I_{\alpha+1}$.)

2. Condition stable par passage de I à un sous-ensemble ordonné *ouvert* I' de I.

3. Dire aussi que l'on a

b′) *Si $i' \leq i$, alors dans le diagramme similaire à $(*)$,*

$$\begin{array}{ccc} X'_{i'} & \longrightarrow & X'_i \\ \downarrow & \text{cocart.} & \downarrow \\ Y'_{i'} & \longrightarrow & \tilde{Y}'_i \\ & & \downarrow {\scriptstyle u_{i',i}} \\ & & Y'_i\ , \end{array}$$

on a $u_{i',i} \in C$ (on retrouve $(*)$ en faisant $i' = i_0$, $i = i_0 + 1$). Le cas b) s'obtient en faisant $i' = 0$, i quelconque, d'où $(X'_i \longrightarrow Y'_i) \in C$. L'appliquant à $i+1$ au lieu de i, on trouve $(u_i : X_i \longrightarrow Y_i) \in C$.

Pour prouver b), il reste à prouver que $u_\alpha \in C$. On regarde le diagramme $(*)$ pour $i_0 = \alpha$. Par l'hypothèse de récurrence (forme a), appliquée à I_α, on a $\alpha_{i_0} \in C$, donc par cochangement de base $\beta_{i_0} \in C$, donc par composition $u_{i_0} = \tilde{u}_{i_0}\beta_{i_0} \in C$. Pour prouver c), il reste à prouver que $\varinjlim_{i<\alpha} u_i \in W$. Mais par l'hypothèse de récurrence appliquée à $I_\alpha = \{i \mid i < \alpha\}$, on sait déjà que $(u_i)_{i<\alpha} \in (TC)_{I_\alpha}$, donc par la partie prouvée du corollaire ou de la proposition, $\varinjlim_{i<\alpha} u_i \in TC$.

3°) Si α est un ordinal limite, et si a) b) c) sont vrais pour I_β avec $\beta < \alpha$, ils le sont aussi pour I_α. Cette fois, b) est contenu dans l'hypothèse de récurrence, il faut prouver [page 5] a), i.e. que

$$u_\alpha \overset{\text{déf}}{=} \varinjlim_{i<\alpha} u_i \ : \ \underbrace{X_\alpha}_{\overset{\text{déf}}{=}\varinjlim_{i<\alpha} X_i} \longrightarrow \underbrace{Y_\alpha}_{\overset{\text{déf}}{=}\varinjlim_{i<\alpha} Y_i}$$

est dans C. Quant à c), il est déjà contenu dans la hypothèse de récurrence. Donc il reste finalement à prouver

$$u_\alpha \ \in \ C$$

quand on suppose que la proposition est prouvée pour les ordinaux $\beta < \alpha$.

On va construire un troisième système ordinal sur I_α, en introduisant pour tout $0 \leq i < \alpha$, i.e. $i \in I_\alpha$, Z_i par le carré cocartésien p. 3

$$\begin{array}{ccc} X_i & \longrightarrow & X_\alpha \\ \downarrow & \text{cocart.} & \downarrow \\ Y_i & \longrightarrow & Z_i \ . \end{array}$$

Les flèches de transition entre les Z_i sont évidentes, et on aura $\varinjlim_{i} Z_i \xrightarrow{\sim} Y_\alpha$. Ainsi, $u_\alpha : X_\alpha (= Z_{-1}) \longrightarrow Y_\alpha$ est décomposé en composé transfini de morphismes

$$Z_i \xrightarrow{v_{i+1}} Z_{i+1} \qquad (-1 \leq i < \alpha) \qquad (*) \qquad \text{[page 6]}$$

et

$$\varinjlim_{i<i_0} Z_i \xrightarrow{v_{i_0}} Z_{i_0} \qquad i_0 \text{ ordinal limite } < \alpha. \qquad (**)$$

(**N.B.** Le cas où i_0 n'est *pas* ordinal limite n'est autre que $(*)$ pour $i = \beta_0 - 1$.) Tout revient à prouver que ces flèches sont dans C (donc leur composé transfini aussi).

Cas $(*)$.

$$\begin{array}{ccccc} X_i & \longrightarrow & X_{i+1} & \longrightarrow & X_\alpha \\ {\scriptstyle u_i}\downarrow & \text{cocart.} & {\scriptstyle v_{i+1}}\downarrow & \text{cocart.} & \downarrow \\ Y_i & \longrightarrow & \tilde{Y}_{i+1} & \longrightarrow & Z_i \\ & & {\scriptstyle \tilde{u}_{i+1}}\downarrow & \text{cocart.} & \downarrow{\scriptstyle v_{i+1}} \\ & & Y_{i+1} & \longrightarrow & Z_{i+1} \ . \end{array}$$

4

Comme $\tilde{u}_{i+1} \in C$, $v_{i+1} \in C$ par cochangement de base, OK. Il faut cependant traiter à part le cas $i = 0$, i.e. la flèche $X_\alpha \longrightarrow Z_0$, qui est incluse dans

$$\begin{array}{ccc} X_0 & \longrightarrow & X_\alpha = Z_{-1} \\ {\scriptstyle u_0}\downarrow & \text{cocart.} & \downarrow{\scriptstyle v_0} \\ Y_0 & \longrightarrow & Z_0 \ , \end{array}$$

4. Pour se donner confiance – on pourrait traiter toute de suite le cas général.

où $u_0 \in C$, donc $v_0 \in C$, OK.

Cas $(**)$. Si $i_0 < \alpha$ est ordinal limite, inspectons $(**)$. On a par passage à la limite

$$Z'_{i_0} \overset{\text{déf}}{=} \varinjlim_{i<i_0} Z_i \;\simeq\; Y'_{i_0} \amalg_{X'_{i_0}} X_\alpha$$

(cf. diagramme $(*)$ pour la définition de X'_{i_0}, Y'_{i_0}), s'insérant dans le diagramme suivant greffé sur $(*)$

p. 4
[page 7]

$$\begin{array}{ccccc} X'_{i_0} & \longrightarrow & X_{i_0} & \longrightarrow & X_\alpha \\ {\scriptstyle \alpha_{i_0}}\downarrow & \text{cocart.} & {\scriptstyle \beta_{i_0}}\downarrow & \text{cocart.} & \downarrow \\ Y'_{i_0} & \longrightarrow & \tilde{Y}_{i_0} & \longrightarrow & Z'_{i_0} \\ & & {\scriptstyle \tilde{u}_{i_0}}\downarrow & \text{cocart.} & {\scriptstyle v_{i_0}}\downarrow \\ & & Y_{i_0} & \longrightarrow & Z_{i_0}\ . \end{array}$$

On a $\tilde{u}_{i_0} \in C$ par hypothèse, donc $v_{i_0} \in C$, ce qui achève la démonstration.

Proposition 2. *$(\mathcal{M}, C)$ et le cas échéant W, comme dans proposition 1 et son corollaire, I ensemble ordonné localement fini, i.e. tel que $\forall\ i_0 \in I$, I/i_0 soit fini. Soit*

$$u_\bullet\ : X_\bullet \longrightarrow Y_\bullet$$

une flèche dans[5] *$\mathcal{M}(I^\circ)_{\mathrm{c}}$ = sous-catégorie pleine de systèmes inductifs sur I, à valeurs dans $\mathcal{M}$, tels que $\underbrace{\emptyset_{\mathcal{M}(I^\circ)}}_{\substack{\text{objet}\\ \text{initial}\\ \text{de } \mathcal{M}(I^\circ)}} \longrightarrow Z_\bullet$ soit dans C_I (définie dans prop. 1), i.e. tel que $\forall\ i_0 \in I$,*

la flèche

$$Z'_{i_0} \;=\; \varinjlim_{i<i_0} Z_i \;\longrightarrow\; Z_{i_0}$$

soit dans C, et supposons $u_\bullet \in C_I$. Alors

a) $\varinjlim_{i\in I} u_\bullet : X_I \overset{\text{déf}}{=} \varinjlim_{i\in I} X_i \longrightarrow Y_I \overset{\text{déf}}{=} \varinjlim_{i\in I} Y_i$ *est dans C,*
et

[page 8]

b) $\forall\ i_0 \in I$, *on a $\alpha_{i_0}, \beta_{i_0} \in C$ dans le diagramme $(*)$ p. 1.*

Corollaire. *De plus (supposant donné W comme dans prop. 1, cor. 1), les conditions suivantes sur une $u_\bullet$ entre $X_\bullet$, $Y_\bullet$ C-cofibrants sont équivalentes.*

1°) *$u_\bullet \in (TC)_I$, i.e. les $\tilde{u}_{i_0} \in TC$ $(\forall\ i_0 \in I)$.*

2°) *$u_\bullet \in T_I \cap W_{I^\circ}$, i.e. $\forall\ i_0 \in I$, $\tilde{u}_{i_0} \in C$, $u_{i_0} \in W$.*

3°) *Pour tout $i_0 \in I$, on a*

$$\alpha_{i_0},\ \beta_{i_0},\ \tilde{u}_{i_0},\ u_{i_0}\ \in\ TC$$

(i.e. $\alpha_{i_0}, \tilde{u}_{i_0} \in TC$, ce qui implique $\beta_{i_0} \in TC$, puis $u_{i_0} \in TC$ par cochangement de base et par composition).


Et ces conditions impliquent

4°) *que $u_I : X_I \longrightarrow Y_I$ est dans TC.*

Voyons comment ou dans quelle mesure le corollaire se déduit de la proposition. On a bien sur

p. 5

5. en fait, l'hypothèse que $X_\bullet$, $Y_\bullet$ dans $\mathcal{M}(I^\circ)_{\mathrm{c}}$ est inutile, tant dans la proposition 2 que dans ses deux corollaires.



tautologiquement. D'ailleurs, la proposition appliquée à TC au lieu de X montre qu'on a $1° \Longrightarrow 3°$ & $4°$, car en l'appliquant aux ensembles $I_{<i_0}$ on trouve que $\alpha_{i_0} \in TC \ \forall\ i_0 \in I$. Donc la proposition 2 implique

$$(1° \Longleftrightarrow 3°) \Longrightarrow 2° \ (\&\ 4°).$$

[page 9]

Donc pour prouver $2° \Longrightarrow 3°$, il resterait à prouver que $2°$ suffit à impliquer $4°$ (et ceci quel que soit I ensemble ordonné localement fini) – car en appliquant ceci aux $I_{<i_0}$, on trouve que $2°$ implique $\alpha_{i_0} \in TC = C \cap W$ (non seulement $\alpha_{i_0} \in C$, selon la proposition 2), donc $\beta_{i_0} \in TC \subset W$, donc $\tilde{u}_{i_0} \in W$ par saturation, donc $\tilde{u}_{i_0} \in TC$, d'où $3°$.

Notons d'autre part que le b) dans la proposition 2 est conséquence de a), appliqué à la restriction de $u_\bullet$ à $I_{<i_0}$. Au total, il y a donc à prouver seulement les deux choses

$$\begin{cases} \text{a)} \quad u_\bullet \in C_I \quad \Longrightarrow \quad u_I \in C \\ \text{b)} \quad u_\bullet \in C_I \cap W \quad \Longrightarrow \quad u_I \in C \cap W \ \ (\overset{\text{déf}}{=} TC) \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\quad (\text{et } u_\bullet \in (TC)_I) \end{cases} \tag{$*$}$$

Nous le prouverons par réduction au cas particulier de la proposition 1, déjà prouvée.

J'ai d'ailleurs aussi envie de prouver le

Corollaire 2. *$\mathcal{M}$, C (et éventuellement W). Les hypothèses sur $X_\bullet, Y_\bullet \in \mathcal{M}(I^\circ)_{\mathrm{c}}$ et sur $u_\bullet \in C_I$, enfin sur I localement fini, sont celles de la proposition 2. Pour toute partie J de I, soit*

$$u_J \overset{\text{déf}}{=} \varinjlim_{i \in J} u_i \ : \ X_J \overset{\text{déf}}{=} \varinjlim_{i \in J} X_i \ \longrightarrow \ Y_J \overset{\text{déf}}{=} \varinjlim_{i \in J} Y_i \ .$$

Soient $I' \subset I''$ deux parties ouvertes *de I, et considérons le diagramme*

[page 10]

$$\begin{array}{ccc} X_{I'} & \xrightarrow{\tau_X} & X_{I''} \\ {\scriptstyle \alpha = u_{I'}}\downarrow & \text{cocart.} & \downarrow{\scriptstyle \beta} \\ Y_{I'} & \xrightarrow{\tilde{\tau}_Y} & \tilde{Y}_{I''} \\ & {\scriptstyle \tau_Y}\searrow & \downarrow{\scriptstyle \tilde{u}} \\ & & Y_{I''} \ . \end{array} \qquad \begin{array}{l} \\ \\ \\

N.B. Le cas de la proposition 2 sous la forme (∗) a), page 9, (i.e. aussi le fait que les $u_{I'}$, $u_{I''}$, … sont dans C) est obtenu en prenant $I'' = I$, $I' = \emptyset$, le diagramme devient

$$\begin{array}{ccc} \emptyset & \longrightarrow & X_I \\ {\scriptstyle \mathrm{id}}\downarrow & \text{cocart.} & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} \\ \emptyset & \longrightarrow & X_I \\ & & \downarrow{\scriptstyle \tilde{u}=u_I} \\ & & Y_I\ , \end{array}$$

et la conclusion est donc $u_I \in C$[8]. La *définition* de C_I, i.e. la condition $u \in C_I$, se retrouve en exigeant $\tilde{u} \in C$ dans (∗) ci-dessus, dans le cas $I'' = I/i_0$, $I' = I_{<i_0}$. Il est remarquable que cette définition de C_I donne une conclusion aussi forte que $\tilde{u} \in C$ pour *tout* couple $I' \subset I''$ de sous-ensembles ouverts de I. [page 11]

C'est finalement sous cette forme qu'on va prouver la proposition 2 – c'est *ça* à présent qui me semble *le* bon énoncé dans cette direction. Avec le complément, bien sûr, que si de plus $u_\bullet \in W_{I^\circ}$, i.e. les u_i sont dans W, alors $u_\bullet$ est même dans $(TC)_I$, ou encore simplement que les $u_{I'}$ *sont dans* TC (d'où il résultera donc que $\tilde{u}$ dans (∗), p. 10, est aussi dans TC). p. 7

On va procéder par construction transfinie. On peut supposer bien sûr que $I'' = I$. On va quand même d'abord prouver le cas particulier où $I' = \emptyset$, i.e. prouver au moins que $u_I \in C$. On construit par récurrence transfinie une suite strictement croissante d'ouverts

$$I_\alpha \ \subset\ I,$$

aboutissant à

$$I_{\alpha_0} \ =\ I,$$

en posant

$$\begin{cases} I_0 \ =\ \emptyset\,, & \\ I_\alpha \ =\ \bigcup_{\beta<\alpha} I_\beta & \text{si } \alpha \text{ ordinal limite}\,, \\ I_{\alpha+1} \ =\ I_\alpha \cup (I/s_\alpha) & \text{si } I_\alpha \neq I, \text{ et en choisissant } s_\alpha \in I \backslash I_\alpha\,. \end{cases}$$

(On finit par avoir $I_{\alpha_0} = I$, bien sûr.) On pose [page 12]

$$\begin{aligned} X_\alpha \ =\ X_{I_\alpha} \ &=\ \varinjlim_{i \in I_\alpha} X_i \\ Y_\alpha \ =\ Y_{I_\alpha} \ &=\ \varinjlim_{i \in I_\alpha} Y_i \\ u_\alpha \ =\ u_{I_\alpha} \ &:\ X_\alpha \longrightarrow Y_\alpha\ , \end{aligned}$$

homomorphisme de systèmes inductifs transfinis. On aura

$$X_{\alpha_0} \ =\ X_I, \qquad Y_{\alpha_0} \ =\ Y_I, \qquad u_{\alpha_0} \ =\ u_I,$$

8. Le cas $(Y_{I'} \xrightarrow{\tau_Y} Y_{I''}) \in C$ est obtenu en prenant $X_\bullet = \emptyset_\bullet$, on aura

$$\begin{array}{ccc} \emptyset & \xrightarrow[\sim]{\tau_X} & \emptyset \\ \downarrow & \text{cocart.} & \downarrow \\ Y_{I'} & \xrightarrow{\mathrm{id}} & \tilde{Y}_{I''} = Y_{I'} \\ & {\scriptstyle \tau_Y}\searrow & \downarrow{\scriptstyle \tilde{u}=\tau_Y} \\ & & Y_{I''}\ . \end{array}$$

et on doit donc prouver que $u_{\alpha_0} \in C$. Pour ceci, on applique la proposition 1, il suffit donc de prouver que $(u_\alpha) \in C_{I_{\alpha_0+1}}$ (où $I_{\alpha_0+1} = \{\text{ordinaux } i \mid i < \alpha_0 + 1, \text{ i.e. } i \leq \alpha_0\}$). Donc il faut prouver que les flèches $\tilde{u}_{i_0}$ dans $(*)$ p. 1 (où cette fois les i, i_0 sont des ordinaux, $i_0 \leq \alpha_0$) sont dans C. Je vais distinguer les deux cas où $\alpha = i_0$ est ordinal limite, qui est trivial car alors $X_{i_0} \xleftarrow{\sim} \varinjlim_{i<i_0} X_i$, $Y_{i_0} \xleftarrow{\sim} \varinjlim_{i<i_0} Y_i$, et $\tilde{u}_{i_0} = \mathrm{id}$, et le cas α non limite, i.e.

$$\begin{array}{ccc} X_{I_{\alpha-1}} & \longrightarrow & X_{I_\alpha} \\ {\scriptstyle u_{\alpha-1}}\downarrow & & {\scriptstyle \beta_\alpha}\downarrow \\ Y_{I_{\alpha-1}} & \longrightarrow & \tilde{Y}_{I_\alpha} \\ & & {\scriptstyle \tilde{u}_\alpha}\downarrow \\ & & Y_{I_\alpha}\ , \end{array} \qquad u_\alpha : X_{I_\alpha} \to Y_{I_\alpha}$$

à prouver que $\tilde{u}_\alpha \in C$. Lorsqu'on suppose de plus $u_0 \in W_{I_0}$, i.e. les $u_i \in W$, il faut de plus prouver que $\tilde{u}_\alpha \in TC = C \cap W$. La proposition 2 et son corollaire 1 résulteront de là. Pour prouver $\tilde{u}_\alpha \in C$ resp. $\tilde{u}_\alpha \in TC$, on peut supposer $I_\alpha = I$ (quitte à changer de notation). On pose donc

p. 8 [page 13]

$$\begin{aligned} I_\alpha &= I, \qquad I_{\alpha-1} = I' \\ I/s_{\alpha-1} &= I_0, \quad I_0 \cap I' = I'_0\ , \end{aligned}$$

de sorte qu'on a un diagramme commutatif d'inclusions ouvertes

$$\begin{array}{ccc} I_0 \cap I' = I'_0 & \hookrightarrow & I_0 \\ \downarrow & & \downarrow \\ I' & \hookrightarrow & I = I_0 \cup I'. \end{array}$$

On utilisera seulement le fait que I_0, donc I'_0, est fini, i.e. que dans le couple $(I' \subset I)$, I peut s'écrire sous la forme $I = I' \cup I_0$, avec I_0 un ouvert *fini,* pour en conclure que dans le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X_{I'} & \xrightarrow{\tau^X_{I',I}} & X_I \\ {\scriptstyle u_{I'}}\downarrow & \text{cocart.} & {\scriptstyle v_{I',I}}\downarrow \\ Y_{I'} & \longrightarrow & \tilde{Y}_I \\ & {\scriptstyle \tau^Y_{I',I}}\searrow & {\scriptstyle \tilde{u}=u_{I',I}}\downarrow \\ & & Y_I \end{array} \qquad u_I : X_I \to Y_I$$

on a $\tilde{u} \in C$ resp. $\tilde{u} \in TC = C \cap W$.

Il faut des notations générales, d'une part pour une inclusion $J \subset K$ d'ouverts de I, donnant lieu au diagramme [page 14]

$$\begin{array}{ccc} X_J & \xrightarrow{\tau^X_{J,K}} & X_K \\ {\scriptstyle u_J}\downarrow & \text{cocart.} & {\scriptstyle v_{J,K}}\downarrow \\ Y_J & \longrightarrow & Y_{J,K} \\ & {\scriptstyle \tau^Y_{J,K}}\searrow & {\scriptstyle u_{J,K}}\downarrow \\ & & Y_K\ , \end{array} \qquad u_K : X_K \to Y_K \quad \text{(anciennement } \tilde{Y}_K\text{)} \tag{1}$$

p. 9

et pour des inclusions de trois ouverts emboîtés $J \subset K \subset L$ de I,

$$\begin{array}{ccccc}
X_J & \longrightarrow & X_K & \longrightarrow & X_L \\
{\scriptstyle u_J}\downarrow & \text{cocart} & {\scriptstyle \tilde{u}_{J,K}}\downarrow & \text{cocart} & {\scriptstyle \tilde{u}_{J,L}}\downarrow \quad \searrow^{\tilde{u}_{K,L}} \\
Y_J & \longrightarrow & Y_{J,K} & \longrightarrow & Y_{J,L} \\
 & & {\scriptstyle u_{J,K}}\downarrow & \text{cocart} & {\scriptstyle u^L_{J,K}}\downarrow \quad \searrow^{u_{J,L}} \\
 & & Y_K & \longrightarrow & Y_{K,L} \\
 & & & & {\scriptstyle u_{K,L}}\downarrow \\
 & & & & Y_L\ ,
\end{array} \tag{2}$$

donnant lieu à une nouvelle flèche $u^L_{J,K}$, déduite de $u_{J,K}$ par le cochangement de base $Y_{J,K} \longrightarrow Y_{J,L}$. Nous utiliserons ce diagramme dans les deux cas où $(J \subset K \subset L)$ est l'un [page 15]
des deux triplets

$$\begin{cases} I'_0 \hookrightarrow I_0 \hookrightarrow I \\ I'_0 \hookrightarrow I' \hookrightarrow I, \end{cases}$$

issus du carré cocartésien (dans Cat) (carré MV)


$$\begin{array}{ccc}
I'_0 & \hookrightarrow & I_0 \\
\downarrow & & \downarrow \\
I' & \hookrightarrow & I\ .
\end{array} \tag{3}$$

Il faut insérer les deux diagrammes correspondants du type $(*)$ [de la page 10] dans un même diagramme. On notera à ce propos que les carrés dans $\mathcal{M}$ déduits de (3) en lui appliquant $J \longmapsto X_J$ et $J \longmapsto Y_J$

$$\left.\begin{array}{ccccc}
(4_X) & X_{I'_0} & \longrightarrow & X_{I_0} & \\
 & {\scriptstyle u_{I'_0}}\downarrow & \searrow & \downarrow & \searrow \\
 & Y_{I'_0} & \longrightarrow & Y_{I_0} & {\scriptstyle u_I}\downarrow \\
(4_Y) & & \searrow & & \searrow \\
 & & & Y_{I'} & \longrightarrow & Y_I
\end{array}\right\} (4)$$


sont cocartésien dans $\mathcal{M}$. (Transitivité des $\varinjlim$ …).

On a un homomorphisme $(u_{I'_0}, u_{I_0}, u_{I'}, u_I)$ déduit de u du carré (4_X) dans les carré [page 16]
(4_Y), et cet homomorphisme lui aussi s'insère dans un diagramme, incluant les deux avatars déjà signalé de (2). Voici le diagramme pertinent : p. 10




(5 [9])

Le cube supérieur est le cube dans $\mathcal{M}$ à 6 faces cocartésiens déduit des trois flèches de $X_{I'_0}$ dans X_{I_0}, $X_{I'}$, $Y_{I'_0}$. On aura besoin de savoir que la *base* du cube est un carré cocartésien. La partie antérieure du diagramme est l'avatar de (2) correspondant aux inclusions $I'_0 \subset I' \subset I$, la partie derrière l'avatar pour l'inclusion $I'_0 \subset I_0 \subset I$. Donc les deux autres carrés verticaux, en dessous du cube supérieur, sont également cocartésiens, ainsi que le carré oblique en pointillés, lequel n'est autre que la base (4_Y) du diagramme (4). De ces caractères du diagramme (5) résulte aisément (quoique j'ai mis une bonne journée de gribouillis en bonheur-la-chance, avant de m'en rendre compte enfin …) que le carré en losange à traits pleins [page 17]



est également cocartésien. On le voit trivialement sur le diagramme déployé p. 11



(6)

qui est finalement le diagramme pertinent (le diagramme (5) ne servait à rien, c'est un mauvais bout par lequel j'ai pris les choses). On voit sur le diagramme (6) que pour prouver $u_{I',I} \in C$ resp. TC, il suffit de prouver $u_{I'_0,I_0} \in C$ resp. TC. Mais c'est là une [page 18]

[9] diagramme imbitable, à remplacer par diagramme (6) ci-dessus.

assertion relative à l'inclusion d'ensembles ordonnés $I'_0 \subset I_0$ *finis.* On est donc réduit à prouver le lemme suivant, où I_0 devient I :

Lemme. *Soit I un ensemble ordonné fini, $u_\bullet : X_\bullet \longrightarrow Y_\bullet$ une flèche dans $\mathcal{M}(I^\circ)$, où $\mathcal{M}$ est une catégorie munie d'un ensemble $C \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ de flèches tel que C soit stable par cochangement de base et par composition, et contienne les isomorphismes. On suppose $u_\bullet \in C_I$, i.e. que pour tout $i \in I$, la flèche $u_{I_{<i},I/i}$ est dans C. Alors pour toute partie ouverte I' de I, la flèche $u_{I',I}$ est dans C* [10].

Corollaire. *Si de plus $W \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ est un localiseur modérément saturé, tel que $TC \overset{\text{déf}}{=} W \cap C$ soit stable par cochangement de base (et l'est de toutes façons par composition, et contient les isomorphismes), alors on a*

$$C_I \cap W_{I^\circ} \;=\; (TC)_I,$$

donc si $u_\bullet \in C_I$ (cf. ci-dessus) et les $u_i \in W$, alors $u_\bullet \in (TC)_I$, donc en appliquant ce qui est dit pour C à TC, on a $u_{I',I} \in TC$ pour toute partie ouverte I' de I. [page 19]

On prouvera en même temps le lemme et son corollaire, en procédant par récurrence sur $\operatorname{card} I = n$. Si $n = 0$, i.e. $I = \emptyset$, les énoncés sont triviaux. Par transitivité, en utilisant les diagrammes du type (2), on est ramené au cas où $I = I' \cup \{i_0\}$, où $i_0 \in I \backslash I'$. On pose encore $I_0 = I/i_0$, $I'_0 = I_0 \cap I'$, et le raisonnement qu'on vient de faire nous montre qu'il suffit de prouver que $u_{I'_0,I_0} \in C$ resp. $\in TC$. Si $I'_0 \neq I$, cela résulte de l'hypothèse de récurrence. Sinon, i_0 est un objet final de I, et $I' = I_{<i_0}$, et alors $u_{I',I} \in C$ est inclus dans la définition de C_I. Reste à prouver alors que $u_{I',I} \in TC$ si les $u_i \in W$. On a le diagramme p. 12

$$\begin{array}{ccc} X_{I'} & \longrightarrow & X_I \\ {\scriptstyle u_{I'}}\downarrow & \text{cocart} & \downarrow{\scriptstyle \tilde{u}_{I',I}} \\ Y_{I'} & \longrightarrow & Y_{I',I} \\ & & {\scriptstyle u_{I',I}}\downarrow \\ & & Y_I \end{array} \qquad u_I \text{ (courbe pointillée de } X_I \text{ à } Y_I),$$

et l'hypothèse de récurrence implique $u_{I'} \in TC$, donc $\tilde{u}_{I',I} \in TC$ par cochangement de base. D'autre part, la flèche $u_I : X_I \longrightarrow Y_I$ s'identifie à $X_{i_0} \longrightarrow Y_{i_0}$ (i_0 étant élément final de I), elle est donc dans W. Donc par saturation, $u_{I',I} \in W$, donc $u_{I',I} \in TC$, q.e.d. [page 20]

Ainsi, la proposition 2 est prouvée, ainsi que son corollaire 1 – et on voit que si dans la proposition 2 et son corollaire, on suppose I *fini,* alors il est inutile dans les hypothèses pour C, resp. $TC = C \cap W$, de supposer la stabilité par composition *transfinie,* la composition ordinaire suffit. Mais il reste à prouver le corollaire 2, que je viens de prouver dans le cas I *fini,* sans avoir à faire appel à une hypothèse "transfinie". Il faut maintenant prouver que c'est encore OK dans le cas localement fini, en supposant C stable par composition transfinie. (Il n'y a plus à revenir sur le cas de W, car on sait déjà maintenant que $C_I \cap W_{I^\circ} = (TC)_I$, par le corollaire 1 déjà prouvé.)

La démonstration est essentiellement la même que pour le cas particulier déjà traité $I' = \emptyset$, $I'' = I$, et on aurait pu aussi bien rédiger la démonstration dans ce cadre, à l'aide d'une suite strictement croissante transfinie d'ouverts dans I, I_α, avec $\boxed{I_0 = I'}$, $I_{\alpha_0} = I''$ ($= I$), et [page 21]

$$\begin{aligned} I_\alpha &= I_{\alpha-1} \cup I/s_{\alpha-1} && \text{si } \alpha \text{ non limite, } I_{\alpha-1} \neq I, \text{ en choisissant } s_{\alpha-1} \in I \backslash I_{\alpha-1}, \\ I_\alpha &= \textstyle\bigcup_{\beta<\alpha} I_\beta && \text{si } \alpha \text{ limite,} \end{aligned}$$

[10] **N.B.** Bien sûr, $u_{J,K} \in C$ si $J \subset K$ sont deux ouverts de I, comme on voit en appliquant le lemme à K au lieu de I.

et en posant encore

$$X_\alpha \;=\; X_{I_\alpha}, \qquad Y_\alpha \;=\; Y_{I_\alpha}, \qquad u_\alpha = u_{I_\alpha} \;:\; X_\alpha \longrightarrow Y_\alpha.$$

Soit α_0 tel que $I_{\alpha_0} = I$ (indice terminal de la suite), il faut prouver que dans

$$\begin{array}{ccc} X_0 & \longrightarrow & X_{\alpha_0} \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y_0 & \longrightarrow & Y_{0,\alpha_0} \\ & & \downarrow{\scriptstyle u_{0,\alpha_0}} \\ & & Y_{\alpha_0}\ , \end{array}$$

on a

$$u_{0,\alpha_0} \;\in\; C.$$

p. 13
[page 22]

Compte tenu du complément marginal à la proposition 1 (qui se prouve de la même façon …), on est ramené à prouver que l'homomorphisme des systèmes ordinaux envisagés est dans $C_{I_{\alpha_0+1}}$ (où I_{α_0+1} est l'ensemble des ordinaux $\leq \alpha_0$). Or qu'il en soit ainsi se prouve exactement comme tantôt, à cela près qu'on doit d'abord faire une vérification de (∗) p. 1 ($\tilde{u}_\bullet \in C$) pour $i_0 = 0$. Alors le diagramme (∗) p. 1 est

$$\begin{array}{ccc} \emptyset & \longrightarrow & X_0 = X_{I'} \\ \downarrow{\scriptstyle \text{iso}} & & {\scriptstyle \text{iso}}\downarrow{\scriptstyle \text{id}} \\ \emptyset & \longrightarrow & X_0 = X_{I'} \\ & & \downarrow{\scriptstyle u_0 = u_{I'}} \\ & & Y_0 = Y_{I'}\ , \end{array}$$

et il faut donc vérifier $u_0 = u_{I'} \in C$. Or ceci est contenu dans la proposition 2 elle-même, déjà prouvé, qu'on doit donc utiliser. Le reste se prouve comme avant. Ainsi, le corollaire 2 de la proposition 2 est également prouvé.

Commentaires : Il y a un malaise, car les proposition 1 et proposition 2 (ainsi que leurs corollaires) ont essentiellement la même conclusion, avec des hypothèses sur I qui sont différentes : bien ordonné dans un cas, localement fini dans un autre. L'idée naturelle, c'est de donner un énoncé commun, qui coiffe les deux à la fois, avec I artinien, i.e. toute suite décroissante est stationnaire. Ce qu'il faut, c'est une hypothèse sur I d'une part, sur $u_\bullet : X_\bullet \longrightarrow Y_\bullet$ dans $\mathcal{M}(I^\circ)$ d'autre part, qui assure ceci :

[page 23]

(∗) $\forall\ i_0 \in I$, et toute partie ouverte J' de $J = I/i_0$, la flèche $u_{J',J}$ dans le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X_{J'} & \longrightarrow & X_J \\ {\scriptstyle u_{J'}}\downarrow & \text{cocart.} & \downarrow{\scriptstyle \tilde{u}_{J',J}} \\ Y_{J'} & \longrightarrow & Y_{J',J} \\ & & {\scriptstyle u_{J',J}}\downarrow \\ & & Y_J \end{array} \qquad u_J$$

est dans C.

Question : est-il exacte qu'il suffit, pour la validité de (∗), de supposer

a) $u_\bullet \in C_I$, i.e. $u_{J',J} \in C$ quand $J = I/i_0$, $J' = J\backslash\{i_0\}$, et

p. 14
[page 24]

b) *I localement fini ?*

Lemme. *Soit $P \subset I$ l'ensemble des $i_0 \in I$ tels que pour tout ouvert K de $J = I/i_0$, la flèche $u_{K,J}$ est dans C. Ceci dit, soit $i_0 \in I$ tel que tout $i < i_0$ soit dans P. Alors $i_0 \in P$.* (On suppose $u_\bullet \in C_I$, mais I quelconque.)

En effet, soit $K \subset J = I/i_0$ un ouvert. Si $K = J$, il est trivial que $u_{K,J} \in C$ (c'est un isomorphisme). Si $K = J$, on a

$$K \ \subset \ J' \overset{\text{déf}}{=} J\backslash\{i_0\} \ \subset \ J,$$

et pour prouver que $u_{K,J} \in C$, il suffit de prouver que $u_{K,J'}, u_{J',J} \in C$. Or $u_{J',J} \in C$ par hypothèse $u_\bullet \in C_I$. Et $u_{K,J'} \in C$ par ce que a été prouvé pour le cas de J', compte tenu que par hypothèse sur i_0, tout $i \in J'$ (i.e. tout $i < i_0$) est dans P.

Corollaire. *Si I est artinien, $P = I$.*

Car toute partie P de I ayant la propriété qu'on vient de dire ($I/i_0 \subset P \Longrightarrow i_0 \in P$) est égale à I. Si en effet il y avait $x_0 \notin P$, il existerait $x_1 < x_0$ avec $x_0 \notin P$, et par récurrence on construirait une suite strictement décroissante dans I, absurde.

[page 25]

2 Description de $C_I \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M}(I^\circ))$, pour I ensemble ordonné

Soit $\mathcal{M}$ une catégorie, stable par (petites) $\varinjlim$, $C \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ ("cofibrations"). On suppose

$$\begin{cases} \text{a)} \quad C & \text{contient les isomorphismes et est stable} \\ & \text{par cochangement de base.} \\ \text{b)} \quad C & \text{stable par composition transfinie.} \end{cases} \tag{2.1}$$

Soit I un (petit) ensemble ordonné, et considérons

$$\mathcal{M}(I^\circ) \ = \ \underline{\mathrm{Hom}}(I, \mathcal{M}),$$

on va définir une partie

$$C_I \ \subset \ \mathrm{Fl}(\mathcal{M}(I^\circ))$$

ainsi, pour $u_\bullet : X_\bullet \longrightarrow Y_\bullet$ flèche dans $\mathcal{M}(I^\circ)$:

$$u_\bullet \in C_I \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{array}{l} \forall\ i_0 \in I \text{ et pour tout ouvert } J \subset I/i_0 = K, \\ \text{la flèche } u_{J,K} \text{ est dans } C. \end{array} \tag{2.2}$$

Voici la définition de $u_{J,K}$. Pour tout ouvert J de I, on pose

$$\begin{cases} X_J \ = \ \varinjlim_{i \in J} X_i, & Y_J \ = \ \varinjlim_{i \in J} Y_i, \\ u_J : X_J \ \longrightarrow \ Y_J, & u_J \ = \ \varinjlim_{i \in J} u_i, \end{cases} \tag{2.3}$$

et on considère, pour $K \subset J$, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X_K & \xrightarrow{\tau^X_{K,J}} & X_J \\ {\scriptstyle u_K}\downarrow & \text{cocart} & \downarrow{\scriptstyle \tilde{u}_{K,J}} \\ Y_K & \xrightarrow[\tau^Y_{K,J}]{} & Y_{K,J} \\ & & \downarrow{\scriptstyle u_{K,J}} \\ & & Y_J \ . \end{array} \qquad \begin{array}{l} \overset{u}{=} Y_K \amalg_{X_K} X_J \\ \\ \\ \\ \\ \end{array}$$

p. 15

[page 26]

Théorème 2.1. *Soit $\mathcal{M}$ $\mathfrak{U}$-catégorie stable par petites $\varinjlim$, $C \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$, satisfaisant les conditions de stabilité* (2.1) *(par cochangement de base et par composition transfinie), I un petit ensemble ordonné, $u_\bullet : X_\bullet \longrightarrow Y_\bullet$ une flèche dans $\mathcal{M}(I^\circ)$.*

1°) *On suppose $u_\bullet \in C_I$ (cf.* (2.2)*). Soient $K \subset J$ deux ouverts de I. Alors $u_{K,J}$ (défini dans* (2.4)*) est dans C.*

2°) *Supposons I artinien. Pour qu'on ait $u_\bullet \in C_I$, i.e. pour que $u_{K,J}$ soit dans C pour tout couple $(K \subset J)$ d'ouverts tel que J ait un plus grand élément, i.e. soit de la forme I/i_0 (i.e. aussi, par* 1°*), pour* tout *couple d'ouverts $J \subset K$), (il faut et) il suffit qu'il en soit ainsi dans le cas particulier où $J = I/i_0$, $J' = I'/i_0 \overset{déf}{=} I/i_0 - \{i_0\} = \{i \in I \mid i < i_0\}$.*

[page 27]

3°) *Supposons encore I artinien*[11]*. Soit $W \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ un localiseur modérément saturé, tel que $TC \overset{déf}{=} C \cap W$ satisfasse également aux conditions de stabilité* (2.1) *(par cochangement de base, par composition transfinie). Les conditions suivantes sur une flèche $u_\bullet : X_\bullet \longrightarrow Y_\bullet$ dans $\mathcal{M}(I^\circ)$ sont équivalentes.*

a) *$u_\bullet \in (TC)_I$, i.e. pour tout $i_0 \in I$ et K ouvert de $J = I/i_0$, la flèche $u_{K,J}$ est dans TC.*

b) *$u_\bullet \in C_I \cap W_{I^\circ}$, i.e. pour tout $i_0 \in I$, on a $u_{i_0} \in W$, et pour tout ouvert K de $I/i_0 = J$, on a $u_{K,J} \in C$.*

Donnons tout de suite les corollaires principaux.

Corollaire 2.2. *Supposons $(u_\bullet : X_\bullet \longrightarrow Y_\bullet) \in C_I$. Alors*

a) *$\forall\ i \in I$, $u_i : X_i \longrightarrow Y_i$ est dans C.*

b) *La flèche*

$$u_I \ : \ X_I \longrightarrow Y_I \tag{2.2.1}$$

est dans C. Plus généralement, pour toute partie ouverte J de I, la flèche

$$u_J \ : \ X_J \longrightarrow Y_J \tag{2.2.2}$$

est dans C.

Pour a), on applique 1°) (ou simplement la *définition* de C_I) dans le cas de l'inclusion d'ouverts $\emptyset \hookrightarrow I/i$, vu qu'on a

p. 16

[page 28]

$$u_{\emptyset,I/i} \ \simeq \ u_i \ .$$

Pour b), on applique 1°) à l'inclusion $\emptyset \longrightarrow I$, vu que

$$u_{\emptyset,I} \ \simeq \ u_I \ ,$$

et plus généralement

$$u_{\emptyset,J} \ \simeq \ u_J \ .$$

Corollaire 2.3. *Supposons $u_\bullet \in C_I \cap W_{I^\circ}$. Alors pour toute inclusion d'ouverts $K \subset J$ de I, on a $u_{K,J} \in TC$, et en particulier (prenant $K = \emptyset$), on a $u_J \in TC$. Enfin, pour tout $i \in I$, on a $u_i \in TC$.*

Corollaire 2.4. *Soit $X_\bullet$ dans $\mathcal{M}(I^\circ)_{\mathrm{c}}$ un système inductif C-cofibrant, i.e. tel que $\emptyset_I \longrightarrow X_\bullet$ soit dans C_I, i.e. tel que pour tout $i_0 \in I$ et tout ouvert K de $J = I/i_0$, la flèche de transition $\tau_{K,J} : X_K = \varinjlim_{i \in K} X_i \longrightarrow X_J \simeq X_{i_0}$ soit dans C. Alors pour* tout *couple d'ouverts $K \subset J$, la flèche*

$$\tau_{K,J} \ : \ \varinjlim_{i \in K} X_i \longrightarrow \varinjlim_{i \in J} X_i$$

est dans C[12]*. En particulier (faisant $K = I/k$, $J = I/j$ pour $k \leq j$), si $k \leq j$ sont dans I, le morphisme de transition*

$$\tau_{k,j} \ : \ X_k \longrightarrow X_j$$

[page 29]

est dans C. Enfin, si $W \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ est comme dans (2.1. 3°)*, et si $\emptyset_I \longrightarrow X$ est dans W_{I°, i.e. les X_i sont W-coasphériques, alors $X_\bullet$ est dans $\mathcal{M}(I^\circ)_{TC}$ (où $TC = C \cap W$), et pour tout ouvert J de I, $X_J = \varinjlim_{i \in J} X_i$ est dans $\mathcal{M}_{TC}$, donc X_J est W-coasphérique, et pour tout couple d'ouverts $K \subset J$, la flèche de transition $\tau_{K,J}$ est dans TC.*

Signalons enfin le complément suivant au théorème 2.1, qui résultera de sa démonstration :

Corollaire 2.5. *Supposons que l'espace topologique associé à I (dont les ouverts sont les ouverts de I, et les I/i forment une base d'ouverts) soit* noethérien*, i.e. toute suite croissante d'ouverts est stationnaire. Alors toutes les conclusions dans le théorème* 2.1 *et ses corollaires restent valables, en supposant seulement la stabilité de C ou de $TC = C \cap W$ par composition simple (au lieu de composition transfinie), en plus des deux autres stabilités.*

p. 17

Démonstration du théorème 2.1 et du corollaire 2.5.

[page 30]

2.1. 1°) On peut supposer $J = I$, $K \subset I$. On construit une suite transfinie strictement croissante d'ouverts I_α, avec

$$\begin{cases} I_0 = K, \\ I_{\alpha+1} = I_\alpha \cup I/s_\alpha \quad \text{où } s_\alpha \in I \backslash I_\alpha \text{ (si } I_\alpha \neq I\text{, sinon, la construction transfinie s'arrête)}, \\ I_\alpha = \bigcup_{\beta<\alpha} I_\beta \quad \text{si } \alpha \text{ ordinal limite.} \end{cases}$$

[page 31]

Il existe un α_0 tel qu'on ait $I_{\alpha_0} = I$. On voit alors comme au paragraphe 1 que pour tout α, on a

$$u_{I_\alpha, I_{\alpha+1}} \in C, \qquad (*)$$

car il est déduit de $u_{(I/s_\alpha)\cap I_\alpha, I/s_\alpha}$ par cochangement de base. Cf. diagramme (6), p. 17, qu'il faudrait dégager en lemme, débarrassé des particularités techniques de la situation, i.e. un lemme sur les homomorphismes de carrés cartésiens :

Lemme 2.6. *Soit un homomorphisme de carrés cocartésiens $X_\bullet$, $Y_\bullet$, dans une catégorie $\mathcal{M}$ avec sommes amalgamées (**N.B.** il suffit que les sommes amalgamées intervenant ci-dessus existent) :*

$$\begin{array}{ccccc} X_0 & \longrightarrow & X_1 & & \\ \downarrow{\scriptstyle f_0} & \searrow & \downarrow & \searrow & \\ & X'_0 & \longrightarrow & X'_1 & \\ & \downarrow & {\scriptstyle f_1}\downarrow & & \\ Y_0 & \longrightarrow & Y_1 & & \downarrow{\scriptstyle f'_1} \\ & \searrow & \downarrow & \searrow & \\ & & Y'_0 & \longrightarrow & Y'_1 \end{array} \qquad (2.6.1)$$

Soient Z_0, Z_1 les deux carrés latéraux et considérons, pour tout carré commutatif $Z = \begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longrightarrow & Y' \end{array}$ *, la flèche u_Z du diagramme*

$$\begin{array}{ccccc} X & \longrightarrow & X' & & \\ \downarrow & \text{cocart.} & \downarrow & & \\ Y & \longrightarrow & \tilde{Z} & \xrightarrow[u_Z]{} & Y' \end{array}.$$

11. J'ignore si cette hypothèse est nécessaire, cf. commentaire p. 39.

p. 18


12. et réciproquement, caractérise les objets C-cofibrants.

[page 32]

Alors la flèche u_{Z_1} *se déduit de* u_{Z_0} *par cochangement de base, de façon plus précise, on a un carré cocartésien, où* $T = \begin{array}{ccc} X_0 & \longrightarrow & X_1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y_0 & \longrightarrow & Y_1 \end{array}$ *et* $T' = \begin{array}{ccc} X'_0 & \longrightarrow & X'_1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y'_0 & \longrightarrow & Y'_1 \end{array}$ *désignent la face postérieure et antérieure du cube* (2.6.1) :

$$\begin{array}{ccc} \tilde{Z}_0 & \xrightarrow{u_{Z_0}} & Y'_0 \\ \downarrow & \text{cocart.} & \downarrow \\ \tilde{Z}_1 & \xrightarrow{u_{Z_1}} & Y'_1 \ , \end{array} \tag{$*$}$$

qu'on voit sur la base du diagramme



(∗∗)

dans lequel le cube est un cube totalement cocartésien, déduit du carré cocartésien X *en l'"exponentiant" par la flèche* $f_0 : X_0 \longrightarrow Y_0$ `[plutôt, par la flèche` (f_0, f_1) `de` $\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M})$`]`.

La base du cube, et le carré composé de celui-ci et de (∗) (base du diagramme polyédral (∗∗)) étant cartésien, il en est de même de (∗). [page 33]

Lemme 2.7. *Soit* $(I_\alpha)_{\alpha \leq \alpha_0}$ *une suite ordinale croissante d'ouverts de* I*. Alors* $u_{I_0,I_{\alpha_0}} : Y_{I_0,I_{\alpha_0}} \longrightarrow Y_{I_{\alpha_0}}$ *est composé transfini, indexé par l'ensemble des ordinaux* $-1 \leq \alpha < \alpha_0$*, d'une suite de flèches* v_α*, où chaque* v_α *est déduit de* $u_{I_\alpha,I_{\alpha+1}}$ *par cochangement de base (et de* $u_{I_0} : X_{I_0} \longrightarrow Y_{I_0}$ *pour* $\alpha = 0$*).*

Pour le voir, on introduit la suite transfinie d'objets $Z_\alpha = Y_{I_\alpha,I_{\alpha_0}}$, définis par le diagramme

p. 19

$$\begin{array}{ccc} X_{I_\alpha} & \longrightarrow & X_{I_{\alpha_0}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y_{I_\alpha} & \longrightarrow & Y_{I_\alpha,I_{\alpha_0}} = Z_\alpha \\ & & \downarrow \\ & & Y_{I_{\alpha_0}} \ , \end{array}$$

on a $Z_0 = Y_{I_\alpha,I_{\alpha_0}}$, $Z_{\alpha_0} = Y_{I_\alpha,I_{\alpha_0}}$, $Z_\alpha = \varinjlim_{\beta<\alpha} Z_\beta$ si α ordinal limite. Donc il reste à [34]

déterminer les $v_{\alpha,\alpha+1} : Z_\alpha \longrightarrow Z_{\alpha+1}$ (pour $\alpha < \alpha_0$), ce qu'on voit sur le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} X_{I_\alpha} & \longrightarrow & X_{I_{\alpha+1}} & \longrightarrow & X_{I_{\alpha_0}} = Z_0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ Y_{I_\alpha} & \longrightarrow & Y_{I_\alpha, I_{\alpha+1}} & \longrightarrow & Y_{I_\alpha, I_{\alpha_0}} = Z_\alpha \\ & & \downarrow{\scriptstyle u_{I_\alpha, I_{\alpha+1}}} & & \downarrow{\scriptstyle v_{\alpha,\alpha+1}} \\ & & Y_{I_{\alpha+1}} & \longrightarrow & Y_{I_{\alpha+1}, I_{\alpha_0}} = Z_{\alpha+1} \ . \end{array}$$

Reprenons la démonstration de 2.1. On va prouver 1° par les deux lemmes précédents. Notons que lorsque l'espace sous-jacent à I est noethérien, alors la construction transfinie est forcément finie, donc on n'a pas besoin de la stabilité de C par composés transfinis infinis.

Prouvons 2°. On suppose donc que pour tout $i_0 \in I$, on ait $u_{I_{<\alpha_0}, I/i_0} \in C$, on veut en déduire que $u_\bullet \in C_I$, i.e. $u_{J,I/i_0} \in C$ pour *tout* ouvert. [35]

Lemme 2.8. (Sous hypothèse artinienne sur I.) *Soit $P \subset I$ l'ensemble des $i_0 \in I$ tels que pour $u_\bullet | I/i_0$ soit dans C_{I/i_0}, i.e. que pour tout $i \leq i_0$, et tout ouvert K de I/i, on ait $u_{K,I/i} \in C$. Soit $i_0 \in I$ tel que $I_{<i_0} \subset P$. Alors $i_0 \in P$.*

Démonstration. Il reste à prouver que si $K \subset I/i_0 = J$ est un ouvert, alors $u_{K,J} \in C$. On peut supposer $K \neq I/i_0$, i.e. $K \subset I_{<i_0} \overset{\text{déf}}{=} J'$. Mais alors par hypothèse initiale sur $u_\bullet$, on a $u_{J',J} \in C$, et d'autre part, par hypothèse sur i_0, $u_\bullet | J'$ est dans $C_{J'}$. Donc par le théorème 2.1. 1°, on a $u_{K,J'} \in C$. Donc par transitivité $u_{K,J} \in C$, q.e.d.

Corollaire 2.9. *Si I est artinien, alors $P = I$, i.e. $u_\bullet \in C_I$.*

Cela prouve donc 2.1. 2°. Notons que $\mathrm{Esp}(I)$ est noethérien, il en est de même de tout ouvert (tel J' ci-dessus), donc pour la conclusion du lemme, inutile de supposer C stable par composition infinie. [36]

Prouvons 2.1. 3°. On a a) $\Longrightarrow$ b), car par 2.1. 1°, $u_\bullet \in (TC)_I$ implique que pour $i \in I$, $u_i : X_i \longrightarrow Y_i$ est dans TC (cf. cor. 2.1 a). Donc il reste à prouver b) $\Longrightarrow$ a), i.e. si $u_\bullet \in C \cap W_{I^\circ}$, alors $u_\bullet \in (TC)_I$, i.e. les $u_{K,I/i_0}$ sont dans TC. On sait déjà que $u_{K,I/i_0} \in C$ par hypothèse $u_\bullet \in C_I$, donc il faut prouver que c'est dans W. On est ramené à prouver que $u_K \in W$, i.e. $u_K \in TC$, car par le diagramme (où $J = I/i_0$) p. 20

$$\begin{array}{ccc} X_K & \longrightarrow & X_J \\ {\scriptstyle u_K}\downarrow & \text{cocart.} & \downarrow{\scriptstyle \tilde{u}_{K,J}} \\ Y_K & \longrightarrow & Y_{K,J} \\ & & {\scriptstyle u_{K,J}}\downarrow \\ & & Y_J \ , \end{array} \qquad u_J : X_J \longrightarrow Y_J$$

$u_K \in TC$ implique $\tilde{u}_{K,J} \in TC$, et comme $u_J \simeq u_{i_0} \in W$ par hypothèse, il en résulte bien $u_{K,J} \in W$ par saturation. Mais on va s'y prendre autrement :

Lemme 2.9. *I ensemble ordonné quelconque, C, W comme dans th.* 2.1, 1° *et* 3°, *$u_\bullet : X_\bullet \longrightarrow Y_\bullet$ dans $C_I \cap W_{I^\circ}$. Soit P l'ensemble des $i_0 \in I$ tels que $u_\bullet | I/i_0$ soit dans $(TC)_{I/i_0}$. Si $i_0 \in I$ est tel que $I_{<i_0} \subset P$, alors $i_0 \in P$.* [37]

En effet, il reste à prouver que pour tout ouvert K de $J = I/i_0$, $K \neq J$, on a $u_{K,J} \in TC$. Mais pour ceci, il suffit de voir que $u_K, u_J \in W$ (comme on venait de le voir). Or $u_J \simeq u_{i_0} \in W$ par hypothèse. D'autre part $u_\bullet | K \in (TC_K)$ puisque $K \subset I_{<i_0} \subset P$, donc par le théorème 2.1, 1°, on conclut que $u_K \in TC$.

Si maintenant on suppose I artinien, il résulte de 3.9 que $P = I$, donc $u_\bullet \in (TC)_I$, q.e.d.

Cela achève la démonstration du théorème 2.1, et aussi du corollaire 2.5, vu que pour la démonstration du lemme 2.9 également, les hypothèses infinies sur C, $C \cap W$ sont inutiles si $\mathrm{Top}(I)$ est noethérien, donc ses ouverts sont aussi noethériens.

Remarques.

1) Dans 2.1. 2°, l'hypothèse I artinien n'est par superflue, comme on voit en prenant $I = \mathbf{N}^{\mathrm{opp}} \simeq \mathbf{Z}^{\leq 0}$, et pour une flèche [38]

$$\emptyset_{\mathcal{M}(I)} \longrightarrow Y_\bullet \ .$$

Dire que cette flèche est dans C_I signifie que les morphismes de transition $Y_i \xrightarrow{u_i} Y_{i+1}$ sont dans C, *et* que les Y_i sont C-cofibrants, i.e. $\emptyset_{\mathcal{M}} \longrightarrow Y_i$ est dans C, pour tout i. Mais la condition envisagée dans 2.1. 1° est seulement que les u_i sont dans C. Donc en prenant pour $Y_\bullet$ un système inductif constant de valeur Y, avec Y non C-cofibrant, i.e. $\emptyset_{\mathcal{M}} \longrightarrow Y$ non dans C, on a un contre-exemple.

Avec le même I, on voit que $u_\bullet : X_\bullet \longrightarrow Y_\bullet$ est dans C si et seulement si

a) les $u_i \in C$, et

b) les $u_{i,i+1} : Y_{i,i+1} \longrightarrow Y_{i+1}$ sont dans C.

Si de plus les u_i sont dans W, donc dans TC, on voit comme ci-dessus que $u_{i,i+1} \in TC$ pour tout i, donc $u_\bullet \in (TC)_I$. Donc ici on a encore p. 21

$$(TC)_I \ = \ C_I \cap W_{I^\circ} \ ,$$

quoique I ne soit pas artinien. J'ignore si l'hypothèse artinienne dans 2.1. 3° est superflue ou non.

2) Soit $u_\bullet \in \mathrm{Fl}(\mathcal{M}(I^\circ))$ [13], donc $u_\bullet$ est un objet de $\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M}(I^\circ)) \simeq \mathcal{M}(I^\circ \times \mathbf{\Delta}^1) = \mathcal{M}((I \times (\mathbf{\Delta}^1)^{\mathrm{opp}})^{\mathrm{opp}})$. On vérifie que pour que cet objet soit C-cofibrant, il faut et il suffit que

1°) $X_\bullet$ soit C-cofibrant, et

2°) $u_\bullet \in C_I$ (ce qui implique que $Y_\bullet$ est aussi cofibrant).

[39]

3 Catégories de modèles à cofibrations

Soit $\mathcal{M}$ une catégorie munie de deux ensembles de flèches

$$W, \ C \ \subset \ \mathrm{Fl}(\mathcal{M}) \ .$$

On suppose que $\mathcal{M}$ contient un objet initial, et :

Cof$_0$ W est modérément saturé, i.e. contient les isomorphismes et si f, g sont composables, et si deux parmi f, g, gf sont dans W, le troisième aussi.

Cof$_1$ C contient les isomorphismes, est stable par composition et par cochangement de base.

Cof$_2$ $TC \overset{\text{déf}}{=} C \cap W$ est stable par cochangement de base.

Cof$_3$ Toute flèche f dans $\mathcal{M}$ s'écrit

$$f \ = \ pi$$

avec $i \in C$, $p \in W$.

[40]

Ce sont les axiomes de K. S. Brown (forme duale), qui suppose de plus que les objets de $\mathcal{M}$ sont C-cofibrants, i.e. $\emptyset_{\mathcal{M}} \longrightarrow X$ est dans C. Je ne ferai pas cette hypothèse. La sous-catégorie $\mathcal{M}_c$ de $\mathcal{M}$ formée des objets C-cofibrants satisfait aux axiomes de Brown, de plus on prouve que

$$\mathrm{Ho}_W(\mathcal{M}_c) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ho}_W(\mathcal{M})$$

est une équivalence. Ainsi les résultats de Brown relatifs à $\mathcal{M}_c$, muni des ensembles de flèches induits par W, C, sont applicables à $\mathrm{Ho}_W(\mathcal{M})$ et à ses avatars (tels $\mathrm{Ho}_W(S\backslash\mathcal{M})$, $\mathrm{Ho}_W(\mathcal{M}/T)$ et $\mathrm{Ho}_W(S\backslash\underset{u_0}{\mathcal{M}}/T)$, où $u_0 : S \longrightarrow T$ est donné). Il se trouve que pour l'essentiel, les résultats homotopiques standard (notamment suite exacte de cofibrations relatifs aux opérations homotopiques "à droite" (ou faut-il dire à gauche ? il s'agit pourtant de questions d'exactitude à droite, non à gauche)) sont valables. Il me faudra revenir dessus de façon plus circonstanciée par la suite. Notamment, il y a une bonne théorie de carrés W-cocartésiens (et *dans* $\mathcal{M}_c$, il y a assez de W-cofibrations[14], …), et de plus, p. 22
ceux-ci sont *exacts*. La catégorie $\mathrm{Ho}_W(\mathcal{M}) \simeq \mathrm{Ho}_W(\mathcal{M}_c)$ "se calcule" par un calcul de [41]
fractions à gauche dans $\pi\mathcal{M}_c$, où $\pi\mathcal{M}_c$ est la catégorie déduite de $\mathcal{M}_c$ en y remplaçant les $\mathrm{Hom}_{\mathcal{M}_c}(X,Y) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(X,Y)$ par le quotient par une relation d'homotopie convenable :

$f, g : X \rightrightarrows Y$ sont QB-homotopes (au sens de *Quillen-Brown*) s'il existe un $X' \xrightarrow{\alpha} X$ dans W (et on peut supposer $X' \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}_c$ également) tel que $f\alpha \overset{1}{\sim} g\alpha$ au sens de Quillen, i.e. il existe un objet cylindre

$$\begin{array}{ccc} I_{X'} & \xrightarrow{\in W} & X' \\ {\scriptstyle \in C}\uparrow & \nearrow & \\ X' \vee X' & & \end{array}$$

pour X', tel que $(f\alpha, g\alpha) : X' \vee X' \longrightarrow Y$ se factorise par un $h' : I_{X'} \longrightarrow Y$.

C'est de ce critère que résulte l'exactitude (à gauche) des carrés W-cocartésiens.

Je veux voir comment une structure de cofibrations sur $\mathcal{M}$ s'étend aux catégories $\mathcal{M}(I^\circ) = \underline{\mathrm{Hom}}(I, M)$. On a dans $\mathcal{M}(I^\circ)$ l'ensemble W_{I°, et C_I (il vaut mieux sans [42]
doute le noter aussi C_{I°) défini au paragraphe précédent. Il s'agit de vérifier les axiomes. L'axiome Cof_0 est immédiat, et bien connu pour I une catégorie quelconque.

Cof_1 : C_{I° contient les isomorphismes, c'est clair, parce que C les contient. Stable par composition $X_\bullet \xrightarrow{u} Y_\bullet \xrightarrow{v} Z_\bullet$, regardons $K \subset J$, posons $w = v \circ u$,

$$\begin{array}{ccccccc} X_K & \longrightarrow & X_J & & & & \\ \downarrow & & \downarrow & & & & \\ Y_K & \longrightarrow & Y_{K,J} & \xrightarrow{u_{K,J}} & Y_J & & \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ Z_K & \longrightarrow & \bullet & \xrightarrow{u'_{K,J}} & Z_{K,J} & \xrightarrow{v_{K,J}} & Z_J\ , \\ & & \underbrace{\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad}_{w_{K,J}} & & & & \end{array}$$

$w_{K,J}$ est composé de $v_{K,J}$, qui est dans C, et $u'_{K,J}$, qui l'est car déduit de $u_{K,J}$ par cochangement de base.

(**N.B.** On a déjà fait le raisonnement avec un seul $u_\bullet$, et *trois* ouverts $J \subset K \subset L$. Il


13. $I^\circ = I^{\mathrm{opp}}$.
14. Plus précisément, par K. S. Brown, *dans* $\mathcal{M}_c$, les objets de C sont des W_c-cofibrations.

y aurait lieu d'introduire la notion de C-carré $\begin{array}{ccc} X_0 & \longrightarrow & X_1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_2 & \longrightarrow & X_3 \end{array}$, comme un carré tel que [43]
$X_1 \amalg_{X_0} X_2 \longrightarrow X_3$ soit dans C (**N.B.** notion symétrique pour les foncteurs de symétrie p. 23
des carrés), et dire que le composé de deux C-carrés est un C-carré.)

Cochangement de base

$$\begin{array}{ccc} X_\bullet & \xrightarrow{u} & Y_\bullet \\ \downarrow & & \downarrow \\ X'_\bullet & \xrightarrow{u'} & Y'_\bullet \end{array} .$$

Considérons $K \subset J$, on a



où les trois carrés latéraux marqués "cocart." sont cocartésiens, ainsi que le carré en plan incliné. Il en résulte, d'abord que le quatrième carré latéral du cube est lui aussi cocartésien, puis que le carré ayant deux côtés $u_{K,J}$, $u'_{K,J}$ est cocartésien. (**N.B.** comparer [44]
le diagramme similaire p. 32 – il y aurait un lemme commun à dégager, distinguant deux cas …)

Cof_2. Pour prouver que $C_{I^\circ} \cap W_{I^\circ}$ est stable par cochangement de base, je ne vois pas de façon de le faire, si je ne sais déjà qu'on a

$$C_{I^\circ} \cap W_{I^\circ} \;=\; (TC)_{I^\circ} \;, \qquad (*)$$

et alors on applique le résultat précédent (où W n'entrait pas) à TC au lieu de C. Mais pour avoir $(*)$, il faut que je suppose qu'on est dans l'un des deux cas suivants (de façon à pouvoir appliquer le théorème 2.1 et son corollaire 2.5).

a) I fini, ou plus généralement I artinien *et* $\mathrm{Top}(I)$ est noethérien.

b) I artinien, et de plus C et TC sont stables par composition transfinie.

Cof_3. L'axiome de facorisation me paraît a priori le plus délicat [15]. Mais cela sort finalement sans trop de mal. Soit donné

$$f \;:\; X_\bullet \longrightarrow Y_\bullet$$

dans $\mathcal{M}(I^\circ)$, considérons les triples p. 24
[45]

$$(J,\ Z,\ i,\ p) \;,$$

15. L'argument qui suit s'applique à d'autres situations de factorisation, par exemple pour un précouple de Quillen donné (Φ, Ψ) dans $\mathcal{M}$.

où $J \subset I$ est un ouvert, Z un objet de $\mathcal{M}(J^\circ)$, et i, p sont des flèches

$$\begin{cases} X|J \xrightarrow{i} Z \xleftarrow{p} Y|J \\ \text{avec } i \in C_{J^\circ},\ p \in W_{J^\circ}. \end{cases}$$

On ordonne les quadruples par prolongement. Si on a un ensemble totalement ordonné, de $(J_\alpha, Z_\alpha, i_\alpha, p_\alpha)$, posant $J = \bigcup I_\alpha$, on trouve de Z, i, p uniques sur J qui prolongent les Z_α, i_α, p_α donnés, de plus on aura $i \in C_{J^\circ}$, $p \in W_{J^\circ}$, car l'appartenance à C_{J° resp. W_{J° est question locale sur J. Donc par Zorn, on est ramené à prouver que si (J, Z, i, p) est maximal, on a $J = I$ – d'ou la factorisation voulue $f = pi$. Donc à prouver que si $J \neq I$, le quadruple n'est pas maximal. Considérons le fermé non vide $I \backslash J$. I est supposé artinien, il y a un *élément minimal* i_0 de $I \backslash J$. Posons [46]

$$J' \ = \ J \cup \{i_0\} \ = \ J \cup I/i_0,$$

et montrons qu'on peut prolonger le triplet Z, i, p en Z', j', p' sur J'. Posant $K' = I/i_0$, $K = J \cap K = I_{<i_0}$, on a donc

$$\begin{array}{ccc} K = J \cap K' & \hookrightarrow & K' = I/i_0 \\ \downarrow & & \downarrow \\ J & \hookrightarrow & J' = J \cup K'. \end{array}$$

On voit alors que les prolongements de (Z, i, p) de J à J' correspondent à ceux de $(Z|K', i|K', p|K')$ à K. Pour ceci, on note que pour une flèche φ d'objets de $\mathcal{M}(J'^\circ)$, cette flèche est dans $C_{J'^\circ}$ resp. $W_{J'^\circ}$, si et seulement si ses restrictions à J et à K' le sont.

On est donc ramené au cas standard d'un ensemble ordonné avec objet final e_0, ensemble ordonné qu'on va noter I, et l'ensemble ordonné I' des objets $i < e_0$, i.e. $I' = I\backslash\{i_0\}$. On a $f : X_\bullet \longrightarrow Y_\bullet$, flèche dans $\mathcal{M}(I^\circ)$, une factorisation de $f|I'$ en $p' \circ i'$ avec $i' \in C_{I'^\circ}$, $p' \in W_{I^\circ}$, et il s'agit de la prolonger en une factorisation similaire de f. [47] On note que la donnée d'un objet $X_\bullet$ de $\mathcal{M}(I^\circ)$ équivaut à celle d'un objet $X'_\bullet$ de $\mathcal{M}(I'^\circ)$ (la restriction de X à I') et d'une flèche

$$X'_{I'} \xrightarrow{\alpha_X} X_{e_0} = X_0$$

dans $\mathcal{M}$, où $X'_{I'} = \varinjlim_{i' \in I'} X'_{i'}$. Donc la donnée de la flèche $f : X_\bullet \longrightarrow Y_\bullet$ revient à celle de $f' = f|I' : X'_\bullet \longrightarrow Y'_\bullet$, et d'une flèche $f_0 : X_0 \longrightarrow Y_0$ rendant commutatif le carré p. 25

$$\begin{array}{ccc} X'_{I'} & \xrightarrow{\alpha_X} & X_0 \\ {\scriptstyle f'_{I'}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_0} \\ Y'_{I'} & \xrightarrow{\alpha_Y} & Y_0\ . \end{array}$$

De même, trouver une factorisation de f en pi, qui prolonge une factorisation donnée $f' = p'i'$ sur J', revient à la donnée d'un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} & & X'_{I'} & \xrightarrow{\alpha_X} & X_0 \\ & {\scriptstyle i'_{I'}}\swarrow & & {\scriptstyle i_0}\swarrow & \\ Z_{I'} & \xrightarrow[\alpha_{Z_{I'}}]{f'_{I'}} & Z_0 & & \downarrow{\scriptstyle f_0} \\ & {\scriptstyle p'_{I'}}\searrow & \downarrow & {\scriptstyle p_0}\searrow & \\ & & Y'_{I'} & \xrightarrow[\alpha_Y]{} & Y_0\ , \end{array} \qquad (*)$$

[48 vide]
[49]


où l'objet Z_0, et les trois flèches α_Z, i_0, p_0 sont à déterminer. Si on a $i' \in C_{I'^\circ}$, $p \in W_{I'^\circ}$, alors on conclut par théorème 2.1. 1° (cor. 2.2) que

$$i'_{I'} \ \in \ C \ ,$$

et si on veut que $i \in C_{I^\circ}$, $p \in W_{I^\circ}$, il reste seulement à exiger

$$p_0 \in W, \qquad (i'_{I',I} : \underbrace{Z_{I'} \amalg_{X_{I'}} X_0}_{Z'_0} \longrightarrow Z_0) \in C,$$

d'après le théorème 2.1. 2°. On va alors construire le diagramme (∗), à partir du diagramme similaire ci-dessous



(avec Z_0 de (∗) remplacé par $Z'_0 = Z_{I',I}$) en factorisant la flèche canonique $p'_0 : Z'_0 \longrightarrow Y_0$ en

$$p'_0 \ = \ p_0 j_0 \ , \qquad \text{avec } p_0 \in W, \ j_0 \in C \ ,$$

et en posant

$$i_0 \ = \ j_0 i'_0 \ ,$$

ce qui achève la construction.

On a ainsi prouvé le

Théorème 3.1. *Soit $(\mathcal{M}, W, C)$ une catégorie à cofibrations (cf. page 39), $\mathcal{M}$ stable par $\varinjlim$ finies. Pour tout ensemble odonné I, considérons le tuple $(\mathcal{M}(I^\circ), W_{I^\circ}, C_{I^\circ})$* p. 26
correspondant, où C_{I° est défini au paragraphe 2 (cf. à ce sujet le théorème 2.1). Supposons [50]
que I soit un ensemble ordonné artinien *(p.ex. I localement fini, i.e. les I/i finis). Supposons de plus qu'on soit dans l'un des deux cas suivants :*

a) *L'espace* $\mathrm{Esp}(I)$ *est noethérien, i.e. toute suite croissante d'ouverts de I est stationnaire (p.ex. I fini).*

b) *C et $TC = C \cap W$ sont stables, non seulement par composition ordinaire, mais aussi par composition transfinie. Dans ce cas, on suppose aussi $\mathcal{M}$ stable par petites $\varinjlim$ filtrantes (donc par petites $\varinjlim$ quelconques).*

Sous ces conditions, $(\mathcal{M}(I^\circ), W_{I^\circ}, C_{I^\circ})$ est également une catégorie à cofibrations.

Proposition 3.2. *Soit $u : I \longrightarrow I'$ une application croissante entre ensembles ordonnés, d'où un couple de foncteurs adjoints*

$$\mathcal{M}(I^\circ) \underset{u^*}{\overset{u_!}{\rightleftarrows}} \mathcal{M}(I'^\circ) \quad . \tag{3.2.1}$$

a) *Le foncteur u^* est compatible avec les localiseurs $W_{I'^\circ}$, W_{I°. Si I est discrète, ou u étale, alors u^* applique $C_{I'^\circ}$ dans C_{I°. Il en est encore de même quand u est* [51]
localement cofiltrant, i.e. si pour tout $i' \in \mathrm{Ob}\, I'$, la catégorie $i'\backslash I$ est localement filtrante, i.e. ses composantes connexes sont cofiltrantes (condition PS_g 1 *sur $i'\backslash I$)* (16).

16. inutile de parler de "faiblement" localement cofiltrant, car il s'agit d'ensembles ordonnés où il n'y a pas à distinguer entre notions forte et faible.

b) *Dans tous les cas, $u_!$ transforme C_{I° en $C_{I'^\circ}$, TC_{I° en $TC_{I'^\circ}$, enfin $\mathcal{M}(I^\circ)_c$ en $\mathcal{M}(I'^\circ)_c$.*

Démonstration. Prouvons a), dans le cas le plus gênant, où on suppose seulement que u est localement faiblement cofiltrant. On applique II 7.4 (p. 92), qui nous dit que $\forall i \in \mathrm{Ob}\, I$, considérant le morphisme induit par u [52]

$$I/i \longrightarrow I'/i' \qquad (\text{où } i' = u(i)),$$


celui-ci est *(globalement)* faiblement cofiltrant, et que pour tout ouvert U de I/i, désignant par U' l'ouvert engendré par son image, le morphisme induit $v : U \longrightarrow U'$ est encore faiblement cofiltrant, et a fortiori *cofinal.* Soit alors $f' : X' \longrightarrow Y'$ une flèche dans $C_{I'^\circ}$, prouvons que

$$\underbrace{u^*(f')}_{f} \;:\; \underbrace{u^*(X')}_{X} \longrightarrow \underbrace{u^*(Y')}_{Y}$$

est dans C_{I°, i.e. que pour tout $i \in I$, et U ouvert de I/i, dans le diagramme canonique p. 27

$$\begin{array}{ccc} X_U & \longrightarrow & X(i) \\ \downarrow & \text{cocart.} & \downarrow \\ Y_U & \longrightarrow & Y_{U,i} \\ & & \downarrow{\scriptstyle v_{U,i}} \\ & & Y(i)\ , \end{array} \qquad (*)$$

la flèche $v_{U,i}$ est dans C. Le diagramme $(*)$ s'envoie dans le diagramme similaire pour [53] $f' : X' \longrightarrow Y'$, $i' = u(i)$, et l'ouvert $U' \subset I'/i'$ engendré par $u(U)$:



$(**)$

Par cofinalité, les deux flèches verticales $c_U^{X'}$ et $c_U^{Y'}$ sont des isomorphismes, en plus de $X(i) \xrightarrow{id} X'(i')$, donc la quatrième flèche du cube, $c_{U,i}^{f'}$, est un isomorphisme. Comme $v_{U',i'}$ est dans C, $v_{U,i}$ aussi, on gagne.

Prouvons b). Soit donc

$$f \;:\; X \longrightarrow Y$$

une flèche dans C_I, et soit

$$f' \;=\; u_!(f) \;:\; u_!(X) = X' \longrightarrow u_!(Y) = Y',$$

prouvons que c'est dans $C_{I'^\circ}$, donc que pour deux ouverts $U' \subset V'$ de I' (où on peut [54] supposer que $V' = I'/i'$), dans le diagramme-base de $(**)$, $v_{U',V'}$ soit dans C. Soit $U = u^{-1}(U')$, $V = u^{-1}(V')$, et considérons le diagramme similaire à $(**)$, défini par les deux inclusions d'ouverts $U' \subset V'$, $U \subset V$. Cette fois, comme la formation de $u_!$ commute

aux restrictions aux ouverts, par transitivité des $\varinjlim$, les trois flèches vertivales $c^X_{U'}$, $c^Y_{U'}$, $c^X_{V'}$ sont des isomorphismes, donc aussi $c^f_{U',V'}$. De même, la flèche $Y_V \longrightarrow Y'_{V'}$ (à la place de $Y(i) \longrightarrow Y'(i')$) est un isomorphisme. Comme $v_{U,V} \in C$, il en est de même de $v_{U',V'}$, ce qui prouve que $f' \in C_{I'^\circ}$. On procède de même pour TC_I. Enfin, l'assertion que $u_!$ applique $\mathcal{M}(I^\circ)_c$ dans $\mathcal{M}(I'^\circ)_c$ résulte des définitions et de $u_!(C_{I^\circ}) \subset C_{I'^\circ}$.

Corollaire 3.3 (de prop. 3.2 et th. 3.1). *Soit $u : I \longrightarrow I'$ comme dans* 3.2. *Supposons de plus I artinien, et qu'on soit pour $\mathcal{M}$, W, C, I dans l'une des conditions* a), b) *du théorème* 3.1. *Alors $u_!$ induit une flèche* p. 28 [55]

$$u_{!\,\mathrm{cof}} \ : \ \mathcal{M}(I^\circ)_c \longrightarrow \mathcal{M}(I'^\circ)_c \ \subset \ \mathcal{M}(I'^\circ)$$

qui transforme flèches de $W(I^\circ)$ en flèches de $W(I'^\circ)$ (i.e. compatible avec les localiseurs). Il induit donc un foncteur sur les localisés, d'où un

$$u_!^W \ : \ \mathrm{Ho}_W(I^\circ) \longrightarrow \mathrm{Ho}_W(I'^\circ) \qquad {}^{(17)}. \tag{3.3.1}$$

Démonstration. Par le théorème 3.1, on sait que $\mathcal{M}(I^\circ)$, $W(I^\circ)$, $C(I^\circ)$ est une structure de catégorie de modèles à cofibrations. On sait par ailleurs que $TC_{I^\circ} = C_{I^\circ} \cap W(I^\circ)$, par th. 2.1. 3° (p. 27). Donc par 3.2, $u_!$ applique $C_{I^\circ} \cap W(I^\circ)$ dans $TC_{I'^\circ} = C_{I'^\circ} \cap W(I'^\circ)$, et a fortiori, en des flèches dans $W(I'^\circ)$. Par ailleurs, par la théorie des catégories à cofibrations, on trouve que toute flèche f entre objets cofibrants est composée $f = pi$, où $i \in C_{I^\circ}$, et où p est dans $W(I^\circ)$, et de plus *inverse à gauche* d'une flèche dans $C_{I^\circ} \cap W(I^\circ)$, i.e. d'une flèche de $(TC)_{I^\circ}$. Quand $f \in W(I^\circ)$, alors $i \in W(I^\circ)$, [56] donc $i \in W(I^\circ) \cap C_{I^\circ} = (TC)_{I^\circ}$. Au total, toute flèche $f \in W(I^\circ)_c$ est composée pi dans $\mathcal{M}(I^\circ)_c$, où $i \in (TC)_{I^\circ}$, et p est inverse à gauche d'une $j \in (TC)_{I^\circ}$. Comme $u_!$ transforme $(TC)_{I^\circ}$ en $(TC)_{I'^\circ}$, il transforme f en $f' = p'i'$, avec $i' \in (TC)_{I'^\circ} \subset W_{I'^\circ}$, et p' inverse à gauche d'une $j' = u_!(j)$ qui est également dans $W_{I'^\circ}$. Mais alors $i' \in W(I'^\circ)$, donc aussi $f' = p'i' \in W_{I'^\circ}$, ce qui prouve que $u_!(W(I^\circ)_c) \subset W(I'^\circ)$. La dernière assertion provient du lemme suivant, appliqué à $(\mathcal{M}(I^\circ), W(I^\circ), C_{I^\circ})$ au lieu de $(\mathcal{M}, W, C)$:

Lemme 3.4. *Soit $(\mathcal{M}, W, C)$ une catégorie à cofibrations. Alors l'inclusion $\mathcal{M}_c \subset \mathcal{M}$ induit une équivalence*

$$\mathcal{M}_c W_c^{-1} \xrightarrow{\sim} \mathcal{M}W^{-1} = \mathrm{Ho}_W \ .$$

Nous donnerons la démonstration (par AQT `[âne qui trotte]`) ultérieurement.

Cela achève la démonstration de 3.3.

3.5. Il se pose la question si le foncteur $u_!^W$ de (3.3.1) est bien un adjoint à gauche du foncteur en sens inverse u_W^*, induit par u^*. Notons que c'est le cas si u^* transforme [57] $\mathcal{M}(I'^\circ)_c$ en $\mathcal{M}(I^\circ)_c$, et quand on suppose que I' est également artinien et satisfait également à l'une des hypothèses a) b) du théorème 3.1. Car alors $(\mathcal{M}(I^\circ), W(I^\circ), C_{I^\circ})$ est une catégorie à cofibrations par le théorème 3.1, on peut lui appliquer le lemme précédent, donc u_W^* et $u_!^W$ se réalisent à partir d'un couple de foncteurs

$$\mathcal{M}(I^\circ)_c \underset{u_c^*}{\overset{u_!^c}{\rightleftarrows}} \mathcal{M}(I'^\circ)_c \ ,$$

lesquels sont visiblement adjoint l'un de l'autre (puisque induits par un couple de p. 29 foncteurs adjoints $u_!$, u^*), et de plus compatibles aux localiseurs. Donc on peut appliquer le lemme des foncteurs adjoints pour les localisés. Pour résumer :

Corollaire 3.5. *Supposons que I, I' soient artiniens, et qu'on soit dans l'un des deux cas suivants :*

a) *Les espaces* $\mathrm{Esp}(I)$, $\mathrm{Esp}(I')$ *sont noethériens (p.ex.* I, I' *finis).*

b) C *et* $TC = C \cap W$ *sont stables par composition transfinie.*

Supposons de plus que u^* *applique* $\mathcal{M}(I'^{\circ})_{\mathrm{c}}$ *dans* $\mathcal{M}(I^{\circ})_{\mathrm{c}}$*, ce qui est le cas notamment si* u *est localement cofiltrant, i.e. les ensembles ordonnés localisés* $i'\backslash I$ *sont localement cofiltrants. Alors le foncteur* $u_!^W$ *construit dans (3.3.1) est adjoint à gauche de* u_W^**.*

Remarque 3.6. Quand on a un couple de foncteurs adjoints

$$\mathcal{C} \underset{u^*}{\overset{u_!}{\rightleftarrows}} \mathcal{C}' \quad ,$$

avec les localiseurs W, W' de $\mathcal{C}$, $\mathcal{C}'$, u^* compatible aux localiseurs, et si de plus on a une sous-catégorie pleine $\mathcal{C}_0$ de $\mathcal{C}$ telle que

a) $u_!|\mathcal{C}_0$ transforme flèches de W en flèches de W', et

b) l'inclusion $\mathcal{C}_0 \hookrightarrow \mathcal{C}$ induit une *équivalence* $\mathcal{C}_0 W_0^{-1} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C}W^{-1}$ (où $W_0 = W \cap \mathrm{Fl}(\mathcal{C}_0)$),

on trouve deux foncteurs canoniques

$$\mathcal{C}W^{-1} \underset{u_W^*}{\overset{u_!^W}{\rightleftarrows}} \mathcal{C}'W'^{-1} \quad ,$$

où $u_!^W$ est défini seulement à isomorphisme canonique près.

Contrairement à ce que prétend Anderson, il n'est par vrai en général que ces deux foncteurs soient adjoints, sans hypothèses supplémentaires. Voici un contrexemple : on prend $\mathcal{C} = \mathcal{C}'$, $u_! = u^* = \mathrm{id}_{\mathcal{C}}$, $W' = \mathrm{Is}(\mathcal{C})$, $W = \mathrm{Fl}(\mathcal{C})$, donc u_W^* est le foncteur canonique [page 59]

$$\underbrace{\Pi\mathcal{C}}_{\text{groupoïde fondamental}} \longleftarrow \mathcal{C} \ .$$

Supposons que $\mathcal{C}$ soit 1-connexe, i.e. $\Pi\mathcal{C}$ soit équivalente à e. Soit $e \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$ tel que $\mathrm{End}_{\mathcal{C}}(e)$ soit le groupe unité, et prenons $\mathcal{C}_0 = \{e\}$. Alors l'hypothèse sur $\mathcal{C}_0$ est satisfaite. Mais si $u_!^W$ était adjoint à gauche de u_W^*, e serait objet initial de $\mathcal{C}$. Par exemple si $\mathcal{C}$ a un objet final e (ce qui implique que $\mathcal{C}$ est 1-connexe et e rigide), cet objet final devrait être initial si Anderson avait raison avec "it is clear that …".

Néanmoins :


Théorème 3.7. *Soit* $(\mathcal{M}, W, C)$ *une catégorie à cofibrations stable par* $\varinjlim$ *finies, et* $u : I \longrightarrow I'$ *une application croissante entre ensembles ordonnés artiniens. On suppose qu'on est sous l'une des hypothèses suivantes.* [page 60]

a) $\mathrm{Esp}(I)$, $\mathrm{Esp}(I')$ *sont noethériens, p.ex.* I, I' *finis.*

b) C *et* $TC \overset{\text{déf}}{=} C \cap W$ *sont stables par composition transfinie, et* $\mathcal{M}$ *stable par petites* $\varinjlim$ *filtrantes.*

Alors le foncteur $u_!^W : \mathrm{Ho}_W(I^{\circ}) \longrightarrow \mathrm{Ho}_W(I'^{\circ})$ *construit dans* (3.3.1) *est adjoint à gauche du foncteur* u_W^* *en sens opposé.* p. 30

Démonstration. On utilise le diagramme bien connu



17. **N.B.** Cette flèche est définie, même sans supposer I' ordonné, car $u_{!\,\mathrm{cof}}$ transforme encore flèches de $W(I^{\circ})$ en flèches de $W(I'^{\circ})$. Cf. commentaire p. 86.

pour factoriser u en

$$u \;=\; vw\ ,$$

où w est une *immersion fermée,* et v est déduit de $\mathrm{pr}_1 : I \times \mathbf{\Delta}^1 \longrightarrow I$ par push-out. C'est une rétraction du mapping-cone C(u) sur l'ouvert I', dont le complémentaire fermé s'identifie à I via w.

[page 61]

Le foncteur de recollement entre I', I

$$H \;:\; I'^{\circ} \times I \;\longrightarrow\; \mathrm{Ens}$$

est donné par

$$\underbrace{H(i',i)}_{=\mathrm{Hom}_{C(u)}(i',i)} \;=\; \mathrm{Hom}_{I'}(i',u(i))\ . \qquad (*)$$

La rétraction v de $C(u)$ dans I' applique i dans $u(i)$, et une flèche $i' \longrightarrow i$ correspondant à $i' \longrightarrow u(i)$ dans I' via $(*)$, est transformé par v en cette même flèche $i' \longrightarrow u(i)$. Calculons, pour i'_0 donné, la catégorie $i'_0\backslash\Big(C(u),\ v : C(u) \longrightarrow I'\Big)$, des couple d'un objet ξ de $C(u)$ et d'une flèche $i'_0 \longrightarrow v(\xi)$ dans I'. On voit que $i'_0\backslash C(u)$ admet l'ouvert $i'_0\backslash I'$, avec le complémentaire fermé $i'_0\backslash I$,

$$\begin{array}{ccccc} & & & & \text{fermé} \\ & & & & \text{complémentaire} \\ & & & & \text{de } I' \\ I' & \xhookrightarrow[\text{ouvert}]{} & C(u) & \xhookleftarrow{} & I \\ & & \Big\downarrow & & \\ & & I' & & \end{array}\ ,$$

ces deux catégories étant recollées par le bifoncteur

$$\begin{array}{rcl} (i'_0\backslash I')^{\circ} \times (i'_0\backslash I) & \longrightarrow & \mathrm{Ens} \\ \Big((\alpha : i'_0 \longrightarrow i'), (\beta : i'_0 \longrightarrow u(i), i)\Big) & \longmapsto & \mathrm{Hom}_{i'_0\backslash I'}(i', u(i)) \end{array}$$

induit par $(*)$; i.e. les flèches de $(\alpha : i'_0 \longrightarrow i') \in \mathrm{Ob}\,(i'_0\backslash I')$ dans $(\beta : i'_0 \longrightarrow u(i)) \in i'_0\backslash I$ sont les flèches $i' \xrightarrow{\gamma} u(i)$ telles que le triangle

p. 31

$$\begin{array}{ccc} & i'_0 & \\ {\scriptstyle\alpha}\swarrow & & \searrow{\scriptstyle\beta} \\ i' & \xrightarrow{\ \gamma\ } & u(i) \end{array}$$

commute.

[page 62]

Si $i' = i'_0$, $\alpha = \mathrm{id}_{i'_0}$, alors cette commutativité revient à $\gamma = \beta$, ce qui signifie qu'il y a une flèche et une seule de α dans (i, β). Cela montre donc que $(i'_0, \mathrm{id}_{i'_0})$ est un objet initial de $i'_0\backslash C(u)$. On a donc prouvé le lemme :

Lemme 3.8. *Soit $u : I \longrightarrow I'$ une flèche dans* (Cat)*, factorisons-le en*

$$I \xrightarrow{w} C(u) \xrightarrow{v} I'\ ,$$

où $C(u)$ est le mapping-cone défini page 60*, w une immersion fermée de complémentaire I', v la rétraction canonique de $C(u)$ sur I'. Ceci posé, pour tout $i'_0 \in \mathrm{Ob}\, I'$, la catégorie*

$i'_0\backslash(C(u),v)$ *admet un objet initial – donc* $v : C(u) \longrightarrow I'$ *est (tout ce qu'il y a de) cofiltrante.*

Nous pouvons maintenant prouver 3.7. Tout d'abord, les hypothèses faites sur I, I' se transportent à $C(u)$ (hypothèse artinienne, et éventuellement hypothèse noethérienne sur $\mathrm{Esp}(C(u))$). Donc on peut appliquer les résultats précédents, notamment 3.5, aux [page 63] flèches v, w. Le lemme précédent montre bien que v satisfait aux conditions de 3.5, donc le foncteur $v_!^W$ construit dans 3.3.1 est adjoint à gauche de v_W^*. Considérons d'autre part le foncteur $w_!^W$ construit dans 3.3.1, je dis que la même conclusion s'applique. Cela provient du fait que w est une immersion fermée. En effet, dans ce cas il est immédiat que

$$w_! \ : \ \mathcal{M}(I^\circ) \ \longrightarrow \ \mathcal{M}(I'^\circ), \qquad \text{où } I = C(u),$$

est compatible avec les localiseurs, puisque l'on a

$$\begin{cases} w_!(X)(j) \ \simeq \ X(j) & \text{si } j \in I, \\ w_!(X)(j) \ \simeq \ \emptyset_{\mathcal{M}} & \text{si } j \in J\backslash I, \end{cases}$$

par le calcul des fibres

$$w_!(X)(j) \ \simeq \ \varinjlim_{i \in I/j} X(i) \ .$$

Donc la définition de $w_!^W$ donnée dans 3.3.1 revient en fait à passer directement aux catégories localisées pour $w_!$, sans avoir à se restreindre à $\mathcal{M}(I^\circ)_{\mathrm{c}}$, et le lemme des foncteurs adjoints nous dit que ce foncteur est adjoint à gauche de w_W^*. p. 32

Comme on a évidemment [page 64]

$$u_!^W \ \simeq \ v_!^W \circ w_!^W \ , \qquad u_W^* \ \simeq \ w_W^* \circ v_W^* \ ,$$

on en conclut que $u_!^W$ est bien adjoint à gauche de u_W^*, q.e.d.

Corollaire 3.9. *Soit* $(\mathcal{M}, W, C)$ *une catégorie à cofibrations. Alors le prédérivateur* $\mathbf{D}_W$*, restreint à la catégorie* Diag_0 *formée des catégories* I ordonnées *artiniennes et telles que* $\mathrm{Esp}(I)$ *soit noethérien, satisfait aux axiomes* Dér 1 (décomposition), Dér 2 (localisation), Dér 3 (objet final), Dér 4 bis (existence de $u_!$), Dér 5 bis (mode de calcul des $u_!$), Dér 6 (exactitude des carrés W-cocartésiens). *Si* C, $TC = C \cap W$ *sont stables par composition transfinie, on a le même résultat sur la catégorie* Diag *formée des catégories* I *ordonnées artiniennes sans plus.*

[page 65]

3.10. Ainsi, pour avoir un dérivateur au plein sens du terme, soit sur Diag_0, soit sur Diag, il ne manque que Dér 4 (existence des u_*), Dér 5 (calcul des u_*) et Dér 6 (exactitude des carrés W-cartésiens). On va les obtenir en principe à l'aide d'une structure de *catégorie à fibrations* $(\mathcal{M}, F, W)$ associé à $(\mathcal{M}, W)$, i.e. l'espèce de structure duale de celle introduite page 39. Ces deux structures n'ont pas à être reliées entre elles d'une façon autre que par le fait qu'elles correspondent au même W. Elles sont considérablement plus faciles à construire que des structures de Quillen (W, C, F), où C, F doivent être reliés de façon extrêmement stricte, avec les propriétés $C \longleftrightarrow \underbrace{TF}_{=F\cap W}$, $\underbrace{TC}_{=C\cap W} \longleftrightarrow F$ (dont il n'est pas question dans l'axiomatique de K. S. Brown), et factorisation pour (C, TF) et (TC, F).

[page 66]

Mais revenant à la construction des $u_!^W$, il reste le problème de les construire pour une flèche $u : I' \longrightarrow I$ *quelconque* dans Cat.

À vrai dire, la construction du foncteur

$$u_!^W \ : \ \mathrm{Ho}_W(I^\circ) \ \longrightarrow \ \mathrm{Ho}_W(I'^\circ) \qquad (3.3.1)$$

est valable sans supposer que I' soit une catégorie ordonnée – ça peut être une catégorie quelconque. Cela provient du fait que le foncteur induit par $u_!$,

$$u_{!\,\mathrm{cof}} \ : \ \mathcal{M}(I^\circ)_\mathrm{c} \ \longrightarrow \ \mathcal{M}(I'^\circ)$$

est encore compatible avec les localiseurs, comme on voit par le calcul des fibres

$$u_!(X)(i) \ \simeq \ \varinjlim_{i\in I/i'} X(i) \ .$$

Ainsi, on est ramené aux cas où $I' = e$, quitte à remplacer I par I/i', et en notant que ($I/i' \longrightarrow I$ étant étale) l'image inverse de X sur I/i' est cofibrant (cf. 3.2.a).

[page 67] Mais il se présente à nouveau la perplexité si le foncteur (3.3.1) ainsi construit est bien adjoint à gauche de u^*_W. On peut songer à utiliser encore la même factorisation en $u = vw$, en utilisant le mapping-cone. La difficulté, cependant, c'est qu'à présent p. 33 $J = C(u)$ n'est plus une catégorie ordonnée, donc on n'a pas une définition toute prête de $C_{J^\circ} \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M}(J^\circ))$, donnant lieu à une sous-catégorie $\mathcal{M}(J^\circ)_\mathrm{c}$ etc. En fait, il semblerait qu'on soit pratiquement paralysé, tant qu'on n'arrive à construire sur $\mathcal{M}(J^\circ)$ également une structure de catégorie à cofibrations, se comportant bien par rapport au foncteurs $v_!$. La "démonstration" d'Anderson de l'existence de $u_!$ pour *toute* flèche dans Cat, foire totalement (même pour $I \longrightarrow e$, I ensemble ordonné fini – mais là j'ai pu rétablir la situation), car il se ramène au cas où I est ordonné localement fini, et il admet sans plus [page 68] que *dans ce cas* $u_!^W$ est adjoint à gauche de u^*_W, et *de plus,* que si u est $\mathbf{W}_0$-connexe, donc $u^* : \mathcal{M}(I'^\circ) \longrightarrow \mathcal{M}(I^\circ)$ pleinement fidèle, qu'il en soit de même de u^*_W déduit par passage aux localisés. Or même si on admet que $u_!^W$ est adjoint à gauche de u_*^W, faute de disposer d'un morphisme d'adjonction tout près "en bas" (dans $\mathrm{Ho}_W(I'^\circ)$), déduit du morphisme d'adjonction dans $\mathcal{M}(I^\circ)$, il n'est absolument pas clair que u^*_W soit pleinement fidèle, i.e. $u_!^W$ un foncteur de localisation. Le contrexemple 3.6 montre bien que, même si on a adjonction (i.e. si e est un objet initial de $\mathcal{C} = \mathcal{C}'$), le foncteur $u^* = \mathrm{id}_\mathcal{C}$ a beau être pleinement fidèle (et même une équivalence de catégories), le foncteur localisé n'a aucune raison de l'être : cela pouverait que tout objet de Cat ayant un objet initial est équivalent à e !

[page 69] **3.11.** Disons qu'on a une *catégorie à cofibrations stricte,* si dans l'axiome Cof_3 de factorisation (cf. p. 39), la factorisation peut être prise fonctoriellement en f. Il revient $\pm$ au même de dire que l'axiome de factorisation reste valable, quand on pense à une catégorie $\mathcal{M}(I)$ pour I dans Cat, en y définissant $W(I)$ et $C(I)$ (à ne pas confondre avec C_I) fibre par fibre. Cela revient au même tout au moins si $\mathcal{M}$ est équivalente à une petite catégorie. Sinon, il faut supposer fonctorialité pour toute *petite* sous-catégorie pleine de $\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M})$. Il vaut mieux définir la catégorie à cofibrations stricte par cette propriété de stabilité.

On voit alors que le prédérivateur $\mathbf{D} = \mathbf{D}_\mathcal{M}$ sur Cat est un dérivateur *relativement à* $\mathcal{D} = \mathrm{Diag}_0$ défini plus haut (catégories ordonnées I artiniennes, telles que $\mathrm{Esp}(I)$ soit noethérien), ou même relativement à $\mathcal{D} = \mathrm{Diag}$ (catégories ordonnées I artiniennes sans plus) lorsque C et TC sont stables par composition transfinie. J'entends par là que $u_!$ existe quand u est une flèche de $\mathcal{D}$, et que ça reste valable quand on passe à un dérivateur [page 70] induit $\mathbf{D}_Z$ (Z dans Cat quelconque) ; en d'autre termes, que $v_!$ existe quand v est de la forme $\mathrm{id}_Z \times u$, où $u : I \longrightarrow I'$ est une flèche de $\mathcal{D}$, et que le calcul se fait *au dessus de* I' selon la règle Dér 5 bis. Cela signifie donc que la flèche de changement de base pour les

$f_!$ est un isomorphismes dans le cas suivant :

$$\begin{array}{ccc} I \times Z & \longleftarrow & (i'\backslash I) \times Z \\ \downarrow{\scriptstyle u\times \mathrm{id}_Z} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_2} \\ I' \times Z & \longleftarrow & \{i'\} \times Z \end{array} ,$$

où i' est un objet quelconque de I'.

L'hypothèse *stricte* pour une catégorie à cofibrations me paraît assez anodine, dans la plupart des cas à ma connaissance, elle est satisfaite. Mais même moyennant cette hypothèse, je ne vois aucun moyen de prouver l'existence de $u_!$ pour *toute* flèche de Cat, et c'est une situation bien sûr très gênante. On voudrait absolument dégager des conditions qui assurent la validité de Dér 4 bis et de Dér 5 bis (existence de $u_!$ pour *toute* flèche de Cat, et mode de calcul des fibres …). p. 34 [page 71]

4 Catégories à cofibrations spéciales

4.1. Je suppose à présent que

ⓐ $\mathcal{M}$ est stable par $\varinjlim$ filtrantes, et

ⓑ que ses objets sont accessibles,

de sorte qu'on est sous les conditions d'application du théorème de factorisation (XV, §1). On suppose :

ⓒ donné $W, C \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$, satisfaisant les conditions Cof_1, Cof_2 de page 39. Pour Cof_3, cf. plus bas.

ⓓ C, $TC \overset{\text{déf}}{=} C \cap W$ *stables par composition transfinie* (c'est le cas si la structure provient d'une structure de Quillen close (W, C, F)).

$$TF \overset{\text{déf}}{=} C_* \ \subset \ \mathrm{Fl}(\mathcal{M}) \ , \tag{4.1}$$

il résulte du théorème de factorisations que toute flèche f de $\mathcal{M}$ se factorise en

$$f \ = \ pi \ , \qquad p \in TF, \ i \in C \ ,$$

pourvu qu'on fasse l'hypothèse

ⓔ

$$\exists\, C_0 \subset C, \ \textit{petite} \text{ partie de } C, \ \text{telle que } C \subset \tilde{C}_0, \ \text{i.e. } TF = (C_0)_*. \tag{4.3}$$

Sous ces conditions, si on suppose

ⓕ

$$TF \subset W \ , \tag{4.4}$$

alors l'axiome de factorisations Cof_3 est satisfait. Inversement, si Cof_3 est satisfait, et si W est stable par facteurs directs, alors on a 4.4. Donc si W est stable par facteurs directs, Cof_3 équivaut à (4.4). [page 72]

4.2. Il me semble que ces conditions, en pratique, ne seront guère jamais remplies, que si W (qui est donné en tout premier lieu, satisfaisant Cof_0 [18]), n'est pas stable par $\varinjlim$ filtrantes. À ce moment, pour construire la structure à cofibrations, on part de C_0 p. 35

18. i.e. saturation faible.

petite partie de $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$, prise telle que l'on ait

$$(C_0)_* \ \subset \ W \ , \tag{4.5}$$

on prend pour C au choix le saturé C_0' de C_0 par cochangement de base et composition transfinie, ou $C = \tilde{C}_0 =$ ensemble des facteurs directs de C_0'. Les conditions Cof_1 (stabilités de C), Cof_3 (factorisation) sont satisfaites automatiquement, et il reste à s'occuper de Cof_2, qui revient à la stabilité de $C \cap W$ par cochangement de base (la stabilité par composition et que ça contienne les isomorphismes, étant immédiates). C'est une condition délicate, et la seule façon standard que je vois pour l'assurer, c'est en supposant

$$C_0 \ \subset \ \mathrm{Cof}_W \ ; \tag{4.6}$$

la stabilité de W par $\varinjlim$ filtrantes (donc aussi par facteurs directs) assure alors qu'on a également [page 73]

$$C \ \subset \ \mathrm{Cof}_W \ , \tag{4.7}$$

et par suite

$$\begin{cases} C \cap W \subset \mathrm{Cof}_W \cap W = W^{\mathrm{univ}}, \\ \text{d'où} \ \ TC \overset{\text{déf}}{=} C \cap W = C \cap W^{\mathrm{univ}} \ , \end{cases} \tag{4.8}$$

ce qui assure la stabilité de $C \cap W$ par cochangement de base. La stabilité de TC par composition transfinie résulte de celle de C, et de la stabilité de W par composition transfinie.

4.3. Je reviens aux conditions générales ⓐ à ⓕ de 4.1, sans supposer nécessairement W stable par $\varinjlim$ filtrantes. Je veux à présent étendre la structure à cofibrations aux $\mathcal{M}(I)$, I quelconque dans Cat. Nous n'avons pas pour ceci (je crois) à utiliser les développements des paragraphes 2, 3, mais nous ferons le lien avec ceux-ci par la suite.

Désignons par I_0 la catégorie discrète ayant mêmes objets que I, d'où un foncteur canonique

$$v = v_I \ : \ I_0 \longrightarrow I \ . \tag{4.9}$$

L'idée est de définir la structure de $\mathcal{M}(I)$ via la structure évidente de $\mathcal{M}(I_0) \simeq \mathcal{M}^{I_0}$, en jouant sur le couple de foncteurs adjoints

$$\mathcal{M}(I_0) \underset{\psi = v^*}{\overset{\varphi = v_!}{\rightleftarrows}} \mathcal{M}(I) \quad .$$

Nous allons présenter les choses de façon un peu plus générale. [page 74]

Définition 4.4. J'appelle structure de cofibrations *spéciale* une structure $(\mathcal{M}, W, C)$ satisfaisant les conditions a) à f) de 4.1, que je reformule :

- ⓐ $\mathcal{M}$ stable par petites limites inductives, et les objets de $\mathcal{M}$ sont accessibles. p. 36
- ⓑ W est faiblement saturé (i.e. Cof_0 de p. 39), C stable par cochangement de base et par composition, $TC \overset{\text{déf}}{=} C \cap W$ stable par cochangement de base (et par composition automatiquement).
- ⓑ′ C et TC sont stables même par composition *transfinie.*
- ⓒ $\exists$ petite partie $C_0 \subset C$ telle que $C \subset \tilde{C}_0$ ($\Longrightarrow \tilde{C} = \tilde{C}_0$).
- ⓓ $TF \overset{\text{déf}}{=} C_* \subset W$ (ce qui implique, joint à ⓐ à ⓒ, l'axiome de factorisation Cof_3 de page 39).

4.5. Nous allons donner une recette générale d'extension d'une telle structure, quand on dispose d'un couple de foncteurs adjoints

$$\mathcal{M} \underset{v^*}{\overset{v_!}{\rightleftarrows}} \mathcal{M}' \quad ,$$

$\mathcal{M}$ étant muni d'une structure de cofibrations spéciale (W, C), et $\mathcal{M}'$ satisfaisant la condition liminaire ⓐ. On définira alors les parties W', C' de $\mathrm{Fl}(\mathcal{M}')$ par [page 75]

$$\begin{cases} W' = (v^*)^{-1}(W) \\ C' = \text{clôture stable par cochangement de base} \\ \qquad\quad \text{et composition transfinie de } v_!(C), \end{cases} \tag{4.5.1}$$

donc

$$v_!(C) \subset C' \subset (v_!(C))\tilde{} = \tilde{C}' \, . \tag{4.5.2}$$

Je dis que (W', C'), et au choix $(W', \tilde{C}')$, est une structure de cofibrations spéciale sur $\mathcal{M}'$. On va vérifier les différentes conditions de 4.4. La condition a) est déjà acquise.

b) [19]. La saturation faible de W' résulte de celle de W, via (4.5.1). La stabilité de C' par cochangement de base et par composition (même transfinie) est acquise par définition de C', et itou pour $\tilde{C}'$ (étant Q-close à gauche). Stabilité de $TC' \overset{\text{déf}}{=} C' \cap W'$ par cochangement de base ? Il suffit de voir que si on a un carré cocartésien

$$\begin{array}{ccc} X'_0 & \xrightarrow{i'} & X'_1 \\ \downarrow & \text{cocart.} & \downarrow \\ X'_2 & \xrightarrow{j'} & X'_3 \end{array}$$

dans $\mathcal{M}'$, avec i' dans $TC' = C' \cap W'$, alors $j' \in W'$ (car on sait déjà $j' \in C'$), i.e. $v^*(j') \in W'$. Nous allons supposer que v^* *commute aux sommes amalgamées,* et on est donc ramené à prouver que $v^*(i') \in TC$. Donc on doit prouver le ||
p. 37
[page 76]

Lemme 4.5.2. *Sous les conditions* (4.5.3) *et* (4.5.4) *ci-dessous, on a*

$$v^*(C') \subset C \, , \qquad v^*(TC') \subset TC \, ,$$

et si $C = \tilde{C}$, on a $v^*(\tilde{C}') \subset C$, $v^*(T\tilde{C}') \subset TC$.

Pour $v^*(C') \subset C$, il faut d'abord prouver

$$v^*(v_!(C)) \subset C \, , \tag{4.5.3}$$

et je ne vois aucun moyen – il faut le poser comme hypothèse. De plus, que v^* commute aux $\varinjlim$ quelconques (cochangement de base déjà admis – à présent on a besoin des limites inductives filtrantes)

$$v^* \text{ commute aux petites } \varinjlim \text{ quelconques} \tag{4.5.4}$$

pour conclure de (4.5.3) que $v^*(C' = \text{clôture de } v_!(C)$ pour cochangement de base et composition transfinie) est également dans C. Passant à $v^*(TC') \subset TC$, par ce qui précède, $v^*(C') \subset C$, il suffit de prouver $v^*(TC') \subset W$, mais $v^*(TC') \subset v^*(W') \subset W$ par définition de W'.

Supposons $C = \tilde{C}$, i.e. C stable par facteurs directs, et prouvons $v^*(\tilde{C}') \subset C$, $v^*(T\tilde{C}') \subset TC$. Par c) plus bas, $\tilde{C}'$ est formé des facteurs directs d'éléments de C', [page 77]

19. **N.B.** Il vaut mieux commencer par prouver c).

donc $v^*(C') \subset C$ implique $v^*(\tilde{C}') \subset C$ puisque C stable par facteurs directs.

Prouvons enfin $v^*(T\tilde{C}') \subset TC \overset{\text{déf}}{=} C \cap W$. Comme $T\tilde{C}' = \tilde{C}' \cap W'$, cela résulte de $v^*(\tilde{C}') \subset C$, et de $v^*(W') \subset W$.

Prouvons b′). La stabilité de C' et de $\tilde{C}'$ par composition transfinie est acquise, il reste à prouver la stabilité de $TC' = C' \cap W'$ et de $T\tilde{C}' = \tilde{C}' \cap W'$. Il suffit de voir que le composé transfinie f en question est dans W', donc que $v^*(f) \in W$, mais cela résulte du fait que v^* commute à la composition transfinie par (4.5.4), et que v^* transforme TC' et $T\tilde{C}'$ dans TC.

Prouvons c) pour C' (donc aussi pour $\tilde{C}'$). Soit C_0 une petite partie de C telle que $C \subset \tilde{C}_0$, i.e. C est contenu dans la clôture de C_0 par les trois opérations de cochangement de base, de composition transfinie, des facteurs directs. On voit alors que $v_!(C)$ est dans la clôture de $v_!(C_0)$ pour les opérations, donc aussi C', et on peut alors prendre $C'_0 = v_!(C_0)$.

Prouvons enfin d), c'est la même assertion pour C' et pour $\tilde{C}'$, puisque

$$C'_* \;=\; \tilde{C}'_* \;(\overset{\text{déf}}{=}\; TF'\;)\;,$$

il faut donc prouver [page 78]

$$TF' \overset{\text{déf}}{=} C'_* \;\subset\; W'\;.$$

Cela va résulter du p. 38

Lemme 4.5.3. *On a* $TF' = (v^*)^{-1}(TF)$.

C'est formel par définition de TF' comme

$$TF' \;=\; (v_!(C))_*\;,$$

de TF comme

$$TF \;=\; C_*\;,$$

et de l'adjonction de $v_!$, v^*. Comme $TF \subset W$, on en conclut

$$TF' \;=\; (v^*)^{-1}(TF) \;\subset\; (v^*)^{-1}(W) = W'\;,$$

q.e.d.

Donc on a prouvé ceci :

Proposition 4.6. *Considérons un couple de foncteurs adjoints*

$$\mathcal{M} \underset{v^*}{\overset{v_!}{\rightleftarrows}} \mathcal{M}'\quad,$$

où $\mathcal{M}$ *est muni d'une structure de cofibrations* spéciale (W, C). *On suppose de plus les conditions suivantes satisfaites.*

$$\begin{aligned}
&1^\circ) \quad \mathcal{M}' \text{ stable par petites } \varinjlim \text{ , ses éléments sont accessibles.}\\
&2^\circ) \quad v^* \text{ commute aux petites } \varinjlim\ .\\
&3^\circ) \quad v^*(v_!(C)) \subset C.
\end{aligned} \tag{4.6.1}$$

Considérons les parties W', C' *de* $\mathrm{Fl}(\mathcal{M}')$ *définies par* [page 79]

$$\begin{cases}
W' \;=\; (v^*)^{-1}(W),\\
C' \;=\; \text{clôture de } v_!(C) \text{ par cochangement de base et par composition}\\
\qquad\quad \text{transfinie.}
\end{cases} \tag{4.6.2}$$

Alors $(\mathcal{M}', W', C')$ est une structure à cofibrations spéciale. Si de plus $C = \tilde{C}$, i.e. C est stable par facteurs directs, alors $(\mathcal{M}', W', \tilde{C}')$ est également une structure à cofibrations spéciale [20].

4.7. J'aimerais, en vue d'énoncés du type 3.7 (établissant l'existence de foncteurs du type $u_!^W$), avoir une prise sur $TC' = C' \cap W'$, et sur $T\tilde{C}' = \tilde{C}' \cap W'$, de façon précise, j'aimerais avoir la relation

$$v_!(TC) \ \subset TC' \subset v_!(TC)\tilde{}\,, \tag{4.7.1}$$

voire la relation légèrement plus forte

$$\underbrace{v_!(TC) \ \subset TC'} \overset{\text{tautol.}}{\subset} \underbrace{T\tilde{C}' \ \subset \ (v_!(TC))\tilde{}}\,, \tag{4.7.2}$$

qui se décompose en deux p. 39

$$\begin{cases} v_!(TC) & \subset & TC' \\ T\tilde{C}' & \subset & (v_!(TC))\tilde{}. \end{cases} \tag{4.7.3}$$

La moins délicate des deux est la première, $v_!(TC) \subset TC'$, qui revient, en vertu des définitions, impliquant [page 80]

$$v_!(TC) \subset v_!(C) \subset C'\,,$$

à

$$v_!(TC) \ \subset \ W'\,,$$

i.e. par définition de W', à

$$v^* v_!(TC) \ \subset \ TC\,, \tag{4.7.4}$$

ce qui est une hypothèse de type (4.6.1) 3°), à joindre aux hypothèses (4.6.1).

La relation hypothétique

$$\underbrace{T\tilde{C}'}_{=\tilde{C}'\cap W'} \ \subset \ (v_!(TC))\tilde{}, \quad \text{ou seulement} \quad TC' \subset (v_!(TC))\tilde{}, \tag{$*$}$$

m'apparaît de nature nettement plus délicate. Comme $T\tilde{C}' \supset TC' \supset v_!(TC)$, elle équivaut à l'*égalité* de $(T\tilde{C}')_*$ resp. $(TC')_*$ et $(v_!(TC))_* = (v^*)^{-1}(TC)_*$. Posons

$$\begin{cases} (TC)_* & \overset{\text{déf}}{=} & F \\ (TC')_* & \overset{\text{déf}}{=} & F' \ \supset \ (T\tilde{C}')_* \ = \ F'_\sim\,. \end{cases} \tag{4.7.5}$$

On a donc, en vertu de l'inclusion

$$v_!(TC) \ \subset \ TC' \ (\subset \ T\tilde{C}')\,,$$

la relation

$$F'_\sim \ \subset \ F' \ \subset \ (v^*)^{-1}(F)\,, \tag{4.7.6}$$

et la question est donc si on a égalité $F' = (v^*)^{-1}(F)$, voire $F'_\sim = (v^*)^{-1}(F)$ (d'où $F'_\sim = F'$).

En fait, on montre assez facilement qu'on a $F'_\sim = F'$, i.e. $T\tilde{C}' \overset{\text{déf}}{=} \tilde{C}' \cap W' \subset (C' \cap W')\tilde{}$ – c'est une histoire générale de catégories à cofibrations spéciales [21]. Mais je ne vois [page 81]

20. **N.B.** C'est là un fait général pour les catégories à cofibrations spéciales, et devrait être explicité plus bas (cf. 5.1). L'hypothèse sur C est inutile ici (ou plutôt, il suffit au lieu de cela que W soit stable par facteurs directs *et* par composition transfinie, ce qui n'est pas une hypothèse plus réjouissante …).

21. cf. prop. 5.1 ci-dessous.

guère comment prouver (sous des hypothèses convenables) que $F' = (v^*)^{-1}(F)$. Il me faudra revenir là-dessus au besoin [22]. Pour l'instant, je me bornerai à récolter le fruit de 4.6 dans un cas particulier :

Proposition 4.8. *Soit $(\mathcal{M}, W, C)$ une catégorie à cofibrations spéciale* (déf. 4.4, page 94)*. Soit I objet de* Cat*, I_0 la catégorie discrète associée, considérons $v : I_0 \longrightarrow I$ et* p. 40

$$\mathcal{M}(I_0) \underset{v^*}{\overset{v_!}{\rightleftarrows}} \mathcal{M}(I) \quad ,$$

enfin munissons $\mathcal{M}(I_0) = \mathcal{M}^{I_0}$ de la structure de catégorie à cofibrations, produit *de celles des facteurs, i.e. définissons $W(I_0)$, $C(I_0)$ "fibre à fibre". (Cela coïncide avec la définition générale donnée au paragraphe 2, pour I_0 muni de la structure d'ordre discret, et fait de $\mathcal{M}(I_0)$ une catégorie à cofibrations spéciale.) Alors le couple $(v_!, v^*)$ satisfait aux conditions de la proposition* 4.6*, ainsi qu'à la condition supplémentaire à* (4.6.1)*,* [page 82]

$$4^\circ) \qquad v^*(v_!(TC(I))) \ \subset \ TC(I) \ . \tag{4.8.1}$$

Donc on trouve une structure de catégorie à cofibrations spéciale sur $\mathcal{M}(I)$, en posant

$$W(I) \ = \ (v^*)^{-1}(W(I_0)) \tag{4.8.2}$$

(c'est en fait équivalent à la définition habituelle de $W(I)$) et

$$C(I) \quad = \quad \text{clôture de } v_!(C(I_0)) \text{ pour les opérations de cochangement de base et composition transfinie.} \tag{4.8.3}$$

On a de plus sous ces conditions :

$$\underbrace{TF(I)}_{\overset{\text{déf}}{=}(C(I))_*} \ = \ (v^*)^{-1}\Big(\ \underbrace{TF(I_0)}_{\substack{\overset{\text{déf}}{=}(C_{I_0})_*, \\ \textit{se définit aussi} \\ \textit{fibre par fibre}}} \ \Big) \ , \tag{4.8.8}$$

$$\begin{cases} v_!\big(\overbrace{(TC)(I_0)}^{C(I_0)\cap W(I_0)}\big) & \subset & TC(I) \\ F(I) \overset{\text{déf}}{=} (TC(I))_* & \subset & (v^*)^{-1}(F(I_0)). \end{cases} \quad {}^{(23)} \tag{4.8.9}$$

Démonstration. On sait déjà que $\mathcal{M}(I)$ est stable par petites $\varinjlim$, et que tout élément est accessible, comme il résulte aussitôt des propriétés idoines de $\mathcal{M}$. Il est clair aussi que v^* commute aux petites $\varinjlim$. Il reste à prouver (4.6.1. 3°), et 4° dans (4.8.1), i.e. que $v^*v_! : \mathcal{M}(I_0) \longrightarrow \mathcal{M}(I_0)$ applique C dans C, TC dans TC. Or on a

$$v_!(F_0)(i) \ = \ \varinjlim_{(\alpha,j)\in i\backslash I_0} F_0(j) \qquad {}^{(24)} \tag{4.8.10}$$ [page 83]

et $i\backslash I_0$ est la catégorie discrète au dessus de I_0, dont la fibre en $j \in \mathrm{Ob}\, I_0 \ = \ \mathrm{Ob}\, I$ est $\mathrm{Hom}_I(i,j)$:

$$i\backslash I_0 \ = \ \coprod_{j\in \mathrm{Ob}\, I} (\text{catégorie discrète associée à } \mathrm{Hom}_I(i,j)) \ ,$$

donc

22. voir cependant prop. 5.8 ci-dessous. p. 41

23. Ces inclusions devraient être des égalités, mais je ne sais pas le prouver sans faire des hypothèses plus fortes, du type *catégorie de Quillen spéciale.*

24. où $j \in \mathrm{Ob}\, I_0 = \mathrm{Ob}\, I$, et $\alpha : i \longrightarrow v(j) = j$.

$$v_!(F_0)(i) \;=\; \coprod_{j\in \mathrm{Ob}\, I=\mathrm{Ob}\, I_0} \underbrace{F_0(j)^{\mathrm{Hom}_I(i,j)}}_{\substack{\text{somme directe}\\ \text{de } \mathrm{Hom}_I(i,j)\\ \text{copies de } F_0(j)}},$$

donc on trouve

$$v^*v_!F_0(\underbrace{\quad i \quad}_{\in \mathrm{Ob}\, I_0=\mathrm{Ob}\, I}) \;=\; v_!(F_0)(i) \;=\; \curvearrowright \quad .$$

Comme C et TC sont stables par sommes directes quelconques (l'étant par sommes directes finies, à cause des conditions de stabilité finies sur C et TC, et aussi par somme infinies à cause de l'axiome de stabilité transfinie …[25]), il s'ensuit bien que $v^*v_!$ applique $C(I_0)$ et $TC(I_0)$ en eux-mêmes.

Ainsi, la première assertion de 4.8 résulte de 4.6. De plus, (4.8.8) et (4.8.9) ont été vus dans 4.7, dans les conditions générales de 4.6 et en supposant de plus le 4° de (4.7.4).

[page 84]

5 Relation des catégories à cofibrations spéciales avec les catégories de Quillen spéciales

Soit $(\mathcal{M}, W, C)$ une catégorie à cofibrations spéciale. J'introduis

$$TF \;=\; C_*, \qquad TC \;=\; C\cap W, \qquad F \;=\; (TC)_*\,, \tag{5.1}$$

donc on a

$$\begin{array}{ccc} TC & \hookrightarrow & C \\ \downarrow & & \downarrow \\ F & \hookleftarrow & TF \end{array}\quad, \tag{5.2}$$

(C, TF) étant un précouple de Quillen clos à droite. On sait alors (XV 4.2 cor. 1, page 31) que $\tilde{C}$ est formé des facteurs directs d'éléments de C. Posons

$$T\tilde{C} \;=\; \tilde{C}\cap W\,, \tag{5.3}$$

d'où

$$TC \;\subset\; T\tilde{C}\,. \tag{5.4}$$

Proposition 5.1 *Soit $(\mathcal{M}, W, C)$ une catégorie à cofibrations spéciale. On a $T\tilde{C} \subset (TC)\tilde{}$ (et même $T\tilde{C} \subset (TC)^\natural$ [26]), ou ce qui revient au même en vertu de (5.4), TC et $T\tilde{C}$ ont même Q-clôture à gauche :*

$$T\tilde{C} = (T\tilde{C})\tilde{} = (TC)\tilde{} \qquad \textit{(et même } T\tilde{C} \subset (TC)^\natural\textit{)}, \tag{5.5}$$

d'où

p. 42

$$(\tilde{C})_* = C_*\,(= TF), \qquad (T\tilde{C})_* = (TC)_*\,(= F) \qquad [27]. \tag{5.6}$$

De plus, si W stable par facteurs directs (ou si seulement tout facteur direct d'une flèche de TC est dans W), et si de plus W est stable par composition transfinie, alors $(\mathcal{M}, W, \tilde{C})$ est une catégorie à cofibrations spéciale. De plus, $T\tilde{C}$ est Q-saturé à gauche, donc (par 5.5)

$$T\tilde{C} \;=\; (TC)^\natural\,. \tag{5.7}$$

[page 85]

25. mérite un lemme général …
26. **N.B.** Pour une partie A de $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$, $A^\natural$ désigne l'ensemble des facteurs directs d'éléments de A.
27. Ces relations ne dépendent pas de l'hypothèse W stable par facteurs directs.

Démonstration. Prouvons

$$T\tilde{C} \subset \tilde{(TC)},$$

et plus précisément, que tout élément de $T\tilde{C}$ est facteur direct d'un élément de TC :

$$T\tilde{C} = (TC)^{\natural} .$$

Soit donc $f \in T\tilde{C} \overset{\text{déf}}{=} \tilde{C} \cap W$, considérons leur factorisation de f en pi, avec $i \in C$, $p \in TF$. Comme $TF \subset W$, on a $p \in W$, donc $i \in W$, donc $i \in C \cap W \overset{\text{déf}}{=} TC$. Comme $f \in C$, $p \in TF$, il existe $q : Y \longrightarrow X'$ tel que $pq = \mathrm{id}_Y$, $qf = i$,

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f \in C \cap W} & Y \\ & {\scriptstyle i \in C} \searrow \quad \overset{q}{\nwarrow} \quad \nearrow {\scriptstyle p \in TF} & \\ & X' & \end{array}$$

donc f apparaît comme facteur direct de $i \in TC$, q.e.d.

Prouvons que $(\mathcal{M}, W, \tilde{C})$ est une catégorie à cofibrations spéciale (déf. 4.4, page 74). Condition a) sur $\mathcal{M}$ acquise, condition b), la partie sur W, aussi. La stabilité de $\tilde{C}$ par cochangement de base et par composition OK, aussi (pour b′) la stabilité par composition transfinie. Stabilité de $T\tilde{C} = \tilde{C} \cap W$ par cochangement de base : il reste à prouver que si on a un carré cocartésien

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\ i\ } & Y \\ \downarrow & \text{cocart.} & \downarrow \\ X' & \xrightarrow{\ i'\ } & Y' \end{array} ,$$

si $i \in \tilde{C} \cap W$, alors $i' \in W$ (car on sait déjà que $i' \in \tilde{C}$). Mais la démonstration précédente montre que c'est facteur direct *dans* $X \backslash \mathcal{M}$ d'une flèche dans TC, donc i' est facteur direct d'une flèche de $TC \subset W$. Donc si W est stable par facteurs directs, $i' \in W$.

Cela achève de prouver b). Pour b′), il reste à voir que $T\tilde{C}$ est stable par composition transfinie. Je ne vois pas d'autre façon de le voir, qu'en supposant que W lui-même est stable par composition transfinie (ce qui paraît à peine moins exigeant que la stabilité de W par $\varinjlim$ `[filtrantes]`). Cela achève de prouver b, b′). La condition c) sur C implique la même condition sur $\tilde{C}$. Enfin, comme $\tilde{C}_* = C_*$, la condition d) est la même pour C et $\tilde{C}$. Cela achève de prouver que $(\mathcal{M}, W, \tilde{C})$ est une catégorie à cofibrations spéciale. (**N.B.** on avait besoin de deux hypothèses supplémentaires sur W, stabilité par facteurs directs et par composition transfinie, pour établir que $T\tilde{C}$ est stable par cochangement de base et par composition transfinie). Le dernière assertion de 5.1 et la relation (5.7) qui en résulte, revient à dire que $T\tilde{C} = \tilde{C} \cap W$ est stable par facteurs directs, ce qui est évident par la même propriété de $\tilde{C}$, et l'hypothèse faite sur W de stabilité par facteurs directs (ou seulement que les facteurs directs d'éléments de $T\tilde{C}$ sont dans W, donc dans $T\tilde{C}$).

p. 43
[page 86]

Proposition 5.2. *Soit* $(\mathcal{M}, W, C)$ *une catégorie à cofibrations spéciale. Alors avec les notations de* (5.1)*, on a*

[page 87]

$$W = TF \circ TC, \tag{5.8}$$

$$TF = F \cap W. \tag{5.9}$$

Démonstration. Soit $f \in W$, écrivons $f = pi$, avec $i \in C$, $p \in TF$, donc $p \in W$, donc $i \in W$, donc $i \in C \cap W = TC$, d'où (5.8).

Prouvons (5.9). On a $TF \subset F \cap W$, prouvons inversement qu'une $f \in F \cap W$ est dans TF. Écrivons $f = pi$, avec $p \in TF$, $i \in TC$.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f \in F \cap W} & Y \\ & {\scriptstyle i \in TC} \searrow \quad \nearrow {\scriptstyle p \in TF} & \\ & X' & \end{array}$$

Comme $f \in F$, $i \in TC$, et $TC \longleftrightarrow F$ par définition de F, $\exists r : X' \longrightarrow X$ tel que $ri = \mathrm{id}_X$, $fr = p$. Donc f est facteur direct de $p \in TF$, et comme $TF = C_*$ est stable par facteurs directs, on conclut que $f \in TF$.

Corollaire 5.3. *Soit $(\mathcal{M}, W, C)$ une catégorie à cofibrations spéciale. Pour que (W, C, F), $(F \overset{déf}{=} (TC)_*)$ soit un triple de Quillen dans $\mathcal{M}$, il faut et il suffit que le couple (TC, F) satisfasse à l'axiome de factorisation (i.e. que ce soit un précouple de Quillen). Pour que cette structure de Quillen soit clos, il faut et il suffit que C soit stable par facteurs directs.*

[page 88]

Démonstration. La nécessité de l'axiome de factorisation pour (TC, F), pour avoir un triple de Quillen, est tautologique. Pour la suffisance, ayant déjà les deux précouples de Quillen (C, TF), (TC, F) avec

p. 44

$$\begin{array}{ccc} TC & \hookrightarrow & C \\ \updownarrow & & \updownarrow \\ F & \hookleftarrow & TF\ , \end{array} \tag{5.2}$$

et $TC = C \cap W$, le fait que (W, C, F) est un triple de Quillen est le corollaire 4 p. 36 de XV : Les conditions $TC = C \cap W$, $TF = F \cap W$, $W = TF \circ TW$ sont équivalentes, et équivalentes au fait que (W, C, F) soit un triple de Quillen.

Par la définition de Quillen des triples *clos,* par les propriétés

$$\underbrace{W = TF \circ TC}_{\substack{\text{vraie pour tous} \\ \text{le triples} \\ \text{de Quillen}}}, \qquad C = (TF)^*, \qquad \underbrace{F = (TC)_*}_{\substack{\text{vraie dans} \\ \text{le cas actuel}}}\ ,$$

il reste à exprimer que $C = (TF)^*$, ce qui équivaut à C stable par facteurs directs (cf. loc. cit. cor. 1, p. 31), q.e.d.

Remarque 5.4. Les énoncés 5.2 et 5.3, et la relation $T\tilde{C} \subset (TC)^\natural$ dans proposition 5.1, ne font pas appel à la totalité de l'hypothèse que $(\mathcal{M}, W, C)$ soit une catégorie à cofibrations spéciale, mais seulement que l'on ait une catégorie à cofibrations, avec $C \longleftarrow\!\shortmid \underbrace{TF}_{\overset{\text{déf}}{=} C_*} \subset W$, i.e. une catégorie avec W, C satisfaisant Cof_0, Cof_1, Cof_2 de la page

[page 89]

39, plus $TF \overset{\text{déf}}{=} C_* \subset W$, plus l'axiome de factorisation pour (C, TF) (lequel implique Cof_3).

Corollaire 5.5. *Soit $(\mathcal{M}, W, C)$ une catégorie à cofibrations spéciale, telle qu'il existe une* petite *partie $TC_0 \subset TC = C \cap W$, avec*

$$TC \ \subset \ \tilde{TC_0}\ , \tag{5.5.1}$$

ou ce qui revient au même, $(TC)\tilde{} = (TC_0)\tilde{}$, i.e.

$$\underbrace{F}_{\overset{\text{déf}}{=}(TC)_*} \ = \ (TC_0)_*\ . \tag{5.5.2}$$

Alors (W, C, F) est un triple de Quillen. Ce triple est clos si et seulement si C est stable par facteurs directs.

En effet, le théorème de factorisation dans XV §1 implique que moyennant l'hypothèse faite sur $TC_0 \subset TC$, le couple (TC, F) satisfait à la condition de factorisation. En effet, par les conditions b, b′ de la définition 4.4, TC a les propriétés de stabilité voulues (contient les isomorphismes, est stable par cochangement de base et par composition transfinie).

[page 90]

Définition 5.6. Les triples de Quillen déduits comme dans 5.5 d'une catégorie à cofibrations spéciale sont dits *spéciaux.* Ainsi un triple de Quillen (W, C, F) dans $\mathcal{M}$ est spécial s'il satisfait les conditions a) à d) dans la définition (4.4), concernant (W, C) exclusivement, plus les deux conditions suivantes.

p. 45

(c′) $\exists$ petite partie TC_0 de TC, telle que $TC \subset (TC_0)\tilde{}$.

(e) $F = (TC)_*$.

Corollaire 5.7. *Soit (W, C, F) un triple de Quillen* clos *dans $\mathcal{M}$. Pour que ce triple soit spécial, il faut et il suffit qu'il satisfasse les conditions suivantes.*

(a) *$\mathcal{M}$ stable par petites $\varinjlim$, et ses éléments sont accessibles.*

(c, c′) *Il existe une petite partie C_0 de C, TC_0 de TC, telles que l'on ait*

$$C = \tilde{C_0}\,, \qquad TC = (TC_0)\tilde{}\,. \tag{5.7.1}$$

En effet, toutes les autres conditions a) à e), y inclus c′) de 5.6, sont automatiquement satisfaites.

[page 91]

Proposition 5.8. *Considérons un couple de foncteurs adjoints*

$$\mathcal{M} \underset{v^*}{\overset{v_!}{\rightleftarrows}} \mathcal{M}'\,, \tag{5.8.1}$$

où $\mathcal{M}$ est munie d'un triple de Quillen spécial clos $(W, C, F = (TC)_*)$, avec $TC = C \cap W$ (cf. définition 5.6). *On suppose satisfaites les conditions suivantes* (comparer prop. 4.6, relations (4.6.1), et (4.7.4)) :

$$\begin{cases} \text{a)} & \mathcal{M}' \text{ stable par petites } \varinjlim \text{, ses éléments sont accessibles.} \\ \text{b)} & v^* \text{ commute aux petites } \varinjlim\,. \\ \text{c)} & v^*(v_!(C)) \subset C,\ v^*(v_!(TC)) \subset TC. \end{cases} \tag{5.8.2}$$

Définissons (W', C', F') dans $\mathcal{M}'$ (comparer prop. 4.6, notamment 4.6.2) *par*

$$\begin{cases} W' &= (v^*)^{-1}(W) \\ C' &= v_!(C)\tilde{} \\ F' &= (TC')_*\,, \qquad \text{où } TC' \overset{\text{déf}}{=} C' \cap W'\,. \end{cases} \tag{5.8.3}$$

Alors (W', C', F') est un triple de Quillen clos spécial dans $\mathcal{M}'$, et on a de plus

$$F' = (v^*)^{-1}(F)\,, \qquad TF' = (v^*)^{-1}(TF)\,, \tag{5.8.4}$$

$$TC' = (v_!(TC))\tilde{}\,. \tag{5.8.5}$$

[page 92]

Démonstration. Par 4.6, on sait déjà que $(\mathcal{M}', W', C')$ est une catégorie à cofibrations spéciale. (**N.B.** Ce qui est noté C' ici, était noté $\tilde{C}'$ dans la proposition 4.5. On doit utiliser la dernière assertion de 4.6, où on suppose C stable par facteurs directs, OK car

p. 46

(W, C, F) supposé clos.) Pour prouver que $(W', C', F' \overset{\text{déf}}{=} (TC')_*)$ est un triple de Quillen spécial, il reste, par 5.3 et définition 5.6, à prouver qu'il existe une petite partie TC'_0 de TC', telle que

$$(\ TC'_0\ \subset\ )\ TC'\ \subset\ (TC'_0)\tilde{}\ . \tag{5.8.6}$$

(Ce triple de Quillen sera de plus clos, puisque C' est Q-clos à gauche par définition.) Soit donc TC_0 une petite partie de TC telle que

$$TC\ \subset\ (TC_0)\tilde{}\ , \tag{5.8.7}$$

qui existe par hypothèse sur (W, C, F). On prendra

$$TC'_0\ \overset{\text{déf}}{=}\ v_!(TC_0)\ . \tag{5.8.8}$$

On a vu dans 4.7 qu'on a

$$v_!(TC)\ \subset\ TC' \tag{5.8.9}$$

(résulte de l'hypothèse $v^*(v_!(TC)) \subset TC$ dans (5.8.2. c)), a fortiori

$$TC'_0\ =\ v_!(TC_0)\ \subset\ TC'\ ,$$

il reste à prouver

$$TC'\ \overset{?}{\subset}\ (TC'_0)\tilde{}\ , \tag{5.8.10}$$

[page 93]

ce qui équivaut à $(TC')\tilde{} \subset (TC'_0)\tilde{}$, ou encore à

$$(TC'_0)_*\ \overset{?}{\subset}\ (TC')_*\ \overset{\text{déf}}{=}\ F'\ , \tag{5.8.10 bis}$$

alors qu'on a a priori l'inclusion inverse (déduite de $TC'_0 \subset TC'$)

$$F'\ \subset\ (TC'_0)_*\ . \tag{5.8.11}$$

Or par adjonction, on a

$$\begin{aligned}(\ \underbrace{TC'_0}_{v_!(TC_0)}\ )_*\ &=\ (v_!(TC_0))_*\\ &=\ (v^*)^{-1}(\ \underbrace{(TC_0)_*}_{=(TC)_*\overset{\text{déf}}{=}F}\ )\\ &=\ (v^*)^{-1}(F)\ ,\end{aligned}$$

donc (5.8.11) s'écrit

$$F'\ \subset\ (v^*)^{-1}(F)\ ,\qquad \text{i.e.}\ \ v^*(F')\ \subset\ F \tag{5.8.12}$$

(comparer (4.7.6)), et il faut montrer que cette inclusion est une égalité (sur quoi j'avais buté p. 80, 81 …), ce qui n'est autre que la première des deux relations (5.8.4). Mais c'est sous la forme initiale (5.8.10) (transposée de (5.8.4)) que nous allons prouver la chose, finalement. Notons que l'on a

$$\underbrace{(v_!(TC_0))\tilde{}}_{TC'_0}\ =\ (v_!(TC))\tilde{}\ ,$$

p. 47

[page 94]

puisque TC est la clôture de TC_0 pour les opérations de cochangement de base, de composition transfinie, et de facteurs directs, et que $v_!$ commute à ces opérations. Donc on doit montrer simplement

$$TC'\ \subset\ (v_!(TC))\tilde{} \tag{5.8.12 bis}$$

(où il n'est plus question de TC_0). Mais le théorème de factorisation s'applique au couple

$$\Big((v_!(TC))\tilde{},\ (v_!(TC))_* = (v^*)^{-1}(F)\Big)\ ,$$

puisque $(v_!(TC))\tilde{} = (TC'_0)\tilde{}$, TC'_0 petit. Si donc on a $f' \in TC' = C' \cap W'$, factorisons f' en $p'i'$, avec

$$i' \ \in\ (v_!(TC))\tilde{}\ , \qquad p' \ \in\ (v^*)^{-1}(F)\ . \tag{5.8.13}$$

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f' \in C' \cap W'} & Y' \\ & {\scriptstyle i'}\searrow \quad \overset{q'}{\nearrow} \ {\scriptstyle p'} & \\ & X'_1 & \end{array} \tag{$*$}$$

Notons qu'on a [page 95]

$$(v_!(TC))\tilde{}\ \subset\ TC'\ (\overset{\text{déf}}{=}\ C' \cap W'\ ) \tag{5.8.14}$$

car $v_!(TC) \subset TC' \subset C'$, donc $(v_!(TC))\tilde{} \subset \tilde{C'} = C'$, et il reste à prouver que $v_!(TC)\tilde{} \subset W'$, i.e. $v^*((v_!(TC))\tilde{}) \subset W$. Or je dis qu'on a même

$$v^*((v_!(TC))\tilde{})\ \subset\ TC\ ,$$

i.e.

$$v_!(TC)\tilde{}\ \subset\ (v^*)^{-1}(TC)\ . \tag{5.8.15}$$

Cela résulte du fait que TC est Q-clos, donc Q-saturé à gauche, ce qui implique, comme v^* commute aux petites $\varinjlim$, que $(v^*)^{-1}(T)$ l'est également. D'autre part, il contient $v_!(TC)$, donc aussi le Q-saturé à gauche de $v_!(TC)$. Mais ce dernier est *égal* à la Q-clôture $(v_!(TC))\tilde{}$, par le théorème de factorisation, vu que $TC'_0 \subset v_!(TC) \subset (TC'_0)\tilde{}$, avec TC'_0 petit.

Ainsi, (5.8.13) et (5.8.14) impliquent $i' \in TC' = C' \cap W'$, donc $i' \in W'$, d'où $p' \in W'$, i.e. $v^*(p') \in W$, et comme par hypothèse (5.8.13) on a $v^*(p') \in F$, on a $v^*(p') \in TF$, i.e. p. 48 [page 96]

$$p'\ \in\ (v^*)^{-1}(TF)\ =\ TF'\ (\overset{\text{déf}}{=}\ C'\ )\ ,$$

l'égalité $(v^*)^{-1}(TF) = TF'$, i.e.

$$(v^*)^{-1}(C_*)\ =\ (v_!(C))_*\ ,$$

résultant de l'adjonction de $v_!$, v^*. Au total, on a donc

$$p'\ \in\ TF'\ (=\ C'_*\ )\ , \tag{5.8.16}$$

et comme $f' \in C'$, le diagramme $(*)$, page 114, nous montre qu'il existe

$$q'\ :\ Y' \longrightarrow X'_1\ ,$$

avec $p'q' = \mathrm{id}$, $q'f' = i'$. Donc f' est facteur direct de $i' \in v_!(TC)\tilde{}$, donc on a $f' \in v_!(TC)\tilde{}$, d'où la relation

$$TC'\ \subset\ v_!(TC)\tilde{}\ ,$$

ce qui achève de prouver que (W', C', F') est un triple de Quillen spécial et clos.

Les deux relations (5.8.4) ont été prouvées chemin faisant (la deuxième étant essentiellement triviale, et la première représentant la difficulté principale dans la démonstration). Reste à établir (5.8.5). Mais on sait déjà (5.8.9) que

$$v_!(TC)\ \subset\ TC'\ , \qquad \text{[page 97]}$$

d'où

$$v_!(TC)^{\tilde{}} \ \subset \ TC',$$

puisque TC' est Q-clos à gauche (ou parce que ça a été prouvé dans (5.8.14)), on a déjà prouvé l'inclusion en sens inverse (5.8.12 bis), assertion équivalente à (5.8.4) (et qui représentait la principale difficulté).

Remarque 5.9. Si on ne suppose pas que la structure sur $\mathcal{M}$ soit close, alors la démonstration donnée de 5.8 montre qu'on trouve pourtant sur $\mathcal{M}'$ une structure de Quillen spéciale, en définissant cette fois C' comme dans 4.6. Mais je doute qu'on aura jamais à travailler avec des triples de Quillen spéciaux qui ne soient aussi clos. De toute façon, si W est stable par petites $\varinjlim$ filtrantes [28] (et je doute qu'on trouve des triples de Quillen spéciaux en dehors de ce cas), alors si (W, C, F) est un triple de Quillen spécial, il en est de même de $(W, \tilde{C} = C^{\natural}, F)$, et je présume qu'on a tout intérêt à remplacer le triple initial par celui-ci.

p. 49
[page 98]

6 Application à la construction des dérivateurs (associés aux triples de Quillen spéciaux)

Théorème 6.1. [29] *Soit (W, C, F) un triple de Quillen clos spécial sur la catégorie $\mathcal{M}$* (cf. déf. 5.6, p. 90, et cor. 5.7). *Pour tout I dans* Cat*, considérons la catégorie*

$$\mathcal{M}(I) \ = \ \underline{\mathrm{Hom}}(I^\circ, \mathcal{M}) \ , \tag{6.1.1}$$

et considérons

$$W(I), \ F(I) \ \subset \ \mathrm{Fl}(\mathcal{M}(I)) \ ,$$

définis par

$$\begin{array}{l} u : X \longrightarrow Y \text{ dans } \mathcal{M}(I) \text{ est dans } W(I) \text{ (resp. } F(I)) \text{ si et seulement} \\ \text{si } \forall\, i \in \mathrm{Ob}I,\ u(i) : X(i) \longrightarrow Y(i) \text{ est dans } W \text{ (resp. } F). \end{array} \tag{6.1.2}$$

a) *Il existe une structure de Quillen close (nécessairement unique) dans $\mathcal{M}(I)$, ayant $W(I)$ et $F(I)$ comme ensembles des quasi-isomorphismes et de fibrations respectivement. On a donc aussi*

$$\begin{cases} TF(I) \ = \ F(I) \cap W(I) \ = \ \{u \in \mathrm{Fl}(\mathcal{M}(I)) \mid u(i) \in TF \ \ \forall\, i \in \mathrm{Ob}I\}, \\ C(I) \ = \ TF(I)^*. \end{cases} \tag{6.1.3}$$

Cette structure de Quillen est spéciale.

b) *Soit I_0 la catégorie discrète ayant même ensemble d'objets que I, et*

[page 99]

$$v_I \ \ ou \ \ v \ : \ I_0 \longrightarrow I \tag{6.1.4}$$

le foncteur canonique. Désignons par

$$C(I) \ = \ (TF(I))^*, \qquad TC(I) \ = \ C(I) \cap W(I) \ = \ F(I)^* \tag{6.1.5}$$

les ensembles de cofibrations resp. de cofibrations triviales dans $\mathcal{M}(I)$, et utilisons les mêmes notations $C(I_0)$, $TC(I_0)$ pour I_0. On a alors

$$\begin{array}{l} u : X_0 \longrightarrow Y_0 \text{ dans } \mathcal{M}(I_0) \text{ est dans } C_0 \text{ (resp. } TC_0) \text{ si et seulement si} \\ \text{pour tout } i \text{ dans } \mathrm{Ob}I,\ u(i) : X_0(i) \longrightarrow Y_0(i) \text{ est dans } C \text{ (resp. } TC). \end{array} \tag{6.1.6}$$

28. ce qui implique la stabilité par facteurs directs, et implique aussi la même propriété pour $W' \overset{\text{déf}}{=} (v^*)^{-1}(W)$.

29. C'est le résultat principal dans cette partie XVII des notes.

Enfin on a

$$\begin{cases} C(I) &= (v_!(C(I_0)))\check{} \\ TC(I) &= (v_!(TC(I_0)))\check{}. \end{cases} \tag{6.1.7}$$

c) *Soit*

$$u \ : \ I \longrightarrow I'$$

une flèche dans Cat*, considérons le couple des foncteurs adjoints*

$$\mathcal{M}(I) \underset{u^*}{\overset{u_!}{\rightleftarrows}} \mathcal{M}(I') \quad . \tag{6.1.8}$$

Ce couple satisfait aux conditions de Quillen pour les couples de foncteurs adjoints entre catégories de Quillen (Hom. Alg. Chp. I, §4, th. 3, p. 4.5)*, de sorte qu'ils définissent par passage aux localisés un couple des foncteurs adjoints* p. 50 [page 100]

$$\mathrm{Ho}_W(I) \underset{u_W^*}{\overset{u_!^W}{\rightleftarrows}} \mathrm{Ho}_W(I') \quad . \tag{6.1.9}$$

On a, plus précisément, les relations

$$\begin{cases} u_!(C(I)) \ \subset \ C(I') \\ u_!(TC(I)) \ \subset \ TC(I') \, , \end{cases} \tag{6.1.10}$$

d'où

$$(u_!(\mathcal{M}(I)_{\mathrm{c}})) \ \subset \ \mathcal{M}(I')_{\mathrm{c}} \, , \tag{6.1.11}$$

et de plus

$$\begin{array}{l} \textit{pour toute flèche } f \textit{ dans } \mathcal{M}(I)_{\mathrm{c}}\textit{, telle que } f \in W(I)\textit{, on a} \\ u_!(f) \in W(I')\textit{, i.e. } (u_!)_{\mathrm{c}} : \mathcal{M}(I)_{\mathrm{c}} \longrightarrow \mathcal{M}(I')_{\mathrm{c}} \textit{ est compatible} \\ \textit{avec les localiseurs.} \end{array} \tag{6.1.12}$$

D'autre part on a

$$\begin{cases} u^*(F(I')) \ \subset \ F(I) \\ u^*(TF(I')) \ \subset \ TF(I) \\ u^*(W(I')) \ \subset \ W(I) \, , \end{cases} \tag{6.1.13}$$

donc

$$\begin{cases} u^*(\mathcal{M}(I')_{\mathrm{f}}) \ \subset \ \mathcal{M}(I)_{\mathrm{f}} \\ u_{\mathrm{f}}^* : \mathcal{M}(I')_{\mathrm{f}} \longrightarrow \mathcal{M}(I)_{\mathrm{f}} \textit{ est compatible avec les localiseurs.} \end{cases} \tag{6.1.14}$$

d) *Supposons que I soit une catégorie ordonnée, et considérons l'ensemble $C_I \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M}(I))$ défini dans §2*[30] (cf. page 25, cf. aussi th. 2.1, p. 26, et ses corollaires). *On a alors* [page 101]

$$\begin{cases} C_I \ \supset \ C(I) \\ TC_I \ \supset \ TC(I) \, , \end{cases} \tag{6.1.15}$$

et on a égalité quand I est un ensemble ordonné artinien.

30. Au paragraphe 2, c'était noté C_{I° au lieu de C_I.

DÉMONSTRATION. L'assertion a) est un cas particulier de 5.8, appliqué au couple de foncteurs adjoints

$$\mathcal{M}(I_0) \underset{v^*}{\overset{v_!}{\rightleftarrows}} \mathcal{M}(I) \quad .$$

Les conditions (5.8.2) sont satisfaites, cela a été vu dans (4.8). La proposition 5.8 nous dit alors l'existence d'une structure de triple de Quillen close sur $\mathcal{M}(I)$, dont l'ensemble des quasi-isomorphismes $W(I)$ et l'ensemble des fibrations $F(I)$, sont donnés par la première formule (5.8.3) et par la première formule (5.8.4), ce qui équivaut aux définitions (6.1.2). (**N.B.** Le fait que $\mathcal{M}(I_0)$, avec la structure $W(I_0)$, $C(I_0)$, $F(I_0)$ évidente (produit), est bien une catégorie de Quillen spéciale close, est ± tautologique.) p. 51 [page 102]

Prouvons b). La relation (6.1.6) est tautologique. Les relations (6.1.7) sont contenues dans 5.8 (cf. deuxième relation dans (5.8.3) pour $C' = v_!(C)\tilde{}$, i.e. $C(I) = (v_!(C(I_0)))\tilde{}$, et (5.8.5) pour $TC(I) = (v_!(TC(I_0)))\tilde{}$).

Prouvons c). La première assertion est, par QUILLEN, un cas particulier des relations (6.1.10) à (6.1.14), c'est elles qu'il s'agit d'établir. Les relations (6.1.13) et par suite (6.1.14) sont tautologiques en vertu des définitions, donc il s'agit d'établir *(6.1.10)* et (6.1.12).

Pour les formules (6.1.10), j'utilise le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} I & \xleftarrow{\ v\ } & I_0 \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u_0} \\ I' & \xleftarrow{\ v'\ } & I'_0\ , \end{array}$$

et je note que les foncteurs $u_!^{\mathcal{M}}$, $u_{0!}^{\mathcal{M}}$, commutant aux petites limites inductives, se comportent bien pour l'opération [page 103]

$$\Phi \longmapsto \Phi\tilde{},$$

quand Φ est une partie de $\mathrm{Fl}(\mathcal{M}(I))$ resp. de $\mathrm{Fl}(\mathcal{M}(I_0))$ qui est Q-accessible, i.e. telle qu'il existe une *petite* partie $\Phi_0 \subset \Phi$ avec $\Phi \subset \tilde{\Phi}_0$, plus précisément, on a

$$u_!(\Phi\tilde{}) \ \subset \ (u_!(\Phi))\tilde{}.$$

Ceci noté, on a par b)

$$C(I) \ = \ (v_!(C(I_0)))\tilde{},$$

d'où

$$u_!(C(I)) \ \subset \ (\underbrace{u_!(v_!(C(I_0)))}_{(uv)_!(C(I_0))})\tilde{},$$

et le deuxième membre s'écrit aussi

$$(v'_!u_{0!}(C(I_0)))\tilde{} \overset{?}{\subset} \ (v'_!(I'_0))\tilde{} \ = \ C(I')\ .$$

Donc tout revient à montrer que

$$u_{0!}(C(I_0)) \ \subset \ C(I'_0)\ , \tag{6.1.16}$$

ce qui résulte aussitôt du calcul de $u_{0!}$ à coups de sommes directes, et du fait que C est stable par sommes directes quelconques. Cela prouve donc $u_!(C(I)) \subset C(I')$, et on prouve de même $u_!(TC(I)) \subset TC(I')$, qui se ramène de même au cas particulier

p. 52

$$u_{0!}(TC(I_0)) \ \subset \ TC(I'_0)\ . \tag{6.1.17}$$ [page 104]

Il reste à prouver (6.1.12), et on procède comme pour 3.3 (p. 54), en utilisant le fait qu'une flèche f dans $\mathcal{M}(I)_c$ qui est dans $W(I)$, s'écrit dans $\mathcal{M}(I)_c$ sous la forme $f = pi$, où $i \in TC(I)$, et où p est inverse à gauche (rétraction) d'une flèche $j \in TC(I)$. On aura donc $u_!(f) = u_!(p)u_!(i)$, et $u_!(i) \in TC(I')$ par (6.1.10), et $u_!(p)$ est inverse à gauche de $u_!(j) \in TC(I')$. On a alors $u_!(i), u_!(j), u_!(p) \in W(I')$, d'où $u_!(f) \in W(I')$, q.e.d.

Prouvons enfin d). Compte tenu de la définition de C_I, pour établir $C(I) \subset C_I$, il suffit de voir ceci :

Corollaire 6.2.[31] *Soit I quelconque dans* Cat*, soient $U \subset V$ deux fermés dans I (i.e. des ouverts dans I°), et soit $f : X_\bullet \longrightarrow Y_\bullet$ une flèche dans $C(I)$ (resp. dans $TC(I)$). Posons encore* [page 105]

$$X_U = \varinjlim_{i \in U} X(i), \qquad X_V = \varinjlim_{i \in U} X(i)\ ,$$

et de même pour Y, et considérons le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X_U & \xrightarrow{\text{trans.}} & X_V \\ {\scriptstyle u_U}\downarrow & \text{cocart.} & \downarrow \\ Y_U & \longrightarrow & Y_{U,V} \\ & \searrow^{\text{trans.}} & \downarrow{\scriptstyle u_{U,V}} \\ & & Y_V\ . \end{array} \qquad u_V \qquad (6.2.1)$$

Alors la flèche $u_{U,V}$ est dans C (resp. TC).

Démonstration de 6.2. Admettons que la restriction d'une flèche de $C(I)$ resp. $TC(I)$ à un fermé V de I est dans $C(V)$ resp. $TC(V)$ (cf. … ci-dessous). Cela nous permet de supposer $V = I$. La donnée de U, qui est un ouvert de I°, équivaut à la donnée d'une flèche $v : I^\circ \longrightarrow \mathbf{\Delta}^1$ (en prenant la fibre en 0), ou encore à la donnée d'une flèche $u : I \longrightarrow (\mathbf{\Delta}^1)^\circ \simeq \mathbf{\Delta}^1$ (en prenant le fibre en 1). Or

$$u\ :\ I \longrightarrow \mathbf{\Delta}^1\ , \qquad U\ =\ I_1 \overset{\text{déf}}{=} u^{-1}(\{1\})\ . \qquad (6.2.2)$$

On a alors

$$X_U\ =\ u_!(X)(1), \quad X_I\ =\ u_!(X)(0)\ , \qquad \text{[page 106]}$$

et le morphisme de transition $X_U \longrightarrow X_I$ est déduit de la flèche $0 \xrightarrow{\partial} 1$ dans $\mathbf{\Delta}^1$, et de même pour Y. Soit

$$\xi\ =\ u_!(X), \qquad \eta\ =\ u_!(Y)\ ,$$

donc le diagramme (6.2.1) s'identifie au diagramme déduit de

$$\varphi\ :\ \xi \longrightarrow \eta\ , \qquad \varphi\ =\ u_!(f)\ , \qquad \text{p. 53}$$

comme

$$\begin{array}{ccc} \xi(1) & \xrightarrow{\xi(\partial)} & \xi(0) \\ {\scriptstyle \varphi(1)}\downarrow & \text{cocart.} & \downarrow \\ \eta(1) & \longrightarrow & \tilde{\eta} \\ & \searrow^{\eta(0)} & \downarrow{\scriptstyle \tilde{\varphi}} \\ & & \eta(0)\quad . \end{array} \qquad \varphi(0) \qquad (6.2.3)$$

31. **N.B.** Ce résultat se généralise, sous les conditions générales dans 6.2.5.

Or par 6.1.10 appliqué à $u : I \longrightarrow \mathbf{\Delta}^1$, la relation $f \in C(I)$ resp. $f \in TC(I)$ implique $\varphi \in C(\mathbf{\Delta}^1)$ resp. $\varphi \in TC(\mathbf{\Delta}^1)$. Donc pour établir 6.1, on est ramené au cas particulier où $I = \mathbf{\Delta}^1$, $U = \{1\}$, $V = I$, donc à prouver le

Lemme 6.2.4. *Soit $\varphi : \xi \longrightarrow \eta$ une flèche dans $\mathcal{M}(\mathbf{\Delta}^1)$. Si $\varphi \in C(\mathbf{\Delta}^1)$ (resp. $\varphi \in TC(\mathbf{\Delta}^1)$), alors la flèche $\tilde{\varphi}$ dans le diagramme* (6.2.3) *est dans C (resp. TC).* [page 107]

Plus généralement, et plus précisément :

Lemme 6.2.5. *Soit $\mathcal{M}$ une catégorie stable par sommes amalgamées, et Φ une partie Q-close à gauche* (on prendra $\Phi = C$, et $\Phi = TC$, dans le cas du lemme 6.2.4). *Soit $\Psi = \Phi_*$, et considérons, pour toute I dans* Cat, *$\Phi(I)$, $\Psi\langle I\rangle$ dans $\mathcal{M}(I)$, définis par :*

$$\begin{array}{l} u : X \longrightarrow Y \text{ dans } \mathcal{M}(I) \text{ est dans } \Psi\langle I\rangle \text{ si et seulement si } \forall\, i \in \mathrm{Ob}I, \\ u(i) : X(i) \longrightarrow Y(i) \text{ est dans } \Psi, \end{array} \tag{6.2.5.1}$$

$$\Phi(I) \;=\; \Psi\langle I\rangle^*. \tag{6.2.5.2}$$

Prenons le cas $I = \mathbf{\Delta}^1 = \{0 \xrightarrow{\partial} 1\}$, et soit $u : X \longrightarrow Y$ une flèche dans $\mathcal{M}(\mathbf{\Delta}^1)$, correspondant à un carré commutatif

$$\begin{array}{ccc} X(1) & \xrightarrow{X(\partial)} & X(0) \\ {\scriptstyle u(1)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u(0)} \\ Y(1) & \xrightarrow{Y(\partial)} & Y(0)\ . \end{array} \tag{6.2.5.3}$$

Considérons le diagramme correspondant

p. 54 [page 108]

$$\begin{array}{ccccc} X(1) & \xrightarrow{X(\partial)} & X(0) & & \\ {\scriptstyle u(1)}\downarrow & \text{cocart.} & \downarrow & & \\ Y(1) & \longrightarrow & \tilde{Y} & {\scriptstyle u(0)} & . \\ & {\scriptstyle Y(\partial)}\searrow & \downarrow{\scriptstyle \tilde{u}} & \swarrow & \\ & & Y(0) & & \end{array} \tag{6.2.5.4}$$

Pour qu'on ait $u \in \Phi(\mathbf{\Delta}^1)$, il faut et il suffit que l'on ait

$$u(0),\ u(1),\ \tilde{u} \;\in\; \Phi\ . \tag{6.2.5.5}$$

J'ai déjà vérifié la chose (sous forme duale), mais ne retrouve plus l'endroit (peut-être n'ai-je pas pris des notes). Je n'ai pas envie de rechercher la démonstration ici.

Pour achever de prouver 6.1. d), i.e. l'égalité $C(I) = C_I$ pour I artinien, j'ai envie de prouver encore quelque chose de plus générale que voici :

Corollaire 6.3. *Soient $(\mathcal{M}, \Phi, \Psi)$ et $I \longmapsto \Phi(I) \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M}(I))$ comme dans* 6.2.5. *Soit I un ensemble ordonné, et considérons aussi Φ_I défini (dans la situation duale) page* 25 (2.2) *(mais avec des notations duales …). Je dis que l'on a*

$$\Phi_I \;\supset\; \Phi(I)\ , \tag{6.3.1}$$

et on a égalité si I est noethérien, i.e. I° est artinien. [page 109]

Démonstration. La démonstration de $\Phi(I) \subset \Phi_I$ est celle qu'on vient de donner. Il reste à prouver que si I est noethérien, on a $\Phi_I \subset \Phi(I)$. Étant donnée $i : A \longrightarrow B$ dans

Φ_I, il faut prouver que $u \in \Phi(I)$, i.e. que pour un diagramme commutatif dans $\mathcal{M}(I)$,

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\alpha} & X \\ {\scriptstyle i}\downarrow & \overset{h}{\nearrow} & \downarrow{\scriptstyle p} \\ B & \xrightarrow[\beta]{} & Y \end{array} \tag{6.3.2}$$

avec $p \in \Psi\langle I\rangle$, i.e. $p(i) : X(i) \longrightarrow Y(i)$ dans Ψ pour tout i, $\exists\, h : B \longrightarrow X$ laissant le diagramme commutatif. On va revenir aux notations duales, en travaillant dans $\mathcal{M}(I^\circ)$, avec I artinien. On considère l'ensemble $\mathcal{H}$ des couple (U, h_U) d'un ouvert U de I et d'un $h_U : B|U \longrightarrow X|U$, rendant commutatif la restriction à U de (6.3.2). On ordonne $\mathcal{H}$ par prolongement, on note que toute partie totalement ordonnée (U_α, h_{U_α}) dans $\mathcal{H}$ a une borne supérieure, savoir $U = \bigcup_\alpha U_\alpha$, h_U défini par les h_{U_α} sur les U_α.

(**N.B.** L'ensemble $\mathcal{H}$ n'est pas vide, car $(\emptyset, h_\emptyset)$ est dans $\mathcal{H}$ – mais c'est contenu dans l'énoncé précédent que toute partie totalement ordonnée de $\mathcal{H}$ y a une borne supérieure …). Par Zorn, il existe un élément maximal (U, h_U). À prouver que $U = I$, et on aura terminé. Ou encore que si (U, h_U) tel que $U \neq I$, ce n'est *pas* maximal. Soit $F = I\backslash U \neq \emptyset$ le fermé complémentaire. Par l'hypothèse artinienne sur I, F a un élément minimal i_0. Soit

p. 55 [page 110]

$$U' \;=\; U \cup \overbrace{I/i_0}^{V} \;=\; U \cup \{i_0\}\ ,$$

on va prolonger h_U en $h_{U'}$ sur U', on aura terminé. Pour ceci, soit $V_0 = V \cap U = V\backslash\{i_0\}$, on est ramené à prolonger la restriction h_{V_0} de h_U à V_0, de V_0 à V. Au total, on peut supposer $I = I/i_0$ muni d'un élément final i_0, $U = I\backslash\{i_0\}$, et montrer qu'une $(U, h_U) \in \mathcal{H}$ se prolonge à I. Soient A', B', X', Y' les restrictions de A, B, X, Y à U (qu'on pourra aussi noter I'). La donné de A équivaut à celle de A', celle de $A_0 = A(i_0) \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$, et d'une flèche de

$$A'_{I'} \overset{\text{déf}}{=} \varinjlim_{i' \in I'} A'(i') \xrightarrow{\lambda_A} A_0 \ (\simeq A_I)\ ,$$

et de même pour B, X, Y. Plus précisément, la catégorie $\mathcal{M}(I^\circ)$ s'interprète comme celle des triples $X = (X', X_0, \lambda_X)$, où $X' \in \mathcal{M}(I'^\circ)$, $X_0 \in \mathcal{M}$, et $\lambda_X : X'_{I'} \longrightarrow X_0$. À ce compte, la donnée du diagramme (6.3.2) équivaut à celle d'un diagramme carré similaire

[page 111]

$$\begin{array}{ccc} A' & \xrightarrow{\alpha'} & X' \\ {\scriptstyle i'}\downarrow & \overset{h'}{\nearrow} & \downarrow{\scriptstyle p'} \\ B' & \xrightarrow[\beta']{} & Y' \end{array} \tag{6.3.3}$$

dans $\mathcal{M}(I'^\circ)$, d'où un diagramme dans $\mathcal{M}$


$$\begin{array}{ccc} A'_{I'} & \xrightarrow{\alpha'_{I'}} & X'_{I'} \\ {\scriptstyle i'_{I'}}\downarrow & \overset{h'_{I'}}{\nearrow} & \downarrow{\scriptstyle p'_{I'}} \\ B'_{I'} & \xrightarrow[\beta'_{I'}]{} & Y'_{I'}\ , \end{array} \tag{6.3.4}$$

d'un autre diagramme carré *dans* $\mathcal{M}$

$$\begin{array}{ccc} A_0 & \xrightarrow{\alpha_0} & X_0 \\ {\scriptstyle i_0}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p_0} \\ B_0 & \xrightarrow[\beta_0]{} & Y_0\ , \end{array} \tag{6.3.5}$$

p. 56 [page 112]

et enfin d'un homomorphisme $\lambda = (\lambda_A, \lambda_B, \lambda_X, \lambda_Y)$ du carré (6.3.4) dans le carré (6.3.5) :



32 (6.3.6)


D'autre part, la question de prolonger $(I', h') \in \mathcal{H}$ en (I, h), revient à celle de trouver $h_0 : B_0 \longrightarrow X_0$ dans $\mathcal{M}$, de façon qu'avec $h'_{I'}$ cela fasse encore un diagramme commutatif de (6.3.6), ce qui revient à dire que d'une part les deux triangles formés dans le carré de base sont commutatifs :

$$p_0 h_0 \;=\; \beta_0, \qquad h_0 i_0 \;=\; \alpha_0\ , \tag{6.3.7}$$

et d'autre part le carré diagonal défini par $h'_{I'}$, h_0 soit commutatif (ce qui exprime qu'on a une flèche h de B dans X) :

$$\lambda_X h'_{X'} \;=\; h_0 \lambda_B\ . \tag{6.3.8}$$

Mais le diagramme (6.3.6), où la flèche en traits pointillés denses $h'_{I'}$ est déjà acquise, et h_0 en pointillés espacés reste à trouver, donne naissance au diagramme, dans lequel est mis en évidence la flèche $\tilde{i} \in \Phi$ qui exprime l'hypothèse $i \in C(i)$, compte tenu de $i' \in C(I')$: [page 113]



(6.3.9)

où la flèche $\tilde{h}_0$ en traits pointillés denses de $\tilde{B} \overset{\text{déf}}{=} A_0 \amalg_{A'_{I'}} B'_{I'}$ dans X_0, est définie par les conditions de commutativité p. 57

$$\tilde{h}_0 r \;=\; \alpha_0, \qquad \tilde{h}_0 s \;=\; \lambda_X h'_{I'}\ , \tag{6.3.10}$$

ce qui est licite, vu que

$$\begin{aligned} \alpha_0 \lambda_A \;&=\; (\lambda_X h'_{I'}) i'_{I'} \\ &=\; \lambda_X (h'_{I'} i'_{I'}) \\ &=\; \lambda_X \alpha'_{I'}. \end{aligned}$$

[page 114]

Quant à la flèche $\tilde{\beta}_0 : \tilde{B} \longrightarrow Y_0$, elle est donnée par la condition de commutativité

$$\tilde{\beta}_0 r \;=\; p_0\alpha_0, \qquad \tilde{\beta}_0 s \;=\; \lambda_Y \beta'_{I'} \;, \tag{6.3.11}$$

ce qui est encore licite, puisque

$$(p_0\alpha_0)\lambda_A \;=\; (\lambda_Y\beta'_{I'})i'_{I'}$$

en vertu de la commutativité du cube (6.3.6). Pour établir la commutativité totale du diagramme (6.3.9) (traits pleins, et traits pointillés denses pour $h'_{I'}$, $\tilde{h}_0$ et $\tilde{\beta}_0$ – à l'exclusion de h_0 pas encore construit), il faut encore vérifier d'une part les relation

$$\begin{cases} \tilde{h}_0 r \;=\; \alpha_0, \quad p_0\tilde{h}_0 \;=\; \tilde{\beta}_0, \\ \lambda_X h'_{I'} \;=\; \tilde{h}_0 s \end{cases} \qquad {}^{33}, \tag{6.3.12}$$

établissant la commutativité du cube supérieur avec le carré diagonal (diagramme du type (6.3.6), la flèche pointillée h_0 y incluse), d'autre part les relations

$$\begin{cases} \tilde{i} r \;=\; i_0 \qquad (\text{et } \tilde{i} s = \lambda_B \text{ pour mémoire}) \\ \beta_0 \tilde{i} \;=\; \tilde{\beta}_0 \;, \end{cases} \tag{6.3.13}$$

où la première ligne est déjà connue par définition de $\tilde{B}$ et de $\tilde{i}$. La deuxième se ramène aux deux relations

$$\begin{aligned} (\beta_0\tilde{i})r \;&=\; \beta_0(\tilde{i}r) \\ &=\; \beta_0 i_0 \\ &=\; p_0\alpha_0 \\ &=\; \tilde{\beta}_0 r \;, \end{aligned}$$

[page 115]

OK par commutativité du carré de base de (6.3.5),

$$\begin{aligned} (\beta_0\tilde{i})s \;&=\; \beta_0(\tilde{i}s) \\ &=\; \beta_0\lambda_B \\ &=\; \lambda_Y\beta'_{I'} \\ &=\; \tilde{\beta}_0 s \;, \end{aligned}$$

OK par commutativité du carré antérieur dans (6.3.6).

Donc il reste à vérifier la deuxième relation (6.3.12),

$$p_0\tilde{h}_0 \;=\; \tilde{\beta}_0 \;,$$

ce qui se ramène à

p. 58

$$\begin{aligned} (p_0\tilde{h}_0)r \;&=\; p_0(\tilde{h}_0 r) \\ &=\; p_0\alpha_0 \\ &=\; \tilde{\beta}_0 r \;, \end{aligned}$$

OK par (6.3.11),

$$\begin{aligned} (p_0\tilde{h}_0)s \;&=\; p_0(\tilde{h}_0 s) \\ &=\; p_0(\lambda_X h'_{I'}) \\ &=\; (p_0\lambda_X)h'_{I'} \\ &=\; (\lambda_Y p'_{I'})h'_{I'} \\ &=\; \lambda_Y(p'_{I'}h'_{I'}) \\ &=\; \lambda_Y\beta'_{I'} \\ &=\; \tilde{\beta}_0 s \;, \end{aligned}$$

32. **N.B.** La condition $p \in \Psi\langle I\rangle$ s'exprime par $p' \in \Psi\langle I'\rangle$ et $\boxed{p_0 \in \Psi.}$

33. **N.B.** la première et la troisième de ces relations sont déjà connues, cf. (6.3.10).

OK.

Ceci posé, je dis que les contraintes (6.3.7), (6.3.8) sur h_0 reviennent à la commutativité des deux triangles dans les carré

$$\begin{array}{ccc} \tilde{B} & \xrightarrow{\tilde{h}_0} & X_0 \\ {\scriptstyle \tilde{i}\in\Phi}\downarrow & \overset{h_0}{\nearrow} & \downarrow{\scriptstyle p_0\in\Psi} \\ B_0 & \xrightarrow[\beta_0]{} & Y_0 \ , \end{array} \tag{6.3.14}$$

i.e. aux deux relations [page 116]

$$h_0\tilde{i} \ = \ \tilde{h}_0 \ , \qquad p_0 h_0 \ = \ \beta_0 \ . \tag{6.3.15}$$

La deuxième de ces relations n'est autre que la première relation (6.3.7), et il reste à voir que la première relation (6.3.15) équivaut à l'ensemble des deux relations restantes dans (6.3.7), (6.3.8) :

$$h_0 i_0 \ = \ \alpha_0 \ , \qquad \lambda_X h'_{I'} \ = \ h_0 \underbrace{\lambda_B}_{\tilde{i}s} \tag{6.3.16}$$

Or la relation en question $h_0\tilde{i} = \tilde{h}_0$ équivaut à l'ensemble des deux relations p. 59

$$\begin{aligned} (h_0\tilde{i})r &= h_0(\tilde{i}r) \\ &= h_0 i_0 \\ &\overset{?}{=} \alpha_0 \\ &= \tilde{h}_0 r, \end{aligned}$$

équivalent à $h_0 i_0 = \alpha_0$,

$$\begin{aligned} (h_0\tilde{i})s &= h_0(\tilde{i}s) \\ &= h_0\lambda_B \\ &\overset{?}{=} \lambda_X h'_{I'} \\ &= \tilde{h}_0 s, \end{aligned}$$

équivalent à $h_0\lambda_B = \lambda_X h'_{I'}$, c'est OK.

Ceci posé, dans le carré (6.3.14), les hypothèses $i \in \Phi(I)$, $p \in \Psi\langle I\rangle$ impliquent $\tilde{i}_0 \in \Phi$, $p_o \in \Psi$. Donc la flèche cherchée h_0 existe, q.e.d.

Cela achève la démonstration du corollaire 6.3, et par là aussi, celle de la dernière partie, d), de 6.1. On est heureux !

Proposition 6.4.[34] *Soit $\mathcal{M}$ une catégorie, et $\Phi \longleftrightarrow \Psi$ un couple Q-clos en Q-dualité ($\Phi = \Psi^*$, $\Psi = \Phi_*$). Soit $u : I \longrightarrow I'$ une flèche dans* Cat*, d'où une suite de foncteurs adjoints* [page 117]

$$\mathcal{M}(I) \ \begin{array}{c} \xrightarrow{u_!} \\ \xleftarrow[u^*]{} \\ \xrightarrow[u_*]{} \end{array} \ \mathcal{M}(I') \quad .$$

On définit $\Phi(I)$, $\Psi\langle I\rangle$, $\Phi(I')$, $\Psi\langle I'\rangle$ comme dans 6.2.5*. On a alors :*

ⓐ

$$\begin{cases} u_!(\Phi(I)) \ \subset \ \Phi(I') \ , \\ u^*(\Psi\langle I'\rangle) \ \subset \ \Psi\langle I\rangle \ . \end{cases} \tag{6.4.1}$$

34. Sous réserve d'existence des $\varinjlim$ et des $\varprojlim$ pertinentes dans $\mathcal{M}$. On peut supposer pour simplifier $\mathcal{M}$ stable par $\varinjlim$ et $\varprojlim$.

ⓑ *On a l'équivalence*

$$u^*(\Phi(I')) \subset \Phi(I) \qquad \Longleftrightarrow \qquad u_*(\Psi\langle I\rangle) \subset \Psi\langle I'\rangle \ . \tag{6.4.2}$$

ⓒ *Les relations équivalentes* (6.4.2) *ont lieu dans chacun des trois cas suivants :*

1°) *u est coétale.*

2°) *I est discrète.*

3°) *Pour tout $i' \in \mathrm{Ob}\, I'$, les composantes connexes de I/i' admettent un objet final.*

p. 60

Corollaire 6.5. *Soit (W, C, F) un triple de Quillen clos spécial dans $\mathcal{M}$, et définissons, pour toute I dans* Cat*, $C(I)$, $TC(I)$ et $F(I)$, $TF(I)$ comme dans le théorème* 6.1. a)*. On a alors*

les équivalences

[page 118]

$$\Big(u^*(C(I')) \ \subset \ C(I)\Big) \quad \Longleftrightarrow \quad \Big(u_*(TF) \ \subset \ TF'\Big) \ , \tag{6.5.1}$$

$$\Big(u^*(TC(I')) \ \subset \ TC(I)\Big) \quad \Longleftrightarrow \quad \Big(u_*(F) \ \subset \ F'\Big) \ . \tag{6.5.2}$$

Les conditions équivalentes (6.5.1) *ainsi que* (6.5.2) *sont satisfaites quand on est dans l'un des cas* 1°) 2°) 3°) *de* 6.4. c).

Démonstration de 6.4. Les assertions ⓐ , ⓑ sont ± tautologiques, par adjonction, comparer XIII, prop. 2, et cor., page 46. Pour prouver c), il suffit de traiter le cas 3°), car 1° $\Longrightarrow$ 3°, 2° $\Longrightarrow$ 3°. Mais le calcul de

$$u_*(X)(i') \ \simeq \ \varprojlim_{i \in I/i'} X(i)$$

montre que si les composantes connexes $(I/i')_\alpha$ de I/i' ont chacune un objet final e_α, alors

$$u_*(X)(i') \ \simeq \ \prod_\alpha X(e_\alpha) \ .$$

Or Ψ, étant clos à droite, est stable par produits quelconques, donc $X \in \Psi\langle I\rangle$ implique que les $u_*(X)(i')$ sont dans Ψ, donc u_* est dans $\Psi\langle I'\rangle$, q.e.d.

p.

LES DÉRIVATEURS

ALEXANDRE GROTHENDIECK

Chapitre XVIII

Catégories et ensembles accessibles

p.

Note des éditeurs de l'édition transcrite.

Ce texte a été déchiffré et transcrit en LaTeX 2_ε par M. Künzer. Il a été édité par M. Künzer, J. Malgoire, et G. Maltsiniotis. La transcription est aussi fidèle que possible au manuscrit. Seules quelques corrections mineures évidentes ont été effectuées. Pour les rares ajouts ou commentaires des éditeurs, ainsi que pour la numérotation originale des pages du manuscrit, les caractères de machine à écrire `[typewriter]` entre crochets sont utilisés. Quelques notes de bas de page ajoutées par les éditeurs sont signalées par « N. Éd. ». La numérotation des pages de ce chapitre commence à la page 50, car à l'origine ce chapitre était la suite du chapitre XIX qui se termine au milieu de la page 50.

Cette édition est provisoire. Les remarques, commentaires et corrections sont bienvenus. Envoyer un message à :

[**e-mail address removed**]

G. Maltsiniotis

p. 1

[page 50]

4 Paratopos et l'opération $\mathcal{M} \boxtimes \mathcal{N}$

4.1 Pseudo-topos. Problème du produit.

J'appelle *catégorie pseudo-$\mathfrak{U}$-topos*, ou simplement *pseudo-topos*, une $\mathfrak{U}$-catégorie $\mathcal{M}$ stable par $\mathfrak{U}$-limites inductives, et qui admet une *petite* sous-catégorie $\mathcal{M}_0$ *strictement génératrice* (i.e. génératrice par épimorphismes stricts). Alors $\mathcal{M}$ admet aussi des $\mathfrak{U}$-limites projectives (SGA 4 I 8.12.7). (Mais l'exemple de (Gr), cf. loc. cit. 8.12.9, montre que $\mathcal{M}^\circ$ n'est par forcément, pour autant, un pseudo-$\mathfrak{U}$-topos, faute à $\mathcal{M}$ d'admettre une petite sous-catégorie strictement *co*génératrice. Mais le théorème 2.6 `[du chapitre XIX]` donne des conditions sur $\mathcal{M}$ (surtout du type exactitude) pour que $\mathcal{M}$ admette assez d'injectifs – ce qui impliquera alors l'existence d'une petite sous-catégorie strictement cogénératrice, donc que $\mathcal{M}^\circ$ est également un pseudo-topos ([1]).

[page 51]

Je visualise les catégories pseudo-topos comme étant la catégorie des "faisceaux" sur un objet $\mathcal{X}$, visualisé comme une sorte d'"espace" que je distingue de la catégorie $\mathcal{M} = \mathrm{Fais}(\mathcal{X})$ des faisceaux sur $\mathcal{X}$. C'est $\mathcal{X}$ qui sera pour ceci le "pseudo-topos". Les pseudo-topos forment une 2-catégorie, la variance dans $\mathcal{X}$ étant opposée de celle dans $\mathrm{Fais}(\mathcal{X}) = \mathcal{M}$. De façon précise, si $\mathcal{X}$ correspond à $\mathcal{M}$, $\mathcal{Y}$ à $\mathcal{N}$, un morphisme f de $\mathcal{X}$ dans $\mathcal{Y}$ sera donné par un foncteur

$$f^* \ : \ \mathcal{N} \longrightarrow \mathcal{M} \tag{4.1.1}$$

en sens inverse, commutant aux $\varinjlim$ inductives quelconques ([2]). (**N.B.** si $\mathcal{X}$, $\mathcal{Y}$ sont même des topos, i.e. $\mathcal{M}$, $\mathcal{N}$ des catégories-topos, et si on veut que f soit un morphisme de topos, on exigera de plus que f^* soit de plus *exact à gauche*. On dira qu'un *morphisme de pseudo-topos est exact* si de plus f^* est exact à gauche.)

1. C'est le cas notamment si $\mathcal{M}$ est un topos.

[page 52]

2. Dire ici que les objets de $\mathcal{M}$ sont visualisés comme des "ouverts" généralisés de $\mathcal{X}$. On a $\mathcal{M} \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}^!(\mathcal{M}^\circ, \mathrm{Ens})$, i.e. $\mathcal{M}$ s'interprète bel et bien comme les "faisceaux" sur cette catégorie $\mathcal{M}$ d'ouverts …

En vertu du dual de loc. cit. 8.12.7, cela équivaut au fait que f^* admette un adjoint à droite f_*,

$$f_* \ : \ \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{N} \ , \tag{4.1.2}$$

lequel commute donc aux petites $\varprojlim$. La donnée de f_* satisfaisant à cette propriété détermine donc f^* à isomorphisme unique près. Mais en général, il ne suffit pas de se donner un tel f_*, pour pouvoir affirmer qu'il corresponde à un f^*, i.e. qu'il admette un adjoint à droite ; pour ceci, il faudrait qu'on sache que les foncteurs $\mathcal{M} \longrightarrow$ Ens qui commutent aux petites $\varprojlim$ sont représentables, ce qui sera le cas si $\mathcal{M}$ admet une petite sous-catégorie *co*génératrice, i.e. si $\mathcal{M}^\circ$ est également une catégorie pseudo-topos.

Il est sans doute judicieux de procéder comme dans le cas des topos, et d'appeler p. 2
morphisme de pseudo-topos $f : \mathcal{X} \longrightarrow \mathcal{Y}$ un quadruple

$$(f^*, f_*, \alpha, \beta) \tag{4.1.3}$$

de deux foncteurs adjoints (f^*, f_*), et des morphismes d'adjonction. Quand f^* est une [page 53]
équivalence, ce qui équivaut à f_* une équivalence, ou α et β des isomorphismes, on dira qu'on a une *équivalence de pseudo-topos*, et à toutes fins pratiques, on pourra alors regarder $\mathcal{X}$ et $\mathcal{Y}$ comme des objets essentiellement identiques.

Pour deux pseudo-topos $\mathcal{X}$, $\mathcal{Y}$, j'ai envie d'introduire (comme dans le cas des topos) un pseudo-topos produit

$$\mathcal{X} \times \mathcal{Y} \ , \tag{4.1.4}$$

qui ait les propriétés d'un 2-produit dans la 2-catégorie des pseudo-topos ([3]). Je devrais préciser que par définition

$$\begin{aligned} \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{pstop}}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}) \ &\simeq \ \underline{\mathrm{Hom}}_{!}(\mathcal{F}(\mathcal{Y}), \mathcal{F}(\mathcal{X}))^\circ \\ &\simeq \ \underline{\mathrm{Hom}}^{!'}(\mathcal{F}(\mathcal{X}), \mathcal{F}(\mathcal{Y})), \end{aligned} \tag{4.1.5}$$

où l'indice ! (resp. l'exposant !) indique la sous-catégorie pleine dans la catégorie $\underline{\mathrm{Hom}}$ envisagée formée des foncteurs qui commutent aux petites $\varinjlim$ (resp. aux petites $\varprojlim$), et [page 54]
l'accent dans le $\underline{\mathrm{Hom}}^{!'}$ dans le dernier membre indique qu'on exige de plus que le foncteur en question ait un adjoint à gauche.

Soient donc

$$\mathcal{M} \ = \ \mathcal{F}(\mathcal{X}) \ , \qquad \mathcal{N} \ = \ \mathcal{F}(\mathcal{Y}) \ , \tag{4.1.6}$$

et soit $\mathcal{Z}$ un troisième pseudo-topos, décrit par

$$\mathcal{P} \ = \ \mathcal{F}(\mathcal{Z}) \ . \tag{4.1.7}$$

On veut expliciter, à équivalence près, la catégorie produit $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{pstop}}(\mathcal{Z}, \mathcal{X}) \times \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{pstop}}(\mathcal{Z}, \mathcal{Y})$, i.e.

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{!}(\mathcal{M}, \mathcal{P})^\circ \ \times \ \underline{\mathrm{Hom}}_{!}(\mathcal{N}, \mathcal{Q})^\circ . \tag{4.1.8}$$

Je vais introduire pour cela une catégorie p. 3
[page 55]

$$\mathcal{M} \boxtimes \mathcal{N} \tag{4.1.9}$$

par la formule

$$\mathcal{M} \boxtimes \mathcal{N} \ \simeq \ \underline{\mathrm{Hom}}^{!!}(\mathcal{M}^\circ \times \mathcal{N}^\circ, \mathrm{Ens}) \ , \tag{4.1.10}$$

3. Il apparaît finalement que ce qu'on construit n'est *pas* un 2-produit dans la 2-catégorie envisagée, donc il vaut mieux le noter par un signe tel que $\mathcal{X} \boxtimes \mathcal{Y}$. Mais si $\mathcal{X}$, $\mathcal{Y}$ sont deux topos, $\mathcal{X} \boxtimes \mathcal{Y}$ est un 2-produit dans la 2-catégorie des topos.

où le signe $\underline{\mathrm{Hom}}^{!!}$ désigne la sous-catégorie pleine de la catégorie $\underline{\mathrm{Hom}}$, formée des bi-contrafoncteurs

$$F \ : \ \mathcal{M}^\circ \times \mathcal{N}^\circ \longrightarrow \mathrm{Ens}\ , \tag{4.1.10.1}$$

tels que pour tout x dans $\mathcal{M}$, le foncteur

$$y \longmapsto F(x,y) \ : \ \mathcal{N}^\circ \longrightarrow \mathrm{Ens} \tag{4.1.10.2}$$

soit dans $\underline{\mathrm{Hom}}^!(\mathcal{N}^\circ, \mathrm{Ens})$, i.e. transforme petites $\varinjlim$ en $\varprojlim$, et que, symétriquement, pour tout y dans $\mathcal{N}$, le foncteur

$$x \longmapsto F(x,y) \ : \ \mathcal{M}^\circ \longrightarrow \mathrm{Ens} \tag{4.1.10.3}$$

soit dans $\underline{\mathrm{Hom}}^!(\mathcal{M}^\circ, \mathrm{Ens})$. Mais cela signifie aussi que ces foncteurs sont *représentables* ; donc on trouve aussi

$$\mathcal{M} \boxtimes \mathcal{N} \xleftarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}^!(\mathcal{N}^\circ, \mathcal{M}) \tag{4.1.11}$$

et

$$\mathcal{M} \boxtimes \mathcal{N} \xleftarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}^!(\mathcal{M}^\circ, \mathcal{N}) \tag{4.1.12}$$

en utilisant (dans chacune de ces formules) dans deux côtés les équivalences de catégories [page 56]

$$\begin{cases} \mathcal{M} & \xrightarrow{\sim} & \underline{\mathrm{Hom}}^!(\mathcal{M}^\circ, \mathrm{Ens}) \\ \mathcal{N} & \xrightarrow{\sim} & \underline{\mathrm{Hom}}^!(\mathcal{N}^\circ, \mathrm{Ens})\ . \end{cases} \tag{4.1.13}$$

On peut dire aussi que la catégorie $\mathcal{M} \boxtimes \mathcal{N}$ est équivalente à celle des *couples* de foncteurs

$$\begin{cases} \varphi & : & \mathcal{M}^\circ & \longrightarrow & \mathcal{N} \\ \psi & : & \mathcal{N}^\circ & \longrightarrow & \mathcal{M}\ , \end{cases} \tag{4.1.14}$$

munis de deux morphismes d'adjonction

$$\begin{cases} \psi\varphi^\circ & \xleftarrow{\alpha} & \mathrm{id}_{\mathcal{M}} \\ \varphi\psi^\circ & \xleftarrow{\beta} & \mathrm{id}_{\mathcal{N}} \end{cases} \tag{4.1.15}$$

satisfaisant les deux compatibilités habituelles exprimant l'adjonction de φ° et de ψ (ou, de façon équivalente, de ψ° et de φ). Le foncteur

$$(\varphi, \psi) \longmapsto \varphi \qquad (\text{resp. } (\varphi, \psi) \longmapsto \psi)$$

donne une équivalence de la catégorie de ces couples avec $\underline{\mathrm{Hom}}^!(\mathcal{M}^\circ, \mathcal{N})$ (resp. avec $\underline{\mathrm{Hom}}^!(\mathcal{N}^\circ, \mathcal{M})$), de sorte qu'on a un carré commutatif d'équivalences canoniques de foncteurs :

p. 4
[page 57]

$$\begin{array}{ccc} & \mathcal{M} \mathbin{\widetilde{\boxtimes}} \mathcal{N} & \\ \swarrow^{\sim} & & \searrow^{\sim} \\ \underline{\mathrm{Hom}}^!(\mathcal{M}^\circ, \mathcal{N}) & & \underline{\mathrm{Hom}}^!(\mathcal{N}^\circ, \mathcal{M}) \\ \searrow_{\sim} & & \swarrow_{\sim} \\ & \underbrace{\mathcal{M} \boxtimes \mathcal{N}}_{\overset{\text{déf}}{=} \underline{\mathrm{Hom}}^{!!}(\mathcal{M}^\circ \times \mathcal{N}^\circ, \mathrm{Ens})} & \end{array} \tag{4.1.16}$$

[où $\mathcal{M} \widetilde{\boxtimes} \mathcal{N}$ est la catégorie des couples définie dans la page précédente.]

Je dis que $\mathcal{M}\boxtimes\mathcal{N}$ *est une catégorie pseudo-topos*. Il est clair, [en] outre, qu'elle admet des petites $\varprojlim$, qui se calculent argument par argument dans $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathcal{M}^\circ\times\mathcal{N}^\circ,\mathrm{Ens})$, ou au choix dans $\underline{\mathrm{Hom}}^!(\mathcal{M}^\circ,\mathcal{N})$, ou $\underline{\mathrm{Hom}}^!(\mathcal{N}^\circ,\mathcal{M})$. Comment construire des petites $\varinjlim$? Il n'est pas question d'invoquer un argument de cogénérateurs. Il faut d'ailleurs trouver aussi une petite sous-catégorie strictement génératrice. Visiblement, il y a quelque chose de non trivial à démontrer !

4.2 Cafouillages sur $\mathcal{M}\boxtimes\mathcal{N}$

Revenons à la situation générale d'un pseudo-topos $\mathcal{X}$, décrit par la catégorie pseudo-topos $\mathcal{M}$. Si $\mathcal{N}$ est une catégorie quelconque, on définit la catégorie [page 58]

$$\mathrm{Fais}(\mathcal{X},\mathcal{N}) \qquad \text{ou} \qquad \mathcal{F}(\mathcal{X},\mathcal{N})$$

des faisceaux sur $\mathcal{X}$, à valeurs dans $\mathcal{N}$, par

$$\mathcal{F}(\mathcal{X},\mathcal{N}) \overset{\text{déf}}{=} \underline{\mathrm{Hom}}^!(\mathcal{M}^\circ,\mathcal{N}) \ . \tag{4.2.1}$$

On a donc un foncteur pleinement fidèle

$$\mathcal{F}(\mathcal{X},\mathcal{N}) \overset{\text{déf}}{=} \underline{\mathrm{Hom}}^!(\mathcal{M}^\circ,\mathcal{N}) \hookrightarrow \mathrm{Hom}^!(\mathcal{N}^\circ,\overline{\mathcal{M}}) \ , \tag{4.2.2}$$

où $\overline{\mathcal{M}}$ désigne la sous-catégorie de $\mathcal{M}^\wedge$ (**N.B.** $\mathcal{M}^\wedge$ n'est pas en général une $\mathcal{U}$-catégorie qu'à cela ne tienne) formée des foncteurs *représentables* $\mathcal{M}^\circ\longrightarrow\mathrm{Ens}$ (laquelle est une $\mathfrak{U}$-catégorie, équivalente à $\mathcal{M}$ par l'inclusion canonique $\mathcal{M}\hookrightarrow\overline{\mathcal{M}}$). Donc on a à isomorphisme unique près une factorisation de (4.2.2) en

$$\mathcal{F}(\mathcal{X},\mathcal{N}) \overset{\text{pl. fid.}}{\hookrightarrow} \underline{\mathrm{Hom}}^!(\mathcal{N}^\circ,\mathcal{M}) \ , \tag{4.2.3}$$

l'image essentielle étant formée des foncteurs

$$\psi \ : \ \mathcal{N}^\circ\longrightarrow\mathcal{M}$$

tels que pour tout x dans $\mathcal{M}$,

$$y\longmapsto\mathrm{Hom}(y,\psi(x)) \ : \ \mathcal{N}^\circ\longrightarrow\mathrm{Ens}$$

soit représentable, i.e. des foncteurs qui admettent un *adjoint à gauche*. Quand $\mathcal{N}$ lui-même est une catégorie pseudo-topos, cette condition est automatique (elle résulte de p. 5
l'hypothèse que ψ commute aux petites $\varprojlim$). Donc dans ce cas, (4.2.3) est une équivalence [page 59]
de catégories.

Soit maintenant S (S comme "site") une *petite* sous-catégorie de $\mathcal{M}$, génératrice par épimorphismes stricts. On sait que cela signifie que le foncteur composé

$$\mathcal{M}\overset{\sim}{\longrightarrow}\underline{\mathrm{Hom}}^!(\mathcal{M}^\circ,\mathrm{Ens})\xrightarrow{\text{restriction à } S} S^\wedge \ (\overset{\text{déf}}{=}\underline{\mathrm{Hom}}(S^\circ,\mathrm{Ens}) \ ) \tag{4.2.4}$$

est pleinement fidèle, et ceci implique plus généralement, que pour toute catégorie $\mathcal{N}$, le foncteur restriction

$$\mathcal{F}(\mathcal{X},\mathcal{N}) \overset{\text{déf}}{=} \underline{\mathrm{Hom}}^!(\mathcal{M}^\circ,\mathcal{N}) \overset{\text{pl. fid.}}{\hookrightarrow} \underline{\mathrm{Hom}}(S^\circ,\mathcal{N}) \tag{4.2.5}$$

est pleinement fidèle. En effet, le deuxième membre, via le plongement pleinement fidèle

$$\mathcal{N} \overset{\text{pl. fid.}}{\hookrightarrow} \underline{\mathrm{Hom}}^!(\mathcal{N}^\circ,\mathrm{Ens}) \hookrightarrow \mathcal{N}^\wedge \ ,$$

se plonge dans

$$\underline{\mathrm{Hom}}(S^\circ, \underline{\mathrm{Hom}}^!(\mathcal{N}^\circ, \mathrm{Ens})) \;\simeq\; \mathrm{Hom}^!(\mathcal{N}^\circ, S^\wedge)\ ,$$

et la pleine fidélité de (4.2.5) équivaut donc à celle du foncteur composé

$$\mathcal{F}(\mathcal{X},\mathcal{N}) \overset{\text{déf}}{=} \underline{\mathrm{Hom}}^!(\mathcal{M}^\circ,\mathcal{N}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}^!(\mathcal{N}^\circ, S^\wedge) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}(S^\circ, \underline{\mathrm{Hom}}^!(\mathcal{N}^\circ, \mathrm{Ens}))\ . \quad (4.2.6)$$

Or on a commutativité dans le carré [page 60]

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}(\mathcal{X},\mathcal{N}) \overset{\text{déf}}{=} \underline{\mathrm{Hom}}^!(\mathcal{M}^\circ,\mathcal{N}) & \xrightarrow{(4.2.5)} & \underline{\mathrm{Hom}}(S^\circ,\mathcal{N}) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle (4.2.3)}\ \text{pleinement fidèle} & & \Big\downarrow\ \text{pleinement fidèle} \\ \underline{\mathrm{Hom}}^!(\mathcal{N}^\circ,\mathcal{M}) & \xrightarrow[\text{pleinement fidèle}]{(4.2.4)} & \underbrace{\underline{\mathrm{Hom}}^!(\mathcal{N}^\circ, S^\wedge)}_{\simeq \underline{\mathrm{Hom}}(S^\circ, \underline{\mathrm{Hom}}^!(\mathcal{N}^\circ,\mathrm{Ens}))} \end{array} \quad (4.2.7)$$

(où les flèches verticales sont des équivalences, si $\mathcal{N}$ est lui-même une catégorie pseudo-topos). Notons d'autre part que l'on a une équivalence

$$\underline{\mathrm{Hom}}(S^\circ,\mathcal{N}) \xleftarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}^!(S^{\wedge\circ},\mathcal{N}) \overset{\text{déf}}{=} \mathcal{F}(\mathrm{Top}(S),\mathcal{N})\ , \quad (4.2.8)$$

où $\mathrm{Top}(S)$ est le pseudo-topos (en fait, un topos) défini par la catégorie pseudo-topos $S^\wedge$. Pour ceci, notons qu'on a

$$\underline{\mathrm{Hom}}^!(S^{\wedge\circ},\mathcal{N}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_!(S^\wedge,\mathcal{N}^\circ)^\circ\ ,$$

et d'autre part le foncteur restriction à $S \hookrightarrow S^\wedge$ donne

$$\underline{\mathrm{Hom}}_!(S^\wedge,\mathcal{N}^\circ) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}(S,\mathcal{N}^\circ)\ ,$$

d'où [p. 6] [page 61]

$$\underline{\mathrm{Hom}}(S^{\wedge\circ},\mathcal{N}) \xrightarrow{\sim} (\underline{\mathrm{Hom}}(S,\mathcal{N}^\circ))^\circ \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}(S^\circ,\mathcal{N})\ ,$$

ce qui n'est autre que (4.2.8). Ainsi :

Proposition 4.2.1. *Soient $\mathcal{M} = \mathcal{F}(\mathcal{X})$ une catégorie pseudo-topos, munie d'une sous-catégorie pleine strictement génératrice S, $\mathcal{N}$ une $\mathfrak{U}$-catégorie quelconque, alors le foncteur "restriction à S" suivant est pleinement fidèle.*

$$\mathcal{F}(\mathcal{X},\mathcal{N}) \overset{\text{déf}}{=} \underline{\mathrm{Hom}}^!(\mathcal{M}^\circ,\mathcal{N}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(S^\circ,\mathcal{N}) \xleftarrow{\sim} \underbrace{\underline{\mathrm{Hom}}(S^{\wedge\circ},\mathcal{N})}_{\overset{\text{déf}}{=}\mathcal{F}(\mathrm{Top}(S),\mathcal{N})}\ , \quad (4.2.1.1)$$

et il s'insère dans le carré commutatif (4.2.7) de foncteurs pleinement fidèles.

Corollaire 4.2.2. *Supposons que $\mathcal{N} = \mathcal{F}(\mathcal{Y})$ soit également une catégorie pseudo-topos, munie d'une sous-catégorie pleine T strictement génératrice. Alors*

$$\mathcal{F}(\mathcal{X},\mathcal{N}) \;\simeq\; \mathcal{F}(\mathcal{Y},\mathcal{M}) \;\simeq\; \underbrace{\underline{\mathrm{Hom}}^{!!}(\mathcal{M}^\circ\times\mathcal{N}^\circ,\mathrm{Ens})}_{=\mathcal{M}\boxtimes\mathcal{N}}\ ,$$

et le foncteur restriction

$$\begin{array}{rcl} \mathcal{M}\boxtimes\mathcal{N} \overset{\text{déf}}{=} \underline{\mathrm{Hom}}^{!!}(\mathcal{M}^\circ\times\mathcal{N}^\circ,\mathrm{Ens}) & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Hom}}(S^\circ\times T^\circ,\mathrm{Ens}) \\ & \simeq & (S\times T)^\wedge \\ & \overset{\text{déf}}{=} & \mathcal{F}(\mathrm{Top}(S\times T)) \end{array} \quad (4.2.2.1)$$

[page 62]

est pleinement fidèle.

La première assertion a été vue dans 4.1. Pour la pleine fidélité de (4.2.2.1), on note que ce foncteur s'interprète, à équivalence de catégories près, comme le composé du foncteur pleinement fidèle (4.2.1.1), et du foncteur similaire relatif à $\mathcal{N}$ (donc lui aussi pleinement fidèle)

$$\mathcal{F}(\mathcal{Y}, S^\wedge) \overset{\text{déf}}{=} \underline{\mathrm{Hom}}^!(\mathcal{N}^\wedge, S^\wedge) \xrightarrow{\text{restr. à } T} \underbrace{\underline{\mathrm{Hom}}(T^\circ, S^\wedge)}_{\underline{\mathrm{Hom}}(S^\circ \times T^\circ, \mathrm{Ens})} , \tag{4.2.2.2}$$

compte tenu de l'équivalence de symétrie

$$\mathcal{F}(\mathcal{Y}, S^\wedge) \overset{\text{déf}}{=} \underline{\mathrm{Hom}}^!(\mathcal{N}^\circ, S^\wedge) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}^!(S^{\wedge\circ}, \mathcal{N}) . \tag{4.2.2.3}$$

Au total, quand $\mathcal{M}$, $\mathcal{N}$ sont tous deux des catégories pseudo-topos, munies de sous-catégories strictement génératrices S resp. T, on a un plongement pleinement fidèle canonique

$$\mathcal{M} \boxtimes \mathcal{N} \overset{\rho}{\hookrightarrow} (S \times T)^\wedge , \tag{4.2.9}$$

qu'on interprète par la suite comme $(f_S^{\mathcal{M}} \times f_T^{\mathcal{N}})_*$, où p. 7

$$\begin{cases} f_S^{\mathcal{M}} : \mathcal{X} \longrightarrow \mathrm{Top}S \\ f_T^{\mathcal{N}} : \mathcal{Y} \longrightarrow \mathrm{Top}T \end{cases} \tag{4.2.10}$$

sont les morphismes de pseudo-topos, donnés par les plongements pleinement fidèles (foncteurs image directe)

$$\begin{cases} (f_S^{\mathcal{M}})_* : \mathcal{M} \longrightarrow S^\wedge \\ (f_T^{\mathcal{N}})_* : \mathcal{N} \longrightarrow T^\wedge , \end{cases} \tag{4.2.11}$$

lesquels admettent bel et bien des adjoints à gauche [page 63]

$$\begin{cases} (f_S^{\mathcal{M}})^* : S^\wedge \longrightarrow \mathcal{M} \\ (f_T^{\mathcal{N}})^* : T^\wedge \longrightarrow \mathcal{N} , \end{cases} \tag{4.2.12}$$

à savoir les prolongements canoniques (par commutativité aux petites $\varinjlim$) des foncteurs d'inclusion $S \hookrightarrow \mathcal{M}$, $T \hookrightarrow \mathcal{N}$.

La question essentielle, à présent, c'est visiblement de construire un adjoint à gauche pour le foncteur (4.2.9). Il revient au même, pour (s,t) dans $S \times T$, de définir un objet

$$s \boxtimes t \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M} \boxtimes \mathcal{N} , \tag{4.2.13}$$

tel que l'on ait, pour F variable dans $\mathcal{M} \boxtimes \mathcal{N}$, un isomorphisme fonctoriel en F,

$$\underbrace{\rho(F)(s,t)}_{\overset{\text{déf}}{=} F(s,t)} \simeq \mathrm{Hom}(s \boxtimes t, F) .$$

Donc il faut prouver ceci :

Lemme 4.2.3 ([4]). *Soient $\mathcal{M}$, $\mathcal{N}$ deux catégories pseudo-topos, et $s \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$, $t \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{N}$, et considérons sur $\mathcal{M} \boxtimes \mathcal{N} \overset{déf}{=} \underline{\mathrm{Hom}}^{!!}(\mathcal{M}^\circ \times \mathcal{N}^\circ, \mathrm{Ens})$ le foncteur $F \longmapsto F(s,t)$. Ce foncteur est* représentable *(par un objet que je note $s \boxtimes t$).*

L'idée naturelle serait de définir $s \boxtimes t$ par

$$(s \boxtimes t)(x,y) = s(x) \times t(y) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(x,s) \times \mathrm{Hom}_{\mathcal{N}}(y,t) , \tag{4.2.14}$$ [page 64]

ce qui définit bien un foncteur

$$\mathcal{M}^\circ \times \mathcal{N}^\circ \longrightarrow \mathrm{Ens}\ .$$

Malheureusement, pour un des arguments fixé, disons pour y fixé, ce foncteur n'est *pas* compatible aux limites projectives, p.ex. il ne transforme pas l'objet final de $\mathcal{M}^\circ$ correspondant à l'objet initial de $\mathcal{M}$) en objet final de Ens, mais en $t(y) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{N}}(y,t)$. Néanmoins, je pense que $s \boxtimes t$ doit bel et bien se définir comme produit de deux objets de p. 8
$\mathcal{M} \boxtimes \mathcal{N}$, dépendant fonctoriellement de s resp. de t ([5]). On est donc amené dès à présent, qu'on le veuille ou non, à essayer de définir des foncteurs canoniques, commutant aux petites $\varinjlim$,

$$\mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{M} \boxtimes \mathcal{N} \longleftarrow \mathcal{N} \tag{4.2.13}$$

(lesquels seront les foncteurs image inverse pour les projections canoniques $\mathcal{X} \leftarrow \mathcal{X} \times \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Y}$) ([6]).

4.3 L'opération $\mathcal{M} \boxtimes \mathcal{N}$ et l'axiome d'accessibilité

J'ai passé la journée hier, essayant d'établir l'existence des $x \boxtimes y$ dans $\mathcal{M} \boxtimes \mathcal{N}$, sans y parvenir – du moins pas sans faire une hypothèse supplémentaire d'accessibilité, dont il devient évident à présent qu'il faut la faire de toutes façons. Je vais quand même énoncer le positif de mes perplexités. [page 65]

Proposition-perplexité 4.3.1. *Soient $\mathcal{M}$, $\mathcal{N}$ deux catégories pseudo-topos, d'où $\mathcal{M} \boxtimes \mathcal{N}$ comme dans 4.1. Soient $S \subset \mathcal{M}$, $T \subset \mathcal{N}$ deux petites sous-catégories strictement génératrices, et considérons l'inclusion pleinement fidèle correspondante :*

$$\underbrace{\mathcal{M} \boxtimes \mathcal{N}}_{\overset{\text{déf}}{=} \underline{\mathrm{Hom}}^{!!}(\mathcal{M}^\circ \times \mathcal{N}^\circ, \mathrm{Ens})} \overset{\varphi\,?}{\hookleftarrow} \xrightarrow[\alpha]{} S^\wedge \boxtimes T^\wedge \ \simeq\ (S \times T)^\wedge. \tag{4.3.1.1}$$

Considérons les conditions suivantes :

a) $\mathcal{M} \boxtimes \mathcal{N}$ *est un pseudo-topos.*

b) *Pour $x \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$, $y \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{N}$, $x \boxtimes y \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M} \boxtimes \mathcal{N}$ existe, i.e. le foncteur (commutant aux petites $\varprojlim$)*

$$F \ \longmapsto\ F(x,y)\ , \qquad \mathcal{M} \boxtimes \mathcal{N} \longrightarrow \mathrm{Ens} \tag{4.3.1.2}$$

est représentable.

b′) *Comme b), avec $x \in \mathrm{Ob}\,S$, $y \in \mathrm{Ob}\,T$.*

c) *Le foncteur α (lequel commute aux petites $\varprojlim$) admet un adjoint à gauche*

$$\varphi\ :\ (S \times T)^\wedge \longrightarrow \mathcal{M} \boxtimes \mathcal{N}\ .$$

4. Pas prouvé ; peut-être faux !

5. également faux, cf. plus bas.

6. Le cas où $\mathcal{M}$, $\mathcal{N}$ sont des catégories-topos, nous montre que ces foncteurs devraient être décrits comme $x \longmapsto x \boxtimes e_{\mathcal{N}}$, $y \longmapsto e_{\mathcal{M}} \boxtimes y$. Mais il n'est pas clair qu'on ait en dehors du cas des topos, et même en admettant l'existence du $x \boxtimes y$, la formule (valable pour un topos) $x \boxtimes y \simeq (x \boxtimes e_{\mathcal{N}}) \times (e_{\mathcal{M}} \boxtimes y)$.

On a alors les implications

$$b \implies b' \iff c \implies a\ . \tag{4.3.1.3}$$

De plus, si c est satisfait, on a ceci : pour $s \in S$, $t \in T$, considérons

p. 9

$$(s,t)\ \in\ (S\times T)\ \subset\ (S\times T)^\wedge\ \simeq\ S^\wedge \boxtimes T^\wedge\ ,$$

qui s'explicite aussi comme

$$\begin{cases} (s,t)\ =\ \mathrm{pr}_1^*(s)\times \mathrm{pr}_2^*(t)\ \simeq\ s \overset{S^\wedge,T^\wedge}{\boxtimes} t \in \mathrm{Ob}\,(S\times T)^\wedge\ , \\ \textit{i.e. } (s,t)(s',t')\ =\ s(s')\times t(t')\ =\ \mathrm{Hom}_S(s',s)\times \mathrm{Hom}_T(t',t) \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\ =\ \mathrm{Hom}_{S\times T}((s',t'),(s,t))\ , \end{cases} \tag{4.3.1.4}$$

$$\begin{array}{ccc} S\times T & \xrightarrow{\mathrm{pr}_2} & T \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_1} & & \\ S\ , & & \end{array}$$

on a

$$s \overset{\mathcal{M},\mathcal{N}}{\boxtimes} t\ \simeq\ \varphi(s,t)\ , \tag{4.3.1.4}$$

et $\varphi(S\times T) = \{s\boxtimes t \mid s\in S,\ t\in T\}$ est une partie strictement génératrice de $\mathcal{M}\boxtimes\mathcal{N}$ ([7]).

[page 66]

N.B. Je ne connais pas d'exemple où les conditions envisagées ne soient satisfaites, mais doute pourtant à présent que même la plus faible le soit toujours, i.e. que $\mathcal{M}\boxtimes\mathcal{N}$ soit un pseudo-topos dès que $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ le sont.

Démonstration de 4.3.1. L'implication b $\implies$ b′ est tautologique. L'implication b′ $\iff$ c résulte du

Lemme 4.3.2. *Soient $\mathcal{E}$, X des $\mathfrak{U}$-catégories avec X petite, $\mathcal{E}$ stable par petites $\varinjlim$,*

$$\alpha\ :\ \mathcal{E}\longrightarrow X^\wedge$$

un foncteur. Pour que α admette un adjoint à gauche φ, il faut et il suffit que pour tout $x\in \mathrm{Ob}\,X$, le foncteur

$$\begin{cases} \xi & \longmapsto & \mathrm{Hom}_{X^\wedge}(x,\alpha(\xi))\ =\ \alpha(\xi)(x) \\ \mathcal{E}^\circ & \longrightarrow & \mathrm{Ens} \end{cases}$$

soit représentable.

C'est évidemment nécessaire. La suffisance résulte du fait que $X\subset X^\wedge$ est strictement génératrice dans $X^\wedge$, i.e. que tout objet F de $X^\wedge$ est limite inductive $F = \varinjlim_I F_i$, les F_i dans X (on prend $I = X/F$), d'où

p. 10

[page 67]

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}(F,\alpha(\xi))\ &\simeq\ \varprojlim_I \underbrace{\mathrm{Hom}(F_i,\alpha(\xi))}_{\mathrm{Hom}(\rho(F_i),\xi)} \\ &\simeq\ \mathrm{Hom}(\varinjlim_I(\rho(F_i),\xi))\ , \end{aligned}$$

donc le foncteur $\xi\longmapsto \mathrm{Hom}(F,\alpha(\xi))$ est représenté par $\rho(F)\overset{\text{déf}}{=}\varinjlim_I \rho(F_i)$.

Prouvons c $\implies$ a. Pour l'existence des petites $\varinjlim$ dans $\mathcal{M}\boxtimes\mathcal{N}$, et l'existence d'une partie strictement génératrice, on invoque le lemme général :

Lemme 4.3.3. *Soit $\alpha : \mathcal{E}\hookrightarrow\mathcal{F}$ un foncteur pleinement fidèle admettant un adjoint à gauche ρ.*

7. **N.B.** On a bien sûr $(s,t) = s \overset{S^\wedge,T^\wedge}{\boxtimes} t$.

ⓐ *Si les* $\varinjlim$ *d'un type donné* I *existent dans* $\mathcal{F}$*, elles existent dans* $\mathcal{E}$*, et se calculent comme*

$$\varinjlim_I{}_{\mathcal{E}}\,\xi_i \;=\; \rho(\varinjlim_I{}_{\mathcal{F}}\,\alpha(\xi_i))\;. \tag{4.3.3.1}$$

ⓑ *Si* U *est une petite partie strictement génératrice de* $\mathcal{F}$*,* $\rho(U)$ *est une petite partie strictement génératrice dans* $\mathcal{F}$*.*

En effet, si ξ désigne le deuxième membre [de l'égalité 4.3.3.1], et η un objet variable de $\mathcal{E}$, on aura

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(\xi,\eta) &\overset{\text{adj.}}{\simeq} \mathrm{Hom}_{\mathcal{F}}(\varinjlim_I \alpha(\xi_i),\alpha(\eta))\\ &\simeq \varprojlim_I \underbrace{\mathrm{Hom}_{\mathcal{F}}(\alpha(\xi_i),\alpha(\eta))}_{\simeq \mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(\xi_i,\eta)\quad \text{car } \alpha \text{ pleinement fidèle}}\;.\\ &\simeq \varprojlim_I \mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(\xi_i,\eta)\;,\end{aligned}$$

[page 68]

ce qui prouve que ξ est une limite inductive des ξ_i dans $\mathcal{E}$ ([8]).
Ceci prouve que (moyennant c)) $\mathcal{M}\boxtimes\mathcal{N}$ est stable par petites $\varinjlim$, donc il reste à prouver que $\mathcal{M}\boxtimes\mathcal{N}$ admet une petite famille strictement génératrice. Cela résultera du b) dans le lemme, puisque $S\times T$ engendre strictement $(S\times T)^\wedge$. Cela prouve en même temps la dernière assertion de la proposition, sous réserve de prouver la formule (4.1.3.4). Il faut donc prouver un isomorphisme fonctoriel en $F\in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}\boxtimes\mathcal{N}$,

$$\mathrm{Hom}(\rho(s,t),F)\;\simeq\; F(s,t)\;,$$

mais par adjonction on a

$$\mathrm{Hom}(\rho(s,t),F)\;\simeq\;\mathrm{Hom}((s,t),\alpha(F))\;=\;\alpha(F)(s,t)\;=\;F(s,t)\;,$$

OK.

p. 11

Proposition 4.3.4. *Soit* $\mathcal{M}$ *une* $\mathfrak{U}$*-catégorie. Les conditions suivantes sont équivalentes.* [page 69]

a) $\mathcal{M}$ *est une catégorie* $\mathfrak{U}$*-pseudo-topos, i.e. elle est stable par* $\mathfrak{U}$*-limites inductives, et admet une* $\mathfrak{U}$*-petite sous-catégorie* S *strictement génératrice.*

b) Il existe une $\mathfrak{U}$*-petite catégorie* S*, et un foncteur* $i:\mathcal{M}\hookrightarrow S^\wedge$ pleinement fidèle*, ayant un adjoint à gauche.*

Démonstration. On a a) $\Longrightarrow$ b), car il suffit de prendre pour S dans b) celui spécifié dans a), l'hypothèse sur S implique que le foncteur canonique

$$\mathcal{M}\;\longrightarrow\;S^\wedge\;,\qquad \text{composé de } \mathcal{M}\hookrightarrow\;\mathcal{M}^\wedge\;\xrightarrow{\text{restriction}}\;S^\wedge$$

est pleinement fidèle. Qu'il admette un adjoint à gauche résulte du lemme 4.3.2. L'implication b) $\Longrightarrow$ a) résulte du lemme 4.3.3.

Corollaire 4.3.5. *Soit* $\mathcal{M}$ *une* $\mathfrak{U}$*-catégorie. Pour que* $\mathcal{M}$ *soit un* $\mathfrak{U}$*-pseudo-topos* accessible *(i.e. dont tous les objets sont accessibles), il faut et il suffit qu'il existe* S *dans* Cat *et un foncteur pleinement fidèle et* accessible $\mathcal{M}\overset{\alpha}{\hookrightarrow}S^\wedge$*, admettant un adjoint à gauche* ρ*.*

Démonstration. Il suffit de noter que si S, α sont comme dans 4.3.4 b), alors α est [page 70]

8. Pour prouver b), on note que la pleine fidélité de α implique que ρ est essentiellement surjectif ; comme ρ commute aux petites $\varinjlim$ et que tout objet de $\mathcal{F}$ est de la forme $\varprojlim_I x_i$, les x_i dans U, on aura $\rho(x)=\varinjlim_I \rho(x_i)$, les $\rho(x_i)$ dans $\rho(U)$, on gagne.

accessible si et seulement si les $\rho(S)$ sont formées d'objets accessibles dans $\mathcal{M}$; comme cette partie est strictement génératrice, on sait que cela implique que *tout* objet de $\mathcal{M}$ est accessible. (Cf. SGA 4 I 9.9.)

Je vais essayer de donner un énoncé plus complet :

Théorème 4.3.6. *Soit $\mathcal{M}$ une $\mathfrak{U}$-catégorie. Conditions équivalentes :*

a) $\mathcal{M}$ stable par petites $\varinjlim$, et elle admet une petite sous-catégorie pleine S, strictement génératrice, et formée d'objets accessibles de $\mathcal{M}$.

a′) $\mathcal{M}$ est une catégorie $\mathfrak{U}$-pseudo-topos faiblement accessible, i.e. satisfait a), avec en plus tout *élément de $\mathcal{M}$ (pas seulement ceux de S) accessible dans $\mathcal{M}$.*

b) Il existe une petite catégorie S, et un foncteur $\alpha : \mathcal{M} \hookrightarrow S^\wedge$ pleinement fidèle et accessible, *tel que α admette un adjoint à gauche.*

c) $\mathcal{M}$ est stable par petites $\varinjlim$, est accessible, et admet une filtration cardinale $(\mathrm{Filt}^\pi \mathcal{M})_{\pi \geqslant \pi_0}$. [page 71]

d) Il existe un cardinal π_1, une petite catégorie $\mathcal{M}_{\pi_1}$, stable par limites inductives de cardinal $\leqslant \pi_1$, tels qu'on ait une équivalence de catégories

$$\mathcal{M} \xleftarrow{\sim} \mathrm{Ind}_{\pi_1} \mathcal{M}_{\pi_1} , \tag{4.3.6.1}$$

où le deuxième membre désigne la sous-catégorie pleine de $\mathrm{Ind}(\mathcal{M}_{\pi_1})$ formée des ind-objets $(X_i)_{i\in I}$ de $\mathcal{M}_{\pi_1}$ tels que I soit grand devant π_1.

Démonstration de 4.3.6 ([9]). On a déjà vu a′ $\Longrightarrow$ a $\Longrightarrow$ b $\Longrightarrow$ a′, i.e. l'équivalence de a, a′, b, soit PTA cette condition. Nous allons prouver les implications

$$\mathrm{PTA} \implies \mathrm{c} \implies \mathrm{d} \implies \mathrm{PTA} ,$$

ce qui établira le théorème.

Prouvons PTA $\Longrightarrow$ c. Soit S une petite sous-catégorie pleine strictement génératrice. Ainsi, pour tout x dans $\mathcal{M}$ on a [p. 12] [page 72]

$$x = \varinjlim_{s\in S/x} s \tag{4.3.6.2}$$

(cf. SGA 4 I 7.2 (i)). Soit $\pi_0 = \mathrm{card}\,\mathrm{Fl}(S)$, et pour tout cardinal $\pi \geqslant \pi_0$, soit

$$\mathrm{Filt}^\pi \mathcal{M} = \text{sous-catégorie pleine de } \mathcal{M} \text{ formée des objets } x \text{ tels que } \mathrm{card}\,(\mathrm{Fl}(S/x)) \leqslant \pi . \tag{4.3.6.3}$$

Je veux prouver que l'on trouve ainsi une filtration cardinale sur $\mathcal{M}$, i.e. que les conditions a) b) c) de SGA 4 I 9.12 sont satisfaites. C'est prouvé dans loc. cit. 9.13 sous des hypothèses légèrement différentes, la condition d'accessibilité de $\mathcal{M}$ étant remplacée par celle (beaucoup moins sympathique !) que les familles de flèches épimorphiques strictes dans $\mathcal{M}$ sont épimorphiques strictes universelles. Cette condition n'est utilisée que dans la démonstration de la condition b), à savoir la stabilité de $\mathrm{Filt}^\pi \mathcal{M}$ par $\varinjlim_I$ de cardinal $\leqslant \pi$ (sans avoir d'ailleurs à supposer I filtrante, ni a fortiori grand devant π_0). Il faut d'ailleurs dire que la définition de $\mathrm{Filt}^\pi \mathcal{M}$ donnée dans loc. cit. n'est pas tout à fait la même que (4.3.6.3), mais c'est [page 73]

$$\mathrm{Filt}'^\pi \mathcal{M} = \text{sous-catégorie pleine de } \mathcal{M} \text{ formée des objets } x \text{ tels qu'il existe une famille épimorphique stricte } x_i \xrightarrow{\alpha_i} x \text{ de cardinal } \leqslant \pi, \text{ avec } x_i \in S \ \forall\ i \in I. \tag{4.3.6.3′}$$

9. Pour une démonstration complète (celle donnée ici canule à partir d'un certain moment), cf. §4.6 (p. 139-148).

Ainsi on a

$$\mathrm{Filt}^{\pi}\,\mathcal{M} \;\subset\; \mathrm{Filt}'^{\pi}\,\mathcal{M}\ ,$$

mais dans loc. cit. on prouve que pour x dans $\mathrm{Filt}'^{\pi}\,\mathcal{M}$, on a

$$\mathrm{card}\,\mathrm{Fl}(S/x) \;\leqslant\; \pi^{\pi_0}\ ,$$

d'où

$$\mathrm{Filt}^{\pi}\,\mathcal{M} \;\subset\; \mathrm{Filt}'^{\pi}\,\mathcal{M} \;\subset\; \mathrm{Filt}^{\pi^{\pi_0}}\,\mathcal{M}\ ,$$

donc si $\pi = \pi^{\pi_0}$, p.ex. $\pi = 2^c$ avec $c \geqslant \pi_0$, alors on trouve

$$\mathrm{Filt}^{\pi}\,\mathcal{M} \;=\; \mathrm{Filt}'^{\pi}\,\mathcal{M}\ .$$

Donc les deux filtrations on l'air ± équivalentes. Mais la démonstration donnée de la stabilité de Filt'^{π} semble vraiment faire appel de façon essentielle à la condition d'universalité des familles épimorphiques strictes (donc épimorphiques effectives, avec les hypothèses faites impliquant l'existence de petites $\varprojlim$). Donc il me faut bon gré, mal gré, refaire le travail !

Condition a) : Filt^{π} équivalente à une petite catégorie. C'est immédiat, puisque par (4.3.6.2), Filt^{π} est formée de $\varprojlim_{I}$ dans $\mathcal{M}$ d'objets de S (petite catégorie), avec I telle que $\mathrm{card}\,\mathrm{Fl}\,I \leqslant \pi$. p. 13 [page 74]

Condition b) : Filt^{π} stable par $\varprojlim_{I}$, quand $\mathrm{card}\,\mathrm{Fl}\,I \leqslant \pi$ ([10]). Soit donc $(x_i)_{i\in I}$, où

$$\begin{array}{ccc} I & \longrightarrow & \mathcal{M} \\ i & \longmapsto & x_i \end{array}$$

un système inductif dans $\mathcal{M}$, avec des x_i dans Filt^{π}. Considérons le produit fibré

$$\begin{array}{ccccc} I & \xleftarrow{\text{cofibré}} & S/I = J & & \\ {\scriptstyle\varphi}\downarrow & & \downarrow & \overset{\psi}{\cdots\!\searrow} & \\ \mathcal{M} & \xleftarrow[\text{Cat-cofibré}]{\text{but}} & S/\mathcal{M} & \xrightarrow{\text{source}} & S \hookrightarrow \mathcal{M}\ , \end{array} \qquad (4.3.6.4)$$

où J est Cat-cofibré sur I, sa fibre en $i \in \mathrm{Ob}\,I$ étant isomorphe à S/x_i, donc $\mathrm{card}\,\mathrm{Fl}\,J_i \leqslant \pi$. Comme par hypothèse $\mathrm{card}\,\mathrm{Fl}\,I \leqslant \pi$, on en conclut que $\mathrm{card}\,\mathrm{Fl}\,J \leqslant \pi^3 = \pi$. (**N.B.** L'ensemble des flèches $v : j_0 \longrightarrow j_1$ de J au dessus d'une flèche $u : i_0 \longrightarrow i_1$ de I est "contenu" dans l'ensemble produit $\mathrm{Ob}\,J_{i_0} \times \mathrm{Fl}\,J_{i_1}$, par l'application

$$v \longmapsto (\mathrm{source}\,v, v' : u_*(j_0) \longrightarrow j_1)\ ,$$

donc de cardinal majoré par π^2.) On a alors

$$x \overset{\text{déf}}{=} \varinjlim_{I} x_i \;=\; \varinjlim_{J} \underbrace{\xi_j}_{=\psi(j)} \qquad ([11])\ , \qquad \text{[page 75]}$$

où cette fois la limite est une limite d'objets de S, prise dans $\mathcal{M}$. Il s'ensuit que $x \in \mathrm{Filt}'^{\pi}$, ce n'est pas tout à fait $x \in \mathrm{Filt}^{\pi}$. (Ça implique $x \in \mathrm{Filt}^{\pi^{\pi_0}}$, donc $x \in \mathrm{Filt}^{\pi}$ si $\pi = \pi^{\pi_0}$,

10. quand I filtrante et grande devant π_0 – je ne le prouve que dans ce cas, hélas !

11. On utilise la propriété de distributivité des $\varinjlim$, relative à un foncteur Cat-cofibrant

$$\begin{array}{ccc} J & \longrightarrow & I \\ & \searrow & \\ & & \mathcal{M}\ , \end{array}$$

explicitée dessus.

p.ex. $\pi = 2^c$ avec $c \geqslant \pi_0$.) Mais c'est le moment d'utiliser le fait que les objets de S sont accessibles, et on prendra π_0 tel que les objets de S soient π_0-accessibles, et cette fois on prendra quand même I filtrante et grande devant π_0 (pour nous borner à ce qui est exigé dans la condition b) de loc. cit.). On doit prouver que $\mathrm{card}\,(\mathrm{Fl}(S/x)) \leqslant \pi$ (ce qui signifie $x \in \mathrm{Filt}^\pi$). Mais comme les objets de S sont π_0-accessibles et I grande devant π_0, on voit aussitôt que

$$S/x \;\simeq\; \varinjlim_i S/x_i \;,$$

d'où p. 14

$$\mathrm{Fl}\, S/x \;\simeq\; \varinjlim_i \mathrm{Fl}\, S/x_i \;,$$

donc

$$\mathrm{cardFl}(S/x) \;\leqslant\; \underbrace{(\mathrm{card} I)}_{\leqslant \pi}\; \underbrace{(\sup_i \mathrm{cardFl}(S/x_i))}_{\leqslant \pi} \;\leqslant \pi^2 = \pi \;,$$

q.e.d.

Prouvons c) ([12]), i.e. que pour tout $\pi' > \pi \geqslant \pi_0$ et tout $x \in \mathrm{ObFilt}^{\pi'}$, on peut écrire [page 76]

$$x \;=\; \varinjlim_I x_i \qquad I \text{ grande devant } \pi,\ \text{les } x_i \text{ dans } \mathrm{Filt}^\pi,\ \mathrm{card} I \leqslant \pi'^\pi. \tag{4.3.6.5}$$

La démonstration se fait comme dans loc. cit. (p. 151-152), en changeant légèrement la définition de I, comme désignant l'ensemble des sous-catégories pleines i de S/x qui sont filtrantes, de cardinal $\leqslant \pi$ *et de plus grandes devant* π_0 ([13]). (On pourra supposer S/x filtrante en augmentant S de façon à ce que S soit stable dans $\mathcal{M}$ par petites $\varinjlim$ finies, donc les catégories S/x aussi, ce qui implique qu'elles sont filtrantes. Il est `[phrase incomplète]`)

On a donc prouvé PTA $\Longrightarrow$ c).

Prouvons c) $\Longrightarrow$ d). Soit

$$\pi_1 \;=\; 2^c \qquad \text{avec} \qquad c \;\geqslant\; \pi_0 \;.$$

On sait alors que

$$\mathrm{Filt}^{\pi_1}\mathcal{M} \;=\; \mathcal{M}_{\pi_1} \overset{\text{déf}}{=} \text{ sous-catégorie pleine de } \mathcal{M} \text{ des objets } \pi_1\text{-accessibles de } \mathcal{M}$$

(loc. cit. 9.16), ce qui implique notamment que $\mathcal{M}_{\pi_1}$ est stable par $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi_1$, en vertu de loc. cit. 9.9 (page 145). De plus, par loc. cit. 9.18 b) (p. 156), on a [page 77]

$$\mathrm{Ind}_{\pi_1}(\mathcal{M}_{\pi_1}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{M} \;,$$

ce qui prouve d).

Prouvons d) $\Longrightarrow$ PTA. Par loc. cit. 9.18 a) (p. 156), on voit que les objets de $\mathcal{M}_{\pi_1}$ sont π_1-accessibles dans $\mathrm{Ind}_{\pi_1}(\mathcal{M}_{\pi_1})$, d'autre part il est clair que $\mathcal{M}_{\pi_1}$ est une sous-catégorie pleine strictement génératrice de $\mathrm{Ind}_{\pi_1}(\mathcal{M}_{\pi_1})$, donc il reste à voir que $\mathrm{Ind}_{\pi_1}(\mathcal{M}_{\pi_1})$ est stable par petites $\varinjlim$, i.e. le

Lemme 4.3.7. *Soit $\mathcal{M}_\pi$ une $\mathfrak{U}$-catégorie stable par limites inductives de cardinal $\leqslant \pi$, où π est un cardinal infini donné. Alors $\mathrm{Ind}_\pi\mathcal{M}_\pi$ est stable par petites limites inductives. De plus, $\mathcal{M} = \mathrm{Ind}_\pi\mathcal{M}_\pi$, munie de $\mathcal{M}_\pi \longrightarrow \mathcal{M}$, est solution d'un problème 2-universel, à savoir que pour toute catégorie $\mathcal{N}$ stable par petites limites inductives, le* p. 15

12. *Démonstration canulée*, ne marche que si $\pi^{\pi_0} = \pi$!!

13. Il n'est pas sûr que I soit grande devant π, sauf si on suppose $\pi^{\pi_0} = \pi$!

foncteur restriction induit une équivalence

$$\underline{\mathrm{Hom}}_!(\mathcal{M},\mathcal{N}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{!\,\pi}(\mathcal{M}_\pi,\mathcal{N}) \ , \tag{4.3.7.1}$$

où le signe ! (resp. $!\,\pi$) désigne la sous-catégorie pleine de la catégorie Hom, *formée des foncteurs qui commutent aux petites* $\varinjlim$ *(resp. aux limites inductives de cardinal $\leqslant \pi$).*

Prouvons d'abord que les $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi$ *dans* $\mathcal{M}_\pi$ sont aussi des $\varinjlim$ *dans* $\mathcal{M} = \mathrm{Ind}_\pi\mathcal{M}_\pi$ ([14]). On a donc [page 78]

$$x \xleftarrow{\sim} \varinjlim_I x_i \qquad \textit{dans } \mathcal{M}_\pi \ ,$$

i.e.

$$\mathrm{Hom}(x,y) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_I \mathrm{Hom}(x_i,y) \qquad \text{si } y \in \mathrm{Ob}\mathcal{M}_\pi \ , \tag{$*$}$$

prouvons que cela reste vrai pour y dans $\mathcal{M}$, i.e. y de la forme

$$y \ = \ \varinjlim_J y_j \ , \qquad J \text{ grande devant } \pi, \text{ les } y_j \text{ dans } \mathcal{M}_\pi.$$

On a en effet

$$\begin{aligned}
\mathrm{Hom}(x,y) \quad &\simeq \quad \varinjlim_J \mathrm{Hom}(x,y_j) \\
&\overset{(*)}{\simeq} \quad \varinjlim_J \varprojlim_I \mathrm{Hom}(x_i,y_j) \\
&\overset{\text{SGA 4 I 9.8}}{\simeq} \quad \varprojlim_I \varinjlim_J \mathrm{Hom}(x_i,y_j) \\
&\simeq \quad \varprojlim_I \mathrm{Hom}(x_i,y) \ ,
\end{aligned}$$

au total

$$\mathrm{Hom}(x,y) \ \simeq \ \varprojlim_I \mathrm{Hom}(x_i,y),$$

q.e.d.

Pour prouver que les petites $\varinjlim$ sont représentables dans $\mathcal{M} = \mathrm{Ind}_\pi(\mathcal{M}_\pi)$, comme elles le sont dans $\mathrm{Ind}(\mathcal{M}_\pi)$ (SGA 4 I 8.9.5 b, on utilise l'hypothèse que les $\varinjlim$ *finies* sont représentables dans $\mathcal{M}_\pi$), il reste à voir que $\mathrm{Ind}_\pi(\mathcal{M}_\pi)$ est stable dans $\mathcal{M}_\pi$ par ces limites. [page 79]

4.4 Étude de $\mathrm{Ind}_\pi(C)$ (pour C petite catégorie stable par $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi$)

4.4.1. Finalement, la démonstration du lemme 4.3.7 n'est pas tellement évidente que je l'anticipais, et il me faut lui consacrer des préliminaires techniques, que je vais réunir ici. Dans toute la suite, C représente une $\mathfrak{U}$-catégorie équivalente à une petite catégorie.

Proposition 4.4.2. *Soit $F \in C^\wedge$ un foncteur ind-représentable, i.e. tel que C/F soit filtrante. Soit d'autre part $i \longmapsto x_i$ un foncteur $I \longrightarrow C$, où I est une petite catégorie filtrante, et soit* p. 16

$$\alpha \ : \ x \ = \ \varinjlim_I {}_{C^\wedge} x_i \longrightarrow F \qquad ([15]) \tag{4.4.2.1}$$

14. Mais *attention*, $\mathcal{M}_\pi \longrightarrow \mathrm{Ind}(\mathcal{M}_\pi)$ ne commute *pas* à ces $\varinjlim$!

*un système projectif de flèches $x_i \longrightarrow F$ (***N.B.** *la limite inductive x est prise dans $C^\wedge$, et est calculée argument par argument), ce qui équivaut à une factorisation $\varphi_\alpha : I \longrightarrow C/F$ de $I \longrightarrow C$ en*

$$I \xrightarrow{\varphi_\alpha} C/F \underset{\psi}{\overset{can.}{\hookleftarrow}} C\ .$$

Ceci dit, pour que α (4.4.2.1) soit un isomorphisme dans $\mathrm{Ind}'(C) \subset C^\wedge$ (sous-catégorie pleine des foncteurs ind-représentables sur C), il faut et il suffit que φ_α soit cofinal*, ou ce qui revient au même, I étant filtrante, qu'il satisfasse les deux conditions habituelles :*

F 1) *$\forall\, \xi \in \mathrm{Ob}C/F$, $\exists\, i \in \mathrm{Ob}I$ et une flèche $\xi \longrightarrow \varphi_\alpha(i)$.*

F 2) *$\forall\, \xi \in \mathrm{Ob}C/F$, et $i \in \mathrm{Ob}I$, et toute double-flèche*

[page 80]

$$\xi \rightrightarrows \varphi_\alpha(i)\ ,$$

il existe une flèche $i \xrightarrow{u} j$ dans I telle que $\varphi_\alpha(u)$ égalise la double-flèche.

Démonstration. Si φ_α est cofinal, on en conclut par définition que $\varinjlim \varphi_\alpha \longrightarrow \varinjlim \psi\varphi_\alpha$ est un isomorphisme, or cette flèche n'est autre que α. Inversement, supposons que cette flèche soit un isomorphisme, donc $C/F \xleftarrow{\sim} C/\varinjlim x_i$, et il reste à voir que le foncteur canonique

$$I \longrightarrow C/\varinjlim\nolimits_{C^\wedge} x_i$$

est cofinal, i.e. satisfait F 1) et F 2). La vérification est ± tautologique, en utilisant le fait que pour tout y dans C, on a

$$\mathrm{Hom}(y, \varinjlim\nolimits_{C^\wedge} x_i) \xleftarrow{\sim} \varinjlim\nolimits_{\mathrm{Ens}} \mathrm{Hom}(y, x_i),$$

et du "calcul" des limites inductives filtrantes dans Ens.

Corollaire 4.4.3. *Soit π un ordinal infini. Pour que F soit dans $\mathrm{Ind}'_\pi(C)$ (image essentielle de $\mathrm{Ind}_\pi(C)$ dans $C^\wedge$), il faut et il suffit qu'il existe une catégorie ordonnée grande devant π I, et un foncteur cofinal $I \longrightarrow C/F$.*

Il nous faut donc donner des conditions, sur une catégorie J $(= C/F)$, pour qu'il existe une catégorie ordonnée I grande devant π, et un foncteur cofinal $I \longrightarrow J$.

[page 81]

Une telle catégorie s'appellera *grande devant π*. (Il est immédiat que dans le cas où J est elle-même ordonnée, cette terminologie est cohérente avec celle déjà adoptée pour les ensembles ordonnés, i.e. que s'il existe une application croissante cofinale $\varphi : I \longrightarrow J$, avec I grand devant π, alors J est lui-même grand devant π.) Une telle catégorie est automatiquement filtrante (SGA 4 I 8.1.3 b)). Notons aussi que si on a un foncteur cofinal $J \longrightarrow J'$, si J est grande devant π, J' l'est aussi (par transitivité de la cofinalité).

p. 17

Proposition 4.4.4. *Soient J une $\mathfrak{U}$-catégorie, π un cardinal infini. Conditions équivalentes :*

a) J est grande devant π, i.e. il existe un ensemble ordonné grand devant π et un foncteur cofinal $\varphi : I \longrightarrow J$.

b) J satisfait les deux conditions suivantes :

PF$_\pi$ 1 *$\mathrm{Ord}\, J$ est grande devant π, i.e. pour toute famille $(y_\alpha)_{\alpha\in A}$ d'objets de J, avec $\mathrm{card}A \leqslant \pi$, il existe un majorant y dans J (i.e. un y et des flèches $y_\alpha \xrightarrow{v_\alpha} y$).*

PF$_\pi$ 2 *Pour y_0, y_1 dans J et tout ensemble $(u_\alpha)_{\alpha\in A}$ de flèches $y_0 \xrightarrow{u_\alpha} y_1$ avec $\mathrm{card}A \leqslant \pi$, il existe une flèche $y_1 \xrightarrow{u'} y_2$ qui les égalise, i.e. telle que $u'u_\alpha = u'u_\beta\ \forall\, \alpha, \beta \in A$. (Il suffit de l'exiger quand $\mathrm{card}A \geqslant 2$.)*

15. La donnée de α équivaut aussi à celle d'un homomorphisme d'ind-objets $(x_i)_{i\in I} \longrightarrow F$, F étant considéré comme ind-objet (généralisé) indexé par C/F.

c) Pour toute partie A de $\mathrm{Fl}J$*, avec* $\mathrm{card}A \leqslant \pi$*, existe une sous-catégorie J' de J, avec* $\mathrm{card}\mathrm{Fl}J' \leqslant \pi$*, telle que $A \subset \mathrm{Fl}J'$ et que J' admette un objet final.*

d) Soit I l'ensemble des sous-catégories J' de J telles que $\mathrm{card}J' \leqslant \pi$ *et ayant un objet final*

et ordonnons I par inclusion. Alors I est grand devant π, de plus le foncteur canonique $I \longrightarrow J$ ($J' \longmapsto e_{J'}$ = objet final de J') est cofinal ([16], [17], [18]). [page 82]

([19])

Démonstration.

a $\Longrightarrow$ b vérification immédiate, en utilisant le critère F 1, F 2 de la cofinalité pour I filtrante.


b $\Longrightarrow$ c par AQT `[âne qui trotte]`.

c $\Longrightarrow$ d par AQT `[âne qui trotte]`.

d $\Longrightarrow$ a Considérons l'ensemble ordonné grand devant π construit dans l'énoncé de d), et le *foncteur* p. 18

$$I \longrightarrow J$$

donné par $J' \longmapsto e_{J'}$ = objet final de J'. (Vérification que c'est un foncteur immédiate.) Ce foncteur est surjectif, donc satisfait la condition F 1 de cofinalité. La condition F 2 résulte aussi de d) en regardant les trois objets J', $j \xrightarrow{u_1} e_{J'}$, $j \xrightarrow{u_2} e_{J'}$ de I,



et en prenant un J'' qui les majore tous trois, alors $e_{J'} \longrightarrow e_{J''}$ égalise u_1, u_2 ([20]).

Corollaire 4.4.5. *Soit $F \in \mathrm{Ob}C^\wedge$. Pour que F appartienne à $\mathrm{Ind}'_\pi(C)$, il faut et il suffit que C/F satisfasse à l'ensemble des quatre conditions équivalentes de 4.4.4.*

Corollaire 4.4.6. *Soit J une catégorie stable par $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi$. Alors J est grande devant π.*

En effet, les conditions PF_π 1, PF_π 2 sont visiblement vérifiées.

4.4.6. Je me donne un foncteur [page 83]

$$J \xrightarrow{\varphi} \mathrm{Ind}'_\pi C\ , \tag{4.4.6.1}$$

16. Introduire $I(J)$ avant l'énoncé de la proposition. **N.B.** La condition de cofinalité $I(J) \longrightarrow J$ n'est pas automatique, comme on voit en prenant $J = B_G$, $G = \{\pm 1\}$.

17. **N.B.** L'hypothèse de cofinalité est superflue si J est rigide, i.e. tout endomorphisme d'un objet de J est identique.

18. N. Éd. Dans cette condition (d), le "*de plus le foncteur … est cofinal*" est ajouté par Grothendieck *a posteriori*, ce qui explique sa vaine tentative de l'établir dans l'implication d $\Longrightarrow$ a ci-dessous, implication qui devient évidente après cet ajout. Par ailleurs, les conditions (c) et (d) ne sont *pas* impliquées par les conditions équivalentes (a) et (b). Par exemple, si J est la catégorie ayant un seul objet et un seul morphisme non identique p tel que $p^2 = p$, alors J satisfait aux conditions (a) et (b), mais *pas* aux conditions (c) et (d).

19. Autres conditions :

e) Pour tout ensemble A avec $\mathrm{card}A \leqslant \pi$, $\mathrm{diag}_J : J \longrightarrow J^A$ est cofinal.

e′) (Si A_0 est un ensemble donné, de cardinal $= \pi$.) $J \longrightarrow J^{A_0}$ est cofinal.

Voir aussi 4.9.6.9.1 et 4.9.6.9.2, pages 237, 238.

20. Un peu bref, le cas où $e_{J'} = j$ échappe à cet argument, et demande qu'on `[phrase incomplète]`

J une petite catégorie, et on cherche une $\varinjlim$ dans $\mathrm{Ind}'_\pi C$, en postulant au besoin l'existence des $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi$ dans C, et l'hypothèse $\mathrm{card}\mathrm{Fl} J \leqslant \pi$. Le procédé le plus naturel pour ramener la question de l'existence des $\varinjlim$ dans $\mathrm{Ind}'_\pi C$, à la question similaire dans C, est explicité dans SGA 4 I 8.8.3. On considère l'inclusion pleinement fidèle

$$C \xhookrightarrow{\alpha} \mathrm{Ind}'_\pi C\ , \tag{4.4.6.2}$$

laquelle commute aux $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi$ (celles qui sont représentables dans C, cf. p. 78 et référence à SGA 4 I 9.8), d'où

$$\underline{\mathrm{Hom}}(J, C) \xhookrightarrow{\alpha} \underline{\mathrm{Hom}}(J, \mathrm{Ind}'_\pi C) \tag{4.4.6.3}$$

également pleinement fidèle, et commutant aux $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi$ (représentables dans le premier membre). Cette flèche s'insère dans le carré commutatif relatif à la donnée d'un $j \in \mathrm{Ob} J$, et des foncteurs d'inclusion

$$e \xrightarrow{\varepsilon_j} J\ , \qquad e_j(e) \ = \ j\ ; \tag{4.4.6.4}$$

p. 19
[page 84]

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{Hom}}(J, C) & \xrightarrow{\alpha^J} & \underline{\mathrm{Hom}}(J, \mathrm{Ind}'_\pi C) \\ \downarrow{\scriptstyle \varepsilon_j^*} & & \downarrow{\scriptstyle \varepsilon_j^{*\prime}} \\ C & \xrightarrow{\alpha} & \mathrm{Ind}'_\pi(C) \end{array} \qquad \begin{array}{c} \ni \varphi \\ \downarrow \\ \ni \varphi(j)\ , \end{array} \qquad ({}^{21}) \tag{4.4.6.2}$$

lequel induit un foncteur

$$\underbrace{\underline{\mathrm{Hom}}(J/C)/\varphi}_{\overset{\text{déf}}{=} I} \xrightarrow{\varepsilon_j^\varphi} C/\varphi(j)\ . \tag{4.4.6.3}$$

Si C est stable par $\varinjlim$ relatives à un ensemble K du type de conditions $\leqslant \pi$ (p.ex. $\varinjlim$ finies), il en est de même de $\underline{\mathrm{Hom}}(J, C)$, et aussi de $\underline{\mathrm{Hom}}(J, C)/\varphi$, et de $C/\varphi(j)$, en vertu du fait que α^J et α commutent aux $\varinjlim$ du type envisagé, de plus (4.4.6.3) commute aux limites en question. Supposons donc C stable tout au moins par $\varinjlim$ finies, donc les catégories source et but dans (4.4.6.3) sont filtrantes. (Le fait que le foncteur commute aux $\varinjlim$ finies ne semble pas utile dans le contexte présent.) Cela nous servira pour avoir le critère commode de cofinalité SGA 4 I 8.1.3 b) par F 1, F 2.

Rappelons que la cofinalité des foncteurs (4.4.6.3), quand elle a lieu (?), implique le fait que φ est une limite inductive du foncteur composé [page 85]

$$\begin{array}{ccccc} I & \xrightarrow{\psi_J} & \underline{\mathrm{Hom}}(J, C) & \xrightarrow{\alpha^J} & \underline{\mathrm{Hom}}(J, \mathrm{Ind}'_\pi(C)) \\ \| & & & & \\ \underline{\mathrm{Hom}}(J, C)/\varphi & & \downarrow{\scriptstyle \varepsilon_j^*} & & \downarrow{\scriptstyle \varepsilon_j^{*\prime}} \\ {\scriptstyle \varepsilon_j^\varphi}\downarrow & & & & \\ C/\varphi(j) & \xrightarrow{\psi_j} & C & \xrightarrow{\alpha} & \mathrm{Ind}'_\pi(C)\ , \end{array} \tag{4.4.6.4}$$

suivant l'ensemble ordonné filtrant I, plus précisément que φ est la $\varinjlim$ "argument par argument en j", ce qui signifie que pour tout $j \in \mathrm{Ob}\, J$, $\varphi(j) = \varepsilon_j^*(\varphi)$ est limite inductive de $\varepsilon_j^*(\alpha^J \psi) = (\alpha\psi_j)\varepsilon_j^\varphi$. (Or on sait en effet que $\varphi(j)$ est la limite de $\alpha\psi$, puisque $\varphi(j) \in \mathrm{Ob}\, C^\wedge$ est ind-représentable, donc aussi celle de $(\alpha\psi_j)\varepsilon_j^\varphi$ si ε_j^φ est cofinal.)

Ainsi, admettant la cofinalité de (4.4.6.3) et interprétant ψ_J dans (4.4.6.4)

$$\psi_J \ : \ I \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(J, C) \qquad \text{[page 86]}$$

21. Les foncteurs ε_j^*, $\varepsilon_j^{*\prime}$ sont les foncteurs évaluation en j.

comme un foncteur

$$I \times J \xrightarrow{\Psi} C \ ,$$

on trouve la "représentation indicielle" de φ

$$\varphi(j) \ = \ \underbrace{\varinjlim_{i\in I} \psi(i,j)}_{\substack{\text{limite inductive}\\ \text{prise dans } \mathrm{Ind}'_\pi(C)\\ \text{d'objets de } C\hookrightarrow \mathrm{Ind}'_\pi(C)}} \ ,$$

d'où

p. 20

$$\begin{aligned} \underbrace{\varinjlim_{j\in J} \mathrm{Ind}'_\pi C\varphi(j)}_{\text{sous réserve d'existence}} \quad &= \quad \varinjlim_{j\in J} \varinjlim_{i\in I} \psi(i,j) \\ &= \quad \varinjlim_{i\in I} \varinjlim_{j\in J} \psi(i,j) \ , \end{aligned}$$

toutes les limites inductives étant prises dans $\mathrm{Ind}'_\pi(C)$. Mais si les $\varinjlim$ de type J sont représentables dans C, et $\mathrm{card}\, J \leqslant \pi$, on sait que la $\varinjlim_{j\in J} \psi(i,j)$ *dans* C est aussi leur $\varinjlim$ dans $\mathrm{Ind}'_\pi C$, et on trouve donc que $\varinjlim_{j\in J} \varphi(j)$ existe dans $\mathrm{Ind}'_\pi(C)$ si et seulement si $\varinjlim_{i\in I} \Psi(i)$ existe dans $\mathrm{Ind}'_\pi(C)$, où pour $i \in I$, on pose

$$\Psi(i) \ = \ \varinjlim_{j\in J} \psi(i,j) \qquad \textit{dans } C.$$

Résumons ce que nous avons obtenu : [page 87]

Lemme 4.4.7. *Soit C une petite catégorie, π un cardinal infini, J une catégorie telle que* $\mathrm{card}\, \mathrm{Fl}\, J \leqslant \pi$, *$\varphi : J \longrightarrow \mathrm{Ind}'_\pi(C)$ un foncteur. Supposons les $\varinjlim$ de type J existant dans C, et que les foncteurs ε_j^φ ($j \in \mathrm{Ob}\, J$) de (4.4.6.3) soient* cofinaux *(ce qui s'explicite de façon simple surtout si source et but sont filtrants, chose acquise si C est stable par $\varinjlim$ finies). Alors φ a une "représentation indicielle canonique"*

$$\psi \ : \ I \times J \longrightarrow C \tag{4.4.7.1}$$

avec

$$I \ = \ \underline{\mathrm{Hom}}(J, C)/\varphi \ , \tag{4.4.7.2}$$

i.e. on a l'isomorphisme fonctoriel en $j \in \mathrm{Ob}\, J$

$$\varphi(j) \ \simeq \ \varinjlim_{I} \psi(i,j) \qquad ({}^{22}) \ . \tag{4.4.7.3}$$

Posons pour tout $i \in \mathrm{Ob}\, I$

$$\Psi(i) \ = \ \varinjlim_{J} \psi(i,j) \qquad ({}^{23}) \ . \tag{4.4.7.4}$$

Alors $\varinjlim_{j\in J} \varphi(j)$ (dans $\mathrm{Ind}'_\pi C$) existe si et seulement si la $\varinjlim_{i\in I} \Psi(i)$ existe (dans $\mathrm{Ind}'_\pi C$ également), et les deux sont égales. [page 88]

Corollaire 4.4.8. *Supposons que C soit stable par $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi$ (pas seulement par celles de type J). Alors $\underline{\mathrm{Hom}}(J, C)$ et $I = \underline{\mathrm{Hom}}(J, C)/\varphi$ ont la même propriété, I est*

p. 21

grande devant π, et $\varinjlim_{j\in J} \varphi(j) = \varinjlim_{i\in I} \Psi(i)$ *existe dans* $\mathrm{Ind}'_\pi(C)$*, sous réserve de cofinalité des foncteurs (4.4.6.3).*

Il suffit en effet de vérifier ce

Lemme 4.4.8.1. *Soit I une catégorie grande devant π, et $\Psi : I \longrightarrow C$ un foncteur. Alors* $\varinjlim_i \Psi(i)$ *existe dans* $\mathrm{Ind}'_\pi(C)$*, et c'est la limite inductive dans $C^\wedge$, ou encore "c'est" l'ind-objet grand devant π représenté par Ψ.* (En d'autres termes ([24]), $\mathrm{Ind}'_\pi(C) \subset C^\wedge$ est une sous-catégorie strictement pleine *stable* par $\varinjlim$ grandes devant π.)

Ce lemme est une tautologie : si F désigne la limite inductive dans $C^\wedge$, il est clair [page 89] par définition (en prenant un foncteur $I_0 \longrightarrow I$ cofinal, avec I_0 *ordonnée* grande devant π, de sorte que la $\varinjlim$ peut être prise suivant I_0) que F est dans $\mathrm{Ind}'_\pi(C)$, et alors c'est a fortiori une $\varinjlim$ dans $\mathrm{Ind}'_\pi C$.

Pour vérifier l'existence des $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi$ dans $\mathrm{Ind}'_\pi C$, dans le cas où C lui-même est stable par lesdites limites, il suffit donc, grâce au corollaire 4.4.8, de prouver la cofinalité des foncteurs (4.4.6.3). Cela va résulter du

Lemme 4.4.9. *Soient C une petite catégorie, π un cardinal infini, J une petite catégorie telle que pour tous $j, j' \in \mathrm{Ob}\, J$, on ait* $\mathrm{card}\,\mathrm{Hom}(j, j') \leqslant \pi$*. Sous ces conditions, pour tout $j \in \mathrm{Ob}\, J$, le foncteur (4.4.6.3)* admet un adjoint à gauche, *donc a fortiori il est cofinal (car les catégories colocalisées au dessus de $C/\varphi(j)$ ont un objet initial, a fortiori elles sont* 0*-connexes).*

Démonstration de 4.4.8. Revenons au diagramme (4.4.6.2), dont on déduit [page 90] (4.4.6.3), nous allons le réécrire de façon simplifiée :

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{\beta} & B' \\ {\scriptstyle\lambda}\uparrow\downarrow{\scriptstyle\varepsilon} & & {\scriptstyle\lambda'}\uparrow\downarrow{\scriptstyle\varepsilon'} \\ C & \xrightarrow{\gamma} & C' \end{array} \qquad \begin{array}{c} \ni y'_0 \\ \downarrow \\ \ni z'_0\ . \end{array} \tag{4.4.9.1}$$

Je dis que ε, ε' ont *des adjoints à gauche* λ resp. λ', et que l'homomorphisme canonique de "changement de base"

$$\lambda'\gamma \longrightarrow \beta\lambda \tag{4.4.9.2}$$

est un *isomorphisme.* En effet, l'existence des adjoints de ε, ε', à savoir des foncteurs $\varepsilon_{j\,!}$ et $\varepsilon'_{j\,!}$ relatifs à l'inclusion

$$\varepsilon_j \ : \ e \longrightarrow J$$

et aux catégories de foncteurs $\underline{\mathrm{Hom}}(J, C)$ resp. $\underline{\mathrm{Hom}}(J, \mathrm{Ind}'_\pi C)$, résultant de l'existence des sommes de type $\mathrm{Hom}(j, j')$ ($j' \in \mathrm{Ob}\, J$) dans C (déjà acquise), *et dans* $\mathrm{Ind}'_\pi C$ *;* et le fait que le foncteur $C \longrightarrow \mathrm{Ind}'_\pi C$ commute auxdites sommes (chose également déjà acquise, [page 91] puisque $\mathrm{card}\,(\mathrm{Hom}(j, j')) \leqslant \pi$) implique alors que (4.4.4.2) est un isomorphisme. Moyennant la vérification en suspens (l'existence des sommes de cardinal $\leqslant \pi$ dans $\mathrm{Ind}'_\pi(C)$), p. 22 le lemme 4.4.9 résultera du résultat plus général :

Lemme 4.4.10. *Considérons un carré commutatif (4.4.9.1) (traits pleins) de catégories, où ε admet un adjoint à gauche λ, ε' un adjoint à gauche λ', et la flèche de changement de base (4.4.9.2) est un isomorphisme. Alors pour tout y'_0 dans B', posant $\varepsilon'(y'_0) = z'_0$, le foncteur induit par $(\varepsilon, \varepsilon')$,*

$$\overline{B} \ = \ B/y'_0 \xrightarrow{\bar\varepsilon} \overline{C} = C/z'_0\ ,$$

22. limite inductive dans Ind'_π d'objets de C.
23. limite inductive prise dans C, mais valable aussi dans $\mathrm{Ind}'_\pi C$.
24. C'est abusif, cette stabilité est un énoncé nettement plus fort ! Je le prouve page 99.

admet un adjoint à gauche $\overline{\lambda}$*, donné par*

$$\overline{\lambda}(\gamma(z) \xrightarrow{v} z'_0) \quad = \quad \Big(\lambda'\gamma(z) \simeq \beta(\lambda(z)) \xrightarrow{\lambda'(v)} \lambda'(z'_0) \Big\| \lambda'\varepsilon'(y'_0) \Big\downarrow \text{adj.} \; y'_0\Big) \quad .$$

$\overline{\lambda}(v) = \text{composé adj}\circ\lambda'(v)$

La démonstration se fait par un AQT [âne qui trotte] fastidieux (j'avoue ne pas avoir poussé jusqu'au dernier détail …). [page 92]

Pour terminer la démonstration de 4.4.9, il reste à prouver un dernier (?)

Lemme 4.4.11. *Soit C une petite catégorie, stable par sommes de cardinal $\leqslant \pi$. Alors $\mathrm{Ind}'_\pi C$ est stable par sommes de cardinal $\leqslant \pi$ (et, pour mémoire, le foncteur $\alpha : C \longrightarrow \mathrm{Ind}'_\pi C$ y commute).*

Appliquant le corollaire 4.4.8 au lemme 4.4.7, on est ramené à prouver la cofinalité de (4.4.6.3) quand J est discrète, plus le fait que $\underline{\mathrm{Hom}}(J, C)/\varphi$ est grande devant π, dans ce cas. Mais la donnée de φ revient à celle d'une famille $(\varphi_j)_{j\in J}$ d'objets de $\mathrm{Ind}'_\pi(C)$, et le foncteur (4.4.6.3) s'explicite comme la projection

$$\prod_{j\in J}(C/\varphi_j) \longrightarrow C/\varphi_j$$

du produit total sur un des facteurs. Donc on est ramené à ceci :

Lemme 4.4.12. *Soit $(C_j)_{j\in J}$ une famille de petites catégories grandes devant π, indexée par un petit ensemble J. Alors $\prod C_j$ est grande devant π, et les projections (pour $j_0 \in J$) $\prod C_j \longrightarrow C_{j_0}$ sont cofinales.* [page 93]

Prouvons d'abord la cofinalité, qui est le plus important pour nous. C'est évident si $J = \{j_0\}$, sinon on a $J = J' \cup \{j_0\}$, et $\prod_{j\in J} C_j \simeq C' \times C_{j_0}$, où $C' = \prod_{j\in J'} C_j$, donc il faut voir que $C' \times C_{j_0} \longrightarrow C_{j_0}$ est cofinal, i.e. que toute catégorie $\xi\backslash(C' \times C_{j_0})$ (pour $\xi \in \mathrm{Ob}\, C_{j_0}$) est 0-connexe, or elle est isomorphe à $C' \times (\xi\backslash C_{j_0})$, et $\xi\backslash C_{j_0}$ étant 0-connexe, il reste à voir que C' est 0-connexe. On fera attention à cet égard qu'un produit *infini* de catégories 0-connexes n'est pas forcément 0-connexe, donc la cofinalité n'est pas totalement tautologique ! Mais si on prouve que la catégorie $\prod_{j\in J} C_j$ est grande devant π, donc filtrante, cela implique qu'elle est 0-connexe, et on peut appliquer ce même résultat à $C' = \prod_{j\in J'} C_j$, et on gagne. p. 23 [page 94]

Donc on est ramené à prouver que $\prod C_j$ est grande devant π. Ceci se voit soit sur le critère $\mathrm{PF}_\pi\, 1$, $\mathrm{PF}_\pi\, 2$ de 4.4.4 b, soit en se ramenant au cas où les C_j sont ordonnées, mais cela a l'air plus long. Notons que l'on prouve de même qu'un (petit) produit de catégories filtrantes est encore une catégorie filtrante.

Remarques.

1. Cet argument ne montre nullement (même si C est stable par $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi$) que pour tout $\varphi \in \underline{\mathrm{Hom}}(J, \mathrm{Ind}(C))$, le foncteur similaire à (4.4.6.3)

$$\underline{\mathrm{Hom}}(J, C)/\varphi \longrightarrow C/\varphi(j)$$

soit cofinal, et je doute qu'il le soit toujours. La difficulté provient du fait que $C \longrightarrow \mathrm{Ind}\, C$ ne commute pas aux sommes de cardinal $\leqslant \pi$, seulement aux sommes finies, donc le lemme 4.4.10 ne peut être invoqué. [page 95]

2. Nous venons de prouver, via 4.4.8 et 4.4.9 (dont la démonstration est achevée avec 4.4.12), que si C est une petite catégorie stable par $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi$, alors $\mathrm{Ind}_\pi C$ est également stable par ces limites. De plus, les systèmes inductifs de ce type J dans $\mathrm{Ind}_\pi C$ admettent une représentation indicielle

$$\psi \ : \ I \times J \longrightarrow C \ ,$$

avec I grande devant π. Et on peut toujours supposer, quitte à prendre $I' \longrightarrow I$ cofinal avec I' ensemble ordonné grand devant π, que I est de plus un ensemble ordonné.

C'est là le moyen donc, pour la démonstration du

Théorème 4.4.13. *Soit C une catégorie équivalente à une petite catégorie, et stable par $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi$, où π est un cardinal infini donné. Alors :* [page 96]

a) (Pour mémoire.) Le foncteur canonique

$$C \longrightarrow \mathrm{Ind}_\pi(C) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ind}'_\pi(C)$$

commute aux $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi$.

b) (Pour mémoire.) Les systèmes inductifs de cardinal $\leqslant \pi$ dans $\mathrm{Ind}_\pi(C)$ (i.e. les foncteurs $\varphi : J \longrightarrow \mathrm{Ind}_\pi(C)$, avec $\mathrm{card}\,\mathrm{Fl}(J) \leqslant \pi$) admettent une représentation indicielle

$$\psi \ : \ I \times J \longrightarrow C \ ,$$

avec I ensemble ordonné grand devant π, et admettent une limite inductive dans $\mathrm{Ind}_\pi C$ qui se calculent par

$$\underbrace{\varinjlim_{j\in J} \varphi(j)}_{\text{dans } \mathrm{Ind}_\pi(C)} \quad \simeq \quad \text{“} \varinjlim_{i\in I} \text{”} \Psi(i)$$

avec p. 24

$$\Psi(i) \ = \ \varinjlim_{j\in J}{}_C \, \psi(i,j) \ .$$

c) $\mathrm{Ind}_\pi\, C$ *est stable par petites limites inductives* ([21]).

Il reste à établir ce dernier point. Comme on a déjà les $\varinjlim$ finies par b, il reste à prouver l'existence des petites $\varinjlim$ filtrantes, ou au choix des sommes infinies, ce qui sera plus joli en fait. Mais on pourra aussi bien traiter le cas général d'une $\varinjlim$ de type J quelconque (J petite). Pour ceci, soit [page 97]

$$I \ = \ I(J) \ = \ \text{ensemble des sous-catégories } J' \text{ de } J \text{ telles que } \mathrm{card}\,\mathrm{Fl}(J') \leqslant \pi,$$

ordonnons I par inclusion. Il est évident que $I \neq \emptyset$ (car $\emptyset \in I$), et même que I *est grand devant* π, car si $(J'_\alpha)_{\alpha\in A}$ avec $\mathrm{card}(A) \leqslant \pi$ est une famille d'éléments de I, alors la sous-catégorie de J engendrée par les J'_α est encore dans I (vérification immédiate), et majore les J'_α. En fait, la considération de $I(J)$ associée à J va nous permettre de prouver ceci, qui généralise 4.4.13 c), compte tenu de b) :

Corollaire 4.4.14 ([22]). *Soit $\mathcal{M}$ une catégorie, π un cardinal infini tel que*

a) *$\mathcal{M}$ est stable par $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi$, et* [page 98]

b) *$\mathcal{M}$ est stable par $\varinjlim$ sur les ensembles ordonnés I grands devant π.*

21. rajouter aussi, en d), le corollaire 4.4.16, page 101.
22. Comparer aussi 4.11.3, page 270.

Alors $\mathcal{M}$ est stable par petites $\varinjlim$.

([23]).

En effet, si $\varphi : J \longrightarrow \mathcal{M}$ est donné, on en construit

$$\psi \ : \ I \ = \ I(J) \ \longrightarrow \ \mathcal{M}$$

par

$$\psi(J') \ = \ \varinjlim_{J'} \varphi(J') \ ,$$

qui existe par hypothèse sur $\mathcal{M}$. Il est alors immédiat que $\varinjlim_{J} \varphi$ existe si et seulement si $\varinjlim_{I} \psi$ existe, or cette existence est assurée du fait que I est grand devant π, et l'hypothèse sur $\mathcal{M}$.

Pour achever de prouver le théorème 4.4.13, on est donc ramené au cas particulier des limites inductives $\varinjlim_{J} \varphi(j)$, quand $\varphi : J \longrightarrow \mathrm{Ind}'_\pi C$ est donné, avec J ensemble ordonné grand devant π. Mais ceci va résulter du résultat plus précis : p. 25 [page 99]

Corollaire 4.4.15 ([24]). *Soit C une petite catégorie. Alors la sous-catégorie strictement pleine $\mathrm{Ind}'_\pi C$ de $C^\wedge$ est stable dans $C^\wedge$ par $\varinjlim$ grandes devant π, en d'autres termes, ces $\varinjlim$ existent dans $\mathrm{Ind}'_\pi(C)$, et le foncteur d'inclusion y commute.*

Démonstration. Soit I ensemble ordonné, grand devant π, et $i \longmapsto F_i$ un foncteur $I \longrightarrow \mathrm{Ind}'_\pi(C)$, $F \ = \ \varinjlim_{I} F_i$ dans $C^\wedge$, prouvons que $F \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{Ind}'_\pi(C)$, i.e. (4.4.3) que C/F est grande devant π. J'utilise le critère b) de 4.4.4, il faut vérifier $\mathrm{PF}_\pi\,1$, $\mathrm{PF}_\pi\,2$. Soient

$$x_\alpha \xrightarrow{u_\alpha} F \ = \ \varinjlim F_i$$

des objets de C/F indexés par A avec $\mathrm{card}\,A \leqslant \pi$. Chaque u_α provient de $x_\alpha \longrightarrow F_{i_\alpha}$, et en prenant un majorant commun des i_α (I grand devant π), on trouve un $i \in I$ et des $v_\alpha : x_\alpha \longrightarrow F_i$. Comme F_i est dans $\mathrm{Ind}'_\pi(C)$, i.e. C/F_i grande devant π, considérant les v_α comme des objets de C/F_i, ils sont majorés par un objet $x \longrightarrow F_i$ de C/F_i. On a donc

$$\begin{array}{ccccc} x_\alpha & \longrightarrow & F_{i_\alpha} & & \\ \downarrow & & \downarrow & \searrow & \\ x & \longrightarrow & F_i & \longrightarrow & F \ , \end{array}$$

qui montre que les $x_\alpha \longrightarrow F$ sont majorés par $x \longrightarrow F$, ce qui prouve $\mathrm{PF}_\pi\,1$. Prouvons $\mathrm{PF}_\pi\,2$, i.e. soient $x \xrightarrow{u} F$, $y \xrightarrow{v} F$ deux objets de C/F, et $(f_\alpha)_{\alpha \in A}$ une famille de cardinal $\leqslant \pi$ de flèches de u dans v. On sait que u, v proviennent de $u_i : x \longrightarrow F_i$, $v_i : y \longrightarrow F_i$ pour i assez grand. [page 100]

$$\begin{array}{ccc} x & \xrightarrow{f_\alpha} & y \\ & {\scriptstyle u}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle v} & \\ & F & \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} x & \xrightarrow{f_\alpha} & y \\ & {\scriptstyle u_i}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle v_i} & \\ & F_i & \end{array}$$

23. **Corollaire 4.4.14.1.** $\mathcal{M}$ étant comme dans 4.4.14, et $f : \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{E}$ étant un foncteur qui commute aux $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi$, et aux petites $\varinjlim$ grandes devant π, alors f commute aux petites $\varinjlim$.

24. comparer à 4.7.3.1, qu'il y aurait lieu d'expliciter ici.

Pour tout α, on peut choisir $i_\alpha \geqslant i$ tel que $v_i f_\alpha$ et u_i deviennent égaux en composant avec $F_i \longrightarrow F_{i_\alpha}$, et comme $\operatorname{card} A \leqslant \pi$ et I grand devant π, il existe un majorant i' des i_α. Au total, on peut supposer (remplaçant i par i') que $v_i f_\alpha = u_i$ pour tout α. Alors u_i, v_i étant considérés comme objets de C/F_i, les f_α sont des flèches de C/F_i de u_i dans v_i. Comme C/F_i est grand devant π (par l'hypothèse $F_i \in \operatorname{Ob} \operatorname{Ind}'_\pi(C)$), on trouve qu'il existe un égalisateur $(y, v_i) \xrightarrow{g} (z, w_i)$. p. 26

$$\begin{array}{ccccc} & & & & \\ x & \overset{(f_\alpha)}{\rightrightarrows} & y & \xrightarrow{g} & z \\ & {\scriptstyle u_i}\searrow & \downarrow{\scriptstyle v_i} & \swarrow{\scriptstyle w_i} & \\ & & F_i & & \end{array}$$

Alors l'image de g dans C/F (via $F_i \longrightarrow F$) égalise les flèches f_α, en tant que flèches de C/F, ce qui prouve $\mathrm{PF}_\pi\, 2$ et achève la démonstration de 4.4.14, et par là aussi celle du théorème 4.4.13, et du lemme 4.3. Par là est aussi achevée la démonstration de la première assertion du lemme 4.3.7 (p. 77), ce qui achève la démonstration du théorème 4.3.6 (p. 70-71). Il reste à établir la propriété universelle énoncée dans 4.3.7, que je vais rappeler : [page 101]

Corollaire 4.4.16 ([25]). *Soient C une catégorie équivalente à une petite catégorie, stable par $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi$, où π est un cardinal infini donné, et considérons le foncteur d'inclusion canonique*

$$C \xrightarrow{\alpha} \operatorname{Ind}_\pi(C)\ . \tag{4.4.16.1}$$

Ce foncteur est 2-universel pour les foncteurs $f : C \longrightarrow \mathcal{E}$, où $\mathcal{E}$ est une $\mathcal{U}$-catégorie stable par petites $\varinjlim$, et f un foncteur commutant à ces limites inductives. En d'autres termes, on a

1°) α possède les propriétés précédentes, i.e. $\operatorname{Ind}_\pi(C)$ est stable par $\varinjlim$, et le foncteur α commute aux $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi$.

2°) Pour toute $\mathfrak{U}$-catégorie $\mathcal{E}$ stable par petites limites inductives, le foncteur

$$\begin{array}{ccc} g & \longmapsto & g \circ \alpha \\ \underline{\mathrm{Hom}}_!(\operatorname{Ind}_\pi C, \mathcal{E}) & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Hom}}_{!\,\pi}(C, \mathcal{E}) \end{array} \tag{4.4.16.2}$$

est une équivalence de catégories, où l'indice $!$ (resp. $!\,\pi$) indique la sous-catégorie strictement pleine de la catégorie $\underline{\mathrm{Hom}}$ envisagée, formée des foncteurs qui commutent aux petites $\varinjlim$ (resp. à celles de cardinal $\leqslant \pi$). [page 102]

On peut donc dire aussi que $\operatorname{Ind}_\pi(C)$ joue le rôle d'une "enveloppe" stable par petites $\varinjlim$ de la catégorie C, quand les $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi$, lesquelles existent déjà dans C, sont respectées par les plongement de C dans son enveloppe. C'est un résultat nullement tautologique qu'il suffit pour cela d'ajouter à C des $\varinjlim$ *grandes devant* π d'objets de C, et que plus précisément, la catégorie enveloppe est réalisée par $\operatorname{Ind}_\pi C$ (ou, au choix et moins pléthoriquement, par $\operatorname{Ind}'_\pi C \subset C^\wedge$).

Démonstration. Le 1°) est contenu dans 4.4.13 a) et c). Prouvons donc 2°). Il est évident que α est un foncteur pleinement fidèle dont l'image essentielle engendre strictement $\mathcal{M} = \operatorname{Ind}_\pi C$, d'où résulte que le foncteur (4.4.16.2) est pleinement fidèle, étant induit par le foncteur pleinement fidèle p. 27

$$\alpha^*_{\mathcal{E}}\ :\ \underline{\mathrm{Hom}}(\mathcal{M}, \mathcal{E}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(C, \mathcal{E})$$

sur les sous-catégorie pleines envisagées. Il reste donc à montrer que (4.4.16.2) est essen-

25. Pourrait être incorporé en partie d) au théorème 4.4.13, car c'est un complément important, et pas tellement évident finalement. [page 103]

tiellement surjectif. Soit donc $f : C \longrightarrow \mathcal{E}$ dans $\underline{\mathrm{Hom}}_{!\,\pi}(C, \mathcal{E})$, considérons son extension canonique

$$\begin{cases} Lf \ : \ \mathrm{Ind}(C) \ \longrightarrow \ \mathcal{E} \\ Lf((X_i)_{i\in I}) \ = \ \varinjlim_{i\in I} f(X_i) \end{cases} \tag{4.4.16.3}$$

(cf. SGA 4 I 8.7.3), et soit

$$\psi(f) \ = \ Lf|\,\mathrm{Ind}_\pi(C)\ . \tag{4.4.16.4}$$

Rappelons que Lf commute aux petites $\varinjlim$ filtrantes, mais comme le foncteur d'inclusion

$$\mathrm{Ind}_\pi\, C \ \longrightarrow \ \mathrm{Ind}(C) \tag{4.4.16.5}$$

ne commute pas à ces $\varinjlim$, il n'est pas clair a priori que $\psi(f)$ commute auxdites limites, ni a fortiori qu'il commute aux petites $\varinjlim$ sans plus. Mais on a vu que (4.4.16.5) commute aux $\varinjlim$ *grandes devant* π, ce qui est contenu dans le corollaire 4.4.15 (vu que les limites inductives *filtrantes* dans $\mathrm{Ind}(C)$ sont les limites *dans* $C^\wedge$) : dire que $\mathrm{Ind}'_\pi(C) \longrightarrow \mathrm{Ind}'(C)$ commute à un certain type de $\varinjlim$ filtrantes, revient à dire qu'il en est ainsi du composé avec $\mathrm{Ind}'_\pi(C) \hookrightarrow C^\wedge$, ce qui est établi par 4.4.15. De ceci résulte que $\psi(f)$ *commute aux* $\varinjlim$ *grandes devant* π. Pour établir que $g = \psi(f)$ commute aux petites $\varinjlim$, il reste donc à voir qu'il commute aux $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi$, en vertu de 4.4.14.1 (marge page 98). Pour l'établir, on utilise le théorème 4.4.13 b, en représentant un foncteur $\varphi : J \longrightarrow \mathrm{Ind}_\pi(C)$ (où $\mathrm{card}\,\mathrm{Fl}J \leqslant \pi$) sous forme indicielle par [page 104]

$$\Phi \ : \ I \times J \ \longrightarrow \ C\ , \tag{4.4.16.6}$$

I étant un ensemble ordonné grand devant π. On a donc

$$\varphi(j) \ = \ \varinjlim_{i\in I} {}_{\mathrm{Ind}_\pi C}\, \Phi(i,j)\ ,$$

et comme $g = \psi(f)$ commute aux $\varinjlim$ de type I par ce qu'on a vu, on aura

$$g(\varphi(j)) \ = \ \varinjlim_{i\in I} {}_{(\mathcal{E})}\ g(\Phi(i,j))\ ,$$

d'où

$$\varinjlim_{j\in J} {}_{(\mathcal{E})}\, g(\varphi(j)) \ = \ \varinjlim_{j\in J}\ \varinjlim_{i\in I}\ \underbrace{g(\Phi(i,j))}_{=f(\Phi(i,j))} \qquad (\text{limites dans } \mathcal{E})\ . \tag{$*$}$$

p. 28

D'autre part, on a

$$\begin{aligned} \varinjlim_{j\in J} {}_{\mathrm{Ind}_\pi}\, \varphi(j) \ &\simeq \ \varinjlim_{j\in J}\ \varinjlim_{i\in I}\ \Phi(i,j) \\ &\simeq \ \varinjlim_{i\in I}\ \underbrace{\varinjlim_{j\in J}\ \Phi(i,j)}_{\substack{\text{peut être calculé}\\ \text{dans } C, \text{ soit}\\ \Psi(i)\,\in\,\mathrm{Ob}\,C}}\ , \end{aligned}$$

donc

$$\varinjlim_{j\in J} {}_{\mathrm{Ind}_\pi}\, \varphi(j) \simeq \varinjlim_{i\in I}\ \Psi(i)\ , \tag{$**$}$$

d'où en appliquant g, qui commute aux $\varinjlim$ de type I, et se rappelant maintenant que $g|C \simeq f$, [page 105]

$$g(\varinjlim_{J} {}_{\mathrm{Ind}_\pi C}\, \varphi(j)) \ \simeq \ \varinjlim_{i\in I}\ f(\Psi(i))\ . \tag{$***$}$$

On a d'autre part

$$\Psi(i) \overset{\text{déf}}{=} \varinjlim_{j\in J} \Phi(i,j)\,, \qquad\qquad \varinjlim \text{ dans } C\,,$$

et comme f commute aux $\varinjlim$ de type J (car $\operatorname{card}\operatorname{Fl}J \leqslant \pi$), on en conclut

$$f(\Psi(i)) \;\simeq\; \varinjlim_{j\in J} f(\Phi(i,j))\,,$$

donc par $(***)$

$$g(\varinjlim_{j\in J} \varphi(j)) \;\simeq\; \varinjlim_{i\in I} \varinjlim_{j\in J} f(\Phi(i,j))\,. \qquad (****)$$

En composant avec $(*)$ et utilisant à nouveau la commutativité de $\varinjlim_I$ à $\varinjlim_J$, on trouve donc

$$g(\varinjlim \varphi(j)) \;\xleftarrow{\sim}\; \varinjlim\, g(\varphi(j))\,,$$

ce qui prouve que g commute aux limites inductives de type J, et achève de prouver que g est [dans] $\underline{\mathrm{Hom}}_!(\mathrm{Ind}_\pi(C),\mathcal{E})$. Comme $g|C \simeq f$, on en conclut que le foncteur (4.4.16.2) est essentiellement surjectif, ce qui achève de prouver 4.4.16. De plus, on a construit un foncteur quasi-inverse explicite, ψ, s'insérant dans le diagramme commutatif

[page 106]

$$\begin{array}{ccccc}
\underline{\mathrm{Hom}}_{!\,\pi}(C,\mathcal{E}) & \xrightarrow[(\sim)]{\psi} & \underline{\mathrm{Hom}}_!(\mathrm{Ind}_\pi(C),\mathcal{E}) & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Hom}}_{!\,\pi}(\mathrm{Ind}_\pi(C),\mathcal{E}) \\
\big\downarrow{\scriptstyle \text{incl. pl. fid.}} & & \big\downarrow{\scriptstyle \text{pl. fid.}} & \nearrow{\scriptstyle R\ \text{(restriction)}} & \\
\underset{\text{(cf. SGA 4 I 8.7.3)}}{\underline{\mathrm{Hom}}(C,\mathcal{E})} & \xrightarrow[\sim]{L} & \underline{\mathrm{Hom}}_{!\,\mathrm{filt}}(\mathrm{Ind}(C),\mathcal{E}) & &
\end{array}\,.$$

(4.4.16.6)

4.5 Filtration cardinale canonique d'une catégorie $\mathfrak{U}$-paratopos

p. 29

Définition 4.5.1. On appelle *catégorie $\mathfrak{U}$-paratopos* une catégorie $\mathcal{M}$ $\mathfrak{U}$-pseudo-topos et accessible, i.e. qui satisfait aux conditions équivalentes du théorème 4.3.6 (p. 70). On dit que c'est une *catégorie π-$\mathfrak{U}$-paratopos*, si elle est π-accessible, i.e. si elle admet une petite sous-catégorie génératrice dont les objets soient π-accessible, ou ce qui revient au même, si $\mathcal{M}$ est équivalente à une catégorie de la forme $\mathrm{Ind}'_\pi(\mathcal{M}_\pi)$, où $\mathcal{M}_\pi$ est une petite catégorie (ou : une catégorie équivalente à une petite catégorie), et stable par $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi$. (Et on peut prendre pour $\mathcal{M}_\pi$ la sous-catégorie pleine de $\mathcal{M}$ formée des objets π-accessibles).

Dans la suite, nous allons, plus généralement, considérer une catégorie C équivalente à une petite catégorie, stable par $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi_0$ ([30]), et la catégorie [page 107]

$$\mathcal{M} \overset{\text{déf}}{=} \mathrm{Ind}'_{\pi_0} C \;\subset\; C^\wedge\,, \qquad (4.5.1)$$

où π_0 est un cardinal infini donné. Je me propose d'introduire sur $\mathcal{M}$ une filtration cardinale canonique :

Proposition 4.5.2 ([31]). *Soit $F \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M} \subset \mathrm{Ob}\,C^\wedge$, et soit π un cardinal $\geqslant \pi_1 = \sup(\pi_0, \operatorname{card}\operatorname{Fl}C_0)$, où C_0 est une petite sous-catégorie pleine de C telle que $C_0 \overset{\sim}{\hookrightarrow} C$. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

30. Il n'y a pas lieu de le supposer tout de suite.
31. N'est prouvé (et n'est vrai) que si $\pi^{\pi_0} = \pi$, voir rectification 4.5.6, page 116.

a) $\operatorname{card} \mathrm{Fl}(C_0/F) \leqslant \pi$.

a′) $\operatorname{card} \mathrm{Ob}\,(C_0/F) \leqslant \pi$.

a″) Pour tout x dans C_0, $\operatorname{card} F(x) \leqslant \pi$.

b) Il existe une petite catégorie filtrante I (pas nécessairement ordonnée), grande devant π_0, *avec* $\operatorname{card} I \leqslant \pi$, *et un système inductif $(x_i)_{i\in I}$ dans C, tel que l'on ait*

$$F \;\simeq\; \varinjlim_{i\in I} x_i \;, \tag{4.5.2.1}$$

où la $\varinjlim$ *est prise dans $\mathcal{M}$, ou ce qui revient au même (en vertu de 4.4.15, I étant grande devant π_0) dans $C^\wedge$, i.e. F est isomorphe au foncteur ind-représentable défini par l'ind-objet $\underline{x} = (x_i)_{i\in I}$ de C.*

c) F est π-accessible dans $\mathcal{M}$.

c′) F est π-accessible dans $C^\wedge$.

Démonstration. On a les implications ± tautologiques [page 108]

$$\begin{array}{ccccc} & & \mathrm{a}' & \Longrightarrow & \mathrm{a}'' \\ \mathrm{a} & \Longrightarrow & & & \\ & & \mathrm{b} & \Longrightarrow & \mathrm{c}' \Longrightarrow \mathrm{c}\;, \end{array} \tag{$*$}$$

où $\mathrm{a}' \Longrightarrow \mathrm{a}''$ provient de l'inclusion canonique $F(x) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(x, F) \hookrightarrow \mathrm{Ob}\, C/F$, $\mathrm{a} \Longrightarrow$ b s'obtient en prenant $I = C_0/F$ et notant que I est stable par limites inductives de cardinal $\leqslant \pi_0$ (C l'étant), donc est grande devant π_0 ([32]). On a $\mathrm{b} \Longrightarrow \mathrm{c}'$ en vertu du fait que la sous-catégorie strictement pleine $C^\wedge_\pi$ de $C^\wedge$ définie par p. 30

$$\left\{ \begin{array}{lcl} C^\wedge_\pi & = & \text{sous-catégorie strictement pleine de } C^\wedge \text{ formée des} \\ & & F \in \mathcal{M} \text{ qui sont } \pi\text{-accessibles.} \end{array} \right. \tag{4.5.2.2}$$

est stable par $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi$ (SGA 4 I 9.9). Enfin $\mathrm{c}' \Longrightarrow \mathrm{c}$ provient du fait que le foncteur d'inclusion $\mathcal{M} \hookrightarrow C^\wedge$ est pleinement fidèle et π_0-accessible, i.e. commute aux limites inductives grandes devant π_0, et a fortiori à celles grandes devant π. Par les implications du diagramme ci-dessus, il suffit donc de prouver qu'on a

$$\mathrm{c} \overset{(33)}{\Longrightarrow} a \qquad \text{et} \qquad \mathrm{a}'' \;\Longrightarrow\; \mathrm{a}\;.$$

Prouvons $\mathrm{a}'' \Longrightarrow \mathrm{a}$. Considérons l'application [page 109]

$$\mathrm{Fl}\, C/F \;\longrightarrow\; \mathrm{Fl}\, C \tag{$*$}$$

induit par le foncteur étale $C' = C/F \longrightarrow C$, alors l'ensemble des flèches au-dessus d'une flèche $\alpha : x \longrightarrow y$ de C est en correspondance biunivoque avec $\mathrm{Ob}\, C'_y = F(y)$, puisqu'une telle flèche α' est connue quand on connaît son but, qui est un objet quelconque de $F(y)$ ($C' \longrightarrow C$ étant étale, i.e. fibrant à fibres discrètes). Donc le fibre de $(*)$ en α est de cardinal $= \operatorname{card} F(y) \leqslant \pi$, donc on a

$$\operatorname{card} \mathrm{Fl}\, C/F \;\leqslant\; \pi \underbrace{\operatorname{card} \mathrm{Fl}\, C}_{\leqslant \pi_1} \;\leqslant\; \pi\, \underbrace{\pi_1}_{\leqslant \pi} \;\leqslant\; \pi^2 = \pi\;,$$

32. On n'a pas besoin de cette stabilité, de toutes façons C_0/F est grande devant π_0, en vertu de 4.4.3, p. 80.

33. n'est prouvé (et n'est vrai) que si $\pi^{\pi_0} = \pi$.

ce qui prouve a.

Prouvons enfin c $\Longrightarrow$ a. Pour ceci, nous allons utiliser la première inclusion $\mathcal{M}_\pi \subset \mathrm{Filt}^\pi \mathcal{M}$ de SGA 4 I 9.16, qui s'applique dès lors que nous prouvons le

Corollaire 4.5.3 ([34]). *Sous les conditions de 4.5.2, soit, pour tout cardinal $\pi \geqslant \pi_1$, $\mathrm{Filt}^\pi(\mathcal{M})$ la sous-catégorie strictement pleine de $\mathcal{M}$ formée des $F \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$ qui satisfont la condition a) de 4.5.2. Alors la famille des $(\mathrm{Filt}^\pi)_{\pi \geqslant \pi_1}$ est une filtration cardinale de $\mathcal{M}$.* [page 110]

La condition a) de loc. cit. 9.12 (les $\underline{\mathrm{Filt}}^\pi$ sont équivalentes à des petites catégories) est évidente. Prouvons b), i.e. la stabilité de $\underline{\mathrm{Filt}}^\pi$ par $\varinjlim$ filtrantes $F = \varinjlim F_i$ *grandes devant* π_0, de cardinal $\leqslant \pi$. Comme $\mathcal{M} \hookrightarrow C^\wedge$ commute à ces limites, pour x dans C

$$F(x) \;=\; \varinjlim_i F_i(x)\ ,$$

d'où $\mathrm{card}\,F(x) \leqslant \mathrm{card}\,\mathrm{Ob}\,I \cdot \pi \leqslant \pi \cdot \pi = \pi$, ce qui (par l'équivalence a $\Longleftrightarrow$ a$''$) implique $F \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{Filt}^\pi$. Prouvons la condition c) de loc. cit. Pour ceci, nous aurons besoin du fait, plus précis que le b), qu'on vient d'établir : p. 31

Corollaire 4.5.4 ([35]). *Pour tout $\pi \geqslant \pi_1$, Filt^π est stable par $\varinjlim$ (dans $\mathcal{M}$) de cardinal $\leqslant \pi$ (pas nécessairement filtrantes, a fortiori pas nécessairement grandes devant π_0).*

Il suffit, en vertu de ce qui est déjà prouvé de du lemme 4.4.14 ([36]), de montrer que Filt^π est stable par $\varinjlim$ *de cardinal* $\leqslant \pi_0$. Si $\varphi : J \longrightarrow \mathrm{Filt}^\pi$ est un foncteur avec $\mathrm{card}\,J \leqslant \pi_0$, on le met sous forme indicielle

$$\psi \;:\; I \times J \;\longrightarrow\; C\ ,$$

grâce à 4.14.3.b, avec I grande devant π_0.

Je rappelle qu'on pouvait prendre [page 111]

$$I \;=\; \underline{\mathrm{Hom}}(J, C)/\varphi\ ,$$

où $\underline{\mathrm{Hom}}(J,C) \hookrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(J, \mathcal{M} = \mathrm{Ind}'_\pi C)$, quitte à ne pas exiger que I soit ordonnée. On a envie de prouver que $\mathrm{card}\,\mathrm{Fl}\,I \leqslant \pi$. L'ennui, c'est qu'on arrive seulement à la majoration

$$\mathrm{card}\,\mathrm{Fl}\,I \;\leqslant\; \pi^{\pi_0}\ .$$

(Même si J est discrète, on n'a pas mieux, puisqu'alors

$$I \;\simeq\; \prod_{j \in J} C/\varphi(j)\ , \qquad \text{d'où} \quad \mathrm{Fl}\,I = \prod_{j \in J} \mathrm{Fl}\,C/\varphi(j)\ ,$$

et si $\mathrm{card}\,\mathrm{Fl}\,C/\varphi(j) = \pi$ pour tout j, on trouve $\mathrm{card}\,\mathrm{Fl}\,I = \pi^{\pi_0}$ – il n'y a pas moyen de faire mieux !)

Donc je n'arrive pas à prouver directement 4.5.4, ce qui m'aurait arrangé pour prouver la condition c) de loc. cit. Mais à vrai dire, on a fait ici le travail de la démonstration du théorème 4.3.6, partie b $\Longrightarrow$ c – on y a déjà prouvé que la filtration qu'on vient de construire (par la condition a) de 4.5.2) est une filtration cardinale. La condition c) de SGA 4 I 9.12 est prouvée à la page 76. Mais je vais refaire la démonstration plus sérieusement. [page 112]

34. Pas prouvé, la condition c) des filtrations cardinales peut-être pas satisfaite. Sans doute *faux* en général.

35. Prouvé seulement si $\pi^{\pi_0} = \pi$! Sans doute *faux* en général.

36. Il faut une variante du lemme 4.4.14, pour les $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi'$, qui se prouve de la même façon.

Soit donc $F \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$, considérons

$$J \;=\; C/F \;,$$

c'est une catégorie stable par $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi_0$, donc grande devant π_0, et on a

$$F \;\simeq\; \varinjlim_{j\in J} x_j \qquad (\varinjlim \text{ dans } \mathcal{M})$$

en désignant par $j \longmapsto x_j$ le foncteur canonique $C/F \longrightarrow C$. Soit alors I l'ensemble des sous-catégories J' de J qui sont *de cardinal* $\leqslant \pi$ *et grandes devant* π_0, I ordonné par inclusion, et pour tout $J' \in I$, posons p. 32

$$X_{J'} \;=\; \varinjlim_{j\in J'} x_j \;.$$

Comme J' est grande devant π_0, la limite inductive dans $\mathcal{M}$ est aussi une limite dans $C^\wedge$, d'où résulte aussitôt, comme $\mathrm{card}\,\mathrm{Ob}\,J' \leqslant \mathrm{card}\,\mathrm{Fl}\,J' \leqslant \pi$, que $X_{J'}$ est dans Filt^π. Alors

$$J' \;\longmapsto\; X_{J'} \;\in\; \mathrm{Ob}\,\mathrm{Filt}^\pi$$

est un foncteur

$$I \;\longrightarrow\; \mathrm{Filt}^\pi \;,$$

dont la limite inductive est celle des x_j, donc isomorphe à F. D'autre part, il est immédiat que I est grand devant π, i.e. que si $(J'_\alpha)_{\alpha\in A}$ est une famille d'éléments de I, celle-ci est [page 113] majorée par un $J' \in I$. Ceci résulte du

Lemme 4.5.5 ([37]). *Soient π, π_0, avec $\pi > \pi_0$, des cardinaux infinis, et soit J une catégorie grande devant π_0. Alors pour toute partie Φ de $\mathrm{Fl}\,J$, telle que $\mathrm{card}\,\Phi \leqslant \pi$, il existe une sous-catégorie J' de J* grande devant π_0, *telle que $\mathrm{card}\,J' \leqslant \pi$ ([38]), et $\mathrm{Fl}\,J' \supset \Phi$.*

Ce lemme étant admis, on a donc représenté un objet quelconque F de $\mathcal{M}$ comme une $\varinjlim_{i\in I} X_i$, avec I ensemble ordonné grand devant π, les X_i dans Filt^π. Il reste à prouver que si $\pi' > \pi$ et $F \in \mathrm{Filt}^{\pi'}$, alors on peut prendre I tel que $\mathrm{card}\,I \leqslant \pi'^\pi$. Mais $F \in \mathrm{Filt}^{\pi'}$ signifie que $J = C/F$ satisfait $\mathrm{card}\,\mathrm{Fl}\,J \leqslant \pi'$. Alors l'ensemble des parties de cardinal $\leqslant \pi$ de $\mathrm{Fl}\,J$ a un cardinal majoré par π'^π, a fortiori $\mathrm{card}\,I \leqslant \pi'^\pi$, ce qui achève de prouver que $(\mathrm{Filt}^\pi)_{\pi\geqslant\pi_1}$ est une filtration cardinale sur $\mathcal{M}$.

Pour prouver le lemme, on commence par saturer Φ par composition finie, on trouve [page 114] une sous-catégorie J'_0 de J telle que $\mathrm{card}\,\mathrm{Fl}\,J'_0 \leqslant \pi_0$ … Mais je m'aperçois que pour prouver le lemme, j'ai encore besoin de $\pi^{\pi_0} = \pi$ – une enveloppe de J' grande devant π_0 va avoir un cardinal majoré (au mieux) par π^{π_0}.

Prenons p.ex.

$$J \;=\; \mathfrak{P}(S) \qquad \text{(ensemble ordonné)}$$

avec $\mathrm{card}\,S = \pi > \pi_0$, donc J est grand devant π_0. Considérons l'application

$$S \;\longrightarrow\; J = \mathfrak{P}(S) \;, \qquad s \longmapsto \{s\} \;,$$

et prenons pour $\Phi \subset \mathrm{Fl}\,J$ l'ensemble des $\mathrm{id}_{\{s\}}$. Donc on cherche une partie J' de J, contenant S, et grande devant π_0 pour l'ordre induit par J. On voit tout de suite que la plus petite partie J' faisant l'affaire est l'ensemble $\mathfrak{P}_{\pi_0}(S)$ des parties de S de cardinal $\leqslant \pi_0$. Mais on trouve

$$\mathrm{card}\,J' \cdot \pi_0! \;=\; \pi^{\pi_0} \;,$$

p. 33
[page 115]

où

$$\begin{aligned} \pi_0! &= \operatorname{card} \operatorname{Aut}(E_0) \qquad (E_0 \text{ ensemble de cardinal } \pi_0) \\ &= \pi_0^{\pi_0} \\ &= 2^{\pi_0} , \end{aligned}$$

donc

$$\operatorname{card} J' \cdot 2^{\pi_0} = \pi^{\pi_0} . \qquad (*)$$

D'autre part, il est immédiat que $\operatorname{card} J' \geqslant \operatorname{card} \mathfrak{P}(E_0) = 2^{\pi_0}$ (où E_0 est une partie de S de cardinal π_0), donc le premier membre de $(*)$ est égal à $\operatorname{card} J'$, donc on trouve

$$\operatorname{card} J' = \pi^{\pi_0} ,$$

sorry !

Finalement, je me suis convaincu que la proposition 4.5.2, et les corollaires et lemmes précédents par lesquels j'ai essayé de l'établir, n'est vrai que pour ces cardinaux $\pi > \pi_0$ tels que

$$\pi^{\pi_0} = \pi ,$$

ce qui, moyennant l'hypothèse du continu généralisée, équivaut à

$$\pi^{\pi_0} < 2^{\pi} \ (= \pi^{\pi})$$

(ou encore à $\pi^{\pi_0} \neq 2^{\pi}$ $(= \pi^{\pi})$). Je vais donner ici un énoncé rectifié. [page 116]

Proposition 4.5.6.

(1°) *Sous les hypothèses générales de 4.5.2 sur C, π_0, π_1, π, les conditions a, a′, a″, b, c′ de cette proposition sont équivalentes (moyennant $\pi \geqslant \pi_1$) ([39]), et impliquent la condition c (F est π-accessible). Quand $\pi^{\pi_0} = \pi$ (notamment quand $\pi = 2^c$, avec $c \geqslant \pi_0$), alors toutes les conditions a à c′ de 4.5.2 sont équivalentes.*

(2°) *Plus généralement et plus précisément, pour $\pi \geqslant \pi_1$ donné, considérons les conditions sur π :*

1) $\pi^{\pi_0} = \pi$.

2) $\operatorname{Filt}^{\pi}(\mathcal{M})$ (définie dans 4.5.3) est stable par $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi$.

3) $\forall$ F dans $\mathcal{M}$, on a $F \simeq \varinjlim_{I} X_i$, avec I ensemble ordonné grand devant π, les X_i dans $\operatorname{Filt}^{\pi}(\mathcal{M})$. De plus, si $\pi' > \pi$ et $F \in \operatorname{Filt}^{\pi'}(\mathcal{M})$, on peut prendre I de cardinal $\leqslant \pi'^{\pi}$.

4) Comme 3), sans la majoration de cardinaux, et en supposant seulement I catégorie grande devant π (pas nécessairement catégorie ordonné).

5) La condition c) de 4.5.2 implique les autres conditions (elles sont équivalentes, par 1°), en d'autres termes

$$\mathcal{M}_{\pi} \subset \operatorname{Filt}^{\pi} \qquad (\text{donc } \mathcal{M}_{\pi} = \operatorname{Filt}^{\pi} , \text{ puisqu'on sait que } \operatorname{Filt}^{\pi} \subset \mathcal{M}_{\pi}) ,$$

où $\mathcal{M}_{\pi}$ désigne la sous-catégorie strictement pleine de $\mathcal{M}$ formée des objets π-accessibles. p. 34 [page 117]

37. N'est prouvé *que* si $\pi^{\pi_0} = \pi$! Sans doute faux en général.

38. C'est OK si on exige seulement $\operatorname{card} J' \leqslant \pi^{\pi_0}$.

39. **N.B.** Pour cette équivalence, l'hypothèse que C soit stable par $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi$ est inutile, et aussi pour que c′) implique c), et lui soit équivalente si $\pi = \pi^{\pi_0} \geqslant \pi_1$, cf. 4.7.1, p. 161.

Ceci posé, on a les implications

$$1) \implies 2) \implies 3) \implies 4) \implies 5) ,$$

et dans le cas particulier où $\mathcal{M} = (\mathrm{Ens})$, $C =$ *sous-catégorie pleine formée des ensembles de cardinal* $\leqslant \pi_0$, *on a aussi* $5) \implies 1)$, *i.e. toutes ces conditions sont équivalentes.*

Démonstration.

$1) \implies 2)$. Cf. démonstration de 4.5.4.

$2) \implies 3)$. La catégorie $J = \mathrm{Filt}^\pi / F$ est stable par $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi$, Filt^π l'étant, donc J est grande devant π, d'ailleurs $F = \varinjlim_{j \in J} X_j$, où $j \longmapsto X_j$ est le foncteur source $\mathrm{Filt}^\pi / F \longrightarrow \mathrm{Filt}^\pi$. D'où la représentation voulue de F, quitte à remplacer J par un ensemble ordonné cofinal I, p.ex. en prenant pour I l'ensemble des sous-catégories J de I telles que $\operatorname{card} \mathrm{Fl}\, J \leqslant \pi$ `[cette deuxième partie de la phrase "p.ex. ..." demande correction]`. La majoration $\operatorname{card} I \leqslant \pi'^{\pi}$, pour $F \in \mathrm{Ob}\, \mathrm{Filt}^{\pi'}$, se fait par AQT `[âne qui trotte]`.

L'implication $3) \implies 4)$ est tautologique.

$4) \implies 5)$ ([40]), car si $F \in \mathrm{Ob}\, \mathcal{M}_\pi$, on trouve par 4) que F est facteur direct d'un objet de Filt^π, et Filt^π étant stable par $\varinjlim$ grandes devant π_0, cela implique que Filt^π est stable par facteurs directs, d'où $F \in \mathrm{Ob}\, \mathrm{Filt}^\pi$. `[page 118]`

Enfin, si $\mathcal{M} = \mathrm{Ens}$, $C = \mathrm{Ens}(\pi_0)$. On note que

$$\mathrm{Filt}^\pi \;=\; \{\; X \in \mathrm{Ob}\, \mathrm{Ens} \mid \operatorname{card} (X)^{\pi_0} \;\leqslant\; \pi \;\} .$$

D'autre part, on trouve facilement

$$\begin{aligned} (\mathrm{Ens})_\pi \quad &\overset{\text{déf}}{=} \quad \text{sous-catégorie pleine de (Ens) formée} \\ &\qquad\quad \text{des objets } \pi\text{-accessibles} \\ &= \quad \{X \in \mathrm{Ob}\, \mathrm{Ens} \mid \operatorname{card} X \leqslant \pi\} . \end{aligned}$$

Donc on a $(\mathrm{Ens})_\pi \subset \mathrm{Filt}^\pi$ si et seulement si $\pi^{\pi_0} \leqslant \pi$, i.e. $\pi^{\pi_0} = \pi$, q.e.d. ([41]).

Corollaire 4.5.7. *Pour tout cardinal* $\pi \geqslant \pi_1$, *on a*

$$\mathrm{Filt}^\pi \;\subset\; \mathcal{M}_\pi \;\subset\; \mathrm{Filt}^{\pi^{\pi_0}} \quad . \tag{4.5.7.1}$$

L'inclusion $\mathrm{Filt}^\pi \subset \mathcal{M}_\pi$ est l'implication a $\implies$ c de la partie 1°) de 4.5.6. Pour prouver $\mathcal{M}_\pi \subset \mathrm{Filt}^{\pi^{\pi_0}}$, on pose $\pi' = \pi^{\pi_0}$ et on note que $\pi'^{\pi_0} = \pi^{\pi_0 \cdot \pi_0} = \pi^{\pi_0} = \pi'$. Donc on peut appliquer 1° à π' au lieu de π, et on trouve que $\mathcal{M}_{\pi'} = \mathrm{Filt}^{\pi'}$. Comme $\mathcal{M}_\pi \subset \mathcal{M}_{\pi'}$, on en conclut $\mathcal{M}_\pi \subset \mathrm{Filt}^{\pi'}$, q.e.d. p. 35

J'ai oublié de démontrer le 1°) dans 4.5.6. Vu le diagramme d'implications $(*)$, p. 108, et l'implication $\mathrm{a}'' \implies$ a déjà prouvé (p. 109), il reste à prouver seulement `[page 119]`

$$\mathrm{c}' \implies \mathrm{a}'' ,$$

i.e. que F π-accessible *dans* $C^\wedge$ implique $\operatorname{card} F(x) \leqslant \pi \;\forall\; x \in C$. Ceci va résulter du résultat un peu plus général :

Lemme 4.5.8.

1°) Dans la catégorie $\mathcal{E} = (\mathrm{Ens})$, *les objets* π*-accessibles* (π *un cardinal infini) sont les ensembles* X *tels que* $\operatorname{card} X \leqslant \pi$.

40. comparer le lemme 4.5.14, page 133.

41. Cf. démonstration de la partie 1°) de 4.5.6, plus bas (bas de page et page suivante).

2°) ([42]). *Soit C une catégorie équivalente à une petite catégorie, telle que $\forall\ x, y \in \mathrm{Ob}\, C$, on ait* $\mathrm{card}\,\mathrm{Hom}(x,y) \leqslant \pi$. *Soit $\mathcal{E}$ une $\mathfrak{U}$-catégorie stable par $\varinjlim$ grandes devant π, et faiblement π-accessible (i.e. admettant une sous-catégorie génératrice formée d'objets π-accessibles), et stable par produits de cardinal $\leqslant \pi$. Alors pour qu'un objet F de $\underline{\mathrm{Hom}}(C, \mathcal{E})$ soit π-accessible, il* faut *que $\forall\ x \in \mathrm{Ob}\, C$, $F(x)$ soit un objet π-accessible de $\mathcal{E}$, et cette condition est aussi suffisante si* $\mathrm{card}\,\mathrm{réd}\,\mathrm{Fl}(C) \leqslant \pi$ ([43]).

Démonstration. 1°) $\mathrm{card}\, X \leqslant \pi \Longrightarrow X$ π-accessible dans $\mathcal{E} = (\mathrm{Ens})$, car $X = \coprod_{x \in X} \{x\}$, et on applique SGA 4 I 9.9. Inversement, supposons X π-accessible, et écrivons $X \simeq \varinjlim_{i \in I} X_i$, où I est l'ensemble des parties de X qui sont de cardinal $\leqslant \pi$. Comme I est grande devant π, l'application identique $X \xrightarrow{\mathrm{id}} X$ se factorise par un ensemble X_i, donc $X_i = X$, donc $\mathrm{card}\, X = \mathrm{card}\, X_i \leqslant \pi$, q.e.d.

2°) Considérons, pour $x \in \mathrm{Ob}\, C$, le foncteur [page 120]

$$e \xrightarrow{\varepsilon_x} C\ ,$$

d'où un foncteur

$$\varepsilon_x^*\ :\ \underline{\mathrm{Hom}}(C, \mathcal{E}) \longrightarrow \mathcal{E}\ , \qquad F \longmapsto F(x)\ ,$$

admettant un adjoint à droite

$$\varepsilon_{x\,*}\ :\ \mathcal{E}\ \longrightarrow\ \underline{\mathrm{Hom}}(C, \mathcal{E})\ ,$$

donné par

$$\varepsilon_{x\,*}(E)(y)\ =\ E^{\mathrm{Hom}(x,y)}$$

(sous réserve d'existence des produits de cardinal $\leqslant \pi$). Ce foncteur $\varepsilon_{x\,*}$ est π-accessible en vertu de loc. cit. 9.8.

Ceci posé, soit F un objet π-accessible de $\underline{\mathrm{Hom}}(C, \mathcal{E})$, on voit que $\varepsilon_x^*(F)$ est π-accessible, ε_x^* ayant un adjoint à droite π-accessible :

$$E\ \longmapsto\ \mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(\underbrace{F(x)}_{\varepsilon_x^*(F)}, E)\ \simeq\ \mathrm{Hom}_{\underline{\mathrm{Hom}}(C,\mathcal{E})}(F, \varepsilon_{x\,*}(E))$$

est composé du foncteur π-accessible $\varepsilon_{x\,*}$, et du foncteur covariant π-accessible représenté par F dans $\underline{\mathrm{Hom}}(C, \mathcal{E})$. p. 36

Inversement, si les $F(x)$ sont π-accessibles, prouvons que F l'est, moyennant $\mathrm{card}\,\mathrm{Fl}(C) \leqslant \pi$. Se fait par AQT `[âne qui trotte]`, je ne vais pas l'expliciter ici.

[page 121]

Proposition 4.5.9. *Soit C une catégorie équivalente à une petite catégorie, et soit $\mathcal{M} = \mathrm{Ind}'_{\pi_0}(C)$, π_0 un cardinal infini donné. On suppose C stable par $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi_0$. Pour tout cardinal $\pi \geqslant \pi_0$, soit $\mathcal{M}_\pi \supset C$ la sous-catégorie pleine de $\mathcal{M}$ formée des objets π-accessibles de $\mathcal{M}$. Soit d'autre part $\pi_1 = \sup(\pi_0, \mathrm{card}\,\mathrm{Fl}\, C)$. Alors $(\mathcal{M}_\pi)_{\pi \geqslant \pi_1}$ est une filtration cardinale de $\mathcal{M}$ ([44]), et de plus, pour $\pi \geqslant \pi_0$, $\mathcal{M}_\pi$ est stable dans $\mathcal{M}$ par $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi$.*

Démonstration. La stabilité de $\mathcal{M}_\pi$ est un rappel, cf. SGA 4 I 9.9. Comme on a

$$\mathcal{M}_\pi\ \subset\ \mathrm{Filt}^{\pi^{\pi_0}}$$

42. Cf. généralisation 4.14.18, p. 391 b) et c).

43. même *sans* condition de stabilité de $\mathcal{E}$ par produits de cardinal $\leqslant \pi$.

44. **N.B.** Toutes les conditions des filtrations cardinales sont vérifiées à l'exclusion, quand $\pi \geqslant \pi_0$, de celle de la majoration de cardinaux $\mathrm{card}\, I \leqslant \pi'^{\pi}$ condition c).

pour $\pi \geqslant \pi_1$ (cf. 4.5.7), on voit donc que les $\mathcal{M}_\pi$ sont équivalentes à des petites catégories (condition a) des filtrations cardinales). La condition b) des filtrations cardinales est contenue dans la propriété de stabilité des $\mathcal{M}_\pi$ qu'on vient de rappeler. Prouvons enfin la condition c). Soit donc $\pi \geqslant \pi_0$, et soit x dans $\mathcal{M}$, considérons la catégorie

$$I \;=\; \mathcal{M}_\pi/x \;,$$

elle est stable par $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi$, d'après la stabilité similaire de $\mathcal{M}_\pi$, donc I est grande devant π et équivalente à une petite catégorie, d'autre part, on a [page 122]

$$x \;=\; \varinjlim_{i\in I} x_i \;,$$

les x_i dans $\mathcal{M}_\pi$ ($\varinjlim$ dans $\mathcal{M}$ des foncteurs $I = \mathcal{M}_\pi/x \longrightarrow \mathcal{M}_\pi$). Quitte à remplacer I par une catégorie ordonnée cofinale, cela prouve la partie qualitative de c. Supposons enfin $x \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}_{\pi'}$, où $\pi' > \pi$, montrons que l'on a alors

$$\mathrm{card}\, I_0,\ \mathrm{card}\, I' \;\leqslant\; \pi'^{\pi} \qquad ([45],[46]) \;, \tag{4.5.9.1}$$

ce qui achèvera de prouver que l'on a une filtration cardinale. Il nous faut une majoration des cardinaux.

Lemme 4.5.10 ([47]). *Soit π un cardinal $\geqslant \pi_1$. Alors on a*

$$\mathrm{card}\,\mathrm{Fl}((\mathrm{Filt}^\pi)_0) \;\leqslant\; 2^\pi \;. \tag{4.5.10.1}$$

On a en effet, en désignant par $C^\wedge(\pi)$ la sous-catégorie strictement pleine de $C^\wedge$ formée des $F : C^\circ \longrightarrow \mathrm{Ens}$ avec $\mathrm{card}\, F(x) \leqslant \pi$ pour tout x dans C (i.e. F se factorise par $\mathrm{Ens}(\pi)$), et par $C^\wedge(\pi)_0$ une sous-catégorie réduite exhaustive, p. 37 [page 123]

$$\mathrm{card}\, C^\wedge(\pi)_0 \;\leqslant\; 2^\pi \;, \tag{4.5.10.2}$$

d'où résulte (4.5.10.1), puisque pour $\pi \geqslant \pi'$, Filt^π est une sous-catégorie pleine de $C^\wedge(\pi')$. Pour établir (4.5.10.2), on note que l'ensemble des classes à isomorphie près de $\mathrm{Ens}(\pi')$ s'identifie à l'ensemble des cardinaux $\leqslant \pi'$, lequel ensemble est de cardinal $\leqslant \pi'$. Remplaçant $\mathrm{Ens}(\pi)$ par $\mathrm{Ens}(\pi')_0$, C par C_0, on doit majorer $\mathrm{card}\,\mathrm{Fl}(\underline{\mathrm{Hom}}(C_0, \mathrm{Ens}(\pi')_0))$. Or $\mathrm{Ob}\,\underline{\mathrm{Hom}}(C_0, \mathrm{Ens}(\pi')_0)$ est contenu dans l'ensemble des applications de $\mathrm{Fl}\, C_0$ dans $\mathrm{Fl}(\mathrm{Ens}(\pi')_0)$, le premier est majoré par π_1, le deuxième par $\pi^\pi \times \pi \times \pi = \pi^{2\pi} = \pi^\pi = 2^\pi$ (**N.B.** $\pi < 2^\pi$, d'où $\pi^\pi \leqslant (2^\pi)^\pi = 2^{\pi^2} = 2^\pi$), donc $\mathrm{Ob}\,\underline{\mathrm{Hom}}$ majoré par $(2^\pi)^{\pi_1} = 2^{\pi\pi_1} = 2^\pi$. D'autre part, si F, G sont dans $\underline{\mathrm{Hom}}(C_0, \mathrm{Ens}(\pi_0))$, $\mathrm{Hom}(F, G)$ est majoré par $(\pi^\pi)^{\pi_1} = \pi^\pi = 2^\pi$, donc $\mathrm{Fl}\,\underline{\mathrm{Hom}}$ est majoré par $2^\pi \times 2^\pi \times 2^\pi$, q.e.d.

Corollaire 4.5.11. *Soit $F \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{Filt}^\pi$, $F' \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{Filt}^{\pi'}$, avec $\pi' \geqslant \pi \geqslant \pi_1$. Alors*

$$\mathrm{card}\,\mathrm{Hom}(F, F') \;\leqslant\; \pi'^{\pi} \;. \tag{4.5.11.1}$$

C'est essentiellement la même démonstration, légèrement plus simple. (On aurait dû commencer par là.) [page 124]

Corollaire 4.5.12. *Si $\pi' \geqslant \pi \geqslant \pi_1$, on a pour $x \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}_{\pi'}$*

$$\mathrm{card}\,(\mathcal{M}_\pi/x)_0 \;\leqslant\; \pi'^{(\pi^{\pi_0})} \;. \tag{4.5.12}$$

45. où I_0, I'_0 sont des sous-catégories réduites de I, I' telles que $I_0 \hookrightarrow I$, $I'_0 \hookrightarrow I'$ soient des équivalences [Grothendieck a biffé l'indice 0 de I' dans 4.5.9.1].

46. On ne le prouve que si $\pi \geqslant \pi_1$.

47. Donner énonce commun avec 4.5.11, et prouver d'abord 4.5.11.

En effet,

$$\operatorname{card}\operatorname{Ob}(\mathcal{M}_\pi/x)_0 \overset{\text{par 4.5.11}}{\leqslant} \underbrace{\underbrace{\operatorname{card}\operatorname{Ob}(\mathcal{M}_\pi)_0}_{\leqslant 2^{(\pi^{\pi_0})}\text{par 4.5.10}} \times (\pi'^{\pi_0})^{\pi^{\pi_0}}}_{=\pi'^{(\pi^{\pi_0})}} ,$$

i.e.

$$\operatorname{card}\operatorname{Ob}(\mathcal{M}_\pi/x)_0 \leqslant \pi'^{(\pi^{\pi_0})} ,$$

d'où

$$\operatorname{card}\operatorname{Fl}(\mathcal{M}_\pi/x)_0 \leqslant \pi'^{(\pi^{\pi_0})} \times \pi'^{(\pi^{\pi_0})} \times (\pi'^{\pi_0})^{(\pi^{\pi_0})} \leqslant \pi'^{(\pi^{\pi_0})} .$$

Cela donne donc (revenant à 4.5.9.1)

$$\operatorname{card} I_0 \leqslant \pi'^{(\pi^{\pi_0})} .$$

D'autre part, I' peut se définir en termes de I_0 comme l'ensemble des sous-catégories de I_0 qui sont de cardinal $\leqslant \pi$, donc leur nombre est majoré par $(\operatorname{card} I_0)^\pi \leqslant (\pi'^{\pi^{\pi_0}})^\pi = \pi'^{\pi\pi^{\pi_0}} = \pi'^{(\pi^{\pi_0})}$.

Mais ce n'est pas tout à fait la majoration exigée, puisque

$$\pi'^{\pi} \leqslant \pi'^{(\pi^{\pi_0})} \qquad ([48]),$$

et qu'il est possible, a priori, que l'inégalité soit stricte ! Apparemment, les "majorations"

$$\mathcal{M}_\pi \subset \operatorname{Filt}^{\pi^{\pi_0}} , \qquad \mathcal{M}_{\pi'} \subset \operatorname{Filt}^{\pi'^{\pi_0}}$$

p. 38
[page 125]

sont trop grossières. Aussi il s'agit de mieux appréhender les catégories $\mathcal{M}_\pi$, pour $\pi \geqslant \pi_0$ ([49]). Je vais hasarder une

Proposition 4.5.13. *Les hypothèses et notations sont celles de 4.5.9. Soit π un cardinal $\geqslant \pi_0$, et soit $x \in \operatorname{Ob}\mathcal{M}$. Considérons les conditions :*

a) Il existe une catégorie I, avec $\operatorname{card}\operatorname{Fl} I \leqslant \pi$, *et un foncteur $i \longmapsto x_i : I \longrightarrow C$, tel que x soit isomorphe à $\varinjlim x_i$.*

a′) Comme a), avec I filtrante.

a″) Comme a), avec I ordonnée filtrante.

b) Il existe un foncteur cofinal $I \longrightarrow C/x$, *avec* $\operatorname{card}\operatorname{Fl} I \leqslant \pi$.

b′) La catégorie filtrante C/x est "essentiellement de cardinal $\leqslant \pi$", i.e. il existe une catégorie ordonnée `[non, cf. b″)]` filtrante I, $\operatorname{card}\operatorname{Fl} I \leqslant \pi$, *et un foncteur cofinal $I \longrightarrow C/x$.*

b″) Comme b′), avec de plus I ordonnée.

c) Il existe une famille de flèches $(u_\alpha)_{\alpha\in A}$, $x_\alpha \longrightarrow x$, épimorphique stricte, indexée par un ensemble A tel que $\operatorname{card} A \leqslant \pi$.

d) On a $x \in \operatorname{Ob}\mathcal{M}_\pi$, i.e. x est π-accessible dans $\mathcal{M}$.


Ceci posé :

[page 126]

48. **N.B.** On a égalité si on a $\pi' = 2^{c'}$ avec $c' \geqslant \pi^{\pi_0}$, soit $\pi = 2^c$ avec $c \geqslant \pi_0$.

49. Mais on peut utiliser 4.5.10, 4.5.11 pour conclure que pour $x \in \operatorname{Ob}\mathcal{M}_{\pi'} \subset \operatorname{Ob}\operatorname{Filt}^{\pi'^{\pi_0}}$, on a $\operatorname{card}\operatorname{Fl}(C_0/x) \leqslant (\pi'^{\pi_0})^{\pi_0} = \pi'^{\pi_0}$, on aura donc $x = \varinjlim_J x_j$ ($x_j \in \operatorname{Ob} C$, $\varinjlim$ filtrante, $\operatorname{card}\operatorname{Fl} J \leqslant \pi'^{\pi_0}$), et en introduisant l'ensemble I des sous-catégories $J' \subset J$ qui sont de cardinal $\leqslant \pi$, et posant $x_{J'} = \varinjlim_{j\in J'} x_j$, on trouve $x = \varinjlim_{J'\in I} x_{J'}$, où cette fois I est un *ensemble ordonné* grand devant π, les $x_{J'} \in \mathcal{M}_\pi$, et $\operatorname{card} I \leqslant (\operatorname{card} J)^\pi \leqslant (\pi'^{\pi_0})^\pi = \pi'^{\pi\pi_0} = \pi'^{\pi}$, c'est la bonne majoration !

(1°) *Les six premières conditions a, a′, a″, b, b′, b″ sont équivalentes, soit $P(\pi)$, et impliquent les deux dernières,*



Si $\pi \geqslant \pi_1$, alors $P(\pi)$ est équivalente à c.

(2°) *Soit* $\mathrm{Filt}'^{\pi} \subset \mathcal{M}$ *la sous-catégorie strictement pleine de $\mathcal{M}$ formée des objets qui satisfont la condition $P(\pi)$ ci-dessus, et* Filt^{π} *la sous-catégorie strictement pleine définie dans 4.5.3 (p. 109). On a alors*

$$\mathrm{Filt}^{\pi} \ \subset \ \mathrm{Filt}'^{\pi} \ \subset \ \mathcal{M}_{\pi} \ , \tag{4.5.13.1}$$

et pour qu'on ait égalité des trois membres, il suffit qu'on ait $\pi^{\pi_0} = \pi$. (Cf. prop. 4.5.6, page 116). De plus, Filt'^{π} *est stable dans $\mathcal{M}$ par* sommes *de cardinal $\leqslant \pi$.*

(3°) *Les conditions suivantes sur C, π_0, π sont équivalentes.*

1) Filt'^{π} *est stable dans $\mathcal{M}$ par $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi$.* p. 39

1′) Filt'^{π} *est stable par conoyaux de double-flèches.*

2) Tout objet x de $\mathcal{M}$ est de la forme $\varinjlim_{I} x_i$, où x_i dans Filt'^{π}*, I grande devant π.*

3) La condition d) de 1°) implique $P(\pi)$ (donc lui est équivalente), i.e. on a

$$\mathcal{M}_{\pi} \ = \ \mathrm{Filt}'^{\pi} \, .$$

Ces conditions sont satisfaites dans les trois cas suivants : [page 127]

A) $\pi^{\pi_0} = \pi$ (pour mémoire, c'est contenu dans 2°).

B) Les familles épimorphiques strictes dans $\mathcal{M}$ sont épimorphiques strictes universelles.

C) Les limites inductives filtrantes dans $\mathcal{M}$ commutent au changement de base (ce qui est le cas notamment si les $\varinjlim$ filtrantes sont exactes à gauche) ([50]).

Remarque. La filtration de $\mathcal{M}$ pour les Filt'^{π} n'est autre que celle envisagée dans SGA 4 I 9.13, où on fait de plus l'hypothèse B) sur $\mathcal{M}$, qui après-coup n'était plus tellement de mon goût. Toujours est-il que d'après (4.5.13.1), cette filtration se rapproche plus de la "bonne" filtration par les $\mathcal{M}_{\pi}$, que celle que j'avais eu encore naguère tendance à lui préférer, celle par les Filt^{π}. Elle a d'ailleurs sur cette dernière l'avantage, dans le cas envisagé B), d'être une filtration cardinale (ce qui n'est pas nécessairement le cas pour Filt^{π}, du moins s'il existe des cardinaux infinis $\pi \geqslant \pi_0$ avec $\pi^{\pi_0} \neq \pi$). Je soupçonne maintenant qu'en général (et s'il existe des cardinaux infinis $\pi > \pi_0$ tels que $\pi^{\pi_0} \neq \pi$), en dehors des conditions A) B) C), la filtration par les (Filt'^{π}) n'est *pas* une filtration cardinale. En tous cas, 4.5.6 et la présente proposition, 3°, montrent que si soit $(\mathrm{Filt}^{\pi})_{\pi \geqslant \pi_2}$, soit $(\mathrm{Filt}'^{\pi})_{\pi \geqslant \pi_2}$ est une filtration cardinale (π_2 étant un cardinal donné $\geqslant \pi_1$), alors elle coïncide avec la filtration par les $\mathcal{M}_{\pi}$. Donc apparemment, dans tous les cas où je sais construire une filtration cardinale, sur un paratopos du moins (i.e. sur une catégorie $\mathcal{M}$ stable par petites $\varinjlim$, et dont tous les objets sont accessibles – l'existence d'une filtration cardinale impliquant de plus celle d'une petite sous-catégorie strictement [page 128]

50. Je suppose que cette condition revient à la même condition sur C, pour les $\varinjlim$ filtrantes de cardinal $\leqslant \pi$.

génératrice …), celle-ci n'est autre que celle par les $\mathcal{M}_\pi$ – chose dont je ne m'étais par aperçu en rédigeant SGA 4 I 9.

Démonstration de 4.5.13.

Prouvons 1°. On a les implications tautologiques

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{b}'' & \Longrightarrow & \mathrm{b}' & \Longrightarrow & \mathrm{b} \\ \Downarrow & & \Downarrow & & \Downarrow \\ \mathrm{a}'' & \Longrightarrow & \mathrm{a}' & \Longrightarrow & \mathrm{a}\ , \end{array} \qquad ([51])\ ,$$

et pour prouver l'équivalence de ces six conditions, il suffit de prouver

$$\mathrm{a} \implies \mathrm{b}''\ .$$

Si on a

$$x \simeq \varinjlim_I x_i\ , \qquad \operatorname{card} \mathrm{Fl}\, I \leqslant \pi\ ,$$

p. 40
[page 129]

soit I' l'ensemble des *sous-diagrammes* $J \subset I$ finis de I, ordonné par inclusion, donc I' est un ensemble ordonné filtrant, et du fait que C est stable par $\varinjlim$ finies, on trouve un foncteur

$$J \longmapsto x_J = \varinjlim_{i \in J} x_i \ :\ I' \longrightarrow C\ ,$$

et on aura

$$x \simeq \varinjlim_{J \in I'} x_J\ .$$

D'autre part, on a

$$\begin{aligned} \operatorname{card} I' &= \operatorname{card} \mathfrak{P}_f(\ \underbrace{\mathrm{Fl}(I)}_{\text{de card} \leqslant \pi}\ ) \\ &\leqslant \pi + \pi^2 + \ \cdots\ + \pi^n + \ \ldots \\ &\leqslant \pi \aleph_0 = \pi\ , \end{aligned}$$

q.e.d. Pour établir 1°, il reste à établir

$$\begin{array}{ccc} & P(\pi) & \\ \swarrow & & \searrow \\ \mathrm{c} & & \mathrm{d}\ , \end{array}$$

et l'implication inverse $\mathrm{c} \Longrightarrow P(\pi)$ quand $\pi \geqslant \pi_1$. Mais $P(\pi) \Longrightarrow \mathrm{c}$ est une tautologie, et $P(\pi) \Longrightarrow \mathrm{d}$ puisque $\mathcal{M}_\pi$ est stable par $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi$. Reste à prouver que $\mathrm{c} \Longrightarrow P(\pi)$ si $\pi \geqslant \pi_1$.

Supposons donc qu'on ait une famille épimorphique stricte

$$x_\alpha \longrightarrow x \qquad (\alpha \in A,\ \operatorname{card} A \leqslant \pi)\ ,$$

[page 130]

cela signifie donc que x est limite inductive d'un système inductif indexé par la catégorie B ayant comme ensemble d'objets $A \amalg (A \times A)$, les flèches non identiques étant représentées par les flèches canoniques


$$\begin{array}{ccccc} & & x_\alpha \times_x x_\beta & & \\ & \swarrow^{p_{\alpha,\beta}} & & \searrow^{q_{\alpha,\beta}} & \\ x_\alpha & & & & x_\beta\ . \end{array}$$

51. compte tenu que C est strictement génératrice dans $\mathcal{M}$, donc $x \simeq \varinjlim_{i \in C/x} x_i$.

(**N.B.** B n'est par une catégorie ordonnée, car pour l'objet (α, α), représenté par $x_\alpha \times_x x_\alpha$, il y a *deux* flèches dans l'objet α, représenté par x_α. Mais on a évidemment $\operatorname{card} \mathrm{Fl}(B) \leqslant \pi$.) Si on savait que C est stable par produits binaires et par passage à des sous-objets (ici les $x_\alpha \times_x x_\beta \subset x_\alpha \times x_\beta$), on aurait prouvé la condition a). À défaut, utilisons encore le fait que C est génératrice par épimorphismes (même stricts) et choisissons pour tout couple (α, β) un ensemble épimorphique de flèches :

$$\underbrace{x_{\alpha,\beta,\gamma}}_{\in \mathrm{Ob}\, C_0} \xrightarrow{u_{\alpha,\beta,\gamma}} x_\alpha \times_x x_\beta \ ,$$

où C_0 est une sous-catégorie réduite exhaustive de C. La flèche $u_{\alpha,\beta,\gamma}$ est connue quand on connaît les composés p. 41
[page 131]



donc pour $x_{\alpha,\beta,\gamma} \in \mathrm{Ob}\, C_0$ fixé, les choix possibles pour $u_{\alpha,\beta,\gamma}$ sont de cardinal majoré par $\pi_1 \pi_1 = \pi_1$, de plus on a $\operatorname{card} \mathrm{Ob}\, C_0 \leqslant \pi_1$, donc le nombre total des flèches $v_{\alpha,\beta,\gamma}$, $w_{\alpha,\beta,\gamma}$ (pour α, β fixés) est majoré par $\pi_1 \cdot \pi_1 = \pi_1$. Donc le nombre total des flèches $u_{\alpha,\beta,\gamma}$, pour α, β, γ variables, est majoré par $\pi \cdot \pi_1 = \pi$ (si $\pi \geqslant \pi_1$). Donc x est représenté par une catégorie I ayant comme objets l'ensemble somme de A et de l'ensemble des indices triples α, β, γ, et pour chaque tel indice, exactement deux flèches $v_{\alpha,\beta,\gamma}$, $w_{\alpha,\beta,\gamma}$ non identiques de source cet objet, et allant respectivement dans x_α, x_β. On a donc $\operatorname{card} \mathrm{Fl}\, I \leqslant \pi$, et on a un foncteur $I \longrightarrow C$, $\alpha \longmapsto x_\alpha$, $(\alpha, \beta, \gamma) \longmapsto x_{\alpha,\beta,\gamma}$, tel que $x = \varinjlim_{i \in I} x_i$. Cela achève la démonstration de 1°).

Prouvons 2°. La première inclusion (4.5.13.1) est tautologique, la deuxième ne fait qu'exprimer $P(\pi) \Longrightarrow$ d. Le fait que $\pi^{\pi_0} = \pi$ implique l'égalité des membres extrêmes [page 132] est un rappel de 4.5.6. Reste à prouver que Filt'^{π} est stable dans $\mathcal{M}$ par sommes de cardinal $\leqslant \pi$. Mais si $(x_\alpha)_{\alpha \in A}$ est une famille d'objets de Filt'^{π}, avec $\operatorname{card} A \leqslant \pi$, et si $x = \coprod_{\alpha \in A} x_\alpha$, prenant pour tout x_α un foncteur $\varphi_\alpha : I_\alpha \longrightarrow C$, avec $\operatorname{card} \mathrm{Fl}\, I_\alpha \leqslant \pi$, tel que x_α soit la $\varinjlim$ dans $\mathcal{M}$ de ce foncteur, on trouve que x est $\varinjlim$ du foncteur $\varphi : I \longrightarrow C$ défini par les φ_α, où $I = \coprod_\alpha I_\alpha$ (somme dans Cat). Il est évident que $\operatorname{card} \mathrm{Fl}(I) \leqslant \pi \cdot \pi = \pi$, ce qui achève de prouver 2°.

Prouvons 3°. On a les implications tautologiques $1 \Longrightarrow 1'$, et $1' \Longrightarrow 1$, puisque Filt'^{π} est stable par sommes de cardinal $\leqslant \pi$. Donc $1 \Longleftrightarrow 1'$, et implique que pour tout x dans $\mathcal{M}$, $I = \mathrm{Filt}'^{\pi}/x$ est stable par $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi$, donc est grand devant π. Comme $x \simeq \varinjlim_{i \in I} x_i$, cela prouve que $1 \Longrightarrow 2$. L'implication $2 \Longrightarrow 3$ est standard, et résulte de [page 133]
$\mathrm{Filt}'^{\pi} \subset \mathcal{M}_\pi$, je vais expliciter dans un

Lemme 4.5.14. *Soient $\mathcal{M}$ une catégorie stable par petites $\varinjlim$, π un cardinal infini, $\mathcal{M}_0$ une sous-catégorie strictement pleine de $\mathcal{M}$. Considérons les conditions*

a) $\mathcal{M}_0$ est une sous-catégorie strictement génératrice, et stable dans $\mathcal{M}$ par $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi$.

b) Pour tout objet de $\mathcal{M}$, on a un isomorphisme

$$x \simeq \varinjlim_{i \in I} x_i \ ,$$

les x_i dans $\mathcal{M}_0$, I grande devant π. p. 42

b′) Comme b), avec I catégorie ordonnée.

c) $\mathcal{M}_\pi \subset \mathcal{M}_0$ (où $\mathcal{M}_\pi$ est la sous-catégorie strictement pleine de $\mathcal{M}$ formée des objets π-accessibles).

On a donc les implications

$$a \implies b \iff b' \implies c\ ,$$

et si on suppose $\mathcal{M}_0 \subset \mathcal{M}_\pi$, et $\mathcal{M}_\pi$ sous-catégorie strictement génératrice de $\mathcal{M}$, alors les quatre conditions a, b, b′, c sont équivalentes, et équivalent à $\mathcal{M}_0 = \mathcal{M}_\pi$ ([52]).

[page 134] Enfin (revenant à la démonstration de 4.5.13, 3°), l'implication 3) $\implies$ 1) provient du fait que $\mathcal{M}_\pi$ est stable par $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi$.

Reste à prouver que ces conditions, i.e. la stabilité de Filt'^{π} par conoyaux de double-flèches, est satisfaite dans les cas A) B) C), le cas A) étant d'ailleurs déjà connu. Le cas B) résulte immédiatement de la transitivité des familles épimorphiques strictes universelles, et c'est d'ailleurs aussi contenu explicitement (stabilité de Filt'^{π} par $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi$) dans SGA 4 I 9.13 (sinon dans l'énoncé, du moins c'est signalé dans la démonstration). En rédigeant SGA 4 I 9, je savais donc qu'on a $\mathcal{M}_\pi \subset \mathrm{Filt}'^{\pi}$ pour tout π, mais l'inclusion, plus évidente pourtant dans le cas d'espèce, $\mathrm{Filt}'^{\pi} \subset \mathcal{M}_\pi$ (quand on suppose les objets de C π_1-accessibles) m'avait apparemment échappé ?

Reste à traiter le cas C). (J'ai l'impression qu'il est un peu plus général que le cas B), i.e. que la condition B) sur $\mathcal{M}$ implique C), mais non inversement. Ainsi, la condition C) est vérifiée dès que $\mathcal{M}$ correspond à une espèce de structure algébrique définie en termes de $\varprojlim$ *finies*, i.e. quand $\mathcal{M}$ est de la forme $\mathrm{Ind}(C)$, C stable par $\varinjlim$ *finies*, [page 135] alors que je doute que la condition B) soit toujours satisfaite pour ces catégories. Par exemple dans la catégorie Cat (qui est un paratopos de cette espèce), les $\varinjlim$ filtrantes sont exactes à gauche, mais je ne crois pas que les familles épimorphiques stricts soient universelles. Prenons p.ex. deux homomorphismes de groupes $G_0 \xrightarrow{u_0} G$, $G_1 \xrightarrow{u_1} G$ tels que $G_0 * G_1 \longrightarrow G$ soit surjectif, alors cette famille à deux éléments est épimorphique stricte dans Gr et dans Cat ([53]), mais n'est pas forcément épimorphique stricte universelle, même si p.ex. $G_0 = G_1 = H$, $G = H \times H$, et u_0, u_1 sont des injections $H \rightrightarrows H \times H$, données par $u_0(h) = (h, 1)$, et $u_1(h) = (1, h)$. Si je prends l'application diagonale $H \longrightarrow H \times H$, les images inverses de u_0, u_1 sont le même objet de $\mathcal{M}/H$, savoir $e \longrightarrow H$, et cette famille n'est épimorphique stricte que si H est le groupe unité.)

Le cas C) va résulter du résultat plus précis :

Corollaire 4.5.15. *Sous les conditions générales de 4.5.13, supposons que dans $\mathcal{M}$ les $\varinjlim$* filtrantes *commutent au changement de base (p.ex. les $\varinjlim$ filtrantes sont exactes).* [page 136] *Alors pour tout $\pi \geqslant \pi_1$, Filt'^{π} est formée des $x \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$ satisfaisant la condition suivante.*

p. 43

c′) Il existe une famille de flèches $(u_\alpha)_{\alpha \in A}$, $u_\alpha : x_\alpha \longrightarrow x$, dans $\mathcal{M}$, qui est épimorphique stricte universelle *(i.e. couvrante pour la topologie canonique de $\mathcal{M}$), avec $x_\alpha \in \mathrm{Ob}\,C\ \forall\ \alpha \in A$, et $\mathrm{card}\,A \leqslant \pi$.*

Démonstration : il faut prouver que cette condition équivaut à la condition c) de 4.5.13 1°). Comme on a c′ $\implies$ c trivialement, il reste à montrer que c $\implies$ c′. Mais on a vu dans 4.5.13 1°) que c implique a″, i.e. qu'on a un isomorphisme

$$x \ = \ \varinjlim_{i \in I} x_i\ ,$$

52. cf. démonstration de proposition 4.5.6, 4 $\implies$ 5, page 117.

53. !, c'est *faux* en général, mais vrai dans le cas particulier plus bas.

les x_i dans C, et I ensemble *ordonné filtrant*, avec $\operatorname{card} I \leqslant \pi$. Il reste à voir que si x dans $\mathcal{M}$ est une limite inductive *filtrante* d'objets x_i, alors l'ensemble des flèches $x_i \longrightarrow x$ est épimorphique stricte *universelle.* Or cela est immédiat, car pour $x' \longrightarrow x$, on a $x' = \varinjlim_i x'_i$ (par hypothèse C), où $x'_i = x' \times_x x_i$, donc la famille $x'_i \longrightarrow x'$ est épimorphique stricte, q.e.d.

Prouvons maintenant que dans le cas C, la condition de 3°, 1 est satisfaite, i.e. que Filt'^{π} est stable par $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi$. Cela résulte aussitôt du [page 137]

Corollaire 4.5.16. (de 4.5.15). *Sous les conditions de 4.5.15 (i.e. la condition C) de 4.5.13, 3°), soit x un objet de $\mathcal{M}$, et supposons qu'il existe une famille* épimorphique universelle *$(x_\alpha \longrightarrow x)_{\alpha\in A}$ de flèches de $\mathcal{M}$, avec $x_\alpha \in \operatorname{Ob}\mathrm{Filt}'^{\pi}$ pour tout $\alpha \in A$, et $\operatorname{card} A \leqslant \pi$. Alors $x \in \operatorname{Ob}\mathrm{Filt}'^{\pi}$.*

En effet, l'hypothèse sur x_α équivaut, en vertu de 4.5.15, à l'existence d'une famille épimorphique stricte universelle de flèches $(x_{\alpha\beta} \longrightarrow x_\alpha)_{\beta\in B_\alpha}$, avec $\operatorname{card} B_\alpha \leqslant \pi$ et les $x_{\alpha\beta}$ dans C. Soit $B = \coprod_{\alpha\in A} B_\alpha$, on a alors $\operatorname{card} B \leqslant \pi^2 = \pi$, et d'autre part, la famille des flèches composées $x_{\alpha\beta} \longrightarrow x_\alpha \longrightarrow x$ indexée par B est épimorphique stricte universelle (par transitivité de ce type de familles), donc $x \in \operatorname{Ob}\mathrm{Filt}'^{\pi}$, q.e.d.

Avec tout ça, on n'a toujours pas donné de caractérisation de $\mathcal{M}_\pi$ lui-même, qui est meilleure que Filt^{π} et Filt'^{π} du point de vue catégorique, car seuls les $\mathcal{M}_\pi$ définissent une filtration cardinale, et de plus ils ont les propriétés de stabilité désirables dans ce contexte, [page 138] pour les $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi$. Le seul critère non tautologique que j'arrive à dégager dans le cas général (pour tout $\pi \geqslant \pi_0$, et sans hypothèse d'exactitude supplémentaire sur $\mathcal{M}$) est le suivant, beaucoup moins "explicite" ou "calculatoire" que les critères très concrets pour Filt^{π} et pour Filt'^{π} :

Proposition 4.5.17. *Soit π un cardinal $\geqslant \pi_0$. Alors $\mathcal{M}_\pi$ est égal à la plus petite sous-catégorie strictement pleine de $\mathcal{M}$, contenant C, et stable par $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi$.* (Il est important de noter qu'il *ne suffit pas* de dire : stable par $\varinjlim_I$, avec *I grande devant* π_0, et $\operatorname{card} I \leqslant \pi$. On trouve alors Filt^{π}, qui risque d'être une catégorie strictement plus petite que $\mathcal{M}_\pi$. Ce n'est pas non plus la catégorie des $\varinjlim_I x_i$, avec $x_i \in C\ \forall\ i \in \operatorname{Ob} I$, et $\operatorname{card}\mathrm{Fl}\, I \leqslant \pi$ – puisque cette catégorie-là est Filt'^{π}.)

Démonstration. Soit $\mathcal{M}'$ la catégorie de l'énoncé, on a donc $\mathcal{M}' \subset \mathcal{M}_\pi$, puisque $\mathcal{M}_\pi$ contient C et est stable par les $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi$. Inversement, le lemme 4.5.14, a $\Longrightarrow$ c.

p. 44

[page 139]

4.6 Caractérisation des catégories paratopos (démonstration de 4.3.6)

Il est temps de revenir à la démonstration du théorème 4.3.6 (p. 70-71), celle que j'avais donnée étant incomplète (et erronée – j'affirmais que $(\mathrm{Filt}^{\pi})_{\pi\geqslant\pi_0}$ est une filtration cardinale, ce qui est faux si on n'admet que $\pi^{\pi_0} = \pi$ pour tout $\pi \geqslant \pi_1$).

On avait vu l'équivalence des conditions a, a′, b, soit PTA. Je vais achever la démonstration par le schéma logique

$$\text{PTA} \implies \text{d)} \implies \text{c)} \implies \text{PTA}\ . \qquad (*)$$

Prouvons PTA $\Longrightarrow$ d), i.e. que si $\mathcal{M}$ est un pseudo-topos accessible, alors existe un cardinal infini π_0, et une petite catégorie C_0 stable par $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi_0$, et une équivalence de catégories

$$\mathcal{M} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ind}'_{\pi_0}(C_0)\ . \qquad (4.6.1)$$

Plus précisément, on a ceci :

Proposition 4.6.1. *Soit $\mathcal{M}$ un paratopos, i.e. une $\mathfrak{U}$-catégorie $\mathcal{M}$ stable par petites $\varinjlim$, admettant une sous-catégorie pleine génératrice S équivalent à une petite catégorie, formée d'objets accessibles de $\mathcal{M}$. Soit π_0 un cardinal tel que les objets de S soient π_0-accessibles (i.e. $S \subset \mathcal{M}_{\pi_0}$), et soit C la plus petite sous-catégorie strictement pleine de $\mathcal{M}$, contenant S et stable par $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi_0$. Alors*

1°) C est équivalente à une petite catégorie.

2°) $C = \mathcal{M}_{\pi_0}$, sous-catégorie strictement pleine de $\mathcal{M}$ formée des objets π_0-accessibles. [page 140]

3°) Le foncteur canonique

$$\mathrm{Ind}'_{\pi_0}(C) \xrightarrow[\sim]{[\varphi]} \mathcal{M}$$

(défini à isomorphisme unique près par la condition que son composé avec l'inclusion $C \hookrightarrow \mathrm{Ind}'_{\pi_0}(C)$ soit isomorphe à l'inclusion $C \longrightarrow \mathcal{M}$, et que φ commute aux petites $\varinjlim$, ou encore aux $\varinjlim$ filtrantes grandes devant π_0 – cf. 4.4.16, page 101) est une équivalence de catégories ([54]).

Démonstration. 1°) On va construire C par induction transfinie, en posant

$$\begin{aligned} C_0 &= \text{sous-catégorie strictement pleine de } \mathcal{M} \text{ engendrée par } S. \\ C_{\alpha+1} &= \text{sous-catégorie strictement pleine de } \mathcal{M} \text{ engendrée par les } \varinjlim_{I} \text{ dans} \\ &\quad \mathcal{M} \text{ d'objets de } C_\alpha, \text{ avec } I \text{ catégorie telle que } \operatorname{card}\mathrm{Fl}\, I \leqslant \pi_0. \\ C_\alpha &= \textstyle\bigcup_{\alpha'<\alpha} C_{\alpha'} \quad \text{si } \alpha \text{ est un ordinal limite.} \end{aligned}$$

Cela définit de façon unique les C_α (pour tout petit cardinal α). Par la définition de C, on voit par induction transfinie que les C_α sont contenues dans C. Soit α_0 le premier ordinal tel que $\operatorname{card}\alpha_0 > \pi_0$, donc l'ensemble I_{α_0} des cardinaux $\alpha < \alpha_0$ est grand devant π_0. Je dis qu'on a $C_{\alpha_0} = C$. Pour ceci, il suffit de voir que C_{α_0} est stable par $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi$. Mais si I est une catégorie telle que $\operatorname{card}\mathrm{Fl}\, I \leqslant \pi_0$, et $\varphi : I \longrightarrow C_{\alpha_0} = \bigcup_{\alpha<\alpha_0} C_\alpha$ un foncteur, alors la définition de α_0 implique que φ se factorise en $\varphi_\alpha : I \longrightarrow C_\alpha$, avec $\alpha < \alpha_0$ ([55]). Donc $\varinjlim \varphi \in \mathrm{Ob}\, C_{\alpha+1} \subset \mathrm{Ob}\, C_{\alpha_0}$, ce qui montre la stabilité requise. p. 45 [page 141]

Pour voir que C est équivalente à une petite catégorie, il suffit de le voir pour les C_α, en procédant par induction transfinie. Cela résulte du lemme suivant, immédiat :

Lemme 4.6.1.1.

1°) La limite inductive C d'un système inductive filtrant $(C_i)_{i\in I}$ de catégories C_i équivalentes à des petites catégories est équivalente à une petite catégorie. Si $\operatorname{card}\mathrm{réd}(C_i) \leqslant \pi$ pour tout i, et $\operatorname{card} I \leqslant \pi$, alors $\operatorname{card}\mathrm{réd}(C) \leqslant \pi$ (π étant un cardinal infini). Ici, pour toute catégorie $\mathcal{A}$, je pose $\operatorname{card}\mathcal{A} = \operatorname{card}\mathrm{Fl}\,\mathcal{A}$, $\operatorname{card}\mathrm{réd}(\mathcal{A}) = \operatorname{card}(\mathcal{A}_0)$, où $\mathcal{A}_0$ est une catégorie réduite équivalente à $\mathcal{A}$. [page 142]

2°) Soit $C_0 \subset \mathcal{M}$ une sous-catégorie pleine d'une catégorie $\mathcal{M}$, π_0 un cardinal infini, et soit C'_0 la sous-catégorie strictement pleine de $\mathcal{M}$ engendrée par les limites inductives dans $\mathcal{M}$ (représentables dans $\mathcal{M}$) de foncteurs $I \longrightarrow C_0$, avec I catégorie telle que $\operatorname{card} I \leqslant \pi_0$. Si C_0 est équivalente à une petite catégorie, il en est de même de C'_0. Plus précisément, si $\operatorname{card}\mathrm{réd}(C_0) \leqslant \pi_1$, π_1 un cardinal infini, alors $\operatorname{card}\mathrm{réd}(C'_0) \leqslant \pi_1^{\pi_0}$ ([56]).

54. donc on a aussi $\mathrm{Ind}'_{\pi_0}(C_0) \xrightarrow{\sim} \mathcal{M}$, où C_0 est une *petite* catégorie équivalente à C.

55. Un peu court. Il faut invoquer le fait que I_{α_0} est grande devant π_0.

56. Cette majoration n'est par prouvée et probablement fausse si on ne fait pas des hypothèses un peu plus strictes.

Corollaire 4.6.1.2. *$\mathcal{M}$ et C_0 étant comme dans 2°) ci-dessus, soit C la plus petite sous-catégorie strictement pleine de $\mathcal{M}$ contenant C_0, et stable par $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi_0$ (celles qui sont représentables dans $\mathcal{M}$). Si C_0 est équivalente à une petite catégorie, il en est de même de C. Plus précisément, si* $\operatorname{card}\operatorname{réd}(C_0) \leqslant \pi_1$, *où π_1 est un cardinal infini, alors*

on a $\operatorname{card}\operatorname{réd}(C) \leqslant \pi_1^{\pi_0}$ ([57]). [page 143]

Le 3°) se prouve par la démonstration transfinie précédente, on prouve par récurrence transfinie que

$$\operatorname{card}\operatorname{réd} C_\alpha \ \leqslant\ \pi_1^{\pi_0}$$

pour tout α. C'est OK pour $\alpha = 0$ par hypothèse (puisque $\pi_1 \leqslant \pi_1^{\pi_0}$). Si c'est vrai pour C_α, alors 2°) assure que

$$\operatorname{card}\operatorname{réd} C_\alpha \ \leqslant\ (\pi_1^{\pi_0})^{\pi_0} \ =\ \pi_1^{\pi_0\cdot\pi_0} \ =\ \pi_1^{\pi_0}\ ,$$

enfin, si α est un ordinal limite $< \alpha_0$, on aura $C_\alpha = \bigcup_{\alpha'<\alpha} C_{\alpha'}$, donc

$$\operatorname{card}\operatorname{réd} C_\alpha \ \longrightarrow\ \pi_0 \cdot \pi_1^{\pi_0} \ =\ \pi_1^{\pi_0}$$

(vu que $\pi_1^{\pi_0} \geqslant \pi_0$), en vertu du 1° ci-dessus, et compte tenu du fait que $\operatorname{card} I_\alpha \leqslant \pi_0$. Soit π_0' le cardinal successeur de π_0, alors la même majoration nous donne

$$\operatorname{card}\operatorname{réd} C_{\alpha_0} \ \leqslant\ \pi_0'\pi_1^{\pi_0}\ .$$

Mais on a $\pi_1^{\pi_0} \geqslant 2^{\pi_0} > \pi_0$, donc $\pi_1^{\pi_0} \geqslant \pi_0'$, donc $\pi_1^{\pi_0} \geqslant \pi_0'$, donc $\pi_0'\pi_1^{\pi_0} = \pi_1^{\pi_0}$, d'où p. 46

$$\operatorname{card}\operatorname{réd} C_{\alpha_0} \ \leqslant\ \pi_1^{\pi_0}\ ,$$

ce qui est la majoration annoncée.

Prouvons 4.6.1 2°, i.e. $C = \mathcal{M}_{\pi_0}$. On a $C \subset \mathcal{M}_{\pi_0}$, puisque par hypothèse $S \subset \mathcal{M}_{\pi_0}$, et on sait que $\mathcal{M}_{\pi_0}$ est stable par $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi_0$. D'autre part, on a $\mathcal{M}_{\pi_0} \subset C$, en vertu de 4.5.19 a $\Longrightarrow$ c appliqué à C, qui est strictement génératrice dans $\mathcal{M}$, S l'étant, et $C \supset S$, et stable par $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi_0$ par construction. [page 144]

Prouvons enfin 3°. Cela équivaut à ceci :

Lemme 4.6.1.3. *Soit $\mathcal{M}$ une $\mathfrak{U}$-catégorie stable par* petites $\varinjlim$ *, π_0 un cardinal, $\mathcal{M}_0$ une sous-catégorie de $\mathcal{M}$* strictement génératrice, *stable par $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi_0$, et formée d'objets π_0-accessibles. (En vertu de 4.6.1 2° déjà prouvée, appliqué à $S = \mathcal{M}_0$, si $\mathcal{M}_0$ est strictement pleine, on a donc $\mathcal{M}_0 = \mathcal{M}_{\pi_0}$.) Alors le foncteur canonique*

$$\operatorname{Ind}'_{\pi_0}(\mathcal{M}_0) \ \longrightarrow\ \mathcal{M}$$

est une équivalence de catégories.

Le fait que ce facteur est pleinement fidèle résulte aussitôt de l'hypothèse que les objets de $\mathcal{M}_0$ soient π_0-accessibles :

$$\begin{aligned}\operatorname{Hom}_{\mathcal{M}}(\varinjlim_{i\in I} \underbrace{X_i}_{\in\mathcal{M}_0},\ \varinjlim_{j\in J} \underbrace{Y_j}_{\in\mathcal{M}_0}\ ) \ &\simeq\ \varprojlim_{i\in I} \underbrace{\operatorname{Hom}_{\mathcal{M}}(X_i,\ \varinjlim_{j\in J} Y_j)}_{\varinjlim_{j\in J}\operatorname{Hom}(X_i,Y_j)} \\ &\simeq\ \underline{\operatorname{Hom}}_{\operatorname{Ind}_{\pi_0}(\mathcal{M})}((X_i),(Y_j))\ .\end{aligned}$$

[page 145]

57. majoration non prouvée, probablement fausse, cf. annotation ci-dessus.

Reste à voir que ce foncteur est essentiellement surjectif. Comme $\mathcal{M}_0$ est strictement génératrice, il s'ensuit que tout $x \in \mathcal{M}$ s'écrit

$$x \;=\; \varinjlim_{i\in I} x_i \;,$$

où $I = \mathcal{M}_0/x$, et les $x_i \in \mathcal{M}_0$. L'hypothèse que $\mathcal{M}_0$ est stable par $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi_0$ implique la même propriété pour $I = \mathcal{M}_0/x$, donc I est grande devant π_0. Donc $(x_i)_{i\in I}$ définit un objet de $\mathrm{Ind}_{\pi_0}\mathcal{M}_0$, dont l'image dans $\mathcal{M}$ est isomorphe à x, q.e.d. (Comparer SGA 4 I 9.18.)

Corollaire 4.6.2. *Sous les conditions de 4.6.1, prenons pour* π_0 le plus petit *cardinal tel que les objets de* S *soient* π_0*-accessibles. Pour tout* $\pi \geqslant \pi_0$*, soit* $\mathcal{M}_\pi$ *la sous-catégorie strictement pleine de* $\mathcal{M}$ *formée des objets* π*-accessibles, qui est aussi (par 4.6.1 2°) l'enveloppe de* C *dans* $\mathcal{M}$ *stable par* $\varinjlim$ *de cardinal* $\leqslant \pi$*.*

1°) Soit $\pi_1 = \operatorname{card}\operatorname{réd} S$*. On a alors*

$$\operatorname{card}\operatorname{réd}\mathcal{M}_\pi \;\leqslant\; \pi_1^\pi \qquad (= 2^\pi \text{ si } \pi \geqslant \pi_0). \tag{4.6.2.1}$$

p. 47
[page 146]

2°) $(\mathcal{M}_\pi)_{\pi\geqslant\pi_1}$ *est une filtration cardinale de* $\mathcal{M}$*, où* $\pi_1 = \sup(\pi_0, \operatorname{card} S)$*.*

Démonstration. La majoration (4.6.2.1) est contenue dans 4.6.1.2, où π_0 est devenu π. Si $\pi \geqslant \pi_1$, on a

$$\pi_1^\pi \;=\; 2^\pi \tag{$*$}$$

car on a $\pi_1 \geqslant 2$, d'où $\pi_1^\pi \geqslant 2^\pi$, d'autre part, on a $\pi_1 \leqslant 2^{\pi_1}$, d'où $\pi_1^\pi \leqslant (2^{\pi_1})^\pi = 2^{\pi_1\pi} = 2^\pi$, puisque $\pi_1\pi = \pi$ pour $\pi \geqslant \pi_1$; d'où $(*)$.

L'assertion 2° est mise pour mémoire ; en vertu de $\mathcal{M} \simeq \mathrm{Ind}'_{\pi_0}\mathcal{M}_{\pi_0}$, on peut supposer que l'on a $\mathcal{M} = \mathrm{Ind}'_{\pi_0}(\mathcal{M}_{\pi_0})$, et on peut alors appliquer 4.5.9. On aurait d'ailleurs envie de dire que $(\mathcal{M}_\pi)_{\pi\geqslant\pi_0}$ est une filtration cardinale, sans se borner aux $\pi \geqslant \pi_1$. C'est vrai sauf pour la majoration de cardinaux dans la condition c) de la définition des filtrations cardinales (SGA 4 I 9.12) :

$$\underbrace{x}_{\in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}_{\pi'}} \;=\; \varinjlim_{i\in I} \underbrace{x_i}_{\in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}_\pi} \;, \qquad\qquad I \text{ grande devant } \pi \text{ et } \operatorname{card} I \leqslant \pi'^\pi$$

pour $\pi' \geqslant \pi$. Il faut supposer, pour cette majoration, que $\pi \geqslant \pi_1$.

[page 147]

On peut à présent achever la démonstration de 4.3.6, en prouvant les deux dernières implications $(*)$ (p. 139). On a d $\Longrightarrow$ c, i.e. si $\mathcal{M} \simeq \mathrm{Ind}'_{\pi_0}(C)$, C stable par limites inductives de cardinal $\leqslant \pi_0$, et C équivalente à une petite catégorie, alors $\mathcal{M}$ est stable par petites $\varinjlim$ (4.4.13, p. 95-96), ses éléments sont accessibles, et elle admet une filtration cardinale (cf. 4.5.9). Mais il faut vérifier quand même que les éléments de C sont π_0-accessibles. C'est contenu dans SGA 4 I 9.18, qui affirme que la pleine fidélité du foncteur $\mathrm{Ind}_{\pi_0}(C) \longrightarrow \mathcal{M}$ *équivaut* au fait que les éléments de C sont π_0-accessibles dans $\mathcal{M}$. La démonstration dans loc. cit. n'était pas claire, le "il suffit" a été vu bas de la page 144. Le "il faut" ne me paraît pas clair, avec la généralité donnée dans loc. cit. – et à présent je vois que c'est même faux, comme on voit en posant pour C la catégorie unité e, donc $\mathrm{Ind}'_{\pi_0}C \simeq e$, et l'assertion affirmant que si e est immergée pleinement dans $\mathcal{M}$ (donc par un objet *rigide* de $\mathcal{M}$, i.e. un objet a tel que $\operatorname{End} a = \{\mathrm{id}_a\}$), alors a est $\aleph_0$-accessible. C'est faux dans la catégorie des anneaux, où $\mathbf{R}$ est un objet rigide non $\aleph_0$-accessible !

[page 148]

Dans le cas qui nous occupe, $\mathcal{M} = \mathrm{Ind}'_{\pi_0}C$, il faut visiblement utiliser le calcul explicite des $\varinjlim$ grandes devant π_0 dans $\mathrm{Ind}'_{\pi_0}C \subset C^\wedge$, elles se calculent en effet "argument par argument", cf. 4.4.15.

Cela achève la démonstration de c $\Longrightarrow$ d dans $(*)$, page 139. Enfin l'implication c $\Longrightarrow$ PTA est tautologique, l'existence d'une filtration cardinale impliquant celle d'une petite sous-catégorie strictement génératrice. Cela achève la démonstration de 4.3.6.

Je vais redonner une formulation légèrement plus précise de 4.3.6., en précisant les cardinaux, et en y rajoutant une condition supplémentaire, inspirée par SGA 4 I 9.11 (revue et corrigée, cf. une annotation à l'exemplaire [de Grothendieck] de SGA 4 I ([58])).

Théorème 4.6.3. *Soit $\mathcal{M}$ une $\mathfrak{U}$-catégorie.* p. 48

(1°) *Les conditions suivantes sont équivalentes pour un cardinal infini π_0 :*

- a_{π_0}) *$\mathcal{M}$ est une catégorie $\mathfrak{U}$-π_0-paratopos, i.e. $\mathcal{M}$ est stable par petites $\varinjlim$, et contient une petite sous-catégorie pleine* [strictement] *génératrice S, formée d'objets π_0-accessibles de $\mathcal{M}$.*
- b_{π_0}) *Il existe une petite catégorie S, et un foncteur pleinement fidèle et π_0-accessible $\mathcal{M} \xrightarrow{i} S^\wedge$, admettant un adjoint à gauche.* [page 149]
- c_{π_0}) *Il existe une petite catégorie C, stable par $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi_0$, telle que $\mathcal{M} \simeq \mathrm{Ind}'_{\pi_0}(C)$.*
- c'_{π_0}) *Comme c), avec C seulement équivalente à une petite catégorie.*

2°) *Ces conditions impliquent que $\mathcal{M}$ est stable par petites $\varinjlim$ et petites $\varprojlim$, et la condition :*

- e_{π_0}) *Pour toute catégorie I grande devant π_0, le foncteur*

$$L = \varinjlim_I : \underline{\mathrm{Hom}}(I, \mathcal{M}) \longrightarrow \mathcal{M}$$

est exact à gauche (donc exact).

Cette condition implique notamment ceci :

- $\alpha(\pi_0)$ *Sur la catégorie des double-flèches de $\mathcal{M}$, le foncteur* Ker *(à valeurs dans $\mathcal{M}$) est π_0-accessible.*
- $\beta(\pi_0)$ *Pour toute flèche $y \leqslant x$ dans $\mathcal{M}$, le foncteur changement de base $\mathcal{M}/x \longrightarrow \mathcal{M}/y$ est π_0-accessible.*

([59]).

3°) *Les conditions suivantes sont équivalentes.* [page 150]

- a) *$\mathcal{M}$ est une catégorie $\mathfrak{U}$-paratopos, i.e. est stable par petites $\varinjlim$, et contient une petite sous-catégorie pleine S génératrice par épimorphismes strictes, et formée d'objets accessibles.*
- a') *Comme a), mais en exigeant que $\mathcal{M}$ soit faiblement accessible, i.e. que* tout *objet de $\mathcal{M}$ soit accessible.*
- b) *Il existe une petite catégorie S et un foncteur pleinement fidèle et accessible $\mathcal{M} \hookrightarrow S^\wedge$ admettant un adjoint à gauche.*
- ⓒ *Il existe un cardinal infini π_0, une petite catégorie S, et une équivalence $\mathcal{M} \simeq \mathrm{Ind}'_{\pi_0}(S)$.*
- c') *Comme c, en supposant seulement S équivalente à une petite catégorie.*
- d) *$\mathcal{M}$ est stable par petites $\varinjlim$, est faiblement accessible, i.e. tous ses objets sont accessibles, et admet une filtration cardinale.*

---

58. N. Éd. Cette annotation dit "cf. résultat plus simple ci-dessus, si C est *strictement* génératrice" et le résultat en question, également en annotation marginale sur l'exemplaire de Grothendieck, est : p. 49

Corollaire. *Soit F admettant* [une] *sous-catégorie génératrice par épimorphismes stricts, formée d'objets accessibles, alors* tout *objet de F est accessible (utiliser 7.2. (i) b)).*

ⓔ ([60]). *$\mathcal{M}$ est stable par petites $\varinjlim$, contient une petite sous-catégorie pleine strictement génératrice, et il existe un cardinal infini π_0 tel que la condition e_{π_0} de 2°) soit satisfaite.*

ⓔ′ *Comme e, mais en exigeant, au lieu de e_{π_0}, la condition plus faible conjonction de $\alpha(\pi_0)$ et $\beta(\pi_0)$ dans 2°.*

DÉMONSTRATION. La partie 1° a déjà été démontrée. La première assertions dans 2°), [page 151]
savoir la stabilité de $\mathcal{M}$ par petites $\varprojlim$, est bien connue (résulte de stabilité par petites $\varprojlim$, et de l'existence d'une petite famille génératrice, cf. SGA 4 I 8.12.7, version duale de l'annotation marginale). La validité de la condition e_{π_0} résulte du fait qu'elle est valable dans $C^\wedge$ (où C est la catégorie mentionnée dans 1°, c_{π_0}), et du fait que les $\varprojlim$ dans $\mathcal{M}$, et les $\varinjlim$ grandes devant π_0 dans $\mathcal{M}$, se calculent dans $C^\wedge$. On trouve d'ailleurs de même :

Corollaire 4.6.4. *Si $\mathcal{M}$ est une catégorie $\mathfrak{U}$-π_0-paratopos, alors pour tout cardinal $\pi \geqslant \pi_0$, et tout catégorie J telle que* $\operatorname{card} J \leqslant \pi$*, le foncteur*

$$\underline{\mathrm{Hom}}(J, \mathcal{M}) \xrightarrow{\varprojlim_J} \mathcal{M}$$

est π-accessible, ou ce qui revient au même, pour toute petite catégorie I grande devant π, le foncteur

$$\underline{\mathrm{Hom}}(I, M) \xrightarrow{\varinjlim_I} \mathcal{M}$$

commute aux $\varprojlim$ de cardinal $\leqslant \pi$.

D'autre part, le fait que e_{π_0} implique $\alpha(\pi_0)$ et $\beta(\pi_0)$ est immédiat.

La partie 3°), en ce qui concerne l'équivalence des conditions a) à d), est contenue dans [page 152]
1°, et l'équivalence avec d) a été vue également (la seule chose non tautologique étant que la condition c), savoir $\mathcal{M} \simeq \mathrm{Ind}_{\pi_0}(C)$ avec C petite et stable par $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi_0$, implique l'existence d'une filtration cardinale, ce qui a été vu dans 4.5.9, et réaffirmé dans 4.6.2 2° ci-dessus). D'autre part, que ces conditions a) à d) impliquent ⓔ , et que ⓔ implique e′, a été vu dans 2°. Donc il reste à voir que les conditions de e′ impliquent a), et pour ceci, il reste à établir que les éléments de $\mathcal{M}$ sont accessibles. Mais c'est ce qui est établi dans SGA 4 I 9.11, à cela près que l'énoncé de la condition c), deuxième cas, est canulé, et devrait être remplacé par la condition $\beta(\pi_0)$ (la condition $\alpha(\pi_0)$ figurant dans la condition a) de loc. cit.).

Remarque 4.6.5. Les développements des sections 4.4, 4.5, 4.6 précisent et affirment [page 153]
considérablement, à bien des égards, la théorie des filtrations cardinales de SGA 4 I 9. Il en est ainsi, tout au moins, dans le cas des $\mathfrak{U}$-catégories $\mathcal{M}$ stables par petites $\varinjlim$. Dans loc. cit. on travaille avec des $\mathfrak{U}$-catégories légèrement plus générales, celles satisfaisant la *condition L* : il existe un cardinal infini π_0 tel que $\mathcal{M}$ soit stable par petites $\varinjlim$ *grandes devant* π_0. Je présume cependant qu'on doit pouvoir améliorer de façon similaire p. 50
la théorie des filtrations cardinales *accessibles*, en s'inspirant du corollaire 9.18 de loc. cit., établissant une équivalence de catégories

$$\mathcal{M} \simeq \mathrm{Ind}_{\pi_0}(C)\ ,$$

pour un cardinal π_0 et une petite catégorie C convenable. Ici, on ne peut plus supposer C stable par tel ou tel type de $\varinjlim$. Néanmoins, 4.4.15 nous dit que sans autre hypothèse sur C, $\mathcal{M} \overset{\text{déf}}{=} \mathrm{Ind}_{\pi_0}(C)$ satisfait bien à L_{π_0}, i.e. est stable (et même stable dans $C^\wedge$)

59. **Question.** Condition e_{π_0} (voire, le couple $\alpha(\pi_0)+\beta(\pi_0)$ plus l'existence d'une petite sous-catégorie strictement génératrice (et la stabilité de $\mathcal{M}$ par petites $\varinjlim$), implique-t-il que $\mathcal{M}$ est un π_0-paratopos ? [page 154]
Je présume que non.)

60. C'est là la caractérisation intrinsèque la plus jolie des paratopos par la modalité "économie", l'autre, l'énoncé structurel, est ⓒ .

par petites $\varinjlim$ grandes devant π_0.

Ceci vu, j'ai envie d'appeler *accessible* une catégorie $\mathcal{M}$ qui admet une filtration cardinal, et qui est de plus faiblement accessible `[i.e.]` dont tout objet est accessible. Et de hasarder une

Conjecture 4.6.6 ([61]). *Soit $\mathcal{M}$ une $\mathfrak{U}$-catégorie. Conditions équivalentes :*

a) $\mathcal{M}$ satisfait la condition L, et admet une petite catégorie strictement génératrice formée d'objets accessibles.

⇑ *b) Il existe une petite catégorie C, et un cardinal infini π_0, tel que $\mathcal{M}$ soit équivalente à la catégorie* $\mathrm{Ind}'_{\pi_0}(C)$.

⇑ *c) $\mathcal{M}$ est "accessible", i.e. est faiblement accessible (tout objet accessible) et admet une filtration cardinale.*

On a b $\Longrightarrow$ a $\Longleftarrow$ c de façon tautologique, et c $\Longrightarrow$ b a été vu dans loc. cit. 9.18, donc on a la suite

$$\mathrm{c} \implies \mathrm{b} \implies \mathrm{a}\,,$$

donc il resterait à établir a $\Longrightarrow$ c.

[page 155]

Le travail accompli (et la sueur versée) dans 4.5 nous préservera d'ailleurs, le moment venu, d'erreurs fort naturelles dans la description d'une filtration cardinale, à partir d'une sous-catégorie S strictement génératrice : ce n'est ni Filt^{π}, ni Filt'^{π}, mais quelque chose de plus subtil – peut-être faut-il prendre encore la catégorie $\mathcal{M}_\pi$, ou alors saturer S par les limites inductives de cardinal $\leqslant \pi$ qui veulent bien être représentables dans $\mathcal{M}$: on trouve alors une $\mathrm{Filt}''^{\pi} \subset \mathcal{M}_\pi$, et si ces Filt''^{π} donnent bien une filtration cardinale, on doit avoir forcément $\mathcal{M}_\pi \subset \mathrm{Filt}''^{\pi}$, donc finalement $\mathrm{Filt}''^{\pi} = \mathcal{M}_\pi$. Donc je m'attends à ce qu'en tout état de cause, la filtration cardinale (si elle existe) se fasse par les $\mathcal{M}_\pi$. La condition a) de loc. cit. 9.12 ($\mathcal{M}_\pi$ équivalente à une petite catégorie), et la majoration de cardinaux dans loc. cit. c), ne doit pas faire de difficultés, et la condition b) est OK. La difficulté

[page 156]

provient du fait que $\mathcal{M}_\pi$ n'étant pas même stable par sommes et conoyaux de double-flèches (quand ceux-ci ne sont pas représentés dans $\mathcal{M}$), la catégorie $\mathcal{M}_\pi/x$ (pour x dans $\mathcal{M}$) n'a aucune raison d'être filtrante, pour autant que je vois, ni a fortiori d'être grande p. 51 devant π. Donc il n'est pas trop clair comment dès lors représenter x comme $\varinjlim_I x_i$, les x_i dans $\mathcal{M}_\pi$ et I grande devant π.

Il faut bien dire que dans SGA 4 I 9, je ne donne aucun *exemple* d'une filtration cardinale sur une catégorie où les petites $\varinjlim$ quelconques ne seraient représentables (cf. loc. cit. 9.13). Peut-être après tout est-ce contre-nature de vouloir elles au delà ? ? Il faut peut-être attendre d'y être forcé, pour essayer de développer une théorie en dehors du cadre des paratopos.

[page 157]

4.6.7. Nous sommes à présent en mesure de reformuler les kyrielles de conditions un peu techniques a) à f) du théorème 2.6 (p. 25 dans XVIII) concernant le caractère "spécial à gauche" de l'ensemble $\mathrm{Mon}(\mathcal{M}) \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$:

Proposition 4.6.7 ([62]). *Les conditions préliminaires sur la $\mathfrak{U}$-catégorie $\mathcal{M}$, assurant la validité du théorème XVIII 2.6, sous une forme très légèrement modifié (savoir en modifiant dans 2.6 d) la condition de stabilité de* Filt^{π} *par quotients, en une propriété*

61. Tout ceci sera considérablement précisé dans la théorie qui sera développé dans les sections 4.7, 4.16.

62. Peut-être on pourrait appeler ces catégories des catégories "*paratopos parabéliens*" ? ?

d'exactitude d) ci-dessous), équivaut à l'ensemble de six conditions suivantes a) à f).

$$\begin{cases} a) & \mathcal{M} \text{ est stable par petites } \varinjlim . \\ b) & \mathcal{M} \text{ admet une petite sous-catégorie strictement génératrice.} \\ c) & \text{Les limites inductives filtrantes dans } \mathcal{M} \text{ sont exactes.} \end{cases}$$

Ces conditions impliquent que $\mathcal{M}$ est une catégorie $\mathfrak{U}$-paratopos *(cf. 4.6.3, 3°), et en particulier que les objets de $\mathcal{M}$ sont* accessibles, *et que $\mathcal{M}$ admet une filtration cardinale $(\mathcal{M}_\pi)_{\pi \geqslant \pi_0}$ telle que pour tout $\pi \geqslant \pi_0$, $\mathcal{M}_\pi$ soit stable par $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi$ (en fait, on aura $\mathcal{M}_\pi$ = sous-catégorie pleine des objets π-accessibles de $\mathcal{M}$). Aussi, elles impliquent la stabilité de $\mathcal{M}$ par petites $\varprojlim$. D'autre part, les trois conditions suivantes sont des conditions de stabilité pour les monomorphismes.*

d) Soit $f : X \longrightarrow Y$ une flèche dans $\mathcal{M}$ et $R = X \times_Y X \rightrightarrows X$, alors $X/R \longrightarrow Y$ est un monomorphisme – en d'autres termes, f se factorise en un composé ip, avec i monomorphe et p un épimorphisme effectif.

[page 158]

e) Si A_1, A_2 sont deux sous-objets d'un objet B de $\mathcal{M}$, et $A_0 = A_1 \cap A_2 \overset{déf}{=} A_1 \times_B A_2$, alors $A_1 \amalg_{A_0} A_2 \longrightarrow B$ est un monomorphisme. (Noter la proche parenté des conditions d) et e).)

f) L'ensemble $\mathrm{Mon}(\mathcal{M})$ *des monomorphismes dans $\mathcal{M}$ est stable par cochangement de base.*

En fait, il n'est pas clair que ces conditions, et notamment d), suffisent à entraîner la stabilité des $\mathcal{M}_\pi$ par quotients (seulement par quotients effectifs), comme postulé dans 2.6 d). Mais dans l'énoncé et la démonstration donnée dans XV cor. 7.4 (p. 98-99), on se contentait d'une forme un peu plus faible de cette propriété de stabilité, en se bornant aux quotients Z' de $Z \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}_\pi$ *tels* qu'il n'existe pas de sous-objet Z'_0 de Z', distinct de Z', et tel que $Z \longrightarrow Z'$ se factorise par Z'_0 ; on exigeait donc que $Z' \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}_\pi$. Mais si la condition d) est satisfaite, il s'ensuit aussitôt qu'un quotient Z' de Z ayant cette propriété supplémentaire est nécessairement effectif, d'où résulte bien que $Z' \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}_\pi$.

p. 52

Corollaire 4.6.8. *Les conditions d), e), f) de 4.6.7 sont satisfaites si $\mathcal{M}$ est une catégorie abélienne. Donc l'ensemble des conditions a) à f) est satisfait dans chacun des deux cas suivants :*

[page 159]

1) $\mathcal{M}$ est une catégorie abélienne où les limites inductives filtrantes sont représentables et exactes, et admettant une petite catégorie strictement génératrice ([63]).

2) $\mathcal{M}$ est un topos.

Remarque 4.6.9. Je ne suis par sûr de connaître d'autres exemples où les conditions de 4.6.7 sont vérifiées, que ceux signalés dans 4.6.8 ci-dessus ([64]). On notera que le cas 1°) qui y est mentionné est celui de Tohoku, où j'établis l'existence de "suffisamment d'objets injectifs" dans une telle catégorie abélienne. Dans Tohoku, je me borne à supposer l'existence d'une petite sous-catégorie, *génératrice pour les monomorphismes*, condition en apparence plus faible que celle énoncée dans 4.6.8 1°). Mais dans une catégorie abélienne, les deux notions (et leurs diverses variantes dans SGA 4 I 7.1) sont équivalentes en vertu de SGA 4 I 7.3 (i).

[page 160]

Par contre, il semble que les conditions e) f) ne sont pratiquement jamais vérifiées pour les catégories définies par les espèces de structure algébrique "définissables par

63. C'est le cas étudié dans "Tohoku".

64. ou qui s'en déduisent trivialement (produits etc.)

produits finis" sans plus, tel les groupes, les anneaux (de toutes sortes), etc. Mais la catégorie des groupes *commutatifs*, étant abélienne, est une exception. (On peut d'ailleurs l'interpréter comme $\mathcal{M} \boxtimes \mathcal{M}$, où $\mathcal{M} = (\mathrm{Gr})$, et on peut se demander dès lors s'il y a quelque généralisations aux catégories paratopos de cette forme, $\mathcal{M}$ étant une catégorie paratopos …)

[page 161]

4.7 $\mathrm{Ind}_\pi C$ (C quelconque) et filtrations cardinales généralisées.

Je sens le besoin de me lancer dans des développements à ce sujet, pour parvenir à une meilleure compréhension de la notion de *partie accessible* d'un paratopos, et du théorème de stabilité pour les paratopos par certaines opérations-clef sur ceux-ci.

Dans la suite, C désigne une catégorie équivalente à une petite catégorie, C_0 une sous-catégorie réduite exhaustive, π_0 un cardinal infini. Nous posons

$$\mathcal{M} \;=\; \mathrm{Ind}_{\pi_0} C \;\subset\; C^\wedge \qquad ([65])\,. \tag{4.7.1}$$

On se propose d'introduire sur $\mathcal{M}$ diverses filtrations ± "cardinales", par des propriétés correspondantes sur un objet F de $\mathcal{M} \subset C^\wedge$, que je vais à présent introduire, en m'inspirant de 4.5.2 (p. 107) et 4.5.6 (p. 116).

Proposition 4.7.1. *Posons $\pi_1 = \sup(\pi_0, \mathrm{card}\, C_0)$. Soit $\pi \geqslant \pi_0$ un cardinal, et considérons les conditions suivantes (dépendant de π) sur un objet F de $\mathcal{M}$:*

a) $\mathrm{card}\, C_0/F \leqslant \pi$ *(i.e.* $\mathrm{card}\, \mathrm{Fl}\, C_0/F \leqslant \pi$*).*

a′) $\mathrm{card}\, \mathrm{Ob}\, C_0/F \leqslant \pi$.

a″) $\mathrm{card}\, F(x) \leqslant \pi$ *pour tout $x \in \mathrm{Ob}\, C$ (***N.B.** *il suffit de l'exiger pour x dans C_0).*

b) On a $F = \varinjlim_{i \in I} x_i$, avec les $x_i \in \mathrm{Ob}\, C$, I une catégorie (pas nécessairement ordonnée) grande devant π_0, et telle que $\mathrm{card}\, I \leqslant \pi$. *(***N.B.** *en vertu de 4.4.2 (p.79), pour I donnée, ceci équivaut à l'existence d'un foncteur cofinal $I \longrightarrow C/F$, ou encore $I \longrightarrow C_0/F$.)* ([66]).

p. 53


[page 162]

b′) On a $F \in \mathrm{Ob}\, \mathrm{Filt}'^\pi$, où Filt'^π est la plus petite sous-catégorie strictement pleine de $\mathcal{M}$ contenant C, et stable par $\varinjlim$ grandes devant π_0 et de cardinal $\leqslant \pi$.

c) On a $F \in \mathrm{Ob}\, \mathcal{M}_\pi$, i.e. F est un objet π-accessible de $\mathcal{M}$.

c′) On a $F \in \mathrm{Ob}\, C^\wedge_\pi$, i.e. F est un objet π-accessible de $C^\wedge$.

Ceci posé, on a le diagramme d'implications suivant.



65. **N.B.** Je désigne maintenant par $\mathrm{Ind}C$, $\mathrm{Ind}_\pi C$ ce qui précédemment était noté $\mathrm{Ind}'C$, $\mathrm{Ind}'_\pi C$.

66. **N.B.** On désignera par $\mathrm{Filt}^\pi \subset \mathcal{M}$ la sous-catégorie strictement pleine de $\mathcal{M}$ formée des F satisfaisant cette condition.

où les deux implications en pointillés, $c' \Longrightarrow a$ et $c \Longrightarrow b$, sont conditionnelles soumises à la condition $\pi \geqslant \pi_1$, resp. $\pi = \pi^{\pi_0}$.

[page 163]

Corollaire 4.7.2.

1°) Si $\pi \geqslant \pi_1$, les six conditions a, a′, a″, b, b′, c′ sont équivalentes, et la condition en question (qu'on peut écrire $F \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{Filt}^{\pi}$ où $F \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{Filt}'^{\pi}$ indifféremment) implique c :

$$\mathrm{Filt}^{\pi} \;=\; \mathrm{Filt}'^{\pi} \;\subset\; \mathcal{M}_{\pi} \qquad \textit{si } \pi \geqslant \pi_1 \tag{4.7.2.1}$$

(alors qu'en général, pour $\pi \geqslant \pi_0$, on a

$$\mathrm{Filt}^{\pi} \;\subset\; \mathrm{Filt}'^{\pi}\ (\subset C^{\wedge}_{\pi} \cap \mathcal{M}\,) \;\subset\; \mathcal{M}_{\pi} \qquad \textit{si } \pi \geqslant \pi_0\textit{).} \tag{4.7.2.2}$$

2°) Quand $\pi = \pi^{\pi_0}$, p.ex. quand π est de la forme 2^c, avec $c \geqslant \pi_0$, alors les conditions b, b′, c, c′ sont équivalentes, i.e. on a

$$\mathrm{Filt}^{\pi} \;=\; \mathrm{Filt}'^{\pi} \;=\; (C^{\wedge})_{\pi} \cap \mathcal{M} \;=\; \mathcal{M}_{\pi}\,. \tag{4.7.3.2}$$

3°) Quand $\pi \geqslant \pi_1$ et $\pi = \pi^{\pi_0}$, alors les sept conditions a), a′), a″), b) , b′), c) , c′) sont équivalentes, donc en particulier

$$\mathrm{Filt}^{\pi} \;=\; \mathrm{Filt}'^{\pi} \;=\; C^{\wedge}_{\pi} \cap \mathcal{M} \;=\; \mathcal{M}_{\pi} \qquad (\pi \geqslant \pi_1 \textit{ et } \pi = \pi^{\pi_0}\textit{).} \tag{4.7.2.4}$$

Démonstration de 4.7.1. Les implications a $\Longrightarrow$ a′ $\Longrightarrow$ a″ sont tautologiques, ainsi que b $\Longrightarrow$ b′. L'implication b′ $\Longrightarrow$ c′ provient de la stabilité de $C^{\wedge}_{\pi}$ par $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi$, et du fait que les $\varinjlim$ du type envisagé (en particulier, grandes devant π_0) *dans* $\mathcal{M}$ sont les mêmes que dans $C^{\wedge}$, i.e. se calculent "argument par argument" (cf. 4.4.15, p. 99). Ceci, plus le fait que l'inclusion $\mathcal{M} \hookrightarrow C^{\wedge}$ est pleinement fidèle, implique aussi c′ $\Longrightarrow$ c.

p. 54

L'implication a″ $\Longrightarrow$ c′ se voit comme dans 4.5.6 (p. 119) en appliquant le lemme 4.5.8 1° et 2°, au cas de $C^{\wedge} = \underline{\mathrm{Hom}}(C^{\circ}, \mathcal{E})$, où $\mathcal{E} = (\mathrm{Ens})$. L'implication conditionnelle inverse c′ $\Longrightarrow$ a″, pour $\pi \geqslant \pi_1$, se voit comme dans loc. cit., en appliquant ce lemme 4.5.8. Il reste donc à établir encore les trois implications

[page 164]

$$\begin{cases} \mathrm{a} & \Longrightarrow & \mathrm{b} & \\ \mathrm{a}'' & \Longrightarrow & \mathrm{a} & \text{si } \pi \geqslant \pi_1 \\ \mathrm{c} & \Longrightarrow & \mathrm{b} & \text{si } \pi = \pi^{\pi_0}. \end{cases} \tag{$*$}$$

Mais a $\Longrightarrow$ b est tautologique, en prenant $I = C_0/F$, puisqu'on sait que C_0/F est grande devant π_0 et que $F = \varinjlim_{i \in I} x_i$, pratiquement par définition de $\mathcal{M} = \underbrace{\mathrm{Ind}_{\pi}(C)}_{\simeq \mathrm{Ind}_{\pi} C_0} \subset C^{\wedge}$. Donc il reste à établir les deux implications conditionnelles de $(*)$. L'implication a″ $\Longrightarrow$ a pour $\pi \geqslant \pi_1$ s'établit comme dans 4.5.2 (cf. page 109), c'est essentiellement sorital. Reste à établir

$$\mathrm{c} \;\Longrightarrow\; \mathrm{b} \qquad \text{si } \pi \;=\; \pi^{\pi_0}\,. \tag{$*$}$$

Nous aurons besoin du résultat auxiliaire :

Lemme 4.7.3. *Soit $\pi \geqslant \pi_0$ tel que $\pi^{\pi_0} = \pi$ (donc en fait $\pi > \pi_0$). Pour tout objet F de $\mathcal{M}$, on a*

[page 165]

$$F \;=\; \varinjlim_{i \in I} x_i \qquad ({}^{67})\,. \tag{4.7.3.1}$$

Si de plus $\pi' > \pi$ et $F \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{Filt}^{\pi'}$, alors on peut prendre I telle que

$$\mathrm{card}\, I \;\leqslant\; \pi'^{\pi}\,. \tag{4.7.3.2}$$

67. les x_i dans Filt^{π}, I ensemble ordonné grand devant π.

En effet, on a

$$F \;=\; \varinjlim_{j\in J} x_j \qquad \text{avec } J = C_0/F \qquad ({}^{68})\,,$$

avec J grande devant π_0. Soit alors

$$I \;=\; \begin{array}{l}\text{ensemble des sous-catégories } J' \text{ de } J \textit{ grandes devant } \pi_0,\\ \text{et telles que } \operatorname{card} J' \leqslant \pi.\end{array} \qquad (4.7.3.3)$$

Je dis que I (ordonné par inclusion) *est grand devant* π ([69]). Cela résulte aussitôt du lemme 4.5.5, p. 113, (énoncé d'abord, de façon erronée, en supposant seulement $\pi > \pi_0$ et non $\pi^{\pi_0} = \pi$). Posons alors, pour tout $J' \in I$, p. 55

$$x_{J'} \;=\; \varinjlim_{j\in J'} x_j\,,$$

on a donc

$$x_{J'} \;\in\; \operatorname{Ob}\operatorname{Filt}^{\pi}$$

par définition de I et de $\operatorname{Filt}^{\pi}$. D'autre part,

$$J' \;\longmapsto\; x_{J'} \;:\; I \;\longrightarrow\; \operatorname{Filt}^{\pi}$$

est un foncteur, donc [page 166]

$$\varinjlim_{J'\in I} x_{J'} \;\simeq\; \varinjlim_{j\in J} x_j \;\simeq\; x\,,$$

d'où la première assertion de 4.7.3. Reste la majoration de cardinaux pour $F \in \operatorname{Ob}\operatorname{Filt}^{\pi}$. Dans ce cas, quitte à remplacer C_0/F par une catégorie cofinale grande devant π_0, $\operatorname{card} J \leqslant \pi'$. On voit alors tout de suite que $\operatorname{card} I \leqslant \pi'^{\pi_0}$, ce qui est la majoration annoncée.

Nous pouvons maintenant prouver l'implication $(*)$, page 164, i.e.

$$\mathcal{M}_{\pi} \;\subset\; \operatorname{Filt}^{\pi} \qquad (\text{pour } \pi = \pi^{\pi_0}).$$

Soit donc F dans $\mathcal{M}_{\pi}$, i.e. π-accessible, écrivons F sous la forme (4.7.3.2), avec I grande devant π. Par définition de la π-accessibilité, appliqué à $F \xrightarrow{\mathrm{id}} F \simeq \varinjlim F_i$, on voit que F est un facteur direct d'un F_i, donc d'un objet de $\operatorname{Filt}^{\pi}$. Faute de savoir que $\operatorname{Filt}^{\pi}$ est stable par facteurs directs, on ne peut en conclure que F est dans $\operatorname{Filt}^{\pi}$ (aussi je ne peux prouver c $\Longrightarrow$ b), mais seulement que F est dans $\operatorname{Filt}'^{\pi}$, qui, lui, est stable par $\varinjlim$ grandes devant π_0, de cardinal π donné $> \pi_0$, donc aussi stable par facteurs directs. Cela achève [page 167] la démonstration de 4.7.1, et en même temps on obtient :

Corollaire 4.7.4. *Si $\pi \geqslant \pi_0$ est tel que $\pi^{\pi_0} = \pi$, alors on a*

$$\operatorname{Filt}'^{\pi} \;=\; (\operatorname{Filt}^{\pi})^{\natural}\,, \qquad (4.7.4.1)$$

i.e. $\operatorname{Filt}'^{\pi}$ *est formée des objets F de $\mathcal{M}$ qui sont facteurs directs d'un objet de* $\operatorname{Filt}^{\pi}$.

En effet, comme $\operatorname{Filt}^{\pi} \subset \operatorname{Filt}'^{\pi}$, et que $(\operatorname{Filt}^{\pi})^{\natural} \subset \operatorname{Filt}'^{\pi}$, et que $\operatorname{Filt}'^{\pi}$ est stable par facteurs directs, on a $(\operatorname{Filt}^{\pi})^{\natural} \subset \operatorname{Filt}'^{\pi}$ pour tout $\pi \geqslant \pi_0$. Mais inversement, comme $\operatorname{Filt}'^{\pi} \subset \mathcal{M}_{\pi}$, l'argument précédent montre que pour $\pi = \pi^{\pi_0}$, on a $\operatorname{Filt}'^{\pi} \subset \mathcal{M}_{\pi} \subset (\operatorname{Filt}^{\pi})^{\natural}$, ce qui prouve 4.7.3.

Remarque 4.7.4.1 `[deux fois 4.7.4.1]`. Bien sûr, par 4.7.2, 1°, dès que $\pi \geqslant \pi_1$, on a même $\operatorname{Filt}^{\pi} = \operatorname{Filt}'^{\pi}$ (sans avoir à supposer $\pi = \pi^{\pi_0}$), donc *si* $\pi > \pi_0$ (ce qui sera la cas si $\pi_1 > \pi_0$, i.e. $\pi_1 \neq \pi_0$). $\operatorname{Filt}'^{\pi}$ étant stable par facteurs directs, $\operatorname{Filt}^{\pi}$ l'est aussi, (4.7.4.1) est satisfait trivialement. Mais si $\pi = \pi_1 = \pi_0$, on a $\operatorname{Filt}^{\pi} = \operatorname{Filt}^{\pi_0} = \operatorname{Filt}'^{\pi_0} =$ p. 56 [page 168]

sous-catégorie des foncteurs *représentables* dans C (équivalent à C), et celle-ci n'est égale à $C^\natural$ dans $\mathcal{M}$ que si C est karoubienne, cf. … ci-dessous.

4.7.5. Pour que la démonstration de 4.7.1 soit complète, il me faudrait encore donner une démonstration de 4.5.5, p. 113, qui est le lemme technique clef pour établir le

Lemme 4.7.5.1 (utilisé dans la démonstration de 4.7.3). *Soient π_0, π deux cardinaux infinis, avec $\pi \geqslant \pi_0$ et $\pi^{\pi_0} = \pi$ (donc $\pi > \pi_0$). Soit J une catégorie grande devant π_0. Alors l'ensemble I, ordonné par inclusion, des sous-catégories J' de J qui sont grandes devant π_0, et telles que* $\operatorname{card} J' \leqslant \pi$, *est grand devant π. (De plus, si* $\operatorname{card} J \leqslant \pi'$, *on a* $\operatorname{card} I \leqslant \pi'^{\pi}$.*)*

Il faut donc montrer le

Corollaire 4.7.5.2 ([70]) (c'est le lemme 4.5.5 non encore démontré). *Sous les conditions de 4.7.5, soit $K \subset \mathrm{Fl}J$ tel que* $\operatorname{card} K \leqslant \pi$. *Alors il existe $J' \in I$ tel que $K \subset J'$.*

On sait, π étant infini, que la catégorie K' engendrée par K est aussi de cardinal $\leqslant \pi$, donc on peut supposer que K "est" une sous-catégorie de J. On va construire une $J' \in I$ contenant K, en construisant par récurrence transfinie une suite croissante K_α de sous-catégories de J, avec $\operatorname{card} K_\alpha \leqslant \pi$, indexée par les ordinaux α tels que $\boxed{\operatorname{card}\alpha \leqslant \pi}$: [page 169]

1°) $K_0 = K$.

2°) $K_\alpha = \bigcup_{\beta<\alpha} K_\beta$ ($= \varinjlim K_\beta$) si α est un ordinal limite (donc $\operatorname{card} K_\alpha \leqslant \pi$, puisque les $\operatorname{card} K_\beta \leqslant \pi$).

3°) $K_{\alpha+1}$ déduit de K_α de la façon suivante. Si K_α est grande devant π_0, on prend $K_{\alpha+1} = K_\alpha$ (donc, compte tenu de 2°, on aura $K_{\alpha'} = K_\alpha$ pour $\alpha' \geqslant \alpha$ – la construction transfinie s'arrête …). Sinon, $K_{\alpha+1}$ s'obtient ainsi :

   a) pour toute partie A de cardinal $\leqslant \pi_0$ de $\mathrm{Ob}\, K_\alpha$, on choisit un majorant x_A dans J (on a envie de le prendre dans K_α, s'il y a un majorant dans K_α) ;

   b) pour tout couple x, y d'objets de K_α, et toute partie de cardinal $\leqslant \pi_0$ de $\mathrm{Hom}_{K_\alpha}(x,y)$, on choisit une flèche $u_B : y \longrightarrow z_B$ dans J, qui égalise les $v_\beta \in B$ (et on prend cette flèche dans K_α, quand c'est possible) ;

   c) on prend pour $K_{\alpha+1}$ la plus petite sous-catégorie contenant les id_{x_A} et les u_B.

Il faut vérifier que

$$\operatorname{card} K_{\alpha+1} \ \leqslant\ \pi\ .$$

Le nombre des choix possibles pour $A \in \mathfrak{P}_{\leqslant\pi_0}(\mathrm{Ob}\, J)$ est $\leqslant \pi^{\pi_0} = \pi$, le nombre des choix possibles pour $B \in \mathfrak{P}_{\pi_0}(\mathrm{Fl}\, J)$ est aussi $\leqslant \pi^{\pi_0} = \pi$, donc le nombre des flèches de la forme [page 170] id_{x_A} ou u_B est $\leqslant \pi + \pi = \pi$. Mais alors la sous-catégorie $K_{\alpha+1}$ de J engendrée par cet ensemble de flèches est de cardinal $\leqslant 1$. Soit alors α_0 le plus petit ordinal tel que

$$\operatorname{card}\alpha_0 \ >\ \pi_0\ , \qquad \text{p. 57}$$

on a donc

$$\operatorname{card}\alpha_0 \ =\ \text{cardinal successeur de } \pi_0 \leqslant \pi\ ,$$

puisque $\pi^{\pi_0} = \pi$, d'où $\pi > \pi_0$ (car $\pi^{\pi_0} = \pi_0^{\pi_0} \geqslant 2^{\pi_0} > \pi_0$). Ainsi, α_0 fait partie des ordinaux α admissibles (i.e. tels que $\operatorname{card}\alpha \leqslant \pi$). Je dis que K_{α_0} *est grande devant* π_0 (ce qui prouvera 4.7.5.2, en prenant $J' = K_{\alpha_0}$). Cela résulte immédiatement du fait que

$$K_{\alpha_0} \ =\ \bigcup_{\alpha<\alpha_0} K_\alpha \qquad \text{(réunion } \textit{croissante}\text{)},$$

et que l'ensemble des $\alpha < \alpha_0$ est *grande devant* π_0 ([71]). Donc tout ensemble d'objets ou de flèches de K_{α_0}, de cardinal $\leqslant \pi_0$, est contenu dans un K_α avec $\alpha < \alpha_0$.

68. où J peut aussi se remplacer par une catégorie cofinale dans [?] C_0/F grande devant π_0.
69. cf. démonstration 4.7.5, page 168-171.
70. Comparer avec la démonstration de 4.6.1.2.
71. expliciter ceci en un [page 171]

Cela implique, s'il s'agit d'un ensemble d'objets, qu'il y a un majorant commun dans $K_{\alpha+1}$, a fortiori dans K_{α_0}. S'il s'agit d'une partie d'un $\mathrm{Hom}_{K_\alpha}(x,y)$, qu'il y a un égalisateur $y \longrightarrow z$ dans $K_{\alpha+1}$, a fortiori dans K_{α_0}. Donc le critère PF_π 1,2 de 4.4.4 (page 89) est satisfait par K_{α_0}, ce qui achève la démonstration de 4.7.5.2.

Corollaire 4.7.6 (de 4.7.1). *Pour tout cardinal $\pi \geqslant \pi_0$, on a*

$$\underbrace{\mathrm{Filt}'^{\pi}}_{si\ \pi \geqslant \pi_1 \ =\ \mathrm{Filt}^{\pi}} \ \subset\ \mathcal{M}_\pi\ \subset\ \underbrace{\mathrm{Filt}^{\pi^{\pi_0}}}_{si\ \pi^{\pi_0} \geqslant \pi_1 \ =\ \mathrm{Filt}^{\pi^{\pi_0}}} \qquad (= (\mathrm{Filt}^{\pi^{\pi_0}})^\natural \text{ par cor. 4.7.4}), \tag{4.7.6.1}$$

donc si $\pi \geqslant \pi_1$, on a aussi

$$\mathrm{Filt}^{\pi}\ \subset\ \mathcal{M}_\pi\ \subset\ \mathrm{Filt}^{\pi^{\pi_0}} \qquad (si\ \pi^{\pi_0} \geqslant \pi_1). \tag{4.7.6.2}$$

En effet, $\mathrm{Filt}'^{\pi} \subset \mathcal{M}_\pi$ n'est autre que l'implication b$'$ $\Longrightarrow$ c de 4.7.1, d'autre part, on a $\pi \leqslant \pi^{\pi_0}$, d'où

$$\mathcal{M}_\pi\ \subset\ \mathcal{M}_{\pi^{\pi_0}}\ =\ \mathrm{Filt}'^{\pi^{\pi_0}}\ ,$$

où la dernière égalité provient de $\mathcal{M}_{\pi'} = \mathrm{Filt}'^{\pi'}$ si $\pi'^{\pi_0} = \pi'$, i.e. de (4.7.2.3) (page 163), en faisant $\pi' = \pi^{\pi_0}$, compte tenu que $\pi'^{\pi_0} = (\pi^{\pi_0})^{\pi_0} = \pi^{\pi_0 \cdot \pi_0} = \pi^{\pi_0} = \pi$.

Proposition 4.7.7. *Considérons C, C_0, $\mathcal{M} = \mathrm{Ind}_{\pi_0}(C)$, $\pi_1 = \sup(\pi_0, \mathrm{card}\,\mathrm{Fl}\,C_0)$* [page 172] *comme précédemment. Pour tout cardinal $\pi \geqslant \pi_0$, soit $\mathcal{F}^\pi$ la sous-catégorie strictement pleine Filt'^{π} (resp. $(C^\wedge)_\pi \cap \mathcal{M}$, resp. $\mathcal{M}_\pi$) dans $\mathcal{M}$. Alors la filtration croissante $(\mathcal{F}^\pi)_{\pi \geqslant \pi_0}$ de $\mathcal{M}$ par les sous-catégories $\mathcal{F}^\pi$ satisfait les conditions suivantes.*

a) Pour tout $\pi \geqslant \pi_0$, $\mathcal{F}^\pi$ est équivalente à une petite catégorie.

b) $\mathcal{M}$ satisfait à L_{π_0} (i.e. est stable par $\varinjlim$ filtrantes grandes devant π_0), et pour tout $\pi \geqslant \pi_0$, $\mathcal{F}^\pi$ est stable par les limites filtrantes grandes devant π_0 et de cardinal $\leqslant \pi_0$ [?]. p. 58

c) Si $\pi \geqslant \pi_0$ est tel que $\boxed{\pi^{\pi_0} = \pi,}$ *alors pour tout F dans $\mathcal{M}$, on a un isomorphisme*

$$F\ =\ \varinjlim_{i \in I} x_i\ ,$$

les x_i dans $\mathcal{F}^\pi$, et I catégorie ordonnée grande devant π_0. Si de plus $\pi' > \pi$ et $F \in \mathrm{Ob}\, F^{\pi'}$, on peut prendre I telle que

$$\mathrm{card}\, I\ \leqslant\ \pi'^{\pi} \qquad \underline{si}\ \pi'^{\pi} \geqslant \pi_1. \tag{4.7.7.1}$$

d) Si $\pi \geqslant \pi_0$, on a $\mathcal{F}^\pi \subset \mathcal{M}_\pi$, i.e. les objets de $\mathcal{F}^\pi$ sont π-accessibles.

N.B. Ce sont là exactement, à part d), les conditions a), b), c) des filtrations cardinales de SGA 4 I 9.7.12, à cela près seulement que dans c), on se restreint ici aux ordinaux π [page 173] tels que $\pi^{\pi_0} = \pi$ ([72]). La condition supplémentaire d) est une "condition d'accessibilité", cf. plus bas.

Démonstration de 4.7.7. a) Comme on a

$$\mathrm{Filt}'^{\pi}\ \subset\ (C^\wedge)_\pi \cap \mathcal{M}\ \subset\ \mathcal{M}_\pi\ ,$$

on est réduit à prouver que $\mathcal{M}_\pi$ est équivalente à une petite catégorie. On est ramené au cas $\pi \geqslant \pi_1$, $\pi = \pi^{\pi_0}$, auquel cas on a $\mathcal{M}_\pi = \mathrm{Filt}^\pi$. En fait, on trouve :

Lemme. *Soit π_0 un cardinal, $\alpha_0 = \alpha_{\pi_0'}$ (π_0' le successeur de π_0) le plus petit ordinal tel que* $\mathrm{card}\,\alpha_0 > \pi_0$, *alors $I_{\alpha_0} = \{\alpha \mid \alpha < \alpha_0\}$ est grand devant π_0.*

72. et *de plus*, dans la majoration (4.7.7.1), aux cardinaux $\pi' > \pi$ tels que l'on ait de plus $\pi'^{\pi} \geqslant \pi_1$ (ce qui est automatique si on a $\pi \geqslant \pi_1$, ce qui est le cas, vu que $\pi = \pi^{\pi_0} \geqslant 2^{\pi_0}$, si on a $2^{\pi_0} \geqslant \pi_1$.)

Corollaire 4.7.7.1 [deux fois 4.7.7.1] ([73]). *Si $\pi \geqslant \pi_1$, on a*

$$\begin{cases} \text{card réd}\,\mathrm{Filt}^{\pi} & \leqslant & 2^{\pi} \\ \text{card réd}\,\mathrm{Filt}'^{\pi} & \leqslant & \text{card réd}\,\mathcal{M}_{\pi} \leqslant 2^{(\pi^{\pi_0})} \qquad (= 2^{\pi} \text{ si } \pi^{\pi_0} = \pi). \end{cases}$$

La deuxième majoration résulte de la première et de

$$\mathcal{F}^{\pi} \subset \mathcal{M}_{\pi} \subset \mathrm{Filt}^{\pi^{\pi_0}} \qquad (\text{pour } \pi^{\pi_0} \geqslant \pi_1) \qquad ([74]).$$

Pour la première, on utilise la condition a'') de 4.7.1 (qui caractérise Filt^{π} pour $\pi \geqslant \pi_1$). Je passe sur les détails de la vérification.

Prouvons 4.7.2 b). La condition L_{π_0} est connue, reste la stabilité de $\mathcal{F}^{\pi}$. Dans le cas de Filt'^{π}, elle est acquise par définition. Dans les cas $C_{\pi}^{\wedge} \cap \mathcal{M}$ et $\mathcal{M}_{\pi}$, elle résulte de la stabilité de la notion de π-accessibilité par $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi$, soit dans $C^{\wedge}$, soit dans $\mathcal{M}$ (compte tenu que $C^{\wedge}$ et $\mathcal{M}$ ont une famille génératrice C formée d'objets π_0-accessibles, donc π-accessibles). [page 174]

Prouvons c) : c'est essentiellement le lemme 4.7.3, compte tenu que l'on a

$$\mathrm{Filt}^{\pi} \subset \mathcal{F}^{\pi},$$

sauf qu'il faut faire attention à la majoration de cardinaux, $\mathrm{card}\, I \leqslant \pi'^{\pi}$. Mais si $F \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{F}^{\pi'}$, comme par (4.7.6.1) p. 59

$$\mathcal{F}^{\pi'} \subset \underbrace{\mathcal{M}_{\pi'}}_{\subset \mathcal{M}_{\pi'^{\pi}} \subset \mathrm{Filt}'^{\pi'^{\pi}}} \subset \mathrm{Filt}'^{\pi'^{\pi_0}},$$

donc a fortiori

$$\mathcal{F}^{\pi'} \subset \mathrm{Filt}^{\pi'^{\pi}} \underbrace{=}_{\text{si } \pi'^{\pi} \geqslant \pi_1} \mathrm{Filt}^{\pi'^{\pi}},$$

d'où, par 4.7.3, avec π' remplacé par $\pi'^{\pi} = \pi''$, la possibilité de prendre I avec

$$\mathrm{card}\, I \leqslant \pi''^{\pi} = (\pi'^{\pi})^{\pi} = \pi'^{\pi \cdot \pi} = \pi'^{\pi},$$

ce qui achève la démonstration.

Remarque 4.7.7.2. J'ai été obligé, dans l'énoncé de la condition c), de faire intervenir un deuxième cardinal π_1, et ceci faut de savoir si, pour π'' tel que $\pi'' = \pi''^{\pi_0}$, $\mathrm{Filt}^{\pi''}$ est stable par facteurs directs. (Il faudrait, pour bien faire, soit prouver qu'il est stable, donc qu'on a dans 4.7.1 c $\Longrightarrow$ b, i.e. $\mathcal{M}_{\pi} \subset \mathrm{Filt}^{\pi}$ (et non seulement c $\Longrightarrow$ b', i.e. $\mathcal{M}_{\pi} \subset \mathrm{Filt}'^{\pi}$) si $\pi = \pi^{\pi_0}$, ou bien faire un contre-exemple !) Cet ingrédient un peu étrange, on sera hélas obligé de le traîner dans la définition des filtrations cardinales généralisées, si on ne veut s'interdire de regarder dans le cas présent $(\mathcal{F}^{\pi})_{\pi \geqslant \pi_0}$ comme une telle filtration, et ne s'autoriser que de regarder $(\mathcal{F}^{\pi})_{\pi \geqslant \pi_1}$ comme telle, ce qui me paraîtrait ridicule. Pratiquement (même si théoriquement l'introduction de π_1 dans la description d'une filtration cardinale généralisée était bel et bien nécessaire) on n'aura guère des cas où il faille faire mention de π_1 dans la condition c. En effet, $\pi \geqslant \pi_0$ et $\pi^{\pi_0} = \pi$ impliquent $\pi \geqslant 2^{\pi_0}$, et dès lors $\pi'^{\pi} \geqslant 2^{(2^{\pi_0})}$. Si donc $\pi_1 \leqslant 2^{(2^{\pi_0})}$, i.e. $\mathrm{card}\, C_0 \leqslant 2^{(2^{\pi_0})}$, alors la condition $\pi^{\pi'} \geqslant \pi_1$ dans c) est automatiquement satisfaite, et il n'y a donc pas à la mentionner. Or il est bien rare qu'on ait à faire à des petites catégories C_0, dont le cardinal soit $>$ puissance du continu c, et a fortiori, telle que $\mathrm{card}\, C_0 > 2^{c}$. Si par contre [page 175] [page 176]

73. Comparer avec 4.7.19.
74. Cf. (4.7.6.2).

$\operatorname{card} C_0 \leqslant 2^c$, comme $2^c \leqslant 2^{(2^{\pi_0})}$ (puisque $\pi_0 \geqslant \aleph_0$), on aura bien $\pi_1 \leqslant 2^{(2^{\pi_0})}$, et on est tranquille.

Définition 4.7.8. Soit $\mathcal{M}$ une $\mathfrak{U}$-catégorie. On appelle $\mathfrak{U}$-*filtration cardinale généralisée* (ou simplement filtration cardinale généralisée, quand $\mathfrak{U}$ est sous-entendu) la donnée d'un cardinal infini π_0, et d'une filtration $(\mathcal{F}^\pi)_{\pi \geqslant \pi_0}$ de $\mathcal{M}$ par des sous-catégories strictement pleines $\mathcal{F}^\pi$, indexées par les $\mathfrak{U}$-cardinaux $\geqslant \pi_0$, et satisfaisant les conditions a) b) c) énoncées dans 4.7.7, où dans c) on pose

$$\pi_1 \;=\; \sup(\pi_0, \operatorname{card} \text{réd}\, \mathcal{F}^{\pi_0})\,. \tag{4.7.8.1}$$

(Donc si $\operatorname{card} \text{réd}\, \mathcal{F}^{\pi_0} \leqslant 2^{(2^{\pi_0})}$, il n'y a pas à tenir compte de la condition $\pi'^{\pi} \geqslant \pi_1$, cf. 4.7.7.1.) On dit que la filtration cardinale généralisée (fcg) est *accessible*, si elle satisfait de plus la condition d). On dit qu'elle est *canonique* si on a même

$$\mathcal{F}^\pi \;=\; \mathcal{M}_\pi \tag{4.7.8.2}$$

pour tout $\pi \geqslant \pi_0$.

Proposition 4.7.9. *Soient $(\mathcal{F}^\pi)_{\pi \geqslant \pi_0}$ une fcg sur la $\mathfrak{U}$-catégorie $\mathcal{M}$, et $\pi > \pi_0$ un cardinal tel que $\pi^{\pi_0} = \pi$. Alors on a*

$$\begin{cases} \mathcal{M}_\pi \subset \mathcal{F}^\pi \quad \textit{(si } \pi = \pi^{\pi_0}\textit{)}, \\ \textit{donc } \mathcal{M}_\pi = \mathcal{F}^\pi \textit{ si de plus la fcg est} \text{ accessible}. \end{cases} \tag{4.7.9.1}$$

p. 60
[page 177]

Démonstration ([75]). Appliquant la condition c) des fcg à un $F \in \operatorname{Ob} \mathcal{M}_\pi$, on trouve que F est facteur direct d'un $x_i \in \operatorname{Ob} \mathcal{F}^\pi$. Comme $\mathcal{F}^\pi$ est stable par $\varinjlim$ grandes devant π_0 et de cardinal $\leqslant \pi$, et que *de plus* $\pi > \pi_0$, on conclut que :

Lemme 4.7.9.1 [deux fois 4.7.9.1]. *Si $\pi > \pi_0$ ([76]), $\mathcal{F}^\pi$ est stable par facteurs directs.*

D'où résulte que $F \in \mathcal{F}^\pi$, d'où (4.7.9.1).

Corollaire 4.7.10. *Supposons la fcg accessible. Pour tout cardinal $\pi \geqslant \pi_0$, on a*

$$\mathcal{F}^\pi \;\subset\; \mathcal{M}_\pi \;\subset\; \mathcal{F}^{\pi^{\pi_0}} \;(=\; \mathcal{M}_{\pi^{\pi_0}})\,. \tag{4.7.10.1}$$

En effet, $\mathcal{F}^\pi \subset \mathcal{M}_\pi$ par définition de fcg accessibles, et $\mathcal{M}_\pi = \mathcal{M}_{\pi^{\pi_0}}$ (puisque $\pi \leqslant \pi^{\pi_0}$), or $\mathcal{M}_{\pi^{\pi_0}} = \mathcal{F}^{(\pi^{\pi_0})}$ en vertu de (4.7.9.1) appliqué à $\pi' = \pi^{\pi_0}$ au lieu de π (vu que $\pi'^{\pi_0} = \pi'$), d'où (4.7.10.1). On notera que cette inclusion généralise (4.7.9.1), elle donne $\mathcal{F}^\pi = \mathcal{M}_\pi$ si $\pi = \pi^{\pi_0}$.

4.7.11. Il me semble que les seules filtrations cardinales généralisées utiles sont celles qui sont *accessibles.* Par la suite, je vais me borner à ce cas. Comme alors $\mathcal{F}^\pi \subset \mathcal{M}_\pi$, on en conclut que le foncteur canonique

$$\operatorname{Ind}_\pi(\mathcal{F}^\pi) \;\hookrightarrow\; \mathcal{M} \tag{4.7.11.1}$$

[page 178]

prolongeant l'inclusion $\mathcal{F}^\pi \subset \mathcal{M}$, de façon à commuter aux $\varinjlim$ grandes devant π, est *pleinement fidèle.* De plus, lorsque $\pi^{\pi_0} = \pi$, la condition c) de fcg nous dit entre autres que ce foncteur est essentiellement surjectif, donc que c'est une *équivalence de catégories* :

$$\operatorname{Ind}_\pi(\mathcal{F}^\pi) \xrightarrow{\sim} \mathcal{M} \qquad (\text{si } \pi = \pi^{\pi_0}). \tag{4.7.11.2}$$

Proposition 4.7.12. *Soit $(\mathcal{F}^\pi)_{\pi \geqslant \pi_0}$ une fcg accessible (fcga) sur la $\mathfrak{U}$-catégorie $\mathcal{M}$, et soit π un cardinal $\geqslant \pi_0$. Les conditions suivantes sont équivalentes.*

75. [Dans ce qui suit, $\mathcal{F}^\pi$ a parfois été écrit $\mathcal{F}_\pi$, souvent corrigé en $\mathcal{F}^\pi$ par l'auteur. Nous écrivons $\mathcal{F}^\pi$ partout.]

76. Mais $\mathcal{F}^{\pi_0}$ n'est pas forcément stable par facteurs directs, comme on voit en prenant $\mathcal{M} = \operatorname{Ind}_{\pi_0}(C)$, C une petite catégorie non karoubienne, et la filtration cardinale pour les Filt'^{π} – on note que $\text{Filt}'^{\pi_0} = \text{Filt}^{\pi_0} \simeq e$, vu qu'une catégorie grande devant π_0 et de cardinal $\leqslant \pi_0$ est cofinale à e.

a) Le foncteur pleinement fidèle (4.7.11.1) est essentiellement surjectif, i.e. est une équivalence de catégories.

b) Pour tout $F \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$, $\mathcal{F}^\pi/F$ est une catégorie filtrante et grande devant π.

Quand ces conditions sont satisfaites, et si $\pi > \pi_0$, on a p. 61

$$\mathcal{F}^\pi \;=\; \mathcal{M}_\pi\,. \tag{4.7.12.1}$$

Démonstration. L'équivalence de a) et b) résulte aussitôt de 4.4.2 et de la définition des catégories grandes devant π (p. 81). Que ces conditions impliquent $\mathcal{F}^\pi = \mathcal{M}_\pi$, i.e. [page 179] $\mathcal{M}_\pi \subset \mathcal{F}^\pi$ dans le cas où $\pi > \pi_0$, se voit comme (4.7.9.1) en utilisant le lemme 4.7.9.1.

Définition 4.7.13.

1°) Un cardinal $\pi \geqslant \pi_0$ est dit *cardinal utile* pour la fcga $(\mathcal{F}^\pi)_{\pi\geqslant\pi_0}$, s'il satisfait les conditions équivalentes a) et b) de 4.7.12, et si de plus dans le cas où $\pi = \pi_0$, on a $\mathcal{F}^\pi = \mathcal{M}_\pi$. (Donc si π est un cardinal utile, on a toujours $\mathcal{F}^\pi = \mathcal{M}_\pi$.) Dans le cas contraire, on dit que π est un *cardinal superflu* (pour le fcga donnée).

2°) Un cardinal π est dit *régulier* pour la fcg donnée, s'il est utile, et si de plus la majoration de cardinaux énoncée dans (4.7.7.1) est valable.

4.7.14 Ainsi, tous les cardinaux $\pi \geqslant \pi_0$ tels que $\pi^{\pi_0} = \pi$ sont utiles, et même réguliers pour la filtration cardinale `[généralisée]` donnée. Notons que si tous les cardinaux $\pi \geqslant \pi_0$ sont utiles, alors on a $\mathcal{F}^\pi = \mathcal{M}_\pi$ pour tout $\pi \geqslant \pi_0$, donc la fcga est canonique. Notons aussi que dans tous les cas, si $(\mathcal{F}^\pi)_{\pi\geqslant\pi_0}$ est une fcga, alors $(\mathcal{M}_\pi)_{\pi\geqslant\pi_0}$ en est une aussi.

En effet, la condition a) des fcg (cf. 4.7.7) résulte de la même condition pour $(\mathcal{F}^\pi)$, et de [page 180] (4.7.10.1), $\mathcal{M}_\pi \subset \mathcal{F}^{\pi^{\pi_0}}$. La condition b) est une propriété générale de la π-accessibilité, compte tenu que $(\mathcal{F}^{\pi_0})_0$ est une petite sous-catégorie génératrice formée d'objets π_0-accessibles de $\mathcal{M}$. La condition d) est satisfaite tautologiquement, et il reste à vérifier la condition c). Mais on a vu que pour $\pi = \pi^{\pi_0}$, on a $\mathcal{M}_\pi = \mathcal{F}^\pi$ (4.7.9.1), donc la condition c) pour $(\mathcal{M}_\pi)$ résulte de la même condition pour $(\mathcal{F}^\pi)$. Ainsi, on trouve :

Proposition 4.7.15. *Si $(\mathcal{F}^\pi)_{\pi\geqslant\pi_0}$ est une fcga sur la $\mathfrak{U}$-catégorie $\mathcal{M}$, il en est de même de $(\mathcal{M}_\pi)_{\pi\geqslant\pi_0}$. De plus, tout cardinal utile (resp. régulier) pour la première filtration, l'est pour la seconde (appelée la fcg* canonique associée *à la filtration cardinale* `[généralisée]` *donnée).*

La dernière assertion résulte du fait que si π est utile pour $(\mathcal{F}^\pi)$, alors on a $\mathcal{F}^\pi = \mathcal{M}_\pi$.

4.7.16. Il me semble qu'on peut dire que la fcg canonique associée à une fcga donnée est toujours "meilleure" que celle-ci (si celle-ci n'est canonique, i.e. si les deux ne sont [page 181] égales), à cause des deux faits suivants :

a) justement parce qu'elle est *canonique*, i.e. ne dépend d'aucun autre choix que celui du seul cardinal π_0, et

b) parce qu'il y a a priori plus des cardinaux utiles et de cardinaux réguliers pour la fcg canonique.

Donc au total, il me semble que les filtrations cardinales `[généralisées]` les seules utiles sont celles qui sont canoniques.

Notons qu'une filtration cardinale (au sens de SGA 4 I 9, que je conserve ici) qui est de p. 62 plus *accessible* (i.e. $\mathcal{F}^\pi \subset \mathcal{M}_\pi$ pour tout $\pi \geqslant \pi_0$), n'est autre qu'une fcga canonique, telle que *tous* les cardinaux sont réguliers (a fortiori utiles) pour ladite filtration. Je présume (sans avoir cependant construit d'exemple) que les filtrations cardinales `[généralisées]` canoniques des catégories de la forme $\mathcal{M} = \mathrm{Ind}_{\pi_0}(C)$, C une petite catégorie *karoubienne* (pour que π_0 soit un cardinal utile) ne sont pas forcément des fc (non généralisées, i.e.

au sens SGA), i.e. je présume qu'il arrive qu'il y ait des cardinaux $\pi \geqslant \pi_0$ non réguliers, et même superflus.

Il me faut enfin étudier ce qui se passe quand on change le cardinal initial π_0 d'une fcga. [page 182]

Proposition 4.7.17. *Soit $(\mathcal{F}^\pi)_{\pi\geqslant\pi_0}$ une fcga sur la $\mathfrak{U}$-catégorie $\mathcal{M}$, et soit π_0' un cardinal $\geqslant \pi_0$. Alors $(\mathcal{F}^\pi)_{\pi\geqslant\pi_0'}$ est une fcga sur $\mathcal{M}$, qui est canonique si celle de départ est canonique. Pour un cardinal $\pi \geqslant \pi_0'$, celui-ci est utile pour $(\mathcal{F}^\pi)_{\pi\geqslant\pi_0'}$ si et seulement s'il l'est pour $(\mathcal{F}^\pi)_{\pi\geqslant\pi_0}$. Pour qu'il soit régulier pour $(\mathcal{F}^\pi)_{\pi\geqslant\pi_0'}$, il* suffit *qu'il le soit pour $(\mathcal{F}^\pi)_{\pi\geqslant\pi_0}$, et c'est aussi nécessaire quand on suppose de plus que $2^\pi \geqslant \pi_1' \overset{déf}{=} \sup(\pi_0', \operatorname{card réd} \mathcal{F}^{\pi_0'})$, a fortiori quand $\pi \geqslant \pi_1'$.*

Démonstration. Les conditions a) b) sont trivialement satisfaites par la deuxième filtration, étant satisfaites par la première, ainsi que d) si elle l'est par la première. Il en est de même de la condition c) si $\pi = \pi^{\pi_0'}$, qui implique en effet $\pi^{\pi_0} = \pi$, puisqu'en général

$$\pi \leqslant \pi^{\pi_0} \leqslant \pi^{\pi_0'}.$$

Reste à examiner la majoration de cardinaux

$$\operatorname{card} I \longrightarrow \pi'^{\pi} \qquad \text{si } F \in \operatorname{Ob} \mathcal{F}^{\pi'} \text{ et } \pi'^{\pi} \geqslant \pi_1',$$

où cette fois $\pi_1' = \sup(\pi_0', \operatorname{card réd} \mathcal{F}^{\pi_0'})$. En tout état de cause, on a $\pi_1' \geqslant \pi_1$, donc $\pi'^{\pi} \geqslant \pi_1'$ implique $\pi'^{\pi} \geqslant \pi_1$, donc on peut appliquer la condition c) des fcg pour $(\mathcal{F}^\pi)_{\pi\geqslant\pi_0}$, [page 183]
pour conclure qu'elle reste encore vérifiée. Donc en somme, *toutes* les conditions des fcg (resp. fcga) sont trivialement vérifiées pour la fcg *restreinte* de la première. De même, le fait qu'un cardinal $\pi' \geqslant \pi_0'$ est utile est trivialement indépendant de quelle des deux filtrations on considère, elle ne dépend que de la donnée du cardinal π' et de la sous-catégorie $\mathcal{F}^{\pi'}$ de $\mathcal{M}$. Reste la majoration de cardinaux, dans le cas où on s'intéresse à la *régularité* de π' pour les fcga envisagées. La majoration exigée est la même, mais la condition préalable de validité de cette majoration, savoir

$$\pi'^{\pi} \geqslant \pi_1' \qquad \text{resp.} \qquad \pi'^{\pi} \geqslant \pi_1,$$

n'est pas la même. Comme $\pi_1' \geqslant \pi_1$, on voit que la condition préalable est moins restrictive dans le cas de la première filtration, que de la seconde, d'où le "il suffit" dans la dernière assertion. Mais lorsque $2^\pi \geqslant \pi_1'$, même la plus restrictive est automatiquement vérifiée, [page 184]
puisque $\pi'^{\pi} \geqslant 2^\pi \geqslant \pi_1'$, et alors la régularité de π pour la deuxième filtration implique la régularité pour le première, q.e.d.

Corollaire 4.7.18. *Supposons π_0 régulier pour la fcga ([77]). Si on restreint la fcga* p. 63
$(\mathcal{F}^\pi)_{\pi\geqslant\pi_0}$ aux cardinaux $\pi \geqslant \pi_0'$, où $\pi_0' \geqslant \pi_1$, alors on trouve une fcga où la majoration de cardinaux (pour $\pi = \pi^{\pi_0}$) est valable sans condition préalable $\pi'^{\pi} \geqslant \pi_1'$; plus précisément, on a alors

$$\pi_1' \leqslant 2^{(\pi_0'^{\pi_0})} \qquad \textit{(a fortiori } \pi_1' \leqslant 2^{(2^{\pi_0'})}\textit{)}, \tag{4.7.18.1}$$

donc la condition préalable $\pi'^{\pi} \geqslant \pi_1'$ est automatiquement vérifiée si $\pi \geqslant \pi_0$, $\pi = \pi^{\pi_0'}$, $\pi' > \pi$ (cf. remarque 4.7.7.2).

Ceci équivaut donc à la majoration de cardinaux suivante (appliquée au cas de $\pi = \pi_0'$).

Lemme 4.7.19. *Supposons π_0 régulier pour la fcga $(\mathcal{F}^\pi)_{\pi\geqslant\pi_0}$. Alors pour tout cardinal $\pi \geqslant \pi_1$ ($\overset{déf}{=} \sup(\pi_0, \operatorname{card réd} \mathcal{F}^{\pi_0})$), on a*

$$\operatorname{card réd} \mathcal{F}^{\pi} \leqslant 2^{(\pi^{\pi_0})}, \tag{4.7.19.1}$$

77. Il suffit pour cela que π_0 soit utile, i.e. $\mathcal{M} \xleftarrow{\sim} \operatorname{Ind}_{\pi_0}(\mathcal{F}^{\pi_0} = \mathcal{M}_{\pi_0})$, cela implique régulier, cf. 4.8.5.

et si $\pi' \geqslant \pi_1$ *et* $F \in \operatorname{Ob} \mathcal{F}^{\pi'}$, *on a*

$$\operatorname{card} \text{réd}\, \mathcal{F}^{\pi}/F \;\leqslant\; \pi'^{(\pi^{\pi_0})} \qquad ([78]). \tag{4.7.19.2}$$

Démonstration du lemme. Comme π_0 est régulier, posant $C = \mathcal{F}^{\pi_0} = \mathcal{M}_{\pi_0}$, on trouve $\mathcal{M} \simeq \operatorname{Ind}_{\pi_0}(C)$, donc on peut supposer $\mathcal{M} = \operatorname{Ind}_{\pi_0}(C)$, et appliquer les résultats prouvés pour les catégories de cette forme. Comme $\mathcal{F}^{\pi} \subset \mathcal{M}_{\pi}$, $\mathcal{F}^{\pi'} \subset \mathcal{M}_{\pi'}$, les majorations (4.7.9.1) et (4.7.9.2) sont contenues dans [page 185]

$$\left\{ \begin{array}{rcll} \operatorname{card} \text{réd}\, \mathcal{M}_{\pi} & \leqslant & 2^{(\pi^{\pi_0})} & \\ \operatorname{card} \text{réd}\, \mathcal{M}_{\pi}/F & \leqslant & \pi'^{(\pi^{\pi_0})} & \text{si } F \in \operatorname{Ob} \mathcal{M}_{\pi'}, \text{ avec} \\ & & & \pi' \geqslant \pi \geqslant \pi_1. \end{array} \right\} \text{ pour } \pi \geqslant \pi_1 \qquad ([79]). \quad (*)$$

La première de ces majorations n'est autre que la deuxième majoration dans 4.7.7.1. Notons qu'on a bien

$$2^{(\pi^{\pi_0})} \;\leqslant\; 2^{(2^{\pi})},$$

ce qui résulte en effet de

$$\pi^{\pi_0} \;\leqslant\; 2^{\pi},$$

qu'on prouve en notant que $\pi < 2^{\pi}$, d'où $\pi^{\pi_0} \leqslant (2^{\pi})^{\pi_0} = 2^{\pi \cdot \pi_0} = 2^{\pi}$ puisque $\pi \geqslant \pi_0$. Il reste à établir la deuxième majoration

$$\operatorname{card} \text{réd}\, \mathcal{M}_{\pi}/F \;\leqslant\; \pi'^{(\pi^{\pi_0})} \qquad \text{si } F \in \operatorname{Ob} \mathcal{M}_{\pi'}, \text{ avec } \pi' \geqslant \pi \geqslant \pi_1\,. \tag{$*$}$$

(On n'en a pas besoin pour 4.7.18, mais ce sera sans doute utile par ailleurs.) On utilise $\mathcal{M}_{\pi'} \subset \operatorname{Filt}^{\pi'^{\pi_0}}$ si $\pi' \geqslant \pi_1$ (4.7.6.2), donc si $F \in \operatorname{Ob} \mathcal{M}_{\pi'}$, on a

$$\operatorname{card} F(x) \longrightarrow \pi'^{\pi_0} \qquad \forall\, x \in \operatorname{Ob} C, \tag{p. 64}$$

[page 186]

donc si $G \in \operatorname{Ob} \mathcal{M}_{\pi} \subset \operatorname{Ob} \operatorname{Filt}^{\pi^{\pi_0}}$, d'où

$$\operatorname{card} G(x) \leqslant \pi^{\pi_0} \qquad \forall\, x \in \operatorname{Ob} C,$$

on trouve

$$\operatorname{card} \operatorname{Hom}(G, F) \leqslant \underbrace{\underbrace{\operatorname{card}(\operatorname{Ob} C)}_{\leqslant \pi_1} \cdot (\pi'^{\pi_0})^{(\pi^{\pi_0})}}_{\pi'^{\pi_0 \cdot \pi^{\pi_0}} = \pi'^{(\pi^{\pi_0})}},$$

d'où

$$\operatorname{card} \operatorname{Ob} \mathcal{M}_{\pi}/F \leqslant \underbrace{\underbrace{\operatorname{card}(\operatorname{Ob} \mathcal{M}_{\pi})}_{\leqslant 2^{(\pi^{\pi_0})}} \cdot \pi'^{(\pi^{\pi_0})}}_{\gamma = \pi'^{\pi^{\pi_0}}},$$

et enfin

$$\operatorname{card} \operatorname{Fl} \mathcal{M}_{\pi}/F \leqslant \underbrace{\underbrace{\gamma \cdot \gamma}_{\gamma = \pi'^{(\pi^{\pi_0})}} \cdot \underbrace{\operatorname{card}(\operatorname{Fl} \mathcal{M}_{\pi})}_{\leqslant 2^{(\pi^{\pi_0})}}}_{\pi'^{(\pi^{\pi_0})}},$$

ce qui est la majoration annoncée (la même que celle prouvée dans 4.5.12, la démonstration étant essentiellement la même).

78. **N.B.** J'ignore si on peut remplacer dans ces majorations π^{π_0} par π_0.

79. Comparer avec majorations $\operatorname{card} \text{réd}\, \operatorname{Filt}^{\pi} \leqslant 2^{\pi}$, $\operatorname{card} \text{réd}\, \operatorname{Filt}^{\pi}/F \leqslant \pi'^{\pi}$, si $F \in \operatorname{Ob} \operatorname{Filt}^{\pi'}$, avec $\pi' \geqslant \pi \geqslant \pi_1$, majorations plus agréables que celles de (4.7.19). Il faudrait quand même s'assurer sur un exemple si les majorations plus sympathiques ne seraient pas valables dans le cas général. [page 187]

4.7.20. Une fcg canonique est dite *maximale* (où *strictement canonique*) si elle n'est par déduite d'une fcg canonique strictement plus étendue $(\mathcal{F}^\pi)_{\pi\geqslant\pi_{00}}$ (donc avec $\pi_{00}<\pi_0$). Donc si $\mathcal{M}$ admet une fcga, alors elle admet même une fcg strictement canonique, et cette dernière est de plus unique. On va revenir là-dessus dans la section suivante.

4.8 Catégories $\mathfrak{U}$-accessibles

Proposition 4.8.1. *Soit $\mathcal{M}$ une $\mathfrak{U}$-catégorie, π_0 un cardinal infini. Considérons les conditions suivantes :*

a) $\mathcal{M}$ satisfait à L_{π_0} (i.e. est stable par petites $\varinjlim$ grandes devant π_0), et contient une petite sous-catégorie pleine S strictement génératrice, *formée d'objets π_0-accessibles.*

b) Il existe une petite catégorie C, et une équivalence de catégories

$$\mathcal{M}\simeq \mathrm{Ind}_{\pi_0}(C).$$

c) $\mathcal{M}$ admet une filtration cardinale généralisée accessible $(\mathcal{F}^\pi)_{\pi\geqslant\pi_0}$, ayant π_0 comme cardinal initial, et telle que π_0 soit un cardinal utile pour ladite filtration.

c′) Comme c), avec π_0 cardinal régulier (et non seulement utile) pour la filtration cardinale généralisée accessible en question, et cette filtration étant supposée de plus canonique. p. 65 [page 188]

On a alors le diagramme d'implications

$$c'\iff c\iff b\Longrightarrow a.$$

4.8.1.1. Il me faut ici préciser la terminologie, sur ce que j'entends par sous-catégorie (pleine) C *strictement génératrice* dans $\mathcal{M}$. Pour ceci, je me réfère à SGA 4 I 7.2, (i), aux conditions équivalentes b) et c) de loc. cit. :

ⓑ $\forall F\in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$, la flèche canonique

$$\varinjlim_{i\in C/F} x_i\longrightarrow F$$

est un isomorphisme.

ⓒ Le foncteur canonique

$$\begin{array}{ccc}\mathcal{M} & \longrightarrow & C^\wedge\\ F & \longmapsto & (\underbrace{x}_{\in\mathrm{Ob}\,C}\longmapsto \underbrace{\mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(x,F)}_{\in\mathrm{Ob}(\mathrm{Ens})})\end{array}$$

est pleinement fidèle.

Ces conditions impliquent :

a) C est génératrice dans $\mathcal{M}$ par épimorphismes stricts, i.e. pour tout F dans $\mathcal{M}$, la famille des flèches $x\longrightarrow F$ de source dans C, de but F, est épimorphique stricte.

Et lorsque $\mathcal{M}$ est stable par produits fibrés, cette condition a) est équivalente aux précédentes. Dans loc. cit. j'affirme

cette équivalence sans hypothèse restrictive sur $\mathcal{M}$ – mais en annotation marginale j'affirme que cette assertion est *fausse*, en dehors de l'hypothèse d'existence des produits fibrés dans $\mathcal{M}$. Pourtant, je viens de vérifier la démonstration donnée dans loc. cit. de l'implication a $\Longrightarrow$ b, et elle est correcte. Mais peut-être l'annotation résulte-t-elle d'une confusion entre la condition a), et la condition suivante, plus faible a priori, et qui lui ressemble comme un frère : [page 189]

a′) Il existe une famille de flèches $u_i : x_i \longrightarrow F$, de source dans C, et de but F, qui est épimorphique stricte (cf. SGA 4 I 10.3).

On a envie de dire que quand on *agrandisse* une famille de flèches épimorphique stricte, en rajoutant d'autres flèches de même but, elle doit rester épimorphique stricte ("a fortiori") – ce qui donne l'impression que a′) doit impliquer a), donc lui être équivalent. Mais si on essaye de prouver cette propriété hypothétique de stabilité pour les familles épimorphiques strictes, on voit qu'on n'y arrive que si on suppose que la famille initiale est de plus *épimorphique universelle* (si les produits fibrés existent dans $\mathcal{M}$), ou (sous la réserve précédente) si pour tout $x' \longrightarrow F$, le crible de $\mathcal{M}/F'$ image inverse du crible de $\mathcal{M}/F$ engendré par les $x_i \longrightarrow F$ est un "crible épimorphique". Cela fait entrevoir en effet qu'il doit y avoir des cas où la condition a′) est satisfaite, mais non la condition a) (équivalente à b et à c). p. 66 [page 190]

Mais nous sommes alors confrontés à la situation très déplaisante : si C est une sous-catégorie strictement génératrice de $\mathcal{M}$, il ne s'ensuit pas pour autant qu'une sous-catégorie pleine C' de $\mathcal{M}$ telle que $C' \supset C$ soit également strictement génératrice ! Or j'ai toujours utilisé précédemment, sans y réfléchir à deux fois, qui si C est strictement génératrice, il en est de même de $C' \supset C$. Donc il faudra que je sois à présent très attentif, et que je vérifie si cette erreur ± tacite rend inopérantes certaines démonstrations, voire même, rend faux certains énoncés. Aussi, il me faudrait donner un exemple où C est strictement génératrice, mais $C' \supset C$ ne l'est pas. [page 191]

Finalement, réflexion faite, ces ennuis craints disparaissent. Je vais énoncer un résultat en forme :

Proposition 4.8.2. *Soient C, $\mathcal{M}$ deux $\mathfrak{U}$-catégories, $i : C \longrightarrow \mathcal{M}$ un foncteur, d'où un foncteur*

$$\begin{cases} \varphi : \mathcal{M} \longrightarrow C^\wedge \\ \varphi(X) = (x \longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(i(x), X)) \end{cases} \tag{4.8.2.1}$$

(foncteur composé $\mathcal{M} \xrightarrow{can.} \mathcal{M}^\wedge \underbrace{\xrightarrow{i^*}}_{\substack{\text{i.e. composition} \\ \text{avec } i}} C^\wedge$). Pour tout X dans $\mathcal{M}$, on considère la catégorie $C/X \simeq C/\varphi(X)$, et l'injection [?] canonique (dans $\mathcal{M}^\vee$)

$$\varinjlim_{x \in C/X} i(x) \longrightarrow X. \tag{4.8.2.2}$$

1°) Considérons les conditions suivantes.

- ⓐ *Pour tout $X \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$, la famille des flèches $i(x) \longrightarrow X$, indexée par $\mathrm{Ob}\,C/X$, est épimorphique stricte.*
- ⓑ *Pour tout $X \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$, la flèche canonique 4.8.2.2. est un isomorphisme, i.e. fait de X une $\varinjlim$ des foncteurs canoniques $C/X \longrightarrow \mathcal{M}$.* [page 192]
- ⓒ *Le foncteur φ (4.8.2.1) est pleinement fidèle.*

On a alors les implications

$$\mathrm{b} \Longleftrightarrow \mathrm{c} \Longrightarrow \mathrm{a},$$

et si on suppose i pleinement fidèle, alors les trois conditions a, b, c *sont équivalentes.* (**N.B.** On dit que le foncteur $i : C \longrightarrow \mathcal{M}$ est *strictement générateur*, si les conditions équivalentes b, c sont satisfaites. Si C est une sous-catégorie de $\mathcal{M}$ (pas nécessairement pleine), on dit que C est *strictement génératrice* si le foncteur d'inclusion est strictement générateur, i.e. satisfait aux conditions équivalentes b), c). Pour ceci, il faut donc que la condition a) soit satisfaite, i.e. que pour tout X dans $\mathcal{M}$, la famille des flèches $x \longrightarrow X$ de source dans C, de but X, soit épimorphique stricte, et cette condition est aussi suffisante quand C est sous-catégorie pleine de $\mathcal{M}$.) p. 67

2°) ([80]). *Supposons que i soit strictement générateur* ([81]). *Alors pour tout objet X de $\mathcal{M}$, la famille des flèches $i(x) \longrightarrow X$, indexée par* $\mathrm{Ob}\, C/X$, *est non seulement épimorphique stricte (condition a) dans 1°), mais de plus, toute famille de flèches de but X, incluant la famille précédente, est également épimorphique stricte.*

3°) Considérons un diagramme commutatif de foncteurs de $\mathfrak{U}$-catégories :

[page 193]

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{\alpha} & C' \\ & {\scriptstyle i}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle i'} & \\ & E & \end{array}$$

Si le foncteur i est strictement générateur ([82]), *et si de plus i' est pleinement fidèle, alors i' est strictement générateur.*

Corollaire 4.8.3. *Soit $\mathcal{M}$ une $\mathfrak{U}$-catégorie, C une sous-catégorie strictement génératrice, C' une sous-catégorie* pleine *de $\mathcal{M}$ qui contient C, alors C' est strictement génératrice.*

C'est en effet un cas particulier de 4.8.2 3°.

[page 194]

Démonstration de 4.8.2. La démonstration de 1°) est celle de SGA 4 I 7.2 (i). (Où on suppose que C est une sous-catégorie pleine de $\mathcal{M}$, mais la démonstration donnée prouve en fait l'énoncé donné ici.) Prouvons 2°). Rajoutons donc à la famille des

$$i(x) \longrightarrow X \qquad (x \in \mathrm{Ob}\, C/X)$$

une famille

$$X_\alpha \xrightarrow{p_\alpha} X \qquad (\alpha \in A)$$

de nouvelles flèches, et prouvons que la famille totale ainsi obtenue est encore épimorphique stricte. On doit donc prouver que si Y est un objet de $\mathcal{M}$, et si on a une famille de flèches $u_x : i(x) \longrightarrow Y$, $u_\alpha : X_\alpha \longrightarrow Y$, satisfaisant la condition de compatibilité habituelle pour des couples de flèches :

(v_x, v_y)

$$\begin{array}{ccccc} & & i(x) & & \\ & {\scriptstyle v_x}\nearrow & & \searrow{\scriptstyle p_x} & \\ Z & & & & X\ , \\ & {\scriptstyle v_y}\searrow & & \nearrow{\scriptstyle p_y} & \\ & & i(y) & & \end{array}$$

ou

p. 68

(v_x, v_α)

$$\begin{array}{ccccc} & & i(x) & & \\ & {\scriptstyle v_x}\nearrow & & \searrow{\scriptstyle p_x} & \\ Z & & & & X\ , \\ & {\scriptstyle v_\alpha}\searrow & & \nearrow{\scriptstyle p_\alpha} & \\ & & X_\alpha & & \end{array}$$

ou

[page 195]

80. [2° se trouve sur la page 193.]
81. Il suffit même qu'il satisfasse la condition plus faible a) de 1°).
82. En fait, il suffit qu'il satisfasse la condition plus faible c) de 1°).

$$(v_\alpha, v_\beta) \qquad \begin{array}{ccccc} & & X_\alpha & & \\ & \overset{v_\alpha}{\nearrow} & & \searrow & \\ Z & & & & X\ , \\ & \underset{v_\beta}{\searrow} & & \nearrow & \\ & & X_\beta & & \end{array}$$

savoir les relations

$$\begin{cases} u_x v_x = u_y v_y \\ u_x v_x = u_\alpha v_\alpha \\ u_\alpha v_\alpha = u_\beta v_\beta, \end{cases} \qquad (*)$$

alors il existe une flèche

$$u : X \longrightarrow Y$$

(nécessairement unique, d'après la propriété c) d'épimorphicité stricte de la famille initiale indexée par C/X) telle qu'on ait

$$\begin{cases} up_x = v_x & \text{pour tout } x \in \operatorname{Ob} C/X \\ up_\alpha = v_\alpha & \text{pour tout } \alpha \in A. \end{cases} \qquad (*)$$

Or d'après la propriété a), il existe un unique $u : X \longrightarrow Y$, de telle façon que la première des relations $(*)$ soit satisfaite, pour tout $x \in \operatorname{Ob} C/X$. Donc il s'agit seulement de prouver que pour cet u, on a pour tout α la relation

[page 196]

$$up_\alpha = u_\alpha.$$

Or, en appliquant la propriété a) à X_α au lieu de X, on veut que la famille des flèches

$$i(y) \xrightarrow{q_y} X_\alpha$$

(indexée par C/X_α) est épimorphique stricte, a fortiori épimorphique. Donc pour prouver $up_\alpha = u_\alpha$, il suffit de prouver qu'on a

$$(up_\alpha)q_y = u_\alpha q_y \qquad (**)$$

pour toute y dans C/X_α. Mais c'est là une conséquence de la compatibilité $(*)$ (deuxième formule), appliquée au cas suivant,

p. 69

$$\begin{array}{ccccc} & & i(y) & & \\ & \overset{\mathrm{id}}{\nearrow} & & \searrow^{p_\alpha q_y = p_x} & \\ Z = i(y) & & & & X\ , \\ & \underset{q_y}{\searrow} & & \nearrow_{p_\alpha} & \\ & & X_\alpha & & \end{array}$$

on a donc, en posant $x = (y, p_\alpha q_y) \in \operatorname{Ob} C/X$,

$$\underbrace{u_x \circ \mathrm{id}_{i(y)}}_{u_x} \ = \ u_\alpha q_y\ ,$$

donc pour prouver $(**)$, il reste à vérifier

$$u_x \ = \ \underbrace{(up_\alpha)q_y}_{u(p_\alpha q_y) = up_x}\ , \qquad \text{[page 197]}$$

qui est en effet vérifiée par définition de u_x. Cela achève de prouver 2°.

Prouvons 3°. Comme i' est pleinement fidèle, en vertu de 1°, pour prouver que i' est strictement génératrice, il suffit d'établir que pour tout objet X de $\mathcal{M}$, la famille des flèches $i'(x') \longrightarrow X$, indexée par $\mathrm{Ob}\, C'/X$, est épimorphique stricte. Or cette famille contient la famille des $\underbrace{i'(\alpha(x))}_{=i(x)} \longrightarrow X$, indexée par $\mathrm{Ob}\, C/X$. Donc il résulte de l'hypothèse sur i, et de 2°, que cette famille est épimorphique stricte. On a gagné ! Ouf …

Démonstration de 4.8.1. On a

$$\mathrm{c}' \implies \mathrm{c} \implies \mathrm{b} \implies \mathrm{a}\,,$$

la première implication tautologique, la seconde résultant du fait que π_0 cardinal régulier pour la fcga envisagée, implique que

$$\mathcal{M} \xleftarrow{\sim} \mathrm{Ind}_{\pi_0}(\mathcal{F}^{\pi_0})\ ,$$

$\mathcal{F}^{\pi_0}$ équivalente à une petite catégorie, d'où b).

Enfin b) $\implies$ a) résulte du fait que $\mathrm{Ind}_{\pi_0}(C)$ est stable par $\varinjlim$ grandes devant π_0 (4.4.15), et que C est une sous-catégorie strictement génératrice de $\mathrm{Ind}_{\pi_0}(C)$, formée d'objets π_0-accessibles. Il nous faut expliciter le [page 198]

Lemme 4.8.4. *Soit C une $\mathfrak{U}$-catégorie, π_0 un cardinal infini. Alors C est strictement génératrice dans $\mathcal{M} = \mathrm{Ind}\, C$ et dans $\mathcal{M} = \mathrm{Ind}_{\pi_0} C$.*

En effet, le foncteur canonique $\mathcal{M} \longrightarrow C^\wedge$ est pleinement fidèle, et on applique le critère c) de 4.8.2. [page 199]

Pour achever de prouver 4.8.1, il reste donc à établir l'implication

$$\mathrm{a} \implies \mathrm{c}'\,.$$

Supposons donc que $\mathcal{M}$ satisfasse à L_{π_0}, et admette une petite sous-catégorie strictement génératrice S, formée d'objets π_0-accessibles, donc un foncteur canonique p. 70

$$\mathrm{Ind}_{\pi_0} S \longrightarrow \mathcal{M}\ ,$$

prolongeant l'inclusion $S \hookrightarrow \mathcal{M}$, de façon à commuter aux $\varinjlim$ grandes devant π_0, et du fait que $S \subset \mathcal{M}_{\pi_0}$, ce foncteur est *pleinement fidèle*. Mais comment prouver qu'il est essentiellement surjectif ? Ce ne sera d'ailleurs pas vrai sans autre hypothèse sur S. L'idée naturelle est de saturer S pour les $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi_0$ représentables dans $\mathcal{M}$, et notamment par facteurs directs, mais même alors (et même en admettant que $\mathcal{M}_{\pi_0}$ lui-même est équivalent à une petite catégorie, et prenant $C = \mathcal{M}_{\pi_0}$), il n'est pourtant pas clair que le foncteur pleinement fidèle $\mathrm{Ind}_{\pi_0} C \longrightarrow \mathcal{M}$ soit essentiellement surjectif, ce qui équivaudrait aussi à dire que pour tout F dans $\mathcal{M}$, C/F est grande devant π_0. Il n'est en effet pas même clair que C/F soit filtrante. [page 200]

Donc finalement, je doute qu'on ait a) $\implies$ c′) ou seulement a) $\implies$ b), la situation n'est pas bien comprise visiblement.

Mais prouvons quand même

$$\mathrm{b} \implies \mathrm{c}'\,.$$

Pour ceci, on peut supposer $\mathcal{M} = \mathrm{Ind}_{\pi_0} C$, C petite. On sait alors que la filtration de $\mathcal{M}$ par les $(\mathcal{M}_\pi)_{\pi \geqslant \pi_0}$ est une fcga (prop. 4.7.7 et définition 4.7.8), et même une fcg *canonique.* De plus, je dis que le cardinal π_0 est *utile* et même régulier pour cette filtration (ce qui achèvera de prouver c′). On a un résultat un peu plus précis :

Corollaire 4.8.5. *Soient C une catégorie équivalente à une petite catégorie, π_0 un cardinal infini, $\mathcal{M} = \mathrm{Ind}_{\pi_0}(C) \subset C^\wedge$. Alors :* [page 201]

1°) π_0 est un cardinal utile *et même régulier pour la fcg canonique $(\mathcal{M}_\pi)_{\pi\geqslant\pi_0}$ de $\mathcal{M}$.*

2°) $\mathcal{M}_{\pi_0} = C^\natural$ (sous-catégorie pleine de $\mathcal{M} = \mathrm{Ind}_{\pi_0} C$ formée des facteurs directs dans $\mathcal{M}$ d'objets de C), et $\mathcal{M}_{\pi_0}$ est une enveloppe de Karoubi de C.

([54], [55]).

Démonstration. p. 71

1°) On sait déjà que

$$\mathrm{Ind}_{\pi_0} \mathcal{M}_{\pi_0} \longrightarrow \mathcal{M} \qquad (*)$$

est pleinement fidèle, et pour voir que c'est essentiellement surjectif, on note que l'on a

$$\mathcal{M} \simeq \mathrm{Ind}_{\pi_0} C \hookrightarrow \mathrm{Ind}_{\pi_0} \mathcal{M}_{\pi_0} \longrightarrow \mathcal{M} ,$$

le composé étant isomorphe au foncteur identique, est essentiellement surjectif, donc aussi $(*)$. Cela prouve donc que π_0 est un cardinal utile pour la filtration envisagée, prouvons que ce cardinal est même régulier, donc que pour

$$F \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}_\pi , \qquad \text{avec } \pi > \pi_0,\ \pi^{\pi_0} \geqslant \pi_1$$

on a

$$F = \varinjlim_I x_i , \qquad x_i \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}_{\pi_0},\ I \text{ grande devant } \pi_0,\ \mathrm{card}\, I \leqslant \pi^{\pi_0}.$$

Pour ceci, on utilise (4.7.6.2), page 171,

$$\mathcal{M}_\pi \subset \mathrm{Filt}^{\pi^{\pi_0}} \qquad (\text{si } \pi \geqslant \pi_0,\ \pi^{\pi_0} \geqslant \pi_1), \qquad \texttt{[page 202]}$$

et la définition de $\mathrm{Filt}^{\pi'}$ (pour $\pi' \geqslant \pi_0$) nous montre que c'est là la conclusion cherchée.

Prouvons donc 2°). Comme $\mathcal{M}_{\pi_0}$ est stable par les $\varinjlim$ inductives finies qui sont représentables dans $\mathcal{M}$ (SGA 4 I 9.9), il est stable par facteurs directs, et comme il contient C, on a donc $C^\natural \subset \mathcal{M}_{\pi_0}$. L'inclusion inverse $\mathcal{M}_{\pi_0} \subset C^\natural$ se voit de la façon standard, en écrivant un objet F de $\mathcal{M}_{\pi_0}$ comme $\varinjlim_I x_i$, les x_i dans C, I grande devant π_0, alors F est facteur direct d'un des x_i.

Le fait que $C^\natural$ est une *enveloppe de Karoubi* de C dans $\mathcal{M} \subset C^\wedge$ provient du fait que $\mathcal{M}$ est stable par facteurs directs, et que C est une sous-catégorie pleine de $\mathcal{M}$, cf. SGA 4 I (? …).

4.8.6. Questions ouvertes. On a ainsi prouvé 4.8.1 revu et corrigé. Il reste la question :

1) Donner un exemple où 4.8.1 a) est vérifié, mais non b) etc. ([56]).
2) Dégager des conditions supplémentaires serviables qui, jointes à a), impliquent b), donc c, c′.

Signalons aussi pour mémoire les questions suivantes.

---

54. **Corollaire 4.8.5.1.** *Si C est karoubienne, alors $\mathcal{M}_{\pi_0} \subset C^\wedge$ est la catégorie formée des foncteurs* représentables *dans $C \xrightarrow{\sim} \mathcal{M}_{\pi_0}$.* [page 203]

55. **4.8.5.2.** Expliciter aussi ceci : Soit $u : C \longrightarrow C'$ un foncteur, avec C, C' équivalentes à des petites catégories. Conditions équivalentes :

a) u induit $\mathrm{Kar}\, C \xrightarrow{\sim} \mathrm{Kar}\, C'$.

a′) u pleinement fidèle, et tout objet de C' est isomorphe à un facteur direct d'un objet de l'image essentielle.

b) $\mathrm{Ind}(u) : \mathrm{Ind}(C) \longrightarrow \mathrm{Ind}(C')$ est une équivalence.

c) $\mathrm{Ind}_{\pi_0}(u) : \mathrm{Ind}_{\pi_0}(C) \longrightarrow \mathrm{Ind}_{\pi_0}(C')$ est une équivalence (π_0 un cardinal infini donné).

d) $u_! : C^\wedge \longrightarrow C'^\wedge$ est une équivalence.

d′) $u_* : C'^\wedge \longrightarrow C^\wedge$ est une équivalence [plutôt $u_* : C^\wedge \longrightarrow C'^\wedge$].

d″) $u^* : C'^\wedge \longrightarrow C^\wedge$ est une équivalence.

56. Il suffit de trouver un cardinal non régulier, pour la fcg canonique d'une $\mathcal{M} = \mathrm{Ind}_{\pi_0} C$.

3) Soit $\mathcal{M} = \mathrm{Ind}_{\pi_0}(C)$, et $\pi > \pi_0$. Alors Filt^{π} est-il stable par facteurs directs ? Cela est-il vrai du moins si $\pi = \pi^{\pi_0}$, ou ce qui revient au même (cf. 4.7.3), a-t-on dans ce cas $\mathrm{Filt}^{\pi} = \mathrm{Filt}'^{\pi}$? Si oui, il serait inutile dans la description 4.7.7 des filtrations cardinales, dans la majoration de cardinaux (4.7.7.1), $\mathrm{card}\, I \leqslant \pi'^{\pi}$, de mettre l'hypothèse restrictive $\pi'^{\pi} \geqslant \pi_1$.

Pour avoir une réponse affirmative à cette question, pour π donné, il suffirait (et probablement faudrait) d'avoir une réponse affirmative à celle-ci : Soient $\mathcal{D}$, $\mathcal{D}_0$ deux catégories grandes devant π_0, $\mathcal{D}_0$ facteur direct de $\mathcal{D}$, $\mathcal{D}$ admettant une catégorie cofinale I grande devant π_0, de cardinal $\leqslant \pi$. Alors en est-il de même de $\mathcal{D}_0$? Si p est une rétraction de $\mathcal{D}$ sur $\mathcal{D}_0$, la difficulté est que je ne sais pas si p est foncteur cofinal. En fait, je vois que ce n'est pas toujours le cas, même si $\mathcal{D}$ est finie. Prenons p.ex. pour $\mathcal{D}_0$ une catégorie p. 72 ayant objet final e, et une flèche $x \longrightarrow e$ qui n'est pas un isomorphisme, et admettant [page 204] une section (p.ex. $\mathcal{D}_0$ la sous-catégorie pleine de $\mathbf{\Delta}$ formée par $\mathbf{\Delta}_0$, $\mathbf{\Delta}_1$: $\mathbf{\Delta}_0 \underset{\kappa}{\overset{\partial_0}{\underset{\partial_1}{\rightrightarrows}}} \mathbf{\Delta}_1$). Soit $\mathcal{D}$ déduit de $\mathcal{D}_0$ en ajoutant un objet final $\tilde{e}$. Alors $\mathcal{D}_0$, $\mathcal{D}$ sont filtrantes, et on obtient une rétraction de $\mathcal{D}$ sur $\mathcal{D}_0$, envoyant $\tilde{e}$ sur x. Ce foncteur n'est pas cofinal, car un foncteur cofinal doit envoyer $\tilde{e}$ en e.

Plus généralement, si $\mathcal{D}_0$ est une catégorie telle qu'il existe une flèche

$$\alpha : e_{\mathcal{D}_0^{\wedge}} \longrightarrow x_0 \qquad (*)$$

dans $\mathcal{D}_0^{\wedge}$, avec $x_0 \in \mathrm{Ob}\, \mathcal{D}_0$, alors on voit que $\mathcal{D}_0$ est grande devant π_0 quel que soit le cardinal infini π_0, et que d'autre part, désignant encore par $\mathcal{D}$ la catégorie déduite de $\mathcal{D}_0$ en lui ajoutant un objet final, il y a une rétraction de $\mathcal{D}$ sur $\mathcal{D}_0$ qui envoie $e_{\mathcal{D}}$ dans x_0. Cette rétraction n'est cofinale que si x_0 est un objet final de $\mathcal{D}_0$, i.e. si et seulement si $(*)$ est un isomorphisme. Supposons qu'il n'en soit pas ainsi. Mais il y a un foncteur cofinal de la sous-catégorie I_0 de $\mathcal{D}_0$, telle que $\mathrm{Ob}\, I_0 = \{x_0\}$, $\mathrm{Fl}\, I_0 = \mathrm{End}_{I_0}(x_0) = \{p, \mathrm{id}_{x_0}\}$, où p est le composé $x_0 \xrightarrow{\text{can.}} e_{\mathcal{D}_0^{\wedge}} \xrightarrow{\alpha} x_0$. Donc pas de contre-exemple de cette façon !

[page 205]

4) Considérons $\mathcal{M} = \mathrm{Ind}_{\pi_0}(C)$, C petite, et considérons la filtration canonique $(\mathcal{M}_\pi)_{\pi \geqslant \pi_0}$. Donner des exemples où il y a des cardinaux non utiles, ou mieux, ou pour tout cardinal π, existe un cardinal $\pi' > \pi$ qui soit non utile. (Cela donnera l'exemple demandé dans 1°.) D'autre part, donner des exemples de cardinaux utiles qui ne soient réguliers – si possible, comme tantôt, de tels cardinaux aussi grands qu'on veut.

Définition 4.8.7. Soit $\mathcal{M}$ une $\mathfrak{U}$-catégorie, π_0 un cardinal infini. On dit que $\mathcal{M}$ est π_0-*accessible* si $\mathcal{M}$ est équivalente à une catégorie $\mathrm{Ind}_{\pi_0}(C)$, C une petite catégorie, i.e. si elle satisfait aux conditions équivalentes b, c, c′ de 4.8.1 (impliquant la condition a), sans doute strictement plus faible). On dit que $\mathcal{M}$ est accessible s'il existe un cardinal tel que $\mathcal{M}$ soit π_0-accessible (**N.B.** si π_0 est un tel cardinal, alors tout cardinal $\pi > \pi_0$ tel que $\pi^{\pi_0} = \pi$, notamment les cardinaux π'^{π_0}, avec $\pi' \geqslant 2$, ont la même propriété), ou ce qui revient au même d'après 4.8.1, si $\mathcal{M}$ admet une fcga, ou encore une fcg canonique. [page 206]

Commentaire 4.8.8. Cette définition est en contradiction avec la terminologie introduite dans SGA 4 I 9.4 (p. 114) ; on désignera dorénavant sous les noms de "catégorie faiblement π_0-accessible", "catégorie faiblement accessible" les notions introduites dans 9.4 – i.e. les catégories admettant une sous-catégorie pleine génératrice (pas même strictement génératrice) dont les objets sont π_0-accessibles (resp. accessibles).

Notons que si $\mathcal{M}$ est π_0-accessible (resp. accessible), la condition de 4.8.1 nous dit que $\mathcal{M}$ est faiblement π_0-accessible (resp. faiblement accessible), et même qu'il existe une petite sous-catégorie pleine *strictement* génératrice, qui soit formée d'objets π_0-accessibles

(resp. accessibles). Je doute fort que cette dernière condition nécessaire soit aussi suffisante pour que $\mathcal{M}$ soit π_0-accessible (resp. accessible). Mais en vertu de 4.6.3.3 (p. 150), il en est ainsi si on suppose C stable par petites $\varinjlim$, ou ce qui revient au même, moyennant L_{π_0}, stable par limites inductives de cardinal $\leqslant \pi_0$. p. 73

[page 207]

Proposition 4.8.9. *Soit $\mathcal{M}$ une $\mathfrak{U}$-catégorie accessible (4.8.7), π_0 un cardinal tel que $\mathcal{M}$ satisfait à L_{π_0}. Conditions équivalentes :*

a) $\mathcal{M}$ est une catégorie paratopos (cf. 4.6.3, 3°, p. 150).

b) $\mathcal{M}$ est stable par petites limites inductives.

b′) $\mathcal{M}$ est stable par limites inductives de cardinal $\leqslant \pi_0$.

b″) (Si $\mathcal{M}$ est équivalente à une catégories $\mathrm{Ind}_{\pi_0} C$, avec C une petite catégorie karoubienne.*) La catégorie C est stable (en elle-même) par limites inductives de cardinal $\leqslant \pi_0$.*

c) $\mathcal{M}$ est stable par petites limites projectives.

c′) (Sous l'hypothèse $\mathcal{M} \simeq \mathrm{Ind}_{\pi_0}(C)$, et quand on se donne un cardinal π tel que $\pi = \pi^{\pi_0} \geqslant \pi_1 = \sup(\pi_0, \mathrm{card\,réd}\, C)$.) $\mathcal{M}_\pi$ est stable par $\varprojlim$ finies, et $\mathcal{M}$ est stable par petits produits infinis (ou encore, par $\varprojlim$ filtrantes).

c″) Il existe un cardinal infini π, et une petite catégorie $\mathcal{D}$ stable par $\varprojlim$ finies, telle que $\mathcal{M} \simeq \mathrm{Ind}_\pi(\mathcal{D})$, de plus $\mathcal{M}$ stable par produits infinis (ou encore par $\varprojlim$ filtrantes).

([57], [58]).

Démonstration. Les implications suivantes sont tautologiques, ou déjà ± connues :

$$\mathrm{a} \Longrightarrow \mathrm{b} \xrightarrow{\text{cf. 4.4.14}} \mathrm{b}' \xrightarrow{\bullet} \mathrm{b}''$$
$$\mathrm{c}\ (\xrightarrow{\bullet} \mathrm{c}' \Longrightarrow \mathrm{c}'')\ ,$$

où seules les implications pointées $\mathrm{b}' \Longrightarrow \mathrm{b}''$ et $\mathrm{c} \Longrightarrow \mathrm{c}'$ demandent une démonstration. Pour $\mathrm{b}' \Longrightarrow \mathrm{b}''$, on note que l'hypothèse C karoubienne implique que $C \simeq \mathcal{M}_{\pi_0}$ (4.8.5, 2°), or on sait que $\mathcal{M}_{\pi_0}$ est stable dans $\mathcal{M}$ par limites inductives de cardinal $\leqslant \pi_0$ (et celles-ci sont représentables dans $\mathcal{M}$ en vertu de b′), donc $\mathcal{M}_{\pi_0}$ admet des $\varinjlim$ du type envisagé, donc C aussi. [page 208]

$\mathrm{c} \Longrightarrow \mathrm{c}'$. Notons que si $\mathcal{M} = \mathrm{Ind}_{\pi_0}(C)$, alors les $\varprojlim$ représentables dans $\mathcal{M}$ se calculent dans $C^\wedge$. Il s'ensuit que si $\pi \geqslant \pi_1$, alors Filt^π est stable par $\varprojlim$ finies (Filt^π étant donné alors par la condition a″ de 4.7.1), d'autre part, si de plus $\pi^{\pi_0} = \pi$, π est un cardinal utile, donc $\mathcal{M} \simeq \mathrm{Ind}_\pi(\mathcal{D})$, où $\mathcal{D} = \mathrm{Filt}^\pi = \mathcal{M}_\pi$. Il suffit maintenant de voir que $\mathrm{Ind}_\pi(\mathcal{D})$ est alors stable par $\varprojlim$ finies, pour conclure qu'il en est de même de $\mathcal{M}$, donc que $\mathcal{M}$ est stable par limites projectives quelconques, s'il l'est par petites produites ou par petites $\varprojlim$ filtrantes, d'où c′. Il reste donc à prouver le lemme suivant.

Lemme 4.8.10. *Soient C une petite catégorie, π_0 un cardinal infini, $\pi_1 = \sup(\pi_0, \mathrm{card}\, réd\, C)$. Supposons Ind_{π_0} stable par $\varprojlim$ finies (resp. et d'un certain type). Alors pour tout $\pi \geqslant \pi_1$, Filt^π est stable par lesdites $\varprojlim$. (Donc aussi $\mathcal{M}_\pi = \mathrm{Filt}^\pi$, si $\pi = \pi^{\pi_0}$.) Plus généralement, soit J une petite catégorie telle que $\mathrm{Ind}_{\pi_0} C$ soit stable par $\varprojlim$ de type J, et soit $c = \mathrm{card}\, réd\, J$, supposons que $\pi^c = \pi$ (p.ex. c fini). Alors Filt^π est stable dans $\mathcal{M}$ par $\varprojlim$ de type J. (Donc il en est de même de $\mathcal{M}_\pi = \mathrm{Filt}^\pi$, si de plus $\pi^{\pi_0} = \pi$.)* p. 74

[page 209]

57. **N.B.** L'équivalence de c′, c″ avec les autres conditions n'est pas établie (ici, mais seulement dans 4.11 plus bas.)

58. **N.B.** Les critères c′, c″ me paraissent plus techniques et moins utiles [c′, c″ ci-dessus sont mis en parenthèses].

On utilise le critère a″ de 4.7.1, savoir $\operatorname{card} F(x) \leqslant \pi$ pour tout $x \in C$, pour l'appartenance à Filt^{π}. On peut supposer J réduite, donc $\operatorname{card} \mathrm{Ob}\, J \leqslant c$. Comme le foncteur d'inclusion $\mathrm{Ind}_{\pi_0}(C) \longrightarrow C^{\wedge}$ commute aux $\varprojlim$ quelconques, le calcul de $\varprojlim_{j\in J} x_j$ dans $C^{\wedge}$ fibre par fibre montre que dans $C^{\wedge}$, on a

$$X \overset{\text{déf}}{=} \varinjlim_{j\in J} x_j \;=\; \underbrace{\prod_{j\in \mathrm{Ob}\, J} x_j}_{\text{produit dans } C^{\wedge}} \quad ,$$

d'où

$$\operatorname{card} X(x) \;\leqslant\; \prod_{j\in \mathrm{Ob}\, J} \underbrace{\operatorname{card} x_j(x)}_{\leqslant \pi} \;\leqslant\; \pi^c \;,$$

d'où (sans autre hypothèse sur π que $\pi \geqslant \pi_1$)

$$\varprojlim_{j\in J} x_j \;\in\; \mathrm{Ob}\,\mathrm{Filt}^{\pi^c} \;, \tag{4.8.10.1}$$

d'où la conclusion voulue si $\pi^c = \pi$, q.e.d.

Nous allons prouver les implications supplémentaires [page 210]

$$\mathrm{b}'' \implies \mathrm{b}\;, \qquad \mathrm{c} \implies \mathrm{b}\;, \qquad \mathrm{c}'' \overset{?}{\implies} \mathrm{c}\;,$$

ce qui achève la démonstration.

L'implication b″ $\implies$ a est contenue dans 4.6.3.

Pour l'implication c $\implies$ b, on note que la stabilité de $\mathcal{M}$ par petites $\varinjlim$ équivaut à l'assertion que toute petite limite projective de foncteurs $\mathcal{M} \xrightarrow{\xi_i}$ Ens représentables, est représentable. Or les objets de $\mathcal{M}$ étant accessibles ($\mathcal{M}$ étant accessible), les foncteurs représentables ξ_i sont accessibles, donc aussi leur $\varprojlim$ (SGA 4 I 9.7). D'autre part, le foncteur ξ est exact à gauche, comme $\varprojlim$ de foncteurs représentables donc exactes à gauche. Donc le fait que ξ est représentable résulte du

Lemme 4.8.11. *Soit $\mathcal{M}$ une catégorie accessible, stable par $\varprojlim$ finies, $\mathcal{M} \longrightarrow$ Ens un foncteur. Pour que ξ soit représentable, il faut et il suffit qu'il soit exact à gauche et accessible. Donc (SGA 4 I 8.12.8.1) si $\mathcal{M}$ est stable par petites $\varprojlim$, ξ est représentable si et seulement s'il commute auxdites $\varprojlim$, et qu'il soit accessible.*


Le "il faut" est remis pour mémoire, on vient de le voir comme conséquence du fait que p. 75
tout objet de $\mathcal{M}$ est accessible. Le "il suffit" est essentiellement SGA 4 I 8.13.2.b), sauf [page 211]
que dans loc. cit. on suppose $\mathcal{M}$ munie d'une fc *stricte*. Mais la démonstration donnée dans loc. cit. montre aussi pour une fcga, en choisissant dans loc. cit. (p. 137) π tel que ξ soit π-accessible, et de plus π soit utile pour la filtration cardinale généralisée envisagée.

Reste à prouver c″ $\overset{?}{\implies}$ c, sous réserve que ce soit bien vrai. Ce serait une conséquence du lemme suivant (où $\mathcal{D}$, π sont remplacés par C, π_0).

Lemme 4.8.12 (?) ([88]). *Soient C_0 une petite catégorie, π_0 un cardinal infini. Si C est stable par $\varprojlim$ finies, alors $\mathrm{Ind}_{\pi_0} C$ également.*

L'assertion similaire pour $\mathrm{Ind}(C)$, au lieu de $\mathrm{Ind}_{\pi} C$, est établie dans SGA 4 I 8.9.1 c). Mais il n'est pas clair sans plus que $\mathrm{Ind}_{\pi} C$ soit stable dans $\mathrm{Ind}(C)$ par $\varprojlim$ finies, dans le cas envisagé. De façon précise, si $F = \varprojlim_{j\in J} F_j$, les F_j dans $\mathrm{Ind}_{\pi} C$, F dans $\mathrm{Ind}(C) \subset C^{\wedge}$, [page 212]
on sait que C/F est filtrant et il faut voir qu'il est filtrante grande devant π_0. On est

88. Lemme non prouvé ici – cf. démonstration 4.11.7 (non achevée).

ramené aux trois cas où $J = \emptyset$, $J = e \amalg e$, et $J =$  . Les deux premiers cas sont essentiellement triviaux (car e, et un produit de deux catégories grandes devant π_0, sont grandes devant π_0), le troisième cas par contre n'a pas l'air trivial a priori. C'est lié visiblement à la question des représentations indicielles de foncteurs $J \longrightarrow \mathrm{Ind}_{\pi_0}(C)$, pour $\mathrm{card\,réd}\, J \leqslant \pi_0$ – i.e. la validité de 4.4.13 b) en dehors de l'hypothèse que C soit stable par $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi_0$. Il nous faudra y revenir très prochainement, car cette question m'apparaît à présent une question-clef, pour les propriétés de stabilité de la notion de catégorie accessible (en dehors d'aucune hypothèse d'existence de $\varinjlim$ ou $\varprojlim$).

Proposition 4.8.13 ([89]). *Soit C une catégorie équivalente à une petite catégorie, et soit $\pi_0 \geqslant \mathrm{card\,réd}\, C$ un cardinal infini. Alors $\mathcal{M} = \mathrm{Ind}_{\pi_0} C = \mathcal{M}_{\pi_0}$ (i.e. tous les objets de $\mathrm{Ind}_{\pi_0} C$ sont π_0-accessibles), et $\mathcal{M}$ est une enveloppe de Karoubi de C.*

Signalons tout de suite les corollaires suivants. [page 213]

Corollaire 4.8.14 ([90]). *Soit $\mathcal{M}$ une $\mathfrak{U}$-catégorie. Conditions équivalentes :*

a) $\mathcal{M}$ est accessible, et est équivalent à une petite catégorie.

a′) $\mathcal{M}$ est accessible, et il existe un cardinal infini π_0 tel que tous les objets de $\mathcal{M}$ soient π_0-accessibles (i.e. $\mathcal{M} = \mathcal{M}_{\pi_0}$).

b) $\mathcal{M}$ est équivalente à une petite catégorie, et est karoubienne, i.e. stable par facteurs directs ([91]).

L'équivalence de a) et a′) est claire, puisque $\mathcal{M}$ admet une filtration cardinale généralisée canonique $(\mathcal{M}_\pi)_{\pi \geqslant \pi_0}$, formée des catégories équivalentes à des petites catégories (condition a) des fcg), et telle que toute telle sous-catégorie soit contenue dans un des $\mathcal{M}_\pi$ p. 76 (résulte de la condition b) des fcg). Comme $\mathcal{M}_{\pi_0}$ est équivalente à une petite catégorie, et est karoubienne (étant stable par $\varinjlim$ filtrantes grandes devant π_0), il est clair aussi que a′) $\Longrightarrow$ b). Reste à prouver b) $\Longrightarrow$ a′), or cela résulte aussitôt de 4.8.13 appliqué à $\mathcal{M}$, qui montre de plus qu'on peut prendre pour π_0 n'importe quel cardinal infini tel que $\pi_0 \geqslant \mathrm{card\,réd}\, \mathcal{M}$.

[page 214]

4.8.15. Démonstration de 4.8.13. Nous allons prouver :

Lemme 4.8.15.1. *Sous les conditions de 4.8.13, soit $F \in \mathrm{Ob}\, \mathcal{M}$, $x \in \mathrm{Ob}\, C$, alors*

$$\mathrm{card}\, F(x) \ \leqslant \ \pi_0 \ . \qquad (*)$$

Ceci signifie donc, en vertu de 4.7.7, a″ $\Longrightarrow$ b pour $\pi \geqslant \pi_1$, compte tenu qu'ici $\pi_J = \pi_0$, $\pi = \pi_0$, qu'on a $F \in \mathrm{Filt}^{\pi_0}$, d'où a fortiori $F \in \mathcal{M}_{\pi_0}$, ce qui implique $\mathcal{M} = \mathcal{M}_{\pi_0}$, i.e. la proposition 4.8.13, compte tenu de 4.8.5. Donc tout revient à prouver $(*)$.

Écrivons

$$F \ = \ \varinjlim_{i \in I} x_i \ , \qquad \text{les } x_i \in \mathrm{Ob}\, C, \ I \text{ ensemble ordonné grand devant } \pi_0,$$

d'où

$$F(x) \ = \ \varinjlim_{i \in I} \mathrm{Hom}_C(x, x_i) \ .$$

On peut supposer

$$\mathrm{card}\, C \ = \ \pi_0 \ ,$$

quitte à remplacer C par une catégorie réduite équivalente.

89. *Pas prouvé.* Mais OK si $\pi_0 > \mathrm{card\,réd}\, C$, cf. 4.15.10, p. 462.

90. *Pas prouvé.* Si finalement, cf. 4.15.10, et 4.15.11, pages 462-463.

91. **N.B.** Ceci implique que $\mathcal{M}$ et $\mathcal{M}^\circ$ sont accessible, et je conjecture que la réciproque est vraie également.

Pour tout $\xi \in \operatorname{Ob} C$, soit

$$I_\xi \;=\; \{i \in I \mid x_i = \xi\}\ ,$$

alors

$$I \;=\; \bigcup_{\xi \in \operatorname{Ob} C} I_\xi\ ,$$

réunion d'une famille de parties de I de cardinal $\operatorname{card} \operatorname{Ob} C \leqslant \pi_0$. Comme I est grand devant π_0, on voit que cela implique que l'ensemble des I_ξ est cofinal dans I. Quitte à remplacer I par I_ξ, on peut supposer $I_\xi = I$, i.e. que tous les x_i sont égaux à un même élément ξ. Quitte à remplacer C par la sous-catégorie pleine $C_0 = \{\xi\}$, on peut supposer C réduite à un seul élément. (Car si on prouve que F, en tant qu'objet de $\operatorname{Ind}_{\pi_0}(C_0)$, est facteur direct d'un objet de C_0 (i.e. de ξ), il en sera de même de F en tant qu'objet de $\operatorname{Ind} C$). Donc on peut supposer [page 215]

$$C \;=\; \{\xi\}\ ,$$

donc C donné par le monoïde

$$M \;=\; \operatorname{End}_C(\xi)\ , \qquad \operatorname{card} M \;\leqslant\; \pi\ ,$$

et la donnée du système inductif $(x_i)_{i \in I}$ revient à la donnée d'un système d'éléments

$$\alpha_{ji} \;\in\; M \qquad (i, j \in I,\ i \leqslant j)$$

satisfaisant p. 77

$$\alpha_{ii} \;=\; 1\ , \qquad \alpha_{kj}\alpha_{ji} \;=\; \alpha_{ki} \ \text{ si } i \leqslant j \leqslant k.$$

On a

$$F(\xi) \;=\; \varinjlim_{i \in I} M_i \qquad \left\{ \begin{array}{l} \text{où } M_i = M\ \forall\, i \in I, \text{ et } M_i \longrightarrow M_j \\ \text{est donné par} \\ \qquad\qquad u \longmapsto \alpha_{ji} u\ . \end{array} \right.$$

J'ai pu me ramener, par des arguments similaires ([92]), au cas où le monoïde $M = \operatorname{End}(\xi)$ est un monoïde de monomorphismes, i.e. [page 216]

$$uv \;=\; uv' \;\implies\; v \;=\; v' \qquad \text{si } u, v, v' \in \mathcal{M}\ ,$$

ce qui implique que les flèches de transition dans le système inductif des $M_i = M$ sont des monomorphismes. Il s'ensuit que l'on ne peut avoir $\operatorname{card} F(\xi) \leqslant \pi_0$ (I étant grand devant π_0) que si α_{ji_0} est un isomorphisme pour $j \geqslant i_0$, et i_0 assez grand, i.e. si le système inductif induit pour $j \geqslant i_0$ est constant, a fortiori que le système inductif envisagé est essentiellement constant. Mais je viens de passer près de quatre heures pour essayer de prouver ce point, sans y être arrivé ! Cela semble plus délicat à prouver que je ne le prévoyais, mais je crois toujours que c'est bel et bien vrai. [page 217]

92. Pour ces réductions, cf. 4.15.8 (p. 453-463). L'ultime réduction se trouve dans 4.15.8.9 (p. 461), et son corollaire 4.15.10.

4.9 Le théorème de représentation indicielle pour $\mathrm{Ind}_\pi(C)$

4.9.1 ([93]). Soient C une catégorie équivalente à une petite catégorie, π_0 un cardinal infini,

$$\mathcal{M} \;=\; \mathrm{Ind}_{\pi_0}(C) \;\subset\; C^\wedge \;, \tag{4.9.1}$$

J une catégorie équivalente à une petite catégorie. Considérons l'inclusion pleinement fidèle $C \hookrightarrow \mathcal{M}$, et l'inclusion correspondante de $\mathfrak{U}$-catégories

$$\underline{\mathrm{Hom}}(J, C) \;\hookrightarrow\; \underline{\mathrm{Hom}}(J, \mathcal{M}) \qquad \text{(pleinement fidèle).} \tag{4.9.2}$$

On sait, comme $C \subset \mathcal{M}_{\pi_0}$, que les objets de $\underline{\mathrm{Hom}}(J, C)$ donnent des objets π_0-*accessibles* de $\underline{\mathrm{Hom}}(J, \mathcal{M})$, du moins si on suppose

$$\mathrm{card}\,\mathrm{réd}\,J \;\leqslant\; \pi_0 \;, \tag{4.9.3}$$

ce que nous ferons désormais. (Cf. 4.5.8, 2°, p. 119.) Comme le deuxième membre de (4.9.2) satisfait L_{π_0} ($\mathcal{M}$ y satisfait), il s'ensuit que ce foncteur (4.9.2) se prolonge en

$$\mathrm{Ind}_{\pi_0}(\underline{\mathrm{Hom}}(J, C)) \;\hookrightarrow\; \underline{\mathrm{Hom}}(J, \underbrace{\mathcal{M}}_{=\mathrm{Ind}_{\pi_0}(C)}) \;, \tag{4.9.3}$$

et ce foncteur est *pleinement fidèle* grâce au résultat d'accessibilité qu'on vient d'énoncer. Je m'intéresse à établir des cas où ce foncteur est essentiellement surjectif, i.e. est une *équivalence* de catégories. Notons que pour que p. 78

$$\varphi \;:\; J \longrightarrow \mathcal{M}$$

appartienne à l'image essentielle, il faut et il suffit qu'il existe un foncteur

$$\Phi \;:\; I \;\longrightarrow\; \underline{\mathrm{Hom}}(J, C)\;,\; I \text{ grande devant } \pi_0 \text{ (et on peut supposer } I \text{ ordonnée)}\;, \tag{4.9.4}$$

tel qu'on ait

$$\varphi \;\xleftarrow{\sim}\; \varinjlim_{i \in I} \Phi(i) \;, \tag{4.9.5}$$

[page 218]

ou ce qui revient au même, tel qu'on ait

$$\varphi(j) \;\xleftarrow{\sim}\; \varinjlim_{i \in I} \Phi(i, j) \;, \qquad \text{pour } j \in J \;, \tag{4.9.6}$$

où on a posé

$$\Phi(i, j) \;=\; \Phi(i)(j) \;,$$

interprétant donc Φ comme un foncteur

$$\Phi \;:\; I \times J \;\longrightarrow\; C \;; \tag{4.9.7}$$

la loi fonctorielle de $\varphi(j)$ donnée par (4.9.6) étant évidente. En d'autres termes, les φ dans l'image essentielle de (4.4.3) sont ceux qui admettent une *représentation indicielle* par un foncteur Φ sous forme (4.9.4), ou sous forme (4.9.7), avec *de plus* I grand devant π_0. Je rappelle a ce sujet la

Proposition 4.9.2. *Sous les conditions précédentes sur C, π_0, J (notamment $\mathrm{card}\,\mathrm{réd}\,J \leqslant \pi_0$), si $\varphi : J \longrightarrow \mathcal{M} \overset{déf}{=} \mathrm{Ind}_{\pi_0}(C)$, pour que φ appartienne à l'image essentielle du foncteur pleinement fidèle (4.9.3), il faut et il suffit qu'elle satisfasse les deux conditions suivantes :*

93. [Les numéros 4.9.1 à 4.9.6 sont utilisés deux fois, 4.9.3 trois fois.] [page 219]

a) $\underline{\mathrm{Hom}}(J,C)/\varphi$ *est grande devant* π_0.

b) Pour tout $j \in J$, *le foncteur*

$$\underline{\mathrm{Hom}}(J,C)/\varphi \longrightarrow C/\varphi(j) \qquad \begin{cases} \textit{foncteur entre catégories filtrantes grandes devant } \pi_0, \textit{ en vertu de a),} \end{cases} \tag{4.9.2.1}$$

induit par le foncteur

$$\begin{cases} \underline{\mathrm{Hom}}(J,C) \longrightarrow C \\ F \longmapsto F(j)\ , \end{cases} \tag{4.9.2.2}$$

est cofinal.

p. 79

Le résultat principal dans la présente section est le suivant :

Théorème 4.9.3. *Sous les conditions générales de 4.9.1 pour* C, π_0, J *(notamment* $\operatorname{card}\operatorname{réd} J \leqslant \pi_0$*), le foncteur pleinement fidèle (4.9.3) est une équivalence de catégories dans chacun des deux cas suivants :*

a) C *est stable par* $\varinjlim$ *filtrantes dénombrables.*

b) Il existe un cardinal $\pi_0 < \pi$, *et un cardinal* $\pi_0' > \pi_0$ (**N.B.** *On peut supposer que* π_0' *est le successeur de* π_0, *donc* $\pi_0' \leqslant \pi$*), tels que* C *soit stable par limites inductives grandes devant* π_0, *et de cardinal* π_0'.

([94]).

Remarque 4.9.4.

a) Ce théorème, cas a), contient le théorème 4.4.13, partie b) (p. 95-96), où on suppose que C est stable par limites inductives de cardinal $\leqslant \pi_0$, l'hypothèse a) de 4.9.3 étant considérablement plus faible.

[page 220]

b) Je présume qu'en dehors d'une hypothèse restrictive du type a) ou b) ci-dessus, le foncteur pleinement fidèle (4.9.3) n'est pas toujours essentiellement surjectif, même dans le cas particulier où J est une catégorie finie, p.ex. $J = B_G$, $G = \{\pm 1\}$. Pour un contre-exemple dans le cas très voisin où on prend $\mathcal{M} = \mathrm{Ind}(C)$ (au lieu de $\mathrm{Ind}_{\pi_0}(C)$), et où on considère le foncteur (pleinement fidèle si J est une catégorie équivalent à une catégorie *finie*)

$$\mathrm{Ind}(\underline{\mathrm{Hom}}(J,C)) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(J, \mathrm{Ind}(C)),$$

je renvoie à l'exercice SGA 4 I 8.8.8.

L'application principale du théorème 4.9.3 consiste en le

Corollaire 4.9.5. *Soient* $\mathcal{M}$ *une catégorie* accessible *(4.8.7),* J *une catégorie équivalente à une petite catégorie. Alors la catégorie* $\mathcal{M}(J^\circ) = \underline{\mathrm{Hom}}(J,\mathcal{M})$ *est accessible. Plus précisément, soient* π_0 *un cardinal* utile *pour* $\mathcal{M}$ *(i.e. tel que* $\mathrm{Ind}_{\pi_0}(\mathcal{M}_{\pi_0}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{M}$, *i.e. un cardinal tel que* $\mathcal{M}$ *soit* π_0*-accessible), soit* π *un cardinal infini tel que* $\pi^{\pi_0} = \pi \geqslant \operatorname{card}\operatorname{réd} J$ ([95]), *i.e.* $\pi = c^{\pi_0}$, *où* c *est n'importe quel cardinal* $c \geqslant \sup(\pi_0, \operatorname{card}\operatorname{réd} J)$, *alors* $\underline{\mathrm{Hom}}(J,\mathcal{M})$ *est* π*-accessible, plus précisément on a une équivalence de catégories*

$$\underline{\mathrm{Hom}}(J,\mathcal{M}) \xleftarrow{\sim} \mathrm{Ind}_\pi(\underline{\mathrm{Hom}}(J,\mathcal{M}_\pi))\ . \tag{4.9.5.1}$$

On sait en effet, avec les hypothèses faites sur π_0, π, que π est utile pour $\mathcal{M}$, i.e. que

[page 221]

$$\mathcal{M} \xleftarrow{\sim} \mathrm{Ind}_\pi(\mathcal{M}_\pi)\ ,$$

p. 80

d'autre part, $\mathcal{M}_\pi$ est stable par $\varinjlim$ grandes devant π_0 et de cardinal $\leqslant \pi$. On peut donc appliquer 4.9.3 b), en prenant $C = \mathcal{M}_\pi$, π et π_0 comme ici (donc $\pi_0 < 2^{\pi_0} \leqslant \pi$), et $\pi'_0 = \pi$.

4.9.6 ([96]). Le reste de la présente section 4.9 est consacré à la démonstration de 4.9.3, i.e. à la vérification, pour $J \longrightarrow \mathcal{M}$, des conditions a), b) de 4.9.2. Dans toute la suite, on se fixe donc une

$$\varphi \ : \ J \longrightarrow \mathcal{M} \ = \ \mathrm{Ind}_\pi(C) \ . \tag{4.9.6.1}$$

On peut supposer J réduite, donc petite et $\operatorname{card} J \leqslant \pi_0$. On va considérer le foncteur déduit du foncteur (4.9.2.1)

$$\underline{\mathrm{Hom}}(J, C)/\varphi \longrightarrow \prod_{j \in \mathrm{Ob}\, J} C/\varphi(j) \ , \tag{4.9.6.2}$$

dont les foncteurs en question se déduisent en composant avec les foncteurs projection

$$\prod C/\varphi(j) \longrightarrow C/\varphi(j_0) \ . \tag{4.9.6.3}$$

Comme les catégories facteurs $C/\varphi(j)$ sont filtrantes (et même grandes devant π), leur produit est également filtrant, et même grand devant π (immédiat), et de même pour les produits partiels. Il s'ensuit aussitôt que les projections (4.9.6.3) sont cofinales, en vertu du [page 222]

Lemme 4.9.6.1. *Soient I, I' deux catégories avec I' 0-connexe (p.ex. filtrante), alors le foncteur projection $pr_1 : I \times I' \longrightarrow I$ est cofinal.*

En effet, pour $i' \in \mathrm{Ob}\, I'$ [plutôt $i \in \mathrm{Ob}\, I$], on a

$$i\backslash(I \times I') \ \simeq \ (i\backslash I) \times I' \ ,$$

or $i\backslash I$ et I' étant 0-connexe, il en est de même de leur produit.

Lemme 4.9.6.2 ([97]). *Soit $(I_\alpha)_{\alpha \in A}$ une famille de catégories* filtrantes *(resp. grandes devant π). Alors $I_A \overset{déf}{=} \prod_{\alpha \in A} I_\alpha$ est filtrante (resp. grande devant π), et pour toute partie $B \subset A$, la projection canonique $I_A \longrightarrow I_B$ est cofinal.*

([98]). La stabilité de la propriété "filtrante" ou "grande devant π" par AQT [âne qui trotte]. On a, si $B' = A\backslash B$, $I_A \simeq I_B \times I_{B'} \longrightarrow I_B$, et on applique le lemme 4.9.6.1 pour conclure que ce foncteur est cofinal, $I_{B'}$ étant filtrante, donc 0-connexe.

Le foncteur (4.9.6.3) étant cofinal, pour établir que (4.9.2.1) l'est, il suffit de prouver qu'il en est ainsi du foncteur (4.9.6.2), ce que nous ferons. Notons de plus que ledit foncteur est *fidèle*, car il s'insère dans le carré commutatif [page 223]

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{Hom}}(J, C)/\varphi & \longrightarrow & \prod C/\varphi(j) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \underline{\mathrm{Hom}}(J, C) & \longrightarrow & C^{\mathrm{Ob}\, J} \ , \end{array}$$

où les flèches verticales et la deuxième flèche horizontale sont fidèles. En définitive, pour p. 81

94. Cas commun : il existe un ordinal limite α, tel que 1) $\operatorname{card} \alpha \leqslant \pi_0$. 2) Les limites inductives [de] type $I_\alpha = \{\beta \mid \beta < \alpha\}$ sont représentables dans C.

95. On a donc $\pi = \pi^{\pi_0} \geqslant 2^{\pi_0} > \pi_0$.

96. Résultats préliminaires (à la démonstration de 4.9.3).

97. Attention, il n'est pas vrai qu'un produit infini de catégories 0-connexes est 0-connexe !

98. Cf. démonstration élégante ci-dessous, 4.9.6.6.

établir le théorème 4.9.3, nous allons étudier le foncteur *fidèle* (4.9.6.2)

$$\begin{array}{l} f \ : \ \underline{\mathrm{Hom}}(J,C)/\Phi \ \longrightarrow \ \prod_{j\in J_0} C/\varphi(j) \\ (\text{où on a posé } J_0 = \mathrm{Ob}\, J,\ J_1 = \mathrm{Fl}\, J)\ , \end{array} \qquad (*)$$

et nous allons prouver :

ⓐ Ce foncteur fidèle $(*)$ est *cofinal.*

ⓑ La catégorie source $\underline{\mathrm{Hom}}(J,C)/\varphi$ est grande devant π_0.

Nous allons pour ceci dégager un lemme auxiliaire sur la cofinalité des foncteurs *fidèles* : [page 224]

Lemme 4.9.6.3 ([99]). *Soit $f : I \longrightarrow I'$ un foncteur, et considérons les conditions :*

a) I filtrante, f cofinal, i.e. (en présence de I filtrante) f satisfait les conditions familières (F 1), (F 2).


b) I' est filtrante, et les $i'\backslash I$ (pour $i' \in \mathrm{Ob}\, I'$) sont filtrantes.

b′) I' 0-connexe, satisfait PF (2) ([100]) (égalisation des double-flèches).

b″) I' est filtrante, les $i'\backslash I$ pseudo-filtrantes, i.e. satisfont à la condition PF $1'$.

c) I' filtrante, et f satisfait à F 1, ainsi que la condition suivante.

(F 3) *Pour tout couple (i_0, i_1) d'objets de I et toute flèche $f(i_0) \xrightarrow{u'} f(i_1)$, il existe un objet i_2 de I, et une flèche $v' : f(i_1) \longrightarrow f(i_2)$, tels que v' et $v'u'$ soient relevables en des flèches $i_1 \xrightarrow{v} i_2$ et $i_0 \xrightarrow{w} i_2$ (i.e. il existe i_2 et $v : i_1 \longrightarrow i_2$, $w : i_0 \longrightarrow i_2$ tels qu'on ait $f(v)u' = f(w)$).*



1) On a les implications

$$a \iff b \iff b' \implies b'' \iff c\ ,$$

et si f est fidèle *(p.ex. I ordonnée), les cinq conditions a), b), b′), b″), c) sont équivalentes.*

p. 82

2) Soit π un cardinal infini, et considérons les conditions : [page 225]

a_π) I grande devant π, f cofinal, i.e. F 1, F 2.

b_π) I' grande devant π, les $i'\backslash I$ ($i' \in \mathrm{Ob}\, I'$) aussi.

b_π″) I' grande devant π, les $i'\backslash I$ ($i' \in \mathrm{Ob}\, I'$) sont π-pseudo-filtrantes, i.e. satisfont PS ${1_\pi}'$.


c_π) I' grande devant π, et f satisfait F 1 et

(F 3_π) ([101]). *Pour toute famille $(i_\alpha)_{\alpha\in A}$ d'objets de I, avec* card $A \leqslant \pi$, *et $i \in \mathrm{Ob}\, I$, et une famille de flèches $u'_\alpha : f(i_\alpha) \longrightarrow f(i)$, existe $j \in \mathrm{Ob}\, I$ et une flèche $v' : f(i) \longrightarrow f(j)$, telle que v'* et *les $v'u'_\alpha$ proviennent de flèches de I, i.e. il existe des flèches $v : i \longrightarrow j$, $w_\alpha : i_\alpha \longrightarrow j$ telles que $f(v)u'_\alpha = f(w_\alpha)\ \forall\ \alpha \in A$.*

99. Ce lemme fait partie du sorite général sur la cofinalité et les catégories filtrantes.

100. p.ex. PF 2 est satisfaite si I' est *ordonnée*, sans avoir à supposer d'avance I' filtrante, seulement 0-connexe.

101. **N.B.** La condition F 3_π est tautologiquement satisfaite si f est *pleinement fidèle.*



Ceci posé, on a

$$a_\pi \iff b_\pi \implies c_\pi \implies b_\pi'' \ ,$$

et si f est fidèle, ou I ordonné, les quatre conditions a_π, b_π, b_π'', c_π sont équivalentes.


([102]).

4.9.6.4. N.B. Dans le cas qui nous intéresse, où f est le foncteur $(*)$ (p. 223), on sait que I' est grande devant π. On voudrait établir que I l'est et que f est cofinal, i.e. la condition a_π. On le prouvera en prenant b_π (qui implique a_π puisque f est fidèle). Il reste donc à prouver, sur le foncteur f dans $(*)$, p. 223, les deux conditions suivantes : [page 226]

F 1) Pour tout système de flèches dans $\mathcal{M}$

$$X(j) \xrightarrow{p(j)} \varphi(j) \ , \qquad j \in J_0 = \mathrm{Ob}\, J, \text{ les } X(j) \text{ dans } \mathrm{Ob}\, C \ ,$$

il existe un foncteur $F : J \longrightarrow C$ et $F \xrightarrow{q} \varphi$, enfin un système de flèches $X(j) \xrightarrow{u(j)} F(j)$ dans les $C/\varphi(j)$, i.e. rendant commutatif les diagrammes




F 3_π) Pour tout système $(F_\alpha)_{\alpha\in A}$ ($\mathrm{card}\, A \leqslant \pi$) d'éléments dans $\underline{\mathrm{Hom}}(C, J)$, et des flèches

$$F_\alpha \xrightarrow{p_\alpha} \varphi \qquad \text{dans } \underline{\mathrm{Hom}}(J, \mathcal{M}),$$

et pour G dans $\underline{\mathrm{Hom}}(J, C)$ et $G \xrightarrow{q} \varphi$ dans $\underline{\mathrm{Hom}}(J, \mathcal{M})$, étant donné un système de flèches $u_\alpha(j)$,


p. 83



$u_\alpha(j)$ flèche dans $C/\varphi(j)$,

il existe $H \xrightarrow{q} \varphi$ dans $\underline{\mathrm{Hom}}(J, C)$ et une flèche $G \xrightarrow{v} H$ dans $\underline{\mathrm{Hom}}(J, C)/\varphi$, telle que pour tout $\alpha \in A$, le système de flèches composés

[page 227]



(pour $j \in J_0 \in \mathrm{Ob}\, J$) provienne d'un *foncteur* $w_\alpha : F_\alpha \longrightarrow H$.

102. Démonstration de la proposition donnée dans 4.9.6.7, page 227.

Pour prouver 4.9.3, nous sommes donc ramené à prouver les deux propositions F 1), F 3_π) précédentes, sous l'une des deux conditions a) ou b) de 4.9.3.

Corollaire 4.9.6.5 (de 4.9.6.3). *Soit* $(f_\alpha : I_\alpha \longrightarrow I'_\alpha)$ *une famille de foncteurs cofinaux, les catégories source étant filtrantes. Alors le foncteur produit* $f = \prod f_\alpha : I = \prod_\alpha I_\alpha \longrightarrow I' = \prod_\alpha I'_\alpha$ *est cofinal.*

En effet, il faut vérifier que les catégories $i'\backslash I$, pour $i' \in \mathrm{Ob}\, I'$, sont 0-connexes. Or si $i' = (i'_\alpha)_{\alpha\in A}$, on a

$$i'\backslash I \;\simeq\; \prod_\alpha (i'_\alpha\backslash I_\alpha)\ ,$$

et par 4.9.6.3, 1°) a $\Longrightarrow$ c, les $i'_\alpha\backslash I_\alpha$ sont filtrantes, donc leur produit est filtrant (cf. [page 228]
4.4.6.2), donc 0-connexe, q.e.d.

Corollaire 4.4.6.6. *Soit* π *un cardinal infini. Tout produit de catégories grandes devant* π *est grand devant* π*.*


Soit $I = \prod_{\alpha\in A} I_\alpha$, soit B un ensemble de cardinal $\leqslant \pi$, il faut prouver que $I \xrightarrow{\mathrm{diag}_I} I^B$ est cofinal. Or ce foncteur s'identifie au produit des foncteurs similaires $I_\alpha \longrightarrow I_\alpha^B$, lesquels sont cofinaux, les catégories source étant de plus filtrantes. Donc on peut conclure par le corollaire 4.9.6.5.

4.9.6.7. Démonstration de 4.9.6.3. (Partie 1°.)


a $\Longrightarrow$ b. On sait déjà que a) implique que I' est filtrante (SGA 4 I 8.1.3 b). Reste à prouver que pour tout $i' \in \mathrm{Ob}\, I'$, $i'\backslash I$ est filtrante ([103]). Deux conditions PF 1′ et PF 2 à vérifier (en plus du fait que $i'\backslash I \neq \emptyset$, qui est connu par cofinalité de f, impliquant que $i'\backslash I$ est 0-connexe).

1) Soient (i, u'), (j, v') deux éléments de $i'\backslash I$, il faut voir qu'ils sont majorés par un troisième élément. Or I étant filtrante, i, j sont majorés par k. On aurait fini donc si on savait que $f(u_1)u' = f(v_1)v'$, soit w', car alors (k, w') ferait l'affaire.

p. 84



Mais on applique F 2 sur f à la double-flèche en question $i' \rightrightarrows f(k)$, on trouve [page 229]
$w : k \longrightarrow \bar{k}$,



telle que

$$\underbrace{f(w)(f(u_1)u')}_{=f(wu_1)u'} = \underbrace{f(w)(f(v_1)v')}_{f(wv_1)v'}\ ,$$

103. Court-circuit : on sait déjà que $i'\backslash I$ est 0-connexe, d'autre part elle est *localement* filtrante, car coétale sur I qui est filtrante, donc elle est filtrante.

et remplaçant k par $\bar{k}$, et u_1, v_1 par wu_1, wv_1, on trouve ce qu'on veut.

2) PF (2) pour $i'\backslash I$, i.e. on se donne un diagramme ci-contre [ci-dessous],

$$\begin{array}{ccccc} i & \overset{u_1}{\underset{u_2}{\rightrightarrows}} & j & \overset{w}{\dashrightarrow} & j' \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ i' & \xrightarrow{u'} f(i) & \overset{f(u_1)}{\underset{f(u_2)}{\rightrightarrows}} & f(j) \overset{f(w)}{\dashrightarrow} & f(j') \ , \end{array}$$

avec $f(u_1)u' = f(u_2)u'$, soit v' (double-flèche dans $i'\backslash I$ de (i, u') dans (j, v')), on veut l'égaliser à droite. Or I étant filtrant, il existe $w : j \longrightarrow j'$ telle que $wu_1 = wu_2$, or cette flèche définit une flèche $(j, v') \longrightarrow (j', f(w')v')$, qui égalise la double-flèche donnée.

b $\Longrightarrow$ b′ est clair.

b) $\Longrightarrow$ a). Comme les $i'\backslash I$ sont filtrantes, donc 0-connexes, f est cofinal, il reste à prouver que I est filtrant, donc à vérifier PF 0 (I 0-connexe), PF 1, PF 2 pour I. I est 0-connexe, car I' l'est, et f cofinal, i.e. $\mathbf{W}_0$-coasphérique, d'où PF 0.

[page 230]

Prouvons PF 1, i.e. que si $\begin{array}{ccc} & & i_1 \\ & \nearrow & \\ i_0 & & \\ & \searrow & \\ & & i_2 \end{array}$ est donné, on peut compléter en un carré commutatif.

$$\begin{array}{ccccc} & & i_1 & & \\ & \overset{u_1}{\nearrow} & & \overset{v_1}{\searrow} & \\ i_0 & & & & i_3 \\ & \underset{u_2}{\searrow} & & \underset{v_2}{\nearrow} & \\ & & i_2 & & \end{array} \qquad \begin{array}{ccccc} & & f(i_1) & & \\ & \overset{f(u_1)}{\nearrow} & & \overset{f(v_1)}{\searrow} & \\ f(i_0) & & & & f(i_3) \\ & \underset{f(u_2)}{\searrow} & & \underset{f(v_2)}{\nearrow} & \\ & & f(i_2) & & \end{array}$$

p. 85

Mais considérons les objets $\xi_1 = (i_1, f(u_1))$, $\xi_2 = (i_2, f(u_2))$ de $f(i_0)\backslash I$, et utilisant PF 1′ pour cette catégorie, on trouve $\xi_3 = (i_3, w')$ dans ladite catégorie, et des flèches de ξ_1, ξ_2 dans ξ_3, i.e. $v_1 : i_1 \longrightarrow i_3$, [$v_2 : i_2 \longrightarrow i_3$,] telles que $\underbrace{f(v_1)f(u_1)}_{f(v_1u_1)} = w'$, $\underbrace{f(v_2)f(u_2)}_{f(v_2u_2)} = w'$, donc

$$f(v_1u_1) \ = \ f(v_2u_2) \ .$$

Ainsi, on a une double-flèche $i_0 \overset{v_1u_1}{\underset{v_2u_2}{\rightrightarrows}} i_3$, égalisée par f. Si on prouve PF 2 sur I, on trouve $i_3 \xrightarrow{\alpha} \bar{i}_3$ telle que $\alpha(v_1u_1) = \alpha(v_2u_2)$, i.e. $(\alpha v_1)u_1 = (\alpha v_2)u_2$, et quitte à remplacer i_3 par $\bar{i}_3$, v_1, v_2 par αv_1, αv_2, on a gagné.

Reste à prouver PF 2 sur I, i.e. égaliser une double-flèche

$$i_0 \ \overset{v_1}{\underset{v_2}{\rightrightarrows}} \ i_1 \ .$$

[page 231]

Or I' satisfaisant à PF 2, on peut égaliser la double-flèche $f(u_1)$, $f(u_2)$ par une flèche $f(i_1) \xrightarrow{v'} i'$ dans I', et comme $i'\backslash I$ non vide, on peut supposer que i' est de la forme $f(i_2)$.

$$\begin{array}{ccccc} i_0 & \underset{u_2}{\overset{u_1}{\rightrightarrows}} & i_1 & \longrightarrow & i_2 \\ \downarrow & & & & \\ f(i_0) & \underset{f(u_2)}{\overset{f(u_1)}{\rightrightarrows}} & f(i_1) & \xrightarrow{v'} & f(i_2) \end{array}$$

Admettons pour un instant la condition F 3 de c), que nous allons appliquer à (i_1, i_2, v'). Il existe donc $i_2 \xrightarrow{v} \bar{i}_2$, $w : i_1 \longrightarrow \bar{i}_2$ tels que l'on ait $f(w)v' = f(v)$. Il s'ensuit que $f(w)$ égalise $f(u_1)$ et $f(u_2)$, i.e. qu'on a $f(wu_1) = f(wu_2)$, i.e. la double-flèche initiale est remplacée par $(\bar{u}_1 = wu_1, \bar{u}_2 = wu_2)$, telle que $f(\bar{u}_1) = f(\bar{u}_2)$. En somme, on est ramené au cas d'une double-flèche (u_1, u_2) telle que $f(u_1) = f(u_2)$, soit v'. Mais alors soit $\xi_1 = (i_0, v')$, $\xi_0 = (i_0, \mathrm{id}_{f(i_0)})$, on a donc une double-flèche $(u_1, u_2) : \xi_0 \rightrightarrows \xi_1$ dans $f(i_0)\backslash I$. Cette catégorie est filtrante, donc cette double-flèche est égalisable à droite, ce qui implique aussitôt que la double-flèche (v_1, v_2) *dans* I est aussi égalisable à droite. [page 232]

Donc il reste à prouver que b′) implique la condition F 3. Mais considérons les deux objets $\xi_0 = (i_0, \mathrm{id}_{f(i_0)})$, $\xi_1 = (i_1, u')$ de $f(i_0)\backslash I$, et utilisons la condition de filtration PF 1 sur cette catégorie, donc on trouve un objet $\xi_2 = (i_2, v')$, et deux flèches $\begin{array}{ccc} \xi_0 & & \\ & \searrow^{w} & \\ & & \xi_2 \\ & \nearrow_{v} & \\ \xi_1 & & \end{array}$, i.e. $i_0 \xrightarrow{w} i_2$ et $i_1 \xrightarrow{v} i_2$ telles qu'on ait $f(w)\mathrm{id}_{i_0} = f(v)u' = v'$, d'où $f(w) = f(v)u'$, ce qui est la condition F 3. p. 86

$$\begin{array}{ccccc} & & w & & \\ & \overset{\cdots\cdots\cdots}{\frown} & & & \\ i_0 & & i_1 & \overset{v}{\cdots\cdots\rightarrow} & i_2 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ f(i_0) & \xrightarrow{u'} & f(i_1) & & f(i_2) \\ & \underset{\cdots\cdots\cdots}{\smile} & & & \\ & & v' & & \end{array}$$


Ainsi on a établi

$$\text{a} \iff \text{b} \iff \text{b}' ,$$

prouvons maintenant


a $\Longrightarrow$ c. On sait déjà que a) implique I' filtrante, et il reste à établir F 3. Or I étant filtrante, il existe des flèches $\begin{array}{ccc} i_0 & & \\ & \searrow^{w} & \\ & & i_2 \\ & \nearrow_{v} & \\ i_1 & & \end{array}$. On n'a pas forcément $f(w) = f(v)u'$, on a là une double-flèche $f(i_0) = f(i_1)$ dans I'. Mais par la condition F 2 sur f, il existe $i_2 \xrightarrow{\alpha} \bar{i}_2$ dans I telle que $f(\alpha)$ égalise ladite double-flèche, donc $f(\underbrace{\alpha w}_{\bar{w}}) = f(\underbrace{\alpha v}_{\bar{v}})u'$, et quitte à remplacer i_2 par $\bar{i}_2$, et w, v par $\bar{w} = \alpha w$, $\bar{v} = \alpha v$, on gagne. [page 233]

Reste à prouver (pour la partie 1°) que si f est *fidèle*, alors c) $\Longrightarrow$ b). Il reste donc à prouver que c) implique que pour i' dans I', $i'\backslash I$ est filtrante. On sait déjà par F 1 que $i'\backslash I$ est non vide, il reste à prouver les conditions PF 1′, PF 2 pour $i'\backslash I$. Comme I' filtrante, l'on peut compléter



et par F 1 on peut supposer j' de la forme $f(i_3)$.

p. 87



Appliquant F 3 à i_1, i_3, v'_1, on peut supposer (quitte à remplacer i_3 par $\bar{i}_3$) que v'_1 provient d'un $v_1 : i_1 \longrightarrow i_3$. Appliquant à nouveau F 3 à i_2, i_3, v'_2, on peut supposer que v'_2 également provient d'un $v_2 : i_2 \longrightarrow i_3$. Alors $\xi_3 = (i_3, v'_1u'_1 = v'_2u'_2)$ est un majorant commun de $\xi_1 = (i_1, u'_1)$, $\xi_2 = (i_2, u'_2)$. [page 234]

Prouvons enfin PF 2 pour $i'\backslash I$, donc on a un diagramme ci-contre [ci-dessous] avec $f(u_1)u' = f(u_2)u'$ (double-flèche dans $i'\backslash I$), on veut égaliser dans $i'\backslash I$.



$$i' \xrightarrow{u'} f(i_0) \underset{f(u_2)}{\overset{f(u_1)}{\rightrightarrows}} f(i_1) \overset{v'}{\dashrightarrow} f(i_2) \longrightarrow f(\bar{i}_2)$$

Mais I' étant filtrante, on peut égaliser $(f(u_1), f(u_2))$ par $f(i_1) \longrightarrow j'$, et à cause de F 1 on peut supposer $j' = f(i_2)$. Appliquant encore F 3 à (i_1, i_2, v'), on trouve $i_1 \longrightarrow \bar{i}_2$ tel que $f(w)$ égalise $f(u_1)$, $f(u_2)$:

$$f(wu_1) \;=\; f(wu_2)\ .$$

Mais f étant *fidèle*, cela implique $wu_1 = wu_2$, et on a donc égalisé la double-flèche de $i'\backslash I$ par $w : (i_1, -) \longrightarrow (\bar{i}_2, -)$.

[page 235]

4.9.6.8. N.B.

1°) Si on ne suppose pas que f soit fidèle, on voit que c) implique pourtant que les $i'\backslash I$ satisfont PF 1′ (elles sont donc pseudo-filtrantes et 0-connexes). Donc f est cofinal.

On voit, par le même argument, que I satisfait PF 1′, i.e. est pseudo-filtrante. Ainsi, si on introduit la condition :

(b″) I' est filtrante, les $i'\backslash I$ ($i \in \mathrm{Ob}\, I'$) sont pseudo-filtrantes (i.e. satisfont PF 1′) (donc f cofinal).

On trouve les implications

$$(\mathrm{a} \iff \mathrm{b} \iff \mathrm{b}') \implies (\mathrm{b}'' \iff \mathrm{c})\ ,$$

et les conditions équivalentes c), b″) impliquent que I est également pseudo-filtrante, et que pour toute double-flèche $\xi_0 \overset{u_1}{\underset{u_2}{\rightrightarrows}} \xi_1$ dans un $i'\backslash I$ ou dans I, il existe une flèche $\xi_1 \xrightarrow{v} \xi_2$ dans la même catégorie, telle que vu_1 et vu_2 : $\xi_0 \rightrightarrows \xi_2$ aient *même image dans* I'. Donc si f est fidèle, alors ces conditions c, c′ [plutôt b″] p. 88 impliquent que I et les $i'\backslash I$ satisfont aussi la condition PF 2 de la double-flèche, donc sont filtrantes, donc dans ce cas les cinq conditions a) b) b′) c) c′) [plutôt b″)] sont équivalentes. Mais aussi lorsque I est ordonnée, on sait [?] que la condition de la double-flèche dans I est satisfaite automatiquement.

[page 236]

2°) Notons aussi que dans la condition b′), on ne peut supprimer l'hypothèse que I' satisfait PF 2 (en plus de I' 0-connexe et les $i'\backslash I$ filtrantes). Pour le voir, prenons $I' = I$, $f = \mathrm{id}$, donc l'hypothèse a ($\iff$ b $\iff$ b′) signifie que I est filtrante, f étant bien sûr cofinal. Mais b′ affaiblie signifie que I est 0-connexe et les $i\backslash I$ sont filtrantes, et on sait que ceci n'implique *pas* que I soit filtrante, même si on suppose I pseudo-filtrante. Un exemple simple est donné par I définie par

$$\mathrm{Ob}\, I \ = \ \mathbf{N}\ , \qquad \mathrm{Hom}_I(i,j) \ = \ \begin{cases} \emptyset & \text{si } i > j \\ \{\mathrm{id}_i\} & \text{si } i = j \\ \{\pm 1\} & \text{si } i < j\ , \end{cases}$$

la composition des flèches se faisant par la multiplication des signes $\varepsilon_{k,j}\varepsilon'_{j,i} = (\varepsilon\varepsilon')_{k,i}$ (en posant $\mathrm{id}_i = (+1)_{i,i}$). Les catégories $i\backslash I$ sont isomorphes entre elles et sont *ordonnées* et pseudo-filtrantes, donc filtrantes, d'autre part, I est pseudo-filtrante, pourtant elle n'est pas filtrante, car ne satisfait pas PF 2.

3°) D'autre part, si f n'est pas fidèle, alors c) (équivalente à b'') n'implique pas a), comme on voit en prenant $I' = e$; alors b″) équivaut à I pseudo-filtrante, qui n'implique pas que I soit filtrante.

4.9.6.9. Démonstration de 4.9.6.3, partie 2°.

[page 237]

C'est essentiellement "la même" démonstration que pour la partie 1°).

$\mathrm{a}_\pi) \implies \mathrm{b}_\pi)$. On peut court-circuiter la démonstration directe, en regardant, pour un ensemble A de cardinal $\leqslant \pi$, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} I & \xrightarrow{\delta_A} & I^A \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f^A} \\ I' & \xrightarrow{\delta_{A'}} & I'^A \end{array}$$

[plutôt δ'_A]. Comme f est cofinal, I filtrante, f^A est aussi cofinal (4.9.8.5), d'autre part, I grande devant π signifie que δ_A est cofinal ($\forall$ A avec $\operatorname{card} A \leqslant \pi$). Donc $f^A\delta_A = \delta_{A'}f$ est cofinal, donc $\delta_{A'}f$ et f le sont, donc $\delta_{A'}$ aussi, ce qui signifie que I' est grande devant π.

Reste à prouver que pour i' dans I', $i'\backslash I$ est grande devant π. Cela résulte du fait que $i'\backslash I \xrightarrow{p} I$ est coétale, que $i\backslash I$ est 0-connexe, et du

Lemme 4.9.6.9.1. *Soit I une catégorie filtrante (resp. grande devant π). Alors pour toute J sur I coétale sur I et 0-connexe, J est filtrante (resp. grande devant π).*

Le cas filtrant est déjà connu (cf. II …). Pour le cas "grande devant π", on va utiliser p. 89 le

Corollaire 4.9.6.9.2. *Soit J une catégorie. Pour que J soit grande devant π, il faut et il suffit qu'elle soit 0-connexe, et satisfasse PF_π 2 (cf. page 81), ainsi que la variante suivante de PF_π 1′.* [page 238]

PF_π 1) Pour tout objet x_0 de J, $x_0\backslash J$ satisfait PF_π 1′, i.e. pour toute famille de flèches $x_0 \xrightarrow{u_\alpha} y_\alpha$ ($\alpha \in A$, $\operatorname{card} A \leqslant \pi$), existe une flèche $x_0 \xrightarrow{v} z$ et des flèches $v_\alpha : y_\alpha \longrightarrow z$, avec $v_\alpha u_\alpha = v$ $\forall\, \alpha \in A$.

Démonstration. Si J est grande devant π, alors PF_π 1) résulte aussitôt de la conjonction de PF_π 1′ et PF_π 2, d'où le "il faut". Inversement, supposons que J satisfasse PF_π 1, PF_π 2, et soit 0-connexe, il faut prouver qu'elle satisfait PF_π 1′. Mais on sait déjà que les conditions en question, qui impliquent PF 1, PF 2, 0-connexe, impliquent que J est filtrante. Donc si on a une famille $(x_\alpha)_{\alpha\in A}$, $\operatorname{card} A \leqslant \pi$, choisissant un $x_0 \in \operatorname{Ob} J$, on peut pour tout α trouver y_α qui majore x_0 et x_α, d'où des flèches $x_\alpha \searrow y_\alpha \nearrow x_0$, on peut leurs appliquer PF_π 1, d'où des flèches $y_\alpha \longrightarrow z$, et en composant des $x_\alpha \longrightarrow z$, q.e.d.

Prouvons maintenant le lemme. Il suffit (par le corollaire précédent) de prouver que J satisfait à PF_π 1 et PF_π 2. Or PF_π 1 est immédiat, puisque $\forall\, x_0$ dans J, $x_0\backslash J \xrightarrow{\sim} y_0\backslash I$, où y_0 est l'image de x_0 dans I. Quant à PF_π 2, si on a des $x_0 \overset{u_\alpha}{\rightrightarrows} x_1$ dans J, d'où des [page 239] $g(x_0) \overset{g(u_\alpha)}{\rightrightarrows} g(x_1)$, on égalise dans I par $g(x_1) \xrightarrow{w} y$, mais comme g est coétale, $\exists\, x_1 \xrightarrow{v} x_2$ dans J telle que $g(v) = w$, donc on a $g(vu_\alpha) = g(vu_\beta)$ pour $\alpha, \beta \in A$, et comme g est fidèle, on en conclut $vu_\alpha = vu_\beta$, donc v égalise $(u_\alpha)_{\alpha\in A}$, q.e.d.


Prouvons $\mathrm{b}_\pi) \Longrightarrow \mathrm{a}_\pi)$: Si I' et les $i'\backslash I$ sont grandes devant π, alors I l'est aussi (et f est cofinal, les $i'\backslash I$ étant 0-connexes, car filtrantes). Comme on sait déjà que I est 0-connexe (I' l'étant et f cofinal), il reste, par 4.9.6.9.2, à vérifier PF_π 1 et PF_π 2.

La démonstration donnée dans 1° pour le cas similaire filtrant (implication $\mathrm{b}' \Longrightarrow \mathrm{a}$, [page 240] pages 231-232), s'applique mutatis mutandis. (La propriété F 3 a déjà été établie dans la partie 1°), comme conséquence de b, et peut donc être utilisée librement.)

Donc on a prouvé $\mathrm{a}_\pi \Longleftrightarrow \mathrm{b}_\pi$. Prouvons $\mathrm{a}_\pi \Longrightarrow \mathrm{c}_\pi$. On sait déjà que a_π implique que I' est grande devant π, et bien sûr la condition F 1, reste à établir la validité de la condition $\mathrm{F}\ 3_\pi$. Par F 3, $\forall\, \alpha \in A$ on peut trouver j_α dans I et $w^0_\alpha : i_\alpha \longrightarrow j_\alpha$, $v^0_\alpha : i \longrightarrow j$ tels que

$$f(v_\alpha)u'_\alpha \;=\; f(w_\alpha)\ .$$

p. 90



Comme I satisfait PF 1_π (cf. 4.9.6.9.2), il existe h dans I et des $\lambda_\alpha : j_\alpha \longrightarrow j$, tels que $\lambda_\alpha v_\alpha^0 = \lambda$ soit indépendant de α, alors on a pour tout $\alpha \in A$

$$f(\lambda)u'_\alpha \Big(= f(\lambda_\alpha) \underbrace{f(v_\alpha)u'_\alpha}_{f(w_\alpha)} \Big) = f(\underbrace{\lambda_\alpha w_\alpha^0}_{w_\alpha}) ,$$

donc $\lambda : i \longrightarrow j$ et les $w_\alpha = \lambda_\alpha w_\alpha^0 : i_\alpha \longrightarrow j$ satisfont aux conditions voulues.

$\mathrm{c}_\pi \Longrightarrow \mathrm{b}''_\pi$. Il faut prouver que si c_π est satisfait, alors les $i'\backslash I$ satisfont PF $1'_\pi$.

Soit donc $\xi_\alpha = (i_\alpha, u'_\alpha)$ ($\alpha \in A$, $\operatorname{card} A \leqslant \pi$) une famille d'éléments de $i'\backslash I$, comme I' satisfait à PF 1_π (cf. 4.9.6.9.2), il existe j' dans I' et des flèches $u''_\alpha : f(i_\alpha) \longrightarrow j'$, telles que $u''_\alpha u'_\alpha = u'$ indépendant de α. Comme f satisfait F 1, on peut supposer que j' est de la forme $f(j)$. Appliquant F 3_π aux i_α, j, u''_α, on trouve $v : j \longrightarrow k$ et des $w_\alpha : i_\alpha \longrightarrow k$, tels que [page 241]


$$f(v)u''_\alpha = f(w_\alpha) \qquad \forall\, \alpha \in A ,$$

d'où

$$f(w_\alpha)u'_\alpha = f(v) \underbrace{u''_\alpha u'_\alpha}_{u'} = f(v)u' \qquad \text{indépendant de } \alpha,$$

soit w', donc les w_α définissent une flèche des ξ_α dans $\xi = (k, w')$, q.e.d.

$\mathrm{b}''_\pi \Longrightarrow \mathrm{b}_\pi$ si f est fidèle. On est ramené à prouver que si b''_π est satisfait, f fidèle, alors les catégories $i'\backslash I$, dont on sait déjà qu'elles satisfont PF 1_π, satisfont également PF 2_π. Soient donc $\xi = (i, u')$, $\eta = (j, v')$ deux objets de $i'\backslash I$, et $(u_\alpha)_{\alpha\in A}$ une famille de flèches $\xi \longrightarrow \eta$ (avec $\operatorname{card} A \leqslant \pi$), donc des flèches dans I telles que $f(u_\alpha)u' = v'$ $\forall\, \alpha \in A$.



Comme I' est grande devant π, on peut égaliser par $f(j) \longrightarrow k'$, et comme $k'\backslash I \neq \emptyset$, on peut supposer k' de la forme $f(k)$. Or d'après l'implication $\mathrm{b}'' \Longrightarrow \mathrm{a} \Longrightarrow \mathrm{c}$ de la partie 1°) (cf. page 235) et comme $\mathrm{b}''_\pi \Longrightarrow \mathrm{b}''$, on sait déjà que f satisfait à F 3. En l'appliquant à j, k et $f(j) \longrightarrow f(k)$, on peut supposer que $f(j) \longrightarrow f(k)$ provient de $v : j \longrightarrow k$. [page 242] [p. 91] On aura donc $f(v)f(u_\alpha) = f(v)f(u_\beta)$ $\forall\, \alpha, \beta \in A$, donc $f(vu_\alpha) = f(vu_\beta)$. Comme f est fidèle, cela implique que $vu_\alpha = vu_\beta$, i.e. v égalise les u_α. D'ailleurs, v peut être considérée comme une flèche *dans* $i'\backslash I$, de (j, v') dans $(k, f(v)v')$. Q.e.d.

4.9.6.10. Quand I est *ordonné*, alors les quatre conditions a_π, b_π, c_π, b''_π sont équivalentes, car les $i'\backslash I$ sont ordonnés, et il est claire qu'alors $\mathrm{b}''_\pi \Longleftrightarrow \mathrm{b}_\pi$.

[page 243]

4.10 Le théorème de représentation indicielle : démonstration

On va d'abord reformuler le théorème 4.9.3 sous forme plus générale, en termes de catégories *cofibrées*. Soit

$$\mathcal{D} \longrightarrow J \tag{4.10.1}$$

un foncteur cofibrant, où J est équivalent à une petite catégorie, et de même pour les catégories fibres $\mathcal{D}_j$ ($j \in \mathrm{Ob}\, J$). On se donne un cardinal infini π. Soit

$$\mathcal{M}_j \;=\; \mathrm{Ind}_\pi(\mathcal{D}_j) \qquad (j \in \mathrm{Ob}\, J)\ , \tag{4.10.2}$$

alors les $\mathcal{M}_j$ sont les fibres d'une catégorie cofibrée $\mathcal{N}$ sur J, que je désigne aussi par $\mathrm{Ind}_\pi(\mathcal{D}/J)$, donc on pose

$$\mathcal{N} \;=\; \mathrm{Ind}_\pi(\mathcal{D}/J)\ . \tag{4.10.3}$$

On a donc une inclusion pleinement fidèle de catégories cofibrées sur J

$$\mathcal{D} \hookrightarrow \mathcal{N}\ ,$$

d'où une inclusion

$$\underline{\Gamma}(\mathcal{D}/J) \longrightarrow \underline{\Gamma}(\mathcal{N}/J)\ . \tag{4.10.4}$$

Dans le cas où $\mathcal{D}$ est de la forme $C \times J$, alors $\mathcal{N}$ est de la forme $\mathcal{M} \times J$, avec $\mathcal{M} = \mathrm{Ind}_\pi(C)$, et l'inclusion (4.10.3) n'est autre (à isomorphisme près) que [page 244]

$$\underline{\mathrm{Hom}}(J, C) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(J, \mathcal{M})\ .$$

Revenant au cas général, on voit encore que :

1°) Le deuxième membre de (4.10.3) est stable par $\varinjlim$ grandes devant π, lesquelles se calculent fibre à fibre.

2°) Le premier membre de (4.10.3) est formé d'objets π-accessibles du second.

D'où un foncteur *pleinement* fidèle

$$\mathrm{Ind}_\pi(\underline{\Gamma}(\mathcal{D}/J)) \hookrightarrow \underline{\Gamma}(\mathcal{N}/J)\ . \tag{4.10.4}$$

([104]).

Théorème 4.10.1. *Supposons qu'on ait* p. 92

$$\mathrm{card}\,\mathrm{réd}\, J \;\leqslant\; \pi\ , \tag{4.10.1.1}$$

et qu'il existe un ordinal limite α, tel que :

1) $\mathrm{card}\,\alpha \leqslant \pi$.

2) Les limites inductives de type $I_\alpha = \{\beta \mid \beta < \alpha\}$ sont représentables dans les catégories $\mathcal{D}_j$ ($j \in \mathrm{Ob}\, J$), et pour toute flèche $\alpha : j \longrightarrow j'$ dans J [trop de α], $\alpha^* : \mathcal{D}_j \longrightarrow \mathcal{D}_{j'}$ commute auxdites limites. [page 245]

Alors le foncteur canonique pleinement fidèle (4.10.4) est une équivalence de catégories.

Ceci va être contenu dans le résultat un peu plus précis :

Corollaire 4.10.2. *Les hypothèses étant celles de 4.10.1, avec en plus*

$$\mathrm{card}\, J \;\leqslant\; \pi \tag{4.10.2.1}$$

104. [Les numéros 4.10.1 à 4.10.4 sont utilisés deux fois.]

(qui équivaut à (4.10.1.1) si J est réduite, cas auquel on peut évidemment se réduire dans 4.10.1). Soit $\varphi \in \mathrm{Ob}\,\underline{\Gamma}(\mathcal{N}/J)$, et considérons le foncteur canonique fidèle *:*

$$\underline{\Gamma}(\mathcal{D}/J)/\varphi \longrightarrow \prod_{j\in J} C_j/\varphi(j)\ . \tag{4.10.2.2}$$

Alors la catégorie source $\underline{\Gamma}(\mathcal{D}/J)/\varphi$ est grande devant π, et le foncteur envisagé est cofinal.

[page 246]

De ceci, le théorème résulte de façon essentiellement soritale, tout comme dans le cas particulier 4.9.3 précédent (cf. page 223) ([105]).

Pour établir le corollaire, comme la catégorie but de (4.10.2.2) est grande devant π, comme produit de telles catégories (cf. 4.9.6.6, page 228), et le foncteur fidèle, il suffit en vertu de 4.9.6.3, 2°, de vérifier les conditions F 1 et F 3_π (page 225) pour le foncteur envisagé.

On va interpréter le foncteur (4.10.2.2) en termes d'une catégorie cofibrée

$$\mathcal{D}_\varphi \longrightarrow J\ , \tag{4.10.5}$$

dont les fibres sont les $\mathcal{D}_j/\varphi(j)$. On note que si $\alpha : j \longrightarrow j'$ est une flèche de J, alors on a

$$\begin{cases} \alpha_* : C_j \longrightarrow C_{j'} \\ \text{et}\ \ \alpha_*(\varphi(j)) \longrightarrow \varphi(j')\ , \end{cases}$$

d'où un foncteur composé

p. 93

[page 247]

$$C_j/\varphi(j) \longrightarrow C_{j'}/\alpha^*(\varphi(j)) \longrightarrow C_{j'}/\varphi(j')\ ,$$

avec transitivité à isomorphisme canonique près etc. On note que l'on a un isomorphisme canonique

$$\underline{\Gamma}(\mathcal{D}_\varphi/J) \simeq \underline{\Gamma}(\mathcal{D}/J)/\varphi\ ,$$

de sorte que le foncteur fidèle canonique (4.10.2.2) s'identifie au foncteur

$$\underline{\Gamma}(\mathcal{D}_\varphi/J) \longrightarrow \prod_{j\in \mathrm{Ob}\,J} (\mathcal{D}_\varphi)_j\ . \tag{4.10.6}$$

Le corollaire 4.10.2 sera alors une conséquence du résultat plus général suivant :

Corollaire 4.10.3. *Soit $\mathcal{E} \longrightarrow J$ un foncteur cofibrant, et π un cardinal infini. On suppose :*

a) $\mathrm{card}\, J \leqslant \pi$.

b) Les catégories fibres $\mathcal{E}_j$ sont équivalentes à des petites catégories, et grandes devant π.

c) Il existe un ordinal limite tel que :

1°) $\mathrm{card}\,\alpha \leqslant \pi$.

[page 248]

2°) Les limites inductives de type I_α sont représentables dans les catégories $\mathcal{E}_j$, et les foncteurs cochangement de base $\lambda_* : \mathcal{E}_j \longrightarrow \mathcal{E}_{j'}$ y commutent. (C'est le cas p.ex. si les limites inductives filtrantes dénombrables *sont représentables dans les $\mathcal{E}_j$, et si les α_* y commutent ; ou s'il existe un cardinal $\pi_0 \leqslant \pi$ et un cardinal $\pi'_0 > \pi_0$, tel que les limites inductives grandes devant π_0 et de cardinal $\leqslant \pi'_0$ soient représentables dans les $\mathcal{E}_j$, et que les α_* y commutent.)*

105. Un peu court ! Il faudrait expliciter l'argument avec soin – il y en a pour deux ou trois pages !

Sous ces conditions, le foncteur canonique fidèle

$$\underline{\Gamma}(\mathcal{E}/J) \longrightarrow \prod_{j\in \mathrm{Ob}\, J} \mathcal{E}_j \tag{4.10.3.1}$$

est cofinal, et la catégorie source est grande devant π.

Il est ± immédiat que les hypothèses de 4.10.1 impliquent que celles de 4.10.3 sont satisfaites pour $\mathcal{E} = \mathcal{D}_\varphi \longrightarrow J$ (4.10.5). Pour ceci, on utilise le [page 249]

Lemme 4.10.4. *Soient C une catégorie, et π un cardinal infini. Alors le foncteur d'inclusion $C \longrightarrow \mathcal{M} \overset{\text{déf}}{=} \mathrm{Ind}_\pi C$ commute aux $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi$.*

Soit en effet I telle que $\mathrm{card}\, I \leqslant \pi$, et $(x_i)_{i\in I}$ un système inductif sur C, y ayant une limite x. Soit d'autre part $X = \varinjlim_{I'} \xi_{i'}$ un objet de $\mathrm{Ind}_\pi C$, avec I' grande devant π. On a donc p. 94

$$\begin{aligned}
\mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(x, X) &\simeq \varinjlim_{I'} \mathrm{Hom}(x, \xi_{i'}) \\
&\simeq \varinjlim_{I'} \varprojlim_{I} \mathrm{Hom}(x_i, \xi_{i'}) \\
&\overset{\text{SGA 4 I 9.8}}{\simeq} \varprojlim_{I} \underbrace{\varinjlim_{I'} \mathrm{Hom}(x_i, \xi_{i'})}_{\simeq \mathrm{Hom}(x_i, X)} \\
&\simeq \varprojlim_{I} \mathrm{Hom}(x_i, X)\ ,
\end{aligned}$$

ce qui prouve que x est aussi une $\varinjlim$ des x_i dans $\mathcal{M}$ tout entier.

Ainsi, on est réduit à prouver 4.10.3. Appliquant 4.9.6 2°, on est ramené à prouver, [250] pour le foncteur envisagé, les conditions F 1 et F 3_π (page 225).

Dans les arguments qui suivent, on va utiliser les conditions a), b) de 4.10.3, mais non, pour l'instant, la condition c.

Lemme 4.10.5. *Sous les conditions de 4.10.3 a) b) (à l'exclusion de c), pour que (4.10.3.1) soit cofinal et $\Gamma(\mathcal{E}/J)$ grande devant π, il faut et il suffit que le foncteur envisagé satisfasse à la condition F 1, rappelée ci-dessous, et à la variante F′ 1 de celle-ci énoncée ci-dessous :*

F 1) *Pour tout système $(X(j))_{j\in \mathrm{Ob}\, J}$ d'éléments $X(j) \in \mathrm{Ob}\, \mathcal{E}_j$, existe une* section *$G$ de $\mathcal{E}$ sur J, et un système de flèches*

$$X(j) \longrightarrow G(j) \qquad (j \in ObJ)\ . \tag{4.10.5.1}$$

F′1) *Sous les conditions de* F 1 *précédent, supposons de plus une section F de $\mathcal{E}$ sur J et un système de flèches* [251]

$$F(j) \longrightarrow X(j) \qquad (j \in \mathrm{Ob}\, J)\ ,$$

alors G et le système de flèches (4.10.5.1) peut être choisi de telle façon que les flèches composées

$$F(j) \longrightarrow X(j) \longrightarrow G(j)$$

définissent un homomorphisme de sections

$$F \longrightarrow G$$

(dans la catégorie $\underline{\Gamma}(\mathcal{E}/J)$).

([106]).

Démonstration. Il faut voir que F 1 & F′ 1 équivaut à F 1 & F 3_π. L'implication $\Longleftarrow$ est ± immédiate, c'est de $\Longrightarrow$ que nous aurons besoin, donc

$$\text{F 1 \& F}' \text{ 1} \quad \Longrightarrow \quad \text{F } 3_\pi \ .$$

Pour ceci, réénonçons F 3_π dans le contexte présent. On se donne une famille $(F_\alpha)_{\alpha\in A}$, card $A \leqslant \pi$, d'objets de $\underline{\Gamma}(\mathcal{E}/J)$, un objet F de la même catégorie, et pour tout j dans Ob J, un système de flèches p. 95

$$F_\alpha(j) \xrightarrow{u_\alpha(j)} F(j) \ ,$$

mais sans supposer que pour α fixé, j variable

cela définisse un homomorphisme de sections $F_\alpha \longrightarrow F$. On cherche une section G de [252] $\mathcal{E}$ sur J, et un homomorphisme de sections $F \longrightarrow G$, tels que pour tout α, le système des composés

$$F_\alpha(j) \longrightarrow F(j) \longrightarrow G(j)$$

définisse un homomorphisme de sections $F_\alpha \longrightarrow G_\alpha$. Soit donc $\lambda : j \longrightarrow j'$ une flèche de J, considérons les carrés (*non commutatifs*)

$$\begin{array}{ccc} F_\alpha(j) & \xrightarrow{u_\alpha(j)} & F(j) \\ {\scriptstyle F_\alpha(\lambda)}\downarrow & ! & \downarrow{\scriptstyle F(\lambda)} \\ F_\alpha(j') & \xrightarrow{u_\alpha(j')} & F(j') \end{array} \qquad (*)$$

(indexés par $\alpha \in A$). Pour j' fixé dans J, le nombre de ces carrés est majoré par card Ob $(J/j') \times$ card $A \leqslant \pi \cdot \pi = \pi$. Il s'ensuit, comme $\mathcal{E}_{j'}$ est grande devant π, qu'il existe un objet $X(j')$ de $\mathcal{E}_{j'}$, et une flèche $v(j') : F(j') \longrightarrow X(j')$ de telle façon que pour tout $\alpha \in A$, et tout $\lambda \in$ Ob J/j', le carré déduit de $(*)$

en composant avec $F(j') \longrightarrow X(j')$ soit commutatif. On fait ce choix pour tout objet [253] j' de J. Appliquons alors F′ 1 à F et au système de flèches $F(j) \xrightarrow{v(j)} X(j)$, on trouve G et un système de flèches

$$w(j) \ : \ X(j) \longrightarrow G(j)$$

de telle façon que les flèches composées

$$w(j)v(j) : \qquad \begin{array}{ccc} F(j) & \longrightarrow & G(j) \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & X(j) & \end{array}$$

définissent un homomorphisme de sections. Je dis que cet homomorphisme a la propriété voulue pour F 3_π, i.e. que pour tout $\alpha \in A$, le système des composés

$$F_\alpha(j) \longrightarrow F(j) \longrightarrow G(j)$$

(pour $j \in$ Ob J variable) définit un homomorphisme de sections $F_\alpha \longrightarrow G$. En effet, il suffit pour cela de considérer, pour une flèche λ de J, le diagramme p. 96

[254]

106. **N.B.** Les conditions F 1 et F′ 1 équivalent à dire que le foncteur envisagé satisfait aux conditions F1 et F3, vu encore (en vertu de 4.9.6.3, 1°) que $\underline{\Gamma}(\mathcal{E}/J)$ est *filtrante* sans plus, et le foncteur fidèle (4.10.3.1) cofinal. Cela implique déjà que $\underline{\Gamma}(\mathcal{E}/J)$ est grande devant π.

$$\begin{array}{ccccccc} F_\alpha(j) & \xrightarrow{u_\alpha(j)} & F(j) & \xrightarrow{v(j)} & X(j) & \xrightarrow{w(j)} & G(j) \\ {\scriptstyle F_\alpha(\lambda)}\downarrow & ! & {\scriptstyle F(\lambda)}\downarrow & \text{comm.} & & & \downarrow{\scriptstyle G(\lambda)} \\ F_\alpha(j') & \xrightarrow{u_\alpha(j')} & F(j') & \xrightarrow{v(j')} & X(j') & \xrightarrow{w(j')} & G(j') \ . \end{array}$$

Le lemme 4.10.5 étant prouvé, tout revient donc à prouver la condition F 1, et son complément F′ 1, qui se prouvera dans la même haleine.

4.10.6. On se donne donc le système d'objets

$$X(j) \ \in \ \mathrm{Ob}\,\mathcal{E}_j \qquad (j \in \mathrm{Ob}\,J) \ , \tag{4.10.6.1}$$

et le cas échéant, un objet F de $\underline{\Gamma}(\mathcal{E}/J)$, et un système de flèches

$$F(j) \xrightarrow{u_j} X(j) \ , \tag{4.6.10.2}$$

et on se propose de construire G de $\underline{\Gamma}(\mathcal{E}/J)$, et un système de flèches

$$X(j) \xrightarrow{w(j)} G(j) \ , \tag{4.10.6.3}$$

de telle façon que (si on a la donnée supplémentaire des $u(j)$) les flèches composées

$$F(j) \xrightarrow{u(j)} X(j) \xrightarrow{v(j)} G(j)$$

soient fonctorielles en j.

[255]

On va faire une construction transfinie sur les ordinaux α tels que

$$\mathrm{card}\,\alpha \ \leqslant \ \pi$$

d'un système inductif

$$(X_\alpha(j))_\alpha$$

d'objets de $\prod_{j\in \mathrm{Ob}\,J} \mathcal{E}_j$. On va d'abord ignorer la donnée éventuelle (4.10.6.2). On posera

$$X_0(j) \ = \ X(j) \ , \tag{4.10.6.4}$$

et on va donner la prescription pour passer de X_α à $X_{\alpha+1}$. La construction inclura aussi, pour toute flèche $\lambda : j' \longrightarrow j$ de J et tout α, la donnée de

$$X_\alpha(j) \xrightarrow{t_\alpha(\lambda)} X_{\alpha+1}(j) \ , \qquad \text{flèche (dans } \mathcal{E}) \text{ au dessus de } \lambda, \tag{4.10.6.5}$$

et ces flèches, et les flèches de transition $X_\alpha(j) \xrightarrow{\tau_\alpha(j)} X_{\alpha+1}(j)$, doivent satisfaire aux trois conditions suivantes :

p. 97

[256]

(i) Si λ est une flèche identique $\mathrm{id}_J : J \longrightarrow J$, alors $\boxed{t_\alpha(\lambda) = \tau_\alpha(j).}$


(ii) Dans le diagramme

$$\begin{array}{ccccccccc} X_\alpha(j') & \xrightarrow{\tau_\alpha(j')} & X_{\alpha+1}(j') & \longrightarrow & X_{\alpha+2}(j') & \longrightarrow & X_{\alpha+3}(j') & \longrightarrow & \\ & \searrow^{t_\alpha(\lambda)} & \bullet & & \searrow^{t_{\alpha+1}(\lambda)} & & \searrow & \cdots & \\ X_\alpha(j') & \longrightarrow & X_{\alpha+1}(j') & \xrightarrow{\tau_{\alpha+1}(j')} & X_{\alpha+2}(j') & \xrightarrow{\tau_{\alpha+2}(j')} & X_{\alpha+3}(j') & \longrightarrow & , \end{array}$$

$\tau_{\alpha+2}(j)$ "rend le carré $\bullet$ commutatif", i.e. égalise $t_{\alpha+1}(\lambda)\tau_\alpha(j')$ et $\tau_{\alpha+1}(j)t_\alpha(\lambda)$:

$$\boxed{\tau_{\alpha+2}(j)t_{\alpha+1}(\lambda)\tau_\alpha(j') \ = \ \tau_{\alpha+2}(j)\tau_{\alpha+1}(j)t_\alpha(\lambda) \ .}$$

(iii) Si on a deux flèches consécutives $\lambda : j'' \longrightarrow j'$, $\mu : j' \longrightarrow j$, on a donc le diagramme



$$\boxed{\tau_{\alpha+2}(j)t_{\alpha+1}(\mu)t_\alpha(\lambda) \;=\; \tau_{\alpha+2}(j)\tau_{\alpha+1}(j)t_\alpha(\mu\lambda)}$$

Ainsi, pour définir les $X_{\alpha+1}(j)$, il faut tenir compte de toutes ces contraintes. Donc : [257]

1°) Pour j fixé, $X_{\alpha+1}(j)$ doit être but des flèches

$$X_\alpha(j') \xrightarrow{t_\alpha(\lambda)} X_{\alpha+1}(j) \ ,$$

pour les $\lambda \;:\; j' \longrightarrow j$ dans $\mathrm{Ob}\, J/j$ – y compris pour $\lambda = \mathrm{id}_j$, auquel cas $t_\alpha(\lambda) \;:\; X_\alpha(j) \longrightarrow X_{\alpha+1}(j)$ jouera le rôle du morphisme de transition $\tau_\alpha(j)$.

2°) Si α est de la forme $\alpha'+2$, i.e. s'il n'est ni ordinal limite, ni successeur d'un ordinal limite, alors on exige de plus, pour les morphismes de transition $\tau_\alpha(j)$, d'égaliser les couples de flèches prévus dans (ii) et (iii) ci-dessus.

Comme l'ensemble de ces données dans 1°), ou de ces contraintes dans 2°), est de cardinal [258]
$\leqslant \pi$, et que la catégorie $\mathcal{E}_j$ est grande devant π, on voit qu'on peut bel et bien trouver $X_{\alpha+1}(j)$ et des $t_\alpha(\lambda) \;:\; X_\alpha(j') \longrightarrow X_{\alpha+1}(j)$, de façon à satisfaire (si $\alpha = \alpha'+2$) aux contraintes rappelées dans 2°. Cela achève la description de la construction de $X_{\alpha+1}(\bullet)$, en termes de $X_\beta(\bullet)$ ($\beta \leqslant \alpha$) et des $t_\beta(\lambda)$ ($\beta < \alpha$).

Il faut enfin définir $X_\alpha(\bullet)$ pour α un ordinal limite. Cette fois, on lui demande seulement de recevoir les $X_\beta(\bullet)$ pour $\beta < \alpha$. Comme l'ensemble I_α de ces β est de cardinal $\leqslant \pi$, et que les $\mathcal{E}_j$ sont grandes devant π, on peut bel et bien trouver les $X_\alpha(j)$.

On a donc prouvé l'essentiel du p. 98

Lemme 4.10.7. [259] *Sous les conditions de 4.10.3 a) b), et pour un système $X(\bullet) \in \mathrm{Ob} \prod_{j\in \mathrm{Ob}\, J} \mathcal{E}_j$ donné, on peut trouver un système inductif $(X_\alpha(i))_\alpha$ dans $\prod \mathcal{E}_j$, indexé par les ordinaux α telle que $\mathrm{card}\,\alpha \leqslant \pi$, et pour toute flèche $\lambda : j' \longrightarrow j$ dans J des flèches $t_\alpha(\lambda) : X_\alpha(j') \longrightarrow X_\alpha(j)$, de telle façon que l'on ait les conditions suivantes.*

1°) $X_0(\bullet) = X(\bullet)$.

2°) Les conditions (i) (ii) (iii) (p. 256).

3°) Si on se donne F dans $\mathrm{Ob}\,\underline{\Gamma}(\mathcal{E}/J)$, et des flèches $u(j) : F(j) \longrightarrow X(j) = X_0(j)$, on peut supposer que pour toute flèche $\lambda : j' \longrightarrow j$ dans J, on a

$$\begin{array}{ccccc} F(j') & \xrightarrow{u(j')} & X_0(j') & & \\ {\scriptstyle F(\lambda)}\downarrow & & & \searrow^{t_0(\lambda)} & \\ F(j) & \xrightarrow{u(j)} & X_0(j) & \xrightarrow{\tau_0(j)} & X_1(j) \end{array} \qquad \text{commutatif.} \qquad (*)$$

Il reste seulement à prouver ce dernier complément 3°. C'est une contrainte unique- [260]
ment sur la construction de $X_1(\bullet)$ et des $t_0(\lambda)$. Supposons donc que l'on ait construit $X_1(\bullet)$ sans tenir compte de cette contrainte. Pour j fixé, il faut donc "rendre commutatif" tous ces carrés, i.e. toutes ces double-flèches $(t_0(\lambda)u(j'), \tau_0(j)u(j)F(\lambda))$ de but $X_1(j)$. [261]

Comme l'ensemble de ces double-flèches est de cardinal $\operatorname{card} \operatorname{Ob} \mathcal{E}/j \leqslant \pi$, on peut trouver $X_1(j) \longrightarrow X_1'(j)$ dans $\mathcal{E}_j$, égalisant toutes ces double-flèches, donc quitte à remplacer $X_1(j)$ par $X_1'(j)$, on gagne.

Il est temps enfin de faire appel à l'hypothèse c) de 4.10.3. Soit donc α un ordinal limite, comme stipulé dans cette condition. Comme $\operatorname{card} \alpha \leqslant \pi$, a fortiori $\operatorname{card} \beta \leqslant \pi$ si $\beta < \alpha$, on a donc un système inductif

$$(X_\beta(\bullet))_{\beta \in I_\alpha}$$

dans $\prod_{j \in J} \mathcal{E}_j$. Comme les $\varinjlim$ de type I_α existent dans $\mathcal{E}_j$, on peut donc considérer

$$G(j) \;=\; \varinjlim_{\beta \in I_\alpha} X_\beta(j) \;\in\; \operatorname{Ob} \mathcal{E}_j \;.$$

Si $\lambda : j' \longrightarrow j$ est une flèche de J, on en déduit une λ-flèche

$$G(\lambda) \;:\; G(j) = \varinjlim X_\beta(j) \longrightarrow G(j') \simeq \varinjlim X_{\beta+1}(j')$$

par $G(\lambda) = \varinjlim t_\beta(\lambda)$. Il faut faire attention que les $t_\beta(\lambda)$ ne définissent pas un homo- [262]
morphisme de systèmes projectifs, mais par la condition (ii), p. 256, ils définissent un homomorphisme d'ind-objets, donc

un homomorphisme sur les $\varinjlim$ ([106]). La condition (i) assure que $\lambda \longmapsto G(\lambda)$ trans- p. 99
forme identités en identités, et la condition (iii) que l'on a $G(\mu\lambda) = G(\mu)G(\lambda)$. Donc G apparaît comme une section de $\mathcal{E}$ sur J. On a d'autre part des flèches

$$X(j) \overset{\text{déf}}{=} X_0(j) \longrightarrow G(j) = \varinjlim_{\beta \in I_\alpha} X_\beta(j) \;,$$

ce qui prouve F (1). D'autre part, la condition 3°) du lemme prouve la validité de F′ (1). Cela achève la démonstration de 4.10.3, et par là de 4.10.1 et de 4.9.3.

Corollaire 4.10.8 (du théorème 4.10.1). *Soit $\mathcal{N} \longrightarrow J$ un foncteur cofibrant, tel que les fibres soient des catégories accessibles (4.8), les foncteurs cochangement de base $\lambda_* : \mathcal{N}_{j'} \longrightarrow \mathcal{N}_j$ accessibles, enfin J équivalente à une petite catégorie. Alors la catégorie $\mathcal{M} = \underline{\Gamma}(\mathcal{N}/J)$ est accessible. Plus précisément, soit π_0 un cardinal infini tel que les catégories $\mathcal{N}_j$ soient π_0-accessibles, et que les foncteurs λ_* soient π_0-accessibles, et soit π un cardinal infini tel que l'on ait :* [page 263]

ⓐ $\pi^{\pi_0} = \pi$.

ⓑ $\forall\, \lambda : j' \longrightarrow j$ *dans* J, $\lambda_* : \mathcal{E}_j \longrightarrow \mathcal{E}_{j'}$ *applique* $(\mathcal{E}_j)_{\pi_0}$ *dans* $(\mathcal{E}_{j'})_{\pi_0}$.

ⓒ card réd $J \leqslant \pi$.

Alors $\mathcal{M}$ est π-accessible, et plus précisément, on a

$$\mathcal{M} \;\simeq\; \operatorname{Ind}_\pi(\mathcal{M}_\pi) \;,$$

où $\mathcal{M}_\pi$ est la sous-catégorie pleine de $\mathcal{M}$ formée des sections F de $\mathcal{M}$ sur J telles que l'on ait $F(j) \in (\mathcal{E}_j)_\pi \;\forall\; j \in \operatorname{Ob} J$, $(\mathcal{E}_j)_\pi$ désignant la sous-catégorie pleine de $\mathcal{E}_j$ formée des objets π-accessibles de $\mathcal{E}_j$. [page 264]

En effet, l'hypothèse au début implique l'existence de π_0 et de π satisfaisant les conditions dites. Les conditions a) et b) sur π, plus le fait que les foncteurs λ_* soient π_0-accessibles, impliquent que la sous-catégorie strictement pleine $\mathcal{N}_\pi$ de $\mathcal{N}$ dont les fibres sont les $(\mathcal{N}_j)_\pi$, est une sous-catégorie cofibrée, et que de plus $\mathcal{N}$ est J-équivalent à $\operatorname{Ind}_\pi(\mathcal{N}_\pi/J)$. D'autre part, les fibres de $\mathcal{N}_\pi/J$ sont stables par $\varinjlim$ grandes devant π_0 et

[page 265]

de cardinal $\leqslant \pi$, donc la condition "ordinale" de 4.10.1 est vérifiée (en y faisant $\mathcal{D} = \mathcal{N}_\pi$). Comme de plus $\operatorname{card} J \leqslant \pi$, on en conclut par 4.10.1 que $\mathcal{M} \simeq \operatorname{Ind}_\pi(\mathcal{M}_\pi)$.

Corollaire 4.10.9. *Soit $\mathcal{N} \longrightarrow J$ une "cofibration en paratopos" ([107]), i.e. un foncteur cofibrant tel que les fibres soient des catégories paratopos, et les foncteurs cochangement de base soient des foncteurs images inverses (resp. images directes) pour des morphismes de paratopos, i.e. qu'ils commutent aux (petites) $\varinjlim$ (resp. aux petites $\varprojlim$). Supposons de plus J équivalente à une petite catégorie. Alors $\underline{\Gamma}(\mathcal{N}/J)$ est une catégorie paratopos.*

En effet, c'est une catégorie accessible en vertu de 4.10.8, d'autre part l'hypothèse sur les λ_* implique aussitôt que $\underline{\Gamma}(\mathcal{N}/J)$ est stable par petites $\varprojlim$ (resp. par petites $\varprojlim$ [plutôt $\varinjlim$?]). Donc $\underline{\Gamma}(\mathcal{N}/J)$ est une catégorie paratopos en vertu de 4.8.9 b $\Longrightarrow$ a (resp. c $\Longrightarrow$ a). p. 100

Corollaire 4.10.10. *Soit $\mathcal{N} \longrightarrow J$ une catégorie* fibrée *(non cofibrée !), telle que les fibres soient des catégories paratopos et les foncteurs changement de base soient des foncteurs images directes pour des morphismes de paratopos (i.e. des foncteurs accessibles, commutant aux petites $\varprojlim$). Supposons de plus J équivalente à une petite catégorie. Alors $\underline{\Gamma}(\mathcal{N}/J)$ est une catégorie paratopos.* [page 266]

En effet, l'hypothèse implique que pour toute flèche $\lambda : j' \longrightarrow j$ dans J, le foncteur $\lambda_* : \mathcal{N}_{j'} \longrightarrow \mathcal{N}_j$ admet un adjoint à gauche $\lambda^* : \mathcal{N}_j \longrightarrow \mathcal{N}_{j'}$, d'où s'ensuit que $\mathcal{N} \longrightarrow J$ est aussi cofibrant, les foncteurs de cochangement de base commutant aux petites $\varinjlim$. Donc on peut appliquer 4.8.9, qui donne le résultat voulu.

Question 4.10.11. *Soit $\mathcal{N} \longrightarrow J$ un foncteur* fibrant, *tel que les $\mathcal{N}_j$ soient des catégories accessibles, et les foncteurs λ^* de changement de base accessibles, J étant équivalente à une petite catégorie. Je conjecture que sous ces conditions, $\underline{\Gamma}(\mathcal{N}/J) \overset{\text{déf}}{=} \underline{\operatorname{Hom}}(J, \mathcal{N})$ est accessible, et qu'il en est de même de $\underline{\operatorname{Hom}}\,\underline{\operatorname{cart}}_J(J, \mathcal{N})$.* [page 267]

C'est ce qui est prouvé dans SGA 4 I 9.24 sous des hypothèses légèrement plus fortes (à l'aide de l'ancienne notion trop forte à mon gré, de filtrations cardinales). Je serais étonné que la démonstration (un peu longuette) de loc. cit. ne s'applique pas au cas général. Mais on aimerait avoir un énoncé qui coiffe celui-ci et 4.10.8, dans le cas d'un foncteur $\mathcal{N} \longrightarrow J$ qui ne serait supposé ni fibrant ni cofibrant, mais …(???).

4.11 Application à l'existence des limites dans une catégorie de la forme $\operatorname{Ind}_{\pi_0}(C)$.

Proposition 4.11.1. *Soit C une catégorie équivalente à une petite catégorie, π un cardinal infini, posons $\mathcal{M} = \operatorname{Ind}_\pi(C)$. Soit Φ un ensemble de catégories de cardinal réduit $\leqslant \pi$. On se propose d'examiner si $\mathcal{M}$ est "stable par $\varinjlim$ de type Φ" (i.e. stable par $\varinjlim$ de type I, quel que soit $I \in \Phi$). Il suffit pour cela que C est stable par $\varinjlim$ de type Φ, et que de plus il existe un ordinal limite α avec $\operatorname{card} \alpha \leqslant \pi$ et tel que C soit stable par $\varinjlim$ de type I_α (p.ex. tel que $I_\alpha \in \Phi$). Inversement, si $\mathcal{M}$ est stable par $\varinjlim$ de type Φ, et si on suppose de plus C karoubienne (i.e. stable par facteurs directs), alors C est stable par $\varinjlim$ de type Φ. Dans l'un et l'autre cas, le foncteur d'inclusion $C \hookrightarrow \mathcal{M}$ commute aux $\varinjlim$ envisagées.* [page 268]

([108]).

Démonstration. a) Condition suffisante. On applique 4.9.3 pour conclure que pour toute catégorie J de cardinal réduit $\leqslant \pi$ (en particulier pour $J \in \Phi$), tout foncteur p. 101 [page 269]

106. Attention, c'est ici qu'on utilise tacitement le fait que le foncteur $\lambda_* : \mathcal{E}_{j'} \longrightarrow \mathcal{E}_j$ commute aux $\varinjlim$ de type I_α, ce qui implique que les inclusions $\mathcal{E}_j \hookrightarrow \mathcal{E}$ commutent à ce type de $\varinjlim$.

107. terme ambigu, cf. la double explication.

108. Expliciter ici les corollaires des types 4.13.20, 4.13.21 (p. 341).

$\varphi : J \longrightarrow \mathcal{M} = \mathrm{Ind}_\pi(C)$ admet une représentation indicielle $\Phi : J \times I \longrightarrow C$, avec I grande devant π. Ceci, plus la stabilité de C par $\varinjlim$ de type J, suffit à établir l'existence de la $\varinjlim$ de φ.

La réciproque provient du fait que si C est karoubienne, alors son image essentielle dans $\mathcal{M}$ n'est autre que $\mathcal{M}_\pi$, laquelle est stable dans $\mathcal{M}$ par toute $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi$ représentable dans $\mathcal{M}$. Si $\mathcal{M}$ est stable par $\varinjlim$ de type Φ, il en est de même de $\mathcal{M}_\pi$, donc de C, q.e.d.

Corollaire 4.11.2. *Pour que $\mathcal{M}$ soit stable par $\varinjlim$ filtrantes (resp. par petites $\varinjlim$), il suffit que C le soit par $\varinjlim$ filtrantes (resp. par $\varinjlim$)* de cardinal $\leqslant \pi$, *et c'est aussi nécessaire si C est karoubienne.*

Supposons C stable par $\varinjlim$ filtrantes (resp. par $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi$, alors par 4.11.1 [page 270]
$\mathcal{M}$ est stable par ce même type de limites inductives. D'autre part, il est stable par $\varinjlim$ grandes devant π. Il suffit donc de prouver le

Lemme 4.11.3. *Soit $\mathcal{M}$ une catégorie, π un cardinal. Supposons que $\mathcal{M}$ soit stable par $\varinjlim$ filtrantes de cardinal $\leqslant \pi$ (resp. par $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi$, resp. par sommes des cardinal $\leqslant \pi$),* et *par $\varinjlim$ grandes devant π. Alors $\mathcal{M}$ est stable par petites $\varinjlim$ filtrantes (resp. par petites $\varinjlim$, resp. par petites sommes).*

Ce lemme se prouve comme 4.4.14, page 97.

Reste la réciproque dans 4.11.2, qui résulte de l'assertion similaire dans 4.11.1.

Corollaire 4.11.4. *Quand $\mathcal{M} = \mathrm{Ind}_\pi C$ est-il stable par sommes ? S'il existe un ordinal α tel que* $\mathrm{card}\,\alpha \leqslant \pi$, *et que C soit stable par $\varinjlim$ de type I_α, alors il suffit que C soit stable par sommes de cardinal $\leqslant \pi$. Cette condition est aussi nécessaire si C est karoubienne.*

([109]).

Se prouve comme 4.11.2, en utilisant 4.11.3.

Proposition 4.11.5 ([110]). *Soit Φ un ensemble de catégories I équivalentes à des catégories finies, et "rigides", i.e. pour tout $i \in \mathrm{Ob}\, I$, $\underline{\mathrm{Hom}}_I(i,i) = \{\mathrm{id}_i\}$. Soient C une catégorie équivalente à une petite catégorie, π un cardinal infini, $\mathcal{M} = \mathrm{Ind}_\pi C$. Pour que $\mathcal{M}$ soit stable par $\varinjlim$ (resp. par $\varprojlim$) de type Φ, il* suffit *que C le soit. Dans le cas non respé, si C est karoubienne, cette condition est aussi nécessaire.* [page 271]

Cette dernière assertion est contenue dans l'assertion similaire dans 4.11.1. Pour la première assertion, cela résulte de la façon habituelle du

Lemme 4.11.6 ([111]). *Soit J une catégorie équivalente à une catégorie finie, J rigide, C une catégorie équivalente à une petite catégorie, π un cardinal infini. Alors tout foncteur $J \longrightarrow \mathcal{M} \overset{\text{déf}}{=} \mathrm{Ind}_\pi C$ admet une représentation indicielle $J \times I \longrightarrow C$, avec I grande devant* p. 102
π, en d'autres termes, le foncteur canonique pleinement fidèle [page 272]

$$\mathrm{Ind}_\pi(\underline{\mathrm{Hom}}(J, C)) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(J, \mathcal{M})$$

déduit de l'inclusion $C \hookrightarrow \mathcal{M}$, d'où $\underline{\mathrm{Hom}}(J,C) \hookrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(J,\mathcal{M})$ (cf. 4.9), est une équivalence de catégories. (**N.B.** J'ignore s'il en est ainsi sans hypothèse de rigidité sur J.)

Démonstration. Cela se prouve comme le résultat similaire pour $\mathrm{Ind}(C)$ au lieu de $\mathrm{Ind}_\pi C$, cf. SGA 4 I 8.8.5.

Corollaire 4.11.7 ([112]). *Pour que $\mathcal{M} = \mathrm{Ind}_\pi C$ soit stable par $\varinjlim$ (resp. par $\varprojlim$)* finies, *il* suffit *que C le soit. Et c'est aussi nécessaire dans le cas non respé, lorsqu'on suppose C karoubienne.* [page 273]

109. Pour autres variantes de 4.11.1, cf. 4.13.19 (p. 340) et corollaires.
110. ?, démonstration pas achevée.
111. ?, démonstration non explicitée est peut-être faux !
112. sous réserve de validité de 4.11.5.

4.12 Foncteurs accessibles entre catégories accessibles

Proposition 4.12.1 ([113]). *Soient $\mathcal{M}$, $\mathcal{N}$ deux catégories accessibles (4.8), et $f : \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{N}$ un foncteur accessible. Alors il existe des cardinaux infinis π_0, π_1 tels que $\pi_1 \geqslant \pi_0$ et que pour tout cardinal $\pi \geqslant \pi_1$, on ait*

$$f(\mathcal{M}_\pi) \ \subset \ \mathcal{N}_{\pi^{\pi_0}} \ , \tag{4.12.1}$$

et en particulier

$$f(\mathcal{M}_\pi) \ \subset \ \mathcal{N}_\pi \qquad \textit{si } \pi = \pi^{\pi_0}. \tag{4.12.1.2}$$

De façon plus précise, on peut prendre pour π_0 un cardinal utile pour $\mathcal{M}$ et tel que f soit π_0-accessible (p.ex. le plus petit cardinal de ce type). Soit alors π_1 un cardinal tel qu'on ait $f(\mathcal{M}_{\pi_0}) \subset \mathcal{N}_{\pi_1}$, $\pi_1 \geqslant$ card réd $\mathcal{M}_{\pi_0}$, et enfin tel que $\mathcal{N}_{\pi_1}$ soit [une] *sous-catégorie strictement génératrice de $\mathcal{N}$. Le couple (π_0, π_1) satisfait aux conditions énoncées.* [page 274]

Démonstration. On aura en effet

$$\mathcal{N}_1 \ \xleftarrow{\sim} \ \mathrm{Ind}_{\pi_0}(\mathcal{M}_{\pi_0})$$

et f commutant aux $\varinjlim$ grandes devant π_0, sera connu (à isomorphisme unique près) par sa restriction à $\mathcal{M}_{\pi_0}$, laquelle se factorise par $\mathcal{N}_{\pi_1}$,

$$f|\mathcal{M}_{\pi_0} : \mathcal{M}_{\pi_0} \ \longrightarrow \ \mathcal{N}_{\pi_1} \ .$$

Pour prouver (4.12.1.1), posant $\pi' = \pi^{\pi_0} \geqslant \pi$, et notant que $\pi'^{\pi_0} = \pi_0$ [plutôt $\pi'^{\pi_0} = \pi'$],

$$f(\mathcal{M}_\pi) \ \subset \ f(\mathcal{M}_{\pi'}) \ \overset{?}{\subset} \ \mathcal{N}_{\pi'} \ ,$$

on voit qu'il suffit de prouver (4.12.1.2) (pour π'). Donc on peut supposer $\pi = \pi^{\pi_0}$ et prouver (4.12.1.2). Mais comme $\pi_1 \geqslant$ card réd $\mathcal{M}_{\pi_0}$, on sait que si π est tel que $\pi \geqslant \pi_1$, $\pi^{\pi_0} = \pi$, alors $\mathcal{M}_\pi$ est formé des $\varinjlim_I x_i$, les $x_i \in \mathcal{N}_{\pi_0}$, et I grande devant π_0, et card $I \leqslant \pi$. p. 103

On a alors (f étant π_0-accessible) [page 275]

$$f(x) \ = \ \varinjlim_I f(x_i) \ ,$$

les $f(x_i)$ sont dans $\mathcal{N}_{\pi_1}$, donc dans $\mathcal{N}_\pi$, or $\mathcal{N}_\pi$ stable par $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi$ (puisque $\mathcal{N}$ est engendrée par $\mathcal{N}_{\pi_1}$, formée d'objets π_1-accessibles et a fortiori π-accessibles, cf. SGA 4 I 9.9). D'où $f(x) \in \mathcal{N}_\pi$, q.e.d.

Corollaire 4.12.2. *Supposons que π_0 soit aussi utile pour $\mathcal{N}$, et que $\pi_1 \geqslant$ card réd $\mathcal{N}_{\pi_0}$. Soit π un cardinal $\geqslant \pi_1$, et tel que $\pi^{\pi_0} = \pi$. Alors f s'identifie, à équivalence de catégories et à isomorphisme de foncteurs près, au foncteur*

$$\mathrm{Ind}(f_\pi) \ : \ \mathrm{Ind}_\pi(\mathcal{M}_\pi) \ \longrightarrow \ \mathrm{Ind}_\pi(\mathcal{N}_\pi) \ ,$$

où $f_\pi : \mathcal{M}_\pi \longrightarrow \mathcal{N}_\pi$ est le foncteur induit par f.

Proposition 4.12.3 ([114]). *Soient C une catégorie équivalente à une petite catégorie, $\mathcal{N}$ une $\mathfrak{U}$-catégorie, π_0 un cardinal infini. On suppose que $\mathcal{N}$ satisfait L_{π_0} (stabilité par $\varinjlim$ grandes devant π_0). Soit $\mathcal{M} = \mathrm{Ind}_{\pi_0} C$, $\underline{\mathrm{Hom}}_{!\,\pi_0}(\mathcal{M}, \mathcal{N})$ la sous-catégorie strictement pleine de $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathcal{M}, \mathcal{N})$ formée des $f : \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{N}$ π_0-accessibles. Alors le foncteur restriction* [page 276]

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{!\,\pi_0}(\mathcal{M}, \mathcal{N}) \ \longrightarrow \ \underline{\mathrm{Hom}}(C, \mathcal{N}) \tag{4.12.3.1}$$

113. Remonterait à 4.8.
114. remonte à 4.7.

est une équivalence de catégories. On trouve un foncteur quasi-inverse comme composé

$$\underline{\mathrm{Hom}}(C,\mathcal{N}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(\underbrace{\mathrm{Ind}_{\pi_0}(C)}_{\mathcal{M}},\mathrm{Ind}_{\pi_0}(\mathcal{N})) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(\mathcal{M},\mathcal{N}) \ , \qquad (4.12.3.2)$$

où la deuxième flèche est le foncteur composition $F \longmapsto L \circ F$ avec le foncteur limite inductive $L : \mathrm{Ind}_{\pi_0}\mathcal{N} \longrightarrow \mathcal{N}$. Le foncteur composé (4.11.3.2) a une image contenue dans $\underline{\mathrm{Hom}}_{!\,\pi_0}(\mathcal{M},\mathcal{N})$ et induit une équivalence entre cette dernière catégorie et $\underline{\mathrm{Hom}}(C,\mathcal{N})$.

En d'autres termes, on peut dire que le foncteur d'inclusion canonique [page 277]

$$C \longrightarrow \mathrm{Ind}_{\pi_0} C = \mathcal{M}$$

est 2-universel *pour les foncteurs de C dans des catégories $\mathcal{N}$ satisfaisant L_{π_0}, celles-ci étant considérées comme* 0*-objets d'une* 2*-catégorie où les* 1*-objets sont les foncteurs $\mathcal{N} \longrightarrow \mathcal{N}'$ π_0-accessibles, i.e. commutent aux $\varinjlim$ grandes devant π_0.*

Cet énoncé est l'analogue, pour C petite quelconque, de 4.4.16 (page 101), valable pour C stable par $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi_0$. Il y a bien sûr d'autres variantes, en relation avec la commutation à d'autres types de $\varinjlim$ ($\varinjlim$ filtrantes, sommes, limites inductives finies etc.) envisagées dans la section 4.11 précédente.

La démonstration de 4.12.3 est soritale.

Corollaire 4.12.4. *Soient $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ deux catégories accessibles, et soit π_0 un cardinal infini tel que $\mathcal{M}$ soit π_0-accessible, i.e. que π_0 soit un cardinal utile pour $\mathcal{M}$. Soit $\pi_1 = \sup(\pi_0, \mathrm{card\,réd}\,\mathcal{M}_{\pi_0})$. Alors pour tout cardinal $\pi \geqslant \pi_1$ utile pour $\mathcal{M}$ (et en particulier, pour tout $\pi \geqslant \pi_1$ tel que $\pi^{\pi_0} = \pi$), la catégorie des foncteurs $\mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{N}$ qui sont π-accessibles est elle-même accessible.* p. 104 [page 278]

En effet, on aura $\mathcal{M} \simeq \mathrm{Ind}_\pi \mathcal{M}_\pi$, d'où par 4.12.3

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{!\,\pi}(\mathcal{M},\mathcal{N}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}(\mathcal{M}_\pi,\mathcal{N}),$$

or $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathcal{M}_\pi,\mathcal{N})$ est accessible par 4.9.5 (p. 220). On peut préciser d'ailleurs ce point. Supposons π_0 choisi tel que π_0 soit utile non seulement pour $\mathcal{M}$, mais pour $\mathcal{N}$ également. Rappelons que l'on a $\mathrm{card\,Fl}\,\mathcal{M}_\pi \leqslant 2^\pi$ (cf. 4.7.7, page 173).

Posons donc

$$\pi' = 2^\pi,$$ [page 279]

on a donc $\pi'^{\pi_0} = 2^{\pi\pi_0} = 2^\pi = \pi'$, et $\mathrm{card\,réd}\,\mathcal{M}_\pi \leqslant \pi'$. Donc 4.9.5 nous donne que

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\mathcal{M}_\pi,\mathcal{N}) \simeq \mathrm{Ind}_{\pi'}(\underline{\mathrm{Hom}}(\mathcal{M}_\pi,\mathcal{M}_{\pi'})),$$

d'où :

Corollaire 4.12.5. *Sous les conditions de 4.12.4, si π_0 est utile pour $\mathcal{M}$ et pour $\mathcal{N}$, alors pour $\pi \geqslant \pi_1$, $\underline{\mathrm{Hom}}_{!\,\pi}(\mathcal{M},\mathcal{N})$ est π'-accessible, où $\pi' = 2^\pi$, de façon plus précise, on a une équivalence de catégories*

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{!\,\pi}(\mathcal{M},\mathcal{N}) \simeq \mathrm{Ind}_{\pi'}(\underline{\mathrm{Hom}}(\mathcal{M}_\pi,\mathcal{N}_{\pi'})).$$

Remarque 4.12.6. Si $\mathcal{M}$, $\mathcal{N}$ sont accessibles, la catégorie $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{acc}}(\mathcal{M},\mathcal{N})$ des foncteurs accessibles n'est par toujours accessible. Si $\mathcal{N}$ satisfait L_{π_0}, cette catégorie satisfait L_{π_0}, et les $\varinjlim$ grandes devant π_0 se calculent argument par argument.

Si on pouvait trouver une sous-catégorie (équivalente à une petite catégorie) $\mathcal{H}_\pi$ de $\mathcal{H} = \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{acc}}(\mathcal{M},\mathcal{N})$, pour un cardinal $\pi \geqslant \pi_0$ telle que tout objet F de $\mathcal{H}$ s'écrive $\varinjlim_I F_i$, les F_i dans $\mathcal{H}_\pi$, I grande devant π, alors si les objets de $\mathcal{H}_\pi$ sont des foncteurs π'-accessibles de $\mathcal{M}$ dans $\mathcal{N}$, il en serait de même de tout F dans $\mathcal{H}$. Donc il existerait un cardinal infini π' tel que tout foncteur accessible de $\mathcal{M}$ dans $\mathcal{N}$ soit π'-accessible. Mais sauf erreur, si p.ex. $\mathcal{M} = \mathcal{N} = \mathrm{Ens}$, il n'existe pas de tel cardinal. Je ne veux pas m'arrêter ici sur cette question, et faire un contre-exemple. [page 280] [page 281]

4.13 Ensembles accessibles d'objets d'une catégorie accessible

Définition 4.13.1. Soient $\mathcal{M}$ une catégorie accessible, S une partie de $\mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$, $\underline{S}$ la sous-catégorie pleine de $\mathcal{M}$ définie par S. On dit que S est une *partie accessible* de $\mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$, ou encore que $\underline{S}$ est une *sous-catégorie "accessible dans $\mathcal{M}$"*, si p. 105

a) $\underline{S}$ est strictement pleine, i.e. pour x, y deux objets isomorphes de $\mathcal{M}$, $x \in S$ implique $y \in S$,

b) $\underline{S}$ est accessible,

c) le foncteur d'inclusion $\underline{S} \longrightarrow \mathcal{M}$ est accessible.

Soient π_0 un cardinal utile pour $\mathcal{M}$, i.e. tel que $\mathcal{M} \simeq \mathrm{Ind}_{\pi_0}(\mathcal{M}_{\pi_0})$, soit $\pi_1 = \sup(\pi_0, \mathrm{card\,réd}\,\mathcal{M}_{\pi_0})$. Soit d'autre part π_0' un cardinal tel que

$\underline{S}$ (supposé accessible dans $\mathcal{M}$) soit π_0-*accessible*, i.e. π_0'-utile pour $\underline{S}$, et de plus tel que $f : \underline{S} \hookrightarrow \mathcal{M}$ soit π_0'-accessible. Soit $\pi_1' \geqslant \pi_0'$ un cardinal tel que $\underline{S}_{\pi_0'} \subset \mathcal{M}_{\pi_1'}$, $\pi_1' \geqslant \mathrm{card\,réd}\,\underline{S}_{\pi_0'}$. Il résulte de 4.12.1 que pour tout cardinal [page 282]

$$\pi \geqslant \pi_1', \qquad \text{tel que } \pi^{\pi_0'} = \pi, \tag{$*$}$$

on doit avoir

$$\underline{S}_\pi \subset \mathcal{M}_\pi, \qquad \text{donc } \underline{S}_\pi \subset \mathcal{M}_\pi \cap \underline{S},$$

d'ailleurs, comme $\underline{S} \hookrightarrow \mathcal{M}$ est π_0'-accessible et a fortiori π-accessible, et pleinement fidèle, il s'ensuit aussitôt que $\mathcal{M}_\pi \cap S \subset S_\pi$, d'où

$$S_\pi = \mathcal{M} \cap S.$$

D'ailleurs, la condition $(*)$ implique que π est utile pour $\underline{S}$, donc [page 283]

$$\underline{S} \xleftarrow{\sim} \mathrm{Ind}_\pi(\underline{S}_\pi).$$

(D'ailleurs, *si* $\pi_0' \geqslant \pi_0$, la relation $\pi^{\pi_0'} = \pi$ implique a fortiori $\pi^{\pi_0} = \pi$, et si $\pi_1' \geqslant \pi_1$, on voit que $(*)$ implique que π est utile aussi pour $\mathcal{M}$, i.e.

$$\mathcal{M} \xleftarrow{\sim} \mathrm{Ind}_\pi(\mathcal{M}_\pi).$$

D'autre part, le foncteur d'inclusion $\underline{S} \hookrightarrow \mathcal{M}$ se déduit essentiellement de $\underline{S}_\pi \hookrightarrow \mathcal{M}_\pi$ en passant aux catégories Ind_π. ([116]).)

Ceci prouve entre autres le "il faut" dans la proposition qui suit :

Proposition 4.13.2. *Soient $\mathcal{M}$ une catégorie accessible, π_0 un cardinal infini utile pour $\mathcal{M}$, S une partie de* $\mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$, *$\underline{S}$ la sous-catégorie pleine de $\mathcal{M}$ correspondante.* [page 284]

a) Pour que S soit accessible, il faut et il suffit qu'il existe un cardinal infini π et une partie $S(\pi)$ de $\mathcal{M}_\pi$, tels que S soit formé des objets de $\mathcal{M}$ qui sont isomorphes à un objet de la forme $\varinjlim_{i \in I} x_i$, avec les x_i dans $S(\pi)$ et I grande devant π. En d'autres termes, il faut et il suffit qu'il existe un cardinal infini π_1 et une sous-catégorie pleine $\underline{S}(\pi)$ de $\mathcal{M}_\pi$, tels que $\underline{S}$ soit l'image essentielle du foncteur canonique pleinement fidèle

$$\mathrm{Ind}_\pi(\underline{S}(\pi)) \longrightarrow \mathcal{M} \qquad (\xleftarrow{\sim} \mathrm{Ind}_\pi(\mathcal{M}) \ ([117])), \tag{4.13.2.1}$$

prolongeant l'inclusion canonique $\underline{S}(\pi) \hookrightarrow \mathcal{M}$ (cf. 4.12.3). p. 106

[page 285]

b) Si S est accessible, on peut trouver des cardinaux π'_0, π'_1 tels que $\pi'_1 \geqslant \pi'_0 \geqslant \pi_0$ (où π_0 est un cardinal donné utile pour $\mathcal{M}$) et tels que tout cardinal $\pi \geqslant \pi'_1$ avec $\pi^{\pi'_0} = \pi$ satisfasse aux conditions de c), en prenant $S(\pi) = S \cap \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}_\pi$, i.e. $\underline{S}(\pi) = \underline{S} \cap \mathcal{M}_\pi$. Sous ces conditions, π est utile pour $\underline{S}$ et *pour $\mathcal{M}$, $S(\pi)$ est une sous-catégorie* strictement *pleine de $\mathcal{M}_\pi$, stable dans $\mathcal{M}_\pi$ par facteurs directs (ou ce qui revient au même, $\mathcal{M}_\pi$ étant karoubienne, une sous-catégorie karoubienne de $\mathcal{M}_\pi$).*

c) On peut prendre π'_0 le plus petit cardinal $\geqslant \pi_0$ utile pour $\underline{S}$ et tel que $\underline{S} \hookrightarrow \mathcal{M}$ soit π'_0-accessible, et $\pi'_1 = \sup(\pi'_0, \mathrm{card\,réd}\,\underline{S}_{\pi'_0})$.

La partie b) ainsi que c) a déjà été prouvée, ce qui implique le "il faut" dans la partie a). Il reste à prouver le "il suffit" dans a). Mais l'hypothèse implique que

$$\underline{S} \xleftarrow{\sim} \mathrm{Ind}_\pi(S_\pi),$$

ce qui implique que $\underline{S}$ est accessible et même π-accessible, et elle implique aussi que $\underline{S}$ est une sous-catégorie *strictement* pleine de $\mathcal{M}$. Il reste à voir

[que] le foncteur d'inclusion est accessible, en fait il est π-accessible, puisque [page 286]
(4.13.2.1) l'est (cf. 4.12.3).

Définition 4.13.3. Soient $\mathcal{M}$, $S \subset \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$, $\underline{S} \subset \mathcal{M}$ comme dans 4.12.1, π un cardinal infini. On dit que S est une partie *π-accessible* de $\mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$, ou que $\underline{S}$ est une sous-catégorie π-accessible dans $\mathcal{M}$, si S, π satisfont les conditions de 4.13.3 a), i.e. $\underline{S}$ est l'image essentielle de $\mathrm{Ind}_\pi(S(\pi))$, où $S(\pi)$ est une sous-catégorie pleine de $\mathcal{M}_\pi$.

Notons que, quitte à renforcer $S(\pi)$ par $S'(\pi) = \natural$-clôture de $S(\pi)$ dans $\mathcal{M}_\pi$, on peut supposer que $S(\pi)$ est une sous-catégorie *strictement pleine et karoubienne*

de $\mathcal{M}_\pi$. On sait alors que, $S(\pi)$ étant karoubienne, $S(\pi) \longrightarrow \underbrace{(\mathrm{Ind}_\pi(S(\pi)))}_{\pi}$ est une [page 287]

équivalence de catégories. Comme $\mathrm{Ind}_\pi(S(\pi)) \simeq \underline{S}$ et que $S(\pi)$ est strictement pleine dans $\mathcal{M}_\pi$, donc aussi dans $\mathcal{M}$ et a fortiori dans $\underline{S}$, que l'on a

$$\underline{S}(\pi) = \underline{S}_\pi, \qquad \text{sous-catégorie de } \underline{S} \text{ des objets } \pi\text{-accessibles de } S. \tag{4.13.1}$$

Je dis qu'on aura aussi

$$\underline{S}(\pi) = \underline{S} \cap \mathcal{M}_\pi. \tag{4.13.2}$$

Comme c est clair, il reste à voir que $\underline{S} \cap \mathcal{M}_\pi \subset \underline{S}(\pi)$, or il est immédiat que $\underline{S} \cap \mathcal{M}_\pi \subset S_\pi$, et on conclut par (4.13.1). On trouve ainsi :

Proposition 4.13.4. *Soit $\mathcal{M}$ une catégorie accessible, π un cardinal infini. Soit Σ_π l'ensemble des*

sous-catégories strictement pleines $\underline{S}(\pi)$ de $\mathcal{M}_\pi$ qui sont karoubiennes, ou ce qui [page 288]
revient au même, stables dans $\mathcal{M}_\pi$ par facteurs directs. Soit Σ'_π l'ensemble des sous-catégories de $\mathcal{M}$ qui sont π-accessibles dans $\mathcal{M}$. Considérons les applications

p. 107

$$\Sigma_\pi \underset{\beta_\pi}{\overset{\alpha_\pi}{\rightleftarrows}} \Sigma'_\pi \tag{4.13.4.1}$$

définies ainsi : Si $\underline{S}(\pi) \in \Sigma_\pi$, $\alpha_\pi(\underline{S}(\pi))$ est l'image essentielle du foncteur non pleinement fidèle $\mathrm{Ind}_\pi(\underline{S}(\pi)) \longrightarrow \mathcal{M}$. *Si $\underline{S} \in \Sigma'_\pi$, $\beta_\pi(\underline{S}) = \underline{S} \cap \mathcal{M}_\pi$. Les applications α_π, β_π sont des bijections, inverses l'une de l'autre.*

On n'a pas eu à supposer que π soit utile pour $\mathcal{M}$, ni que π soit minoré par un cardinal utile pour $\mathcal{M}$, i.e. qu'on ait $\pi \geqslant \pi_0$, où π_0 est le plus petit cardinal utile pour $\mathcal{M}$.

116. [Le contenu de cette parenthèse est] "facultatif". [page 289]
117. si π utile pour $\mathcal{M}$.

4.13.5. Soit $\underline{S}$ une sous-catégorie *strictement pleine* de $\mathcal{M}$ (catégorie accessible), π_0' un cardinal infini. Dire que $\underline{S}$ est π_0'-accessible dans $\mathcal{M}$ signifie que les conditions suivantes sont satisfaites.

1) π_0' est utile pour $\underline{S}$, i.e. $\underline{S} \xleftarrow{\sim} \mathrm{Ind}_{\pi_0'}(\underline{S}_{\pi_0'})$.

2) $\underline{S} \hookrightarrow \mathcal{M}$ est π_0'-accessible.

3) $\underline{S}_{\pi_0'} \hookrightarrow \mathcal{M}_{\pi_0'}$ (qui implique que $S_{\pi_0'}$ est équivalente à une petite catégorie).

Supposons ces conditions satisfaites, et soit π un cardinal $> \pi_0'$. Est-ce que $\underline{S}$ est π-accessible dans $\mathcal{M}$, i.e. les conditions similaires sont-elles satisfaites pour π ? C'est évident pour 2°), mais risque d'être faux pour 1°, 2° `[plutôt 3° ?]`. Mais faisons appel à 4.13.2 c). Posons

$$\pi_1' = \sup(\pi_0', \operatorname{card}\text{réd}\, S_{\pi_0'}, \underbrace{\pi_0}_{\substack{\text{plus petit cardinal}\\ \text{infini utile}\\ \text{pour } \mathcal{M}}}).$$

Alors pour $\pi \geqslant \pi_1'$ tel que $\pi^{\pi_0'} = \pi$, $\underline{S}$ est π-accessible dans $\mathcal{M}$ (4.13.2 b et c). Supposons p.ex. [page 290]

$$\pi_0' \geqslant \pi_0$$

(pratiquement ce sera toujours vérifié) et de plus

$$\pi_0' \geqslant \operatorname{card}\text{réd}\, \mathcal{M}_{\pi_0},$$

i.e. supposons

$$\pi_0' \geqslant \sup(\pi_0, \operatorname{card}\text{réd}\, \mathcal{M}_{\pi_0}) = \pi_1.$$

Alors

$$\pi_1' = \sup(\pi_0', \operatorname{card}\text{réd}\, S_{\pi_0'}) \leqslant \sup(\pi_0', \operatorname{card}\text{réd}\, \mathcal{M}_{\pi_0'}) \leqslant 2^{(\pi_0'^{\pi_0})}$$

(4.7.7.1, p. 177). Donc on trouve ceci :

Corollaire 4.13.6. *Soit π_0' un cardinal $\geqslant \pi_1 = \sup(\pi_0, \operatorname{card}\text{réd}\, \mathcal{M}_{\pi_0})$ ([118]), et soit $\underline{S}$ une sous-catégorie π_0'-accessible dans $\mathcal{M}$. Alors pour tout cardinal π tel que $\pi \geqslant 2^{(\pi_0'^{\pi_0})}$, et tel que l'on ait $\pi^{\pi_0'} = \pi$ (i.e. π de la forme $c^{\pi_0'}$, avec c un cardinal $\geqslant 2^{(\pi_0'^{\pi_0})}$), $\underline{S}$ est π-accessible dans $\mathcal{M}$. (De plus, ces cardinaux sont réguliers pour $\underline{S}$ et pour $\mathcal{M}$, donc $\underline{S} \simeq \mathrm{Ind}_\pi(\underline{S}_\pi)$, $\mathcal{M} \simeq \mathrm{Ind}_\pi(\mathcal{M}_\pi)$).*

([119], [120]).

Proposition 4.13.7 ([121]). *Soient $\mathcal{M}$ une catégorie accessible, $(S_\alpha)_{\alpha\in A}$ une famille de parties de* $\mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$*, indexée par un petit ensemble A, $(\underline{S}_\alpha)_{\alpha\in A}$ la famille des sous-catégories accessibles dans $\mathcal{M}$ correspondante. Soit $S = \bigcap_{\alpha\in A} S_\alpha$, $\underline{S} = \bigcap_{\alpha\in A} \underline{S}_\alpha$, de sorte que $\underline{S}$ est la sous-catégorie pleine de $\mathcal{M}$ définie par $S \subset \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$. Ceci posé, si les S_α sont accessibles, il en est de même de S – ou encore, si les $\underline{S}_\alpha$ sont accessibles dans $\mathcal{M}$, il en est de même de $\underline{S}$.* p. 108 [page 291]

Cela résulte du résultat plus précis :

Corollaire 4.13.8 ([122]). *Avec les notations de 4.13.7 et 4.13.6, soit, pour tout $\alpha \in A$, π_α' un cardinal $\geqslant \pi_1$ tel que S_α soit π_α'-accessible. Soit*

$$\pi_0' = \sup_{\alpha\in A} \pi_\alpha'$$
$$\pi_0'' = \sup(\operatorname{card} A, \sup_\alpha 2^{(\pi_\alpha'^{\pi_0})})$$

118. **N.B.** π_0 est le plus petit cardinal utile pour $\mathcal{M}$.
119. Enchaîner ici avec 4.13.23 etc.
120. Mettre ici le lemme 4.16.7.11 signalé en marge p. 292.
121. Le rejeter après 4.13.23.
122. Cf. reformulation plus raisonnable et plus correcte page 302, 302 bis.

et soit $\pi \geqslant \pi_0''$ un cardinal tel que $\pi^{\pi_0'} = \pi$, i.e. de la forme $c^{\pi_0'}$, avec $c \geqslant \pi_0'$. Alors S est π-accessible (i.e. $\underline{S}$ est π-accessible dans $\mathcal{M}$). En particulier, S est $2^{\pi_0''}$-accessible. ([123]).

[page 292]

Démonstration. Soit $\alpha \in A$. Comme $\pi_\alpha' \leqslant \pi_0'$ et $\pi^{\pi_0'} = \pi$, on a a fortiori

$$\pi^{\pi_\alpha'} = \pi, \qquad \text{de plus } \pi \geqslant \pi_0'' \geqslant 2^{(\pi_\alpha^{\pi_0})},$$

donc en vertu de 4.13.6, $\underline{S}_\alpha$ est π-accessible dans $\mathcal{M}$. D'autre part, comme $\underline{S}_\alpha$ est π_α'-accessible, il est stable dans $\mathcal{M}$ par $\varinjlim$ grandes devant π_α', a fortiori par $\varinjlim$ grandes devant π_0' ($\geqslant \pi_\alpha'$). D'ailleurs, $\pi^{\pi_0'} = \pi$ implique $\pi \geqslant 2^{\pi_0} > \pi_0'$. Donc 4.13.8 résulte du

Corollaire 4.13.9. *Soit $\pi > \pi_0$ un cardinal tel que $\underline{S}_\alpha$ soit π-accessible dans $\mathcal{M}$ pour tout $\alpha \in A$, et tel que* $\operatorname{card} A \leqslant \pi$. *Supposons de plus qu'il existe un cardinal π_0' tel que $\pi_0 \leqslant \pi_0' < \pi$, tel que les $\underline{S}_\alpha$ soient stables dans $\mathcal{M}$ par $\varinjlim$ grandes devant π_0'. Alors $\underline{S} = \bigcap_{\alpha\in A} \underline{S}_\alpha$ est π-accessible dans $\mathcal{M}$.*

([124]).

Posons, pour tout $\alpha \in A$,

$$\underline{S}_\alpha(\pi) \overset{\text{déf}}{=} \underline{S}_\alpha \cap \mathcal{M}_\pi$$
$$\underline{S}(\pi) \overset{\text{déf}}{=} \underline{S} \cap \mathcal{M}_\pi = \bigcap \underline{S}_\alpha(\pi).$$

Chaque $\underline{S}_\alpha(\pi)$ est stable dans $\mathcal{M}$ par $\varinjlim$ grandes devant π_0' et de cardinal $\leqslant \pi$ (puisqu'il en est ainsi de $\underline{S}_\alpha$ et de $\mathcal{M}_\pi$) (donc il en est de même de leur intersection

[page 293]

$\underline{S}(\pi)$. A fortiori, $\underline{S}(\pi)$ est une sous-catégorie strictement pleine et karoubienne de $\mathcal{M}_\pi$.)

p. 109

D'autre part, chaque $\underline{S}_\alpha$ étant stable dans $\mathcal{M}$ par $\varinjlim$ grandes devant π_0', il en est de même de leur intersection $\underline{S}$. A fortiori, celle-ci est stable par $\varinjlim$ grandes devant π, donc le foncteur pleinement fidèle canonique $\operatorname{Ind}_\pi(\underline{S}(\pi)) \longrightarrow \mathcal{M}$ se factorise par S en

$$\operatorname{Ind}_\pi \underline{S}(\pi) \hookrightarrow \underline{S}\ ,$$

il faut prouver que ce foncteur est essentiellement surjectif. Soit donc $x \in S = \operatorname{Ob} \underline{S}$, tout revient à prouver que

$$\varinjlim_{i\in \underline{S}(\pi)/x} x_i \xrightarrow{\sim} x\ , \qquad (*)$$

et que $\underline{S}(\pi)/x$ est grande devant π.

Notons que, comme $\pi_0' \geqslant \pi_0$, et $\pi^{\pi_0'} = \pi$, on aura $\pi^{\pi_0} = \pi$, donc π est cardinal utile pour $\mathcal{M}$, donc $I = \mathcal{M}_\pi/x$ est grande devant x, et on a

$$\varinjlim_{i\in I=\mathcal{M}_\pi/x} x_i \xrightarrow{\sim} x\ . \qquad (**)$$

Donc, si on admet que $\underline{S}(\pi)/x$ est grande devant π, le fait que $(*)$ soit un isomorphisme équivaut à dire que le foncteur canonique

[page 294]

$$J \overset{\text{déf}}{=} \underline{S}(\pi)/x \hookrightarrow \mathcal{M}_\pi \ = \ I$$

est *cofinal* (cf. 4.4.2, p. 79). Mais on voit tout de suite que ce foncteur est un foncteur d'inclusion d'une sous-catégorie strictement pleine (stable par $\varinjlim$ grandes devant π_0', de cardinal $\leqslant \pi$).

123. Ça a l'air un peu abracadabrant ! Il faut de plus supposer que π n'est pas cardinal limite !

124. Ce serait le moment de formuler ici le Lemme 4.16.7.11 (p. 488), qui devrait même remonter avec les premières généralités sur les parties π-accessibles dès avant 4.13.7 (immédiat après 4.13.6).

Notons maintenant que la flèche $(**)$ similaire à $(*)$, avec $\underline{S}(\pi)$ remplacée par $\underline{S}_\alpha(\pi)$, est bel et bien un isomorphisme, puisque $x \in \mathrm{Ob}\,\underline{S} \subset \mathrm{Ob}\,\underline{S}_\alpha$, et que $\underline{S}_\alpha$ est π-accessible. Cela s'interprète par le fait que le foncteur d'inclusion

$$J_\alpha \overset{\text{déf}}{=} \underline{S}_\alpha(\pi)/x \hookrightarrow \mathcal{M}_\pi/x \;=\; I$$

est cofinal. C'est encore une inclusion d'une sous-catégorie J_α strictement pleine de I, stable par $\varinjlim$ grandes devant π_0' et de cardinal $\leqslant \pi$, et on a

$$J \;=\; \bigcap J_\alpha \,.$$

Donc la condition voulue résultera du [page 295]

Lemme 4.13.10 ([125], [126]). *Soient π_0' et $\pi > \pi_0'$ des cardinaux infinis, I une catégorie équivalente à une petite catégorie, $(J_\alpha)_{\alpha\in A}$ une famille de sous-catégories J_α de I. On suppose :*

ⓐ *I est grande devant π ([127]).*

ⓑ *I est stable par $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi$, et grandes devant π_0' ([128]).*

ⓒ *$\forall\ r \in A$, J_r est stable dans I par les limites inductives envisagés dans b) (en particulier, J_r est une sous-catégorie* strictement pleine *de I).* p. 110

ⓓ *$\forall\, r \in A$, J_r est une sous-catégorie* cofinale *de I (*grande devant π*).*

ⓔ $\mathrm{card}\, A \leqslant \pi$.

Soit $J = \bigcap_{r\in A} J_r$. Alors J est encore cofinale dans I, et grande devant π (et de plus stable dans I par $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi$ et grandes devant π_0').

En d'autres termes, si I est grande devant π, l'intersection J d'une famille $(J_\alpha)_{\alpha\in A}$ de sous-catégories strictement pleines cofinales et grandes devant π, est encore cofinale [page 296] et grande devant π, *pourvu que* $\mathrm{card}\, A \leqslant \pi$, et que l'on postule une propriété de stabilité de I et des J_α dans I, pour les limites inductives de cardinal $\leqslant \pi$ et grandes devant un cardinal convenable $\pi_0' < \pi$ donné.

4.13.10.1. Notons d'ailleurs que si $f : J \longrightarrow I$ est un foncteur cofinal *pleinement fidèle*, avec I grande devant π, alors J est automatiquement grande devant π. Cela résulte p.ex. de 4.9.6.3 2° (p. 225) par le critère c_π (vu que pour f pleinement fidèle, la condition F 3_π est tautologiquement satisfaite). On peut aussi le voir ainsi : Soit B un ensemble avec $\mathrm{card}\, B \leqslant \pi$, il faut prouver que $J \longrightarrow J^B$ est cofinal, or on a

$$\begin{array}{ccc} J & \xrightarrow{\text{cof. ?}} & J^B \\ {\scriptstyle\text{cof.}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\text{cof.}} \\ I & \xrightarrow{\text{cof.}} & I^B \,, \end{array}$$

où trois des quatre flèches du carré sont cofinales, $J^B \longrightarrow I^B$ l'étant comme produit de foncteurs cofinaux entre catégories *filtrantes* (cf. 4.9.6.5, page 227) – on sait en effet déjà que J est filtrante.

Donc le composé [page 297]

$$J \longrightarrow J^B \xrightarrow{\text{cof.}} I^B$$

125. Il faut supposer que π ne soit pas un cardinal limite, pour pouvoir conclure que I est stable par $\varinjlim$ de type I_{α_π}, et les J_r stables dans I par ces limites.

126. Cf. forme plus générale du lemme dans 4.13.10.2, p. 302.

127. Il suffit que I soit grande devant tout $\pi' < \pi$.

128. Il suffit ici la stabilité par $\varinjlim$ de type I_{α_π}, cf. page 302 [?].

est cofinal. Mais comme le deuxième foncteur $J^B \longrightarrow I^B$ est pleinement fidèle, il s'ensuit aussitôt que $J \longrightarrow J^B$ est cofinal (car $\xi\backslash J$ pour $\xi \in \mathrm{Ob}\, J^B$ est le même, à isomorphisme près, qu'on considère ξ comme objet de J^B, ou de I^B).

Ainsi dans l'énoncé de la condition d) du lemme, il est inutile de spécifier que J_α est grande devant π, et de même dans la conclusion sur J.

Comme $J \longhookrightarrow I$ est pleinement fidèle, pour voir que ce foncteur est cofinal, il suffit de voir qu'il satisfait F 1, i.e. que pour tout $i \in \mathrm{Ob}\, I$, existe $j \in J$ avec $i \longrightarrow j$. On va construire j comme limite d'un système inductif ordinal d'objets i_α de I, indexé par les ordinaux α tels que $\mathrm{card}\,\alpha < \pi$. Désignons par α_π le plus petite ordinal tel que p. 111
$\mathrm{card}\,\alpha_\pi = \pi$. L'ensemble ordonné I_{α_π} des ordinaux $\alpha < \alpha_\pi$ étant grande devant π_0' ([129]) [page 298]
et de cardinal π, on pourra donc prendre la limite $\varinjlim_{\alpha \in I_{\alpha_0}} i_\alpha$ dans I.

Construction de $(i_\alpha)_{\alpha \in I_{\alpha_0}}$. Soit

$$\alpha_\pi \;=\; \text{plus petit ordinal } \alpha \text{ tel que } \mathrm{card}\,\alpha = \pi, \tag{1}$$

donc c'est l'ordinal caractérisé par

$$\begin{cases} \mathrm{card}\,\alpha_\pi \;=\; \pi \\ \alpha < \alpha_\pi \;\Longrightarrow\; \mathrm{card}\,\alpha \;<\; \pi\ , \end{cases} \tag{2}$$

ou encore par le fait que l'ensemble ordonné I_{α_π} des ordinaux $\alpha < \alpha_\pi$ est *parfaitement bien ordonné*. Ainsi, *I_{α_π} est grande devant π' pour tout cardinal $\pi' < \pi$* ([130]). Dans les conditions b) c) de 4.3.10, il suffira de supposer I stable par $\varinjlim$ de type I_{α_π}, et les J_r $(r \in A)$ stables dans I par ce type de limites.

Lemme 4.13.10.1. *Soit π un cardinal infini, A un ensemble non vide tel que* $\mathrm{card}\,A \leqslant \pi$. *Alors il existe une application* [page 299]

$$\varphi \;:\; I_{\alpha_\pi} \longrightarrow A$$

telle que pour tout $r \in A$, $\varphi^{-1}(\{r\})$ soit une partie cofinale de I_{α_π}, ou ce que est plus précis, $\mathrm{card}\,\varphi^{-1}(\{r\}) = \pi$.

En effet, il suffit de considérer un ensemble A' de cardinal π (p.ex. $A' = I_{\alpha_\pi}$), l'application

$$\psi \;=\; \mathrm{pr}_1 \;:\; A \times A' \longrightarrow A\ ,$$

et de se donner une bijection

$$A \times A' \xrightarrow{\sim} I_{\alpha_\pi}$$

laquelle existe puisque

$$\mathrm{card}\,(A \times A') \;=\; \mathrm{card}\,A \cdot \mathrm{card}\,A' \;=\; \mathrm{card}\,A' \;=\; \pi \;=\; \mathrm{card}\,I_{\alpha_\pi}\ ,$$

puisque $0 \neq \mathrm{card}\,A \leqslant \mathrm{card}\,A' = \pi$ et π infini. On suppose choisie φ comme dans 4.13.10.1, et on construira le système inductif $(i_\alpha)_{\alpha \in I_{\alpha_\pi}}$ de telle façon qu'on ait

$$i_\alpha \;\in\; J_{\varphi(\alpha)}\ .$$

Posant

$$j \;=\; \varinjlim_{\alpha \in I_{\alpha_\pi}} i_\alpha\ ,$$

pour tout r, comme p. 112

[page 300]

129. faux si π est un cardinal limite.
130. Faux si π est cardinal limite.

$$I_r \overset{\text{déf}}{=} \varphi^{-1}(r) \ \subset \ I_{\alpha_\pi}$$

est cofinal dans I_{α_π}, on aura donc

$$j \ = \ \varinjlim_{\alpha \in I_r} i_\alpha \ ,$$

et en vertu de $(*)$, les i_α pour $\alpha \in I_r$ sont dans J_r, donc par passage à la limite, utilisant l'hypothèse c), on trouve que $j \in J_r$, donc

$$j \ \in \ \bigcap_{r \in A} J_r \ = \ J \ ,$$

et comme on choisira

$$i_0 \ = \ i \ , \qquad (**)$$

on aura bien trouvé $i \longrightarrow j$ avec $i \in J$. Donc il suffit de construire le système inductif (i_α) satisfaisant $(*)$ et $(**)$.

Si le système inductif est construit jusqu'au cran $i_\alpha \in \operatorname{Ob} J_{\varphi(\alpha)}$, on continue par

$$i_\alpha \longrightarrow i_{\alpha+1} \ \in \ \operatorname{Ob} J_{\varphi(\alpha+1)} \ ,$$

ce qui est possible puisque $J_{\varphi(\alpha+1)}$ est cofinale. Donc il reste à construire i_α pour α ordinal limite. Or l'ensemble des i_β pour $\beta < \alpha$ est de cardinal $< \pi$, et comme par a) I est grande devant π (il suffit qu'il le soit devant tout cardinal $< \pi$), il existe un $i \in \operatorname{Ob} I$ qui majore tous les i_β. Choisissons des [page 301]

$$i_\beta \xrightarrow{v_\beta} i \ .$$

On n'aura pas a priori commutativité dans

$$i_{\beta'} \xrightarrow{\tau_{\beta,\beta'}} i_\beta \xrightarrow{v_\beta} i \ , \qquad i_{\beta'} \xrightarrow[v_{\beta'}]{} i$$

mais comme l'ensemble des double-flèches $i_{\beta'} \overset{v_\beta \tau_{\beta,\beta'}}{\underset{v_{\beta'}}{\rightrightarrows}} i$ est de cardinal $< \pi$, I étant grande devant π, il existe $i \longrightarrow i'$ qui les égalise tous. Comme $J_{\varphi(\alpha)}$ est cofinal dans I, il existe $i'' \in J_{\varphi(\alpha)}$, et $i \longrightarrow i''$. On prend $i_\alpha = i''$, avec les homomorphismes composés

$$i_\beta \xrightarrow{v_\beta} i \longrightarrow i' \longrightarrow i'' \ , \qquad i_\beta \xrightarrow[\tau_{\alpha,\beta}]{} i''$$

comme morphismes de transition. Cela achève la démonstration de 4.13.10 et par là de 4.13.9, 4.13.8. p. 113 [page 302]

Remarque 4.13.10.2. Voici ce qu'on a eu à utiliser vraiment, pour établir la conclusion de 4.13.10, en termes de I, π, $(J_r)_{r \in A}$ (et sans introduire de π'_0).

(a′) I est grande devant tout cardinal $\pi' < \pi$.

(b′) I est stable par $\varinjlim$ de type I_{α_π}.

(c′) $\forall\, r \in A$, J_r est stable dans I par les $\varinjlim$ de type I_{α_π}.

(d′) $\forall\, r \in A$, J_r est cofinale dans I.

(e′) $\operatorname{card} A \leqslant \pi$.

(**N.B.** d′) et e′) ne sont autres que d) et e) de 4.3.10, tandis que a′), b′), c′) sont des versions affaiblies de a), b), c) respectivement.)

4.13.8 (reformulation). *Soit pour $r \in A$, $\pi''_r \geqslant \pi'_r \geqslant \pi_0$ (= cardinal utile pour $\mathcal{M}$ donné) comme spécifié dans 4.13.2 b) (et c), soit $\pi' = \sup_{r\in A} \pi'_r$, $\pi'' = \sup_{r\in A} \pi''_r$, de sorte que pour tout cardinal π avec $\pi^{\pi'_0} = \pi \geqslant \pi''$, $\underline{S}_r$ soit π-accessible dans $\mathcal{M}$ (et π utile pour $\underline{S}_r$* et *pour $\mathcal{M}$). Soit c un cardinal* non limite *tel que $c \geqslant \operatorname{card} A$ et $c > \pi'$ (p.ex. le successeur de* $\sup(\operatorname{card} A, \pi')$*). Prenons π tel que*

$$\pi^{\pi'} \;=\; \pi \;\geqslant\; \sup(\pi'', c)\ .$$

Alors $\underline{S} = \bigcap_{r\in A} \underline{S}_r$ est π-accessible.

En effet, si α_c est le premier ordinal de cardinal c, comme c n'est pas limite, I_{α_c} est grande devant tout cardinal $c' < c$, en particulier devant π'. Or pour tout $x \in \operatorname{Ob}\mathcal{M}$, $I = \mathcal{M}_\pi/x$ et les $J_r = \underline{S}_r/x$ sont stables par $\varinjlim$ grandes devant π' et de cardinal $\leqslant \pi$, et les J_r stables dans I pour ces limites, donc il en est en particulier ainsi pour les $\varinjlim$ de type I_{α_c}. On peut donc appliquer le résultat 4.13.10.2 pour conclure que si les J_r sont cofinaux dans I (qui est grande devant π, π étant utile pour $\mathcal{M}$), alors $J = \underline{S}/x$ l'est également. Cela implique alors, comme on a vu, que $\underline{S}$ est π-accessible dans $\mathcal{M}$. [page 302 bis]

4.13.10.3. On peut reformuler la reformulation précédente, en utilisant la terminologie introduite plus bas (4.13.23) :

Soit c un cardinal, α_c le plus petit ordinal α tel que $\operatorname{card}\alpha = c$, *$\pi$ un cardinal $\geqslant c$. On suppose*

(∗) *π est utile pour $\mathcal{M}$, et $\mathcal{M}$ est stable par $\varinjlim$ de type I_{α_c}. (Cette deuxième condition est le cas p.ex. si c est* non limite *et $c > \pi_0$, π_0 étant un cardinal tel que $\mathcal{M}$ satisfait 2_{π_0}, p.ex. un cardinal* utile *pour $\mathcal{M}$ ([131])).*

Alors l'ensemble des sous-catégories $\underline{S}$ de $\mathcal{M}$ qui sont α_c-π-accessible dans $\mathcal{M}$ (i.e. qui sont π-accessibles et stables dans $\mathcal{M}$ par $\varinjlim$ de type I_{α_c}) est stable par intersection de cardinal $\leqslant c$. Plus généralement, si Φ est un ensemble de catégories telles que

1°) $I \in \Phi \Longrightarrow \operatorname{card} I \leqslant \pi$ et

2°) $I_{\alpha_c} \in \Phi$,

alors l'ensemble des sous-catégories de $\mathcal{M}$ qui sont Φ-π-accessibles dans $\mathcal{M}$, est stable par intersection de cardinal $\leqslant c$.

Définition 4.13.11 ([132]). Soient $\mathcal{M}$ une catégorie accessible, π_0 un cardinal utile pour $\mathcal{M}$, $\pi > \pi_0$ un cardinal. Une catégorie I est dite π_0-π-*adaptée* si p. 114 [page 303]

a) I est équivalente à une petite catégorie,

b) I est grande devant π, et

c) I est stable par $\varinjlim$ de cardinal $\leqslant \pi$, et grandes devant π_0 ([133]).

Un système inductif $(x_i)_{i\in I}$ de type I dans $\mathcal{M}$ est dit π_0-π-*adapté*, si I est π_0-π-adaptée, i.e. satisfait les conditions a) b) c), et si de plus on a

d) le foncteur $i \longmapsto x_i : I \longrightarrow \mathcal{M}$ commute aux $\varinjlim$ (grandes devant π_0 et de cardinal $\leqslant \pi$) envisagées dans c), et

e) les x_i sont dans $\mathcal{M}_\pi$.

Proposition 4.13.12. *Soient $\mathcal{M}$ une catégorie π_0-accessible, et $\pi > \pi_0$ un cardinal utile pour $\mathcal{M}$. Alors tout $x \in \operatorname{Ob}\mathcal{M}$ admet une représentation comme $x \xleftarrow{\sim} \varinjlim_{j\in J} x_j$, où le système inductif $(x_j)_{j\in J}$ dans $\mathcal{M}$ est π_0-π-adapté. De façon précise, on peut prendre $J = \mathcal{M}_\pi/x$.*

131. Car alors I_{α_c} est grande devant π_0.

132. Refondre avec 4.13.23 etc.

133. **N.B.** Si $\pi = \pi_0$, la condition c) équivaut à dire que I est stable par facteurs directs. [page 304]

En effet, la vérification des propriétés a) à d) pour le système inductif canonique, de $\varinjlim$ isomorphe à x, est immédiate.

La proposition précédente ne dit pas si on peut prendre pour J un ensemble ordonné. Dans ce cas, la condition c) signifie que pour toute partie J' de J grande devant π_0 et de cardinal $\leqslant \pi$, J admet une borne supérieure i_J dans J, et la condition d) que l'on a alors $x_{i_J} \xleftarrow{\sim} \varinjlim_{i\in J'} x_i$.

L'idée naturelle, pour construire un système inductif π_0-π-adapté $(x_j)_{j\in J}$, avec J ordonnée, en partant de celui qu'on a canoniquement, avec $J = \mathcal{M}_\pi/x$, est de prendre pour I l'ensemble, ordonné par inclusion, des sous-catégories J' de J_0 (sous-catégorie pleine petite de J équivalente à J) qui sont de cardinal $\leqslant \pi$ et grandes devant π_0. (Comparer (4.7.3.3), page 165). Cet ensemble ordonné est bel et bien (petit et) *grand devant* π, si on suppose que $\pi^{\pi_0} = \pi$ (cf. démonstration 4.7.5, p. 168-171).

[page 305]

Lemme 4.13.13. *Soient π_0, $\pi > \pi_0$ des cardinaux infinis tels que $\pi^{\pi_0} = \pi$, et J une petite catégorie, grande devant π. Soit I l'ensemble des sous-catégories J' de J qui sont grandes devant π_0, et de cardinal $\leqslant \pi$. Alors I est π_0-π-adaptée.*

Il reste à voir que pour tout ensemble ordonné A grand devant π_0 et de cardinal $\leqslant \pi$, si $r \longmapsto J_r$ est une famille croissante d'éléments de I indexée par A, alors

$$J \overset{\text{déf}}{=} \bigcup_{r\in A} J_r \;=\; \varinjlim_{r\in A} J_r$$

est dans I, i.e. est une sous-catégorie de I de cardinal $\leqslant \pi$ (ce qui est clair) et *grande devant* π_0. Cela va résulter du

p. 115

Lemme 4.13.13.1. *Soit $(J_r)_{r\in A}$ un système inductif de catégories grandes devant π_0, indexé par un ensemble ordonné A grand devant π_0. Alors $J = \varinjlim_{r\in A} J_r$ est grande devant π_0.*

[page 306]

Il faut voir que si B est un ensemble de cardinal $\leqslant \pi_0$, alors le foncteur diagonal

$$\delta \;:\; J \longrightarrow J^B \qquad (*)$$

est cofinal. Or comme A est grande devant π_0, $\operatorname{card} B \leqslant \pi_0$, les produits indexés par B commutent aux $\varinjlim$ de type A (SGA 4 I 9.8 appliqué à Cat et à π_0). Donc la flèche $(*)$ s'interprète comme limite inductive des flèches similaires

$$\delta_r \;:\; J_r \longrightarrow J_r^B \;, \qquad (**)$$

lesquelles sont cofinales, donc δ est cofinal comme limite inductive de foncteurs cofinaux.

Lemme 4.13.13.2. *Sous les hypothèses de 4.13.13, soient $\mathcal{M}$ une catégorie satisfaisant L_{π_0}, et $(x_j)_{j\in J}$ (où $J \longrightarrow \mathcal{M}$) un système inductif dans $\mathcal{M}$, indexé par J. Pour toute $J' \in I$, posons*

$$x_{J'} \;=\; \varinjlim_{j\in J'} x_j$$

(qui existe dans $\mathcal{M}$, puisque $\mathcal{M}$ satisfait à L_{π_0}). Alors les $(x_{J'})_{J'\in I}$ forment un système inductif dans $\mathcal{M}$, et $I \longrightarrow \mathcal{M}$ commute aux limites inductives grandes devant π_0 et de cardinal $\leqslant \pi$. Si $\mathcal{M}$ est π_0-accessible, et les x_j ($j \in \operatorname{Ob} J$) sont dans $\mathcal{M}_\pi$, alors $(x_{J'})_{J'\in I}$ est un système inductif π_0-π-adapté dans $\mathcal{M}$.

[page 307]

Tout ceci est essentiellement trivial, et donne :

Corollaire 4.13.14 (de 4.13.12). *Sous les conditions de 4.13.12, si $\pi^{\pi_0} = \pi$, on peut pour tout $x \in \operatorname{Ob}\mathcal{M}$ trouver une représentation $x \simeq \varinjlim_{i\in I} x_i$, où $(x_i)_{i\in I}$ est un système*

inductif π_0-π-adapté avec I ensemble ordonné. *De plus, si $\pi' > \pi$ et si $x \in \mathcal{M}_{\pi'}$, on peut prendre I tel qu'on ait*

$$\operatorname{card} I \leqslant \pi'^{\pi} .$$

Ce dernier complément est immédiat, via les majorations habituelles. [page 308]

Théorème 4.13.15 ([134]). *Soient $\mathcal{M}$ une catégorie π_0-accessible, et $\pi > \pi'_0 \geqslant \pi_0$ tels que $\pi^{\pi_0} = \pi$ ([135]). Soit $\underline{S}$ une sous-catégorie strictement pleine de $\mathcal{M}$, et soit $\underline{S}(\pi) = \underline{S} \cap \mathcal{M}_\pi$. Les conditions suivantes sont équivalentes.*

ⓐ *$\underline{S}$ est π-accessible dans $\mathcal{M}$ (4.13.3) et $\underline{S}$ est stable dans $\mathcal{M}$ par limites inductives grandes devant π'_0.*

a′) *$\underline{S}$ est π-accessible dans $\mathcal{M}$, et $\underline{S}(\pi)$ est stable dans $\mathcal{M}_\pi$ par limites inductives grandes devant π'_0 et de cardinal $\leqslant \pi$* ([136]). p. 116

b) *Pour tout objet x de $\mathcal{M}$, on a ceci : la sous-catégorie strictement pleine $\underline{S}(\pi)/x$ de $J = \mathcal{M}_\pi/x$ est cofinale dans $\mathcal{M}_\pi/x$ si et seulement si $x \in \operatorname{Ob} \underline{S}$. De plus, $\underline{S}(\pi)$ est stable dans $\mathcal{M}_\pi$ pour $\varinjlim$ grandes devant π'_0 et de cardinal $\leqslant \pi$.*

ⓒ *Pour tout objet x de $\mathcal{M}$ et pour toute représentation $x \simeq \varinjlim_{i \in I} x_i$, où $(x_i)_{i \in I}$ est un système inductif π'_0-π-adapté, (4.13.11), on a ceci : la sous-catégorie strictement pleine $I_{\underline{S}}$ de I formée des $i \in \operatorname{Ob} I$ tels que $x_i \in \operatorname{Ob} \underline{S}$, est cofinale dans I si et seulement si $x \in \operatorname{Ob} \underline{S}$. De plus, $S(\pi)$ est stable dans $\mathcal{M}_\pi$ par $\varinjlim$ grandes devant π'_0 et de cardinal $\leqslant \pi$.*

c′) *Comme d)* `[plutôt c)]`, *avec I ensemble ordonné.* [page 309]

Corollaire 4.13.16. *Les hypothèses sur $\mathcal{M}$, π_0, $\underline{S}$ étant celles de 4.13.15, pour qu'il existe des cardinaux $\pi > \pi'_0 \geqslant \pi_0$ satisfaisant les conditions $\pi^{\pi'_0} = \pi$ (a fortiori $\pi^{\pi_0} = \pi$) et les conditions équivalentes a) à d′)* `[plutôt c′)]` *de 4.13.15, il (faut et il) suffit que $\underline{S}$ soit accessible dans $\mathcal{M}$. De façon plus précise, si $\underline{S}$ est accessible dans $\mathcal{M}$, soit $\pi'_0 \geqslant \pi_0$ un cardinal tel que $\underline{S}$ soit π'_0-accessible dans $\mathcal{M}$, et soit π un cardinal $> \pi'_0$ tel que $\pi^{\pi'_0} = \pi$. Alors $(\underline{S}, \pi'_0, \pi)$ satisfait aux conditions équivalentes de 4.13.15.*

En effet, le "il faut" est évident sur la condition a) de 4.13.15. Pour le "il suffit" on note que $\underline{S}$ π'_0-accessible dans $\mathcal{M}$ implique que $\underline{S}$ est stable dans $\mathcal{M}$ par $\varinjlim$ grandes devant π'_0. Donc pour vérifier a), il suffit de vérifier que $\underline{S}$ est π-accessible dans $\mathcal{M}$. Or comme $\underline{S}$ est π'_0-accessible et que $\pi > \pi'_0$ satisfait $\pi^{\pi'_0} = \pi$, on en conclut que $\underline{S}$ est $\underline{S}_\pi$-accessible, i.e. $\underline{S} \xleftarrow{\sim} \operatorname{Ind}_\pi(\underline{S}_\pi)$. Donc en vertu de 4.13.3, il reste à voir que $\underline{S}_\pi \subset \mathcal{M}_\pi$, [page 310] ou ce qui revient au même, que $\underline{S}_\pi \subset \underline{S}(\pi) \overset{\text{déf}}{=} \underline{S} \cap \mathcal{M}_\pi$. (En fait, on aura même égalité, car il est clair que $\underline{S}(\pi) \subset \underline{S}_\pi \ldots$). Or $\underline{S}(\pi)$ est une sous-catégorie de $\underline{S}$ stable par $\varinjlim$ grandes devant π'_0 et de cardinal $\leqslant \pi$ (puisque $\underline{S}$ et $\mathcal{M}_\pi$ sont stables par ces limites *dans* $\mathcal{M}$, et que ces limites dans $\underline{S}$ et dans $\mathcal{M}$ sont itou), et $\underline{S}(\pi)$ contient $S_{\pi'_0}$. Donc $\underline{S}(\pi)$ contient $\underline{S}_\pi$, en vertu de 4.7.1 (page 161), implication c) $\Longrightarrow$ b′), appliquée à $\underline{S}$, π'_0, π au lieu de $\mathcal{M}$, π_0, π. Cela prouve donc le corollaire 4.13.16.

Démonstration de 4.13.15. Voici les implications ± tautologiques,

$$\mathrm{a} \Longrightarrow \mathrm{a}' \overset{\bullet}{\Longrightarrow} \mathrm{c} \begin{array}{l} \nearrow \mathrm{c}' \\ \searrow \mathrm{b} \end{array} , \qquad (*)$$

134. Cf. version plus générale et plus symétrique du théorème 4.13.15 dans 4.13.22.

135. On peut se borner à supposer π utile pour $\mathcal{M}$ (au lieu de $\pi^{\pi_0} = \pi$), alors on trouve que a, a′, b, c sont équivalentes et impliquent c′, mais ne sont peut-être pas équivalentes à c′.

136. donner un nom à cette dernière condition, soit $\mathrm{L}(\pi'_0, \pi)$ (pour $\underline{S}(\pi)$ dans $\mathcal{M}_\pi$).

que je vais expliciter un peu. On a a $\Longrightarrow$ a′ puisque si a est satisfait, $\underline{S}$ *et* $\mathcal{M}_\pi$ sont stables *dans* $\mathcal{M}$ par $\varinjlim$ grandes devant π'_0 et de cardinal $\leqslant \pi$, donc aussi leur intersection $\underline{S}(\pi)$, qui est donc aussi stable dans $\mathcal{M}_\pi$ par lesdites limites. L'implication c $\Longrightarrow$ c′ est une tautologie, et c $\Longrightarrow$ b aussi, compte tenu de 4.13.12, qui nous dit que le système inductif canonique $(x_i)_{i\in I}$, avec $I = \mathcal{M}_\pi/x$, de limite x est π_0-π-adapté. (**N.B.** Comme $\pi^{\pi'_0} = \pi$ et $\pi'_0 \geqslant \pi_0$, on a aussi $\pi^{\pi_0} = \pi$, donc π est utile pour $\mathcal{M}$, de sorte que 4.13.12 s'applique.) [page 311] p. 117

Reste à prouver la "± tautologie" a′ $\Longrightarrow$ c. Soit donc une représentation π_0-π-adaptée

$$x \;\simeq\; \varinjlim_{i\in I} x_i \ ,$$

prouvons que

$$x \;\in\; \mathrm{Ob}\,\underline{S} \qquad\Longleftrightarrow\qquad I_{\underline{S}} \text{ cofinal dans } I.$$

L'implication $\Longleftarrow$ provient du fait que, $\underline{S}$ étant π-accessible dans $\mathcal{M}$, est stable dans $\mathcal{M}$ par $\varinjlim$ grandes devant π ([137]). Reste à prouver que si $x \in \mathrm{Ob}\,\underline{S}$, alors $I_{\underline{S}}$ est cofinal dans I. Considérons donc le diagramme de catégories [page 312]

$$\begin{array}{ccc} I & \xrightarrow{\ \varphi\ } & J = \mathcal{M}_\pi/x \\ \uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \alpha} \\ I' = I_{\underline{S}} & \xrightarrow{\ \varphi'\ } & J' = \underline{S}(\pi)/x \ , \end{array}$$

c'est un carré cartésien ($I' = I_{\underline{S}}$ est l'image inverse par $\varphi : I \longrightarrow J$ de la sous-catégorie strictement pleine J' de J). On a les propriétés suivantes

1) I est grande devant π, et φ cofinal ($\Longrightarrow J$ grande devant π).
2) I stable par $\varinjlim$ grandes devant π'_0 et de cardinal $\leqslant \pi$, et φ commute à ces $\varinjlim$.
3) J' est stable par $\varinjlim$ du type précédent et α y commute ([138]).
4) J' cofinal dans J.

On vient de conclure que $I' = \varphi^{-1}(J')$ est cofinale dans I. Comme c'est une sous-catégorie pleine (et même strictement pleine), il suffit de prouver la propriété F 1, i.e. que pour tout $i \in \mathrm{Ob}\,I$, existe $i' \in \mathrm{Ob}\,I'$ et une flèche $i \longrightarrow i'$. [page 313]

On va construire encore i' par construction transfinie, sur l'intervalle ordinal I_{α_π}, en construisant un système inductif

$$(i_\alpha)_{\alpha\in I_{\alpha_\pi}} \ , \qquad i_\alpha \in \mathrm{Ob}\,I \ ,$$

d'objets de I, et un système inductif $(j_\alpha)_{\alpha\in I_{\alpha_\pi}}$, $j_\alpha \in \mathrm{Ob}\,J'$, flèches de transition notées $\tau_{\beta,\alpha} : i_\alpha \longrightarrow i_\beta$, $\tau'_{\beta,\alpha} : j_\alpha \longrightarrow j_\beta$, enfin pour tout α dans I_{α_π} des flèches

$$\varphi(i_\alpha) \xrightarrow{u_\alpha} j_\alpha \xrightarrow{v_\alpha} \varphi(i_{\alpha+1}) \ (\xrightarrow{u_{\alpha+1}} j_{\alpha+1}\ ) \qquad (*)$$

(arcs : $\tau'_{\alpha+1,\alpha}$ de j_α à $j_{\alpha+1}$; $\varphi(\tau_{\alpha+1,\alpha})$ de $\varphi(i_\alpha)$ à $\varphi(i_{\alpha+1})$)

dans J, telles que [p. 118]

$$\begin{cases} v_\alpha u_\alpha \;=\; \varphi(\tau_{\alpha+1,\alpha}) \\ u_{\alpha+1} v_\alpha \;=\; \tau'_{\alpha+1,\alpha} \end{cases} \qquad ([139]) \ . \qquad (**)$$

[page 314]

Montrons comment la construction d'un tel système d'objets et de flèches avec

$$i_0 \;=\; i \qquad (***)$$

va impliquer l'existence de $i' \in \operatorname{Ob} I'$ et de $i \longrightarrow i'$. En effet, comme I_{α_π} est grande devant π_0' (il est grand devant tout cardinal $< \pi$), il existe

$$i' \overset{\text{déf}}{=} \varinjlim_{i \in I_{\alpha_\pi}} i_\alpha$$

dans I, et on a une flèche de transition

$$i \;=\; i_0 \longrightarrow i' \;,$$

donc il reste à prouver que $i' \in \operatorname{Ob} I'$, i.e. $\varphi(i') \in \operatorname{Ob} J'$. Or φ commutant aux $\varinjlim$ de type I_{α_π}, on aura

$$\varphi(i) \;=\; \varinjlim \varphi(i_\alpha) \;.$$

Il me faut encore des compatibilités

$$\begin{array}{ccc} \varphi(i_\alpha) & \xrightarrow{u_\alpha} & j_\alpha \\ {\scriptstyle \varphi(\tau_{\beta,\alpha})}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \tau'_{\beta,\alpha}} \\ \varphi(i_\beta) & \xrightarrow{u_\beta} & j_\alpha \end{array} \qquad \text{et} \qquad \begin{array}{ccc} j_\alpha & \xrightarrow{v_\alpha} & \varphi(i_{\alpha+1}) \\ {\scriptstyle \tau'_{\beta,\alpha}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \varphi(\tau_{\beta+1,\alpha+1})} \\ j_\beta & \xrightarrow{v_\beta} & \varphi(i_{\beta+1}) \end{array} \qquad (****)$$

oubliées tantôt.

Les compatibilités $(****)$ impliquent qu'on a des homomorphismes [page 315]

$$\varphi(i) \underset{v}{\overset{u}{\rightleftarrows}} j \qquad \text{où } j \overset{\text{déf}}{=} \varinjlim_{\alpha \in I_{\alpha_\pi}} j_\alpha \quad \text{(limite } \textit{dans } J', \text{ donc dans } J) \;,$$

et les compatibilités $(**)$ impliquent que

$$vu \;=\; \mathrm{id}_{\varphi(i)} \;, \qquad uv = \mathrm{id}_J \;,$$

donc que u, v sont des isomorphismes inverses l'un de l'autre. Comme J' est une sous-catégorie *strictement* pleine de J, il s'ensuit bien que $\varphi(i) \in J'$, i.e. $i \in I'$, q.e.d.

Donc tout revient à construire les

$$\underbrace{i_\alpha}_{\in \operatorname{Ob} I} \;,\; \tau_{\beta,\alpha} \;, \qquad \underbrace{j_\alpha}_{\in \operatorname{Ob} J'} \;,\; \tau'_{\beta,\alpha} \;, \qquad u_\alpha \;,\; v_\alpha \;,$$

satisfaisant aux contraintes $(**)$, $(***)$, $(****)$. On va faire la construction en trois étapes. p. 119

① Départ :

$$i_0 \;=\; i \;.$$

Comme J' est cofinal dans J, existe $j_0 \in \operatorname{Ob} J'$ et

$$\varphi(i_0) \xrightarrow{u_0} j_0 \;.$$

137. On n'utilise ici, pour $\Longleftarrow$, de l'hypothèse $(x_i)_{i \in I}$ π_0-π-adapté, que le seul fait que I soit grande devant π.

[page 316]

138. C'est ici qu'intervient l'hypothèse de stabilité faite dans b), car d'après b), $\underline{S}$ est π-accessible dans $\mathcal{M}$.

139. cf. aussi $(****)$, page suivante.

② Supposons que les i_β, j_β soient construits pour $\beta < \alpha$, ainsi que les $\tau_{\beta',\beta} : i_\beta \longrightarrow i_{\beta'}$, $\tau'_{\beta',\beta} : j_\beta \longrightarrow j_{\beta'}$ pour $\beta, \beta' < \alpha$, enfin les $u_\beta : \varphi(i_\beta) \longrightarrow j_\beta$, $v_\beta : j_\beta \longrightarrow \varphi(i_{\beta+1})$ pour $\beta < \alpha$ resp. pour $\beta + 1 < \alpha$, de façon à satisfaire aux contraintes $(**)$, $(***)$, i.e. commutativités dans

$$\left\{\begin{array}{lll}
\left.\begin{array}{ll} ① & \varphi(i_\beta) \xrightarrow{u_\beta} j_\beta \xrightarrow{v_\beta} \varphi(i_{\beta+1}) \\ & \qquad \overset{\frown}{\varphi(\tau_{\beta+1,\beta})} \\ ② & j_\beta \xrightarrow{v_\beta} \varphi(i_{\beta+1}) \xrightarrow{u_{\beta+1}} j_{\beta+1} \\ & \qquad \underset{\smile}{\tau'_{\beta+1,\beta}} \end{array}\right\} & si\ \beta + 1 < \alpha \\
③ \quad \begin{array}{ccc} \varphi(i_\beta) & \xrightarrow{u_\beta} & j_\beta \\ {\scriptstyle \varphi(\tau_{\beta',\beta})}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \tau'_{\beta',\beta}} \\ \varphi(i_{\beta'}) & \xrightarrow{u_{\beta'}} & j_{\beta'} \end{array} & \text{si } \beta < \beta' < \alpha \\
④ \quad \begin{array}{ccc} j_\beta & \xrightarrow{v_\beta} & \varphi(i_{\beta+1}) \\ {\scriptstyle \tau'_{\beta',\beta}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \varphi(\tau_{\beta'+1,\beta+1})} \\ j_{\beta'} & \xrightarrow{v_{\beta'}} & \varphi(i_{\beta'+1}) \end{array} & \text{si } \beta < \beta' \text{ et } \beta' + 1 < \alpha\ ,
\end{array}\right.$$

il faut construire

1) $i_\alpha \in \operatorname{Ob} I$, et un homomorphisme $(i_\beta)_{\beta\in I_\alpha} \longrightarrow i_\alpha$, i.e. des $\tau_{\alpha,\beta} : i_\beta \longrightarrow i_\alpha$ $(\beta \in I_\alpha)$, compatibles aux translations $\tau_{\beta',\beta}$ pour $\beta < \beta' < \alpha$. [page 317] p. 120
2) $j_\alpha \in \operatorname{Ob} J'$, et un homomorphisme $(j_\beta)_{\beta\in I_\alpha} \longrightarrow j_\alpha$, i.e. des $\tau'_{\alpha,\beta} : j_\beta \longrightarrow j_\alpha$ $(\beta \in I_\alpha)$, compatibles aux translations $\tau'_{\beta',\beta}$ pour $\beta < \beta' < \alpha$.
3) Une flèche
$$u_\alpha : \varphi(i_\alpha) \longrightarrow j_\alpha\ .$$
4) Si α n'est pas ordinal limite, i.e. $\alpha = \alpha_0 + 1$, une flèche
$$v_{\alpha_0} : j_{\alpha_0} \longrightarrow \varphi(i_{\alpha_0+1}) = \varphi(i_\alpha)\ ;$$

et ceci de façon à satisfaire aux contraintes ①②③④ quand on y suppose $\beta+1 \leqslant \alpha$ (au lieu de $\beta' < \alpha$) dans ① et ②, et $\beta' \leqslant \alpha$ (au lieu de $\beta' < \alpha$) dans ③, et $\beta' + 1 \leqslant \alpha$ (au lieu de $\beta' + 1 < \alpha$) dans ④. Donc pour les contraintes 1°, 2°, 4°, il n'y a en tenir compte *que* si α n'est pas ordinal limite, donc $\alpha = \alpha_0 + 1$, et en y faisant

$$\beta' \ = \ \alpha_0\ .$$

Quant à la contrainte 3°, il faut en tenir compte pour $\beta' = \alpha$. Donc au total, il faut exiger

$$(3_\alpha)(\beta) \qquad \begin{array}{ccc} \varphi(i_\beta) & \xrightarrow{u_\beta} & j_\beta \\ {\scriptstyle \varphi(\tau_{\alpha,\beta})}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \tau'_{\alpha,\beta}} \\ \varphi(i_\alpha) & \xrightarrow{u_\alpha} & j_\beta \end{array} \qquad \text{commutatif pour } \beta < \alpha\ (^{140}),$$ [page 318]

(par restriction sur α), et si $\alpha = \alpha_0 + 1$ est ordinal non limite, il faut exiger de plus

$$(4_\alpha)(\beta) \qquad \begin{array}{ccc} j_\beta & \xrightarrow{v_\beta} & \varphi(i_{\beta+1}) \\ {\scriptstyle \tau'_{\alpha_0,\beta}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \varphi(\tau_{\alpha,\beta+1})} \\ j_{\alpha_0} & \xrightarrow{v_{\alpha_0}} & \varphi(i_{\alpha_0+1}) = \varphi(i_\alpha) \end{array} \qquad \beta < \alpha_0$$

140. **N.B.** Il suffit de l'exiger pour $\beta = \alpha_0$, dans le cas $\alpha = \alpha_0 + 1$, cf. ci-dessous, p. 323.

$$(1_\alpha) \qquad \varphi(i_{\alpha_0}) \xrightarrow{u_{\alpha_0}} j_{\alpha_0} \xrightarrow{v_{\alpha_0}} \varphi(i_{\alpha_0+1}) = \varphi(i_\alpha) \quad ; \quad \varphi(\tau_{\alpha,\alpha_0})$$

$$(2_\alpha) \qquad j_{\alpha_0} \xrightarrow{v_{\alpha_0}} \varphi(i_{\alpha_0+1}) = \varphi(i_\alpha) \xrightarrow{u_\alpha} j_\alpha \ . \quad ; \quad \tau'_{\alpha,\alpha_0}$$

p. 121

Dans ces compatibilités, j'ai cerclé les flèches $\tau_{\alpha,\beta}$, $\tau'_{\alpha,\beta}$ $(\beta < \alpha)$, $\Big(\ \tau_{\alpha,\beta+1}\ (\beta{+}1 < \alpha)\ \Big)$, v_{α_0}, $\Big(\ \tau_{\alpha,\alpha_0}\ \Big)$, u_α, $\Big(\ \tau'_{\alpha,\alpha_0}\ \Big)$, qui ont été introduites dans les donnés 1) 2) 3) 4), page 317.

On va distinguer donc les deux cas. [page 319]

2 A) $\alpha = \alpha_0 + 1$.

Pour construire i_α et les $\tau_{\alpha,\beta} : i_\beta \longrightarrow i_\alpha$, il suffit de construire i_α et

$$\tau_{\alpha,\alpha_0} \ : \ i_{\alpha_0} \ \longrightarrow \ i_\alpha = i_{\alpha_0+1} \ .$$

De même pour j_α et les $\tau'_{\alpha,\beta}$, il suffit de construire

$$\tau'_{\alpha,\alpha_0} \ : \ j_{\alpha_0} \ \longrightarrow \ j_\alpha \ .$$

Il faut de plus se donner

$$j_{\alpha_0} \xrightarrow{v_{\alpha_0}} \varphi(\underbrace{i_\alpha}_{=i_{\alpha_0+1}}) \xrightarrow{u_\alpha} j_\alpha \ ,$$

donc en tout deux objets i_α, j_α (dans I et dans J' respectivement) et quatre flèches τ_{α,α_0}, τ'_{α,α_0}, v_{α_0}, u_α. Il faut quatre compatibilités (page 318), où les deux dernières $3_\alpha(\beta)$, $4_\alpha(\beta)$ dépendent d'un paramètre $\beta < \alpha$, i.e. $\beta \leqslant \alpha_0$, ou de $\beta < \alpha_0$.

On va d'abord s'occuper de deux premières compatibilités 1_α, 2_α, en termes de la donnée de [page 320 biffé] [page 321]

$$i_{\alpha_0} \ \in \ \mathrm{Ob}\, I \ , \qquad j_{\alpha_0} \ \in \ \mathrm{Ob}\, J' \ , \qquad u_{\alpha_0} \ : \ \varphi(i_{\alpha_0}) \ \longrightarrow \ j_{\alpha_0} \ .$$

Les deux compatibilités voulues pour les deux objets i_α, j_α et les quatre flèches τ_{α,α_0}, τ'_{α,α_0}, v_{α_0}, u_α sont indiquées dans le diagramme

$$(*) \qquad \varphi(i_{\alpha_0}) \xrightarrow{u_{\alpha_0}} j_{\alpha_0} \underset{v_{\alpha_0}\ ?}{\overset{\tau'_{\alpha,\alpha_0}}{\rightrightarrows}} \varphi(\underbrace{i_\alpha}_{?}) \xrightarrow{u_\alpha\ ?} j_\alpha \ . \quad ; \quad \varphi(\tau_{\alpha,\alpha_0})$$

On note que comme φ est cofinal, $\exists\ i_\alpha = i \in \mathrm{Ob}\, I$ et $j_{\alpha_0} \xrightarrow{v_{\alpha_0}} \varphi(i)$. Mais on veut que le composé

$$w \ : \ \varphi(i_{\alpha_0}) \xrightarrow{u_{\alpha_0}} j_{\alpha_0} \xrightarrow{v_{\alpha_0}} \varphi(i)$$

soit de la forme $\varphi(\tau)$, où $\tau = \tau_{\alpha,\alpha_0} : i_{\alpha_0} \longrightarrow i_\alpha$ est une flèche dans I. Comme φ est un foncteur cofinal de catégories filtrantes, on sait qu'on peut trouver $i \xrightarrow{\rho} i'$ dans I, [page 322]

p. 122

tel que la flèche composée $\varphi(i_{\alpha_0}) \xrightarrow{w} \varphi(i) \xrightarrow{\varphi(\rho)} \varphi(i')$ soit de la forme $\varphi(\tau)$. Donc quitte à remplacer i par i', et v_{α_0} par le composé $v'_{\alpha_0} : j_{\alpha_0} \xrightarrow{v_{\alpha_0}} \varphi(i) \xrightarrow{\varphi(\rho)} \varphi(i')$, on peut supposer que $v_{\alpha_0}u_{\alpha_0}$ est de la forme $\varphi(\tau)$. Cela nous donne donc en principe l'objet $i = i_\alpha$, et les flèches $v_{\alpha_0} : j_{\alpha_0} \longrightarrow \varphi(i)$ et $\tau_{\alpha,\alpha_0} : i_{\alpha_0} \longrightarrow i_\alpha$, de façon à satisfaire à la première compatibilité dans $(*)$. Il reste à construire j_α, τ'_{α,α_0}, u_α de façon à satisfaire à la deuxième compatibilité $(*)$. Or J' étant cofinal dans J, il existe j_α dans J' et une flèche $u_\alpha : \varphi(i_\alpha) \longrightarrow j_\alpha$. D'autre part, comme $J' \longrightarrow J$ est pleinement fidèle, la flèche composée $j_{\alpha_0} \xrightarrow{v_{\alpha_0}} \varphi(i_\alpha) \xrightarrow{u_\alpha} j_\alpha$ dans J, entre objets de J', provient d'une unique flèche $\tau'_{\alpha,\alpha_0} : j_{\alpha_0} \longrightarrow j_\alpha$ dans J'.

Ainsi, on a construit les deux objets et les quatre flèches voulues, de façon à satisfaire aux contraintes 1_α, 2_α de la page 318. Les contraintes $3_\alpha(\beta)$, $4_\alpha(\beta)$ sont-elles alors satisfaites automatiquement ? [page 323]

$$\begin{array}{ccc} \varphi(i_\beta) & \xrightarrow{u_\beta} & j_\beta \\ \downarrow & & \downarrow \\ \varphi(i_{\alpha_0}) & \xrightarrow{u_{\alpha_0}} & j_{\alpha_0} \\ {\scriptstyle \varphi(\tau_{\alpha,\alpha_0})}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \tau'_{\alpha,\alpha_0}} \\ \varphi(i_\alpha) & \xrightarrow{u_\alpha} & j_\alpha \end{array} \qquad \beta < \alpha, \text{ i.e. } \beta \leqslant \alpha_0 \ .$$

Le carré supérieur est commutatif par hypothèse de récurrence, pour que le carré total (composé) soit commutatif, il suffit que le carré inférieur le soit. On a donc une double-flèche $(\tau'_{\alpha,\alpha_0}u_{\alpha_0}, u_\alpha\varphi(\tau_{\alpha,\alpha_0})) : \varphi(i_\alpha) \rightrightarrows j_\alpha$, elle n'est peut-être pas triviale, mais on sait, J' étant filtrante, qu'on peut l'égaliser par une flèche $j_\alpha \longrightarrow \bar{j}_\alpha$ dans J'. Donc quitte à remplacer j_α par $\bar{j}_\alpha$, u_α par le composé $\bar{u}_\alpha : \varphi(i_0) \longrightarrow j_\alpha \longrightarrow \bar{j}_\alpha$ et τ'_{α,α_0} par le composé [page 324]
$\bar{\tau}'_{\alpha,\alpha_0} : j_{\alpha_0} \longrightarrow j_\alpha \longrightarrow \bar{j}_\alpha$ (sans toucher à i_α, v_{α_0}, $\tau_{\alpha_0,\alpha}$), on peut obtenir la commutativité, d'où $3_\alpha(\beta)$.

Reste la contrainte $4_\alpha(\beta)$. Pour ceci, considérons le diagramme composite

$$\begin{array}{ccc} j_\beta & \xrightarrow{v_\beta} & \varphi(i_{\beta+1}) \\ {\scriptstyle \tau'_{\alpha_0,\beta}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \varphi(\tau_{\alpha,\beta+1})} \\ j_{\alpha_0} & \xrightarrow{v_{\alpha_0}} & \varphi(i_{\alpha_0+1}) = \varphi(i_\alpha) \ . \end{array}$$

Si α_0 n'est pas un ordinal limite, mais de la forme $\alpha_1 + 1$, on peut encore se ramener au cas où $\beta = \alpha_1$, en procédant comme ci-dessus. Mais on peut procéder dans tous les cas, sans un tel artifice (!), en considérant les double-flèches

$$(*) \qquad j_\beta \underset{v_{\alpha_0}\tau'_{\alpha_0,\beta}}{\overset{\varphi(\tau_{\alpha,\beta+1})v_\beta}{\rightrightarrows}} \varphi(i_\alpha)$$

déduites du carré précédent. Comme l'ensemble de ces double-flèches est de cardinal p. 123
$\operatorname{card}\alpha < \pi$, et que J est grande devant π (il suffirait qu'il le soit pour les cardinaux [page 325]
$\pi' < \pi$), on peut trouver une flèche $\varphi(i_\alpha) \xrightarrow{u} j$ dans J qui égalise toutes ces double-flèches. Comme φ est cofinal, on peut supposer que j est de la forme $\varphi(i)$. Comme φ est un foncteur cofinal de catégories filtrantes, il existe alors $i \xrightarrow{\rho} i'$ dans I, tel que le composé $\varphi(i_\alpha) \xrightarrow{u} \varphi(i) \xrightarrow{\varphi(\rho)} \varphi(i')$ soit de la forme $\varphi(\sigma)$, pour $\sigma : i_\alpha \longrightarrow i'$. Au total, on a trouvé $\sigma : i_\alpha \longrightarrow i'$, tel que $\varphi(\sigma)$ $(= \varphi(\rho)u) : \varphi(i_\alpha) \longrightarrow \varphi(i')$ égalise toutes les double-flèches [page 326]

envisagées dans (∗), p. 324. Donc il s'impose de remplacer i_α par $\bar{i}_\alpha = i'$, v_{α_0} par le composé $j_{\alpha_0} \longrightarrow \varphi(i_\alpha) \xrightarrow{\varphi(\sigma)} \varphi(\bar{i}_\alpha)$, τ_{α,α_0} par le composé $\bar{\tau}_{\alpha,\alpha_0} : i_{\alpha_0} \xrightarrow{\tau_{\alpha,\alpha_0}} i_\alpha \xrightarrow{\sigma} \bar{i}_\alpha$.

Pour résumer, voici la recette pour construire, d'abord $\boxed{i_\alpha,\, v_{\alpha_0},\, \tau_{\alpha,\alpha_0},}$et *ensuite* $\boxed{j_\alpha,\, u_\alpha,\, \tau'_{\alpha,\alpha_0}}$.

On procède d'abord comme page 321, 322 pour construire le premier triple, de façon à satisfaire à la première compatibilité (∗) (p. 321), i.e. à 1_α. On "corrige" ensuite ce choix de i_α, v_{α_0}, τ_{α,α_0}, en remplaçant i_α par $\bar{i}_\alpha$ pour $\sigma : i_\alpha \longrightarrow \bar{i}_\alpha$, v_{α_0} par $\bar{v}_{\alpha_0} = \varphi(\sigma)v_{\alpha_0}$, et τ_{α,α_0} par $\bar{\tau}_{\alpha,\alpha_0} = \sigma\tau_{\alpha,\alpha_0}$, de sorte à obtenir les compatibilités $4_\alpha(\beta)$ pour $\beta < \alpha_0$, comme on vient de l'indiquer. On ne touchera plus à ces choix de i_α, v_{α_0}, τ_{α,α_0}, dans la suite de la construction. On construit $(j_\alpha, u_\alpha, \tau'_{\alpha,\alpha_0})$ de façon à satisfaire à la deuxième compatibilité (∗) (p. 321), comme indiqué page 322. Ensuite, on corrige ce choix, en remplaçant j_α par [page 327]
$\bar{j}_\alpha$, avec $\rho : j_\alpha \longrightarrow \bar{j}_\alpha$, et u_α par $\bar{u}_\alpha = \rho u_\alpha$, τ'_{α,α_0} par $\bar{\tau}'_{\alpha,\alpha_0} = \rho\tau'_{\alpha,\alpha_0}$, de façon à satisfaire aux contraintes $3_\alpha(\beta)$ de la page 318.

Cela achève la construction dans le cas où $\alpha = \alpha_0 + 1$.

Cas 2 B : α est ordinal limite.

Il faut donc construire les données 1) 2) 3) de la page 317 (à l'exclusion de la donnée 4), de façon à satisfaire à la seule contrainte $3_\alpha(\beta)$.

On commence à construire i_α et les $\tau_{\beta,\alpha}$ dans I. C'est possible, car $I_\alpha = \{\beta \mid \beta < \alpha\}$ est de cardinal $\pi_\alpha < \pi$ – il suffit donc de supposer I grande devant les cardinaux $\pi' < \pi$.

On construit ensuite de même J_α dans J' et les $\tau'_{\beta,\alpha}$ $(\beta < \alpha)$, en utilisant le fait que [page 328]
J' est grande devant $\operatorname{card}\alpha = \operatorname{card} I_\alpha$. On doit de plus construire une flèche

$$u_\alpha \;:\; \varphi(i_\alpha) \;\longrightarrow\; j_\alpha \;.$$

C'est possible, car J' étant cofinale dans J, il existe j' dans J' et $\varphi(i_\alpha) \longrightarrow J'$, et J' étant filtrante, il existe $\bar{j}_\alpha$ et des flèches $j_\alpha \longrightarrow \bar{j}_\alpha$, donc quitte à remplacer

$$\begin{array}{ccc} j_\alpha & \longrightarrow & \bar{j}_\alpha \\ & \searrow & \uparrow \\ & & j' \end{array}$$

j_α par $\bar{j}_\alpha$, les $\tau'_{\alpha,\beta}$ par des $\bar{\tau}'_{\alpha,\beta}$, on trouve bien une flèche $u_\alpha : \varphi(i_\alpha) \longrightarrow j_\alpha$. Il faut ensuite s'occuper des

compatibilités $3_\alpha(\beta)$, donc des double-flèches p. 124

$$\varphi(i_\beta) \underset{u_\alpha\varphi(\tau_{\alpha,\beta})}{\overset{\tau'_{\alpha,\beta}u_\beta}{\rightrightarrows}} j_\alpha \;.$$

Comme l'ensemble de ces double-flèches est de cardinal $\operatorname{card}\alpha < \pi$, et que J' est grande devant ledit cardinal, on trouve donc une flèche

[page 329]

$$\rho : j_\alpha \longrightarrow j$$

dans J qui les égalise toutes. Comme J' est cofinal, on peut supposer j dans J', soit $\bar{j}_\alpha$. Donc quitte à remplacer j_α par $\bar{j}_\alpha$, et les $\tau'_{\alpha,\beta}$ par $\bar{\tau}'_{\alpha,\beta} = \rho\tau'_{\alpha,\beta}$, enfin $u_\alpha : \varphi(i_\alpha) \longrightarrow j_\alpha$ par $\bar{u}_\alpha = \rho u_\alpha : \varphi(i_\alpha) \longrightarrow \bar{j}_\alpha$, on satisfait à toutes les contraintes voulues.

Je résume le résultat ("± tautologique" !) prouvé dans les pages 313-329.

Lemme-clef 4.13.17. *Considérons un carré cartésien dans* Cat

$$\begin{array}{ccc} I & \xrightarrow{\varphi} & J \\ \uparrow & & \uparrow\psi \\ I' & \longrightarrow & J' \;. \end{array}$$

On fait les hypothèses suivantes : [page 330]

1) φ et ψ sont cofinaux, ψ est l'inclusion d'une sous-catégorie strictement pleine J' de J, I est filtrant (donc J et J' aussi).

On cherche des conditions pour que l'inclusion de la sous-catégorie strictement pleine $I' \longrightarrow I$ soit cofinale (auquel cas on voit tout de suite que I' est filtrante, et $I' \longrightarrow J'$ est aussi cofinal). Pour ceci, on suppose qu'il existe un ordinal limite α_0 *ayant les propriétés supplémentaires suivantes :*

2) I et J' sont stables par $\varinjlim$ de type I_{α_0} $(= \{\beta \mid \beta$ ordinal $< \alpha_0\})$, et les foncteurs φ, ψ commutent à ces limites.

3) Pour tout $\alpha \in I_{\alpha_0}$, I est grande devant $\operatorname{card}\alpha$. *(Donc, φ étant cofinal, J est également grande devant* $\operatorname{card}\alpha$, *et de même, ψ étant pleinement fidèle, et cofinal, J' est grande devant* $\operatorname{card}\alpha$.*)*

Sous ces conditions, I' est cofinal dans I (donc aussi grande devant $\operatorname{card}\alpha$, *pour tout $\alpha \in I_{\alpha_0}$).*

La démonstration est celle donnée ci-dessus. On n'a pas eu à utiliser que l'ordinal $\alpha_0 = \alpha_\pi$ était de cette espèce particulière, seulement que c'était un cardinal limite.

Ce lemme implique, comme on l'a vu à la page 312, l'implication b $\Longrightarrow$ d dans le diagramme d'implications $(*)$ page 310, lequel est donc à présent prouvé. p. 125 [page 331]

Pour achever de prouver le théorème 4.13.15, il reste à prouver les implications

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{c}' & & \\ & \searrow & \\ & & \mathrm{a}' \Longrightarrow \mathrm{a}\ . \\ & \nearrow & \\ \mathrm{b} & & \end{array}$$

Démontrons donc (b ou c′) $\Longrightarrow$ a′. Il reste à prouver que $\underline{S}$ est π-accessible dans $\mathcal{M}$, i.e. que le foncteur pleinement fidèle

$$\mathrm{Ind}_\pi(\underline{S}(\pi)) \longrightarrow \mathcal{M} \qquad (*)$$

a pour image essentielle $\underline{S}$. Donc il faut prouver que si $x \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$, alors

$$x \in \mathrm{Ob}\,\underline{S} \quad \overset{(?)}{\Longleftrightarrow} \quad \begin{array}{l} x \text{ est dans l'image essentielle de } \mathrm{Ind}_\pi(\underline{S}(\pi)), \text{ i.e.} \\ x \text{ est isomorphe à } \varinjlim_{i\in I} x_i, \text{ les } x_i \text{ dans } \mathrm{Ob}\,\underline{S}(\pi),\ I \\ \text{grande devant } \pi. \end{array} \qquad (*)$$

[page 332]

(Supposons d'abord que $\underline{S}$ satisfasse b) ([141]). Donc on sait que

$$x \in \mathrm{Ob}\,\underline{S} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \underline{S}/x \text{ est cofinale dans } \mathcal{M}_\pi/x\ . \qquad (**)$$

Nous voulons déduire l'équivalence $(*)$ de l'équivalence $(**)$.

Prouvons $\Longrightarrow$ dans $(*)$, i.e. supposons $x \in \mathrm{Ob}\,\underline{S}$, et prouvons que x est dans l'image essentielle de $\mathrm{Ind}_\pi\,\underline{S}(\pi)$. En vertu de $(**)$, $\underline{S}(\pi)/x$ est une sous-catégorie (strictement pleine) cofinale dans $\mathcal{M}_\pi/x$, donc comme $\mathcal{M}_\pi/x$ est grande devant π, $\underline{S}(\pi)/x$ l'est aussi. Comme on sait que

$$x \ = \ \varinjlim_{i\in\mathcal{M}_\pi/x} x_i$$

141. Maladroit, on peut traiter les deux cas b) et c) en même temps, cf. bas de page 333.

(π étant cardinal utile pour $\mathcal{M}$), il s'ensuit par cofinalité qu'on a aussi

$$x \;=\; \varinjlim_{i\in \underline{S}(\pi)/x} x_i \;,$$

et comme $\underline{S}(\pi)/x$ est grande devant π, cela implique que x appartient à l'image essentielle de $\mathrm{Ind}_\pi(\underline{S}(\pi))$.

Prouvons $\Longleftarrow$ dans $(*)$, i.e. supposons que x soit dans l'image essentielle de $\mathrm{Ind}_\pi(\underline{S}(\pi))$, p. 126

[page 333]

$$x \;=\; \varinjlim_{i\in I} x_i \;, \qquad \text{les } x_i \text{ dans } \underline{S}(\pi),\ I \text{ grande devant } \pi.$$

Alors le foncteur composé $i \longmapsto x_i$,

$$I \;\longrightarrow\; \underline{S}(\pi)/x \;\hookrightarrow\; \mathcal{M}_\pi/x$$

est cofinal (cf. 4.4.2, page 79), donc $\underline{S}(\pi)/x \longrightarrow \mathcal{M}_\pi/x$ satisfait la condition F 1 (puisque le composé le satisfait), et comme $\underline{S}(\pi)/x \longrightarrow \mathcal{M}_\pi/x$ est pleinement fidèle, cela implique déjà que ce foncteur est cofinal. Donc par $(**)$ on en conclut $x \in \mathrm{Ob}\,\underline{S}$, q.e.d.

Supposons maintenant que S satisfasse c$'$ (au lieu de b), et prouvons encore l'équivalence $(*)$. Pour ceci, écrivons

$$\square \qquad x \;=\; \varinjlim_{i\in I} x_i \qquad \begin{cases} \text{les } x_i \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}_\pi,\ I \textit{ ensemble ordonné},\ (x_i)_{i\in I} \\ \text{est } \pi_0\text{-}\pi\text{-adaptée } ([142]). \end{cases}$$

ce qui est possible puisque π est utile pour $\mathcal{M}$ $\Big)$. Définissons $I_{\underline{S}}$ comme dans l'énoncé de c), donc comme image inverse de $\underline{S}(\pi)/x \hookrightarrow \mathcal{M}_\pi/x$ par $I \longrightarrow \mathcal{M}_\pi$. Par hypothèse d$'$) `[plutôt c')]`, on a

$$x \in \mathrm{Ob}\,\underline{S} \qquad \Longleftrightarrow \qquad I_{\underline{S}} \text{ est cofinal dans } I\;. \tag{$**'$}$$

En utilisant $(**')$, prouvons encore $(*)$ (page 331). En fait, on utilisera seulement qu'on a l'isomorphisme $\square$, avec I grande devant π, et qu'on a l'équivalence $(**')$, sans avoir à utiliser que I est ordonnée. Donc la démonstration vaut aussi dans le cas c). [page 334]

Prouvons $\Longrightarrow$ dans $(*)$, i.e. supposons $x \in \mathrm{Ob}\,\underline{S}$, prouvons que x est dans l'image essentielle de $\mathrm{Ind}_\pi(\underline{S}(\pi))$. En vertu de $(**')$, $I_{\underline{S}}$ est cofinale dans I, et comme $I_{\underline{S}} \longrightarrow I$ est une inclusion pleinement fidèle, il s'ensuit que $I_{\underline{S}}$ est également grande devant π, d'autre part on aura par cofinalité

$$x \;=\; \varinjlim_{i\in I_{\underline{S}}} x_i \;,$$

où cette fois les x_i sont dans $\underline{S}(\pi) = \underline{S}\cap\mathcal{M}_\pi$, d'où résulte que x est dans l'image essentielle de $\mathrm{Ind}_\pi(\underline{S}(\pi))$.

Prouvons $\Longleftarrow$ dans $(*)$, i.e. supposons que l'on ait

$$x \;=\; \varinjlim_{j\in J} x_j \;, \qquad \text{les } x_j \text{ dans } \underline{S}(\pi),\ J \text{ grande devant } \pi\;.$$

En invoquant à nouveau 4.4.2, on trouve que $J \longrightarrow \mathcal{M}_\pi/x$ est cofinal, et comme ce foncteur se factorise par le foncteur d'inclusion pleinement fidèle $\underline{S}(\pi)/x \hookrightarrow \mathcal{M}_\pi/x$, il p. 127

[page 335]

142. **N.B.** Ça existe, grâce à 4.13.14.

s'ensuit comme tantôt que ce dernier est cofinal. Nous allons admettre pour un moment que ceci implique que l'image inverse $I_{\underline{S}}$ de cette sous-catégorie strictement pleine, par le foncteur également cofinal $I \longrightarrow \mathcal{M}_\pi/x$, est cofinal dans I. Ceci étant, l'équivalence $(**')$ (p. 333) implique $x \in \mathrm{Ob}\,\underline{S}$, ce qu'on voulait.

Donc il reste à prouver que si

$$J' \;=\; \underline{S}(\pi)/x \hookrightarrow \mathcal{M}_\pi/x \;=\; J$$

est cofinal, alors $I' = I_{\underline{S}} \longrightarrow I$ l'est aussi. Il semble qu'il faille bel et bien à nouveau invoquer les conditions de stabilité $\mathrm{L}(\pi_0, \pi)$ faites dans d') `[plutôt c')]` ce qui n'avait pas été nécessaire pour le cas c) et le lemme-clef (un peu) vache 4.13.17, où on prendra [page 336] (comme dans la démonstration écrite avant l'énoncé de cet lemme) $\alpha = \alpha_\pi \overset{\text{déf}}{=}$ plus petit ordinal α tel que $\mathrm{card}\,\alpha = \pi$. Donc I_α est de cardinal π, et grande devant tout cardinal $\pi' < \pi$, et en particulier devant π'_0. L'hypothèse 2°) de 4.13.17 est vérifiée pour I, par définition d'un système inductif π_0-π-adapté, et pour J', grâce à l'hypothèse $\mathrm{L}(\pi_0, \pi)$ sur $\underline{S}(\pi)$. De même, l'hypothèse 3°) (I grande devant tout cardinal $< \pi$) est satisfaite par définition des systèmes π_0-π-adaptés – I est même grande devant π. L'hypothèse 1°) a déjà été vue.

On a donc prouvé (par voie circulaire)

$$\mathrm{a} \Longrightarrow \Big(\mathrm{a}' \Longleftrightarrow \mathrm{c} \Longleftarrow \mathrm{c}' \qquad\qquad \mathrm{c} \Longrightarrow \mathrm{b} \Big),$$

`[et aussi b` $\Longrightarrow$ `c,]` en ayant à invoquer le lemme-clef vache pour les *deux* implications

$$\mathrm{a}' \Longrightarrow \mathrm{c} \qquad \text{et} \qquad \mathrm{c}' \Longrightarrow \mathrm{a}'$$

(donc pour deux implications *en sens inverses*, chose étrange …).

Il reste seulement encore à prouver l'implication [page 337]

$$\mathrm{a}' \Longrightarrow \mathrm{a}\,,$$

ce qui est essentiellement sorital.

Cela achève la démonstration du critère d'accessibilité 4.13.15 d'une sous-catégorie pleine $\underline{S}$ de $\mathcal{M}$.

On va donner une variante un peu décantée de 4.13.15, qui (avec des hypothèses un peu plus faibles) capte l'essentiel de sa substance. L'énoncé 4.13.15 en est une conséquence quasi immédiate :

Corollaire 4.13.18 (de 4.13.15). *Soient $\mathcal{M}$ une catégorie accessible, π un cardinal utile pour $\mathcal{M}$, α_0 un* ordinal limite *tel que l'on ait* $\mathrm{card}\,\alpha_0 \leqslant \pi$. *Soit $I_{\alpha_0} = \{\alpha \mid \alpha < \alpha_0\}$, et supposons que $\mathcal{M}$ soit stable par $\varinjlim$ de type I_{α_0}.* p. 128 [page 338]

Soit alors $\underline{S}$ une sous-catégorie strictement pleine de $\mathcal{M}$, $\underline{S}(\pi) = \underline{S} \cap \mathcal{M}_\pi$. Désignons par $L(\alpha_0)$ la condition : $\underline{S}(\pi)$ est stable dans $\mathcal{M}_\pi$ (ou ce qui revient au même, dans $\mathcal{M}$) par $\varinjlim$ de type I_{α_0}. Alors les conditions suivantes sont équivalentes.

a) $\underline{S}$ est π-accessible dans $\mathcal{M}$, et est stable dans $\mathcal{M}$ par $\varinjlim$ de type I_{α_0}.

a') $\underline{S}$ est π-accessible et $\underline{S}(\pi)$ satisfait $L(\alpha_0)$.

b) $\underline{S}(\pi)$ *satisfait* $L(\alpha_0)$*, et pour tout* $x \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$*, on a ceci :* $x \in \mathrm{Ob}\,\underline{S}$ *si et seulement si la sous-catégorie strictement pleine* $\underline{S}(\pi)/x$ *de* $\mathcal{M}(\pi)/x$ *est cofinale dans* $\mathcal{M}(\pi)/x$ `[lire` $\mathcal{M}_\pi/x$`]`.

c) $\underline{S}(\pi)$ *satisfait* $L(\alpha_0)$*, de plus pour tout* $x \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$*, et toute représentation*

$$x \;\simeq\; \varinjlim_{i\in I} x_i$$

qui est "α_0*-*π*-adaptée", i.e. telle que* [page 339]

1°) *I équivalente à une petite catégorie, et grande devant* π*,*

2°) *les* $\varinjlim$ *de type* I_{α_0} *existent dans* I*,*

3°) *le foncteur* $I \longrightarrow \mathcal{M}$*,* $i \longmapsto x_i$*, commute aux* $\varinjlim$ *de type* I_{α_0}*, et enfin*


4°) *les* $x_i \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}_\pi$

(comparer 4.13.11), on a ceci (où on désigne par $I_{\underline{S}}$ *la sous-catégorie strictement pleine de* I *formée des* i *tels que* $x_i \in \mathrm{Ob}\,\underline{S}$*) : on a* $x \in \mathrm{Ob}\,\underline{S}$ *si et seulement si* $I_{\underline{S}}$ *est cofinale dans* I*.*

*c′) (*Si I_{α_0} *est grande devant* π_0*, et* $\pi^{\pi_0} = \pi$*, pour pouvoir invoquer 4.13.14, cf. p. 335.) Comme c), mais en supposant* I *ordonnée.*

([143]).

Démonstration. Elle se fait suivant le même diagramme logique que celle de 4.13.15,



où on a marqué du signe ! les deux implications qui sont "vaches", en ce sens qu'elles font appel au lemme-clef 4.13.17 (pages 329-330), qui se prouve par une construction transfinie un peu vissée. La démonstration des sept implications du diagramme est essentiellement celle donné dans les pages précédentes 311-337,

à l'exception de $\mathrm{a}' \Longrightarrow \mathrm{a}$, qui est un peu plus simple dans le cas actuel. On va la dégager sous forme de lemme un peu plus général. (**N.B.** La démonstration de $\mathrm{a}' \Longrightarrow \mathrm{a}$ dans 4.13.15 avait été omise comme "soritale" !, cf. page 337 …) p. 129 [page 340]

Lemme 4.13.19. *Soient* $\mathcal{M}$ *une catégorie accessible dans* $\mathcal{M}$*,* π *un cardinal utile pour* $\mathcal{M}$ *et tel que* $\underline{S}$ *soit* π*-accessible, i.e.* $\underline{S}$ *est l'image essentielle de* $\mathrm{Ind}_\pi(\underline{S}(\pi))$ *par le foncteur pleinement fidèle canonique* $\mathrm{Ind}_\pi(\underline{S}(\pi)) \longrightarrow \mathcal{M}$*, où* $\underline{S}(\pi) = \underline{S} \cap \mathcal{M}_\pi$*. On suppose qu'il existe un ordinal limite* α*, tel que* $\mathrm{card}\,\alpha \leqslant \pi$ *et tel que* $\mathcal{M}_\pi$ *et* $\underline{S}(\pi)$ $(= \underline{S}_\pi)$ *soient stables par* $\varinjlim$ *de type* I_α *soient stables par* $\varinjlim$ *de type* I_α*, et que le foncteur d'inclusion* $\underline{S}(\pi) \longrightarrow \mathcal{M}_\pi$ *y commute. Soit* Φ *un ensemble de catégories telles que* $\forall\ I \in \Phi$*, on ait* $\mathrm{card}\,\mathrm{réd}\,I \leqslant \pi$*, et supposons que* $\mathcal{M}_\pi$ *soit stable par* $\varinjlim$ *de type* Φ*, et que* $\underline{S}(\pi)$ *soit stable dans* $\mathcal{M}_\pi$ *par lesdites limites (ou ce qui revient au même, qu'il soit stable en lui-même par ces* $\varinjlim$*, et que le foncteur d'inclusion y commute). Alors* $\mathcal{M}$ *et* $\underline{S}$ *sont stables par* $\varinjlim$ *de type* Φ*, et le foncteur d'inclusion* $\underline{S} \longrightarrow \mathcal{M}$ *y commute, i.e.* $\mathcal{M}$ *est stable par ces limites, et* $\underline{S}$ *stable dans* $\mathcal{M}$ *par ces mêmes limites.* [page 341]

143. **N.B.** Si on ne suppose par I_{α_0} grande devant π_0 et $\pi^{\pi_0} = \pi$, alors toutes les conditions de a) à c) (a, a′, b, c) sont équivalentes et *impliquent* c, mais ne lui sont peut-être pas équivalentes.

DÉMONSTRATION. On applique 4.11.1 (p. 267-268) séparément à $\mathcal{M} \simeq \mathrm{Ind}_\pi \mathcal{M}_\pi$ et à $\underline{S} \simeq \mathrm{Ind}_\pi \underline{S}(\pi)$, pour conclure que $\mathcal{M}$ et $\underline{S}$ sont stables séparément par $\varinjlim$ de type Φ. Il reste à voir que le foncteur $\underline{S} \longrightarrow \mathcal{M}$ y commute. Cela se voit comme dans la démonstration de 4.11.1, on obtient plus généralement ceci :

Lemme 4.13.20 (cor. à 4.11.1). *Soient $f_0 : C \longrightarrow C'$ un foncteur entre catégories équivalentes à des petites catégories, π un cardinal infini, $f : \mathcal{M} \overset{\text{déf}}{=} \mathrm{Ind}_\pi C \longrightarrow \mathcal{M}' \overset{\text{déf}}{=} \mathrm{Ind}_\pi C'$ l'extension canonique $\mathrm{Ind}_\pi(f_0)$ de f_0. Soient Φ et α comme dans 4.11.1, et supposons que $I_\alpha \in \Phi$ et que f_0 commute aux $\varinjlim$ de type Φ. Alors f commute à ces mêmes limites inductives.* ([144]).

Corollaire 4.13.21. *Sous les conditions de 4.13.20, supposons que Φ contienne les catégories de cardinal $\leqslant \pi$ (resp. les catégories filtrantes de cardinal $\leqslant \pi$, resp. les catégories filtrantes grandes devant π_0 de cardinal $\leqslant \pi$, resp. les catégories discrètes de cardinal $\leqslant \pi$). Alors f commute aux petites $\varinjlim$ (resp. aux petites $\varinjlim$ filtrantes, resp. aux petites $\varinjlim$ filtrantes grandes devant π_0, resp. aux petites sommes). (Réciproque claire et "laissée au lecteur".)*

Se voit comme 4.4.14 et 4.4.14.1 (p. 97, 98).

Voici enfin, il me semble, la forme définitive (?) de 4.13.15, 4.13.18. [page 342]

Théorème 4.13.22 ([145]). *Soient $\mathcal{M}$ une catégorie accessible, π un cardinal infini, utile pour $\mathcal{M}$, et Φ un ensemble de catégories satisfaisant les deux conditions :*

1°) $J \in \Phi$ implique card réd $J \leqslant \pi$.

2°) Il existe un ordinal limite α_0 *avec $I_{\alpha_0} \in \Phi$.*

On suppose $\mathcal{M}$ stable par $\varinjlim$ de type Φ. Soient $\underline{S}$ une sous-catégorie strictement pleine *de $\mathcal{M}$, et $\underline{S}(\pi) = \underline{S} \cap \mathcal{M}_\pi$. Désignons par $L(\varphi)$ la condition sur $\underline{S}(\pi)$: $\underline{S}(\pi)$ est stable dans $\mathcal{M}$ (où ce qui revient au même, dans $\mathcal{M}_\pi$) par $\varinjlim$ de type Φ. Ceci posé, les conditions* p. 130
suivantes sur $\underline{S}$ sont équivalentes :

ⓐ *$\underline{S}$ est π-accessible dans $\mathcal{M}$, et stable dans $\mathcal{M}$ par $\varinjlim$ de type Φ.*

a′) *$\underline{S}$ est π-accessible dans $\mathcal{M}$, et $\underline{S}(\pi)$ satisfait à $L(\Phi)$.*

[page 343]

b) *$\underline{S}(\pi)$ satisfait à $L(\Phi)$, et pour tout $x \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$, on a ceci : $x \in \mathrm{Ob}\,\underline{S}$ si et seulement si la sous-catégorie strictement pleine $\underline{S}(\pi)/x$ de $\mathcal{M}(\pi)/x$ est cofinale dans $\mathcal{M}(\pi)/x$* `[lire $\mathcal{M}_\pi/x$]`.

ⓒ *$\underline{S}(\pi)$ satisfait à $L(\Phi)$, et pour tout $x \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$ et toute représentation $x \simeq \varinjlim_{i \in I} x_i$ qui est Φ-π-adaptée (cf. définition plus bas), on a ceci : $x \in \mathrm{Ob}\,\underline{S}$ si et seulement si $I_{\underline{S}}$ est cofinale dans I, où $I_{\underline{S}}$ est la sous-catégorie strictement pleine de I formée des $i \in \mathrm{Ob}\,I$ tels que $x_i \in \mathrm{Ob}\,\underline{S}$ (ou encore, $x_i \in \mathrm{Ob}\,\underline{S}(\pi)$).* **N.B.** *On dit qu'un système inductif $(x_i)_{i \in I}$ dans $\mathcal{M}$ est Φ-π-adapté si*

1) I équivalente à une petite catégorie, et I grande devant π,

2) les $\varinjlim$ de type Φ existent dans I,

3) le foncteur $i \longmapsto x_i$ de I dans $\mathcal{M}$ commute aux $\varinjlim$ de type Φ, et enfin

4) les $x_i \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}_\pi$.

c′) *(Si $\pi^{\pi_0} = \pi$, où π_0 est un cardinal $\leqslant \pi$ utile pour $\mathcal{M}$, et si $J \in \Phi$ implique que J est grande devant π_0.) Comme c), avec I* ordonnée.

144. Il vaut mieux prendre des foncteurs $f_0 : C \longrightarrow \mathcal{N}$, et $\mathcal{N}$ [?] que f_0 commute aux $\varinjlim$ de type Φ, donc il en est de même de son extension $\mathrm{Ind}_\pi(C, \mathcal{N}) \longrightarrow \mathcal{N}$. (**N.B.** On suppose que $\mathcal{N}$ satisfait L_π.)

145. cf. variante 4.13.36, page 358.

([146], [147]).

Définition 4.13.23 ([148]). Soient $\mathcal{M}$ une catégorie accessible, π un cardinal, Φ un ensemble de catégories, satisfaisant les deux conditions :

a) $J \in \Phi \Longrightarrow \operatorname{card} \text{réd}\, J \leqslant \pi$.

b) Il existe un ordinal limite α_0, tel que $I_{\alpha_0} \in \Phi$ ([149]).

Soit S une partie de $\operatorname{Ob}\mathcal{M}$, $\underline{S}$ la sous-catégorie pleine qu'elle définit. On dit que S est une *partie Φ-π-accessible de* $\operatorname{Ob}\mathcal{M}$, ou que $\underline{S}$ est une *sous-catégorie Φ-π-accessible dans* $\mathcal{M}$, si les conditions suivantes sont satisfaites. [page 344]

1°) π est utile pour $\mathcal{M}$, $\mathcal{M}$ est stable par $\varinjlim$ de type Φ ([150]).

2°) $\underline{S}$ est une sous-catégorie π-accessible dans $\mathcal{M}$.

3°) $\underline{S}$ est stable dans $\mathcal{M}$ par $\varinjlim$ de type Φ.

([151]).

N.B. Quand la condition préliminaire 1°) *sur* $\mathcal{M}$ est satisfaite, la validité des conditions 2°) 3°) équivaut donc à la condition que $\underline{S}$ soit *strictement* pleine dans $\mathcal{M}$, et que de plus $\underline{S}$ satisfasse la condition a) du théorème 4.13.22. D'autre part, cette condition est équivalente à chacune des conditions a′, b, c de ce même théorème, et aussi à la dernière condition c′, sous réserve qu'on ait $\pi^{\pi_0} = \pi$ (pour un cardinal $\pi_0 < \pi$ utile pour $\mathcal{M}$) et que $J \in \Phi$ implique que J est grande devant π_0. p. 131

Conceptuellement, c'est la définition donnée dans 4.13.23, i.e. la condition ⓐ de 4.13.22, qui paraît la plus claire, ou sa variante immédiate a′. Mais du point de vue pratique, du travail avec les parties accessibles, c'est par propriété ⓒ qui paraît la plus commode. Le poids principal du théorème 4.13.22 est bien l'implication a $\Longrightarrow$ c (via a $\Longrightarrow$ a′ $\overset{!}{\Longrightarrow}$ c). Donc il faut surtout voir ce théorème comme donnant un critère remarquable d'appartenance à $\operatorname{Ob}\underline{S}$ d'un objet x de $\mathcal{M}$ qui est présenté par un système inductif Φ-π-adapté : [page 345]

$$x \in \operatorname{Ob}\underline{S} \qquad \Longleftrightarrow \qquad I_{\underline{S}} \text{ cofinal}\,, \tag{$*$}$$

et dans cette équivalence, c'est l'implication $\Longrightarrow$ qui est la partie non soritale, et remarquable.

Proposition 4.13.24. *Soient $\mathcal{M}$, π, Φ comme dans 4.13.23 ([152]), on suppose que la condition 1° de 4.13.23 est satisfaite (π utile pour $\mathcal{M}$, $\mathcal{M}$ stable par $\varinjlim$ de type Φ). Soit ${\Sigma'}_\pi^\Phi$ l'ensemble des sous-catégories $\underline{S}$ de $\mathcal{M}$ qui sont Φ-π-accessibles dans $\mathcal{M}$, et Σ_π^Φ l'ensemble des sous-catégories $\underline{S}(\pi)$ de $\mathcal{M}_\pi$ qui sont strictement pleines, et stables dans $\mathcal{M}_\pi$ par $\varinjlim$ de type Φ. (Ces sous-catégories sont forcément karoubiennes, car stables par $\varinjlim$ de type I_{α_0}, donc aussi par facteurs directs.) Alors les bijections (4.13.4.1) (page 288) induisent des bijections inverses l'une à l'autre*

$$\Sigma_\pi^\Phi \underset{\longleftarrow}{\longrightarrow} {\Sigma'}_\pi^\Phi \quad .$$

Proposition 4.13.25. *Soient $\mathcal{M}$, π, Φ comme dans 4.13.23, avec $I_{\alpha_\pi} \in \Phi$ (α_π étant le plus petit ordinal de cardinal Φ* [plutôt π]*). Alors l'ensemble ${\Sigma'}_\pi^\Phi$ des sous-catégories* [page 346]

146. **N.B.** Quand les conditions restrictives ci-contre [parenthèse dans c′)] ne sont pas satisfaites, alors a, a′, b, c sont encore équivalentes, et impliquent c′, mais ne sont peut-être pas équivalentes à c′).

147. **N.B.** Il faudrait réénoncer les conditions annexes [?] (Si …), cf. p. 359-360.

148. **N.B.** Il y aurait intérêt à remonter cette définition (*sans* b), dès avant 4.13.15.

149. Si c'est pour poser une définition, on peut se passer de la condition b).

150. Condition préliminaire sur $\mathcal{M}$.

151. **N.B.** Quand $\Phi = \{I_{\alpha_0}\}$, on dit aussi que $\underline{S}$ est α_0-π-accessible dans $\mathcal{M}$. Si Φ est formé des catégories de cardinal $\leqslant \pi$ et grandes devant π_0, on dit que $\underline{S}$ est π_0-π-accessible dans $\mathcal{M}$.

152. **N.B.** La condition $I_{\alpha_0} \in \Phi$ n'est pas utile.

de $\mathcal{M}$ Φ-π-accessibles dans $\mathcal{M}$ est stable par intersection de familles de cardinal $\leqslant \pi$ ([153]).

(**N.B.** La bijection $\Sigma_\pi^\Phi \xrightarrow{\sim} \Sigma'^\Phi_\pi$ de 4.13.24 respecte les relations d'ordre naturelles d'inclusion, donc transforme intersections en intersections.)

Se voit comme 4.13.7 (qui est contenu dans l'énoncé actuel), en utilisant le lemme 4.13.10.

4.13.26. Soient $\mathcal{M}$, π, Φ comme dans 4.13.23, et soit $\underline{S}$ une sous-catégorie *strictement pleine* de $\mathcal{M}$, $f : \underline{S} \longrightarrow \mathcal{M}$ le foncteur d'inclusion. La condition que $\underline{S}$ soit Φ-π-accessible dans $\mathcal{M}$ se décompose en :

1) π est utile pour $\mathcal{M}$ *et* pour $\underline{S}$.
2) $\mathcal{M}$ et $\underline{S}$ sont stables par $\varinjlim$ de type Φ.
3) f commute auxdites limites.
4) f est π-accessible.
5) $f(\underline{S}_\pi) \subset \mathcal{M}_\pi$.

Soit alors $\pi' > \pi$ un autre cardinal, quand peut-on assurer que si $\underline{S}$ est Φ-π-accessible dans $\mathcal{M}$, il soit aussi Φ-π'-accessible ? Les conditions 2) 3) 4) sont visiblement stables par passage de π à π'. Restent les conditions 1) et 5). On sait que si $\pi'^\pi = \pi'$, alors la condition 1) reste valable pour π'. Plus généralement, si π_0 est un cardinal $\leqslant \pi$ tel que π_0 soit utile pour $\mathcal{M}$ et pour $\underline{S}$, alors si $\pi' > \pi_0$ est tel que $\pi'^{\pi_0} = \pi'$, alors π' est aussi utile pour $\mathcal{M}$ et pour $\underline{S}$. Si on admet l'HCG (hypothèse du continu généralisée), il en est ainsi pour tout $\pi' > \pi_0$, donc pour tout $\pi' > \pi$.

p. 132
[page 347]

Reste la condition 5), pour laquelle une réponse est donnée par 4.12.1 (p. 273). Si $\pi_0 \leqslant \pi$ est choisi de façon que f soit π_0-accessible (p.ex. $\pi_0 = \pi$), et si

$$\pi'_1 = \operatorname{card}\operatorname{réd}\underline{S}_{\pi_0} \qquad (\leqslant \operatorname{card}\operatorname{réd}\underline{S}(\pi))$$
$$\pi''_1 = \sup(\pi'_1, \pi) ,$$

on voit que si $\pi' \geqslant \pi''_1$ (i.e. $\pi' \geqslant \pi'_1, \pi$) est tel que $\pi'^{\pi_0} = \pi'$, alors on a bien

$$f(\underline{S}_{\pi'}) \ \subset \ \mathcal{M}_{\pi'} .$$

Si donc de plus $\pi' > \pi \geqslant \pi_0$ (comme supposé au début), et si on suppose l'HCG, alors la condition $\pi'^{\pi_0} = \pi'$ est automatique, et il reste la seule condition $\pi' \geqslant \pi''_1$, i.e. en définitive $\pi' \geqslant \operatorname{card}\operatorname{réd}\underline{S}_{\pi_0}$. Pour résumer :

[page 348]

Proposition 4.13.27. *Sous les conditions de 4.13.23 (sans condition b) sur Φ), soit $\underline{S}$ une sous-catégorie de $\mathcal{M}$ qui est Φ-π-adaptée. Soit $\pi_0 \leqslant \pi$ un cardinal qui est utile pour $\underline{S}$ et pour $\mathcal{M}$, et tel que $f : \underline{S} \longrightarrow \mathcal{M}$ soit π_0-accessible, i.e. tel que $\underline{S}$ soit stable dans $\mathcal{M}$ par $\varinjlim$ grandes devant π_0 (on peut p.ex. prendre $\pi_0 = \pi$). Alors pour tout cardinal $\pi' > \pi$ tel que*

a) $\pi'^{\pi_0} = \pi'$ et

b) $\pi' \geqslant \operatorname{card}\operatorname{réd}\underline{S}_{\pi_0}$,

$\underline{S}$ est Φ-π'-accessible dans $\mathcal{M}$. Donc si $\pi' > \pi$ est tel que $\pi'^\pi = \pi'$, $\pi' > \operatorname{card}\operatorname{réd}\underline{S}_\pi$, alors $\underline{S}$ est Φ-π'-accessible. (Il suffit p.ex. de prendre $\pi' = 2^c$, avec $c \geqslant \sup(\pi, \operatorname{card}\operatorname{réd}\underline{S}(\pi))$.) Si on admet l'HCG, il suffit donc qu'on ait $\pi' > \sup(\pi, \operatorname{card}\operatorname{réd}\underline{S}(\pi))$.

Proposition 4.13.28 ([154]). *Soient $\mathcal{M}$, π, Φ comme dans 4.13.23. Supposons de plus que $J \in \Phi$ implique que J est* filtrante. *Alors l'ensemble $\tilde{\Sigma}_\pi^\Phi$ des sous-ensembles Φ-π-accessibles de $\mathcal{M}$ est stable par réunions finies. Plus généralement, soit λ un cardinal*

[page 349]

153. Si π n'est pas cardinal limite. Sinon, il faut dire : familles de cardinal $< \pi$. Cf. 4.13.10.3, où je donne un énoncé rectifié légèrement plus général.

154. À rejeter plus bas, après 4.13.31, qui est la première application importante de 4.13.22, alors que 4.13.28 se prouve sans avoir à utiliser 4.13.22 ou ses variantes.

$< \pi$ tel que $\forall\ J \in \Phi$, J soit grande devant λ. Alors l'ensemble $\tilde{\Sigma}_\pi^\Phi$ est stable par réunions $(S_r)_{r\in A}$, indexées par des ensembles A de cardinal $\leqslant \lambda$.

Corollaire 4.13.29. *L'ensemble des parties accessibles de* $\mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$ *est stable par "petites" réunions – i.e. si $(S_r)_{r\in A}$ est une petite famille de parties accessibles de* $\mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$*, alors $\bigcup_{r\in A} S_r$ est aussi accessible.*

La démonstration de 4.13.28 repose sur le lemme suivant (je n'explicite par la démonstration) :

p. 133

Lemme 4.13.30. *Soit I une catégorie grande devant π, et $(J_r)_{r\in A}$ une famille des sous-catégories pleines telles que* $\operatorname{card} A \leqslant \pi$*, telle que $\bigcup_{r\in A} \mathrm{Ob}\,J_r$ soit cofinal dans* $\mathrm{Ord}(I)$*, i.e. pour tout $i \in \mathrm{Ob}\,I\ \exists\ j \in \bigcup_{r\in A} \mathrm{Ob}\,J_r$, et une flèche $i \longrightarrow j$. Alors il existe $r \in A$ tel que J_r soit cofinal dans I.*

[page 350]

Théorème 4.13.31. *Soient $\mathcal{M}$, $\mathcal{N}$ des catégories accessibles, $f : \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{N}$ un foncteur accessible, $T \subset \mathrm{Ob}\,\mathcal{N}$ une partie de $\mathcal{N}$, $\underline{T} \subset \mathcal{N}$ la sous-catégorie strictement pleine correspondante de $\mathcal{N}$, $S = f^{-1}(T)$, $\underline{S} = f^{-1}(\underline{T})$ la sous-catégorie pleine de $\mathcal{M}$ associée. Si T est accessible, alors S est accessible ; en d'autres termes, si $\underline{T}$ est accessible dans $\mathcal{N}$, $\underline{S}$ est accessible dans $\mathcal{M}$.*

Cela résulte de l'énoncé plus précis :

Corollaire 4.13.32. *Soient π_0 et $\pi > \pi_0$ des cardinaux ayant les propriétés suivantes :*

[page 351]

a) $\underline{T}$ est π_0-π-accessible dans $\mathcal{N}$ (4.13.23).

b) π_0 est utile pour $\mathcal{M}$ (il l'est pour $\mathcal{N}$, à cause de a)).

c) $f(\mathcal{M}_\pi) \subset \mathcal{N}_\pi$.

d) $\mathcal{M}$ satisfait à L_{π_0}, et f est π_0-accessible.

(L'existence d'un tel couple (π_0, π) résulte aussitôt de 4.13.16 et de 4.12.1.) Alors $\underline{S}$ est π_0-π-accessible dans $\mathcal{N}$.

Comme f commute aux $\varinjlim$ grandes devant π_0 en vertu de d), et que $\underline{T}$ est stable par ces limites par a) (cf. 4.13.23, 3°), il en est donc de même de $\underline{S}$, i.e. le 3° de la définition 4.13.23 est satisfait. D'autre part, la condition 1° (π utile pour $\mathcal{M}$, $\mathcal{M}$ stable par $\varinjlim$ grandes devant π_0 et de cardinal $\leqslant \pi$) est vérifiée par b) et d). Donc il reste à vérifier la condition 2°, i.e. que $\underline{S}$ est π-accessible. Posons

$$\underline{T}(\pi) = \underline{T} \cap \mathcal{N}_\pi$$
$$\underline{S}(\pi) = \underline{S} \cap \mathcal{M}_\pi \quad \underbrace{\subset}_{\text{grâce à c)}} \quad f^{-1}(\underline{T}(\pi))\ .$$

Comme $\underline{S}$ est stable dans $\mathcal{M}$ par $\varinjlim$ grandes devant π_0 (lesquelles existent dans $\mathcal{M}$ par d), et a fortiori par $\varinjlim$ grandes devant π, on a un foncteur canonique pleinement fidèle

$$\mathrm{Ind}_\pi\, \underline{S}(\pi) \ \longrightarrow\ \underline{S}\ .$$

[page 352]

D'ailleurs, $\underline{T}$ étant strictement pleine dans $\mathcal{N}$, $\underline{S}$ est strictement pleine dans $\mathcal{M}$, et il reste à vérifier que le foncteur précédent est essentiellement surjectif. Soit donc $x \in \mathrm{Ob}\,\underline{S}$. On aura, grâce à b),

$$x\ =\ \varinjlim_I x_i\ , \qquad x_i \in \mathcal{M}_\pi,\ I = \mathcal{M}_\pi/x\ .$$

D'ailleurs, le système inductif précédent est π_0-π-adapté, i.e. (p. 339) :

1) I équivalente à une petite catégorie, I grande devant π (résulte du fait que π est utile pour $\mathcal{M}$, cf. (b)).

p. 134

2) Les limites inductives grandes devant π_0 est de cardinal $\leqslant \pi$ existent dans I (résulte de L_{π_0} sur $\mathcal{M}$ (cf. ⓓ)).
3) Le foncteur $\xi : I \longrightarrow \mathcal{M}$ y commute.
4) Les x_i sont dans $\mathcal{M}_\pi$.

Comme f commute aux $\varinjlim$ grandes devant π_0 (cf. ①), a fortiori à celles grandes devant π, on a donc

$$f(x) \simeq \varinjlim_I f(x_i) ,$$

je dis que le système inductif $(f(x_i))_{i\in I}$ dans $\mathcal{N}$ est π_0-π-adapté. Les conditions 1), 2) sont *ne varietur* (ne concernent que I), le foncteur $I \longrightarrow \mathcal{N}$ est le composé $I \xrightarrow{\xi} \mathcal{M} \xrightarrow{f} \mathcal{N}$, donc commute aux $\varinjlim$ grandes devant π_0 et de cardinal $\leqslant \pi$ ([155]), puisqu'il en est ainsi de ξ et de f, enfin les $f(x_i)$ sont dans $\mathcal{N}_\pi$ puisque par ⓒ $f(\mathcal{M}_\pi) \subset \mathcal{N}_\pi$.

Par ailleurs $f(x) \in \mathrm{Ob}\,\underline{T}$ (puisque $x \in \mathrm{Ob}\,\underline{S}$, où $\underline{S} \overset{\text{déf}}{=} f^{-1}(\underline{T})$). Donc on peut appliquer [page 353]
4.13.22 a $\Longrightarrow$ c à la situation $(\mathcal{N}, \pi_0, \pi, \underline{S})$ et au système inductif $(f(x_i))_{i\in I}$, pour conclure que la sous-catégorie I' de I formée des i tels que $f(x_i) \in \mathrm{Ob}\,\underline{S}$ `[plutôt Ob` $\underline{T}$`]`, i.e. tels que $x_i \in \underline{S}$, donc $x_i \in \underline{S}(\pi)$, est *cofinale* dans I. Donc on a

$$x \simeq \varinjlim_{i\in I'} x_i ,$$

avec cette fois les x_i dans $\underline{S}(\pi)$, et I' grande devant π (car cofinale et pleine dans I, qui est grande devant π), ce qui prouve que x est dans l'image essentielle de $\mathrm{Ind}_\pi(\underline{S}(\pi))$, q.e.d.

Question 4.13.33. On vient de voir que si $f : \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{N}$ est un foncteur accessible entre catégories accessibles, alors l'image inverse d'une partie accessible de $\mathrm{Ob}\,\mathcal{N}$ est une partie accessible de $\mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$. Je conjecture que l'énoncé similaire, non pas pour les images directes, mais pour les *images essentielles*, est vraie, i.e. que pour toute sous-catégorie $\underline{S}$ de $\mathcal{M}$ accessible dans $\mathcal{M}$, son image essentielle dans $\mathcal{N}$ est accessible dans $\mathcal{N}$ ([156]). [page 354]
Dans cette question, on peut supposer que $\underline{S} = \mathcal{M}$, et la question revient à celle-ci : tout foncteur accessible $f : \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{N}$ entre catégories accessibles se factorise-t-il en un foncteur (accessible) *essentiellement surjectif*, et un foncteur accessible pleinement fidèle $\mathcal{M} \longrightarrow \underline{T} \longrightarrow \mathcal{N}$ (où $\underline{T}$ est elle-même accessible) ([157]) ? Si oui, cela me paraîtrait peut-être le résultat le plus profond (peut-être le seul véritablement profond) en théorie des catégories.

Voici une question qui me paraît très voisine. Soient $\mathcal{M}$ une catégorie accessible, A une sous-catégories pleine petite. Supposons que $\mathcal{M}$ satisfasse à L_{π_0} (p.ex. π_0 utile pour $\mathcal{M}$), et soit $\underline{S}$ la plus petite sous-catégorie strictement pleine de $\mathcal{M}$ contenant A, et stable par limites grandes devant π_0. Je conjecture que $\underline{S}$ est accessible dans $\mathcal{M}$.

De même, si Φ est un petit ensemble de petites catégories, tel que $\mathcal{M}$ soit stable par [page 355]
$\varinjlim$ de type Φ, on peut prendre l'enveloppe $\underline{S}$ de A pour les $\varinjlim$ grandes devant π_0 *et* les $\varinjlim$ de type Φ, et je conjecture encore que $\underline{S}$ est accessible. Dans cette direction, on a du moins le résultat très partiel suivant. p. 135

Proposition 4.13.34. *Soit $\mathcal{M}$ une catégorie accessible stable par petites $\varinjlim$ filtrantes, et soit $\underline{S}$ une sous-catégorie strictement pleine de $\mathcal{M}$. Conditions équivalentes :*

a) $\underline{S}$ est accessible dans $\mathcal{M}$, et stable dans $\mathcal{M}$ par petites $\varinjlim$ filtrantes.
b) Il existe une petite sous-catégorie pleine A de $\mathcal{M}$, telle que $\underline{S}$ soit la plus petite sous-catégorie strictement pleine de $\mathcal{M}$ contenant A et stable par petites $\varinjlim$ filtrantes.

155. cette commutation devrait avoir un nom, condition $\mathrm{L}(\pi_0, \pi)$ sur un foncteur. [page 356]
156. Faux, même si on prend la ♮-clôture de l'image essentielle ("image ♮-essentielle").
157. Il faut se borner tout au moins à essentiellement ♮-surjectif – mais même cela est trop optimiste.

On a a) $\Longrightarrow$ b), car si $\underline{S}$ est π-accessible dans $\mathcal{M}$, il est immédiat (sans autre condition de stabilité sur $\underline{S}$) que $\underline{S}$ est la plus petite sous-catégorie strictement pleine de $\mathcal{M}$ contenant $\underline{S}(\pi) \overset{\text{déf}}{=} \underline{S} \cap \mathcal{M}_\pi$ et stable par $\varinjlim$ grandes devant π. Si donc on sait déjà que $\underline{S}$ est même stable par *toutes* $\varinjlim$ filtrantes petites, il s'ensuit que $\underline{S}$ est la plus petite sous-catégorie de $\mathcal{M}$ ayant cette propriété de stabilité plus forte, et contenant A.

Prouvons b $\Longrightarrow$ a. Soit π un cardinal utile pour $\mathcal{M}$, et tel que $A \subset \mathcal{M}_\pi$. Soit B la plus petite sous-catégorie strictement pleine de $\mathcal{M}$ contenant A et stable par $\varinjlim$ filtrantes de cardinal $\leqslant \pi$. On a donc $B \hookrightarrow \mathcal{M}_\pi$ et $B \subset \underline{S}$, et $\underline{S}$ est aussi la L-enveloppe de B. D'ailleurs B est stable par facteurs directs. Considérons alors l'image essentielle $\underline{S}'$ de [page 357]
$\mathrm{Ind}_\pi(B)$ dans $\mathcal{M}$. On a $\underline{S}' \subset \underline{S}$, et tout revient à prouver que $\underline{S}' = \underline{S}$, d'où résultera en effet que $\underline{S}$ est π-accessible dans $\mathcal{M}$, a fortiori accessible dans $\mathcal{M}$, d'où a). Pour prouver que $\underline{S}' = \underline{S}$, par définition de $\underline{S}$ comme la L-enveloppe de A, il suffit de voir que $\underline{S}'$ est stable par petites $\varinjlim$ filtrantes. Or cela résulte du fait que $B \subset \mathcal{M}_\pi$ est stable dans $\mathcal{M}_\pi$ par $\varinjlim$ filtrantes de cardinal $\leqslant \pi$, et de 4.13.19, qui implique tout au moins, comme $B = \underline{S}' \cap \mathcal{M}_\pi$ (en vertu de 4.13.4) que $\underline{S}'$ est stable par $\varinjlim$ filtrantes *de cardinal* $\leqslant \pi$. Qu'il soit même stable par petites $\varinjlim$ filtrante quelconques, résulte de ceci, et du fait qu'il l'est par $\varinjlim$ grandes devant π. (Cf. 4.13.21 …)

Définition 4.13.35. Soient $\mathcal{M}$ une catégorie accessible, stable par petites $\varinjlim$ fil- [page 358]
trantes, S une partie de $\mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$, $\underline{S}$ la sous-catégorie pleine correspondante dans $\mathcal{M}$. On dit que S est *L-accessible*, ou que $\underline{S}$ est L-accessible dans $\mathcal{M}$, si $\underline{S}$ est accessible dans $\mathcal{M}$, et de plus stable par petites $\varinjlim$ filtrantes ([158]).

Proposition 4.13.36. *Soient $\mathcal{M}$, S, $\underline{S}$ comme dans 4.13.35, et soit π un cardinal utile pour $\mathcal{M}$. Supposons $\underline{S}$ stable dans $\mathcal{M}$ par petites $\varinjlim$ filtrantes, ou seulement $\underline{S}(\pi) \overset{déf}{=} \underline{S} \cap \mathcal{M}_\pi$ stable par petites $\varinjlim$ filtrantes de cardinal $\leqslant \pi$. Conditions équivalentes :*

a) $\underline{S}$ est π-accessible. (Il sera automatiquement stable par petites $\varinjlim$ filtrantes, donc L-accessible.)

b) Pour tout $x \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$, on a $x \in \mathrm{Ob}\,\underline{S}$ si et seulement si $\underline{S}(\pi)/x$ est cofinale dans $\mathcal{M}_\pi/x$. p. 136

c) Pour tout $x \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$, et toute représentation $x \simeq \varinjlim_{i \in I} x_i$ qui est L-π-adaptée (cf. page 343, c), on a ceci : $x \in \mathrm{Ob}\,S$ si et seulement si $I_{\underline{S}}$ est cofinal dans I. [page 359]

c′) Comme c), avec I ordonnée.

c″) (Si on a choisi, pour tout $x \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$, une *représentation π-adaptée $x \simeq \varinjlim_I x_i$) : $x \in \mathrm{Ob}\,\underline{S} \Longleftrightarrow$ l'ensemble $I_{\underline{S}}$ est cofinal dans I.*

Démonstration. C'est essentiellement l'énoncé de 4.13.22 dans le cas particulier où Φ = ensemble des catégories *filtrantes* de cardinal $\leqslant \pi$, mais où, pour simplifier, on a supposé d'avance que $\underline{S}(\pi)$ satisfait à L(Φ). L'équivalence de a) b) c) est contenue dans 4.13.22, ainsi que c $\Longrightarrow$ c′. Mais pour c′ $\Longrightarrow$ a, l'hypothèse accessoire $\pi^{\pi_0} = \pi$ et que les $J \in \Phi$ seront grandes devant π_0, n'est pas satisfaite ici, et il faut un démonstration indépendante, calquée sur celle des pages 333-336. Il suffit pour cela, à l'endroit [de] $\square$, page 333, d'invoquer le

Lemme 4.13.37. *Soient $\mathcal{M}$ une catégorie accessible stable par $\varinjlim$ filtrantes, π un cardinal utile pour $\mathcal{M}$. Alors pour tout $x \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$, on a une représentation* [page 360]

$$x = \varinjlim_{i \in I} x_i$$

158. **N.B.** L'ensemble des parties L-accessibles de $\mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$ est stable par petites intersections, et par réunions *finies*. L'image inverse d'une partie L-accessible par un foncteur ([159]) $f : \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{N}$ de catégories accessibles est L-accessible.

159. un *L_0-foncteur* : qui commute aux petites $\varinjlim$ filtrantes.

L-π-adaptée (i.e. avec

1) I équivalente à une petite catégorie, et I grande devant π,

2) I stable par $\varinjlim$ *filtrantes de cardinal* $\leqslant \pi$,

3) $I \longrightarrow \mathcal{M}$ *commute à ces* $\varinjlim$,

d) $x_i \in \operatorname{Ob} \mathcal{M}_\pi \ \forall\, i \in I$*),*

avec de plus I ordonné.

En effet, on part de

$$x \;=\; \varinjlim_{j \in J} x_j \;, \qquad J \;\simeq\; \underbrace{(\mathcal{M}_\pi/x)_0}_{\substack{\text{sous-catégorie réduite} \\ \text{équivalente à } \mathcal{M}_\pi/x}} \;.$$

On définit I comme l'ensemble des sous-catégories *filtrantes* J' de J, de cardinal ["cardinal" biffé] $\leqslant \pi$, I ordonné par inclusion, et on pose, pour $J' \in I$,

$$x_{J'} \;=\; \varinjlim_{j \in J'} x_j \;.$$

Il est immédiat qu'on obtient ainsi un système inductif dans $\mathcal{M}$, indexé par I.

D'autre part, il est clair que I est petite, je dis que I est stable par $\varinjlim$ filtrantes [page 361]
de cardinal $\leqslant \pi$, et que le foncteur $J' \longmapsto x_{J'} : I \longrightarrow \mathcal{M}$ y commute, enfin que les $x_{J'}$ sont dans $\mathcal{M}_\pi$. Il reste à voir que I est grande devant π, i.e. que si on a $(J'_r)_{r \in A}$, avec $\operatorname{card} A \leqslant \pi$, les J'_r dans I, alors $\exists\, J' \in I$ qui majore les J'_r. Soit K la sous-catégorie de J engendrée par les J'_r, on voit facilement que $\operatorname{card} K \leqslant \pi$. Tout ["tout" biffé] revient à prouver :

Lemme 4.13.38 ([160]). *Soient J une catégorie grande devant π, K une sous-catégorie* p. 137
de J de cardinal $\leqslant \pi$*. Alors il existe une sous-catégorie K′* filtrante *de J, contenant K, de cardinal* $\leqslant \pi$*. Si on suppose que l'on n'est pas, dans le cas où J contient un objet maximal, et que K contienne tous les objets maximaux de J, on peut même prendre K′* [page 362]
telle que $\operatorname{Ob} K' = \operatorname{Ob} K \cup \{e\}$*, où e est un* objet final *de K′, et K est une sous-catégorie pleine de K′. (Donc si* $K' \neq K$*, K′ est isomorphe au cône à droite construit sur K, "déduit de K en lui ajoutant un objet final".)*

Démonstration. Si K admet un objet final, on prend $K' = K$. Sinon, comme J est grande devant $\operatorname{card} \operatorname{Ob} K$, il existe un $j \in \operatorname{Ob} J$ qui majore tous les objets de K. Choisissons, pour tout $k \in \operatorname{Ob} K$, une flèche

$$\alpha_k \;:\; k \longrightarrow j \;.$$

Pour toute flèche

$$u \;:\; k' \longrightarrow k$$

dans K, considérons la double-flèche

$$(\alpha_k \circ u, \alpha_{k'}) \;:\; k' \rightrightarrows j \;.$$

L'ensemble de ces double-flèches, de but j, est de cardinal $\leqslant \operatorname{card} \operatorname{Fl} K \leqslant \pi$, donc J étant grande devant π, il existe une flèche $\rho : j \longrightarrow e$ dans J qui égalise toutes ces double-flèches. Soit $K' \subset J$, ayant comme objets $\operatorname{Ob} K \cup \{e\}$, et ayant comme flèches, en plus de celles de K, les flèches $\rho\alpha_k : k \longrightarrow e$ (pour $k \in \operatorname{Ob} K$), et id_e. *Si* $e \notin \operatorname{Ob} K$, on voit que [page 363]
c'est bien une sous-catégorie, admettant e comme objet final et K comme sous-catégorie

160. **N.B.** Pour la démonstration de 4.13.37, il suffit de prouver 4.13.38 dans le cas où J est ordonnée, auquel cas les contorsions de la fin sont inutiles.

pleine. Si on avait $e \in \mathrm{Ob}\, K$, et s'il existe un objet e' de J qui majore e et qui n'est pas dans K, on se ramène aussitôt au cas précédent, en remplaçant e par e'.

([161]). Donc il reste le cas où il existe un objet e dans K qui est un plus grand élément dans K, et tel que tout objet de J majorant e soit dans K. Cela implique, J étant filtrante, que e est un plus grand objet de J. (Car si $x \in J$, $\exists\, x'$ majorant commun de x et e, donc x' est dans K, donc majoré par e, qui majore donc x.) On voit comme tantôt qu'il existe une flèche $p : e \longrightarrow j$ dans J, qui égalise toutes les double-flèches $k \rightrightarrows e$ de but e *dans* K. Quitte à composer avec $j \longrightarrow e$, on peut supposer $j = e$. On a donc un endomorphisme p de e dans J, tel que $pu = pv$ pour toute double-flèche $k \underset{v}{\overset{u}{\rightrightarrows}} e$ dans K, de but e.

[page 364]

Pour $k \in \mathrm{Ob}\, K$, soit

$$f_k \ : \ k \longrightarrow e$$

la valeur commune des pu, pour $u \in \mathrm{Hom}_K(k, e)$. On voit tout de suite que si on a $k' \xrightarrow{v} k$ dans K, alors

$$f_{k'} \ = \ f_k \circ v \ .$$

En particulier, prenant $k' = e$, on trouve

p. 138

$$f_k \circ v \ = \ f_e \,(= \ p \,) \qquad \text{si } v : e \longrightarrow k \ .$$

Soit donc K' la sous-catégorie de J ayant mêmes objets que K, et comme flèches, en plus de celles de K, les flèches composées $k \xrightarrow{u} e \xrightarrow{p^r} e \xrightarrow{v} k'$, avec u, v dans K, et $r \geqslant 1$, i.e. les flèches composées $k \xrightarrow{f_k} e \xrightarrow{p^{r'}} e \xrightarrow{v} k'$, avec $k, k' \in \mathrm{Ob}\, K$, $v \in \mathrm{Fl}\, K$, $r' \geqslant 0$. Il faut voir que c'est stable par composition (pour avoir bien une sous-catégorie). C'est clair pour vu si u ou v sont dans $\mathrm{Fl}\, K$. Si [ni] u ni v ne le sont, on doit prendre un composé

$$k \xrightarrow{u_1} e \underset{r\geqslant 1}{\xrightarrow{p^r}} e \xrightarrow{u_2} k' \xrightarrow{v_1} e \underset{s\geqslant 1}{\xrightarrow{p^s}} e \xrightarrow{v_2} k'' \ ,$$

avec u_1, u_2, v_1, v_2 dans $\mathrm{Fl}\, K$, $r, s \geqslant 1$. Or on a

$$p(v_1 u_2) \ = \ p \ , \qquad \text{d'où} \qquad p^s(v_1 u_2) \ = \ p^{s-1}(p v_1 u_2) \ = \ p^{s-1} p \ = \ p^s \ ,$$

donc le composé est

$$k \xrightarrow{u_1} e \xrightarrow{p^{r+s}} e \xrightarrow{v_2} k'' \ ,$$

qui est donc bien dans $\mathrm{Fl}\, K'$.

[page 365]

Ainsi, K' est une sous-catégorie de J, mais est-elle filtrante ? La condition PS 1′ est évidente, puisque e est un plus grand élément de J, reste la condition PS 2 de la double-flèche. On voit aisément que cette condition est satisfaite dans K', si et seulement si elle est satisfaite pour toute double-flèche

$$e \underset{p^s}{\overset{p^r}{\rightrightarrows}} e \qquad \text{avec } r, s \geqslant 0 \ .$$

(En effet, on se ramène aussitôt aux double-flèches de but e, et on note que toute flèche de K' de but e s'écrit comme un composé $k \xrightarrow{u} e \xrightarrow{p^r} e \xrightarrow{v} e$, avec $r \geqslant 0$ et u, v des flèches dans K'. En composant avec $e \xrightarrow{p} e$, on trouve alors, comme $pv = pu$, $k \xrightarrow{u} e \xrightarrow{p^{r+1}} e$, soit $k \xrightarrow{f_k} e \xrightarrow{p^r} e$.) Mais on voit aussitôt que la possibilité d'égaliser (p^r, p^s) dans K' équivaut à l'existence de $t \geqslant 0$ tel que $p^{r+t} = p^{s+t}$. Donc K' est filtrante si et seulement si $r \longmapsto p^r$

[page 366]

est une suite stationnaire (faire $r = 0$, $s = 1$, d'où $p^r = p^{r+1}$ pour r grand). Ce n'est pas forcément le cas.

Posons donc $K = K_0$, $K' = K_1$, et construisons par induction une suite croissante de sous-catégories K_i ($i \in \mathbf{N}$), avec $\mathrm{Ob}\, K_i = \mathrm{Ob}\, J$, et (pour $i \geqslant 1$) K_i étant déduites de K_{i-1} en lui rajoutant une flèche $p_i : e \longrightarrow e$, comme ci-dessus. Ainsi toute double-flèche dans un K_i peut s'égaliser dans K_{i+1}. Prenons $K_\infty = \varinjlim K_i$, K_∞ est une sous-catégorie *filtrante* de J, contenant K et de cardinal $\leqslant \pi$, q.e.d.)

On peut préciser cette construction ainsi :

Corollaire 4.13.39. *Sous les conditions de 4.13.38, supposons que K contienne un objet e maximal dans J. Soit Σ l'ensemble des endomorphismes p de e dans J, tels que pour toute double-flèche $k \overset{u}{\underset{v}{\rightrightarrows}} e$ dans K, on ait $pu = pv$. Alors Σ est stable par composition, et il existe une partie non vide Σ_∞ [$= \Sigma_0$] de Σ, telle que pour $p, p' \in \Sigma_0$, existe $q \in \Sigma_0$ tel que $qp = qp'$ (i.e. telle que la sous-catégorie J_0 de J dont l'ensemble des objets est $\{e\}$, et l'ensemble des flèches $\{\mathrm{id}_e\} \cup \Sigma_\infty$, soit filtrante). Si Σ_0 est choisie ainsi, soit $\mathcal{F}$ l'ensemble réunion de $\mathrm{Fl}\, K$ et de l'ensemble des flèches composées*

p. 139

[page 367]

$$k \xrightarrow{u} e \xrightarrow{p} e \xrightarrow{v} k' \ , \qquad (*)$$

avec $u, v \in \mathrm{Fl}\, J$, $p \in \Sigma_\infty$. Alors $\mathcal{F}$ est l'ensemble des flèches d'une sous-catégorie K' de J, ayant mêmes objets que J, et admettant e pour plus grand élément. De plus, K' contient K et est filtrante.

Démonstration. Que Σ soit stable par composition est clair. Pour construire Σ_∞ ayant les propriétés énoncées, on note que, J étant grande devant π, Σ est non vide ([162]). On construit par récurrence une suite d'éléments

$$p_0 \ , \ p_1 \ , \ \cdots \ , \ p_n \ , \ \cdots$$

de Σ, en prenant pour p_0 un élément quelconque de Σ, et pour $i \geqslant 1$, prenant $p_i \in \Sigma$ tel que pour toute double-flèche (p, p') du sous-monoïde M_{i-1} de $\mathrm{End}_J(e)$ engendré par $(p_j)_{0 \leqslant j \leqslant i-1}$, on ait $p_i p = p_i p'$. Un tel p_i existe, car prenant l'ensemble des double-flèches de la forme précédente (p, p'), avec $p, p' \in M_{i-1}$, et de celles de la forme $(u, v) : k \rightrightarrows e$, avec $u, v \in \mathrm{Fl}\, J$, l'ensemble de toutes ces double-flèches est de cardinal $\leqslant \pi$ (M_{i-1} étant dénombrable, donc de cardinal $\leqslant \pi$), donc il existe une flèche $e \longrightarrow j$ dans J qui les égalise toutes (J étant grande devant π). Quitte à composer avec $j \longrightarrow e$ (e étant objet maximal de J), on trouve le $p_i : e \longrightarrow e$ cherché.

[page 368]

Soit alors Σ_0 le sous-ensemble multiplicatif de Σ engendré par les p_i ($i \in \mathbf{N}$), limite inductive des ensembles similaires Σ_i engendrés par les p_j pour $j \in [0, i]$. Si p, p' sont dans Σ_∞, il sont dans un même Σ_i, donc on aura $p_{i+1} p = p_{i+1} p'$, ce qui prouve que Σ_∞ a la propriété filtrante exigée.

Prouvons maintenant que $\mathcal{F}$ est l'ensemble de flèches d'une sous-catégorie K' de J, ayant $\mathrm{Ob}\, K$ comme ensemble d'objets. Il reste à établir la stabilité par composition vu. Mais si u et v sont dans $\mathrm{Fl}\, K$, ou si l'un des deux est dans $\mathrm{Fl}\, K$, l'autre non (donc de la forme $(*)$), cette stabilité est évidente. Reste à voir le cas où ni [u] ni v sont dans $\mathrm{Fl}\, K$, donc sont tous deux de la forme $(*)$:

$$k \xrightarrow{u} e \xrightarrow{p} e \xrightarrow{v} k' \xrightarrow{u'} e \xrightarrow{p'} e \xrightarrow{v'} k'' \ ,$$

avec $u, v, u', v' \in \mathrm{Fl}\, K$, $p, p' \in \Sigma_\infty$. Comme $(u'v, \mathrm{id}_e)$ est une double-flèche de K de but

p. 140

161. La construction qui suit est contenue dans l'énoncé plus général et plus précis 4.13.39.

[page 369]

162. cf. argument plus bas pour construction de p_i.

e, on a

$$p'u'v \;=\; p'\mathrm{id}_e \;=\; p' \;,$$

donc le composé en question s'écrit aussi

$$k \xrightarrow{u} e \xrightarrow{p'p} e \xrightarrow{v'} k'' \;,$$

où $p'p \in \Sigma_\infty$ puisque Σ_∞ est stable par composition, donc il est dans $\mathcal{F}$, q.e.d.

Il est clair que K' contient K, et ayant mêmes objets que K qui admet e comme plus grand élément, que e est un plus grand élément de K'. Reste à prouver que K' est filtrante. Comme K' a un plus grand élément, il reste à voir que toute double-flèche $k \rightrightarrows l$ dans K' peut être égalisée dans K'. Quitte à composer avec $l \longrightarrow e$, on peut supposer $l = e$. Or on voit que toute flèche $k \longrightarrow e$ dans K' est de la forme

$$k \xrightarrow{u} e \xrightarrow{p} e \xrightarrow{v} e \;,$$

avec $u, v \in \mathrm{Fl}\, K$ et $p \in \Sigma_\infty \cup \{\mathrm{id}_e\}$. Quitte à composer avec $p_0 \in \Sigma_\infty$ fixé, cette flèche devient (puisque $p_0 v = p_0 \mathrm{id}_e = p_0$)

$$k \xrightarrow{u} e \xrightarrow{p_0 p} e \;, \qquad \text{i.e. } p_0 p u \;.$$

Pour une flèche $v'p'u' : k \longrightarrow e$, on trouve $p_0 p' u'$. Soit alors $q \in \Sigma_0$ tel que $q(p_0 p) = q(p_0 p')$, soit r (q existe puisque $p_0 p, p_0 p' \in \Sigma_\infty$). Donc $(q(p_0 p u), q(p_0 p' u')) = (ru, ru')$, et on a $ru = ru'$ puisque $r \in \Sigma_\infty$. Au total, qp_0 égalise les deux flèches vpu et $v'p'u'$, q.e.d.

[page 370]

4.14 Critères d'accessibilité pour grosses catégories

Théorème 4.14.1. *Soient $\mathcal{C}$ une catégorie équivalente à une petite catégorie, Φ, Ψ deux petits ensembles de catégories, équivalentes à des petites catégories. Pour toute catégorie I, on désigne par $I_\bullet$ (resp. ${}_\bullet I$) le cône droit (resp. gauche) sur I, déduit de I en ajoutant un objet final (resp. initial) $e = e_I$. Soit Λ_1 (resp. Λ_2) un ensemble de couples (I, φ) (resp. (I, ψ)), où $I \in \Phi$ (resp. $I \in \Psi$), et où*

$$\varphi \;:\; I \longrightarrow \mathcal{C} \qquad (\text{resp. } \psi \;:\; I \longrightarrow \mathcal{C} \;) \tag{4.14.1.1}$$

est un foncteur. Pour toute catégorie $\mathcal{N}$ stable ([163]), par $\varinjlim$ de type Φ et par $\varprojlim$ de type Ψ on désigne par

$$\underline{\mathrm{Hom}}^{\Lambda_2}_{\Lambda_1}(\mathcal{C}, \mathcal{N}) \;\subset\; \underline{\mathrm{Hom}}(\mathcal{C}, \mathcal{N}) \tag{4.14.1.2}$$

la sous-catégorie strictement pleine de $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathcal{C}, \mathcal{N})$ formée des foncteurs $f : \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{N}$ ayant la propriété suivante :

a) $\forall\ (I, \varphi) \in \Lambda_1$, le foncteur composé

$$I_\bullet \xrightarrow{\varphi} \mathcal{C} \xrightarrow{f} \mathcal{N}$$

est I-exact à gauche, i.e. fait de $(f\varphi)(e_I)$ une $\varinjlim_I$ de $f\varphi|I$.

b) Pour tout $(I, \psi) \in \Lambda_2$, le foncteur composé

p. 141

$$ {}_\bullet I \xrightarrow{\psi} \mathcal{C} \xrightarrow{f} \mathcal{N}$$

[page 371]

est I-exact à droite, i.e. fait de $(f\psi)(e_I)$ une limite projective de $(f\psi)|I$.

163. Cette propriété de stabilité n'est pas nécessaire pour la définition de $\underline{\mathrm{Hom}}^{\Lambda_2}_{\Lambda_1}(\mathcal{C}, \mathcal{N})$, et il est presque sûr que le théorème est valable sans faire cette hypothèse sur $\mathcal{N}$. Cf. 4.14.16, où on voit que c'est en tous cas inutile pour Ψ.

Avec ces notations : si $\mathcal{N}$ est une catégorie accessible, il en est de même de $\underline{\mathrm{Hom}}^{\Lambda_2}_{\Lambda_1}(\mathcal{C},\mathcal{N})$.

Commentaire. On utilisera ce théorème surtout quand on a $\Lambda_2 = \emptyset$ ou $\Lambda_1 = \emptyset$, auquel cas on note $\underline{\mathrm{Hom}}_{\Lambda_1}(\mathcal{C},\mathcal{N})$, resp. $\underline{\mathrm{Hom}}^{\Lambda_2}(\mathcal{C},\mathcal{N})$, la catégorie $\underline{\mathrm{Hom}}^{\Lambda_2}_{\Lambda_1}(\mathcal{C},\mathcal{N})$. On appliquera le théorème surtout quand $\mathcal{C}$ elle-même est stable par $\varinjlim$ de type Φ et par $\varprojlim$ de type Ψ, et quand Λ_1 (resp. Λ_2) est déjà formé de foncteurs φ (resp. ψ) qui sont I-exacts à gauche (resp. à droite). Donc $\underline{\mathrm{Hom}}^{\Lambda_2}_{\Lambda_1}(\mathcal{C},\mathcal{N})$ est alors formée des $f : \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{N}$ qui commutent à certaines $\varinjlim$ de type Φ, et à certaines $\varprojlim$ de type Ψ. En particulier, on trouve :

Corollaire 4.14.2. *Soient $\mathcal{C}$ une catégorie équivalente à une petite catégorie, $\mathcal{N}$ une $\mathfrak{U}$-catégorie, Φ et Ψ deux petits ensembles de catégories I, équivalentes à des petites catégories. On suppose $\mathcal{C}$ et $\mathcal{N}$ stables par $\varinjlim$ de type Φ, par $\varprojlim$ de type Ψ. Soit $\underline{\mathrm{Hom}}^{\Psi}_{\Phi}(\mathcal{C},\mathcal{N})$ la sous-catégorie strictement pleine de $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathcal{C},\mathcal{N})$ formée des $f : \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{N}$ qui commutent aux $\varinjlim$ de type Φ et aux $\varprojlim$ de type Ψ. Alors, si $\mathcal{N}$ est accessible, il en est de même de $\underline{\mathrm{Hom}}^{\Psi}_{\Phi}(\mathcal{C},\mathcal{N})$.* [page 372]

Voici des cas particuliers remarquables de ce corollaire :

Corollaire 4.14.3. *Soient $\mathcal{M}$, $\mathcal{N}$ deux catégories accessibles, et π_0 un cardinal infini, tel que $\mathcal{M}$ satisfasse à L_{π_0}. Soit $\underline{\mathrm{Hom}}_{\pi_0}(\mathcal{M},\mathcal{N})$ la sous-catégorie strictement pleine de $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathcal{M},\mathcal{N})$ formée des foncteurs π_0-accessibles. Alors $\underline{\mathrm{Hom}}_{\pi_0}(\mathcal{M},\mathcal{N})$ est accessible.*

(Le cas où π_0 est utile pour $\mathcal{M}$ a déjà été traité.) [page 373]

Démonstration. Dans le cas général, soit $\pi > \pi_0$ un cardinal utile pour $\mathcal{M}$, de sorte qu'on a

$$\mathcal{M} \xleftarrow{\sim} \mathrm{Ind}_{\pi}(\mathcal{C}) \qquad \text{avec } \mathcal{C} = \mathcal{M}_{\pi} \ .$$

On peut supposer $\mathcal{M} = \mathrm{Ind}_{\pi}(\mathcal{C})$. Le fait que $\mathcal{M}$ satisfasse à L_{π_0} implique que $\mathcal{C}$ est stable par $\varinjlim$ grandes devant π_0, et de cardinal $\leqslant \pi$. Soit Φ l'ensemble des catégories de cette nature. Φ n'est pas petit, mais il existe $\Phi_0 \subset \Phi$ petit, tel que toute $I \in \Phi$ soit isomorphe à une $I_0 \in \Phi_0$, ce qui suffira pour la validité de 4.14.1 et 4.14.2 (où on fera ici $\Psi = \emptyset$). On peut considérer $\underline{\mathrm{Hom}}_{!\,\pi_0}(\mathcal{M},\mathcal{N})$ comme une sous-catégorie strictement pleine de $\underline{\mathrm{Hom}}_{!\,\pi}(\mathcal{M},\mathcal{N}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}(\mathcal{C},\mathcal{N})$ (cf. 4.12.3, p. 275). Pour un foncteur $f : \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{N}$ qui est π-accessible, dire qu'il est même π_0-accessible revient à dire que sa restriction à $\mathcal{C}$, i.e. son image dans $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathcal{C},\mathcal{N})$, commute aux $\varinjlim$ de type Φ. (Cf. 4.13.20, page 341 ([164]), où on prend $\alpha = \alpha_{\pi}$, notant que $J_{\alpha_{\pi}}$ grande devant π_0 puisque $\pi > \pi_0$).

Donc on trouve [page 374]

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{!\,\pi_0}(\mathcal{M},\mathcal{N}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{\Phi}(\mathcal{C},\mathcal{N}) \ ,$$

et le corollaire 4.14.2 donne la conclusion voulue. p. 142

Corollaire 4.14.4. *Soient $\mathcal{M}$, $\mathcal{N}$ deux catégories accessibles, Φ et Ψ deux ensembles des catégories comme dans 4.14.2, on suppose que $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ satisfassent L_{π_0}, et* [soient] *stables par $\varinjlim$ de type Φ et par $\varprojlim$ de type Ψ. Soit $\underline{\mathrm{Hom}}^{\Psi}_{\Phi,\pi_0}(\mathcal{M},\mathcal{N})$ la sous-catégorie strictement pleine de $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathcal{M},\mathcal{N})$ formée des foncteurs π_0-accessibles qui commutent aux $\varinjlim$ de type Φ, et aux $\varprojlim$ de type Ψ. Alors $\underline{\mathrm{Hom}}^{\Psi}_{\Phi,\pi_0}(\mathcal{M},\mathcal{N})$ est accessible.*

Démonstration. Cette fois, on choisit $\pi > \pi_0$ tel qu'on ait $\mathrm{card\,réd}\, I \leqslant \pi$ pour tout I dans Φ ou dans Ψ. La catégorie envisagée s'interprète alors (posant encore $\mathcal{C} = \mathcal{M}_{\pi}$) comme [page 375]

$$\underline{\mathrm{Hom}}^{\Psi}_{\Phi,\pi_0}(\mathcal{M},\mathcal{N}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}^{\Psi}_{\Phi'}(\mathcal{C},\mathcal{N}) \ ,$$

où Φ' est formée des catégories qui sont soit dans Φ, ou qui sont grandes devant π_0 et de cardinal $\leqslant \pi$. Il suffit donc d'appliquer encore 4.14.2.

Corollaire 4.14.5. *Considérons les trois ensembles suivants :*

a) Φ_1 est formée de toutes les catégories équivalentes à des petites catégories.

164. La référence n'est pas tout à fait adéquate. Il faudrait réunir dans un paragraphe à part tous les énoncés de ce type, dont certains utilisent le théorème de représentation indicielle.

b) Φ_2 *comme a), mais en restreignant aux catégories filtrantes.*

c) Φ_3 *formé des catégories discrètes, et de celles qui sont grandes devant* π_0 *(*π_0 *un cardinal infini donné).*

Soit Φ *l'un des ensembles de catégories* Φ_1, Φ_2, Φ_3, $\Phi_2 \cup \Phi_3$ *ou la réunion d'un de ceux-ci et d'un petit ensemble* Φ_0 *de catégories essentiellement petites (*[165]*). Soit* Ψ *un petit ensemble de catégories. Soient* $\mathcal{M}$, $\mathcal{N}$ *des catégories accessibles, stables par* $\varinjlim$ *de type* Φ*, et par* $\varprojlim$ *de type* Ψ*. Alors* $\underline{\mathrm{Hom}}^{\Psi}_{\Phi}(\mathcal{M},\mathcal{N})$ *est accessible.*

Démonstration. Soit $\pi'_0 \geqslant \pi_0$ un cardinal utile pour $\mathcal{M}$, π un cardinal ayant les pro- [page 376]
priétés suivantes.

a) $\pi \geqslant \sup(\pi'_0, \operatorname{card} \operatorname{réd} \mathcal{M}_{\pi'_0})$, $\pi > \pi_0$.

b) $\pi^{\pi'_0} = \pi$.

c) $I \in \Phi_0 \cup \Psi \Longrightarrow \operatorname{card} \operatorname{réd} I \leqslant \pi$.

Soit $\mathcal{C} = \mathcal{M}_\pi$, d'où $\mathcal{M} \simeq \mathrm{Ind}_\pi(\mathcal{C})$. Dans tous les cas envisagés, Φ contient l'ensemble des catégories essentiellement petites qui sont grandes devant π_0, a fortiori celles qui sont grandes devant π, donc la catégorie $\underline{\mathrm{Hom}}^{\Psi}_{\Phi}$ s'interprète comme une sous-catégorie strictement pleine de

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\mathcal{C},\mathcal{N}) \ .$$

Si d'autre part Φ_π désigne l'ensemble des $I \in \Phi$ telles que $\operatorname{card} I \leqslant \pi$, on trouve

$$\underline{\mathrm{Hom}}^{\Psi}_{\Phi}(\mathcal{M},\mathcal{N}) \ \simeq \ \underline{\mathrm{Hom}}^{\Psi}_{\Phi_\pi}(\mathcal{C},\mathcal{N}) \ ,$$

et on applique 4.14.2.

En particulier, on trouve : p. 143

Corollaire 4.14.6. *Soient* $\mathcal{M}$, $\mathcal{N}$ *deux catégories accessibles, supposons* $\mathcal{M}$ *stable par petites* $\varinjlim$ *(i.e.* $\mathcal{M}$ *est une catégorie paratopos). Alors la catégorie* $\underline{\mathrm{Hom}}_!(\mathcal{M},\mathcal{N})$ *des foncteurs* $f : \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{N}$ *qui commutent aux petites* $\varinjlim$ *est accessible. Si* $\mathcal{N}$ *est elle aussi un paratopos,* $\underline{\mathrm{Hom}}_!(\mathcal{M},\mathcal{N})$ *est un paratopos.* [page 377]

Démonstration. La première assertion est le cas particulier de 4.14.5 relatif au cas où $\Phi = \Phi_0$, $\Psi = \emptyset$. La deuxième assertion en résulte, puisque $\underline{\mathrm{Hom}}_!(\mathcal{M},\mathcal{N})$ est visiblement stable par petites $\varinjlim$, donc c'est un paratopos étant accessible (4.8.9, page 207).

Corollaire 4.14.7. *Soient* Φ, Ψ, $\mathcal{M}$ *comme dans 4.14.5. Alors pour toute catégorie accessible* $\mathcal{N}$*, la catégorie* [page 378]

$$\underline{\mathrm{Hom}}^{\Phi}_{\Psi}(\mathcal{M}^\circ,\mathcal{N}) \ \simeq \ (\underline{\mathrm{Hom}}^{\Psi}_{\Phi}(\mathcal{M},\mathcal{N}^\circ))^\circ$$

est accessible.

Démonstration. On procède comme pour 4.14.5, pour expliciter

$$\underline{\mathrm{Hom}}^{\Psi}_{\Phi}(\mathcal{M},\mathcal{N}^\circ) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}^{\Psi}_{\Phi_\pi}(\mathcal{C},\mathcal{N}^\circ) \ ,$$

d'où

$$\underline{\mathrm{Hom}}^{\Phi}_{\Psi}(\mathcal{M}^\circ,\mathcal{N}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}^{\Phi_\pi}_{\Psi}(\mathcal{C}^\circ,\mathcal{N}) \ ,$$

et on applique 4.14.2 à $\mathcal{C}^\circ$, Ψ, Φ_π.

Corollaire 4.14.8. *Soient* $\mathcal{M}$ *et* $\mathcal{N}$ *deux catégories paratopos. Alors*

$$\mathcal{M} \boxtimes \mathcal{N} \ \simeq \ \underline{\mathrm{Hom}}^{!}(\mathcal{M}^\circ,\mathcal{N}) \qquad \textit{(cf. 4.2 et 4.3)}$$

est un paratopos.

[page 379]

En effet, en vertu de 4.14.7 (avec $\Phi = \Phi_\pi$ [?], $\Psi = \emptyset$), c'est une catégorie accessible.

D'autre part, il est immédiat qu'elle est stable par petites $\varprojlim$, $\mathcal{N}$ l'étant. Donc on conclut encore par 4.8.9 (page 207) que c'est une catégorie paratopos.

Corollaire 4.14.9. *Soient $\mathcal{M}$, $\mathcal{N}$ deux catégories paratopos, et $\underline{\mathrm{Hom}}^!(\mathcal{M},\mathcal{N})$ la catégorie des foncteurs $\mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{N}$ qui commutent aux petites $\varprojlim$. On a alors une équivalence de catégories*

$$\begin{aligned} \underline{\mathrm{Hom}}^!(\mathcal{M},\mathcal{N}) &\xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_!(\mathcal{N},\mathcal{M})^\circ \\ f &\longmapsto \textit{adjoint à gauche de } f \ , \end{aligned}$$

!! *et par suite la catégorie* **opposée** *à $\underline{\mathrm{Hom}}^!(\mathcal{M},\mathcal{N})$ est accessible.*

Ceci résulte du

Lemme 4.14.10 (pour mémoire). *Soient $\mathcal{M}$* `[une]` *catégorie pseudo-topos, $f : \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{N}$ un foncteur. Pour que f admette un adjoint à gauche (resp. à droite), il faut et il suffit que f commute aux petites $\varprojlim$ (resp. aux petites $\varinjlim$).*

Ceci équivaut au cas particulier : p. 144

Corollaire 4.14.11. *Soit $\mathcal{M}$ un paratopos, et f un foncteur covariant (resp. contravariant) de $\mathcal{M}$ dans* Ens. *Pour que f soit représentable, il faut et il suffit que f commute aux $\varprojlim$.* [page 380]

Ça a été vu – le cas des contrafoncteurs étant le plus évident (cf. 4.1 – il suffit que $\mathcal{M}$ soit un paratopos, et même que $\mathcal{M}$ admette une petite sous-catégorie pleine génératrice, cf. SGA 4 I 8.12.7 (pour l'énoncé dual). Dans les cas d'un foncteur covariant, la difficulté provient du fait que $\mathcal{M}$ n'admet pas forcément de petite sous-catégorie cogénératrice. Il faut utiliser l'existence d'une filtration cardinale (généralisée), cf. loc. cit. 8.3.12.)

Après tous ces beaux corollaires, on est mûr pour s'attaquer à la démonstration de 4.14.1 !

[page 381]

Démonstration de 4.14.1. On sait que $\mathcal{M} = \underline{\mathrm{Hom}}(\mathcal{C},\mathcal{N})$ est accessible (4.9.5, p. 220), et $\underline{\mathrm{Hom}}^{\Lambda_2}_{\Lambda_1}(\mathcal{C},\mathcal{N})$ est une sous-catégorie strictement pleine de cette catégorie. Il suffit de prouver que c'est une sous-catégorie accessible dans $\mathcal{M}$ (4.13.1, p. 281). Pour tout $\xi = (I,\varphi) \in \Lambda_1$, on a un foncteur

$$L_\xi \ : \ \mathcal{M} \ = \ \underline{\mathrm{Hom}}(\mathcal{C},\mathcal{N}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{N}) \ ,$$

donné par

$$L_\xi(f) \ = \ \text{flèche canonique } \varinjlim_{i\in I} f\varphi(i) \longrightarrow f\varphi(e_I) \ .$$

Je dis que le foncteur L_ξ est *accessible.* En effet, soit π_0 un cardinal tel que $\mathcal{N}$ satisfasse à L_{π_0}, il en est donc de même de $\mathcal{M} = \underline{\mathrm{Hom}}(\mathcal{C},\mathcal{N})$ et de $\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{N}) \overset{\text{déf}}{=} \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{\Delta}_1,\mathcal{N})$, les limites en question se calculent argument par argument. Je dis que L_ξ est π_0-accessible, i.e. commute aux $\varinjlim$ grandes devant π_0. Il suffit de voir qu'il en est ainsi des foncteurs composés avec les foncteurs

$$\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{N}) \underset{\rho}{\overset{\sigma}{\rightrightarrows}} \mathcal{N}$$

"source" et "but", i.e. des foncteurs

$$f \longmapsto \varinjlim_{i\in I} f\varphi(i) \qquad \text{et} \qquad f \longmapsto f\varphi(e_I) \ .$$

[page 382]

165. On pourrait faire ici un énoncé qui englobe 4.14.4 en rajoutant un

d) Φ_4 formé des catégories grandes devant π_0,

et prendre Φ de la forme de Φ_1, Φ_2, Φ_4, Φ_3, $\Phi_3 \cup \Phi_2$, $\Phi_3 \cup \Phi_4$, ou la réunion de ceux-ci et d'un Φ_0.

Or le premier foncteur, $f \longmapsto \varinjlim_{i\in I} f\varphi(i)$, est le composé de

$$f \longmapsto f \circ \varphi_I \ : \ \underline{\mathrm{Hom}}(\mathcal{C},\mathcal{N}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(I,\mathcal{N})$$

(lequel commute aux $\varinjlim$ qui sont représentables dans $\mathcal{N}$, et en particulier aux $\varinjlim$ grandes devant π_0) et du foncteur

$$\varinjlim_{I} \ : \ \underline{\mathrm{Hom}}(I,N) \longrightarrow \mathcal{N} \ ,$$

qui lui aussi commute aux limites inductives représentables dans $\mathcal{N}$, et en particulier à celles grandes devant π_0. Quant au foncteur $f \longmapsto (f\circ\varphi)(e_I) = f(\varphi(e_I))$, il est clair qu'il commute également aux $\varinjlim$ représentables dans $\mathcal{N}$, donc il est π_0-accessible.

Ceci posé, notons que p. 145

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\Lambda_1}(\mathcal{C},\mathcal{N}) \ = \ \bigcap_{\xi\in\Lambda_1} \underline{\mathrm{Hom}}_{\{\xi\}}(\mathcal{C},\mathcal{N}) \ ,$$

et que $\underline{\mathrm{Hom}}_{\xi}(\mathcal{C},\mathcal{N})$ est l'image inverse, par le foncteur accessible L_ξ précédent, de la sous-catégorie strictement pleine $\underline{\mathrm{Is}}(\mathcal{N})$ de $\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{N})$ formée des *isomorphismes* dans $\mathcal{N}$. Si on prouve que cette dernière est accessible dans $\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{N})$, il s'ensuit que $\underline{\mathrm{Hom}}_{\xi}(\mathcal{C},\mathcal{N})$ est accessible dans $\mathcal{M}$ (4.3.31, page 350). Donc, Φ étant petite, il s'ensuit que $\underline{\mathrm{Hom}}_{\Lambda_1}(\mathcal{C},\mathcal{N})$ [page 383] est accessible dans $\mathcal{M}$ (4.13.7, page 291).

On prouve de la même façon que $\underline{\mathrm{Hom}}^{\Lambda_2}(\mathcal{C},\mathcal{N})$ est accessible dans $\mathcal{M} = \mathrm{Hom}(\mathcal{C},\mathcal{N})$. Ici, on doit considérer les foncteurs

$$L'_\xi \ : \ \mathcal{M} = \underline{\mathrm{Hom}}(\mathcal{C},\mathcal{N}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{N})$$

définis par

$$L'_\xi \ = \ \text{flèche canonique } f\varphi(e'_I) \longrightarrow \varprojlim_{i\in I} f\varphi(i) \ .$$

Pour prouver que ce foncteur est accessible, on procède comme tantôt, en prenant cependant π_0 assez grand pour qu'on ait

$$\begin{cases} I \in \Psi \implies \mathrm{card}\,\mathrm{réd}\, I \leqslant \pi_0. \\ \mathcal{N}_{\pi_0} \text{ est génératrice dans } \mathcal{N}. \end{cases}$$

Je dis qu'alors L'_ξ est π_0-accessible : en effet, en procédant comme tantôt pour L_ξ, on est ramené à voir que

$$\varinjlim_{I} \underline{\mathrm{Hom}}(I,\mathcal{N}) \longrightarrow \mathcal{N}$$

est π-accessible. Or cela est contenu dans SGA 4 I 9.8.

Ainsi, on a prouvé que les deux sous-catégories strictement pleines

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\Lambda_1}(\mathcal{C},\mathcal{N}) \ , \qquad \underline{\mathrm{Hom}}^{\Lambda_2}(\mathcal{C},\mathcal{N}) \qquad \text{[page 384]}$$

de $\mathcal{M} \overset{\text{déf}}{=} \underline{\mathrm{Hom}}(\mathcal{C},\mathcal{N})$ sont accessibles dans $\mathcal{M}$. Il en est donc de même de leur intersection (4.13.7)

$$\underline{\mathrm{Hom}}^{\Lambda_2}_{\Lambda_1}(\mathcal{C},\mathcal{N}) \ = \ \underline{\mathrm{Hom}}_{\Lambda_1}(\mathcal{C},\mathcal{N}) \cap \underline{\mathrm{Hom}}^{\Lambda_2}(\mathcal{C},\mathcal{N}) \ ,$$

q.e.d.

Il reste à prouver le

Lemme 4.14.12. *Soit $\mathcal{N}$ une catégorie accessible. Alors la catégorie $\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{N}) \overset{\text{déf}}{=} \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{\Delta}_1,\mathcal{N})$ est accessible (4.9.5), et la sous-catégorie strictement pleine $\underline{\mathrm{Is}}(\mathcal{N})$ formée des flèches inversibles dans $\mathcal{N}$ est accessible dans $\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{N})$. (Il en est de même de la sous-catégorie strictement pleine $\underline{\mathrm{Mon}}(\mathcal{N})$ formée des monomorphismes dans $\mathcal{N}$.)*

DÉMONSTRATION. Soit $\mathcal{C}$ une petite sous-catégorie strictement génératrice de $\mathcal{N}$, et considérons la petite famille des foncteurs

$$h_x \;=\; (y \longmapsto \mathrm{Hom}(x,y)) \;:\; \mathcal{N} \longrightarrow \mathrm{Ens}\ ,$$

d'où des foncteurs p. 146

$$\underline{\mathrm{Fl}}(h_\xi) \;:\; \underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{N}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Fl}}(\mathrm{Ens})\ . \qquad \texttt{[page 385]}$$

Pour qu'une flèche $u : y \longrightarrow z$ dans $\mathcal{N}$ soit isomorphe (resp. monomorphe), il faut et il suffit que pour tout $x \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$, $h_x(u)$ le soit. Ainsi, $\underline{\mathrm{Is}}(\mathcal{N})$ (resp. $\underline{\mathrm{Mon}}(\mathcal{N})$) apparaît comme l'intersection des images inverses, par les foncteurs $\underline{\mathrm{Fl}}(h_\xi)$ ci-dessus, de la sous-catégorie $\underline{\mathrm{Is}}(\mathrm{Ens})$ (resp. $\underline{\mathrm{Mon}}(\mathrm{Ens})$) de $\underline{\mathrm{Fl}}(\mathrm{Ens})$. Cela nous ramène au cas où $\mathcal{N} = (\mathrm{Ens})$. Mais si $\mathcal{C}$ désigne la sous-catégorie strictement pleine de Ens formée des ensembles *finis*, ceux-ci forment une famille strictement génératrice formée d'objets de *présentation finie*, et comme Ens est stable par petites $\varinjlim$, donc par $\varinjlim$ filtrantes, il s'ensuit qu'on a

$$\mathrm{Ind}(\mathcal{C}) \longrightarrow (\mathrm{Ens})\ , \qquad (*)$$

d'où aussitôt (SGA 4 I 8.8.5, p. 104)

$$\mathrm{Ind}(\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{C})) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Fl}}(\mathrm{Ens})\ . \qquad (*) \qquad \texttt{[page 386]}$$

Donc le résultat d'accessibilité voulu résulte des deux lemmes suivants :

Lemme 4.14.13. *L'équivalence* $(*)$ *précédente induit des équivalences*

$$\begin{aligned} \mathrm{Ind}(\underline{\mathrm{Is}}(\mathcal{C})) &\xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Is}}(\mathrm{Ens}) \\ \mathrm{Ind}(\underline{\mathrm{Mon}}(\mathcal{C})) &\xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Mon}}(\mathrm{Ens}) \end{aligned}$$

(où $\mathcal{C} = (\mathrm{Ensf})$ *est la sous-catégorie pleine de* (Ens) *formée des ensembles* finis*.)*

Lemme 4.14.14 ([166]). *Soit* $\mathcal{C}$ *une catégorie équivalente à une petite catégorie. Alors :*

a) $\mathcal{M} \overset{\text{déf}}{=} \mathrm{Ind}(\mathcal{C})$ *est une catégorie accessible.*

b) Pour toute sous-catégorie pleine $\mathcal{D}$ *dans* $\mathcal{C}$*, l'image essentielle de* $\mathrm{Ind}\,\mathcal{D}$ *dans* $\mathcal{M} = \mathrm{Ind}(\mathcal{C})$ *est une sous-catégorie L-accessible dans* $\mathcal{M}$*.*

DÉMONSTRATION des deux lemmes immédiate et "laissée au lecteur". Le b) dans 4.14.14 provient du fait que le foncteur $\mathrm{Ind}(\mathcal{D}) \longrightarrow \mathrm{Ind}(\mathcal{C})$ provenant d'un foncteur $\mathcal{D} \longrightarrow \mathcal{C}$ (ici un foncteur d'inclusion) est un L-foncteur (i.e. commute aux petites $\varinjlim$ filtrantes), et a fortiori est accessible (et même $\aleph_0$-accessible). [page 387]

4.14.15. On ne peut s'empêcher de se demander si pour $\mathcal{N}$ accessible, la sous-catégorie strictement pleine $\underline{\mathrm{Ép}}(\mathcal{N})$ dans $\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{N})$, formée des épimorphismes dans $\mathcal{N}$, est accessible dans $\mathcal{N}$. Il est immédiat que si $\mathcal{N}$ satisfait à L_{π_0}, alors $\underline{\mathrm{Ép}}(\mathcal{N})$ est stable dans $\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{N})$ par les $\varinjlim$ de type L_{π_0}, a fortiori par facteurs directs. Elle aurait donc dû mal à ne pas être accessible dans $\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{N})$. Notons quand même :

Corollaire 4.14.15.1 (de 4.14.13). *Soit* $\mathcal{N}$ *une catégorie accessible stable par sommes amalgamées* $y \amalg_x z$ ([167])*. Alors* $\underline{\mathrm{Ép}}(\mathcal{N})$ *est une sous-catégorie accessible dans* $\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{N})$*.*

Considérons en effet le foncteur p. 147

$$\begin{aligned} \gamma \;:\; \underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{N}) &\longrightarrow \underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{N}) \\ (x \longrightarrow y) &\longmapsto (y \amalg_x y \xrightarrow{\text{codiag}} y)\ . \end{aligned} \qquad \texttt{[page 388]}$$

166. **N.B.** À équivalence près, on trouve les catégories accessibles $\mathcal{M}$ stables par petites $\varinjlim$ filtrantes, et telles que $\mathcal{M}_{\mathrm{pf}}$ (sous-catégorie des objets de présentation *finie*) soit strictement génératrice.

167. Je suis presque sûr que cette hypothèse est superflue. Comparer page 390.

Ce foncteur commute aux types de $\varinjlim$ qui sont représentables dans $\mathcal{N}$, en particulier, il est accessible. D'autre part, $\underline{\text{Ép}}(\mathcal{N})$ est l'image inverse par γ de la sous-catégorie strictement pleine $\underline{\text{Is}}(\mathcal{N})$ de $\underline{\text{Fl}}(\mathcal{N})$. Donc le corollaire résulte du fait que par 4.14.13 cette dernière est accessible dans $\underline{\text{Fl}}(\mathcal{N})$.

4.14.16. Je présume que 4.14.1 reste valable sans supposer $\mathcal{N}$ stable par les $\varinjlim$ de type Φ et par les $\varprojlim$ de type Ψ. Si on a une essentiellement petite catégorie I, la question est de savoir si la sous-catégorie strictement pleine $\underline{\text{Hom}}_{\square}(I_\bullet,\mathcal{N})$ de $\underline{\text{Hom}}(I_\bullet,\mathcal{N})$, formée des foncteurs satisfaisant la condition a) de 4.14.1, est accessible dans $\underline{\text{Hom}}(I_\bullet,\mathcal{N})$, et de [page 389]
même pour $\underline{\text{Hom}}^{\square}({}_\bullet I,\mathcal{N})$. Pour ce deuxième cas, ça a l'air OK, car si $\mathcal{C}$ est une petite sous-catégorie strictement génératrice de $\mathcal{N}$, et si pour tout $x \in \text{Ob}\ [\mathcal{C}]$ on considère encore le foncteur



$$h_x \ : \ \mathcal{N} \longrightarrow \text{Ens}\ ,$$

d'où

$$\bar{h}_x \ : \ \underline{\text{Hom}}({}_\bullet I,\mathcal{N}) \longrightarrow \underline{\text{Hom}}({}_\bullet I,\text{Ens})\ ,$$

on voit que $\underline{\text{Hom}}^{\square}({}_\bullet I,\mathcal{N})$ est l'intersection des images inverses des sous-catégories $\underline{\text{Hom}}^{\square}({}_\bullet I,\text{Ens})$ de $\underline{\text{Hom}}({}_\bullet I,\text{Ens})$. Donc ces dernières étant accessibles dans $\underline{\text{Hom}}({}_\bullet I,\text{Ens})$, par 4.14.1 ((Ens) étant stable par petites $\varprojlim$), il s'ensuit bien que $\underline{\text{Hom}}^{\square}({}_\bullet I,\mathcal{N})$ l'est dans $\underline{\text{Hom}}({}_\bullet I,\mathcal{N})$, q.e.d.

Le cas de $\underline{\text{Hom}}_{\square}(I_\bullet,\mathcal{N})$ dans $\underline{\text{Hom}}(I_\bullet,\mathcal{N})$ semble plus délicat, dans le cas où [page 390]

$I =$  , donc $I =$  ,

si l'énoncé envisagé est vrai, on en conclura que $\underline{\text{Ép}}(\mathcal{N})$ est accessible dans $\underline{\text{Fl}}(\mathcal{N})$, pour toute catégorie accessible, car c'est l'image inverse de $\underline{\text{Hom}}_{\square}(I_\bullet,\mathcal{N})$ par le foncteur canonique (accessible)

$$\begin{array}{ccc} \underline{\text{Fl}}(\mathcal{N}) & \longrightarrow & \underline{\text{Hom}}(I_\bullet,\mathcal{N}) \\ (x \xrightarrow{u} y) & \longmapsto & \left(\begin{array}{ccccc} & & y & & \\ & \overset{u}{\nearrow} & & \overset{\text{id}_y}{\searrow} & \\ x & & & & y \\ & \underset{u}{\searrow} & & \underset{\text{id}_y}{\nearrow} & \\ & & y & & \end{array} \right) . \end{array}$$

C'est dire que la généralisation envisagée de 4.14.1 n'est pas oiseuse, mais est sans p. 148
doute utile.

[page 391]

Théorème 4.14.17 ([168]). *Soit $p : \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{C}$ un foncteur cofibrant ou fibrant, avec $\mathcal{C}$ essentiellement petite (i.e. équivalente à une petite catégorie), et tel que les catégories fibres soient accessibles, et les foncteurs cochangement de base (cas cofibrant) ou de changement de base (cas fibrant) associés aux flèches u de $\mathcal{C}$ soient accessibles. Alors la catégorie $\underline{\Gamma}(\mathcal{E}/\mathcal{C})$ des sections de $\mathcal{E}$ sur $\mathcal{C}$ est accessible, et pour tout $s \in \text{Ob}\,\mathcal{C}$, le foncteur "évaluation en s" $\varepsilon_s : \underline{\Gamma}(\mathcal{E}/\mathcal{C}) \longrightarrow \mathcal{E}_s$ est accessible.*

Corollaire 4.14.18. *Soit π_0 un cardinal infini tel que les catégories fibres satisfassent la condition L_{π_0}, et que les foncteurs cochangement de base (resp. changement de base) entre icelles satisfassent également L_{π_0}. (Un tel π_0 existe.)*

ⓐ *Alors $\mathcal{M} = \underline{\Gamma}(\mathcal{E}/\mathcal{C})$ satisfait la condition $\underline{\text{L}}_{\pi_0}$, et les foncteurs ε_s aussi, i.e. les $\varinjlim$ grandes devant π_0 dans $\underline{\Gamma}(\mathcal{E}/\mathcal{C})$ se calculent argument par argument.*

168. Cf. généralisation dans [le] théorème page 422, th. 4.14.26.

ⓑ *Soit un cardinal* $\pi \geqslant \sup(\pi_0, \operatorname{card} \operatorname{réd} \mathcal{C})$. *Pour qu'un objet* f *de* $\mathcal{M}$ *appartienne à* $\mathcal{M}_\pi$, *il* suffit *que* $\forall\ s \in \operatorname{Ob} C$, $f(s) \overset{\text{déf}}{=} \varepsilon_s(x)$ [plutôt $\varepsilon_s(f)$] *soit dans* $\mathcal{E}_{s\,\pi}$. *(Comparer 4.5.8, page 119.)*

ⓒ *Supposons pi*$_0$ *choisi de façon* [page 392]
à satisfaire les conditions supplémentaires suivantes : π_0 *est utile pour* $\mathcal{M} = \underline{\Gamma}(\mathcal{E}/\mathcal{C})$, *et pour chacune des catégories fibres* $\mathcal{E}_s$ ($s \in \operatorname{Ob}\mathcal{C}$) *(un tel* π_0 *existe). Soit*

$$\pi_1 \ = \ \sup(\pi_0, \operatorname{card} \operatorname{réd} \mathcal{C}, \operatorname{card} \operatorname{réd} \mathcal{M}_{\pi_0}) \ .$$

Alors pour tout cardinal $\pi \geqslant \pi_1$ *et tel que* $\pi^{\pi_0} = \pi$, *on a*

$$\mathcal{M}_\pi \ = \ \left\{ \begin{array}{l} \text{sous-catégorie strictement pleine de } \mathcal{M} \text{ formée des } f \in \\ \operatorname{Ob}\mathcal{M} \text{ telles que } f(s) \in \operatorname{Ob}\mathcal{E}_{s\,\pi}\ \forall\ s \in S \text{ [plutôt } s \in \\ \operatorname{Ob} C\text{]}. \end{array} \right.$$

Si de plus π *est choisi tel qu'on ait*

$$\pi \ \geqslant \ \sup_{s \in \operatorname{Ob}\mathcal{C}} \operatorname{card} \operatorname{réd} \mathcal{E}_{s\,\pi_0} \ ,$$

alors la sous-catégorie strictement pleine $\mathcal{E}(\pi)$ *de* $\mathcal{E}$ *telle que* $\operatorname{Ob}\mathcal{E}(\pi) = \bigcup_{s \in \operatorname{Ob}\mathcal{C}} \operatorname{Ob}\mathcal{E}_{s\,\pi}$ *est une sous-catégorie* $\mathcal{C}$*-cofibrée (resp.* $\mathcal{C}$*-fibrée) de* $\mathcal{E}$, *et on a*

$$\underline{\Gamma}(\mathcal{E}/\mathcal{C})_\pi \xleftarrow{\sim} \underline{\Gamma}(\mathcal{E}(\pi)/C),$$

donc (π *étant utile pour* $\mathcal{E}$*) on a une équivalence de catégories*

$$\underline{\Gamma}(\mathcal{E}/\mathcal{C}) \xleftarrow{\sim} \operatorname{Ind}_\pi(\underline{\Gamma}(\mathcal{E}(\pi)/\mathcal{C})) \ .$$

Toutes ces assertions se prouvent facilement dans l'ordre où elles sont données, en utilisant 4.14.17 et les résultats généraux déjà prouvés. Bien sûr, on peut commencer par remplacer $\mathcal{C}$ par une sous-catégorie réduite $\mathcal{C}_0$ équivalente et $\mathcal{E}$ par $\mathcal{E}_0 = \mathcal{E}|\mathcal{C}$ [plutôt $\mathcal{E}|\mathcal{C}_0$], de façon à se réduire (dans b) et c)) au cas où $\operatorname{card}\mathcal{C} \leqslant \pi$. p. 149 [page 393]

Corollaire 4.14.19. *Sous les conditions de 4.14.17, la sous-catégorie* $\underline{\Gamma}_{\text{cocart}}(\mathcal{E}/\mathcal{C})$ *de* $\mathcal{M} = \underline{\Gamma}(\mathcal{E}/\mathcal{C})$ *(cas p cofibrant), resp. la sous-catégorie* $\underline{\Gamma}_{\text{cart}}(\mathcal{E}/\mathcal{C})$ *(cas p fibrant) est accessible dans* $\mathcal{M}$, *donc accessible et le foncteur d'inclusion* [est] *accessible.*

(**N.B.** Ces deux catégories sont strictement pleines dans $\underline{\Gamma}(\mathcal{E}/\mathcal{C})$, donc l'assertion qu'elles soient accessibles dans celle-ci *équivaut* à la dernière assertion.)

Démonstration de 4.14.19. On peut supposer $\mathcal{C}$ réduite, donc petite. Considérons le cas où p est cofibrant. Pour toute flèche $\lambda : s \longrightarrow t$ dans $\mathcal{C}$, considérons le foncteur

$$\varphi_\lambda \ : \ \mathcal{M} \longrightarrow \underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{E}_t)$$

défini par [page 394]

$$\varphi_\lambda(f) \ = \ (\lambda_*(f(s)) \xrightarrow{f(\lambda)^\natural} f(t)) \ .$$

C'est un foncteur accessible, car son composé avec les foncteurs source et but sont les foncteurs $\lambda_*\varepsilon_s$ et ε_t, donc accessibles, ε_s, ε_t et λ_* étant accessibles. Considérons la sous-catégorie strictement pleine

$$\underline{\mathrm{Is}}(\mathcal{E}_t) \ \subset \ \underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{E}_t) \ ,$$

on sait qu'elle est accessible dans $\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{E}_t)$ (4.14.12). Donc son image inverse par φ_λ est accessible dans $\mathcal{M}$, et par suite aussi

$$\underline{\Gamma}_{\text{cart}}(\mathcal{E}/\mathcal{C}) \ \overset{\text{déf}}{=} \ \bigcap_{\lambda \in \operatorname{Ob}\mathcal{C}} \varphi_\lambda^{-1}(\underline{\mathrm{Is}}(\mathcal{E}_t))$$

comme intersection d'une *petite* famille de sous-catégories accessibles dans $\mathcal{M}$, q.e.d. Le cas où p est fibrant se traite de façon similaire, en introduisant les foncteurs

$$\psi_\lambda \ : \ \mathcal{M} = \underline{\Gamma}(\mathcal{E}/\mathcal{C}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{E}_s)$$

donnés par

$$\psi_\lambda(f) \ = \ (f(s) \xrightarrow{f(\lambda)^\flat} \lambda^* f(t)) \ .$$

Corollaire 4.14.20. *Soit π_0 un cardinal infini choisi comme dans 4.14.18 a).* [page 395]

ⓐ *Alors $\mathcal{M}_{\mathrm{c}} = \underline{\Gamma}_{\mathrm{cocart}}(\mathcal{E}/\mathcal{C})$ (resp. $\mathcal{M}_{\mathrm{c}} = \underline{\Gamma}_{\mathrm{cart}}$) est L_{π_0}-stable dans $\mathcal{M} = \underline{\Gamma}(\mathcal{E}/\mathcal{C})$, ou ce qui revient au même (comme elle est strictement pleine), elle satisfait L_{π_0}, et le foncteur d'inclusion satisfait à L_{π_0}. Les $\varinjlim$ grandes devant π_0 dans cette catégorie se calculent argument par argument.*

ⓑ *Pour tout cardinal $\pi \geqslant \pi_0$, tout objet de $\mathcal{M}_{\mathrm{c}}$ qui est π-accessible dans $\mathcal{M}$ l'est (tautologiquement) dans $\mathcal{M}_{\mathrm{c}}$. Si $\pi \geqslant \sup(\pi_0, \operatorname{card} \operatorname{réd} \mathcal{C})$, alors (par 4.14.18 b) tout objet f de $\mathcal{M}_{\mathrm{c}}$ tel que $f(s) \in \operatorname{Ob} \mathcal{E}_{s\,\pi}$ $\forall$ $s \in S$* `[plutôt` $s \in \operatorname{Ob} C$`]` *est dans $\mathcal{M}_\pi$ et dans $\mathcal{M}_{\mathrm{c}\,\pi}$.*

ⓒ *Supposons π_0 choisi comme dans 4.14.18 c, et que de plus $\mathcal{M}_{\mathrm{c}}$ soit π_0-accessible dans $\mathcal{M}$. (Un tel π_0 existe.) On a donc, pour $\pi \geqslant \pi_1 = \sup(\pi_0, \operatorname{card} \operatorname{réd} \mathcal{C}, \operatorname{card} \operatorname{réd} \mathcal{M}_\pi)$ tel que $\pi^{\pi_0} = \pi$,* p. 150

$$(\mathcal{M}_{\mathrm{c}})_\pi \ = \ \mathcal{M}_\pi \cap \mathcal{M}_{\mathrm{c}} \ = \quad \begin{array}{l} \text{Sous-catégorie strictement pleine de } \mathcal{M}_{\mathrm{c}} \text{ formée des } f \\ \text{telles que } f(s) \in \operatorname{Ob} \mathcal{E}_{s\,\pi} \ \forall \ s \in \operatorname{Ob} \mathcal{C}. \end{array}$$

Si de plus π est choisi tel qu'on ait $\pi \geqslant \sup_{s \in \operatorname{Ob} \mathcal{C}} \operatorname{card} \operatorname{réd} \mathcal{E}_{s\,\pi_0}$, alors [page 396]

$$\left\{ \begin{array}{rcl} & \mathcal{M}_{\mathrm{c}\,\pi} & \xleftarrow{\sim} \ \underline{\Gamma}_{\mathrm{cocart}}(\mathcal{E}(\pi)/\mathcal{C}) \\ \textit{resp.} & \mathcal{M}_{\mathrm{c}\,\pi} & \xleftarrow{\sim} \ \underline{\Gamma}_{\mathrm{cart}}(\mathcal{E}(\pi)/\mathcal{C}) \ , \end{array} \right.$$

donc (π étant utile pour $\mathcal{M}_{\mathrm{c}}$) une équivalence de catégories

$$\begin{array}{rrcl} & \underline{\Gamma}_{\mathrm{cocart}}(\mathcal{E}/\mathcal{C}) & \xleftarrow{\sim} & \mathrm{Ind}_\pi(\underline{\Gamma}_{\mathrm{cocart}}(\mathcal{E}(\pi)/\mathcal{C})) \\ \textit{resp.} & \underline{\Gamma}_{\mathrm{cart}}(\mathcal{E}/\mathcal{C}) & \xleftarrow{\sim} & \mathrm{Ind}_\pi(\underline{\Gamma}_{\mathrm{cart}}(\mathcal{E}(\pi)/\mathcal{C})). \end{array}$$

Démonstration. Tout est clair dans l'ordre où c'est donné en utilisant les deux corollaires précédents.

Corollaire 4.14.21. *Considérons un diagramme de foncteurs*

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{E}_1 & & & & \mathcal{E}_2 \\ & \searrow^{p_1} & & \swarrow_{p_2} & \\ & & \mathcal{E}_0 \ , & & \end{array} \qquad (*)$$

les catégories et les foncteurs étant accessibles.

a) Le produit 2-fibré

$$\mathcal{M}_0 \ = \ \mathcal{E}_1 \overset{2}{\times}_{\mathcal{E}_0} \mathcal{E}_2$$

[page 397]

est accessible, et les foncteurs canoniques $\mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{E}_1$, $\mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{E}_2$ sont accessibles.

b) ([169]). La catégorie $\mathcal{M}$ des triples (x_1, x_2, u) avec $x_1 \in \operatorname{Ob} \mathcal{E}_1$, $x_2 \in \operatorname{Ob} \mathcal{E}_2$, et

$$u \ : \ p_1(x_1) \ \longrightarrow \ p_2(x_2) \ ,$$

est accessible, et les foncteurs canoniques $\mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{E}_1$, $\mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{E}_2$ sont accessibles.

169. Ceci est contenu dans 4.14.22.1 ci-dessus (p. 406), appliqué à $\Pi = \mathcal{E}_1 \times \mathcal{E}_2$, $\Pi' = \mathcal{E}_0$, et $F, G : \Pi \rightrightarrows \Pi'$ donnés par $F = p_1 \circ \mathrm{pr}_1$ et $G = p_2 \circ \mathrm{pr}_2$. D'autre part, a) et c) résultent facilement de b).

c) La sous-catégorie strictement pleine $\mathcal{M}_0$ de $\mathcal{M}$ est accessible dans $\mathcal{M}$.

Démonstration. Soit $\mathcal{C}$ la catégorie

$$\begin{array}{ccc} 1 & & 2 \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & 0\ , & \end{array}$$

et $\mathcal{E}$ la catégorie cofibrée sur $\mathcal{C}$ définie par le diagramme $(*)$. On est sous les conditions de 4.14.17. La catégorie $\Gamma = \underline{\Gamma}(\mathcal{E}/\mathcal{C})$ s'interprète comme la catégorie des quintuplets p. 151 $(x_0, x_1, x_2, u_1, u_2)$, avec $x_i \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{E}$ pour $i \in \{0,1,2\}$, et $u_1, u_2 \in \mathrm{Fl}\,\mathcal{E}_0$, [page 398]

$$\begin{array}{ccccc} p_1(x_1) & & & & p_2(x_2) \\ & \overset{u_1}{\searrow} & & \overset{u_2}{\swarrow} & \\ & & x_0\ . & & \end{array} \qquad (**)$$

En vertu de 4.14.18, cette catégorie $\underline{\Gamma}$ est accessible. La catégorie $\mathcal{M}$ est équivalente à la sous-catégorie strictement pleine Γ_0 de Γ, formée des quintuplets pour lesquels on a $u_2 \in \underline{\mathrm{Is}}\mathcal{E}_0$. On a en effet des foncteurs quasi-inverses l'un de l'autre

$$\mathcal{M} \underset{\beta}{\overset{\alpha}{\rightleftarrows}} \Gamma_1$$

donnés par

$$\begin{aligned} \alpha(x_1, x_2, u) &= (p_2(x_2), x_1, x_2, u, \mathrm{id}_{p_2(x_2)}) \\ \beta(x_0, x_1, x_2, u_1, u_2) &= (x_1, x_2, u_2^{-1}u_1)\ , \end{aligned}$$

on a alors

$$\begin{aligned} \beta\alpha &= \mathrm{id}_{\mathcal{M}} \\ \alpha\beta &\xrightarrow{\sim} \mathrm{id}_{\Gamma_1}\ . \end{aligned}$$

D'autre part, Γ_1 est évidemment accessible dans $\mathcal{M}$, comme image inverse de $\underline{\mathrm{Is}}(\mathcal{E}_0)$ (qui est accessible dans $\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{E}_0)$ par le foncteur accessible [page 399]

$$\underline{\Gamma} \longrightarrow \underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{E}_0)$$

donné par $(x_1, x_1, x_2, u_1, u_2) \longmapsto u_2$. Cela prouve que $\mathcal{M}$, qui est équivalente à Γ_1, est également accessible, et l'accessibilité du foncteur canonique $\mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{E}_i$ ($i \in \{1,2\}$) résulte de celle de $\Gamma \longrightarrow \mathcal{E}_i$, impliquant celle du composé $\Gamma_1 \hookrightarrow \Gamma \longrightarrow \mathcal{E}_i$. Cela prouve donc b). Pour prouver a), il suffit de voir que $\mathcal{M}_0$ est accessible dans $\mathcal{M}$, or c'est encore l'image inverse de $\underline{\mathrm{Is}}(\mathcal{E}_0) \subset \underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{E}_0)$ par le foncteur accessible canonique

$$\mathcal{M} \longrightarrow \underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{E}_0)\ ,$$

donc $\mathcal{M}$ est bien accessible dans $\mathcal{M}$, comme image inverse d'une sous-catégorie accessible dans $\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{E})$. On peut d'ailleurs aussi interpréter $\mathcal{M}$, à équivalence de catégories près, comme [page 400]

$$\mathcal{M}_0 \simeq \underline{\Gamma}_{\mathrm{cocart}}(\mathcal{E}/\mathcal{C})\ ,$$

les foncteurs canoniques $\mathcal{M}_0 \longrightarrow \mathcal{E}_i$ ($i \in \{0,1\}$) s'interprétant comme des foncteurs évaluation, ce qui donne a) directement, comme cas particulier de 4.14.19.

4.14.22. Démonstration de 4.14.17. Le cas où p est cofibrant a déjà été démontré p. 152 (th. 4.10.8, p. 263). Nous allons voir que le cas où p est fibrant se ramène au théorème précédent (dans un cas très particulier), en utilisant à fond les résultats généraux sur [page 401]

les parties accessibles d'une catégorie accessible. Notons que les assertions a) et b) du corollaire 4.14.18 se prouvent de façon AQT `[âne qui trotte]` sans avoir à faire appel à 4.14.17. Le a) implique déjà que les foncteurs évaluation $\varepsilon_s : \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{E}_s$ sont accessibles. Il reste donc à prouver que $\mathcal{M} = \underline{\Gamma}(\mathcal{E}/\mathcal{C})$ est accessible, dans le cas où p est *fibrant*. On supposera de plus que $\mathcal{C}$ est petite (quitte à remplacer $\mathcal{C}$ par une petite sous-catégorie pleine équivalente).

Soient

$$\Pi \;=\; \prod\nolimits_{s\in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}} \mathcal{E}_s$$
$$\Pi' \;=\; \prod\nolimits_{\lambda\in \mathrm{Fl}\,\mathcal{C}} \mathcal{E}_{s(\lambda)}\ ,$$

où $s(\lambda)$ désigne la *source* s de la flèche $\lambda : s \longrightarrow t$ dans $\mathcal{C}$. Π, Π' sont des catégories accessibles, comme (petits) produits de catégories accessibles. (Cas particulier trivial de 4.10.8, pour une catégorie d'indices discrète.) On va définir deux foncteurs

$$\Pi \underset{G}{\overset{F}{\rightrightarrows}} \Pi'$$

en définissant pour tout $\lambda : s_0 \longrightarrow t_0$ dans $\mathrm{Fl}\,\mathcal{C}$ deux foncteurs [page 402]

$$\left\{\begin{array}{lcll} \Pi & \underset{G_\lambda}{\overset{F_\lambda}{\rightrightarrows}} & \mathcal{E}_{s(\lambda)=s_0} & \\ F_\lambda & = & \mathrm{pr}_{s_0} & \text{projection de } \Pi = \prod_s \mathcal{E}_s \text{ sur le facteur } \mathcal{E}_{s_0} \\ G_\lambda & = & \lambda^*\mathrm{pr}_{s_1} & \text{composé } \Pi \xrightarrow{\mathrm{pr}_{s_1}} \mathcal{E}_{s_1} \xrightarrow{\lambda^*} \mathcal{E}_{s_0} \\ & & & \texttt{[plutôt } \lambda^*\mathrm{pr}_{t_0} \texttt{ resp. } \Pi \xrightarrow{\mathrm{pr}_{t_0}} \mathcal{E}_{t_0} \xrightarrow{\lambda^*} \mathcal{E}_{s_0}\texttt{]} \end{array}\right. \qquad \big({}^{170}, {}^{171}\big)\ .$$

Soit $f \in \mathcal{M} = \underline{\Gamma}(\mathcal{E}/\mathcal{C})$, alors pour tout $\lambda \in \mathrm{Fl}\,\mathcal{C}$, f définit une flèche

$$\alpha_\lambda(f)\ :\quad \underbrace{f(s)}_{=F_\lambda(\varepsilon(f))} \quad \xrightarrow{f(\lambda)^\flat} \quad \underbrace{\lambda^*(f(t))}_{=G_\lambda(\varepsilon(f))}\ ,$$

fonctorielle en f. On a un foncteur

$$\varepsilon \;=\; (\varepsilon_s)_{s\in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}} \;:\; \mathcal{M} \;\longrightarrow\; \Pi\ ,$$

et pour tout $\lambda \in \mathrm{Fl}\,\mathcal{C}$ un homomorphisme fonctoriel

$$\alpha_\lambda \;:\; F_\lambda \circ \varepsilon \;\longrightarrow\; G_\lambda \circ \varepsilon\ ,$$

d'où un homomorphisme fonctoriel

$$\alpha \;=\; (\alpha_\lambda)_{\lambda\in \mathrm{Fl}\,\mathcal{C}} \;:\; F \circ \varepsilon \;\longrightarrow\; G \circ \varepsilon\ .$$

Soit alors $\mathcal{M}'$ la catégorie suivante :

$$\mathcal{M}' \quad = \quad \text{catégorie des couples } (X, u), \text{ avec } X \text{ dans } \mathrm{Ob}\,\Pi, \text{ et } u : F(X) \longrightarrow G(X) \text{ une flèche dans } \Pi'.$$

p. 153
[page 403]

L'homomorphisme fonctoriel $\alpha : F \circ \varepsilon \longrightarrow G \circ \varepsilon$ définit un foncteur

$$\mathcal{M} \;\longrightarrow\; \mathcal{M}'\ ,$$

170. Il est immédiat que les F_λ, G_λ, donc F et G, sont des foncteurs *accessibles*.

171. **N.B.** On suppose choisi pour tout $\lambda \in \mathrm{Fl}\,\mathcal{C}$ un foncteur image inverse $\lambda^* : \mathcal{E}_t \longrightarrow \mathcal{E}_s$. On suppose que si λ est une flèche identique, id_s, `[on]` choisit $\lambda^* = \mathrm{id}_{\mathcal{E}_s}$.

et il est immédiat que ce foncteur est pleinement fidèle. En fait, la catégorie $\mathcal{M}'$ est isomorphe à la catégorie formée des couples (f_0, f_1) de deux applications

$$\begin{array}{rccccc} f_0: & \mathrm{Ob}\,\mathcal{C} & \longrightarrow & \mathrm{Ob}\,\mathcal{E} & s & \longmapsto & f_0(s) \\ f_1: & \mathrm{Fl}\,\mathcal{C} & \longrightarrow & \mathrm{Fl}\,\mathcal{E} & \lambda & \longmapsto & f_1(\lambda) \end{array}$$

de telle façon que f_1 et f_0 soient compatibles avec les applications source et but, i.e. qu'ils définissent un homomorphisme de *diagrammes* $f : \mathrm{diag}\,\mathcal{C} \longrightarrow \mathrm{diag}\,\mathcal{E}$, et que cet homomorphisme soit inverse à droite de $\mathrm{diag}(p) : \mathrm{diag}\,\mathcal{E} \longrightarrow \mathrm{diag}\,\mathcal{C}$.

Le foncteur précédent $\mathcal{M} \hookrightarrow \mathcal{M}'$ s'interprète comme le foncteur qui associe à toute [page 404] sections f de $\mathcal{E}$ sur $\mathcal{C}$, le morphisme de diagrammes correspondant. C'est donc l'inclusion d'une sous-catégorie *strictement pleine* de $\mathcal{M}'$. Donc pour prouver que $\mathcal{M}$ est accessible, il suffit de prouver :

a) $\mathcal{M}'$ est accessible.

b) $\mathcal{M}$ est accessible dans $\mathcal{M}'$.

Prouvons d'abord b) (en admettant a). La sous-catégorie $\mathcal{M}$ de $\mathcal{M}'$ est définie par deux types des conditions, sur un objet $f = (f_0, f_1)$ de $\mathcal{M}'$:

1°) $\forall\ s \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$, $f_1(\mathrm{id}_s) = \mathrm{id}_{f_0(s)}$.

2°) Si $s \xrightarrow{\lambda} t \xrightarrow{\mu} u$ sont deux flèches composables dans $\mathcal{C}$, alors

$$f_1(\mu\lambda) \;=\; f_1(\mu) f_1(\lambda)\ .$$

Ces conditions s'explicitent l'une et `[l'autre par]` l'égalité d'une double-flèche dans $\mathcal{E}_s$, savoir [page 405]

$$f_0(s) \underset{\mathrm{id}_{f_0(s)}}{\overset{f_1(\mathrm{id}_s)}{\rightrightarrows}} f_0(s)$$

dans le cas 1°), et

$$f_0(s) \underset{(f_1(\mu)f_1(\lambda))^\flat}{\overset{f_1(\mu\lambda)^\flat}{\rightrightarrows}} (\mu\lambda)^*(f_0(u))$$

dans le cas 2°). Dans l'un et l'autre cas, on a un foncteur

$$\mathcal{M}' \xrightarrow{\gamma_s \text{ resp. } \gamma_{\lambda,\mu}} \underline{\mathrm{Hom}}(I, \mathcal{E}_s)$$

dans la catégorie des double-flèches de $\mathcal{E}_s$ (I désignant la catégorie double-flèche type p. 154 $0 \rightrightarrows 1$), foncteur qui est (trivialement) accessible. Soit alors $I \xrightarrow{i} \mathbf{\Delta}_1$ le foncteur canonique, et

$$\underbrace{\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{\Delta}_1, \mathcal{E}_s)}_{\simeq \underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{E}_s)} \hookrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(I, \mathcal{E}_s)$$

le foncteur $u \longmapsto u \circ i$, qui est un foncteur strictement pleine fidèle, ayant comme image la sous-catégorie des double-flèches (u, v) telles que $u = v$. Comme le foncteur d'inclusion est accessible et $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{\Delta}_1, \mathcal{E}_s)$ et $\underline{\mathrm{Hom}}(I, \mathcal{E}_s)$ accessibles (cas particulier de 4.14.1, ou aussi [page 406] de 4.10.8 !), on voit que la sous-catégorie strictement pleine de $\underline{\mathrm{Hom}}(I, \mathcal{E}_s)$ des double-flèches égalisées dans $\mathcal{E}_s$, est accessible dans $\underline{\mathrm{Hom}}(I, \mathcal{E}_s)$. Donc, son image inverse dans $\mathcal{M}'$ est accessible. Donc l'intersection de ces images inverses pour $s \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$ et $(\lambda, \mu) \in \mathrm{Fl}_2(\mathcal{C})$ variables, l'est également ($\mathcal{C}$ étant petite).

Donc tout revient à prouver que $\mathcal{M}'$ est accessible, ce qui est contenu dans le

Lemme 4.14.22.1. *Soient Π, Π' deux catégories accessibles, $F, G : \Pi \rightrightarrows \Pi'$ deux foncteurs accessibles, et $\mathcal{M}'$ la catégorie des couples (X, u), avec $X \in \mathrm{Ob}\,\Pi$ et $u : F(x) \longrightarrow$*

$G(x)$ une flèche de Π'. Alors $\mathcal{M}'$ est accessible, et le foncteur canonique $\mathcal{M}' \longrightarrow \Pi$ est accessible.

Démonstration du Lemme. La donnée de Π, Π', F, G définit une catégorie cofibrée $\mathcal{F}$ sur la catégorie $I = (0 \rightrightarrows 1)$ précédente. La catégorie $\underline{\Gamma}(\mathcal{F}/I)$ s'interprète, à [page 407] isomorphisme près, comme la catégorie des triples (x, u, v) avec $x \in \mathrm{Ob}\,\Pi$, $x' \in \mathrm{Ob}\,\Pi'$, et u et v des flèches

$$\begin{array}{ccc} F(x) & & G(x) \\ & {\scriptstyle u}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle v} & \\ & x' & \end{array}$$

dans Π'. La catégorie $\mathcal{M}'$ est équivalente à la sous-catégorie strictement pleine de $\underline{\Gamma}(\mathcal{F}/I)$, formée des triples (x, u, v) tels que v soit un isomorphisme, i.e. à la sous-catégorie de $\underline{\Gamma}(\mathcal{F}/I)$, image inverse de $\underline{\mathrm{Is}}(\Pi')$ par le foncteur $(x, u, v) \longmapsto v$,

$$\underline{\Gamma}(\mathcal{F}/I) \longrightarrow \underline{\mathrm{Fl}}(\Pi') .$$

Or par 4.10.8, $\underline{\Gamma}(\mathcal{F}/I)$ est accessible, et le foncteur précédent est bien sûr accessible. Enfin, par 4.14.12, $\underline{\mathrm{Is}}(\Pi')$ est accessible dans la catégorie accessible $\underline{\mathrm{Fl}}(\Pi')$. Donc son [page 408] image inverse $\mathcal{M}'$ dans $\underline{\Gamma}(\mathcal{F}/I)$ est accessible dans $\underline{\Gamma}(\mathcal{F}/I)$, donc accessible. Donc il en est de même de la catégorie équivalente, q.e.d.

Ainsi, grâce aux résultats généraux sur les parties accessibles des catégories accessibles, le théorème 4.14.17, dans le cas où p est fibrant, est ramené aux cas cofibrant, dans le cas très particulier où la catégorie d'indices est $I = (0 \rightrightarrows 1)$. On pourrait d'ailleurs faire une réduction similaire dans le cas où p est cofibrant, par une démonstration pratiquement identique. En d'autres termes, le théorème 4.10.8 se ramène au cas où la catégorie p. 155 d'indices est $I = (0 \rightrightarrows 1)$. Mais je suspecte que la démonstration du théorème dans ce cas particulier, n'est pas essentiellement plus simple que dans le cas général.

4.14.23. On peut se demander de trouver un énoncé assurant l'accessibilité d'une [page 409] catégorie $\underline{\Gamma}(\mathcal{E}/\mathcal{C})$, qui coiffe les deux cas envisagés dans 4.14.17. Voici ce que je peux proposer. Je vais faire l'hypothèse suivante sur les foncteur $p : \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{C}$ (en plus de celle que $\mathcal{C}$ soit essentiellement petite) :

H) Pour tout $\lambda \in \mathrm{Fl}\mathcal{C}$, la catégorie $\mathcal{E}_\lambda = \mathcal{E} \times_{\mathcal{C}} (\mathbf{\Delta}_1, i_\lambda)$, où $i_\lambda : \mathbf{\Delta}_1 \longrightarrow \mathcal{C}$ est le foncteur défini par λ, est accessible, et le foncteur canonique $\mathcal{E}_\lambda \xrightarrow{p_\lambda} \mathbf{\Delta}_1$ est accessible.

Notons que si $\lambda : s \longrightarrow t$ dans $\mathcal{C}$ est tel que $\mathcal{E}_\lambda$ et p_λ soient accessibles, alors $\mathcal{E}_s$ et $\mathcal{E}_t$ sont accessible, car isomorphes aux catégories image inverse par $p_\lambda : \mathcal{E}_\lambda \longrightarrow \mathbf{\Delta}_1$ des sous-catégories $\{0\}$ resp. $\{1\}$ de Δ_1, lesquelles sont accessibles dans la catégorie accessible $\mathbf{\Delta}_1$, donc $\mathcal{E}_{\lambda_0}$ et $\mathcal{E}_{\lambda_1}$ sont accessibles dans $\mathcal{E}_\lambda$, donc sont accessibles, donc aussi $\mathcal{E}_s$ et $\mathcal{E}_t$. [page 410] Ainsi, l'hypothèse H) implique que les catégories fibres sont accessibles. Notons de plus :

Lemme 4.14.23.1. *Supposons que $p : \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{C}$ soit cofibrant ou fibrant, et soit $(\lambda : s \longrightarrow t) \in \mathrm{Fl}(\mathcal{C})$. Pour que $\mathcal{E}_\lambda$ soit accessible et $\mathcal{E}_\lambda \xrightarrow{p_\lambda} \mathbf{\Delta}_1$ accessible, il faut et il suffit que $\mathcal{E}_s$, $\mathcal{E}_t$ soient accessibles et $\lambda_* : \mathcal{E}_s \longrightarrow \mathcal{E}_t$ resp. $\lambda^* : \mathcal{E}_t \longrightarrow \mathcal{E}_s$ soit un foncteur accessible.*

Démonstration. On peut supposer que $\mathcal{C} = \mathbf{\Delta}_1$, et que $\mathcal{E}$ est la catégorie cofibrée (resp. fibrée) sur $\mathbf{\Delta}_1$ définie par un foncteur $\varphi : \mathcal{E}_0 \longrightarrow \mathcal{E}_1$ (resp. $\psi : \mathcal{E}_1 \longrightarrow \mathcal{E}_0$), et à montrer que $\mathcal{E}$ et $p : \mathcal{E} \longrightarrow \mathbf{\Delta}_1$ sont accessibles si et seulement si $\mathcal{E}_0$ et $\mathcal{E}_1$ et φ (resp. ψ) le sont.

Prouvons le "il faut". On a déjà vu que si $\mathcal{E}$, p sont accessibles, $\mathcal{E}_0$ et $\mathcal{E}_1$ sont accessibles [page 411] dans $\mathcal{E}_s$, donc accessibles, et les foncteurs d'inclusion

$$\mathcal{E}_0 \hookrightarrow \mathcal{E} \hookleftarrow \mathcal{E}_1$$

accessibles. Dire que p est cofibrant (resp. fibrant) signifie que le foncteur d'inclusion $\mathcal{E}_1 \hookrightarrow \mathcal{E}$ admet un adjoint à droite $\bar{\varphi}$ (resp. que le foncteur $\mathcal{E}_0 \hookrightarrow \mathcal{E}$ admet un adjoint à gauche $\tilde{\psi}$). Alors φ (resp. ψ) est le composé $\mathcal{E}_0 \longrightarrow \mathcal{E} \xrightarrow{\bar{\varphi}} \mathcal{E}_1$ (resp. le composé $\mathcal{E}_1 \hookrightarrow \mathcal{E} \xrightarrow{\tilde{\psi}} \mathcal{E}_1$). Donc pour prouver que φ (resp. ψ) est accessible, il suffit de prouver que $\bar{\varphi}$ (resp. $\tilde{\psi}$) l'est. Cela est un cas particulier du

Lemme 4.14.23.2. *Soient $\mathcal{E}$, $\mathcal{E}'$ deux catégories accessibles ([172]), et $\mathcal{E} \underset{G}{\overset{F}{\rightleftarrows}} \mathcal{E}'$ un couple de foncteurs adjoints entre $\mathcal{E}$ et $\mathcal{E}'$. Alors F et G sont accessibles.*

[page 412]

En effet, F est accessible, car il commute aux petites $\varinjlim$ quelconques, a fortiori il satisfait L_{π_0} (où π_0 est tel que $\mathcal{E}$, $\mathcal{E}'$ satisfassent L_{π_0}). Prouvons que G est accessible. Si S est un petit ensemble d'éléments générateur dans $\mathcal{E}$, de sorte que la petite famille des foncteurs

p. 156

$$h_\xi \;=\; (x \longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(\xi, x)) \;:\; \mathcal{E} \;\longrightarrow\; \mathrm{Ens}$$

est conservative, pour prouver que G est accessible, il suffit de prouver que les $h_\xi \circ G$ ($\xi \in S \subset \mathrm{Ob}\,\mathcal{E}$) le sont. Or

$$L_\xi \circ G(x') \;=\; \mathrm{Hom}(\xi, G(x')) \;\simeq\; \mathrm{Hom}_{\mathcal{E}'}(F(\xi), x')\ ,$$

et comme $F(\xi)$ est un objet accessible de $\mathcal{E}'$, le foncteur

$$x' \;\longmapsto\; (L_\xi \circ G)(x') \;\simeq\; \mathrm{Hom}_{\mathcal{E}'}(F(\xi), x')$$

est bien accessible, q.e.d.

Cela prouve le "il faut" dans 4.14.23.1. Prouvons le "il suffit", i.e. supposons $\mathcal{E}_s$, $\mathcal{E}_t$ accessibles, et φ (resp. ψ) accessible.

[page 413]

Dans les deux cas, $\mathcal{E}_0$ est un ouvert de $\mathcal{E}$, $\mathcal{E}_1$ est le fermé complémentaire, et $\mathcal{E}$ est la catégorie "recollée" à l'aide du bifoncteur

$$H \;:\; \mathcal{E}_0^\circ \times \mathcal{E}_1 \;\longrightarrow\; \mathrm{Ens}$$

donné par

$$\begin{cases} H(x_0, x_1) \;=\; \mathrm{Hom}(\varphi(x_0), x_1) \\ \qquad \text{resp.} \\ H(x_0, x_1) \;=\; \mathrm{Hom}(x_0, \psi(x_1))\ , \end{cases}$$

suivant qu'on est dans le cas p cofibrant ou p fibrant. On va utiliser la

Proposition 4.14.24 ([173]). *Soit $\mathcal{E}$ une catégorie, $\mathcal{E}_0$ une sous-catégorie ouverte, $\mathcal{E}_1$ la sous-catégorie fermée complémentaire. Conditions équivalentes :*

a) $\mathcal{E}$ est accessible, et $\mathcal{E} \longrightarrow \mathbf{\Delta}_1$ (de fibres $\mathcal{E}_0$, $\mathcal{E}_1$) est accessible.

b) $\mathcal{E}$ est accessible, et $\mathcal{E}_0$, $\mathcal{E}_1$ sont accessibles dans $\mathcal{E}$.

c) $\mathcal{E}_0$, $\mathcal{E}_1$ sont accessibles, et pour tout $x_0 \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{E}_0$, le foncteur

$$x_1 \;\longmapsto\; \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{E}}(x_0, x_1) \;:\; \mathcal{E}_1 \;\longrightarrow\; \mathrm{Ens}$$

est accessible, et il existe π tel que pour tout $x_1 \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{E}_1$, le foncteur

[page 414]

$$x_0 \;\longmapsto\; \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{E}}(x_0, x_1)^\circ \;:\; \mathcal{E}_0 \;\longrightarrow\; (\mathrm{Ens})^\circ$$

soit π-accessible.

p. 157

Admettons ce lemme [plutôt cette proposition], achevons la démonstration de 4.14.23.1. On suppose $\mathcal{E}_0$, $\mathcal{E}_1$ et φ (resp. ψ) accessibles, on veut prouver la condition a) de 4.14.23.3. Pour ceci, il suffit de prouver la condition c). Or on a, dans le cas p cofibrant,

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(x_0, x_1) \;\simeq\; \mathrm{Hom}_{\mathcal{E}_1}(\varphi(x_0), x_1)\ ,$$

c'est bien accessible en x_1, puisque $\mathcal{E}_1$ est accessible, et π-accessible en x_0 si φ l'est, comme composé de φ avec $\mathcal{E}_1 \longrightarrow \mathrm{Ens}$, $\mathrm{Hom}(-, x_1)$, qui l'est. Dans le cas p fibrant, on a

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(x_0, x_1) \;\simeq\; \mathrm{Hom}_{\mathcal{E}_0}(x_0, \psi(x_1))\ ,$$

c'est accessible en x_1, comme le composé du foncteur accessible $\psi : \mathcal{E}_1 \longrightarrow \mathcal{E}_0$, et du foncteur également accessible $\mathrm{Hom}(x_0, -) : \mathcal{E}_0 \longrightarrow \mathrm{Ens}$, qui est π-accessible en x_0 tautologiquement.

Pour achever la démonstration de 4.14.23.1, il reste donc à prouver la proposition 4.14.24. On a déjà noté qu'on a a $\Longrightarrow$ b, et b $\Longrightarrow$ c clair, puisque le foncteur envisagé $\mathcal{E} \longrightarrow \mathrm{Ens}$ est le composé $\mathcal{E}_1 \overset{\text{incl.}}{\hookrightarrow} \mathcal{E} \xrightarrow{\mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(x_0,-)} \mathrm{Ens}$, est accessible comme composé de deux foncteurs accessibles. Reste donc à prouver c $\Longrightarrow$ a. Soit donc π_0 un cardinal utile pour $\mathcal{E}_0$, et tel que les foncteurs [page 415]

$$x_0 \;\longmapsto\; H(x_0, x_1) \;:\; \mathcal{E}_0 \longrightarrow \mathrm{Ens}^{\circ}$$

soient π_0-accessibles, soit π un cardinal $\geqslant \sup(\pi_0, \mathrm{card\,réd}\,\mathcal{E}_{0\,\pi_0})$ tel que $\pi^{\pi_0} = \pi$ (donc utile pour $\mathcal{E}_0$), utile pour $\mathcal{E}_1$, et tel que les foncteurs

$$x_1 \;\longmapsto\; H(x_0, x_1) \;:\; \mathcal{E}_1 \longrightarrow \mathrm{Ens}$$

soient π-accessibles, pour $x_0 \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{E}_{0\,\pi_0}$. Soit $\mathcal{E}(\pi)$ la sous-catégorie strictement pleine de $\mathcal{E}$, telle que

$$\mathrm{Ob}\,\mathcal{E}(\pi) \;=\; \mathrm{Ob}\,\mathcal{E}_{0\,\pi} \cup \mathrm{Ob}\,\mathcal{E}_{1\,\pi}\ .$$

Je dis que

1°) $\mathcal{E}$ satisfait à L_π, et $\mathcal{E}_0$ et $\mathcal{E}_1$ sont stables dans $\mathcal{E}$ sous L_π, les foncteurs $\mathcal{E}_0 \longrightarrow \mathcal{E}$, $\mathcal{E}_1 \longrightarrow \mathcal{E}$, $\mathcal{E} \longrightarrow \mathbf{\Delta}_1$ satisfont L_π ([174]).

2°) $\mathcal{E}(\pi) = \mathcal{E}_\pi$ (d'où un foncteur pleinement fidèle

$$\mathrm{Ind}_\pi(\mathcal{E}(\pi)) \;\longrightarrow\; \mathcal{E}\ ).$$

3°) Ledit foncteur est essentiellement surjectif, donc une équivalence de catégories. [page 416]

Notons que 2°) et 3°) impliquent que $\mathcal{E}$ est accessible, et 1°) que $\mathcal{E} \longrightarrow \mathbf{\Delta}_1$ est accessible, d'où la condition a) du lemme qu'il s'agit d'établir. Donc tout revient à prouver les 1°, 2°, 3° ci-dessus.

1°) Comme $\mathcal{E}_1$ est fermée dans $\mathcal{E}$, il est clair que $\mathcal{E}$ est stable par toutes $\varinjlim$ représentables dans $\mathcal{E}$, et plus précisément, que pour un foncteur $I \longrightarrow \mathcal{E}_1$, sa limite inductive dans $\mathcal{E}_1$ existe si et seulement si elle existe dans $\mathcal{E}$, et les deux sont isomorphes. Supposons I grande devant π, et soit $\varphi : I \longrightarrow \mathcal{E}$, $i \longmapsto x_i$. Distinguons deux cas. p. 158

172. **N.B.** Il suffit que $\mathcal{E}$ admette une petite sous-catégorie génératrice, et que les objets de $\mathcal{E}'$ soient accessibles.

173. cf. énoncés plus généraux et démonstration sympathique, 4.15.1 et 4.15.4 (p. 425, 432).

174. il suffit que $\mathcal{E}_0$ et $\mathcal{E}_1$ satisfassent L_π, et que

$$x_0 \;\longmapsto\; H(x_0, x_1) \;:\; \mathcal{E}_0 \longrightarrow \mathrm{Ens}^{\circ}$$

satisfasse L_π $\forall\ x \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{E}$.

a) φ prend ses valeurs dans $\mathcal{E}_0$. Soit x_0 sa limite inductive *dans* $\mathcal{E}_0$. Je dis que c'est aussi une limite inductive dans $\mathcal{E}$. Il faut prouver que pour $x_1 \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{E}_1$, la flèche

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(x_0, x_1) \longrightarrow \varprojlim_{i\in I} \mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(x_i, x_1)$$

est isomorphe. Or c'est le cas par hypothèse sur π, [page 417]

$$\xi \longmapsto H(\xi, x_1) \,:\, \mathcal{E}_0 \longrightarrow (\mathrm{Ens})^\circ$$

satisfait à L_π pour tout x_1 dans $\mathrm{Ob}\,\mathcal{E}_1$.

b) φ ne se factorise pas par $\mathcal{E}_0$, i.e. $\exists\ i_0 \in \mathrm{Ob}\,I$ avec $\varphi(i_0) \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{E}_1$. Alors on a $\varphi(i) \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{E}_1$ pour tout $i \in \mathrm{Ob}\,I[i_0]$, où $I[i_0]$ désigne la sous-catégorie strictement pleine de I formée des i tels que $i \geqslant i_0$. Cette catégorie est cofinale dans I, donc grande devant π comme I, et pour que $\varinjlim_{I} x_i$ existe, il faut et il suffit que $\varinjlim_{I[i_0]} x_i$ existe, ce qui est le cas d'après les cas a) déjà traité.

Cela prouve donc en même temps que $\mathcal{E}$ satisfait à L_π, et que $\mathcal{E}_0$ et $\mathcal{E}_1$ sont L_π-stables. La démonstration montre en même temps que le foncteur $p : \mathcal{E} \longrightarrow \mathbf{\Delta}_1$ satisfait à L_π.

2°) De ceci résulte aussitôt que $\mathcal{E}_\pi \subset \mathcal{E}(\pi)$. Prouvons qu'on a aussi

$$\mathcal{E}(\pi) \subset \mathcal{E}_\pi\ ,$$

et distinguons encore deux cas, pour $x \in \mathrm{Ob}\,E(\pi)$, suivant que x est dans $\mathcal{E}_{0\,\pi}$ ou $\mathcal{E}_{1\,\pi}$. [page 418] S'il est dans $\mathcal{E}_{1\,\pi}$, pour prouver que

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(x, \underbrace{\varinjlim y_i}_{y}) \xleftarrow{\sim} \varinjlim_{i} \mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(x, y_i) \qquad (*)$$

(pour un système inductif $(y_i)_{i\in I}$ dans $\mathcal{E}$ grand devant π), si les y_i sont dans $\mathcal{E}_0$, donc $y \in \mathcal{E}_0$, alors les deux membres sont vides, et c'est OK. Sinon, on peut supposer (quitte à remplacer I par un $I[i_0]$) que les x_i sont dans $\mathcal{E}_1$, et alors c'est OK aussi, puisque y est aussi la $\varinjlim$ dans $\mathcal{E}_1$, d'après 1°).

Si x est dans $\mathcal{E}_{0\,\pi}$, alors $(*)$ est clair si les y_i sont dans $\mathcal{E}_0$. Sinon, on peut supposer encore que les y_i sont dans $\mathcal{E}_0$, et $(*)$ s'écrit

$$H(x, \varinjlim y_i) \xleftarrow{\sim} \varinjlim H(x, y_i)\ ,$$

pour $x \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{E}_{0\,\pi}$, les y_i dans $\mathcal{E}_1$, I grande devant π. En d'autres termes, il faut prouver que le foncteur

$$x_1 \longmapsto H(x_0, x_1) \,:\, \mathcal{E}_1 \longrightarrow \mathrm{Ens}$$

est π-accessible, quand x_0 est dans $\mathcal{E}_{0\,\pi}$. Or par hypothèse sur π, il est π-accessible si x_0 est dans $\mathcal{E}_{0\,\pi_0}$. Mais si x est dans $\mathcal{E}_{0\,\pi}$, on aura [p. 159] [page 419]

$$x_0 = \varinjlim_{i\in I} x_{0\,i} \qquad \begin{cases} I \text{ grande devant } \pi_0, \\ \text{les } x_{0\,i} \text{ dans } \mathcal{E}_{0\,\pi_0}, \\ \mathrm{card}\, I \leqslant \pi \end{cases}$$

(car π_0 est utile pour $\mathcal{E}_0$ par hypothèse, et π satisfait $\pi^{\pi_0} = \pi \geqslant \mathrm{card\ réd}\mathcal{E}_{\pi_0}$). Comme $x_0 \longrightarrow H(x_0, x_1) : \mathcal{E}_0 \longrightarrow \mathrm{Ens}$ satisfait à L_{π_0}, pour tout x_1 dans $\mathcal{E}_1$, on aura donc

$$H(x_0) \simeq \varprojlim_{i\in I} H(x_{0\,i})$$

[page 420]

(où pour x_0 dans $\mathcal{E}_0$, $H(x)$ désigne le foncteur $x_1 \longmapsto H(x_0, x_1) : \mathcal{E}_1 \longrightarrow (\mathrm{Ens})$). Comme les foncteurs $H(x_{0\,i})$ sont π-accessibles, et $\operatorname{card} I \leqslant \pi$, il s'ensuit que leur $\varprojlim_I H(x_0)$ est π-accessible (SGA 4 I 9.6 (ii)). Cela achève de prouver donc 2°).

3°). Pour prouver que $\mathrm{Ind}_\pi(\mathcal{E}(\pi)) \longrightarrow \mathcal{E}$ est essentiellement surjectif, il suffit de voir que tout $x \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{E}_0$ et tout $x \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{E}_1$ est dans l'image essentielle. Or cela résulte de l'hypothèse que π est utile pour $\mathcal{E}_0$ et $\mathcal{E}_1$, et de 1°) qui implique que $\mathcal{E}_0 \longrightarrow \mathcal{E}$ et $\mathcal{E}_1 \longrightarrow \mathcal{E}$ satisfont L_π.

Cela achève de prouver la proposition 4.14.24, et de même le résultat suivant, plus précis que l'implication c) $\Longrightarrow$ a).

Corollaire 4.14.25. *Soient $\mathcal{E}$ une catégorie, $\mathcal{E}_0$ une sous-catégorie ouverte, $\mathcal{E}_1$ la sous-catégorie fermée complémentaire,*

$$H \;=\; ((x_0, x_1) \longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(x_0, x_1)) \;:\; \mathcal{E}_0^\circ \times \mathcal{E}_1 \;\longrightarrow\; \mathrm{Ens}$$

le foncteur recollement.

1°) Soit π un cardinal infini. Pour ce que $\mathcal{E}$ et $\mathcal{E}_0$ satisfassent à L_π, et le foncteur d'inclusion $\mathcal{E}_0 \hookrightarrow \mathcal{E}$ itou, il faut et il suffit que $\mathcal{E}_0$ satisfasse à L_π, et que pour tout x_1 dans $\mathcal{E}_1$, le foncteur $x_0 \longmapsto H(x_0, x_1) : \mathcal{E}_0 \longrightarrow \mathrm{Ens}^\circ$ satisfasse à L_π. Alors $\mathcal{E}_1$ et $\mathcal{E}_1 \hookrightarrow \mathcal{E}$ satisfont aussi à L_π, et on a [page 421]

$$\mathcal{E}_\pi \;\subset\; \mathcal{E}(\pi) \overset{\text{déf}}{=} \begin{array}{l} \text{sous-catégorie strictement pleine de } \mathcal{E} \text{ telle que} \\ \mathrm{Ob}\,\mathcal{E}(\pi) = \mathrm{Ob}\,\mathcal{E}_{0\,\pi} \cup \mathrm{Ob}\,\mathcal{E}_{1\,\pi}. \end{array}$$

2°) Supposons que la condition c) de 4.14.24 soit satisfaite, et soit π_0 un cardinal infini tel que π_0 soit utile pour $\mathcal{E}_0$, et que les foncteurs $x_0 \longmapsto H(x_0, x_1) : \mathcal{E}_0 \longrightarrow \mathrm{Ens}^\circ$ définis par les $x_1 \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{E}_1$ soient π_0-accessibles. Soit π un cardinal tel que $\pi^{\pi_0} = \pi \geqslant \sup(\pi_0, \operatorname{card} \mathrm{réd}\mathcal{E}_{0\,\pi_0})$, et tel que pour tout $x_0 \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{E}_{\pi_0}$, le foncteur $x_1 \longmapsto H(x_0, x_1) : \mathcal{E}_1 \longrightarrow \mathrm{Ens}$ soit π-accessible. Alors on a

$$\mathcal{E}_\pi \;=\; \mathcal{E}(\pi)\ .$$

3°) Si π_0 et π sont comme dans 2°), et si de plus π est utile pour $\mathcal{E}_1$, alors π est utile pour $\mathcal{E}$, donc (en vertu de 2°) p. 160

$$\mathcal{E} \;\xleftarrow{\sim}\; \mathrm{Ind}_\pi(\mathcal{E}(\pi))\ .$$

Nous pouvons maintenant énoncer la généralisation cherchée de 4.14.17 :

Théorème 4.14.26 (généralisation de 4.14.13). *Soit $p : \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{C}$ un foncteur, avec $\mathcal{C}$ petite. On suppose que p satisfait à l'hypothèse H) de la page 409, qui équivaut (moyennant 4.14.24) à la suivante :* [page 422]

H′) $\forall\ s \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$, la catégorie fibre $\mathcal{E}_s$ est accessible, et pour tout $\lambda : s \longrightarrow t$ dans $\mathrm{Fl}\,\mathcal{C}$, le foncteur

$$\left\{ \begin{array}{rcl} H_\lambda : \mathcal{E}_s^\circ \times \mathcal{E}_t & \longrightarrow & \mathrm{Ens} \\ (x_0, x_1) & \longmapsto & \mathrm{Hom}_\lambda(x_0, x_1) \end{array} \right.$$

satisfait les deux conditions suivantes :

a) $\forall\ x_0 \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{E}_s^\circ$, $x_1 \longmapsto H_\lambda(x_0, x_1) : \mathcal{E}_t \longrightarrow \mathrm{Ens}$ est accessible.

b) Il existe un cardinal infini π_λ, tel que pour tout $x_1 \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{E}_t$, le foncteur $x_0 \longmapsto H_\lambda(x_0, x_1) : \mathcal{E}_s \longrightarrow (\mathrm{Ens})^\circ$ soit π_λ-accessible.

[page 423]

Ceci posé, la catégorie $\underline{\Gamma}(\mathcal{E}/\mathcal{C})$ *des sections de* $\mathcal{E}$ *sur* $\mathcal{C}$ *est accessible, et les foncteurs* $\varepsilon_s : \underline{\Gamma}(\mathcal{E}/\mathcal{C}) \longrightarrow \mathcal{E}_s$ *sont accessibles. On peut préciser de façon similaire à 4.14.18 (énoncé en forme laissé au lecteur).*

Démonstration de 4.14.26. Elle se fait exactement comme celle de 4.14.17 (p. 400 ff.), mais est conceptuellement plus simple. On suppose $\mathcal{C}$ petite, et on introduit les catégories

$$\Pi \;=\; \prod_{s \,\in\, \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}} \mathcal{E}_s \;, \qquad \Pi' \;=\; \prod_{\lambda \,\in\, \mathrm{Fl}\,\mathcal{C}} \mathcal{E}_\lambda \;,$$

où

$$\mathcal{E}_\lambda \;=\; \mathcal{E} \times_{\mathcal{C}} (\mathbf{\Delta}_1, i_\lambda) \;,$$

et les deux foncteurs canoniques

$$\Pi \underset{G}{\overset{F}{\rightrightarrows}} \Pi'$$

de composantes

$$\begin{aligned} F_\lambda \;&=\; i_\lambda \circ \mathrm{pr}_{s(\lambda)} \\ G_\lambda \;&=\; j_\lambda \circ \mathrm{pr}_{b(\lambda)} \;, \end{aligned}$$

où pour $\lambda : s \longrightarrow t$, on pose

$$s(\lambda) \;=\; s \;, \qquad b(\lambda) \;=\; t \;,$$

et i_λ, j_λ sont les inclusions canoniques

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{E}_s & \xrightarrow{\;i_\lambda\;} & \mathcal{E}_\lambda & \xleftarrow{\;j_\lambda\;} & \mathcal{E}_t \;. \\ \big\downarrow \wr & & & & \big\downarrow \wr \\ (\mathcal{E}_\lambda)_0 & & \big\downarrow p_\lambda & & (\mathcal{E}_\lambda)_1 \\ & & \mathbf{\Delta}_1 & & \end{array}$$

On désigne par $\mathcal{M}'$ la catégorie

p. 161
[page 424]

$$\mathcal{M}' \;=\; \begin{array}{l} \text{catégorie des couples } (X, u), \text{ avec} \\ X \in \mathrm{Ob}\,\Pi,\; u : F(x) \longrightarrow G(x), \end{array}$$

qui est constructible par 4.14.22.1 est accessible (car Π et π' et les foncteurs F et G le sont, par l'hypothèse H) faite sur p). On peut l'interpréter comme la catégorie des sections de $\mathrm{Diag}(\mathcal{E})$ sur $\mathrm{Diag}(\mathcal{C})$. On a un foncteur strictement pleinement fidèle

$$\mathcal{M} \;\overset{\text{déf}}{=}\; \underline{\Gamma}(\mathcal{E}/\mathcal{C}) \;\hookrightarrow\; \mathcal{M}' \;,$$

qui permet d'interpréter $\mathcal{M}$ comme une sous-catégorie strictement pleine de $\mathcal{M}'$. On voit alors comme dans le cas de 4.14.17 que cette sous-catégorie est accessible dans $\mathcal{M}'$ – c'est essentiellement sorital. Il s'ensuit que $\mathcal{M}$ est accessible et que les foncteurs $\mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{E}_s$ le sont aussi, comme composés de

$$\mathcal{M} \;\overset{\text{acc.}}{\hookrightarrow}\; \mathcal{M}' \;\overset{\text{acc.}}{\hookrightarrow}\; \Pi \;\xrightarrow{\;\mathrm{pr}_s \;\; \text{acc.}\;}\; \mathcal{E}_s \;,$$

q.e.d.

[page 425]

4.15 Catégorie accessible sur une autre

Proposition 4.15.1. *Soit $f : \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{C}$ un foncteur avec $\mathcal{C}$ petite. On suppose de plus satisfaite la condition H (p. 409), qu'on explicite ici sous la forme équivalente H′ :*

H 1) Pour tout $s \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$, $\mathcal{E}_s$ est accessible.

H 2) Pour toute $\lambda \in \mathrm{Fl}\,\mathcal{C}$, $\lambda : s \longrightarrow t$, existe un cardinal infini π_λ tel que pour tout $x_1 \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{E}_t$, le foncteur

$$x_0 \longmapsto \mathrm{Hom}_\lambda(x_0, x_1) : \mathcal{E}_s \longrightarrow (\mathrm{Ens})^\circ$$

est π_λ-accessible ($\mathcal{E}_s$ satisfaisant de plus à L_{π_λ}).

H 3) Pour toute $\lambda \in \mathrm{Fl}\,\mathcal{C}$, $\lambda : s \longrightarrow t$, et pour tout $x_0 \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{E}_s$, le foncteur

$$x_1 \longmapsto \mathrm{Hom}_\lambda(x_0, x_1) : \mathcal{E}_t \longrightarrow (\mathrm{Ens})$$

est accessible.

Alors les foncteurs d'inclusion $i_s : \mathcal{E}_s \longrightarrow \mathcal{E}$ sont accessibles. De plus, si $\mathcal{C}$ "est sans projecteurs" (i.e. si tout endomorphisme p d'un objet s de $\mathcal{C}$ tel que $p^2 = p$, est l'identité), alors $\mathcal{E}$ est accessible, et $f : \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{C}$ est accessible.

Cela résulte du résultat plus précis :

Corollaire 4.15.2 ([175]). *Les hypothèses sur $f : \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{C}$ sont celles de 4.15.1 ($\mathcal{C}$ petite, et f satisfait $H' = H$ 1) 2) 3)).* p. 162 [page 426]

a) Soit $s \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$ et soit π_1 un cardinal infini tel que pour toute $\lambda : s \longrightarrow t$ (flèche de $\mathcal{C}$ de source t), on ait $\pi_1 \geqslant \pi_\lambda$ (où π_λ est défini dans l'énoncé de H 2). Alors le foncteur $i_s : \mathcal{E}_s \longrightarrow \mathcal{E}$ est π_1-accessible.

b) On suppose $\mathcal{C}$ sans projecteurs. Soit π_1 un cardinal $\geqslant \sup(\pi_\lambda, \mathrm{card}\,\mathcal{C})$. Alors $\mathcal{E}$ satisfait L_{π_1}, et $f : \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{C}$ est π-accessible.

c) Supposons encore que $\mathcal{C}$ soit sans projecteurs (p.ex. une catégorie "rigide", p.ex. une catégorie préordonnée). Soient π_0, π_1 des cardinaux tels que :

① $\forall\, s \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$, π_0 est utile pour $\mathcal{E}_s$ (un tel π_0 existe grâce à H 1 et au fait que $\mathcal{C}$, donc $\mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$ petits).

② $\pi_1 \geqslant \sup(\pi_0, \mathrm{card}\,\mathcal{C}, \sup_{\lambda \in \mathrm{Fl}\,\mathcal{C}} \pi_\lambda, \sup_{s \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}} \mathrm{card\ réd}\mathcal{E}_{s\,\pi_0})$.

③ $\forall \lambda \in \mathrm{Fl}\,\mathcal{C}$, et $x_0 \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{E}_{s,\pi_0}$, le foncteur $H_\lambda(x_0)$ de H 3, $x_1 \longmapsto \mathrm{Hom}_\lambda(x_0, x_1) : \mathcal{E}_t \longrightarrow \mathrm{Ens}$ est π_1-accessible.

Soit π un cardinal tel que $\pi^{\pi_0} = \pi \geqslant \pi_1$. Alors par b), $\mathcal{E}$ satisfait L_{π_1}, donc L_π, et $f : \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{C}$ est π_1-accessible. De plus,

$$i_s(\mathcal{E}_{s\,\pi}) \subset \mathcal{E}_\pi\ ,$$

ou encore

$$\mathcal{E}(\pi) \subset \mathcal{E}_\pi\ , \qquad (*)$$

où $\mathcal{E}(\pi)$ est la sous-catégorie pleine de $\mathcal{E}$ telle que

$$\mathrm{Ob}\,\mathcal{E}(\pi) = \bigcup_{s \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}} \mathrm{Ob}\,(\mathcal{E}_{s\,\pi})\ .$$

Comme $\mathcal{E}_\pi$ satisfait L_{π_1} par b), donc a fortiori L_π, on a donc par $(*)$ un foncteur pleinement fidèle

$$\mathrm{Ind}_\pi(\mathcal{E}_{s\,\pi}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{E}\ ,$$

et ce foncteur est une équivalence de catégories (donc $\mathcal{E}$ est accessible). [page 427]

d) En fait, sous les hypothèses de c) sur $\mathcal{C}$, π_0, π_1, π, on a $\mathcal{E}(\pi) = \mathcal{E}_\pi$ (non seulement $\mathcal{E}(\pi) \subset \mathcal{E}_\pi$).

Démonstration de 4.15.1 et 4.15.2. Il est clair que 4.15.1 est contenu dans 4.15.2 a) et c). Nous allons donc prouver 4.15.2.

a) Soit $(x_i)_{i\in I}$ un système inductif dans $\mathcal{E}_s$, avec I grand devant π_0, et x sa limite inductive dans $\mathcal{E}_s$ (qui existe, car $\mathcal{E}_s$ satisfait à L_{π_λ}, donc à L_{π_0}). Il faut prouver que c'est une limite dans $\mathcal{E}$, donc que pour tout $y \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{E}$, la flèche canonique

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(x, y) \longrightarrow \varprojlim_I \mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(x_i, y) \qquad (*)$$

est un isomorphisme. Or $\mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(x, y)$ et les $\mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(x_i, y)$ sont des objets de $\mathrm{Ens}/\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(s, t)$, où $s = f(x)$, $t = f(y)$, et les flèches de transition sont des flèches dans $\mathrm{Ens}/\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(s, t)$. Cela montre que la bijectivité de $(*)$ revient à celle de p. 163

$$\mathrm{Hom}_{\lambda}(x, y) \longrightarrow \varprojlim_I \mathrm{Hom}_{\lambda}(x_i, y) \qquad (*)$$

pour tout $\lambda \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(x, y)$ [plutôt $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(f(x), f(y))$]. Pour λ fixé, et y fixé dans $\mathrm{Ob}\,\mathcal{E}_t$, la bijectivité dans $(*)$, pour tout système inductif grand devant π_1 dans $\mathcal{E}_s$, de limite x, signifie que le foncteur

$$x \longmapsto \mathrm{Hom}_{\lambda}(x, y) \,:\, \mathcal{E}_s \longrightarrow (\mathrm{Ens})^\circ$$

est π_0-accessible. Or c'est bien le cas, par hypothèse sur π_1, quel que soit la flèche $\lambda : s \longrightarrow t$ de source s, et quel que soit $y \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{E}_t$.

Soit $(x_i)_{i\in I}$ un système inductif grand devant π_1, et $(s_i)_{i\in I}$ l'image de ce système dans $\mathcal{C}$. Nous prouverons plus bas le [page 428]

Lemme 4.15.3 ([176], [177]). *Soit $\mathcal{C}$ une catégorie, π un cardinal, tels que* $\mathrm{card}\,\mathcal{C} \leqslant \pi$, *et que $\mathcal{C}$ soit sans projecteurs. Alors pour tout système inductif $(s_i)_{i\in I}$ grand devant π dans $\mathcal{C}$, existe une partie cofinale J dans I telle que le système induit $(s_i)_{i\in J}$ soit* constant, *i.e. tel que les s_i soient égaux à un $s \in \mathcal{C}$, et que les morphismes de transition soient tous égaux à* id_s.

Mais attention, on s'appuie pour prouver 4.15.3 sur le théorème 4.8.13 (page 212-216), que je n'ai toujours pas prouvé. Dans le cas où $\mathcal{C}$ est rigide (i.e. $\mathrm{End}_{\mathcal{C}}(s) = \{\mathrm{id}_s\}\ \forall\ s \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$), la démonstration est cependant immédiate, cf. plus bas.

Pour prouver que $x = \varinjlim_I x_i$ existe dans $\mathcal{E}$, et commute à f, on peut remplacer I par une sous-catégorie cofinale. Cela nous ramène, grâce au lemme, au cas où $(s_i)_{i\in I}$ est constant, donc au cas où le système inductif provient d'un système inductif dans une catégorie fibre $\mathcal{E}_s$. Mais par a), on sait que sa limite x dans $\mathcal{E}_s$ est une limite dans $\mathcal{E}$, d'où l'existence de cette dernière, et la commutation à f, puisque $\varinjlim s_i = s$ ($\varinjlim$ d'un système inductif filtrant constant). [page 429]

c) Il faut prouver que si $x \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{E}_s$ est π-accessible dans $\mathcal{E}_s$, il l'est dans $\mathcal{E}$, i.e. que pour tout système inductif $(y_i)_{i\in I}$ grande devant π, la flèche canonique

$$\varinjlim_i \mathrm{Hom}(x, y_i) \longrightarrow \mathrm{Hom}(x, y) \qquad (**)$$

est bijective. Or comme par 2°) $\pi \geqslant \pi_1 \geqslant \sup(\mathrm{card}\,S, \sup_\lambda \pi_\lambda)$, il résulte encore du lemme que, quitte à remplacer I par une sous-catégorie cofinale, on peut supposer que

175. Pour a) et b) on n'utilise que H 1 et H 2, à l'exclusion de H 3.

176. Cf. démonstration page 452.

177. sous réserve de la validité de 4.8.13 (Mais c'est à présent établi, sous une forme suffisante, dans 4.15.10).

le système inductif $(y_i)_{i\in I}$ provient d'un système dans une catégorie fibre $\mathcal{E}_t$, et que y est sa $\varinjlim$ dans $\mathcal{E}_t$. Mais alors les ensembles $\mathrm{Hom}(x,y)$ et $\mathrm{Hom}(x,y_i)$, et les morphismes de transition entre celles-ci, sont encore dans $\mathrm{Ens}/\mathrm{Hom}(s,t)$, et on est ramené

p. 164

à prouver que pour tout $\lambda : s \longrightarrow t$, la flèche

[page 430]

$$\varinjlim_i \mathrm{Hom}_\lambda(x,y_i) \longrightarrow \mathrm{Hom}_\lambda(x,y)$$

est bijective. Pour x et λ fixés, et des systèmes inductifs variables dans $\mathcal{E}_t$, grands devant π, cela signifie que le foncteur

$$H_\lambda(x) = (y \longmapsto \mathrm{Hom}_\lambda(x,y)) : \mathcal{E}_t \longrightarrow \mathrm{Ens}$$

est π-accessible, et ceci quel que soit

$$x \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{E}_{s\,\pi} .$$

Or c'est le cas si $s \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{E}_{s\,\pi_0}$, en vertu de l'hypothèse 3°) (alors $H_\lambda(x_0)$ est π_1-accessible, et a fortiori π-accessible). Il faut passer de là au cas où $x \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{E}_{s\,\pi}$. Or comme π_0 est utile pour $\mathcal{E}_s$ par 1°, on a

$$x = \varinjlim_{j\in J} x_j , \qquad x_j \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{E}_{s\,\pi_0},\ J \text{ grande devant } \pi_0 ,$$

et comme par 2°, $\pi^{\pi_0} = \pi \geqslant \pi_1 \geqslant \sup(\pi_0, \mathrm{card\,réd}\,\mathcal{E}_{s\,\pi_0})$, on en conclut qu'on peut prendre J de sorte que

$$\mathrm{card}\,J \leqslant \pi .$$

D'autre part, en vertu de $\pi \geqslant \pi_1 \geqslant \pi_\lambda$, le foncteur

$$\begin{cases} x_0 \longmapsto H_\lambda(x_0) \\ \mathcal{E}_s \longrightarrow (\underline{\mathrm{Hom}}(\mathcal{E}_s, \mathrm{Ens}))^\circ \end{cases}$$

est π_0-accessible, donc on a

$$H_\lambda(x_0) \simeq \varprojlim_{j\in J} H_\lambda(x_j) .$$

Comme $x_j \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{E}_{s\,\pi_0}$, $H(x_j)$ est un foncteur π_1-accessible, et comme $\mathrm{card}\,J \leqslant \pi$, la $\varprojlim_{j\in J} H_\lambda(x_j)$ est aussi π-accessible (cf. SGA 4 I 9.8).

[page 431]

Ainsi on a prouvé $\mathcal{E}_{s\,\pi} \subset \mathcal{E}(\pi)$ pour tout $s \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$, i.e. l'inclusion

$$\mathcal{E}(\pi) \subset \mathcal{E}_\pi ,$$

d'où le foncteur pleinement fidèle

$$\mathrm{Ind}_\pi(\mathcal{E}(\pi)) \longrightarrow \mathcal{E} , \qquad (*)$$

comme $\mathcal{E}$ satisfait à L_π. Il reste à prouver que c'est essentiellement surjectif. Mais si $x \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{E}$, $s = f(x)$, on a $x \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{E}_s$, et comme π_0 est utile pour $\mathcal{E}_s$ par 1°), et $\pi^{\pi_0} = \pi > \pi_0$, π est également utile pour π, donc on a *dans* $\mathcal{E}_s$

$$x = \varinjlim_I x_i , \qquad \text{les } x_i \in \mathcal{E}_{s\,\pi} \subset \mathcal{E}(\pi),\ I \text{ grande devant } \pi ,$$

et d'après a) (comme $\pi \geqslant \pi_1 \geqslant \sup_{\lambda\in \mathrm{Fl}\,\mathcal{C}} \pi_\lambda$) x est aussi limite des x_i dans $\mathcal{E}$, donc il est dans l'image essentielle de $(*)$.

p. 165

[page 432]

d) Reste à prouver que l'on a $\mathcal{E}_\pi \subset \mathcal{E}(\pi)$. Mais on sait (par 4.8. …), comme $\mathcal{E} \simeq \mathrm{Ind}_\pi(\mathcal{E}(\pi))$, que $\mathcal{E}_\pi = \mathcal{E}(\pi)^\natural$, i.e. que pour $x \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{E}_\pi$, $\exists\, y \in \mathcal{E}(\pi)$ et un projecteur p dans x, tel que x soit isomorphe à l'image de p dans $\mathcal{E}$. Or $f(p)$ est un projecteur dans $f(y) = s$, donc par hypothèse sur $\mathcal{C}$, $f(p) = \mathrm{id}_s$, i.e. p est un projecteur dans $\mathcal{E}_s$. Comme donc x est dans $\mathcal{E}_s$, et

même dans $\mathcal{E}_{s\,\pi}$, puisque $\mathcal{E}_{s\,\pi}$ est stable dans $\mathcal{E}_s$ par facteurs directs. Cela prouve que $x \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{E}(\pi)$, q.e.d.

On peut présenter 4.15.1 sous une forme plus sympathique.

Corollaire 4.15.4. *Soit $f : \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{C}$ un foncteur de $\mathfrak{U}$-catégories. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

a) Pour tout foncteur $\mathcal{C}' \longrightarrow \mathcal{C}$, avec $\mathcal{C}'$ petite et sans projecteurs, $\mathcal{E}' \overset{déf}{=} \mathcal{E} \times_{\mathcal{C}} \mathcal{C}'$ est accessible, et $f' : \mathcal{E}' \longrightarrow \mathcal{C}'$ est accessible.

b) Comme a), mais avec $\mathcal{C}' = \mathbf{\Delta}_1$, en d'autres termes, c'est la condition H p. 409 : pour toute $\lambda \in \mathrm{Fl}\,\mathcal{C}$, $\mathcal{E}_\lambda = \mathcal{E} \times_{\mathcal{C}} (\mathbf{\Delta}_1, i_\lambda)$ est accessible, et $\mathcal{E}_\lambda \longrightarrow \mathbf{\Delta}_1$ est accessible.

c) La condition $H' = H\ 1 + H\ 2 + H\ 3$, explicitée dans l'énoncé de 4.15.1.

Démonstration. Elle se fait circulaire,

$$\mathrm{a} \implies \mathrm{b} \implies \mathrm{c} \implies \mathrm{a}\ ,$$

l'implication a $\Longrightarrow$ b étant tautologique, b $\Longrightarrow$ c l'étant presque (cf. 4.14.24, a $\Longrightarrow$ b $\Longrightarrow$ c). En fait, les conditions b et c sont des conditions sur les catégories $\mathcal{E}_s \overset{f_\lambda}{\longrightarrow} \mathbf{\Delta}_1$ pour $\lambda \in \mathrm{Fl}\,\mathcal{C}$, donc stables par changement de base. Pour prouver

c $\Longrightarrow$ a, on peut donc supposer que $\mathcal{C}' = \mathcal{C}$, $\mathcal{C}' \longrightarrow \mathcal{C}$ le foncteur identique, et prouver que si c) est satisfaite et si $\mathcal{C}$ est petite et sans projecteurs, alors $\mathcal{E}$ est accessible et f accessible. Or c'est ce qu'affirme 4.15.1. [page 433]

Remarque 4.15.5. Si $f : \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{C}$ est un foncteur pleinement fidèle, il est immédiat que la condition H est satisfaite (car $\mathcal{E}_\lambda \longrightarrow \mathbf{\Delta}_1$ sera pleinement fidèle, donc $\mathcal{E}_\lambda$ est équivalente à e où à $\mathbf{\Delta}_1$, donc accessible, et tout foncteur de $\mathcal{E}_\lambda$ dans une catégorie quelconque est accessible …). Mais si on suppose $\mathcal{C}$ petite *sans* supposer $\mathcal{C}$ sans projecteurs, il ne s'ensuit pas que $\mathcal{E}$ soit accessible, ou ce qui revient au même (étant essentiellement petite), que $\mathcal{E}$ soit karoubienne. (L'exemple le plus trivial est celui où $\mathcal{E} = \mathcal{C}$, $f = \mathrm{id}_{\mathcal{C}}$, $\mathcal{E}$ n'est karoubienne que si $\mathcal{C}$ l'est !) Mais même en supposant $\mathcal{C}$ une petite catégorie karoubienne, il ne s'ensuit pas forcément que $\mathcal{E}$ l'est. En effet, *toute* petite catégorie $\mathcal{E}$ (karoubienne ou non) se plonge comme sous-catégorie pleine dans son enveloppe karoubienne $\mathcal{C}$ – il suffit donc de prendre $\mathcal{E}$ non karoubienne. L'exemple

le plus économique est [page 434]

$$\mathrm{Ob}\,\mathcal{E} = \{0\}\ , \qquad \mathrm{Fl}(\mathcal{E}) = \{\mathrm{id}_0, p\}\ , \qquad \text{avec } p^2 = p \neq \mathrm{id}_0\ ,$$

l'enveloppe de Karoubi de $\mathcal{E}$ est donnée par p. 166

$$P = \left\{ 1 \underset{\sigma}{\overset{\rho}{\leftrightarrows}} 0 \circlearrowright p \qquad \begin{array}{l} \rho\sigma = \mathrm{id}_1 \\ \sigma\rho = p \neq \mathrm{id}_0 \end{array} \implies p^2 = p \right\}.$$

Cela soulève la question de trouver un énoncé similaire à 4.15.1, donnant des conditions serviables simples, plus fortes que H′ = H (1+2+3), sur $f : \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{C}$, pour que $\mathcal{E}$ soit accessible et f accessible, en supposant $\mathcal{C}$ *karoubienne*. Ou encore, des conditions nécessaires et suffisants serviables (plus fortes que 4.15.4) sur $f : \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{C}$, pour que toute *petite* catégorie *karoubienne* $\mathcal{C}'$, et tout foncteur $\mathcal{C}' \longrightarrow \mathcal{C}$, la catégorie $\mathcal{E}' = \mathcal{E} \times_{\mathcal{C}} \mathcal{C}'$ soit accessible, et le foncteur $\mathcal{E}' \longrightarrow \mathcal{C}'$ accessible. Une idée naturelle, c'est qu'il suffirait que

cette conclusion soit vraie quand $\mathcal{C}'$ est une des deux catégories $\mathbf{\Delta}_1$, P (où P est la catégorie à deux objets, à trois flèches non identiques, définie plus haut). Mais je doute qu'il en soit ainsi ([178]).

On va quand même essayer un énoncé un peu très particulier dans ce sens : [page 435]

Proposition 4.15.6 ([180]). *Soit $f : \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{C}$ un foncteur de $\mathfrak{U}$-catégories. On suppose :*

a) f est fibrant ou cofibrant ([181]).

b) Les catégories fibres $\mathcal{E}_s$ ($s \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$) sont accessibles, et pour toute flèche $\lambda : s \longrightarrow t$ dans $\mathcal{C}$, le foncteur changement de base $\lambda^* : \mathcal{E}_t \longrightarrow \mathcal{E}_s$ (resp. cochangement de base $\lambda_* : \mathcal{E}_s \longrightarrow \mathcal{E}_t$) est accessible.

c) $\mathcal{C}$ est essentiellement petite et karoubienne.

Alors $\mathcal{E}$ est accessible, et f est accessible.

Démonstration. On a déjà vu que les conditions a) et b) impliquent H′, i.e. H (1+2+3). D'ailleurs, si $\mathcal{C}'$ est une catégorie et $\mathcal{C}' \xrightarrow{\sim} \mathcal{C}$ une équivalence, donc alors $\mathcal{E}' \overset{\text{déf}}{=} \mathcal{E} \times_{\mathcal{C}} \mathcal{C}' \longrightarrow \mathcal{E}$ est une équivalence, donc la conclusion voulue pour $\mathcal{E}$, f équivaut à la même conclusion pour $\mathcal{E}'$, $f' : \mathcal{E}' \longrightarrow \mathcal{C}'$. Donc on peut supposer que $\mathcal{C}$ est petite (et même réduite, si on y tient). En vertu de 4.15.2 a), on voit donc que les foncteurs d'inclusion $\mathcal{E}_s \longrightarrow \mathcal{E}$ sont accessibles (et même π_1-accessibles) dès que $\pi_1 \geqslant \sup_{\lambda \in \mathrm{Fl}\,\mathcal{C}} \pi_\lambda$. On voit d'ailleurs

par AQT `[âne qui trotte]` qu'on peut trouver des cardinaux π_0, π_1 ayant les propriétés suivantes : [page 436]

p. 167

(1°) π_0 est utile pour $\mathcal{E}_s$, $\forall\ s \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$.

2°) $\pi_1 \geqslant \sup(\pi_0, \mathrm{card}\,\mathcal{C}, \sup_{\lambda \in \mathrm{Fl}\,\mathcal{C}} \pi_\lambda, \sup_{s \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}} \mathrm{card\,réd}\,\mathcal{E}_s)$.

(3°) $\forall\ (\lambda : s \longrightarrow t) \in \mathrm{Fl}\,\mathcal{C}$ et $x_0 \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{E}_{s\,\pi_0}$, le foncteur

$$H_\lambda(x_0)\ :\ (x_1 \longmapsto \mathrm{Hom}_\lambda(x_0, x_1))\ :\ \mathcal{E}_t\ \longrightarrow\ (\mathrm{Ens})$$

est π_1-accessible. (**N.B.** Si f est cofibrant, cela signifie que $\forall\ \lambda \in \mathrm{Fl}\,\mathcal{C}$, $\lambda : s \longrightarrow t$, $\boxed{\lambda_*(\mathcal{E}_{s\,\pi_0})\ \subset\ \mathcal{E}_{s\,\pi_1}}$. Si f est fibrant, il suffit d'exiger que $\forall\ \lambda \in \mathrm{Fl}\,\mathcal{C}$, $\lambda^* : \mathcal{E}_t \longrightarrow \mathcal{E}_s$ soit π_1-accessible.) Mais dans ce cas, on veut aussi $\boxed{\lambda^*(\mathcal{E}_{s\,\pi_0})\ \subset\ \mathcal{E}_{s\,\pi_1}}$.

(4°) Les foncteurs λ^* (cas f fibrant) resp. λ_* (cas f cofibrant) sont π_1-accessibles.

Soit alors π un cardinal tel que

$$\pi\ =\ \pi^{\pi_0}\ \geqslant\ \pi_1\ , \qquad (*)$$

et soit $\mathcal{E}(\pi)$ la sous-catégorie (strictement) pleine de $\mathcal{E}$ définie par

$$\mathrm{Ob}\,\mathcal{E}(\pi)\ =\ \bigcup_{s \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}} \mathrm{Ob}\,\mathcal{E}_{s\,\pi}\ .$$

178. Ça devrait marcher par contre si on prend les catégories $0 \longrightarrow 1$,

$$2 \longrightarrow \underbrace{1 \underset{\sigma}{\overset{\rho}{\leftleftarrows}} 0 \circlearrowright p}_{P} \quad \text{et} \quad 2 \longleftarrow \underbrace{1 \underset{\sigma}{\overset{\rho}{\leftleftarrows}} 0 \circlearrowright p}_{P} \qquad ([179])\ ,$$

3 objets et 5 flèches non identiques

grâce à 4.15.7, page 440.

179. ces catégories représentent respectivement les foncteurs Cat $\longrightarrow$ Ens associant à une catégorie $\mathcal{C}$ les diagrammes dans $\mathcal{C}$ formés de (x, y, p, u), avec p projecteur dans p `[plutôt dans C]`, et $u : y \longrightarrow x^\natural$ (i.e. $u : y \longrightarrow x$ avec $u = pu$), resp. $u : x^\natural \longrightarrow y$ (i.e. $u : x \longrightarrow y$ avec $u = up$).

180. *Faux ?*

181. Le cas fibrant n'est pas prouvé, peut-être *faux* – et de même pour le cas cofibrant !

Grâce à $(*)$, et à 1°, 4° et à

$$\begin{cases} \pi_1 \geqslant \sup_s(\operatorname{card} \text{réd}\, \mathcal{E}_{s\,\pi_0}) & \text{(contenu dans 2°)} \\ \lambda^*(\mathcal{E}_{t\,\pi_0}) \subset \mathcal{E}_{s\,\pi_1} \quad \text{resp.} \quad \lambda_*(\mathcal{E}_{s\,\pi_0}) \subset \mathcal{E}_{t\,\pi_1} & \text{(contenu dans 3°)}\ , \end{cases}$$

on voit que $\mathcal{E}(\pi)$ est une sous-catégorie

fibrée, resp. une sous-catégorie cofibrée, sur $\mathcal{C}$ (le foncteur $\mathcal{E}(\pi) \longrightarrow \mathcal{E}$ étant donc cartésien resp. cocartésien). À $\mathcal{C}$-équivalence près, $\mathcal{E}$ se reconstitue alors à partir de $\mathcal{E}(\pi)$, en passant au $\operatorname{Ind}_\pi(\mathcal{E}_{s\,\pi})$, qui forment un système fibré resp. cofibré sur $\mathcal{C}$ par les foncteurs $\operatorname{Ind}_\pi(\lambda_\pi^*)$ resp. $\operatorname{Ind}_\pi(\lambda_*^\pi)$ … [page 437]

Prouvons que $\mathcal{E}$ satisfait à L_π et que $f : \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{C}$ est π-accessible ([182]). Comme $\mathcal{C}$ est karoubienne, et $\pi \geqslant \pi_1 \geqslant \operatorname{card} \mathcal{C}$, $\mathcal{C}$ satisfait à L_π et les ind-objets grands devant π de $\mathcal{C}$ sont essentiellement constants (4.8.13). Soit alors I grande devant π, et $I \longrightarrow \mathcal{E}$, $i \longmapsto x_i$, un foncteur, il faut construire une $\varinjlim$ dans $\mathcal{E}$, en utilisant la $\varinjlim$ déjà connue s des $s_i = f(x_i)$. On va prendre un x dans $\mathcal{E}_s$. Prenons d'abord le cas où f est cofibrant. On voit que les $\beta_i(x_i)$ forment un système inductif dans $\mathcal{E}_s$, puisque pour $i = j$, on a

$$\beta_{i\,*}(x_j) \;=\; \beta_{j\,*}\underbrace{\beta_{ji\,*}(x_i)}_{\longrightarrow x_j} \;\longrightarrow\; \beta_{j\,*}(x_j)\ .$$

$$\begin{array}{ccc} x_i & \xrightarrow{\quad\alpha_i\quad} & x\,? \\ s_i & \xrightarrow{\quad\beta_i\quad} & s \\ & {\scriptstyle\beta_{ji}}\searrow \quad \nearrow{\scriptstyle\beta_j} & \\ & s_j & \end{array}$$

On pose

$$x \;=\; \varinjlim_I \beta_{i\,*}(x_i)\ , \qquad \varinjlim \ \textit{dans}\ \mathcal{E}_s\ . \qquad \text{p. 168} \quad [\text{page 438}]$$

On sait que c'est une $\varinjlim$ dans $\mathcal{E}$, donc que pour tout y dans $\mathcal{E}$, on a

$$\operatorname{Hom}(x, y) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_I \operatorname{Hom}(\beta_{i\,*}(x_i), y)\ ,$$

ou ce qui revient au même, pour toute flèche $\lambda : s \longrightarrow t$, et y dans $\operatorname{Ob} \mathcal{E}_t$, on a

$$\underbrace{\operatorname{Hom}_\lambda(x, y)}_{=\operatorname{Hom}_{\mathcal{E}_t}(\lambda_* x, y)} \;\simeq\; \varprojlim \operatorname{Hom}_{\mathcal{E}_t}(\underbrace{\lambda_*\beta_{i\,*}(x_i)}_{(\lambda_i\beta_i)_*(x_i)}, y)\ .$$

Cela résulte aussi du fait que λ_* est π-accessible (étant π_1-accessible) … On vérifie facilement que c'est une $\varinjlim$ des x_i dans $\mathcal{E}$. Et bien sûr, cette limite commute avec f par construction.

Mais dans le cas où f est fibrant, je ne vois comment faire pour construire une limite dans $\mathcal{E}_s$. Il est vrai qu'on peut supposer que tous les s_i sont égaux à s, mais les transitions β_{ji} ne sont pas l'identité, ni même des isomorphismes. Il faudrait prendre $\mathcal{C} = P$ pour essayer de comprendre – je ne vais pas insister ([183]).

Dans le cas où f est fibrant, admettons (comme hypothèse supplémentaire au besoin) que $\mathcal{E}$ satisfasse L et que f soit accessible, et prenons π assez grand pour que $\mathcal{E}$, f satisfassent L_π. Nous pouvons alors terminer la démonstration de 4.15.6. Il faut prouver [page 439]

$$\mathcal{E}(\pi) \subset \mathcal{E}_\pi\ ,$$

182. Ici on utilise seulement $\pi \geqslant \operatorname{card} \text{réd}\, \mathcal{C}$.

183. J'ai vérifié que si f est fibrant, alors $\mathcal{E}$ est *karoubienne*. Il y a donc de l'espoir …

donc que si $x \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{E}_{s\,\pi}$, et $(y_i)_{i\in I}$ est un système inductif dans $\mathcal{E}$ grand devant π, de limite y, on a

$$\varinjlim \mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(x, y_i) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(x, y)\ .$$

Donc il faut prouver que toute flèche $x \xrightarrow{u} y$ se factorise, de façon essentiellement unique u_i, par un y_i. Mais la flèche $s \xrightarrow{\lambda = f(u)} t$ dans $\mathcal{C}$ se factorise, de façon essentiellement unique, par des $\lambda_i : s \longrightarrow t_i$. Donc on est ramené à trouver un λ_i-*morphisme* $x \longrightarrow y_i$ pour i grand, qui factorise. Dans le cas fibrant, cela signifie qu'on cherche $x \longrightarrow \lambda_i^*(y_i)$ qui factorise $x \longrightarrow \lambda^*(y)$, or les $\lambda_i^*(y_i)$ forment un système inductif dans $\mathcal{E}_s$, et sa limite *dans* $\mathcal{E}_s$ est $\lambda^*(y)$ (*à vérifier*). Comme x est dans $\mathcal{E}_{s\,\pi}$, l'hom`[omorphisme]` donné $x \longrightarrow \lambda^*(y)$ se factorise de

[page 440]

façon essentiellement unique par un $\lambda_i^*(y_i)$.

Cette fois par contre, c'est le cas f cofibrant qui pose problème. En fait, je n'arrive pas à m'en tirer.

Ainsi, on trouve bien un foncteur

$$\mathrm{Ind}_\pi(\mathcal{E}(\pi)) \longrightarrow \mathcal{E}\ ,$$

qui est essentiellement surjectif, mais faute de savoir que $\mathcal{E}(\pi) \subset \mathcal{E}_\pi$ dans le cas cofibrant, il n'est pas clair que ce foncteur soit une équivalence de catégories. p. 169

4.15.7. Il me faut reporter la démonstration du lemme 4.15.3 (p. 428), en admettant 4.8.13. (Non encore démontré – je vais revenir plus bas sur la démonstration de 4.8.13.) On va utiliser le

Lemme 4.15.7.1. *Soient $\mathcal{C}$ une catégorie, $\underline{x} = (x_i)_{i\in I}$ un ind-objet de $\mathcal{C}$. Pour que $\underline{x}$ soit essentiellement constant, i.e. isomorphe, dans* $\mathrm{Ind}(\mathcal{C})$*, au ind-objet constant défini par un objet*

[page 441]

de $\mathcal{C}$, il faut et il suffit qu'il existe un foncteur cofinal $\varphi : J \longrightarrow I$, avec J filtrant, de telle façon que le système réindexé $(x_j)_{j\in J}$, avec $x_j = x_{\varphi(j)}$, ait la propriété suivante : pour tout $j \in J$, on peut trouver un projecteur p_j dans x_j, de telle façon que :

1°) Pour toute flèche $\lambda : j \longrightarrow j'$ dans J, on ait commutativité dans

$$\begin{array}{ccc} x_j & \xrightarrow{x_\lambda} & x_{j'} \\ \downarrow{\scriptstyle p_j} & & \downarrow{\scriptstyle p_{j'}} \\ x_j & \xrightarrow{x_\lambda} & x_{j'} \end{array}$$

(où les x_λ sont les flèches de transition), i.e. $p_{j'}x_\lambda = x_\lambda p_j$.

2°) Pour tout $j \in \mathrm{Ob}\,J$, il existe une flèche $\lambda : j \longrightarrow j'$ dans J telle que $p_{j'}x_\lambda = x_\lambda p_j = x_\lambda$.

3°) Pour tout $j \in \mathrm{Ob}\,J$, le projecteur p_j dans x_j admet un image $x_j^\natural$.

4°) Pour toute flèche $\lambda : j \longrightarrow j'$ dans J, la flèche $x_\lambda^\natural : x_j^\natural \longrightarrow x_{j'}^\natural$ induite par x_λ (grâce à 1°) est un isomorphisme.

De plus, si on peut supposer J de la forme $i_0\backslash I$, le foncteur cofinal $J \longrightarrow I$ étant le foncteur canonique $i_0\backslash I \longrightarrow I$ (i_0 étant un objet fixé convenable de I) `[phrase incomplète]`

[page 442]

Notons tout de suite deux corollaires.

Corollaire 4.15.7.2. *Supposons que $\mathcal{C}$ soit sans projecteurs. Alors $\underline{x} = (x_i)_{i\in I}$ est un ind-objet essentiellement constant si et seulement s'il existe un foncteur cofinal, $J \longrightarrow I$, avec J filtrant ([184]), de telle façon que le système inductif réindexé $(x_j)_{j\in J}$ soit isomorphe*

184. et on peut supposer $J = i_0\backslash I \xrightarrow{\text{can.}} I$

(dans la catégorie $\underline{\mathrm{Hom}}(J,\mathcal{C})$) *à un système inductif* constant *(i.e. défini par un foncteur constant $J \longrightarrow \mathcal{C}$: tous les x_j égaux à un même x, et les morphismes de transition des identités).*

La suffisance est claire, pour la nécessité on applique 4.15.7.1, qui nous dit qu'on peut réindexer de façon à satisfaire aux conditions 1°) à 4°) (pour des projecteurs p_j convenables dans les x_j). Mais l'hypothèse sur $\mathcal{C}$ implique que $p_j = \mathrm{id}_{x_j}\ \forall\, j \in \mathrm{Ob}\, J$, et les conditions 1°, 2°, 3° sont satisfaites tautologiquement pour un tel choix, la condition 4° signifie que les morphismes de transition sont des isomorphismes. Mais il est immédiat que pour un système inductif $(x_j)_{j\in J}$ donné, avec J 1-*connexe* (p.ex. J filtrant), la condition que les x_j sont des isomorphismes est nécessaire et suffisante pour que ce système soit isomorphe à un système inductif constant, d'où la conclusion.

p. 170

Corollaire 4.15.7.3. *Supposons que I soit grande devant π_0, où π_0 est un cardinal infini tel que $\pi_0 \geqslant \mathrm{card}\,\mathcal{C}$. Alors $(x_i)_{i\in I}$ est essentiellement constant si et seulement si on peut trouver un foncteur cofinal $J \longrightarrow I$ avec J grande devant π_0 (et ordonnée si on veut) ([185]), de telle façon que le système réindexé $(x_j)_{j\in J}$ satisfasse les conditions suivantes :* [page 443]

1°) L'application $j \longmapsto x_j$ de $\mathrm{Ob}\, J$ dans $\mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$ est constante, i.e. il existe un $x_0 \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$ tel que $x_j = x_0\ \forall\, j \in \mathrm{Ob}\, J$.

2°) Il existe un projecteur p dans x_0 tel que pour $j < j'$ dans J, on ait $\tau_{j',j} = p$.

3°) Le projecteur p admet une image dans $\mathcal{C}$.

Démonstration. Ces conditions impliquent évidemment celles de 4.15.7.1, en prenant $p_j = p\ \forall\, j \in \mathrm{Ob}\, J$, du moins si J n'admet de plus grand élément (ce qui fait une difficulté pour 2°). Mais si J admet un objet final, il en est de même de I, et il est clair alors que tout système inductif indexé par I est essentiellement constant. Donc, dans ces cas, les conditions 1°) 2°) 3°) ci-dessus impliquent que $\underline{x}$ est essentiellement constant. Inversement, supposons que $\underline{x}$ soit essentiellement constant, et prouvons que l'on peut [page 444] réindexer comme indiqué. Le cas où I admet un objet final est trivial, on prendra $J = e$, $p = \mathrm{id}$. Supposons donc que I n'ait pas d'objet final. Comme I grande devant π_0 et $\pi_0 > \mathrm{card}\,\mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$, on voit qu'il existe un $x_0 \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$ tel que la sous-catégorie pleine $I' = I_{x_0}$ de I, formée des i tels que $x_i = x_0$, soit cofinale dans I. Comme $(x_i)_{i\in I}$ est essentiellement constant, il en est de même de $(x_{i'})_{i'\in I'}$, et on peut lui appliquer le critère 4.15.7.1, avec $J \longrightarrow I'$ cofinal. La démonstration montrera de plus que si I' est grand devant π_0 ‖ (cardinal infini sans autres conditions), on peut supposer J grande devant π_0 ([186]). De plus, il est clair qu'on peut supposer J ordonnée. Comme $\pi_0 \geqslant \mathrm{card}\,\mathrm{Hom}(x_0,x_0)$, on voit encore qu'il existe un projecteur p dans x_0 tel que la partie $J_1 = J'$ de J, formée des j tels que $p_j = p$, soit cofinale. Étant cofinale, elle est également grande devant π_0. Donc on peut supposer que tous les p_j sont égaux à un même p. Les conditions 1°-4° deviennent :

1°) $p\tau_{j'j} = \tau_{j'j}p$ pour $j \leqslant j'$.

2°) Pour tout j, existe $j' \geqslant j$ avec

$$p\tau_{j'j} \;=\; \tau_{j'j}p \;=\; \tau_{jj'}\ .$$

3°) L'image $x_0^\natural$ du projecteur p dans x_0 existe.

4°) L'endomorphisme $\tau^\natural_{j'j}$ de $x_0^\natural$ est un isomorphisme, pour $j \leqslant j'$.

Or on a le [page 445]

185. La démonstration (légèrement réarrangée) montre qu'on peut prendre pour J une sous-catégorie (pas pleine) d'une catégorie $i_1\backslash I$, pour un objet convenable i_1 de I. On a donc $\mathrm{card}\, J \leqslant \pi$ si $\mathrm{card}\, I \leqslant \pi$, π étant un cardinal infini donné.

186. en tenir compte dans la démonstration de 4.15.7.1.

Lemme 4.15.7.4. *Soient $\mathcal{C}$ une catégorie, x_0 un objet de $\mathcal{C}$, p un projecteur dans x_0, τ un endomorphisme de x_0 satisfaisant les relations*

$$\tau p \;=\; p\tau \;=\; \tau\;, \tag{$*$}$$

et tel que l'automorphisme de $x_0^\natural \overset{\text{déf}}{=} \operatorname{Im} p$ (défini p.ex. comme objet de $\mathcal{C}^\wedge$, $x_0^\natural = \operatorname{Ker}(\mathrm{id}_{x_0}, p)$ soit l'identité. Alors on a $\tau = p$. p. 171

Démonstration de 4.15.7.4. On est ramené aussitôt, par le procédé standard, au cas où $\mathcal{C} = \mathrm{Ens}$, où la vérification est immédiate : les automorphismes τ de l'ensemble E $(= x)$ qui satisfait $(*)$ correspondent biunivoquement aux endomorphismes u de $E^\natural = pE$, via

$$\begin{cases} u \;\longmapsto\; \sigma u \rho \\ \tau \;\longmapsto\; \tau | E^\natural \end{cases} \qquad (\text{où} \quad E^\natural \underset{\rho}{\overset{\sigma}{\leftrightarrows}} E \quad \text{sont les flèches canoniques})\;,$$

donc $\tau | E^\natural = \mathrm{id} \Longrightarrow u = \sigma\rho = p$.

Choisissons un $j_0 \in J$, et considérons les homomorphismes

$$\tau^\natural_{j,j_0} \;:\; x_0^\natural \longrightarrow x_0^\natural$$

induits par les τ_{j,j_0} avec $j \geqslant j_0$. Ici encore, comme l'ensemble des isomorphismes possibles est de

cardinal $\leqslant \pi_1$, et J/j_0 est grande devant π_0, on voit qu'il existe $J' \subset j_0\backslash J$, cofinale dans $j_0\backslash J$, donc dans J, telle que pour $j \in J'$, les $\tau^\natural_{j,j_0}$ soient égaux à un même $\tau : x_0^\natural \xrightarrow{\sim} x_0^\natural$. Donc si $j', j'' \in J'$, avec $j' \leqslant j''$, on a [page 446]

$$\underbrace{\tau_{j''j_0}}_{\tau} \;=\; \tau_{j''j'}\, \underbrace{\tau_{j'j_0}}_{\tau}\;,$$

d'où

$$\tau_{j''j'} \;=\; \mathrm{id}_{x_0^\natural}\;,$$

puisque la flèche τ est un isomorphisme. Donc le système inductif réindexé par J', la condition 4° est remplacée par la condition plus stricte $\boxed{\text{4° bis) } \tau^\natural_{j',j} = \mathrm{id}_{x_0^\natural}.}$ Mais la condition 2° devient alors, grâce à 4.15.7.4,

$$\boxed{\text{2° bis) Pour tout } j, \text{ existe } j' \geqslant j \text{ avec } \tau_{j',j} = p}\;.$$

Donc, on peut supposer 1°, 2° bis, 3°, 4° bis (on désigne à nouveau par J, au lieu de J', l'ensemble ordonné grand devant π_0 indexant).

Soit K l'ensemble ordonné défini par

[page 447]

$$\begin{cases} \operatorname{Ob} K \;=\; \operatorname{Ob} J \\ \text{si } j, j' \in \operatorname{Ob} J, \text{ on a } j \overset{K}{\leqslant} j' \text{ si et seulement si } j \overset{\mathrm{J}}{=} j', \text{ ou } j \overset{J}{<} j' \text{ et } \tau_{j',j} = p\,. \end{cases}$$

Il est immédiat que c'est une *relation d'ordre* sur J (car $p^2 = p$), plus fin que la relation d'ordre initiale. Le système inductif induit sur K satisfait aux conditions 1°, 2°, 3° de 4.15.7.3. D'autre part, $K \longrightarrow J$ est cofinal, donc aussi le composé $K \longrightarrow J \longrightarrow I$. Il reste à prouver que K est grande devant π_0, donc que toute partie $K' \subset K$ telle que $\operatorname{card} K' \leqslant \pi_0$ admet un majorant dans K. Elle admet un majorant *dans* J, soit j. Par hypothèse 2 bis, il existe $j' \geqslant j$ tel que $\tau_{j'j} = p$, et on peut supposer $j' > j$. (En effet, si p. 172 $\tau_{j'j} = p$, on voit que la forme initiale 2°) de la condition 2° bis que l'on a $\tau_{j''j} = p$ pour [page 448]

tout $j'' \geqslant j'$, donc si j n'est par objet final de J, on peut supposer $j' > j$. Mais J n'a pas d'objet final, car sinon I en aurait un, cas que l'on avait éliminé. Donc il existe j' tel que $j' \overset{K}{>} j$.) Or on a ceci (qu'on applique au cas $i \in K'$) :

$$i \leqslant j \ \text{ et } \ j \overset{K}{<} j' \qquad \Longrightarrow \qquad i \overset{K}{<} j' \ .$$

$$\underbrace{x_i}_{=x_0} \xrightarrow{\tau_{j,i}} x_j \xrightarrow{\tau_{j',j}=p} x_{j'} \ ,$$

$$\tau_{j'i} \ = \ \tau_{j'j}\tau_{ji} = \underbrace{p\tau_{ji}}_{\overset{1^\circ}{=}\tau_{ji}p} \overset{?}{=} \ p \ ,$$

on a en effet

$$\left.\begin{aligned} \tau_{j',i} \ &= \ p\tau_{j',i} \\ \tau_{j',i} \ &- \ \tau_{j',i}p \end{aligned}\right\} \quad \overset{\text{par } 4.15.7.4}{\Longrightarrow} \quad \tau_{j',i} \ = \ p \ .$$

Cela achève la démonstration du corollaire 4.15.7.3.

Corollaire 4.15.7.5 (de 4.15.7.3). *Soit $(x_i)_{i\in I}$ un système inductif essentiellement constant grand devant $\pi_0 \geqslant \operatorname{card}\mathcal{C}$, dans $\mathcal{C}$* sans projecteurs. *Alors il existe $J \longrightarrow I$ cofinal, avec J ordonné grand devant π_0, et tel que le système inductif induit sur J soit* constant.

Démontrons le lemme 4.15.7.1. Il faut expliciter l'existence de deux flèches dans $\mathrm{Ind}(\mathcal{C})$,

$$z \underset{\beta}{\overset{\alpha}{\rightleftarrows}} \text{"}\varinjlim_{i\in I}\text{"} x_i \ = \ \underline{x} \ ,$$

avec $\beta\alpha = \mathrm{id}_z$, $\alpha\beta = \mathrm{id}_{\underline{x}}$. La donnée

de x équivaut à celle d'un élément de $\varinjlim_{i\in I} \mathrm{Hom}(z, x_i)$, et est donc donné par un [page 449]

$$\alpha_{i_0} \ : \ z \longrightarrow x_{i_0} \ ,$$

la donnée de β équivaut à celle d'un élément de $\varprojlim_{i\in I} \mathrm{Hom}(x_i, z)$, i.e. de flèches

$$\beta_i \ : \ x_i \longrightarrow z \ ,$$

avec la condition de compatibilité habituelle. Quitte à remplacer I par I', avec $I' \longrightarrow I$ cofinal, on peut supposer I ordonnée (et grande devant π_0, si I initiale l'était), et la condition de compatibilité sur les β_i s'écrit

$$\beta_i\tau_{ji} \ = \ \beta_j \qquad \text{si } i \leqslant j \text{ dans } I,$$

où $\tau_{ji} : x_i \longrightarrow x_j$ désigne la flèche de transition. Il faut expliciter, en termes de ces données, les conditions

$$\alpha\beta \ = \ \mathrm{id}_z \ , \qquad \beta\alpha \ = \ \mathrm{id}_{\underline{x}} \ .$$

p. 173

$$\begin{array}{ccccc} z & \xrightarrow{\alpha_{i_0}} & x_{i_0} & \xrightarrow{\tau_{i,i_0}} & x_i \\ & \searrow & \downarrow{\scriptstyle \beta_{i_0}} & \swarrow & {\scriptstyle \beta_i} \\ & & z & & \end{array}$$

La relation $\alpha\beta = \mathrm{id}_z$ équivaut à

$$\beta_{i_0}\alpha_{i_0} \ = \ \mathrm{id}_z \ , \qquad (*_{i_0})$$

elle implique d'ailleurs, en posant pour $i \geqslant i_0$,

$$\alpha_i \overset{\text{déf}}{=} \tau_{i,i_0}\alpha_{i_0} \ : \ z \longrightarrow x_i \ ,$$

que l'on a pour $i \geqslant i_0$

$$\beta_i\alpha_i \ = \ \mathrm{id}_z \qquad \forall\, i \geqslant i_0 \ . \tag{$*_i$}$$

Posons alors [page 450]

$$p_i \ = \ \alpha_i\beta_i \ : \ x_i \longrightarrow x_i \ ,$$

il est clair qu'on a

$$\begin{cases} p_i^2 \ = \ p_i \qquad (p_i \text{ un projecteur}) \\ \alpha_i \ : \ z \longrightarrow x_i \qquad \text{induit un isomorphisme} \\ \qquad z \xrightarrow{\sim} x_i^\natural \overset{\text{déf}}{=} \mathrm{Im}\, p_i \ = \ \mathrm{Ker}(\mathrm{id}_{x_i}, p_i) \ . \end{cases}$$

L'ensemble ordonné cofinal cherché J est $i_0\backslash I$, il est filtrant, et est grand devant π_0 si I l'est. À vrai dire, la réduction au cas I ordonné est inutile, on peut prendre directement $J = i_0\backslash I$, il est immédiat que J est filtrante (I l'étant), et $i_0\backslash I \longrightarrow I$ cofinal, enfin que si I est grande devant un cardinal infini π_0, il en est de même de $i_0\backslash I$.

Exprimons que $\beta\alpha = \mathrm{id}_{\underline{x}}$; or on voit que $\beta\alpha$ est défini par l'endomorphisme $(p_j)_{j\in J}$ du système inductif $(x_j)_{j\in J}$ – le fait que ce soit bien un endomorphisme de ce système, i.e. qu'on ait la relation 1°) de 4.15.7.1,

$$p_{j'}x_\lambda \ = \ x_\lambda p_\lambda \qquad \text{si } \lambda : j \longrightarrow j' \text{ dans } J,$$

est immédiat, ça s'écrit

$$\alpha_{j'}\underbrace{\beta_{j'}x_\lambda}_{\beta_j} \ = \ \underbrace{x_\lambda\alpha_j}_{\alpha_{j'}}\beta_j \ , \qquad \text{or les deux membres sont égaux à } \alpha_{j'}\beta_j.$$

Dire que c'est l'identité, est exprimé par la condition 2°) sur $(x_j, p_j)_{j\in J}$. La condition 3° est clair par construction, p_j admettant une image isomorphe à z par α_j. D'autre part, on voit [tout] de suite que pour une flèche $\lambda : j \longrightarrow j'$ de J, on a commutativité dans p. 174 [page 451]

$$\begin{array}{ccc} x_j & \xrightarrow{x_\lambda} & x_{j'} \\ \uparrow & & \uparrow \\ x_j^\natural & \xrightarrow{x_\lambda} & x_{j'}^\natural \\ \wr\uparrow{\scriptstyle \overline{\alpha_j}} & & \wr\uparrow{\scriptstyle \overline{\alpha_{j'}}} \\ z & \xrightarrow[\sim]{\mathrm{id}_z} & z \ , \end{array}$$

où $\overline{\alpha_j}$, $\overline{\alpha_{j'}}$ sont les isomorphismes définis par α_j, $\alpha_{j'}$ respectivement. Cela prouve que $x_\lambda^\natural$ est un isomorphisme.

Cela prouve que si $(x_i)_{i\in I}$ est essentiellement constant, il existe $J \longrightarrow I$ comme indiqué. L'inverse est également vrai, car on peut supposer $J = I$, puisque $(x_i)_{i\in I}$ et $(x_j)_{j\in J}$ définissent des ind-objets isomorphes. Alors le système inductif des $x_j^\natural$ a des morphismes de transition des isomorphismes, et comme J est filtrante donc 1-connexe, on en déduit facilement qu'il est isomorphe à un système inductif constant, de valeur z. En choisissant un tel isomorphisme [page 452]

$$z \xrightarrow[\sim]{\overline{\alpha_i}} x_i^\natural \ ,$$

on trouve $z \xrightarrow{\alpha} \underline{x}$, et le système des p_i définit des

$$x_i \xrightarrow{\overline{p_i}} x_i^\natural \xrightarrow{\overline{\alpha_j}^{-1}} z \ , \qquad \beta_i \overset{\text{déf}}{=} \overline{\alpha_j}^{-1}\overline{p_i}$$

et on voit facilement que l'on aura

$$\beta\alpha \ = \ id_z \ , \qquad \alpha\beta \ = \ \mathrm{id}_{\underline{x}} \ ,$$

q.e.d.

Je peux maintenant prouver 4.15.3. C'est en effet essentiellement la conjonction des 4.15.7.5 (p. 448), et de 4.8.13, qui nous dit essentiellement que si $\mathcal{C}$ est *karoubienne* (condition vérifiée si $\mathcal{C}$ est sans projecteurs), alors tout système inductif dans $\mathcal{C}$, grand devant π_0, où $\pi_0 \geqslant \operatorname{card} \text{réd}\,\mathcal{C}$, est essentiellement constant,

q.e.d.

4.15.8. Je veux revenir ici sur la démonstration inachevée de 4.8.13 (p. 212-216). Je reprends la démonstration où je l'avais laissée (p. 215). Il faut prouver que

p. 175 [page 453]

$$F(\xi) \ = \ \varinjlim_{i\in I} M_i$$

est de cardinal $\leqslant \pi_0$. J'ai annoncé qu'on peut se ramener au cas où M est un monoïde de monomorphismes, i.e. que $uv = uv' \Longrightarrow v = v'$ (pour $u, v, v' \in M$). Je vais expliciter cet argument.

Pour tout $i \in I$, soit

$$N_i \ = \ \left\{ u \in M \ \middle| \ \begin{array}{l} \text{l'ensemble } I_{i,u} \text{ des } j \in I \text{ tels} \\ j \geqslant i, \ \alpha_{ji} = u \text{ est cofinal} \\ \text{dans } I, \text{ i.e. pour tout } j_0 \in I, \\ \text{existe } j \in I_{i,u}, \text{ avec } j \geqslant j_0 \end{array} \right\} . \tag{4.15.8.1}$$

Comme I, donc $i\backslash I$ est grande devant π_0, et $\operatorname{card} M \leqslant \pi_0$, on voit aussitôt que

$$N_i \ \neq \ \emptyset \ . \tag{4.15.8.2}$$

(Si d'autre part $i' \geqslant i$, on trouve

$$N_i \ = \ N_{i'}\alpha_{i'i} \ . \tag{4.15.8.3}$$

L'inclusion $N_{i'}\alpha_{i'i} \subset N_i$ est ± tautologique, prouvons $N_i \subset N_{i'}\alpha_{i'i}$. Soit $u \in N_i$, l'ensemble $J = I_{i,u} \cap (i'\backslash I)$ des $j \geqslant i'$ tels que $\alpha_{ji} = u$ est cofinal dans I, donc grand devant π_0.

$$i \longrightarrow i' \xrightarrow[u=\alpha_{ji}]{\alpha_{ji'}} j$$

Donc il existe un $v \in M$ tel que l'ensemble J' de $j \in J$ tels que $\alpha_{ji'} = v$ soit cofinal dans J, donc dans I. Comme cet ensemble J' est contenu dans $I_{i',v}$, cela implique que $I_{i',v}$ est cofinal dans I, i.e. $v \in N_{i'}$. On a d'autre part, pour $j \in J'$,

[page 454]

$$\underbrace{\alpha_{ji'}}_{v}\alpha_{i'i} \ = \ \underbrace{\alpha_{ji}}_{u} \ ,$$

d'où $u = v\alpha_{i'i}$ avec $v \in N_{i'}$, d'où $u \in N_i\alpha_{i'i}$, q.e.d.)

p. 176

Pour $i \in I$, soit

$$\alpha_i \ : \ \underbrace{\mathrm{Hom}(\xi, \underbrace{x_i}_{=\xi})}_{=M} \ \longrightarrow \ \underbrace{\mathrm{Hom}(\xi, F) \ = \ F(\xi)}_{\simeq \varinjlim_i \mathrm{Hom}(\xi, x_i)}$$

le morphisme canonique. On trouve ceci :

(4.15.8.4) Si $u \in N_i$, alors la relation d'équivalence R_i dans M définie par α_i ($v \overset{R_i}{\sim} v' \iff \alpha_i(v) = \alpha_i(v')$) est égale à celle définie par l'application $v \longmapsto uv$ de M dans M, i.e.

$$\alpha_i(v) \ = \ \alpha_i(v') \qquad \Longleftrightarrow \qquad uv \ = \ uv' \ .$$

C'est immédiate, puisque $I_{i,u}$ étant cofinal dans I, on a $\alpha_i(v) = \alpha_i(v')$ si et seulement si $\exists\, j \in I_{i,u}$ avec $\alpha_{ji} v = \alpha_{ji} v'$, or $\alpha_{ji} = u$.

Pour $u \in M$, notons R_u la relation d'équivalence dans M définie par $v \longmapsto uv$. L'ensemble des relations d'équivalence dans $[M]$ obtenu ainsi est de cardinal $\leqslant \mathrm{card}\, M \leqslant$ [page 455] π_0, donc l'ensemble des relations d'équivalences R_i ($i \in I$) est lui aussi de cardinal $\leqslant \pi_0$. Cela montre, π_0 étant grand devant π_0, qu'il existe une relation d'équivalence de la forme R_u ($u \in M$), et un ensemble cofinal I' dans I, tel que $\forall\ i \in I'$ on ait $R_i = R_u$. Cela montre que, quitte à remplacer I par l'ensemble ordonné cofinal I', qu'on peut supposer que l'on a

$$R_i \ = \ R_u \qquad \forall\, i \in I \ . \tag{4.15.8.5}$$

Soit alors

$$E \ = \ M/R_u \ = \ M/R_i \qquad (\forall\ i \in I) \ ,$$

on voit donc que les $\alpha_{ji} \in M$ (pour $i \leqslant j$) sont tels que l'application

$$\tau_{\alpha_{ji}} \ : \ v \ \longmapsto \ \alpha_{ji} v \ : \ M \ \longrightarrow \ M$$

est compatible avec la relation d'équivalence R_u, donc passe au quotient en une application

$$\overline{\alpha_{ji}} \ : \ E \ \longmapsto \ E \ ,$$

laquelle est d'ailleurs *injective.*

Soit M' le sous-monoïde de M formé des $u \in M$ qui ont la propriété de stabilité précédente, ainsi que la propriété d'injectivité qu'on vient de dire, et $\overline{M'}$ le monoïde image de M' dans le monoïde

$$\mathrm{Mon}(E) \ \subset \ \mathrm{End}_{\mathrm{Ens}}(E)$$

des applications injectives de E dans lui-même. On voit donc que le système inductif [page 456] donné, défini par les α_{ji}, prend ses valeurs dans le sous-monoïde M' de M (i.e. de la sous-catégorie correspondante de la catégorie B_M), et que la limite inductive $F(\xi)$ qui nous intéresse (pour prouver $\mathrm{card}\, F(\xi) \leqslant \pi_0$) est isomorphe à la limite inductive du système inductif d'un système d'ensembles tous égaux à E, les morphismes de transition étant les $\overline{\alpha_{ji}} \in \overline{M'} \subset \mathrm{Mon}(E)$. De plus, on aura $\mathrm{card}\, \overline{M'} \leqslant \mathrm{card}\, M \leqslant \pi_0$. Le résultat $\mathrm{card}\, F(\xi) \leqslant \pi_0$ voulu résultera alors du

Lemme-clef 4.15.8.1. *Soit M un monoïde de monomorphismes (i.e. tel que $uv = uv' \Longrightarrow v = v'$, pour $u, v, v' \in M$), et soit $(\alpha_{ji})_{i \leqslant j}$ un système inductif dans B_M, indexé par un ensemble ordonné I grand devant π_0, où π_0 est un cardinal infini tel que* $\mathrm{card}\, M \leqslant \pi_0$. p. 177
Alors il existe un $i_0 \in I$ tel que pour tout $i \geqslant i_0$, $\alpha_{i_0,i}$ soit un isomorphisme. [page 457]

Si on applique ce lemme au cas de $\overline{M'}$ et du $\overline{\alpha_{ji}}$, on trouve donc qu'il existe un $i_0 \in I$ tel que les $\overline{\alpha_{ji_0}}$ soient des isomorphismes. Cela implique que $F(\xi) \simeq \varinjlim_i \underbrace{E_i}_{E}$ est isomorphe à E_{i_0}, donc est de cardinal égal à $\operatorname{card} E_{i_0} = \operatorname{card} E \leqslant \pi_0$, ce qui achèvera la démonstration.

D'ailleurs, l'énoncé 4.8.13 implique 4.15.8.1, car dans le système inductif des $(M_i = M, \alpha_{ji})$, de $\varinjlim$ égale à $F(\xi)$, s'il n'existait *pas* de i_0 comme stipulé dans 4.15.8.1, alors on en conclurait aisément que l'on aurait $\operatorname{card} F(\xi) > \pi_0$, contrairement à 4.8.13. Nous allons dégager ceci dans un lemme :

[page 458]

Lemme 4.15.8.2. *Soit $(E_i)_{i\in I}$ un système inductif d'ensembles, indexé par un ensemble ordonné I grand devant π_0. On suppose qu'il existe $i_0 \in I$ tel que*

a) $i \geqslant i_0$ implique $\operatorname{card} E_i = \pi_0$, *et*

b) $j \geqslant i \geqslant i_0$ implique que $u_{ji} : E_i \longrightarrow E_j$ est un monomorphisme. Supposons de plus

c) $\forall\, i \geqslant i_0\ \exists\, j > i$ tel que u_{ji} ne soit pas *un isomorphisme (i.e. ne soit pas surjectif).*

Soit $E_\infty = \varinjlim_{i\in I} E_i$. Alors $\operatorname{card} E_\infty > \pi_0$.

Ce lemme implique donc l'*équivalence* de 4.8.13 et du "lemme-clef" 4.15.8.1. Pour prouver 4.15.8.2, nous allons prouver quelque chose d'un peu plus précis :

Corollaire 4.15.8.3. *Sous les conditions de 4.15.8.2, soit α_0 le premier ordinal tel que* $\operatorname{card} \alpha_0 > \pi_0$, *et soit I_{α_0} l'ensemble des ordinaux $\beta < \alpha$ (ensemble ordonné qui est grand devant π_0). Il existe alors une application strictement croissante*

$$I_{\alpha_0} \longrightarrow I\ , \qquad \alpha \longmapsto i_\alpha\ , \qquad \textit{appliquant } 0 \textit{ dans } i_0\ ,$$

tel que pour tout $\alpha \in I_{\alpha_0}$, on ait

[page 459]

$$\underbrace{u_{i_{\alpha+1},i_\alpha}}_{\substack{\textit{c'est un monomorphisme,}\\ \textit{d'après b, vu que } i_{\alpha+1}>i_\alpha\geqslant i_0}} \qquad \textit{n'est pas un isomorphisme } ([187]).$$

On a alors

$$E'_\infty \overset{\text{déf}}{=} \underbrace{\varinjlim_{\alpha\in I_{\alpha_0}} E_{i_\alpha}} \hookrightarrow \varinjlim_{i\in I} E_i \overset{\text{déf}}{=} E_\infty$$

et

$$\operatorname{card} E'_\alpha \geqslant \underbrace{\operatorname{card} I_{\alpha_0}}_{\substack{=\ \textit{successeur de } \pi_0}} > \pi_0\ ,$$

d'où $\operatorname{card} E_\infty \geqslant \operatorname{card} E'_\infty > \pi_0$.

Démonstration. La construction des i_α par récurrence transfinie est immédiate, en utilisant c) et le fait que I est grande devant π_0, et que pour tout $\alpha \in I_{\alpha_0}$, l'ensemble I_α des $\beta < \alpha$ est de cardinal $\leqslant \pi_0$. Le fait que $E'_\infty \longrightarrow E_\infty$ soit injectif résulte de b). Le fait que

p. 178

$$\operatorname{card} E'_\infty \geqslant \operatorname{card} I_{\alpha_0}$$

résulte du fait que E'_∞ est réunion croissante de sous-ensembles identifiés à E_{i_α}, et pour tout α on peut trouver un

[page 460]

$$\xi_\alpha \in E_{i_\alpha} \setminus \bigcup_{\beta<\alpha} E_{i_\beta}\ .$$

L'application

$$\begin{aligned} \alpha &\longmapsto \xi_\alpha \\ I_{\alpha_0} &\longrightarrow E'_\infty \end{aligned}$$

187. *mieux* : $\forall\, \alpha \in I_{\alpha_0}\ \varinjlim_{\beta\in I_\alpha} E_{i_\beta} \longrightarrow E_{i_\alpha}$ n'est pas surjectif.

est injective, donc $\operatorname{card} E'_\infty \geqslant \operatorname{card} I_{\alpha_0}$.

Corollaire 4.15.8.4. *Pour un M et un π_0 donnés, pour que le lemme-clef 4.15.8.1 soit valable, il faut et il suffit qu'il le soit dans le cas où $I = I_{\alpha_0}$, α_0 étant le premier ordinal tel que $\operatorname{card} \alpha_0 > \alpha_0$. Il revient au même qu'on ne puisse trouver de système inductif $(\alpha_{ji})_{j \geqslant i}$ indexé par I_{α_0}, à valeurs dans M, tel que pour $i < j$, on ait α_{ji} non inversible dans M.*

[page 461]

Je vais résumer ce qui a été obtenu dans un énoncé récapitulatif :

Théorème 4.15.9. *Soient $\mathcal{C}$ une petite catégorie, π un cardinal tel que $\pi \geqslant \operatorname{card} \mathcal{C}$. Les conditions suivantes sont équivalentes (et je conjecture qu'elles sont toujours satisfaites) :*

a) $\mathcal{M} \overset{\text{déf}}{=} \operatorname{Ind}_\pi \mathcal{C}$ *est réduit à $\mathcal{M}_\pi$.*

a′) (Si $\mathcal{C}$ est karoubienne.) Tout système inductif $\underline{x} = (x_i)_{i \in I}$ dans $\mathcal{C}$, grand devant π, est essentiellement constant.

a″) Pour tout système inductif $(x_i)_{i \in I}$ dans $\mathcal{C}$, grand devant π, il existe un foncteur cofinal $J \longrightarrow I$, avec J ensemble ordonné grand devant π, et tel que le système réindexé $(x_j)_{j \in J}$ satisfasse les conditions suivantes :

1) Tous les x_j sont égaux à un même élément x de $\mathcal{C}$.

2) Il existe un projecteur p dans x, tel que l'on ait $\alpha_{j'j} = p$ pour $j < j'$ $(j, j' \in J)$, où $\alpha_{j'j} : x_j \longrightarrow x_{j'}$ est la flèche de transition.

b) Pour tout $x \in \operatorname{Ob} \mathcal{C}$, et pour tout monoïde quotient M' de $M = \operatorname{End}_{\mathcal{C}}(x)$, tel que M' soit un monoïde de monomorphismes (i.e. $uv = uv' \Longrightarrow v = v'$ si $u, v, v' \in M'$), et pour tout système inductif grand devant π à valeurs dans $B_{M'}$ (définie par un système d'éléments $(\alpha_{ji})_{i \leqslant j,\ i,j \in I}$ d'un ensemble ordonné I grand devant π, avec $\alpha_{kj}\alpha_{ji} = \alpha_{ki}$ pour $i \leqslant j \leqslant k$), il existe $i_0 \in I$ tel que $\alpha_{ii_0} = 1$ pour $i \geqslant i_0$, i.e. [page 462] *$\alpha_{ji} = 1$ pour $j \geqslant i \geqslant i_0$.*

b′) M' étant un monoïde de monomorphismes comme dans b) (donc $\operatorname{card} M' \leqslant \operatorname{card} \mathcal{C} \leqslant \pi$), soit de plus α_0 le plus petit ordinal tel que $\operatorname{card} \alpha_0 > \pi$, et soit $I = I_{\alpha_0}$ l'ensemble ordonné des ordinaux $\alpha < \alpha_0$ (lequel ensemble est grand devant π). Il n'existe pas *de système inductif dans $B_{M'}$, tel que pour $i < j$ dans I, α_{ji} soit un élément non inversible dans M' (donc $u \longmapsto \alpha_{ji}u : M' \longrightarrow M'$ est injectif mais non surjectif).*

Signalons tout de suite le p. 179

Corollaire 4.15.10. *Les conditions équivalentes précédentes sont satisfaites, si $\pi > \operatorname{card} \mathcal{C}$.*

En effet, soit α_1 le plus petit ordinal tel que $\operatorname{card} \alpha_1 > \operatorname{card} \mathcal{C}$. Donc $\pi_1 \overset{\text{déf}}{=} \operatorname{card} \alpha_1$ est le successeur de $\pi_0 \overset{\text{déf}}{=} \operatorname{card} \mathcal{C}$, et on a $\pi \geqslant \pi_1$, donc (si α_0 est comme explicité dans b′ ci-dessus) $\operatorname{card} \alpha_0 > \pi_1$, donc $\alpha_1 < \alpha_0$. Soit (avec les notations de b′), pour $\alpha \in I$ [plutôt $\alpha \in I_{\alpha_0}$], i.e. $\alpha < \alpha_0$,

$$M_\alpha \ = \ \varinjlim_{i<\alpha} \underbrace{M_i}_{=M} \ ,$$

on voit donc, comme les α_{ji} sont injectifs et non surjectifs, que

$$\operatorname{card} M_\alpha \ \geqslant \ \operatorname{card} \alpha \ ,$$

et que pour $\alpha < \beta$, on a

[463]

$$M_\alpha \ \hookrightarrow \ M_\beta \qquad \text{injectif} \ .$$

Appliquons ceci au cas où $\alpha = \alpha_1$, donc on trouve

$$\operatorname{card} M_{\alpha_1} \ \geqslant \ \operatorname{card} \alpha_1 \ = \ \pi_1 \ ,$$

d'autre part, en prenant $\beta = \alpha_1 + 1$, d'où $M_\beta \simeq M$, on trouve une injection

$$M_{\alpha_1} \ \hookrightarrow \ M \ ,$$

d'où

$$\pi_1 \;=\; \operatorname{card} M_{\alpha_1} \;\leqslant\; \operatorname{card} M \;=\; \pi_0 \;,$$

une contradiction, ce qui établit b′.

Corollaire 4.15.11. *Soit $\mathcal{C}$ une catégorie essentiellement petite, π un cardinal tel que $\pi > \operatorname{card}\operatorname{réd}\mathcal{C}$. Soit $\mathcal{M} \overset{déf}{=} \operatorname{Ind}_\pi \mathcal{C}$, alors $\mathcal{M} = \mathcal{M}_\pi$, et c'est une enveloppe de Karoubi de $\mathcal{C}$.*

On peut supposer $\mathcal{C}$ réduite, donc $\operatorname{card}\mathcal{C} < \pi$, et on applique le corollaire précédent.

Ainsi, le résultat litigieux 4.8.13 (p. 212) est finalement prouvé sous une forme légèrement plus faible, avec $\pi > \operatorname{card}\operatorname{réd}\mathcal{C}$ au lieu de $\pi \geqslant \operatorname{card}\operatorname{réd}\mathcal{C}$. Du même coup, les applications de 4.8.13 qu'on a fait jusqu'à présent (notamment le lemme 4.15.3).

[464]

4.16 Exemples et questions

4.16.0. J'avais cru que tout foncteur "raisonnable" (ou plus précisément, tout foncteur "logiquement accessible") entre catégories accessibles devrait être accessible. Ce n'est malheureusement pas vrai, puisqu'un composé de deux foncteurs Hom

$$\mathrm{Ens} \longrightarrow \mathrm{Ens} \;, \qquad E \longmapsto \underbrace{\operatorname{Hom}(\operatorname{Hom}(E,I),J)}_{J^{(I^E)}}$$

est non accessible, si I, J sont tous deux de cardinal $\geqslant 2$. Prenant p.ex. $I = J = \{0,1\}$, on trouve le foncteur p. 180

$$E \longmapsto \mathfrak{P}(\mathfrak{P}(E)) \;,$$

qui n'est pas accessible.

4.16.1. Deuxième désillusion : j'avais cru que pour toute catégories accessible $\mathcal{M}$, toute sous-catégorie $\mathcal{N}$ strictement pleine et stable par facteurs directs "raisonnable" (p.ex. "logiquement accessible") devrait être accessible dans $\mathcal{M}$. Il n'en est rien, même dans le cas particulier de l'image inverse de la sous-catégorie accessible dans Ens

[465]

$$\underbrace{\mathrm{Ens}^*}_{=\{E\in\mathrm{Ens}\,|\,E\neq\emptyset\}} \qquad \subset\ \mathrm{Ens}$$

par un contrafoncteur accessible *représentable*

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{M} & \longrightarrow & (\mathrm{Ens})^\circ \\ x & \longmapsto & \operatorname{Hom}_{\mathcal{M}}(x,z) \;, \end{array}$$

i.e. la sous-catégorie ouverte (donc strictement pleine) $\mathcal{M}_z$ de $\mathcal{M}$ formée des objets x tels que $\operatorname{Hom}_{\mathcal{M}}(x,z) \neq \emptyset$, n'est par toujours accessible dans $\mathcal{M}$. Ici, je ne suis pas parvenu à un exemple aussi élémentaire (cf. appendice) – j'ai pris $\mathcal{M} = (k\text{-alg. comm.})$, k un corps infini et z l'objet initial k de $\mathcal{M}$ – j'ai trouvé que $\mathcal{M}_z$ n'est pas L_π-stable dans $\mathcal{M}$, quelque soit le cardinal π – mais cet exemple utilisait que $\mathfrak{U} = \mathfrak{U}_1$, plus petit univers contenant $\mathbf{N}$. J'ignore si pour tout autre univers, on peut trouver un corps k de cardinal $\pi \in \mathfrak{U}$ assez grand, de façon que tout π-ultrafiltre sur un ensemble $E \in \mathfrak{U}$ soit trivial. Peut-être un tel exemple, où non la construction du couple $(\mathcal{M},\mathcal{N})$, mais la démonstration du fait que $\mathcal{N}$ n'est pas accessible dans $\mathcal{M}$, fait appel à des hypothèses particulières sur l'univers ambiant, ne doit pas être considéré comme (tout à fait !) "logiquement accessible". Pour être vraiment probant, il faudrait un exemple de nature plus élémentaire. [466]

Il reste la possibilité qu'il y ait un théorème métamathématique qui assure que tout couple $(\mathcal{M},\mathcal{N})$ logiquement accessible, avec $\mathcal{M}$ accessible, et $\mathcal{N}$ sous-catégorie strictement pleine L_π-stable dans $\mathcal{M}$ pour π assez grand, soit accessible dans $\mathcal{M}$ ([188]). Ceci

188. C'est faux, même pour une sous-catégorie fermée, cf. 4.16.7.10 ci-dessous.

s'appliquerait en particulier au cas d'une sous-catégorie *fermée* : toute sous-catégorie fermée (qui soit logiquement accessible) serait accessible dans $\mathcal{M}$. L'exemple-test le plus simple serait celui du complémentaire fermé $\mathcal{M}'_z$ de la sous-catégorie ouverte $\mathcal{M}_z$ ci-dessus ([189]), i.e. la catégorie des $x \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$ tels que $\mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(x,z) = \emptyset$, ou encore l'image [467]
inverse de la sous-catégorie fermée accessible

$$e \;=\; \{\emptyset\} \;\subset\; (\mathrm{Ens})$$

réduite à $\{\emptyset\}$, par le foncteur représentable $x \longmapsto \mathrm{Hom}(x,z) : \mathcal{M} \longrightarrow \mathrm{Ens}$. Il se pourrait donc qu'une telle catégorie soit toujours accessible dans $\mathcal{M}$. Mais j'ai été incapable de le prouver, même dans le cas particulier ci-dessus, où $\mathcal{M} = (k\text{-alg. comm.})$, k étant un corps commutatif infini. La difficulté est (dans tous les cas) la suivante : trouver, p. 181
pour z fixé, un cardinal $\pi > \pi_0$ tel que pour tout $x \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$, et tout système (ou *un* système) π_0-π-adapté $(x_i)_{i\in I}$ de limite inductive x_0 (π_0 un cardinal donné, utile pour $\mathcal{M}$), *si* $\mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(x,z)$ ($\simeq \varprojlim \mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(x_i,z)$) est vide, alors $\exists\, i_0 \in I$ tel que $\mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(x_{i_0},z)$ soit déjà vide. Dans l'exemple $\mathcal{M} = (k\text{-alg. comm.})$, il faut donc prouver que l'on peut trouver un cardinal π tel que pour tout k-algèbre A avec $\mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(A,k) = \emptyset$, il existe une sous-$k$-algèbre A_i de cardinal $\leqslant \pi$, telle que $\mathrm{Hom}_k(A_i,k) = \emptyset$ ([190]). J'ai tendance à croire que ça doit être vrai (et même sans supposer que k soit un corps, et aussi en prenant la condition $\mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(A,Z) = \emptyset$, où Z est un objet quelconque de $\mathcal{M}$). Ce genre de questions [468]
semble étonnement délicat …

4.16.2. Il est possible, plus généralement, que la question suivante ait une réponse affirmative : Soit

$$f \;:\; \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{N}^\circ$$

un foncteur accessible, avec $\mathcal{M}$, $\mathcal{N}$ catégories accessibles, et soit $\underline{T}$ une sous-catégorie de $\mathcal{N}$ accessible dans $\mathcal{N}$, et telle qu'il existe un cardinal π ayant les propriétés suivantes : $\mathcal{N}^\circ$ satisfait L_π (i.e. $\mathcal{N}$ stable par $\varprojlim$ grandes devant π_1). Alors $\underline{S} \overset{\text{déf}}{=} f^{-1}(\underline{T})$ est-elle accessible dans $\mathcal{M}$ ([191]) ? Ceci généralise le cas $\mathcal{N} = (\mathrm{Ens})$, $\underline{T} = \{\emptyset\}$, f foncteur représenté par $z \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$, envisagé tout à l'heure. Avec le même type d'exemple, mais en prenant $\mathcal{N} = (\mathrm{Ens})^*$ au lieu de $\mathcal{N} = \{\emptyset\}$, on voit que la condition supplémentaire de stabilité sur $\underline{T}$ n'est pas superflue. (**N.B.** Elle sont à assurer que $\underline{S}$ est L_π-stable dans $\mathcal{M}$ pour π [469]
grand.)

4.16.3. Questions apparentée : j'avais espéré que pour un foncteur accessible entre catégories accessibles

$$f \;:\; \mathcal{N} \longrightarrow \mathcal{M}\ ,$$

la $\natural$-image essentielle, formée des $y \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$ qui sont isomorphes à un facteur direct d'un objet de la forme $f(x)$, avec $x \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{N}$, serait accessible dans $\mathcal{N}$. L'exemple ci-dessus (nullement élémentaire !) de la sous-catégorie $\mathcal{M}_z$ de $\mathcal{M}$ (formée des $x \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$ tels que $\mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(x,z) \neq \emptyset$) montre qu'il n'en est rien. En effet, $\mathcal{M}_z$ est l'image essentielle, et aussi l'image $\natural$-essentielle, du foncteur

$$\mathcal{M}/z \longrightarrow \mathcal{M}\ ,$$

or $\mathcal{M}/z$ est accessible, et le foncteur précédent accessible, si $\mathcal{M}$ est accessible (vérification par AQT `[âne qui trotte]`, cf. plus bas, énoncé plus général).

On a l'impression que la raison pour laquelle on a de tels contre-exemples, c'est que l'on a des $\natural$-images essentielles qui ne sont L_π-stables dans $\mathcal{M}$ pour aucun cardinal $\pi \in \mathfrak{U}$. [470]
Cela amène à modifier la conjecture ainsi : soit π un cardinal tel que $\mathcal{M}$ satisfasse à L_π, et soit $\underline{S}(\pi)$ la plus petite sous-catégorie strictement pleine de $\mathcal{M}$, L_π-stable dans $\mathcal{M}$, et

189. **N.B.** elles est accessible dans $\mathcal{M}$ si et seulement si $\mathcal{M}_z$ l'est ! p. 182
190. C'est faux, cf. annotation marginale p. 466.
191. Faux, avec $\mathcal{N} = \mathrm{Ens}$ et un foncteur représentable $\mathcal{M} \longrightarrow \mathrm{Ens}^\circ$, prenant $I = \{\emptyset\}$, cf. annotations marginales p. 466, 467.

qui contienne l'image essentielle de f. (On pourrait appeler $\underline{S}(\pi)$ la L_π-image essentielle.) Alors $\underline{S}(\pi)$ est accessible dans $\mathcal{M}$. De plus, la famille (décroissante) des $\underline{S}(\pi)$, pour π variable, est stationnaire, i.e. il existe un cardinal π tel que $\pi' \geqslant \pi$ implique $\underline{S}(\pi') = \underline{S}(\pi)$. Il est clair alors que $\underline{S}(\pi)$ est la plus petite sous-catégorie de $\mathcal{M}$ qui soit accessible dans $\mathcal{M}$ et qui contienne l'image essentielle de f. La même question se pose pour un foncteur $g^\circ : \mathcal{N}^\circ \longrightarrow \mathcal{M}$, où $g : \mathcal{N} \longrightarrow \mathcal{M}^\circ$ est un foncteur accessible, $\mathcal{N}$ et $\mathcal{M}$ accessibles. Je conjecture que la réponse est encore affirmative.

[471] Soit $\mathcal{M}$ une catégorie satisfaisant la condition L, et admettant une petite sous-catégorie pleine strictement génératrice $\mathcal{C}$, formée d'objets accessibles. On a donc un foncteur pleinement fidèle et accessible

$$\mathcal{M} \hookrightarrow \mathcal{C}^\wedge ,$$


$\mathcal{M}$ L_π-stable dans $\mathcal{C}^\wedge$ pour π convenable. Si $\overline{\mathcal{M}}$ est l'image essentielle, de sorte que $\mathcal{M} \simeq \overline{\mathcal{M}}$, c'est donc une sous-catégorie strictement pleine L_π-stable dans $\mathcal{C}^\wedge$. Donc on s'attend à ce qu'elle soit accessible dans $\mathcal{C}^\wedge$ (si la situation décrite est "logiquement accessible"), ou ce qui revient au même, que $\mathcal{M}$ soit accessible. (Comparer 4.8.1, p. 187.) Mais il ne doit pas être difficile ([192]), en procédant à un nombre $\pi_{\mathfrak{U}}$ de choix (où $\pi_{\mathfrak{U}} = \operatorname{card} \mathfrak{U}$), de faire quand même des exemples ("logiquement inaccessibles") d'une sous-catégorie strictement pleine $\mathcal{M}$ de $\mathcal{C}^\wedge$ qui soit L_π-stable, mais non accessible dans $\mathcal{C}^\wedge$. Cette $\mathcal{M}$ admet donc une petite sous-catégorie strictement génératrice formée d'objets accessibles ([193]) et satisfait à L_π, sans pourtant être accessible.

[472] **4.16.4** ([194]). Soit $\mathcal{M}$ une catégorie telle que $\mathcal{M}$ et $\mathcal{M}^\circ$ soient accessibles. Je conjecture qu'alors $\mathcal{M}$ est essentiellement petite. Plus généralement, supposons $\mathcal{M}$ accessible, et que $\mathcal{M}$ admette une petite sous-catégorie qui soit *strictement co*génératrice. Alors $\mathcal{M}$ est-elle essentiellement petite ? Plus généralement, si $\mathcal{M}$ admet une petite sous-catégorie strictement génératrice, et aussi une petite sous-catégorie strictement cogénératrice, i.e. si $\mathcal{M}$ et $\mathcal{M}^\circ$ sont toutes deux équivalentes à des sous-catégories pleines d'une $\mathcal{C}^\wedge$, avec $\mathcal{C}$ petite, alors $\mathcal{M}$ est-elle essentiellement petite ?

4.16.5. Soit I une petite catégorie, $I_\bullet$ le cône droit sur I (obtenu en rajoutant un objet final e), $\mathcal{M}$ une catégorie accessible,

$$\underline{\mathrm{Hom}}_\square(I_\bullet, \mathcal{M}) \hookrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(I_\bullet, \mathcal{M})$$

la sous-catégorie strictement pleine de la catégorie (accessible) $\underline{\mathrm{Hom}}(I_\bullet, \mathcal{M})$, formée des foncteurs f qui font de $f(e)$ la limite inductive dans $\mathcal{M}$ des $f(i)$ ($i \in \mathrm{Ob}\, I$). Cette sous-catégorie est L_π-stable pour π grand, donc il y a lieu de conjecturer qu'elle est accessible [473] dans $\underline{\mathrm{Hom}}(I_\bullet, \mathcal{M})$. (Je rappelle qu'on a vu dans 4.14 que c'est OK si les $\varinjlim$ de type I sont représentables dans $\mathcal{M}$. Et qu'une réponse affirmative, dans le cas où p. 183



implique que la sous-catégorie $\underline{\mathrm{Ép}}(\mathcal{M})$ dans $\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M})$ est accessible dans $\underline{\mathrm{Fl}}(\mathcal{M})$.)

192. OK en prenant un *fermé* $\underline{S}$ non accessible dans $\mathcal{M}$ d'une catégorie accessible $\mathcal{M}$, qu'on plonge dans un $\mathcal{C}^\wedge$. Mais ces $\underline{S}$ n'a *pas* une petite famille strictement génératrice !

193. Ce n'est pas clair, il faudrait pour cela que le foncteur d'inclusion soit un adjoint à gauche !

194. descendre après 4.16.5.

N.B. Si $\mathcal{M}$ admet une petite sous-catégorie *co*génératrice, alors la question est justiciable de la conjecture 4.16.2 relative à un foncteur accessible $\mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{N}^\circ$, ici $\underline{\mathrm{Hom}}(I_\bullet, \mathcal{M}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(I^\circ \times \mathcal{C}, \mathrm{Ens})^\circ \ldots$

4.16.6. Il reste la question de l'accessibilité relative d'une catégorie $\mathcal{E}$ sur une petite catégorie $\mathcal{C}$. Je pense à présent, grâce à 4.15.9, et son corollaire 4.15.10, que l'énoncé suivant doit "tomber" par AQT `[âne qui trotte]` :

Proposition 4.16.6.1. *Soit $f : \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{C}$ un foncteur, avec $\mathcal{C}$ petite catégorie karoubienne. On suppose que f satisfait la condition $H' = H$ (1+2+3) de 4.15.1 (page 415), où il suffit H 2, H 3, pour toute flèche λ* non identique *de $\mathcal{C}$. On suppose de plus que pour une catégorie $\mathcal{C}'$ d'un des deux types qu'on va décrire, et un foncteur $\mathcal{C}' \longrightarrow \mathcal{C}$, $\mathcal{E}' = \mathcal{E} \times_{\mathcal{C}} \mathcal{C}'$ soit accessible, et $\mathcal{E}' \longrightarrow \mathcal{C}'$ accessible.* [474]

(*On prend pour $\mathcal{C}'$ la catégorie*

$$\mathcal{Q} = \left\{ \begin{array}{l} \xi_0 = \xi^{\natural} \underset{\rho}{\overset{\sigma}{\rightleftarrows}} \xi \circlearrowright p \quad \text{avec } u_0 : \xi_0 \to \eta \text{ et } u = u_0\rho : \xi \to \eta \\ \qquad\qquad \rho\sigma = \mathrm{id}_{\xi_0} \\ \qquad\qquad \sigma\rho = p\,, \quad \textit{d'où} \left\{ \begin{array}{lcl} p^2 & = & p \\ p\sigma & = & \sigma \\ \rho p & = & \rho \end{array} \right. \\ \qquad\qquad u = u_0\rho\,, \quad \textit{d'où} \left\{ \begin{array}{lcl} up & = & u \\ u\sigma & = & u_0 \end{array} \right. \end{array} \right.$$

(trois objets ξ, ξ_0, η et cinq flèches non identiques σ, ρ, p, u_0, u, liés par les relations ci-dessus), ou la catégorie (isomorphe à Q°)

$$\mathcal{Q}' = \left\{ \begin{array}{l} \xi_0 \underset{\rho}{\overset{\sigma}{\rightleftarrows}} \xi \circlearrowright p \quad \text{avec } u_0 : \xi_0 \to \eta \text{ et } u : \xi \to \eta \\ \left. \begin{array}{lcl} \rho\sigma & = & \mathrm{id}_{\xi_0} \\ \sigma\rho & = & p \end{array} \right\} \Longrightarrow \left\{ \begin{array}{lcl} p^2 & = & p \\ p\sigma & = & \sigma \\ \rho p & = & \rho \end{array} \right. \\ u = \sigma u_0 \Longrightarrow \left\{ \begin{array}{lcl} pu & = & u \\ \rho u & = & u_0 \end{array} \right. \end{array} \right.$$

On se limite aux foncteurs $\mathcal{Q} \longrightarrow \mathcal{C}$, $\mathcal{Q}' \longrightarrow \mathcal{C}$ tels que p soit transformé en une flèche non identique *de $\mathcal{C}$ ([195]) (donc la condition relative à $\mathcal{Q}$, $\mathcal{Q}'$ devient vide, si $\mathcal{C}$ est sans projecteurs).*)

Sous ces conditions, $\mathcal{E}$ est accessible, et $f : \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{C}$ est accessible.

On trouve alors le p. 184 [page 475]

Corollaire 4.16.6.2. *Soit $f : \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{C}$ un foncteur. Conditions équivalentes :*

a) Pour toute catégorie $\mathcal{C}'$ petite *et* karoubienne, *et tout foncteur $\mathcal{C}' \longrightarrow \mathcal{C}$, $\mathcal{E}' = \mathcal{E} \times_{\mathcal{C}} \mathcal{C}'$ est accessible, et le foncteur $\mathcal{E}' \longrightarrow \mathcal{C}'$ est accessible.*

b) Comme a), mais $\mathcal{C}'$ étant une des trois catégories Δ_1, $\mathcal{Q}$, $\mathcal{Q}'$ (où $\mathcal{Q}$, $\mathcal{Q}'$ sont définies dans 4.15.6.1 ci-dessus).

b′) ([196]). (Si $\mathcal{C}$ est sans projecteurs.) Comme b), mais en se limitant au cas $\mathcal{C}' = \mathbf{\Delta}_1$ (à l'exclusion de $\mathcal{Q}$, $\mathcal{Q}'$).

Corollaire 4.16.6.3. *Supposons $f : \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{C}$ fibrant ou cofibrant. Alors les conditions équivalentes précédentes impliquent que :*

1°) Les $\mathcal{E}_s$ sont accessibles ($s \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$).

2°) Pour toute flèche $\lambda : s \longrightarrow t$ dans $\mathcal{C}$, le foncteur $\lambda^* : \mathcal{E}_t \longrightarrow \mathcal{E}_s$ (resp. $\mathcal{E}_s \longrightarrow \mathcal{E}_t$) est accessible.

195. Je ne suis pas sûr si c'est raisonnable – à vérifier avec soin !
196. ?, à vérifier avec soin !

D'autre part, l'ensemble de ces conditions 1°, 2°) équivaut à la validité de b) ci-dessus, dans le cas $\mathcal{C}' = \mathbf{\Delta}_1$*, ou encore à la validité de a) ci-dessus, quand* $\mathcal{C}'$ *est* sans projecteurs. [page 476]

Question 4.16.6.4. *Les conditions 1° et 2° précédentes impliquent-elles celles de 4.16.6.2 ? En d'autres termes, si la catégorie base* $\mathcal{C}$ *est égale à* $\mathcal{Q}$ *ou à* $\mathcal{Q}'$*, alors ces conditions impliquent-elles que* $\mathcal{E}$ *est accessible, et* $f : \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{C}$ *accessible ?*

Ça semble idiot de ne pas connaître la réponse !

4.16.6.5. J'ai envie d'appeler catégorie *accessible sur* $\mathcal{C}$, une catégorie $\mathcal{E}$ sur $\mathcal{C}$ satisfaisant les conditions équivalentes de 4.16.6.1 – du moins dans le cas où on suppose $\mathcal{C}$ petite. Pour que cette terminologie soit vraiment satisfaisant, il faudrait que l'on sache prouver que ces conditions impliquent ceci : pour toute catégorie accessible $\mathcal{M}$ et tout foncteur accessible $\mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{C}$, la catégorie $\mathcal{E} \times_{\mathcal{C}} \mathcal{M}$ est accessible, et le foncteur $\mathcal{E} \times_{\mathcal{C}} \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{M}$ est accessible.

[page 476bis]

L'idée, c'est qu'on appellerait (sous hypothèse de petitesse) *catégorie accessible* $\mathcal{E}$ sur une autre $\mathcal{C}$, une catégorie ayant la propriété qu'on vient de dire – mais en supposant maintenant de plus que $\mathcal{C}$ satisfasse à L_π, j'imagine, pour tout foncteur accessible $\mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{C}$, avec $\mathcal{M}$ accessible, $\mathcal{E} \times_{\mathcal{C}} \mathcal{M}$ est accessible et le foncteur canonique $\mathcal{E} \times_{\mathcal{C}} \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{E}$ est accessible.

[page 477]

4.16.7. Retour sur les sous-catégories fermées d'une catégorie accessible (4.16.1).

Proposition 4.16.7.1. *Soient* $\mathcal{M}$ *une catégorie accessible,* $(\underline{S}_i)_{i\in I}$ *une famille de sous-catégories fermées accessibles dans* $\mathcal{M}$*. On ne suppose que* $\operatorname{card} I$ *soit petit. Soit* $\underline{S}$ *la sous-catégorie strictement pleine de* $\mathcal{M}$ *telle que* $\operatorname{Ob}\underline{S} = \bigcup_{i\in I} \operatorname{Ob}\underline{S}_i$*. Alors pour que* $\underline{S}$ *soit accessible dans* $\mathcal{M}$*, il faut et il suffit qu'il existe une* petite *partie* $J \subset I$*, telle que* $\operatorname{Ob}\underline{S} = \bigcup_{i\in J} \underline{S}_i$*. (En particulier, si* I *est ordonnée, et* $i \longmapsto \underline{S}_i$ *croissante et grande devant tout petit cardinal, il faut et il suffit qu'il existe un* $i \in I$ *tel que* $\underline{S} = \underline{S}_i$*, i.e. tel que* $j \geqslant i$ *implique* $\underline{S}_j = \underline{S}_i$*.)* p. 185

C'est évidemment suffisant, en vertu de 4.13… Prouvons inversement que si $\underline{S}$ est accessible dans $\mathcal{M}$, alors la condition précédente est satisfaite. Soit π un cardinal $\geqslant \pi_0$ tel que $\underline{S}$ soit π-accessible dans $\mathcal{M}$, donc

$$\underline{S} \xleftarrow{\sim} \operatorname{Ind}_\pi \underline{S}(\pi) , \qquad \text{où } \underline{S}(\pi) = \underline{S} \cap \mathcal{M}_\pi.$$

[page 478]

Soit $\underline{S}(\pi)_0$ une sous-catégorie réduite de $\underline{S}(\pi)$, telle que $\underline{S}(\pi)_0 \hookrightarrow \underline{S}(\pi)$ soit une équivalence, de sorte que $\underline{S}(\pi)_0$ est petite. Pour tout $x \in \operatorname{Ob}\underline{S}(\pi)_0$, soit $i_x \in I$ tel que $x \in \operatorname{Ob}\underline{S}_{i_x}$. Soit J l'ensemble de tous les i_x, que est une petite partie de I, et soit $\underline{S}_J$ la sous-catégorie strictement pleine de $\mathcal{M}$ ayant pour ensemble d'objets $\bigcup_{j\in J} \operatorname{Ob}\underline{S}_j$. Donc $\underline{S}(\pi)_0$ est contenue dans $\underline{S}_J$, donc aussi $\underline{S}(\pi)$, puisque $\underline{S}_J$ est strictement pleine :

$$\underline{S}(\pi) \hookrightarrow \underline{S}_J .$$

D'ailleurs $\underline{S}_J$ est accessible dans $\mathcal{M}$ (loc. cit.), et est fermée dans $\mathcal{M}$ comme réunion de sous-catégories fermées, *a fortiori elle satisfait à* L_π. Donc, comme $\underline{S}(\pi) \subset \underline{S}_J$, le foncteur essentiellement surjectif $\operatorname{Ind}_\pi(\underline{S}(\pi)) \longrightarrow \underline{S}$ se factorise par $\underline{S}_J$. Donc $\underline{S}_J \hookrightarrow \underline{S}$ est essentiellement surjectif, et comme $\underline{S}_J$ est strictement pleine, on en conclut $\underline{S}_J = \underline{S}$, q.e.d.

[page 479]

Proposition 4.16.7.2. *Soient* $\mathcal{M}$ *une catégorie accessible,* x *un objet de* $\mathcal{M}$*, et* ${}_x\mathcal{M}$ *la sous-catégorie fermée de* $\mathcal{M}$ *engendrée par* x*, formée des* $y \in \operatorname{Ob}\mathcal{M}$ *tels que* $\operatorname{Hom}(x, y) \neq \emptyset$*, i.e. l'image essentielle de* $x\backslash\mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{M}$*. Alors* ${}_x\mathcal{M}$ *est une sous-catégorie de* $\mathcal{M}$ *accessible dans* $\mathcal{M}$*.*

En effet, c'est l'image inverse de la sous-catégorie Ens* accessible dans Ens par le foncteur représentable (donc accessible)

$$h_x \ : \ y \longmapsto \mathrm{Hom}(x,y) \ : \ \mathcal{M} \ \longrightarrow \ \mathrm{Ens} \ ,$$

donc est accessible dans $\mathcal{M}$ en vertu de 4.13…

Corollaire 4.16.7.3. *Soit $\mathcal{M}$ une catégorie accessible, $\underline{S}$ une sous-catégorie fermée. Pour que $\underline{S}$ soit accessible, il faut et il suffit qu'il existe une* petite *partie J de $\underline{S}$, telle que* $\mathrm{Ob}\,\underline{S} = \bigcup_{x\in J} \mathrm{Ob}\,({}_x\mathcal{M})$.

En effet, on a

$$\mathrm{Ob}\,\underline{S} \ = \ \bigcup_{x\in \mathrm{Ob}\,\underline{S}} \mathrm{Ob}\,({}_x\mathcal{M}) \ ,$$

i.e. $\underline{S}$ apparaît comme réunion de la famille (pas nécessairement petite) de sous-catégories [page 480]
fermées ${}_x\mathcal{M}$ de $\mathcal{M}$ (indexées par $x \in \mathrm{Ob}\,\underline{S}$), accessibles dans $\mathcal{M}$ en vertu de 4.16.7.2. Donc notre assertion est un cas particulier de 4.16.7.1.

On peut aussi, pour toute partie petite J de $\mathrm{Ob}\,\underline{S}$, considérer la sous-catégorie fermée p. 186
$\underline{S}_J \subset \underline{S}$ de $\mathcal{M}$ engendrée par J. L'ensemble I des parties J en question, ordonné par inclusion, est grand devant tout cardinal $\pi \in \mathfrak{U}$, et $\underline{S}$ est réunion croissante des $\underline{S}_J$. D'autre part, la proposition nous dit que $\underline{S}$ est accessible dans $\mathcal{M}$ si et seulement s'il existe un $J \in I$, tel que $\underline{S}_J = \underline{S}$, i.e. tel que $\underline{S}_J = \underline{S}_{J'}$ pour $J \subset J'$.

Proposition 4.16.7.4. *Soit $\mathcal{M}$ une catégorie accessible. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

a) Il existe une sous-catégorie $\underline{S}$ de $\mathcal{M}$ fermée dans $\mathcal{M}$, et non accessible dans $\mathcal{M}$.

b) Soit I l'ensemble des ordinaux α tels que $\mathrm{card}\,\alpha \in \mathfrak{U}$, *i.e. des ordinaux α qui sont* [page 481]
dans $\mathfrak{U}$. Donc $I = I_{\alpha_0}$, où α_0 est le plus petit ordinal qui n'appartienne pas à $\mathfrak{U}$, et I est grand devant tout petit cardinal π, i.e. devant tout cardinal dans $\mathfrak{U}$ ([197]). La condition envisagée est la suivante :

Il existe une suite transfini

$$\underline{x} \ = \ (x_\alpha)_{\alpha\in I}$$

d'éléments de $\mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$, *telle que l'on ait*

$$\mathrm{Hom}(x_\beta, x_\alpha) \ = \ \emptyset \qquad\qquad \textit{si } \beta < \alpha.$$

De façon précise, pour une telle suite transfinie, soit $\underline{S}$ ou ${}_{\underline{x}}\mathcal{M}$ la sous-catégorie fermée de $\mathcal{M}$ engendrée par la famille des x_α, i.e. telle que $\mathrm{Ob}\,\underline{S} = \bigcup_{\alpha\in I} \mathrm{Ob}\ {}_{x_\alpha}\mathcal{M} = \bigcup_{\alpha\in I} x_\alpha \setminus \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$. *Alors ${}_{\underline{x}}\mathcal{M}$ est une sous-catégorie fermée non accessible dans $\mathcal{M}$, et toute sous-catégorie fermée non accessible dans $\mathcal{M}$ s'obtient de cette façon.*

Démonstration. Considérons une suite $\underline{x} = (x_\alpha)_{\alpha\in I}$ comme dessus. Si J est une petite partie de I, il existe un $\alpha \in I$ qui majore les $\beta \in J$, donc $\mathrm{Hom}(x_\beta, x_\alpha) = \emptyset$, pour $\beta \in J$, ce qui signifie que x_α n'appartient à aucune des $\underline{S}_\beta = {}_{x_\beta}\mathcal{M}$, pour $\beta \in J$. Donc [page 482]
$\underline{S}$ n'est par réunion d'une petite sous-famille de la famille des ${}_{x_\alpha}\mathcal{M}$, donc en vertu de 4.16.7.1, $\underline{S}$ n'est par accessible dans $\mathcal{M}$.

Inversement, soit $\underline{S}$ une telle sous-catégorie dans $\mathcal{M}$. Considérons un bon ordre sur $\mathrm{Ob}\,\underline{S}$ (objets s_α), et construisons la suite des x_α ($\geqslant s_\alpha$) par récurrence transfinie ([198]).

1) On choisit $x_0 =$ premier élément de $\mathrm{Ob}\,\underline{S}$ (existe, car $\mathrm{Ob}\,\underline{S} \neq \emptyset$, i.e. $\underline{S} \neq \emptyset$, car sinon, $\underline{S}$ serait accessible dans $\mathcal{M}$).

2) Si les x_β ($\beta < \alpha$) sont construits, on prend pour x_α le premier élément de $\underline{S}$ majorant les x_β et qui n'appartient pas à la sous-catégorie fermée de $\mathcal{M}$ engendrée par

197. introduire $I = I_{\mathfrak{U}}$ avant l'énoncé de la proposition.

198. **N.B.** On a $\mathrm{card}\,\underline{S} \notin \mathfrak{U}$, sinon, $\underline{S}$ serait petite, donc accessible dans $\mathcal{M}$, contrairement à l'hypothèse.

les x_β ($\beta < \alpha$). (Cette sous-catégorie fermée est $\subset \underline{S}$, et $\neq \underline{S}$, car $\underline{S}$ n'est pas accessible dans $\mathcal{M}$.) On a donc bien

$$\mathrm{Hom}(x_\beta, x_\alpha) \;=\; \emptyset \qquad\qquad \text{si } \beta < \alpha.$$

Ainsi, la récurrence transfinie se poursuit sur I tout entier. On voit par récurrence transfinie qu'on a, pour tout $\alpha \in I$, p. 187 [page 483]

$$s_\alpha \;\leqslant\; x_\alpha$$

(card $x_\alpha > x_\beta \geqslant s_\beta$ pour $\beta < \alpha$, donc $x_\alpha > s_\beta$ pour tout $\beta < \alpha$, ce qui équivaut à $x_\alpha \geqslant s_\alpha$). De plus, on trouve aussi, par récurrence transfinie, que

$$\beta \;<\; \alpha \qquad \Longrightarrow \qquad \begin{array}{l} s_\beta \text{ appartient à la sous-catégorie} \\ \text{fermée } \underline{S}_\alpha \text{ de } \mathcal{M} \text{ engendrée par} \\ \text{les } x_{\beta'} \text{ avec } \beta' < \alpha. \end{array} , \qquad (*)$$

puisque par construction s_α est le *premier* des éléments de $\underline{S}$ qui n'est *pas* dans ladite sous-catégorie $\underline{S}_\alpha$ de $\mathcal{M}$. Cela montre que tout s_β appartient à la sous-catégorie fermée ${}_{\underline{x}}\mathcal{M}$ de $\mathcal{M}$ engendrée par la famille de *tous* les x_α, donc on trouve que $\underline{S} \subset {}_{\underline{x}}\mathcal{M} \subset \underline{S}$, donc $\underline{S} = {}_{\underline{x}}\mathcal{M}$, q.e.d.

Proposition 4.16.7.5. *Pour un univers $\mathfrak{U}$ donné (contenant $\mathcal{N}$ comme élément), les conditions suivantes sont équivalentes :*

1) Il existe une catégorie $\mathfrak{U}$-accessible $\mathcal{M}$ ayant une sous-catégorie fermée non accessible dans $\mathcal{M}$.

b) Il existe une catégorie $\mathcal{C} \in \mathfrak{U}$, et une suite transfinie d'éléments de [page 484]

$$\mathcal{C}^\wedge \;\overset{\text{déf}}{=}\; \underline{\mathrm{Hom}}(\mathcal{C}, \mathrm{Ens}_{\mathfrak{U}}) \;,$$

$\underline{x} = (x_\alpha)_{\alpha \in I}$, indexée par l'ensemble de tous les ordinaux $\alpha \in \mathfrak{U}$, et telle que

$$\mathrm{Hom}(x_\alpha, x_\beta) \;=\; \emptyset \qquad\qquad \textit{si } \alpha < \beta.$$

Démonstration. On a b) $\Longrightarrow$ a) en prenant $\mathcal{M} = \mathcal{C}^\wedge$, en vertu de la proposition précédente. On voit de même a) $\Longrightarrow$ b), en plongeant $\mathcal{M}$ dans une catégorie $\mathcal{C}^\wedge$ ($\mathcal{C}$ étant une petite sous-catégorie strictement génératrice de $\mathcal{M}$).

Je n'ai pas été capable ([199]) de construire une suite $(x_\alpha)_{\alpha \in I}$ comme exigée dans cette proposition, ni de prouver qu'une telle suite n'existe pas, même dans un cas particulier tel que $\mathcal{M} = (k\text{-alg. comm.})$, k un anneau commutatif. Je n'ai pas même prouvé qu'on ne puisse trouver une suite transfinie de *corps* k_α, ayant les propriétés dites.

A fortiori, je n'ai pu tirer au clair la question si une sous-catégorie $\underline{L}$-stable d'une catégorie $\mathcal{M}$ accessible est toujours accessible dans $\mathcal{M}$ ([200]). Il se pourrait qu'il n'y ait pas de tel cas. Il se pourrait aussi qu'il y en ait, même avec une sous-catégorie fermée (laquelle est stable par tout type de $\varinjlim$ représentable dans $\mathcal{M}$, sauf la $\varinjlim$ sur une catégorie d'indices vide ...). [page 485]

Pour les sous-catégories *ouvertes*, je rappelle que j'ai construit (dans l'appendice) un exemple d'une telle sous-catégorie, non accessible dans $\mathcal{M}$. Au sujet des sous-catégories ouvertes, je signale ici l'énoncé (quasi tautologique) : p. 188

Proposition 4.16.7.6 ([201]). *Soient $\mathcal{M}$ une catégorie accessible, $\underline{S}$ une sous-catégorie* ouverte *de $\mathcal{M}$. Pour que $\underline{S}$ soit accessible dans $\mathcal{M}$, il faut et il suffit qu'elle soit $\underline{L}$-stable* [page 486]

199. Mais si, finalement, cf. 4.16.7.10 plus bas.

200. C'est faux, cf. plus bas.

201. Cette proposition et son corollaire sont contenus dans 4.16.7.8 ci-dessous, il n'y a pas lieu d'en faire un énoncé séparé.

dans $\mathcal{M}$, i.e. qu'il existe un cardinal π_0 tel que $\mathcal{M}$ satisfasse à L_{π_0}, et que $\underline{S}$ soit stable dans $\mathcal{M}$ par $\varinjlim$ de type L_{π_0}. De façon plus précise, si cette condition est satisfaite, alors pour tout cardinal π tel que $\pi \geqslant \pi_0$ et que π soit utile pour $\mathcal{M}$, $\underline{S}$ est π-accessible dans $\mathcal{M}$. Ou encore : si π est un cardinal utile pour $\mathcal{M}$, alors $\underline{S}$ est π-accessible dans $\mathcal{M}$ si et seulement s'il est L_π-stable dans $\mathcal{M}$.

Cette dernière assertion résulte aussitôt du corollaire suivant, lui-même tautologique.

Corollaire 4.16.7.7. *Soit π un cardinal comme indiqué ci-dessus, soit $\underline{S}(\pi) = \underline{S} \cap \mathcal{M}_\pi$, et soit $x \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$ et*

$$x \simeq \varinjlim_{i \in I} x_i \qquad \begin{cases} x_i \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}_\pi \\ I \text{ grande devant } \pi \end{cases}$$

une représentation de x comme image essentielle d'un objet de $\mathrm{Ind}_\pi\,\mathcal{M}_\pi$. Alors $x \in \mathrm{Ob}\,\underline{S}$ $\iff x_i \in \mathrm{Ob}\,\underline{S}(\pi)\ \forall\, i \in I$.

J'ai finalement tiré au clair la question de l'accessibilité des sous-catégories ouvertes et des sous-catégories fermées d'une catégorie accessible : [page 487]

Proposition 4.16.7.8. *Soient $\mathcal{M}$ une catégorie accessible, $\underline{S}$ une sous-catégorie fermée de $\mathcal{M}$, $\underline{T}$ la sous-catégorie ouverte complémentaire de $\underline{S}$, π un cardinal infini utile pour $\mathcal{M}$. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

a) $\underline{S}$ est π-accessible dans $\mathcal{M}$.

a′) $\underline{S}$ est le fermé engendré par $\underline{S}(\pi) \overset{\text{déf}}{=} \underline{S} \cap \mathcal{M}_\pi$, i.e. pour $x \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$, on a $x \in \mathrm{Ob}\,\underline{S}$ si et seulement si $\exists\, \xi \in \mathrm{Ob}\,\underline{S}(\pi)$ tel que $\mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(\xi, x) \neq \emptyset$.

b) $\underline{T}$ est π-accessible dans $\mathcal{M}$.

b′) $\underline{T}$ est $\underline{L}_\pi$-stable dans $\mathcal{M}$.

Notons tout de suite le

Corollaire 4.16.7.9. *Pour $\mathcal{M}$, $\underline{S}$, $\underline{T}$ comme dessus, conditions équivalentes :*

a) $\underline{S}$ est accessible dans $\mathcal{M}$.

a′) Il existe une petite *partie A de $\mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$, telle que $\underline{S}$ soit la sous-catégorie fermée ${}_A\mathcal{M}$ engendrée par A, i.e. $\underline{S} = \bigcup_{\xi \in A} {}_\xi\mathcal{M}$, où ${}_\xi\mathcal{M}$ est la sous-catégorie fermée de $\mathcal{M}$ formée des $x \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$ tel que $\mathrm{Hom}(\xi, x) \neq \emptyset$.*

b) $\underline{T}$ est accessible dans $\mathcal{M}$. [page 488]

b′) $\underline{T}$ est $\underline{L}$-stable dans $\mathcal{M}$. p. 189

Corollaire 4.16.7.10. *Soit $\mathcal{M}$ une catégorie accessible. Les conditions suivantes sont équivalentes* ([202]).

a) Il existe une sous-catégorie fermée de $\mathcal{M}$, non accessible dans $\mathcal{M}$.

b) Il existe une sous-catégorie ouverte dans $\mathcal{M}$, non accessible dans $\mathcal{M}$.

c) Il existe une suite transfinie

$$\underline{x} = (x_\alpha)_{\alpha \in I}$$

d'objets de $\mathcal{M}$, indexée par l'ensemble I des ordinaux de l'univers de référence $\mathfrak{U}$, telle que l'on ait

$$\mathrm{Hom}(x_\alpha, x_\beta) = \emptyset \qquad \text{pour } \alpha < \beta.$$

202. Exemple où ces conditions sont satisfaites : $\mathcal{M} = (k\text{-alg. comm.})$, k un corps commutatif infini, $\mathfrak{U}$ étant le plus petit univers tel que $\mathbf{N} \in \mathfrak{U}$.

En effet, l'équivalence de a) et b) est claire par le corollaire précédent, et celle de a) et c) n'est autre que 4.16.7.4.

Démonstration de 4.16.7.8. Nous aurons à utiliser le

Lemme 4.16.7.11. *Soient $\mathcal{M}$ une catégorie accessible, π un cardinal utile pour $\mathcal{M}$, $\underline{S}$ une sous-catégorie pleine de $\mathcal{M}$, $\underline{S}(\pi) \overset{déf}{=} \underline{S} \cap \mathcal{M}_\pi$, d'où un foncteur pleinement fidèle*

$$\varphi \ : \ \mathrm{Ind}_\pi(\underline{S}(\pi)) \longrightarrow \mathcal{M} \ .$$

[page 489]

a) Soit $x \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$. Pour que x appartienne à l'image essentielle du foncteur ψ, il faut et il suffit que la sous-catégorie pleine $\underline{S}(\pi)/x$ de la catégorie $\mathcal{M}_\pi/x$ (qui est filtrante et même grande devant π) soit cofinale (donc aussi grande devant π).

b) Pour que $\underline{S}$ soit π-accessible dans $\mathcal{M}$, il faut et il suffit que pour tout $x \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$, on ait

$$x \ \in \ \mathrm{Ob}\,\underline{S} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \underline{S}(\pi)/x \text{ est cofinale dans } \mathcal{M}_\pi/x$$

(ou encore, que $\underline{S}$ satisfasse à L_π, et que pour tout x dans $\mathcal{M}$, on ait

$$x \ \in \mathrm{Ob}\,\underline{S} \qquad \Longrightarrow \qquad \underline{S}(\pi)/x \text{ cofinale dans } \mathcal{M}_\pi/x.)$$

Démonstration. La partie b) est une conséquence tautologique de a), que je vais prouver. Dire que x est dans l'image essentielle de $\underline{S}$, signifie que

$$x \ \simeq \ \varinjlim_{i \in I} x_i \ , \qquad (*)$$

avec I grande devant π et les x_i dans $\underline{S}(\pi)$. On sait que $(*)$ implique (I étant filtrante, et $\mathcal{M}$ étant équivalente à $\mathrm{Ind}_\pi(\mathcal{M})$ puisque π utile pour $\mathcal{M}$) que $I \longrightarrow \mathcal{M}_\pi/x$ est cofinale (4.4.2, page 79). Or ce foncteur se factorise par le foncteur d'inclusion pleinement fidèle $\underline{S}(\pi)/x \hookrightarrow \mathcal{M}_\pi/x$, lequel est cofinal si et seulement s'il satisfait la condition F 1. Il est immédiat que cette condition est satisfaite quand elle est satisfaite pour le foncteur composé en question, ce qui est bien le cas par hypothèse. p. 190

Inversement, supposons que $\underline{S}(\pi)/x$ soit cofinale dans $\mathcal{M}_\pi/x$. Comme on a [page 490]

$$x \xleftarrow{\sim} \varinjlim_{\mathcal{M}_\pi/x} x_i \ ,$$

π étant utile pour $\mathcal{M}$, on aura aussi par cofinalité

$$x \xleftarrow{\sim} \varinjlim_{\underline{S}(\pi)/\pi} x_i \ ,$$

or $\mathcal{M}_\pi$ étant grande devant π, il en est de même de la sous-catégorie pleine cofinale $\underline{S}(\pi)/x$. Donc x est dans l'image essentielle de $\mathrm{Ind}_\pi\,\underline{S}(\pi)$, q.e.d.

Lemme 4.16.7.12. *Soient I une catégorie filtrante, J une sous-catégorie fermée, K la sous-catégorie ouverte complémentaire. On a alors les équivalences*

$$J \neq \emptyset \iff J \text{ cofinale} \iff K \text{ non cofinale} \iff K \neq I \ .$$

Démonstration immédiate.

Je reviens à la démonstration de 4.16.7.8. On applique le lemme 4.16.7.11 à $\mathcal{M}$, π, et aux deux sous-catégories $\underline{S}$, $\underline{T}$ de $\mathcal{M}$, en notant que pour $x \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{M}$, $\underline{S}(\pi)/x$ est une [page 491]

sous-catégorie fermée de $\underline{S}(\pi)$, dont le complémentaire ouvert est $\underline{T}(\pi)/x$, de sorte qu'on peut appliquer le lemme 4.16.7.12. On trouve :

$$\underline{S}\ \pi\text{-accessible} \overset{4.16.7.11}{\iff} \forall\, x \in \operatorname{Ob}\mathcal{M},\ \text{on a}\ (x \in \operatorname{Ob}\underline{S} \iff \underline{S}(\pi)/x\ \text{cofinale dans}\ \mathcal{M}_\pi/x)$$

$$\iff \forall\, x \in \operatorname{Ob}\mathcal{M},\ \text{on a}\ \Big(\underbrace{x \notin \operatorname{Ob}\underline{S}}_{\text{(i.e. } x \in \operatorname{Ob}\underline{T}\text{, par 4.16.7.12)}} \iff \underbrace{\underline{S}(\pi)/x\ \text{non cofinale dans}\ \mathcal{M}_\pi/x}_{\text{(i.e. } \underline{T}(\pi)/x\ \text{cofinale dans}\ \mathcal{M}_\pi\text{, par 4.16.7.12)}} \Big)$$

$$\overset{4.16.7.11}{\iff} \underline{T}\ \text{est}\ \pi\text{-accessible.}$$

On a donc l'équivalence de a) et b). D'autre part, $\underline{S}(\pi)/x$ cofinale dans $\mathcal{M}_\pi/x$ signifie simplement $\underline{S}(\pi)/x \neq \emptyset$ (4.16.7.12), donc $\underline{S}$ π-accessible signifie que $\underline{S}$ est formée des $x \in \operatorname{Ob}\mathcal{M}$ tels que $\underline{S}(\pi) \neq \emptyset$, ce qui signifie aussi que $\underline{S}$ est le fermé dans $\mathcal{M}$ engendré par $\underline{S}(\pi)$, d'où a $\iff$ a′. D'autre part, l'équivalence b $\iff$ b′ n'est autre que 4.6.7.6 (dernière formulation).

[page 492]

4.17 Retour sur les paratopos, et sur les opérations $\mathcal{M}\boxtimes\mathcal{N}$, $\underline{\mathrm{Hom}}_!(\mathcal{M},\mathcal{N})$

[Ce paragraphe n'existe pas.]

p. 191
[page 1]

Appendice

Ultraproduits de corps, et catégories accessibles

Soit $(k_\xi)_{\xi\in E}$ une famille de corps, indexé par un ensemble E. (Soit Φ un filtre non trivial dans E, i.e. une partie $\Phi \subset \mathfrak{P}(E)$ telle que :

a) $\emptyset \notin \Phi$, i.e. $A \in \Phi \Longrightarrow A \neq \emptyset$.

b) $A, B \in \Phi \Longrightarrow A \cap B \in \Phi$.

c) Si $A \in \Phi$, $A \subset B$, alors $B \in \Phi$.

d) $\Phi \neq \emptyset$ ($\iff E \in \Phi$).

(Cela revient à dire que Φ est une partie fermée de l'ensemble ordonné $\mathfrak{P}(E)$, *filtrante à gauche*, et ne contient pas le plus petit élément de $\mathfrak{P}(E)$, i.e. non égale à $\mathfrak{P}(E)$ tout entier.)) Pour toute partie J de E, posons

$$k_J = \prod_{\xi\in J} k_\xi\ ,$$

on a donc un système projectif

$$(k_J)_{J\in\mathfrak{P}(E)}\ , \qquad \text{i.e. } J \subset J' \text{ donne } k_{J'} \longrightarrow k_J\ ,$$

et le système

$$(k_J)_{J\in\Phi}$$

est un système inductif d'annaux, indexé par l'ensemble ordonné filtrant Φ^o. Posons

$$k_\Phi = \varinjlim_{J\in\Phi} k_J\ .$$

[page 2]

Si Ψ est un filtre plus fin que Φ, i.e. tel que $\Psi \supset \Phi$, on trouve un homomorphisme canonique

$$k_\Phi \longrightarrow k_\Psi \ ,$$

donc si $\mathcal{F}(E) = \mathcal{F}$ est l'ensemble des filtres sur E, ordonnés par inclusion, on trouve un système inductif

$$\Phi \longmapsto k_\Phi \ : \ \mathcal{F} \longrightarrow \mathrm{Ann} \ .$$

On n'a pas utilisé encore que les k_ξ sont des corps, en fait il suffirait que ce soient des objets d'une catégorie $\mathcal{A}$ stable par petits produis et par petits $\varinjlim$ filtrantes. Prenons maintenant $\mathcal{A} = \mathrm{Ann}$ (catégorie des anneaux unitaires, non nécessairement commutatifs), et supposons que les k_ξ soient des corps.

Proposition 1. *Supposons que les k_ξ ($\xi \in E$) soient des* corps ([203]). *Pour que k_Φ soit un corps, il faut et il suffit que Φ soit un ultrafiltre, i.e. que pour toute décomposition $E = A \amalg B$, on ait $A \in \Phi$ ou $B \in \Phi$.* (NB Si $A \in \Phi$, on a $B \notin \Phi$, puisque sinon, on aurait $A \cap B \in \Phi$, donc $\emptyset \in \Phi$, absurde.) p. 192

Nécessité : Soit, pour toute partie A de E,

$$f_A \in k_E \qquad \text{défini par} \qquad f_A(\xi) \ = \ \begin{cases} 1_{k_\xi} & \text{si} \quad \xi \in A \\ 0_{k_\xi} & \text{si} \quad \xi \in E \backslash A \ . \end{cases}$$

Soit [page 3]

$$f_{A,\Phi} \ \in k_\Phi$$

l'image de f_A par l'homomorphisme canonique $k_E \longrightarrow k_\Phi$. Si $E = A \amalg B$, on aura

$$f_A \ + \ f_B \ = \ 1 \ , \qquad f_A \, f_B \ = \ 0 \ ,$$

d'où

$$f_{A,\Phi} \ + \ f_{B,\Phi} \ = \ 1 \ , \qquad f_{A,\Phi} \, f_{B,\Phi} \ = \ 0 \ .$$

Si k_Φ est un corps, cela implique qu'on a $f_{A,\Phi} = 0$ ou $f_{B,\Phi} = 0$. Mais si p.ex. $f_{A,\Phi} = 0$, on voit que cela signifie qu'il existe un $J \in \Phi$ tel que $f_A | J = 0$, ce qui signifie aussi que $J \subset B$. De même, si $f_{B,\Phi} = 0$, on aura $J \subset A$. Donc Φ est un ultrafiltre.

Inversement, supposons que Φ soit un ultrafiltre. Prouvons que k_Φ est un corps, i.e. que pour $f \in k_\Phi$, $f \neq \emptyset \Longrightarrow f$ inversible. Notons que f provient d'un élément d'un k_J ($J \in \Phi$), donc est l'image canonique d'un $g \in k_E$. Dire que $f = 0$ signifie que $\exists \ J \in \Phi$ tel que $g|J = 0$. L'inverse $f \neq 0$ signifie donc que pour tout $J \in \Phi$, on a $g|J \neq \emptyset$.

Soit alors A l'ensemble des $\xi \in E$ tel que $g(\xi) \neq \emptyset$, $B = E \backslash A$ l'ensemble des $\xi \in E$ tels que $g(\xi) \neq \emptyset$. On a donc $B \notin \Phi$ puisque $f \neq 0$, et comme Φ est un ultrafiltre, on a donc $A \in \Phi$. Mais soit $g' \in k_E$ défini par $g'(\xi) = f(\xi)^{-1}$ si $\xi \in A$, $g'(\xi) = 1$ si $\xi \in B$, et soit f' l'image de g' dans k_Φ. On voit alors qu'on a [page 4]

$$f \ f' \ = \ f' \ = \ f \ = \ 1 \ ,$$

ce qui montre bien que k_Φ est un corps.

Supposons maintenant que tous les k_ξ ($\xi \in E$) soient égaux à un même corps k. Alors les k_J forment un système projectif de k-algèbres, les k_Φ un système inductif de k-algèbres. Si k est commutatif, il en est de même des k_J, k_Φ, et en particulier pour Φ un ultrafiltre, k_Φ est une *extension* du corps k.

Revenons au cas général, mais les k_ξ commutatifs. Soit $\mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}$ l'ensemble des ultrafiltres sur E. Notons que pour tout $\Phi \in \mathcal{F}$, $k_E \longrightarrow k_\Phi$ est surjectif. Donc si $\Phi \in \mathcal{F}$, k_Φ s'identifie à un corps quotient de l'anneau k_E. p. 193

203. NB Cette condition est nécessaire si on veut que k_Φ soit un corps pour tout ultrafiltre. [page 5]

Pour tout anneau $\mathcal{A}$, soit $\mathrm{Max}(\mathcal{A})$ le spectre maximal, i.e. l'ensemble des idéaux maximaux de $\mathcal{A}$. On trouve donc une application canonique

$$\left\{\begin{array}{ccc} \mathcal{F}_0 & \longrightarrow & \mathrm{Max}(k_E) \\ \Phi & \longmapsto & \mathrm{Ker}(k_E \longrightarrow k_\Phi) \overset{\text{déf}}{=} \mathfrak{m}_\Phi \ . \end{array}\right. \qquad (*)$$

Proposition 2. *L'application précédente est* bijective.
Prouvons d'abord qu'elle est injective, cela résulte aussitôt du
Corollaire 1 ([204]). *Soit, pour* $\Phi \in \mathcal{F}_0$,

$$\chi_\Phi \ : \ k_E \longrightarrow k_\Phi$$

l'application canonique. Alors pour $A \in \mathfrak{P}(E)$, *on a*

$$A \ \notin \ \Phi \qquad \Longleftrightarrow \qquad \chi_\Phi(f_A) \ = \ 0 \ , \quad \textit{i.e. } f_A \in \mathfrak{m}_\Phi$$

(i.e. $A \in \Phi \iff \chi_\Phi(f_A) \neq 0$, *i.e.* $f_A \notin \mathfrak{m}_\Phi$*)* ([205]).
En effet, $\chi_\Phi(f_A) = 0$ signifie qu'il existe $B \in \Phi$ tel que $f_A|B = 0$, i.e. tel que $B \subset E\backslash A$; mais cela équivaut à $E\backslash A \in \Phi$, donc à $A \notin \Phi$ puisque Φ est un ultrafiltre, q.e.d.
Reste à prouver que l'application $(*)$ est surjective. Soit donc $\mathfrak{m}$ un idéal maximal de k_E, [page 6]
et soit

$$\Phi \overset{\text{déf}}{=} \{A \in \mathfrak{P}(E) \mid \chi(f_A) \ = \ 1\} \ ,$$

où $\chi : k_E \longrightarrow k_E/\mathfrak{m} = \kappa(\mathfrak{m})$ est l'application canonique. Je dis que Φ est un ultrafiltre. En effet :

a) $\emptyset \notin \Phi$ car $f_\emptyset = 0$, d'où $\chi(f_\emptyset) = 0 \neq 1$ dans k_Φ.
b) Si $A, B \in \Phi$, on a $A \cap B \in \Phi$, car $f_{A\cap B} = f_A \cdot f_B$, d'où $\chi(f_{A\cap B}) = \chi(f_A)\chi(f_B) = 1$.
c) Si $A \subset B$ et $A \in \Phi$, alors $B \in \Phi$. En effet, on a $f_A = f_A f_B$, d'où $\chi(f_A) = \chi(f_A)\chi(f_B)$, et comme $\chi(f_A) = 1$, on trouve $\chi(f_B) = 1$.
d) On a $E \in \Phi$, i.e. $\chi(f_E) = 1$, or $f_E = 1$, donc $\chi(f_E) = 1$.

Ainsi, Φ est un filtre – on n'a utilisé que le fait que $A/\mathfrak{m}$ est un anneau $\neq 0$ (pour conclure que $\emptyset \notin \Phi$). Prouvons que si $A/\mathfrak{m}$ est intègre, Φ est un *ultrafiltre*, i.e. :

e) Si $A \notin \Phi$, alors $B \overset{\text{déf}}{=} E\backslash A \in \Phi$.

En effet, on a $f_A + f_B = 1$, $f_A f_B = 0$, d'où
ⓐ $\chi(f_A) + \chi(f_B) = 1$, et
ⓑ $\chi(f_A)\chi(f_B) = 0$. p. 194
$\chi(f_A) \neq 1$, on conclut de ⓐ $\chi(f_B) \neq 0$, d'où par ⓑ $\chi(f_A) = 0$, d'où de ⓐ $\chi(f_B) = 1$, d'où $B \in \Phi$.

Prouvons enfin que $\mathfrak{m} = \mathfrak{m}_\Phi$. Comme $\mathfrak{m}_\Phi$ est un idéal maximal, il suffit de prouver [page 7]

$$\mathfrak{m}_\Phi \ \subset \ \mathfrak{m} \ .$$

Or si $A \in \mathfrak{P}(E)$ est telle que $A \notin \Phi$, ou $f_A \in \mathfrak{m}_\Phi$ (cor. 1), on a aussi $f_A \in \mathfrak{m}$. Donc il suffit de prouver le

---

204. **NB** Pour $\Phi \in \mathcal{F}$ quelconque, $\mathfrak{m}_\Phi \overset{\text{déf}}{=} \mathrm{Ker}(\chi_\Phi : k_E \longrightarrow k_\Phi)$ détermine Φ, puisque

$$A \ \in \ \Phi \qquad \Longleftrightarrow \qquad \chi_\Phi(f_A) \ = \ 1$$

(mais il faut supposer les $K_\xi \neq 0$, i.e. $0_\xi \neq 1_\xi$ ...).

205. **NB** On a donc

$$(\chi_\Phi(f_A) \ \neq \ 0) \qquad \Longleftrightarrow \qquad (\chi_\Phi(f_A) \ = \ 1) \ .$$

Lemme. *Soit $\Phi \in \mathcal{F}_0$. Alors $\mathfrak{m}_\Phi$ est l'idéal engendré par les f_A pour $A \in \mathfrak{P}(E)\backslash\Phi$. Plus précisément, les f_A sont dans $\mathfrak{m}_\Phi$, et tout $f \in \mathfrak{m}_\Phi$ est de la forme ff_A, avec A comme dessus.*

En effet, $f \in \mathfrak{m}_\Phi$ signifie qu'il existe $B \in \Phi$ tel que $f|B = 0$. Mais cela signifie aussi que $f = ff_A$, où $A = E\backslash A$ `[plutôt` $A = E\backslash B$`]`, d'où $A \notin \Phi$.

Cela prouve la proposition 2, et en même temps :

Corollaire 2. *Tout anneau quotient intègre de $k_E = \prod_{\xi\in E} k_\xi$ est un corps.*

Notons maintenant que si $\Phi \in \mathcal{F}$ est un filtre quelconque sur E, alors k_Φ est un anneau quotient de k_E, donc

$$\mathrm{Max}(k_\Phi) \hookrightarrow \underbrace{\mathrm{Max}(k_E)}_{\simeq \mathcal{F}_0} . \qquad (*)$$

Ceci posé, on trouve :

Corollaire 3 ([206]). *L'inclusion précédente identifie* $\mathrm{Max}(k_\Phi)$ *à l'ensemble des ultrafiltres Ψ sur E qui sont* plus fins *que Φ.*

En effet, si Ψ est un tel ultrafiltre, on a le diagramme commutatif [page 8]

$$k_E \xrightarrow{\chi_\Phi} k_\Phi \xrightarrow{\quad} k_\Psi \quad , \qquad (**)$$
$$\qquad\qquad \underset{\chi_\Psi}{\searrow}$$

ce qui montre que Ψ `[plutôt` $\mathfrak{m}_\Psi$`]` est dans l'image de $(*)$. Inversement, supposons que $\Psi \in \mathcal{F}_0$ provienne de $\mathrm{Max}(k_\Phi)$, i.e. que l'on ait $\mathfrak{m}_\Phi \subset \mathfrak{m}_\Psi$ (où $\mathfrak{m}_\Phi$ est le noyau de χ_Φ), ou encore qu'on ait une factorisation $(**)$ de χ_Ψ. Prouvons que Ψ est plus fin que Φ, i.e. que $\Psi \supset \Phi$. Soit donc $A \in \Phi$, prouvons que l'on a $A \in \Psi$. Mais $A \in \Phi$ implique `[le]` fait que $\chi_\Phi(f_A) = 1$, donc son image dans k_Ψ est égale à 1, donc on a $A \in \Psi$ par le corollaire 1.

Supposons à présent que tous les k_ξ sont égaux `[à]` un même anneau $\boxed{k \neq 0}$. Donc k_J, k_Φ sont des 'anneaux sous k' $k \longrightarrow k_J \longrightarrow k_\Phi$, d'ailleurs $k \longrightarrow k_J$ (si $J \neq \emptyset$) et $k \longrightarrow k_\Phi$ sont injectifs. On se pose la question quand $k \longrightarrow k_\Phi$ est *bijectif*, i.e. surjectif. Comme $k_\Phi \simeq k_E/\mathfrak{m}_\Phi$, cela signifie donc que $k_E = k + \mathfrak{m}_\Phi$, i.e. que tout $f \in k_E$ s'écrit

p. 195
[page 9]

$$f = c + g \qquad \begin{cases} c \in k , & \text{i.e. } c(\xi) = \underbrace{c_0}_{\in k} \ \forall\, \xi \in E , \\ g \in \mathfrak{m}_\Phi & \text{i.e. } \exists\, A \in \Phi \text{ avec } g|A = 0 . \end{cases}$$

Mais pour $f \in k_E$, $c \in k$ et $A \in \Phi$ fixés, l'existence de $g \in k_E$ telle que $g|A = 0$ et $f = c+g$ équivaut à $f|A = c_A$ (fonction constante dans A, de valeur c), i.e. $A \subset f^{-1}(\{c\})$. Pour f, c fixés, l'existence de $A \in \Phi$ satisfaisant la relation équivaut à $f^{-1}(\{c\}) \in \Phi$. Et pour f fixé, l'existence de c équivaut à celle d'une fibre E_c de $f : E \longrightarrow k$, qui soit dans Φ. Ainsi :

Proposition 3. *Soit $\Phi \in \mathcal{F}$. Pour que $k \longrightarrow k_\Phi$ soit surjectif, il faut et il suffit que pour toute famille de parties* essentiellement disjointes *$(E_\xi)_{\xi\in k}$ de E indexée par k, de réunion E, il existe un $\xi \in k$ tel que $E_\xi \in \Phi$. A fortiori, il* faut *que Φ soit un ultrafiltre (puisque* $\mathrm{card}\, k \geqslant 2$ *par hypothèse).*

En effet, la donnée d'une telle famille $(E_\xi)_{\xi\in k}$ équivaut à la donnée d'une application [page 10]
$E \longrightarrow k$, i.e. d'un élément de f_E.

Scholie. La propriété qu'on vient d'expliciter pour un filtre Φ sur E, ne dépend de k que par l'intermédiaire de $\pi = \mathrm{card}\, k$. On peut aussi l'énoncer en disant que pour toute

206. Marche pour tout système d'anneaux $(k_\xi)_{\xi\in E}$ *non nuls*, et $\Phi, \Psi \in \mathcal{F}$, Ψ plus fin que Φ, i.e. $\Phi \subset \Psi$ si et seulement si $\mathfrak{m}_\Phi \subset \mathfrak{m}_\Psi$ (pas la peine que Ψ soit un ultrafiltre).

partition $(E_i)_{i\in I}$ de E en un ensemble I des parties tel que $\operatorname{card} I \leqslant \pi$, il existe un (et un seul) des E_i qui soit dans Φ. On dit alors que Φ est un π-*ultrafiltre.*

Si $\pi \geqslant 2$ est fini, cette propriété équivaut à dire que Φ est un ultrafiltre. Par ailleurs, quel que soit π, les ultrafiltres Φ *triviaux* (i.e. tels qu'il existe $\xi \in E$ avec $\{\xi\} \in \Phi$, ou encore tel que $\Phi = \{A \in \mathfrak{P}(E) \mid \xi \in A\}$) sont des π-ultrafiltres. Si π est infini, il n'est pas clair qu'il existe des π-ultrafiltres non triviaux. On sait qu'il n'en existe sur E *que* si $\operatorname{card} E \notin \mathfrak{U}_1$, où $\mathfrak{U}_1$ est le plus petit univers tel que $\mathbf{N} \in \mathfrak{U}_1$, i.e. tel que $\mathfrak{U}$ contienne [page 11] comme élément un ensemble infini.

Si $\mathfrak{U} = \mathfrak{U}_1$, et si k est un corps infini, p.ex. $k = \mathbf{Q}$, alors pour tout ensemble $E \in \mathfrak{U}$ et pour tout ultrafiltre *non trivial* Φ sur E, k_E est une extension *non triviale* de k. Mais si $\mathfrak{U} = \mathfrak{U}_\alpha$ est un univers quelconque, et π le premier cardinal dans $\mathfrak{U}$ qui n'appartienne pas à un univers $\mathfrak{U}' \subset \mathfrak{U}$ strictement plus petit, je présume que pour tout $E \in \mathfrak{U}$, tout π-ultrafiltre sur E est trivial.

p. 196

Application à un exemple d'une sous-catégorie non accessible.

Soit $\mathcal{M}$ une catégorie $\mathfrak{U}$-accessible, et $a \in \operatorname{Ob}\mathcal{M}$, d'où un foncteur

$$\begin{aligned} f^o \ : \ \mathcal{M}^o \ &\longrightarrow \ \mathrm{Ens} \\ x \ &\longmapsto \ \mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(x,a) \overset{\text{déf}}{=} a(x) \ , \end{aligned}$$

foncteur commutant aux $\varprojlim$ quelconques, donc tel que $f : \mathcal{M} \longrightarrow (\mathrm{Ens})^o$ commute aux $\varinjlim$ quelconques, et en particulier f est accessible. Considérons la sous-catégorie strictement pleine [page 12]

$$\underbrace{\mathrm{Ens}^*}_{=\mathrm{Ens}\setminus\{\emptyset\}} \ \subset \ \mathrm{Ens}$$

des ensembles non vides, on sait qu'elle est accessible, mais elle n'est par stable par $\varprojlim$ de type L_π, quelque grand qu'on prenne π.

Considérons

$$\underbrace{\underline{S} \ = \ \underline{S}_a}_{\overset{\text{déf}}{=} f^{-1}(\mathrm{Ens}^*)} \ \subset \ \mathcal{M} \ ,$$

sous-catégorie strictement pleine de $\mathcal{M}$ formée des $x \in \operatorname{Ob}\mathcal{M}$ tels que

$$a(x) \ \neq \ \emptyset \ , \qquad \text{i.e. } x \leqslant a \text{ pour le préordre canonique de } \mathcal{M} \ .$$

C'est donc une sous-catégorie *ouverte* de $\mathcal{M}$. Son complémentaire fermé $\underline{S}' = \underline{S}'_a$ est la sous-catégorie fermée image inverse, par f, de la sous-catégorie strictement pleine de Ens réduite au seul objet $\{\emptyset\}$. Cette sous-catégorie de Ens est la catégorie finale type. Elle est stable dans Ens par $\varinjlim$ quelconques, et par $\varprojlim$ filtrantes quelconques. Ainsi, $\underline{S}'$ est stable dans $\mathcal{M}$ par $\varinjlim$ filtrantes quelconques. Ainsi, $\underline{S}'$ est stable dans $\mathcal{M}$ par $\varinjlim$ filtrantes quelconques, en particulier, elle est L_π-stable pour π assez grand. Explicitons : [page 13]

$$\begin{array}{ccl} \underbrace{\underline{S}' \ = \ \underline{S}'_a} \ \subset \ \mathcal{M} & & \\ \Big\| \ \text{déf} & & \text{sous-catégorie fermée de } \mathcal{M} \\ f^{-1}(\{\emptyset\}) \ = & & \text{formée des } x \ \in \ \operatorname{Ob}\mathcal{M} \text{ tels} \\ & & \text{que } a(x) = \emptyset. \end{array}$$

Comme $\underline{S}'$, étant fermée dans $\mathcal{M}$, est stable par $\varinjlim$ non vides et en particulier L_π-stable pour π grand, il y a plus de raison de s'attendre à ce que $\underline{S}'$ soit accessible dans $\mathcal{M}$

que pour son complémentaire $\underline{S}$, dont il n'est pas clair qu'il ait cette propriété de stabilité, mais seulement stabilité par $\varprojlim$ non vides, et en particulier par facteurs directs.

En fait, nous allons voir qu'il peut arriver que $\underline{S}$ et $\underline{S}'$ soient tous deux non accessibles dans $\mathcal{M}$:

Proposition 4. *Soient $\mathfrak{U}$ un univers, contenant un cardinal infini π_0 tel que pour tout $E \in \mathfrak{U}$, tout π_0-ultrafiltre sur E soit trivial. Soit alors $k \in \mathfrak{U}$ un corps de cardinal $\pi_0' \geqslant \pi_0$, et soit $\mathcal{M}$ la catégorie des k-algèbres commutatives. Donc $\mathcal{M}$ est un $\mathfrak{U}$-* p. 197
paratopos, admettant k comme objet initial. Soit $\underline{S}'$ la sous-catégorie strictement pleine, [page 14]
stable par petites $\varinjlim$ non vides, formée des objets A de $\mathcal{M}$ tels que $\mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(A,k) = \emptyset$, et $\underline{S}$ la sous-catégorie strictement pleine complémentaire, formée des objets A tels que $\mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(A,k) = \emptyset$. Alors $\underline{S}'$ est une sous-catégorie fermée *dans $\mathcal{M}$, et $\underline{S}$ la sous-catégorie ouverte complémentaire, donc $\underline{S}$ (tout comme $\underline{S}'$) est stable par facteurs directs. Ceci posé :*

a) Il n'existe pas de cardinal π tel que $\underline{S}$ soit L_π-stable dans $\mathcal{M}$, a fortiori $\underline{S}$ n'est pas accessible dans $\mathcal{M}$.

b) ([207]). Bien que $\underline{S}'$ soit L_0-stable dans $\mathcal{M}$ (i.e. stable par $\varinjlim$ filtrantes, et même, on l'a dit, par toute $\varinjlim$ non vide), $\underline{S}'$ n'est pourtant pas accessible dans $\mathcal{M}$.

Démonstration. L'assertion a) va résulter du

Corollaire 1. *Sous les conditions de la proposition 4, soient $E \in \mathfrak{U}$ un ensemble infini, Φ_0 le filtre des complémentaires des parties finies de E. Alors $\mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(k_{\Phi_0}, k) = \emptyset$, a fortiori, pour tout filtre Φ sur E plus fin que Φ_0, on a $\mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(k_\Phi, k) = \emptyset$.*

On a posé ici, bien sûr, pour tout filtre Φ sur E, [page 15]

$$k_\Phi \;=\; \varinjlim_{J \in \Phi} k_J \ .$$

On sait que pour toute k-algèbre commutative $\mathcal{A}$, $\mathrm{Hom}(\mathcal{A}, k)$ est en correspondance 1-1 avec la partie de $\mathrm{Max}(\mathcal{A})$ formée des idéaux maximaux $\mathfrak{m}$ de $\mathcal{A}$ tels que $k \longrightarrow \mathcal{A}/\mathfrak{m}$ soit un isomorphisme. Si $\mathcal{A}$ est de la forme k_Φ, Φ un filtre sur E, cet ensemble est en correspondance biunivoque avec l'ensemble des π_0'-ultrafiltres Ψ sur E plus fins que Φ, où $\pi_0' = \mathrm{card}(k)$ (proposition 3, et cor. 3 de prop. 2, page 7). Comme $\pi_0' \geqslant \pi_0$, un tel ultrafiltre est trivial par hypothèse. Donc on trouve

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(k_\Phi, k) \;\simeq\; \text{ensemble des } \xi \in E \text{ tels que } \{\xi\} = \textstyle\bigcap_{A \in \Phi} A \ . \qquad (*)$$

Mais dire que Φ est plus fin que Φ_0 signifie aussi que pour tout $\xi \in E$, on a $E \backslash \{\xi\} \in \Phi$, i.e. $\exists\, A \in \Phi$ avec $A \subset E \backslash \{\xi\}$, i.e. $\{\xi\} \notin \bigcap_{A \in \Phi} A$. Donc on a alors $\mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(k_\Phi, k) = \emptyset$.

La conclusion du corollaire 1 s'exprime par la relation

$$k_\Phi \;\notin\; \mathrm{Ob}\,\underline{S} \ , \qquad \text{i.e. } k_\Phi \in \mathrm{Ob}\,\underline{S}' \ ,$$

d'autre part, on a par définition

$$k_\Phi \;=\; \varinjlim_{J \in \Phi} k_J \ ,$$

et il est clair (comme ces $J \in \Phi$ sont $\neq \emptyset$), que les k_J en question sont dans $\underline{S}$. Ainsi, [page 16]
pour un filtre Φ comme dans le corollaire 1, on trouve un système inductif d'objets de $\underline{S}$, indexé par Φ^o, dont la limite inductive n'est pas dans $\underline{S}$. Donc le a) de la proposition 4 se déduit en notant que pour tout cardinal $\pi \in \mathfrak{U}$, on peut trouver un ensemble $E \in \mathfrak{U}$, et un filtre Φ sur E plus fin que Φ_0, tel que l'ensemble ordonné Φ^o soit grand devant π. Pour trouver un tel Φ, il suffit de prendre E de cardinal $\pi' > \pi$, et pour Φ l'ensemble p. 198

des complémentaires des parties de E de cardinal $\leqslant \pi$, de sorte que Φ^o est isomorphe à l'ensemble ordonné des parties de E de cardinal $\leqslant \pi$, lequel est bien grand devant π. Cela prouve le a) de la proposition 4.

Prouvons maintenant le b). Notons le

Lemme. *Soit $\mathcal{M}$ une catégorie accessible stable par $\varinjlim$ de type I_α, α un ordinal limite donné, $\underline{S}'$ une sous-catégorie fermée, π un cardinal utile pour $\mathcal{M}$, tel que* $\operatorname{card}\alpha \leqslant \pi$. [page 17] *Pour tout $x \in \operatorname{Ob}\underline{S}'$, choisissons une représentation ω-π-adaptée (ω étant le premier ordinal infini)*

$$x \simeq \varinjlim_{i\in I_x} x_i$$

(donc I_x grande devant π, stable par $\varinjlim$ de type I_α, $i \longmapsto x_i : I \longrightarrow \mathcal{M}$ commute auxdites limites, enfin les $x_i \in \operatorname{Ob}\mathcal{M}_\pi$). Pour que $\underline{S}'$ soit π-accessible dans $\mathcal{M}$, il faut et il suffit que pour tout $x \in \operatorname{Ob}\underline{S}'$, il existe un $i \in I_x$ tel que $x_i \in \operatorname{Ob}\underline{S}'$.

En effet, notons que $\underline{S}'$ étant fermée, est stable dans $\mathcal{M}$ par toute $\varinjlim$ non vide représentable dans $\mathcal{M}$, et en particulier par $\varinjlim$ de type I_α. Donc on peut appliquer 4.13.22 (p. 342) à $\mathcal{M}$, $\underline{S}'$, π et à $\Phi = \{I_\omega\}$. Alors a) $\Longrightarrow$ c) implique que si $\underline{S}'$ est π-accessible dans $\mathcal{M}$, alors pour tout $x \in \operatorname{Ob}\underline{S}'$, l'ensemble $I_{x,S'}$ des $i \in I_x$ tels que $x_i \in \operatorname{Ob}\underline{S}$ est cofinal dans I_x. Cela implique qu'il est non vide. (Et réciproquement d'ailleurs, $\underline{S}'$ étant un fermé dans $\mathcal{M}$, puisque si $x_i \in \underline{S}'$, alors pour $j \in \operatorname{Ob} I_x$ avec $i \leqslant j$, on a $x_j \in \underline{S}'$, i.e. $I_{x,\underline{S}'}$ contient l'image essentielle de $i\backslash I_x$, laquelle est cofinale dans I …) Cela prouve le 'il faut'. Prouvons le 'il suffit'. Donc prouvons que $\underline{S}'$ est égale à l'image essentielle de $\operatorname{Ind}_\pi(\underline{S}'(\pi))$. Elle la contient, puisque $\underline{S}'$ est stable par $\varinjlim$ de type L_π.

Donc il reste à prouver que tout $x \in \operatorname{Ob}\underline{S}'$ est dans l'image essentielle. Or l'hypothèse [page 18] nous assure que $x \simeq \varinjlim_{i\in I_x} x_i$ est isomorphe à $\varinjlim_{i\in I_{x,\underline{S}'}} x_i$ (car $I_{x,\underline{S}'}$ est cofinale dans I_x), où cette fois les x_i sont dans $\underline{S}'$. Comme I_x grande devant π, de même la sous-catégorie pleine cofinale $I_{x,\underline{S}'}$, donc on gagne.

Corollaire. *Sous les conditions précédentes, si $\underline{S}'$ est π-accessible, il en est de même de l'ouvert complémentaire $\underline{S}$,* pourvu *que $\underline{S}$ soit stable dans $\mathcal{M}$ par $\varinjlim$ de type L_π.*

Il faut prouver que $\underline{S}$ est égale à l'image essentielle de $\operatorname{Ind}_\pi \underline{S}(\pi)$. L'hypothèse 'pourvu' assure que cette image essentielle est $\subset \underline{S}$. Inversement, tout [?] $x \in \operatorname{Ob}\underline{S}$ est dans cette image essentielle. On aura

$$x \simeq \varinjlim_{i\in I} x_i\ , \qquad x_i \in \operatorname{Ob}\mathcal{M}_\pi,\ I = \mathcal{M}_\pi/x,\ \text{grande devant } \pi\ ,$$

et comme $x \in \operatorname{Ob}\underline{S}$ et $\underline{S}$ ouverte, les x_i sont dans $\underline{S}$, donc dans $\underline{S}(\pi)$, OK.

Dans le cas qui nous occupe, où $\mathcal{M} = (k\text{-alg.})$, comme $\underline{S}$ n'est justement *pas* stable dans $\mathcal{M}$ par L_π (quel que soit π) (c'est cela qui nous faisait conclure que $\underline{S}$ n'est pas [page 19] accessible dans $\mathcal{M}$), on ne peut donc conclure de cette inaccessibilité de $\underline{S}$, celle de $\underline{S}'$. Notons le

p. 199

Corollaire. *Soit π un cardinal infini. Pour que la sous-catégorie fermée $\underline{S}'$ de $\mathcal{M}$ (formée de k-algèbres commutatives A telles que* $\operatorname{Hom}_{\mathcal{M}}(A,k) = \emptyset$*) soit π-accessible, il faut et il suffit que pour tout k-algèbre A (de cardinal $> \pi$), telle que* $\operatorname{Hom}_{\mathcal{M}}(A,k) = \emptyset$*, existe une sous-algèbre A_i* de cardinal $\leqslant \pi$, *telle que* $\operatorname{Hom}_{\mathcal{M}}(A_i,k) = \emptyset$.
(On applique le lemme, en prenant pour α le premier ordinal infini.)

Question. *Cela est-il vérifié, en prenant simplement $\pi \geqslant \operatorname{card} k$?* La question de l'existence d'un cardinal π, ayant la propriété indiquée plus haut, me paraît délicate, et j'ignore

207. ?, pas prouvé.

la réponse. Si on veut construire un contre-exemple pour tout π, les développements précédents suggèrent de prendre pour A un produit infini d'extensions non triviales de k, ou un anneau k_Φ comme dans la démonstration de la proposition 4 a).

LES DÉRIVATEURS

p. (non numérotée)

ALEXANDRE GROTHENDIECK

Chapitre XIX

Modèles (4)

p. (non numérotée)

Note des éditeurs de l'édition transcrite.

Ce texte a été déchiffré et transcrit en LaTeX 2_ε par M. Künzer. Il a été édité par M. Künzer, J. Malgoire, et G. Maltsiniotis. La transcription est aussi fidèle que possible au manuscrit. Seules quelques corrections mineures évidentes ont été effectuées. Pour les rares ajouts ou commentaires des éditeurs, ainsi que pour la numérotation originale des pages du manuscrit, les caractères de machine à écrire `[typewriter]` entre crochets sont utilisés.

Cette édition est provisoire. Les remarques, commentaires et corrections sont bienvenus. Envoyer un message à :

[**e-mail address removed**]

G. Maltsiniotis

p. 1

[page 1]

1 Rappels sur les couples de Quillen (couples de Quillen spéciaux)

Je vais reprendre les notations et la terminologie pour les relations de LLP `[left lifting property]` et RLP `[right lifting property]` de Quillen. J'écris (pour une catégorie $\mathcal{M}$, et $\Phi, \Psi \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$)

$$\Phi \mathrel{\rotatebox{180}{$\rightarrowtail$}} \Psi \qquad \Longleftrightarrow \qquad (\Phi \subset \Psi^*) \qquad \Longleftrightarrow \qquad (\Psi \subset \Phi_*)\ , \tag{1.1}$$

i.e. Φ a la LLP par rapport à Ψ, ou encore Ψ la RLP par rapport à Φ. Je dis aussi que (Φ, Ψ) est un *couple* Q-*orthogonal*. Cette notion n'est pas symétrique, mais je me permets parfois (exceptionnellement) d'écrire

$$\Psi \mathrel{\rotatebox{180}{$\rightarrowtail$}} \Phi \qquad \text{comme synonyme de} \qquad \Phi \mathrel{\rotatebox{180}{$\rightarrowtail$}} \Psi\ . \tag{1.2}$$

Φ est Q-*orthogonal à gauche* de Ψ, Ψ est Q-*orthogonal à droite* à Φ, et la Q-orthogonalité à gauche (resp. à droite) est notée par le demi-sommet de flèche pointant vers le bas (resp. vers le haut). J'écris

$$\begin{cases} \Phi \mathrel{\rotatebox{180}{$\rightarrowtail$}} \Psi & \Longleftrightarrow \quad (\Phi = \Psi^*) \\ \Phi \mathrel{\rightarrowtail} \Psi & \Longleftrightarrow \quad (\Psi = \Phi_*) \\ \Phi \mathrel{\rotatebox{180}{$\rightarrowtail$}} \Psi & \Longleftrightarrow \quad (\Phi = \Psi^* \ \text{ et } \ \Psi = \Phi_*)\ . \end{cases} \tag{1.3}$$

Ces trois cas de Q-orthogonalité renforcée sont donc ceux où on a de plus $\Phi = \tilde{\Phi}$ resp. $\Psi = \bar{\Psi}$ resp. $\Phi = \tilde{\Phi}$ et $\Psi = \bar{\Psi}$. On dit que Φ est Q-*clos à gauche* si $\Phi = \tilde{\Phi}$, que Ψ est Q-*clos à droite* si $\Psi = \bar{\Psi}$, que le couple Q-orthogonal (Φ, Ψ) est Q-*clos à gauche* (resp. *à droite*) si Φ (resp. Ψ) est Q-clos à gauche (resp. à droite). On dit qu'il est Q-*clos* si les deux conditions

[page 2]

sont satisfaites simultanément. Quand aucune confusion n'est à craindre, il m'arrivera de dire simplement que Φ est Q-clos, ou que Ψ est Q-clos, sans spécifier si c'est à gauche

où à droite. Mais pour un couple Q-orthogonal (Φ, Ψ) (ou je préfère l'écrire $\Phi \rightarrowtail\!\!\!\!\!\rightarrow \Psi$), Q-clos signifie toujours Q-clos à gauche et à droite.

Quand un couple Q-orthogonal $\Phi \rightarrowtail\!\!\!\!\!\rightarrow \Psi$ a la propriété de factorisation de Quillen, je l'indique par la barre verticale croisant l'horizontale, ainsi

$$\Phi \;\rightarrowtail\!\!\!\!\!\!\rightarrow\; \Psi \;, \tag{1.4}$$

et on définit de même le sens des graphismes

$$\begin{cases} \Phi & \rightarrowtail\!\!\!\!\!\!\rightarrow & \Psi \\ \Phi & \leftarrowtail\!\!\!\!\!\!\rightarrow & \Psi \\ \Phi & \rightarrowtail\!\!\!\!\!\!\rightarrow & \Psi \\ \Phi & \leftarrowtail\!\!\!\!\!\!\rightarrow & \Psi \;. \end{cases} \tag{1.3}$$

Un couple Q-*orthogonal* Q-*factorisant* $\Phi \rightarrowtail\!\!\!\!\!\!\rightarrow \Psi$ est appelé un *précouple de Quillen.* S'il est de plus Q-clos, i.e. si on a $\Phi \leftarrowtail\!\!\!\!\!\rightarrow \Psi$, on dit que c'est un *couple de Quillen.* p. 2

Φ est dit Q-*saturé à gauche* s'il contient les isomorphismes et est stable par cochangement de base, par (petite) composition transfinie, et par facteurs directs. Dualement Ψ est dit Q-*saturé à droite* s'il

contient les isomorphismes, est stable par changement de base, par composition transfinie, et par facteurs directs. Si Φ est Q-saturé à gauche, il est stable par (petites) sommes directes, i.e. si les $f_i : A_i \longrightarrow B_i$ ($i \in I$, I petit) sont dans Φ, $f = \coprod f_i : \coprod A_i \longrightarrow \coprod B_i$ aussi, et de même pour (petites) sommes amalgamées finies ou infinies (quand on se place dans un $A\backslash\mathcal{M}$ au lieu de $\mathcal{M}$). On a l'énoncé dual pour Ψ, quand Ψ est Q-saturé à droite. [page 3]

En fait, il y a des notions plus faibles de Q-saturation que celle que je viens de dire : Q-*saturation simple* (à gauche : Φ contient les isomorphismes, stable par composition binaire, par cochangement de base), Q-*saturation transfinie* (on exige de plus stabilité par composition transfinie), enfin Q-*saturation totale,* ou Q-saturation tout court (quand on exige de plus la stabilité par facteurs directs). On a les implications

$$\begin{cases} \text{Q-clos à gauche} \\ \Downarrow \\ \text{Q-saturé (total)} \\ \Downarrow \\ \text{Q-saturé transfini} \\ \Downarrow \\ \text{Q-saturé simple.} \end{cases} \tag{1.6}$$

Pour $\Phi \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$, on a sa Q-clôture (à gauche) $\tilde{\Phi}$ (qui est la plus petite partie Q-close à gauche de $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ contenant Φ) et de même son Q-saturé (total) à gauche, son Q-saturé transfini, son Q-saturé simple

avec les inclusions tautologiques [page 4]

$$\Phi \;\subset\; \underbrace{\Phi'}_{\substack{\text{Q-saturé} \\ \text{à gauche simple}}} \;\subset\; \underbrace{\Phi''}_{\substack{\text{Q-saturé} \\ \text{à gauche transfini}}} \;\subset\; \underbrace{\Phi'''}_{\substack{\text{Q-saturé} \\ \text{à gauche total}}} \;\subset\; \underbrace{\tilde{\Phi}}_{\substack{\text{Q-clôture} \\ \text{à gauche}}} \;, \tag{1.7}$$

et dualement pour Ψ. Entre Φ et Φ' il y a encore un Φ'_0,

$$\Phi \;\subset\; \Phi'_0 \;\subset\; \Phi' \;, \tag{1.8}$$

qui est le Q-*saturé pour cochangement de base* (contenant aussi, par définition, tous les isomorphismes). Pour construire tous ces saturés, on procède ainsi : p. 3

1) Φ'_0 = ensemble des flèches $i : A \longrightarrow B$ s'insérant dans un carré cocartésien

$$\begin{array}{ccc} A_0 & \xrightarrow{i_0} & B_0 \\ \downarrow & & \downarrow \\ A & \xrightarrow{i} & B \end{array},$$

avec $i_0 \in \Phi$ ou i_0 une identité (auquel cas on trouve pour i les isomorphismes).

2) Φ' = ensemble des flèches composées multiples

$$i_n\, i_{n-1} \cdots i_1 ,$$

avec $i_\alpha \in \Phi'_0$.

3) Φ'' = ensemble des composés transfinis de flèches $\in \Phi'_0$.

On a envie de poser

$$\Phi''' = \Phi''^{\natural} \overset{\text{déf}}{=} \text{ensemble des facteurs directs d'éléments de } \Phi'',$$

et c'est un fait que $\Phi''^{\natural} \subset \Phi'''$ trivialement, mais il n'est par clair en général qu'on ait égalité, faute de pouvoir montrer que $\Phi''^{\natural}$ est stable, non seulement par facteurs directs, mais aussi par cochangement de base et par composition transfinie. Cependant, rappelons : [page 5]

Théorème 1.1. *Supposons $\mathcal{M}$ stable par petites $\varinjlim$, et que ses éléments soient accessibles. Supposons de plus que Φ soit petit, plus généralement, qu'il existe une partie $\Phi_0 \subset \Phi$ petite telle que $\Phi \subset \tilde{\Phi_0}$, donc*

$$\Psi \overset{\text{déf}}{=} \Phi_* = (\Phi_0)_* \qquad {}^{1}. \tag{1.1.1}$$

Sous ces conditions, si Φ''_0 désigne le Q*-saturé à gauche transfini de Φ_0, alors on a $\Phi''_0 \rightarrowtail \Psi$, i.e. toute flèche f de $\mathcal{M}$ se factorise en $f = pi$, avec $i \in \Phi''_0$, $p \in \Psi$* [2]*. A fortiori, si Φ'' désigne le* Q*-saturé à gauche transfini de Φ, on a*

$$\Phi'' \rightarrowtail \Psi .$$

Corollaire 1.2. *Sous les conditions du théorème, on a*

$$\Phi''' \text{ (Q-saturé total à gauche de } \Phi) = \underbrace{\Phi''^{\natural}}_{\substack{\text{ensemble des} \\ \text{facteurs directs d'éléments} \\ \text{de } \Phi''}} = \tilde{\Phi} . \tag{1.2.1}$$

Plus généralement (en apparence seulement !), si Φ_1 est une partie de $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ qui est Q*-saturée à gauche transfinie, et telle que*

$$\Phi_0 \subset \Phi_1 \subset \tilde{\Phi} = \tilde{\Phi_0} ,$$

alors p. 4 [page 6]

a) *on a $\Phi_1 \rightarrowtail \Psi$ et*

b) $\Phi_1^{\sim} = \Phi^{\sim} = \Phi_1^{\natural}$.

1. **N.B.** On a donc $\Phi \longrightarrow \Psi$, a fortiori $\Phi_0 \longrightarrow \Psi$.
2. Il y a même factorisation *fonctorielle* en f, propriété qui mérite une notation, p.ex. $\Phi''_0 \rightarrowtail\!\!\!\!\rightarrow \Psi$.

Ce corollaire résulte du théorème en vertu de XV prop. 4.2, dont je rappelle ici l'essentiel :

Proposition 1.3. *Soit* $\Phi \rightarrowtail\!\!\!\!\!\!\rightarrow \Psi$. *Alors* $\Phi^{\sim} = \Phi^{\natural} = \Psi^*$, *et dualement on a* $\Psi^{-} = \Psi^{\natural} = \Phi_*$.

Notons aussi, dans cet ordre d'idées :

Corollaire 1.4. *Soit* $\Phi \rightarrowtail \Psi$, *et soit* W *une partie quelconque de* $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$. *Pour qu'on ait* $\Phi \subset W^{\natural}$, *il suffit que toute flèche de* $\mathcal{M}$ *se factorise en* $f = pi$, *avec* $i \in W$, $p \in \Psi$. *(Et cette condition est évidemment aussi nécessaire si* $\Phi \rightarrowtail\!\!\!\!\!\!\rightarrow \Psi$, *et* W *stable par facteurs directs.)*

On dit qu'une partie Φ_0 de Φ est Q-*génératrice à gauche* de Φ si elle satisfait la condition

$$\Phi \ \subset \Phi_0^{\sim} \ , \tag{1.9}$$

et on dit que Φ est une partie *spéciale* si Φ admet une *petite* partie Q-génératrice à gauche. Si $\Phi_0 \subset \Phi$ est petit, et si $\mathcal{M}$ satisfait les conditions du théorème 1.1, alors Φ_0 est une partie Q-génératrice (à gauche) si et seulement si son Q-saturé total (à gauche) Φ_0''' contient Φ (condition en apparence plus forte que $\Phi \subset \Phi_0^{\sim}$, puisque en général on a $\Phi_0''' \subset \Phi_0^{\sim}$). Cela signifie donc aussi, via 1.2, que tout élément de Φ est facteur direct [page 7] d'un composé transfini de flèches déduites de

$$\Phi_0 \cup (\text{Identités de } \mathcal{M})$$

par cochangement de base.

Je rappelle encore le sorite ± tautologique des foncteurs adjoints :

Proposition 1.5. *Soit*

$$\mathcal{M}' \underset{v^*}{\overset{v_!}{\leftrightarrows}} \mathcal{M} \tag{1.5.1}$$

un couple de foncteurs adjoints, soient

$$\Phi \ \subset \ \mathrm{Fl}(\mathcal{M}) \ , \qquad \Psi' \ \subset \ \mathrm{Fl}(\mathcal{M}') \ ,$$

alors on a

$$(v_!(\Phi) \rightarrowtail \Psi') \qquad \Longleftrightarrow \qquad (\Phi \rightarrowtail v^*(\Psi')) \ . \tag{1.5.2}$$

Corollaire 1.6. *Pour toute partie* Φ *de* $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$,

$$(v_!(\Phi))_* \ = \ (v^*)^{-1}(\Phi_*) \ . \tag{1.6.1}$$

En effet, appliquant 1.5 à Φ et à $\{f'\}$, où $f' \in \mathrm{Fl}(\mathcal{M}')$, on trouve p. 5

$$f' \in (v_!(\Phi))_* \qquad \Longleftrightarrow \qquad v^*(f') \in \Phi_* \ ,$$

ce qui équivaut à (1.6.1). Dualement :

Corollaire 1.7. *Pour toute partie* Ψ' *de* $\mathcal{M}'$, *on a*

$$(v^*(\Psi'))^* \ = \ (v_!)^{-1}(\Psi'^*). \tag{1.7.1}$$

En effet, si $f \in \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$, on a par (1.5.2)

$$f \in (v^*(\Psi'))^* \qquad \Longleftrightarrow \qquad v_!(f) \in \Psi^* \ .$$

(3).

[page 8]

3. donner ici 1.9 page 9.

Un couple Q-orthogonal $\Phi \leftarrow\!\!\!\!\!\!\sim\!\!\!\!\!\!\rightarrow \Psi$ est dit *spécial* s'il satisfait les conditions suivantes.

$$\left\{\begin{array}{ll} \text{a)} & \mathcal{M} \text{ est stable par petites } \varinjlim \text{, les objets de } \mathcal{M} \text{ sont accessibles.} \\ & \text{(On dit alors que } \mathcal{M} \text{ est “spéciale”.)} \\ \text{b)} & \text{Le couple est clos : } \Phi \longleftrightarrow \Psi. \\ \text{c)} & \Phi \text{ est } \textit{spéciale.} \end{array}\right. \tag{1.10}$$

Cela implique donc, par 1.1, que $\Phi \longleftrightarrow\!\!\!\!\!\!+\!\!\!\!\!\!\rightarrow \Psi$ est un couple de Quillen. Si $\mathcal{M}$ satisfait a), les couples Q-orthogonaux spéciaux dans $\mathcal{M}$, ou encore les couples de Quillen spéciaux, correspondent donc biunivoquement aux parties Φ de $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ qui sont *spéciales* et closes à gauche (ou ce qui revient au même, Q-saturées à gauche), en associant à une telle Φ le couple $\Phi \longleftrightarrow\!\!\!\!\!\!+\!\!\!\!\!\!\rightarrow \Phi_*$.

Ceci posé :

Corollaire 1.8. *Supposons que $\mathcal{M}$, $\mathcal{M}'$ satisfassent la condition* a) *de* (1.10), *et soit* ‖ (Φ, Ψ) *un couple de Quillen spécial dans $\mathcal{M}$. Alors* $\Big(\Phi' = v_!(\Phi)^\sim, \Psi' = (v^*)^{-1}(\Psi)\Big)$ *est un couple de Quillen spécial dans $\mathcal{M}'$.*

En effet, par le corollaire 1.6 on a

$$\Phi'_* \;=\; (v_!(\Phi))_* \;=\; (v^*)^{-1}(\Psi) \;=\; \Psi' \;,$$

donc $\Phi' \longleftrightarrow \Psi'$. Il reste à prouver que Φ' est spécial. Soit Φ_0 une partie petite de Φ telle que $\Phi \subset \Phi_0^\sim$, posons $\Phi'_0 \;=\; v_!(\Phi_0) \subset \Phi'$, il suffit de voir qu'on a

[page 9]

$$v_!(\Phi) \;\subset\; v_!(\Phi_0)^\sim \;, \tag{$*$}$$

d'où résultera qu'on a $\Phi' \overset{\text{déf}}{=} (v_!(\Phi))^\sim \subset v_!(\Phi_0)^\sim$. Mais on a

$$v_!(\Phi_0)^\sim \;=\; (v_!(\Phi_0)_*)^* \;,$$

et

$$v_!(\Phi_0)_* \;=\; (v^*)^{-1}(\underbrace{\Phi_{0*}}_{\Psi}) \;=\; (v^*)^{-1}(\Psi) \;\overset{\text{déf}}{=}\; \Psi' \;,$$

p. 6

donc

$$v_!(\Phi_0)^\sim \;=\; \Psi'^* \;=\; \Phi' \;=\; v_!(\Phi)^\sim \;,$$

d'où $(*)$. Cet argument ne fait pas appel à l'hypothèse “spéciale” sur $\mathcal{M}$, et peut s'expliciter en le

Corollaire 1.9. [(4)] *Sous les conditions générales de* 1.5 *($v_! : \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{M}'$ étant un foncteur admettant un adjoint à droite), soient Φ_0, Φ deux parties de* $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ *telles que $\Phi \subset \Phi_0^\sim$ (ou ce qui revient au même, $\Phi^\sim \subset \Phi_0^\sim$). Alors $v_!(\Phi) \subset v_!(\Phi_0)^\sim$, i.e. $v_!(\Phi)^\sim \subset v_!(\Phi_0)^\sim$.*

En effet, cette relation équivaut aussi à $v_!(\Phi_0)_* \;\subset\; v_!(\Phi)_*$, c'est-à-dire (par 1.6) $(v^*)^{-1}(\Phi_{0*}) \;\subset\; (v^*)^{-1}(\Phi_*)$, et est impliqué par $\Phi_{0*} \;\subset\; \Phi_*$. Cette dernière d'autre part équivaut à l'hypothèse $\Phi^\sim \subset \Phi_0^\sim$, q.e.d.

Si Ψ est une partie de $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$, on en déduit pour toute I dans Cat une partie

[page 10]

$$\left\{\begin{array}{l} \Psi(I) \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M}(I)), \quad \text{avec } \; \mathcal{M}(I) = \underline{\mathrm{Hom}}(I^\circ, \mathcal{M}) \;, \\ f \in \Psi(I) \iff f(i) \in \Psi \;\; \forall\, i \in \mathrm{Ob}\, I \;. \end{array}\right. \tag{1.11}$$

Si on introduit la catégorie discrète I_0 sous-jacente à $\mathrm{Ob}\, I$, et le foncteur canonique

$$v_I = v \;:\; I_0 \longrightarrow I \;, \tag{1.12}$$

4. devrait passer avant 1.8.

on trouve un couple de foncteurs adjoints

$$\begin{array}{c} \mathcal{M}(I) \underset{v^*}{\overset{v_!}{\leftrightarrows}} \mathcal{M}(I_0) \\ \left(\underset{v_*}{\overset{}{\leftarrow\cdots\cdots}} \right) \end{array} \quad \simeq \ \mathcal{M}^{I_0} \ , \tag{1.13}$$

et on a

$$\Psi(I) \ = \ (v^*)^{-1}(\Psi(I_0)) \ .$$

Supposons maintenant qu'on ait

$$\left\{ \begin{array}{rcl} \Psi & = & \Phi_* \\ \text{d'où} \ \ \Psi(I_0) & = & \Phi(I_0)_* \end{array} \right. \tag{1.14}$$

(vérification immédiate), on conclut alors par 1.6

$$\Psi(I) \ = \ (v_!(\Phi(I_0)))_* \ = \ (\Phi\langle I\rangle)_* \ , \tag{1.15}$$

avec

$$\Phi\langle I\rangle \ \overset{\text{déf}}{=} \ v_!(\Phi(I_0))^\sim \ = \ \Psi(I)^* \ . \tag{1.16}$$

Si on a un foncteur

$$u \ : \ I \longrightarrow I' \ , \tag{1.17}$$

d'où un triple de foncteurs adjoints

p. 7
[page 11]

$$\left\{ \mathcal{M}(I) \underset{u_*}{\overset{u_!}{\underset{u^*}{\rightrightarrows}}} \mathcal{M}(I') \ \right. , \tag{1.18}$$

on aura de façon ± tautologique

$$\left\{ \begin{array}{rcl} u_!(\Phi\langle I\rangle) & \subset & \Phi\langle I'\rangle \\ u^*(\Psi(I')) & \subset & \Psi(I) \ . \end{array} \right. \tag{1.19}$$

Le corollaire 1.8 donne :

Proposition 1.10. *Supposons que* $\Phi \longleftrightarrow \Psi$ *soit un couple de Quillen* spécial *dans* $\mathcal{M}$*, i.e. de la forme* (Φ, Φ_*)*, avec* Φ *partie Q-close à gauche spéciale dans* $\mathcal{M}$ *(*$\mathcal{M}$ *satisfaisant la condition* (1.10. a)*). Alors pour toute* I *dans* Cat, $(\Phi\langle I\rangle, \Psi(I))$ *est un couple spécial dans* $\mathcal{M}(I)$*, en particulier il satisfait au théorème de factorisation.*

Considérons la construction duale, qui nous fait introduire, à partir d'un couple $\Phi \longleftarrow \Psi$ dans $\mathcal{M}$, le couple

$$\Phi(I) \ \longleftarrow \ \Psi[I] \ , \tag{1.20}$$

où $\Phi(I)$ est défini par la formule générale (1.11) (où Ψ est remplacé par Φ), et où $\Psi[I]$ est défini soit comme $\Phi(I)_*$, soit comme

$$\Psi[I] \ = \ v_*(\Psi(I_0))^- \ = \ \Phi(I)_* \ . \tag{1.21}$$

On a alors, pour $u : I \longrightarrow I'$

[page 12]

$$\left\{ \begin{array}{rcl} u^*(\Phi(I')) & \subset & \Phi(I) \\ u_*(\Psi[I]) & \subset & \Psi[I'] \ . \end{array} \right. \tag{1.22}$$

Il se pose encore la question si le couple $(\Phi(I), \Psi[I])$ satisfait au théorème de factorisation, sous des hypothèses convenables sur (Φ, Ψ). Je peux seulement hasarder la

Question-conjecture 1.11. *Supposons que* (Φ, Ψ) *soit un couple de Quillen* spécial, *en est-il de même de* $(\Phi(I), \Psi[I])$ *pour toute* I *dans* (Cat) *? En d'autres termes, si* $\mathcal{M}$ *est spéciale, condition* (1.10. a)), *et si* Φ *est une partie Q-close à gauche* spéciale *de* $\mathcal{M}$, *i.e. admettant une petite partie Q-génératrice, est-il vrai que pour toute* I *dans* Cat, $\Phi(I)$ *est également spéciale ? Je conjecture que oui, en faisant au besoin des hypothèses supplémentaires sur* $\mathcal{M}$ *(existence d'une filtration cardinale ?). P.ex. si* Φ_0 *est Q-génératrice dans* Φ, *et petite, alors* $\Phi_0(I)$ *est-elle Q-génératrice dans* $\Phi(I)$ *?*

Proposition 1.12 [5]. *Soit* $\Phi \longleftrightarrow \Psi$ *dans* $\mathcal{M}$, *soit* $u : I \longrightarrow I'$ *une flèche dans* Cat, *d'où*

$$\left\{ \mathcal{M}(I) \underset{\xrightarrow{u_*}}{\overset{\xrightarrow{u_!}}{\underset{\longleftarrow}{\overset{}{\longrightarrow}}}} \mathcal{M}(I') \right. . \tag{1.12.1}$$

On a alors (1.19), *i.e.* p. 8

$$\left\{ \begin{array}{rcl} u_!(\Phi\langle I\rangle) & \subset & \Phi\langle I'\rangle \\ u^*(\Psi(I')) & \subset & \Psi(I) \ , \end{array} \right. \tag{1.13.1}$$

et de plus l'équivalence

$$u^*(\Phi(I')) \subset \Phi\langle I'\rangle \qquad \Longleftrightarrow \qquad u_*(\Psi(I)) \subset \Psi(I') \ . \tag{1.13.2}$$

Ces relations équivalentes sont satisfaites dans chacun des trois cas [6] *:*

1°) *u est coétale.*

2°) *I est discrète.*

3°) *$\forall\, i' \in \mathrm{Ob}\, I'$, toute composante connexe de I/i' admet un objet final.*

[page 13]

2 Rappels sur les triples de Quillen clos et les triples de Quillen spéciaux

Soit $(\mathcal{M}, W)$ une *catégorie de modèles,* i.e. $\mathcal{M}$ munie d'un localiseur $W \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$, i.e. une partie satisfaisant

> W contient les isomorphismes, et si f, g sont des flèches composables, si deux parmi f, g, gf sont dans W, la troisième aussi *(saturation faible).* (2.1)

Je rappelle que la donnée d'un *triple de Quillen clos* (W, C, F), ou d'une structure de Quillen close, sur $\mathcal{M}$, ayant W comme ensemble de quasi-isomorphismes, revient à la donnée de deux couples de Quillen

$$C \longleftrightarrow TF \ , \qquad TC \longleftrightarrow F \ , \tag{2.2}$$

satisfaisant

$$TC \ \subset \ C \cap W \ , \qquad TF \ \subset \ F \cap W \ , \tag{2.3}$$

plus une des trois conditions équivalentes :

$$\left\{ \begin{array}{lrcll} \text{a)} & TC & = & C \cap W & (\text{i.e. } C \cap W \subset TC) \\ \text{b)} & TF & = & F \cap W & (\text{i.e. } F \cap W \subset TF) \\ \text{c)} & W & = & TF \circ TC \ . & \end{array} \right. \tag{2.4}$$

Rappelons aussi que ceci implique que W *est fortement saturée,* et a fortiori que $W = W^{\natural}$, p. 9
i.e. W stable par facteurs directs. [page 14]

Rappelons aussi qu'en vertu de (1.4), on a :

(2.5) Étant donnés les deux couples (2.2), avec $TC \subset C$ (équivalent à $TF \subset F$), pour qu'on ait la première relation (2.3), i.e. $TC \subset W$, il faut, et il suffit si $W = W^{\natural}$, que toute flèche f de $\mathcal{M}$ (ou seulement toute flèche de TC) se factorise en $f = pi$, avec $i \in W$, $p \in F$. Dualement, pour qu'on ait $TF \subset W$, il faut et il suffit si $W = W^{\natural}$, que toute flèche f de $\mathcal{M}$ (ou seulement toute flèche de TF) se factorise en $f = pi$, avec $i \in W$, $f \in C$.

On dit que la structure de Quillen (W, C, F) est *spéciale* si les deux couples de Quillen (2.3) sont spéciaux, i.e. si les conditions suivantes sont satisfaites.

(2.6) a) $\mathcal{M}$ est stable par petites $\varinjlim$, et ses éléments sont accessibles ($\mathcal{M}$ "spéciale").

b) Il existe des *petites* parties $C_0 \subset C$, $TC_0 \subset TC$ qui soient Q-génératrices à gauche, i.e. telles que l'on ait

$$\left\{\begin{array}{rcl} C & \subset & C_0^{\sim}\ , \quad \text{i.e.} \quad C = C_0^{\sim}\ , \quad \text{i.e.} \quad TF = C_{0*}\ ; \\ TC & \subset & (TC_0)^{\sim}\ , \quad \text{i.e.} \quad TC = (TC_0)^{\sim}\ , \quad \text{i.e.} \quad F = (TC_0)_*\ . \end{array}\right.$$

Ainsi, la donnée d'un tel triple de Quillen *spécial* dans $\mathcal{M}$, quand $\mathcal{M}$ satisfait (2.6. a), revient à la donnée des deux parties [page 15]

$$TC \ \subset \ C \tag{2.7}$$

de $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$, satisfaisant les conditions :

$$\left\{\begin{array}{l} C,\ TC \text{ "spéciales"} \quad \left\{\begin{array}{l} \text{a)} \quad C,\ TC \text{ sont Q-closes à gauche.} \\ \text{b)} \quad C,\ TC \text{ sont Q-engendrées à gauche par des } \textit{petites} \text{ parties } C_0,\ TC_0 \text{ de } C,\ TC \text{ respectivement.} \end{array}\right. \\ \quad \text{c)} \quad TC \subset W,\ TF \overset{\text{déf}}{=} C_* \subset W. \\ \quad \text{d)} \quad \text{On a l'une des trois conditions équivalentes supplémentaires de (2.4), i.e. :} \\ \qquad \alpha) \quad TC = C \cap W\ , \quad \text{i.e.} \quad C \cap W \subset TC\ . \\ \qquad \beta) \quad TF = F \cap W\ , \quad \text{i.e.} \quad F \cap W \subset TF\ . \\ \qquad \gamma) \quad W = TF \circ TC\ . \end{array}\right. \tag{2.8}$$

Proposition 2.1. *Soit* p. 10

$$\mathcal{M}' \underset{v^*}{\overset{v_!}{\rightleftarrows}} \mathcal{M} \tag{2.11}$$

un couple de foncteurs adjoints, $\mathcal{M}$ étant muni d'une structure de Quillen close (W, C, F). Posons

$$\left\{\begin{array}{rcl} W' & = & (v^*)^{-1}(W) \\ F' & = & (v^*)^{-1}(F) \\ TF' & = & F' \cap W' \ = \ (v^*)^{-1}(TF) \\ C' & = & v_!(C)^{\sim} \\ TC' & = & v_!(TC)^{\sim}\ . \end{array}\right. \tag{2.1.2}$$

5. cf. XVII 6.4 (p. 117), mais où les notations pour $\Phi\langle I\rangle$, $\Psi(I)$ sont inverses.
6. **N.B.** On a $1° \Longrightarrow 3°$, $2° \Longrightarrow 3°$.

1°) *On a alors*

$$\begin{cases} C' \longleftrightarrow TF', & TC' \longleftrightarrow F', \\ TC' \subset C', & TF' \subset F'. \end{cases} \tag{2.1.3}$$

Pour que les données (2.1.2) *dans* $\mathcal{M}'$ *y correspondent à un triple de Quillen* (W', C', F')*, il faut et il suffit que les conditions suivantes soient satisfaites :* [page 16]

$$\begin{cases} \text{a)} & \textit{Factorisation pour } C' \longleftrightarrow TF' \textit{ et } TC' \longleftrightarrow F', \textit{ i.e. les relations } C' \longmapsto TF' \textit{ et } TC' \longmapsto F', \\ \text{b)} & TC' \subset W', \end{cases} \tag{2.1.4}$$

ou encore, au lieu de b)*, la condition équivalente* (en présence de a)) :

$$\begin{cases} \text{b}') & \textit{Toute flèche } f' \textit{ dans } \mathcal{M}' \textit{ (non seulement } f' \in TC') \textit{ se factorise en } f' = p'i', \textit{ avec } i' \in W', \ p' \in F'. \end{cases} \tag{2.1.5}$$

2°) *Supposons* (2.1.4. a) *satisfaite (factorisation). Alors, pour que* (W', C', F') *soit un triple de Quillen clos, il* suffit *que l'on ait*

$$\text{b}'') \qquad \boxed{v^* v_!(TC) \ \subset \ TC} \ , \tag{2.1.6}$$

et que de plus on soit dans l'un des trois cas suivants :

A) v^* *admet un adjoint à droite* v_*.

B) v^* *commute aux petites* $\varinjlim$*,* (W, C, F) *est spécial, et* $\mathcal{M}'$ *est spéciale, i.e. satisfait à la condition* (2.6. a).

C) v^* *est pleinement fidèle, et* $v^* v_!(F) \subset F$.

Notons tout de suite le

Corollaire 2.2. *Supposons que* (W, C, F) *soit un triple de Quillen spécial, que* $\mathcal{M}'$ *soit spéciale, que* v^* *commute aux petites* $\varinjlim$*, enfin que l'on ait* (2.1.6)*, i.e.* $v^* v_!(TC) \subset TC$*. Alors* (W', C', F') *est un triple de Quillen spécial.*

En effet, en vertu du 2.1. 2°, cas B, pour voir que (W', C', F') soit un triple de Quillen clos, il est à vérifier (2.1.6. b″). Mais cela résulte de 1.8, appliqué aux deux couples de Quillen spéciaux (C, TF), (TC, F) dans $\mathcal{M}$: les couples (C', TC') et (TC', F') sont des couples de Quillen spéciaux, ce qui prouve en même temps que le triple (W', C', F') est spécial, q.e.d. p. 11 [page 17]

Démontrons 2.1. Les premières deux relations (2.1.3) sont contenues dans 1.6, les relations $TC' \subset C'$, $TF' \subset F'$ sont tautologiques. Le critère (2.1.4) pour que (W', C', F') soit un triple de Quillen clos, est contenu dans le rappel de la page 13, compte tenu que l'on sait déjà que $TF' = F' \cap W'$ (relation (2.4. b)). Que la condition (2.1.4. b), en présence de (2.1.4. a), soit équivalente à la condition (2.1.5. b′), est contenu dans la première assertion (2.5), en notant que l'on a $W' = W'^{\natural}$ (ce qui résulte de la définition de W' et de $W = W^{\natural}$).

Il reste à prouver 2°), i.e. que la condition b) est satisfaite moyennant a) et b″) (2.1.6) dans chacun des trois cas A), B), C).

Cas A. Par définition de $W' = (v^*)^{-1}(W)$, pour prouver que $TC' \subset W'$, il suffit de prouver

$$v^*(TC') \ \subset \ W' \ ,$$

et a fortiori, il suffit de prouver

$$v^*(TC') \ \subset \ TC \ , \qquad \text{i.e. } v^*(TC') \longmapsto F \ . \tag{2.1.7}$$ [page 18]

Or par 1.5, appliqué au couple de foncteurs adjoints (v^*, v_*), cette relation équivaut à

$$TC' \longmapsto v_*(F) \ .$$

Comme $TC' \overset{\text{déf}}{=} v_!(TC)^\sim$, ceci équivaut à

$$v_!(TC) \longmapsto v_*(F) \ ,$$

ou encore (en réappliquant 1.5 à $(v_!(TC), F)$ au lieu de (TC', F)), à

$$v^*v_!(TC) \longmapsto F \ , \qquad \text{i.e. } v^*v_!(TC) \subset \underbrace{TC}_{=F^*} \ ,$$

or c'est là l'hypothèse b″).

Cas B. Il suffit encore de prouver 2.1.7. Or, du fait que $v_!(TC)$ admet un petit ensemble Q-générateur à gauche, $v_!(TC)^\sim$ est la clôture de $v_!(TC)$ pour les opérations de cochangement de base, de composition transfinie, de facteurs directs. Comme v^* commute à toutes ces opérations (comme il commute aux petites $\varinjlim$), et comme TC dans $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ est stable par ces opérations, on voit donc que pour montrer que v^* applique $v_!(TC)^\sim$ dans TC, il suffit de voir qu'il applique $v_!(TC)$ dans TC, ce qui est encore l'hypothèse b″).

Cas C. On va vérifier b) sous la forme équivalente b′). Soit donc $f' \in \mathrm{Fl}(\mathcal{M}')$, $f' : X' \longrightarrow Y'$, posons

p. 12
[page 19]

$$f \ = \ v^*(f'),$$

et factorisons f en pi, avec $i \in TC$, $p \in F$, d'où

$$v_!v^*(f') = v_!(f) = v_!(p)v_!(i) \ .$$

Mais v^* étant pleinement fidèle, $v_!v^* \xrightarrow{\sim}$ id, donc on trouve une factorisation de f' en $v_!(p)v_!(i)$. Il suffit donc de voir que

$$v_!(p) \ \in \ F' \ , \qquad v_!(i) \ \in \ W' \ ,$$

ce qui équivaut à

$$v^*v_!(p) \in F \ , \qquad v^*v_!(i) \in W \ ,$$

et résulte des hypothèses que $v^*v_!(F) \subset F$ et $v^*v_!(TC) \subset TC \subset W$, q.e.d.

N.B. J'ai noté les cas A) et C) par acquis de conscience, sans application précise en vue. Le cas le plus utile sera justiciable du cas B), et mérite d'être réexplicité en un

Théorème 2.3 [7]. *Soit (W, C, F) un triple de Quillen spécial dans $\mathcal{M}$. Pour toute I dans* Cat*, considérons le triple $(W(I), C\langle I\rangle, F(I))$ dans $\mathcal{M}(I) = \underline{\mathrm{Hom}}(I^\circ, \mathcal{M})$, où les notations sont celles de page 10, donc $W(I)$, $F(I)$ et $TF(I)$ se définissent fibre par fibre, et $C\langle I\rangle = (F(I))^* = (v_{I\,!}(C(I_0)))^\sim$* [8].

1°) *Pour toute I dans* Cat*, $(W(I), C\langle I\rangle, F(I))$ est un triple de Quillen spécial dans $\mathcal{M}(I)$.* [page 20]

2°) *Si $u : I \longrightarrow I'$ est une flèche dans* Cat*, d'où*

$$\mathcal{M}(I) \underset{u^*}{\overset{u_!}{\rightleftarrows}} \mathcal{M}(I'), \tag{2.3.1}$$

[7] cf. scholie 2.10, qui devrait précéder le théorème 2.3.

[8] où $v_I : I_0 \longrightarrow I$ (I_0 catégorie discrète ayant mêmes objets que I).

alors

$$\left\{\begin{array}{rcl} u^*(W(I')) & \subset & W(I) \\ u^*(F(I')) & \subset & F(I) \\ u^*(TF(I')) & \subset & TF(I) \end{array}\right\} \textit{tautologie}$$
$$\left\{\begin{array}{rcl} u_!(C\langle I\rangle) & \subset & C\langle I'\rangle \\ u_!(TC\langle I\rangle) & \subset & TC\langle I'\rangle\ , \end{array}\right. \tag{2.3.2}$$

enfin, $u_!$ induit un foncteur

$$\mathcal{M}(I)_{\mathrm{c}} \longrightarrow \mathcal{M}(I')_{\mathrm{c}} \qquad {}^{(9)} \tag{2.3.3}$$

compatible aux localiseurs $W(I)_{\mathrm{c}} = W(I)|\mathcal{M}(I)_{\mathrm{c}}$ *et* $W(I')_{\mathrm{c}} = W(I')|\mathcal{M}(I')_{\mathrm{c}}$, *donc induit un foncteur*

$$u_!^W \ :\ \mathrm{Ho}_W(I) \longrightarrow \mathrm{Ho}_W(I')\ . \tag{2.3.4}$$

Ce foncteur est un adjoint à gauche du foncteur u_W^*, p. 13

$$u_W^* \ :\ \mathrm{Ho}_W(I') \longrightarrow \mathrm{Ho}_W(I)\ , \tag{2.3.5}$$

induit par u^* (3.3.1).

Démonstration de 2.3.

Prouvons 1°). On considère comme dans 1.10 le foncteur

$$v = v_I \ :\ I_0 \longrightarrow I$$

et le couple de foncteurs adjoints

$$\mathcal{M}(I) \underset{v^*}{\overset{v_!}{\leftrightarrows}} \mathcal{M}(I_0)\ , \tag{2.3.6}$$

auquel on peut appliquer 2.2. Il reste à vérifier seulement [page 21]

$$v^*v_!(TC) \ \subset\ TC\ , \tag{2.3.7}$$

or on a, pour $X = (X_i)_{i\in I_0} \in \mathcal{M}(I_0)$,

$$\begin{array}{rcl} v_!(X)(i) & \simeq & \coprod_{j\in I_0} v_{j\,!}(X_j)(i) \\ & \simeq & \coprod_{j\in I_0} \underbrace{X_j^{\mathrm{Hom}(i,j)}}_{\substack{\text{somme directe} \\ \text{de } \mathrm{Hom}(i,j) \text{ copies}}} \end{array}\ ,$$

et la relation (2.3.7) résulte du fait que TC, étant Q-clos à gauche, est stable par petites sommes directes.

Prouvons 2°). Les formules (2.3.2) sont essentiellement tautologiques, les deux dernières résultent de la troisième et de la deuxième, en vertu de 1.5 appliqué au couple de foncteurs adjoints $(u_!, u^*)$. La relation $u_!(C\langle I\rangle) \subset C\langle I'\rangle$, et le fait que $u_!$ transforme objet initial en objet initial, impliquent (2.3.3). Que $u_!$ restreint à $\mathcal{M}(I)_{\mathrm{c}}$ soit compatible aux localiseurs provient de $u_!(TC\langle I\rangle) \subset TC\langle I'\rangle$, et du fait que toute flèche f dans $\mathcal{M}(I)_{\mathrm{c}}$ qui est dans $W(I)$, se décompose en $f = pi$, avec $i \in TC$ et p inverse à gauche d'une $j \in TC\langle I\rangle$. Ceci vu, joint aux deux premières formules (2.3.2) montre qu'on est sous les conditions du théorème d'adjonction de Quillen, d'où l'adjonction de $u_!^W$ et de u_W^*, q.e.d. [page 22]

Corollaire 2.4. *Soit W un localiseur dans $\mathcal{M}$, tel qu'il existe un triple de Quillen spécial (W, C, F) incluant W. Alors le prédérivateur* Ho_W *sur* Cat *satisfait aux axiomes*

[9] Sous-catégories des objets cofibrants.

Dér 1 (décomposition), Dér 2 (localisation), Dér 3 (objet final), Der 4 bis (existence des $u_!^W$), Dér 5 bis (calcul des fibres des $u_!^W$), Dér 6 bis (exactitude à gauche, i.e. exactitude à gauche des carrés W-cocartésiens dans les $\mathrm{Ho}_W(I)$), Dér 6 (exactitude à droite des carrés W-cartésiens).

On vient de prouver Dér 4 bis, et Dér 5 bis est pratiquement contenu dans le mode d'obtenir de $u_!$, compte tenu de proposition 1.12, qui implique que pour X dans $\mathcal{M}(I)_c$, et i' dans I', l'image inverse de X dans $\mathcal{M}(i'\backslash I)$ est dans $\mathcal{M}(i'\backslash I)_c$ …

p. 14

L'axiome de décomposition est satisfait pour tout prédérivateur de la forme $\mathbf{D}_{\mathcal{M},W}$. L'axiome d'exactitude à gauche Dér 5 bis est valable, pourvu que les $(\mathcal{M}(I), W(I))$ s'insèrent dans une structure à cofibrations, ce qui est le cas. De même pour l'axiome Dér 2 de localisation, pourvu que de plus W soit fortement saturé, ce qui est également le cas. Enfin, l'axiome de l'objet final dit que si I admet un objet final, alors

[page 23]

$$\mathrm{Ho}_W(e) \longrightarrow \mathrm{Ho}_W(I)$$

est pleinement fidèle, ou encore que le morphisme d'adjonction

$$u_! u^*(\xi) \longrightarrow \xi$$

est un isomorphisme. Mais en vertu de 1.12, cas 3°, dans ce cas u^* applique $\mathcal{M}(e)_c = \mathcal{M}_c$ dans $\mathcal{M}(I)_c$, donc le calcul du couple de foncteurs adjoints $u_!^W$, u_W^* peut se faire en utilisant les restrictions de $u_!$, u^* à $\mathcal{M}(I)_c$ et $\mathcal{M}_c$ respectivement. Comme le morphisme d'adjonction $u_!^c u_c^* \longrightarrow \mathrm{id}$ est un isomorphisme, il en est donc de même de $u_!^W u_W^* \longrightarrow \mathrm{id}$, qui s'en déduit en localisant, q.e.d.

2.5. Pour achever de construire Ho_W comme un dérivateur sur Cat tout entier, il faut donc établir Dér 4, Dér 5 : existence des u_*^W, et calcul des fibres de u_*^W. Quant à Dér 6, il est acquis automatiquement, du fait que chaque $(\mathcal{M}(I), W(I))$ s'insère dans une structure de fibration $(W(I), F(I))$. (Oubli dans la démonstration de 2.4.) L'idée naturelle est d'utiliser à présent la structure de triple

[page 24]

$$(W(I), C(I), \quad \underbrace{F[I]}_{\overset{\text{déf}}{=} TC(I)_*} \quad) \,, \tag{2.5.1}$$

mais la difficulté est de prouver la factorisation pour un couple

$$C(I) \longleftrightarrow TF[I] \,, \qquad \underbrace{TC(I)}_{\overset{\text{déf}}{=} C(I)\cap W(I)} \qquad \longleftrightarrow F[I] \,, \tag{2.5.2}$$

faute de pouvoir montrer, dans les conditions générales de 2.3 seulement (triple de Quillen spécial) que $C(I)$ et $TC(I)$ sont également spéciaux. (Cf. question 1.11.) Mais moyennant des conditions convenables sur $\mathcal{M}$, on arrivera à s'en tirer si $C = mono$. L'énoncé pertinent, un peu technique, se trouve dans XV cor. 7.4 (p. 98-99), que je vais rappeler ici.

p. 15

[page 25]

Théorème 2.6. *Soit $\mathcal{M}$ une catégorie satisfaisant les conditions suivantes.*

$$\left\{\begin{array}{l}
\text{a) } \mathcal{M} \textit{ est "spéciale", i.e. stable par petites } \varinjlim \textit{, et ses éléments sont accessibles.}\\
\text{b) } \textit{Les limites inductives filtrantes dans } \mathcal{M} \textit{ sont exactes à gauche (et dans } \mathcal{M} \textit{ les } \varprojlim \textit{ finies sont représentables – résulte de a et c).}\\
\text{c) } \mathcal{M} \textit{ admet une filtration cardinale } (\mathrm{Filt}^{\pi})_{\pi\geq\pi_0}.\\
\text{d) } \textit{Les } \mathrm{Filt}^{\pi} \textit{ sont stables par } \varprojlim \textit{ indexées par des catégories } I \textit{ telles que } \operatorname{card}\mathrm{Fl}(I)\leq\pi\textit{, et par quotients } (Z\in\mathrm{Filt}^{\pi} \textit{ et } Z\longrightarrow Z' \textit{ épimorphisme implique } Z'\in\mathrm{Filt}^{\pi}).\\
\text{e) } \textit{Si } A_1, A_2 \textit{ sont deux sous-objets d'un objet } B \textit{ de } \mathcal{M}\textit{, et } A_0=A_1\cap A_2\textit{, alors } A_1\amalg_{A_0}A_2\longrightarrow B \textit{ est un monomorphisme.}\\
\text{f) } \textit{Si on a un carré cocartésien}\\
\qquad\qquad \begin{array}{ccc} A_0 & \xrightarrow{i} & A_1\\ \downarrow & & \downarrow\\ A_2 & \xrightarrow{i'} & A_3 \end{array}\\
\qquad \textit{avec } i \textit{ monomorphisme, alors } i' \textit{ est un monomorphisme.}
\end{array}\right. \qquad (2.6.1)$$

[10,11,12,13]. *(On dira alors que $\mathcal{M}$ est* "très spéciale"*). Soit de plus*

$$W\ \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M}) \qquad (2.6.2)$$

un localiseur dans $\mathcal{M}$, qui satisfait les conditions

$$\left\{\begin{array}{l}
\text{a) } W \textit{ est stable par } \varinjlim \textit{ filtrantes } [14].\\
\text{b) } W \textit{ est de plus } \mathrm{L}_1\textit{-accessible, i.e. il existe une petite partie } W_0\subset W \textit{ telle que } W \textit{ soit la } \mathrm{L}_1\textit{-enveloppe de } W\textit{, i.e. que } W \textit{ soit la plus petite partie de } \mathrm{Fl}(\mathcal{M}) \textit{ contenant } W_0\textit{, et stable par } \varinjlim \textit{ filtrantes.}
\end{array}\right. \qquad (2.6.3)$$

Posons alors

p. 16
[page 26]

$$C\ =\ \mathrm{Mono}(\mathcal{M}),\qquad TC\ =\ C\cap W\ ,\qquad TF\ =\ C_*\ ,\qquad F=(TC)_*\ . \qquad (2.6.4)$$

Sous ces conditions :

[10] **N.B.** a + c signifie aussi que $\mathcal{M}$ est une "catégorie $\mathfrak{U}$-paratopos", et implique l'existence d'une filtration cardinale satisfaisant d) (sauf l'assertion concernant les quotients Z' de Z). Donc il s'agit d'un $\mathfrak{U}$-paratopos satisfaisant de plus b) e) f). (Est-ce alors un topos ? *Non,* car e), f) sont O.K. dans les *catégories abéliennes !*)

[11] **N.B.** La condition d) est sans doute inutile, du moins si les épimorphismes sont effectifs, car d) sera satisfaite en tous cas pour $\pi=2^c$, avec $c\geq\pi_0$.

[12] **N.B.** La condition e) n'est *pas* satisfaite pour la catégorie (Gr), et le théorème est en défaut pour cette catégorie, laquelle n'admet *pas* "assez d'injectifs", cf. SGA 4 I 8.12.9. Par contre, e) et f) sont satisfaites par les catégories *abéliennes.*

[13] Cf. XVIII 4.6.7 (p. 157) pour une formulation plus sympathique de l'ensemble des conditions a) à f) pour $\mathcal{M}$.

[14] **N.B.** a) implique déjà que $W=W^{\natural}$.

1°) $C \leftarrow\!\!\!\!\!\!\rightarrow TF$, *plus précisément* $C \rightarrowtail TF$ *est un couple de Quillen spécial.*

2°) *Pour que* $TC \rightarrowtail F$ *soit un couple de Quillen, il faut et il suffit que* TC *soit stable par cochangement de base, et alors c'est un couple de Quillen spécial.*

3°) *Pour que* (W, C, F) *soit un triple de Quillen (lequel sera nécessairement spécial par* 1°, 2°, *et en particulier clos), il faut et il suffit que les conditions suivantes soient satisfaites.*

$$\begin{cases} \text{a)} \quad TC \ (\overset{\text{déf}}{=} W \cap \text{Mono}) \text{ est stable par cochangement de base.} \\ \text{b)} \quad TF \ (\overset{\text{déf}}{=} (\text{Mono})_*) \ = \text{ “applications de type injectif” } \subset W. \end{cases} \tag{2.6.5}$$ [15]

Et la condition b) *équivaut encore à :*

$$\text{b}') \quad \begin{array}{l} \textit{Toute flèche } f \textit{ de } \mathcal{M} \textit{ (ou seulement de } TF\textit{) se factorise} \\ \textit{en } f = pi, \textit{ avec } i \textit{ monomorphisme, } p \in W. \end{array} \tag{2.6.6}$$

Corollaire 2.7. $\mathcal{M}$ *et* W *étant comme dans* (2.6.1), (2.6.3), *pour que* (W, C, F) *soit un triple de Quillen* propre à gauche *(i.e.* $C \subset \text{Cof}_W$*), il faut et il suffit que* W *satisfasse la condition* (2.6.5. b) *(i.e.* W *contient les flèches de type injectif), et de plus* [page 27]

$C \subset \text{Cof}_W$, *i.e. la condition :*

a′) *Pour tout diagramme cocartésien*

$$\begin{array}{ccc} A_0 & \xrightarrow{i} & A_1 \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ A_2 & \xrightarrow{i'} & A_3 \end{array} \tag{2.7.7}$$

avec i *monomorphisme, si* $f \in W$, *alors* $f' \in W$. *(Stabilité de* W *par cochangement de base par monomorphismes.)*

Sous ces conditions, ce triple de Quillen est spécial, et a fortiori clos.

Ce corollaire résulte de 2.6. 3°), puisque $C \subset \text{Cof}_W$ implique $TC \overset{\text{déf}}{=} C \cap W = C \cap W^{\text{univ}}$ (car $\text{Cof}_W \cap W = W^{\text{univ}}$), donc que TC est stable par cochangement de base, d'où la condition (2.6.5. a).

2.8. On dit qu'une *structure de Quillen* (W, C, F) sur $\mathcal{M}$ est *très spéciale,* si elle est obtenue comme au théorème 2.1., i.e. si on a les conditions : p. 17

$$\begin{cases} \text{a)} \ \mathcal{M} \text{ est très spéciale, i.e. satisfait aux conditions (2.6.1).} \\ \text{b)} \ W \text{ est stable par petites } \varinjlim \text{ filtrantes, et est accessible (conditions (2.6.3)).} \\ \text{c)} \ C = \text{Mono}. \end{cases} \tag{2.8.1}$$

Donc pour qu'un localiseur W dans $\mathcal{M}$ corresponde à une structure de Quillen très spéciale dans $\mathcal{M}$ (laquelle sera forcément unique), il faut et il suffit que $\mathcal{M}$ et W satisfassent les conditions (2.8.1. a) b)), et que de plus on ait : [page 28]

$$\begin{cases} \text{a)} \ TC \overset{\text{déf}}{=} \text{Mono} \cap W \text{ est stable par cochangement de base.} \\ \text{b)} \ TF \overset{\text{déf}}{=} (\text{Mono})_* \subset W, \text{ i.e. } W \text{ contient les flèches de type injectif dans } \mathcal{M}. \end{cases} \tag{2.8.2}$$

[15] **N.B.** Ces conditions (2.6.5) équivalent à dire que (W, C) est une structure de catégorie à cofibrations sur $\mathcal{M}$.

(16).

On trouve maintenant le

Théorème 2.9. *Soit* $(W, C = \mathrm{Mono}, F = (TC)_* = (W \cap \mathrm{Mono})_*)$ *un triple de Quillen très spécial dans une catégorie* $\mathcal{M}$ (2.8). *Alors :*

1°) *Pour toute* I *dans* Cat, $(W(I), C(I), F[I])$ *est un triple de Quillen très spécial dans* $\mathcal{M}(I)$*, et on a en particulier*

$$C(I) \;=\; \mathrm{Mono}(\mathcal{M}(I))\ , \tag{2.9.1}$$

et de plus

$$F[I] \cap W(I) \;=\; (TF)[I]\ . \tag{2.9.2}$$

2°) *Pour toute flèche* $u : I \longrightarrow I'$ *dans* Cat, *d'où le couple de foncteurs adjoints*

$$\mathcal{M}(I) \underset{u_*}{\overset{u^*}{\leftrightarrows}} \mathcal{M}(I')\quad , \tag{2.9.3}$$

on a

$$\left\{\begin{array}{rcl} u^*(W(I')) & \subset & W(I) \\ u^*(C(I')) & \subset & C(I) \\ u^*(TC(I')) & \subset & TC(I) \\ u_*(F[I]) & \subset & F[I'] \\ u_*(TF[I]) & \subset & TF[I']\ , \end{array}\right. \tag{2.9.4}$$

enfin u_* *induit un foncteur*

p. 18
[page 29]

$$u_*^{\mathrm{f}}\ :\ \mathcal{M}(I)_{\mathrm{f}} \longrightarrow \mathcal{M}(I')_{\mathrm{f}} \qquad {}^{(17)} \tag{2.9.5}$$

compatible aux localiseurs $W(I)_{\mathrm{f}}$ *et* $W(I')_{\mathrm{f}}$ *induits par* $W(I)$, $W(I')$ *respectivement, donc induit un foncteur*

$$u_*^W\ :\ \mathrm{Ho}_W(I) \longrightarrow Ho_W(I')\ . \tag{2.9.6}$$

Ce foncteur est un adjoint à droite *du foncteur*

$$u_W^*\ :\ Ho_W(I') \longrightarrow \mathrm{Ho}_W(I) \tag{2.9.7}$$

induit par u^* (2.9.3).

Démonstration de 2.9. Pour prouver 1°), il faut vérifier d'abord que les conditions préliminaires (2.8.1. a) b)) sur $\mathcal{M}$, W sont stables par passage de $\mathcal{M}$, W à $\mathcal{M}(I)$, $W(I)$, ce qui se fait par AQT `[âne qui trotte]`. D'ailleurs on vérifie tout de suite que

$$C(I) \;=\; \mathrm{Mono}(\mathcal{M}(I))\ ,$$

et le théorème 2.6 (1°, 2°) implique alors que

$$\begin{array}{ccccc} C(I) & \rightarrowtail & C(I)_* & \overset{\text{déf}}{=} & TF[I] \\ \underbrace{TC(I)}_{\overset{\text{déf}}{=} C(I)\cap W(I)} & \rightarrowtail & (TC(I))_* & \overset{\text{déf}}{=} & F[I] \end{array}$$

sont des couples de Quillen spéciaux. (En notant pour le deuxième, que $TC(I)$ est bien stable par cochangement de base, TC l'étant.) Pour vérifier que l'on a un triple de Quillen

[page 30]

[16] On dit aussi que le localiseur W est très spécial, s'il définit une structure de Quillen très spéciale.
[17] sous-catégories pleines des objets fibrants.

très spécial, il reste en vertu de 2.8 à vérifier que

$$TF[I] \ \subset \ W(I) \ ,$$

ce qui s'écrit

$$v^*(TF[I]) \ \subset \ W(I_0) \ ,$$

où

$$v \ : \ I_0 \longrightarrow I$$

est défini comme dans (1.12) (p. 10). En fait, on aura même

$$v^*(TF[I]) \ = \ v^*v_*(TF(I_0)) \ \subset \ \underbrace{TF(I_0)}_{=F(I_0)\cap W(I_0)} \quad ,$$

et la démonstration est duale de celle de

$$v^*v_!(TC(I_0)) \ \subset \ TC(I_0)$$

(cf. (2.3.7), p. 21), elle ne dépend pas des questions de factorisation dans $\mathcal{M}(I)$, et provient ici de la stabilité de TF par petits produits. Cela prouve 1°.

La démonstration de 2° est maintenant la duale de celle de (2.3. 2°). Comme cela nous fait répéter deux fois la même démonstration, cela montre qu'on n'a pas "monté le sorite" tout à fait avec assez de soin. Donc à titre de rattrapage, j'ajoute un

p. 19
[page 31]

Scholie 2.10. *Soit (W, C, F) un triple de Quillen clos dans $\mathcal{M}$. Pour I dans* Cat*, pour que $(W(I), C\langle I\rangle, F(I))$ soit un triple de Quillen clos pour $\mathcal{M}(I)$, il faut et il suffit que les couples $C\langle I\rangle \longleftrightarrow TF(I)$ et $TC\langle I\rangle \longleftrightarrow F(I)$ soient factorisants. Supposons que cette condition soit satisfaite pour I et pour I', et soit $u : I \longrightarrow I'$ une flèche de I dans I'. Alors les assertions de* 2.3. 2° *sont valables, en particulier on trouve un foncteur $u_!^W : \mathrm{Ho}_W(I) \longrightarrow \mathrm{Ho}_W(I')$, adjoint à gauche de u_W^** [18]*. Ces résultats se dualisent aussitôt (par $\mathcal{M} \longmapsto \mathcal{M}^\circ$, $I \longmapsto I^\circ$) pour les triples $(W(I), C(I), F[I])$, et pour la construction de u_*^W, adjoint à droite de u_W^*. En particulier, pour que le triple précédent soit un triple de Quillen (forcément clos), il faut et il suffit que les deux couples $C(I) \longleftrightarrow TF[I]$ et $TC(I) \longleftrightarrow F[I]$ soient factorisants ; et quand cette condition est satisfaite pour I et pour I' (pour une flèche $u : I \longrightarrow I'$ dans* Cat *donnée), alors u_*^W existe et se construit dualement de la construction de $u_!^W$ explicitée dans* 2.3. 2°.

[page 32]

Corollaire 2.11. *Le prédérivateur $\mathbf{D}_{\mathcal{M},W}$ défini pour un localiseur* très spécial *W dans $\mathcal{M}$ est un dérivateur en plein sens du terme, i.e. il satisfait à tous les axiomes Dér 1 à Dér 6 (y inclus Dér 4 bis et Dér 5 bis et Dér 6 bis) des dérivateurs.*

N.B. À ma propre surprise, je n'ai pas été capable de trouver un cas d'un localiseur W qui définisse un dérivateur sur Cat tout entier (avec existence de $u_!^W$, u_*^W), *que* pour W un localiseur très spécial, donc s'insérant dans un triple de Quillen très spécial – ou quand on peut s'y ramener de la façon standard. (Par exemple dans le cas où $\mathcal{M} = \mathrm{Cat}$, W un localiseur fondamental satisfaisant Loc 6 a) et Loc 8, 8 bis) [19] – les monomorphismes dans W se refusent formellement à être stable par cochangement de base !) J'ignore totalement si le résultat mirobolant "prouvé" par Anderson est vrai ou faux. Ça a l'air presque trop beau pour être vrai …D'ailleurs, je ne connais pas de structure de Quillen spéciale qui ne soit très spéciale – désolé !

[page 33]

18. Dire aussi que le calcul des fibres de $u_!^W(X)$, prévu dans Dér 5 bis, est OK.
19. axiome des carrés cocartésiens (version directe), axiome des limites inductives, accessibilité.

3 Cas des catégories à cofibrations, des catégories à fibrations

Je rappelle les axiomes d'une *structure à cofibrations* (W, C) sur une catégorie $\mathcal{M}$.

Cof_0 : W est un localiseur.

Cof_1 : C contient les isomorphismes, est stable par cochangement de base, par composition.

Cof_2 : $C \cap W$ est stable par cochangement de base (et aussi par composition, et contient les isomorphismes, en vertu de Cof_0, Cof_1).

Cof_3 : Toute flèche f dans $\mathcal{M}$ se factorise en $f = pi$, avec $i \in C$, $p \in W$.

(Axiomes de K. S. Brown, légèrement généralisés par Anderson). Il y a un "axiome de continuité" ou *"axiome transfini"* facultatif, qui est le suivant : p. 20

Cof_4 : $\mathcal{M}$ stable par petites $\varinjlim$ filtrantes, et C et $TC = C \cap W$ sont stables par composition transfinie.

Ainsi, Cof_1, Cof_2, Cof_4 peuvent se résumer en disant que C et TC sont Q-saturés transfiniment à gauche.

La structure de cofibration est dite *spéciale* si elle satisfait Cof_4, si $\mathcal{M}$ est spéciale, et si C admet une *petite* partie C_0 qui soit Q-génératrice à gauche, i.e. telle que

$$C \ \subset \ C_0{}^{\sim}, \qquad \text{i.e.} \quad \tilde{C} = C_0{}^{\sim}. \tag{3.1}$$

Alors, par le théorème de factorisation 1.1, on a [page 34]

$$C \ \leftarrow\!\!\!\!\!\rightarrow \ TF \ \overset{\text{déf}}{=} \ C_* \ ,$$

et l'axiome de factorisation Cof_3 implique (cf. 1.4) $TF \subset W^{\natural}$. Plus généralement, on a :

Proposition 3.1. *Supposons que $\mathcal{M}$ soit spéciale (stable par petites $\varinjlim$, et éléments accessibles), que (W, C) satisfasse à Cof_0, Cof_1, et que C soit stable par composition transfinie (ce qui, joint à Cof_1, s'énonce en disant que C est Q-saturé transfini à gauche), enfin que C admette une petite partie C_0 Q-génératrice à gauche, de sorte que $C \leftarrow\!\!\!\!\!\rightarrow TF \overset{déf}{=} C_*$. Alors pour que l'axiome de factorisation Cof_3 soit satisfait, il suffit qu'on ait*

$$TF \ \subset \ W \ , \tag{3.1.1}$$

et il faut qu'on ait $TF \subset W^{\natural}$, donc si $W = W^{\natural}$, l'axiome Cof_3 équivaut à (3.1.1).

La structure de cofibration est dite *semi-close* si C est Q-clos à gauche, i.e. si on a $C = C^{\sim}$ (ce qui implique que C est stable par composition transfinie), *close* si de plus $TC = (TC)^{\sim}$ (ce qui implique l'axiome transfini Cof_4).

Je ne reviens pas ici sur la théorie de K. S. Brown des catégories à cofibrations. C'est à ma connaissance l'ensemble d'axiomes le plus économique connu, pour assurer d'une part une bonne prise sur Ho_W (par une notion correspondante d'homotopie d'applications, et un calcul de fractions dans $\Pi\mathcal{M}_c$), et d'autre part l'existence de la suite *exacte* de cofibrations, donc une théorie de cofibres W-homotopiques. (**N.B.** Quand la structure est *propre,* i.e. $C \subset \mathrm{Cof}_W$, alors l'existence de cette structure revient à dire simplement que "W admet assez de W-cofibrations", i.e. que toute $f \in \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ se factorise en pi, avec $i \in \mathrm{Cof}_W$, $p \in W$; et on peut donc prendre $C = \mathrm{Cof}_W$. Dans le cas où W est stable par petites $\varinjlim$ filtrantes, $C = \mathrm{Cof}_W$ et $TC = W^{\mathrm{univ}}$ satisfont de plus l'axiome transfini Cof_4.) Enfin, K. S. Brown montre que toute flèche $i : X \longrightarrow Y$ dans C, *avec X, Y cofibrants* (i.e. $\emptyset_{\mathcal{M}} \longrightarrow X$, $\emptyset_{\mathcal{M}} \longrightarrow Y$ dans C) est dans Cof_W ("Lemme de Brown"). [page 35] [page 36]

Je m'intéresse ici à la question d'étendre la structure à cofibrations à une catégorie de la forme $\mathcal{M}(I)$, et d'utiliser cette extension pour construire les foncteurs $u_!^W$. Notons déjà que la théorie de K. S. Brown, avec les compléments d'Anderson [20], donne essentiellement ceci : p. 21

Proposition 3.2. *Soit $W \subset \mathrm{Fl}(\mathcal{M})$ un localiseur associé à une structure à cofibrations (C, W) dans $\mathcal{M}$.*

1°) *Sur la catégorie* Diag_0 *des ensembles ordonnés* finis*, ce prédérivateur satisfait aux axiomes Dér 1 (décomposition), Dér 2 (localisation), Dér 3 (objet final), Dér 4 bis (existence de $u_!^W$), Dér 5 bis (calcul des fibres de $u_!^W$), Dér 6 bis (exactitude à gauche).*

2°) *C'est encore vrai sur la sous-catégorie* Diag_1 *dans* Cat *plus grande, formée des ensembles ordonnés I* noethériens *tels que l'espace topologique associé à I° soit noethérien (toute suite croissante d'objets de I, ou d'ouverts de I°, est stationnaire).*

3°) *Enfin, si l'axiome transfini Cof_4 est satisfait, i.e. si C et TC sont stables par composition transfinie, alors la conclusion de* 1° *reste valable sur la sous-catégorie pleine* Diag_2 *de* Cat *formée des ensembles ordonnés qui sont noethériens sans plus.*

Corollaire 3.3. *Supposons que l'on ait Cof_3 sous la forme plus forte d'une factorisation $f = pi$* fonctorielle *en f, ce qui est le cas en particulier si la structure à cofibrations est spéciale. Alors pour toute I dans* Cat*, $\mathcal{M}(I)$ muni de $(W(I), C(I))$ est une catégorie à cofibrations, laquelle satisfait l'axiome transfini Cof_4 si (W, C) y satisfait. Donc on peut lui appliquer les résultats de* 3.2*, qui impliquent notamment que les axiomes Dér 1, 2, 3 (?) sont valables sur* Cat *tout entier, et que $u_!^W$ existe quand u est de la forme $\mathrm{id}_I \times v$, avec $v : J \longrightarrow K$ une flèche dans* Diag_1 *(resp. dans* Diag_2*, si l'axiome transfini est satisfait).* [page 37]

3.4. La clef de la théorie est dans l'extension de la structure à cofibrations (W, C) de $\mathcal{M}$ à une catégorie $\mathcal{M}(I)$, où I est un ensemble ordonné, en $(W(I), C_I)$. Les faits principaux sont énoncés dans XVII, dans les théorèmes p. 26-27, p. 50, p. 60. C'est quand I est *noethérien,* et qu'on suppose soit que $\mathrm{Esp}(I^\circ)$ est également noethérien (p.ex. I fini), soit que (W, C) satisfait l'axiome transfini Cof_4, qu'on prouve que $(W(I), C_I)$ est également une structure à cofibrations sur $\mathcal{M}(I)$.

Un fait important pour la construction des foncteurs $u_!^W$, pour $u : I \longrightarrow I'$ une flèche entre catégories ordonnées noethériennes, est la relation [page 38]

$$C_I \cap W(I) \;=\; (TC)_I \;, \tag{3.4.1}$$

d'où résulte que l'on a, pour u comme dessus,

$$u_!(C_I \cap W(I)) \;\subset\; C_{I'} \cap W(I') \;, \tag{3.4.2}$$

ingrédient essentiel de la construction du foncteur $u_!^W$. Pour étendre cette construction au cas d'une flèche $\pm$ quelconque dans Cat, il se pose donc le problème d'étendre la définition de C_I, et les formules (3.4.1) et (3.4.2), au cas de catégories $\pm$ quelconques dans Cat. Or on a prouvé :

Proposition 3.5. *Si $\Phi = \Psi^*$ est une partie* Q-close *à gauche de* $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$*, et I un ensemble ordonné noethérien, Φ_I l'extension de Φ en une partie de* $\mathrm{Fl}(\mathcal{M}(I))$ *définie par* Anderson*, alors on a*

$$\Phi_I \;=\; \Psi(I)^* \;=\; v_!(\Phi(I_0))^\sim \;, \tag{3.5.1}$$

où $v : I_0 \longrightarrow I$ est le foncteur canonique de la catégorie discrète définie par $\mathrm{Ob}\, I$*.*

20. revus et arrangés par mes soins. p. 22

C'est (avec des notations différentes) le lemme 6.2.5 (p. 107) de XVII, dont je ne reprends pas ici la démonstration.

Ceci donne la clef d'une définition de Φ_I comme $\Phi\langle I\rangle$ (avec les notations des paragraphes 1, 2), pour I quelconque dans Cat, [page 39]

$$\Phi_I \overset{\text{déf}}{=} \Phi\langle I\rangle \overset{\text{déf}}{=} \Psi(I)^* = v_!(\Phi(I_0))\tilde{} \ , \tag{3.5.2}$$

où $\Psi = \Phi_*$, et où on suppose Φ Q-clos à gauche, i.e. $\Phi = \Psi^*$. Dans le cas où on suppose seulement Φ Q-saturé transfini sans plus, on aurait envie de poser

$$\Phi_I \overset{\text{déf}}{=} \text{Q-saturé transfini de } v_!(\Phi(I_0)) \ , \tag{3.5.3}$$

et je présume que pour I ordonné noethérien, cela coïncide avec la définition d'Anderson. Mais je vais me borner pour la suite au cas où $C = \Phi$ est Q-clos à gauche.

Revenons alors au cas d'une structure à cofibrations (W, C) dans $\mathcal{M}$, en supposant C et $TC = C \cap W$ Q-clos à gauche. Définissons pour toute I dans Cat $C_I = C\langle I\rangle$ comme dans (3.5.2). On a alors, pour $u : I \longrightarrow I'$ une flèche dans Cat,

$$u_!(C\langle I\rangle) \subset C\langle I'\rangle \ , \tag{3.5.4}$$

mais on n'y a guère de raison d'espérer avoir aussi (3.4.2), sans disposer de la formule

$$C\langle I\rangle \cap W(I) \overset{?}{=} (TC)\langle I\rangle \qquad {}^{21}. \tag{3.5.5}$$

On a prouvé que cette formule est valable si I est ordonné noethérien (XVII th. 2.1, p. 26-27). Cela nous amène à la [page 40]

Question 3.6. *Soit $\mathcal{M}$ une catégorie stable par petites limites, et soit (W, C) une structure à cofibrations dans $\mathcal{M}$ telle que C et $TC = C \cap W$ soient Q-clos à gauche. Soit I un objet de* Cat*, a-t-on alors*

$$C\langle I\rangle \cap W(I) = (TC)\langle I\rangle \, ? \tag{3.6.1}$$

On a vu au paragraphe précédent qu'il en est ainsi si (W, C) s'insère dans un triple de Quillen clos $(W, C, F = (TC)_*)$, et quand on suppose de plus que les couples


$$C\langle I\rangle \longleftrightarrow TF(I) \ , \qquad TC\langle I\rangle \longleftrightarrow F(I)$$

sont factorisant, auquel cas $(W(I), C\langle I\rangle, F(I))$ est une structure de Quillen close dans $\mathcal{M}(I)$. D'ailleurs, (W, C, F) est une structure de Quillen (nécessairement close) si et seulement si les couples $C \longleftrightarrow \underbrace{TF}_{\overset{\text{déf}}{=} C_*}$, $TC \longleftrightarrow \underbrace{F}_{\overset{\text{déf}}{=} (TC)_*}$ eux-mêmes sont factorisants, et si de plus $TF \subset W$ (ce qui est automatique si $W = W^\natural$, car on aura en tous cas, par Cof_4, $TF \subset W^\natural$). p. 23

Mais peut-on s'en tirer avec moins, pour pouvoir conclure à (3.6.1) ? Ne suffirait-il pas de savoir que $TC\langle I\rangle \longleftrightarrow F(I)$ est factorisant (ce qui n'a guère de chances d'être vrai pour une $I \pm$ générale, si on n'a déjà $TC \leftrightarrow\!\!\!\!\rightarrow F$, factorisation dans $\mathcal{M}$ lui-même). C'est bien le cas : [page 41]

Proposition 3.7. *Sous les conditions générales de* (3.6) *sur $\mathcal{M}$, W, C, I, supposons que le couple $TC\langle I\rangle \longleftrightarrow F(I)$ (où $F \overset{déf}{=} (TC)_*$) soit factorisant, i.e. $TC\langle I\rangle \leftrightarrow\!\!\!\!\rightarrow F(I)$. Alors la formule* (3.6.1) *est vraie.*

En effet, si $f \in C\langle I\rangle \cap W(I)$, on factorise f en pi, avec $i \in TC\langle I\rangle$, $p \in F(I)$. Comme $f, i \in W(I)$, on aura $p \in W(I)$, i.e. $p \in TF(I)$, et à cause de $\underbrace{C\langle I\rangle}_{\ni f} \longmapsto \underbrace{TF(I)}_{\ni p}$, il existe $p : Y \longrightarrow X'$ telle que $pq = \mathrm{id}_Y$, $qf = i$,



donc f est facteur direct de $i \in TC\langle I\rangle$. Comme $TC\langle I\rangle$ est stable par facteurs directs, on gagne.

Corollaire 3.8. *Soit (W, C, F) une structure de Quillen close dans $\mathcal{M}$, et supposons que $TC = C \cap W$ soit une partie Q-spéciale de $\mathcal{M}$, i.e. le couple $TC \leftrightarrow F$ un couple spécial (i.e. $\mathcal{M}$ est* spéciale*, et il existe une petite partie TC_0 Q-génératrice à gauche pour TC). Alors pour toute I dans* Cat*, on a*

$$C\langle I\rangle \cap W(I) \;=\; TC\langle I\rangle \;. \tag{3.8.1}$$

En apparence, on n'a pas eu à supposer que C soit elle aussi une partie Q-spéciale de $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$. Mais comme on a besoin de la factorisation pour $C \longmapsto TF$ (pour avoir au moins une structure de cofibrations sur $\mathcal{M}$), on n'a guère le moyen de l'établir sans supposer C spéciale. Sans compter que pour pouvoir expliciter (3.8.1) pour la construction de $u_!^W$, on a besoin de savoir que $(W(I), C\langle I\rangle)$ définit bien une structure à cofibrations sur $\mathcal{M}(I)$, ce qui ne peut guère se faire (il me semble) sans avoir la factorisation pour $C\langle I\rangle \longmapsto TF(I)$ également ; chose que je n'arrive à établir pour un I général dans Cat, que moyennant l'hypothèse de spécialité sur C également. [page 42]

3.9. Pour en avoir le cœur net, il faudrait quelques exemples concrets et illuminants, du type suivant :

a) `[Il n'y a pas de b).]` Structure de Quillen close (W, C, F) sur $\mathcal{M}$, telle que pour le prédérivateur associé, $u_!^W$ n'existe pas toujours, ou u_*^W n'existe par toujours. Je pense notamment au cas d'une flèche $u : I \longrightarrow I'$ avec $I' = e$ (présumant que si dans ce cas, $u_!^W$ resp. u_*^W existe, alors il existe dans tous les cas). Un tel exemple serait encore plus

instructif, bien sûr, si $\mathcal{M}$ est stable par petites $\varinjlim$, que ses objets soient accessibles etc. et que W soit L-accessible (i.e. stable par petites $\varinjlim$ filtrantes, et de plus accessible …). Le premier candidat pour I auquel je pense serait un $\overrightarrow{B}G$ (G un groupe, p.ex. $G = \pm 1$), c'est en effet l'exemple aux antipodes des ensembles ordonnés, lesquels, eux, ne semblent pas faire trop de problème (moyennant l'hypothèse noethérienne tout au moins). p. 24 [page 43]

Les exemples suivants ne sont pas aussi convaincants que ça, hélas !

Exemple 3.10. Soit $\mathcal{M}$ une catégorie quelconque, alors les couples $(\mathrm{Fl}(\mathcal{M}), \mathrm{Is}(\mathcal{M}))$ et $(\mathrm{Is}(\mathcal{M}), \mathrm{Fl}(\mathcal{M}))$ sont tous deux des couples de Quillen,

$$\mathrm{Fl}(\mathcal{M}) \longmapsto\!\shortmid \mathrm{Is}(\mathcal{M}) \;, \qquad \mathrm{Is}(\mathcal{M}) \longmapsto\!\shortmid \mathrm{Fl}(\mathcal{M}) \;. \tag{3.10.1}$$

Il s'ensuit que si on pose

$$W \;=\; \mathrm{Is}(\mathcal{M}) \;, \qquad C \;=\; F \;=\; \mathrm{Fl}(\mathcal{M}) \;, \tag{3.10.2}$$

(W, C, F) est un triple de Quillen clos [22]. D'ailleurs pour toute I dans Cat, on a $W(I) = \mathrm{Is}(\mathcal{M}(I))$, donc

$$\mathrm{Ho}_W(I) \;=\; \mathcal{M}(I) \;. \tag{3.10.3}$$

22. au moins si on admet que $\mathcal{M}$ est stable par $\varinjlim$ et $\varprojlim$ *finies.*

Donc la question de l'existence des foncteurs $u_!^W$, u_*^W se réduit à celle des foncteurs $u_!$, u_* habituels, adjoints à gauche et à droite de $u^* : \mathcal{M}(I') \longrightarrow \mathcal{M}(I)$.

On sait bien que l'existence de ces foncteurs pour u donné, fait appel à l'existence de certaines $\varinjlim$ resp. $\varprojlim$ dans $\mathcal{M}$; p.ex. si $I' = e$, il est nécessaire et suffisant que les $\varinjlim$ (resp. $\varprojlim$) de type I° soient représentables dans $\mathcal{M}$. Mais avec les hypothèses faites sur $\mathcal{M}$, il n'y a pas de problème si $u : I \longrightarrow I'$ est un foncteur entre catégories *finies.* On va donner un exemple où il n'en est plus ainsi. [page 44]

Exemple 3.11. Soit k un anneau commutatif, et $\mathcal{M} = K^{\mathrm{b}}(k\text{-Ab})$ la catégorie des complexes de cochaînes bornés de k-modules, W l'ensemble des quasi-isomorphismes, donc

$$\mathrm{Ho}_W \;=\; D^{\mathrm{b}}(k\text{-Ab})\ ,$$

catégorie dérivée bornée de la catégorie abélienne des k-modules. On sait, en utilisant l'existence d'assez de projectifs dans k-Ab, que cette structure est associée à une structure de Quillen close (W, C, F), décrite par QUILLEN dans Homotopical Algebra – à cela près qu'il prend $D^-(k)$ au lieu de $D^{\mathrm{b}}(k)$. Peut-être, pour vérifier les axiomes, doit-on supposer que k est de dimension cohomologique finie. [page 45]

Prenons $I = B_G$, où G est un groupe (p.ex. $G = \{\pm 1\}$), et $u : I \longrightarrow e$. Alors $\mathcal{M}(I)$ est la catégorie des complexes bornés de $k[G]$-modules. On voit que $u_!^W$ resp. u_*^W existe si et seulement si pour tout tel complexe borné, ou simplement pour un $k[G]$-module sans plus M, le complexe $L\Gamma^G(M)$ resp. $R\Gamma_G(M)$ appartient à $D^{\mathrm{b}}(k)$, ou ce qui revient au même, si et seulement si on a p. 25

$$\begin{aligned} H_i(G, M) \;&=\; 0 \quad \text{pour } i \gg 0\ , \\ \text{resp.} \quad H^i(G, M) \;&=\; 0 \quad \text{pour } i \gg 0\ , \end{aligned}$$

pour tout $k[G]$-module M. Ce n'est pratiquement jamais le cas ; quand on prend p.ex. $k = \mathbf{Z}$ et G groupe fini, cela n'est le cas que si $G = e$. L'exemple le plus économique me paraît $G = \pm 1$, $k = \mathbf{F}_2$.

Donc ici $u_!^W$ et u_*^W n'existent pas, pour $I \longrightarrow e$ avec I catégorie finie. Mais aussi $\mathcal{M}$ n'est pas stable par petites $\varinjlim$. [page 46]

Exemple 3.12. Soit $\mathcal{M}$ une catégorie muni d'un localiseur W fortement saturé, tel que $\mathcal{M} \longrightarrow \underbrace{\mathcal{M}W^{-1}}_{=\mathcal{H}}$ admette un adjoint – à gauche disons. On a donc une situation de deux foncteurs adjoints

$$\mathcal{H} \underset{v^*\ \text{localisation}}{\overset{v_!\ \text{pleinement fidèle}}{\rightleftarrows}} \mathcal{M}\ , \tag{3.12.1}$$

et $W = (v^*)^{-1}(\mathrm{Iso}(\mathcal{H}))$. On trouve que pour toute I dans Cat, on a

$$\mathrm{HO}_W(I) \;\simeq\; \mathcal{H}(I) \overset{\text{déf}}{=} \mathrm{Hom}(I^\circ, \mathcal{H}). \tag{3.12.2}$$

On peut donc songer à faire un exemple où dans $\mathcal{M}$ les petites $\varinjlim$ et $\varprojlim$ existent, mais non dans $\mathcal{H}$, de sorte que les $u_!^W$ ou u_*^W n'existent pas toujours. Mais ce semble difficile à construire, vu que dans la situation envisagé, on voit facilement que les petites $\varprojlim$ existent dans $\mathcal{H}$. Donc si dans $\mathcal{H}$ il existe une petite famille cogénératrice (et pour ceci, il suffit qu'une telle famille existe dans $\mathcal{M}$), il y aura également des petites $\varinjlim$, en vertu de SGA 4 I 8.12.7. De même, elles existent si $\mathcal{H}$ est une sous-catégorie pleine de $\mathcal{M}$ *stable par petites* $\varinjlim$, et il paraît pratiquement impossible de faire un exemple (3.12.1) sans que $\mathcal{H}$ ait cette propriété de stabilité. Sans compter qu'il y a même la perplexité suivante : [page 47]

Question 3.13. *Existe-t-il une* $\mathfrak{U}$*-catégorie (*$\mathfrak{U}$ *un univers donné) où les petites* $\varinjlim$ *soient représentables, sans qu'il en soit de même des petites* $\varprojlim$ *?* **N.B.** Une telle catégorie ! | [page 48]

n'admet pas de petite famille génératrice, a fortiori elle n'est pas équivalente à une petite catégorie.

Question 3.14. Anderson prétend que pour le prédérivateur défini par une catégorie à cofibrations satisfaisant l'axiome Cof_4 transfini, les foncteurs $u_!^W$ existent. Sa démonstration est totalement canulée, néanmoins je n'arrive pas à faire de contre-exemple. Le résultat qu'il annonce serait-il vrai ? Je ne connais pas même d'exemple d'un localiseur W, dans une catégorie $\mathcal{M}$ *avec petites* $\varinjlim$ *et petites* $\varprojlim$ *,* tel que $u_!^W$ ou u_*^W n'existent pas toujours – mais je suis persuadé qu'il y a des exemples (même avec $\mathcal{M}$ une petite catégorie ?). J'en suis moins convaincu si on suppose W stable par $\varinjlim$ filtrantes, et au besoin, de plus, que les éléments de $\mathcal{M}$ sont accessibles (plus éventuellement d'autres propriétés catégoriques anodines sur $\mathcal{M}$, telles l'existence d'une filtration cardinale etc.) p. 26

Question 3.15. Cela me ramène à la question particulièrement élusive et irritante, [page 49] de l'existence des petits ensembles Q-générateurs, dans une partie Φ de $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$, quand on suppose (disons) que $\mathcal{M}$ est stable par petites $\varprojlim$, que ses éléments sont accessibles et qu'il admet une filtration cardinale. Ainsi on a la question : une partie L-accessible de $\mathrm{Fl}(\mathcal{M})$, qu'on suppose au besoin Q-saturé à gauche (ou ce qui revient au même, contenant les isomorphismes, et stable par cochangement de base, par composition et par facteurs directs) admet-elle une *petite partie* Φ_0 Q-génératrice à gauche ?

D'autre part, je n'ai pas à présent construit un seul exemple d'un couple $\Phi \longleftrightarrow \Psi$, ! | dans une catégorie $\mathcal{M}$, qui ne soit factorisant ! Le cas où $\mathcal{M}$ est spéciale, était bien sûr le plus intéressant. Visiblement, dans tout ça ce sont les exemples qui manquent. Le clef [page 50] d'une compréhension semble bien être dans les questions de factorisation entre ensembles $\Phi \longleftrightarrow \Psi$. Il faudrait en faire une étude systématique, mais je recule devant la perspective d'une digression qui me prendrait peut-être encore des semaines !