[scan 446]

$$\begin{array}{lcc}
\dim 3 & \begin{array}{c}\underline{\mathrm{Cent}}(\mathcal{M}^{\circ}_{\rho,\sigma}) = R^{\circ}_{\rho,\sigma} \\ \simeq ST_\rho \times ST_\sigma \times G_m \\ \uparrow \end{array} & \begin{array}{c} \\ \xhookrightarrow[(\text{quotient } \mu_2\times\mu_2)]{} \\ \end{array} \quad \begin{array}{c} R_{\rho,\sigma} \\ \simeq S'T_\rho \times SN'_\sigma \times G_m \\ \uparrow \end{array} & \dim 3 \\
\dim 2 & \begin{array}{c}\underline{\mathrm{Cent}}(\mathcal{M}_{\rho,\sigma}) \cap \mathcal{M}^{\circ}_{\rho,\sigma} \\ = ST_\rho \times \mu_2 \times G_m \end{array} & \xhookrightarrow[(\text{quotient } \mu_2)]{} \quad \begin{array}{c}\underline{\mathrm{Cent}}(\mathcal{M}_{\rho,\sigma}) \\ \simeq S'T_\rho \times SN'_\sigma\mu_2 \times G_m) \end{array} & \dim 2
\end{array}$$

[scan 574]


sg|sgn
(8)
$\mathcal{G}^{+\wedge}$
$\mathcal{G}_3$
groupe symétrique
à trois lettres
$= \mathcal{G}^{+\wedge}/$
$\widehat{\Pi}$
image
inverse
de $\Pi^{\wedge}_{0,3}$
dans $\mathcal{G}^{+\wedge}$
signature
d'une perm.
$\{\pm 1\}$



(62)

$\|$

$\{1, \tau'\} \,.\, \mathcal{G}^+$

[scan 637]

(37)


$\mathcal{M}^0(-\bar{j})$
$\mathcal{M}'(-\bar{j})$
$= Z^!_{\rho,0}$
$\mathcal{M}'(-\bar{j}) \times \mu$
Z_ρ
$\mathcal{M}'(-\bar{j}) \times \mu$
$\mathcal{M}'''(-\bar{j})$
$\mathcal{M}'''(-\bar{j}) \times \mu$
$\mathcal{N}^?_\rho$
$\mathcal{N}^*_\rho$
1
μ
L_ρ
$\mu_{\tau'}$
$\mathbb{D}_{\tau'}$
$\mathbb{D}_\rho$
2
3

[scan 638]


Z_ρ
$\mathcal{N}^*_\rho$
$Z^!_{\rho,0} = \mathcal{M}'(-\bar{j})$
$\mathcal{M}'(-\bar{j}) \cdot \mu_{\tau'}{}^*$
$Z^!_\rho = \mathcal{M}'(-\bar{j}) \times \mu$
$\mathcal{N}^?_\rho$
$\mathcal{M}^0(-\bar{j})$
$\mathcal{M}'''(-\bar{j})$
Z_ρ
$\mathcal{N}_\rho | \mathcal{N}^*_\rho$
$\mathcal{M}^0(-\bar{j}) \times \mu$
$\mathcal{M}'''(-\bar{j}) \times \mu$
$\mu_{\tau'}$
(38)
μ
$\mathbb{D}_{\tau'}$
L_ρ
$\mathbb{D}_\rho$
L_ρ
$\mathbb{D}_\rho$