Preceding material.

Théorème Si Sous les conditions précédentes
m1

Note marginale. m1

($\mathcal{G}$ groupe discret métabélien, G schéma en groupes loc. de prés. finie sur schéma de base S), l'application canonique (61) est bijective si on suppose de plus, pour ne pas me|se fatiguer, que injective, et a comme image l'ens. des hom. quasi-unipotents de $\mathcal{G}$ dans $G(S)$ — du moins si on suppose, pour nous simplifier l'existence, que S est noeth. et G affine sur $S|S_0$.

Preceding material.

Théorème [d1] Sous les conditions précédentes
[m2]

Note marginale. [m2]

($\mathcal{G}$ groupe discret métabélien, G schéma en groupes loc. de prés. finie sur schéma de base S), l'application canonique (61) est [d2] injective, et a comme image[i1] l'ens. des hom. quasi-unipotents de $\mathcal{G}$ dans $G(S)$ — du moins si on suppose, pour nous simplifier l'existence, que S est noeth. et G affine sur $S|S_0$.

Preceding material.

Théorème † Sous les conditions précédentes
m3

Note marginale. m3

($\mathcal{G}$ groupe discret métabélien, G schéma en groupes loc. de prés. finie sur schéma de base S), l'application canonique (61) est † injective, et a comme image l'ens. des hom. quasi-unipotents de $\mathcal{G}$ dans $G(S)$ — du moins si on suppose, pour nous simplifier l'existence, que S est noeth. et G affine sur $S|S_0$.

Preceding material.

Théorème Si Sous les conditions précédentes
m4

Note marginale. m4

($\mathcal{G}$ groupe discret métabélien, G schéma en groupes loc. de prés. finie sur schéma de base S), l'application canonique (61) est bijective si on suppose de plus, pour ne pas me|se fatiguer, que injective, et a comme image l'ens. des hom. quasi-unipotents de $\mathcal{G}$ dans $G(S)$ — du moins si on suppose, pour nous simplifier l'existence, que S est noeth. et G affine sur $S|S_0$.

Preceding material.

Théorème [d1] Sous les conditions précédentes
[m5]

Note marginale. [m5]

($\mathcal{G}$ groupe discret métabélien, G schéma en groupes loc. de prés. finie sur schéma de base S), l'application canonique (61) est [d2] injective, et a comme image[i1] l'ens. des hom. quasi-unipotents de $\mathcal{G}$ dans $G(S)$ — du moins si on suppose, pour nous simplifier l'existence, que S est noeth. et G affine sur $S|S_0$.

Preceding material.

Théorème † Sous les conditions précédentes
m6

Note marginale. m6

($\mathcal{G}$ groupe discret métabélien, G schéma en groupes loc. de prés. finie sur schéma de base S), l'application canonique (61) est † injective, et a comme image l'ens. des hom. quasi-unipotents de $\mathcal{G}$ dans $G(S)$ — du moins si on suppose, pour nous simplifier l'existence, que S est noeth. et G affine sur $S|S_0$.

Preceding material.

Théorème Si Sous les conditions précédentes
m7

Note marginale. m7

($\mathcal{G}$ groupe discret métabélien, G schéma en groupes loc. de prés. finie sur schéma de base S), l'application canonique (61) est bijective si on suppose de plus, pour ne pas me|se fatiguer, que injective, et a comme image l'ens. des hom. quasi-unipotents de $\mathcal{G}$ dans $G(S)$ — du moins si on suppose, pour nous simplifier l'existence, que S est noeth. et G affine sur $S|S_0$.

Preceding material.

Théorème [d1] Sous les conditions précédentes
[m8]

Note marginale. [m8]

($\mathcal{G}$ groupe discret métabélien, G schéma en groupes loc. de prés. finie sur schéma de base S), l'application canonique (61) est [d2] injective, et a comme image[i1] l'ens. des hom. quasi-unipotents de $\mathcal{G}$ dans $G(S)$ — du moins si on suppose, pour nous simplifier l'existence, que S est noeth. et G affine sur $S|S_0$.

Preceding material.

Théorème † Sous les conditions précédentes
m9

Note marginale. m9

($\mathcal{G}$ groupe discret métabélien, G schéma en groupes loc. de prés. finie sur schéma de base S), l'application canonique (61) est † injective, et a comme image l'ens. des hom. quasi-unipotents de $\mathcal{G}$ dans $G(S)$ — du moins si on suppose, pour nous simplifier l'existence, que S est noeth. et G affine sur $S|S_0$.