[scan 252]

(75)

$$[columnsep = small]1 \longrightarrow \Pi_{g,\nu} \longrightarrow \widetilde{A}_{g,\nu} \xrightarrow{p} A_{g,\nu} \longrightarrow 1$$

$$1 \longrightarrow A^{\circ}_{g,\nu} \longrightarrow \widetilde{A}_{g,\nu} \longrightarrow \Gamma'_{g,\nu+1} \longrightarrow 1$$

$$[columnsep = small]1 \longrightarrow (A^{\circ}_{g,\nu} \times | \rtimes \Pi_{g,\nu}) \longrightarrow \widetilde{A}_{g,\nu} \longrightarrow \Gamma_{g,\nu} \longrightarrow 1$$

[scan 252]

(75)

$$1 \to \Pi_{g,\nu} \to \widetilde{A}_{g,\nu} \xrightarrow{p} A_{g,\nu} \longrightarrow 1$$

$$1 \to A^{\circ}_{g,\nu} \to \widetilde{A}_{g,\nu} \to \Gamma'_{g,\nu+1} \to 1$$

$$1 \to (A^{\circ}_{g,\nu} \times | \rtimes \Pi_{g,\nu}) \to \widetilde{A}_{g,\nu} \to \Gamma_{g,\nu} \to 1$$

[scan 252]

(75)

$$[columnsep = small]1 \longrightarrow \Pi_{g,\nu} \longrightarrow \widetilde{A}_{g,\nu} \xrightarrow{p} A_{g,\nu} \longrightarrow 1$$

$$1 \longrightarrow A^{\circ}_{g,\nu} \longrightarrow \widetilde{A}_{g,\nu} \longrightarrow \Gamma'_{g,\nu+1} \longrightarrow 1$$

$$[columnsep = small]1 \longrightarrow (A^{\circ}_{g,\nu} \times | \rtimes \Pi_{g,\nu}) \longrightarrow \widetilde{A}_{g,\nu} \longrightarrow \Gamma_{g,\nu} \longrightarrow 1$$

[scan 252]

(75)

$$1 \to \Pi_{g,\nu} \to \widetilde{A}_{g,\nu} \xrightarrow{p} A_{g,\nu} \longrightarrow 1$$

$$1 \to A^{\circ}_{g,\nu} \to \widetilde{A}_{g,\nu} \to \Gamma'_{g,\nu+1} \to 1$$

$$1 \to (A^{\circ}_{g,\nu} \times | \rtimes \Pi_{g,\nu}) \to \widetilde{A}_{g,\nu} \to \Gamma_{g,\nu} \to 1$$

(75) [scan 252]

$$[columnsep = small]1 \longrightarrow \Pi_{g,\nu} \longrightarrow \widetilde{A}_{g,\nu} \xrightarrow{p} A_{g,\nu} \longrightarrow 1$$

$$1 \longrightarrow A^{\circ}_{g,\nu} \longrightarrow \widetilde{A}_{g,\nu} \longrightarrow \Gamma'_{g,\nu+1} \longrightarrow 1$$

$$[columnsep = small]1 \longrightarrow (A^{\circ}_{g,\nu} \times | \rtimes \Pi_{g,\nu}) \longrightarrow \widetilde{A}_{g,\nu} \longrightarrow \Gamma_{g,\nu} \longrightarrow 1$$

(75) [scan 252]

$$1 \to \Pi_{g,\nu} \to \widetilde{A}_{g,\nu} \xrightarrow{p} A_{g,\nu} \longrightarrow 1$$

$$1 \to A^{\circ}_{g,\nu} \to \widetilde{A}_{g,\nu} \to \Gamma'_{g,\nu+1} \to 1$$

$$1 \to (A^{\circ}_{g,\nu} \times | \rtimes \Pi_{g,\nu}) \to \widetilde{A}_{g,\nu} \to \Gamma_{g,\nu} \to 1$$